

BOOK RECEIVED

Hutterer R., Happold D. C. D., 1983. The Shrews of Nigeria (Mammalia: Soricidae). Bonner Zoologische Monographien, nr. 18. Zool. Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn, str. 79, Cena 15 DM.

Praca jest taksonomicznym studium 24 współcześnie znanych w Nigerii gatunków ryjówkowatych z rodzajów *Sylvisorex*, *Suncus* i *Crocidura*. Zawiera klucze do oznaczania gatunków po cechach zewnętrznych i po czaszkach, ilustracje czaszek w trzech podstawowych normach oraz diagnozy, wymiary, rozmieszczenie, uwagi do biologii. Autorzy sugerują, że możliwe jest występowanie co najmniej czter-nastu dalszych gatunków (w tym przestawicielei dwu nowych rodzajów), żyjących aktualnie w pobliżu granic Nigerii. To wielkie bogactwo tej grupy ssaków wynika po części ze znacznego, strefowego układu szaty roślinnej Nigerii. Autorzy wstępnie proponują podział fauny *Soricidae* Nigerii wg głównych typów roślinności, lecz nie wszystkie gatunki mogą być jednoznacznie zaszeregowane do danego krajo-brazu.

O zróżnicowaniu fauny ryjówkowatych tego obszaru świadczy też ogromna zmienność wymiarów poszczególnych gatunków, których np. długości ciała mieszczą się między 30—40 mm (*Suncus etruscus*) a 140—150 mm (*Crocidura odorata* i *C. manni*).

Jest to pierwszy systematyczny przegląd tej bogatej, choć niezbyt licznie występującej (3—7% wszystkich *Micromammalia*) grupy drobnych ssaków nigeryjskich. Zgromadzenie pokaźnych materiałów (n=601 okazów) i wykazanie obecności na tym terenie dwa razy większej liczby gatunków niż to było dotychczas wiadome, jest poważnym sukcesem. Tym niemniej autorzy zdają sobie sprawę ze wstępnego charakteru ich badań, wskazują na potrzebę dalszych poszukiwań i konieczność pogłębienia wiedzy o ekologii *Soricidae* Nigerii i innych regionów Afryki.

Z.P.