



Deutschland's
nützliche und schädliche Vögel



Tafeln

Nr. Inv. 3298

Stadu

Polska

2298

K 110/82

100,-

Deutschland's nützliche und schädliche Vögel.

Zu Unterrichtszwecken

und für

Landwirte, Forstleute, Jäger und Gärtner, sowie alle Naturfreunde

dargestellt auf

Zweiunddreissig Farbendrucktafeln.



Unter Mitwirkung eines Zoologen herausgegeben

von

Dr. Hermann Fürst,

Kgl. Oberforstrat und Direktor der Forstlehranstalt in Aschaffenburg.

Nebst einem Textband.

BERLIN.
VERLAG VON PAUL PAREY
Verlagshaus für Technik, Naturwissenschaften und Künste.
SW. 40 Heidestraße 10
1884.



2292

Inhalt der Tafeln.

Tafel I. Die Meisen (Paridae).

1. Die Habenmeise (*Parus cristatus*). — 2. Die Tannenmeise (*Parus niger*). — 3. Die Kohlmeise (*Parus major*). — 4. Die Blaumeise (*Parus caeruleus*). — 5. Die Beutelemeise (*Parus pendulinus*). — 6. Die Sumpfmeise (*Parus palustris*). — 7. Die Bartmeise (*Parus barbatus*). — 8. Die Schwanzmeise (*Parus caudatus*).

Tafel II. Die Würger (Laniidae).

1. Der grosse oder grane Würger (*Lanius excubitor*). — 2. Der kleine graue oder Schwarzschnäbelwürger (*Lanius minor*). — 3. Der rotköpfige Würger (*Lanius rufus Bris.*) — *ruficeps*, *Bachstator*. — 4. Der rotstrückige Würger (*Lanius collurio*).

Tafel III. Die Drosseln (Turdidae).

1. Die Misteldrossel (*Turdus viscivorus*). — 3. Die singdrossel (*Turdus viscivorus*). — 4. Die Rotdrossel (*Turdus iliacus*). — 7. Die Steinadressel (*Turdus saxatilis*).

Tafel IV. Die Drosseln (Turdidae).

1. Der Wacholderdrossel (*Turdus philomelos*). — 5. Die Ringdrossel (*Turdus torquatus*). — 6. Die Schwarzdrossel (*Turdus merula*).

Tafel V. Spechte.

1. Der Grünspecht (*Picus viridis*). — 2. Der Grasenspecht (*Picus viridis*). — 3. Der Buntspecht (*Dendrocopos major*). — 4. Der weissrückige Buntspecht (*Dendrocopos leucotos*).

Tafel VI. Spechte, Baumläufer, Wendehals.

1. Der Schwarzspecht (*Dryocopus martius*). — 2. Der mittlere Buntspecht (*Dendrocopos medius*). — 3. Der kleine Buntspecht (*Dendrocopos minor*). — 4. Der Kleiber (*Sitta europaea*). — 5. Der Baumläufer (*Certhia familiaris*). — 6. Der Wendehals (*Jynx torquilla*).

Tafel VII. Kukuksvögel.

1. Der Kukuk (*Cuculus canorus*). — 2. Der Wiedehopf (*Upupa epops*). — 3. Die Blauzacke (*Coracias garrulus*).

Tafel VIII. Schwäbchen und Segler, Nachtschwäbchen.

1. Die Rauchschwärche (*Hirundo rustica*). — 2. Die Meltschwalbe (*Chlidonias urbis*). — 3. Die Uferschwalbe (*Civivola riparia*). — 4. Der Mauersegler (*Cypselus apus*). — 5. Die Nachschwalbe (*Caprimulgus europaeus*).

Tafel IX. Rabenvögel.

1. Kalkräke (*Corvus corone*). — 2. Nebelkräke (*Corvus cornix*). — 3. Saatkräke (*Corvus frugilegus*). — 4. Dohle (*Columba oenas*).

Tafel X. Rabenvögel.

1. Kalkräke (*Corvus corax*). — 2. Elster (*Pica pica*). — 3. Eichhäher (*Garrulus glandarius*). — 4. Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*). — 5. Rabenkräke (*Corvus frugilegus*).

Tafel XI. Star, Rosenstar, Piro, Eisvogel.

1. Star (*Sturnus vulgaris*). — 2. Rosenstar (*Pastor roseus*). — 3. Piro (*Oriolus galbula*). — 4. Eisvogel (*Alcedo atthis*).

Tafel XII. Tauben, Steppenhuhn.

1. Ringeltaube (*Columba palumbus*). — 3. Hohtaupe (*Columba eversmanni*). — 3. Tureltaube (*Turtur communis*). — 4. Haustaube (*Columba livia*). — 5. Steppenhuhn (*Syrinx paradoxus*).

Tafel XIII. Sperlingsartige Vögel.

1. Seidenschwanz (*Bombycilla garrula*). — 2. Haubenderle (*Galerita cristata*). — 3. Schneeannehmer (*Calandria nivalis*). — 4. Goldammer (*Emberiza citrinella*). — 5. Berggrink (*Fringilla montifringilla*). — 6. Feldsperrling (*Passer montanus*).

Tafel XIV. Sperlingsartige Vögel.

1. Gartennanner (*Emberiza hortulana*). — 2. Graumümer (*Emberiza calandra*). — 3. Rohrnammer (*Emberiza schoeniclus*). — 4. Kirschköpfchenweiser (*Coccothraustes vulgaris*). — 5. Heidelärche (*Alauda arvensis*).

Tafel XV. Sperlingsartige Vögel.

1. Giritz (*Serinus helianthus*). — 2. Stieglitz (*Carduelis elegans*). — 3. Buchfink (*Fringilla coelebs*). — 4. Kirschköpfchenweiser (*Coccothraustes vulgaris*). — 5. Haussperling (*Passer domesticus*).

Tafel XVI. Sperlingsartige Vögel.

1. Fichtenkronenzahnel (*Loxia curvirostra*). — 2. Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*). — 3. Blauhälfing (*Acanthis cannabina*). — 4. Zelbig (*Chrysomitra spinus*).

Tafel XVII. Sperlingsartige Vögel.

1. Weisse Bachstelze (*Metacilla alba*). — 2. Graue Bachstelze (*Metacilla melanope*). — 3. Gelbe Bachstelze (*Badys flavus*). — 4. Wassersessel (*Cinclodes merula*). — 5. Teichrösinger (*Aerocephalus palustris*). — 6. Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus stercusmuscarum*). — 7. Wasserpipter (*Anthus spinoletta*).

Tafel XVIII. Sperlingsartige Vögel.

1. Nachtigall (*Erythacus lesueuri*). — 2. Blankelichen (*Erythacus cyanescens*). — 3. Rotkehlchen (*Erythacus rubecula*). — 4. Gartenrotschwanz (*Erythacus phoenicurus*). — 5. Hansrotschwanz (*Erythacus tytus*).

Tafel XIX. Sperlingsartige Vögel.

1. Gelbkopfiges Goldlälbchen (*Regulus cristatus*). — 2. Fenerküppiges Goldlälbchen (*Regulus ignicapillus*). — 3. Zankönig (*Trochocercus polytmus*). — 4. Steinschmätzer (*Saxicola oenanthe*). — 5. Brannkehlchen (*Pratincola rubetra*). — 6. Schwarzkehlchen (*Pratincola rubicola*).

Tafel XX. Sperlingsartige Vögel.

1. Garngansmücke (*Sylvia hortensis*). — 2. Dorngrasmücke (*Sylvia rupestris*). — 3. Mönchsgansmücke (*Sylvia atricapilla*). — 4. Heckengansmücke (*Accipiter nodularis*). — 5. Gartenlaubsänger (*Euphylax philomela*). — 6. Trauerfliegengänzer (*Muscicapa atricapilla*).

Tafel XXI. Tagraubvögel.

1. Gemeiner Bassard (*Buteo vulgaris*). — 2. Rauthaubenbassard (*Archibuteo lagopus*). — 3. Wespenbassard (*Pernis apivorus*).

Tafel XXII. Tagraubvögel.

1. Haliicht (*Aquila pallidioris*). — 1. Alter Vogel. — 2. Junger Vogel. — 3. Nestjunges.

Tafel XXIII. Wunderfalke und Sperber.

1. Wunderfalke (*Falco peregrinus*). — 2. Sperber (*Accipiter nisus*).

Tafel XXIV. Tagraubvögel.

1. Würgfalk (*Falco tinnuculus*). — 2. Zwergfalk (*Falco tinnuculus*). — 3. Lerchenfalk (*Falco subbuteo*).

Tafel XXV. Tagraubvögel.

1. Rotfussfalk (*Falco vespertinus*). — 2. Turnfalk (*Falco tinnunculus*).

Tafel XXVI. Tagraubvögel.

1. Gabelweihe (*Milvus regalis*). — 2. Schwarzer Milan (*Milvus migrans*).

Tafel XXVII. Weihen.

1. Rehrweide (*Circus aeruginosus*).

Tafel XXVIII. Weihen.

1. Wiesenweide (*Circus pygargus*). — 2. Kernweide (*Circus cyaneus*).

Tafel XXIX. Schleiereule, Adler.

1. Schleiereule — 2. Fischadler (*Pandion haliaetus*). — 3. Seeadler (*Balaeniceps albicapilla*). — 4. Steinadler (*Aquila chrysaetos*).

Tafel XXX. Nachtraubvögel.

1. Chu (*Bubo igneus*). — 2. Zwergohreule (*Pisorhina scops*). — 3. Waldohreule (*Asio otus*). — 4. Sumpfohreule (*Asio accipitrinus*).

Tafel XXXI. Eulen.

1. Der Rauhfußkauz (*Nyctale tengmalmi*). — 2. Der Stein-Kauz (*Carne noctua*). — 3. Der Waldkauz (*Syruina aluco*). — 4. Sperlingskauz (*Carne passerina*).

Tafel XXXII. Schneepfen.

1. Waldschneepfe (*Scopsax rusticola*). — 2. Kleine Sumpfschneepfe (*Gallinago gallinago*). — 3. Bekassine (*Gallinago caelata*). — 4. Große Sumpfschneepfe (*Gallinago major*).



Verlag von Paul Parey in Berlin SW, 10 Heddernstrasse Siberia Czubatka

sosnowka

bog. kru

Sikors medra

1. Die Haubenmeise (Parus cristatus L.). 2. Die Tannenmeise (Parus ater L.). 3. Die Kohlmeise (Parus major L.). 4. Die Blaumeise (Parus caeruleus L.). 5. Die Beutelmeise (Parus pendulinus L.).

6. Die Sumpfmeise (Parus palustris L. — Fruticeti Wallgr.). 7. Die Bärtmeise (Parus biarmicus L.). 8. Die Schwanzmeise (Parus caudatus L.).











Verlag von Paul Parey in Berlin SW₄, 10 Hedemannstrasse.

1. Der Kukuk, *Cuculus canorus*. 2. Der Wiedehopf, *Upupa epops*. 3. Die Blauradie, *Coracias garrula*. 1_a Ei des Braunkehlchens, 1_b des Schildrohrsängers, 1_c des Baumpiepers,
1_d des Hausröthschwanzes. (Eier in ganzer Größe).





































1. Rötelfußfalken, Falco vespertinus. 2. Turmfalke, Falco tinnunculus.



















E № 004559



Polska Akademia Nauk
Biblioteka Instytutu Matematycznego
Sygnatura 202298

