

1626

Fennebaum



S. 1025.

## Coleoptères nouveaux.

Par

S. Solsky.

**Haliphus Schaumi:** *ovatus, nitidus, ferrugineus, antennis pedibusque ferrugineo-testaceis; elytris punctato-striatis concoloribus seu plus minusve fusco-maculosis, striarum interstitiis parumpunctatis.* Long.  $2\frac{1}{2}$  mlm.

De la forme et de la taille du *H. fluvialilis* Aub., auquel il ressemble aussi beaucoup par la ponctuation de la tête, des élytres et du corselet, qui est seulement un peu plus rétréci en avant, par conséquent plus triangulaire, mais présente également de chaque côté de la base une courte impression longitudinale, limitée extérieurement par un repli. Tout l'insecte est ferrugineux avec les antennes et les pattes plus testacées, les élytres sont concolores ou bien ornées sur le côté de taches plus ou moins foncées, nébuleuses, confluentes et formant quelques fois une assez large bande longitudinale noirâtre, située le long du bord extérieur, qu'elle ne touche cependant pas. Tout le reste est exactement comme dans le *H. fluvialilis* Aub.

Plusieurs individus de cette espèce, que je n'ai trouvée dans aucune collection et dans aucun ouvrage, m'ont été envoyés par mon ami M. Lange, qui les a découverts près de la ville de Koslow, dans la Russie orientale.

Inst. doś. 20236  
5.9.50 Jg.

**Philonthus rubiginosus:** *Nigro-piceus, nitidus, sub-*  
*tus rufescens, antennais, elytrorum sutura, abdomine versicolore apice*  
*segmentorumque ventralium marginibus, piceo-rufis; pedibus fer-*  
*rugineis. Thoracis seriebus sexpunctatis.* Long. 8.—9 mm.

Cette espèce dont la place est près des *Ph. fumarius* et *nigrita* est d'un noir de poix luisant en dessus, plus claire en dessous, surtout sur le corselet qui y est presque ferrugineux. La tête en oval oblong, à côtés subparallèles, un peu moins large que le devant du corselet, lisse, luisante avec des points assez profonds, mais peu serrés sur les côtés du front et derrière les yeux; deux points plus gros disposés transversalement, se trouvent de chaque côté sur le devant du front près du bord interne des yeux. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du corselet, assez grêles; articles 2 et 3 allongés, ce dernier un peu plus long que le précédent, les autres égaux en largeur, mais graduellement plus courts, les premiers plus longs que larges, les tout derniers aussi larges que longs; article 11 tronqué et échancré à l'extrémité. Elles sont d'un rouge brunâtre avec la base ferrugineuse, ainsi que les parties de la bouche. Corselet plus long que large, rétréci en avant à côtés très faiblement arrondis; les angles antérieurs obtus et arrondis à l'extrémité, rougeâtres, les postérieurs à peine marqués. Les points des séries dorsales au nombre de six, assez gros et profonds, mais pas toujours régulièrement disposés; en dehors de ces séries six autres points plus petits, dont trois sont disposés en ligne parallèle aux séries dorsales et les trois autres en triangle, dans l'angle antérieur du corselet. Ecusson triangulaire densément et finement ponctué, pubescent. Elytres plus longues et plus larges que le corselet, obliquement tronquées vers la suture à leur extrémité; déprimées le long de la suture, qui est étroitement bordée d'un rouge de poix. Elles sont assez finement, densément ponctuées, un peu rugueuses, ce qui les rend plus terne que le reste du corps, couvertes ainsi que l'abdomen d'une très fine pubescence gri-

sâtre. Abdomen en dessus et en dessous très finement et assez densément ponctué très luisant, à reflets métalliques assez vifs; l'extrémité et les bords postérieurs des segments du ventre d'un rouge ferrugineux. Pattes ferrugineuses; tarses du mâle médiocrement dilatés, plus que ceux de la femelles.

L'avant dernier segment abdominal du mâle très faiblement sinué dans toute sa largeur avec une petite et faible échancrure, un peu déprimée, sur le milieu.

Egypte.

**Stenus pulchripes:** *Niger, nitidus, crebre-punctatus, albido-pubescentis, antennis validiusculis palpisque ferrugineis, apice fuscis, femoribus flavis, tibiis tarsisque rufis, genibus nigro-brunneis. Thorace cordato.* Long. 7 mlm.

Il ressemble beaucoup surtout par son corselet cordiforme et la structure des antennes au *St. cordatus*, près du quel et du *St. hospes* il doit aussi se placer. Il est moins grand surtout moins large que le *St. cordatus*, la pubescence est moins longue, les impressions du corselet et des élytres moins profondes, la ponctuation plus fine, les pattes plus claires. La tête de grandeur ordinaire, couverte de points assez forts et serrés, le front largement, mais peu profondément sillonné de chaque côté, l'interval régulièrement bombé, non caréné. Les antennes sont allongées, dépassant le bord postérieur du corselet, conformées comme celles du *St. cordatus*, mais encore plus fortes, avec la massue allongée faiblement marquée. Article 3 de moitié plus long que deux; tous les articles allongés cylindriques; les premiers ferrugineux, art. 1 et 2 noirâtres en dessus, les derniers bruns. Palpes allongés, d'un testacé ferrugineux, bruns à l'extrémité. Le corselet est presque deux fois moins large que les élytres, à peine plus long que large, les côtés fortement arrondis en avant; il est convexe, fortement et densément ponctué, rugueux, avec un faible sillon médian et deux légères impressions de chaque côté. Elytres beaucoup plus larges et plus longues que le corselet, ponctuées comme celui-

ci, moins rugueuses, à épaules saillantes, toruleuses en avant et le long de la suture. Abdomen graduellement rétréci vers l'extrémité, mais moins triangulaire que chez le *St. cordatus*, finement et assez densément ponctué, pubescent. Patte de longueur habituel, cuisses jaunes, noires à l'extrémité, hanches brunâtres; les jambes et les tarsi d'un testacé roussâtre, les premières plus foncés à la base.

Un individu de cette élégante espèce, qui figure parmi les plus grandes du genre, me fut envoyé par M. Becker, qui l'a pris aux environs de Sarepta.

**Dasytes callosus:** *Oblongus, convexus, dorso subdepressus, niger; capite thoraceque subtiliter granulato-rugulosis, opacis, elytris nitidis, crebre fortiter punctatis; antennarum basi tarsisque picescentibus.* Long. 4—5 mlm.

♂ *Antennis brevibus, gracilibus, articulis duobus primis majoribus, incrassatis, subaequalibus, primo cylindrico, secundo triangulari, 3 praecedenti brevior et multo angustiore conico, intus parum productis; sequentibus sensim longioribus et latioribus acute serratis, 7—10 inter se aequalibus; ultimo duobus praecedentibus longitudine fere aequali, ovato, apice obtuse acuminato. Abdomine segmento sexto apice subtruncato, leviter emarginato.*

♀ *Differt antennis minus serratis; articulo 3 secundo vix brevior sed multo angustiore cylindrico, articulo 4 hoc brevior, leviter subtrigono, 5 et 6 subaequalibus, trigonis, minus quam in mare productis, sequentibus ut in mare sed minus serratis. Elytris ante apicem spacio ovali subelevato laevissimo ornatis. Abdomine segmento ultimo rotundato.*

Oblong, convexe, un peu déprimé sur le dos, glabre en dessus (peut-être la pubescence, qui est propre plus ou moins, à tous les Dasytides, a-t-elle été enlevée, car tous les 12 individus que je possède ont été conservés dans de l'alcool),

très finement pubescent en dessous, noir, avec la base des antennes et les tarses brunâtres. Tête assez petite, finement et densément granuleusement chagrinée, sans impressions visibles, presque entièrement terne. Antennes courtes, dépassant un peu le bord postérieur du corselet, fines, conformées différemment dans les deux sexes comme il a déjà été dit plus haut. Le corselet transversal, d'un tiers à peine plus large que long, offrant la plus grande largeur près de la base, régulièrement rétréci en avant, avec les côtés arrondis et les bords latéraux très finement crénelés; la partie antérieure un peu plus large que la tête; le bord antérieur faiblement arrondi, le postérieur également arrondi et légèrement sinué de chaque côté avant les angles postérieurs qui sont aussi arrondis ainsi que les antérieurs; il est convexe chagriné comme la tête et terne comme celle-ci; chez quelques individus on aperçoit un faible et court sillon antéscutellaire. Ecusson arrondi en arrière, à peu près aussi long que large, rugueux. Elytres beaucoup plus larges que le corselet et 3 fois plus longues que celui-ci, à épaules saillantes; elles sont parallèles sur les côtés, arrondis à l'extrémité, l'angle sutural obtus; leur surface est assez luisante, très finement chagrinée et criblée de points assez gros, profonds et assez serrés; elles sont gibbeuses chacune séparément en avant près de l'écusson. Chez les femelles elles sont ornées en arrière un peu avant l'extrémité d'un espace ovale, un peu élevé, très lisse et très luisant, dont il n'existe pas même de traces chez les mâles. L'abdomen est luisant, très finement, pubescent finement chagriné, vaguement parcimonieusement pointillé. Pattes grêles, les genoux, les jambes et surtout les tarses brunâtres; tarses allongés à articles d'égal longueur, excepté le 4<sup>ème</sup>, qui est plus court que les autres.

Cette intéressante espèce, remarquable par l'ornement des élytres, approprié aux sexe féminin, a été découverte près de la ville de Samara par M. M. Link et Faust; c'est de ce dernier que j'ai obtenu toutes les femelles.

**Dasytiscus posticus:** *Elongatus, fusco-aeneus, sat dense subtiliter punctatus, flavescenti pubescens, nigro-pilosus; antennis moniliatis nigris basi ab art. 2, ferrugineis, elytrorum apice late, tibiis tarsisque testaceis.* Long.  $2\frac{1}{4}$ —3 mlm.

Allongé, peu convexe, d'un bronzé obscur, luisant, couvert d'une pubescence jaunâtre couchée, presque imperceptible sur le devant du corps, plus longue et plus abondante sur les élytres, et hérissé de poils noirs assez longs mais rares. Tête inclinée, rugueusement ponctuée, légèrement impressionnée de chaque côté sur le front, le long des yeux. Antennes assez courtes, dépassant à peine le bord postérieur du corselet chez la ♀, plus longues et plus fortes chez les ♂, moniliformes chez les premières, subpectinées et plus grêles chez les derniers, à articles égaux, graduellement plus gros vers l'extrémité; art. 3 conique et plus long que le suivant chez la ♀, à peine plus long que le suivant, faiblement conique chez les ♂; articles 2, 3 et 4 ferrugineux chez la ♀, bruns chez le mâle. Corselet plus large que la tête, ayant sa plus grande largeur plus près de la base, rétréci en avant, avec les côtés arrondis et finement rebordés ainsi que le bord postérieur, qui est arrondi et un peu sinué au milieu; il est muni de chaque côté d'un sillon arqué qui part de la base; il est convexe, luisant, finement assez doucement pointillée, hérissé de poils noirs plus abondants que sur le reste du corps. Elytres un peu plus larges que le corselet, à épaulures bien dessinées, subparallèles, assez finement, rugueusement et un peu indistinctement ponctuées, couvertes d'une pubescence jaunâtre assez longue, un peu redressée, mais pas serrée et parsemées de rares poils noirs; elles sont bronzées comme le reste du corps avec l'extrémité largement testacée. Cuisses noires de poix, les tibias et les tarses testacés.

J'ai trouvé quelques individus de cette espèce, en fauchant, en Algérie.

**Dasytiscus scutellaris:** *Oblongus, aeneus, tenuis, parce cinereo-pubescens et nigro-pilosus. Antennarum basi, elytris, ma-*

*cula triangulari circa scutellum excepta, tibiis tarsisque testaceis.*  
Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  mlm.

Allongé, un peu élargi en arrière, peu convexe, bronzé, luisant, finement parcimonieusement pubescent, hérissé de longs poils noirs clairsemés. Tête inclinée, ruguleusement ponctuée, avec une très faible impression de chaque côté, près du bord interne des yeux. Antennes dépassant à peine le bord postérieur du corselet, moniliformes, plus fortes vers l'extrémité, noires, les quatre premiers articles et le 5<sup>ème</sup> plus au moins, ferrugineux, le premier avec une grande tache noire en dessus; articles non alternants, le troisième un peu plus long que le 4, obconique. Corselet plus large que long, à peine plus large que la tête avec les yeux, aussi large en avant qu'en arrière, arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu de sa longueur, sans sillon creusé sur les côtés; sa surface est densément et finement pointillée. Écusson légèrement transversal. Elytres plus de trois fois aussi longues que le corselet, à épaules bien accusées, élargies vers la partie postérieure, conjointement arrondies à l'extrémité; elles sont testacées avec une tache triangulaire autour de l'écusson et une courte ligne subhumérale, bronzé, finement et assez densément rugueusement ponctuées. Cuisses d'un noir de poix avec les tibiais et les tarses testacés; les genoux également ferrugineux.

J'ai pris deux individus de cette espèce, en fauchant, en Algérie.

**Xyletinus tenebricosus:** *ater, obscurus, tenue griseo-puberulus, femoribus apice, tibiis tarsisque ferrugineis; thorace angulis posticis explanatis; elytris profunde striatis.* Long. 2—3 mlm.

Voisin des *X. ater* et *X. pectinicornis*, mais moins allongé que ce dernier et beaucoup moins robuste que le premier; d'un noir obscur, presque terne, recouvert d'une très fine pubescence

grisâtre, laineuse; les genoux, les tibiae et les tarses ferrugineux, ces derniers rembrunis. La tête de grandeur médiocre avec les yeux un peu saillants, l'épistome légèrement déprimé sur le devant; la surface de la tête est très finement et densément chagrinée comme celle de tout le reste du corps; les parties de la bouche rougeâtres, les antennes noires rougeâtre à la base. Elles sont pectinées, le premier article gros, le deuxième  $\frac{1}{3}$  du premiers, aussi long que large, conique, 3 de la longueur du précédent, mais plus large, fortement triangulaire en dedans, les autres pectinés, mais diminuant d'épaisseur vers l'extrémité. Le corselet beaucoup plus large que long, aussi large que les élytres à la base, rétréci en avant, les angles postérieurs presque nuls largement rebordés et le rebord un peu redressé en dehors. Les élytres sont près de trois fois aussi longues que le corselet parallèles, profondément striées, les intervals des stries légèrement convexes; la première strie est réunie à la dixième, la deuxième à la neuvième, les stries 3 et 8 n'atteignent pas la neuvième et renferment entre elles toutes les autres qui se réunissent parfois deux à deux, la 4 à la 5 et la 6 à la 7<sup>ème</sup>. Le dessous de la même couleur noire obscure.

Cette espèce qui se reconnaît facilement par la couleur noire obscure à teinte grisâtre de ses téguments et par ses antennes noires a été découverte par M. Lange près de la ville de Koslow.

**Pseudochina obscura:** *oblongo-ovata, convexa, nitida, piceo-nigra cinerco pubescens*. Long. 3—3 $\frac{1}{2}$  mlm.

De la grandeur et de la forme de *Ps. cyphonoides* Mrw., mais d'un noir de poix luisant, très finement chagriné recouvert d'un duvet cendré, court et un peu hérissé, semblable à celui qui revêt la *Ps. cyphonoides*. Quelques individus, ceux peut-être qui ne sont pas encore entièrement mûrs présentent à l'extrémité des élytres une teinte rougeâtre qui s'étend plus ou

moins le long des bords latéraux; les tibias avec les tarse et les antennes sont rougeâtres. Mais outre la couleur c'est principalement la conformation du corselet qui distingue cette espèce de celle qui a été décrite par M. F. Morawitz. Cet organe est plus convexe, plus allongé et moins brusquement rétréci en avant; le bord postérieur largement bisinué se recourbe peu à peu vers les angles antérieurs qui sont plus déclives que chez la *Ps. cyphonoïdes*, plus allongés, obtus au sommet; le rebord plus visible sur les côtés. Une dépressions transversale parallèle au bord antérieur et située vers le tiers antérieur de la longueur a pour effet que la partie du corselet comprise entre cette depression, qui finit dans la région post-oculaire, et le bord antérieur paraît un peu relevée et non tout à fait déclive. Pour tout le reste cette espèce ressemble à la *Ps. cyphonoïdes*.

Plusieurs individus de cette espèce m'ont été envoyés des environs de Sarepta, par M. Becker, dont les chasses ont déjà fourni un si grand nombre de nouveautés à l'Entomologie.



Besonders abgedruckt aus dem Vten Theile der Horae Societatis Entomologicae  
Rossicae. S. 29—37.

Въ типографіи В. Безобразова и Ком. (В. О., 8 Л., №. 45).

*J. Peterbolsing.*



1

11  
12  
13

