

### **15. *Betula oycoviensis* Bess. — Brzoza ojcowska**

Gatunek endemiczny dla flory polskiej, wykryty i opisany przez Bessera w 1809 r. (*Primitiae Florae Galiciae*, 2), blisko spokrewniony z *Betula verrucosa*. Ograniczony w swym występowaniu do kilku zaledwie stanowisk położonych w okolicach Krakowa. Podlega całkowitej ochronie.

Brzozie ojcowskiej poświęconych było szereg prac, zwłaszcza J. Jentys-Szaferowej (1928, Roczn. Polsk. Tow. Dendr., 2; 1953, Ochrona Przyrody, 21).

Species endemic to Polish flora discovered and described by Besser in 1809 (*Primitiae Florae Galiciae*, 2), remarkably near the *Betula verrucosa* in affinity. It is limited in its occurrence to only a few localities, lying in the vicinity of Kraków. It is under protection.

A number of works have been written about *Betula oycoviensis*, especially by J. Jentys-Szafer (1928 Roczn. Polsk. Tow. Dendr., 2; 1953, Ochrona Przyrody, 21).





Это эндемичный вид для польской флоры. Открыл его и описал в 1809 г. Бессер (*Primitiae Florae Galiciae*, 2) *B. oycoviensis* Bess. родственна *B. verrucosa*. Известен только несколькими местонахождениями, расположенными в окрестностях Krakowa. Этот вид находится под полной охраной.

Виду *B. oycoviensis* Bess. был посвящен ряд работ, в том числе работы Я. Ентий-Шафер (1928, Ежегодник польского дендрологического общества, 2; 1953, Охрана природы, 21).

#### STANOWISKA — LOCALITIES — МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

1. Dolina Karniowicka (1953, Jentys-Szaferowa, l. c.); Dolina Bolechowicka (J. Walas, 1935, Roczn. Polsk. Tow. Dendr., 6).
2. Dolina Prądnika, kolo Hamerni (Besser, 1809, l. c.)!!
3. Kobierzyn pod Krakowem (Berdau, 1859, Fl. Cracoviensis; Jentys-Szaferowa, 1928, l.c.)?
4. Tarnawa Dolna kolo Zembrzyc (Turalówna, 1957, Fragm. Fl. et Geobot., 3,1).







BELARUS DOCUMENTS BE 22

