



PANSTWOWE
MUZEUM ZOLOGICZNE
BIBLIOTEKA
Inw. Nr. K.1915.



ENUMERATIO LEPIDOPTERORUM HALICIAE ORIENTALIS

auctore

MAXIMILIANO SIŁA NOWICKI

LEOPOLIENSIS C. R. GYMNASII ACADEMICI PROFESSORE, VINDOBONENSIS
ZOOLOGICO-BOTANICAE SOCIETATIS MEMBRO.



LEOPOLI,

SUMPTIBUS AUCTORIS.

Typis Instituti Stauropigiani.

1860.

144164

МУЗЕУМ ПОДОБІСТВА
MUSEUM ZOOLOGICUM

БІБЛІОТЕКА
LIBRARY
K. 1915.

ІНДУСТРІЯ
INDUSTRY

ІНДУСТРІЯ ОРІЕНТАЛЬНА

ІНДУСТРІЯ

ІНДУСТРІЯ ОРІЕНТАЛЬНА

ІНДУСТРІЯ ОРІЕНТАЛЬНА

ІНДУСТРІЯ ОРІЕНТАЛЬНА

ІНДУСТРІЯ ОРІЕНТАЛЬНА

~~БІБЛІОТЕКА~~

ІНДУСТРІЯ ОРІЕНТАЛЬНА

ІНДУСТРІЯ

ІНДУСТРІЯ ОРІЕНТАЛЬНА

Biblioteka Muzeum i Inst. Zoologii PAN

K. 1915



100000000338.org.pl

Praefamen.

Praesente opella benevolis Lepidopterologiae Cultoribus tradō
Enumerationem lepidopterorum Haliciae orientalis,¹⁾ haud quidem
integralē et absolutam, sed tamen quod ad numerum specierum
adtinet, ita locupletem, ut eam aliis cum Faunis laudatis modeste
aemulari posse opiner.

Ne tamen hic meus labor, quo primus lepidoptera Haliciensis
in notitiam Orbis Entomologici perfero, injuste dijudicetur, nonnulla
pauca sunt praemonenda.

Sub hac Enumeratione elaboranda nullis adminiculis, quae
laborem sublevassent, laetari potui. Lepidoptera in eam introducta,
ego ipse, qui cognitione praedivitis insectorum Faunae nostrae Ha-
liciae ardeo, per integrum decennium, annis scilicet 1850. ad 1860.
sub excursionibus in loca propinquiora nec non sub spatiiosis itine-
ribus per Haliciam orientalem, meo Marte meisque sumptibus insti-
tutis, laboriose conquisiivi, comportavi, expansaque meis collectioni-
bus recondidi. Omni insuper emitens opera et huncce libellum con-
scripsi, eumque ad finem adduxi. Ea enim est conditio mei tempo-
ris, quod in negotiis publicis deinceps transigo, ut horas tantum
subsecivas, easque paucissimas, dilectissimae mihi scientiae sacrare
possum. Hoc etiam in causa fuit, cur optima voluntate observatio-
nes circa erucas, tempus earum vivendi, victum, mores, metamor-

¹⁾ In programmate Samboriensis Gymnasi anni 1858. primitias Faunae
Coleopterorum Haliciae orientalis in lucem edidi. Publicationem
reliquorum ordinum, qui restant intacti, in alium diem differo.

phosin aliaque hactenus paucissimas tantum fecerim easque hoc tempore silentio praeterire melius duxerim.

Mille ducentas species, ab anno 1850. usque ad annum 1856. collectas, anno 1857. Vindobonae ²⁾ adhibitis literarum subsidiis, quae ibidem inveneram, determinavi. Prae ceteris quamlibet speciem, nulla excepta, cum speciminibus originalibus collectionis lepidopterologicae Musei zoologici Palatini Vindobonensis exactissime vicibus iteratis comparavi morosoque subjeci scrutinio. Tum demum sensim sensimque summa cum diligentia pervolvi Hübneri, Herrieh-Schäfferi, Freyeri, Fischeri de Röslerstamm, Ochsenheimerii—Treitschki, Zelleri pleraque alia scientiae Heroum eximia opera separata exactosque tractatus solitariorum generum novarumve specierum variis Actis insertos.

Viris Amplissimis: **D. Josepho Mann**, Musei entomologiae Palatini Vindobonensis Custodi, Lepidopterologo experientissimo et indefesso, qui me non solum tempore dum viverem Vindobonae, consilio et opera libentissime adjuvabat, sed et nunc, omni fere subsidio literarum carentem, amicissime adjuvat, tum **D. Henrico Zimmermann**, Medico militari, Lepidopterologo ardore scientiae amplificandae nunquam senescenti, qui pretiosa Hübneri, Herrieh-Schäfferi, Freyeri, Fischeri de Röslerstamm opera tempore postremo mecum singulari favore et liberalitate Ei propria communicavit, quam maximas publice dico gratias.

Num species nudas cum solis citationibus Auctorum et annotationibus habitationis, temporis vigendi, vel insimul characteres specificos in hac Enumeratione afferrem, diu haesitavi. Quum vero adumbrationibus specierum cognitarum, quae et saepius repetitis descriptionibus adequare expositis atque figuris illustratis jam satis sunt elaboratae et stabilitae, Lectoribus vix quidquam novi utilisve adtulisse, ego ceteroquin id opusculum, propriis sumptibus editum, tam exiguo, quam fieri potuit, volumine dare voluerim, diagnoses us-

²⁾ Vide Celeberrimi Vincentii Kollar dissertationem „Ueber springende Cynips Gallen“ in Actis C.R. Zoolgico—Botanicae Societatis Vindobonensis, vol. VII.. pag. 513. Notissimus Hic orbi literario Entomologus meritissimus et nunquam obliviscendus, Fautor scientiae indefessus. Vir honestissimus, anno pristino premature e vita discessit. Sit Ei terra levis!

que ad Tineacearum genus Gelechiam plerasque omisi. Sed speciebus reliquorum hujus familiae generum, distinctu plerumque difficilioribus corporisque magnitudine minutissima individua continentibus, descripciones addere necessarium duxi. Usus sum hac ratione Excellentissimi Zelleri diagnosibus, quae in Linnaeae Entomologicae Stettinensis voluminibus I—XIII, et in Iside Okeni anni 1839. leguntur, quasque semper retinui immutatas, quoties et expositiones ampliores DD. Zelleri et Schäfferi in mea animalecula Haliciensia bene quadrabant. Omnes vero illas species, easque non paucissimas, de quibus in aliquo versabar dubio, ex natura fideliter ipse adumbrare conabar. Num vero mihi contigerit hac ratione semper optima et ex voto praestare, experientiori Lectori benevolo dijudicandum erit, quocum species dubias scopo literario communicare semper paratus ero.

In citatione Auctorum nec non in synonymis afferendis paucus fui, semper de eo sollicitus, ne in magnum volumen excresceret libellus. Tales solummodo Auctores citavi, quorum opera tempore postremo comparaveram, tum qui et optime et novissime species descripserunt atque depinxerunt ³⁾. Si tamen errores evitare non potuerim, vel si ambigua quoad species Micropterorum difficiles, post redditum Vindobona captas ⁴⁾ et cum collectionibus originariis non comparatas, sed operibus adjuvantibus determinatas, aliquando invitus attulerim, id benigne excusetur et non graviter in culpam mihi vertatur.

Ex reminiscientia in hoc opusculo nihil recepi, nec quod mihi ab aliis communicatum sit, sed striete illa tantum in eo di-

³⁾ In citatione horum Auctorum sequentibus usus sum abbreviationibus: OT. = Ochsenheimer — Treitschke; HS. = Herrich — Schäffer; FR. = Fischer de Röslervamm; H. = Hübner; Z. vel Zeil. Is. . . . et Linn. . . . = Zeiller Isis Okeni 1839 . . . et Linnaeae Entomologicae Stettinensis vol. . . .

⁴⁾ Museo zoologico C.R. Academiae Leopolitanae dono missa est a Museo zoologico Palatini Vindobonensis satis opulenta et europaeorum et exoticorum lepidopterorum collectio simul cum catalogo systematico, digito Amplissimi Mannii conscripto. Cum speciminibus hujus collectionis figurisque illustratis DD. Schäfferi, Hübneri, Freyeri, Praunii, Meigeni Bergii, Treitschki, Panzeri, omnia mea macrolepidoptera, annis proxime praeterlapsis capta, comparavi eaque recte determinata esse scio.

vulgantur, quae ipse bene et observavi et vidi, reapseque inveni. Cum ita igitur circa singulas species, quoad loca inhabitata, tempus volandi, dispositionem, hinc inde et frequentiam, a me prolata vera esse sincere confirmo. Sumpsi enim ea ex sedulo conscriptis annuarum excursionum diariis nec non ex schedulis, unicuique individuo in mea collectione additis, quibus loca natalia, dies mensesve vigendi aliaque sollicite inscripsi. Loca habitationis nominibus tantum, iisque plerumque abbreviatis, designavi. Ea enim, ad evitandas descriptionum repetitiones, infra sub indice, literarum ordine disposita, comprehendendi et quantum potui, saltem quod silvas, elevationem aliaque spectat, determinavi. Lectores igitur, indolem allatorum locorum cognoscere cupientes, ad hanc indicem delegare mihi licitum sit. Hoe loco reticere insuper non debo, D. Zimmermann, Illum experientissimum et felicissimum erucarum inventorem et educatorem, anno 1860. sub excursionibus in varias Leopolienses localitates opulentam lepidopterologicam fecisse messem et non solum aliquot macrolepidoptera, quae meis oculis haec tenus se subtraxerunt⁵⁾, sed etiam majore minoreve frequentia in imaginibus declaratis erueisive non paucas tales conquisivisse species, quas ego hueusque singulis, ad summum aliquot, cepi specimini bus.⁶⁾ Id hac de causa mibi est commemorandum, ne benevoli Lectores putent, pleraque lepidoptera, quae uti unica in mea Enumeratione, initio anni 1860. typis mandata, adducuntur, in Halicie rariissime procreari vel quasi fortuito inveniri. Me igitur plerasque species neque raras neque frequentes esse dixisse, imo numerum tantum exemplarium ad id tempus captorum designare melius duxisse, nemini displicere posse puto, fieri enim potest, ut multae harum specierum, quas nunc falso raras putem, olim vulgares in

⁵⁾ *Colias palaeno* L., *Bombyx Querna* SV., *Bombyx Velitaris* Esp., *Orgyia Gonostigma* Fabr., *Zygaena Minos* SV., *Zyg. Peucedani* Esp., *Zyg. Onobrychis* SV., *Acronycta Bradyoporina* Tr., *Mania Maura* L., *Cucullia Scrophulariae* SV., *Toxocampa Craccae* SV.

⁶⁾ *Cuspis*, *Batis*, *Tragopogonis*, *Cassinia*, *Conspicillaris*, *Abrotani*, *Ori-on*, *Leucophaea*, *Oxyacanthae*, *Pinastri*, *Pisi*, *Calvaria*, *Carbonaria*, *Aprilina*, *Psittacata*, *Margaritaria*, *Badiata*, *Roboraria*, *Fasci- lina*, *Fureula*, *Bifida*.

certis regionibus futurae sint.⁷⁾ Moneam insimul oportet, numerum lepidopterorum, quibus et insignibus et communibus terrae nostrae superbiunt et abundant, minime ad unguem exquisitum esse. In meis enim excursionibus, quas annis proxime praeterlapsis scopo entomologico abrupte instituebam, adhuc semper circiter 100 species, antea non visas, colligere mihi contigit, quamvis nunquam indagationi solius faunae lepidopterologicae deditus fuisse potissimum meam operam in sola Lepidopterologia collocavisse. Quantum opinor, producit alitque Halicia in suis fructuosis, pratis etc. ad minimum duo millia lepidopterorum species.

Quoad Macrolepidopterorum nomenclaturam seriemque systematicam in ordinanda collectione Auctor mihi fuit D. Lederer;⁸⁾ in Micropteryx secutus sum, deficientibus me olim operibus, omnes meas species amplectentibus, D. Heydenreichii catalogum methodicum. Eundem ordinem, omni ratione veram collectionis meae imaginem redditurus, retineo in summa etiam in hoc libello, quo Lepidopterorum Studiosis non sistema sed indicem, nostris temporibus certe desideratam, dare volui, ut saltem scirent quot et quaenam lepidopterorum species terrae nostrae in suo gremio proferant, alant et sustentent.

Micropterorum species plane novas, quas in Halicia mihi contigit detegere, quasque in hoc opuseculo descriptas divulgo, Viris Celeberrimis, de doctrinis naturalibus optime meritis, in tesseram summae meae observantiae dedicare ausus sum. Me ceterum et fidelibus iconibus illustratis, sine quibus etiam ampliores descriptions saepe vacillare expertum habeo, hunc libellum adornare conatum fuisse, Lectores ex addita tabula, haud perfecta persuasissimum habeant. Hoc vero meum propositum variis insuperabilibus difficultatibus tempore frustratum est. Si tamen in futurum mihi contigerit, saltem aliquot tabulas curare illustrandas, scientiae Coryphaeis insignioribusque Museis eas mittere non negligam.

⁷⁾ Ubi de aliqua specie in Enumeratione dicitur: illam per cunctum territorium habitare, significatur, eandem in omnibus sere perlustratis regionibus inveniri.

⁸⁾ Versuch die europ. Lepidopteren etc. Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereines, Wien 1852, 1853. — Noctuinen Europas, Wien 1857. — Lepidopt. Mittheilungen. Berliner entomolog. Zeitschrift, vol. II.

Ne quis denique hoc libello, qui Enumeratio Lepidopterorum Haliciae orientalis inscribitur, offendatur neve forsitan sentiat, me eo tantum superbire voluisse, succinctam excursionum mearum narrationem peropportunam esse censeo, eoque magis, ut qui post me in Halicia dabunt Lepidopterologiae operam, adequare sciant, quasnam regiones ego ad unguem fere perquisiverim, in quibus me diutius breviusve ad insecta colligenda detinuerim, quas porro peragrari festinanter, semel pluriesve legendō tetigerim vel omnimo non viderim.

Annos 1850. et 1851. transegī in oppidulo *Brody*, unde multoties rus evolans perserutabar saepissime imprimis: uliginosa inter *Brody* et *Koniusskow*, sterilia sabuleta urbi adjacentia, lucum betulineum *Brzesina*, luces querceos ad *Gaje starobrodzkie*, vasta pineta urbi propiora eaque juxta *fines Rossicos*, floridum monticulum *Drańca vel Makutra*, fagetis convestitos monticulos circa *Sasow*, *Podhorodce*, *Boratyn*, *Huciska*.

Aestatem exeuntem totumque autumnum anni 1851. in terris Podolicis degebam. Ex pluries bimestri tempore lustratis localitatibus laudandus est praeprimis lucus mixtus et ambitus pagi *Płotycze*, tum herbosi colles, qui *Tarnopolim inter et Płotycze* continuorum stagnorum ripis eminent potiusque autem ratione geognostica quam botanica entomologice insigniuntur.

A m. Martio an. 1852. usque ad m. Augustum an. 1858. habitabam Samboriae, unde continuos instituebam excursus non solum in omnes localitates vicinas urbi adjacentes verum et in multas remotas Samborianenses, Stryenses et Sanocenses regiones indolis diversissimae: Etenim perquisivi frequentissime per sexennium a primo verno usque ad hyemem ineuntem *Samborię* ipsam cum ejus floralibus, pometis, ambulacrorum arbustis, suburbii; tum pratum *Błażowszczyzna*, herbosa uliginosa *Pod Lwowcem*, betutetum *Lwowiec*, aliaque silvatica frond. in vicino pago *Radłowiec górne*. Lustrabam porro saepissime qualibet aestate silvam Abietis peet. in *Uherce*, fructecta querccea pascuaque sterilia in *Szady*, silvam Abietis peet. *Jedlina*, sylvulam fagineam *Zapust*, fruticosa frond. *Sabaryna*, quercetum *Woznycne* cum adjacente ei udo prato *Pod Woznycnym* in pago *Stupnica*, fagetis interpositum quercetum *Pawłówka* in pago *Czaple*, prata uda inter pagos *Kalinow*, *Czerniechow* et *Koniusski*, quercetum in *Chłopezyce*, alneta et excisum quercetum in *Koniusski*. Ad summum decies pervagatus sum mensibus aestivis junipereta et alneta in monticulo *Baczyńska góra*, herbosa hortosque in pago *Strzelbice*, piceta in *Starasol*. Vicibus iteratis perscrutavi summatim aliquot per dies silvulam frond. ad *Nocoszyce*, betuletum in *Bronica*, mixta silvatica cum marginalibus fruticetis frond. et his adjacente udo prato *Miedzy kątem i białą drogą* in pago *Dobrowlany*, quercetum *Łuh* cum adjacente ei humido prato *Stawki w Łuhu* in pago *Rakowiec*, steriles campos humidiusculos in *Molow*, silvas frond.

et acer. cum apricis lapidosis promentiorum ad Spas, fruticosa promon-
torum ad Staremiasto. Pluries praeterea Leopolim iter faciens perambulabam vario tempore et prata et mixtas silvulas frond. circa Rudki et
Hoszany, quercentum ad Lubień, silvamque in pago Zimnawoda e Betula,
Quereu et Pino silvestri compositam. Semel denique commorabar initio
m. Maji per 4 dies in vastis sylvaticis Abietis pectinatae in montosis
circa pagum Ławrów; sub finem vero ejusdem mensis item in paucos dies
pagum Wołcze profectus sum, unde die 22. in propinquum et ad oppidulum
Łomna vergentem montem Magóra (infra Abietis pect., supra Fago con-
vestitum), tum die 24. in montem Werch Rosłucki (Abiete pect. tectum), sub
eius eacumine flumen Dniester scaturit, enixus sum.

Ferias scholae anni 1853. (in Halicie orientali a medio m. Julio u.
ad finem m. Aug. durantes) vivebam in Beskidis Sanocensis. Peragrai
ibidem hue illuc vastas Abietis pectinatae silvas circa opp. Ustrzyki ad
flumen Strwiąż, sterilia lapidosa circa opp. Lutowisko (ad flumen San),
silvas fagineas et Abietis pectinatae cum pratis montanis circa pag. Sto-
posiany, inferiores regiones primaeorum fagitorum circa pagos Dwernik et
Ustrzyki górne, in ipso Hungariae confinio sitos. Die 28. m. Julii condescendi
ex pago Ustrzyki górne, ubi diutius me detinui, vicinam alpem ^{s)}
nomine Rabka Berehowska, in circumiacentes montes dominantem et prop-
ter ceteros ab vernaculis celebratam. Sub finem m. Augusti, postquam
plures alias adhuc alpes transiens immensa silvarum aequora pervolavi,
duos dies duasque noctes in his desertis sylvaticis aviisque erravi, domum
per pagum Sianki (ubi flum. San scaturit) et per oppidula Turka et Borynia
reversus sum.

Feriis anni 1854. visitabam a medio m. Julio u. ad medium m. Aug.
prata circa Stebnik, fageta in Truskawiec et Urycz, quercenta mixtaque be-
tuleta inter pagos Łukawica et Lisowice, fageta in Roshurcz et Bubnisczce,
herbosa ante Korezyn, inferiores regiones fagitorum in Kruszelnica,
aprica herbosa fagitorum ante Podhorodce. Ultimum hunc pagum prae-
cipue meritissimi nostri Zoologi Constantini de Pietruski salutandi causa
adieram. Ultimis m. Julii diebus me contuli in singulos dies, comitante
primario nostro Botanico oculatissimo D. Hyacintho de Łobarzewski, ad
alpes Zelemin et Paraszka, quarum prior ultra opp. Skole, posterior ultra pa-
gos Kruszelnica et Korezyn eminet. Per duas ultimas feriarum hebdomades
continuo proficiscebar percarrebamque legendō hortos oppidulorum Bole-
chow, Dolina, Stryj, quercenta ad Kałusz, quercentum et Quereu intermixtam
silvam Abietis pectinatae circa Podhorki, betuletam ante Bednarów, juven-
ea fageta mixta inter Bednarów et Halicz, hortos Stanislaopoli, uliginosa cir-

) Cäcumina et terga montium supra terminum silvarum eminentia pascendisque ovibus
et cornutis inservientia in Halicie orientali ruthenice „Polony“ vocitantur.

ea *Tyśmienica*, qu reeta circa *Tyśmieniczan* et *Fitkow*, silvas frond. et Abietis pect. circa *Sotłwina* et *Nadworna*.

Feriis anni 1855. adii pagum *Czarna*, in amoenissimis convallibus Beskidorum Sanocensis situm, ubi pluries sub finem Julii in adjacentia pago prata, pineta et silvatica Abietis pectinatae excurrebam.

Feriis anni 1856. prospera mihi fuit occasio in totum annum Vindobonam ad determinandas collectiones proficisciendi. Sub hoc itinere inspicerem non deeram plerasque localitates juxta viam stratam inter oppida *Sambor*, *Przemysl* et *Dembica* jacentes, Cracoviae bis aliquot dies me delinui.⁹

Initio feriarum anni 1858. iterata vice in pagum *Wołcze* peregrinabar et perquisivi ibidem semel atque iterum convallium prata Łuh, Kaminka et Zahariske pole, porro montium declivia haud depasta. Die 24. m. Julii denuo ad montem *Magóra* enixus sum, postridie vero evasi in silvigeram Beskidorum orientalium plagam alpestrem circa pagum *Husne wyższe* et descendendi ibidem cœlo sereno d. 26. m. Julii ad fontes fluminis Latureza in Hungariae confinio elatum sagetisque cinctum montem *Hušla* ejusque alpem *Pikuj*. Ineunte Augusto e pago *Wołcze* discessi pagumque *Modrycz* pétii, ubi per duas hebdomades pagi ambitum imprimis vero quercetum *Parna vel Tepluch*, tum mixta silvatica frond. *Skrzynny potok* et *Dąbrowa* saepius lustrabam. Dimidio m. Aug. perambulavi oppidulum *Bolechow*, sageta in *Rozhurze* *Bubnissze*, *Synowicze*, et deverti denique ad pagum *Dobrawlany* ubi triduo jam supra nominatas localitates pervestigabam.

Sub finem m. Augusti a. 1858. sedem transtuli *Leopolim*. Ibi singulis fere diebus a m. Martio usque ad m. Nov. excurrens perquirebam urbis hortos, sabuleta, florida vervaeta, varia prata, tum omnia silvatica frond. inter *Leopolim*, *Krzywezyce*, *Winniki* et *monticulum Czartowska skała* in *Lisienice*, sabuleta, pratula farraginemque silvaticorum et fructuosorum in *Hołosko*, quercetum in *Bednarowka*, betuletum in *Zubrza*. Ad hoc pluries ditionem oppiduli *Janów* petebam, ubi sterilia sabuleta sicca, pinetum *Romanówka*, quercetum *Pod Romanówką*, collina *Próchnik*, *Pod Próchnikiem* et *Szyp*, pratumque adum *Maxymówka*, summatis per 10 dies sedulo disquisiveram.

Initio denique feriarum anni 1860. fuit mihi longe exoptata occasio insignes *Pokutiae montes Carpathicos*, speciatim vero alpinum, meridiem versus ultra pagum *Żabie* (*Hcia*) elatum tractum *Czornahora* invisendi.

⁹) *Paucorum lepidopterorum divulgatorum, hac occasione conquisitorum, in hoc opusculo mentionem non facio, quia me Halicia orientali contineo.. Disquerendis Cracoviae lepidopteris D. Theophilus Źebrowski vacat. Lectores igitur lepidopterologicam Cracoviae faunam cognoscere cupientes, inspiciant ejusdem D. Źebrowski opusculum quod „O wady Łuskoskrzydłe i zyli motylowate z okolic Krakowa, Cracoviae 1860^a inscribitur nuper rimeque in lucem est editum.*

Quum vero propter continuas tempestates pluvias inopportunum ad tam excursionem tempus elegissem, in disquisitione cuncti tractus *Czornahora* impeditabar. In pago *Hcia* (Żabie) per 14 dies otio languens et vix aliquoties in proxima convallium prata exiens consilium demum cepi, ne irrito incepto domum reverterem, saltem in occidentalem tractus *Czornahora* postrematatem excurrendi. Ingresso itaque itinere transibam coelo obnubilo die 7. m. Augusti abietineta (*Abies excelsa*) et alpes montis *Kostrzyca*, ad flumen *Hcia* assurgentis, et progressus sum usque ad radices ipsius tergi *Czornahora*, ubi in pastoris tugurio pernoctavi. Postridie enixus sum, dum lucecebat, in summitates, sed solum alpes *Pohane misce*, *Szpyci* et *Howerla*, ibidem emetiri potueram, quum immani mox post meridiem subito coorta procella, quam nix, grando, fulgura atque tonitrua comitabantur, fugae se committere coactus fuisse. Quum demum bido praeterlapso nulla spes serenioris coeli adesset, ad pagum *Hcia* (Żabie) redii domumque iter institui. In longinquuo itinere pagum Żabie versus (die 16—23 m. Julii) nec non inter redditum (d. 15—20 m. Augusti), cursum per oppida *Stryj* et *Sambor* ad *Leopolim* dirigens, tetigi legendo pleraque loca devia et juxta viam sita, scilicet: hortos in *Kurowice*, fagetum ante *Przemysłany*, septa hortorum in *Rohatyn*, sepuleretum in *Bursztyn*, monticulum herbosum, ruinis arcis principum quondam *Hali-ciensium coronatum*, in oppidulo *Halics*, quercetum trans oppidulum, septa *Stanislaopoli*, quercetum betuletumque procul ante *Ottynijs*, hortos in *Kołomyja*, floralia et sepimina in *Peczeniżyn* (ubi triduum commorabar), convallium herbosa et fruticosa circa *Jablonów*, *Młodiatyn*, *Kossow*, *Kuty*, *Bieloberezka*, *Jasienów*, *Żabie*, porro jam supra nominata loca *Bednarów*, *Pod-orhi*, *Kałusz* *Dolina Bolechów*, *Stryj*, *Drohobycz*, *Bronica*, *Radłowice*, *Sambor*,¹⁰⁾ *Baczynska góra*, *Strzelbice*, *Lubień*, *Zimnawoda*.

Ex supra allatis cognosci potest, me haud paucas Haliciae orientalis ditiones peragrasse, quarum multae, ut insimul addam, aliam maris elevationem, quaemadmodum aliud clima aliud solum aliasque plantas, ita etiam certa sua et determinata animalecula proferunt. Praeter ditiones Samboriensem vero et Leopolitanam, ad unguem fere exquisitas, paucas tantum localitates alias adecuratius diutiusque perserutaveram. Quum ceteroquin magnam Haliciae partem inspiciendi hactenus negata mihi fu- erit occasio per se intelligitur, multa adhuc ad meae Enumerationis integritatem lepidopterorumque mihi cognitorum geographicam distributionem, penuriam, frequentiam, raritatem aliaque phaenomena cum his cohaerentia desiderari.

¹⁰⁾ Die 18. m. Augusti vidi hic circa vesperam urbem praetervolantes myriades individuorum *Acridia migratoria* quod hoc anno multas Haliciae regiones penitus devastavit.

Index

localitatum perlustratarum cum explicacione abbreviationum in
Enumeratione adhibitarum.

B.—Bednarówka. Vicus in campestribus 1000 circiter p. v. elatis, quae a *Leopoli* meridiem versus porrigitur. Datur hic parvam queretum, cui adjacent frond. fructecta floridum pratulum continentia. Reliqua regio cultissima usque ad conterminum pagum *Zubrza* ejusque silvatica.

Bednarów. Pagus in montieuloso-collina ditione 1100 circiter p. v. elata, quae pone opp. *Halicz* incipit, oppida *Kalusz* et *Stanisławów* praetergreditur et protinus meridiem versus in *Carpatica* promontoria excurrit. In collinis inter *Bednarów* et *Halicz* praevalent sageta, in illis vero pagum *Podhorki* versus datur betuleum. In valliculis prata frequentia, secus regio cultissima, quamquam solum est sterilius et clima frigidius, quam in planitiebus circa opp. *Stanisławów*.

Berehiwskie potonny: series alpium in *Carpatis Sanocensis*. Vide *Rabka Berehiwska*.

B. g.—Baczynska góra: culminans mōnticulus *Carpath.* promontiorum in finibus planitiei *Samboriensis* pone pagum *Smolnica* ad sinistram flum. *Dniester* ripam imminentium. Tergum hujus monticuli juniperitis *Alnique incanae* virguletis convestitum; solum lapidosum, sterile, vegetationis pauperum. Altitudo circiter 1500 p. v. In meridionali prolongatione eorundem promontiorum lateat in convallibus loca: *Staremiasto*, *Spas*, *Strzelbice*, *Starasol*, *Lawrów*.

Biłoberezka. Pagus intra *Kolomyenses Carpatus* in fluminis Czernemosz perangusta convalle intermontana, quae exinde longitudine aliquot milliarium intra altos montes porrigitur usque ad pagum *Zabie*. Montium latera lapidosa, sterilia, promiseue Abiete excelsa et Betula alba obiecta. Indigenae victitant e caseo ovillo *Zeaque mayde*, ex *Bucovina* importata. Arbores pomiferae satis prospere succedunt. Vide *Zabie*.

Perlustratarum localitatum maris elevationem sumsi ex mappis geographicis DD.

Kummersberg et *Raffelsberger*, ex charta geognostica D. *Lipoldi*, tum ex DD. *Kreilii* et *Fritschii* vel ipsius D. *Kreilii* opusculis, quae inscribuntur: *Magnetische und geographische Ortsbestimmungen im österreichischen Kaiserstaate*, Prag 1850 dritter Jahrgang 1848. et Prag 1851. vierter Jahrgang 1850. Etiam D. *Łobarzewski*, a quo in elaboranda perlustrati territorii adumbratione libentissime adjuvabar, aliquot montium terminorumque silvarum altitudines, quas ipse mensus est, mecum amicissime communicavit. Brevis gratia significo Autores commemoratos literis: *Khg.*, *Raff.*, *Lip.*, *KF.*, *Kr.*, *Łob.* Ubi vero ego ipse deficientibus mensuris verisimilem alicujus loci indicavero altitudinem, cum altitudinibus cognitis comparata, hoc benevoli Lectores ex addito verbo circiter cognoscent. DD. *Kreil* et *Fritsch* offerunt altitudinem in Gallica mensura „*Toise*“ (= 1,027639873 hexapedas *Vindobonenses*), D. *Kummersberg* cum reliquis in hexapedis *Vindobonensis*. Aequabilitatis gratia utramque mensuram pedibus *Vindobonensis* reddidi.

Sub designatione „montosa“ illas comprehendeo regiones quarum montes in cuncta usque silvis sunt convestiti; regiones vero „alpestres“ illas voco, quarum montes superiorem silvam terminum excedunt pratisque „subalpinis“ in tergo sunt constrati; pro „alpinis“ denique illas habeo regiones, quarum montes ultra *Pinum Mughum* efferuntur alpinamque edunt floram.

Bl.-Blażowszczyzna: floridum pratum siccum ad dextram flum. Dniester ripam. Vide Radłowice górn.

Bolechów. Oppidum salineque ad flumen Brzaska. Situm est in finibus planitiei, quae ab urbe septentrionem versus usque ad eum locum porrigitur, quo flumen Swica ad flumen Dniester profluit. In oppidi meridie assurgunt alta promontoria Fago et Abiete excelsa convestita, quibus interjecta est angusta convallis, ad montes juxta flumen Brzaska trans pagum Bubniszcze tendens.

Borynia: pagus in Carpathis Samboriensibus ad flumen Stryj. Circumcirca extolluntur humiliores montes, Abiete excelsa vestiti nullibique ad alpestrem altitudinem pervenientes. Agri potissimum avenacei.

Br.-Brody. A. Oppidum in Halicie oriente aestivo pone Volhyiae fines in meditulio ampliae planitiei situm. Omnes hujus planitiei plaga, quae ab urbe occid. versus usque ad fl. Styr porrigitur, tum illae quae orientem versus per fines Rossicos usque ad Volhynense opp. Radziwiłłow extenduntur, arenis volaticis sunt obiectae pinetisque amplis convestitae. Cuncta vero urbi meridiem versus adjacens ditio solo gaudet admodum fertili, quam ob rem tota fere, si excepteris aliquot lucos querceos ad pagum Gaje starobrodzkie, in cultam permutata est regionem. In ipsius oppidi ambitu solum est aridum et fluvioli paucas ducunt aquas; ditio autem flumini Styr et opp. Stanislawczyk propior sub tegimine pinorum humore magis impletur continentque magna turfarum spatia, nam propter aequum superficie situm aliquantulus est tantum aquarum in flumina delapsus. Eodem modo datur etiam pone urbem angusta linea palundum et aquarum, id est ea, quae septentr. versus supra pagos Berlin et Boldary ad fl. Styr tendit et in qua unice salutantur pratala. Elevatio urbis: 709 p. v. (sec. Kr.), planitierum et pinorum ab oriente 769, ab occid. pone laterariam (Pod Cegielnią) 834 p. v. (sec. Kbgm.).

B. In urbis meridie elevatur in milliariis distantia series monticulorum transverse ab oriente ad occasum ex Volhynia ad Halicie opp. Sasow et Złoczow tendentium. Cuneti hi monticuli ratione geognostica potissimum ex petra arenosa constant tegunturque silvis fagineis, quam tamen planities circum Brody margis cretaceis substratae, passim volaticis arenis diluvialibus (nullibi contignum plantarum cespitem praebentibus) consitae pinetisque convestitae sunt. Media altitudo horum mont. numerum 1300 p. v. adaequat, quum ex. gr. mont. nomine Drańca (Makutra) 1114, dorso vero incidentia loca: monasterium Podkamień cum opp. ejusdem nominis 1396, pagus Huciska 1308, pagus Boratyn 1231, et pagus Podhorce 1255 p. v. (sec. Kbgm.) elevantur.

Bronica. Pagus in ditione collina magnam per partem culta. In pagi vicinitate obvenit silvula betulinea. Vide Drohobycz.

Brylików. Pagus in Sanocensi Carpathorum montosis.

Brz. vel Bee.-Brzuchowice. Pagus in Leopolis septentrione. Situs in monticulosa ditione, quae solum habet sabulosum, in depressis repletur uliginosis, ceterum meritis conveslitur pinetis, quae hinc indant agnoscunt nemora frondosa. Vide Leopolim F.

Brzezina. Sic vocatur opere plantatus lucus betulineus inter Brody et Koniuszków, retinendis arenis volaticis inserviens.

Bubniszcze. Vide Lukawica. B.

Bursztyn. Oppidum ad flumen Lipa gnila. Situm est in planicie ex hinc ad opp. Halicz tendente. Ambitus oppidi Burszyn continetur collinis ditionibus, quae admodum secundae sunt et cultae, queretisive et coryletis convestitae. Juxta flumen Lipa virent prata uda. Tumulorum gypseorum ubivis haud parva copia. Elevatio oppidi: 734 p. v. (sec. Kbgm)

c. Lis. = **capona Lisienicensis.** Intra monticulos fagetis obtectos quibus utrimque continetur vallicula inter Leopolim et Winniki extensa, imminet haud procul a Leopoli tamquam separatos tumulus lateralis, in cuius limite collocata est capona ad pagum Lisienice pertinens (Lisiennicki browar). Tumulus hic, olim querecto convestitus, obtigitur nunc per excisa collucatave loca Pop. tremulæ fruticetis, coryletis, pumilecentibusque Fagis et Quercubus; tergum ejus vero et declivia superbunt praeceps locis apertis pulcherrimo tegili florido. Ad radices denique florent in supra dicta vallicula prata humida. Ad indicandam hanc localitatem, quae speciali nomine vacat, in Enumeratione usus sum designatione „pone cauponam Lisienensem“.

Cz. vel Czp. — Czaple. In occidente oppidi Sambor elevatur posne vicum Dabrówka silvigera ditiuncula monticuloso-collina, quae ad oppidulum Staromiasio salinasque Starasol tendit ibidemque in Carpathica excurrit promontoria. Trans hanc ditionem porriguntur juxta flumen Strwiąż ampli campi siccii, quibus pagus Czaple cum pluribus aliis insidet. Collina ad vicum Dabrówka virguletis juniperinis et pineis, illa vero pagum Czaple potentia silvis fagineis convestita sunt; in cuncta demum parte media, quae vocatur Pawłówka, alternaut densa fructecta mixta cum silvulis praevalenter querceis, betulinis et piceis. Pratula sub — et intersilvatica ubivis haud rara, et quidem secca in collinorum declivibus. humescientia autem in valliculis.

Czarna: pagus in amoenissimis Sanocensiis Beskidorum convallis. Montes circumiacentes et remotiores (vide Wołcze, Łomna) nullibz ad alpestrem efferuntur altitudinem vestiunturque hic silvis Abietis pectinatae vel Pini silvestris. In vallis virent frequentia prata uda. Agri plerumque avenacei.

Czerniechów: vicus ad marginem illorum campestrium, quae planitiem Samboriensem a septentrione limitant. Silvae nullae. Prata uda; hinc inde florida, alibi caricina. Ad flumen Strwiąż salicta. Vide Sambor.

Czornahora (vel Mons niger in idiomate latino). Sic vocatur alpinus tractus Carpathicus in Halicia orientali altissimus, ceterum altitudine aequalibus solum in Tatis et Transsylvaniae Carpatis gaudens. Amplectitur hic tractus fluminibus Tibisco alba et Prutha in ejus dorso securientibus, extolliturque meridiem versus trans pagum Zabie et adjacentem ei vicu Iłca in ipso Halicie et Hungariae confinio haud procul a Bucovinae et Transsylvaniae finibus. Per longitudinem porrigitur tractus Czornahora inter occasum aestivum et orientem hibernum 3 millaria Austriae, per transversum autem ubivis circiter milliare, exhibetque montosa, quorum latus alterum in Haliciam, alterum vero in Hungariam delabitur. Utrumque latus silvigerum praevalenter Abiete excelsa vestitur, altitudo vero cuncti tractus ad superiorem silvarum terminum in tota sua extensione assurgentis circiter 4500 p. v. efficit. Tergum ipsum obsidetur serie altorum tumulorum, qui cuncti silvarum terminum longe superant opulentaque flora alpina superbunt. Ex ambis altissimis tumulis in cunctam regionem dominantibus, alter ad Bucovinam vergens et 6852 p. v. (sec. Raff.) altus Pop Iwan, alter in occid. extremitate eminenus et 6488 p. v. sec. Kummersbergum, 6200 p. v. autem sec. Lipoldium altus Hoverla vocatur; omnia reliqua cacumina interjacentia (ex. gr. Spyki, Rebra, Pohane misce) altitudinem 5000 p. v. certe excedunt. Scopulorum in his summitatibus ubivis parva invenitur copia; hinc inde latent minutissimuli alpestres lucentive parvi stratus nivis stabilis. Inferiores omnium alpium partes undique Pino Mugho in latere Haliciano cinguntur^{a)}.

^{a)} Singuli frutices reptantes in cacumina usque ascendunt. Latera vero Hungarica Mughum non agnoscent.

praebentque densos caespites Airae caespitosae L. Frequenter offenduntur porro ubique locorum etiam vastiores vel interrupti passus Rhododendri ferruginei L. Aliisque viridis DC. (haec ad torrentium ripas); summa vero fastigia Junco trifido L. spisse convestita sunt, unde ferrugineo e longinquo rubeescunt colore. In occidentalibus alpibus *Howerla*, *Sspyci* et *Pohane Misce* (haec ultima continua fere nebulis velatur), quas die 8. m. Augusti festinanter et quasi carpendo emensus sum, collegiratione botanica in summis rupibus: *Doronicum Clusii Koch.* *Aconitum napellus L.* *Cerastium alpinum L.* *Linum alpinum Jacq.* *Primula minima L.* *Rhodiola rosea L.* *Saxifraga aizoon Jacq.* *Sedum atratum L.* *Valeriana tripteris L.* — ad nives deliquescentes sub fastigiis: *Pedicularis foliosa L.* et *verticillata L.* *Primula elatior Jacq.* *Trollius europaeus L.* — per declivia et cæcumina: *Geum montanum L.* *Anemone alpina L.* *Hieracium aurantiacum L.* et *alpinum L.* *Phleum alpinum L.* *Campanula alpina Jacq.* *Campanula linifolia Scheuchzer.* *Scorzonera rosea W.* et *Kit.* *Carlina acaulis L.* *Vaccinium vitis idaea* et myrt., *Juniperus nana Willd.* *Luzula euphrina Rochel.* porro *Cetraria islandica*, *Lycopodium sellago*, *Potentilla aurea L.* *Polygonum bistorta Tourn.* *Parnassia palustris L.* etc. — ad tugurium pastoris in cohorte pecunaria sub alpium radicibus: *Rumex alpinus L.* *Seneio cordatus Koch.* *Chrysanth. rotundif.* et *leucanthemum L.* *Geranium palustre L.* *Cirsium heterophyllum DC.* *Epilob. angustifolium DC.* *Lilium mortagon L.* *Pulmonaria mollis Wolff.* *Origanum vulgare L.* etc. — Quoad alia montosa hujus regionis inspiciant Lectores articulos *Zabie et Kostrzyca*.

Cz. sk. vel Czart. Skala = Czartowska Skala. Ad finem silvigerorum monticulorum, qui porrigitur inter Leopolim et Winniki, eminet in pago Lisienice monticulus satis prolongatus, qui vocatur Czartowska skala et 130*½* p. v. (sec. Kbgm.) est altus. Radices ejus cinguntur fageticis, hinc inde Quercubus intermixtis, monticulus ipse vero convestitur eunculus fere Populi tremulae variisque aliis fructicetis, quibus ampliora pratula florida apertave loca herbosa sunt interjecta. Exstant porro ex monticuli dorso passim et arenosa saxula, in quibus sec. D. Łobarzewski degunt: *Jungermannia platyphylla*, *Anomodon viticulosum*, *Leskea longifolia*, *Hypnum alopecurum*, *Timmia megalopolitana*.

Pagus Lisienice situs est in planitię, juxta pedem supra nominatorum monticulorum porrecta pratisque humidis patentibus atque agris cultis concisa. Vide secus *Leopolim E.*

D. = Dobrowlany: pagus in septemtrionali termino collinae distinctionis, infra sub nomine *Drohobycz* accuratius descriptae. Agri culti; prata paucissima in depressis humidiusculis. Sub ipso pago incipiunt ampli sterilesque campi humescentes, qui inde septemtrionem versus usque ad planitiam juxta flumen Dniester (vide *Sambor*) protrahuntur. Colles ad opp. Drohobycz vergentes convestiti sunt majore silva ex *Carpino*, *Pop. tremula*, *Betula*, *Salice caprea*, *Alno glutinosa* et *Queren commixta*; aprici colliculi herbosi marginibus silvæ adjacentes proferunt fructecta *Coryli*, *Quercus*, *Carpini*, *Salicis caprae* et *Rhamni frangulae*; juxta pedem vero horum collinorum viret pratum adum patens. Cuncta haec localitas ab indigenis *Miedzy katem i biały drogą* vocatur adjacetque agris vici *Rakowiec*, ubi datur in collinis silva querccea *łuk* adumque pratum depresso *Stawki w łuku*, eadem querceto circumcinetur.

Da. = Dabrowa: locale nomen mixtae silvae ad pagum *Tustanowice*. *Vide *Modyrz*.

Dolina: oppidum (salinae) ad pedem *Stryensium* promontoriorum Carpathicorum. Situm media in ditiuncula collina, cuius solum est maerum et infecundum. Oppidum elevatur 1150 p. v. (sec. KF. et Kr.).

Dranicza vel Makutra: In limite silvigerorum monticulorum, qui juxta pagos *Podhorce*, *Boratyn* et *Huciska* Volhyniam versus tendunt,

assurgit inter oppida *Brody* et *Podhamieś* monticulus tumulosus planicie Brodensi imminens, silvis carens, 1114 p.v.(sec. Kbgm.) altus qui Drańca vel Makutra vocatur magnopereque est singularis. Circumirea enim diffunduntur culta, ad radices parciter crescent diversi fruticuli frondosi, declivia vero cum tergo tantam copiam plantarum ex heterogeneis familiis proferunt, ut monticulus totus, si cunctam vegetationis in opem plagam circumiacentem respicimus, naturalis hortus botanicus esse videatur. Ex insignioribus plantarum speciebus a D. Lobarzewskio hic collectis, quarum multae in inumeris procreantur individuis, laudanda sunt: *Asperula tinctoria* L., *Asperula galioides* MB., *Anchusa Barelieri* Besser, *Ajuga chamaepitis* Schreb., *Adonis vernalis* L., *Alyssum montanum* L., *Anemone pulsatilla* L., *Aster amellus* L., *Cytisus austriacus* L., *Centaura mollis* WK., *Daphne eneorum* L., *Euphorbia Gerardiana* Jacq., *Echium rubrum* Jacq., *Gypsophila fastigiata* L., *Hypericum elegans* Steph., *Jurinea mollis* Rchb., *Trinia vulgaris* DC., *Thalictrum minus* L., *Trifolium rubens* L., *Teucrium montanum* L., *Veronica prostrata* L., *Veronica dentata* Schmidt, *Veratrum nigrum* L. etc. Laudare hic licet etiam Drabam nemoralem Erhard, quae per sabuleta circa Brody magnis copiis invenitur, tum Vincam herbaceam W. et K., quae viget in querceo luco ad Gaje starobrodzkie. Vide secus articulum *Brody*.

Drohobycz: Ad dextram flaminis Dniester ripam elevatur in oppidi Sambor oriente humilis tractus monticulosus - collinus, qui orientem hibernum versus trans oppidum *Drohobycz* porrigitur et pro extremis Carpathicorum promontoriorum prolongationibus haberit potest.

Meridiem versus tendit haec ditio, quam *Drohobycensem* nominare lubet, usque ad pagos Mokszany et Czerchawa, finiturque ibidem tota longitudine primis Carpathorum molibus exstructis, que in punto culminante supra Urycz 2958, in monte Bystra supra pagum *Kropienik* 2636, et in monte Magóra supra pagum Podburz 2309 p. v. (sec. Kbgm.) extolluntur. Orientem hibernum versus extenditur ditio *Drohobycensis* 4 circiter millaria juxta regionis mont. pedem usque ad illas planities, quae circa oppidum Stryj et flumen ejusdem nominis late patent; fines orientales praebet linea per pagos Kłodniea et Kawsko dueta, fines septentrionales vero planities in articulo sub nomine *Sambor* descripta.

In euncta ditione *Drohobycensi*, plura millaria quadratica amplectente, nullus deprehenditur clivus, qui ceteros altitudine magnopere superaret; nusquam etiam iuveniuntur ampliores planities interpositae valles profundi projectae. Universam elevationem, quae insimul media totius fuerit plaga, deficientibus mensuris indicare non possum; certum autem est, omnes monticulosus colles aliquot centenos pedes supra planitem *Samboriensem*, 985 p. v. (sec. KF. et Kr.) elatam elevari.

Constituitur porro haec ditio ratione geognostica formationibus salliferis arenosae petrae Carpathicae (Karpathensandstein); superficies vero obtegitur solo secundo admodumque culto. Quoad silvas praevalent hic praeципue quercta, cum betulelis alternantia. Si vicinos demum montes in meridie elatos respicimus, est ditio *Drohobycensis* callida ac mitis, secca autem ad planitem *Samboriensem* comparata, quae est humida passimve paludosa. Pandunt denique in descripta ditione *Drohobycense* plura loca a me perlustrata et in Enumeratione saepius memorata; scilicet: *Baldowice górne* (cum localitatibus *Błażośczezyna*, *Moczar*, *Lewowiec* Pod *Lewowcem*, *Wychylówka*), *Uherce*, *Szady*, *Osimina*, *Bronica*, *Nowoszyce*, *Rakowiec* (cum localitatibus *Zuh* et *Stawki u Zuhu*), *Dobrowlany* (cum localitate *Miedzy katem i białą drogą*), *Rowe*, *Drohobycz*, *Stebniki*, *Truskawiec*, *Modrycz* (cum localitatibus *Tepluch*, *Parna*, *Skrzyżony potok*, *Dąbrowka*), *Stupnica* (cum localitatibus *Jedlina*, *Zapust*, *Sabaryna Woźnyczne*, *Pod Woźnyczem*).

Dwernik: pagus ad flumen San in Carpathis Sanocensisibus. Circumiacentes montes fageti obiecti. Quoad ampliorem descriptionem re-

gionis ad scaturigines fluminis San inspiciant lectores articulam sub nomine Rabka Berehiuska.

F. J. = Franz-Josephsberg. Vide Wysoki zamek.

G. zj. = Góra zjawienia. Sic vocatur certa localitas intra monticulos pagi Hołosko, ubi eminent petrae arenosae saxula, ex quibus scaturit aqua salubris, defatigato collectori exoptata suavissimoque sapore. Circumirea virent fageta.

H. = Hołosko. Vide in articulo „Leopolis“ literam F.

Halicz: oppidulum antiquissimum ad dextram fluminis Dniester ripam in minutula planicie situm. In opp. septemtrione extenditur amplior planities secunda, juxta flumen Lipa opp. *Bursztyn* petens; meridiem autem versus elevatur monticulosa ditio, quae ex hinc meridiem versus protrahitur per loca *Kałusz*, *Bednarów* et juxta flumen *Bystrzyca* usque ad promontoria Carpathica. In herboso silvarumque vacuo monticulo, qui ad ipsum opp. extollitur, exstant ex fastigio ruinae arcis quondam principum Haliciensium; in monticulis paullo remotioribus obvenit quercetum.

Hel. = Helowszczyzna: sterilis arenae tumulus intra monticulos silvasque pagi Hołosko.

Howerla: altissima alpes in occidentali parte alpini tractas Czornahora.

Hušla: nomen Samboriensis montis Carpathici in occidente supra Hungaricum opp. Verecko et in meridie supra Halicienses pagos *Husne wyższe et niższe* imminentis. Assurgit vero mons Hušla in separato scaturiginibusque fluminum *Stryj* et *Laturecza* amplexo tractu alpestri, qui circa Verecko incipit exindeque 4 circiter millaria juxta Hungariae confinium porrigitur usque ad balineum acidum Uszok, item Hungarico adhaerens lateri. Tam Hungaria quam Haliciana cuncti hujus tractus latera immensis fagetis primaevis sunt conquestita; cunctum vero tergum ubivis fere eadem altitudine supra terminum silvarum extollitur exhibetque in toto decursu continuas alpes pascendis ovibus cornutisque inservientes. Superior terminus fagelorum, quibus septentr. declivia Haliciensia integuntur, decurrit secundum D. Łobarzewskii mensuras altitudine 3550 p. v. *Pinus Mughus* nullibi conspicitur.

In illa nostri tractus extremitate, quae vergit ad opp. Verecko, insidet ergo in modum humilis metae undique conspicuus tumulus, qui vocatur *Pikuj* et cuius secundum D. Łobarzewski est altitudo 4190 p. v. Culmen ejus ruprestre est, declivia herbosa passimve saxosa. Quum ceterum alpes *Pikuj* gregibus quotannis depascatur plantarum magnopere est inops. Die 26. m. Julii, quo hanc alpem condescendi, florebant disperse per declivias *Dianthus barbatus L.* et *Scorzonera rosea W.* et *Kit.*, tum *Saxifraga aizoon Jacq.* in compactis pulvinulis in summi cacuminis rupibus, quas sec. D. Łobarzewski incolunt etiam: *Umbilicaria deusta*, *Parmelia ventosa*, *Leptohymenium elatochloron*. Majores denique passus occupant cespites *Vaccinium vitis ideae*.

In septentr. parte Haliciana ejusdem tractus expanduntur ad ipsos radices pagi *Husne wyższe et niższe*, quorum agri praeter Avenam nihil aliud proferunt. Ipsa Avena interdum non maturescit, sed viridis adhuc primis diebus m. Octobris quando brumae hie incipiunt, nive superstruitur. Arbores pomiferae male procedunt et indigenae tantum Avena, laete et caseo aluntur. In regione silvatica deprehenduntur frequentia prata montana, quae foeno demetuntur; *Senecionis nemorensis L.* ubivis magnae copiae.

H. w. = Husne wyższe. Vide Hušla.

J. = Janow. A monticulo *Kortumowa góra*, qui Leopoli ab occidente imminet, porrigitur campestria, oecid. versus usque ad ipsum fere flumen San tendentia. Cuneta haec plaga circiter 1000 p. v. in universum

elata, est ubivis aperta et plana obsideturque hinc inde tantum longioribus humilibusque collinis, acsi levibus tumeret superficies undis.

Tali regione campestri-collina *Leopoli* vehentes cursusunque ad occasum aestivum dirigentes oppidulum *Janow* pervenient. Prae ceteris, quae sub oculos hic eadunt, conspicuum est amplum stagnum, 977 p. v. (sec. *Kbgm.*) elatum. Orientalis hujus stagni ripa vestita est simulcum adjacente ditione amplis pinetis; juxta septentrionales vero fines patescent paludes et cariceta quae a viculo *Stawki* usque ad pagum *Lelechówka* diffunduntur. A meridionali denique ripa, in qua jacet opp. *Janow* porrigitur pagum *Lelechówka* versus sabuleta humilesque colles sabulosi calee substrata, circiter 130 p. v. supra stagnum elati, oppidulo proprius culti, remotius vero denudati pinetisve amplissimis (excepta una silvula quercea) undique convestiti. (In haec ultima plaga, insectorum omnium ordinum ditissima, sitae sunt plures in Enumeratione saepius citatae localitales, scilicet: *Próchnik*, *Pod Próchnikiem*, *Szyp*, *Romanówka*, *Pod Romanówka*, *Maxymowka*.)

Circa viculum *Stawki*, insigni chloride superbientem, elevantur item calcarea collina, quae occid. versus prolongantur, 1250 circiter p. v. sunt alta omninoque fagineis teguntur silvis, in cuncta ditione Janoviensi solum hic obvenientibus. In occasu hiberno item silvigeria collina reperiuntur, quorum puncto culminanti *Fedorówka* est altitudo 1193 p. v. (sec. *Kbgm.*). Singularis igitur Janoviensis ditionis proprietas est, quod amplissima in ea dominantur pineta et paludosa, quam tamen cuncta collina calcarea omniaque sabuleta sunt vulgo perarida. Praesentia ampli stagni, paludum et pratorum aquosorum imprimis climati immodico humore et inde creatis aurae nebulis peculiarem characterem, quo via ulla alia, quantum expersum habeo, Halicie orientalis ditio insignitur.

Jablonów: oppidulum in margine Carpathorum Kolomyensium, in convalle ad flumen *Luezka* situm. In septemtr. et meridie extolluntur alti quidem, sed nullibi ad alpestrem altitudinem pervenientes montes. Vestimentum eorum exhibent fageta: in humilioribus vero declivibus circumiacentibus procreantur luci betulinei.

Jasienów: pagus ad flumen *Czeremosz* in Carpathis Kołomyensiibus. Adjacentes montes saxosi convestiti sunt aut puris abietinatis, aut fruticosis *Alni incanae*, *Abiete excelsa* intermixtis. Vide secus *Zabie*

Jed. = Jedlina: mera *Abietis pectinatae* silva in pago *Stupnica*, cui adjacent ampla coryleta (*Sabaryna*) et mixta silvula faginea (*Zapust*).

Icia: vicus ad pagum *Żabie* pertinens. Situs est in convalle, quae extenditur ad septentrionalia montis *Kostrzyca* declivia et per quam latitur fluvius *Icia*, in propinquuo ad flumen *Czeremosz* profluens. Vide secus *Żabie*, *Kostrzyca*, *Czornahora*.

K. = Krzywezyce: pagus Leopoli confinis. Annititur partim ad silvigeros monticulos inter Leopolim et Winniki elatos, partim vero ad planitiem, ad radices eorundem mont. juxta pagos *Zniesienie*, *Lisienice* et *Bitka* porrectam. Quoad silvas dominantur hic fageta, hinc inde Quercubus intermixta; ad ipsam vero Leopolim erescunt pone felonium suburbii *Łyczaków* silvula carpinea, et post hanc silvula betulinea, florido pratulo marginata, cui adjacet porro mixtus lucus, aliud pratulum continens. Ad hanc ultimam localitatem referuntur in Enumeratione adhibitae designationes: „in luco vel pratulo ad betuletum *Krzywezyce*.“

Ka. vel Kal. = Kalinow: pagus in planicie *Samboriense*. Ambitus ejus silvarum omnino expers; ad flum. *Dniester* saliceta. Partem in cultam occupant ampla prata subhumida, per omnem aestatem pulcherissimo stragulo florido condecorata. Infinito prope numero procreantur hic ex. gr. *Fritillaria meleagris L.*, *Trollius europaeus L.*, *Iris sibirica L.*, *Polygonum bistorta Tourn.*, *Leucojum vernum L.*, *Colchicum autumnale L.* etc. Versus pagum *Koniuszki* diffunduntur jam vastissima cariceta, hinc

inde stratibus Lychnidis floris eculi, Ranunculi acris, Pedicularis palustris et Equiseti palustris concisa. Versus opp. *Sambor* autem patescunt culta, prata et pascua.

Kalusz: oppidum ad flumen Łomnica in ditione collina situm et 911 p. v. (sec. Kr.) elatum. Collina septemtr. convestita sunt quergetis; in meridie vero extenditur ampla fertilisque planities culta, juxta Carpathorum pedem ad opp. Rożniatow tendens.

Kam. = **Kaminka**; pratum in convallibus montosorum Samboviensium. Vide *Wolcze*.

Kki. = **Koniuszki**; Pagus ad flum. Strwiąż in limine campestrium, planitiem Samboviensem terminantium. Circumiacentia campestria omnino sunt culta, exceptis quergetis, alnetis et salictis, quae ad ipsos pagos Koniuszki et Chłopczyce inveniuntur. Trans dextram vero flum. Strwiąż ripam patescunt ampla solisque caricetis obiecta prata palustria, quae quotannis fere tempore verno, frequentius etiam tempore autumnali, dum nempe in Carpathis nives brumales repente deliquescent vel pluviosae incipiunt tempestates, aquis fluminum Strwiąż et Dniester propter difficilem delapsum extra ripas diffluentibus inundantur et tunc magni lacus adspicuum praebent.

Kolomyja: oppidum ad flumen Prut in ampla planicie, cuius solum est nigrum admodumque fertile. Septemtrionem versus adjacens ditio amplis quergetis impletur; trans flumen Prut assurgunt meridiem versus montes Carpathici. Oppidum elevatur 884 p. v. (sec. KF. et Kr.).

Kor. = **Korycina**: purum queretum in monticulo pagi Hołosko. Per loca hujus queretii omnino excisa, quae vocantur Zapole et Mostki, luxuriantur nunc ampla fructecta quercea, coryletis, populetis, pumilescentibus Fagis, Pinis silvestribus et Abietibus excelsis permixta herbosisque pratalis concisa. In fine horum virguletorum porriguntur sterilia Na Powicowem, trans viam autem pagum Brzuchowice petentem, elevantur alii monticuli silvigeri, vulgo Świńska dicti.

K. g. = **Kortumowa góra**: Leopolitanus monticulus, 1179 p. v. (sec. Kbym.) altus, omnino sterilis silvarumque expers, exceptis arbustis vicini horli Kortum.

Kossow: oppidum in fauebus ad radices Carpathorum Kolomyensium pone flumen Rybnica situm. Meridiem versus extolluntur ad ipsum opp. alti montes praecepites silvisque carentes; septemtrionem autem versus porrigitur usque ad flum. Prut convallis secunda ac milis, praevaenter Zea mayde culta.

Kostrzyca. Sic vocatur tractus alpestris in meridie pagi Żabie pone sinistram fluminis Czeremosz czarny ripam et juxta fluvium Icia assurgens, 5003 p. v. (sec. Kbym.) altus, circum circa vastis abietinetis vestitus, in denudato vero dorso subalpinis pratis constratus. Ad septemtrionalium declivium radices porrigitur angusta convallis, in qua latet vicus Icia ad ejusdem nominis fluvium, quod non procul in flumen Czeremosz effunditur; meridiem autem versus trans montem Kostrzyca surgit juxta Hungariae confinium alpinus tractus Czornahora. Vide securus articulos Żabie et Czornahora.

Kutty. Oppidulum ad flumen Czeremosz in Carpathis Kolomyensibus. In opp. meridie elevantur montosa incipiuntque hic fauces intermontanae, juxta flumen Czeremosz et pagos Biłobereska, Jasienow etc. usque ad pagum Żabie porrectae. Septemtrionem versus oritur ampla pratisque concisa planities, flumen Prut petens.

L. = **Leopolis**. A. Haliciae Metropolis. Urbs ipsa oculitur in convalle, 828 p. v. (sec. Kr.) elata; circum circa vero elevantur monticuli aliquot centenos pedes altiores, quem ex. gr. occidentalis mont. Kortumowa

góra 1179, orient. mont. *Wysoki zamek* (Löwenburg, Piaskowa góra) 1240, et remotior monticulus *Czartowska skała* in pago *Lisienice* 1304 p. v. (sec. *Kbgm.*) elevari dicitur. Ex his monticulis insigniuntur orientales solo arenoso apertisque sabuletis, unde etiam nomen eorum *Piaskowa góra* vel *Mons arenosus*; monticulus vero merid. et occid. propria sunt argillosa diluvialia, exceptis campestribus ad opp. *Janow* tendentibus, quae hinc inde item sunt arenosa.

B. Exeunte urbe orientem versus, progredimur usque ad pagum *Winniki* angusta vallicula amoenissima, initio sabulosa partimque culta, tum virentibus pratis uidis serieque parvorum stagnorum condecorata. Juxta hanc valliculam tendunt utrimque monticulosa silvis fagineis convestita, quibus nemora vel fruticosa betulinea et carpinea in pago *Krzywczycy*, quercea in pago *Lisienice* et picea ante pagum *Winniki* aggregantur. — Trans monticulos ad pagum *Winniki* acclives extenditur ampla planities admodum culta dispersisque pratis et quercetis insignita.

C. Leopoli porro ad plagam meridionalem exeuntes, salutamur ampla ditione campestri, Leopolis convallem elevatione satis excedente, quum ex. gr. altitudo conterminorum pagorum *Bednarówka* et *Zubrza* 1100 et pagi *Sokolański* 1096 p. v. (sec. *Kbgm.*) sit. Solum horum campestrium ubi vis fertile est, unde etiam cuncta fere ditio cultissima et prata rara. Quoad silvas dantur regionatim querceta, rarius betuleta. Clima est frigidius quam Leopoli, quapropter silivae 2 fere hebdomades serius frondescunt, quam alibi circa Leopolim. Ulterius denique ad meridiem desinunt haec campestria in ditionem collinam fagetis convestitam pagosque Podciemno ac Derewacz continentem.

D. Trans elivosa demum occidentalia, ubi separantur duae viae stratae oppidula *Grodek* et *Janow* petentes, ingredimur similem priori ditionem campestrem superficie undulata insignitam Leopolisque convallem elevatione satis superantem, quum ex. gr. pagorum *Rzesna* et *Sknilow* est altitudo 1008 et 1039 p. v. (sec. *Kbgm.*). In cuncta hac ditione, ejus clima item frigidius habetur, alternant cum fertilibus agris cultis ampla prata humida, aperta sabuleta, tum alneta, pineta, hinc inde etiam betuleta et querceta. Quoad extensionem horum campestrium, quae ratione geognostica magni sunt momenti, tantum observare hic liceat, ipsa multa milliaria a Leopoli prolongari cunctaque plagam inter loca: *Janow*, *Grodek*, *Lubien*, *Rudki*, *Mikołajow*, *Rozdol*, *Koniuszki*, *Felsztyn*, *Chyrów*, *Przemyśl* et *Mościska* occupare.

E. In septentrione denique aperitur convallis Leopolitana desinuisse ibidem in amplas planities *Belskie pola* vocatas, quae juxta rivum Pełtew luxuriosis pratis humidis consternuntur, hinc inde turfosus teguntur, ceterum per pagos *Zniesienie*, *Krzywczycy* et *Lisienice* usque ad pagum *Bilka* porrigitur. Priora tres pagi siti sunt ad septentr. radices ejusdem monticulos tractus, trans quem extenditur supra (sub B.) commemorata *vallicula Winniciensis*.

F. In septentrionali parte planitierum supra allatarum jacet pagus *Hołosko*. Media via inde pagum Brzuchowice duecente elevant monticulosa ad minimum 1000 p. v. elata, multa milliara trans pagum Brzuchowice prolongata, rationeque geognostica ex iisdem formationibus ac monticuli circa *Lisienice* et *Winniki* constantia. Cuncti monticuli pago *Hołosko* propiores (ab indigenis vulgo *Swinka* dicti) convestiuntur novellis fagetis, quibus hinc inde abietineta, betuleta, querceta et populeta sunt interposita; ad conterminum pagum Brzuchowice vero crescunt pura pineta. Pratula in profundis tantum valliculis angustis obveniunt; ceterum jacent in cuncta hac ditione (*Hołosko* — *Brzuchowice*) steriles arenac apertae, quae hinc inde ad altiores humilioresve cumulantur tumulos nullibique contiguum praebent plantarum espitem.

Ex perlustratis descriptae ditionis Leopolitanae localitatibus, magnam differentiam praebentibus, memorantur in Enumeratione: *Wysoki zamek, Kortumowa góra, Krzywczycy, Czartowska skała, caupona Lisienicensis, Bednarówka, Zubrza, Świnia, Korycina, Mostki, Zapole, Na Popowiczuem, Helowszczyzna, Góra zjawienia, Brzuchowice.* Speciales omnium horum locorum proprietates adecuratius expositae sunt in separatis articulis, quos igitur benevolos Lectores inspicere rogo.

Lel. = **Lelechówka.** Vide articulum Janow.

L. et Liś. = **Leopolim et Lisienice.**

L. et Wi. = **Leopolim et Winniki.**

Li. = **Lisowice.** Vide Łukawica.

Liś. = **Lisienice.** Vide Leopolim et Czartowska skała.

Lubien. Pagus in *Leopolis* occidente, aquis sulphureis amplisque stagnis insignitus. Ditio campestris (vide Leopolim D.). Quoad silvas praevalent querceta; hinc inde dantur passus Pini silvestris et Betulae albae similiter ac in pago *Zimnawoda*.

Lutowiska. Oppidulum in Beskidis Sanocensis, quorum configurationem et naturam infra in separato articulo sub nomine *Rabka Berhiwska* determinavi.

Lw. = **Lwowiec:** amplius betuletum in occid. declivibus monticuli in pago *Radłowice góra*. Per loca ejus excisa luxuriantur herbosa, aut *Popuiae* tremulae impenetrabilia virguleta. In vallicie ad betuleti introitum floret pratulum uliginosum (*Pod Lwoccem*), silvescente *Alno glut. dumosisque* circumneictum; reliquos betuleti margines ambit latior cingulus floridus, ratione botanica imprimis *Hieracio aurantiaco* insignitus. Meridiem versus trans viam stratam oritur quercetum, quod usque ad pagum *Uherce* protrahitur, ibidemque *Abietis pect. silva* finitur. Trans fines omnium horum silvaticorum jacent pagum *Szady* versus ampla pascua sterilia, grumis talparum superstructa passimque ericetis ornata.

L. = **Lomna vel Launia:** oppidulum intra Samboriensia montosa Carpathia. Latet in convalle ad flumen Dniester tali loco, quo rivus ex pago Chaszczowa tendens suas undas in Tyram effundit. Montes circumiacentes picetis sunt investiti et nullibi silvarum terminum superant; ceterum habentur ii, qui ad oppiduli orientem surgunt, paullo humiliores quam ii, qui extolluntur ab occasu hiberno, alveos fluminum Dniester et San sejungunt aquarumque exhibent divortium. — Intra hos posteriores montes dominatur praecipue unus, qui vocatur *Magóra*, in oppiduli ambitu punctum culminans habetur, et circiter 3000 p.v. est altus. Pars inferior hujus montis cingitur Abiete pectinata, cuncta pars superior autem silva faginea, et in culmine floret pratulum, quod tamen minime subalpinæ est naturæ, plantisque regionibus supersilvaticis propriis insignitur. Insectorum ubivis paucitas.

Lawrów. Pagus cum monasterio PP. Ordinis St. Bazilii intra alta Carpathorum Samboriensium promontoria, undique silvis *Abietis pectinatae* tecta. Flora et fauna horum desertorum silvaticorum specierum pauperrima est.

L. in R.=Luh in Rakowiec: Populo tremula, Alnis coryletisque intermixtum quercetum in collinis viculi Rakowiec. Huic querceto interpositum est depresso pratulum paludosum, quod *Starcki w luhu* vocatur et hinc inde procreat salicta et dumosa. Reliquae huic localitati, magnum numerum insectorum foventi, adjacentes plagae praehent ditionem cultissimam, usque ad pagum *Dobrowlany* porrectam.

L. in W.=Luh in Wolcze: pratulum in convalle montosorum pagi *Wolcze*. Juxta ripas rivuli per hoc pratulum labentis crescunt salicta et virguleta. Ononis hircinae *Jacq.* ubivis innumerabilitas.

Luk. **Lukawica.** A. *Pagus* in collina ditione flaviis Swica et Stryj amplexa, frequentibus pratis humidis concisa, ceterum aut sterilibus agris cultis aut quercetis obiecta, exceptis hinc inde lucis betulineis, tum abietinetis in pago *Lisowice* et picietis in pago *Morszyn*. Elevationem hujus ditionis, quae humilem velut pulvinum in Carpathorum radiebus repraesentat similemque ac ditio oppidi *Drohobycz* habet situm, indicent pagi Niniów et Żulin, quorum prior 1145, posterior 1032 p. v. (sec. *Kbgm.*) altus est. Si vero fines respicimus, desinit *ditio Lukavicensis* septentr. versus in viam stratam inter oppida *Bolechow* et *Stryj*; ab occidente porrigitur juxta flumen Stryj patentes planities, quae ulterius collina ditione *Drohobycensi* finiuntur; ab oriente dantur item planities, ab opp. *Bolechow* juxta flumen Swica tendentes; in meridie denique extolluntur promontoria Carpathica, 2000 — 2500 p. v. alta, fagetis convestita, convalibus concisa, pagosque *Roshurcze* et *Bubnissze* continentia.

B. *Pagus Roshurcze* annititur partim ad flumen Stryj, partim ad praerupta declivia promontiorum, omnino fagetis cinctorum. Infra vicum crescent in fluvii lapidosis ampla saliceta incipitque hic lata planities, quae ex hinc juxta nominatum flumen usque ad urbem Stryj tendit. In limine vero adversae partis eorundem promontiorum, pari modo vastis fagetis, rarius silvulis Abietis excelsae, convestitorum, pandit pagus *Bubnissze* ad flumen *Brzaska*, quod labitur per angustam convallem, pone opp. *Bolechow* incipientem, tum in montes Carpath. penetrantem. In vicinitate pagorum *Bubnissze* et *Roshurcze* extolluntur intra silvas alta, abrupta et rupinosa petrae arenosae Carpathicae saxa, ex vetustissimis temporibus opere excavata, de quibus prodigiosissima ab indigenis narrantur. Flora horum desertorum silvaticorum pauperrima; insectorum vero penuria dependere videtur e paucitate vel specierum vel individuorum plantarum, quae insectis aut escam suppeditarent, aut alii vivendi rationi inservirent.

Luk. et Li. = Lukawica et Lisowice.

M. = Modryez. *Pagus* in merid. margine collinae ditionis *Drohobycensis* et sub Carpath. promontoriis situs. In ambitu hujus pagi, 1178 p. v. (sec. *Kbgm.*) elati, alternant agri culti cum luxuriosis pratis sterilibusve pascuis. Quoad silvas datur in collibus pago adjacentibus quercetum vetustissimum nomine *Parna* vel *Teplich*, tum alia silvula, *Skrzynny potok* vocata, potissime ex Quercubus, Betulis et Abietibus excelsis commixta; remotius vero meridiem versus extenditur ad vicum *Tustanowice* in promontiorum convalle silva ampliuscula vulgo *Dąbrowa* dicta et ex Betulis, Alnis, Pop. tremulis, Quercubus, coryletis, porro ex Aceribus plat., Fraxinis excels. et Pinis silvestribus composita. In contermino balneo *Truskawiec* obveniunt juvenea fageta; saline *Stebnik* autem silvis omnino carent.

Mag. = Magóra. Vide *Lomna*.

Makutra. Vide articulos *Drańca* et *Brody*.

Max. = Maxymówka: sic vocatur in opp. *Janów* amplum pratum uliginosum, a finibus stagni usque ad pagum *Lelechówka* extensem. In meridionali ejus parte extolluntur collina (vide P-S); per ipsum vero pratum labitur fluvius *Wereszczyca*, stagnum *Janoviense* nutiens; ulterius trans fluvium diffunduntur cariceta a vico *Stawki* usque ad pagum *Lelechówka*.

M. k. i b. d. = Między kątem i białą drogą. Vide *Dobrowlany*.

Moczar: pratum subhumidum ad dextram fluminis *Dniester* ripam. Vide secus articulum *Radłowice górnne*.

Mostki. Vide *Korycina*.

Nadwórna. Oppidulum ad flumen *Bystrzyca* sub radiebus Carpath. promontiorum situm et 1395 p. v. (sec. *K.F.*) elatum. Silvas vicina

promontoria investientes, constituant Fagus, Quercus, Betula et Abies pectinata. A septemtrione aperiuntur ampliae planities secundae, oppidum Stanisławów petentes.

Nowoszyce: pagus in collina ditione *Drohobycense*. Excepto mixto luco frondoso, ad pagum crescente, reliqua regio circumcirea cultissima est.

N. P. = Na Popowiezowem. Vide Korycina.

Otynija: Oppidulum pone flumen Worona in ditione collina situm et 789 p. v. (sec. Kr.) elatum. Juxta nominatum flumen uda prata; hinc inde querceta, rarius luci betulinei. In occidente denique palescant ampliae planities, usque ad opp. Stanisławów porrectae.

P. = Pawłówka. Vide articulum Czaple.

Par. = **Paraszka**. Vide articulum Skole.

Parna: quercetum vetustum in pago *Modrycz*. Vide Tepluch.

Peczynizyn. Oppidulum in secunda convalle ad marginem Carpathorum Kolomyensium. Meridiem versus extolluntur alti montes, qui tam superiorem silvarum terminum non excedunt. Vestimentum horum montium constituit fagetis; in humilioribus vero regionibus oppido propinquioribus salutantur hinc inde querceta.

Pikuj: alpes in montosis Samboriensis. Vide Husla.

pl. S. = planities Samboriensis. Vide Sambor.

P. L. = Pod Lwowiecem. Vide articulum Lwowiec.

Podhorki: pagus inter Bednarów et Kalusz. In pagi vicinitate datur purum quercetum et Quercu intermixtum pietum.

Podhorodce. Pagus ad flumen Stryj in angusta convalle Beskidorum Stryensium. A septemtrione elevantur alta fagetisque convestita promontoria; a meridie vero et ad dextram fluminis Stryj ripam exstruuntur montes, qui ad subalpinam altitudinem assurgunt et orientem versus usque ad oppidum *Skole* protrahuntur. In ima pagi convalle agri feni et pometa; eodem modo coluntur et humiliora promontoriorum declivia.

Pohane misce: alpes in alpino tractu *Czornahora*, circiter 5800 p. v. alta rupibus insignita; continuisque fere nebulis se involvens.

P. P. = Pod Próchnikiem: sterilia collina sabulosa, collibus Próchnik et Szyp interjacentia (vide P.-S.), nullibique arbusculam vel fructiculum agnoscentia, ceterum Filicibus obsita.

Pr. = Próchnik: longus collis arenosus, 1110 p. v. (sec. Khgm.) elatus, fruticosis Pinis silvestribus plantisque florae arenosae parce obsitus. Adversus hunc collem diffunduntur in campestribus et collinis ampla pineta, quorum pars anterior ab indigenis *Romanówka* vocatur. Vide seclusus Próchnik - Szyp.

P. R. = Pod Romanówka: vetustum quercetum in collinis inter Janów et Lelechówka, quod quasi fortuito in his regionibus, pinetis omnino convestitis, invenitur. Idem quercetum attingit pinetum *Romanówka*; adversus haec sylvatica autem elevantur arenoso-calearia collina Próchnik-Szyp, silvis carentia.

Przemyslany. Oppidulum haud procul a fontibus fluminis Lipa gniła. Continetur ditione monticulosa, usque ad opp. *Rohatyn* protracta, fagetisque tecta. Colles circumiacentes omnino culti; juxta flumen vero prata humida virent.

P.-S. = Próchnik-Szyp: sic designo cunctam seriem collum inter Janów et Lelechówka, qui ab indigenis Próchnik, Pod Próchnikiem et Szyp vocitantur. Juxta pedem horum collum porrigitur uno ex latere sabuleta sterilia et pineta (vide *Romanówka*), ex altero autem profunda prata uliginosa et carieeta, quibus stagnum Janoviense finitur. Insectorum

haec regio ditissima est; mirandum vero, horum etiam tales species hic inveniri, quae intra regionem subalpinam habitant et manent, et in regionem silvaticam vix descendant.

P. W. = Pod Woznyeznem: pratum uliginosum juxta, pedem silvigerorum collinorum porrectum stagnoque finitum. Vide *Stupnica*.

R. = Romanówka: sic vocatur pars anterior vastorum pinetorum, quae in campestribus et collinis inter Janów et Lelechówka diffunduntur. Loca excisa et collucata pineti Romanówka occupantur nunc arboribus et fruticulis frond., juxta marginem autem florent siccata pratula herbosa, in cuneto ambitu solum hic obvenientia. In vicinitate continetur pinetis amplius querectum *Pod Romanówka*. Vide secus Próchnik-Szyp.

Rabka Berehiwska. Intra Carpathos Sanocenses, qui immediate ad Hungariae elevantur confinium, scaturit in pago Sianki flumen San, quod inde occasum aestivum versus labitur per angustum convallem aliquot milliaria longam, pagisque Beniowa, Tarnawa, Dzwiniacz, Smolnik obsessam. Juxta hanc convallem tendunt sed dextram flum. San ripam humiliores prolongatique tractus montosi, uniformibus Abietis pectinatae silvis obtecti, hinc inde agris avenaceis constrati. Juxta sinistram vero ripam extolluntur praecipites montes altissimi, quorum dorsa et tumuli dorsales ultra silvas ubivis eminent, et quos circiter 4000—4500 p. v. elatos esse censeo.

Pone supra memoratum pagum *Smolnik* effundit se in flumen San fluviolus, directe a Hungariae terminis tendens. Alveo hujus fluvioli ad pagum *Ustrzyki górne* progredientes, conspiciant in occasu montosum fagisque circumcinctum tractum, cuius dorsum silvarum terminum excedit continuasque exhibit alpes, quae ab incolis *Berehiwski połonyny* vocantur. In oriente vero ejusdem convallis extolluntur alii multo altiores montes, qui pari modo ac priores immensis cinguntur fagetis, in jugo autem denudato subalpina gerunt prata. Culminantem hic tumulum *Kijowiec*, qui non solum in cunetam regionem ad securigines fluminis San dominatur, sed multo altior est etiam omnibus alpibus ad fontes fluminis Stryj et ad opp. *Skole*, ad minimum 5000 p. v. elevari censeo. Sub merid. alpis *Kijowiec* lateribus latet ad ipsum Hungariae confinium in valle nimirum elata pagus *Wołosate*. Occasum versus ab hoc pago imminet item ad ipsum Hungariae terminum intra paullo minores immensisque fagetis undique convestitos montes humilior aliquantulum alpes nomine „Rabka Berehiwska,” quam vernaculi propter id, quod undique est conspicua liberumque tam in Hungariam quam in Illiciam praebet prospectum erroneo altissimam existimast. Constituant igitur memoratae ditiones regionem sensu strictissimo alpestrem, tam montium altitudine, quam alpium frequentia et amplitudine insignitam. Agri frumentarii et triticei nullibi conspiciuntur, rarius ceterum et avenacei, et incolae re plerumque pecuaria vitam sustentant. Suaviter virentibus fagetis differunt porro omnia haec loca a montibus ad opp. *Skole*, ubi potissime nigricantia et tristia procrecent silvatica abietinea et picea. Flora alpium hujus regionis eadem est, ac in aliibus ad *Skole* et in alpe *Pikuj*. *Pinus Mughus* nullibi agnoscitur; in montibus humilioribus autem crescent frequentia *Alni incanae* fruticosa. Propter feras majores, praecipue autem ursos et lupos, qui magna hie gregibus inferunt detimenta, excursiones in has desertas solitudines per molestiae periculorumque plenae sunt.

Rak. = Rakowiec: viculus in collina ditione *Drohobycense* situs pagoque *Dobrowlany* conterminus. Intra culta obvenit hic querectum nomine *Zuh*, quo continetur luxuriosum pratum udum, *Stawki w Zuhu* vocatum.

R. g. = Radlowice górne: pagus ad flumen Dniester non procul a Carpathis, partim ad opp. *Sambor*, patim ad latera monticuloso — collinae ditionis *Drohobycensis* annexus. In planicie *Samboriense* extenduntur juxta flumen Dniester intra agros cultos luxuriosa prata (*Blaiov-*

szczyzna Moczar). Monticulis trans pagum innascitar septentr. versus amplior silva betulinea (*Lucowiec*), et meridiem versus queretum patens, per cuius loca excisa alternant merae permixtae silvulae *Alni glut.*, *Betulae*, *Fagi*, *Populi tremulae*. Ulterius meridiem versus excurrit hoc queretum (a me „queretum Radłowice“ vocatum) in contermini pagi *Uherce picea*. Vallieulae replentur herbosis uliginosis, vepretis, dumosis, alnetis, coryletis. Trans silvarum vero fines, pagum Szady versus, dantur sterilia pascua unduloso-collina, talparum grumis superstructa passim ericetis condicorata; secus regio cultissima admodumque secunda. Flora demum et insectorum fauna pagi Radłowice et adjacentium regionum, magna diversitate insignitarum, ditissimae sunt, numerantque haud paucas tales species, quae in alpes usque ad descendunt aut regionibus supersilvaticis sunt propriae. Sabuleta et pineta, ita etiam et insecta illa inhabitantia, omnino hic disiderantur.

Rohatyn. Oppidum pone flumen Lipa gniła. Situm in planicie fertili et undique culta. Orientem hibernum versus elevantur humiles fageticus obiecti monticuli, ex hinc versus opp. *Przemysłang* et *Brzezany* porrecti.

Rozhureze. Vide Łukawica B.

S. — Sambor. A. Oppidum in vicinitate Carpathorum ad sinistram fluminis Dniester ripam situm, et 985 p. v. (sec. KF.) elatum. Omnia cerealia, olera, arboresque pomiferae prospere hic procedunt. *Vitis vinifera* quoque maturescit. Brumae incipiunt sub finem m. Octobris durantque usque ad medium vel exeuntem m. Martium.

B. Insidet porro oppidum Sambor meditilio ampliae planitei, quae ad opp. *Staremiasto* incipit, per Samborię intra flumina Dniester et Strwiąż latius latiusque usque ad pagum *Koniuszki*, ex hinc vero secundum dextram flum. Dniester ripam orientem hibernum versus usque ad oppida Zurawno et Zydaezow late extenditur. Cuncta haec planities, quam „*Samboriensem*“ nomino, in omni extensione est horizontalis et librata sylvarumque ubivis expers. Partes ejus septentr. et occid., quae pagis *Kalinów*, *Babina*, *Czerniechów* et *Koniuszki* finiuntur, tum illae, quae ex pago Koniuszki ad oppida Zurawno, Zydaezow et Mikołajów tendunt, propter annuas inundationes omnino sunt nuda et uliginosae, nullibi aratae vel cultae, imo vastissimis pratis caricinis infectae. Pars vero meridionalis, quae juxta flumen Dniester a pagis *Kalinow* et *Babina* porrigitur per Samborię usque ad opp. *Staremiasto*, terram praebet secundam admodumque cultam vel luxuriosis pratis ornatam. Comparata ad altitudinem aliarum planitierum Haliciensium est Samboriensis satis elata, quum ex. gr. planities *Rzeszowiensis* 582, pl. *Przemysłensis* 654, pl. *Stanislaopolitana* 790, et opp. Sambor 985 p. v. (sec. KF. et Kr.) elevari dicuntur.

C. Laudare demum licet ditiones planitem Samboriensem terminantes. Ab occasu hiberno limitatur pl. Samb. pone opp. *Staremiasto* promontoriis Carpath., 1500—2000 p. v. elatis, hinc inde cultis, ceterum silvigeris, Alnove incana convestitis. A meridie extollitur ditio monticuloso-collina, quae definitur linea per pagos *Uherce*, *Radłowice*, *Kornalowice*, *Ozimina* et *Drobowlawy* circumcurrente; ejus indolem et configurationem in articulo *Drohobycs* determinavi. A septentrione denique dantur elata campestria, quae usque ad opp. *Chyrów*, *Przemyśl* et *Mościska* vergunt, ab opp. *Felsztyn* juxta sinistram flum. Strwiąż ripam ad pagum *Koniuszki* tendunt, ex hinc vero juxta sinistram flum. Dniester ripam usque ad opp. Mikołajów et *Rozdol*, tum trans opp. *Rudki* et *Komarno* usque ad *Leopolim* porrigitur. Summam elevationem horum campestrium, planitie Samb. propriorum, habet vetustissimus inter opp. *Rudki* et *Grodek* pago *Hodwiszna* eminens tumulus, quem ad minimum 1000 p. v. elatum esse censeo. Obsidentur denique haec campestria pluribus locis a me perlustratis, scilicet:

Czerniechow, Koniusski, Chłopczyce, Kudki, Hossany, Grodek, Janów, Lubień, Zimnawoda.

Sab. = **Sabaryna**: ampla coryleta cum mixto fageto et puro pi-
ceto cohaerentia. Vide *Stupnica*.

Sianki. Vide *Rabka Berehiwska*.

Ška. = **Świnika**. Sie vocatur in pago *Holosko* series monticulorum silvigerorum, qui elevantur juxta viam lateralem, pagum *Brzuchowice* ducentem. Quoad silvas, quibus memorati monticuli omnino teguntur, occurunt in partibus pago *Holosko* propriis juvenca fageta, passim betuletis, alnetis et populetis interrupta; ad ipsum introitum vero viget silvula *Abietis excelsae*. Remotiores eorundum mont. partes proferunt pura pineta, quae usque ad pagum *Brzuchowice* diffunduntur. In aliis denique monticulis pago *Holosko* adjacentibus invenitur quercetum (*vide Korycina*).

Ste. = **Skole**. Oppidulum ad flumen *Opora* in Carpathis *Stryenis* sibus. Situm est in rotunda convalle, 1200 p. v. (sec. Kr.) elata, silvigerisque montibus alpestribus circumscripta. Clima salioni autumnali arboribusque pomiferis satis favet.

Occidentalem *Skolensis* valliculae parietem exhibent praerupta declivia tractus alpestris, vulgo *Koreczanka* dicti, qui ad oppidulum, per occid. scilicet latera, silvis ex *Fago*. *Abiete* pect. et excelsa commixtis investitur, ex hinc porro sesquimilliare circiter occasum aestivum versus protrahitur, in toto hoc decursu superiorem silvarum terminum excedit, in tergo pratis subalpinis consternitur, tumulisque variae altitudinis ob-
sidetur. Altissimi horum tumulorum, qui *Paraszka* vocitatur, est altitudo 3996 p. v. secundum mappam geogr. D. *Kummersberg*, 3925 p. v. autem secundum mensuras D. *Lobarzewskii*. — Septemtrionalia tractus *Koreczanka* latera, quae ad flumen *Stryj* devolvuntur, antiquissimis tecta sunt fagellis; in ima vero convalle ad flumen *Stryj* jacent pagi *Krusselnicza et Koreczyn*, qui cultis continentur agris hactenusque calidum habent clima, quod et cerealia et pometa satis prospere succedunt. Adjacentes montes humiliores integuntur coryletis *Alnique incanae fruticosis*. — Meridionalia eiusdem tractus declivia gaudent silvis abietineis exhibentque simul cum numerosis montibus conterminis vasta deserta nullibi inhabitata, excepto solitario pago *Kostow* ad flumen *Oriawa*. — Superior terminus silvarum tractus *Koreczanka* decurrit in declivibus occid. et septentr. secundum D. *Lobarzewskii* mensuras altitudine 3596 p. v. Pratorum montanorum ubivis multitudine.

Orientales parietes montanae valliculae, in qua latet oppidulum *Skole*, pari modo ac occidentales subito praeruptissimeque ad alpestrem altitudinem assurgunt. In hac parte extollitur mons *Zelemin*, 3703 p. v. (sec. *Kbgm.*) altus, cuius longum tergum silvarum fines superiores ubi vis superat, exinde 2 circiter millaria orientem hibernum versus porrigitur, suisque demum extremitatibus attingit illa immensa vastaque spatia et montosa, ubi patescunt primaeva nullibique inhabitata deserta silvatica ad fluvium *Mizunia*.

Numerant denique alpes *Paraszka* et *Zelemin* multis plantarum species regionibus subalpinis proprias; ex gr. reperitur: *Luzula spadicea* *Dese.*, *Hieracium grandiflorum* et *aurantiacum L.*, *Hypochoeris helvetica* *Jacq.*, *Homogyne alpina L.*, *Soldanella alpina L.*, *Scorzonera rosea W. et Kit.* etc. Numerum vero insectorum considerantes, invenimus, illa quidem esse insignia sed pauciora, quam in ulla alia regione silvatica aut subsilvatica. Praeclarum demum omniq[ue] cum majestate in his regionibus sese manifestans naturae phaenomenon, silvas ad superioris suos terminos pumilescente, quilibet non satis contemplari admiraque poterit.

S. P. = Skrzynay Potok: silva initio e Quercubus, Betulis et Abietibus excelsis commixta, ad finem vero ex sola Abiete excelsa constans. Vide secus Modycz.

Sototwina. Oppidulum ad pedem Carpathorum Stanislaopolitanorum. In meridie extolluntur alta promontoria silvigena, praecipue betuleta producentia; in septentrione autem elevatur cultissima ditio collino — monticulosa, quae ex hinc protrahitur usque ad Tyram et opp. Halicz.

Spas: pagus intra Samboriensia promontoria Carpathica, passim silvarum expertia et sicciosa, passim abietineta et fageta proferentia. Agri plerumque avenacei.

St. = Stanisławów: oppidum ad fluvium Bystrzyca situm et 787 p. v. (sec. K.F. et Kr.) elatum. Jacet porro hoc opp. in aperta tabulaeque instar aequa planitie, quae extenditur septentr. versus juxta cursum flum. Bystrzyca usque ad flumen Dniester pone oppid. Jeszpol meridiem versus usque ad opp. Bohorodczany et promontoria (1382 p. v. sec. Kbym. elata) in vicinitate pagi Chorochlina, orientem et orientem hibernum versus usque ad fluvii Worona ripas pone opp. Tyśmienica et Otyńja, exinde vero usque ad opp. Nadwórna, quod promontoriorum radicibus tali adhaeret loco, quo flumen Bystrzyca ex Carpathis erumpit apertamque jam ingreditur planitiem.

In cuncta hac planitie nullibi conspicitur clivulus; solum est siccum et fertile, hic illic lapidibus et arenis commixtum aut nigrum, segregibus admodum fecundum, idcirco cuncta fere regio cultissima. Raro ceterum conspicitur pratalum, silvae autem hinc inde obvenientes sunt queretaria (ex. gr. in Tyśmieniczan, Fithów etc.), rarius betuleta. Secundum ripas fluminis Worona tendunt angustis lineis paludosa prata seu paludes aquosae et arundineta; secundum flumen Bystrzyca vero frequenter crescunt salicta. Ad indicandam elevationem planitiei Stanislaopolitanae observare demum licet, oppidulum Lysiec 953, pagum Tyśmieniczan 937, p. Chrypiin 811, et pagum Chomiakówka 849 p. v. (sec. Kbym) elatum esse.

Starasol: oppidulum et vetustissimae saline intra Samboriensia promontoria Carpathica. Silvae adjacentes ex Abiete pectinata constant.

Staremiasto: oppidulum in limite Samboriensium promontor. Carpath. ad flumen Dniester, quod hic e montibus erumpit apartamque planitem Samboriensem ingreditur. Adjacentia promontoria partim culta, partim Juniperi communis Atique incanae fructicetis obsita sunt inserviuntque pascendis ovium gregibus.

Stoposiany: pagus intra Beskidorum Sanocensium alpestria ad confinium Hungaricum elata. Quoad silvas dantur vasta fageta et piceta. Prata montana et subalpina frequentia. Vide secus Rabka Berehicska.

Stryj: Oppidum ad flumen ejusdem nominis. Elatum est 1054 p. v. (sec. K.F.) jacetque in meditilio perfertilis admodumque cultae planitiei, quae orientem versus in collinam ditionem Łukavicensem, occidentem autem versus in collinam ditionem Drohobycensem desinit. Ambitus oppidi silvis caret; ad flumen Stryj salicta.

Strzelbice: pagus in margine promontor, pone opp. Staremiasto. Silvae nullae; pometa frequentia; prata hinc inde.

Stup. = Stupnica: pagus in Drohobycense ditione collina, meridiem versus in promontoria Carpath. excurrende. Agri secundi admodumque culti; prata rariora. Silvae constant in universum ex Abiete pectinata, Fago, Quercu, Populo tremula, Carpino, Alno glutinosa, Betula. Collina pone Ecclesiam, a pago satis distantem aggeraque terreo (tempore invasionum Turcomanorum exstructo) munitam, obiecta sunt puro piceto Jedlinia, mixto fageto Zapust, et amplis coryletis impenetrabilibus, vulgo Sabaryna dictis; in collibus vero pago propioribus obvenit valde collucatum

quercetum *Woznycze*, cui adjacet depressum pratum uliginosum *Pod Waznyczem*. Intra pagum denique et Ecclesiam crescit purum betuletum, nec unum fruticulum patiens.

St. w. I. = Stawki w luku: floriferum pratum udum querceto cinctum. Vide Rakowica.

Synowucko. Pagus ad flumen Stryj in Beskidis Stryensibus. Septemtrionem versus extenditur latius latiusque planities cultissima juxta flumen Stryj ad opp. Stryj tendens; in meridie vero, oriente et occid. exolluntur alta promontoria, potissime fageti convestita. Trans promontoria orientalia invenitur pagus *Bubniscze*, trans meridionalia autem latet jam intra montes alpestres oppidulum *Skole*.

Szady: pagus in collina ditione *Drohobycense*. Exceptis agris cultis dantur hic ampla pascua sterilia vel prata florida in uidis valliculis. Septemtrionem versus extenduntur quercea fructecta; occid. versus adjacent silvalica pagi *Radlowice*.

Szpyei: nomen alpis in occid. parte alpini tractus *Czornahora* imminentis et circiter 6000 p. v. altae.

Szyp: tumulus calcareus, crassa arenae strue intectus. Tam ipse tumulus quam proximae ejus prolongationes pagum Lelechowka versus convestitae sunt virguleatis querceis, pineis, corylinis et carpineis, quae hinc inde minusculis dant locum pratulis. Adversus collem Szyp elevantur alia collina, puris pinetis convestita, quibus interpositum est amplius quercetum *Pod Romanocka* vocatum. Vide secus P.—S.

Te. = Tepluch vel Parna: purum quercetum vetustum in collinis pagi *Modycz*, quod exceptis coryletis nullas alias arbuseulas nullaque fructecta agnoscit. In ejus vicinitate viget alia silva mixta, cui est nomen *Skrzynny potok*.

Truskawiec: balineum pone opp. *Drohocyca* sub Carpathorum promontoriis siltum. Adjacentibus collinis innascuntur fageta. Secus regio cultissima.

Turka: oppidulum in meditilio Capathorum Samboriensium. Circum circa humiliora montes culti.

U. g. Ustrzyki górné. Vide Rabka Berehiwska.

Uherce. Vide Radlowice górné.

Uryez: pagus intra Carpath. promontoria, 2958 p. v. (sec. *Kbgm.*) alta, quae potissime Fago, hinc inde vero Abiete excelsa et janiperitis; convestiuntur, et ex hinc pagum *Podhorodee* versus protrahuntur. In vicinitate pagi Uryez exstant altae nudaque rupes arenosae, excavationibus artificialibus reminiscentiisque historicis insignitae.

Ustrzyki: oppidulum ad flumen Strwiąż intra humiliora Sambriensium Carpathorum promontoria, quae in euneta ditione obteguntur picetis. Oppidum ipsum jaet in frigida convalle angusta agris plerumque avenaceis concisa.

W. = Wołcze: pagus in Carpathis Sambriensibus non procul a fluminis Dniester fontibus, quae scaturiunt sub cacumine silvigeri et miliiare circiter a pago distantis montis, qui ab indigenis *Werch Bożnicki* vocatur. Pagus ipse latet in convalle intra humiliora montes, quos partim investiunt piceta (hinc inde Abiete excelsa parce permixta), partim vero obtegunt junipereta. Omnes agrí steriles sunt, edentque vix Avenam et Solanum tuberosum. Secale cereale et *Triticum sativum* seruntur hinc inde in solanorum agris talibusve locis, ubi rustici silvas, quae nullius hic sunt pretii, partiatim deflagrant. Culturae arborum pomiferarum non libenter opera datur, quum raro fructificant hibernoque frequenter perirent frigore. Brumae incipiunt ineunte m. Octobri (nonnunquam jam sub finem m. Augusti) durantque usque ad medium m. Majum. Monendum denique, convallem pagi Wołcze, frequentibus pratis luxuriosis concisam

esse, quorum plerique deflagrati et extirpatione silvarum annis labentibus orta sunt. Prata a me perlustrata vocantur: Łuh, Kaminka et Zahariškie pole. Trans montosa pagi Wolcze pandunt loca: Łumna, Turka, Czarna.

Wi. = Winniki: pagus pone Leopolim.

Wozn. = Woznyczne: collinum queretur magnam per partem excisum variisque arboribus silvaticis et fruticosis nunc permixtum. Ad introitum extenditur juxta collinorum pedem pratum uliginosum Pod Woznyczem vocitatum. Vide sensus Stupnica.

W. R. = Werch Rozłucki: sic vocatur mons Carpathicus militare circiter a pago Wolcze distans, sub eius cacumine, aquis subterraneis subtulo, scaturit Tyras, qui pagum Wolcze duobus ramis circumfluit, ex hinc vero jam uti spectabilis fluviosus oppidula Łomna et Staromiastra petit, ubi e Carpathis erumpens apertam ingreditur planitiem Samboensem. Trans montem Werch Rozłucki invenitur pagus Rosłucz, ubi naescuntur sageta; montosa vero ad Wolcze gaudent picetis et juniperetis.

W. z. = Wysoki zamek. Leopolitanus monticulus, 1240 p. v. (sec. Khgm.) altus, partim lucis betulineis et aerosis, opere plantatis, constratus, partim amoenissimis ambulaeris condecoratus, in reliqua tandem parte denudatus passimve cultus. Nomen *Wysoki zamek* debet hic mont. ruinis arcis quondam Haliciae principum; propter arenosam ejus vero naturam vulgo etiam Piashowa góra (Mons arenosus) dicuntur; in honorem demum Nostri Imperatoris Francisci Josephi impositum est ei nuperrime et nomen Franz-Josephsberg. Trans Leopolim excurrit m. *Wysoki zamek* in monticulos silvigeros, qui pagum Winniki versus protrahuntur.

Wychylówka: amoenissimis arbustis insignia ambulaera ad sinistram Tyrae ripam in confinio pagi Radlowice górne oppidique Sambor sita. Juxta Tyrae ripas luxuriantur ampla salicta, quorum loca excisa spissis Rubi caesii fruticosis occupantur. Cuneta secus regio adjacente cultissima est.

Z. = Zubrza. In campestribus, quae meridiem versus trans Leopolim extenduntur, adiacet vico Bednarówka pagus Zubrza. Ambitus hujus pagi cultissimus, pratala perrara; ceterum obvenit hic amplior silva frondosa, quae betuleto incipit et quereto finitur, in media vero parte alnetis et populetis permixtis interrupitur. Ad marginem humidum nardetum.

Z. = Zabie. Sic vocatur pagus cum nonnullis attinentibus vicis (ex. gr. Ilcia) haud procul a terminis Bucovinae intra altissima alpestria Pockutiae Carpathorum in ima convalle ad flumen Czeremosz situs. Si ex hoc pago ad meridiem spectamus, conspicimus dextra ex parte transverse imminentem montem Kostryca, enjus dorsum ubivis ultra silvas paulo surgit, pratisque subalpinis est constratum; sinistra vero ex parte elevantur pari altitudine alia alpestria, vulgo Kręta dicta, trans ambos denique hos tractus silvigeros extenditur protinus meridiem versus jam ad ipsos Hungariae fines alias tractus montosus ultra Mughi regionem elatus, copiisque Rhododendri insignitus, cui est nomen Czornahora. Montes occidentales quoque alti et silvigeri sunt, sed ad alpestrem altitudinem non perveniunt; illi vero ad pagi orientem elati sunt etiam occidentalium minores eduntque jam rarius silvatica. Cuneta haec alpestria pago Zabie circumiacentia integruntur immensis Abietis excelsae silvicis, quibus frequenter prata montana sunt interjecta; omnes vero alpes ditissima superbunt chloride. Agriculturae propter agrorum sterilitatem paucissima, rei vero pecuariae propter amplissima pascua alpestria maxima opera hic navatur; arbores pomiferae male procedunt et indigenae vescuntur potissimum e caseo ovillo et Zea mayde, ex aliis circuli Kolomyensis regionibus et ex Bucovina importata. Monendum quoque, ab incolis harum regionum in magnis deliciis haberi equos, qui tam a viris, quam a feminis ad omnia itinera perficienda et onera portanda adhibentur.

Convallis angusta, in qua latet pagus Źabie, protrahitur exinde orientem versus intra montes juxta flumen Czeremosz czarny 2 circiter millaria usque ad confluentem fluv. Potyla et Czeremosz. In cuncta hac extensione declivia montium adjacentium tantum solum distantiae praehent, ut ima convallis ipso fere flumine ejusque lapidosis occupetur, ideoque etiam potius nomen faucium intermontanarum mereatur. Expanduntur hic denique juxta flumen pagi Krzywórnica, Jasienów, Uścieryki, Uście Potyły, in quibus indigenae pari modo ac in Źabie inopem tolerant vitam pastoricam; clima vero horum pagorum paullo mitius esse videtur, quum arbores pomiferae hic saepius deprehenduntur. Montes demum juxta memoratas fauces utrimque elati humiles sunt silvarumque fines superiores nullibi exceedunt. Silvae raro obveniunt suntque abietineta; hinc inde dantur ampla Alni incanae *Willd.* virguleta.

Zap. = **Zapole**. Vide Korycina.

Zapust: collina sylvula faginea, Abiete pectinata, Betula, Populus tremula et Carpino betulo intermixta. Adjacent ei porro ampla coryleta (*Sabaryna*) purumque picetum (*Jedlina*). Vide secus Stupnica.

Zel. = **Zelemín**. Vide Skole.

Zimnawoda. Pagus in fecundis admodumque cultis campestribus, quae a Leopoli multa millaria meridiem et occid. versus porrigitur. Pone pagum nascitur major silva, passim ex Pino silvestri, ex Betula et Quercu composita.

Z. P. = **Zahariskie pole**: pratum foenarium in convalle montosorum Beskidorum pagi Wolcze, desflagratu et extirpatione silvarum creatum.

Valeas liber, Lectoribus salutem dicas, et apud Eos auctorem commendas.

(Zetterstedt.)

Scripsi Leopoli anno 1860.

M. Sita Nowicki.

I. RHOPALOCERA. B.

Papilionina.

Equites HS.

Papilio L.

1. Podalirius L. OT I. 118; HS. I. 140; H. 388. 389. Per omne territorium quotannis quidem vulgate nusquam gregatim. Frequentat libenter hortos tempore florum Syringae vulgaris; ceterum navigare solet in lucidis prosilviis fruticosisque, aut in apri- cis rupestribus regionum coll. et circiter 1800 p. v. elatorum promontoriorum Spas et B. g. prope Smolnica. Primum Majo et Junio, tum (solitarie) Augosto. In ditionibus alpestribus subalpinis- que Pod. adhuc usque non observavi.

Viget secus in media meridionalique Europa; adest usque ad Wolgam, mon- tes Altaios et in Aegypto, Hollandiae, Britanniae et Scandinaviae deest. *

2. Machaon L. OT. I. 121; HS. I. 140; H. 390. 391. Frequentior praecedente, localiterque plus minusve acervatim; re- peritur per cunctum terr. a pl. in subalpina usque; Majo, Aug.,

* Addita lepid. geogr. distributione, sumpta ex operibus (Herrich — Schäfferi, Treitschki, Zelleri (*Isis* 1839. et *Linn. Ent. vol. I — X.*), Adolphi et Au- gusti Speyer: „Die g. V. der Schmet. (Papilio, Bombyx, Sphinx L.) Deutschlands und der Schweiz, Leipzig 1858,” denique Gabrieli Koch: „Dic g. V. der europ. Schmet. in anderen Welttheilen, Leipzig 1857“), quae mihi Leopoli praesto erant, viris doctis me nulla adjumenta adulisse scio, praesertim quo- niam haec distributio quod adtinet ad Noctuas, Geometras, Pyralides Tor- tricesque deficientibus mihi de hac materia necessariis scriptis, est manca; hoc tamen eo consilio feci, ut opusculo aliquis inferatur vigor, ceterum ut iis, qui a Bibliothecis remoti majoribus operibus uti non possint, atiquid for- tas exoptati utilisque praebeam.

in alpibus Zelemin et Pikuj (sociis: * 4, 5, 7, 10, 73, — 78½, 448, 808, 973, 665, 664, 541, 618, 808, 710, 617, 606, 556, ceterum vide 17 etc.) autem mense Julio.

Secus per universam Europam, maximam Asiae et borealis Africæ partem; in Insulis Canariis, in Japonia montibusque Himalaicis.

Hypermnestra Heyden.

3. Mnemosyne L. OT. I. 139; HS. I. 146; H. 398. Unicum exemplar (comitibus: 112, 887, 1019, 539, 530, 383, 336, 326, 302, 300, 303, 255, 295 etc.) Junio 1859 in Cetnerówka Leopoli. Testantibus autem antiquioribus lepidopteris farraginibus Mn. circa Leopolim vulgaris quondam fuisse videtur. Non possum hodie testificari, utrum nimia captura jam extincta aut rarissima facta sit, an aliis de causis fortuito tantum hoc anno abfuerit. Circa Samboriam nullibi reperitur.

Per magnam Europæ partem et Asiam confinem; in Finlandia, montibus Pyraeis, Asia minore et ad mare Caspium. In boreali — occid. Europæ parte non occurrit. In Rossia meridionali planities, in Germania montosa incolit.

H. Apollinem, qui in montibus Carpathicis volitare dicitur et jam aliquoties a pluribus est observatus, mihi invenire non contigit, propterea eum in Enumeratione collocare dubitavi.

Pierides B.

Pieris Schrank.

4. Brassicae L. OT. I 144; HS. I. 96; H. 401 — 403. Per vagatur copiosus anno fere toto culta, prata aliaque loca terr. cuneti usque ad alpes (Pikuj, Rabka, Zel. et Par.), ubi vividus et in pulcherrimis exempl. ultro citroque per auras volitavit Julio.

In cuncta Europa (excepto summo sept.), magna porro Asiae parte et in sept. Africa; ex Norvegia usque ad Aegyptum et Nepaliam, ex Iberia et Britannia usque ad Japoniam.

^{*)} Praeter g. distrib. data occasione circa singulas species ceteros quoque eodem excursu in aliqua regione lectos papiliones enumeravi, quod additamentum pone adjectam locorum natalium adumbrationem nonnullis lectoribus gratum fore opinor. Sane mihi objicent, me in enumerandis consociis pro nominibus usum esse numeris talique modo prospectum difficultem reddidisse. Hoc momento excusat me necessitas quacunque ratione impensis typographicis parcendi.

5. Napi L. OT. I. 149; HS. I. 96; H. 406. Hic valent eadem dicta, quorum supra mentionem feci.

Secus per (universam?) Europam, Sibiriam et Orientem; ex Lapponia usque ad Italię, ex Anglia usque ad Altaium et Caucasum.

6. Daplidice L. OT. I. 156; HS. I. 98; H. 414. 415. 777. 778.

Volitat plus minusve frequens in planitierum pratis etc. circa St., S., et Br.; in collinis circa Czaple, Stup. et D.; denique in montosorum vallibus Kam. et Z. P. circa Wołeze. In his ulterioribus regionibus, quas 24. Julii turbida perlustravi tempestate, legi sequentia lepidoptera: 4, 5, 12, 35, 68, 73.—78 $\frac{1}{2}$, 83, 92, 93, 104, 298, 277, 322, 333, 394, 397, 413, 431, 448, 454, 491, 547, 560, 565, 583, 588, 599, 617, 647, 656, 659, 662, 676, 677, 702, 705, 706, 727, 728, 757, 766, 778, 779, 781, 783, 788, 797, 798, 800, 819, 820, 847, 857, 859, 873, 877, 902, 947, 948, 961, 966, 1000, 1020, 1050, 1055, 1058, 1061, 1065, 1068, 1106, 1145 — 1147, 1149, 1154, 1162, 1163, 1165. — 1167, 1206, 1211, 1260, 1282, 1308, 1336, 1346.

In cuncta Europa (excepto summo sept.), in maxima Asiae parte, in boreali et merid. Africa.

7. Crataegi L. OT. I. 142; HS. I. 95; H. 399. 400. Ubique locorum Junio — Aug., sed plerumque solitatem. Reperitur a pl. in subalpina usque, sic e. g. in alpe Pikuj, ubi 26. Julii (una cum 566 etc.) in declivibus sept. pluria spec. vidi volitantia. Anno 1856 plus quam sexages in diversas excucurri regiones, sed nusquam Crat. observare mibi contigit.

Habitat in universa fere Europa, in Sibiria et in Oriente; a Lapponia ad Hispaniam merid. et ex Anglia usque ad Altaium.

8. Rapae L. OT. I. 146; HS. I. 96; H. 404. 405. Samboriae in horto olitorio, deinde in agris Trifolio consitis pone coll. silvam R. g. reperi Junio 1854 pluria specimina mixtim cum 4, 5 etc. Nunc pro certo dicere non possum, utrum R. universe rarer sit in Halicie, an localiter tantum vigeat.

Similiter distributus ac Brassicae, praeter id, quod Petropoli deesse videtur, usque ad Lapponiam adest.

Anthocharis B.

9. Cardamines L. OT. I. 165; HS. I. 101; H. 424. 425.
791. 792. Vagatur Majo ubique in pratis, nemoribus silvati-

cisque, sed solitatum. A pl. usque ad montanas regiones (*Magóra*). Feminae difficillime inveniuntur.

In universa Europa Asiaque occid.; ex Lapponia usque ad insulam Cyprum ex Hispania Britanniaque ad Altium usque.

Leucophasia Steph.

10. Sinapis L. OT. I. 169; HS. I. 95; H. 410. 411. Volitat copiose socialiterque per totum annum cunctumque terr. in alpes usque, sic e. g. *Rabka, Pikuj*, ubi sub finem Julii aderant et 2. 4. 5. 7. 73 — 78½, 556. etc.

In cuncta Europa (exceptis regionibus arcticis), in Asia boreali et in Oriente; ab Anglia Hispaniaque usque ad Pekingum Sinensem.

Colias Fabr.

11. Edusa Fabr. OT. I. 173; HS. I. 105; H. 429—431. Per volat Julio et Aug. prata, segetes, vervaeta etc. terr. cuncti in montosa usque, scilicet: *W., Mag.* etc. Ubivis plerumque infrequens.

Degit in Europa media et australi, occid. Asia, boreali et merid. Africa, imo in America boreali. Ditiones igitur callidas et temperatas incolit, fugit frigidas.

12. Hyale L. OT. I. 181; HS. I. 104; H. 438. 439. Multo frequentior priore vulgarisque ab Julio ad finem Oct. in pratis, pascuis incultisque a pl. usque ad montosa (circiter 3400 p. v. elata) omnium a me hueusque perlustratorum locorum. In reg. alpestribus nec H. nec Edusa mihi unquam obvii fuerunt.

Inhabitat maximam orbis antiqui partem; a Petropoli Rossiae usque ad Nubiam Africæ et Nepaliam Indiae, imo in promontorio bonae spei.

Rhodocera B.

13. Rhamni L. OT. I. 186; HS. I. 106; H. 442 — 444. Per omne territorium vulgaris Martio — Oct. a planicie usque ad ditionum alpestrium valles 2000 — 3000 p. v. elatas.

In universa Europa magna Asiae parte, et in Africa sept.; in insulis Canariis, montibus Himalaicis — imo in California.

Lycaenoidæ B.

Thecla Fabr.

14. Betulae L. OT. I. 113; HS. I. 137; H. 383 — 385. Singula spec. reperi in Samboriue pomario, in nemore betulineo circiter

2500 p. v. elatorum montosorum circa Brylików (Augusto) et in campestribus ad betuleti Zubrze marginem (29. Sept.).

In Europa media, Asiaque contermina; ab Anglia usque ad Altaium, ex Christiania usque ad Pedemontium.

15. Pruni L OT. I. 111; HS. I. 136; H. 386. 387. In apricis inter frutices coll. queretii Pawłówka legi Junio 1854 semel aliquot exemplaria una cum 54. 1291. 42. 159. 543. 654. etc. Aliis locis frustra cum quaesivi.

Europaeus est, praecipue in medio continente et in Asia boreali; ab Anglia usque de Altaium, ex Livonia usque ad Itiam borealem.

16. Hicis Esp., „Subtus maculis marginalibus rufis“ OT. I. 105; HS. I. 136; H. 378. 379. 863 — 866. Volitat solitarie in collinorum fruticosorum M. k. i b. apricis (una cum 1195 etc.); frequenter in pineti R. excisis (sociis: 87, 69, 30, 20, 39, 38, 36, 40, 548 719 ceterum 998 etc.) et in coll. silvaticis H. prope L. Julio.

Per omnem fere medium et aust. Europam, Orientemque; in Scandinavia merid., in Livonia, Uralo, et Caucaso. Angliae deest.

17. Spini SV., „Subtus lunulis marginalibus fulvis maculaque anali coerulescente“. OT. I. 103; HS. I. 136; H. 376. 377. 692. 693. Exemplar unum, quod in collectione habeo, reperi 26. Julii in primaevo fageto alpestris montis Hušla; vagabatur ibidem in prato non procul a Fagi termino (3550 p. v. Lob.) in societate specierum: 43. 49. 73 — 77. 81. 82. 84. 104. 132. 495. 536. 583. 597. 604. 668. 702. 766. 991. 999. 1196. ceterum vide 556 etc.

Inhabitat Europam medium australiisque, Orientem, et universam Asiam temperatam usque ad Pekingum. Angliae et Europae boreali deest.

18. Quereus L. OT. I. 96; HS. I. 137; H. 368 — 370. Exemplar primum (comitibus 85 etc.) ad marg. coll. queretii R. g. 14. Aug., secundum (sociis 258 etc.) ibidem in pratulo uliginoso 19. Julii, tertium item Augusto (similiter cum 14) in montosis pagi Brylików ad marg. pineti solidi loco circiter 2800 p. v. elato.

Per Europam medium; ex Anglia usque ad Uralum, ab Stokholmia usque ad Sardiniam.

19. Rubi L. OT. I. 91; HS. I. 135; H. 364. 365. 786. Degit in coll. pratis silvaticis circa R. g. et L, deinde in collinorum fruticosis pratisque subsilvaticis M. k. i b. d. (vide 1195). Majo — Iulio. Ubivis satis frequens.

In cuncta Europa, Asia occid. et Africa boreali; a Lapponia usque ad Algérium Persiamque, orientem versus usque ad Altaium.

Polyommatus Latr.

20. Virgaureae L. OT. I. 85; HS. I. 134; H. 349 — 351.
884 — 887. Hucusque semel 3. Julii in apricis floridisque ad marg.
campestris pineti R. exempl. duo una cum: 40, 30, 998 etc. Circa
Samboriam Virg. necubi reperitur, ceterum eum paucis tantum
in Halicie regionibus vigere puto.

In Europa et Asia boreali; hic mont. Pyraeis terminatur, illinc Peking.

21. Chryseis SV. (Eurydice Hufgl.) OT. I. 79; HS. I. 132;
H. 335. 337. 338. Frequens toto Junio per omne terr. coll. et in
promontoriis ad 1600 p. v. elatis, praecipue in humidis pratis: *St.*
w *t.*, *P. L.*, *Bt.*, *Moczar*, *Max.*, nec non ubivis circa *Leopolim*.
Femina eriores esse videntur, nam difficulter inveniuntur.

In maxima Europae parte Asiaque occid.; ab Anglia usque ad Altaium.

22. Hippothoë L. OT. I. 83; HS. I. 133; H. 353 — 354. In
apricis coll. quercetorum circa Łuk., *R. g.* (sociis 258. etc.) et *Lis*
(hoc loco comitibus 945 etc.) singula specimina Julio.

*Per Fur. medianam et Asiam temperatam; ab Anglia usque ad Pekingum, in
Eur. boreali deest, in merid. usque ad Hetruriam adest.*

23. Hipponeë Esp. (Alciphron Rott.) OT. I. 76; HS. I.
132; H. 356 — 359. Sat frequens Junio circa *R. g.* in herbosis coll.
silvarum marginibus pratisque *Moczar*, *P. L.* et *Bt.*, deinde in lo-
cis similibus inter *L.* et *Wi.* sub finem Maji.

*In Eur. media Asiaque occid. a Francia usque ad Altaium; in Europeo
meridie latere merid. Alpium terminatur, in sept. litore Baltico. Britanniae, Holl.,
Belgio et Parisiis deest.*

24. Circe SV. (Dorilis Hufgl.) OT. I. 70; HS. I. 131; H.
334 — 336. Per sex annos semel unum marem in margine florido
coll. silvae *R. g.* Circa *L.* est Circe in pratis et silvaticis frequen-
tior quidem, sed etiam solitaria Majo.

*In Eur. media et australi, Sibiria et in Oriente; a Parisiis usque ad Alta-
ium, in Italia media et in Syria; in septentrione litore Baltico terminatur. In An-
glia non occurrit.*

25. Phlaeas L. OT. I. 87; HS. I. 134; H. 362. 363. In silva-
ticis pratisque cuncti terr. coll. promontoriorumque, deinde (so-
ciis: 775 etc.) in silvigerro monte *Magóra*. Volitat primum Majo
Junioque tum Octobri; necubi multus.

*Per universam Europam, ditionem Mediterraneanam, Asiae et Americae borea-
lis partem. A Lapp. usque ad ins. Canarias, ex hinc usque ad m. Himalaticos et
Pekingum Sinensem. In nova Scotia, Novoboraco et Baltimore Americae borealis.*

Lycaena Fabr.

26. Amyntas SV. (Tiresias Hufgl.) OT. I. 59; HS. I. 129; H. 322 — 324. Vulgaris in lucidis coll. silvaticorum pratisque floridis circa S. et L. sub finem Maji et Junio. Anno 1856 reperi semel unam feminam 14. Aug. in quercente R. g.

Var. Polysperchon Bergst. Vernea, ut dicunt, Tiresiae generatio. OT. I. 61; H. 319 — 321. Reperitur iisdem ac prior locis frequenterque Majo ad medium Junium.

Per Eur. medianam australiemque, universam Asiam temperatam et Amer. bor. litora occid. A Paristis usque ad Pekingum. In sept. Europaeo terminatur Caspia litoribusque Balticis, in meridie Corsica. In montibus Himalaicis adest. In Brit. Holl. et Holsatia non reperitur.

27. Acis SV. OT. I. 14; HS. I. 116; H. 269 — 271. Vulgaris usque ad promontoria (circiter 1600 p. v. alta) ubique in pratis silvaticis et soenariis circuli Samboriensis et Stryensis; praeterea circa L. (comitibus 945 etc.) et J. (hoc loco sociis: 1309, 998 etc.). Junio initioque Julii.

Ubivis fere in Eur. et Asia contermina: ex Lapp. usque ad Siciliam et ab Anglia usque ad Altaium.

28. Cyllarus Fabr. OT. I. 12; HS. I. 115; H. 266 — 268. Vulgaris Junio in collinorum lucidis silvaticis pratisque apertis circa S., L., et J. (hic una cum 1309 etc.).

Inquinilus maximaee Europae partis Orientisque; a Christiania Petropolique usque ad Siciliam et Cyprum, a Parisiis usque ad Uralum et Caucasum. In Brit. Holl. Belgioque non provenit.

29. Hylas SV. OT. I. 63; HS. I. 119; H. 325 — 327. In floridis ad marginem campestris pineti R. reperi semel 12. Junii unum marem comitibus: 1309 etc.

Degit in Eur. media, ditionibus Mediter. et in Sibiria; a litoribus Balticis usque ad Algerium Syriamque, a Parisiis Altaium usque. Britanniae deest.

30. Battus SV. OT. I. 64; HS. I. 119; H. 328 — 330. 801, 802. Habitat eodem ac prior loco, ubi 3. Julii obvia mihi fuerunt exemplaria 4 una cum: 666, 704, 998 etc. In Halicia rariss adnumerandus est papilionibus.

In Europa et Asia; ubivis sporadicus. Ex Stockholmia usque ad Corsicam, a Provincia Galliae usque ad Pekingum. In bereali — occid. Europa non invenitur.

31. Aegon SV. OT. I. 57; HS. I. 127; H. 313 — 315. In apricis fruticetorum 1309 p. v. elati collis Cz. sk. semel feminam unam 18. Maji simul cum: 50, 107, 689, 716, 1095 etc.

Per cunctam Eur. et in Asia minore : ex arcticis regionibus Scand. usque ad Vandalitiam et ab hinc usque ad Uralum mareque Hyrcanum.

32. Argus L. OT. I. 52; HS. I. 127; H. 316—318. In silvaticis R. g. reperi per sex annos semel unum marem 25. Maji. Circa L. et prope J. (hic sociis 1309 etc.) volitat Argus ubique frequens in apricis silvaticorumque herbosis. Junio.

Incolit Europam (exceptis regionibus bor. trans Petropolim.) Scand., insulasque Britannicas. Et in Asia minore adest, quoque ad Pekingum.

33. Chiron Hufgl. (Eumedon Esp.). „Subtus vitta alba, a macula media inter ocellos 3 et 4 ad marginales maculas fulvas tendente.“ OT. I. 48; HS. I. 123; H. 301, 302, 700, 701. Volitat in apricis collinorum frutectorum Julio. Duo spec. reperi (sociis 908 etc.) in querceto P., tertium (una cum 1195 etc.) in fruticosis M. k. i. b. d., quartum denique in silvaticis ad pedem montieuli Cz. sk. (hoc loco simul cum 945 etc.).

Per Eur. medianam et austr. Asiamque conterminam. Ex Christiania usque ad Neapolim, ab Arvernia Galliae usque ad Altaium. Britanniae, Hollandiae et Belgio deest.

34. Erebus Knob (Arcas Hufgl.) „Infra profunde fuscus, disco maris ad late nigrum limbum coerulescenti; subtus fuscus striga parvorum ocellorum“ OT. I. 10; HS. I. 117; H. 260—262. Per omnes annos semel unum marem 18. Julii (socio 37) in apricis fruticotorum coll. querceti P. in Czaple.

In Europa media et Sibiria; a Divione Galliae usque ad m. Altaicos, citra Alpes solummodo usque ad Carniolam. In Anglia, Hollandia, Belgio et Gallia boreali non occurrit.

35. Icarus Hufgl. (Alexis SV.) OT. I. 31; HS. I. 120; H. 292—294. Ubique locorum frequens Mayo—Aug. in cuncti terr. pratis silvaticisque a pl. usque ad montanas valles 1500 ad 2000 p. v. elatas.

Per omnem Europam, Africam sept. et Asiam occid. A regionibus arcticis usque ad ins. Canarias, Altaium et Indiam occidentalem.

36. Argestes Bergst. (Dorylas SV). OT. I. 31; HS. I. 123; H. 289—291. In fruticosis coll. querceti P. (una cum: 908) floridoque margine pineti R. (sociis 998 etc.) singula spec. Julio.

In Europa et Asia minore : a Petropoli ad Vandalitiam usque. Brit., Holl., et conterminae Germ. deest. Ad Wolgam plane non provenit.

37. Adonis SV. OT. I. 33; HS. I. 121; H. 295—297, 645, 646, 698, 699. Hucusque semel unicum marem 18. Junii in

apricis fructectorum in exciso coll. querceto Pawłówka una cum: 10, 34, 83, 93, 92, 429, 438, 509. etc.

A Christiania usque ad Granatum Iberiae, in provinciis Transcaucasicis quoque, secus in boreali — occid. et boreali — orient. plagis Europae solummodo sporadicæ.

38. Corydon Scop. OT. I. 28; HS. I. 121; H. 286—288.

Semel unam feminam 3. Julii in campestris pineti R. florido margine sociis: 30, 39, 40, 511, 998, etc.

In Europa med. et mer. et in Oriente; a Gedano et Livonia usque ad Vandalitiam.

39. Daphnis SV. OT. I. 22; HS. I. 118; H. 280—282.

Hucusque unum par cum priore, ceterum: 40, 998. etc.

Per Eur. mediam et merid. et in Oriente adest. A Gallia usque ad Uralum, in Italia merid. et in Syria. In sept. usque ad Casanum.

40. Alsus SV. OT. I. 22; HS. I. 117; H. 278. 279. Duo exemplaria 3. Julii in floridis silvarum marginibus ditionis campestri — collinae Janow; sociis: 16, 20, 30, 36, 38, 39, 40, 65, 87, 193, 481, 494, 470, 457, 458, 430, 424, 408, 403, 444, 511, 558, 658, 666, 673, 699, 704, 760, 762, 784, 793, 794, 806, 885, 927, 952, 946—949, 958, ceterum vide 998. etc.

In Europa Asiaque contermina usque ad Altaium.

41. Argiolus L. OT. I. 17; HS. I. 113; H. 272—274. Vulgaris in omnibus pratis, silvaticis, memoribus, prosilviisque per omne terr. usque ad promontoria circiter 2500 p. v. elata, Majo Jauioque.

Inhabitat cunctam fere Europam exceptis regionibus maxime borealibus; in Sibiria, regione Mediterranea, mont. Himalaicus et in America boreali.

42. Aleon SV. (*Dionedes Husgl.*) OT. I. 7; HS. I. 117; H. 263—265. Pluria spec. Junio inter virgulta coll. querceti P. (sociis: 1291, 654, 543, 159 etc.) et in pratulis subsilvaticis prope Janow (hoc loco comitibus 1309 etc.).

Per mediam et austr. Europam confinesque Asiaticas plagas; a merid. provinciis Scandinaviae mediaque Wolga usque ad gradum lat. Corsicae Caucasumque, a meditilio Galliae ad Altaium usque.

43. Arion L. OT. I. 4; HS. I. 118; H. 254—256. Volitat sat multus Julio et Aug. per cuncti terr. silvatica prataque a pl. usque ad alpestres regiones. In Beskidorum silvigero monte Hušla

inveni eum (sociis 17 etc.) in prato intersilvatico circiter 300 p. v. sub Fagi termino.

In Europa media et australi, Asia minore, Sibiriae; ex merid. Suecia usque ad merid. Italiam et austro — occid. litora maris Caspii. a montibus Pyreneis Angliae usque ad Altaium.

Ericinides B.

Nemeobius Steph.

44. Lucina L. OT. I. 50; HS. I. 92; H. 21, 22. Vagatur quotannis et ubivis solitaria in coll. silvaticis circa L., R. g. et in fructecosis Sabaryna Majo initio Junii.

In occid. et media Europa; in orientali Europa terminatur linea ducta ab Upsalia Sueciae usque ad ostium fluminis Dniester. Praeter Bessarabiam nusquam alibi in Rossia reperitur.

Nymphalides B.

Apatura Fabr.

45. Iris L. OT. I. 154; HS. I. 44; H. 117, 118. 584.

46. Ilia SV. OT. I. 160; HS. I. 45; H. 115, 116.

V. Clytie H. 113, 114.

Vulgares Junio Julioque circa L. et S. in ditionum coll. pagis, urbibus, ad vias praecipue Salicibus exornatas, nec non in frond. prosilviis. Extremis tribus annis nullo loco mihi obvii fuerunt, excepta una Ilia in plantario Salicum suburbii Samboriensis, ubi interdum species ambae cum varietatibus inveniuntur frequentissimae.

Iris inhabitat medianam Europam; ex Italia media usque ad Liconiam, ab Anglia usque ad austr. Uralum. — Ilia riget in media et australi Europa borealiisque Asia; a Livonia usque ad Liguriam Syriamque, a Parisiis per Caucasum Sibiriamque usque ad Pekingum et insulas Japonicas.

Limenitis Fabr.

47. Populi L. OT. I. 145; HS. I. 43; H. 108—110. Vagatur Junio initioque Julii in cuncti terr. silvaticis a pl. usque ad elatiora promontoria; praeterea obvius mihi fuit Pop. in montosis, circiter 3000 p. v. elatis, prope pagum Brylikow Augusto (una cum: 14 et 18). Est in universum non multus; anno 1855 autem in coll. silvis frond. R. g. et Czaple ingenti numero apparuit.

Var. Tremulae Esp. volitat mixtim cum specie normali reperiturque satis frequenter.

In Europa media; a Christiania Norvegiae et Petropoli Rossiae usque ad Toscanam, a Parisiis usque ad Uralum. Angliae, Holl., et boreali — occid. Germaniae deest.

48. Sybilla SV. OT. I. 139; HS. I. 43; II. 103—105.
„Subtus serie dupli punctorum nigrorum marginalium.“ Alterum exemplar ad meam collectionem praebuit mihi chrysalis inventa Samboriae in Evonymo europaeo (vide 321), alterum fructum 1000 ultra p. v. elatorum collinorum Zapole. Julio.

In temperata Europa; a Balticis litoribus usque ad Calabriam et provincias Transcaucasicas, ex Anglia usque ad Uralum.

49. Lucilla SV. OT. I. 138; HS. I. 43; II. 101. 102.
Unicum exemplar, quod possideo, cepi 26. Julii (una cum 17 etc.) in prato circa 3100 p. v. elato in montis Hušla fageto.

Per Asiam medium et Europam orientalem; a Ticino Helvetiae per Silesiam usque ad Casanum, a Pedemontio usque ad Pekingum Sinensem. In Urali promontoriis, in Casano et in Altaio.

50. Aceris Fabr. OT. I. 136; HS. I. 42; II. 99. 100. Sat frequens in apricis silvaticis collinorum inter Leopolim et Winniki, praecipue autem in monticulo Cz. sk. Solitarie invenitur A. ceterum et ad frod. silvarum margines prope H. Sub finem Maji Junioque. Circa Samborium Aceris similiter ac multi alii papillones nullibi reperitur, verisimiliter ob frigidius clima harum subcarpathicarum regionum.

In orientali Europa et merid. Asia. Bruna, Salisburgum, Carniola, Illyria Casanum, merid. Rossia, Transsylvania, Quinquae Ecclesiae, Obrovazzo in Dalmatia, Pekingum, Cashmire, montes Himaluici, Java.

Melitaea Fabr.

51. Dietynna Esp. OT. I. 42; HS. I. 24; II. 15. 16.
Satis frequens Junio circa L. et R. g. (vide 1014) in coll. pratis humidis, fruticosis, silvarumque excisis.

In Europa media Sibiriaque; a Parisiis ad Altaium usque, ex merid. Scandinavia usque ad Italiam borealem et Bessarabię. In Uralo, Casano, et ad inferiorem Wolgam. Hollandiae et Brit. deest.

52. Athalia Esp. OT. I. 44; HS. I. 23; II. 17. 18. In apricis pratisque silvaticis vulgatissima Majo — Julio per omne terr. a planicie usque ad elatiora promontoria, e. g. Urycz 2958 p. v. (Kbg.) elata.

In cuncta fere Europa Asiaque anteriore; a Sicilia usque ad Japoniam merid., ab Hispania usque ad Sibiriam.

53. Artemis SV OT. I. 24; HS. I. 22; II. 4—6. Sat frequens sub finem Maji atque Junio in apriis herbosisque ad vias coll. silvarum Lw., Zap. et Wozn. In promontoriis Spas, circiter 1400 p. v. elatis, obvia mihi fuerunt praeterea pluria specimina, quae prima vesperi Rhopalocerorum more variis plantis quieta insidebant. Localiter tantum in Halicie provenire videtur.

Per cunctam Europam (exceptis reg. arcticis), per Orientem, Sibiriam et bor. Africam; ab Anglia et Portugalia (?) usque ad Altaium et lacum Baikalensem. In Uralo, provincia Orenburg, Casano, Caucasusque. Norvegiae deest.

54. Maturna L. OT. I. 18; HS. I. 20; II. 12. In apriis fructosisque declivibus quereteti P. reperi exempl. duo 3. Junii (sociis 99. etc.), tertium in depresso pratulo humido item coll. quereteti R. g. 12. Junii (hic simul cum: 1, 13, 21, 27, 32, 35, 51, 53, 59, 80, 91, 102, 105, 1014. etc.).

In maxima Europae mediate parte et in Sibiria; ex Italia boreali usque ad Petropolim et Sueciam maxime australem, a Parisiis ad Altaium usque. Britanniae, Holl., Daniae et Norvegiae deest. Ubivis sporadica.

55. Cinxia L. OT. I. 27; HS. I. 25; II. 78. Volitavit copiosa 12. Junii in tractus campestri — collini Janow herbidis pratulis soli expositis ad marginem pineti R. (comitibus: 1309 etc.) Ceterum nunquam et necubi in Halicia mihi obvia fuit.

In Europa (exceptis summis septentrionalibus), in Oriente Sibiriae; ex Anglia usque ad Uralum imo Altaium, a Christiania usque ad Italiam bor. et Caucasum.

56. Phoebe SV OT. I. 3; HS. I. 24; II. 13, 14. Exemplar unicum cum priore. Paucis locis in Halicia provenire videtur.

In austr. et orient. Europa magna que Asiae parte; a Portugalia usque ad Pekingum, a Livonia usque ad Italiam merid. et Siciliam. In insula Cypro, Asia minori et Altaio.

57. Didyma Fabr. OT. I. 30; HS. I. 26; II. 9, 10, 773, 774, 969, 970. Volitat gregatim initio Julii (comitibus: 130, 945. etc.) in apriis coll. silvarum inter L. et Wi., praecipue in colle Cz. sk. Solitariam inveni Did. ceterum in pratulis subsilvaticis prope Janow (una cum 1309, 998. etc.) Circa Samborianam nullibi reperitur similiter ac 55, 56, 90. etc.

In Europa Asiaque; ex Hispania usque ad Pekingum, a Casano et Regiomonte usque ad Algerium et Syriam. In Asia minori, provinciis Transcaucasicis, in Ararato et Altaio.

58. Parthenie Berk. (*Aurelia Nick.*) OT. I. 48; HS. I. 23; II. 19. 20. In floridis pratulis subsilvaticis secundum coll. betuletum *Licowiec* inveni 25. Junii 1854. tria exempl. in varietibus (simul cum: 91, 96, 632, 838, 866, 938, 1270, 1205. etc.).

In media orientalique Europa et cuncta Asia boreali ad Kamtschatkam usque. Potissime ad Wolgam et in Sibiria. A Casano usque ad litora Ponti Euxini.

Argynnus Fabr.

59. Selene SV. OT. I. 55; HS. I. 33; II 26. 27. Vulgata Majo — Junio in pratulis siccis et humidiuseculis, fruticetis silvisque frondosis omnium collinarum ditionum promontoriorumque, quae ad id tempus perserutatus sum.

Per cunctam Europam et in Asia boreali; a Lapponia usque ad Calabriam et ex Anglia ad Altaium usque.

60. Euphrosyne L. OT. I. 58; HS. I. 33; II. 28—30. Circa S. per omnes annos unicum spec. in betuleti *Licowiec* excisis. Estne Eu. fortuito ventis hoc rejecta, an fiunt faunae locales interjectis annis partim aliae? Circa L. reperitur Eu. frequenter in pratulis apriesque silvarum *Winniki* versus, vulgate autem in monticulo Cz. sk. Majo.

Itidem ac Selene, nisi quod in Asia boreali flumine Jeniseio terminetur.

61. Dia L. OT. I. 61; HS. I. 32; II 31—33. Circa R. g. semel spec. unum 5. Junii in fruticosis betuleti *Lw.* (vide 1300). Circa Leopolim frequenter in apries silvaticorum *Winniki* versus; Majo et Junio.

A Livonia usque ad Itiam borealem provinciasque Transcaucasicas, a Parisiis usque ad Altajum. In Grönlandia (?).

62. Pandora SV. OT. I 99; HS. I. 29; II. 71, 72, 606, 607. Anno 1853 reperi mense Julio exemplaria duo (sociis: 45, 46, 48, 78, 321. etc.) ad rivulum in plantario salicium suburbii *Samboriensis*. Ex eo tempore Pand. *Samboriae* jam nunquam mihi apparuit. Unum exemplar praebuit mihi ceterum anno 1851 et mixta silvula in agro campestri — podolico haud procul a Tarnopoli. Exceptis his duobus locis P. nullibi mihi obvia fuit.

In ditionibus Mediterraneis et in australi Europa; ab insulis Canariis usque ad Syriam mareque Caspium. In Halicia similiter ac Brunae in Moravia Pandora jam jam in limite septentrionali territorii sui apparere videtur.

63. Hecate SV. OT. I. 67; HS. I. 31; II. 42—44. Speciem hanc reperi semel 16. Junii 1856 tribus speciminibus (sociis

1014 etc.) in coll. betuleti *Lwowiec* excisis, Annis sequentibus *H.* hoc loco et alibi frustra quaesivi.

In Europa merid. et in Asia anteriore; a Casano usque ad Caucasum, a Provincia Galliae usque ad Altaium.

64. Ino *Esp.* OT. I. 69; HS. I. 31; H. 40, 41. In pratis silvisque frond. circa *R. g.* rarissima Junio; gregatim autem (co-mitibus 98 ceterum 1195 etc.) 2. Julii in prato humido *Stawki w Łuhu* penes querectum *Luh* in *Rak*. Anno 1859 Inonem circa Leopolim non conspexi.

In maxima Europae parte, in Oriente, Asiaque boreali; ex Lapponia usque ad Liguriam et Syriam, a Gallia usque ad Kantschatkam. Britanniae, Holl., Daniae et boreali-occid. Germaniae deest.

65. Daphne *SV.* OT. I. 72; HS. I. 31; H. 45, 46. Huc usque reperi semel tantum 3. Julii in pratalis herbidis ad marginem campestris pineti *Romanówka* quatuor specimina (sociis: 16, 20, 27, 30, 35, 36, 38 — 40, 43, 57, 67 — 69, 71, 87, 92, 93, 95. ceterum vide 998).

In Europa australi et orientali et in Asia minore; ex Gallia merid. usque ad Uralum et Caucasum, a Casano et Regiomonto usque ad Italiam inferiorem.

66. Latonia *L.* OT. I. 80; HS. I. 29; H. 59, 60. A planicie in humiliora montosa usque ubique locorum per cunctum terr. frequens Aprili, Majo Augustoque.

In Europa et magna Asiae parte; ab ins. Canariis usque ad Lapponiam, orientem versus ad Altaium montesque Himalaicos usque.

67. Aglaja *L.* OT. I. 91; HS. I. 37; H. 65, 66. Vulgaris in silvaticis pratisque per omne terr. usque ad altiora promontoria et inferiores Fagi regiones. Majo — Sept.

In cuncta Europa, Sibiria, Asiaque minore: a Lapponia usque ad Calabriam et ab Anglia usque ad Altaium. Ad mare Caspium.

68. Niobe *L.* OT. I. 83; HS. I. 36; H. 61, 62, 961, 962. Frequens circa *Stup.* (sociis 748 etc.), *Janow* (cum posteriore etc.), et in mont. vallium pratis circa *Wołce* (sociis: 6 etc.) Variat magnopere. Julio et Augusto.

In Europa, Sibiria, Orienteque; a Lapponia usque ad Vandalitiam Syriamque, et ab Hispania Hollandiaque in Altaium usque. Slesvico, Holsatiae, Britanniae, Parisiisque deest.

69. Adippe *SV.* OT. I. 88; HS. I. 37; H. 63, 64, 859, 860, 888, 889. Alterum exemplar inter segetes collinorum *Saba-*

ryna (cum priore) in *Stupnica*, alterum prope *Janow* in humido prato *Maxymówka* (vide 998).

In cuncta Europa et per magnam Asiae partem; ex Lapponia usque ad merid. Europam, ab Hispania Britanniaque ad Pekingum Sinorum usque.

70. Laodice *Esp. OT. I. 95; HS. I. 30; II. 67, 68.* Volitat Jucio in coll. silvaticis inter *Leopolim* et *Winniki*, praecipue autem in apricis silvigeri monticuli *Czartowska skała*, 1304 p. v. (Kbg.) elati. Nonnullis annis est Laodice satis frequens (1854), aliis penitus deest (1859).

In Europa media ab occidente Vistula terminatur, in septentrione Livonia, in meridie Chersoneso Taurica, orientem versus usque ad Pekingum Sinorum. Loca in Europa maxime occidentalia sunt Regiomontura, Urbs Drusiana, Thorunumque ad Vistulam.

71. Paphia *L. OT. I. 96; HS. I. 30; H. 69, 70.* Communis Junio — Aug. in lucidis marginibusque silvarum per universum terr. usque ad montosa, circiter 3000 p. v. elata. Apparet interdum similiter ac multi alii papilioes ingenti numero, ita e. g. anno 1855, quando acervatim praecipue in fossarum floridis juxta silvarum *Czaple* margines vagabatur; annis sequentibus fere penitus in hisce regionibus deerat.

In cuncta fere Europa et finitima Asia, a Lapponia usque ad Calabriam, ex Anglia usque ad Altaium et Araratum.

Vanessa Fabr.

72. Prorsa *L. OT. I. 129; HS. I. 41; H. 94—96, 728, 729.* Julio et Aug. localiter in silvis frond. a planicie usque ad montosa circiter 2600 p. v. elata. Quotannis infrequens.

Var. *Levana L.* Vernalis Prorsae generatio. *OT. I. 182; HS. I. 41; H. 87, 98.* In coll. silvaticis eorumque pratis Majo circa *R. g.*, *Stup.* et *L. Ubivis* solitaria dispersaque.

In Europa media confineque Asia; a Parisiis usque ad Altaium, a Livonia et litoribus Balticis in Pedemontium et Carniolam usque. In Caucaso. Britanniae deest.

73. Cardui *L. OT. I. 102; HS. I. 141; H. 73, 74.* Vulgaris tota aestate et autumno ubivis in urbibus, pagis, hortis, arbustis et silvaticis per cunctum territorium a planicie usque ad alpes; sic e. g. in alpe *Pikuj* 4190 p. v. (Lob.), *Paraszka* 3926 p. v. (Lob.) et *Zelemin* 3703 p. v. (Kbg.) elata.

Inhabitat omnes orbis terrarum partes, omnesque zonas borealis et australis hemisphaerii. In Europa usque ad Lapponiam.

74. Jo L. OT. I. 107; HS. I. 39; H. 77, 78. Vulgaris vere, Julio et Augusto iisdem in locis ac Cardui.

In media et australi Europa et in Asia finitima; a Stockholmia Petropolique usque ad Calabriam et Amasiam, ab Anglia ad Altaium usque.

75. Antiopa L. OT. I. 110; HS. I. 39; H. 79, 80. Communis vere, Julio et Augusto in arbustis silvaticisque per omne territorium in alpes usque (Pikuj).

In cuncta fere Europa, in boreali Asia et Africa, in boreali tropicaque australi America. In Europa usque ad Lapponiam. Ad Wolgam, in Caucaso et Altaio.

76. Urtiae L. OT. I. 120; HS. I. 40; H. 87—89. Communissima ab ineunte vere (exemplaria, quae hiemant) ad Novembrem ubique locorum a planicie in alpes usque.

Per cunctam Europam usque ad Lapponiam.

77. Polychloros L. OT. I. 114; HS. I. 50; H. 81, 82. Frequens Aprili, Majo Julioque per omne territorium in alpes usque (vide Cardui).

In cuncta fere Europa media et australi, nec non magna Asiae parte; a Stockholmia usque ad Vandalitiam, Syriam et montes Himalaicos, ab occidentalibus Europae litoribus usque ad Japoniam.

78. Atalanta L. OT. I. 104; HS. I. 41; H. 75, 76. Vulgaris Majo, Julio Septembrique ubique locorum in alpes usque (Pikuj).

In universa Europa (exceptis reg. arcticis), in Africa boreali, in Oriente, m. Himalaicos, insulis Sundaicos et in nova Scalandia, in America boreali, in Mexico et insulis Antilllicis. In Asia boreali hucusque non visus.

78½ C-album L. OT. I. 125; HS. I. 39; H. 92, 93. Communis ab Aprili ad finem Septembbris (excepto Junio) per cunctum territorium usque ad subalpinas regiones (vide Cardui).

In cuncta fere Europa, in boreali et media Asia et in boreali America. In Europa a Lapponia usque ad Neapolim et Sardiniam

Satyroidae B.

Hipparchia Fabr.

79. Galathea L. OT. I. 242; HS. I. 53; H. 183—185. Volitat copiosa in circuli Stryensis coll. silvis frond. inter Łuk. et Li.; satis frequens (sociis 17. etc.) in pratis intersilvaticis (circa 3200 p. v. elatis) in montis Hušla fageto; solitaria denique in sepulcretis Leopoli Julio. Circa Samboriam non occurrit.

Per medium et australem Europam et in Asia minore; a Livonia et boreali Anglia usque ad Siciliam Vandalitiamque, ab Hispania Britannique usque ad Uralum Caucasumque.

Erebia B.

80. Medusa SV. OT. I. 273; HS. I. 66; H. 103, 104.
Communis extremo Majo Junioque ubique locorum in pratis silvaticisque per cunctum terr. usque ad promontoria 2500—3000 p. v. elata.

In Europa media; a Livonia usque ad Pedemontium. In promontoriis Uralensibus et in Caucaso. Britanniae, Hollandiae, Galliae occid., Scandinaviae et campus Rossiae australis deest. Mirum quod iterum adsit in Lapponia arctica.

81. Goante Esp. OT. I. 293; HS. I. 57, fig. 283, 284; H. 233, 234.

82. Pronoë Esp. (Arachne Fabr.) ; OT. I. 290; HS. I. 60; H. 215—217.

Ambae hae species obviae mihi fuerunt 26. Julii in montibus Carpathicis, speciatim autem in prato intersilvatico primaevi fageti in alpestris monte Hušla exemplaribus singulis, quae non procul a Fagi termino vagabantur in apricis.

Goante habitat in Alpibus; Pronoe in montosis Europae australis ab Jurasso montibusque Pyraeneis usque ad Caucasum.

83. Medea SV. OT. I. 281; HS. I. 63; H. 220—222.
Frequens Julio et Aug. in lucidis silvaticis eorumque pratis per omne terr. usque ad valles montanas in Wołze (vide 6 etc.), Czarna, Stoposiany, Ustrzyki górné etc.

Ab occid. litoribus Europae ad Altaium usque, a Livonia et Scotia usque ad meridionaliores Europae partes.

84. Ligea L. OT. I. 283; HS. I. 63; H. 225—227. Volitavit catervatim 26. Julii (sociis 17 etc.) in montis Hušla pluribus pratis silvaticis ad altitudinem circiter 3100 p. v. Terminum silvarum non transgressa est.

Per cunctam fere Europam finitimumque Asiam; a Scandinaviae boreali promontorio usque ad Apenninum et ab Anglia ad Altaium usque.

? **Var.** Euryale Esp. Alterum exemplar cum priore, alterum in Beskidorum Sanocensis plagis alpestribus circa pagum Ustrzyki górné, ubi comite Ligea vagabatur solitarie in fageti prato non procul ab alpibus, Berchiwski połonyń vocatis. In regionibus coll. montibusque humilioribus nec E. nec L. mihi

unquam obvii fuerunt. Haliciensia Euryalis specimina sunt multo minora, quam illa Ligaeae.

In montosis Silesiae, in Jurasso et Alpibus.

Satyrus Latr.

85. Semele L. OT. I. 197; HS. I. 76; H. 143, 144, Annis 1852 ad 1858 inveni circa Samborianum unicum tantum exemplar obsoletum 14. Aug. ad marginem coll. queretii R. g. (una cum: 2, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 26, 35, 43, 73, 75, 59, 83, 86, 89, 92, 97, 187, 217, 291, 372, 357, 391, 433, 435, 439, 455, 461, 469, 491, 508, 677, 681, 682, 744, 764, 768, 769, 779, 702, 797, 873, 877, 891, 910, 911, 919, 920, 936, 963, 1021, 1048, 1070, 1099, 1107, 1109, 1127, 1128, 1171, 1199, 1200, 1206, 1201, 1227, 1250, 1277, 1286, 1326, 1331). Circa Leopolim voluntat Sem. sat frequenter, localiter gregatim, in prosilviis apri- cisque collinorum inter Krzywczycę et Lisienice.

In cuncta Europa Orienteque; a Lapponia usque ad Cyprum, ab Hispania ad mare Caspium usque.

86. Phaedra L. OT. I. 186; HS. I. 80; H. 127—129. Vulgaris, interdum copiosa, in coll. prosilviis nemoribusque herbidis circa R. g., Stup. (vide 748), L. etc.; extremo Julio et toto Aug.

Per medium et austr. Europam et in magna Asiae parte; a Gallia occid. usque ad Pekingum, a Casano usque ad Italiam medium Asiamque minorem. Europae boreali et boreali — occid. deest.

Paraga HS.

87. Maera L. OT. I. 231; HS. I. 88; H. 174, 175. Volitavit frequenter 12. Junii (sociis 1309 etc.) et 3. Julii 1859 (una cum 998 etc.) in campestris pineti R. lucidis, praesertim excisis, ubi nunc Vacc. myrt. luxuriatur cum Frag. vesca. Alibi in Halicia Maera in conspectum mihi non venit, quamquam plurimas tam frond. quam acerosas pervagatus sum silvas.

A Lapponia usque ad Syriam et ab Hispania ad Altaium usque. Britanniae, Holl., Daniae, provinciisque Germaniae ad sept. Oceanum deest.

88. Hieria O. OT. I. IV. 135; HS. I. 89; H. 176. Speciem hanc contigit mihi invenire singulo specimine 22. Maji (una cum 795 etc.) in montis Magóra loco silvatico, ad 2800 p. v. elato. Mons hic convestitus est in parte inferiore Abiete pect.,

suum in cacumine verum Fagi silvula, quae nunc cum abieti-
nea de loco contendere videtur.

Per borealem mediemque Europam et per Asiam confinem; ab arctis regio-
nibus usque ad Italiam superiorem Amasiamque, a Geneva ad Sibiriam usque. In
Europa occid. (Vindobona — Schonlia) nullibi provenire videtur.

89. Megaera L. OT. I. 235; HS. I. 89; H. 177, 178.
In cultis, incultis, pratis silvisque per omne terr. humilius ubique
vulgaris, Majo — Aug.

In occid. et australi Europa et per cunctam maris Medit. ditionem; a
Christiania usque ad Syriam, ab Anglia Hispaniaque ad Caucasum usque.

90. Egeria L. OT. I. 238; HS. I. 89; H. 181. 182.
Bellus hic papilio reperitur solitarie Majo in umbrosis coll. fa-
getorum inter L. et Wi., ubi vias silvestres libenter pervolare
solet. Egeria videtur paucissimis in nostratibus provenire locis,
quum mihi praeter Leopolim nullibi in meis botanico-entomologi-
cis itineribus per Haliciam orient. in conspectum venerit.

Per Europam medianam et maris Medit. litora; a media Suecia usque ad
Algerium, ab insulis Canariis usque ad fines Sibiricos. In Casano et Caucaso.

91. Dejanira L. OT. I. 229; HS. I. 87; H. 170, 171.
Vulgaris (interdum copiosa), sed localiter, in coll. silvis frond.
praecipue queretis in R. g., Czaple, circa L. et J. Junio Julioque.

In Europa media et finitima Asia; a Parisiis usque ad Altaium; in meridie
linea per Transsylvania, Carniolam et Pedemontium ducta terminatur. Petropoli
et ad Wolgam adest; in Caucaso porro in Brit., Holl., Belgia. et in boreali —
occid. Germania non provenit.

Epinephele HS.

92. Janira L. OT. I. 218; HS. I. 83. fig. 104, 105,
429; H. 161, 162. Copiosa ubique locorum in pratis, silvatico-
rumque herbosis a planicie usque ad medium Fagi regionem.

In cuncta Europa, Oriente et in Africa boreali; a Lapponia Britanniaque
usque ad insulas Canarias, Uralum et Syriam.

93. Hyperanthus L. OT. I. 225; HS. I. 81; H. 172,
173. Per cunctum terr. catervatim ubivis in pratis et silvarum
marginibus usque ad ditiones montanas, circiter 3000 p. v. elata.
Julio et Augusto.

In universa boreali et media Europa et in Siberia occid.; a Lapponia usque
ad Liguriam et Caucasum, occidentem versus ad Altaium usque. Litoribus maris
Medit. (excepta Liguria) deesse videtur.

Coenonympha HS.

94. Hero L. OT. I. 313; HS. I. 85; H. 252, 849, 850.

Vagatur frequenter Junio in ditionum collinarum silvaticis lucidis, pratis et fruticetis circa R. g. (vide 158), Stup., L. et J. (hoc loco comitibus 1309 etc.).

In Europa media; a litoribus Balticis usque ad Basileam Helvetiae, Labacum, Goritiam et Dalmatiam, tum a Parisiis usque ad Altaium. Adest item in media Scandinavia, Petropoli, ad Wolgam et in promontoriis Uralensibus.

95. Iphis SV. OT. I. 310; HS. I. 85; H. 249—251. Frequentis iisdem in locis ac prior. Junio et Julio.

In Europa medin; a Petropoli usque ad montes Pyraeaeos; in Pedemontio et Liguria, in Uralo, Chersoneso Taurica et in provinciis Caucasicis. Britanniae, Daniae, Galliae occid. et Scandinaviae deest.

96. Areania L. OT. I. 317; HS. I. 85; H. 240—242. Vulgaris Junio et Julio in pratulis herbidis silvarum et fruticetorum per ditiones coll. R. g., Czaple, et H. prope Leopolim.

In maxima parte Europae mediae et in regionibus maris Medit.; a Westmannia Sueciae usque ad Algerium, a Parisiis ad Uralum usque. Britanniae et Hollandiae deest.

97. Pamphilus L. OT. I. 305; HS. I. 84; H. 237—239. Ubique locorum a pl. in promontoria usque vulgatissimus in herbosis Majo, Junio et Augusto.

In universa sere Europa, regionibus maris Medit., Sibiriaque; a Norvegiae insula Alstan usque ad bor. Africam, a Lusitania ad Altaium usque.

98. Davus L. OT. I. 302; HS. I. 84. Frequentissimum inveni Davum 2. Julii in coll. prato humido Stawki w tahu (una cum 64., ceterum vide 1195 etc.). In R. g. et circa L. minus frequens est. Junio et initio Julii.

In media et sept. Europa Asiaque vicina; a boreali promontorio usque ad latera merid. Alpium et Caucasi, ab Anglia ad Altaium usque. Europae meridionali et Italiae superiori deest.

Hesperiidae.

Hesperia Latr.

99. Malvarum O. OT. I. 195; HS. I. 150; H. 450, 451.

Hucusque reperi semel ineunte Junio exemplar unicum, quod in fruticeto coll. quereti P. vagabatur inter flores. Uno tempore reperiuntur circum circa Samboriam species sequentes: 19, 27,

35, 41, 54, 71, 91, 96, 97, 128, 129, 139, 143, 183, 187, 188, 197, 206, 208, 248 — 250, 269, 290, 291, 297, 302, 303, 314 — 316, 318, 320, 329, 332, 381, 389, 391, 392, 406, 412, 445, 463, 466, 485, 493, 506, 531, 540, 550, 559, 570, 575, 587, 612, 607, 623, 655, 636, 637, 651, 677, 685, 700, 706, 717, 718, 728, 733, 734, 744, 766, 777, 780, 782, 802 — 804, 814, 816, 820, 841 — 843, 850, 852, 861, 872, 873, 875, 894, 895, 897, 900 — 902, 928, 931, 947, 1007, 1013, 1017, 1032, 1054, 1059, 1060, 1119, 1125, 1138, 1161, 1191, 1189, 1045 — 1047, 1248, 1250, 1253, 1283, 1296, 1331. ceterum vide 1300, 99, 863.

In Europa media, ditione maris Medit., Sibiriaque; a Casano usque ad Hispaniam et Algerium, orientem versus ad Altaium usque, Scandinaviae et Britanniae deest.

100. Tages L. OT. I. 214; HS. I. 158; H. 456, 457. Frequens Majo et Junio ubique in coll. silvaticis, pratis, incultis et siccaneis apricis circa R. g., L. et J. (hoc loco simul cum 1309 etc.), praeterea in montis Magóra sterilibus.

In temperatis coeli plagis per omnem orbem antiquum; ab occid. Europae litoribus usque ad orientalem Asiae vram. In Europa a Suecia usque ad Calabriam et Graeciam.

101. Alveus Hüb. (Fritillum O.). OT. I. 207; HS. I. 156; H. 461 — 463. Vagabatur frequenter 12. Junii 1859 ubique locorum in ditione campestri — collina inter Janow et Lelechówka in apricis, pratulis, silvaticis, sterilibusque. Quoad consocios vide 1309.

In Europa et ditione maris Medit.; a Norvegia usque ad Algerium et Cyprum, a mont. Pyraeneis usque ad Uralum et Caucasum, Angliae, Holl., et Daniae deest.

102. Alveolus Hüb. 466, 467, 847, 848; OT. I. 208; HS. I. 154. Copiosas Majo in silvarum excisis, pratis, fruticetorumque apricis per ditiones coll. circa R. g. et Leopolim.

In cuncta fere Europa, Asiaque confine; a Lapponia usque ad Cyprum, ab Anglia Altajum usque.

103. Taumas Hufgl. (Linea SV.). OT. I. 228; HS. I. 159; H. 485 — 487. Frequens Majo — Julio in coll. silvarum pratulis, floridisque agrorum confiniis circa R. g., Czaple, Stup. et L.

In Europa media omnibusque maris Medit. oris; a Finlandia usque ad Algerium et Syriam, ab Anglia et Hispania usque ad Uralum et Caucasum.

104. Lineola O. OT. I. 230; HS. I. 159; H. 660—663.
Per cunctum terr. frequens in silvarum herbosis excisisque a pl. usque ad regiones alpestres (vide 17. etc.). Julio.

In Europa media, Sibiria, et in omnibus maris Medit. litoribus; a Petropoli et Schonia usque ad Algerium et Syriam, ab Hispania ad Altaium usque. Angliae deest.

105. Silvanus Fabr. OT. I. 226; HS. I. 159; H. 482, 484. Frequens Junio iisdem in locis ac 103; praeterea (sociis 1159 etc.) 2. Julii in prato humido St. w. L. prope Rakowiec.

Itidem distributus ac Comma; in Europa solum usque ad Finlandiam et Westmanniam.

106. Comma L. OT. I. 224; HS. I. 159; H. 479—481.
Vulgaris Junio per omne terr. in silvarum herbosis et pratis usque ad promontoria, circiter 2800 p. v. elata.

In cuncta fere Europa, in Asia occid., et in America boreali. In orientali hemisphaerio a Scandinavia (Finnmark) usque ad Syriam, ab Anglia usque ad Altaium.

Garterocephalus Lederer.

107. Paniceus Fabr. OT. I. 219; HS. I. 158; H. 475, 476. Majo Junioque in pratis, silvaticis, herbosisque soli expositis in ditionibus coll. circa R. g. et Leopolim. Infrequens.

In Europa, praecipue media, et in Sibiria; a Finlandia usque ad Pedemontium, ab Anglia usque ad Altaium et Caucasum. Scandinaviae Daniae, Hollandiae et borealis Germaniae campis deest.

II. HETEROCEA. B.

Sphinges.

Thyridides HS.

Thyris Illig.

108. Fenestrina SV. OT. II. 115; HS. II. 81; H. 16.

Lautum hunc papiliunculum reperi in coll. ericeto silvarum ante Winniki sub finem Junii duobus speciminiibus, una cum: 248, 335, 247, 257, 425. etc.

Secus in Belgia, Germ. occid., Bohemia, Moravia, Austria, Carniola et Helvetia, in Transsylvania et Hungaria, porro in Hispania, Sabaudia, Toscana et in insula Corsica. Adest etiam in provincia Casano, in Asia minore, et in Altaio; in America boreali (?).

Sesioidae B.

Bembecia Hüb.

109. Apiformis L. (*Crabroniformis* Hüb.). OT. II. 121; HS. II. 61; H. 51. Extremo Junio unum specimen (similis cum: 273 etc.) Leopoli in horto botanico.

In universa fere Europa et in Sibiria; a Svecia usque ad Sardiniam, ab Anglia ad Altaium usque.

Sesia Fabr.

110. Tabaniformis Hufgl. (*Asiliformis* SV.). OT. II. 128; HS. II. 67; H. 44. Unum specimen cum posteriore 2. Junii *Samboriae* in horto inter flores Philadelphi coronarii. Quoad species alias eodem die lectas vide 863.

In Europa media et australi, nec non in Oriente; a Livonia usque ad Cyprum, ab Anglia usque ad Uralum.

111. Tipuliformis L. OT. II. 171; HS. II. 72; H. 49.

Cum priore, sed frequenter; praeterea unum spec. (similis cum 863 etc.) in floridis pratulis uliginosis in mixta silva Zapust regio-
nis coll. Stupnica.

*In cuncta fere Europa, Sibiria, Asiaque minore; a Lapponia usque ad Tos-
canam et Amasiam, ab Anglia ad Sibiriam usque.*

**112. Culiciformis L. OT. II. 162; HS. II. 80; H. 151,
152. Duo exempl. (sociis 234, 993. etc.) in alneto silvae R. g.
Majo; tertium 5. Junii in floralium sepe Leopoli (comitibus: 295
383, 336, 326, 302, 303 300, 317, 255 etc.).**

*Per borealem medianamque Europam, provincias Transcaucasicas et Sibiriam,
ab Anglia usque ad Dauriam, a Lapponia usque ad Pedemontium Iberiamque.*

**113. Tenthrediniformis SV. (Empiformis Esp.); H.
52; OT. II. 176; HS. II. 68; fig. 7, 8, 9. Frequens in vepre-
torum herbosis ad marg. hetuleti K. (comitibus 205. etc.), rarior
in fruticosis circa H. (sociis 353 etc.). Initio Junii. Vagatur ut
congeneres sole aestuante diversos per fruticulos florentes.**

*In media et australi Europa, Africaque septentrionali; a Livonia usque ad
Algerium, a Parisiis in Caucasum usque.*

*In inveniendis Sesiis Zygaeisque parum adhuc mibi for-
tuna favit et pro certo dicere non possum, num hae familiae in
nostratis paucis tantum repraesentatae sunt speciebus, an me
animadvententem fugerint.*

Sphingoidae B.

Macroglossa O.

**114. Fuciformis L. OT. II. 185; HS. II. 83; H. 56.
Singula spec. 27. Maji in prato foenario pone campestre queretum B. et 9. Junii in sterilis collis Hel. apricis. Quoad comites
vide 256 et 328.**

*In plurimis Europae terris, in Sibiria et Asiae minoris septentrionaliis; a
Lapponia usque ad Corsicam et Tokat, ab Anglia ad Altaium usque. Australioribus
maris Medit. ditionibus deest.*

**115. Bombyliformis O. OT. II. 189; HS. II. 83;
H. 55, 117. Unum exemplar cum priore in supra dicto tumulo
arenoso tempore pomeridiano.**

*In Europa et Sibiria; a Lapponia usque ad Toscanam, ab Anglia usque
ad Altaium.*

116. Stellatarum L. OT. II. 193; HS. II. 84; H. 57.

In floralibus, pratis et silvaticorum herbosis circa S., L., Br. et St.; ubique vulgaris Majo, Junio et Augusto.

Per medium et austr. Europam, Asiam medium et Africam bor.; a merid. Suecia usque ad Syriam, ab Anglia insulisque Canariis usque ad Pekingum.

Pterogon B.

117. Oenotherae SV. OT. II. 196; HS. II. 84; H. 58.

In apertis huac papilionem invenire hucusque mihi non contigit. Singulum exemplar, quod possideo, educavi ex eruca, quam in quodam pratulo silvatico inter L. et Wi. reperi. Oenotheram bennem hic nusquam conspexi.

In Europa centrali, Gallia orientali, in Sabaudia, Neapolit. et in Sicilia, in insulis Canariis et in Algerio, ad Casanum et in promontoriis Uralensibus. Rara.

Deilephila O.

118. Porcellus L. OT. II. 211; HS. II. 85; H. 60.

Singula spec. reperi 16. Junii in S. floralibus (sociis: 119 etc.), et 3. Julii (una cum 998 etc.) in collinorum Szyp floridis declivibus. In Leopolis monticolo F. J., 1240 p. v. (Kbg.) elato, vagatur P. item solitarie (in posterioris societate) in locis floribus exornatis.

Per bor. et medium Europam (usque ad maris Medit. limites), per bor. Asiam minorem; a Lapponia usque ad Liguriam et Siwas, ab Anglia ad Uralum usque.

119. Elpenor L. OT. II. 209; HS. II. 85; H. 61. Sat frequens in Samboriæ floralibus (sociis: 118, 119, 389, 935, 372, 293, 316, 315, 226, 227, 269, 414. etc.), Leopoli volitat Elp. in monticolo F. J., et quidem in locis floribus consitis infernum copiosissime. Junio.

In cuncta Europa magnaue Asiae parte; ab Anglia usque ad Japoniam, a Lapponia usque ad Sardiniam.

120. Euphorbiae L. OT. II. 223; HS. II. 88; H. 66,

139, 140. Circa S., L., et Br. Augusto. Nonnullis annis vulgaris, aliis deest. Anno 1855. observavi in siccis pascauis circa Samboriæ infinitum prope erucarum numerum. Unam erucam inveni praeterea in prato montano circa Brylików, quapropter Euphorbiae et Halicyæ montosa inhabitare videtur.

In Europa media et australi nec non fructuosa Asia et Africa boreali; a Selandia Casanoque usque ad Syriam et Algerium, ab Anglia Hispaniaque usque ad Sibiriam et Caucasum.

121. Galii SV. OT. II. 217; HS. II. 87; H. 64. Frequentius Majo Leopoli in monticuli F. J. floridis; Samboriae etiam non rarus in floralibus (sociis 391, 303 etc.), sed Augusto.

In Europa (exceptis reg. arcticis), in Asia occid., insulisque Canariis; a Petropoli usque ad ins. Canarias, ab Anglia usque ad Altaium et Amasiam.

122. Livornica Esp. (Lineata Fabr.) OT. II. 214; HS. II. 86; H. 65, 112. Speciem hanc reperi singularem initio Aug. in Populi trem. truncō in pagi Stoposiany silvaticis alpestribus, loco circiter 2800. p v. elato. Praeter me detexit Liv. et Claris. Pietruski in promontoriis Stryensibus prope pagum Podhorodce.

In Europa occid. et media; a Britannia per Galliam, Helvetiam, universam Germ., usque ad provinciam Posnaniensem, Silesiam et Transsylvania; porro in campestribus ad lacum Caspium et in Caucaso. In Europa australi: in Lusitania, Hispania, m. Pyraeneis, in Pedemontio, in insulis Corsica, Sardinia, Neapolitana et in Dalmatia. Secus in Asia minori, Algerio et austr. Africæ prom. bonae spei. Rara.

Sphinx O.

123. Convolvuli L. OT. II. 236; HS. II. 90; H. 70. Samboriae Leopolique in hortorum sepimentis versus finem Aug. et Septembri; infrequens, nounnullis annis. deest.

Per Europam exceptis: Scotia bor., Scand. media et boreali, et Rossia trans Petropolim. Secus circa Pekingum, in India orientali in Algerio, Abyssinia et in prom. bonae spei; denique in America boreali, nova Hollandia et in insula Taiti.

124. Ligustri L. OT. II. 240; HS. II. 90; H. 69. Leopoli in hortis solitarie Juvio (sociis 273 etc.). Eruca ejus reperi Sept. in horto botanico in Ligastro vulg. Circa S. eum frustra per annos quaesivi, quamquam Ligustrum, Syringa et Lonicera hic ubivis in hortis coluntur.

In Europa (exceptis reg. arcticis), in Siberia, Oriente et in Africa bor.; a Petropoli usque ad ins. Canarias et ex his et Brit. usque ad Altaium et Caucasum.

125. Pinastri L. OT. II. 243; HS. II. 90; H. 67. Aliquot exempl. (una cum 238, 690. etc.) 30. Jubii pervesperi in pratalo herboso in H., aduersus pinetum Swinka. Copiose P. ne cubi mihi ad id tempus in conspectum venit.

Ubivis in Europa, ubi dantur silvae acerosae; a Lapponia usque ad Liguriā, a Scotia usque ad Uralum. In meridie incolit Pinastri potissime montosa.

Acherontia O.

126. Atropos L. OT. II. 231; HS. II. 90; H. 68. Invenitur quidem per cunctam Haliciam orientalem, sed summopere est difficile, eum in apertis volitantem captare; frequentius per-

vesperi in collistrata domicilia involat. Erucas ejus legi aestate in solanorum agris circa *Samboriam* et *Tarnopolim*, ubi sat frequentes adsunt. Tam papilio ipse, quam ejus erucae magnum timorem ignaris incutient, similiter ac *Euprepiarum* erucae, quae pro venenatis animalibus habentur.

(*Per Europam medium et australem, porro in Syria, insula Java, Algerio, insulis Canariis, in Guinea Africæ, promontorio bonae spei, et in nova Hispania.*)

Smerinthus O.

127. Tiliae L. OT. II. 246; HS. II. 91; H. 72. Quotannis solitarie et in pulchris varietatibus *Samboriae Leopolique* in *Tiliarum* aliarumque arborum truncis.

In media et austr. Europa, Sibiriaque; a Suecia merid., Livonia et Casano usque ad Neopolim, a Britannia ad Sibiriam usque.

128. Ocellata L. OT. II. 249; HS. II. 91; H. 73. Vulgaris, nonnullis annis copiosa, circa S. in *Salicium* truncis et ad vias publicas *Salicibus* exornatas in promontoria usque (Spas). Anno 1859 *Ocellata* circa *Leopolim* mihi non apparuit.

Per Europam Sibiriamque; a Lapp. usque ad Sardiniam, ab Anglia usque ad Sibiriam.

Laothoe Fabr.

129. Populi L. OT. II. 252; HS. II. 91; H. 74. Frequentis eodem ac prior tempore circa *Samboriam* et *Leopolim* in *Populorum* truncis, vicinisque locis.

In Europa et in Sibiria, a Lapp. usque ad Corsicam, ab Anglia in Altaium usque.

Syntomides HS.

Syntomis Illig.

130. Phegea L. OT. II. 105; HS. II. 50; H. 99, 160. Copiosa circa *Leopolim* in apricis declivibus silvigeri monticuli Cz. sk., rarius in pagi H. coll. fruticetis Zapole et Mostki. Versus finem Junii et initio Julii (vide 945 etc.). Tractui *Samboriensi* aliisque perlustrati terr. locis deest.

Per Europam medium et australem, per Sibiriam et Asiam minorem; a Livonia usque ad Siciliam, a Vandalitia usque ad Altaium. In occidente sporadica.

Zygaenoidae B.

Zygaena Fabr.

131. Brizae Esp. OT. II. 27; HS. II. 32; H. 85. In pratulo ad pedem collis Cz. sk. specimen unum 1. Julii. Quoad comites vide 946.

In Rossia australi, ad Budam, in Hungaria, in Dalmatia, ad Nissam; an in Valesia Helvetiae et in Bohemia?; — secus ad Araratum Asiae minoris.

132. Filipendulae L. OT. II. 54; HS. II. 42; H. 31.
Singula spec. in pratis coll. querceti P., promontoriorum Urycz,
moatosorum circa Czarna, et in inferiore Fagi regione in monte
Hušla, 4190 p. v. (Lob.) alto, (hoc loco simul cum 17 etc.).

*In Europa, Sibiria, Oriente, insulisque Canariis (?) ; a Petropoli et Suecia
usque ad ins. Canarias, a m. Pyraeneis Angliaque ad Wolgam usque.*

133. Achilleae Esp. OT. II. 30; HS. II. 34. Julio.

134. Lonicerae Esp. OT. II. 49; HS. II. 36; H. 7, 160. Junio.

135. Angelicae O. OT. II. 67; HS. II. 37; H. 20, 21. Augusto.

Singula specimina in fruticosorum apriis, herbosisque pratis in
monticulo *Czartowska skała*, 1304 p. v. (Kbg) elato.

*Achilleae habitat in Europa media et australi; a Parisiis et Alvernia per
Pedemontium usque ad prom. Uralensia. Britanniae, Holl., boreali — occid.
Germ., et Scandinaviae deest. In Oriente et Ararato adest. — Lonicerae reperi-
tur in Europa media et Scandinavia, a Britannia usque ad Petropolim et prom.
Uralensia. In m. Pyraeneis, Regno Granatensi, Pedemontio, Neapolii, ad Amasiam et
Tokat in Asia minori. — Angelicae denique occurrit in Europa centrali: in Saxo-
nia, Lusatia, Silesia, Bohemia, Austria inferiori, Styria, Hungaria et Polonia.*

In o Leach.

136. Statices L. OT. II. 11; HS. II. 27; H. 1. Vulgaris
in pratis humidis P. L., P. W., Maxymówka, Moczar etc. per
omne territorium planum et collinum. Junio et Julio.

A Suecia usque ad Vandalitiam, ab Anglia usque ad Uralum, Caucasumque.

137. Chloros Hüb. (*Globulariae* Esper.). OT II 13; HS.
II. 26; H. 2, 3. Unum specimen initio Julii prope Hołosko in
arenosi clivi *Helowszczyzna* sterilibus.

Secus circa Vindobonam, Budam, in Dalmatia, Brussaque.

138. Pruni SV. OT. II. 15; HS. II. 27; H. 4. Unum
exemplar graminis insidens (cum priore) inter frutices spisse ad
marginem coll. querceti *Korycina* crescentes.

*In Europa media, a Livonia usque ad Toscanam et Asiam borealem, a
Parisiis usque ad Pekingum Sinorum. Adest ad Wolgam et in Altaio. Britanniae deest.*

Bombyces.

Hepialides HS.

Hepialus Fabr.

139. Humuli L. OT. III. 104; HS. II. 6; H. 203, 204.
Quotannis solitarie *Samboriae Leopolique* Junio ac Julio in pomariorum sepibus.

A Petropoli usque ad merid. latera Alpium et Caucasi, ab Anglia ad Uralum usque.

140. Sylvinus L. OT. III. 109; HS. II. 7; H. 207, 216.
Duo exempl. (comitibus: 926, 995, 1253. etc.) inter frutices mixti nemoris coll. adversus betuleum *Krzywczycę* prope L. Majo.

A Suecia media et Petropoli usque ad medium Italianam Asiamque minorem, ab Anglia usque ad Uralum et Caucasum. Infrequens.

141. Velleda Hub. OT. III. 106; HS. II. 8; H. 212, 233, 234. Medio Junio. (socia 311.).

142. Lupulinus L. OT. III. 114; HS. II. 8; H. 210, 211. Augusto.

Singula specimina *Leopoli* in pomariorum sepimentis.

Velleda inhabitat Europam medianam et borealem; a Lapponia et Suecia usque ad merid. latera Alpium, ab Anglia ad Altaium usque. In Casano. Ubivis sporadica. — *Lupulinus* reperitur a Petropoli et merid. Suecia usque ad Liguriam, ab Anglia usque ad Transsylvania.

143. Hectus L. OT. III. 116; HS. II. 8; H. 208, 209, 258. Sat frequens in omnibus silvis circa L. In alneto R. g., ubi hinc inde *Humulus lupulus luxuriatur*, apparuit *Hectus* annis 1855 et 1856. ingenti numero; anno 1858 vero vix aliquot exemplaria in commemorata silva observavi.

A Petropoli usque ad Pedemontium et Transsylv., ab Anglia in Casanum usque.

Cossides HS.

Zeuzera Latr.

144. Aesculi L. OT. III. 99; HS. II. 12; H. 212. Singula specimina Majo *Samboriae* (simil cum: 211, 229, 231, 128, 214, 384, 346, 226, 216, 166, 129, 331, 372, 242, 1116.), et *Leopoli* (socia 260) in pomariorum sepibus. Decorus hic papilio est perrarus in Halicia.

A Hafnia et Livonia usque ad Algerium, ab Anglia usque ad Transsylv. Rara.

Cossus Fabr.

145. Ligniperda L. OT. III. 90; HS. II. 11; H. 198.

Vulgaris medio Junio, quando ex pupis exit, in plantario Salicum suburbii *Samboriensis*. Sat frequentes inveniuntur circum circa S. et ejus eruae vagantes praecipue in viis utraque parte Salicibus exornatis. Anno 1859 Lign. circa *Leopolim* non inveni.

A media australique Suecia et Petropoli usque ad Algerium, a Britannia usque ad Pekingum Sinensem. Ad Wolgam.

Psychides HS.

Psyche Schrk.

(*Fumea Haw*; *Epichnopteryx H.*).

146. Unicolor Hufgl. (Graminella SV). OT. III. 181; HS.

H. 20; H. 1. Unicum specimen, quod possideo, exiit 19. Junii ex pupa, quam *Samboriae* extremo Majo in pomarii septo reperi. Eodem die legi sequentia lepidoptera: 47, 139, 148, 206, 208, 249, 250, 269, 271, 276, 280, 290, 293, 296, 314 — 316, 320, 322, 332, 425 $\frac{1}{2}$, 526, 647, 656, 700, 778, 797, 1136, 1284.

A Suecia merid. et Casano usque ad Corsicam, a Gallia ad Uralum usque.

147. Bombycella Hüb. 4. OT. III. 171; HS. V. 61.

Frequens Junio initioque Julii in coll. silvaticis *R. g.* praecipue autem ibide in betuleti *Lwowiec* excisis tempore vespertino.

A Livonia usque ad Taurinum, a com. Burgundiae usque ad Transsylvania.

148. Pulla Esp. OT. III. 167; HS. V. 61. Volitavit satis

frequens medio Majo in depresso prato uliginoso *P. W.* prope *Stup.* (una cum: 10, 25, 26, 72, 102, 148, 226, 527, 536, 596, 599, 601, 705, 896, 953, 1017, 1028, 1045, 1064, 1106, 1158, 1248, 1014). Praeterea reperitur Pulla Junio *Samboriæ* in pomariorum sepibus et in betuleto *Lwowiec* (hic una cum: 551, 854, 936, 1005, 1162, 1192, 1280, 1253. etc.).

In universa fere merid. et media Europa; a Livonie usque ad Vandalitiam, orientem versus usque ad Uralum et Caucasum.

149. Calvella O. (Hirsutella Hüb.) OT. III. 172; HS. II.

20; H. 3. Unicum spec. 27. Junii inter frutices in coll. butuleti *Lwowiec* excisis, comitibus: 4, 7, 21, 58, 59, 67, 91, 94 — 98, 136, 143, 152, 156, 187, 188, 197, 288, 329, 406, 409, 413, 426 — 429, 442, 443, 454, 455, 505, 513, 529, 598, 584, 557, 581, 583, 639, 623, 647, 646, 656, 671, 677, 700, 717, 729, 733, 734,

749, 750, 754, 774, 777, 781, 783, 786, 798, 800, 802, 803, 816, 817, 822, 827, 828, 835, 840, 843, 847, 873, 875, 889, 894, 896, 928, 947, 948, 950, 966, 1012, 1036, 1040, 1041, 1045, 1046, 1113, 1129, 1149, 1163, 1166, 1182, 1191, 1206, 1209, 1228, 1222, 1241, 1246, 1248, 1262, 1266, 1272, 1279, 1283, 1336, 1337, 1346, 1350.

A Wismaria Germ. usque ad Besontium Galliae, ab Anglia usque ad Transsylv.

150. Nitidella Hüb. 6; OT. III. 169; HS. V. 62. Solitam et localiter Junio—Aug. in pratulis silvaticis, fruticetis, silvisque usque ad montosa, circiter 2800 p. v. elata.

A Lapponia meridionali usque ad Pedemontium Galliamque australem, ab Anglia usque ad Turciam.

151. Pectinella SV. OT. III. 170; HS. V. 62; H. 5. Pluria spec. 29. Junii in pratulorum fructecosis ad marginem coll. silvarum frond. inter L. et Wi., ubi ceterum eodem die sequentes volitaverunt species: 96, 143, 153, 187, 188, 243, 320, 424, 446, 453, 493, 581, 597, 623, 626, 700, 708, 729, 728, 751, 763, 749, 778, 798, 802, 803, 819, 828, 890, 902, 928, 947, 948, 966, 951, 969, 1000, 1060, 1052, 1055, 1077, 1083, 1090, 1033, 1114, 1133, 1163, 1168, 1180, 1183, 1198, 1201, 1206, 1221, 1241, 1242, 1232, 1263, 1286, 1295, 1327, 1336, 1346, 1338.

In media et austr. Europa; a Gallia usque ad Uralum, ex Luneburgo usque ad Liguriam. Haud dubie in Austria.

Cochliopoda B.

Limacodes Latr.

152. Testudo SV. OT. VII. 14; HS. II. 16; H. 164, 165. Quotannis vulgatissima Junio et Julio praesertim in quercetis per omne terr. usque ad altiora promontoria.

A media Suecia usque ad Corsicam, ab Anglia et Gallia usque ad Sibiricos fines. Ad Wolgam. 3. Julii 1857 reperi Testudinem (una cum multis aliis lepidopteris) in silvaticis prope Biehl in Austria.

153. Asellus SV. OT. VII. 18; HS. II. 16; H. 166, 167. Solitarius et dispersus, sed universim satis frequens, sub finem Junii et Julio in coll. ditionibus R. g. (sociis: 158, 561, 452, 451.), Czaple (una cum: 908 etc.) et L. (hic comitibus 151, 1083. etc.). Degit in Quercubus.

A Suecia media et Livonia usque ad Taurinum Dalmatianque, ab Anglia usque ad fines Sibiricos. Rara.

Platypterygidae Steph.

Cilix Leach.

154. Spinula SV. OT. V. 400; HS. II. 110; H. 40.

Hucusque inveni spec. duo (comitibus: 219, 863. etc.) in coll. dumosis ante silvas *R. g.*, tertium (sociis: 311, 264, 228, 282, etc.) *Leopoli* in floralibus. Majo et Junio.

In Europa media Italiaque; ab Anglia usque ad Transsylvania, a Gedano et Holsatia ad Sardiniam usque. Infrequens.

Platypteryx Lasp.

155. Lacertinaria L. (*Lacertula* Hüb.). OT. V. 417; HS.

II. 112; H. 49. Interdum sat frequens Majo — Aug. in coll. quer-
cetis (perraro betuletis) *R. g.*, *Tepliuch*, et *Woznyczne*. Circa L.
solitatem in campestri querceto *Bednarówka*.

*Viget in totius fere Europae regionibus, ubi Betula crescit; a Lapponia
usque ad Itiam medium, ab Anglia usque ad Casanum. Non rara.*

156. Falcataria L. (*Falcula* Hüb.) OT. V. 408; HS. II. 112; H. 44. Vulgaris Majo, Junio et Aug. in diversis sylvis fron- dosis, praeceps alnetis et buteletis, per omne terr. usque ad humiliores montes.

*Per cunctam fere Europam; a media et merid. Suecia usque ad Itiam
centralem, ab Anglia usque ad promontoria Uralensia. In provinciis Casano et
Orenburg.*

157. Curvatula Lasp. OT. V. 405; HS. II. 112; H. 42. 43. Per omnes annos reperi Junio (sociis: 561, 460 etc.) media in mixta silva *R. g.* specimina duo, quae ibidem interdiu in um- brosis prope humum inter herbas abdita latebant.

*A Suecia media et Petropoli per Parisios usque ad Alpes, specialiter Julicas.
Incolit alneta. Ubivis rara.*

158. Sicula SV. OT. 403. HS. IV. 112; H. 41. Unicum exemplar percussione Quercus 19. Junii in coll. querceto Radl. gorne. Hac excursione legi sequentes papiones: 21, 25, 27, 59, 78, 73, 91, 94, 96, 98, 103, 105, 107, 136, 143, 147, 152, 153, 155, 156, 158, 139, 160, 187, 188, 197, 212, 213, 320, 276, 392, 396, 407, 413, 426—429, 431, 434, 442, 443, 445, 446, 454, 463, 465, 467, 468, 472, 486, 491—493, 504, 505, 513, 509, 535, 544, 547, 550, 559, 565, 578, 583, 584, 587, 593, 595, 597, 600, 607, 609, 619, 612, 623, 628, 630, 636, 639, 646,

647, 650, 662, 669, 670, 671, 677, 681, 683, 685, 695, 700, 717, 718, 728, 733, 734, 739, 749, 750, 763, 764, 765, 767, 755, 774, 777, 778, 783, 786, 800, 802, 803, 806, 816, 817, 827, 828, 822, 835, 843, 846, 847, 856, 867, 868, 873, 875, 888, 894—896, 900, 902, 903, 908, 928, 935, 936, 947, 968, 972, 991, 994, 1012, 10 7, 1027, 1038, 1045, 1046, 1051—1054, 1060, 1061, 1063, 1069, 1075, 1076, 1092, 1097, 1113, 1125, 1131, 1138, 1149, 1156, 1166, 1206, 1210, 1225, 1229, 1248, 1250, 1262, 1279, 1281, 1283, 1287, 1296, 1327, 1346.

Inquinalis Europae mediae; ab Anglia usque ad Transsylvania, a Livonia usque ad Carniolam. Pomeraniae, Holsatiae, ad Rhenum etc. deest.

159. Unguicula Hüb. 48; OT. V. 414; HS. II. 111.
In collino fageto Czaple singulum exemplar Junio 1853 sociis;
1291, 654, 543, 42, 15 etc.

Inhabitat fageta Europae mediae; a Schonia et Prussia per Parisios usque ad Pedemontium, a Britannia ad Transsylvania usque.

160. Binaria Husgl. (*Humula SV.*) OT. V. 411; HS. II. 111; H. 46. 47. Ad id tempus legi 5. taatum exemplaria in coll. quercetis Radłowice górne et Bednarówka. Extremo Majo Junioque. Quoad consocios vide species: 1086, 256, 1014, 158.

A Hollandia usque ad Italiam centralem, ab Anglia usque ad Wolgam mediam (Saratow). Ubivis rara.

Saturnina HS.

Saturnia Schrank.

161. Carpini SV. OT. III. 6; HS. II. 96; H. 53, 54, 275, 276. Reperitur quotannis solitatem et raro in coll. fageto Czaple, silvaticisque frond. circa Leopolim. Aprili. In Halicia rarissima esse videtur

Per cunctam fere Europam et Sibiriam; a Lapponia usque ad Siciliam ab Anglia usque ad Altaium.

Aglia O.

162. Tau L. OT. III. 12; HS. II. 97; H. 51, 52. Frequens Aprili et Majo in coll. silvaticis circa L., praeccipue in illis inter H. et Brz., ubi fugaces mares horis antemeridianis ultro citroque per auras volitant. Ceterum obvia mihi fuit Tau quotannis solitarie in coll. fageto Czaple, et una femina trunco Piri insidens in pomario pagi Strzelbice, qui jam in carpath. situs est

promontoriis. In silvaticis R. g., duo circiter millaria a silvis Csaple remotis, Agliam Tau annis 1852 ad 1858 non inveni.

A merid. Suecia usque ad Pedemontium, a Parisiis ad Uralum usque. In Casano et in Baskiria. Britanniae deest.

Endromides B.

Endromis O.

163. Versicolora L. OT. III. 16; HS. II. 98; H. 12.
Unum specimen reperi semel per sex annos in silva Radl. górne in trunco Pop. tremulae. Circa Leopolim est V. frequentior, sed etiam quotannis solitaria in coll. silvaticis Hołosko. Aprili. In Halicia Vers. raris adnumeranda est papilionibus.

Per cunctas borealem et medium Europam; ab Anglia usque ad Casanum, a Lapponia usque ad merid. latera Alpium (Pedemontium — Transsylvania). In plurimis reg. rara.

Bombycides Leach.

Gastropacha Curt.

164. Quercifolia L. OT. III. 247; HS. II. 104; H. 187. 188. Solitarie Julio Samboriae et Leopoli in hortorum sepimentis aut arborum truncis.

In media et merid. Europa et in Siberia; a Petropoli et australi Suecia usque ad Sardiniam, ab Anglia ad Altaium usque.

165. Populifolia SV. OT. III. 245; HS. II. 103; H. 189.
Reperitur sparse Samboriae in hortorum sepibus Julio.

In Europa; a Petropoli usque ad Taurinum, a Parisiis ad Uralum usque. Scandinaviae, Britanniae, Holsatiae et Hamburgo deest.

166. Betulifolia O. OT. III. 242; HS. II. 103; H. 191. 192
Samboriae in pomariorum septis aliquot spec. Majo.

A Parisiis ad Altaium usque, a Petropoli usque ad Pedemontium. In Casano, provincia Orenburg, et in Baskiria. Scandinaviae, Britanniae, Borussiae, Holsatiae et ad merid. latera Alpium deest.

Bombyx B.

167. Pini L. OT. III. 251; HS. II. 104; H. 184. 185. In truncis Pini silvestris, ex qua in pago Hołosko silvula Swinka constat, reperi aliquot exemplaria in varietatibus Julio.

Per Sibrium et Europam; a Lapponia usque ad Corsicam, ab Anglia ad Altaium usque. Devastat interdum pineta. Multis regionibus Europae boreali — occidentalis deest.

168. Pruni L. OT. III. 254; HS. II. 104; H. 186. Duo specimina (simul cum : 288 etc.) in pomariis *Leopoli*. Julio.

In Europa, a Parisiis ad Uralum usque a Petropoli usque, ad Taurinum. Ubivis rara.

169. Potatoria L. OT. III. 256; HS. II. 104; H. 182.

183. Nona Junii reperi in *Hołosko* quatuor ad marginem querecti *Korycina* in florido segetum confinio reptantes erucas maturitatem jam assecutas, quae altero die pupae factae sunt et 30. Junii papiliones praebuerunt.

Viget in plurimis Europae terris et in Sibiria; a Petropoli usque ad Toscana, ab Anglia in Altaium usque.

170. Neustria L. OT. III. 296; HS. II. 105; H. 179, 180.

Quotannis vulgatissima (interdum innumerosa) Julio ubique in pomariis a pl. usque ad elatiiores montes, ubi arbores pomiferae sat prospere procedunt.

Habitat cuncta fere in Europa et in Asia finitima; a merid. Lapponia usque ad Calabriam et Asiam minorem, ab Anglia usque ad Altaium. Saepe noxia.

171. Populi L. OT. III. 276; HS. II. 105; H. 163. Unum par *Leopoli* in pomarii sepimine initio Sept. in societate specie-

rum : 123, 271, 334, 376, 393, 419.

A Stockholmia et Petropoli usque ad Padum Transsylvaniaque, ab Anglia usque ad Wolgam (Sarepta). Regionibus arcticis et ditioni maris Medit. deest.

172. Crategi L. OT. III. 278; HS. II. 105; H. 162. Unum

exemplar, quod possideo, prodit 11. Julii ex pupa, quam in *Samboriae* pomario sub finem Junit reperi.

Ab australi Lapp. usque ad Pedemontium Transsylvaniaque, ab Anglia usque ad Rossiam occidentalem Ad Wolgam et in Europa merid. non occurrit. Rara.

173. Lanestris L. OT. III. 289. HS. II. 108; H. 169, 170.

Initio Aprilis semel specimen unicum *Leopoli* in pomarii septo comitibus : 590. 350. 377. etc.

A Suecia media et Petropoli usque ad Pedemontium, ab Anglia usque ad fines Sibiricos. Ad medianam Wolgam.

174. Trifolii SV. OT. III. 262; HS. II. 107; H. 171. In

graminosis pratuli in ditione coll. *Hołosko* reperi duo specimina 30. Junii comitibus : 238. 690. etc.

In media et australi Europa nec non in Oriente; a Stockholmia usque ad Siciliam, ab Anglia usque ad Uralum et Lenkoran.

175. Quercus L. OT. III. 266; HS. II. 106; H. 172, 225.

349. 350. Tria spec Julio prope *Leopolim* in coll. querceti Ko-

rycina excisis. Erucas ejus vidi hic Majo. Circa Samboriam Q. nullibi in conspectum mihi venit.

In cuncta Europa et Sibiria occid.; a merid. Lapponia usque ad Sardiniam, ab Anglia ad Altaium usque.

176. Rubi L. OT. III. 270; HS. II. 106; H. 174. 281.
Singula spec. Majo in pratulo humido P. L. (sociis 1086 etc.) et in coll. silvaticis prope Lisienice. Medio Junio 1859. volitavit Rubi sat multa circa J. (comitibus: 1309 etc.) in pratis juxta pineto-rum margines.

In cuncta fere Europa Sibiriaque occid.; a Lapponia usque ad Itiam mediam, ab Anglia ad Altaium usque.

Liparides B.

Porthesia Steph.

177. Chrysorrhoea L. OT. III. 202; HS. II. 136; H. 67. 248. 249. Quotannis copiosa Julio Samboriae Leopolque in pomatis, arbustis etc.

In cuncta Europa media et australi; a Gothlandia usque ad Algerium, et per Caucasum et Wolgani usque ad montes Himalaya in Asia. Interdum noxia.

178. Auriflua SV. OT. III. 205. HS. II. 136. H. 68. 69. Primum spec. 20. Julii Samboriae (sociis 246. 165. 675 etc.) in pomario, secundum 25. Aug. in fruticoso alneto ante coll. silvam R. g.

In media et australi Europa, a Livonia usque ad Itiam inferiorem et Asiam minorem, ab Anglia ad Pekingum usque. Ad Wolgam, in Caucaso et Altaio.

Ocnoeria H.

179. Dispar L. OT. III. 195; HS. II. 135; H. 75. 76. 263. Vulgatissima Julio initioque Aug. ubique locorum in vicinia humanarum habitationum in hortis, arbustis, ambulacris etc. Veloces et interdu vagantes mares persaepe in domicilia involant.

In Europa media et australi, Asia occid., et in Africa boreali; a Stockholmia usque ad Algerium, ab Anglia usque ad Altaium et mare Caspium. Noxia.

Psilura Steph.

180. Monacha L. OT. III. 192; HS. II. 137; H. 74. Solitatem Julio in pomariis silvisque frond. regionum coll. circa S. et L.; porro in querceto ditionis campestri - collinae prope bali-neum Lubien.

In Europa; ab Upsalia et Petropoli usque ad Corsicam, ab Anglia usque ad fines Asiaticos. Devastat interdum pineta.

Dasychira Steph.

181. Selenitica Esp. OT. III. 216; HS. II. 134; H. 79. 80.

Unum par *Leopoli* in sepalereto *Lyczakoviensi* in muro templari
Majo comitibus: 260. 144 etc.

Per Europam medium; a Rheno usque ad medium Wolgam, a Petropoli
usque ad septentrionalia latera Alpium et montium Carpathicorum. In Europa
australi et boreali — occid. non provenit.

182. Faseolina L. OT. III. 214; HS. II. 134; H. 81.

Unum marem 30. Junii (simul cum: 238, 566, 192. 987, 690 etc.)
in collinorum *Mostki* fruticeto querceo prope *Hołosko*.

In cuncta boreali et media Europa et in Sibiria; a Lapponia usque ad Pe-
demontium, ab Anglia ad Altaium usque.

183. Pudibunda L. OT. III. 209; HS. II. 134; H. 84. 85.

Satis multa Junio *Samboriae Leopolique* in promariis, praeterea in
coll. silvaticis pagorum R. g. et H.

In silvis frond. a Petropoli et Suecia usque ad Italianam medium, ab Anglia
usque ad fines Sibirices.

Orgyia O.

184. Antiqua L. OT. III. 221; HS. II. 133; H. 77. 235.

Singula specimina Julio in pomario *Samboriae*, silvaticis coll. pro-
pe *Lisienice*, et 8. Oct. in campestri querceto *Bednarówka*.

Incola Europae et bor. Africæ; a Lapponia usque ad Algerium, ab Anglia
usque ad provinciam Orenburg.

Laria Hub.

185. V-nigrum Fabr. OT. III. 200; HS. II. 138; H. 71.

Medio Junio 1854 inveni *Samboriae* in trunko *Salicis* exemplar uni-
cum, quod paulo ante ex pupa exit. Postea nunquam nullibique
V-nigrum in conspectum mihi venit. Uno tempore aderant *Sam-
boriae* sequentes praeterea papilones: 118, 119, 127, 128, 139,
164, 198, 199, 185, 206, 208, 212, 213, 222, 226, 227, 244, 245,
249, 252, 250, 261, 264, 269, 274, 276, 278, 290, 291, 289, 293,
294, 297, 312, 314 — 316, 320, 322, 329, 332, 337, 384, 386,
396, 414, 469, 584, 627, 647, 656, 685, 813, 976, 1017, 1039

Ab Anglia usque ad Uralum, a Livonia ad Pedemontium usque. Ubivis
vara, Carniolæ, Budæ et Transsylvaniae desst.

Leucoma Steph.

186. Salicis L. OT. III. 189.; HS. II. 135; H. 70. Quo-

tannis ingenti numero Julio per cunctum humilius terr. in urbibus,

pagis, et ad vias exornatas Populis aut Salicibus, quas vesperi gregatim circumvolat.

Degit in tota Europa Asiaque sept.; a Lapponia usque ad Italiam medium ab Anglia usque ad Pekingum. Interdum noxia.

Lithosioidae B.

Calligenia Dup.

187. Miniata Forst. (*Rosea* Fabr.) OT. III. 145; HS. II. 162; H. 111. Quotannis vulgaris praecipue in querctis a pl. usque ad promontoria, circiter 2000 p. v. elata. Junio et Julio.

In cuncta Europa media et in Sibiria; a Petropoli usque ad Liguriam, ab Anglia ad Altaium usque. Infrequens.

Setina Schrk.

188. Mesomella L. (*Eborina* SV.) OT. III. 152; HS. II. 154; H. 104. 266. Frequentissima Junio Julioque in silvis frondosis frutectosisque per omne terr. collinum; nec non in promontoriis, circiter 2800 p. v. elatis.

Viget in Europa media et in Sibiria; a Suecia et Petropoli usque ad Liguriam, ab Anglia ad Altaium usque.

188½. Irrorella L. HS. II. 155; OT. III. 148; H. 105. Vagabatur frequenter medio Junio 1859. prope Leopolim in herbosis apricisque coll. silvae Krzywczycze, speciatim autem in vicinis ruderorum cauponae ad pagum Krzywczycze pertinentis. Irrorella in Halicia rarer esse, saltem paucissimis locis reperiri videtur, quam annis 1852. ad 1859, quibus diversissimas peragravis regiones, mihi nullibi eam observare contigerit.

In cuncta fere Europa et in Asia anteriore; ab arctiis Scandinaviae regionibus usque ad montes Pyraeaeos, Sibiriam et Asiam minorem. Non rara.

Lithosia Fabr.

189. Aureola Hüb. OT. III. 140; HS. II. 158; H. 98. Invenitur perraro circa S. in fruticosis coll. betuleti Lwowiec, vulgate vero ubivis circa L. in variis silvis frond., nec non in quercto P. R. (hic comitibus 1309 etc.). 18. Maji — 12. Junii.

In Europa media; a Selandia usque ad Italiam superiorem, ab Anglia usque ad Wolgam. Non rara.

190. Complana L. OT. III. 129; HS. II. 158; In silva R. g. reperi per sex annos exemplaria duo; in sylvaticis circa L. est Compl. sat frequens quidem, sed dispersa. Extremo Junio (comitibus 238, 690 etc.) totoque Julio.

A Lapp. usque ad Italiam medium, ab Anglia usque ad Uralum et Sibiriam.

191. Helveola O. HS. II. 159; H. 95; OT. III. 133. Unum exemplar, quod possideo, reperi 1. Julii (sociis 945 etc.) ad pedem monticuli Czartowska skała in trunco vicini fageti.

192. Depressa Esp. HS. II. 159; H. 96; OT. III. 132. Unum specimen 30. Junii (comitibus: 238, 566, 424, 986, 1098, 690 etc.) prope Hołosko in querceo fruticeto collinorum Zapole et Mostki. *)

Proveniunt in Europa media; a Petropoli usque ad merid. latera Alpium, ab Anglia ad Transsylvania usque. Orientali Rossiae Sibiriae et regionibus inter silvam Hercyniam et flumen Oderam desunt.

Oeonistis Hüb.

193. Quadra L. OT. III. 126; HS. II. 161; H. 101, 102.

Hucusque singula spec. Julio Samboriae (una cum: 270 etc.) in sepe pomarii, prope Janow (vide 998.) inter frutices querceos collinorum Szyp, et in promontoriorum Uryez intersilvatico pratulo, 2958 p. v. (Kbg.) elato.

In Europa media et australi; ab Anglia usque ad Wolgam inferiorem, a Smaelandia Curlandiaque usque ad Italiam inferiorem.

Gnophria Steph.

194. Rubricollis L. OT. III. 142; HS. II. 161; H. 94.

Provenit in collinis quercetis R g., P., Kor., P. R., in silvigeris promontoriis Spas, nec non in pratulo fageti in summo monte Magóra. Junio et Julio; ubivis semperque rara.

Ab Anglia ad Altaium usque, ab Uplandia usque ad Pedemontium Transsylvaniaque. Ad Wolgam. Nullibi frequens.

Chelonides B.

(Arctiidae Steph. Euprepiae Led.)

Emydia B.

195. Grammica L. OT. III. 306; HS. II. 149. Unum specimen (sociis: 432, 929, 892, 1219, 1240, etc.) in collinorum Zapole querceo fruticeto 4. Junii percussione humilium herbarum, in quibus Gr. Chelonidum more delitescebat.

In media et austr. Europa, in Sibiria Orientaleque; a Stockholmia ad Cyprum usque, ab Anglia usque ad Altaium.

*) Helveolam et Depressam Clariss. Speyer habet pro mare et femina unius ejusdemque speciei.

Euchelia B

196. Jacobaeae L. OT. III. 154; HS. II. 151; H. 112.
Hueusque specimen unicum (simul cum 328.) 9. Junii in summo
pratulo collini fageti Swinka in Hołosko prope Leopolim.

In Europa (excepto sept. extremo), in Sibiria et in Asia minore; a Suecia
media et Livonia usque ad Siciliam et Patara in Asia minore, ab Anglia usque
ad Altaium.

Nemeophila Steph.

197. Russula L. OT. III. 309; HS. II. 148; H. 124, 125.
Copiosa Majo — Julio per omne terr. usque ad humiliores montes
in pratis subsylvaticis nemorumque herbosis. Feminae rariores esse
videntur, nam difficulter etiam iis inveniuntur locis, in quibus ma-
res ad taedium sunt frequentes.

Viget in maxima Europae parte conterminaque Asia; a Suecia Petropolique
ad Italiam medium usque, ab Anglia usque ad Altaium.

198. Plantaginis L. OT. III. 312; HS. II. 147; Hüb.
126 — 128. Speciem hanc, quae rara est universim in Halicia mi-
reque et apud nos mutat colores, legi hucusque aliquot tantum
exemplaribus. Varietates eius praestantiores sunt:

- a) „alis poster. albis, limbo maculisque duabus nigris.“ Unum ma-
rem (sociis 185 etc.) 15. Junii Samboriae in pomario, qui gra-
mini insidebat.
- b) „alis poster. nigris, facia ante limbum maculaque anali albis.“
Junio in cacumine collis Cz. sk. marem unum, qui inter her-
bas lalebat. Alia meae collectionis specimina, quae item Ju-
nio circa Leopolim legi, prope ad normalem accedunt speciem.

In Europa Sibirique; ex borealibus Scandinaviae regionibus usque ad Van-
dalitiam et Caucasum, ab Anglia ad Altaium usque.

Callimorpha Latr.

199. Dominula L. OT. III. 316; HS. II. 151; H. 117, 118.
Extremo Majo legi in betuleti Lwowiec herboso margine numero-
sas erucas, quae mox pupae factae, 15. Junii pulcherrimos pre-
buerunt papiliones. Sub finem Junii inveni D. frequentem prope
Stupnica in solida Abietis pect. silvula Jedlina et pluria spec. 21. Ju-
nii in querceto R. g. In sylvaticis circa L. invenitur D. non raro
mense Junio.

Colit Europam Orientemque; a Lapponia usque ad Calabriam, ab Anglia ad
Uralum usque.

200. Hera L. OT. III. 319; HS. II. 151; H. 116. Solitariae Julio *Samboriae Leopolique* in hortis; praeterea in sterilibus collinorum Na *Popowiczym* prope fornacem calcariam in *Hołosko*.

In Europa australi, Oriente et in Aegypto inferiore; a litoribus occid. Galiae usque ad Uralum Persiamque meridionalem, a silva Hercynia usque ad Nilum insulamque Rhodum.

Pleretes Leaderer.

201. Matronula L. OT. III. 327; HS. II. 150; H. 138.
139. Duos pulcherrimos mares reperire mihi contigit semel 12. Junii 1859, prope Janow (sociis 1309 etc.) in florido pratulo, pineto R. et segetibus interposito, ubi abditi latebant inter herbas, et ex his percussis sursum avolabant. Auctore Inclito Czerny *) edit Matr. peculiarem sonum, quae facultas ad id tempus de sola *Acherontia* nota erat.

In Europa media; a Livonia et litoribus Balticis usque ad Alpes maritimam et Transylvaniam, a Lotharingia ad Uralum usque. Ubivis rara. In Scandinavia, Britannia, Hollandia, Belgia etc. non occurrit.

Arctia Steph.

202. Caja L. OT. III. 335; HS. II. 147; H. 130. 131.
Samboriae Leopolique in hortis Junio; infrequens.

In Europa, Sibiria Californiaque; a Lapponia usque ad Sardiniam, ab Anglia usque ad Altaium — imo orient. oras Sibiricas.

203. Villaea L. OT. III. 330; HS. II. 148; H. 136. Jisdem in locis et tempore, ac prior, sed *Leopoli* frequentior.

A Livonia usque ad Siciliam et insulam Rhodum, ab Anglia per Caucasum et Casanum ad Uralum usque.

204. Hebe L. OT. III. 339; HS. II. 146; H. 129. 196. In coll. querecto Korycina prope *Hołosko* nonnullis annis frequens. *Samboriae et Leopoli* rarissima. Junio.

A Holsatia usque ad Italianam inferiorem, a Parisiis per Europam et Asiam usque ad Altaium. In Britannia, Hollandia, Belgia et in Germaniac boreali — occid. parte non provenit.

205. Aulica L. OT. III. 324; HS. II. 146; H. 139. Unum marem gramini incidentem detexi semel 2. Junii inter L. et W., in aprico pratulo silvatico frequentibus Quercubus limbato. Eodem die legi in his regionibus sequentia lepidoptera: 13, 19, 27, 32, 35, 60, 70, 73, 76, 78, 91, 94, 107, 113, 156, 187, 188, 197,

*) Verhandlungen der k. k. zoolog. bot. Ges. in Wien. Vol. IX. pag. 19.

206, 208, 269, 288, 301, 304, 320, 398, 407, 409, 411, 446,
453, 463, 467, 478, 485, 493, 510, 512, 531, 551, 557, 559,
586, 564, 570, 597, 604, 622, 623, 628, 636, 663, 677, 683,
691, 701, 705 — 708, 717, 718, 730, 744, 773, 777, 779, 783,
803, 816, 820, 860, 873, 875, 886, 894 — 896, 900 — 902, 928,
947, 953, 999, 1024, 1045, 1040, 1048, 1049, 1059, 1061, 1073,
1076, 1138, 1149, 1197, 1190, 1210 1262, 1271, 1297, 1298 etc.

In Europa (exceptis extremis bor. et merid. terris), in Sibiria Asiaque minore; a Petropoli et Stockholmia usque ad Toscanam, a Lotharingia ad Altaium usque. Britanniae, Hollandiae, Belgio et boreali — occid. Germaniae deest.

206. Lubricipeda SV. OT. III. 358; HS. II. 143; H. 155,
156. Quotannis copiosa Junio *Samboriae et Leopoli* in hortis, rarius in silvaticis. Pluria specimina obvia mihi fuerunt 2. Julii in pago D. (sociis 1195 etc.).

In cuncta fere Europa; a Petropoli et Suecia usque ad Corsicam, ab Anglia usque ad provinciam Orenburg.

207. Purpurea L. OT. III. 322; HS. II. 148; H. 142.
Aliquot exemplaria Junio circa *Leopolim* in silvaticorum graminosis.

In Europa media, Sibiria et in Asia minori; a Parisiis usque ad Caucasum et Altaium, a litoribus Balticis usque ad Pedemontium.

208. Menthastris SV. OT. III. 354; HS. II. 143; H. 152,
153. *Vulgaris Lubricipedae* comes.

In Europa (excepto sept. extreme) et in Asia occid.; a Suecia et Petropoli usque ad Sardiniam et Transcaucasiam, ab Anglia usque ad Altaium.

209. Urticae Hüb. 154; OT. III. 357; HS. II. 143. Semel unam seminam 15. Junii 1853 in coll. quereteti Pawłówka fruticosis.

Habitat in Europa a Petropoli usque ad Pedemontium et Transsylvaniam, ab Anglia usque ad provinciam Orenburg. Palatinatu, Magno Duc. Badenensi, Alsacie, Regno Wurtemburgico etc. deest.

210. Mendica L. OT. III 351; HS. II. 143; H. 148, 149.
Hucusquae unum par (sociis 238. 690. etc.) 30. Junii in querceo fruticeto collinorum Zapole prope *Leopolim*.

Per maximam Europae partem usque ad Sibiriam; a Petropoli et Stockholmia usque ad Italiam medium, ab Anglia ad Altaium usque. Holsatiac et Silesiae inferiori deest.

Phragmatobia Steph.

211. Fuliginosa L. OT. III. 346; HS. II. 142; H. 143.
Vulgaris in sepibus (una cum 298. 346. etc.) *Samboriae Leopoli* que Aprili et Majo. Hiemantes in latebris erucae conspicuntur jam

primi verni diebus pulchris, quamquam nives brumales nondum deliquescerunt et solum adhuc congelatum est.

Incolit Europam, Sibiriam, Orientem, Californiamque. A Lapponia usque ad Sardiniam et Asiam minorem, ab Anglia usque ad Altaium et Caucasum.

Notodontides B.

Harpyia O.

212. Vinula L. OT. III. 20; HS. II. 119; H. 34. Obvenit solitarie in hortorum septis circa S. et L., porro in querecto pagi R. g. Tempus vigendi m. Juuius.

In Europa, Asia occid. et Africa boreali; a Lapponia usque ad Algerium, ab Anglia usque ad Sibiriam Transcaucasiamque.

213. Erminea Esp. OT. III. 24; HS. II. 119; H. 35. Reperitur in supra nominatis localitatibus haud vulgate quidem, attamen summatim frequentius quam Vinula. Viget Majo-Julio.

A Livonia usque ad Pedemontium, a Parisiis ad Wolgam usque. Ubivis rara. Scandinaviae, Hollandiae, Britanniae et boreali-occid. Germaniae deest.

214. Fureula L. OT. III. 32; HS. II. 118; H. 39. Tria specimina, quae in collectione habeo, exierunt Majo ex pupis, quas Samboride et Leopoli in pomiorum sepibus, e tabulis factis, reperi. Autumno anni 1859. inveni Leopoli satis multas erucas.

A Lapp. usque ad Toscanam, ab Anglia ad Casanum usque.

215. Fagi L. OT. III. 39; HS. II. 120; H. 31. (*Stauropus Fagi*). „*Atis fusco cinereoque mixtis, ant. strigis 2 flexuosis lutescentibus (posteriore ultra costam alarum post. producta), serie punctorum nigrorum pallidae lineae undulatae maculari adnatorum; ciliis in venis albo sectis.*“ 27.” Hactenus semel unum marem in querecto B. 23. Junii (sociis: 28, 35, 27, 89, 258, 281, 623, 700, 728, 729, 734, 733, 749, 759, 763, 798, 800, 802, 803, 817, 822, 828, 883, 903, 928, 1213, 1214, 1304 etc). Stauropum Fagi nequaquam in Halicia rarum esse, ex hac re conjiciendum esse puto, quod ejus erucas quamquam non frequentes tamen aliquot speciminibus circa L. in Fagis et Quercubus repererim, quum Septembri fagetum in L. et queretur in B. perscrutabar.

A Suecia et Liv. u. a. Neap. Iberiamque, ab Anglia u. a. Wolgam et Caucasum.

Notodontida Tr.

216. Dictaea L. OT. III. 63; HS. II. 123; H. 22. (*Leio-campa Dictaea*). Specimina plura Samboriae in arbustis ambulatorum Wychylówka et Leopoli in hortis. Viget Majo.

A Petropoli usque ad Liguriam, ab Anglia usque ad Sibiricos fines.

217. Ziezac L. OT. III. 48; HS. II. 124; H. 26. Exemplar alterum *Samboriae* in pomarii septo, alterum in fruticeto alneto, silvatica *R. g.* vestiente. Volat m. Aug. simul cum: 418, 85 etc.

A Lapponia usque ad Sardiniam, ab Anglia ad medium Wolgam usque.

218. Dromedarius L. OT. III. 53; HS. II. 124; H. 28. Aliquot specimina initio Junii (simal cum: 863, 295, 1309) in pomariorum sepimentis et silvaticis circa S., L., J.

A Petropoli et Stockholmia usque ad Sabaudiam, Carniolam et Transsylvania, ab Anglia in Casanum usque.

219. Ruficornis Hufgl. (*Chaonia SV*). OT. III. 82; HS. II. 122; H. 10. 11. Semel exemplar unicum in trunco Populi tremulae in mixtis silvaticis pagi *R. g.* ineunte Majo simul cum: 5, 9, 10, 13, 75, 76, 112, 128, 129, 144, 154, 156, 166, 197, 211, 214, 216, 219, 224, 226, 229, 231, 236, 242, 249, 252, 290, 291, 331, 346, 349, 372, 375, 379, 384, 478, 485, 527, 533, 536, 550, 572, 575, 582, 596, 599, 601, 612, 637, 706, 979, 1007, 1044, 1061, 1106, 1116, 1248, 1318, 1319.

In Europa media, a litoribus Balticis usque ad Helvetiam, Pedemontium et Liguriam; a Parisiis et Anglia usque ad Wolgam inferiorem. Incola queretorum.

220. Crenata Esp. OT. III. 79; HS. II. 117; H. 12. (*Glyphidia Crenata*). „*Alis fuscis, cinereo mixtis, anter. striga baseos abbreviata duabusque mediis crenatis nigris tantibus pallideque adumbratis (posteriore alas post. percurrente), lunula areae mediae lineaque undulata pallidis, hac extus nigro-marginata; post. in angulo ani obscurioribus.*“ 14.” Hactenus obvia mihi fuerunt per 5 annos specimina 4; tria *Samboriae* in pomariorum septis, quartum in Alao glutinosa silvaticorum pagi *R. g.* Omnia haec specimina inveni mense Junio: Aprili eam frustra ad id tempus quaevisi.

A Braunberg in Borussia u. a. Vandalitiam, ab Anglia u. ad Transsyl. Rara.

221. Plumigera SV. OT. III. 71; HS. II. 121; H. 13. 250. (*Ptilophora Plumigera*). „*Varians; alis ant. ochraceis, striga dupli media pallidiore, anteriore subobsoleta, posteriore distinctiore; vel: alis ant. ferrugineo fuscoque mixtis, area media fusca. Antennis maris plumosis.*“ 16—18½.” Speciem hanc possideo tribus speciminibus; ambo ochracea (marem et feminam) reperi in Betulis silvarum frond. circa pagum Liš., tertium marem, area media fusca insignitum, in fageto mixt. silvarum pagi *R. g.* Tempus vigendi est m. Aprilis; Octobri eam hactenus non inveni.

In Europa media ab ostiis Allis ad Galliam merid. et Carinthiam usque, a Britannia ad Livoniam et Transsylvania usque. Infrequens.

222. Bicolora SV. OT. III. 73; HS. II. 124; H. 18. (*Microdonta Bicolora*). „*Alis nireis, anterioribus strigis 2 macularibus nigris, anteriore fascine fractae aurantiacae adnata.*“ 17.” Decoram hauc speciem reperi hactenus 8 specimibus. Agit vitam solitariam in silvis frondosis circa R. g., Stup., H. Volat in terris nostris m. Majo et Junio (similis cum: 1086, 863, 328 etc). In Samboriae pometis obvium mihi fuit per 6 annos specimen unum.

A Suecia merid. et litoribus Balticis usque ad Vindobonam, a Parisiis usque ad Livonian et Casanum. Rara. Daniae et Hollandiae et Britan. deest.

223. Sieversii Schaufelberger in lit. (*Odontosia Sieversii*). Descripta a Celeb. M. E. Ménétrière in Etudes entomologiques, Helsingfors 1856, pag. 42.^o) „*Alis ant. elongatis cinereo-albidis, ferrugineo mixtis, fascia media dentata subobscuriore, antice dilata (3'') maculisque costae albidis (in strigas obsolet. continuatis) utrimque terminata; postice coarctata (3/4'') denticuloque dorsali nigricante finita, venis passim subnigris posticeque sagittas exhibentibus, linea limbali fusca, flexuosa, ciliaque albida in venis dividente; post. fuscouscentibus, striga submedia albida antice obsoleta, ad dorsum distincta, angulo ani fusco-griseo, ciliis albo fuscoque rectis; subtus al. omn. ferrugineis, striga post medium distincta albida percurrente.*“

Latitudo inter alas expansas 21—24.” Antennae ferrugineae, maris peccinatae, fem. filiformes. Corpus coloris lanae analis in Chrysorrhœa. Scapulae pilis erectis albidis, nigro-terminatis. Costa dorso longior, limbus subrotundatus, nullo dente angulove. Alae semipellucidae, ant. cinerascentes, inaequaliter ferrugineo mixtae, ad costam in utroque sexu obscuriores. Area media, quoque subobscurior, obliquam fasciam dentatam refert, quae utrimque strigis obsoletissimis pallidis, in maculis costalibus (quarum post. distinctior) incipientibus, marginatur et in breviusculum dentem pone dorsi medium excurrit. Striga post. in alas post. continuatur; ambae subtus bene expressae. Dentes in margine fasciae externo cum obscuris venis (fasciam ter dissecant.) collabuntur constituantque cum his sagittas, quarum praecipue 2 superiores in mare distinctissimæ. Linea undulata non conspicua. Ceterum omnia ut in diagnosi. Mas et fem. pares, nisi quod haec major paullo dilutior.

Formosissimum hoc lepidopteron quod hactenus pluribus tantum specimibus circa Petropolim et Moscoviam m. Aprili est captum, in Halicia prope Leopolim in campestri betuleto Zuberze die 30. Martii a. 1859. detegere mihi fortuna favit. Quinque specimina pulcherrima (3 mares, 2 fem.), quae nominato die (in societate frigoris patientiorum specierum: 240,

¶ D. Lederer ejus mentionem facit in suo tractatu „Lepidopt. Mittheilungen über die Ochsenheimer'sche Gattung Notodonta, Berliner Ent. Zeitung Vol. II p. 357, addit tamen, se eam in natura non vidiisse. In aliis, quantum novi, operibus, post annum 1856 in publicum editis, non commemoratur, quam ob rem hactenus paucissimis tantum Lepidopterologis nota esse videtur. Secundum D. Ménétriés gloriantur *Odontosia Sieversii* musea DD. Bremer (primus detector), Schaufelberger, Sievers, Albrecht, Icen. Ex meis 5 speciminiis uacuum par Sincerius meis Amicis Henrico Zimmermann et Josepho Mann memoriae causa dono dabam.

436, 437, 518, 519, 523 524, 572, 575, 600, 829, 914, 921, 1008, 1010) reperi, circa vesperam, nivalem et frigidam, ex pupis prodierant pandebantque singula et dispersa haud procul a silvae marginibus ad radices juvenearum Fagorum, quae hie passim uti inquiline spontaneae salutantur. In Betulis, quas pari modo adequare attinge circumspectavi, nullum exemplar vidi. In quiete alas anticas ita complicat, ut conniventes margines interiores cum solito denticulo supra tergum eleventur. Aeu transsuta motu valde est tarda, acsi mortuam simularet. Puparum thecas neque in truncis neque ad radices invenire potui, quamquam diligenter quaesiveram; idecirco tempore etiam dicere non possum, utrum pupae sint folliculo inclusae, foliis quisquiliisve alligatis involutae, in terra sepultae, vel humi absconditae, metamorphosis igitur fiat sub terra, an supra eam. Mense Aprili saepissime idem betuleum et confine queretur in pago Bednarówka pervingstabam, sed ne unum quidem Sieversii exemplar mihi jam obvium fuit, quam ob rem eam etiam in terris nostris haud frequenter esse censeo. Quum demam Sieversii in betuleto Zubrza, quod praeter corytela, rubeta, aliquot Fagos et Quercus nullam aliam agnoscit arbuseulam, haud dubie procreata sit omniaque specimena capta in Fagis sederent, ad veritatem accedere videtur, erreas e Fago silvaticae, forsitan et in Betula alba vietitare.

224. Camelina L. OT. III. 58; HS. II. 126; H. 19. (*Lophopteryx Camelina*). Obvenit in Samboriae hortis, in ambulatoris Wychylówka, et in silvaticis R. g. Summatim satis frequens, attamen quotannis solitaria dispersaque. Viget m. Majo et Junio.

A Lapponia usque ad Pedemontium, ab Anglia usque ad Sibiricos fines.

225. Cueullina SV. OT. III. 55; HS. II. 126; H. 20. (*Lophopteryx Cueullina*). „Alis ant. ochraceis, juxta dorsum et ad apicem ferrugineis, limbo albido; poster. litura anali obscura.“ 17.” Specimen unicum in Populi tremulae truncis in silvaticis pagi R. g. 19. Maji sociis Thyatira Batide etc.

Ab Anglia usque ad Transsylvania, ex Berolino in Carniolam usque. Ubivis rara.

226. Palpina L. OT. III. 69; HS. II. 127; H. 16. (*Pterostoma Palpina*). Reperitur frequenter in hortorum septionibus ubique circa S. et L. Prima generatio Majo initioque Junii, secunda Julio.

A Petropoli usque ad Sardiniam, ab Anglia in Uralum usque. Ad Pekingum.

Pygaera B.

227. Buephala L. OT. III. 235; HS. II. 128; H. 194. 195. Frequens Junio Julioque (solitaria jam Majo) Samboriae Leopolique in pomariorum septis Salicumque truncis. Erucae autumno ubivis circa L. frequentissimae inveniuntur.

In fagetis a Lapponia u. a. Siciliam, ab Anglia u. a. fines Sibiricos.

228. Buephalooides OT. III. 238. HS. II. 128; H. 267, 268. Consimilis et affinis speciei priori, a qua macula media magna ovali et macula apicis cellulam tertiam fere totam occupante differt. Hactenus inveni semel unum par in copula Leopoli in muro Judaeorum sepulcreti medio m. Junio simul cum speciebus: 311, 315, 316, 307, 269, 264, 282, 267, 255, 250, 252, 226, 227, 188, 141, 139,

202, 198, 154, 164, 145, 118, 119. Praeterea conspexi B. una cum Bucephala in pluribus antiquis farraginibus ex Leopolitanis papilionibus factis, unde sequitur, B. et ab aliis Leopoli reperitam esse.

Secus Vindobonae, in Hungaria et Transsylvania, in Gallia australi et ad Wolgam (Sarepta). Rara.

Clostera Steph.

229. Reclusa SV. OT. III. 228; HS. II. 129; H. 90. Vulgaris *Samboriae* et *Leopoli* in hortis Majo.

In boreali et media Europa; a Lapponia usque ad Liguriam, ab Anglia ad Uralum usque.

230. Anachoreta SV. OT. III. 230; HS. II. 129; H. 88. Reperitur iisdem ac prior locis et tempore.

A Petropoli usque ad Calabriam, a Parisiis usque ad Wolgam.

231. Curtula L. OT. III. 232; HS. II. 129; H. 89. Vulgaris Majo circa *Samboriam* *Leopolinique* in hortorum sepibus, rarius in silvaticis.

Per maximam Europae partem; ab Anglia usque ad Petropolim et a Stockholmia usque ad Adiacium Corsicae. Praeterea in oriente borealis Americae.

232. Anastomosis L. OT. III. 226; HS. II. 129; H. 87. Semel unum specimen *Samboriae* in horti sepamine 30. Maji simul cum: 222, 254, 156, 176, 862. praeterea vide 1086 etc.

A Lapponia usque ad Pedemontium et Transsylvania, a Parisiis ad Altaium usque. Boreali — occid. Germaniae, Hollandiae et Angliae deest. Ubivis rara.

Cymatophoridae HS.

Gonophora Bruand.

233. Derasa L. OT. V. 2. 165; HS. II. 170, H. 66. Specimina duo *Samboriae* in sepe 6. Junii 1855. simul cum: 111, 119, 129, 128, 139, 145, 164, 202, 203, 206, 208, 226, 227, 230, 244, 245, 249, 250, 252, 261, 268, 269, 271, 276, 280, 290, 291, 297, 314 — 316, 320, 329, 332, 379, 383, 391, 421, 480, 506, 530, 531, 580, 627, 813, 815, 849, 1106.

Secus in Germania, Anglia, Gallia, Uralo, Casano, Baskiriaque³⁾.

³⁾ Geogr. distributionem specierum 233—1350 sumsi ex operibus: T. eitschkii, Kochi Herrich — Schäfferi et Zelleri.

Thyatira O.

234. Batis L. OT. V. 2. 162; HS. II. 170; H. 65. Exemplar unum 19. Maji 1854 inter Rubi idaei fructecta, luxuriantia regionatim in mixta silva Radłowice górnne. Hac excursione sequentes ceterum legi papiliones: 24, 32, 41, 60, 97, 102, 112, 128, 129, 155, 156, 189, 211, 214, 225, 226, 235, 252, 256, 290, 298, 315, 349, 398, 413, 472, 474, 478, 486, 491, 501, 502, 514, 536, 544, 550, 644, 572, 575, 587, 599, 601, 612 — 614, 620, 623, 683 — 686, 700, 777, 782, 795, 798, 803, 816, 831, 836, 844, 852, 853, 854, 875, 894, 896, 897, 900 — 902, 928, 947, 953, 1038, 1043, 1119, 1248, 1249, 1252, 1295, 1319.

Secus in Suecia, Anglia, Gallia, Germania et in Casano.

Gymatophora Tr.

235. Ocularis L. (Octagesima Hüb. 209.) OT. V. 1. 95; HS. II. 169. Unum exemplar (sociis 234 etc.) 19. Maji pereussione Quercus in coll. silva Radłowice górnne.

236. Or SV. OT. V. 1. 98; HS. II. 169; H. 210. Sat frequens in hortorum sepibus Samboriae et Leopoli, praeterea in coll. silvis circa R. g., Stup., et H., ubi plerumque in Fagorum Alnorumque degunt truncis. A 4. Aprilis ad 2. Junii.

237. Duplaris L. (Bipuncta Borkh.) OT. V. 1. 92; HS. II. 170; H. 211. Solitarie in silvaticis circa H. et B. In R. g. rarissima (vide 258). Junio et Julio. Incola Quercuum.

238. Fluetuosa Hüb. 212. OT. V. 1. 94; HS. II. 170. Hucusque contigit mihi tria tantum invenire specimina; ex his duo (comitibus 451. etc.) initio Julii in silva Radł. górnne, tertium 30. Junii prope Leopolim ad frond. silvae marginem in Hołosko (sociis: 16, 27, 28, 35, 50, 89, 125, 130, 152, 153, 169, 174, 182, 187, 188, 190, 192, 197, 204, 210, 237, 320, 324, 406, 424, 427, 430, 432, 434, 458, 491, 493, 513, 514, 529, 548, 559, 562, 566, 570, 581, 584, 588, 598, 613, 623, 624, 627, 661, 667, 681, 728, 729, 738, 747, 749, 758, 763, 777, 802, 803, 828, 879, 902, 928, 947, 848, 951, 986, 987, 1033, 1066, 1082, 1088, 1091, 1092, 1098, 1206, 1229, 1237, 1241, 1248, 1264, 1350. ceterum vide 680.) In utraque regione collina degit Fluetuosa in silvaticorum marginalibus Quercubus, quibus interdiu percussis, non avolat sed Noctuarum more in humum decidit.

Octagesima reperitur secus circa Vindobonam, ad Rhenum, in boreali Germania, in Anglia et Gallia. — Or: ubivis in Europa et in Uralo — Bipuncta: in Anglia, Gallia boreali, Austria, Bavaria, in Uralo. — Fluctuosa denique: in Anglia, Gallia boreali, Bavaria et in Saxonie. Ubivis rarissima.

Asphalia Hüb.

239. Diluta SV. OT. V. 1. 90; HS. II. 169; II. 206. Unum specimen 15. Sept. in campestri querceto B. percussione Cor. avel-lanae. Hac excursione legi sequentes species: 357, 360, 362, 431, 591, 594, 744, 800, 835, 853, 855, 837, 874, 877, 909, 910, 907, 906, 916, 917, 921, 922, 963, 1069, 1116, 1143, 1206, 1249, 1322, etc.

240. Flavicornis Esp. OT. V. 1. 100; HS. II. 169; II. 208. Provenit solitarie Samboriae in pomariis et in Fagis in silva mixta R. g., frequentius in truncis juvenearum Fagorum in campestri betuleto Zubrze (sociis: 223, 1008 — 1011 etc.). Martio Aprilique.

241. Ridens Fabr. (*Xanthoceros* Hüb. 205.). OT. V. 1. 86; HS. II. 169. Uniūm exemplar, quod habeo, detexi Aprili 1853. in Aloë glut. trunco in coll. silva R. g. Ex eo tempore hanc speciem mihi non licuit invenire, quam ob rem in terris nostris eam rarissimam esse censeo. Alii papiliones, quos circumcirea *Samboriam* tempore verno legi, hi sunt: 13, 66, 75 — 78 $\frac{1}{2}$, 161 — 163, 173, 211, 221, 231, 236, 240, 317, 331, 348, 352, 354, 355, 369 — 375, 378, 433, 436, 437, 493, 518 — 525, 534, 535, 544, 547, 572, 573, 575, 577, 580, 590, 599, 601, 629, 692, 722, 829, 860, 881, 909, 915, 1007-1011, 1051, 1064, 1069, 1106, 1247, 1250, 1285.

Diluta reperitur in Austria, Anglia, Gallia boreali. — *Flavicornis*: per cunctam Europam. — *Xanthoceros*: in Anglia, Gallia, Germania et in Austria,

Noctuae.

Bombycoidae B.

Dileba B.

242. Coeruleocephala L. OT. V. 112; HS. II. 177; II. 196. Sat frequens autumno in hortis eorumque sepibus Samboriae (sociis 440, 574 etc.) et Leopoli.

Secus ubivis in Europa usque ad Lapponiam Casanumque.

Demas Steph.

243. Coryli L. OT. X. 1. 178; HS. II. 175; H. 17, 18.
Singulum specimen, quod in collectione conservo, reperi 29. Ju-
nii (sociis: 151, 153, 424, 1083 etc.) prope *Leopolim* in querceo
fruticeto ad betuleti *Krzywczycę* marginem.

In Europa usque ad Lapponiam et Casanum.

Acronycta Tr.

244. Leporina L. OT. V. 5; HS. II. 180; H. 15. Sam-
boriae *Leopolique* Majo et Junio in pomariorum septis; infrequens.

245. Aceris L. OT. V. 11; HS. II. 184; H. 13, 14. Vul-
garis extremo Majo in septis *Samboriae et Leopolis*.

Var. **Candelisequa** Esp. est item satis frequens *Sambo-
riae* in pomariis Junio.

246. Megacephala SV. OT. V. 13; HS. II. 184; H. 10.
11. *Vulgaris* Julio in hortis et silvis circa *Samborię*. *Leopoli* Majo.

247. Alni L. OT. V. 16; HS. II. 182; H. 3. Singula spe-
cimina *Samboriae* in pomarii septo (comitibus: 110, 111, 154, 218,
220, 222, 223, 383, ceterum vide 863.) et *Leopoli* in muro
nosocomii civilis (socia 257). 1. et 20. Junii.

248. Strigosa SV. OT. V. 23; HS. II. 181; H. 2. Circa *Sam-
boriam* inveni annis 1852. ad 1858 spec. singula in urbis ipsius pomario
(sociis: 381, 389, 303, 302, 391, 392, 290, 329, 297. etc.) et in coll.
querceto Radł. górne (comitibus 99 etc.). Circa *Leopolim* reperi-
tur Str. frequentius in urbis ipsius sepibus (sociis: 335, 265,
257, etc.) et in silvaticis Hołosko.

249. Tridentis SV. OT. V. 26; HS. II. 181; H. 5. Auno
1858. apparuit Tr. fere copiose *Samboriae* in pomariis aderatque
a Majo ad Julium. Annis 1852 ad 1856 eam hic non observavi,
quamquam quotaonis hortorum septa accurate perlustraveram.

250. Psi L. OT. V. 30; HS. II. 181; H. 4. Reperitur sat
frequenter circa *Samborię* *Leopolisque* praecipite Majo et Junio.
In pago Dobrowlany autem inveni eam in Tiliae trunko 11. Aug.
(simil cum: 266. etc.).

251. Euphorbiae SV. OT. V. 40; HS. II. 184; H. 12.
Unicum exemplar, quod in collectione habeo, detexi 12. Junii pro-
pe hortum oppiduli Janow in muro (vide 1309 etc.).

252. Rumičis L. OT. V. 38; HS. II. 182; H. 9. Vulgaris Majo et Junio ubivis circa *Samboriam Leopolimque* in hortis et ambulacrorum arboreis; rarius in silvaticis.

253. Ligustri SV. OT. V. 20; HS. II. 184; H. 21. Quotannis solitarie iisdem in locis et tempore ac prior.

254. Cuspis Hüb. OT. V. 32; HS. II. 181; H. 504. Semel exemplar unum 29. Maji *Samboriae* in pomario. Uno tempore legi: 1086, 660, 327, 224, 222, 232, 156, 176, 862, 160. etc.

Leporina reperitur secus in Gallia, Germania, Silesia etc. usque ad Lapponiam, porro in Baskiria, provincia Orenburg et in Uralo. — *Aceris: ubivis in Europa usque ad Sueciam, porro in Baskiria, provincia Orenburg et in Altaio.* — *Megacephala: ubivis in Europa usque ad Lapponiam, porro in Baskiria, in Uralo, prov. Orenburg alibi in Asia.* — *Alni: in Gallia, Silesia, Germania alibi in Europa usque ad Sueciam, porro in Uralo, prov. Orenburg, et in Baskiria;* (*Ubivis rarissima*). — *Strigosa: in Gallia, Germania, Silesia alibi in. (Rara.)* — *Tridens: ubivis in Europa usque ad Sueciam, porro in Uralo, provincia Orenburg et in Baskiria.* — *Psi: in cuncta Europa usque ad Sueciam.* — *Euphorbiae: in Gallia, Silesia, alibi in Europa usque ad Sueciam, porro in Uralo, provincia Orenburg, Baskiriaque. (Rara.)* — *Rumicis: in Europa usque ad Lapponiam, porro in Algeria.* — *Ligustri: in Europa usque ad Sueciam.* — *Cuspis denique: in Gallia, Prussia, Austria, Silesia et in America boreali.* — *In Europae meridie nulla Acronycta provenire dicitur.*

Bryophila Tr.

255. Fraudatricula Hüb. 28; OT. V. 70; HS. II. 186. Pluria exemplaria Junio in pomariorum sepiminibus *Leopoli* (comitibus: 218, 139, 253, 269, 295, 316, 317, 315, 300, 326, 336, 383, 350, 539, 1019, 887 etc.). *Samboriae* deest.

Secus in Silesia, Austria, Hungaria, Germania et Ukraina.

Moma Hüb.

256. Orion Esp. OT. V. 54; HS. II. 176; H. 22. Duo specimina formosae hujus Noctuae detexi inter campestris querceti *Bednarówka* coryleta 27. Maji (comitibus: 1, 4, 13, 26, 35, 76, 80, 90, 94, 97, 114, 160, 189, 222, 398, 427, 431, 446, 453, 467, 488, 491, 492, 504, 506, 510, 514, 535, 547, 587, 599, 614, 621, 622, 623, 628, 637, 650, 663, 677, 685, 700, 777, 782, 820, 816, 831, 861, 875, 891, 895, 928, 937, 1027, 1031, 1047, 1075, 1076, 1101, 1136, 1187, 1199, 1200, 1213, 1248, 1260, 1294, 1312).

Varietatem „alis anticis sordide albis” inveni Majo in coll. silva R. g. simul cum: 234, 225, 235, 349, 501, 502, 844, 112.

Ubiris in Europa usque ad Succiām et Casanum. In Halicia Orion raris adnumeranda est lepidopteris.

Noctuidae B.

Agrotis Tr.

257. Sigma SV. OT. V. 212; HS. II. 361; H. 122. Singulam exemplar, quod in collectione habeo, detegere mihi contigit prope L. in fageto Lisienice 20. Junii (una cum: 27, 150, 187, 188, 247, 275, 320, 425, 581, 623, 700, 728, 734, 763, 777, 798, 800, 802, 803, 828, 873, 888, 895, 900, 928, 902, 948, 947, 951, 1012, 1183, 1327.).

258. Fimbria L. OT. V. 266; HS. II. 328; H. 102. Singula spec. hujus decorae et rarae in Halicia speciei inveni 23. Junii (socio 215.) in campestri querceto Bednarówka et 19. Julii (comitibus: 18, 22, 83, 93, 92, 103, 186, 237, 258, 299, 319, 322, 397, 429, 431, 439, 448, 455, 459, 461, 471, 491, 509, 544, 555, 581, 583, 607, 659, 677, 681, 702, 725, 749, 766, 783, 798, 800, 803, 818, 823, 842, 853, 856, 867, 870, 876, 901, 903, 924, 1027, 1066, 1068, 1069, 1094, 1105, 1117, 1131, 1134, 1174, 1177, 1221, 1263, 1265, 1326, 1308, 1329, 1336, 1340, 1346, 1334, 1350.) in mixta silva R. g. His in locis delitescebat F. in Quercubus.

259. Augur Fabr. OT. V. 210; HS. II. 361; H. 148. *Samboriae* duo exemplaria. Alterum involavit 22. Maji sub vesperum in meum conclave (vide 368, 993 etc.) alterum latitabat (sociis 356 etc.) 23. Junii in sepis latebris.

260. Ravida SV. OT. V. 207; HS. II. 339; H. 126. Unam feminam *Leopoli* in pomarii septo 26. Maji una cum: 1, 2, 4, 12, 13, 73, 128, 129, 144, 181, 290, 252, 253, 244, 224, 226, 211, 229, 346, 504, 782, 928, 994, 1017.

261. Pronuba L. OT. V. 260; HS. II. 329; H. 103. Vulgaris *Samboriae* in pometis Junio (sociis: 262, 280, 268, 272, 259, 302, 303, 261, 264, 356, 358, 530). Anno 1859 eam *Leopoli* non inveni.

262. Triangulum Hufgl. OT. V. 240; HS. II. 357; H. 497. Semel unicum exemplar *Samboriae* in borto extremo Junio (simil cum: 15, 139, 206, 208, 249, 250, 261, 268, 269, 272, 276, 280, 290, 296, 312, 314 — 316, 320, 322, 329, 332, 395, 396, 420, 421, 506, 526, 581, 667, 688, 749, 750, 1023, 1147, 1171 etc.).

263. Baia SV. OT. V. 215; HS. II. 360; H. 119. Unum mas rem Leopoli in muro coemeterii Lycezakoviensis extremo Junio (comitibus: 273, 283, 124, 109 etc.).

264. C-nigrum L. OT. V. 237; HS. II. 356; H. 111 Samboriae Leopolique in hortorum septionibus Junio. Quotannis rara.

265. Tristigma O. (*Ditrapezium* Borkh.) OT. V. 243; HS. II. 357; H. 113. Sub fine Junii exemplar unum Leopoli in pomarii sepe (comitibus: 335, 248, 108, 425, 275, 257, 247, 150 etc.).

266. Rubi Vievey (Bella Borkh.), OT. V. 2. 121; HS. II. 359, fig. 81; H. 477. Singulum exemplar, quod in collectione conservo, involavit 11. Augusti sub noctem e pometo in meum conclave in pago Dobrowlany, ubi domum ex vico Modrycz revertens, unum commoratus sum diem. Una cum Bella legi sequentia lepidoptera: 226, 250, 359, 448, 598, 599, 616, 653, 676, 677, 738, 744, 747, 766, 768, 769, 847, 853, 877, 900, 936, 962, 963, 1064, 1069, 1050, 1094, 1012, 1113, 1129, 1131, 1134, 1171, 1197, 1276, 1289. Lepidoptera 2. Julii circa Dobrowlany collecta enumeravi sub numero 1195.

267. Brunnea SV. OT. V. 219; HS. II. 359; H. 121. Unicum spec. meae collectionis detexi Leopoli in pomario medio Junio (una cum: 311, 307, 154, 228, 141, 282, 264. etc.).

268. Putris L. OT. V. 3. 29; HS. II. 341; H. 245. Occurrit solitarie Samboriae in hortorum sepimentis Junio (comitibus 280, 813, 233, 262, 356. etc.).

269. Exclamationis L. OT. V. 160; HS. II. 351; H. 149. Frequens Samboriae Leopolique in hortorum sepibus; deinde in campestri — collinis silvaticis inter J. et Lel. (hic sociis 1309.). Junio,

270. Saueia Hüb. OT. V. 149; HS. II. 336; Speciem normalem hucusque invenire mihi non contigit.

Variet. **Aequa** Hüb. 564. detexi semel tantum Samboriae initio Julii in pomarii septo (simul cum: 292, 319, 312, 315, 276, 249, 193, 180, 177, 186.).

271. Simulans Husgl. (*Pyrophila* SV.). OT. V. 202; HS. II. 334; H. 43. Aliquot spec. (sociis: 233, 276, 280, 271, 269, 146 etc.) in pomariis Samboriae Junio. Unam feminam 4. Sept. Leopoli in muro (una cum 1287 et 1322.).

272. Nigrieans L. (*Fumosa* SV.). OT. V. 1. 140; HS. II. 345.

Semel unum spec. praecipite Junio *Samboriae* in sepagine horti (una cum: 262, 320, 322, 329, 276, 296, 420, 421, 688, 280, 249, 268, 250).

273. Tritici L. OT. V. 137; HS. II. 343; H. 6. 23. Species normalis hucusque in conspectum mihi non venit.

Var. **Aquilina** SV. detexi semel *Leopoli* in muro horti jaculatorii extremo Junio (simil cum: 315, 316, 269, 263, 283, 250, 227, 207, 203, 206, 208, 197, 124, 109 etc.).

274. Suffusa SV. OT. V. 152; HS. II. 354; H. 134. Medio Junio exemplar unum *Samboriae* in pomario. Quoad consocios vide numerum: 185.

275. Clavis Husgl. (*Segetum* SV.) OT. V. 155; HS. II. 353; H. 147. Unum specimen (sociis 357, 247 etc.) 20. Junii *Leopoli*, quod in monticulo arenoso F. J. sub vesperum per florentes herbas vagabatur.

276. Herbida SV. OT. V. 2. 56; HS. II. 263; H. 76. Per 6. annos reperi semel tantum exemplar unum in coll. querceto R. g. Anno 1858. autem apparuit H. sat multa in *Samboriae* hortis aderatque toto Junio et (rarius) Julio.

277. Praecox L. OT. V. 2. 69; HS. II. 347; H. 70. Alterum exemplar (simil cum: 186, 319, 452, 455, 471, 584, 659, 677, 725, 751, 766, 869, 870, 884, 924, 983, 1066, 1056, 1038, 1109, 1174, 1198, 1159, ceterum vide 776) in collino querceto R. g., alterum (comitibus: 333, 322, 394, 454, 565, 1154, 1147, 1068, 1058, 1055, 961, 788, 757, 617, 6. etc.) in trunco *Tiliae* coemeterii in montano pago *Wolfze*. 12 et 24. Julii.

278. Pleeta L. OT. V. 248; HS. II. 340; H. 117. Semel medio Junio spec. unum (sociis: 175 etc.) *Samboriae* in pomarii septo.

279. Cinerea SV. OT. V. 178; HS. II. 336; H. 155, 156. Semel exemplar singulum 12. Maji *Leopoli* in pomarii septime adversus hortum botanicum.

280. Corticea SV. OT. V. 158; HS. II. 353; H. 145. Unum par Junio *Samboriae* in floralium sepe; (simil cum: 233, 244, 268, 261, 276, 332, 849, 813, 627, ceterum vide 262.).

281. Birivia SV. OT. V. 191; HS. II. 338; H. 42. *Samboriae* duo exemplaria in arboribus pomiferis initio Julii (sociis: 213, 290, 291, 249, 677, 686, 749, 764, 766, 774, 828, 873, 968, 529, 415, 338, 291, 287, 319, 281, 179, 227, 180, 177, 186, 344).

282. Flammata SV. OT. V. 245. H. 124; HS. II. 342.
Semel exemplar unum Leopoli medio Junio in pomarii septo (una
cum: 311, 307, 267, 228, 141, 154, etc.).

283. Vestigalis Hufgl. (*Valligera* SV.). OT. V. 1. 163;
H. 150; HS. II. 354. Sub finem Junii feminam unam Leopoli in
monticulo arenoso F. J. in Pop. pyramidalis truncu. Eodem tem-
pore adsunt: 273, 263, 109, 124, etc.

284. Occulta L. OT. V. 2. 52. II. 79; HS. II. 263. Huc-
usque exemplar unicum 25. Maji prope Hołosko in truncu pineti
Swinka (comitibus 790 etc.).

Sigma reperitur secus in Austria, Germ. boreali, ad Rhenum, in provincia Orenburg, in Iberia, Caucaso. — *Fimbria*: in Austria, Germ., alibique. — *Augur*: in Germ. merid., Hungaria, Baskiria. — *Ravida*: in Germ. merid. Austria, Hungaria, Baskiria. — *Pronuba*: in cuncta fere Europa, finalibus Asiatico — Russicis provinciis, in Iberia, Terra Barbarorum, Algerio. — *Triangulum*: in Gallia, Germania, Austria, Iberia. — *Baja*: in Austria. — *C-nigrum*: Vindobonae, in Germania, Uralo, m. Himalaicis, Caschmiro. — *Tristigma*: ad Ratisbonam, in Germania, m. Uralensibus et Himalaicis, Caschmiro. — *Bella*: potissime in Germ. boreali, porro in Suecia (rara). — *Brunnea*: Vindobonae, Brunsvigae alibique in Germania, porro in Baskiria. — *Putris*: in Gallia, Italia, Austria, Germ., Uralo. — *Exclamationis*: in cuncta fere Europa usque ad Lapponiam, in Uralo, prov. Orenburg, Baskiria. — *Saucia*: in Austria, merid. Gallia, Italia, Algerio, insulis Canariis. — *Pyrophila*: Vindobonae, in Saxonie, Hungaria, Baskiria. — *Fumosa*: in universa fere Europa, porro circa Bolat in Asia. — *Tritici*: ubivis in Europa usque ad Sueciam, porro in Uralo et Caucaso. — *Suffusa*: in Austria alibique in Europa et testante Inclito Koch in omnibus coeli plagiis. — *Segetum*: in Europa usque ad Lapponiam, porro in Baskiria, provincia Orenburg, Brussa et Baltimore. Devastat saepe gramina, hortensia cerealiaque. — *Herbida*: in Austria, Germ. boreali, prov. Orenburg. — *Praecox*: in Saxonie, Franconia, ad Rhenum. — *Plecta*: in Saxonie alibique in Germ., circa Vindob., in prov. Orenburg. — *Cinerea*: Vindobonae et in pluribus Germ. regionibus; (rara.). — *Corticea*: circa Vindob. alibique in Europa, porro in Baskiria. — *Birivia*: Vindobonae et in Gallia meridionali. (Rara.) — *Flammata*: in merid. Germ. et Gallia, Valesiae in Helvetia, Vindobonae. (Rara). — *Valligera*: praecepit in boreali Europa, secus in America (Baltimore). — *Occulta* denique: in Suecia, Bavaria, Styria, Austria, Pedemontio, Baskiria, Uralo.

Hadenidae B.

Neuronia Hüb.

285. Popularis Fabr. OT. V. 316; HS. II. 291; H. 59;
Tria specimina, quae in collectione habeo, involaverunt 8. Aug.
per vesperi e graminoso pomario in meum conclave collustratum

in gago *Lukawica*, ubi, in circuli Stryensis montes Carpathicos proficiscens, pernoctavi. Alibi in Halicia orientali Pop. nunquam et necubi conspicere mihi contigit.

In Austria, in pluribus Germaniae regionibus; in provincia Orenburg et in Caucaso. Rard.

Mamestra Fr.

286. Leucophaea SV. OT. V. 319; HS. II. 252; H. 80. *Leopoli* in pomarii septione semel unum par in copula 29. Maji (una cum: 280, 290, 739, 782, 248, 936, 939, 900, 994, 814, 1019, 1020, 1024, 1060, 1102, 1135, 1136, 1175, 1176, 1322, 380, 330, 289, 245, 252, 216. etc.

287. Advena SV. OT. V. 2. 39; HS. II. 264. H. 81. *Samboriae* per 6 annos unum tantum specimen (comitibus 1261, 281 etc.). *Leopoli* Ady. frequentior esse videtur, quam identidem (sociis 288 etc.) a me inventa est. Dagit in hortorum sepibus. Julio.

288. Tineta Brahm. OT. V. 2. 43; HS. II. 264; H. 77. Semel unum marem *Leopoli* in horti botanici muro; Julio una cum, 292, 287, 313, 325, 333, 179, 227, 177, 186, 168, 79, 323, 387, 305 etc.

289. Nebulosa Husgl. OT. V. 2. 48; HS. II. 264; H. 78. Hucusque aliquot specimina *Samboriae Leopolique* (sociis: 286, 185 etc.) in hortorum sepimentis Majo et Junio.

290. Thalassima Borkh. OT. V. 342; HS. II. 280; H. 483. Vulgatissima *Samboriae Leopolique* Majo — Julio in hortorum septis.

291. Suasa SV. OT. V. 2. 136; HS. II. 254; H. 426. Reperitur sat frequenter in hortorum sepibus *Samboriae* et *Leopoli* ab extremo Majo usque ad medium Augustum.

292. Pisi L. OT. V. 2. 128; HS. II. 255; H. 492. Hucusque reperi singula specimina *Samboriae* (una cum: 270 etc.) et *Leopoli* (sociis 288 etc.) in hortorum septis Julio.

293. Brassieae L. OT. V. 2. 150; HS. II. 270; H. 88. Vulgatissime circa *Samboriam* et *Leopolim* Majo Junioque. Frequentem observavi Br. *Leopoli* etiam Augusto.

294. Persicariae L. OT. V. 2. 156; HS. II. 275; H. 64. Vulgaris *Samboriae Leopolique* Junio et Julio. Varietates; „alis ant. sine stigmate albo“ sunt rarae.

295. Splendens Hüb. 400; OT. V. 2. 131; HS. II. 225; Unicum specimen obsoletum *Leopoli* in horti sepagine 5. Junii (in

societate specierum: 3, 89, 112, 139, 198, 218, 206 — 208, 253, 255, 269, 290, 291, 296, 297, 300, 302, 303, 315 — 317, 329, 326, 336, 381, 383, 392, 396, 530, 539, 636, 639, 647, 728, 729, 739, 767, 777, 774, 790, 796, 800, 802, 803, 815, 861, 887, 1017, 1019, 1093, 1106, 1260.

296. Oleracea L. OT. V. 2. 132; HS. II. 254; H. 87.
Vulgaris Junio *Samboriae*, *Leopoli* et in silvaticis R. g.

297. Genistae Brkh. OT. V. 349; HS. II. 280; H. 611.
Frequens *Samboriae Leopolique* in hortorum septionibus Junio.

298. Dentina SV. OT. V. 328; HS. II. 263; H. 408. Vulgaris per omne terr. a pl. usque ad valles montanas, e. g. *Wołcze* (sociis 6. etc.). Reperitur in hortis et silvis. Majo — Julio.

299. Chenopodii SV. OT. V. 2. 144; HS. II. 254; H. 86.
Vulgaris tota aestate circa *Samboriam Leopolimque* in pomariis et silvaticis.

Leucophaea reperitur ubivis fere in Europa et in Uralo. — *Advena*: hic illie in Europa, praecipue in Saxonie, porro in Uralo, prov. Orenburg, (Rara.) — *Tincta*: in Austria, Styria, Germania praesertim Saconia, porro in Uralo. — *Nebulosa*: in cuncta fere Europa, in Uralo, in Baskiria. — *Thalassina*: in Austria, Germania, alibiique in Europa, porro in prov. Orenburg. — *Suza*: in Austria, Germania, alibiique. — *Pisi*: in Europa cuncta, in Uralo, prov. Orenburg, Baskiria. — *Brassicæ*: per universam Europam, porro in Uralo, Baskiria, Brussa; (noxia.) — *Persicariæ*: in cuncta Europa et in prov. Orenburg. — *Splendens*: in Germania boreali, Silesia, Vindobonæ. (Rara.) — *Oleracea*: in cuncta Europa Uralo, prov. Orenburg, Baskiria. — *Genistæ*: in plurimis Europæ terris, in Uralo. — *Dentina*: in Europa, Algerio, Baskiria, in Uralo. — *Chenopodii* denique: ubivis in Europa, in Uralo, Algerio, Baskiria.

Dianthœcia B.

300. Comta SV. OT. V. 389; HS. II. 251; H. 53. Singulum specimen, quod habeo, detexi *Leopoli* in pomarii sepamine 5. Junii (sociis: 295, 317, 255, 253, 303, 302, 326, 336, 381, 383, 530, 539, 887, 1019, 112, 207, 206, 208, 198 etc.).

301. Conspersa SV. OT. V. 387; HS. II. 251; H. 52;
Samboriae Leopolique singula exemplaria in hortorum septis initio Junii, (sociis: 392, 303, 290, 297, 320, 314, — 316, 332, 143, 111, 110, 218, 220, 222, 224, 247, 249, 252, 271, 383, 387, 391, 398. ceterum 863 etc.).

302. Capsineola SV. OT. V. 308 HS. II. 248; H. 57. |

303. Cueubali SV. OT. V. 311; HS. II. 248; H. 56. |

Vagantur mixtum (praeterea simul cum: 390, 391, 397, 584. etc.)

prima vesperi in floralibus *Samboriae et Leopolis*. Junio solitarie, Julio frequenter. Specimina Augusto lecta, sunt cunctim obsoleta et lacera.

304. Irregularis Hufgl. (*Echii Borkh.*) OT. V. 2. 343; HS. II. 249; H. 90. Hucusque reperi duo specimina *Leopoli*; alterum adversus coll. betuletum K. (sociis 205) in herboso segetum confinio percussione *Anchusae off.*; alterum in monticulo Kortum, 1178 p. v. (Kbg.) elato, ubi post solis occasum per *Dianthos* vagatur.

Comta reperitur secus circa *Vindobonam*, in Germania, prov. Orenburg, Uralo. — *Conspersa*: in Austria, Germania. — *Capsincola*: in cuncta Germania, Uralo, Baskiria. — *Cucubali*: in Saxonia, ad Rhenum, alibique in Germania; porro in prov. Orenburg. — *Echii denique*: *Moguntiae*, in Austria, Hungaria, Germania merid., prov. Orenburg.

Ammocoenia Lederer.

305. Caecimacula SV. OT. V. 202; H. 137; HS. II. 200. Unicum spec. *Leopoli* in horti botanici muro. Medio Julio, una cum 288 etc.

In Europa usque ad Sueciam; in Moravia, Hungaria, Germania. In Uralo. Rara.

Dryobota Lederer.

306. Protea SV. OT. V. 1. 362; H. 406; HS. II. 281. Exemplaria duo *Leopoli* in pomariorum sepiminibus ineunte Julio. Secus in Austria.

Dichonia Hüb.

307. Aeruginea Hüb. OT. V. 355; HS. II. 281; H. 374. Semel unam feminam Junio (sociis: 311, 228, 267, 282, etc.) *Leopoli* in horti botanici muro.

308. Aprilina L. OT. V. 411; HS. II. 293; H. 71. Ex quo tempore colligo, reperi semel tantum spec. unum praecepit Oct. in trunco Pop. tremulae, quae ad marginem in mixta silva *R. g.* magnum convestivit spatium. Apr. comitabant species sequentes: 503, 576, 577, 603, 366, 372, 517, 516, 497, 448, 362, 242, pluraque alia lepidoptera autumno prodeuntia.

Aeruginea reperitur secus in Austria et Gallia. — *Aprilina*: in Austria, Germania, alibique.

Miselia Steph.

309. Oxyacanthae L. OT. V. 405; HS. II. 295; H. 31. Singula specimina in *Samboriae Leopolisque* hortis, et in silvaticis *R. g.* (hic sociis: 440 etc.). Septembri. Rara.

Incolit Austriam, Germaniam aliaque loca Europae.

Apamea Tr.

310. Testacea SV. OT. V. 2. 107; HS. II. 257; H. 139.

Semel unicum spec. *Leopoli* in horti septo ineunte Julio, quo tempore et plures aliae species in *Halicia* rariores aderant prouti: 482, 481, 832, 945, 1232, etc.).

Secus in Austria, ad Pestinum; infrequens.

Hadena Tr.

311. Ochroleuea SV. OT. V. 2. 345; HS. II. 298; H. 91.

Hucusque exemplar unicum *Leopoli* in horti botanici floridis medio Junio (una cum 118, 119, 145, 154, 164, 198, 139, 141, 188, 269, 264, 282, 267, 255, 250, 252, 227, 228, 226, 202, 315, 316, 307.).

312. Polyodon L. OT. V. 3. 41; HS. II. 279; H. 82. *Vulgaris Samboriae* in pomariorum floraliumque sepibus. Junio et Julio. Anno 1858. apparuit Pol. *Samboriae* frequentissime.

313. Lithoxylea SV. OT. V. 3. 47; HS. II. 288; H. 240.

Semel unicum spec. (sociis 288 etc.). medio Julio *Leopoli* in ambulacrorum Pop. pyramidalii.

314. Infesta O. OT. V. 2. 112; HS. II. 273; H. 484. Communis in *Samboriae* hortis Junio et Julio.

315. Basilinea SV. OT. V. 2. 110; HS. II. 269; H. 427.

Vulgatissime ab extremo Majo ad Julium *Samboriae* et *Leopoli* in hortis aliisque ditionum coll. locis.

316. Rurea Fabr. OT. V. 3. 35; HS. II. 288; H. 241. Anno 1858 in *Samboriae* hortis toto Junio frequens et in pulcherrimis varietatibus, quae simulate penitus inter se discrepunt. Anno 1859 *Rurea Leopoli* rarissima erat. Interdum tantum regionatimque in nostratis apparere videtur.

317. Hepatica SV. OT. V. 3. 39; HS. II. 287; H. 638.

Unicum specimen, quod in collectione habeo, reperi ineunte Junio in *Leopolis* pomario (sociis: 295, 255, 300 etc.).

318. Gemina Hüb. OT. V. 345; HS. II. 274; H. 481 Speciem normalem hucusque non inveni, varietatem:

Remissa Hüb. 423, autem semel tautum *Samboriae* 15. Junii sub vesperum in floralibus. Quoad alias eodem tempore collectas species vide numerum 185. etc.

319. Didyma Esp. (*Oculea Fabr.*). OT. V. 2. 86; HS. II. 274; H. 619, 620. *Vulgaris* Julio *Samboriae* in hortorum sepibus et floralibus; singulatim praeterea in silvaticis circa R. g. et D. Colores magnopere mutat.

320. Strigilis L. OT. V. 2. 102; HS. II. 284; H. 95. Sat frequens *Samboriae* (vide 262) *Leopolique* in hortorum septionibus toto Junio. Reperitur ceterum et in silvis, sed multo rarius,

Var. Latruncula SV. H. 94. *Vulgaris* ubique locorum in hortis et silvis circum *Samboriam Leopolisque* Junio et Julio; frequentior specie normali.

321. Abjecta Hüb. 539. (*Nigricans Vieweg.*, *Fribolus B.*) OT. V. 2. 141; HS. II. 270. Semel unum par in horto *Samboriae* medio Julio (simul cum : 48, 62, 177, 179, 180, 186, 209, 249, 298, 312, 319, 321, 322, 386, 395, 415, 425, 473, 598, 602, 608, 676, 657, 647, 714, 737, 756, 766, 969, 1021, 1065, 1117, 1182, 1147, 1204, 1341.)

322. Lateritia Hufgl. OT. V. 3. 45; HS. II. 272; H. 74. Hucusque inveni *Samboriae* specimina quatuor (sociis : 185, 258, 321, etc.) Junio, quintum Julio in montano pago Wołze (una cum 277, 333, 6 etc.). Dagit in hortorum septis.

323. Connexa Borkh. OT. V. 2. 105; HS. II. 282; H. 462. Semel specimen unicum (sociis : 288 etc.) 24. Julii in *Leopolis pomario*. Praeter me et Inclytus Zawadzki Connexam in *Bucovina* invenisse dicitur, quod comperi ex adnotafione, quae ad hanc speciem in margine operis Treitschkeani Bibliothecae Musei Ent. Palat. Vindob. stylo cerussato a quodam facta erat.

Ochroleuca reperitur secus in Austria et in Europa meridionali. — *Polyodon*: ubivis fere in Europa, in Uralo, Baskiria. — *Lithoxylea*: in Tyroli, Franconia, Saxonia inferiore, Germania boreali, Dalmatia, Vindobonae. — *Infesta*: in Austria, Franconia, ad Rhenum. — *Basilinea*: in Austria, Germania, Uralo, prov. Orenburg, Baskiria. — *Rurea*: in Germania, Austria, alibique. — *Hepatica*: in Gallia orientali, Germania merid., ad Hannoveram et Vindobonam. — *Gemina*: in Austria, Franconia, Saxoniam, Uralo, prov. Orenburg. — *Didyma*: ubivis fere in Europa; in Uralo. — *Strigilis*: Vindobonae, in Moravia, Germania etc.; in Uralo et in Baskiria. — *Abjecta*: Vindobonae, in Germ. merid., Saxoniam infer., Uralo, Baskiria. — *Lateritia*: in Italia, Dalmatia, Germania; in Uralo, prov. Orenburg, Baskiria. — (Rara. Vindobonae deesse dicitur). — *Connexa* denique: ad Rhenum, in Saxoniam inferiore.

Dipterygia Steph.

324. Pinastri L. OT. V. 3. 58; HS. II. 300; H. 246.

Hucusque semel exemplaria duo 30. Junii prope Hołosko in coll. faginea silvula Swinka. Eodem die legi in his regionibus sequentia lepidoptera: 192, 182, 210, 169, 174, 125, 624, 627, 635, 566, 562, 424, 832, 944, 986, 987, 990, 1088, 1082, 1091, 1092, 1098, 1085, 1220, 1278, 1307, ceterum vide: 238 et 690.

Hic illie in Europa, praecipue in Germ., bor.; porro in Bashiria.

Rhizogramma Lederer.

325. Petrorhiza Brkh. OT. V. 3. 49; HS. II. 288. H. 251.

Semel exemplar unicum (comitibus 288 etc.) Leopoli medio Julio in pomarii sepe adversus hortum botanicum.

Secus Vindobonae, in Hung. et Gallia.

Chloantha B.

326. Hyperiei SV. OT. V. 3. 67; HS. II. 289; H. 250.

Specimen unicum 5. Junii Leopoli in horti sepe (sociis: 112, 139, 218, 255, 295 — 297, 383, 336, 302, 303, 396, 316, 317, 530, 539, 887, 1019).

327. Perspicillaris L. OT. V. 3. 69; HS. II. 301; H. 249.

Degit Sumboriae Leopolique in hortis; praeterea in silvaticis R. g. (hic una cum: 129, 156, 298, 491, 501, 536, 544, 547, 550, 572, 575, 601, 612, 623, 637, 644, 686, 705, 734, 775, 777, 803, 831, 853, 865, 891, 894, 896, 900—902, 928, 953, 1017, 1036, 1043, 1045, 1054, 1244, 1248, 1252, 1257, 1260, 1277, 1295, 1119, 1162, 1318, 1319, ceterum vide 1086.). Majo. Ubivis rara.

Hyperici reperitur secus in Germ. australi, Hung., alibique in Eur. merid. (Rara.). — Perspic.: in Hung., Austria, ad Rhenum, in Suevia, Svecia.

Eriopus Tr.

328. Pteridis Fabr. OT. V. 1. 366; H. 65; HS. II. 379.

Speciosum hoc lepidopteron reperi semel 9. Junii specimine unico prope Hołosko in collinis Mostki, 1071 p. v. (Kbg.) elatis et querco fruticeto cum coryletis spisse convestitis. Pteridis latebat hic abdite in pumiloscente Quercu, decidebatque hac percussa in humum. Eodem die legi in his regionibus plures alias exoptatas et raras, universim autem sequentes species: 1. 23, 25, 26—28, 32, 35, 41, 47, 50, 73, 80, 89, 91, 113, 114, 115, 143 152, 174.

183, 187, 188, 194, 196, 197, 206, 208, 222, 248, 250, 289, 328,
315, 320, 345, 399, 405, 407, 409, 427, 432, 493, 478, 502, 504,
505, 510, 512 — 515, 531, 542, 568, 559, 613, 623, 625, 636,
646, 667, 700, 715, 717, 721, 718, 728, 729, 733 — 735, 737,
739, 749, 763, 767, 774, 777, 790, 796, 800, 802, 803, 816, 817,
819, 828, 836, 873, 875, 879, 880, 886, 888, 895, 900, 902, 928,
943, 947, 948, 951, 962, 972, 968, 982, 1030, 1038, 1053, 1059,
1075, 1079, 1061, 1091, 1095, 1100, 1130, 1135, 1136, 1149,
1163, 1165, 1190, 1197, 1205, 1213, 1224, 1229, 1237, 1240,
1254, 1262, 1298, 1315, 1319.

Secus in Germ. bor., Gallia merid., Italia, Bohemia, Hung.; rara.

Trachea Hüb.

329. Atriplicis L. OT. V. 2. 66; HS. II. 263; H. 83.
Vulgaris Junio et Julio ubique locorum circa Samboriam et Leopolim.

Secus in Franconia, ad Rhenum, in Austria, in montibus Uralensibus et Himalaicis, nec non in Caschmiro.

Euplexia Steph.

330. Lucipara L. OT. V. 377; HS. II. 277; H. 55. Frequens Majo et Junio in *Samboriae Leopolisque* sepiminibus.

Secus in Germ., Austria, Hung., Italia etc.; porro in pr. Orenburg.

Brotolomia Lederer.

331. Meticulosa L. OT. V. 373; HS. II. 300; H. 67.
Aprilii (sociis 241 etc.) et Majo sat frequens Samboriae Leopolique in hortorum septis.

Secus ubivis fere in Eur.; in Terra Barb., Algerio, Asia minori, insula Creta. Auctore Clariss. Lederer in Syria, Vandalitia, et in Styriae Alpibus.

Naenia Steph.

332. Typica L. OT. V. 298; HS. II. 292; H. 61. Singulatim *Samboriae* in hortorum sepibus toto Junio.

Secus ubivis in Germ., Austria alibique in Eur.; porro in Baskiria.

Hydroecia Guen.

333. Nictitans L. OT. V. 2. 82; HS. II. 19; H. 221. Hucusque tria exemplaria; unum *Leopoli* (simul cum 288 etc.) in horto botanico, duo in montano pago Wołcze (sociis: 277, 322, 6, etc.), quae sub noctem in domicilium, ubi pernoctavi, involaverunt e pomario. Julio.

Per cunctam Eur. usque ad Lapp., porro in Uralo, pr. Orenburg.

Leucanidae B.

Leucania Tr.

334. Pallens L. OT. V. 2. 290; HS II. 235; H. 234.

Unum spec. *Leopoli* in horto botanico initio Septembris (una cum: 376, 419, 393, 171, 123, 271, etc.)

335. Obsoleta Hüb. 233; OT. V. 2. 301; HS. II. 234.

Semel unum exemplar masculum in pratulo humido ante Winniki percussione *Lythri salicariae*, 22. Junii (simul cum: 23, 26, 108, 197, 187, 188, 206, 208, 248, 265, 297, 320, 623, 700, 728, 729, 734, 733, 749, 763, 765, 774, 777, 798, 800, 802, 803, 828, 888, 895, 900, 902, 928, 939, 947, 948, 951, 972, 1034, 1055, 1084, 1126, 1163, 1183, 1185, 1201, 1236, 1286, 1290, 1297, 1298, 1322, 1336, 1346.).

336. L - album L. OT. V. 2. 306; HS. II. 230; H. 227.

Leopoli Junio in sepiibus (simul cum: 295, 112, 255, 539, 530, 338, 326, etc.). Infrequens.

337. Al bipuneta SV. OT. V. 2. 187; HS. II. 238;

H. 223. 15. Junii sociis: 127, 128, 198, 322, 584, 647, 976, 813, 1039, 627, 414, 386, 384, 289, 318, 274, 264, 278, 185, etc.

338. Turea L. OT. V. 2. 181; HS. II. 239; H. 218.

Initio Julii una cum: 281, 415, 287, 227, 179, 319, 291, etc.

Samboriae singula exemplaria in hortorum septis.

Pallens invenitur secus ad Ratisb., Rhenum et Moenum etc., porro in pr. Or. — *Obsoleta*: in bor. Germ., ad Rhenum, in Lusatia. — *L - album*: in cuncta fere Eur. — *Al bip.*: in Austria, Hung., Uralo, pr. Or. — *Turea* denique: praecipue in Germ. merid., porro in Austria, Uralo.

Mythimna Guen.

339. Imbecilla Fabr. OT. V. 2. 193; HS. II. 239; H.

555. Speciem hanc inveni 7. Julii, Alnum glut. in collina silva R. g. percutiens specimine unico (simul cum: 92, 93, 83, 342, 319, 430, 452, 513, 583, 607, 770, 797, 803, 820, 842, 869, 874, 928, 947, 986, 1027, 1056, 1131, 1174, 1308, 1329, ceterum vide: 344, 281.).

Secus in Alpibus et montosis, in Styria, circa Mehadiam in Hung.

Caradrinidae B.

Grammesia Steph.

340. Trigrammica Hufgl. (*Trilinea* SV.). OT. V. 2. 272;

HS. II. 194; H. 216. Duo exemplaria 12. Junii percussione Pini

silvestris in collinis Szyp (una cum: 558, 958, 959, 444, 658, 793, 197, 658, 570, 774, 779, ceterum vide 1309.).

Habitat in Austria Germ., Hung. alibique in Eur. usque ad Sueciam.

Caradrina Tr.

341. Cubicularis SV. OT. V. 2. 251; HS. II. 209; H. 417.
Frequens Sept. et Oct. *Samboriae Leopolique* in domiciliis.

342. Pulmonaris Esp. OT. V. 2. 342; HS. II. 213; H. 98.
Semel specimen singulum 7. Julii (sociis 339 etc.). in alneto fructioso ad marginem coll. sylvaticorum R. g.

343. Alsines Brahm. OT. V. 2. 266; HS. II. 211; H. 557.
Unam feminam 1. Julii in trunco carpineti, quod prope *Leopolim* crescit ante betuletum *Krzywczycę* in vicinia domus saltuarii.
Eodem die legi plures alias species mihi exoptatas prouti: 482,
832, 70, 1322, 479, ceterum vide 945 etc.

Cubic. provenit secus ad *Vindob.*, in *Hung.*, *Germ.*, *Rossia*. — *Pulm.*: in *Hung.*, *Italia*, *Styria*, *Franconia*. — *Alsines* denique: in *Austria*, *Gallia* etc.; porro in *Uralo*, prov. *Or.*, *Baskiria*.

Amphipyra Tr.

344. Pyramidea L. OT. V. 285; HS. II. 326. H. 36. Initio Julii specimen unicum *Samboriae* in pomarii sepagine (sociis: 177, 213, 227, 290, 312, 329, 421, 416, 391, 396, 290, 319, 312, 179, 213, 281 etc.).

345. Tragopogonis L. HS. II. 324; OT. V. 1. 277, H. 40.
Hucusque semel specimen unicum 9. Juuii prope H. in querceo fructecto Z. (sociis: 114, 194, 196, 222, 248, 399, 407, 323, etc.).

Pyramidea reperitur per cunctam Eur. in *Sueciam* usque. secus ad *Lenkoran*; — *Trag.*: per univ. Eur. usque ad *Lapp.*; in pr. *Or.*, *Bask.*, *Persia* merid.

Orthosidae B.

Taeniocampa Guen.

346. Gothica L. OT. V. 233, HS. II. 196, H. 112. *Samboriae Leopolique* frequens Majo in septis (sociis: 211, 224, 331 etc.).

347. Cruda SV. OT. V. 2. 230; HS. II. 201; H. 173
Leopoli initio Maji exemplar unum in pomarii sepe (sociis: 213, 230, 231, 216, 245, 250, 504, 596, 1106, 1322, 346, 327, 331, 290, 252, 214, 213, 216, 226, 211, 229, 121, etc.).

348. Populeti Fab. OT. V. 2. 221; HS. II. 202; fig. 109.

Aderat satis frequens primo vere anni 1856 *Samboriae* in arboribus pomiferis, porro in silva *R. g.* in aliorum Populorumque truncis. Ex eo tempore jam necubi et nunquam in conspectum mihi venit.

349. Incerta Hufgl. (*Instabilis* SV.). OT. V. 2. 204; HS. II. 202; H. 165. Initio Maji solitarie in coll. silva *R. g.* (sociis 219, 234, etc.) in Alni glutinosae truncis.

350. Munda SV. OT. V. 2. 208; HS. II. 202; H. 166. Tria exemplaria *Leopoli* in hortorum septis (sociis: 590, 377, etc.). Aprili.

351. Opima Hüb. 424; OT. V. 2. 219; HS. II. 205. Semel unicum exemplar initio Maji (comitibus: 1304, 1285, 1294 etc.) in trunko Quercus in campestri betuleto Zubrze.

352. Stabilis SV. OT. V. 2. 223; HS. II. 204; H. 171. In mixta silva *R. g.* exemplar unum (simul cum: 355, 370, 378, 241, 378, 573, 590 etc.) in Populi trem. truncō. Aprili.

Gothica invenitur in cuncta Eur. usque ad Lapp. et Cas.; secus in prov. Or., America (Labrador). — *Cruda*: in univ. Eur., ad Cas. usque. — *Populeti*: hic illuc in Germ.; ad Brunsvigam, Vindob. (Rara). — *Inst.*: ubivis in Europa usque ad Sueciam et Cas.; secus in pr. Or., Bask. — *Munda*: localiter in Germ., ad Vindobonam (Rara). — *Opima*: Vindobonae, in Austria, Casano. — *Stabilis* denique: per universam Europam.

Panolis Hüb.

353. Piniperda Kob. (T. V. 2. 76; HS. II. 191; II. 91).

Unicum specimen percussione Pini silv. prope Hołosko in coll. piæteto *Świńka* 1. Junii (una cum: 24, 26, 28, 32, 41, 59, 80, 446, 463, 472, 491, 512, 544, 550, 559, 557, 597, 777, 790, 816, 873, 888, 895, 900 — 902, 904, 928, 930, 1059, 1136, 1153, 623, 568, 329, 320, 208, 197, etc.).

Usque ad regiones arcticas et Casanum; frequentissime in Franconia et Suevia. Devastat pineta.

Pachnobia Guen.

354. Leucographa SV. OT. V. 2. 118; HS. II. 197; H. 572. Hucusque semel exemplaria duo 23. Aprilis (sociis 348, 370, 355, 241, etc.) in truncis populeti in mixta silva *R. g.*

355. Rubricosa SV. OT. V. 2. 396; HS. II. 197; H. 430. 509. Aprili semel unum marem in Alni glut. truncō in supra dicta silva (una cum: 354, 348, 374 370, 373, 241 etc.).

Leucographa reperitur secus in Gallia, Germ., Saxonie, ad Rhenum, Moenum et Erfurtum. — Rubricosa: in Austria, Hung., Germ., Casano, in pr. Or., Bask.

Galymlnia Hüb.

356. Pyralina SV. OT. V. 2. 392; HS. II. 224; H. 203.

Duo spec. Junio in horti olitorii pometique sepiminiibus (sociis: 139, 206, 208, 248 — 250, 259, 261, 264, 269, 280, 290, 296, 302, 303, 312, 314 — 316, 320, 332, 530, 391, 454, 714, 727, 747, 767, 778, 779, 797 etc.).

357. Trapezina L. OT. V. 2. 383; HS. II. 223; H. 200.

Frequens in coll. silvaticis circa R. g. et L. Aug.—Oct., solitariae jam Julio.

Pyralina reperitur secus in Germ., Austria, Hung., Uralo (Rara). — Trapezina: per omnem Europam; in Uralo, prov. Or.

Dyschorista Lederer.

358. Ypsilon SV. OT. V. 2. 210; HS. II. 262; H. 136.

Extremo Junio tria specimina *Samboriae* in floralibus, ubi sub vesperum (simil cum: 391, 390, 297 etc.) vagabantur per flores. Quoad alias eodom tempore volitantes species vide 460.

Secus in Germ.; in Uralo.

Plastenis B.

359. Subtusa SV. OT. V. 82; HS. II. 222; H. 213.

Initio Aug. involaverunt pervesperi exemplaria duo in meum conclave e pomario in pago Dobrowlany (vide 266.).

360. Retusa L. OT. V. 80; HS. II. 222; H. 214. Medio Sept. exemplaria duo in coll. fageto inter L. et W. ad viae stratae dextram crescenti. Praeterea unam feminam in campestri querecto B. 1. Maji (simil cum: 13, 76, 523, 527, 572, 575 etc.).

Subtusa reperitur secus in Austria. — Retusa: in Austria alibique in Eur.

Orthosia Tr.

361. Lota L. OT. V. 2. 212; HS. II. 205; H. 167. *Samboriae* in tranco Salicis pone floralia crescentis reperi tempore pomeridiano 19. Sept. specimen unicum, quod paulo ante e pupa exierat. Eodem tempore volitaut: 242, 309, 401, 399, 400, 440, 393, 397, 372 etc.

362. Circellaris Hufgl. (*Ferruginea SV.*) OT. V. 2. 349; HS. II. 203; H. 181. Solitarie autumno in coll. silvaticis circa R. g. (comitibus: 574, 440, 308 etc.) et *Leopolim* (sociis 498 etc.).

363. Rufina L. OT. V. 2. 347; HS. II. 216; H. 184. Unam feminam 22. Oct. percussione *Quercus* in campestri quer-
ceto *Bednarówka* (una cum: 12, 364, 516, 517, 577, 603, 749,
851, 855, 906, 907, 910, 912, 914, 919, 921, 1181, 1206, 1287,
1322, 1339 et 362.)

364. Pistacina SV. OT. V. 2. 239; HS. II. 200; H. 464,
131. Cum priore item specimen unum.

365. Laevis Hüb. OT. V. 2. 232; HS. II. 202; H. 163.
Unum marem *Leopoli* in pomario sub finem Julii.

Lota reperitur secus in Germ., Austria, alibique in Eur. usque ad Sueciam.
— *Ferruginea*: in Austria, Germ., alibique in Eur., porro in Casano. — *Rufina*:
in Austria, Germ., alibique in Eur. usque ad Sueciam. — *Pistacina*: in Germ.
merid., praecipue ad Vindob. — *Laevis* denique: in Germ., Gallia, ad Vindob.

Xanthia Tr.

366. Fulvago L. (*Cerago SV.*) OT. V. 2. 370; HS. II.
217; H. 190. Sat frequens Sept. et Oct. (una cum. 362, 360 etc.)
in quercentis R. g. et B.

Secus in Germ., Austria, alibique in Eur., usque ad Sueciam. In prov.
Orenburg et in Uralo.

367. Gilvago SV. OT. V. 2. 373; HS. II. 217; H. 443.
In campestri quercento B. 20. Oct. specimen unum (cum priore et:
12, 181, 363, 518, 577, 603, 516, 517, 851, 855, 905—907, 910—
914, 919, 921, 1062, 1249—1251, 1206, 1322, 1339, 1122.)

Secus in Austria Germ., circa Darmstadium alibique in Eur. usque ad Sueciam.

Cerastis Tr.

368. Silene SV. OT. V. 2. 412; HS. II. 321; H. 175.
Unam feminam 22. Maji *Samboriae* in horti olitorii septo (sociis:
871, 795, 865, 943, 938, 1225, 1307, 1305, 1049, 1316, 993 etc.).

369. Rubiginea SV. OT. V. 2. 398; HS. II. 322; H. 183.
Primo vere marem unum in trunco Pop. tremulae in coll. silva
R. g. (comitibus: 352, 370, 241, 374, 378, 573. etc.).

370. Vaccinii L. OT. V. 2. 401; HS. II. 322; H. 177.
Reperitur solitarie a primo vere usque ad Majum in silva R. g.

ubi degit (similiter ac : 355, 378, 369, 375, 352, 241 etc.) in truncis praecipue Alnorum et Populorum. Variat adeo, ut nonnulla exemplaria speciem mutare videantur.

Silene reperitur secus circa Vindob., in Franc., ad Rhenum. — Rubiginea: in Austria, Germ. etc., usque ad Lapp.; porro in Bask. (Rara). — Vaccinii deinde: per Eur. usque ad Sueciam.

Scopelosoma Curt.

371. Satellitia L. OT. V. 2. 414; HS. II. 321; H. 182. *Samboriae* per omnes annos semel unicum spec. 22. Aprilis in pomario (sociis : 1009, 915, 372, 517, 528, 1064 ceterum vide 241 etc.). In campestri betuleto Zubrze invenitur *Satellitia* frequentius sed dispare in truncis juvencarum hinc inde ibidem crescentium Fagorum Martio (comitibus : 223, 1008 — 1011, 921, 912, 829, 523, 372, 240, 241, 390, 829, 914, 1317, 575, 572, 524, 519, 518, 437, 436, 13, 76, etc.).

Secus in Austria, Germ. etc.; usque ad Sueciam.

Scoliopteryx Germ.

372. Libatrix L. OT. V. 2. 172; HS. II. 319; H. 436. Reperitur quotannis solitarie a Martio usque ad Novembrim non solum *Samboriae Leopolique* in sepimentis, sed etiam in frond. silvis circa R. g. et L.

Per cunctam Europam ad Sueciam usque. Circa Lenhoran.

Xylinidae HS.

Xylina Tr.

373. Socia Hufgl. (*Petrifictata* SV.). OT. V. 3. 23; HS. II. 303; H. 239. Sat frequens *Samboriae Leopolique* in hortorum septis Aprili et Majo (una cum 346. etc.).

374. Eureifera Hufgl. (*Conformis* SV.). OT. V. 3. 12; HS. II. 305; H. 243. Quotannis solitarie Aprili in truncis Alnorum Populorumque coll. silvarum circa R. g. (sociis 241 etc.) et *Leopolim* (comitibus : 76, 520, 519, 523, 575, 829, 921, 1010, 572, 524, 518, 527, 437, 163 etc.).

375. Rhizolitha SV. OT. V. 3. 21; HS. II. 305; H. 242. Vulgaris in hortorum septis *Samboriae Leopolique*, deinde in silvaticis pagi R. g. et circa *Leopolim*. Reperitur primum Martio, Aprili, tum Sept. et Oct. (rarius.).

Petrificata reperitur securis in Germ., Austria, Suevia, ad Rhenum etc. — Conformis: in Austria, Germ. — Rhizolitha: per cunctam Germ.

Callocampa Steph.

376. Exoleta L. OT. V. 3. 7; HS. II. 302; H. 244. Tria specimina Leopoli initio Sept. in pomariorum septis (una cum 419, 393, 171, 123, 271.).

Per cunctam Europam.

Xylo miges Guen.

377. Conspicillaris L. OT. V. 3. 26; HS. II. 303; H. 236, 237. Leopoli in horto botanico primo vere exemplaria duo (simul cum: 590, 350, 377 etc.).

Secus Vindob., in Germ., Hung.

Asteroscopus B.

378. Nubeculosa Esp. OT. V. 3. 55; HS. II. 192; H. 3. 4. Degit Samboriae in arboribus pomiferis et in silvis circa R. g. et Leopolim in Alnorum aut Pop. tremulae truncis. In utraque regione solitatim Martio, Aprili (comitibus: 236, 241, 1008, 221, 331, 355, 370, 378, 1009, 75, 78 $\frac{1}{2}$, 575, 523, 524, 525, 519, 518, 520, 348, 433, 437, 629, 375, 436.).

Secus in Hung., Silesia, Austria, circa Augustam Vindelicorum, ad Rhenum, in Germ. Porro in Casano. Rara.

379. Sphinx Husgl. (Cassinia SV.) OT. V. 3. 53; HS. II. 192; H. 56. Semel marem unicum in Hołosko in trunko alneti Swinka Aprili (simul cum: Nubeculosa, 374, 590, 350, 377, 173, 223, 525, 371, 829, 221 etc.).

Secus ubique in Europa.

Cleophanidae B.

Galophasia Steph.

380. Lunula Husgl. (Linariae SV.). OT. V. 3. 77. HS. II. 298; H. 252. Hucusque marem unum 29. Maji Leopoli in pomarii sepimine adversus hortum botanicum (comitibus: 1019, 1024, 286.).

In Eur. usque ad Germ. bor. et Succiam; secus in Uralo, Baskiria.

Cueullidae B.

Cueullilia Schrk.

381. Prenanthis B. (Ceramanthae Freyer). HS. II. 311; fig. 185, 186. Initio Junii pluria exemplaria Samboriae (simul cum

99. etc.) *Leopolique* (comitibus: 1017, 814, 685, 329, 139, etc.) in pomariis.

382. Verbasei L. OT. V. 3. 127; HS. II. 313; H. 266. Unam feminam 16. Junii in pratulo silvatico ante Winniki, ubi percussione plantarum a me excitata est.

383. Asteris SV. OT. V. 3. 148; HS. II. 260. Dagit solitarie *Samboriae* et *Leopoli* in sepibus. Unum exemplar involavit praeterea pervesperi in pago *Stupnica*, ubi pernoctavi, in collustratum conclave (vide 863.), Junio.

384. Chamomillae SV. OT. V. 3. 111; HS. II. 315; H. 261. Duo spec. *Samboriae* in septis: alterum 16 Maji, alterum 15. Junii (sociis: 1036, 1257, 599, 596, 1116, 601, 372, 171, 1106, 1064, 226, 1158, 245, 1017, 831, 853, 891, 775, 865, 1162, 1152 etc.).

385. Tanaceti SV. OT. V. 3. 100; HS. II. 315; H. 265. In pratulo silvatico pone monticulum *Czartowska skała* initio Julii unum exemplar (sociis 945 etc.).

386. Lactucae SV. OT. V. 3. 109; HS. II. 317; H. 264. Semel feminam unam 15. Junii *Samboriae* in pomario (vide 185 etc.).

387. Argentea Hufgl. (*Artemisiae* SV.). OT. V. 3. 95; HS. II. 318; H. 259. Medio Julio *Leopoli* in monticulo *Wysoki zamek* specimen unicum, quod sole occidente vagabatur inter flores. Alias eodem tempore lectas species enumeravi sub numero 288.

388. Artemisiae Hufgl. (*Abrotani* SV.). OT. V. 3. 88; HS. II. 309; H. 257. In coll. pratulo silvatico ante Winniki reperi semel exemplar unicum 18. Maji (sociis: 689, 716, 1273. etc.).

389. Umbraticea L. OT. V. 3. 105; HS. II. 317; H. 263. Duo exemplaria *Samboriae* in pomariis Junio (sociis: 381, 303, 302, 248, ad hoc vide 99 etc.).

Ceramanthae reperitur secus in *Delphinatu*, *Carniola*. — *Verbasei*: ubivis in Eur. usque ad Sueciam, in Uralo, prov. Or. — *Asteris*: in Gallia, Germ., Austria, Uralo, pr. Or. (Rara,) — *Cham.*: in Austria, Hung. — *Tanaceti*: in Germ. bor., Gallia, Uralo, pr. Or. — *Lactucae*: in Germ., Uralo, pr. Or. — *Artemisiae*: in Germ. bor., circa Berolinum, in Uralo, Japonia; (rara). — *Abrotani*: in Germ., circa Ratisb., Vindob., in Hung., Uralo, pr. Or. — *Umbraticea*: in Germ. alibi in Eur., usque ad Sueciam; in Uralo et pr. Or.

Plusiidae B.

Abrostola O.

390. Urtiae Hüb. 625. OT. V. 3. 145; HS. II. 391.

391. Triplasia L. OT. V. 3. 138; HS. II. 391; H. 626.

Volitant pervesperi mixtim et frequenter (una cum: 394, 397, 954 etc.) in floralibus *Samboriae Leopolisque*. Junio, Julio initioque Aug. *Triplasia* multo numerosior est.

Urticae degit in Austria, Moravia, Bavaria, pr. Or. — *Triplasia* in Germ., alibique in Eur.; porro in pr. Or.

Plusia O.

392. Moneta Fabr. OT. V. 3. 158; HS. II. 401; H. 189. Frequens *Samboriae Leopolisque* in floralibus, ubi *Aconitum* colitur, Junio. In apertis M. nondum mihi in conspectum venit.

393. Festueae L. OT. V. 3. 165; HS. II. 397; H. 297. Alterum exemplar (sociis 400, 379, 440, etc.) tempore pomeridiano in agris *Trifolio* consitis penes sylvam R. g., alterum *Leopoli* in floralibus. Septembri.

394. Jota L. OT. V. 3. 181; HS. II. 395; H. 282. Volitat singulatim in *Samboriae Leopolisque* floralibus (una cum: 390, 391. etc.). Unum exemplar inveni praeterea (sociis 6 etc.) in montani pagi *Wolcze* convalle *Zahariskie pole*, ubi spisse magnum per spatium florebat *Ononis hircina*. Julio.

395. Circumflexa L. OT. V. 3. 179; HS. II. 396; H. 285. Reperitur sat frequenter primum Majo, tum Julio in *Leopolis* et *Samboriae* floralibus, ubi cum prioribus vagatur sub vesperum diversos inter flores et quibus paulisper ad nectar bibendum insidet. Praeterea obvia mihi fuit C. (sociis 1309 etc.) 12. Junii in coll. querceto P. R. specimine singulo, quod abditum media in silva inter herbas prope humum latebat.

396. Chrysitis L. OT. V. 3. 169; HS. II. 399. H. 272. Vulgaris *Samboriae Leopolisque* Junio et Julio in hortorum sepiminibus.

397. Gamma L. OT. V. 3. 185; HS. II. 394. H. 283. Pervulgata haec *Plusia* reperitur in nostratisbus ubique locorum a planicie in alpes usque. Volitat Majo et Junio solitarie, Julio — Sept. copiose, Oct. initioque Nov. item rarius. Anno 1856. apparuit G. numero prope infinito circa pagum *Radłowice górne*, ubi a 13. Sept. ad medium Oct. pervagata est (continuo innumerosa) agros demessos, Raphano raphanistro nec non alias florente *Trifolio* consitos. Vulgatissimam inveni Gammam 24. Julii 1858 et in pratis foenariis *Zahariskie pole* et *Kaminka* montanarum vallium circa *Wolcze* (vide 6), sat frequentem autem 26. Julii e. a. in al-

pis *Pikuj* (4190 p. v. *Lob. elatae*) rupestribus cespitibusque Vacc. vitis ideae (hoc loco in societate specierum 448, 541, 617 etc.).

Moneta provenit secus in Germ. merid., Hung., Italia, Gallia, Uralo, pr. Or. — *Festucae*: in bor. Europa, in Germ., pr. Or. — *Jota*: in Germ., Gallia bor., foederatis Americae civitatibus. — *Circumflexa*: in Germ., Gallia, Hung., Styria, Austria; secus in Asia et America boreali (Maryland, Delaware, Labrador.). — *Chrysitis*: ubi vis in Eur., usque ad Lapp.; in ins. Canariis, reg. Transcauc., ad Lenkoran. — *Gamma*: per omnem Eur., usque ad Lapp. (HS.). Teste *Inchyto* Koch in pr. Or., in Caucaso, Asia minori, Caschmire, m. Himalaicus, Japonia, Algerio, Aegypto, Nubia, Abyssinia, in America bor., nova Hollandia.

Heliothidae B.

Heliaca HS.

398. Tenebrata Scop. (*Arbuti F.*, *Heliaca SV.*). OT. V. 3. 212; HS. II. 370; II. 316. *Vulgaris Majo* ubique in pagis, silvaticisque pratis siccis et humidis a planicie in montosa usque (*Magóra*). Secus regionatim in Europa media et austr.

Heliothis Tr.

399. Dipsacea L. OT. V. 3. 220; HS. II. 366; II. 314. Singula exemplaria 13. et 26. Sept. circa R. g., quae tempore pomeridiano (una cum: 393, 397, 400, 401 etc.) agros Trifolio consitos pererraverunt. Extremo Aug. vidi praeterea D. montanos agros avenaceos in Czarna, et (socia 328) 9. Junii culta in Hołosko sole aestuante pervagari.

400. Scutosa SV. OT. V. 3. 224; HS. II. 366; II. 309. 13. Sept. (sociis 393, 397, 440 etc.).

401. Armigera Hüb. 370. OT. V. 3. 230; HS. II. 367. 13. et 26. Sept. comitibus 440, 574, 399 etc. Hucusque inveni semel in pago R. g. spec. bina, quae ibidem per agros Trifolio consitos in sole mox volitabant, mox in floribus ad nectar sugendum paulisper assidebant.

Dipsacea provenit in media australique Eur.; in Uralo, pr. Or., Baskiria. — *Scut.*: in meridionaliori Eur.; in Silesia, Austria, Hung., in Uralo, pr. Or., Bask. — *Armig.*: in Dalmatia, Hung., Gallia media et austr.; secus in Asia, Africa, America, Australiaque.

Chariclea Kirby.

402. Umbra Husgl. (*Marginata* Fabr.). OT. V. 3. 232; HS. II. 220; II. 185. Mediis in silvis inter Leopolim et Winniki detexi

semel ineunte Julio (una cum: 967, 1137 etc.) duo spec. obsoleta, quae in ramis vetustarum Quereum longe a se distantium abdita latebant.

Secus in Germ., in Uralo; rara.

Acontidae B.

Acontia Tr.

- 403. Luctuosa** SV. OT. V. 3. 247; HS. II. 418; H. 305.
306. Semel unicum spec. 3. Julii in siecco pratulo aprico ad marginem pineti inter Janow et Lelechówka (una cum: 408, 998 etc.).

In Europa usque ad Sueciam: in Germania, Hung., Italia, Gallia, Armenia, ad Lenkoran.

Noctuophalaenidae B.

Thalpochares Led.

- 404. Paula** Hüb. OT. V. 3. 268; HS. II. 440; H. 452.
Volitavit (una cum: 704, 833, ceterum vide 1309) copiose 12. Junii 1859 circa Janow prope humum in collis arenosi Próchnik siccis declivibus, parce plantis flórae arenosae et hic illuc Pinis silvestribus obsitis. 3. Julii e. a. iterum in hoc loco fui, sed ne unum quidem exemplar jam vidi. Sabuletis circa Leopolim Paula deest.

In Eur. usque ad Germ. bor. (HS.) et Livoniam (Lederer); in Dalmatia, Italia, Hung., Uralo, Asia anteriore.

Erastria Tr.

- 405. Bankiana** Fabr. (*Argentula Borkh.*) OT. V. 3. 255; HS. II. 428; H. 292. Vulgaris a fine Maji ad Julium in hortis, collinisque pratalis intersilvaticis circa Samboriam Leopolimque. Vagatur interdiu.

- 406. Uneana** L. (*Unca SV.*) OT. V. 3. 253; HS. II. 428; H. 293. Reperitur in pratis humidis P. L. (sociis: 149 etc.), St. w. (comitibus 1159 etc.), deinde in iis circa Leopolim. Extremo Junio initioque Julii. Ubivis rarissima.

- 407. Candidula** SV. OT. V. 3. 263; HS. II. 403; H. 295. Degit solitarie in pratalis silvaticis circa R. g., Leopolim et Janow (hic sociis 1309 etc.). Junio.

- 408. Deceptoria** Scop. (*Atratula SV.*) OT. V. 3. 261; HS. II. 403; H. 296. Volitavit frequentissime 12. Junii (sociis

1309 etc.) minoreque numero 3. Julii (una cum: 998 etc.) in siecaneis apricisque ad marginem coll. pinetorum inter Janow et Lelechówka non procul a fornace calcaria.

409. Pyrarga Hufgl. (*Fuscula SV.*). OT. V. 3. 275; HS. II. 403; H. 297. Reperitur quotannis copiose in silvis frond. prae-
sertim quercentis per omnes ditiones collinas et in promontoriis
toto Junio (comitibus: 557, 466, 491, 468, 409, 510, 612, 717,
493, 330, 669, 685, 850, 446, 550, 613, 621, 700, 413, 411, 398,
774, 544, 597, 488, 766, 671, 936, 314, 648, 136, 227, 454, 843,
946, 293, 692, 1191, 1166, 1052, 1027 etc.).

Bankiana provenit in Germ., in Uralo. — *Uncana*: in Eur. usque ad Sueciam; in Germ. merid., Hung., Helvetia, Gallia; in Uralo, Asia anter. — *Candidula*: in Hung., Germ. merid. — *Decept.*: in Austria, Germ., Uralo, prov. Or. — *Pyrarga*: in Germ., pr. Or.

Prothymia Hüb.

410. Laeetata Scop. (*Aenea SV.*). OT. V. 3. 274; HS. II. 432; H. 350. Vulgaris in collinarum silvarum herbosis circa R. g. et Leoplum; praeterea solitarie in silvigerorum montium Magóra et Hušla pratis, quae 2500 ad 3500 p. v. elata esse censeo. Rectum voluturae tempus est mensis Majus; semel reperi **L.** pluribus exemplaribus et 19. Julii in betuleti Lwowiec excisis.

Per Eur. usque ad Sueciam; in Uralo, pr. Or.

Agriphila B.

411. Sulphuralis L. (*Sulphurea SV.*). OT. V. 3. 251; HS. II. 427; H. 291. Vulgaris Junio in hortis, cultis, pratis, silvisque per omne territorium, exceptis montibus, quos mense Junio hucusque mihi non lieuit visitare.

In Europa usque ad Sueciam; Angliae deest. In Uralo, pr. Or., Bask., ad Lenkoran, mare Caspium, et in Armenia adest.

Ophiussidae HS.

Euclidia Tr.

412. Mi L. OT. V. 3. 395; HS. II. 421; H. 346. Quotannis frequens Majo et Junio in diversissimae naturae pratis per eundem territorium usque ad plura millia elatos montes prouti: Magóra prope oppidum Łomna (sociis: 795 etc.) et Werch Rozłucki in Wołcze (hic una cum: 6 etc.).

413. Glyphica L. OT. V. 3. 390; HS. II. 422; H. 347.
Adest iisdem ac prior locis (excepto monte Magóra) et tempore,
sed multo frequentius universim reperitur. In pratis Kaminka et
Zahariskie połe circa Wołcze inveni Gl. (sociis 6 etc.) vulgatissimam.

*Ambae species incolunt univ. Eur. usque ad Sueciam; Glyph. volitat' etiam
in Transcaucasia et circa Lenkoran.*

Catephia Tr.

414. Alchymista SV. OT. V. 3. 323; HS. II. 405; H. 303.
Speciosum hoc lepidopteron reperi anno 1858 Samboriae
in hortorum sepimentis duobus speciminibus; primum (sociis: 226,
227, 229, 245, 252, 259, 298, 293, 299, 327, 330, 397, 398 ceterum
vide 993) 26. Maji, secundum (comitibus: 185, 813, 198, 127,
128, 264, 278, 274, 289, 318, 337, 384, 386, 322, 414, 584, 627,
647, 718, 976, 1039.) 15 Junii.

Secus in meridionaliori Germania; rara.

Catocala Schrk.

415. Fraxini L. OT. V. 3. 329; HS. II. 411; H. 327.
Dagit solitarie mense Julio (sociis 281, 321) in arboribus pomiferis Samboriae. Ceterum reperi eam in silvaticis inter L. et W.
uno specimine obsoleto 8. Sept. (una cum 922 etc.).

416. Elocata Esp. OT. V. 3. 334; HS. II. 409; H. 494.
Samboriae et Leopoli solitarie in sepiminibus et muris. Julio.

417. Nupta L. OT. V. 3. 337; HS. II. 409; H. 330.
Sat frequens *Samboriae et Leopoli* sub finem Aug. et Septembri
in domuum parietibus.

418. Sponsa L. OT. V. 3. 343; HS. II. 410; H. 333.
Unum exemplar *Samboriae* in muro 14. Aug. una cum: 217, 397,
391, 390, 303, 116, 76.

419. Promissa SV. OT. V. 3. 349; HS. II. 410; H. 334.
Leopoli in muro horti jaculatorii exemplar unum 1. Sept. (sociis:
376, 393, 171, 123, 271).

420. Eleeta Brk. Hüb. 331; OT. V. 3. 355; HS. II. 410.
Extremo Junio exemplar alterum (sociis 262 etc.) *Samboriae*, alterum
Aug. *Leopoli* in muris.

421. Paranymptha L. OT. V. 3. 368; HS. II. 406; H. 336.
Sat frequens incola pomariorum *Samboriae* (vide 262, 344 etc.)
Leopolisque. Juvenitur Junio et Julio.

Catocalae inveniuntur per Eur. usque ad Sueciam (415 — 418.) et Germ. medium (419 — 421). Secus adest Frax. in Uralo. — Elocata: in Syria, Caucaso, prov. Talyche. — Nupta: in Uralo, pr. Or., Bask. — Sponta: in Uralo, pr. Or. — Promissa in Uralo, Bask. — Electa in Somchetia.

Toxocampa Guen.

422. Lusoria L. OT. V. 3. 289; HS. II. 414; H. 420. {

423. Viciae Hüb. OT. V. 3. 293; HS. II. 416; H. 671 — 673. {

Singula ambarum specierum specimina, quae in collectione habeo, detexi 5. Junii in collino querceto R. g. simul cum: 155, 432, 445, 491, 480, 478, 467, 411, 409, 429, 426, 427, 564, 510, 512 650, 694, 613, 761, 683, 867, 718, 816, 847, 835, 817, 852, 933, 1003, 1045, 1047, 1054, 1022, 1076, 1113, 1125, 1131, 1101, 1295, 1135, 1327, 1300.

Lusoria incolit Austria, Hung., Germ., Sueciam, Uralum. — Viciae: reg. ad Rhenum, secus Uralum, pr. Or.

Deltoidae Guen.

Aventia Dup.

424. Flexula SV. OT. VI. 4; HS. II. 434; H. 19. Hucusque spec. singula prope pagum Stupnica in Abietis pectinatae solida silvula Jedlina (comitibus 746, 668, 791 etc.) et in silvis frond. circa Leopolim (sociis: 151, 1083, 238, 566, 690, etc.) oppidumque Janow (hic simul cum: 998 etc.). Junio, Julio.

Secus in Austria, Saxonie, Bavaria.

Boletobia B.

425. Fuliginaria L. *) (Carbonaria SV.). HS. III. 36; OT. VI. 1. 184; H. 151. Unam feminam 20. Junii Loepoli in muro, unum marem (sociis 321 etc.) 16. Julii Samboriae in trunco Populi.

In cuncta Eur. usque ad Lapp.; secus in Uralo, pr. Or.

Heilia Guen.

425½. Calvaria SV. OT. VII. 41; HS. 430; H. 23. Semel tria specimina in mixtae silvae R. g. Alnis et Populis 8. Junii (simil cum: 21, 23, 26 — 28, 32, 53, 59, 80, 89, 91, 147, 197, 143, 187, 188, 269, 320, 314 — 316, 426 — 429, 431, 442, 443,

*) Species haec a Clariss. Lederer nuperrime Noctuis adnumerata est; vide: Berliner Ent. Zeitschrift, Vol. II., pag. 360.

445, 446, 450, 453, 454, 461, 463, 465 — 468, 472, 474, 478, 547, 550, 612, 613, 620, 623, 677, 700, 733, 734, 749, 763, 767, 774, 777, 800, 802, 803, 826, 828, 843, 847, 873, 875, 888, 894 — 903, 928, 931, 936, 947, 978, 979, 981, 1037, 1038, 1053, 1060, 1062, 1069, 1105, 1113, 1166, 1189, 1192, 1211, 1213, 1215, 1217, 1218, 1221, 1222, 1225, 1224, 1226, 1228, 1229, 1239, 1244, 1279, 1283, 1296, ceterum vide: 233, 1022, 1238.).

Secus in meridionaliori Germania in superiore Palatinatu, in Austria, Hungaria, Italia. (Rara.).

Zanclognatha Lederer.

426. Tarsierinalis Knoch. OT. VII. 13; HS. II. 384; fig. 611. Vulgaris in silvaticis per omne terr. usque ad promontoria Junio.

427. Emortalis SV. OT. VII. 5; HS. II. 433; H. 1. Quotannis solitarie sub finem Maji Junioque in fructecto betuleti Lwo-wiec, silvaticisque circa Leopolim.

Tarsi. provenit secus in Germ., ad Vindob., Augustam Vindelic. — Emort.: in Germ., Hung., Dalmatia.

Madop a Steph.

428. Salicatis SV. OT. VII. 34; HS. II. 426; H. 3. Viget Majo — Julio in diversis silvis frond. fruticetisque regionum coll. R. g., Stup., Cz. et L. Non rara.

Secus in Hung. Austria, Bavaria, Germania.

Herminia Tr.

429. Tentacularis L. (*Tentaculalis* SV.). OT. VII. 11; HS. II. 385; fig. 607, 608; H. 6. Frequens Junio Julioque in locis supra enumeratis et circa Janow (hic comitibus 1309 etc.).

430. Derivalis Hüb. OT. VII. 7; HS. II. 383; H. 19. Reperitur disperse et solitarie Julio in coll. quercetis R. g., P. R. et Kor.

Tentacul. provenit per Eur. usque ad Sueciam. — Deriv.: in Austria, Dalmatia, ad Ratisb.

Pechipogon Steph.

431. Barbalis L. OT. VII. 15; HS. II. 383; H. 122. Frequens Majo — Julio in silvis nemoribusque per cunctum coll. territorium, praeterea (una cum 6. etc.) in pratis foenariis vallium montanarum prope Wolcze. Medio Sept. 1859 apparuit B. numerose in betuleto Z. loco, ubi Pop. tremula magnum per spatium crescit.

Per Europam usque ad Sueciam.

Bomolocha Hüb.

432. Crassalis Fab. OT. VII. 24; HS. II. 426; H. 12. 27.

Venustum hoc lepidopteron initio Junii 1859. prope Leopolim in Hołosko detexi, identidemque id in collino fruticeto Mostki inveni, ubi libenter in umbrosis degit, juvencas Quercus inhabitat, frequensque esse videtur. Una cum Cr. legi in his regionibus sequentes species: 328, 1, 25, 26, 32, 47, 50, 73, 80, 91, 97, 113, 114, 143, 152, 188, 194, 228, 248, 353, 399, 405, 407, 409, 478, 502, 504, 505, 510, 513, — 515, 559, 613, 625, 667, 717, 718, 721, 816, 968, 969, 972, 1053, 1059, 1061, 1149, 1319.

Secus in Hung., Germ., ad Vindob., in Livonia.

Hypena Hüb.

433. Rostralis L. OT. VII. 29; HS. II. 425; H. 10. 134.

Quotannis solitarie ab Aprili ad Nov. in Samboriae Leopolisque domiciliis eorumque vicinia.

434. Proboscidalis L. OT. VII. 22; HS. II. 426; H. 7.

Vulgaris Junio-Aug. in coll. pratis silvarumque umbrosis circa R. g., Stup., Cz., L., et Janow.

Rostralis reperitur per Eur. usque ad Sueciam. — Prob.: usque ad Lapp.

Rivula Guen.

435. Seriealis Scop. SV. OT. VII. 125; HS. II. 447;

H. 56. Vulgaris Junio-Sept. in coll. silvaticis circuli Samb., nec non in iis circa L. Anno 1856 apparuit Ser. sub finem Sept. magno numero in alneto populetoque in mixta silva R. g.

Secus in Austria, Hung., Germ., Livonia.

Brephides HS.

Brephos Tr.

436. Parthenias SV. OT. V. 3. 379; HS. II. 450; H. 341. 342.

437. Notha Hüb. 343. 344; OT. V. 3. 383; HS. II. 450.

Ambae hae species volitant mixtum socialiterque (N. vulgate, Part. minore numero) circa Samborianam Leopolisque in coll. betuletorum marginibus aliisque locis soli expositis jam primis veris diebus pulchris (12. Mart. 1855).

Inveniuntur in universa fere Europa. Br. puella, quam primo vere anni 1857 frequentem vidi Vindobonae, Halicie orientali deest.

Geometroidae.

Pseudoterpna HS.

438. Pruinata Hufgl. (*Cytisaria SV.*). HS. III. 11; H. 2; OT. VI. 1. 120. Provenit solitarie in coll. fruticosis querecti P., et mixtis silvis ad pedem monticuli Cz. sk.; frequenter autem in campestri collini tractus Janow silvaticis et apertis, praecipue in Pin. silvestrium vicinia. Julio.

Ubivis in Europa media et australi; secus in provincia Orenburg.

Geometra B.

439. Papilionaria L. OT. VI. 1. 103; HS. III. 8; H. 6. Agit vitam solitariam mediis in sivis frond. circa R. g. (vide 258) et Leopolim. Julio et Aug.

440. Vernaria L. HS. III. 11; H. 7; OT. VI. 1. 101. Hucusque unam feminam in coll. querceto R. g. initio Sept. (simil cum: 6, 12, 66, 67, 73, 123, 242, 309, 357, 361, 372, 375, 393, 397, 399 — 401, 417, 435, 583, 663, 665, 1107 etc.).

Papil. provenit a Suecia usque ad Eur. medium; secus in Uralo. — Vern.: a Lapp. usque ad merid. Eur.; in Italia, Anglia, Uralo.

Phorodesma B.

441. Pustulata Hufgl. (*Bajultria SV.*) „*Viridis, angulo anali alarum omnium flavo, ferrugineo - notato*“ HS. III. 9; H. 3. OT. VI. 1. 122. Sub finem Junii initioque Julii 1856 reperi in coll. querceto R. g. specimina quinque (4 mares, 1 fem.). Una cum Pust. legi: 721, 722, 578, 1238, 425 $\frac{1}{2}$, 469, 451, 238.

Secus localiter in Europa media; ad Augustam Vindelic.

Nemoria Hüb.

442. Porrinata Zell. (*Viridata Tr.*) HS. III. 10; H. 11. 352; OT. VI. 1. 107. Reperitur vulgate in pratorum subsilvaticorum herbidis, in nemoribus dumosisque per coll. ditiones R. g., Stup., Cz. et L. Majo rario, Junio et Julio frequens,

443. Fimbriata Hufgl. (*Aestivaria Hüb.*, *Thymiaria SV.*).
HS. III. 10; H. 9; OT. VI. 1. 117. *Vulgaris Junio Julioque in coll. silvis frond. circuli Samb.* et in iis prope *Leopolim.* *Incolit et pometa.*

Ambae species inveniuntur usque ad Sueciam. Fimbriata adest etiam in Uralo.

Thalera Hüb.

444. Thymiaria L. (*Bupleuraria SV.*). HS. III. 10; H. 8;
OT. VI. 1. 114. *Unum specimen pulcherrimum 3. Julii prope Janów ad radices juvencae Pini silv. in colle Pr. pineto R. eminente, egena chloride arenosa et solis Pinis silv. vestito. Una cum Th. inveni:* 481,
494, 404, 704, 793, 794, 958, 959, 997. *ceterum vide 998.*

In Europa usque ad Sueciam; secus in Baskiria.

Jodis Hüb.

445. Putataria L. OT. III. 11; H. 10; OT. VI. 1. 112.
Quotannis copiosa praecipue in quercetis per cunctum territorium in promontoria usque. Extremo Majo totoque Junio.

446. Laetearia L. (*Aeruginaria SV.*). HS. III. 11; H. 46;
OT. VI. 1. 109. *Vulgaris iisdem in locis temporeque ac prior sed ubi vis minore numero reperitur.*

Putat volitat a Suecia per univ. Eur. — Lact.: in Eur. media, pr. Or.

Acidalia Tr.

447. Aureolaria SV. HS. III. 27; H. 62; OT. VI. 2. 266. *Vagabatur frequenter socialiterque 12. Junii (vide 1309) et 3. Julii (vide 998) prope Janów in sicco pratulo, quod in apricis declivibus calciorum collinorum Szyp floret, et juvencis Quercubus, Fagis, Betulis, Pinis silv., Corylisque est cinctum. Excepto hoc loco eam nunquam et necubi in perlustrato territorio conspiceri mihi contigit.*

448. Perochrearia FR. 49. HS. III. 19; OT. VI. 2. 6; H. 110. *Vulgaris Julio et Aug. in pratis et herbosis per omne terr. a pl. in alpes usque (Pikuj, Paraszka, Zelemin). Pluria exemplaria reperi semel mense Oct. in coll. silvaticis R. g.*

449. Ochreata Scop. HS. III. 20; OT. VI. 2. 6. FR. 50. *Hucusque semel unicum spec. 1. Aug. in prato uliginoso penes coll. quercetum Wozn. in Stup. (cum priore, ceterum vide 748.).*

450. Rufaria Hüb. 112. HS. III. 19; OT. VI. 2. 7. *Unum exemplar Junio percussione herbarum in coll. querceto R. g.*

451. Moniliata SV. HS. III. 20; H. 59; OT. VI. 2. 290.

Unam feminam 11. Julii in coll. querecto R. g. (comitibus: 13, 83, 92, 93, 153, 186, 238, 298, 319, 429, 438, 441 — 443, 452, 509, 535, 583, 607, 659, 669, 703, 717, 718, 725, 749 — 751, 758, 764, 774, 783, 828, 869, — 871, 901, 912, 932, 1000, 1001, 1056 — 1058, 1066, 1069, 1075, 1084, 1126, 1131, 1146, 1174, 1179, 1198, 1227, 1283, 1308, 1336, 1343, 1346.).

452. Muricata Husgl. (*Auroralis* SV.; *Auroraria* Hüb. 63.) „*Purpurea, maculis centralibus limboque fulvis*”. HS. III. 27; OT. VI. 1. 267. Venustum hoc lepidoptera invenitur satis frequenter in coll. querecti R. g. lucidis et pratulis (simul cum: 153, 1260, 1259, 1211, 1174, 1171, 1146, 1139, 1136, 1079, 1078, 1056, 1027, 1000, 947, 928, 869, 828, 857, 803, 774, 764, 751, 766, 749, 727, 686, 675, 677, 451, 430, 319 etc.). Circa Leopolim inveni semel exemplar unicum (sociis 985 etc.) in coll. nemore adversus betuletum K. Volitat Julio.

453. Pallidata SV. *Byssinata* Tr. VI. 2. 34 et 36; HS. III. 19. fig. 110 — 113; H. 96. Toto Majo Junioque multa ubivis in pratulis silvaticis per cunctum terr. usque ad humiliores montes circiter 2000 p. v. elatos.

454. Incanata L. HS. III. 16; H. 104. 106; OT. VI. 2. 281. Frequens Junio Julioque in domiciliis, sepiminibus silvisque frond. coll. ditionum. 24. Julii obvia mihi fuerunt aliquot exemplaria (simul cum 6 etc.) in pometo montani pagi Wołcze.

455. Bisetata Husgl. HS. III. 16. f. 116; OT. VI. 2. 287. Vulgaris Julio in coll. querectis Wozn., R. g. (vide 149. 258.), et circa L. Adest etiam *Samborizae* in pomariorum sepimentis. Julio.

456. Rusticata SV. HS. III. 21; H. 241; OT. VI. 2. 44. Hucusque semel 16. Junii spec. unicum (sociis 475. 1014 etc.) loco graminoso in coll. querecto R. g.

457. Osseata SV. „*Alarum ant. costa purpurea.*” HS. III. 18; H. 102; OT. VI. 2. 32. Vagabatur frequenter socialiterque Julio 1859 in floridis apricisque declivibus siccorum collinorum Szyp (comitibus: 447. 998 etc.), porro in pratulo nemorali adversus coll. betuletum K. (hic sociis: 501½, 967, 1137, etc.). Secus nulibi mihi apparuit.

458. Holosericeata Dup. HS. III. 19. f. 80, 81. Vul-

garis extremo Junio initioque Julii iisdem ac prior locis, praeterea in nardeto prope campestre betuletum Zubrze.

459. Interjectaria B. (*Dilutaria Hüb.*, 100); HS. III. 18. fig. 78, 79; OT. VI. 2. 281. Hucusque reperi medio Julio in coll. querecto R. g. (una cum: 153, 258, 430, 472, 776, 1126, 1163, 1170, 1172, 1235, 1269) spec. duo, quae ibidem inter herbas abdita latebant et ex his percussis velociter affugere conabantur.

460. Rufillaria HS. (*Rufularia FR.*). HS III. 17, fig. 84, 85. Unicum spec., quod in collectione habeo, cepi 30. Junii in querecto R. g., humiliores herbas percutiens. Una cum Ruf. legi sequentes praeterea species: 67, 89, 91, 95, 98, 152, 157, 187, 188, 197, 261, 296, 320, 358, 396, 409, 427, 429, 435, 441, 442, 461, 491, 492, 544, 581, 593, 623, 652, 677, 681, 717, 718, 729, 733, 734, 737, 738, 747, 741, 749, 750, 751, 755, 763, 764, 765, 766, 767, 771, 774, 777, 800 — 803, 816, 819, 822, 823, 828, 835, 839, 847, 858, 873, 875, 877, 928, 947, 948, 950, 966, 986, 1002, 1012, 1016, 1027, 1049, 1069, 1076, 1125, 1138, 1149, 1163, 1166, 1171, 1179, 1196, 1206, 1209, 1213, 1215, 1218, 1221, 1222, 1224, 1225, 1228, 1229, 1239, 1241, 1243, 1270, 1279, 1281, 1283, 1296, 1303, 1308, 1327, 1338, 1346.

461. Aversata L. HS. III. 17. H. 56; OT. VI. 2. 268. Vulgaris in silvaticorum excisis et herbosis per omne coll. territorium et in promontoriis. Extremo Junio et Julio. Variat magnopere.

462. Emarginata L. HS. III. 28; H. 107; OT. VI. 1. 28. Quotannis solitarie disperseque Julio in frond. prosilviis, nemoribus fructetosisque per coll. ditones R. g., *Stup.* et L.

463. Immorata L. HS. III. 25; H. 133; OT. VI. 1. 295. Vulgatissima Junio in pratis et silvaticis per canetum terr. usque ad promontoria. 24. Julii vidi Im. frequentem in pratis Kam. et Z. P. mont. vallium circa Wołcze.

464. Rubricata SV. HS. III. 22; H. 111; 487; OT. VI. 2. 8. Hucusque singula spec. Junio in planitiei Samb. aperto prato humido prope Ka. (socia 943), porro in siccō pratulo herbito in collinorum Szyp declivibus apricis (hic una cum 447. 1309 etc.).

465. Immutata L. HS. III. 24. fig. 101.; H. 108; OT. VI. 2. 278. Solitarie Junio et Julio in coll. silvis frond. per ditiones R. g., Cz. et L.

466. Mutata Tr. HS. III. 24; fig. 98, 99, 100; OT. VI. 2.
275. Quotannis satis multa Junio in coll. silvaticis R. g.

467. Remutata SV. HS. III. 22; fig. 86—90; OT. VI. 2.
273; H. 98. Vulgaris Majo et Junio ubique locorum in silvatis us-
que ad promontoria, circiter 2000 p. v. elata.

468. Subpunctaria HS. (*Punctata* Tr. VI. 2. 305; *Nemoraria* Freyer). „Nivea, strigis obsoletis testaceis, limbo nigro-punc-
tato”. HS. III. 23. fig. 311—323. Reperitur sat frequenter toto
Junio praesertim in quercetis collinarum ditionum R. g. (vide
158.), Cz., Stup., L. et J. (vide 1309).

469. Silvestrata Brkh. HS. III. 23; fig. 103, 105; H.
97; OT. VI. 2. 306. Singula specimina in S. sepagine (Junio),
in coll. silva R. g. (14. Aug. una cum 58 etc.) et in pratulo
coll. querceti P. (10. Julii sociis 908 etc.).

470. Strigaria Hüb. 95; HS. III. 26. fig. 114, 115;
OT. VI. 2. 35. Volitavit frequenter 3. Julii prope J. in floridis
declivibus collinorum Szyp (sociis: 447, 658, 457, 458, 998 etc.).

471. Nigropunctata Hufgl. (*Prataria* B; *Strigilata* H.
109). HS. III. 26. fig. 108, 109; Tr. VI. I. 25. Toto Julio frequens
in coll. silvaticis circa Stup., R. g., et L. Volitat libenter in um-
brosis pratulis humidiuseculis.

472. Paludata L (*Ornata* SV. Scop.). HS. III. 25; H. 70;
OT. VI. 2. 283. Vulgaris in silvaticis, fruticetis et pratis a fine
Maji ad Aug. circa R. g., M., L., et J.

473. Scutulata SV. (*Dimidiata* Hufgl.). HS. III. 15; H. 72;
OT. VI. 2. 288. *Samboriae* in pariete domus semel 16. Julii sin-
gulum exemplar (una cum: 321, 425, 676, 657, 322 etc.).

Aureol. invenitur secus in Helvetia, Sardinia, ad Vindob., Ratisb. — Perochr.:
ad Ratisb., in Germ., Austria etc. — Ochreata: hic illic in Eur.; Ratisbonae deest.
— Rufaria: in Austria, Germ., ad Ratisb.; secus ad Stanchio, in prov. Or. —
Moniliata: in Eur. usque ad Sueciam, in Gallia merid., ad Ratisb. — Muricata:
in Austria, Bavaria, Saxonia; Ratisbonae, Parisiis. (Rara.) — Pallidata: in Germ.,
Styria, ad Vindob., Ratisb.; secus in Uralo, pr. Or. — Incanata: per univ. Eur.
usque ad Sueciam, secus in Algerio. — Bisetata: in Hung., Austria, ad Berolinum,
Lenkoran, in Africa. — Rusticata: in Austria, Gallia. — Osseata: per omnem
Eur. usque ad Sueciam; secus in Algerio, Baskiria, Uralo. — Holosericeata: ad
Ratisb etc. — Interject.: in Austria, Gallia merid. (Rara.) — Rufill: in Austria.

— *Aversata*: per omnem Eur., in prov. Or. — *Emarg.*: in Austria, Saxonie etc. usque ad Sueciam; in Uralo. — *Immorata*: hinc inde in Eur.; in Burgundia, pr. Or. Angliae et pluribus Germ. reg. deest. — *Rubricata*: in pluribus Eur. reg. usque ad Sueciam; ad Ratisb.; secus in pr. Or. — *Immutata*: in Germ.; secus in pr. Or. Ratisbonae deest. — *Mutata*: in Austria, ad Ratisb. — *Remutata*: per univ. Eur. usque ad Lapp. — *Subpunct.*: in Austria. — *Silvestrata*: hic illuc in Eur., in Uralo. — *Strigaria*: in Eur. media; in pr. Or. — *Nigropunctata*: in Eur. media; ad Ratisb. — *Paludata*: per eunctam Eur. usque ad Sueciam; porro in Transcaucasia, ad Lenkoran, in Brussa, Phinika, Algerio. — *Scutulata*: in Germ., Gallia.

Zonosoma Lederer.

474. Pendularia L. HS. III. 31. fig. 357; H. 66; OT. VI. 1. 361. Quotannis solitaria et dispersa in diversis silvis frond., rarius acerosis per ditiones R. g., Stup., Cz., et L. Majo.

475. Omicronaria SV. HS. III. 31; H. 65; OT. VI. 1. 358. Hucusque semel 16. Junii exemplar unum percussione Quercus in coll. silva R. g. (sociis: 456, 1014 etc.).

476. Albiocellaria HB. (*Ocellaria* Tr. Hüb. 64; *Argusaria* B.). „*Subaurantiaca*, area media fusco nebulosa; omnibus ocellis nigris, pupilla magna alba.“ HS. III. 30; OT. VI. 1. 360. Semel spec. singulum 1. Junii (sociis: 489, 863, 1042 etc.) percussione Pyri, quae crescit in saltu frond. silvae Zapust in collina ditione Stupnica.

477. Porata L. (*Punctaria* SV.). „*Subochracea*, lateritio-irrorata; annulo medio albo-repleta.“ H. 67; HS. III. 31; OT. VI. 1. 356. Raram hanc in Halicia speciem inveni 21. Julii in coll. querceto R. g. spec. unico, quod in inferioribus ramis Quercus abditum latebat. Hac excursione legi ceterum sequentes papilioes: 4, 12, 13, 43, 45, 71, 73, 75, 77, 78, 83, 87, 92, 93, 104, 116, 186, 199, 288, 319, 397, 429, 430, 434, 455, 461, 478, 472, 483, 486, 491, 499, 544, 550, 583, 588, 599, 616, 623, 625, 671, 691, 747, 749, 752, 758, 778, 779, 766, 801, 810, 828, 851, 853, 857, 870, 896, 900, 924, 931, 936, 1001, 1050, 1052, 1060, 1061, 1101, 1107, 1109, 1113, 1134, 1131, 1165, 1171, 1174, 1184, 1196, 1206, 1233, 1263, 1282, 1294, 1320, 1334, 1342, 1345.

478. Punctaria L. „*Rufoochracea*, lateritio - adspersa, striga ferruginea serieque punctorum nigrorum. Alae sine annulo medio.“ HS. III. 30; H. 574; OT. VI. 1. 352. Vulgaris in sil-

vis mixtis per cunctum terr. a pl. usque ad humiliores montes.
Majo — Sept. Variat magnopere.

479. Trilinearia Brkh. „*Lutea, lineis tribus fuscis, media laticore.*“ HS. III. 30; H. 68; OT. VI. 1. 367. Solitatim Majo in Fagis mixtarum silvarum in H. Exemplar unum reperi et 1. Julii in sageto ad pedem monticuli Cz. sk. (una cum: 671, 672, 481, 482, 70, 832, 1081, 1088, 1089, 1104, 1232, ceterum vide 945 etc.).

Pendul. invenitur per omnem Eur. — *Omicr.*: in Austria, Germ., Hung. — *Albiocell.*: in Eur. merid.; ad Vindob., in Hung. — *Porata*: ad Vindob., in Hung. — *Punct.*: per cunctam fere Eur. — *Trilin.*: in Germ., ad Rhenum. (*Rara*.).

Timandra B.

480. Amataria L. HS. III. 13; H. 52. 524. 525; OT. VI. 1. 20. Reperitur quotannis solitarie Majo — Aug. in floralibus, pomariis, silvisque frond. circa S., R. g., M., et L.

Per univ. Eur. usque ad Sueciam; secus in Borneo.

Pellonia Dup.

481. Vibicaria L. HS. III. 13. H. 50; OT. VI. 2. 263, Volitat solitatem inter densa Pop. tremulae fruticeta in colle Cz. sk. (vide 945 etc.), frequenter autem prope J. in collinis Próchnik inter juvencas Pinos silv. (sociis: 494, 444, 511, 998.). Initio Julii. Omnia exemplaria lecta erant plus minusve obsoleta. Circulo Samboriensi deest.

482. Calabra Petagna. (*Calabraria* H. 49). HS. III. 14; OT. VI. 2. 262. Semel exemplar unicum 1. Julii inter rupestria in apricissimis declivibus monticuli Cz. sk. (cum priore, 945 etc.).

Vibic. invenitur in cuncta Eur. usque ad Sueciam; secus in pr. Or. — *Calabra*: in Calabria, Lusitania, Hispania, Gallia merid., Sardinia, Dalmatia; secus in Asia et Africa, (*Transcaucasia*, Lenkoran, Makri, Rhodus, Algerium).

Zerene Tr.

483. Grossulariata L. HS. III. 64; H. 81. 82; OT. VI. 2. 238. Vulgaris Majo — Julio in hortis et silvis frond. usque ad promontoria, circiter 2000 p. v. elata. In coll. silva R. g., ubi Ribes gross. magnum per spatium luxuriatur, reperitur Gr. quotannis frequentissime.

484. Ulmata Fabr. HS. III. 64; H. 85. 391. 362; OT. VI. 2. 240. Quotannis solitatim Junio Julioque in hortis, ambulacris, arbustis silvisque frond. in ditionibus R. g., L., et J.

485. Adustata SV. HS. III. 83. H. 75; OT. VI. 2. 225. Frequens Junio Julioque in hortorum sepimentis et silvis frond. per omne terr. usque ad promontoria.

486. Marginata L. HS. III. 64. H. 80. 79. 77; OT. VI. 2. 231. Quotannis communissima et in pulchris varietatibus Majo-Julio ubique locorum in silvaticis et fruticosis usque ad promontoria, circiter 2800 p. v. elata. In floralibus pometisque quoque reperitur.

Grossul. provenit in cuncta Eur. usque ad Sueciam; secus in pr. Or., ad Berbices. — *Ulmata*: in Suecia, Anglia, Gallia, Alpibus, Carniola, Ukraina, pr. Or. Caucaso. — *Adustata*: in univ. Eur. — *Marg*: per omnem Eur. usque ad Lapp.; secus in Uralo.

B a p t a Steph.

487. Bimaculata Fabr. (*Taminata* SV.). „*Alba, maculis duabus costalibus fuscis.*” HS. III. 69; H. 90; OT. VI. 2. 245. Vulgaris Majo et Junio per frond. silvas terr. cuncti in promontoria usque.

488. Temerata SV. (*Punctata* Fabr.). „*Nivea; area limbali fusca subundata, puncto medio nigro.*” HS. III. 69; H. 91. 376. 377; OT. VI. 2. 246. Provenit quotannis solitarie Majo in variis silvis frond., praesertim autem in coll. betuletis circa R. g. et L.

Bimaculata habitat in Hung., Dalmatia, Ukraina, Casano. — *Temerata*: in Germ. merid., Austria, Hung., Bavaria, Helvetia, Tyroli, Casano.

Terpnomicta Led.

489. Dilectaria Hüb. „*Flavescens, atomis, costis, strigis binis et undulato flexuosis lunulaque media ferrugineis, angulo anali alarum anteriorum plumbeo-notato.*” HS. III. 70. fig. 59; H. 39; OT. VI. 1. 293. Hucusque reperi semel 1. Junii in collucato querceto Wozn. in pago Stup. spec. unicum (sociis: 863, 1095, 1096 etc.). Videtur in Halicia rarer esse Cararia.

490. Cararia Borkh. Hüb. 38. „*Flavescens, atomis, lunula alarum media, linea limbali et undulata triarcuta in costa 1 b. et 5 limbum tangente fuscis, loco strigae posterioris series puncto-*

rum." HS. III. 70; OT. VI. 1. 295. Subtilem et speciosam hanc Geometram raram reperi annis 1852 ad 1859 a 26. Maji ad 16. Junii sex speciminiibus in variis silvis frond. aut solidis aut mixtis, speciatim autem in coll. betuleto *Lucowiec* (sociis: 993, 1022, 1014 etc.), in coll. juvenca faginea silva *Zapust* (una cum 863 etc.) et in vetusto campestri querceto B. (comitibus: 940 etc.). In omnibus his locis latitabat *Cararia* solitarie disperseque praesertim in prosilviorum fruticosis.

Dilect. volitat ad Vindob., in Hungaria. — Cararia: in Gallia bor. et ad Vindobonam. (Rara.).

C a b e r a Tr.

491. Pusaria L. HS. III. 84; H. 87; OT. VI. 1. 344. Quotannis vulgatissime et socialiter Majo — Aug. in silvis nemoribus, fruticetisque per territorium cunctum usque ad humiliores Beskidorum montes, circiter 3000 p. v. elatos.

492. Exanthemata Scop. HS. III. 85; H. 88. 506; OT. VI. 1. 346. Ut praecedens nisi quod paulo minore appetere numero.

Ambae species inveniuntur ubivis in Eur. usque ad Lapp., secus in Uralo, Casano, provincia Orenburg.

N u m e r i a Dup.

493. Pulveraria L. HS. III. 68; H. 203; OT. VI. 1. 309. Quotannis vulgaris per omne terr. Junio in mixtis silvis frond., potissime in quercetis usque ad promontoria (*Spas*). Exemplaria Haliciensia sunt constanter multo laetius colorata, quam illa, quae in museo Vindob. et in collectione Amicissimi Mann vidi.

Secus in Germania, Bohemia, Casano, Uralo.

E l l o p i a Steph.

494. Fasciaria L. „*Rufescens, limbo rotundato.*“ HS. III. 39; H. 5. 447; OT. VI. 1. 97. Hucusque semel 3. Julii unicum spec. paulo obsoletum prope J. inter Pinos silv., quae solae hinc inde in arenoso et 1110 p. v. (Kbg.) alto colle *Próchnik* crescent. In his collinis degunt praeterea: 448, 481, 958, 959, 998 etc.

495. Margaritaria L. „*Marygritaceo - viridis, limbo in costa 4 obtusangulo.*“ HS. III. 39; H. 13; OT. VI. 1. 92. Singula specimina 21. Julii *Samboriae* (simil cum: 178, 186, 45, 77, 78, 391, 397, 671, 676, 697, 696, 599, 739, 954, 1021, 1109, 395, 319, 287, 246, 179, 180, 177) in trunko *Tiliae* et 26. Julii (sociis

17 etc.) in fageto alpestris montis *Hušla*, speciatim autem loco circiter 3400 p. v. elato (terminus Fagi: 3550 p. v. *Łob.*).

Fasc. invenitur secus circa *Vindob.*, in *Francia*, ad *Rhenum* in *Helvetia*, alibique ad *Sueciam* usq[ue]. — *Margarit.*: in *Eur.* usque ad *Sueciam*; in *Germania*, ad *Vindobonam*.

Eugonia Hüb.

496. Angularia SV. HS. III. 42; fig. 66. 67; H. 22. 27; OT. VI. 1. 69. Exemplar unum S. Sept. (sociis: 922 etc.) in mixtis silvaticis ad pedem monticuli Cz. sk. Degebat in *Quercu*.

497. Alniaria SV. HS. III. 41; H. 26; OT. VI. 1. 79. Per omnes annos semel 20. Oct. 1855 tria exemplaria (sociis: 503, 576, 308, 362 etc.) *Samboriae* in pomarii floraliumque septis.

498. Erosaria SV. HS. III. 42; H. 25. 24. 440; OT. VI. 1. 73 Singula spec. 6. Julii in coll. beluleto *Lw.* et 4. Sept. in campestri querceto *B.* (una cum: 4, 5, 10 271, 334, 362, 366, 397, 744, 764, 857, 906, 908, 921, 963, 1106, 1169, 1251 1322, 1324, 1306.).

Angul. et *Aln.* inveniuntur in *Eur.* usque ad *Sueciam*; secus in pr. *Or.* — *Erosaria*: in *Austria*, *Germ.*, ad *Ratisb.*, in *Uralo*.

Selenia Hüb.

499. Illunaria Hüb. 36. 37; HS. III. 47; OT. VI. 1. 61. Unum marem (sociis: 477 etc.) 21. Julii percussione *Quercus* ad marginem betuleti *Lw.*, unam feminam 11. Maji inter *Quercus* ad pedem collis Cz. sk. (hic comitibus: 825, 1112, 1231 etc.).

500. Lunaria SV. HS. III. 47; H. 33. 34. 451; OT. VI. 1. 56. Unum marem et duas feminas 23. Maji in excisis coll. querceti prope c. *Lis.* (una cum: 26, 73, 78, 89, 171, 189, 467, 623, 691, 700, 777, 782, 875, 891, 901, 953, 1038, 1043, 1125, 1248, 1253, 1324 etc.). Latitabant in fruticibus.

501. Illustraria Hüb. 35. HS. III. 47; OT. VI. 1. 63. Quotannis solitarie Majo in hortis et coll. silvis frond. circa R. g. (vide 327, 234, 993 etc.) et *Leopolim*. Variat adeo, ut nullum exemplar sit simile alteri.

Illun. provenit in *Eur.* usque ad *Lapp.*; secus in *Casano*. — *Lunaria*: per *Eur.* usque ad *Sueciam*, in *Casano*. pr. *Or.*, *Uralo*. — *Illustr.*: ubivis fere in *Europa* et in *Uralo*.

Pericalia Steph.

501^{1/2}. Syringaria L. H. 29; HS. III. 47; OT. VI. I. 52.

Unicum exemplar, quod in collectione habeo, inveni 6. Julii sub vesperum in mixto nemore adversus betuletam K. (in societate specierum: 457, 458, 471, 455, 402, 237, 190, 179, 184, 1137, 967. etc.). In hortis ubi Syringa et Ligustrum coluntur, frustra eam per annos quae sive. Rarissima in Halicie esse videtur.

Hic illuc in Eur. usque ad Sueciam.

Odontopera Steph.

502. Bidentata L. (*Dentaria Esp.*). HS. III. 45; H. 12;

OT. VI. I. 76. Unam feminam reperi 19. Maji *Samboriae* in pomarii sepimine (sociis 234 etc); unum par prope L. 9, Junii in coll. piceto *Świnika* (una cum: 559, 510, 514, 328, 407, 399 etc.).

In Europa media, usque ad Sueciam; in Casano.

Himera Dup.

503. Pennaria L. HS. III. 46; H. 14; OT. VI. I. 156.

Provenit solitarie Oct. in coll. silvis frond. circa S. et L, Interdum et in pomariis adest.

A Suecia usque ad Europam meridionaliorem.

Eurymena Dup.

504. Dolabraria L. HS. III. 55; H. 42. OT. VI. 2. 38.

Sat multa sed dispersa in quercketis R. g., Kor., B., et P. R. Majo, rarius Junio et Julio. *Leopoli* reperi eam etiam in sepimentis.

Per Eur. usque ad Sueciam; secus in Casano et Uralo.

Angerona Dup.

505. Prunaria L. HS. III. 63; H. 122. 123; OT. VI. I. 45.

Vulgaris Junio et Julio in silvis frond. per omne terr. usque ad promontoria circiter 2000 p. v. elata.

Var. Corylaria Thunb. Sub finem Maji Junioque item frequens iisdem in locis ac *Prunaria*, quacum mixtim volitat.

A Suecia per univ. Eur.; secus in Casano et pr. Or.

Rumia Dup.

506. Crataegata L. HS. III. 55; H. 32; OT. VI. I. 41.

Vulgaris Majo Junioque in *Samboriae Leopolisque* sepibus, nec non in silvis frond. virguletisque omnium regionum in promontoria usque.

Per cunctam Eur. usque ad Lapp. In Casano, Caucaso, Algerio.

Urapteryx Leach.

507. Sambuearia L. HS. III. 54; H. 28; OT. VI. 1. 85.

Hucusque 4. spec. *Samboriae et Leopoli* in florentium Tiliarum truncis. Extremis tribus annis Sambuc. similiter ac *Alniaria* nec ubi mihi obviae fuerunt.

Per Etr. usque ad Sueciam; in Casano, Uralo, Caschmiro, m. Himalaicis.

Epione Dup.

508. Apiciaria SV. HS. III. 49; H. 47. „*Lutea; striga*

anteriore angulata rufa, posteriore fusca obliqua in alae apicem excurrente, limbo cinereo rubescente.“ OT. VI. 1. 34. Solitarie disperse Julio et Aug. in coryletis coll. silvaticorum circa R. g., Stup., Cz., et L. Perraro etiam in *Samboriae* pomariis.

509. Vespertaria L. (*Parallelaria* SV.). HS. III. 49;

H. 43. 44. „*Flava, aurantiaco adspersa; striga anteriore rotundata rufa, posteriore fusca sinuata, limbo cinereo rufo.*“ OT. VI. 1. 31. Quotannis frequentior priore, sed universim non multa. Reperitur Junio — Aug. in silvis frond. virguletisque, praecipue in quercentis R. g., P., L. in R., Te., et Kor.

510. Advenaria Borkh. HS. III. 49; H. 45; OT. VI. 1.

36. *Vulgaris* in diversis silvis frond. Majo Junioque per cunctum terr. usque ad altiora promontoria. Degit socialiter in virguletis.

Apiciaria provenit in Eur. media, usque ad Sueciam; in Anglia, Casano, Uralo, prov. Or. — *Vespert.*: in Eur. media usque ad Sueciam; in Anglia; Casano, prov. Or. — *Adven.*: in Eur. media. in Casano, pr. Or., Uralo. (Rara).

Gaustoloma Lederer.

511. Flaviecaria SV. HS. III. 50; H. 40; OT. VI. 1.

30. „*Sulphurea; strigis, maculis 5 costalibus, pustulis post strigam posteriorem ciliisque versus apicem alarum anter. fuscis.*“ Reperitur Leopoli nonnullis annis fere copiose. Volitat Majo inter zizania sub hortorum sepibus pone collem W. z., in suburbio Łyczakoviensi et in Kisielka. Interdu in umbrosis zizaniorum abdita latet et ex his primo post solis occasum in aperta prodit, quae tunc socialiter prope humum pervagatur. In silvis circa Leopolim est Flav. rarissima; alibi in Halicia eam invenire mihi non contigit.

Secus in Hung., Ukraina, ad Sareptam. Rara.

Venilia Dup.

512. Macularia L. HS. III. 53; H. 135; OT. VI. 2. 234.
Quotannis communissime socialiterque Majo et Junio in silvarum
pratulis per omne terr. in promontoria usque. In silvigeru monte
Magóra inveni eam 22. Maji loco circiter 2600 p. v. elato.

Per Eur. usque ad Sueciam; secus in pr. Or.

Macaria Curt.

513. Notata L. HS. III. 51; H. 53. 316; OT. VI. 1. 10.
Vulgaris socialiterque Majo et Junio ubique locorum in silvaticis
nemoribusque circuli Samb. in montosa usque. In coll. silvis circa
Leopolim ubivis multa.

514. Alternata SV. HS. III. 51; H. 315; OT. VI. 1. 17.
Volitat cum priore, sed rara est in universum.

515. Liturata L. HS. III. 52; H. 54. 314; OT. VI. 1. 12.
Aliquot spec. Junio in coll. pinetis prope H. (comite 328) et Ja-
now (una cum: 1309 etc.). In silvaticis R. g. est Lit. rarissima,
etiamsi hic illic frequentes crescunt Pini et in confine pago Uher-
ce adest picetum diffusum.

Notata provenit in Eur. usque ad Lapp.; secus in pr. Or., Surinam. —
Alternata: in Germ., Gallia, pr. Or. — Liturata: in silvis acerosis usque ad
Sueciam; secus in prov. Or. et Transcauc., ad Lenkoran.

Hibernia Latr.

516. Aurantiaria Esp. Hüb. 184; HS. III. 60; OT.
VI. 1. 311. Quotannis solitarie in mixtis silvis frond. circa R. g.
et L. Sero autumno;

517. Defoliaria L. HS. III. 60; H. 182; OT. VI. 1.
315. Reperitur iisdem in locis et tempore ac prior; nonnullis
annis copiosa (1855 in R. g.), aliis deest (1859 circa L.). Quod
adtinet ad magnitudinem signaturasque variat Def. adeo, ut spe-
ciem mutare videatur. Feminas Def. et Aur. invenire hueusque
mihi non contigit.

518. Progemmaaria Hüb. 183; HS. III. 60; OT. VI.
1. 313. Quotanuis vulgaris circa R. g. et L. primo vere; so-
litatim et autumno. Feminae tam multae, quam mares.

519. Leucophearia. SV. HS. III. 60; H. 181. 195;
OT. VI. 1. 323. Quotannis copiosa ineunte vere (simil cum: 518,

523, 520, 601, 371, 223, 370, 1069 etc.) ubique locorum in silvis frond. circa *R. g.* et *L. Solitarie* et in pometis. Hucusque reperi *Leuc.* bis tantum in copula.

Aurantiaria provenit per Eur. usque ad Sueciam; in Casano. — *Defol.*: per cunctam Eur. usque ad Sueciam. — *Progem.* ubivis et *Leucoph.* hic illuc in Eur.

Anisopteryx Steph.

520. Aescularia SV. HS. III. 106; H. 189. 514; OT. VI. 1. 325. Quotaunis communissima iisdem ac prior locis et tempore. Ex quo tempore colligo reperi *Aesc.* semel tantum in copula in silvaticis *R. g.*

Per cunctam Europam usque ad Sueciam.

Phigalia Dup.

521. Pilosaria SV. HS. III. 101; H. 176. 594; OT. VI. 1. 240. Primo vere in pomariis silvisque frond. circa *R. g.* et *Leopolim.* Semper et ubique singulatim. In copula semel tantum unum par mihi obvium fuit.

Præcipue in Europa boreali; in Anglia, Suecia, Germania.

Biston Leach.

522. Hispidarius SV. HS. III. 101; OT. VI. 1. 247; Primis veris diebus singulatim et disperse in silvis frond., præcipue in iis Pop. tremulæ in pago *R. g.* Feminas frustra ad id tempus quaesivi.

523. Pomonarius Esp. Hüb. 180; HS. III. 100. f. 439; OT. VI. 1. 249. Singulariter in *Samboriae Leopolisque pomariis*; ceterum quotannis ad taedium copiose (mares et feminae) in diversis silvis frond. circa *R. g.* et *L.* Primo vere, solitarie in Majum usque. Insidet interiu truncis Alnorum, Populorum, Quercuum, Fagorum, Betularum etc. sub vesperum autem volitant mares gregatim secundum silvarum margines. In copula invenitur Pom. similiter ac Prog. frequentissime.

524. Hirtarius L. (*Congeneraria* Hüb. 174). HS. III. 102; OT. VI. 1. 236. Ab ineunte vere in Majum usque. Invenitur solitarie cum priore in pomariis *Samboriae et Leopolis*; vulgate autem in silvis. frond. præcipue alnetis et populetis circa *R. g.*, *L.*, et *Bræ. Minora* mascula exemplaria fusca (*Hirtaria* Hüb. fig. 175)

sunt rariora, veniuntque primum Majo in conspectum. Memoratu etiam est dignum, me mares com. varietatis semper cum minoribus feminis in copula invenisse. Anno 1859. Hirt. circa *Leopolim* nullibi conspexi; anno 1856. deerat in silvaticis R. g.

525. Stratarius Husgl. (*Prodromaria SV.*). HS. III. 102; H. 172; OT. VI. 1. 234. Hucusque reperi 4 exemplaria; unum marem *Samboriae* in pomario, duos mares in *Alni glut. truncis* in coll. silvaticis R. g. (simul cum 241 etc.). unam feminam denique in coll. alneto prope *Hołosko* (comitibus: 76, 378, 379, 520, 921, 1010, 1011, 575, 572, 601, 524, 523, 519, 518, 436, 437, 221). Aprili.

Hispid. invenitur in Germ. merid., Austria, Gallia. (*Rarus*). — Pomon.: in Gallia orientali, Silesia, Germania. — Hirt.: in Europa media et boreali; se-*cus* in Baskiria, Epheso. — Strat.: in Europa media.

Amphidasy Tr.

526. Betularia L. HS. III. 102; H. 173; OT. VI. 1. 230. Provenit quotannis solitariae *Samboriae* (vide 146) *Leopolique* in pomariis. Unum exemplar reperi praeterea in trunco *Tiliae* promontoriorum prope pagum *Strzelbica*. Junio et Julio.

In Europa media et boreali, in Uralo.

Boarmia Tr.

527. Cinetaria SV. HS. III. 80; H. 166; OT. VI. 1. 188. Aprili Majoque frequentissima ubique locorum in ditionum coll. promontoriorumque pomariis, arbustis, silvisque frond. et acerosis.

528. Abietaria L. HS. III. 79; H. 160; OT. VI. 1. 204. Unicum exemplar, quod in collectione habeo, reperi in silva picea pagi *Uherce* prope R. g.; Majo, una cum: 993, 368. etc.

529. Repandata L. HS. III. 81; H. 161, 321, 393. OT. VI. 1. 208. Singulariter Majo et Junio, frequenter vero Julio in pomariis et silvis frond. acerosisque circa R. g., L., et J.

530. Roboraria SV. HS. III. 81; H. 169; OT. VI. 1. 198. Omnibus annis unum marem *Leopoli* (socia 295), unam feminam *Samboriae* (simul cum 356 etc.). In pomariorum sepiminibus Junio. Ambo exemplaria *Haliciensia* sunt minora et fuscius colorata quam illa, quae *Vindobonae* in variis vidi collectionibus.

531. Consortaria Fabr. HS. III. 80; H. 168, 152; OT. VI. 1. 200. Vulgaris Majo et Junio in pomariis, arbustis et silvaticis circa R. g., L., et J.

532. Glabraria SV. HS. III. 81; H. 162, 339, 348;
OT. VI. 1. 225. Hucusque semel exemplaria duo 10. Augusti
percussione herbarum in montano fageto Bubniscze, loco circiter
2800 p. v. elato. Praeter Glabr. reperi in his desertis per aliquas
horas vix pluria spec. Heparanae, Tristelli, Fissellae et Spiniellae.

533. Crepuscularia SV. HS. III. 82; H. 158; HS. 389;
OT. VI. 1. 190. Vulgatissime Aprili et Majo ubique locorum in
pometis variisque silvis cuncti terr. in promontoria usque.

534. Consonaria Hüb. HS. III. 82; H. 157. Exemplar
primum in fageto Czaple, secundum (sociis 241 etc.) in silvaticis
R. g., tertium circa Brz. in Pop. tremulae trunc. Aprili.

535. Extersaria Hüb. 159. HS III. 83; OT. VI. 1. 216.
Frequens Majo — Julio in pomariis, arbustis silvisque frond. a
planicie usque ad promontoria 2300 ad 3000 p. v. (Kbg.) elata
(Urycz, Bubniscze etc.).

536. Punctulata SV. HS. III. 83; H. 317; OT. VI. 1. 180.
Provenit Majo solitarie in hortis, copiose autem ubique locorum
in silvis diversis praecipue mixtis per terr. cunctum usque ad su-
periores Fagi regiones (Huśla).

537. Viduata SV. HS. III. 81; H. 165, 364. OT. VI.
1. 223. Hucusque reperi semel 13. Julii in coll. querceto Kor.
unicum marem, qui ibidem abditus latebat in Quercus ramis.

Cinctaria provenit ubivis in Europae silvis acerosis, in Uralo, Baskiria. —
Abiet.: ad Vindob., in Franconia, ad Rhenum, etc.; securis in Casano. — Repand.:
in Germ. alibi in Europa, in Uralo, pr. Or. — Robor.: hinc inde in Eur.;
in Austria, in Uralo. — Consort.: in Austria alibi in Eur. — Glabr.: in Bo-
hemia, Germ., Styria, Helvetia, Gallia occid.; in Casano. — Crepusc.: in Germ.,
Gallia, pr. Or. — Conson.: in Germ., Gallia. — Exters.: in Germ., Gallia, Ca-
sano, Uralo. — Punctulata: in cuncta Eur. usque ad Lapp.; in pr. Or. — Viduata:
in Germ., Austria, Gallia bor.

Tephronia Hüb.

538. Sepiaria Hufgl. (Cineraria SV). HS. III. 93; H.
171; OT. VI. 1. 227. Singulum specimen obsoletum, quod habeo,
reperi Leopoli 28. Julii in ambulacrorum Pop. tremula.

Secus Vindobonae, in Silesia alibi in Europa.

Gnophos Tr.

539. Furvata SV. HS. III. 73; H. 144; OT. VI. 1. 161.
Unicum exemplar (sociis: 295, 530, 383, 326, 336, 887, 255,
317, 112 etc.) Leopoli in pomarii sepagine. Junio.

540. Obscurata S V. HS. III. 74; H. 146; OT. VI. 1. 168.
Hucusque semel in quereeo fruticeto collinorum P. exemplar unicum Junio (simil cum: 99, 54 etc.).

541. Dilucidaria S V. HS. III. 73; H. 143; OT. VI. 1. 173.
Volavit frequenter 26. Julii 1858 in montis *Hušla* (4190 p. v. *Lob elati*) cacumine alpino *Pikuj* praecipue per cespites V. vitis ideae (sociis: 556, 606, 618, 664, 665, 808, 973, 617, 710 etc.).

542. Operaria Hüb. 359. HS. III. 73. Duos mares (sociis 328) 9. Junii in querceti *Kor.* excisis percussione herbarum ibidem in siccaneis crescentium.

Furvata provenit secus in Alpibus, in Austria, Ratisbonae. — *Obscurata*: in Austria, Styria, etc — *Dilucid.*: in Alpibus, Montibus metalliferis, montosis Austriac et Styriae, in Helvetia, Palatinatu superiore, Uralo. — *Operaria*: in Gallia meridionali, Scotia.

Fidonia Tr.

543. Roraria Esp. (*Spartiaria* Hüb 116). „*Alis fulvis, atomis margineque ex fusco nigris.*“ HS. III. 89; OT. VI. 1. 270.
Per omnes annos reperi semel 23. Junii in coll. querceto P. (sociis: 15, 42, 159, 654, 1291 etc.) specimen unicum, quod loco aperto per flores sole aestuante vagabatur.

Secus ad Rhenum, Ratisb., alibique. In Casano.

Ematurga Lederer.

544. Atomaria L. HS. III. 91; H. 136; HS. 322, 323,
OT. VI. 1. 286. Quotannis copiosissime ubique in pratis, nemoribus, herbosis, diversisque silvis usque ad promontoria humilioresque montes. Majo — Augusto.

Per Eur. usque ad Lapp. In Iberia, Casano, Constantinopoli.

Bupalus Leach.

545. Pinarius L. HS. III. 90; H. 119, 120; 469. 470.
OT. VI. 1. 274. Sat multus Junio et Julio in coll. silvis pineis prope Hołosko et Janow. Vagatur horis aatemeridianis supra summas arbores.

In Europae silvis acerosis usque ad Lapp.

Selidosema Hüb.

546. Plumaria HS. III. 86; H. 124; OT. VI. 1. 306;
Semel 30. Junii in summo pratulo intersilvatico collinorum Świnia

in *H.* specimen unicum (sociis: 238, 324, 125, 174, 169, 210, 182, 192, 424, 562, 566, 627, 624, 1098 etc.). Latitavit prope humum inter herbas in loco frequentibus Quercubus fruticosis obsito.

Secus in Suecia, Gallia merid., Hung., Germ., pr. Or., Uralo, Bask.

Thamnonomma Lederer.

547. Wawaria *L.* HS. III. 88; *H.* 55; OT. VI. 1. 302. Quotannis copiosissime Aprilli — Julio in pomariis atque silvaticis per omne terr. a pl. usque ad superiores Fagi regiones.

548. Brunneata *Thunb.* (*Pinetaria*, *H.* 130; *Quinquaria* *Hab.* 516, 517.). HS. III. 89; OT. VI. 1. 265. Vagabatur solitarie 12. Junii per vaccineta in pineti *R.* excisis (comitibus: 87, 719. etc.). Unum exemplar obvium mibi fuit praeterea 30. Junii (sociis 238, 690, 1098 etc.) in coll. querceo fruticeto *Mostki*, ubi *Fragariae* insidebat.

Wawaria provenit per Eur. usque ad Sueciam. In Casano et pr. Or. — *Brunneata*: in Helvetia, Vogeso, Germ. bor., Suevia, Saxonie, Casano, ad Ratisb.

Phasiane Dup.

549. Glarearia *SV.* HS. III. 90; *H.* 131; OT. VI. 1. 289. Volitavit frequenter 12. Junii et 3. Julii prope J. in siccis floridisque declivibus fruticosorum collinorum Szyp, alibique in apri- cis ad pinetorum margines (vide 1309 et 998.).

550. Clathrata *L.* HS. III. 90. *H.* 132; OT. VI. 1. 290. Reperitur communissime Majo — Julio ubique locorum in pratis apertis, fructectis et silvis usque ad promontoria.

551. Petraria *Esp.* HS. III. 58; *H.* 133; OT. VI. 1. 149. Circa *R. g.* inveni per sex annos 9. et 16. Junii singula spec. (sociis: 220, 1014 etc.) inter frutices excisorum betuleti *Lwowiec*. Circa Leopolim reperitur Petr. frequenter altera parte Maji Junioque in herbido fruticeto nemoreque mixto ad marginem betuleti *K.* (comitibus: 113, 205, 304, 773, 1073, 1210, 1271 etc.).

Glar. invenitur regionatim in Europa; in pr. Or. — *Clath.*: in cuncta Europa*, in pr. Or. et Transcauc., ad Lenkoran. — *Petraria*: in Germ. bor., ad Rhenum, Vindobonae, in Italia; in Uralo.

Eubolia B.

552. Arenacearia *SV.* HS. III. 86; *H.* 114; OT. VI. 1. 134. Hucusque semel 3. Julii exemplar unicum percussione Pici

silv. prope J. in arenoso colle *Próchnik*, 1110 p. v. (Kbg.) elato (vide 998).

Secus ad Vindob., in Gallia orientali. In prov. Or.

Scodiona B.

553. Favillaearia Hüb. 139; HS. III. 65. fig. 47; OT. VI. 1. 297. Semel unum par pulcherrimum initio Julii in coll. quercento R. g. (sociis: 71, 83, 92, 93, 179, 152, 187, 319, 430, 441, 443, 452, 461, 493, 504, 557, 565, 581, 598, 669, 672, 677, 717, 747, 749, 751, 764, 766, 774, 783, 827, 828, 842, 869, 874, 947, 1001, 1016, 1057, 1061, 1078, 1079, 1126, 1149, 1174, 1196, 1197, 1209, 1218, 1204, 1224, 1228, 1262, 1260, 1276, 1281, 1294, 1334.)

Secus in Gallia, Hispania, Brunsviga, Hungaria, Austria.

Aspilates Tr.

554. Gilvaria SV. HS. III. 94; H. 201, 534, 535; OT. VI. 1. 132. Unicum exemplar, quod in collectione habeo, reperi 3. Julii in calcariorum collinorum Szyp floridis declivibus (vide 998).

555. Strigillaria Hüb. 125, 540, 541; HS. III. 85; OT. VI. 1. 348. Semel unum exemplar masculum (comitibus 434, 471, 529, 595, 287, 1261, 1239 etc.) 2. Julii percussione Quercus in coll. silva R. g.

Gilv. habitat secus in Austria, Germ., prov. Or., Bask. — Strigill.: in Austria, Germ., Uralo.

Gleogene B.

556. Tinctoria Hüb. (*Lutearia* Tr. Fabr.). „*Alis omnibus luteis immaculatis.*” HS. III. 62. fig. 361; H. 121; OT. VI. 2. 250. Hucusque semel 26. Julii unicum marem in montis Hušla (4190 p. v. Łob. elati) alpe *Pikuj*, ubi in *Saxifraga aizoone latitavit*. Una cum *Tinctaria* legi hic et: 2, 4, 5, 7, 10, 73 — 78½, 448, 541, 618, 606, 617, 664, 665, 710, 808, 973, ceterum vide: 17, 974, 709, 711.)

Secus in Hispania, Italia, Alpibusque Valesiacis.

Scoria Steph.

557. Dealbata L. HS. III. 61; H. 214. 528 — 531. OT. VI. 2. 259. Quotannis copiosa a fine Maji ad Julianum ubivis

in aridis pratulis inter — et subsilvaticis, nemoribus, floridisque silvarum frond. marginibus a pl. usque ad montosa.

In Europa usque ad Sueciam. In Casano.

L y t h r i a Hüb.

558. Purpuraria L. HS. III. 107; H. 107. 199; OT. VI.

1. 127. Vagabatur sat multa et in pulchris varietatibus 3. Julii prope Janow in sterilibus apertisque declivibus collinorum sabulosorum P. P., speciatim vero in talibus locis, quae *Filix mas* et *Pteris aquilina* convestiverunt. In his plantis viget hic *Purp.* socialiter, ad quas etiam cito, si perterrefacta est et avolavit affugit. Quoad consocios vide 998. Alibi in Halicia *Purp.* non inveni.

Per Europam usque ad Sueciam. In prov. Orenb.

O r t h o l i t h a Hüb.

559. Plumbaria Fabr. (*Palumbaria SV.*). HS. III. 164;

H. 221; OT. VI. 1. 146. Vulgate *Majo* et *Junio* in diversis silvis circa R. g., *Stup.*, *Cz.*, et *J.* Numerosissimam observari Pl. anno 1859 prope *H.* in coll. piceto *Sucińska* nec non in vicinis fruticetis querceis collinorum *Zapole* et *Mostki*. Exemplaria silvas acerosas inhabitantia sunt colore ardenter.

560. Zonata Hufgl. (*Mensuraria SV.*). HS. III. 165; *H.*

193; OT. VI. 2. 78. Copiose Julio et Aug. per cunctum terr. usque ad ditiones montanas (*Wołcze*) ubivis in pascuis, pratis, prosilviis, floridisque silvarum marginibus.

561. Angulata Hufgl. (*Moeniaria SV.*). HS. III. 165;

H. 298; OT. VI. 2. 173. Hucusque semel exemplar unicum in herbido pratulo subsilvatico penes R. g. 23. Junii (comitibus: 21, 27, 64, 91, 103, 105, 143, 152, 153, 157, 187, 188, 197, 199, 320, 426, 429, 341, 434, 441, 583, 485, 491-493, 505, 535, 559, 583, 609, 612, 621, 623, 669, 677, 700, 717, 718, 729, 733, 734, 747, 749, 750, 755, 763, 764, 766, 767, 771, 773, 774, 777, 778, 780, 783, 786, 800, 802, 803, 817, 828, 816, 835, 836, 843, 868, 875, 873, 888, 894-896, 900, 902, 947, 1012, 1025, 1038, 1052, 1113, 1131, 1132, 1166, 1203, 1206, 1222, 1279, 1288, 1296, ceterum vide 654, 356.).

562. Bipunctaria SV. HS. III. 167; *H.* 276; OT. VI.

2. 87. Unum par 30. Junii percussione *Quercus* in silvaticis *Hołosko* prope arenoso - rupestrem collem, qui vocatur *Góra zjawienia*. Quoad comites vide 238 et 690.

Plumb. habitat in Austria, Germ. alibi in Eur. Sueciae deesse videtur. — Zonata: in Eur. cuncta usque ad Succiām. In Casano, pr. Or. — Angulata: in univ. sere Eur.; in Casano, pr. Or. — Bipunct.: ubivis in Eur. In Casano; pr. Or.

Mesotype Hüb.

563. Virgata Hufgl. (*Lineolata SV.*). HS. III. 163; H. 311; OT. VI. 1. 144. Unicum exemplar, quod in collectione habeo, reperi (sociis: 998 etc.) 3. Julii in floridis declivibus collinorum Szyp prope J.

In plur. Eur. reg. usque ad Succiām; ad Ratisb. In Casano, pr. Or., Uralo.

M in o a B.

564. Fuseata Hufgl. (*Euphorbiata SV.*). HS. III. 109; H. 78; OT. VI. 2. 249. Vulgaris Majo et Junio per omne terr. usque ad promontoria ubivis in collucatis silvaticis eorumque pratalis aridioribus aut floridis marginibus.

In Europa media; Sueciae deest, in Casano et prov. Or. adest.

O d e z i a B.

565. Chaerophyllata L. HS. III. 183; H. 196; OT. VI. 2. 251. Reperitur Junio et Julio solitarie disperseque in silvaticis R. g., fruticeto coll. M. k. i b. d. prope D. (vide 1195), in promontoriis Spas silvaticisque montis Magóra (comitibus 662 etc.). Volitat horis antemeridianis.

566. Tibialata Hüb. 210. 211. „*Alis atris, anter. fascia albida; poster. immaculatis.*” HS. III. 109; OT. VI. 2. 301. Hucusque singula spec. prope H. (30. Junii sociis: 238, 690 etc.) in coll. campis sterilibus circa lapicidinas N. P. et prope Janow (12. Junii, simul cum 1309 etc.) in coll. querceto P. R.

Chaeroph. incolit Europam usque ad Succiām, secus Casanum, prov. Or. et Transcauc., nec non reg. ad Lenkoran. — Tibialata invenitur praeter Haliciam in Hung., Rossia merid.; in Uralo. An in Austria? Rara.

S i o n a Dup.

566. Decussata SV. H. 213; HS. III. 183; OT. VI. 2. 260. Exemplar unicum 3. Julii (vide 998) in graminosis collinorum Szyp declivibus prope J.

Secus in meridionaliori Europa; in Hung., ad Vindob.

Lithostegē Hüb.

567. Griseata SV. HS. III. 183; H. 216; OT. VI. 2. 253. Semel 26. Maji exemplar unum (comitibus: 993 etc.) in siccis et sterilibus pascuis collinis silvam R. g. inter et pagum Szady.

568. Farinata Hufgl. (*Niveata Scop.*). HS. III. 83; H. 217; OT. VI. 2. 254. Hucusque exemplaria duo prope *H.* in herbido agrorum confinio ad marginem collimi querceti Kor. initio Junii (vide 353).

Griseata invenitur ad Ratisb., in Austria, Hung., Gallia merid., Casano. — *Niveata* in Suecia, Germ. bor., Austria, Gallia merid., Algerio, Casano, pr. Or.

Anaitis B.

569. Praeformata Hüb. 532. 533. (*Cassiata Tr. VI. 1. 85.*) HS. III. 164. Medio Junio exemplar unicum inter coryleta in mixta silva *R. g.* (vide 1014).

570. Plagiata L. HS. III. 164; H. 220; OT VI. 2. 82. Quotannis vulgaris Majo-Julio in hortis, pratis apertis silvaticisque per omne terr. usque ad promontoria.

Praef. inhabitat Alpes, Eur. merid., Silesiam. — *Plagiata* Europam usque ad Sueciam, secus Casanum, Asiam minorem.

Lobophora Curt.

571. Sexalata Brkh. (*Sexalisata Hüb. 228*). HS. III. 180; OT. VI. 2. 40. Semel duas feminas et unum marem 30. Maji percusione fruticum in prosilvio campestris betuleti Zubrze (vide 1275.).

572. Halterata Hufgl. (*Hexapterata SV*). HS. III. 180. fig. 245; H. 232; OT. VI. 2. 38. Apparet vere quotaunis copiose in coll. silvis frond. praesertim fagetis aut Fago intermixtis circa *R. g.* et *Leopolim*.

573. Viretata Hüb. 230. HS. III. 179; OT. VI. 2. 51. Unicum exemplar, quod possideo, reperi Aprili 1855 (sociis: 241 etc.) in trunco *Alni glut.* in coll. silva *R. g.*, plura millaria a Carpathis remota.

574. Sertata Hüb. 489. 490. (*Appendicularia B.*). HS. III. 178; OT. VI. 2. 90. Hucusque inveni semel tantum 26. Sept. 1854 media in silva *R. g.* specimina duo, quae in Pop. tremulae pandebant truncis. Eodem die legi praeterea species: 517, 401, 362, 366, 372, 375, 397, 399, 242, 73, 76, 78, 13.

575. Lobulata Hüb. 362; HS. III. 179; OT. VI. 2. 29. Quotannis vulgatissime, interdum innumerose, Martio-Majo in coll. silvaticis mixtis circa *R. g.*, Cz., et *L.*

Sexalata invenitur hic illuc in Eur. usque ad Casanum; ad Augustam Vincelic.; (rara). — *Hexapt.*: in Austria, Germ., alibique ad Sueciam usque secus in

Casano et prov. Or. — *Viretata*: in montosis Austriae, in Alpibus, ad Ratisbonam; (rara). — *Sertata*: in Germ., Alpibus Carniolae et Styriae. Gallia; (rara). — *Lobulata* in Tyrolis Styriaeque Alpibus, ad Gunzenhausen, in Casano.

Chimatobia Steph.

576. Brumata L. HS. III. 177. fig. 352; H. 191. 415. 509; OT. VI. 2. 23. Plures mares extremo Octobri initoque Nov. in silvaticis R. g.

577. Boreata Hüb. 413. 414; HS. III. 177. fig. 353; OT. VI. 2. 26. Apparet medio Octobri. In mixtis silvis R. g. reperitur Bor. raro, circa Leopolim autem frequenter in campestri betuleto Zubrze (vide 367), ubi unum par etiam in copula invenire mihi contigit.

Brumata provenit in Eur. usque ad Sueciam et Casanum. — *Boreata*: in Silesia, Germ. bor, alibique ad Sueciam usque.

Eucosmia Steph.

578. Undulata L. HS. III. 144; H. 262. 436; OT. VI. 2. 53. Quotaonis solitarie disperseque Junio et Julio in quercetis aut mixtarum silvarum Querebus circa R. g. et L.

579. Certata Hüb. (*Cervinata* Hüb. 266). HS. III. 143; OT. VI. 2. 72. Semel 2. Maji exemplar unicum Leopoli in pomario.

Undulata invenitur per Eur. usque ad Sueciam, secus in finalibus Russico — Asiaticis provinciis, in America et Australia (Delaware, Maryland, Port Jakson, New-Sidney). — *Certata*: in Austria, Germ., ad Ratisbonam.

Triphosa Steph.

580. Dubitata L. HS. III. 142; H. 265; OT. VI. 2. 69. Quotaonis solitarie Aprili-Junio *Samberiae Leopolique* in pomariorum segmentis. Exemplaria sub finem Maji et Junio lecta sunt obsoleta laceraque.

Indigena cunctae Eur. in Sueciam usque.

Scotosia Steph.

581. Vetulata S V. HS. III. 143; H. 263; OT. VI. 2. 54. Volat in quercetis, nemoribus, dumosisque per omne terr. usque ad humiliores montes. Ubique numerose; extremo Junio et Julio. In pomariis quoque reperitur.

582. Transversata Husgl. (*Rhamnata* SV.). HS. III. 145;

H. 271. 400; OT. VI. 2. 67. Hucusque semel exemplar unicum (sociis: 219 etc.) 13. Maji 1854 in coll. silvaticis Radl. górne in Ribe grossularia.

Ambae species inveniuntur per Europam usque ad Sueciam. — Rhamnata adest secus in Uralo.

L y g r i s Hüb.

583. Ribesaria B. (*Prunata L.*). HS. III. 169; H. 304; OT. VI. 2. 194. Quotannis vulgaris in hortis silvaticisque per omne terr. a pl. usque ad valles montanas (*Wołcze*) superioresque Fagi regiones (*Hušla*.).

584. Populata SV. HS. III. 172; H. 300; OT. VI. 2. 165. Vagatur frequenter (cum priore) in *Samboriae Leopolisque* hortis et floralibus, e quibus persaepe et in domicilia iavolare solet. Praeterea inveni eam solitarie in frond. silvis *R. g.*, *H.*, nec non ad marginem pineti *R.* (vide 998). Junio, Julio.

Ribes. provenit per Eur. usque ad Sueciam et Casanum. — Pop.: usque ad Lapponiam, in Casano et provincia Orenburg.

C i d a r i a Tr.

585. Pyraliata SV. HS. III. 172; H. 302; OT. VI. 2. 182. Ad marginem pineti *R.* reperi 3. Julii (cum priore) exemplaria tria, quae jam obscura luce ibidem volitaverunt. Provenit praeterea *Leopoli* in pomariis, sed rarer est priore.

586. Fulvata Forster. HS. III. 171. H. 297; OT. VI. 2. 177. Unicum exemplar, quod in collectione habeo, inveni 2. Junii (sociis: 205, 304, 113, etc.) in juvenco piceto ad viam inter *L.* et *Wi.*

587. Ocellata L. HS. III. 147; H. 252; OT. VI. 2. 153. Satis frequens sed solitam per cuncti terr. silvaticae a pl. usque ad humiliores montes. Majo Junioque. Inhabitat praeterea et pometa.

588. Bicolorata Hufgl. (*Rubiginata SV.*). HS. III. 155; H. 250. OT. VI. 2. 223. Hucusque inveni pluria specimina in coll. quercetis *Kor.* et *R. g.*, porro in montani pagi *Wołcze* floralibus, ubi post solem occasum vagabantur. 30. Junii — 24. Julii.

589. Juniperata L. HS. III. 173; H. 294; OT. VI. 1. 336. Aliquot specimina 1. Junii in pratulis intersilvaticis prope *Hołosko* (vide 353) et 24. Julii in pomario et pratis foenariis montium circa *W.* (vide 6.).

590. Siterata Hufgl. (*Psittacata SV.*). HS. III. 170; H. 227; OT. VI. 2. 94. Singula specimina Aprili *Samboriae* et *Leopoli* in pomariorum septis.

591. Truncata Hufgl. (*Russata SV.*). HS. III. 172; H. 305, 445; OT. VI. 2. 189. Pluria exemplaria (simul cum: 239, 918 etc.) medio Sept. inter virgulta prosilvii in campestri betuleto *Zubrze*.

592. Olivata SV. HS. III. 148; H. 307; OT. VI. 2. 157. Unicum exemplar, quod possideo, inveni 3. Julii prope J. ad marginem quercreti *P. R.* adversus calcaria collina *Szyp.* Quoad comites vide 998.

593. Peetinitaria Fuessly. (*Maria SV.*). HS. III. 166; H. 292; OT. VI. 2. 159. *Vulgaris Junio et Julio* ubique in silvis nemoribusque per omne terr. usque ad promontoria, circiter 2500 p. v. elata.

594. Brunnearia de Vill. (*Vespertaria SV.*). HS. III. 167; H. 226; OT. VI. 1. 137. Unicum specimen 15. Sept. in prosilvio betuleti *Zubrze* (una cum: 239, 591, 594, 744, 837, 916, 917, 1143 etc.).

595. Silvata SV. HS. III. 110; H. 231; OT. VI. 2. 15. Alterum exemplar (simul cum 1261. etc.) 2. Julii in coryleto silvae *R. g.* alterum 6. Junii in saltu fruticoso silvae mixtae *Zapust* non procul a munimento in *Stupnica* (una cum: 424, 426, 428, 429, 431, 446, 467; 468, 471, 491, 493, 650, 669, 683, 717, 803, 816, 1028, 1045, 1047, 1054.).

596. Fluctuata L. HS. III. 154; H. 249; OT. VI. 2. 219. Frequentissime a Majo in auctumnnum usque ubique locorum in pomariis, floralibus et silvis per omne terr. in promontoria usque.

597. Montanata SV. HS. III. 152; H. 248; OT. VI. 2. 201. *Vulgaris Junio* in silvis frond., nemoribus et fruticetis per cunctum territorium humilius. 26. Julii 1858 volitavit M. frequenter (sociis: 17 etc.) in monte *Hušla* sub ipso fere *Fagi* termino (3550 p. v. *Lob.*), quem tamen non transgressa est.

598. Ligustrata S V. HS. III. 147; H. 282; OT. VI. 2. 151. Sat frequens sed dispersa Junio et Julio in pomariis, fruticetis et silvis per cunctum terr. in humiliores montes usque.

599. Ferrugata L. HS. III. 149; H. 285, 460; OT. VI.

2. 148. Copiose a primo vere in autumnum usque in hortis, pometis frondosisque silvis per territorium cunctum in ditiones montanas usque.

599^{1/2}. Spadicearia SV. HS. III. 149; H. 460. Hucusque tria specimina; primum 22. Maji (sociis: 795 etc.) in silvaticis montis Magóra, tum 12. Junii (simul cum 1309 etc.) prope Janow in coll. querecto P. R.

600. Suffumata SV. HS. III. 169; H. 306; OT. VI. 2. 192. Apparet Martio reperiturque in Junium usque (exempl. obsoletis) in coll. silvaticis circa R. g., et L. Una femina obvia mihi fuit (sociis 795 etc.) 22. Maji in silvaticis in superiore parte montis Magóra. Infrequens.

601. Quadrifasciaria Hüb. 284; HS. III. 148; OT. VI. 2. 146. Vulgaris Aprili et Majo in hortorum sepimentis silvisque frond. circa R. g., et L.

602. Propugnata SV. HS. III. 147; H. 286; OT. VI. 2. 141. Aliquot exemplaria Junio et Julio Samboriae in pomariorum sepibus et in querecto R. g.

603. Dilutata SV. HS. III. 160; H. 188; OT. VI. 2. 26. Reperitur frequenter Oct. initioque Nov. in campestri betuleto Z. alibique in silvis circa L. In coll. silvaticis R. g. obvium mihi fuit annis 1852 ad 1858 exemplar unicum.

604. Caesiata SV. HS. III. 161; H. 275; OT. VI. 2. 89. Hucusque exemplar unicum 26. Julii (comitibus: 17 etc.) in montis Hušla prato intersilvatico in superioribus Fagi regionibus.

605. Nebulata Tr. HS. III. 161. fig. 370. 371; OT. VI. 2. 164. In mixtis silvis frond. promontorium Spas exemplar unicum sub finem Junii.

606. Rupestrata SV. HS. III. 156. fig. 192; OT. VI. 2. 30. Duo exemplaria, quae in collectione habeo, reperi in Diantho barbato et Scorzonerá rosea 26. Julii (simul cum: 541, 617, 618, 556 etc.) in summo cacumine alpis Píkuj, (4190 p. v. Łob.).

607. Pieata Hüb. 435; HS. III. 152; H. 435; OT. VI. 2. 193. Quotannis solitarie Junio Julioque in coll. querectis R. g. et P. Circa Leopolim eam anno 1859 non inveni.

608. Galiata SV. HS. III. 150; OT. VI. 2. 155. H. 272. Exemplaria duo sub finem Maji inter zizania hortorum Leopolis (una cum Flavicaria, ceteram vide 260.).

608. Cucullata Hufgl. (*Sinuata SV.*). HS. III. 150; H. 288; OT. VI. 2. 227. Hucusque semel exemplar unicum 16. Junii in *Samb.* pomario (sociis: 813, 185, 127, 128, 322, 584, 647, 976 etc.).

609. Albicillata L. HS. III. 154; H. 76; OT. VI. 2. 228. Reperitur Junio in pomariis silvisque coll. circa R. g., L. et J.

610. Procellata SV. HS. III. 155. H. 251; OT. VI. 2. 218. Semel exemplar unum 26. Maji in coll. querceto R. g. (vide 993).

611. Luetuata SV. HS. III. 156; H. 253; HS. 321; OT. VI. 2. 214. Semel spec. unicum 30. Junii sociis (460 etc.) inter frutices in coll. querceti P. excisis.

612. Affinitaria Wood. HS. III. 157; fig. 319, 271, 272. Reperitur sub finem Maji initioque Junii quotannis vulgate in mixtis silvis coll. ditionis R. g., volitat autem per spatium parvum talemque locum, ubi variae arbores silvaticae cum diversis fructibus promiscue crescunt, veramque farraginem vix penetrabilem singunt. Monendum quoque, Aff. hic plerumque prope humum vagari, in umbrosis vigere rareque sua sponte in aperta prodire. Quoad consocios vide 327, 234, 993, 1086, 863, 1300, 1022, 425^{1/2}, 220, 1014.

613. Tristata L. HS. III. 156; H. 254. 260; OT. VI. 2. 210. Frequentissime Majo, Junio et Aug. in silvaticis et fruticosis per omne terr. usque ad montes elatiores (*Wołcze*).

614. Alehemillata L. HS. III. 151; H. 261. 370; OT. VI. 2. 203. Communissime tota aestate totoque fere auctumno per cunctum terr. humilius. Nescio locum, ubi non inveniatur.

615. Rivata Hüb. 409. HS. III. 151; OT. VI. 2. 212. Hucusque semel 3. Junii exemplaria duo (sociis 1216 etc.) in virginalto campestris betuleti *Zubrza*.

616. Rivulata SV. HS. III. 157; fig. 289; H. 259; OT. VI. 2. 42. Frequens Julio et Aug. in pomariis, et silvaticis coll. circa R. g., M., D., et L.; preaterea solitarie in montibus Mag. et W. R.

617. Blandiata SV. HS. III. 153; H. 258; OT. VI. 2. 43. Sub finem Julii 1858 inveni Bl. aliquot exemplaribus in foenariis pratis Z. p. et Kam. mont. vallium circa *Wołcze* (sociis 6 etc.), frequentem autem (simul cum 556 etc.) in declivibus alpis *Pikuj* (4190 p. v. Łob.) in *Thymo serp.*, *Prunella vulg.*, *Diantha barbata* etc.

618. Minorata Tr. (*Ericetata Dale.*). OT. VI. 2. 143; HS. III. 153. fig. 118. Volitavit frequenter 26. Julii 1858 (cum priore, 556 etc.) per flores *Prunellae vulg.*, *Thymi serp.*, *Saxifragae aizoonis* etc. in montis *Hušla* alpe *Pikuj*.

619. Albulata SV. HS. III. 157; H. 257; OT. VI. 2. 13. Frequens Majo et Junio in pratis subsilvestribus, nemoribus, silvis dumosisque circa S., R. g., *Stup.*, *D.*, *L.*, etc. In montosis nullibi mihi obvia fuit.

620. Decolorata Hüb. 243; HS. III. 157; OT. VI. 2. 13. Quotannis vulgaris iisdem ac prior locis extremo Majo et Junio.

621. Luteata SV. HS. III. 110; H. 103; OT. VI. 2. 16. Quotannis communissime Junio in diversis silvis frond. nemoribusque per omne terr. in humiliores montes usque.

622. Candidata SV. HS. III. 110; H. 101; OT. VI. 2. 31. Volitat frequenter circa L. extremo Majo in omnibus silvis circumjacentibus. In silvaticis R. g. reperi per sex annos semel exemplar unicum.

623. Obliterata Hufgl. (*Heparata SV.*). HS. III. 111; H. 58; OT. VI. 1. 264. Quotannis communissime in variis silvis, salicetis nemoribusque silvescentis Alni glut. per cunctum terr. usque ad inferiores Fagi regiones. Extremo Majo, totoque Junio

624. Scripturaria SV. HS. III. 143; H. 274; OT. VI. 2. 47. Hucusque semel exemplar unicum (sociis; 238, 690 etc.) percussione Quercus 30. Junii inter fruticeta coll. Zapole prope H.

625. Bilineata L. HS. III. 143; H. 264; OT. VI. 2. 56. Quotannis vulgaris Majo-Sept. in silvaticis eorumque pratalis ubique locorum usque ad promontoria. Legi eam circa Spas, Urycz, R. g., M., J., et L.

626. Riguata Hüb. 358; HS. III. 143; OT. VI. 2. 52. Semel exemplar singulum 29. Junii in coll. pratulo subsilvatico inter L. et Wi. (simil cum 151 etc.).

627. Silaceata Hüb. 477. 478. 303; HS. III. 170; OT. VI. 2. 197. Singula specimina in *Samboriae* pomario et in silvaticis circa D., *Stup.*, H., et J. Junio. Quoad consocios vide 185, 233, 1195, 863, 238, 690, 1309.

628. Corylata Thbg. (*Ruptata Hüb. 295.*), HS. III. 172;

OT. VI. 2. 200. Sigulatim in coll. silvaticis circa R. g. et L. sub finem Maji Junioque.

629. Badiata SV. HS. III. 145; H. 291; OT. VI. 2. 80.
Hucusque reperi exempl. duo *Samboriae* et *Leopoli* in pomario-
rum sepiminibus Aprili.

629. Berberata SV. HS. III. 146; OT. VI. 2. 185; H
287. Hucusque spec. duo Julio *Leopoli* in horto botanico (vide 288).

630. Rubidata SV. HS. III. 146; H. 2. 90. OT. VI. 2.
188. Hucusque semel 19. Junii exempl. duo (sociis: 158 etc.) in
coll. querceti R. g. herbosis virguletisque.

631. Chenopodiata SV. HS. III. 165; H. 299; OT. VI.
2. 167. Quotannis vulgaris Julio in floralibus et pometis usque ad
regiones montanas. Adest *Samboriae Leopoli*, circa M., D., W., etc.
Involat saepe in domicilia.

632. Tersata SV. HS. III. 174; H. 268. 448; OT. VI.
2. 62. Hucusque semel 25. Junii in coll. querceto R. g. unicum
exemplar obsoletum (sociis: 58, 91, 96, 143, 187, 188, 194, 314,
320, 390, 391, 426, 428, 429, 431, 434, 446, 472, 491 — 493,
581, 623, 639, 643, 677, 689, 700, 703, 708, 717, 718, 720, 727,
729, 733, 734, 740, 747, 749, 750, 755, 763, 764, 767, 771, 774,
777, 778, 780, 781, 783, 786, 797, 798, 800 — 803, 816, 817,
823, 827, 828, 835, 838, 843, 847, 866, 873, 875, 888, 891, 894,
896, 928, 938, 947, 948, 950, 966, 988, 1038, 1051, 1052,
1075, 1076, 1092, 1101, 1166, 1205, 1209 — 1211, 1213, 1217,
1218, 1221, 1222, 1224 — 1226, 1228, 1229, 1215, 1239, 1241,
1244, 1249, 1262, 1266, 1270, 1279, 1283, 1308, 1313, 1314,
1316, 1320, 1321, 1325, 1327, 1337.).

633. Vitalbata SV. HS. III. 175; H. 269; OT. VI. 2. 66.
Hucusque exemplar unum *Leopoli* 2. Julii in muro horti botanici.

634. Variata SV. HS. III. 173; OT. VI. 1. 334; H. 293.
380. Exemplaria duo 3. Julii ad marginem coll. querceti P. R.

Var. Obeliscata Hüb. 296. HS. 240 — 242. OT. VI. 1.
338. Specimen unicum, quod in collectione habeo, reperi eodem
die una cum Variata. Alia hac excursione lecta lepidoptera enu-
meravi sub numero 998.

635. Albimacularia Freyer. (*Arctata* Lienig, *Aquilaria*

FR.). In silvaticis inter L. et Wi. reperi semel 30. Junii in Quercu exemplar unicum (vide 690 et 238).

Pyradiata invenitur per Eur. usque ad Lapp., in Casano, pr. Or. — *Fulv.* : in Austria, Germ. etc., usque ad Sueciam. — *Ocell.* et *Bicol.* : per Eur. usque ad Lapp., in Casano, pr. Or. — *Iunip.* : usque ad Sueciam. — *Siterata* : usque ad Sueciam et Cas. — *Trucata* : in Austria, Germ. etc. usque ad Lapp. et Cas. — *Olivata* : hic illuc in Europa. — *Maria* : ubivis in Eur. usque ad Lapp., in Casano, pr. Or. Uralo. — *Brunn.* : ad Vindob., in Saxonie, Suecia, Casano. — *Silvata* in Austria, (rara). — *Fluct.* : per Eur. usque ad Lapp. et Cas., secus in pr. Or., ins. Rhodo, Asia minori. — *Mont.* : usque ad Lapp., in Cas. et pr. Or. — *Ligustr.* : praecipue in Eur. bor. usque ad Cas., in Uralo. — *Ferrug.* : usque ad Lapp., in Cas., pr. Or. — *Suff.* : in Austria, etc.; usque ad Cas. — *Quadrif.* : *Vindobonae*, in Germ. bor. alibique ad Lapp et Cas. usque. — *Propug.* : in Austria, Germ. bor., *Gallia*, usque ad Lapp. et Cas. — *Dilutata* : per Eur. in Sueciam et Cas. usque. — *Caesiata* : in Alpibus in Helvetia, Tyroli et Styria, in Palat. superiore, *Bavaria*, ad Ratisb., in Lapp. — *Nebulata* : in summis, *Styriae Alpibus*, in *Gallia merid.* — *Rupestr.* : in Tyrolis et *Styriae Alpibus*, Germ. bor., *Francia*, Suecia. — *Galiata* : per Eur. in Lapp. usque; in Styria. — *Cucull.* : hic illuc in Eur. ad Cas. usque, in pr. Or.; (rara). — *Albicill.* : per Eur usque ad Sueciam, in Cas., pr. Or. — *Procell.* : in Austria, Hung., etc. — *Luct.* : in Austriae montosis, *Styriae et Helv. Alpibus*, Germ. bor., in Lapp. et Cas. — *Affinit.* : in Alpibus et Anglia. — *Trist.* : usque ad Lapp., in Cas., Uralo, Bask. — *Alchem.* : ubivis in Eur. usque ad Lapp. et Cas. — *Rivata* : in *Styriae Alpibus*, ad Ratisbonam, etc. — *Rivul.* : usque ad Lapp., in prov. Or. — *Bland.* : in Austria — *Minorata* : in *Styriae Alpibus*. — *Albul.* : in Germ. etc.; usque ad Lapp. et Cas. — *Decol.* : in *Styriae Alpibus*, Germ. bor., Suecia, Casano, prov. Or. — *Lut.* : in Austria, Hung. etc., ad Sueciam et Cas. usque. — *Candid.* : in Lapp. usque. — *Hepar.* : usque ad Sueciam et Cas., in Uralo. — *Script.* : in Austriae et *Styriae montosis*, ad Vindob., *Rhenum*, in *Gallia merid.* — *Bilin.* : usque ad Sueciam, in Transcaucasia, ad Lenkoran, Tlos, Macri, in ins. Rhodo. — *Rig.* : in Suecia, *Gallia merid.*, ad Vindob., Ratisb. in Uralo. — *Silac.* : in Austria, *Bavaria*, *Gallia bor.*, Casano, Japonia, (rara). — *Rupt.* : in Austria, *Bavaria*, Casano. — *Badiata* : hinc inde per Eur. usque ad Sueciam. — *Berberata* : in Austria, *Helvetia*, Germ. — *Rubid.* : in Austria alibique, (rara). — *Chenop.* : usque ad Sueciam, in Cas., pr. Or. — *Tersata* : ad Vindob., in Palat. super.; ad Sueciam usque. — *Vitalb.* : regionatim in Eur. usque ad Cas. — *Variata* : in Sueciam et Cas. usque.

Eupithecia Curt.

636. Castigata Hüb. 166. HS. III. 133. et. 121. fig. 164 — 167. *Vulgaris Junio* inter frutices silvarum circa L. et in betuleti *Lwowiec* excisis. Incolit praeterea et pomaria.

637. Exiguata Hüb. 379. HS. III. 123 et 137; OT. VI. 2. 116. Aliquot exemplaria Majo et Junio in frutectis silvaticis pagorum R. g., et Cz.

638. Lanceata Hüb. Verz. (*Hospitata Tr.*), HS. III. 118 et 125. H. 236. Hucusque exemplar unicum 25. Maji in Abiete pect. prope H. (vide 790).

639. Satyrata Hüb. 439. HS. III. 120. et 130; fig. 147 — 151; OT. VI. 2. 108. Vulgaris sub finem Maji et Junio in pomariis silvarumque fruticosis circa *Samb.* et *L.*, porro in monte *Magóra*.

640. Pimpinellata Hüb. 443. 444. HS. III. 139 et 123. fig. 153; OT. VI. 2. 115. Unicum exemplar 20. Aug. in piceto *Swinka* prope *Hołosko*.

641. Tenujata Hüb. 394. HS. III. 119 et 129. fig. 168 169. Singula spec. Junio in querceto *R. g.* virguletisque corylinis silvarum in *Liš.* (vide 158. 690 etc.).

642. Innotata Husgl. HS. III. 119 et 128. fig. 274; H. 441. 442; OT. VI. 2. 124. Unicum exemplar sub finem Junii (sociis: 215 etc.) in campestri querceto *B.*

643. Nanata Hüb. 387; HS. III. 119 et 128. fig. 168. 169; OT. VI. 2. 136. (?). Semel exemplar unicum 26. Maji (sociis: 993 etc.) percussione *Coryli avell.* in coll. silvaticis *R. g.*

644. Centaureata SV. HS. III. 118 et 125; H. 240. 452; OT. VI. 2. 126. Aliquot exempl. Majo in truncis arborum pomarii ante silvas in pago *R. g.* et in lucis circa *L.*

645. Linariata SV. HS. III. 118 et 125; H. 242; OT. VI. 2. 122. Unicum exemplar 12. Junii (comitibus: 1309 etc.) prope *Janow* in Quereu ad marginem mixtae silvae *P. P.*

646. Begrandaria B. HS. III. 122 et 135. fig. 128 et 129. Quotannis copiose Junio in silvaticis et fruticosis usque ad ditiones montanas; speciatim autem circa *R. g.*, *D.*, *L.*, *J.*, et *W.*

647. Rectangulata L. HS. III. 123 et 138. fig. 275. 276; H. 235. 337; OT. VI. 2. 97. Vulgaris Junio-Aug. in horitorum sepiminibus et silvaticis circa *S.*, *M.*, *L.* et *W.*

648. Sparsata Tr. HS. III. 142; H. 398; OT. VI. 2. 133. Medio Junio exempl. duo in coll. betuleti *Lw.* fruticosis (vide 1014.)

649. Strobilata Hüb. 449. 450; HS. III. 124 et 139; OT.

VI. 2. 110. Extremo Majo exemplar unum (sociis: 993) in Corylo avell. in coll. silvaticis R. g.

650. Pusillata SV. HS. III. 122 et 136. fig. 158. 159; H. 378; OT. VI. 2. 119. Reperitur solitarie Majo in Samboriae hortis et Junio inter virguleta coll. betuleti Lw.

651. Silenata Standf. HS. fig. 428. 544. Singula specimen 21. Maji in Quercu mixtarum silvarum ad pedem monticuli Cz. sk. (sociis: 26, 97, 176, 189, 298, 474, 486, 512, 550, 622, 632, 636, 663, 683, 700, 705-708, 777, 782, 816, 852, 860, 865, 894, 896, 897, 900-903, 953, 994, 1047, 1054, 1076, 1118, 1190, 1248, 1260, 1325) et 1. Junii in Evonymo (frequentissime per Haliciae silvas crescenti) in mixtis silvaticis R. g. (vide 863)

652. Austerata Hüb. 457. (*Vulgata Haw.*) HS. III. 119 et 129. fig. 138 - 140; OT. VI. 2. 107. Provenit solitarie Majo et Junio Samboriae Leopolique in sepibus, porro in variis silvaticis circa L. nec non inter virguleta in betuleti Lw. excisis.

653. Subumbrata Hüb. 233. *Laquearia* HS. III. 124 et 139. fig. 181. 182. OT. VI. 2. 112. Semel exemplar unicum 8. Aug. (vide 266) in Quercu ad marginem coll. querceti Łuh in Rak. prope D.

654. Immundata Lienig. *Argillacearia* HS. III. 136. fig. 143. 144. Hucusque exemplar unicum 24. Junii (sociis: 15, 19, 42, 96, 159, 187, 197, 320, 461, 465, 466, 468, 559, 543, 581, 779, 775, 789, 800, 802, 803, 816, 835, 843, 891, 895, 1045 - 1047, 1052, 1291) in Corylo coll. querceti P. prope Cz.

655. Obrutaria FR. HS. III. 126 et 119; fig. 145. 146. Sat multa initio Junii in campestri querceto B. In coll. silvaticis R. g., rarissima.

Castigata invenitur hic illic in Eur., in Uralo. — *Exig.* per Eur. usque ad Livoniam. — *Lanc.*: usque ad Livoniam et Lapp. — *Satyrata*: in Austria. — *Pimp.*: in Bohemia. — *Tenujata*: ad Ratisb. etc — *Innotata*: in Austria, Germ., alibique in Livon. usque. — *Nanata*: hic illic in Eur. usque ad Livon. — *Cent.*: per Eur. usque ad Sueciam. Livon. et Cas. — *Linariata*: praecipue in Germ. bor., usque ad Livon.; Vindobonae, in Anglia, Casano. — *Begr.*: ad Ratisb., Glogaviam etc., in Livonia. — *Rect.*: per Eur. ad Sueciam et Livon. usque. — *Sparata*: in Germ., Gallia, Casano. — *Strobil*: in silvis acerosis Austriae, Germ. etc — *Pusill.*: in silvis acer. ad Livon. usque. — *Aust.*: in s. acer. in Austria, Palat. super., alibique ad. Liv. usque. — *Subumbr.*: in Austria, Germ., Palat. superiore, ad Ratisbonam. — *Immund.*: in Bohemia, Livonia. — *Obrut.*: in Bohemia, ad Vindobonam et Ratisbonam.

Microlepidoptera.

Pyralidae.

Pyralis Schrk.

656. Pinguinalis L. HS. IV. 119; H. 24; OT. VII.

39. Frequeos Majo-Julio ubivis in domiciliis usque ad montanas alpestresque regiones (U. g., W.).

657. Angustalis SV. HS. IV. 126; H. 21. 123; OT.

VII. 46. Unicum exemplar obsoletum, quod in collectione habeo, reperi 16. Julii 1854 (sociis: 321 etc.) in *Samboriae* pomario graminoso.

Ping. invenitur secus ubique in Eur. usque ad Lapp. — Ang.: ad Vindob., in Hung., Italia, Germ. media, Suecia, Anglia.

Scopula Schrk.

658. Dentalis SV. HS. IV. 15. fig. 120; H. 25; OT. VII.

54. Semel exemplar unicum 3. Julii in calcareorum collinorum Szyp herbosis declivibus (una cum: 447, 448, 457, 458, 470, 552, 554, 762, 998, 1078, 1180 etc.).

659. Prunalis SV. HS. IV. 40; H. 77. 118; OT. VII. 56.

Singulatim Majo Junioque, copiose Julio ubivis in hortis silvaticisque a pl. usque ad montosa (*Wołcze*).

660. Sophialis Hüb. HS. IV. 35; H. 50; OT. VII. 58.

Hucusque exemplar unicum 30. Maji in coll. querceto Radł. górnne (vide 1086).

661. Frumentalis L. (*Repandalis* Hüb. 64.). HS. IV.

35; OT. VII. 60. Exemplar alterum Leopoli inter zizania 26. Maji (sociis: Flaviearia, Alchymista, Dip. Pinastri, Echiella, Proboseidali); alterum in sabuletis prope Hołosko 30. Junii (comitibus: 238 etc.).

662. Olivalis SV. HS. IV. 42; H. 52; OT. VII. 65.

Exemplar alterum 19. Junii (sociis: 158 etc.) in coll. silvaticis

R. g., alterum 25. Julii (una cum: 194, 448, 565, 616, 681, 702, 766, 873, 1027, 1166) in inferiore parte silvigeri montis *Magóra* prope *Łomna*.

663. Sticticallis L. HS. VI. 34; H. 45; OT. VII. 64.
Quotannis communissime Majo-Sept. usque ad montanas regiones in hortis, silvis, pratis pascuisque. Infinito prope numero obser-
vavi Stict. 25. Maji 1859 circa *Leopolim*, 7. Aug. 1857 in ver-
vactis inter *Modrycz* et *Bolechow*, et Septembri 1855 in agris
cirea *Samb.* et *Radł. górae*.

664. Alpinalis SV. HS. IV. 31. f. 10; H. 63. 175. 176;
OT. VII. 69. Unicum exemplar (sociis: 556 etc.) 26. Julii in
summo cacumine rupestri alpis *Pikuj* (4190 p. v. *Lob.*) in florente
Saxifraga aizoone, quae densum ibidem format pulvinulum.

665. Nebulalis Hüb. HS. IV. 33. fig. 11. 12; H. 51;
OT. VII. 62. Volitavit frequenter (cum priore, 556 etc.) 26. Julii per
alpis *Pikuj* declivia septentrionalia. Exemplaria quiescentia
praecipue sub *Gentianae asclep.* foliis delitescunt.

666. Aenealis SV. HS. IV. 25; H. 46; OT. VII. 72.
Hucusque semel spec. duo (simul cum: 998 etc.) 3. Julii in col-
linorum *Szyp* declivibus floridis.

667. Margaritalis SV. HS. IV. 34. H. 55; OT. VI. 73.
Samboriae per omnes annos semel specimen unicum in pomario
graminoso. In herboso margine illius silvae mixtae in *Hołosko*,
quae arenosum tumulum *Hel.* attingit, volitat Marg. frequenter to-
to Junio (una cum: 328, 238 etc.). Excepta utraque regione re-
peri Marg. 3. Julii (sociis 998 etc.) in calcareorum collinorum
Szyp siccaneis declivibus apricis.

668. Stramentalis H. Verz. HS. IV. 35; H. 62. OT. VII.
76. Singula specimina inter zizania in silvae mixtae *Zapust* saltu
paludosso (sociis: 746 etc.), in Quercu ad marginem quereteti *Łuh*
in *Rak.* (comitibus: 1195 etc.) et in Senecione nemorensi in fagete
montis *Hušla* (una cum: 17 etc.) loco circiter 3400 p. v. elato.
(Terminus Fagi: 3550 p. v. v. *Lob.*). Julio.

Dent. provenit seeus in Austria, Hung., Germ., ad Ratisb., in Italia, Dalmatia. — *Prun.*: ubique in Europa usque ad Livoniā et Lapp. — *Soph.*: in Bo-
russia, Banatu, Alpibus Styriae, Austria, Dalmatiaque. — *Frum.*: in Europa

meridionaliori; ad Vindob., in Hung., Rossia, Germ., Livonia, Suecia. — Oliv.: in Styriae Alpibus, in Hung., Saxonia, Livoniaque. — Stictic.: in Eur. usque ad Sueciam Livoniamque; in Austria, Germ., Gallia, Rossia. — Alp.: in Austriae et Styriae montosis; in Sudetis. — Nebul: in Styriae Alpibus, in Silesia, Austria, Lapp. — Aenealis: in Alp., ad Vindob., in Dalm., Hung. — Marg.: per Europam usque ad Livoniam et Sueciam; in Austria, Hung., Bavaria, Germ., Ukraina, ad Neapolim. — Stram.: usque ad Sueciam Livoniamque; in Germ. bor., Austria.

B o t y s Lalr.

669. Lancealis SV. HS. IV. 29; H. 117; OT. VII. 79.

Reperitur frequenter, interdum numerose, Junio Julioque in mixtis silvis coll. ditionum R. g. et Stup. Circa Leopolim inveni anno 1859 semel exemplar unicum.

670. Silacealis Hüb. 116. 94. HS. IV. 30; OT. VII. 81.

Raram hanc in nostratis Pyralilem inveni adhuc usque singulis spec. Junio in mixta silva R. g. (sociis 220, 1014) et 2. Julii ad marginem querceti Łuh in Rak. (vide 1195.).

671. Sambucalis SV. HS. IV. 30; H. 81. OT. VII. 83.

Samboriae Leopolique in floralibus, praeterea inter zizania in coll. silvaticis circa R. g., Stup. et ad pedem monticuli Cz. sk. Quotannis satis frequens. Junio et Julio.

672. Stachydalis Zinck. HS. IV. 30. fig. 114. Volitat

mixtim cum Sambuc., sed rarius invenitur. Testante Amplissimo Łobarzewski Parietaria Haliciae deest, quam ob rem erucae aliis plantis ali videntur.

673. Politalis SV. HS. IV. 35; H. 136. 183. FR. 27;

OT. VII. 85. Hucusque exemplar unicum (sociis 998 etc.) 3. Julii in collinorum Szyp fruticosis mixtis. Delitescebat in Corylo.

674. Rubiginalis Hüb. 79. FR. 27; HS. IV. 30; OT. VII.

87. Hucusque exemplaria tria: duo (comitibus 1309 etc.) 12. Junii in coryletis coll. querceti P. R., tertium (simul cum: 1320, 1319, 1273, 1252, 1250, 1240, 1206, 1199, 1181, 1171, 1128, 1127, 1116, 1117, 1107, 1099, 1061, 963, 896, 877, 768, 749, 744, 742, 734, 728, 703, 691, 682, 677, 560, 513, 517, 435, 366, 156.) 19. Aug. ad coll. silvae R. g. marginem in Serbo aucuparia.

675. Ferrugalis Hüb. 54. 150. HS. IV. 39; OT. VII.

94. Hucusque semel 20. Julii Samboriae prope ambulacra

Wychylówka ad marginem saliceti (ripas fluminis Dniester vestientis) exemplar unicum (comitibus: 1283, 1171, 1162, 1069, 1061, 1057, 1056, 889, 828, 824, 766, 758, 602, 607, 686, 588, 544, 461 455, 452, 442, 319, 298, 246, 187, 186, 178, 165, 155, 83, 72, 43.).

676. Fulvalis Hüb. 147. FR. 6. HS. IV. 39; OT. VII. 95. Singula exempl. in *Samboriae* floralibus (una cum 321), in florido sepulcreto pagi *D.* (sociis 266 etc.) et in prato *Z. p.* mont. val- lium circa *Wołcze* (comitibus 6 etc.). Julio.

677. Fuscalis SV. HS IV. 27; H. 66; OT. VII. 96. Quotannis communissime ab extremo Majo ad Aug. ubique in silvaticis per omne terr. usque ad montes elatiores (Mag., W. R.).

678. Pallidalis Hüb. (*Repandalis* SV.), HS. IV. 27; H. 115; OT. VII. 59. Semel specimen unicum 24. Aug. ad marginem silvae frond. in promontoriis *Spas.*

679. Cinetalis Tr. HS. IV. 37; H. 72. 73. OT. VII. 97. Semel exemplar unicum (comitibus: 482, 479, 481, 687, 945 etc.) prima Julii in nemore mixto monticuli *Cz. sk.* 1304 p. v. (Kbg.) alti.

680. Flavalis SV. HS. IV. 28; H. 69; OT. VII. 99. Unicum exemplar (comitibus: 1309 etc.) 12. Junii prope *J.* ad marginem pineti *R.* in *Quercu*, quae hic passim aliis cum arboribus frondentibus crescit.

681. Hyalinialis Hüb. 74; HS. IV. 28; OT. VII. 100. *Vulgaris* Junio Julioque in silvaticis per omne terr. usque ad ditiones montanas. In vico *D.* vagabatur *Hy.* frequentissime 2. Julii (vide 1195 etc.) ad marginem mixtarum silvarum *M. k. i b. d.*

682. Verticalis L. HS. IV. 29; H. 57; OT. VII. 101. Vulgatissime Julio et Aug. in coll. silvaticis circa *R. g.*, *Stup.*, *D.* et *L.* Annis 1855 et 1859 eam nullibi conspicere mihi contigit.

683. Pandalis Hüb. 59; HS. IV. 29. fig. 88; OT. VII. 103. Quotannis copiose Majo et Junio ubique in silvis per cunctum terr. a pl. in elatiora promontoria usque.

684. Trinalis SV. HS. IV. 31; H. 68; OT. VII. 105. Hucusque semel 3. Julii exemplar unicum (comitibus: 998 etc.) prope *J.* in *Quercu* pumilescenti, quae cum *Pinis* silv. *Coryletis-* que *calcicorum* *collinorum* *Szyp* terga convestivit.

685. Urticallis Hüb. 78; HS. IV. 27; OT. VII. 106.

Quotannis communissime Majo-Julio ubique locorum inter zizania in hortis silvisque per omne terr. a pl. in montosa usque (Mag., W., W. R.). Mense Junio frequentissime.

686. Hybridalis Hüb. 114; HS. IV. 42; OT. VII. 109.

Solitarie Majo Junioque in sylvaticis R. g., Stup. et H. 20. Julii 1859. autem vagabatur Hybr. copiose cirea R. g. per agros florente Trifolio consitos.

687. Palealis SV. HS. IV. 39; H. 70; OT. VII. 116.

Hucusque semel prima Julii specimen unicum inter densa Pop. tremulae fruticeta in monticulo Cz. sk. (vide 945 etc.).

688. Forficalis L. HS. IV. 36; H. 58; OT. VII. 122.

Semel exemplar unicum (sociis: 262 etc.) sub finem Junii in Samboriae pomario graminoso.

689. Interpunctalis Hüb. 128; HS. IV. 26. f. 59. 86;

OT. VII. 128. Exemplar unicum ad pedem monticuli Cz. sk. loco uliginoso in Lythro salicaria 18. Maji (sociis: 1, 2, 13, 23, 24, 26, 31, 41, 44, 56, 60, 61, 75, 76, 78, 90, 97, 100, 107, 189, 211, 388, 397, 410, 413, 474, 478, 488, 501, 512, 513, 510, 527, 544, 547, 550, 572, 599, 622, 683, 689, 700, 705-708, 749, 716, 755, 775, 777, 780, 782, 783, 831, 846, 852, 853, 860, 871, 894, 896, 900-903, 912, 953, 1027, 1040, 1043, 1045, 1038, 1054, 1059, 1075, 1095, 1117, 1136, 1231, 1244, 1248, 1252, 1273, 1295, 1316, 1319, 1320, 1322, 1325.).

Lanc. invenitur secus in Eur. usque ad Germ. bor.; ad Vindob., in Hung. — Silac.: in Livonia, Germ., ad Vindob., in Hung., Italia merid. — Samb.: in Eur. usque ad Sueciam et Livoniam. — Stach: ad Vindob., Glogaviam, Megalopolim, Brunsvigam. — Polit.: in Austria, Siciliaque. — Rubig.: in Austria, Hung., Ukraina. — Ferrug.: in Hung., Italia, Helvetia. — Fulv.: in Austria, Hung., ad Parisios Syracusasque. — Fusc.: in Eur. usque ad Sueciam Livonianaque, in Italia, Hung., Rossia, Germ. — Pallid.: in Germ., Austria, Hung. — Cinct.: in Europa usque ad Sueciam Livonianaque; in Germania, Hung., Austria, Dalmatia. — Flav.: in Austria etc. usque ad Livoniam Suecianaque. — Hyal.: in Hung., Austria, Germ., Rossia; usque ad Sueciam Livonianaque. — Vert.: in cuncta Eur. usque ad Liv. et Sueciam; ad Syracusas. — Pand.: in Hung., Austria etc. usque ad Liv.; ad Neapolim. — Trin.: in Austria, praecipue ad Vindob. — Urt.: in universa Eur. ad Liv. et Sueciam usque. — Hybr.: in Austria, Germ. etc. usque ad Livon. Lapponiamque; in Italia, Dalm. — Pal.: per Eur. usque ad Livon.; in Italia merid., Dalm., Hung. — Forf.: in universa Eur. usque ad Livon. Suecianaque. — Interpunct.: in Gallia merid., Corsica, Italia, Dalmatia.

Cledeobia Steph.

690. Acuminalis HS. II. 442. f. 619. (*Costaestrigalis* Wood). Eximum hunc papiliunculum, quem Clariss. Schäffer Noctuis adnumerat, inveni uno specimine pulcherrimo in Quercu prima vesperi 30. Junii prope Leopolim in excisis coll. querceti supra c. Liš. Una cum Acum. legi tempore pomeridiano in dicta silva sequentes species: 27, 56, 67, 70, 152, 153, 187, 188, 194, 197, 299, 320, 427, 432, 434, 491, 493, 513, 514, 570, 581, 598, 613, 623, 635, 728, 729, 641, 802, 803, 832, 864, 902, 928, 944, 988, 990, 1066, 1085, 1090, 1098, 1183, 1191, 1193, 1196, 1198, 1210, 1211, 1220, 1221, 1237, 1248, 1264, 1278, 1282, 1307, 1336; horis antemeridianis vero in silvaticis Hołosko lepidoptera sub numero 238 enumerata.

Reperitur secus circa Reichstadt, Neustrelitz et Biberteich.

Nymphula Schrk. (*Cataclysta* Hüb.)

691. Reticularis L. (*Literalis* SV.). HS. IV. 26; H. 86; OT. VII. 131. Quotannis copiose Majo-Aug. in pratis, silvis, ver-vactis pascuisque siccis per terr. cunetum usque ad montanas regiones (Mag., W., Czarna.).

692. Lemnalis L. SV. HS. IV. 7; H. 83. 84; OT. VII. 134. Sat frequens Majo, Junio et Aug. *Samboriae Leopolique* in pomariorum sepibus, praeterea in floridis ripis rivulorum in pago R. g.

693. Stratiotalis SV. HS. IV. 10; H. 87; OT. VII. 137. Aliquot exemplaria Junio in arundineto ad marginem piscinae in pago Radł gorne.

694. Nymphaealis L. Tr; HS. IV. 11; H. 82; OT. VII. 141. Hucusque semel 15. Junii (cum priore) in paludosis ante pagum R. g. spec. unicum in Butomo umbellato.

695. Potamogalis L. Tr; HS. IV. 11; H. 85; OT. VII. 143. Reperitur quotannis solitarie in humidis pratis: P. L., Bl., St. w. t., nec non in illis circa L. 31. Maji — 4. Aug.

Retic. provenit secus ubique in Eur. usque ad Livon. — Lemn.: per Eur. in Sueciam et Livonię usque; ad Neapolim. — Strat. et Potamog.: in Europa usque ad Livon. Sueciamque; in Sicilia. — Nymph.: ad Vindob., in Hungaria, Germ. etc. usque ad Sueciam Livonięque.

A s o p i a Tr.

696. Farinalis L. HS. IV. 121; H. 95; OT. VII. 147.

Vulgaris Junio Julioque ubivis in domiciliis per territorium cunctum in montosa usque (Czarna).

697. Glaucinalis L. HS. IV. 122; H. 98; OT. VII. 149.

Semper et ubique solitatum in ditionum coll. pomariis, lucis, fructicis, dumosisque circa S., R. g., Stupnica, Modrycz, Janow et Leopolim. Junio-Aug.

698. Fimbrialis SV. HS. IV. 122; H. 97; OT. VII. 154.

Unum specimen hujus eximii papiliunculi inveni 12. Junii ad marginem querceti P. R. (comitibus: 770, 674, 697, 1309 etc.).

Farin. invenitur secus in Eur. usque ad Lapp.; in Italia, America boreali.

— *Glauc.*: in Eur. bor. et media; in Suecia, Anglia, Germ., Silesia, Hungaria, Austria. — *Fimbr.*: in media et austr. Europa; in Italia, Suecia, Anglia, Silesia, Austria, Hungaria.

A g r o t e r a Schrk.

699. Flavmealis SV. HS. IV. 12; H. 99; OT. VII. 155.

Duo exemplaria, quae in coll. habeo, reperi in Quercu 3. Julii in mixto prosilvio coll. pineti R. (vide: 998 etc.).

Secus in Austria, Hung., circa Ratisb., Berolinum, Neapolim.

E n d o t r i c h a Zell.

700. Nemoralis SV. HS. IV; 12. H. 100; OT. VII. 156.

Elegans subtilisque hic papiliunculus reperitur quotannis fere copiose Majo Julioque in variis siivaties nemoribusque (praecipue Alni glut.) per omne territorium usque ad montanas regiones (Magóra, Wolcze, Czarna).

Secus in Austria, Germ., Hung., Polonia, Italia merid. etc.

C h o r e u t i s H. (Simaethis H.)

701. Parialis Tr. (Pariana H. 1. 2.); FR. 26; HS. V. 94;

OT. VII. 159. Semel 6. Julii exemplar unicum (sociis 967 etc.) in Quercu ad marginem fageti, quod crescit inter Leopolim et Winniki ad viae stratae dextram.

702. Alternalis Tr. VII. 160. (Fabriciana H. 4. 5.).

HS. V. 95. Volitat frequentissime Majo — Sept. ad silvarum,

dumetorum, fruticosorum, nemorumque (praecipue Alni glut.) margines per terr. cunetum a pl. usque ad alpestres regiones. Obvia mihi fuit circa *Stup.*, *R. g.*, *M.*, *D.*, *L.*, *W.*, nec non in superioribus Fagi regionibus (sociis 17 etc.) in alpestri monte *Hušla* (4190 p. v. Łob. alto), unde 26. Julii anni 1858. plura exemplaria per spisse hic crescentem florentemque Senacionem nemorensem volitantia in memoriam mihi sumpsi.

703. Scintilulalis *Tr.* X. 3. 33. (*Scintilulana H.* 204). *HS.* V. 96. Specimina singula Junio (una cum 632 etc.), Julio (comitibus 451 etc.) et Aug. (sociis: 674 etc.) in mixtae coll. silvae *R. g.* virguletis.

Par. invenitur secus in Europae septentrione usque ad maris Baltici provincias; in Casano. — Altera; in Eur. meridionaliori usque ad Bohemiam; in Casano. — Scint. : in Hung., Bavaria etc.; sept. versus usque ad Neostreliciam.

Pyrausta Schrk.

704. Sanguinalis *L.* „*Alis ant. flavis, costa fasciisque duabus sanguineis, media macula adjacente subflava, antelimbali inulae apicem angulumque ani excurrente; poster. cinereis.*“ *OT.* VII. 163; *HS.* IV. 23; *H.* 33. Decoram hanc Pyraustam detexi prima vice 12. Junii 1859. prope Janow adversus pinetum Romanówha in arenosorum collinorum *Próchnik* declivibus apricis, ubi Sang. frequenter socialiterque una cum Thalp. Paula (ceterum vide 1309 etc.) prope ipsam humum per plantas humillimas vagabatur. 3. Julii e. a. iterum in hac regione fui, sed aliquot tantum exemplaria obsoleta (comitibus 998 etc.) obvia mibi tune fuerunt. Treitschkeana adumbratio locorum a Sanguinali inhabitatorum est collinis *Próchnik* tam consentanea, ut Treitschkium ipsum hic legisse aliquis putare possit.

705. Purpuralis *L.* *Tr.* VII. 166; *Hüb.* 34. *Ostrinalis* *HS.* IV. 22; *fig.* 107. 108. Quotannis vulgaris Majo — Julio ubique in pratis silvisque usque ad regiones alpestres (*Hušla*).

706. Ostrinalis *Hüb.* 113. *Tr.* VII. 172. *Purpuralis* *HS.* IV. 22. *f.* 105. 106. Itidem ac *Purpuralis*.

707. Punicealis *SV.* *HS.* IV. 21. *fig.* 703, 104; *H.* 36. *OT.* VII 168. *Vulgaris Majo* et *Junio* per cuneti terr. prata et silvatica usque ad regiones montanas (*Wołcze, Magóra* etc.).

708. **Cespitalis** SV. HS. IV. 23. H. 39. 40. OT. VII. 173. In R. g. et D. reperi per sex annos singula tantum exemplaria. In pratulo florido ad marginem betuleti Krzywczycę prope L. volitat Cesp (sociis: 1183, 1180, 785 etc.) solitarie Majo Junioque, vulgatissime autem Julio ²).

Sang. provenit secus in Port., Gallia, Italia, Hung., Austria, Germania, ad Ratisb. in Liconia. — Purp.: ubivis in Eur. — Ostr.: in Italia merid., Hung., Germ. bor.; usque ad Livoniam et Succiam. — Punic.: in Austria, Germ., ad Ratisb., in Italia merid., Livonia, — Cesp.; usque ad Sueciam Livonianamque.

Hercyna Tr.

709. **Normalis** Hüb. 41. HS. IV. 16; fig. 98; OT. VII. 175. Hucusque semel specimen unicum Julio in herbosis in summo cacumine alpis Paraszka (3996 p. v. sec. Kbg. et 3926 sec. Łob. elatae).

710. **Rupicolalis** Hüb. 139. HS. IV. 17; OT. VII. 181. *Holosericealis* Hüb.). Hanc speciem reperi sub finem Julii singulis spec. in Scorzonera rosea Dianthoche barbato in alpibus Pikuj (vide 556) et Zelemin, quarum prior 4190 (Łob.), posterior 3703 p. v. (Kbg.) est elata.

711. **Alpestralis** Fabr. HS. IV. 18; 135; OT. VII. 182. Unicum exemplar, quod in collectione habeo, reperi extremo Julio in graminosis alpis Rabka, quae affirmante Clariss. Łobarzewski alpem Paraszka (vide 709) altitudine aequat.
(*Roeselia* Hüb.)

712. **Strigulalis** Hüb. 16. HS. II. 163; fig. 137; OT. VII. 187. Hucusque inveni specimina tria 15. Aprilis et 13. Junii (so-

²) Praeter enumeratas Pyraustas testantibus Clarissimis Schäfferio et Zawadskio in Halicia etiam Pyr. palustralis et castalis reperiuntur. Hac occasione praetermittendum non est, in Halicia multo plures adiuv species in hoc opusculo non adductas ab aliis visas lectasve fuisse. Sie obseruavit noster ornithologus Clariss. Comes Wodzicki in summis Tatris Majo Auroram et Eudoram una cum Hyperantho et Pontia Crataegi (vide ejus „Wycieczka ornitologiczna w Tatrach” pag. 24.); a Clariss. Consiliario Nechay inventi sunt prope Leopolim Sat. Brzezis et Alcyone; a me vero in residuis plurium antiquarum collectionum et in farraginibus ex Haliciensis lepidoptoris factis visi sunt: Xanthomelas Myrmidone, W-album, Onobrychis, Peucedani, Everia, Gonostigma, Bifida, Tritophus Virens, Persfua, Maura, Literosa, Asclepiadis, Citrago, Sulphurago, Elinguaria etc. etc. Ubi et quando haec lepidoptera lecta sint nihil certi affere possum; sed quoniam jam semel in nostratis capti sunt, verisimile est, eadem etiam a me in futurum inveniri.

ciis 1014 etc.) in coll. silvaticorum *R. g.* Alnis glut., quartum 16. Maji *Samboriae* in pomarii septo. Specimen Junio inventum est obsoletum lacerumque.

713. Albulalis Hüb. 14. HS. II. 166. f. 140; OT. VII. 191. Unicum exemplar (sociis: 967, 1137, 501 $\frac{1}{2}$ etc.) 6. Julii in coll. silvaticis mixtis inter *Leopolim* et *Winniki*. Latitavit in altioribus vetustae *Quercus* ramis.

714. Palliolalis Hüb. 13. (*Cucullatella L.*). HS. II. 164; OT. VII. 188. Quatuor exemplaria pulcherrima *Samboriae* in pomariorum sepiminibus 23. Junii et 16. Julii (sociis 356, 321 etc.).

Norm. provenit secus in Hung. — Rupic.; in Italiae et Helvetiae Alpibus; in Lapp. — Alpestr.; in montosis Austriae, Styriae Helvetiaeque; porro in Lapp. — Strig.; hinc inde in Europa. — *Albul.*: in Hung., Austria, Saxonia; rura. — *Palliol.*: in cuncta fere Europa.

Ennychia Tr.

715. Cingulalis SV. HS. IV. 20. H. 30; OT. VII. 197. Hueusque semel 9. Junii prope H. in tumulo sabuloso *Helowszczyzna* (sociis 328 etc.) duo pulchra specimina, quae ibidem sole aestuante per flores prope ipsam hamum vagabantur.

716. Anguinalis Hüb. 32. HS. IV. 20. OT. VII. 198. Volitat solitarie in nardeto ad campestris betuleti Zubrza marginem (vide 1275), in apricis pratulis sub - et intersilvaticis circa *Lis*. (simul cum 789) et *Janów* (vide 1309 etc.), et in sterilibus apertis ante montem *Magóra* prope Ł. (vide 795). Majo, Junio.

717. Luctualis Hüb. 88. „Atra; alae anter. macula lunulata, poster. fascia transversa niveis“. OT. VII. 200. HS. IV. 20. fig. 63. Bellus hic papiliunculus in aliis Europae regionibus rarus volitat in nostratis vulgate socialiterque secundum coll. queretici *R. g.* margines (rarius in media silva), praeterea solitarie in fruticosis silvarumque excisis per coll. ditiones *Stupnica*, *Hołosko* et *Krzywezyce*. Vagatur humiliter velociterque libentissime duas tresve horas ante solis occasum in silvarum marginibus inter folia et fratices, quam ob rem difficuler conspicitur capiturque. 24. Maji — 11. Julii. Specimina extremo Majo initioque Junii lecta pulcherrima, serius capta obsoleta sunt.

718. Octomaculalis L. „Atra; alae omnes binis maculis niveis; scapulis flavis.“ OT. VII. 201; HS. IV. 20; H. 75. Iisdem in locis et tempore ac prior, sed ubique vulgaris.

719. Pollinalis SV. HS. IV. 16; H. 29; OT. VII. 202.
„Nigra; alae omnes binis maculis albis, anteriores lineola alba e
media basi“. Volitavit satis frequenter 12. Junii prope Janow per
vaccineta in pineti R. excisis (una cum : 87, 548, 799) et in col-
linorum Szyp apries declivibus herbosis. In lucidis silvaticorum
circa Leopolim reperi Poll. medio Majo.

720. Atralis Hüb. 27; HS. IV. 16; OT. VII. 206. Se-
mel 25. Junii exemplaria duo in herbosis in coll. betuleti Lwowiec
excisis (vide 632).

Cing. et Anguin. reperiuntur secus per Eur. usque ad Sueciam Livoniamque.
— De Luctualis geogr. distrib. dicit Clariss. Schäffer: „Certissime ex Syrmia et
Italia; certe non ex Saxonie.“ — Octomac. et Poll: occurunt in Hung., Bavaria,
Austria etc usque ad Livoniam Sueciamque. — Atralis denique habitat in Alpibus,
in Austria, Germ., Livonia, Lapponia.

Tortricidae.

Haliás Tr.

(Chloëphora Steph.)

721. Prasinana L. HS. II. 446; H. 158; OT. VIII. 4.
Hucusque singula exemplaria Junio in coll. quercetis R. g. (so-
ciis : 1238 etc.) et Kor. (una cum 328 etc.).

722. Quereana SV. HS. II. 446; H. 159; OT. VIII. 7.
Alterum exemplar reperi in coll. querceto R. g. (sociis : 721,
1238 etc.), alterum prope J. in querceto P. R. (hic una cum :
698, 806, 1309 etc.). Junio.

(Earias Hüb.)

723. Vernana Hüb. 161; HS. II. 447; OT. VIII. 9.
Duo exemplaria 16. Aug. Leopoli in ambulacrorum Pop. tremula.

724. Clorana L. HS. II. 448; H. 160. OT. VIII. 10. An-
nis 1852 ad 1858 reperi exemplaria duo (simil cum 1086 etc.)
in silvaticorum R. g. Pop. tremulis, tertium Samboriae in po-
marii sepinine Majo.

Pras. invenitur secus in Austria, Hung., Germ., Helvetia, Gallia, Lapponia.
— Quercana : in quercetis Austriae, Hungariae etc. usque ad Sueciam. — Vernana:
in Austria, Hung., ad Vindobonam. — Clorana : ubivis in Eur. usque ad Lapp.

Penthina Tr.

(*Sarothripus Curt.*)

725. Revayana *) SV. HS. II. 445; H. 6 - 10; OT. VIII.

22. Hucusque specimen singulum 29. Maji 1852. in coll. querceto R. g. (una cum: 1086 etc.).

Var. Ramosana Hüb. 10. Item exemplar unicum 26 Maji 1859. in Quercu ad campestris quereeti *Bednarówka* marginem (sociis: 940, 980. etc.).

Var. Undulana Hüb 7. Hucusque exemplaria septem Julio (una cum 451, 238 etc.) in coll. querceto R. g., octavum 1. Maji (comitibus: 360, 1044, 1255 etc.) in campestri querceto B. Latitat praecipue in marginalibus *Quercubus*.

(*Penthina Tr.*)

726. Hartmanniana L. HS. IV. 227. H. 110. OT. VII. 91. Exemplaria duo 29. Maji 1853. in coll. silvaticorum R. g. *virguletis* (comitibus: 1086 etc.).

727. Salicana L. SV. HS. IV. 226; H. 11. OT VIII. 24. Frequens in hortorum septis zizaniisque *Samboriae Leopoliique*; praeterea vulgaris incola dumetorum spinetorumque territorii cuncti in elatiores montes usque (*Wołcze*). Extremo Junio, Julio.

728. Capreana Hüb. 250; HS. IV. 227. fig. 182; OT. VII. 27. Frequentissime Junio et Aug. in vepretis silvarumque virgultis per omne terr. in montanas valles usque.

729. Variegana Hüb. 14; HS. IV. 228; OT. VIII. 35. Vulgaris Junio inter zizania ad hortorum sepimenta silvarumque margines; praeterea in dumosis fruticetisque per omne terr. usque ad elatiores montes (*Czarna*, *Podhorodce* etc.).

730. Pruniana Hüb. 15; HS. IV. 228; OT. VIII. 33. Quotannis communissime Junio ubique in dumetis ad agrorum silvarumque margines in promontoria usque.

731. Lediana L. (*Lienigiana* Zell.). HS. IV. 229. Huc-

*) *Clariss. Herrich-Schäffer species 721—725 Noctuis adnumerat.*

usque semel 22 Maji ad coll. silvae *R. g.* marginem specimen unicum in *Alno glutinosa*.

732. Dimidiana *Tr. X. 3. 46; HS. IV. 228, fig. 164.*
165. In rubeto coll. silvae *R. g.* exemplar unicum Junio.

733. Gentianana *Hüb. 12; HS. IV. 230; OT. VIII. 36.*
Communissime Junio et Aug. ubique locorum in dumetis ad silvarum margines in promontoria usque.

734. Sellana *H. 331; HS. IV. 230 fig. 183.* Itidem ac *Gentianana*.

735. Cynosbana *L. (Tripunctana SV.). HS. IV. 233;*
H. 18; OT. VIII. 38. Solitatim Junio ad margines coll. silvarum in *R. g.*, *H. et K.*

736. Amoenana *Hüb 248. (Incarnatana H. 191). OT.*
VIII. 41; HS. IV. 232. Unicum specimen inter frutices ad mixtae silvae *R. g.* marginem 30. Maji (vide 1086).

737. Suffusana *Kuhlw. HS. IV. 232 fig. 178.* Solitarie Junio Julioque in *Samboriae Leopolisque* septis, porro in dumetis fructecosisque ad silvarum coll. margines in *R. g.*, *H. et D.*

738. Ocellana *SV. OT. VIII. 40; HS. IV. 233; H. 16,*
Vulgatissime Junio-Aug. ubique in hortorum sepiminibus, silvis, lucis, dumetisque per cunctum terr. in montanas ditiones usque.

739. Dealbana *Fröl. Minorana Tr. VIII. 43 et X. 3. 53;*
FR. 22; HS. IV. 232. Quotannis copiose Junio Julioque praecipue in pomariorum septionibus; porro in dumosis usque ad promontoria.

740. Aceriana *Mann. HS. IV. 232. fig. 350.* Semel 25. Junii exempl. duo (sociis: 632 etc.) inter frutices in coll. betuleti *Lwowiec* excisis.

741. Simplana *FR. 20. „Alis anter. argenteis, sordide-albo maculatis; basi, oppositis duabus maculis costae et dorsi, limbo ciliisque fuscis; alis poster. cinereis, capite albo.“ HS. IV. 234.* Speciem hanc hueusque speciminibus pluribus in solo betuleto *Lwowiec* pagi *R. g.* invenire mihi contigit. Volitat ibidem quotannis solitarie initio Junii mox post solis occasum in excisorum herbosis prope ipsam fere humum. Uno tempore dantur in hac regione;

1222, 1224, 1327, 1187, 1283, 1225, 1060, 1113, 1013, 1125,
1209, 1211, 1213, 1022, 1243, 931, 628, 428.

742. Roseomaculana Mann. „*Alis omnibus fuscis, anterioribus crebre, poster. parce persicino-variegatis, illis macula magna ad $\frac{2}{3}$ costae persicina.*“ HS. IV. 229. fig. 163. Semel 19. Aug. (sociis: 674, 703, 1099, 1181 etc.) specimen unicum paulo obsoletum in fruticoso alneto ad coll. silvae R. g. marginem.

743. Sauciana Hüb. 305. „*Alis anter. nigricantibus, fascia undulata obliqua a $\frac{2}{3}$ costae ad angulum ani persicina; alis poster. obscure-griseis.*“ HS. IV. 229. Hucusque exemplaria duo 25. Maji (comitibus: 790 etc.) in coll. piceto Swińska, tertium 12. Junii (sociis: 1309 etc.) in campestri pineto R. prope J.

Revayana reperitur una cum varietatibus in plurimis Europae regionibus. — *Hartmanniana*: in Europa usque ad Livoniam. — *Salicana*: in Austria, Germania etc. — *Capr.*, *Variegana* et *Pruniana*: per Europam usque ad Livoniam. — *Dimid.*: in Silesia, Bohemia, Bavaria, Lapp., Liv., circa Francosurtum a. M.; (rara). — *Gent.*: in Tyroli, Styria, ad Salisburgum etc. usque ad Livoniam — *Sell.*: in Europa usque ad Livoniam. — *Amoenana*: in Germania Hungariaque. — *Suff.*: localiter in Eur. usque ad Livoniam. — *Ocell.*: in Austria, circa Ratisb. alibi in Eur. usque ad Livoniam. — *Dealb.*: hic illic in Eur. usque ad Livoniam. — *Acer.*: circa Vind., Francosurtumque a. M. — *Simpl.*: in Bohemia, circa Vindob. et Ratisb.; (rara). — *Roseomac.*: de geogr. distrib. *Roseomaculanae*, papiliunculi affirmante amicissimo Mann rarissimi, nihil certi adducere possum. — *Sauc.*: in Sax., Boh., Austria, Livoniaque; (rara). — *Triquetra*: in Bohemia, Regno Wurtemburgico, Germania boreali, etc.; usque ad Livoniam. — *Cretaceana*: praecipue in Germania boreali.

(*Steganoptyla* Steph.)

744. Ramana L. „*Cano-albida; macula dorsali anteriore oblique-triquetra fusca, litura posteriore apiceque pallidioribus.*“ *Triquetra* Tr. X. 3. 52; HS. IV. 279; H. 280. 336. Satis frequens Aug. et Sept. in betuletis vel mixtarum silvarum prosilviis *Betula* intermixtis in Modrycz (vide 1152), Radł. górne (comitibus: 85 etc.), Dobrowlany (una cum: 266 etc.) et Zubrze (hic sociis: 239 etc.).

(*Poecilochroma* Wood.)

745. Cretaceana Hüb. 318. „*Alis anter. ochroleucis, dorsi striola anteriore interrupta incurva nigra, litura posteriore griseacente nigro-punctata; alis poster. griseis.*“ HS. IV. 203. Hucusque singula specimina Junio in herbosis coll. querceti R. g. (sociis: 1300 etc.) et in campestris betuleti Zubrze prosilvio (comitibus: 1026, 1216 etc.).

Tortrix L.

(*Lozotaenia* Curtis)

746. Besseri* sp. n.

„*Nitidula; alis anterioribus pallidis, hepatico-griseis, grosse obscurius reticulatis tenuiterque fusco venosis, fascia media integra antice dilatata postice coarctata fusca, macula costali solita ante apicem nulla; ciliis utrinque basi flavescentibus, apice exalbidis, squamis nigris inspersis; posterioribus fuscescenti-, ciliis pallide lutescenti-griseis.*“

Novam hanc Tortricem dedico memoriae Inlyti olim **Vilibaldi Besseri**, Haliciensis et Podolico-Volhyniensis florae primi disquisitoris riorumque insectorum Polonicorum descriptoris.^{**}

Unicum specimen, quod in collectione habeo, in collina ditione *Stupnica* 29. Junii de marginali Abiete pectinata in solido piceto *Jedlina* excitare mihi contigit, ubi eodem tempore et species: 950, 936, 816, 803, 791, 738, 668, 686, 681, 623, 506, 471, 429, 424, 103, 199, 96, 83 volabant.

Quod similitudinem cum aliis Tortricibus adinet, Besseri bene cum Diversanae varietatibus comparari potest. In collectione Amplissimi Josephi Mann Vindobonae vidi Tortricem „Vienensianam“ appellatam meoque exemplari Haliciano simillimam. Ex accurate comparatione amborum exemplarium haud dubie apparuit, specimen Mannianum cum meo identicem non esse. In museo Palatini Vindobonensis nulla invenitur Tortrix, quae cum mea specie congrueret. Summa cum perseverantia animique intentione icones inspicere et descriptiones legere etiam non deeram, sed nihil tale invenire mihi licuit, quod in meam Tortricem quadraret.

Habitus et magnitudo Diversanae; latitudo 9'', longitudo 3½''.

Caput cum thorace luteo—, seapulæ fusco-griseæ; abdomen fuscum, barba analis luteola, pedes albido-fusci.

Alarum anteriorum aream basalem minorem fundo obscuriorem terminat obsoletior linea arcuata subinterrupta fusca, ante costam evanescens et basin versus concava. Per medium tendit oblique extorsumque fascia utrinque angulata fusca, quae nullibi est interrupta, in costa media incipit et non sicut apud Diversanam prope angulum analem, sed remotius

*) Ultimas syllabas ana et ella, quae Tortricum Tinearumque nominibus adjunguntur, praeaccountibus Illustrissimis Fabricio, Zellerio aliisque in meis speciebus novis omitto.

**) Maxima Clarissimi Besseri de historia naturali merita nuntiabunt etiam Bessera azurea Schultes, Carabus Besseri Fischer, Brachycerus Besseri Schönnherr, Marmaropus Besseri Schönnherr, Chrysomela Besseri Krynicki.

finitur. Huc accedit, quod haec fascia media in specie nostra pone costam est latissima, versus marginem anteriorem autem aequaliter fit angustior, quem fascia media Diversanae costam versus coaretatur, dorsum versus dilatatur. Costa inermis; apex et angulus posticus non prominuli; limbus subverticalis.

Macula costalis anteapicalis, quae in numerosis Diversanae exemplaribus meae collectionis semper plus minus distincta adest, in Tortrice Besseri nec conspicitur nec ullis signaturis est indicata.

Regio angusta inter lineam baseos fasciamque medianam antice penitus innotata, postice aliquot strigulis in plura triangula positis est signata. In area limbali magna disjectae sunt crassae strigulae transversae fuscae, partim distinctissimae partim obsoletiores, porro rectae vel subarcuatae tribuuntque alis simul cum nervis tenuibus obscurioribus aspectum reticulatum.

Linea limbalis alarum anticarum nigricans extremis alae strigulis obsessa; cilia dimidii apicalis obscuriora subdimidio basali flavescentia, apice exalbida, squamis crassis nigris passim dense (sub apice) inspersis subdivis. Linea limbalis alarum posticarum alis vix obscurior; ciliarum linea dividens subfuscens.

Pagina inferior alarum omnium fuscescens-grisea, anteriorum vix obscurior. Alae posticae non sunt reticulatae, in anticis sola costa vix conspicue est strigulata.

747. Ameriana L. „Alis anter. ferrugineis, subviolaceo-tinctis, linea liturave fasciaeformi diffluent media maculisque duabus (una costali ante apicem effusa, una ex angulo ani versus costalem) fuscis, limbo ciliisque quasi ambustis; poster. cinerascentibus, apice late aurantiacis“. 12". FR. 43, 44; HS. IV. 156; H. 124; OT. VIII. 49. Provenit solitarie Junio-Aug. in sepibus pomariorum circa S. et L., satis multa vero in quercetis R. g., L. in Rak., Wozn. in Stup. et in mixtis silvaticis ditionis Leopolitanae.

748. Pieceana L. „Alis anter. ferrugineis, subroseo tinctis, apice, maculis duabus costalibus, una ex angulo ani strigulisque transversis crebris fuscis, stria longitudinali disci medii brevicula nigricante; poster. vix apice aurantiacis.“ Magnitudo prioris. HS. IV. 157; FR. 43; H. 264; 564. OT. VIII. 65. Hucusque semel unicum exemplar masculum 2 Aug. in Abiete pectinata in silvula Jedlina prope munimenta in Stup. (comitibus 1171, 1057, 827, 697, 695, 692, 682, 613, 560, 508, 462, 455, 461, 491, 492, 424, 448, 449, 434, 431, 429, 550, 1177, 1103, 768, 766, 682, 104, 93, 92, 89, 86, 83, 72—79, 69, 68, 67, 6.

749. Xylosteana L. „Alis anter. subolivaceis, ferrugineo-mixtis, fascia media, maculis tribus (una dorsi pone basin verticali, una costae ante apicem quadrata, una ex angulo ani) apiceque subcinnamomeis brunneove-fuscis; poster. fusco-cinereis.“ 9—11”. HS. IV. 157; H. 125; FR. 45; OT. VIII. 55. Quotannis copiosa Junio-Aug. in variis silvis, praecipue quercetis, per omne terr. in humiliores montes usque.

750. Crataegana Hüb. 126. 107. „Alis anter. luteo-griseis, macula una baseos, una costali versus angulum ani producta, fascia media disco dilatata subdentata limboque castaneis.“ 10—11.” FR. 45; HS. IV. 157; OT. VIII. 57. Solitatum Junio Julioque in quercetis R. g. et Euh in Rak.

751. Laevigana SV. „Alis anter. griseo-testaceis, signaturis plerumque haud determinatis obsoletissimisque; macula una basali, una costali ante apicem (latere postico versus angulum ani continuata) fasciaque media obliqua antice linearis postice dilatata fuscis; poster. intense cinereis, apice ochraceis; omnibus subtus dimidiato luteis.“ 10”. FR. 11; H. 117. 118. 302; HS. IV. 159; OT. VIII. 62. Quotannis communissima Julio in dumosis, lucis, silvaticisque circa R. g. et L.

752. Dumetana FR. 20. „Alis anter. subreticulatis dilute fuscouscentibus, area basali, fascia media obliqua utrinque acute terminata, macula costali lineolaque ex ea versus angulum ani continuata obscurioribus; poster. flavidо-albis, apice infra ochraceis, subtus lineolis transversis fuscis.“ 9”. HS. IV. 160; OT. X. 3. 60. Exemplaria 4 ad coll. quercreti R. g. marginem 21. et 31. Julii (sociis 477 et 1320. 1308. 1206. 1171. 1110. 1103. 936. 984. 851, 857. 850. 853. 779. 778. 766. 758. 697. 682. 671. 631. 692. 616. 697. 625. 560. 544. 429. 461. 357. 492. 448. 462. 319. 455. 93. 92. 86. 83. 72. 57. 26). Omnia specimina de vetustis Quercubus marginalibus excitavi.

753. Gerningana SV. „Alis anter. flavo-brunneis, fascia media obliqua (limbum versus paululum inflata) maculaque costae ante apicem magna versus angulum ani continuata rufescenti-ferrugineis, area basali fundo non obscuriore; poster. flavidо-cinereis; antennis pectinatis.“ 9”. HS. IV. 160. f. 239; H. 108; OT. VIII. 72. Hucusque unicum exemplar masculum 10. Julii ad marginem silvulae betulinae in mixtis silvaticis collinorum Świnika prope H.

754. Consimilana Hüb. 239. „Alis anter. pallide aureis, parte areae basalis supra dorsum, fascia media obliqua (limbum versus inacute determinata), macula costali effusa lineolaque ex ea versus ang. ani continuata fulvo-brunneis; poster. antice albidis, postice dilutis canescentibus.“ 8”. HS. IV. 160. f. 54. 347; OT. VIII. 75. Universim satis frequens quidem, sed ubique solitaria dispersaque. Reperitur praecipue in quercetis ditionum R. g., Cz., Stup., Rak. et Liš. Julio.

755. Diversana Hüb. 251. „Aliis anter. pallidis griseolutescentibus, tenuissime obscurius reticulatis, fascia media obliqua interrupta maculaque costae ante apicem (saepe continuata posticeque cum fascia confluenta) fuscis; poster. griseis, subtus exalbidis fuscoque strigulatis.“ 9—11”. HS. IV. 161. f. 50—52; OT. VIII. 176. Quotannis vulgaris Junio et Julio per cunetum terr. humilius.

756. Orana FR. 9. „Aliis anter. ferrugineis, tenuissime dense cinnamomeo-reticulatis, fascia media maculaque costali obsoletis vix obscurioribus; poster. cinereis.“ 8—10”. Hüb. 271; HS. IV. 161; OT. X. 3. 61. Samboriae Leopolique specimina singula Julio in pomariorum sepiminibus.

757. Pilleriana SV. „Alis anter. nitidis orichalceis ochraceisve, macula dorsali baseos, fasciis duabus (una ante, una post medium) limboque fuscis ferrugineisve; poster. fuscescentibus.“ 8—11”. HS. IV. 162. f. 349; H. 136. 172; OT. VIII. 73. Exemplar alterum inter frutices ad ripas montani rivuli pratensis in Wolcze, alterum in Quereu ad marginem coll. quereti Ė. in R. (comitibus 6. 1195. etc.). Julio.

758. Grotiana Fabr. „Alis anter. aureo-flavicanibus, tenuissime rufo strigulatis, basi, fascia media obliqua interrupta constrictave et macula costali (postice cum fascia saepe confluenta) fuscis; poster. fuscescentibus.“ 8.” HS. IV. 162; FR. 11; H. 133; OT. VIII. 81. Reperitur frequenter Julio in silvaticis circa R. g., Cz., D, L. et J. Incola Quercuum.

759. Ochreana Hub. 134. „Aureoflava; fascia media obliqua ferruginea cum tali macula costali postice confluxae maculum minorem ochraceam intercludunt; alae poster. obscure-cinereae.“ Major Gerningana. HS. IV. 162; OT. VIII. 84. Hucusque specimen singulum 23. Junii (sociis 215 etc.) in nemore fruticoso ad betuletum K. prope Leopolim.

760. Strigana Hüb. 141. „Alis anter. aureolis nitidis, strigis duabus (altera baseos breviore, altera media) obliquis maculaque costali ante apicem (saepe plus minus versus angulum analem continuato) carneo-cinnamomeis; poster. colore variantibus.“ 8 - 10”. HS. IV. 163; OT. VIII. 80. Aliquot exemplaria inveni 12. Junii et 3. Julii (sociis: 1309, 998 etc.) prope J. in collinorum P.-S. sterilibus sabuletisque apertis. In Leopolitano arenoso monticulo W. z. satis frequenter volitat.

761. Gnomana L. „Alis anter. ochroleucis sericeis, fascia media obliqua (in costa distinctissima, postice obsoletissima) plures interrupta maculaque costali anteapicali fusco-rubentibus; area basali non obscuriore; poster. exalbidis.“ 8”. Costana SV. FR. 10; HS. IV. 164; OT. VIII. 79. Exemplar unicum (sociis 1300 etc.) 5. Junii inter coryleta mixtarum silvarum circa pagum R. g. In Halicia rarissima esse videtur.

762. Adjunctana Tr. VIII. 54. „Fusco-grisea, maculis duabus (altera costae mediae, altera apicis) obscurioribus. Alae poster. cinerascentes, apice anguste obscuriores.“ 11.” Viburnanae similis. FR. 9; HS. IV. 164, Exemplar singulum 3. Julii inter quercea Pinique silvestris frutecta in calcareis collinis Szyp (vide 998).

763. Sorbiiana Hüb. 113. „Alis anter. sericeis, flavescenti-griseis, area basali, fascia media obliqua interrupta (antice angusta, postice versus angulum ani effusa) maculaque postica costali unicoloribus olivaceis; poster. fusco-nigricantibus; omnium limbo subtus late flavo.“ 13.” HS. IV. 165; OT. VIII. 51. Volitat frequenter in coll. silvaticis circa R. g. et J. In aliis regionibus hucusque obvia mihi non fuit.

764. Cerasana Hüb. 119. „Alis anter. alutaceo-flavescens, dimidio interno nigro-fumatis, area basali, fascia media integra fusco-marginata maculaque costae anteapicali subferrugineis; poster. fuscescentibus.“ 9-11.” HS. IV. 165; OT. VIII. 69. Frequens toto Junio, satis multa Julio — Sept. in variis silvaticis coll. ditionum R. g., Rak. et L.

765. Cinnamomeana Tr. VIII. 61. „Alis anter. cinnamomeis, basi, fascia media obliqua indentata maculaque costali anteapicali subrubiginosis pallideque marginatis; poster. cinereis; capite, palpis antennisque albidis. 8”. FR. 9; HS. IV. 166. Exemplaria plura in silvaticis circa R. g. et Cz. sk. Junio.

766. Meparana SV. „*Alis anter. hepaticis, basi, fascia media disco dentata maculaque anteapicali obscurioribus; poster. obscure cinereis; capite alis anter. concolore.*“ 9 - $11\frac{1}{2}$ ”. HS. IV. 166; H. 116; OT. VIII. 58. Quotauis vulgatissima Julio et Aug. in pomariorum sepibus et in silvaticis terr. cuneti a pl. usque ad alpestres regiones (*H. w.*, *U. g.*, *Sle.*).

767. Ribeana Hüb. 114. „*Alis anter. ochroleuco-flavescens, area basali, fascia media, macula costae anteapicali ciliisque obscurioribus; poster. obscure fuscis.*“ 8- $10\frac{1}{2}$ ”. HS. IV. 166. OT. VIII. 67. Vulgaris in pomariorum septis, porro in silvaticis per omne terr. in humiliores montes usque. Junio.

768. Corylana Fabr. „*Alis anter. alutaceo-flavis, cinnamomeo reticulatis, basi, fascia media maculaque costae anteapicali cinnamomeis; poster. cinerascentibus, apice albidis.*“ 12”. HS. IV. 167; OT. VIII. 66; H. 115. Frequens Aug. et Sept. in marginibus coryletisque silvarum per omne terr. usque ad promontoria. (*Argyrotoxa Wood*).

769. Holmiana L. „*Alis anter. fulvis, postice subviolaceis, maeula costae media trigona nivea.*“ 6”. HS. IV. 169; OT. VIII. 124; H. 39. Specimina plura Julio et Aug. in coryletis silvarum circa *R. g.*, inter zizania ad hortorum sepimina in pago *M.*, ad marginem querceti *L.* in *R.* et in monticulo *W.* z.

770. Bergmanniana L. „*Alis anter. citrinis, postice ferrugineo-reticulatis, costa striaque limbali obscurius -, fasciis duabus mediis irregularibus dilutius-aurantiacis, plumbeo-maculatis; poster. cinerascentibus.*“ 6 $\frac{1}{2}$ ”. HS. IV. 170; OT. VIII. 121; H. 137. 340. Communis Junio Julioque in rosetis, dumetis et in silvarum marginibus, in quibus Rosae crescunt. Inveni eam hueusque solum circa *R. g.*, *L.* et *J.*.

771. Forskaeleana L. „*Alis anter. flavis, ferrugineo reticulatis, costa, fascia media unica rectangulariter fracta striaque limbali fuscis; poster. aureolis.*“ Magnitudo prioris. HS. IV. 171; OT. VIII. 120; H. 143. Hucusque semel specimina duo sub finem Junii (sociis 460 etc.) inter virguleta querceti *R. g.*

772. Loefflingiana L. „*Alis anter. stramineis flavis, ferrugineo-signatis, strigis quattuor (una baseos, duabus mediis, una limbali) fuscis, vix plumbeis; poster. cinereis.*“ 9”. Plumbana

Hub. 190, 54; *HS.* IV. 170; *OT.* VIII. 118. Exemplaria duo (sociis 328 etc.) inter quercea fruticeta *Zapole prope Hołosko*.

(*Ptycholoma* Wood.)

773. Lecheana L. „*Alis anter. fuscis, aequaliter fulvo squamatis, strigis duabus mediis maculisque pluribus disjectis plumbeis; poster. obscure fuscis.*“ 10.” *Leacheana* L. *HS.* 171; *OT.* VIII. 106. Reperitur quotannis solitatum Junio in quercetis vel in Quercubus mixtarum silvarum circa *R. g.*, *Stup.* et *L.* (vide 205). In septis pomariorum et hortorum *Leopolitanorum* rarissima.

(*Tortrix* L.)

774. Viridana L. „*Alis anter. prasinis, costa albida; poster. cinereis.*“ 10½.” *HS.* IV. 172; *OT.* VIII. 96; *H.* 156. Communissima Junio et Julio in silvaticis per cunctum terr. in montosa usque. Anno 1856. vidi eam innumerosam catervatimque non solum in frond. silvaticis pagi *R. g.*, sed etiam in contermino piceto vetusto circa pagum *Uherce*.

775. Rusticana Tr. VIII. 95. „*Alis anter. maris cervinis, feminae sulphureis, subtilissime ferrugineo-reticulatis; poster. cinereis.*“ 7.” *HS.* IV. 173; *FR.* 10; *H.* 102. Volitat solitatum Majo per herbosa in betuleto *Lw.* et in silvigero monticulo *Cz. sk.* prope *Leopolim* (sociis 689, 993 etc.).

776. Viburnana SV. „*Alis anter. innotatis, maris ochraceis, feminae fuscogriseis; poster. obscure-cinereis.*“ 10.” *HS.* IV. 173, f. 45; *OT.* VIII. 300. Semel exemplaria tria (2 mares, 1 fem.) in coryletis silvaticorum *R. g.* 13. Julii (comitibus; 83, 92, 93, 153, 186, 237, 319, 429, 430, 452, 509, 581, 607, 692, 725, 738, 747, 749, 751, 758, 754, 764, 766, 811, 818, 823, 827, 856, 859, 870, 877, 901, 983, 1012, 1050, 1051, 1057, 1058, 1066, 1069, 1078, 1105, 1125, 1131, 1158, 1126, 1163, 1170, 1171, 1174, 1179, 1172 1205, 1206, 1234, 1235, 1250, 1259, 1262, 1269, 1294, 1313, 1316, 1308, 1329, 1336, 1341, 1346).

(*Lophoderus* Steph.)

777. Ministrana L. „*Alis anter. fulvis nitidis, per medium basale limboque cinnamomeis, maculis duabus fasciam medium indicantibus obscurioribus, puncto centrali albido; poster. cinereis.*“ 10—13.” *HS.* IV. 175; *OT.* VIII. 89. Quotannis vulgatissima Majo Junioque in silvis, lucis dumetisque per omne terr. in montosa usque.

(*Xanthosetia Steph.*)

778. Hamana L. „Alis anter. citrinis, puncto antico supra dorsum strigaque hamata in dimidio limbali ferrugineis; poster. fusco-cinereis; ciliis albidis.“ 11.” HS. IV. 175; H. 139, 140; OT. VIII. 85. Copiosa Junio-Aug. in hortis, pratis, prosilviis cultisque per terr. cunctum a pl. in alpestria usque (U. g., Žabie).

779. Zoegana SV. „Alis anter. vitelinis, puncto antico supra dorsum castaneo, striga angulata postica limboque castaneo-rufis confluentibus, maculam fundo concoloram suborbicularem includentibus; poster. fuscouscentibus; ciliis rufo-aureolis.“ 9.” HS. IV. 176; H. 138; OT. VIII. 87. Speciem hanc inveni frequenter in convallibus montanis circa W. (cum priore, 6 etc.), porro satis multam in pratis silvarumque herbosis circa R. g., Cz., J. et L. In urbium pagorumque hortis quoque adest, unde pervesperi in domicilia collustrata involat. 23. Juuii—14. Aug.

(*Cochylis Tr.*)

780. Decimana SV. „Alis anter. cinnamomeis, strigis contiguis subflexuosis plumbeis, maculis 4—5 (una baseos, duabus in costae dorsique dimidio, quarta majore duabusve minoribus pustulaeformibus ante limbum) colore fundi (in media ola literam H effidente) sejunetis citrinis; poster. fusco-nigris.“ 7—9.” HS. IV. 181; H. 145; OT. VIII. 112. Volitat frequenter inter coryleta alneti in mixtis silvaticis pagi R. g., porro solitatum in coll. ditionibus Stup., Cz. et L. Majo, Junio.

781. Tesserana SV. „Alis anter. cinnamomeis, strigis contiguis subflexuosis plumbeis, maculis 5 (prima pone basin, secunda ante medium costae, tertia in dorsi dimidio, quarta costali longe ante apicem, quinta ad limbi dimidium) subcontiguis citrinis. Color fundi imitatur in sinistra ala signaturam IAH.“ Magnitudine mediocre Decimanae specimina adaequat. HS. IV. 181. f. 327; H. 144; OT. VIII. 111. Specimina plura inter fructecta betuleti Lv., in querceto P. R. et in floridis pratis vallium mont. circa W. (vide 1309, 6 etc.). Junio, Julio.

782. Baumanniana SV. „Alis anter. exalbidis nitidis, macula humerali fasciisque duabus introrsum obliquis cinnamomeo-rufis, punctis subargenteis; poster. cinereis.“ 8.” HS. IV. 184; H. 146; OT. VIII. 113. Volitat copiose socialiterque in subsilvatico

prato humido P. L. Vulgarem inveni eam secus in apertis pratis circa L. et in siccis sterilibus elatis ante silvigerum montem Magóra prope oppidulum Łomna. Majo et Junio.

783. Rubigana Tr. „Alis anter. ochroleuco-sulphureis nitidis, basi, fascia media angulata basim versus obliqua, macula una costali, una ante ang. ani rubigineis, strigis argenteis; poster. nigro-fuscis.“ 10” HS. IV. 185; H. 147; OT. VIII. 117. Vulgatissima in pratis aridis paludosisque, in sterilibus silvarumque excisis per cunctum terr. usque ad regiones montanas (Mag.). 22. Maii—24 Julii.

784. Amiantana Hüb. 155. „Alis ant. pallide-stramineis, argenteo rivulatis, basi, fascia media subrecta, limbo ciliisque rufis; poster. fusco cinereis, albido ciliatis.“ 8”. HS. IV. 191; OT. VIII. 115. Hucusque semel exemplar unicum 3. Julii inter collinorum Szyp frutices querceos (vide 998 etc.).

(*Euchromia* Steph.)

785. Rosetana Hüb. „Alis ant. unicoloribus ferrugineis, maculis minutulis subrotundis inordinate congestis plumbeis; poster. fusco-cinereis 8 - 9”. HS. IV. 204; OT. VIII. 94. Volitat frequenter circa L. in sabuletis monticuli W. z. et in florido dumosoque pratulo ad betuleti K. marginem, porro in collinorum P. - S. sterilibus sabuletisque. Junio. Jisdem in locis et tempore volant species 760, 788, 982, 1180, 1183, 1090, 1309 etc. Circa Samboriam ei pagum R. g. non reperitur.

786. Maurana Hüb. 122. „Alis anter. serieis fusco-griseis, basi fasciaque media indeterminata obsoletissimis paulo obscenioribus; poster. pallidioribus, capite lutescente.“ 11½”. HS. IV. 205; OT. VIII. 91. Reperitur quotannis solitarie in Alnis glutinosis ad coll. querceti R. g. marginem.

Var. Viduana Hüb. 303. „Alis anter. pallide cinereis, basi fasciaque media irregulari (in dorso diffluente) distinctis, fusco-griseis; poster. fuscescensibus.“ 9 - 13.” Frequentior specie primaria. quacum mixtim invenitur.

Exemplaria omnia, quae possideo, ab 19. Junii - 11. Julii de Alnis glutinosis excitavi. Excepto pago R. g. obvium mihi fuit per omnes annos exemplar unicum etiam in querceto Łuh prope vicum Rak. Alia eodem tempore cum Maurana volitania lepidoptera circa species 158, 561, 1238, 632, 149, 451, 1195, enumeravi.

(*Sciaphila* Tr.)

787. Cinetana SV. „*Alis anter. margaritaceo-niveis, basi, fascia media subobliqua cuspidigera maculaque apicis ferrugineis, punctis sparsis nigris; atomis areæ limbalis cæsiis; poster. cinereis.*“ 9”. HS. IV. 196; H. 132; OT. VIII. 76. Hucusque semel exemplaria duo initio Ang. (sociis 1152 etc.) ad margines luci Dąbrówka. Exemplar alterum in Queren, alterum in Alno glutinosa abditum latebat.

Ameriana occurit secus per Eur. usque ad Angliam et Sueciam. — *Xylost. u. ad Liv.*, *Sueciam Angliamque*. — *Dumetana*: in Hung., Bavaria — *Piller.*: in Austria, Hung., Gallia, Liconia. — *Decim.*: in Alpibus pratisque mont., in Austria, Bav., Sax. — *Amianth.* in Austria Hung. — *Rosetana*: ad Vindob. alibi quis in Eur. media solitatem, in *Liv. vulgaris*. — *Species* 760, 761, 769, 772, 774 — 777, 779, 781, 782, 783, 787 reperiuntur usque ad Liconiam; *species* 748, 770, 771, 773, 778 usque ad Sueciam et *Liv.*; *species* 750, 751, 753 — 756, 758, 759, 762 — 768, 786 usque ad Angliam et Liconiam.

Argyroptera Dup.

(*Ablabia* Steph.)

788. Pratana Hüb. 227, 228. „*Testaceo-grisea, sericea, punctis aliquot majoribus fuscis.*“ 9” HS. IV. 178; OT. VIII. 101. Innumerousam vidi eam in pratis humidiuseulis prope D. et in pratis siccis valium mont. circa W. Plura specimina reperi secus in sterilibus circa J. Quod consocios adtinet vide 1195, 6, 998 etc.). Regionibus Samboriae deesse videtur.

789. Gouana L. „*Alis anter. niveo - argenteis, subtus fuliginosis; poster. utrinque albis.*“ 12” HS. IV. 177; H. 225, 226, 86, 48; OT. VIII. 102. Exemplaria tria 23. Junii in quereti *P. humido pratulo intersilvatico* (simul cum 654 etc.).

Ambae species reperiuntur secus per Eur. usque ad Liconiam.

Coccyx Tr.

790. Comitana SV. HS. IV. 219; OT. VIII. 132; *Piceana* Hüb. 72. Volitavit copiose 25. Maji et 9. Junii in piceto *Ska.* (simul cum: 19, 24, 26, 41, 26, 60, 100, 116, 156, 199, 236, 284, 427, 428, 446, 472, 491, 504, 510, 535, 547, 550, 559, 564, 622, 623, 628, 638, 663, 700, 733, 743, 777, 782, 816, 875, 880, 900, 901, 953, 994, 1038, 1048, 1049, 1138, 1319, porro 328 etc.)

791. Nigricana Mann. HS. IV. 220, f. 138. Hucusque semel exemplar unicum (sociis 746 etc.) 29. Junii in marginali Abiete pect. in piceto *Jedlina*.

792. Resinana L. Hüb. 29; HS. IV. 221; OT. VIII. 128.
Initio Maji 1854. legi in pinetis circa pagum Bce. copiosas gallas
resinaceas, ex quibus 22. Maji Samboriae plures papiliuneli pul-
cherrimi exierunt. Postea inveni eam solitariam in fruticosis Pi-
nis silv. in collinis P.-S. prope Janow.

793. Buoliana SV. HS. IV. 221, f. 49; II. 154; OT. VIII.
140. Eleganter haec speciem inveni prope J. Julio (sociis: 794,
958, 959, 494, 1150, etc.) in Pinis silv. calcareo-arenosorum col-
linorum P.-S. Specimina hucusque lecta suat minora colorisque
dilutioris, quam illa, quae Vindobonae in variis vidi collectionibus.

794. Pudendana FR (*Pinicorana* Zell). „Alis anter.
dilutius obscuriusque latritius; cinereo ochrotruncace rivelosis; po-
ster. fusco-cinereis.“ 7. HS. IV. 222. fig. 149, 150. Viget in
Pinis silv. eodem ac prior loco. Duo spec. pulchra 12 Junii, tertium
paullo decoloratum 3. Julii excitavi. Quoad consocios vide 1309 et 998.
(*Steganoptyla* Steph.)

795. Pygmaeana Hüb. 69. HS. IV. 281; OT. VIII. 135.
Vagabatur frequenter 22. Maji (sociis: 1294, 826, 816, 782, 777,
716, 705, 689, 639, 600, 599, 599½, 512, 410, 398, 100, 88,
66, 25.) per frutices fagetii in cæcumine montis Mag. Unum spe-
cimen reperi praeterea 29. Maji (comitibus: 1086 etc.) in Rubo
idaeo ad coll. silvae R. g. marginem. Omnia exemplaria lecta
sunt plus minus obsoleta.

(*Strophedra* HS.)

796. Vigeliana Heyd. (*Rotundana* FR.) HS. V. 94. f. 195.
Satis multa Junio Julioque in dumetis et in lucorum silvarumque
marginibus circa R. g., D. et L.

Comit. et Resin. reperiuntur secus per Eur. usque ad Laponiam; prior
etiam in Alpibus.—*Buoliana* et *Pygmaeana* u. ad Liv.—Nigris. in Bohemia, Austria,
ad Ratisb. — *Pudendana*: in Germ. bor., circa Vindob., Ratisb. in Lironia.—
Vigeliana: in montibus Sudetis alibi per Eur. u. ad Sueciam.

Sericoris Tr.

797. Trifoliana Hüb. HS. IV. 209. Reperi eam Sam-
boriae Leopolique in pomariis floralibusque in agris Trifolio con-
sitis ante silvatica circa R. g., in solanorum agris circa M. et in
mont. vallium pratis fruticetisque ad agrorum margines circa W.
(exemplaria minima). Junio-Aug. Ubivis solitaria.

797. Striana *SV. HS. IV.* 209; *H. 66.* 260; *OT. VIII.* 178.
Volgatissima Junio Julioque in pratis, fruticosis silvarumque um-
brosis per cunctum terr. a pl. usque ad montanas regiones.

799. Mygindana *SV. HS. IV.* 210; *H. 181.* Hucusque
semel exemplaria duo (simul cum 1309 etc.) 12. Junii in cam-
pestris pineti *R. excisis*, ubi Vacc. myrtillus et Fragaria vesca
ingenti crescunt numero.

800. Conchana *Hüb. 106. HS. IV.* 213; *OT. VIII.* 148.
Copiosa Junio decrescenteque numero usque ad Sept. in pratis,
dumosis herbidisque fruticetis per omne terr. in alpestria et
alpina usque (W., U. g., Czhra.).

801. Cespitana *Hüb. 244, 245; HS. IV.* 213; *OT. VIII.*
152. Numerosam inveni eam in prato humido *St. w. l.* penes quer-
cetum *L. in R.*, porro satis multam in humidis pratis *B. l.*; *P. L.*,
P. W., et *Max.* Junio, Julio.

802. Umbrosana *Zell. HS. IV.* 215; f. 207. 208. Quot-
annis communissima Junio in pratis, nemoribus, dumetis fru-
ticetisque humidiusculis per omne terr. in montosa usque.

803. Laeunana *SV. HS. IV.* 215. f. 338-340. Innume-
rosa Majo-Julio ubique locorum per terr. cunctum in alpina usque,

804. Rurestrana *FR. HS. IV.* 215. f. 211, 212. Ali-
quot exemplaria initio Junii in humidi prati *P. L.* dumosis marginibus.

805. Urticana *Hüb. 65. HS. IV.* 215. f. 209, 210; *OT.*
VIII. 145. Hucusque exemplar unicum 30. Junii (sociis 460 etc.)
in spineto ad coll. querceti *P. marginem*. Verisimiliter parum
tantum a me observata.

806. Venustana *Hüb. 326. (Implicana Kuhlw.; Der-
moyana Dup.), HS. IV.* 216. f. 187, 188. Singula specimina (so-
ciis 158, 998 etc.) 19. Junii et 3. Julii in coll. quercetis *R. g.*
et *P. R.* Rarissima esse videtur.

807. Bipunctana *Tr. VIII.* 154; *HS. IV.* 217. f. 230.
Semel exemplar unicum (sociis 482, 832, 945 etc.) 1. Julii in Quercu
mixtorum sylvaticorum ad pedem monticuli *Cz. sk.*

808. Charpentierana *Tr. VIII.* 153; *HS. IV.* 218. f.
204. Exemplaria ambo, quae in collectione habeo, Julio de ces-
pitibus Vacc. vitis ideae et de Rhododendro ferrugineo in alpibus
Pikuj et *Szpyci* excitavi.

809. Textana Hüb. 307—309. HS. f. 39. „*Alis anter. nigris, fascia ad 1/3 (nigro-interrupta), macula costali anteapicali effusa anguloque ani flavidis; ciliis nigris ochroleuco-bidivisis; poster. fuscis.*“ Magnitudo Urticanae. Hucusque inveni exemplaria duo; alterum pulchrum 5. Junii (sociis 1300 etc.) in luxurianti rubeto in mixtis sylvaticis pagi *R. g.*, alterum obsoletum (comitibus Margaritaria, Matronula, Mayrella etc.) 11. Julii in Queren marginali in sylvaticis fagineis prope K.

(*Argyrotoxa* Wood.)

810. Bifasciana HB. HS. IV. 171, f. 62. „*Alis anter. fuscis, plumbeo-strigulatis, fascia media indeterminata obsoleta, apice ciliisque ochraceis; poster. obscure cinereis.*“ Magnitudo Implicanae. Hucusque semel exemplar unicum (sociis 447 etc.) 21. Julii media in silva pagi *R. g.* Latitabat ibidem in Spirea (per cunctam fere silvam luxuriante) tali loco, ubi diversae arbores sylvaticæ spissæ promiscueque crescunt.

(*Coccyx* Tr.)

811. Rufimitrana FR. HS. IV. 220. f. 139. Semel specimen unicum (sociis 776 etc.) 13. Julii in sylvaticis *R. g.* in Symphyto pannonicō, quod ibidem in saltus parietibus densum hinc inde singit tegile.

Trifoliana provenit secus in Palat. sup., circa Ratisb. etc. — Species 798—803 per Eur. usque ad Liv. — Rurestr.: hic illuc in Eur. — Urtic.: in Germ. etc. — Venust.: in Silesia, circa Ratisb., Neostr., Berolinum — Bipunct.: in Boh., Silesia, ad Ratisb., in Palat. sup., Liv., Lapponia. — *Bifasciana*: in Bohemia, Crania et circa Megalopolim; Junio. Rarissima. — *Rufimitr.*: in silvis Abietis excelsae in Boh., circa Vindob., Ratisb. — In Alpibus volitant species 808, 798, 799, 803; in silva Hercinia species 801. — De geogr. distrib. *Textanae* nihil certi profere possum. Affirmante Josepho Mann est ea usque adhuc species rarissima.

Aspis Tr.

812. Udmanniana L. FR. 91; HS. IV. 248. H. 49; OT. VIII. 157. Singulis speciminibus reperi eam *Samboriae* in pomarii septo, prope Kki. inter Iuci herbosa fruticeta marginalia et ad pedem monticuli Cz. sk. inter zizania ad fagitorum marginem (vide 321, 890, 945 etc.). Satis frequenter obvia mihi fuit haec species simul cum Bergmanniana in rosetis ad mixti pineti *R. marginem*. In rubetis frustra eam per annos quaesivi. Junio, Julio,

Per Europam ad Livoniam usque.

*

Carpocapsa Tr.

814. Pomonana SV., *Alis anter. violaceo-cinereis, fusco-rivulosis, area tertia fusca, speculo innotato aureo-marginato.** HS. IV. 251; H. 30; OT. VIII. 161. Frequens Majo et Julio Samboriae Leopolique in pomariorum sepiminibus. Anno 1854. pomorum ubertate insigni, apparuit Pomonana Samboriae magno numero.

(*Grapholitha* Tr.)

813. Lobarzewskii sp. n.

„Minor; alis anterioribus aureolis, confuse creberrime fusco-rivulosis, laete cupreo-tinctis, speculo majori fumato flavescenti-limitato, medio fusescenti-luteo, nigro - quadripustulato; ciliis aureolis, apice versus limbi medium obscurioribus; alis posterioribus unicoloribus nigricantibus, ciliis exalbidis.“

Mirum hunc papiliunculum insignio nomine Doctissimi **Hyacinthi de Lobarzewski**, C. R. Acadamiae Leopolitanae Professoris, vegetationis Haliciae scrutatoris indefessi scriptorisque bene meriti. *)

Detexi eum initio Junii in urbe Samboria, quum rus evolans quasi forte fortuna zizania et urticeta sub horreo in pomario luxuriantia per septum percussus sum. Ex ambobus speciminiibus pulcherrimis hucusque a me captis masculum septima, feminineum decima Junii eodem in loco excitavi. Quoad alias iisdem diebus Samboriae inventas species videant lectores Gonophoram Derasam et Lariam V-nigrum.

Cum *Carpocapsa* (*Grapholitha*) Woeberiana, qua multo est minor, remotiorem tantum habet similitudinem. Excepta ad summum etiam *Grapholitha minutana* nullas alias *Tortricum Haliciensium* species in collectione possideo, quas nostra magis adaequaret quibuscumque accuratius comparari possit. In Vindobonensibus collectionibus nec non in iconographicis operibus nullum quoque inveniri microlepidopteron, quod cum specimine meo identicum eique consentaneum sit. oculis habeo compunctiones motilis, sed animata, sed et leviter motilis.

*) Celeberrimus Italorum *Algologus Trevisan* in opere suo „Saggio di una monografia delle Alghe coccothale, Padova 1848. genus quoddam Diatomacearum „Lobarzewskyam“ vocavit.

tum. Quum denique ex Iaclyto Lepidopterologo Mann quaererem, quid de meo specimine sentiat, primo aspectu mihi respondit hanc speciem sibi ignotam esse.

Tota latitudo $6\frac{1}{2}''$; longitudo $2\frac{3}{4}''$. Alae anter. $3''$ longae, $1''$ latae. Antennae filiformes fuscae, dimidium costae subaequantes. Oculi magni globosi nigri.

Palpi breves, ochroleuci, prominuli, eorum articulus penultimus subarcuatus squamis densis elongatis subtus divergentibus incrassatus ad minimum duplo longior articulo apicali conico, inermi. Capilli fasciculati obscure ferruginei; frons argyrea nitida; collare, thorax et scapulae fuscocrescenti-aureola; abdomen fusco-einereum, barba analis flava, squamis nigris pareiter mixta.

Pedes subtus ochroleuci, infra fuscocrescentes; tarsi articulo basali longissimo alternatim luteo fusoque annulati; tibiae femoraque biaculeata.

Alae anteriores subaequatae, posterioribus subtriangularibus angustiores; costa dorso paulo longior, ambo subrecta; limbus vix obliquus dimidium dorsi aequans; apex et angulus ani non prominula.

Fundus alarum anteriorum aureolus obtegitur congestis lineolis transversis dilutius obscuriusque fuscis, atam totam potissime in majori parte basali undatim perecurrentibus. Areolae minusculae inter has lineolas fuscas colore fundi item in rivulorum forma replentur, quam ob rem alae, exceptis aliquot typicis signaturis, laete fuso flavoque rivulosae memorataevidentur.

Dimidio costae apicali insident quinque hamuli simplices pallide-aurei, limbum versus spectantes ab apice decrescentes. Eorum interstitia fusca late flavidae sunt circumfluxa. Sub hamulis extenditur juxta costam ampliusecula plaga macularis tumata, plumbeo submicens paulo-que ante lineam limbalem evanescens. A hamulo quarto currunt item limbum versus serie simplici obliqua plures distinctissimae striolae longitudinales nigrae; post hamulum quintum vero invenitur in media fere costa stria transversa obliqua nigra, ad dimidium limbi apicale vergens.

Margini interiori insidet basim versus proprius macula subquadrata fuso-lutea, inaequalibus rivulis fuscis quadridivisa, alae tertium dorsale adaequans signaturisque dimidii basalis vix distinctior.

Speculum completum suborbiculare undique tenuissime flavidum est circumscriptum superatque alae dimidium dorsale. In ejus medio fumato (plagae sub hamulis concolore) conspicitur series transversa quattuor macularum intercostalium rectangularium et inaequaliter magnarum, quibus limbum versus proprius pustulæ singulæ atræ (antice majores) insident. Superiorem speculi arcum attingunt extremæ striolæ a hamulo quarto tendentes. Haec striolæ, pustulæ speculares et stria costalis media obscurissima sunt in tota ala loca.

Spatium angustum lineam limbalem inter et signum speculare fundo est subeonecolor et exceptis parce disjectis squamis obscurioribus innotatum ab angulo postico usque ad apicem. Regio ampliuscula supra speculum exceptis signaturis interpositis, quarum jam memineramus, tota colore aureolo usque ad costam repletur nullibique est rivulosa. In dorso denique adest etiam parvulus locus obscurior, lateribus speculi maculaeque dorsalis interclusus, quo quasi macula strigae costali mediae oblique opposita indicatur.

Punctum ocellare simplex utrinque distinctissimum ochroleucum, sub apice ad ipsam lineam limbalem positum, cilia ad eorum apicem dissecat.

Cilia alarum omnium brevia, antica aureola, in tertio limbi medio fuscescentia laeteque micantia; postica unicolora pallidissime aurea.

Linea ciliorum dividens simplex, obscura, ciliorum basi appropinquata. Pagina alarum inferior fusco-cinerea, fusco-cupreo micans. Praeter ochroleuea puncta hamata costalia punctumque ocellare subapicale nullae aliae dantur hic signaturae.

Mas et femina plane pares nisi quod signaturae feminae omnes sunt distinctiores et praevalent hinc inde color fuscus.

815. Woeberiana SV. „Major; alis anter. aurantiacis, fusco-variegatis, speculo purpureo-cinecto nigroque striato; poster. nigricantibus.“ 7—8.” HS. IV. 264; H. 32; OT. VIII. 164. Samboriae rarissima (per sex annos specimen unicum), Leopoli interdum satis frequens. Dedit in pomariorum sepimentis Junio.

(*Roxana Wood.*)

816. Areuana L. „Alis anter. aurantiaco-luteis, lineis 3 ex basi fasciisque 4 inaequalibus transversis plumbeis, disco stramineo, nigro-venoso et macula atra plumbeo-pustulata.“ 7—8.” HS. IV. 250; H. 33; OT. 166. VIII. Extremo Mayo totoque Junio quotannis innumerosa in frond. acerosisque silvis, in nemoribus fruticosisque per cunctum terr. in montosa usque (Magóra). Volat uno tempore cum *Nemophoris* pluribusque Adelis.

Pomon. occurit secus per Eur. usque ad Sueciam. — *Woeber.* u. ad Liv. *Rara.* — *Areuana:* u. ad Liv. et Lapp.

Sciaphila Tr.

817. Incertana Tr. X. 3. 91; HS. IV. 199. f. 121, 122. Vulgaris toto Junio initioque Julii in silvaticis per omne terr. in promontoria usque.

818. Chrysanthemana Goldegg. HS. IV. 200. Reperitur satis frequenter ab Junio usque ad Augustum in arboribus silvaticis circa Radłowice górne, Modrycz, Janow et Leopolim. Magnam habet similitudinem cum Incertana, Wahlbomiana, Communana, Alticolana, Minorana, Virgaureana, Pasivana et Musculana.*)

819. Wahlbomiana L. HS. IV. 200.; OT. VIII. 173. Vulgatissima omnium Sciaphilarum. Volat ab ultimis diebus Maji usque ad finem Julii provenitque per cuncti territorii silvatica et fruticosa a planicie usque ad regiones montanas. Variat magnopere.

820. Communana HS. IV. 200. Invenitur frequenter a Majo usque ad Julium in silvis frendosis totius territorii humilioris. Specimina plura inveni in arboribus pomiferis in montano pago Wołcze (sociis Rhombella, Horridella etc.).

821. Alticolana Koll. HS. IV. 200. Semel exemplar unicum 29. Maji (sociis Oecophora Curtisella etc.) in Populo tremula in collinae ditionis Radłowice górne mixta silvis frondosis, a montibus Carpathicis plura milliaria remotis.

822. Minorana Maun. Minusculana Zell. HS. IV. 201. Iuvenitur satis frequenter Junio initioque Julii in truncis mixtarum silvarum frondosarum circa Radłowice górne, Dobrawlany et Leopolim. Quoad consocios videant lectores Fumeam Calvellam, Argyresthiam Dzieduszyckii, Stauropum Fagi.

823. Virgaureana Tr. X. 3. 89; HS. IV. 201. Provenit vulgate toto Junio in silvaticis collinarum ditionum Radłowice górne, Dobrawlany, Czaple, Stupnica et ubivis circa Leopolim.

824. Pasivana H. HS. IV. 201. Aliquot exemplaria Julio (sociis Bot. Ferrugali, Neph. Argyrella, Arg. Dzieduszyckii, Crambo Warringtonello etc.) in dumosis et silvaticis circa Samborianam, Dobrawlany, Janow et Leopolim. (Syndemis H.)

825. Quadrana Hüb. 223. HS. IV. 277; OT. VIII. 169. Reperitur solitatem (simil cum 1086, 821 etc.) in exciso betuleto Lwowiec prope Radłowice górne, multo frequentius in silvaticis inter Leopolim et Winniki (hic sociis 1295, 1231, 1112, 1086, 1054, 1045, 901, 894, 883, 853, 821, 828, 777, 706, 601, 575, 572, 550, 544, 527, 512, 500, 499, 230, 102, 162, 156, 90, 72,

* Omnes has specieis Amplissimus Mann mihi determinavit. Exceptis Chrysanthemana et Wahlbomiana descriptiones Inelyti Schäfferi bene cum reliquis meis speciebus congruent. Wahlbomianam Schäfferianam, quae inter omnes Sciaphilas latissimas habet alas anteriores, Inelytus Mann pro Chrysanthemana habet et vice versa.

44, 13, 9, 5, 1 etc.). Volat vesperi per herbosa diligique loca aperta pratulaque intrasylvatica. Majo. Posteriori speciei similis.

826. Cuphana *Ti. HS. IV. 276.* Hucusque semel specimen tria (comitibus Pararga Hiera, Coccyge Fygmaeana etc.) 22. Maji in summo monte Magóra, cuius pars superior juveno fageto, inferior autem vetustissimo piceto est convestitus. Exemplaria capta delitebant in fruticibus frondosis ad fageti marginem; in piceto eam invenire non potui.

(*Coccyx Tr.*)

827. Ulmana *Hüb. HS. IV. 224.* Invenitur solitatum Junio et Julio in fruticosis pascuis secundum margines silvarum circa pagum Radłowice górne. Lepidoptera eodem tempore volantia adducta sunt circa species 149, 158, 632, 553, 776, 1022. Localiter tantum in Halicie provenire videtur. Gelechiae Leucatellae magnopere similis.

(*Euchromia Steph.*)

828. Terreana *Tr. X. 3. 88; HS. IV. 205.* Reperitur quotannis magno numero in querceto pagi Radłowice górne. Satis vulgarem observavi eam etiam in sylvaticis ditionis Leopolitanae aliarumque regionum usque ad elatiora Carpathorum promontoria. Incola Quercuum. Junio, Julio.

(*Cheimatophila Steph.*)

829. Hyemana *Hüb. HS. IV. 287.* Apparuit ingenti numero primo vere anni 1856. in mixtis sylvaticis pagi Radłowice górne et anno 1859. in querceto pagi Bednarówka prope Leopolim. In silvis betulineis, quae in utraque regione adsunt paululumque tantum ab supra commemoratis distant silvis eam non conspexi. Insidet copiose praecipue Corylis avellanis, quarum si rami percutiuntur, catervatim sursum avolat. Autumno eam ad id tempus non inveni videturque vere tantum in Halicie volare. Variata deo, ut speciem mutare videatur.

(*Loxotaenia Curt.*)

830. Nubilana *Hüb. HS. IV. 177.* Semel specimen unicum (sociis 995 etc.) 29. Maji prope Leopolim in collino querceto pone cauponam Lisienensem.

831. Musculana *Hüb. HS. IV. 168; OT. VIII. 175.* Invenitur altera parte Maji Junioque in lucidis sylvaticorum circa Radłowice górne, Leopolim et Janow. Quotannis solitatum. Lepidoptera eodem tempore volantia circa species 234, 256, 327, 689 sunt enumerata.

(*Penthina Tr.*)

832. Inundana Fabr. ; *Alis anterioribus ferreis, nebulosis, argenteo mixtis, punto centrali albo; posterioribus fuscescensibus.* “10.” Speciem hanc inveni hucusque tribus tantum specimini bus in silvaticis inter *Leopolim et Winniki*; duo 30 Junii in querceto prope *cauponam Lisienensem*, tertium 1 Julii in mixtis silvaticis ad pedem monticuli *Cz. sk.* In utraque regione delitebant capta specimina in vetustarum Querecum: ramis. Quoad consocios videant lectores numerum 690 et 945.

Incerta reperitur secus in Hungaria, circa Vindobonam, Glogoviam.—Chrysanthemana, Communana et Minorana ad Vindobonam, Ratisbonam alibique.—Wahlboniana Vindobonae, Glogavine, in Livonia etc.—Alticola circa Ratisbonam, in Palatinatu superiore, in Austria in regionibus Pini Mughi.—Virgaureana ad Vindobonam, Ratisbonam, in Livonia.—Pasievana Vindobona e.—Quadrana provenit vulgate in Livonia, raro in Alpibus, circa Vindobonam, Ratisbonam et Francofurtum ad M.—Cuphana incenit per Europam usque ad Liconiam—Ulmana in Livonia, circa Dresdam, Labacum, Neustrelitz.—Terreana in Bohemia, circa Gunzenhausen, Ratisbonam.—Hyemana in Bavaria, Hungaria, Saxoniam.—Nubilana in Anglia, circa Vindobonam, Ratisbonam—Musculana circa Ratisbonam, in Bohemia, Hungaria Saxoniam, Livonia.—Inundana in Livonia, Bohemia Franconia, circa Ratisbonam. Testante Amplissimo Mann est Inundana species rarissima

Paedisca Tr.

833. Pietruskii sp. n.

Alis anterioribus fusco - olivaceis, parciter nigro conspersis, macula dorsi magna subtetragona nivea, speculo minori suborbiculari cano inferne lunulis tribus argenteis interrupte limitato bigaque media punctulorum nigrorum; posterioribus obscurius griseis; ciliis anticus brevibus brunneo - lutescentibus pallideque tridivisis, posticus longioribus ditute - griseis.“

Novam hanc Paediscam Illustrissimo **Constantino de Pietruski**, animalium vivorum Haliciensium observatori et cultori scriptorique optime merito, dedicatam *) 12. Junii in campesti-collina ditione Janow detexi, quum ibidem calcareo-arenosa, adversus pinetum Romanówka elata collina Próchnik-Szyp perscrutabar. Cepi eam ante solis occasum in declivibus commemoratorum collinorum, egena chloride arenosa fruticosisque Pinis silvestribus passim tectorum, ubi prope ipsam humum per humiles herbas una cum Thalp. Paula, Pyr. Saanguinali pluribusque aliis (vide 1309) vagabatur.

Quoad similitudinem cum aliis Paediscae speciebus appropinguat se Pietruskii Clivosanae Mann et Graphanae Tr. Quam neque Clivosanam

*) In honorem ejusdem zoologi Clarissimus Pfeiffer novam Heltcem, in Carpathis Stryensibus detectam, nomine „Pietruskiana” insignivit.

neque localem ejus varietatem esse, ab ipso Mann comperi. A Graphana, quacum habet eundem habitum, colore signaturis, magnitudine primo aspectu haud dubie specifice differt.

Latitudo: 8", longitudo 3".

Antennae fuscae, submiaeantes, $\frac{1}{5}$ longitudinis costae non excedentes. Palpi cum fronte straminea illi apice nigrescentes. Capilli ferruginei. Thorax et abdomen nigro-fusca, ille signaturis flammeis dilutioribus fuscis marginibusque dilute stramineis obsoletis, hoc verticillis cinerascenti-fusco limbatis. Scapulae flavido-ferrugineae, dilute stramineo terminatae. Barba analis scapulis subconcolor. Pedes straminei tarsis cinereo-fusco annulatis, temora et tibiae aculeis binis finalibus armata.

Forma alarum eadem ac apud Graphanam. Area basalis alarum anteriorum terminatur margine postice subverticali, paulo supra dorsum semel sinuato, antice basim versus curvato. Pars maculae dorsali adhaerens vix obscurior signaturam numero 8 non insimilem mentitur.

Macula dorsi nivea alae dimidium dorsale paululum superat. Una ex parte areae basali est annata propiusque ad basim quam limbum accedit. In disco dantur hinc inde atomi atrae singulae obsoletiores, dorso ipso vero incident puncta tria nigra bene conspicua. Supra maculam et ab hac ipsa tendit juxta areae basalis limbum usque ad costam color obscurior in forma striae perangustae, quam obrem macula dorsalis quasi pyriformis esse videtur.

Signum speculare minutum alae medium dorsale vix aequat. Intus omnino quasi stanni colore farcitur et excepta biga media pectorum nigrorum obsoletiorum nullas alias habet signaturas. Pars ejus inferior circumdatur lineolis tribus (una limbum, una dorsum, una basim versus spectantibus) sublunulatis argenteis, distantibus et introversis convexis; pars vero superior dilutiore fundi colore amplectitur, quo totum spatium speculum inter et costam repletur. Ante speculum basim versus conspicitur denique paululum supra dorsum pustula parva atra.

Dimidio costae apicali incident quattuor hamuli gemini albi, ab apice decrescentes et inferioribus suis apicibus ad angulum analem vergentes. Intervalla eorum majora fundo sunt concolora.

Spatium majus inter speculum maculamque dorsalem, oblique continuatum usque ad costae partem inter primum par hamulorum processumque maculae dorsalis, efficit fasciam medianam aequilatam lateribus subrectis et parallelis. Quorum sinistrum emitit denticulum obsoletissimum in maculam dorsalem, dextrum vero fert commemoratam atram pustulam antespiculariem.

Puncta ocellaria tria subobsoleta pallida inveniuntur; duo sub apice, tertium supra angulum analem, omnia in alae pagina superiore cilia usque ad eorum apicem tenuissime dissecant. Subtas haec puncta straminea lineae exalbidae juxta ipsum limbum currente sinistrorum sunt annatae; punctum duplex subapicale distinctior; cilia vero ab iis non dividuntur.

Linea limbalis alarum anteriorum alba dense nigro-irrorata posteriorum pallide-aurea. Linea ciliorum dividens obscura.

Cilia alarum anteriorum brevia, alis subconcolora, sub apice pallide bidivisa supra angulum analem semel tantum; alarum posteriorum longiora, alis obscure griseis pallidiora.

Pagina inferior alarum anticarum cinerascenti fusco-euprea, posteriarum suborichaleo-cinerea. Cilia alis dilutiora. Praeter hamulos stramineos in costa antica, porro commemorata puncta ocellaria et lineam antelimbalem in alis posterioribus nullum vestigium ullius signaturae datur.

834. Similana SV. (*Fluidana SV.*). FR. 63; HS. IV. 235.
Exemplar singulum (sociis 1309 etc.) 12. Junii percussione La-
thyri abundanter in collinorum Szyp frutetosis declivibus crescentis.

835. Hepaticana FR. 63. HS. IV. 238. f. 223; OT. X. 97.
Volitat solitarie Junio per fruticeta pratulaque ad coll. silvarum
R. g. margines.

836. Scutulana SV. HS. IV. 239. f. 228; Quotannis fre-
quentis in pratulis silvaticis fruticosorumque herbosis per eoll. di-
tiones *R. g.*, *Stup.*, *D* et *L.* Majo — Julio.

837. Dissimilana Tr. X. 103. HS. IV. 239; FR. 62;
H. 41. Exemplar unicum (comitibus: 239 etc.) 15. Sept. ad cam-
pestris betuleti Zubrze marginem in Alno glut., quae frequenter
hic secundum fossas crescit.

838. Demarniana Messing. FR. 65; HS. IV. 239; f.
232. Semel exemplar unicum (sociis 632 etc.) 25. Junii inter coll.
betuleti Lwowiec frutices.

839. Delitana FR. 65. HS. IV. 240. Unicum exemplar
(sociis 460 etc.) extremo Junio prope *R. g.* in dumeto ante hu-
midum pratum *P.*, *L.*

840. Graphana Tr. X. 96. HS. IV. 240. f. 439. Exem-
plaria duo reperi (sociis 704, 1309 etc.) 12. Junii in herbosis
arenosorum collinorum Próchnik, tertium (una cum 149 etc.) 27.
Junii in fruticeto coll. silvam *R. g.* vestiente.

841. Ravulana HS. IV. 241. f. 143. Hucusque exemplar
unicum in coll. silvae *R. g.* coryleto ineunte Junio (vide 863 etc.).

842. Cirsiana Zell. Ent. Z. 1843. p. 150; HS. IV. 241.
f. 225. Vulgaris Majo — Julio in pratis humidis conterminisque
virguletis per coll. ditiones *R. g.*, *Stup.*, *Cz.*, et *H.*

843. Brunnichiana L. SV. HS. IV. 242. FR. 65; H.
21. OT. VIII. 194. Vulgaris toto Junio iisdem in locis ac prior,
praeterea circa J. (sociis 1309 etc.) et *D.* (una cum 1195 etc.).

844. Sublimana FR. HS. IV. 242. f. 229. Singula exem-
plaria 19. Maji (una cum 234 etc.) et 1. Junii (comitibus 863 etc.)
ad mixtae silvae *R. g.* marginem floridum.

845. Luctuosana D. HS. IV. 242. f. 227. Volitatat fre-
quenter toto Majo (solitarie ad finem Junii) per virguleta
in coll. silvaticis *R. g.*

(*Coccyx* Tr.)

846. **Fuligana** Hüb. 109. HS. IV. 221. f. 332; OT. VIII. 172. Exemplar unicum (sociis 158 etc.) 19. Junii in Corylo in coll. silva R. g.

847. **Squalidana** FR. HS. IV. 223. Reperitur plus minusve frequenter in dumosis fruticetisque per coll. ditiones R. g. *Stup.*, *D.* (vide 266) et *L.* Plura spec. obvia mihi fuerunt etiam in vallibus montanis circa Wołze (vide 6.). Ab Junio ad 14. Aug.

848. (Var ?) **Remyana** Koll. HS. IV. 223. f. 276. Exemplar unicum 20. Julii inter frutices ad ripas torrentis in alpestri regione Stoposiany.

(*Grapholitha* Tr.)

849. **Foeneana** Tr. H. 40; HS. IV. 268; OT. VIII. 197. Exemplaria tria 6. Julii (sociis: 813, 627, 332, 276, 280, 268, 233 etc.) *Samboriae* in pomariorum sepiminibus.

(*Argyrotoxa* Wood.)

850. **Schreberiana** Hüb. 45; HS. IV. 169. Reperitur vulgate Junio in Alnis glut. ad margines mixtarum silvarum in R. g. et betuleti Zubrza prope L.

(*Poecilochroma* Wood.)

851. **Parmatana** Hüb. 253. 254. FR. t. 1—4; HS. IV.* 203; OT. VIII. 199 et X. 108. Frequens Junio Julioque (solitarie et spec. obsoletis ad Sept.) in R. g., *D.* et *Z.* ad variarum silvarum margines, praecipue autem locis Betula Alnoque convestitis. Variat adeo, ut nonnulla exemplaria speciem mutare videantur.

Varietatem **Ratana** Hüb. 236. inveni in Betulis primum 21. Julii (sociis: 477 etc.) in R. g., tum 11. Aug. (una cum: 266 etc.) inter fruticeta subsilvatica *M. k. i b. d.*

Varietas **Sordidana** Hüb. 292. reperitur frequenter sub finem Sept. totoque Oct. prope L. ad betuleti Zubrza marginem, ubi socialiter Alnos glut. inhabitat. Circa R. g. nunquam et nec ubi mihi apparuit.

(*Steganoptyla* Steph.)

852. **Immundana** Ti. HS. IV. 279; FR. 53. Satis

multa Majo Junioque in silvaticis vepretisque circa Radłowice górne, Leopolim et Łukawica.

853. Frutetana Hüb. 293. 294. HS. IV. 282: FR. 52, 53; OT. VIII. 170. Quotaannis communissime eodem ac prior tempore praecipue in Alnis per omne terr. in promontoria usque. In copula reperitur Frut. frequenter.

854. Rubiginosana FR. HS. IV. 282. f. 185. Singula specimina 19. Maji (sociis 234 etc.) et 11. Junii (una cum 1014 etc.) inter frutices in coll. silvaticis R. g.

(*Ditula Wood.*)

855. Ophthalmicana Hüb. 51. HS. IV. 207; OT. VIII. 198. Sat multa sero autumno per silvarum coryleta in R. g., Z., Lis.

856. Corticana Hüb. 270. 209. HS. IV. 207; OT. VIII. 193. Vulgatissime Julio — Novembri ubique in truncis ramisque arborum diversarum praecipue Quercuum per euneti territorii humilioris silvatica.

857. Profundana SV. H. 26. FR. 62; HS. IV. 207. OT. VIII. 192. Vulgaris comes prioris; praeterea etiam in pomatis reperitur.

858. Oppressana Tr. X. 3. 95. HS. IV. 207. f. 242. Frequentem inveni hanc speciem 26. Junii 1857. in pago Ko-niuszki ad sinistram fluminis Strwiąż ripam inter densa saliceta in Alnorum et Populorum truncis. In silvaticis circa R. g., L. et J. reperitur Oppr. solitarie Julio.

859. Ratzeburgiana Sax. HS. IV. 208. f. 333. Specimina duo in mixtae silvae R. g. rubeto (sociis 776 etc.), tertium (simul cum 6. etc.) in prato Z. P. vallium mont. prope Wołcze, ubi sole occidente per flores vagabatur. Julio.

Simil. reperitur secus circa Vindob. et Ratisb. — Hepat.: ad Vindob., Nixdorf in Bohemia alibique. — Scut.: praecipue in Eur. merid.; porro in Livonia. — Dissimil.: per Eur. in Lironiam usque. — Demarn.: in virguletis circa Neustrelitz. — Delitana: Vindobonae et in Helvetia. — Graph.: in Hung., Bohemia, Saxonie, Livonia. — Ravulana: Vindobonae, in Semmeringo et circa Francof. a. M. Hucusque plura tantum exemplaria (excepto meo specimine) inventa. — Cirs.: per Eur. usque ad Alpes Livoniamque. — Brunn.: per Eur. usque ad Linan. — Sublimana: in Semmeringo. — Luct.: ad Ratisb., Vindob. alibique per Eur. — Fulig.: in Austria, Germ., ad Neostreliciam, Dresdam. — Squalidana: ad Vindob. — Foeneana:

regionatim in Eur. usque ad Livon.; rara. — Schreberiana: in Gallia merid., Suecia, Livonia, Germ. bor., Bohemia; rara. — Parmatana: ad Vindob., in Bohemia, Palatinatu super., Saxonie, Livonia alibiique; infrequens. — Immund.: per Eur. usque ad Livoniam. — Frut.: per cunctam Eur. usque ad Livon. — Rubig.: circa Nixdorf et Neustrelitz. — Opht.: in Germ., in maris Baltici provinciis, ad Vindobonam. — Coit.: praecipue per Eur. bor.; usque ad Livoniam. — Prof.: in Austria, Hung., Saxonie etc. — Oppres.: praecipue in Germ. bor.; ad Vindob. Rara. — Ratzeb.: in Silesia, Bohemia, Livonia.

Grapholitha Tr.

860. Daldorfiana F. Rhediella L. Rhediana Tr. VIII.

220. HS. IV. 253. H. 22. Volitat frequenter Majo prope L. per coll. dumeta penes betuletum Krzywczycce. Exemplar unum reperi praeterea Sambriae in pomarii septo.

861. Fulvifrontana Zell. (Germarana FR.). HS. IV. 253. f. 258. Sat multa a medio Majo ad medium Junium Leopoli in pomariorum sepiminibus: praeterea iu dumetis et ad margines silvarum fruticetorumque circa R. g., H., B. Quoad magnitudinem magnopere variat.

862. Gruneriana Mann. HS. IV. 256. f. 261. Semel exemplar unicum 29. Maji Samboriae in floralibus (vide 1086.).

863. Ustulana Hüb. 231. HS. IV. 257; OT. VIII. 219. Singulum specimen, quod in collectione haheo, excitatum est a me 1. Junii 1854. de Alno glutinosa in coll. silvae R. g. margine. Supra commemorato die, quo proprie pagum Stupnica versus excurredi silvamque R. g. cursim tantum visitavi obvia mihi fuerunt sequentia Macro — et Microlepidoptera: 19, 27, 32, 35, 53, 89, 94, 110, 111, 116, 119, 143, 154 — 156, 183, 188, 208, 218, 220, 222, 224, 227, 247, 249, 252, 271, 290, 297, 301 — 303, 314, — 316, 320, 332, 383, 387, 391, 398, 411, 427, 428, 433, 453, 463, 476, 486, 489, 490, 491, 510, 513, 544, 559, 564, 570, 612, 619, 620, 623, 627, 641, 650, 651, 652, 663, 669, 677, 682, 683, 691, 700, 707, 717, 718, 728, 730, 770, 777, 780, 782, 802 — 804, 815, 816, 819, 820, 824, 828, 836, 841, 843, 844, 847, 850, 853, 873, 875, 894, 895, 899 — 902, 928, 931, 932, 937, 947, 953, 1024, 1027, 1040, 1042, 1046, 1052 — 1054, 1060, 1076, 1095, 1096, 1125, 1135, 1136, 1153, 1187, 1213, 1224, 1239, 1250, 1256, 1257, 1273, 1279, 1296, 1314, 1320, 1332, ceterum vide 1086.

864. Nebritana *Tr. VIII.* 209. *et X.* 3. 115; *HS. IV.* 258. *f.* 234. Sat multa Julio in dumosis ad margines coll. silvarum inter *L.* et *Liš.*

865. Funebrana *Tr. X.* 3. 116; *HS. IV.* 259. Frequens Majo initioque Junii inter vepreta spinetaque secundum margines betuleti *Krzywoczyce* (sociis Nebritana, Daldorfiana etc.) silvaticorumque circa *R. g.* In pago *Modrycz* obvia mihi fuerunt plura spec. 11. Aug. (vide 1152).

866. Acuminatana *Schläg. Germarana* *Tr. HS. I V.* 259. *f.* 282. Unicum exemplar (sociis: 632 etc.) 25. Junii in fruticetis pascuis secundum silvas circa *R. g.*

867. Plumbagana *Tr. VIII.* 218; *HS. IV.* 260. *f.* 289; *H.* 211. Specimina tria 5. et 16. Junii in fruticosis pratulisque coll. betuleti *Lwowiec* (vide 1300 et 1014.).

868. Gemmiferana *Tr. VIII.* 217. *et X.* 118. *Zachana Hüb.* 243. *HS. IV.* 258. Frequens Junio in floridis per omne terr. in promontoria usque.

869. Augustana *Hüb.* 205. (*Cruciana L.*). *HS. I V.* 272. *f.* 362; *OT. VIII.* 221. Semel initio Julii exemplaria quinque (sociis: 553, 672 etc.) in alneto Salicibus intermixto in coll. silvaticis ditionis *Radłowice górne*.

(*Semasia Steph.*)

870. Hohenwartiana *SV. HS. IV.* 248; *f.* 296; *OT. VIII.* 204; *H.* 20. Communis Julio in herbosis pratulis subsilvaticis secundum viam stratam in pago *Radł. górne*. In *D.* et *Cz.* rarius invenitur.

871. Aspidiseana *Hüb.* 256; *HS. IV.* 247. *f.* 241; *OT. VIII.* 208. Frequens Majo, rarer Junio et Julio, in pratis apertis sub — et intersilvaticis, in silvarum excisis pomariisque. Obvia mihi fuit circa *S.*, *R. g.*, *D.*, *L.* et *H.*

872. Metzneriana *Kuhlw.* *HS. IV.* 245. *f.* 311. Unicum exemplar iuente Junio (sociis: 54, 99, 540, 872) in prato humido inter silyas frond. coll. ditionis *Czaple*.

873. Hypericana *Hüb.* 23. *HS. IV.* 249; *OT. VIII.* 205. Quotannis numerose Majo — Aug. praecipue in siccis pratulis fruticetisque herbidis per terr. cunctum a pl. usque ad montes elatiiores (*Wołcze, Czarna, Magóra*).

(*Steganopticha Steph.*)

874. Siliceana Hüb. 196. HS. IV. 280; OT. VIII. 210.
Apparet Julio inveniturque frequenter ad finem Oct. in truncis
diversarum arborum sylvaticarum per omne territorium in pro-
montoria usque.

Varietas Petrana (Tr. X. 3. 114. H. 210.) reperitur
satis frequenter mixtumque cum Sil. Aug. et Sept.

Varietas Decorana (Tr. X. 3. 114. 265.) bis mihi obvia
fuit (6. Julii et 8. Sept.) inter coryleta in coll. fageto *Liš.* prope *L.*

875. Campoliliana Tr. SV. OT. VIII. 212; HS. IV. 279.
f. 269. Vulgatissime ab 20. Maji ad finem Junii (rarius Julio) in
mixtis sylvaticis, nemoribus frutetosisque per ditiones *R. g.*, *L.* et *J.*

876. Freyeriana FR. 51. HS. IV. 279. Hucusque exem-
plar unicum (sociis 258 etc.) 19. Julii ad marginem coll. silvae *R. g.*

877. Penkleriana SV. *Mitterpacheriana* Tr. VIII. 214;
HS. IV. 282; FR. 19. 20. Magnopere varians hic papiliunculus
apparet copiose Junio volitatque decrescente numero ad Novem-
brim in variis silvis frond. a pl. usque ad montanas regiones.
Communi Siliceanae comes.

878. Minutana Hüb. 73. HS. IV. 283. f. 174. OT. VIII.
216. Hucusque semel exemplaria duo 8. Junii prope *L.* in coll
querceto supra c. *Liš.* (sociis: 26 — 28, 35, 70, 89, 113, 188,
197, 198, 206, 208, 320, 598, 623, 728, 729, 749, 763, 767, 774,
777, 783, 785, 800, 803, 828, 836, 873, 875, 888, 895, 900, 902,
928, 939, 948, 947, 941, 1095, 1139, 1163, 1165, 1175, 1185,
1193, 1197, 1210, 1222, 1228, 1229, 1237, 1253, 1254, 1286,
1298, 1322).

(*Carpocapsa* Tr.)

879. Sucedana Froehl. HS. IV. 252; H. 194; OT.
VIII. 211. Copiosa toto Junio prope *H.* in piceto *Swiňka* conter-
minisque silvis frond. et querceis fruticetis collinorum *Zap.* et *M.*

(*Syndemis* Hüb.)

880. Vacciniana Ti. HS. IV. 275. f. 206. Subtilem
hunc papiliunculum inveni 25. Maji (una cum: 790 etc.) et 9. Junii
(sociis: 328 etc.) in supra commemoratis collinis speciminibus
tribus, quae tempore pomeridiano per declivium Vaccinia v. id.
humilioresque herbas vagabantur.

Daldorf et Fulvisfr. inveniuntur hinc inde per Eur. usque ad Livoniam. — Grun.: in vineis ad Vindob. — Ustulana: in Austria. Rarissima. — Nebritana: in Austria, Bohemia, Hung. Saxoniam. — Funebr.: in Bohemia, ad Dresdam alibi. — Acum.: circa Glogaviam, Ratisbonam alibi in mont. pratis. — Plumbag.: in Austria, Styria, Bohemia. — Gemmif.: in Hung., Bohemia, Germ. — August.: hinc inde in Eur. usque ad Livon.; in Bohemia; rara. — Hohenwart.: ubi in Europa. — Aspid.: in cuncta fere Eur.; in Bohemia, Hung., Saxoniam, Alpibus, Livonia. — Metzn.: in Hung. — Hyperic.: in cuncta Europa. — Silicanna: in Austria, Germ., Livonia etc. — Campol.: localiter per Europam usque ad Livon.; in Bohemia. — Freyeriana: in Alpibus Silesiaque. — Penkl.: per Eur. usque ad Livon. — Minut.: in Austria, Saxoniam alibi. — Succ.: in cuncta fere Europa. — Vacc.: in Bohemia, ad Ratisbonam.

Ephippiphora Dup.

(Grapholitha Tr.)

881. Plumbatana Zell. Js. 1846. p. 249; HS. IV. 254. f. 321. Semel exemplar unicum (sociis: 241 etc.) Aprili 1853 in trunco Pop. tremulae in mixta silva coll. R. g.

882. Blepharana HS. IV. 254. f. 197. 198. Hucusque exemplar singulum (sociis: 1300 etc.) 5. Junii in Corylo avell. ad marginem coll. silvaticorum in R. g.

883. Loderana Koll. (Sehrankiana Fröhl.). Tr. X. 3. 121; HS. IV. 265. f. 265. Hucusque semel exemplaria quatuor Leopoli 4. Maji (sociis: 523, 527, 572, 575, 825, 894, 901, 912, 923, 1043, 1045, 1054, 1252) in florentibus Anemonis nemorosis ad introitum fageti prope teloneum Lyczakow.

884. Dorsana Fröhl. II. 36; HS. IV. 266; OT. VIII. 225. Singula specimina in silvae R. g. coryleto (sociis: 277 etc.) et in querecto Łuh in Rakowiec (vide 1195 etc.). Julio.

885. Deflexana FR. HS. IV. 268. f. 277. Unicum exemplar obsoletum prope J. in Quercu 3. Julii ad pineti R. marginem (vide 998).

886. Interruptana Kuhlw. HS. IV. 269. f. 280. Specimina duo (sociis 328, 790 etc.) in piceto Swinka, tertium (comitibus 1309 etc.) inter Pinos silv. collinorum Próchnik. Junio.

887. Motacillana Tr. Cytisana Zell. Is. 1847. p. 735. HS. IV. 269. f. 266. Unum exemplar 5. Junii Leopoli in pomarii szpamine in vicinia Sambuci (sociis: 861, 1019, 1093, 1260, 255, 300, 303, 295 etc.).

888. Petiverana L. Froehl. H. 37; HS. IV. 271; OT. VIII. 229. Quotannis innumerosa toto Junio Julioque (minore numero Aug.) in pratulis subsilvaticis per omne terr. usque ad valles montanas *Wolfze, Czarna etc.*).

889. Alpinana Tr. VIII. 230. HS. IV. 271. f. 155. 156. Singula exemplaria 27. Junii (una cum 149 etc.) et 20. Julii (so ciis 675 etc.) in florido platulo subsilvatico ad viae stratae dextram in pago R. g.

890. Diffusana FR. (*Fissana* Fröhl.) HS. IV. 266. f. 284. Unum exemplar 26. Junii in fruticeto ad marginem luci in *Koniuszki* (sociis: 948, 888, 812, 858, 968 etc.). In dumeto pone betuletum *Krzywczycyce* (non procul a telonio *Łyczakow*) reperi Diff. pluribus speciminibus Junio et Julio (simul cum: 1083, 151, 985, 1173, 1210, 1334, 452 etc.).

891. Gundiana Hüb. 42. (*Composana* Fab.). HS. IV. 264. f. 281. Satis multa praecipue in fruticetis herbidis ad coll. silvarum margines circa R. g., Cz., D. et L. 22. Maji — 14. Aug.

892. Coniferana Saxes (*Separatana* Fr.). HS. IV. 266. f. 322. Hucusque semel exemplar singulum (sociis: 27, 28, 32, 35, 105, 113, 188, 195, 197, 206, 208, 320, 432, 578, 623, 646, 695, 700, 717, 733, 734, 749, 815, 828, 871, 873, 875, 879, 888, 895, 900, 902, 928, 929, 935, 947, 948, 951, 994, 1037, 1038, 1051, 1075, 1130, 1132, 1135, 1163, 1197, 1219, 1222, 1237, 1240, 1254, 1267) 4. Junii in querceo fruticeto collinorum Zapolje prope *Hofosko*.

Phlebotana provenit secus a Berolino usque ad Vindob.; porro in Livonia. — *Bleph.*: ubi vis in Eur. — *Loder.*: hinc inde per Eur. usque ad Livon.; ad Vindob., in Styria. — *Dors.*: in Austria, Hung., Silesia, Bavaria. — *Deflex.*: hinc inde per Eur., in Francof. a. M., in Livonia. — *Interrupt.*: in Bohemia ad Ratisb. — *Motac.*: ad Ratisb. Rara. — *Petiv.*: per cunctam Eur. — *Alp.*: in Bohemia, Hung., ad Vindob., Ratisb. — *Diff.*: ad Vindob. alibique. — *Gund.*: per cunctam fere Europam. — *Conif.*: hinc inde per Eur.; rara. —

Phoxopteryx Tr.

893. Upupana Tr. X. 120. HS. IV. 285. f. 205. Specimen unicum 26. Maji 1853. in Melampyro in querceti Pawłowka herbosis.

894. Mitterpacheriana *SV Penkleriana Tr. VIII. 244; HS. IV. 285. H. 192.* Vulgatissime Majo Junioque in fruticosis silvaticisque per omne terr. in elatiores montes usque.

895. Derasana *Hüb. 206. HS. IV. 285; OT VIII. 244.* Vulgaris ab extremo Majo ad finem Junii ubivis ad silvarum fructicorumque lucidorum margines usque ad valles montanas (*Wołcze, Czarna etc.*).

896. Badiana *SV: H. 53. HS. IV. 285; OT. VIII. 243.* Quotannis communissime Majo, minore numero Junio — Aug., praeceps in quercetorum coryletis per cunctum humilius territorium.

897. Uneana *Hüb. 76. HS. IV. 286; OT. VIII. 237.* Vulgaris Majo Junioque ubique in pratis subsilvaticis virgultisque in promontoria usque.

898. Fluetigerana *FR. HS. IV. 286. f. 319.* Aliquot specimina Junio in herbosis coll. betuleti *Lwowiec.*

899. Cuspidana *Tr. VIII. 236; HS. IV. 286. f. 238.* Reperitur solitarie eodem ac prior loco sub finem Maji initioque Junii.

900. Siculana *Hüb. 79. HS. IV. 287: VIII. 233.* Frequens a medio Majo ad ineuntem Julium in silvaticorum pratis circa *R. g., L. et J.* Sat multam inveni Sic. etiam 11. Aug. circa pagum *D.*

901. Harpana *Hüb. 17. (Ramana Fröhl.). Tr. VIII. 235. HS. IV. 287.* Vulgaris Majo, minore numero Junio, in silvis frond. praeceps quercentis per omne terr. usque ad elatiora promontoria. (*Aphelia Steph.*)

902. Lanceolana *Hüb. 80. HS. IV. 243; OT. VIII. 232.* Quotannis copiose Majo — Julio ubique locorum in pratis, fructectis silvaticisque per territorium cunctum a planicie usque ad valles montanas (*Czarna Wołcze.*).

(*Ditula Wood.*)

903. Achatana *SV. HS. IV. 207; H 25. OT. VIII. 171.* Frequens extremo Majo Junioque in pomariorum sepibus silvaticisque circa *S. R. g., et L.*

(*Syndemis Hüb.*)

904. Ericetana *Zell. Is. 1846. p. 243. (Flexulana Dup.).*

HS. IV. 276. f. 136. Plura exemplaria Junio in coll. silvaticis circa L. (simul cum 353), J. (vide 1309) et R. g. (hic sociis: 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1218, 1221, 1222, 1224 — 1226, 1228, 1229, 1239, 1241, 1243 1244, 1189, 1192, 1037, 1038, 1062, 1069, 947, 903 — 894 etc.).

Upupana reperitur siccus in Hung. et Bohemia; rarissima. — *Mitterp.*: in Austria, Saxonie etc. — *Deras*: in Austria alibique per Eur.; infrequens. — *Bad.*: in Austria, Germ., Alpibus etc. — *Unc.*: per cunctam Eur. — *Fluct.*: ad Ratisb. etc. — *Cuspidana*: in Hung., Bohemia, Germania bor., Bavaria, Helvetia; rara. — *Sicul.*: per omnem Eur. — *Harp.*: in Austria pluribusque aliis Eur. regionibus. — *Lanc.*: per cunctam Eur. — *Achat.*: in Austria, Germ. etc. — *Ericetana*: in Saxonie, Bohemia, Bavaria, ad Ratisbonam. Infrequens.

Teras Tr.

905. Cristana *SV. HS. IV.* 139. f. 237. 25; *H.* 176; *OT. VIII.* 253. Hucusque exemplaria tria (1 marem, 2 fem.) *S. Sept.* — *20. Oct.* in campestri betuleto *Zubrze*. Latitabant in Querebus.

906. Abildgardana *Fabr. HS. IV.* 141; *H.* 55; *OT. VIII.* 268. Speciem hanc reperi frequentem *Sept.* et *Oct.* 1858, prope *L.* ad quereeti *B.* marginem in *Corylis* et *Carpinis*. Anno 1859, hic non apparuit. Circa *Samborianam* nunquam et nec ubi mihi obvia fuit.

907. Erutana *HS. IV.* 143. f. 9. 19. Vagabatur copiose *Sept.* et *Oct.* (solitarie et *Novembri*) 1859, medio in betuleto *Zubrze*, praecipue autem ibidem per virgulta inter *Alnos glut.* et *Pop.* trem., quae solae certo loco silvulam singunt. In aliis silvis frond. circa *Leopolim* quoque reperitur, sed solitatem.

908. Favillaceana *Hüb.* 62; *HS. IV.* 143. f. 270; *OT. VIII.* 260. Hucusque plura spec. 10. *Julii* in quereeto *P.*, (sociis: 677, 681, 738, 749, 751, 766, 757, 758, 754, 774, 823, 828, 870, 874, 968, 991, 1070, 1056, 1105, 1263, 1346, 581, 529, 509, 471, 469, 246, 186, 153, 103, 92, 93, 83, 36, 43, 33), porro *Septembri* et *Octobri* in silvaticis circa *Leopolim* et 4. *Novembribus* *Leopoli* in muro.

909. Sparsana *SV. OT. VIII.* 257; *H.* 61; *HS. IV.* 143. f. 10. Plura spec. *Samboriue* in sepiibus Aprili (sociis: 371 etc.) et in silvaticis circa *Leopolim* *Septembri*.

910. Schalleriana L. OT. VIII. 265; H. 288, 289; HS. IV. 144. Reperitur solitarie Augusto, frequenter autem Sept. et Octobri in Alnis glut. sylvaticorum circa R. g. (vide 85) et Leopolim, hic praecipue ad marginem betuleti Zubrze.

911. Comparana Hüb. 284; HS. IV. 145; OT. VIII. 264, Vulgaris Schallerianaes comes

912. Ferrugana SV. FR. 23. 24; HS. IV. 146; f. 407; OT. VIII. 263. Reperitur toto anno a primis veris diebus in Nov. usque in hortis sylvaticisque per omne terr. humilius. Copiose invenitur Ferr. autumno prope L. ad margines querceti B. betuleti que Zubrze. Variat quoad magnitudinem, signaturas coloresque adeo, ut speciem mutare videatur. Possideo 30 ultra eodem tempore et loco circa Leopolim collectas varietates autumnales, quae penitus fere inter se discrepant, speciminibus mediantibus autem haud dubie uniuntur. Exemplaria vernalia aestivaque constantius characteres specificos servant.

913. Boscana Fabr. (*Cerusana* Hüb. 63.). HS. IV. 147; OT. VIII. 182. Exemplaria tria sub Oct finem in truncis campestris betuleti Zubrze prope Leopolim.

914. Umbrana Hüb. 59; HS. IV. 149; OT. VIII. 253. Reperitur frequenter socialiterque Oct. initioque Nov. (solitarie et Martio) in virguletis betuleti Zubrze (sociis: 1302, 1143, 1301, 367, 1006, 577, 603, 1251, 1062, 363, 1122, 1287 etc.). Mares rarissimi esse videntur; inter 20 feminas unicum tantum marem invenire mihi contigit.

915. Seabrania SV. HS. IV. 149. f. 11—13; H. 169. 58; OT. VIII. 255. Hucusque exemplar unicum 22. Aprilis 1857. *Samboriae* in pomarii sepagine.

916. Asperana Tr. VIII. 185; HS. IV. 152. f. 2. 3. }
917. Parisiana Guen. HS. IV. 153. f. 4. 5. 6. }

Ad campestris querceti *Bednarówka* marginem 15. Sept. exemplaria bina in Quercubus (vide 239).

918. Contaminana Hüb. 142; HS. IV. 153; OT. VIII. 250. Unicum exemplar in varietate **Ciliiana** (Hüb. 171.) 16. Sept. eodem loco ac ambo priores (sociis: 744, 851, 855, 877, 910, 911, 916, 917, 919, 906, 921, 1066, 1069, 1255, 1322, 1339, 366, 375).

919. Caudana *Fabr. HS. IV. 154; FR. 54. 55; OT. VIII. 248.* Satis frequens Aug. in silvaticis *R. g.*, porro Sept. et Oct. prope *L.* ad betuleti *Zubrze* marginem. Viget in Alnis glut., rarius in Salicibus. Exemplaria costa non erosa raro reperiuntur.

920. Emargana *FR. HS. IV. 154; H. 233.* Tria exemplaria Augusto — Oct. in Alnis Salicibusque in silvaticorum *R. g.* et *Z.* marginibus. Unum horum spec. habet costam integrum.

921. Treueriana *Hüb. 100. HS. IV. 151; OT. VIII. 93.* Primo vere solitarie, sero autumno quotannis vulgaris praecipue in betuletis cirea *R. g.* et *L.* Insidet betularum truncis; perterrefacta invita porro avolat, sed tergo in humum ac congeneres incidit.

922. Nebulana *Hüb. 104. 103.; HS. IV. 151. OT. X. 3. 138.* Hucusque exemplaria quinque circa *L.* in truncis in fageto *Lisienice* 8. Sept. (sociis: 71, 76, 357, 397, 415, 625, 702, 835, 853, 874, 905 — 909, 921, 963, 851, 1064, 1066, 1067, 1069, 1107, 1181, 1339, 496.) et in betuleto *Z.* (vide 1302 etc.) Octobri.

(*Sciaphila Tr.*)

923. Rigana *Tr. X. 3. 140. HS. IV. 197; H. 327.* Prope *L* in querceto supra *c. Liš.* ad dextram viae versus *Winniki* spec. duo 4. Maji (una cum 883, 1043, 1045, 1252, 912, 894 etc.).

Cristana: provenit secus in Gallia bor., Anglia, Germ. merid., ad Ratisb.; rara. — *Abild.*: per Eur. usque ad Livoniam; in Germ., Italia. — *Erutana*: hinc inde in Eur.; rara. — *Favill.*: in Austria, Hung., circa Francof. a. M., alibique; rara. — *Sparsana*: ad Vindob.. in Hung., Bavaria, Saxonie, Franconia. — *Schall. et Comp.*: in Saxonie, Palatinatu etc.; usque ad Livoniam. — *Ferrug.*: per Eur. usque ad Livon. — *Boscana*: a Saxonie usque ad Hung. et Siciliam. — *Umbrana*: in Franconia, Saxonie, Bavaria, Bohemia etc. usque ad Livoniam; rara. — *Scabrina*: in Franconia, Bavaria, Saxonie, ad Vindob.. — *Asper.*, *Par.* et *Cont.*; hinc inde per. Eur. — *Caud. et Emarg.*: in Franconia, Bavaria, Saxonie Austria etc. usque ad Livoniam; *Emarg.* est rario *Caud.* — *Treueriana*: in Germania, Austria etc. usque ad Livoniam. — *Nebulana*: in Livonia, Brandenb., Regno Wurtemburgico, Bavaria, Franconia; rara. — *Rigana*: in Hung., Tyrolis Alpibus, Brandenb., circa Rigam; infrequens.

Cochyliis Tr.

924. Flagellana *Dup. HS. IV. 182. f. 95.* Exemplaria tria Julio ad mixtae silvae *R. g.* marginem inter frutices (sociis: 277, 258, 477 etc.).

925. Smeathmanniana *Fabr.* *H.* 149. *HS.* *IV.* 185; *OT.* *VIII.* 274. Hucusque ad betuleti *Zubrze* marginem 30. Maji (sociis 1275 etc.) spec. unicum, quod ibidem sub vesperum per nardeta prope ipsam humum vagabatur.

926. Tischerana *Tr.* *VIII.* 275; *FR.* 12; *HS.* *IV.* 185. Reperitur satis frequenter sub finem Maji initioque Junii circa Janow et Leopolim ubivis in sterilibus pascuis, siecaneis sabuletisque. Exemplar unum reperi et 26. Sept. (sociis 855, 914, 921, 591, 918, 239 etc.) in nardeto ante campestre betuletum *Zubrze*. Volitat primum post solis occasum prope ipsam humum.

927. Zephyrana *Tr.* *HS.* *IV.* 183; *OT.* *VIII.* 127. Exemplaria duo (sociis 658, 998 etc.) 3. Julii prope J. in caleareorum collinorum *Szyp* floridis declivibus.

928. Dubitana *Hüb.* 71. *HS.* *IV.* 192; *OT.* *VIII.* 283. Quotannis copiose a medio Majo ad finem Junii (rarius Julio) in herbosis silvarum et in fruticetis per omne terr. in montosa usque.

929. Pallidana *FR.* (*Ambiguana Fröhl.*). *HS.* *IV.* 190. Unum exemplar 4. Junii (sociis 892 etc.) prope H. inter frutices ad coll. queretii *Korycina* marginem.

930. Angustana *Tr.* *VIII.* 284. (*Cruentana Fröhl.*). *HS.* *IV.* 191. Semel exemplar unicum 1. Junii inter queceos frutices collinorum *Zapole* prope H. (vide 353).

931. Rubellana *Hüb.* 285. *HS.* *IV.* 187. *fig.* 285; *OT.* *VIII.* 279. Sat multa ab extremo Majo ad Julium in herbosis fruticetis circa R. g. et L.

932. Epilinana *Zell.* *HS.* *IV.* 187. *fig.* 80. Hucusque exemplaria duo; alterum involavit 1. Junii noctu in *Stupnica* (vide 863 etc.) in meum conclave, alterum vagabatur per flores 11. Julii in coll. betuleti *Lwowiec* fruticosis (una cum 451 etc.).

933. Dipsaceana *Mann.* *HS.* *IV.* 187. *f.* 76 — 79. Semel exemplar unicum in herbosis coll. betuleti *Lwowiec* 5. Junii (una cum: 1300 etc.).

934. Humidana *FR.* *HS.* *IV.* 188. *f.* 86. 87. Exemplar unum cum priore.

935. Roserana *Fröhl.* (*Ambiquella Hüb.* 253.) *HS.* *IV.*

192, f. 93; OT. VIII. 280. Plura spec. Junio in pomario *Samboriae*, porro in fruticosis silvarum circa R. g., et L.

936. Mussehliana OT. X. 3. 142; HS. IV. 188. Frequens sed dispersa in coll. fruticosis herbidis circa *Stup.* R. g., L. et D. 29. Maii — 8. Aug.

937. Pumilana FR. *Ambiguana* HS. IV. 192. Satis frequens Majo initioque Junii in fruticetis coll. silvaticorum circa Radłowice górne et Leopolim.

938. Manniana FR. 51; HS. IV. 189, f. 67. Exemplar alterum (sociis: 1086 etc.) 29. Maji, alterum (una cum: 632 etc.) 25. Junii in coll. betuleti *Lwowiec* herbosis.

939. Carduana Zell. Is. 1847. pag. 741. (*Dissolutana* FR. *Hybridella* Hüb.). HS. IV. 190, f. 83. Plura exemplaria sub finem Maji Junioque *Leopoli* in pomariorum sepiminibus et in fruticosis pone betuletum *Krzywczycę*. Volitat sub vesperum.

(*Penthina*.)

940. Postremana Zell. *Ambiguana* Tr. VIII. 282; HS. IV. 231. Hucusque semel exemplar unicum 26. Maji inter fructices ad campestris querceti *Bednarówka* marginem (una cum: 121, 189, 490, 535, 622, 623, 663, 700, 725, 777, 819, 820, 860, 875, 895, 900, 901, 912, 928, 980, 1101, 1125, 1187, 1248, 1312, 1319 etc.).

941. Servillana Dup. (*Nubilosana* FR.). HS. IV. 234. f. 98. Unicum exemplar (sociis: 1086 etc.) 29. Maji ad coll. silvae Radł. górne marginem in Alno glut., quae alternatim ibidem cum Quercubus, Salicibus, Sorbis etc. crescit.

(*Coccyx* Tr.)

942. Schreibersiana Fröhl. OT. VIII. 285; HS. IV. 224; H. 306, 151. Reperitur frequenter socialiterque ultimis diebus Majo initioque Junii in Pruno pado ad hortorum limites dumosos in *Leopolitano* suburbio Łyczakow.

943. Fischerana Tr. X. 3. 175. (*Permixtana* Hüb. 75.) HS. IV. 225. Extremo Majo initioque Junii spec. plura in fruticosis circa R. g. (sociis: 863, 1086 etc.), in *Samboriensis* planitiei pratis floridis circa Kalinow (comitibus: 97, 197, 570, 463, 426, 429, 431, 1211, 902, 464, 803, 947 etc.) et in silvaticis circa L.

Flagell. reperitur secus in Hispania, Gallia merid., Hung., ad Vindobonam, Francof. a. M. — *Smeathm.*: in Hung., Austria, ad Ratisb. etc. — *Tisch.*: in Hispania, Germ. bor., ad Ratisb., Sareptam in Hung. Rara. — *Zeph.*: in Hungaria etc. — *Dubit.*: per Eur. usque ad Livon. — *Pall.*: praecipue in Germania bor.; porro in Livonia. — *Angust.*: in Bohemia, Saxoniam, Livonia. — *Rubell.*: in Austria, Germ. etc. usque ad Livon. — *Epilinana*: circa Glogaviam a Clariss. Zellero detecta. — *Dipsaceana*: circa Vindobonam in Dipsaco silvestri ab Inclito Mann detecta et lecta. — *Humidana*: circa Neustrelitz in Eupatoria cannabino. — *Roserana*: in Italia, ad Stutgardiam et lacum Brigantinum. — *Muss.*: in Boh., ad Vindob., Ratisb., Megalopolim, Francof. a. O. — *Pumil.*: hinc inde per Eur.; in Livonia. — *Manniana*: in Hung., Bohemia, Alpibus, Livonia. — *Card.*: ad Tibur in Italia, ad Vindob. et Francof. a. M; rara. — *Postrem.*: in Bohemia, Suevia, Livonia, Franconia. — *Servillana*: ad Ratisbonam, Vindobonam et Neostreliciam; rarissima. — *Schreib.*: in Austria, Bohemia etc. — *Fischerana*: in Bohemia, Helvetia, Saxoniam, ad Megalopolim, Ratisbonam.

Tineidae Zeller *)

Fam. Crambinae Z.

Chilo Zckn.

944. **Gigantellus** SV. Zell. Is. 170; HS. IV. 51; H. 53; FR. 16; OT. IX. 1. 62. Semel spec. unicum (una cum: 238, 690 etc.) 30. Junii ante Winniki in prato paludosio in vicinia stagni.

945. **Forficellus** Thbrg. Zell. Is. 170; HS. IV. 51; FR. 17; H. 220; OT. IX. 1. 65. Hucusque exemplar unicum 1. Julii ad pedem monticuli Cz. sk. loco uliginoso in Acoro calamo. Uno die legi in hac regione sequentia lepidoptera; 22, 27, 50, 56, 60, 57, 33, 70, 71, 73, 78, 83, 95, 98, 92, 93, 103, 130, 187, 179, 190, 191, 197, 310, 343, 385, 397, 434, 439, 465, 479, 481, 646, 671, 672, 679, 681, 687, 749, 754, 807, 812, 828, 823, 832, 902, 928, 1021, 1081, 1088, 1089, 1104, 1165, 1232, 1248, 1340.

Gig. reperitur secus in Austria, Hung., Brandenb., Borussia, Anglia. — *Forficellus*: in Sicilia, Austria, Bohemia, Hungaria, Borussia, ad Brunseigam, Lipsiam, in Anglia.

*) Tineac in genera dispositae et diagnosibus stabilitae a P. P. Zellero; Isis 1839.

C r a m b u s F a b r.

946. Dumetellus Hüb. 29. 389. 390; Zell. Is. 172; OT. IX. 1. 80; HS. IV. 54. Aliquot exemplaria in sterilibus collinis circa Janow (vide 998) et in herbosis silvarum circa Radłowice górne. Julio.

947. Pratellus OT. IX. 1. 81. (*Pratorum F. Zkn. H. 401.*) HS. IV. 54. Zell. Is. 172. Quotannis copiose, imo innumerose, a fine Maji in Julium usque in pratis, pascuis et fruticosis ubique locorum per omne terr. in montosa usque.

948. Pascuellus L. H. 31. Zell. Is. 172; HS. IV. 53; OT. IX. 1. 75. Frequentissime Junio Julioque in agris, dumosis, herbidis lucis fruticosisque a pl. in humiliores montes usque. In pomariis graminosis quoque reperitur.

949. Ericellus Hüb. 371. Zell. Is. 173; HS. IV. 54; OT. IX. 1. 77. Plura exemplaria Majo et Julio prope Janow in excisis pineti R. alibique in sterilibus agrorum calcareorumque collinorum Próchnik, P. P., Szyp etc.

950. Mortuellus Hüb. 46; Zell. Is. 173; HS. IV. 59; OT. IX. 1. 84. Frequens in pratis siccis et humidis Junio Julioque per omne terr. usque ad altiora promontoria.

Varietatem **Cespitellus** Hüb. inveni semel 11. Julii (sociis: 895 etc.) prope L. in fruticoso pratulo humido ante c. Lis.

951. Cerusellus SV. H. 62. 61; Zell. Is. 173; HS. IV. 56; OT. IX. 1. 88. Vulgatissime Junio Julioque in herbosis pratulis circa Leopolim et Janow. Ditioni R. g. deest.

952. Rorellus L. Hüb. 43; Zell. Is. 173; HS. IV. 58; OT. IX. 1. 89. Unicum exemplar 3. Julii prope J. in collinorum Szyp declivibus (una cum: 949, 951, 997, 998 etc.).

953. Crysonnuehellus Scop. Zell. Is. 173; H. 44; HS. IV. 58; OT. IX. 1. 91. Quotannis communissime Majo et Junio ubique locorum in pratis, pascuis, veryactis fruticosisque per omne terr. in promontoria usque.

954. Falsellus SV. Zell. Is. 173; H. 30; HS. IV. 58; OT. IX. 1. 105. Volitat satis frequenter Julio sub vesperum in Samboriae floralibus pomariisque (vide 495.).

955. Strenziellus Metzn. (*Conchella SV.*). *Tr. X.*
3. 167; *Zell. Is.* 173; *HS. IV.* 63. f. 1.

956. Mytilellus Hüb. 287; *Zell. Is.* 173; *HS. IV.*
63; *OT. IX.* 1. 99.

957. Pyramidellus *Tr. IX.* 1. 104; *HS. IV.* 64.
f. 5; *Zell. Is.* 174.

Singula specimina (sociis: 1309 etc.) 12. Junii prope *J.* in herbosis
collinorum *Próchnik* — *Szyp.* Volitabant sub vesperum prope humum.

958. Pinetellus Clerck *H.* 38; *Zell. Is.* 173; *HS.*
IV. 63. f. 2; *OT. IX.* 1. 94.

959. Margaritellus Hüb. 39; *Zell. Is.* 173; *HS.*
IV. 62; *OT. IX.* 1. 102.

Aderant sat multi socialiterque 3. Julii prope *Janow* in collino-
rum *Próchnik* Pinis silv. Quoad comites vide 998.

960. Aridellus Thbg. *Zell. Is.* 174; *HS. IV.* 61 f. 17.
18. Unicum exemplar (sociis 998 etc.) 3. Julii in collinorum *Szyp*
declivibus floridis.

961. Culmellus L. *H.* 49; *Zell. Is.* 174; *HS. IV.* 57; *OT.*
IX. 1. 93. Exemplar alterum (simul cum 6 etc.) 24. Julii in mont.
prato circa *W.*, *Z. P.* alterum (sociis: 120, 692, 738, 766, 1016,
508, 1171, 417, 179, 227, 123, 121) 5. Aug. *Samboriae* in pomario.

962. Inquinatellus Hüb. 54. *Zell. Is.* 174; *HS. IV.* 56;
OT. IX. 1. 121. Hucusque semel exemplaria tria (sociis: 266 etc.)
8. Aug. in prato humido *St. w.*, t. pone quercetum *Luh* in *Rak*.

963. Tristellus *SV.* *Aquilellus.* *Tr. IX.* 1. 114; *H.* 50.
404; *HS. IV.* 66; *Zell. Is.* 174. Reperitur vulgatissime in pascuis
circa *Modrycz*, frequenter in campis circa *R.* et *L.*, denique in ste-
rilibus promontoriorum *Bubniscze* (vide 532 etc.). Toto Augusto
initioque Septembri.

964. Selasellus Hüb. 405. 406. (*Pratella L.*). *HS. IV.*
66; *OT. IX.* 1. 119; *Zell. Is.* 174. Unicum exemplar (sociis 985 etc.)
11. Julii prope *L.* in humido pratulo pone c. *Liš*.

965. Luteellus *SV.* *Zell. Is.* 174; *H.* 55. 48; *HS. IV.* 66.
OT. IX. 1. 125. Reperitur frequenter prope *Janow* (comitibus:
1309, 998 etc.) in sterilibus collinis *Próchnik* — *Szyp*, porro so-

litarie circa Leopolim in nardeto pone campestre betuletum Krzywczycze. 12. Junii — 6. Julii.

966. Perlellus Scop. Zell. Is. 174; H. 40; HS. IV. 66. OT. IX. t. 129. Frequens ubique in pratis foenariis subsilvaticisque per omne terr. usque ad valles montanas (Wołcze, vide 6. etc.).

967. Warringtonellus Stainton. Zell. Zeit. f. Ent. p. 36. t. 3. f. 10; HS. VI. 145. Unicum exemplar 6. Julii prope L. in pratulo ad betuleti Krzywczycze marginem (una cum 57, 79, 83, 179, 184, 190, 237, 402, 455, 457, 458, 471, 501 $\frac{1}{2}$, 526, 701, 708, 713, 749, 754, 819, 824, 828, 856, 902, 928, 965, 968, 999, 1000, 1084, 1050, 1083, 1120, 1123, 1137, 1155, 1168, 1179, 1180, 1206, 1210, 1232, 1236, 1245, 1322, 1335, 1336.).

Dumet. reperitur secus in Anglia, Livonia, Germ., ad Brunsvigam, Augustam Vindelicorum, Francofurtum, Berolinum, Glogaviam, in Saxonia Carniola, Austria, Hungaria. — Prat.: in Gallia, Anglia, Lapponia, Suecia, Dania, Sax., Brandenb., ad Brunsv., in Helvetia, Silesia, Austria, Hung. — Pasc.: in Gallia, Anglia, Lapp., Livon., Saxonia, ad Brunsv., Francof., Berol., Glog. — Eric.: in Austria, Bohemia, Bavaria, ad Brunsv., Berol., in Brit. — Hort.: in Brit., Liv., Saxonia, ad Aug. Vindelic., Francof., Berol., Glog., in Austria, Bohemia. — Cerus.: in Brit., Livonia, ad Brunsv., Dresden et Schandau in Sax., Berol., Francof., Glog., Vindob., in Bohemia, Hung. — Ror.: in Germ. merid., Austria, Hung., Pedemontio, ad Zaram in Dalm.; porro in Hierosolyma. — Chrys.: in Brit. Suecia, Saxonia, ad Berol., Francof., Glog., Brunsv., Aug. Vindelic., in Carniola, Austria. — Fals.: in Brit., Lapp., Suecia, Livonia, Saxonia, Germ., ad Brunse. Ratisb., Francof., Berol. Nixdorf in Bohemia, in Montibus piniferis, in Austria, Sicilia. — Stenz.: in montosis Austriae Styriaeque, ad Labacum, Berol., Parisios, porro in Livonia. — Myt.: hinc inde per Eur. in planities montosisque; rara. — Pyr.: in Austriae monte Schneeberga, in Alpibus. — Pinet.: in Gallia, Suecia, Dania, Saxonia (Dresda, Schandau), Germ., ad Aug. Vindelic., Brunsv., Berol., Francof., Glog., in Carniola, Austria, Boh., Hung., Helv., Sicilia; rara. — Marg.: in Gallia, Livonia, Suecia, Germ., ad Aug. Vindelic., Brunsv., Nixdorf, Dresden et Schandau, Francof., Glog., in Austria, Hung., Italia. — Arid.: in Brit., Suecia, Curlandia (Riga), ad Brunsv., Dresden, Francof., Glog., in Hung., Helv. — Culm.: in Gallia, Brit., Lapp., Suecia, Livonia, Dania, Sax., Germ., ad Aug. Vindelic., in Rossia, Helv., Carniola, Austria, Silesia, Montibus Sudetis. In Museo Palat. Vindob. addita est Culmello adnotatio „In Gebirgsgegenden.“ — Inquin.: in Brit., Suecia, Livonia, Germ., Sax., ad Aug. Vindelic., Brunsv., Berol., Francof., Glog., in Rossia, Bohemia, Austria, Hung., Sicilia. — Trist.: in Brit., Lapponia, Suecia, Livonia, Sax., ad Brunsv., Berol., Francof., Glog., in Bohemia, Austria, Hung. — Selas.: in Brit., Suecia, Livonia, Sax., Palat. super., ad Megalopolim, Brunsvigam, Berol., Francof., Glog., Nixdorf in Bohemia, in Silesia. — Lut.: in Brit., Lapp., Suecia, Livon., Bavaria, ad Aug. Vindelic., Brunsvigam., Dresden,

Berol., Francof., Glog., in Helv., Bohemia, Austria, Hung. — Perl.: in Brit. Suecia, Livon., ad Aug. Vindelic., Dresdam et Schandau, Francof., Berol., Glog., in Carniola, Austria. — Warr.: a Clariss. Zellerio ad Glogaviam detecta.

Eudore a Curt.

968. Ambigualis Tr. IX. 1. 138; HS. IV. 45. f. 108. 109; Zell Is. 175. et Linn. I. 289. Frequentissima omnium Eudorearum. Reperitur Junio — Aug. in truncis in pomariis silvisque frondosis et acerosis in promontoria usque. In reg. alpestribus obvia mihi non fuit.

969. Mercurella L. Tr. IX. 1. 133; HS. IV. 48; Zell. Linn. I. 293. et Is. 175. Itidem ac prior, sed rarer.

970. Crataegella Hüb. 231, HS. IV. 48. f. 113; Zell. Linn. I. 296, et Is. 175. Duo exemplaria Julio Samboriae in pomariorum septis.

971. Oehrealis SV. Silacellus Tr. IX. 1. 130; H. 232. HS. IV. 49; Zell. Linn. I. 271, et Is. 175. Semel exemplaria duo (sociis 998 etc.) 3. Julii prope Janow in collinorum Szyp declivibus floridis.

972. Pyralella Hüb. (Dubitellus Zink.). Zell. Is. 175, et Linn. I. 285; HS. IV. 45. f. 107; OT. IX. 1. 136. Provenit solitaria in Samboriae pomariis, porro in Quercuum truncis in silvaticis circa L. et D.

973. Sudetica Zell. Is. 175. et Linn. I. 304; HS. IV. 48. f. 115. 117. Hucusque semel 26. Julii in montis Hušla alpe Pikuj (4190 p. v. Łob.) unicum exemplar paulo obsoletum in florente Scorzonera rosea (vide 556.).

974. Ingratella FR. HS. IV. 45. f. 105. 106; Zell. Linn. I. 283. Item exemplar unum sub finem Julii in graminosis alpis Zelemin (3703 p. p. Kbg.). Quoad alias species hucusque in Haliiae orientalis alpibus lectas vide numerum 556.

Ambig.: reperitur secus in Italia, Hung., Austria, Bohemia, Carniola, Styria, circa Posnaniam et Polnisch-Lissa, ad Labacum, Ratisb., Heidelbergam, Salzbrunn et Reinerz, Glogaviam. — Merc.: haud dubie circu Glogaviam, Francof. a. O., in Bohemia, ad Brunsv., Vindob., in Suecia usque ad promont. boreale. — Crat.: circa Glog., Salzbrunn, Heidelbergam, Aug. Vindelic., Parisios, Neapolim.

— Ochr.: ad Vindob., in Hung., circa Brunam. — Pyr: in Anglia, Suecia, Liv., Germ., Borussia, ad Aug. Vindel., Ratisb., Vindob.. Brunsv., Francof. a. O., Dresden et Schandau, Glogaviam, in Bohemia, Austria, Silesia, Gallia, Corsica. — Sudet.: in Austriae monte Schneeberga, in Montibus Sudetis aliisque, in montosis Styriae et Silesiae (hic prope pagum Aupa); porro in Livon. — Ingr.: in montosis circa Vindobonam.

Galleria Fabr.

975. Mellonella L. Zell. Is. 180; Hüb. 25; HS. IV. 114; OT. IX. 1. 51. Copiose Junio ubique in alveariis circuli Tarnopoliensis (apibus abundantis) et Samboriensis. Dagit gregatim in alvis; serena tempestate aparia socialiter circumvolat.

(Aphonia Hüb.)

976. Colonella L. Zell. Is. 180; Hüb. 22: 23; HS. IV. 114; OT. IX. 1. 46. Solitarie Julio et Aug. in domiciliis. In silvis apertisque similiter ac Mell. necubi et nunquam obvia mihi fuit.

Mell. reperitur ubivis fere per Eur. Hospes ingratus apes colentibus. — Colon.: in Brit., Suecia, ad Aug. Vindelic., Brunsvigam, Dresden et Schandau, Francof., Glog., in Austria, Hung.

Phycideae Z.

Anerastia H.

977. Lotella H. 454; Zell. Is. 177; HS. IV. 109. f. 90—92; OT. IX. 1. 156. Unum par in copula 3. Julii prope Janow in Pino silvestri in collinis Szyp (sociis: 793, 794, 958, 959, 494, 997, 998 etc.).

Secus praecipue in Germ. bor. usque ad Curlandiam; ad Brunsvigam, Dresden et Leucopetram in Saxonia, Berol., Francof., Glog. et Haineburg in Silesia.

Ephestia Guen.

978. Elutella Hüb. 163; Zell. Is. 176; HS. IV. 110; OT. IX. 1. 194. 10. Junii. }

979. Oblitella Zell. Is. 176; HS. IV. 107; f. 194. 14. Maii. }

Singula exemplaria obsoleta prope R. g. in pratulo humido Pod Lwowcem initio Junii (simil cum: 981, 425 $\frac{1}{2}$ etc.).

Elut. reperitur secus in Anglia, Saxonia, circa Aug. Vindelio., Francof., Berol., Glog., Vindob. — Oblit.: in Sicilia et circa Hungaricum lacum Peisonis. Ex Hungaria oritur testante adnotazione exemplar musei Palat. Vindob., quocum meum Haliciense et secundum Amicissimi Mann sententiam ad unquem identicum est.

Homeosoma Curt.

980. Nebulella SV. Zell. Is. 178; H. 157; HS. IV. 106; OT. IX. 1. 169. Hucusque exempl. tria sub finem Maji (sociis: 940, 490, 1275, 1266, 1296, 1310 etc.) in Corylis in campestri querceto Bednarówka prope L.

981. Nimbella Zell. Is. 178; HS. IV. 106. f. 29. Unum exemplar obsoletum (una cum 979, 425 $\frac{1}{2}$ etc. 8. Junii in pratulo humido Pod Lwowcem (una cum: 978.).

982. Sinuella F. Zell. Is. 178. Elongella Tr. IX. 1. 202, II. 174; HS. IV. 108. f. 124. Frequentissime et in pulchris varietibus toto Junio in siccaneis sterilibus apricissimisque sabuletis circa L. et. J., hic in serie colium Próchnik — Szyp (simil cum: 704, 404, 783, 785, 833, 1309, 997, 998. etc.).

Nebul. provenit secus in Austria, Hung., ad Francof., Glog., Ratisb., in Curlandia. — Nimb.: usque ad Silesiam, Curlandiam Siciliamque; ad Dresden et Schandau in Saxonia, circa Reichsstadt in Bohemia, Francof., Glog., — Sin.: in Italia, Hung., circa Mödling in Austria.

Acrobasis Zell.

983. Tumidella Zink. Zell. Is. 177; H. 73; HS. IV. 99. f. 45; OT. IX. 1. 179.

984. Rubrotibiella Mann. FR. 60; HS. IV. 99. Singula exemplaria paulo obsoleta in Quercubus ad marginem coll. querceti R. g.; prius 13. Julii (comitibus 776, 277 etc.), posteriorius 31. Julii (sociis 752. etc.)

985. Consociella H. 328; Zell. Is. 177; HS. IV. 99. f. 200; OT. IX. 1. 187. Unicum exemplar in Quercu 11. Julii prope L. in excisis querceti penes o. Lis. (sociis: 33, 83, 91-93, 104, 156, 179, 357, 452, 457, 491, 492, 738, 749, 758, 798, 800, 802, 803, 828, 856, 858, 864, 890, 950, 964, 965, 968, 969, 985, 1001, 1033, 1034, 1060, 1066, 1069, 1083 — 1085, 1087, 1133, 1155, 1171, 1173, 1210, 1206, 1209, 1224, 1225, 1263, 1286, 1322, 1334, 1344, 1340).

Tumid. volitat secus in Britannia, Germ. bor., ad Megalop Aug. Vindelic., Brunsv., Glog., Nixdorf in Bohemia, Vindob., in Hungaria, Ratisbonae deest. — Rubrot.: circa Vindob. ab Inlyto Mann detecta. — Consoc.: in Brit., ad Aug. Vindelic., Brunsv., Dresdam et Schandau, Francof. et Glogaviam.

Glyptotelles Zell.

986. Leucaerininella Ti. HS. IV. 101. f. 188. Speciem hanc legi aliquot speciminibus sub finem Junii prope R. g. in coll. betuleto Lwowiec (una cum: 460 etc.) et prope L. in querceis fruticetis Zapole in H. (vide: 238, 690). Omnia exemplaria degabant in Quercubus Alnisque.

Reperitur secus circa Glogaviam et Dresdam. Rara.

Nyctegretis Zell.

987. Achatinella Hüb. 451; Zell. Is. 177; HS. IV. 102. Hucusque semel exemplar unicum 30. Junii in Quereu inter coll. fructecta Zapole prope Hołosko. Quoad comites (vide 238 et 690.)

Secus in Curlandia, Polonia, circa Ratisbonam, Megalopolim Francofurtum a. O. Glogaviam.

Mylelois H.

988. Cribrella H. 67; (*Cribrum SV.*). Zell. Is. 76. HS. IV. 104; OT IX. 1. 205. Ex duobus exempl., quae mihi hucusque invenire contigit, latitabat unum in Carduo ad viam inter L. et Wi., alterum in Cirsio in pratulo humido P. L circa Radłowice górne. Junio.

989. Compositella Tr. X. 3. 171; HS. IV. 92. f. 128; Zell Is. 177. Semel exemplar unicum (sociis: 1309 etc.) in Quereu 12. Junii prope J. in collinis Szyp.

990. Advenella Zink. Zell. Is. 177; HS. IV. 97. f. 201; OT. IX. 1. 184. In dumeto ad betuleti Krzywezyce marginem exemplar unicum 30. Junii (vide 238 et 690).

Cibr. reperitur secus per Eur. usque ad Germ. boreal. et Curlandiam; in Ukraina, ad Aug. Vindelic. Francof., Berolinum, Glogaviam, Vindob. — Comp.: in Hung., Austria, Helvetia, ad Ratisb. — Adv.: in Brit., Curlandia, ad Brunsv., Francof. Glog., Ratisb., Vindob.

Hypochalcia H.

991. Ahenella SV. Zell. Is. 178; H. 41. 58; HS. IV. 86; OT. IX. 1. 144. Volitat frequenter in pratulo fruticosisque ad be-

tuleti *Krzywczycy* marginem; praeterea solitarie in pratis circa *R. g.* (vide 158), *Cz et J.* (sociis 1309, 998 etc.). Junio Julioque.

992. Melanella Tr. IX. 1. 146; Zell. Is. 187; HS. IV. 86. f. 72. 73. Exemplaria duo (sociis 1300 etc) 5. Junii in prato humido *Pod Lwowcem*, ubi cum priore prima vesperi prope humum vagabantur.

Ahenella provenit secus in *Brit. Curlandia*, ad *Brunsv.*, *Francof.*, *Glog.*, *Aug. Vindelic.*, *Dresdam* et *Bautzen Saxonum*, in *Austria*, *Bohemia*, *Hung.* — *Mel.* in *Curlandia*, ad *Dresdam*, *Megalopolim*, in *Dalm.*, *Carinthia*, *Bohemia*, *Hung.*

A n c y l o s i s Z.

993. Dilutella Hüb. 69. (*Cinnamomella* Dup.). Zell. Is. 178; HS. IV. 94. f. 58—61; OT. IX. 1. 164. Hucusque obvia mihi fuerunt exemplaria duo in varietatibus in coll. silvaticorum Radl. górne virguletis; primum 22., secundum 26. Maji (sociis: 1, 9, 25, 26, 32, 41, 53, 66, 72, 97, 100, 102, 107, 112, 156, 166, 211, 226, 227, 229: 236, 245, 252, 259, 290, 293, 298, 299, 327, 330, 368, 397, 398, 412 — 414, 428, 453, 467, 472, 474, 478, 480, 487, 490, 501, 510, 513, 514, 528, 544, 550, 567, 572, 580, 587, 596, 610, 612, 613, 620, 623, 628, 637, 644, 649, 652, 677, 682, 683, 686, 691, 666, 700, 705 717, 728, 734, 755, 775, 777, 780, 782, 783, 792, 803, 814, 816, 819, 820, 836, 842, 847, 845, 852, 855, 861, 871, 873, 875, 896, 894, 899, 900 — 902, 926, 928, 931, 937, 947, 953, 994, 1017, 1027, 1040, 1043, 1047, 1045, 1054, 1060, 1076, 1095, 1121, 1136, 1148, 1164, 1178, 1189, 1190, 1244, 1247, 1248, 1250, 1253, 1258, 1259, 1260, 1273, 1274, 1295, 1319).

Secus per Eur. usque ad *Curlandiam*; circa *Ratisb.*, *Glog.*, *Berol.*, *Francof.*, *Aug. Vindelic.*, in *Hung.*

N e p h o p t e r y x H.

994. Rhenella Zinck. Zell. Is. 179; FR. 29; HS. IV. 80. f. 130; OT. IX. 1. 175. *Vulgaris Majo Junioque Leopoli* in sepi-minibus, rara autem in silvis circumjacentibus. Urbi *Samboriae* penitus deest, et in silvaticis *R. g.* reperi per sex annos semel exemplar unicum (sociis 158, 490, 993 etc.).

995. Similella Zink. (*Contiguella* Heyd.). HS. IV. 81. f. 69. Hucusque spec. duo circa *L.*; alterum 29. Maji in querceto

supra c. *Lis.* (simul cum : 19, 24, 35, 80, 189, 427, 431, 446, 463, 491, 544, 550, 613, 621 — 623, 636, 637, 641, 659, 691, 700, 777, 816, 830, 875, 894 — 897, 900 — 904, 928, 980, 1038, 1049, 1045, 1059, 1060, 1075, 1076, 1125, 1253, 1319), alterum 6. Junii in querceto *B.* (comitibus : 900, 902, 895, 820, 802, 800 etc.). In utraque regione latitabat Simil. in *Quercuum ramis*.

996. Abietella SV. Zell. Is. 178; H. 74; HS. IV. 79. f. 43; OT. IX. 1. 177. Singula spec. 12. Junii (una cum 1309 etc.) et 3. Julii (sociis 998, etc.) prope Janow in Pinis silv. in collinis Szyp. Prodit primum pervesperi ex latebris.

997. Janthinella H. 374, 375; Zell. Is. 179; FR. 28; HS. IV. 81. f. 131; OT. IX. 1. 188.

998. Argyrella SV. H. 64; HS. IV. 81; Zell. Is. 179; OT. IX. 1. 152.

Ambas has species in Halicia raras inveni singulas 3. Julii prope *J.* in calcareorum collinorum Próchnik — Szyp. declivibus, ubi luce jam obscura prope humum per humiles plantas in Pinorum silv. vicinia vagabantur. Una cum *Janth.* et *Argyr.* inveni in his regionibus a meridie ad noctem sequentes lepidopterorum species : 16, 20, 27, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 57, 65, 67, 68, 69, 71, 87, 92, 93, 95, 104, 118, 193, 197, 403, 408, 434, 430, 438, 444, 447, 457, 458, 470, 481, 484, 494, 506, 511, 529, 549, 552, 554, 558, 570, 563, 584, 585, 587, 592, 634, 658, 666, 667, 673, 684, 699, 704, 739, 749, 760, 762, 770, 774, 779, 784, 788, 793, 794, 798, 801, 806, 819, 824, 828, 856, 858, 885, 900, 902, 927, 928, 946 — 949, 951, 952, 958, 959, 960, 965, 971, 977, 982, 996, 999, 1000, 1004, 1046, 1055, 1074, 1078 — 1080, 1097, 1103, 1111, 1133, 1146, 1150, 1160, 1161, 1165, 1166, 1169, 1182, 1198, 1234, 1264, 1322, 1335, et 1336. Species 12. Junii inter *Janow* et *Lelechówka* lectas, adduxi omnes ad unam infra sub 1309.

Rhen. occurrit secus in Brit., Germania, Brandenb., ad Aug. Vindelic., Berol. Francof., Vindob. alibi in Austria, in Bohemia, Hung. — Simil. : circa Ratisb., Gunzenhausen, Brunsv. Francof., Berol., in Livonia. — Abiet. : in Gallia, Suecia, circa Berol., Ratisb., Aug. Vindelic., Brunsv., Francof., Dresdam et Schandau, Glog., in Austria. — Janth. : usque ad Livoniam et Hungariam ; in Germ., ad Brunsv. Aug. Vindelic., Dresdam, Francof., Glog., Ratisb., in Brandenb., Bohemia. — Argyr. : usque ad Brit., Livoniam et Hungariam ; circa Dresdam Francof., Ratisb., Brunsv., Rigam, Glog., Vindob.

Elut. reperitur secus in Anglia, Saxonie, circa Aug. Vindelio., Francof., Berol., Glog., Vindob. — *Oblit.: in Sicilia et circa Hungaricum lacum Peisonis. Ex Hungaria oritur testante adnotacione exemplar musei Palat. Vindob., quocum meum Haliciense et secundum Amicissimi Mann sententiam ad unguem identicum est.*

Homeosoma Curt.

980. Nebulella SV. Zell. Is. 178; H. 157; HS. IV. 106; OT. IX. 1. 169. Hucusque exempl. tria sub finem Maji (sociis: 940, 490, 1275, 1266, 1296, 1310 etc.) in Corylis in campestri querceto Bednarówka prope L.

981. Nimbella Zell. Is. 178; HS. IV. 106. f. 29. Unum exemplar obsoletum (una cum 979, 425 $\frac{1}{2}$ etc. 8. Junii in pratalo humido Pod Lwowcem (una cum: 978.).

982. Sinuella F. Zell. Is. 178. Elongella Tr. IX. 1. 202. H. 174; HS. IV. 108. f. 124. Frequentissime et in pulchris varietibus toto Junio in siccaneis sterilibus apricissimisque sabuletis circa L. et. J., hic in serie colium Próchnik — Szyp (simil cum: 704, 404, 783, 785, 833, 1309, 997, 998. etc.).

Nebul. provenit secus in Austria, Hung., ad Francof., Glog., Ratisb., in Curlandia. — Nimb.: usque ad Silesiam, Curlandiam Siciliamque; ad Dresdam et Schandau in Saxonie, circa Reichsstadt in Bohemia, Francof., Glog., — Sin.: in Italia, Hung., circa Mödling in Austria.

Acrobasis Zell.

983. Tumidella Zink. Zell. Is. 177; H. 73; HS. IV. 99. f. 45; OT. IX. 1. 179.

984. Rubrotibiella Mann. FR. 60; HS. IV. 99. Singula exemplaria paulo obsoleta in Quercubus ad marginem coll. querceti R. g.; prius 13. Julii (comitibus 776, 277 etc.), posteriorius 31. Julii (sociis 752. etc.)

985. Consociella H. 328; Zell. Is. 177; HS. IV. 99. f. 200; OT. IX. 1. 187. Unicum exemplar in Quercu 11. Julii prope L. in excisis querceti penes c. Liš. (sociis: 33, 83, 91-93, 104, 156, 179, 357, 452, 457, 491, 492, 738, 749, 758, 798, 800, 802, 803, 828, 856, 858, 864, 890, 950, 964, 965, 968, 969, 985, 1001, 1033, 1034, 1060, 1066, 1069, 1083 — 1085, 1087, 1133, 1155, 1171, 1173, 1210, 1206, 1209, 1224, 1225, 1263, 1286, 1322, 1334, 1344, 1340.

Tumid. volitat secus in Britannia, Germ. bor., ad Megalop. Aug. Vindelic., Brunsv., Glog., Nixdorf in Bohemia, Vindob., in Hungaria, Ratisbonae deest. — *Rubrot.* : circa Vindob. ab Inlyto Mann detecta. — *Consoc.* : in Brit., ad Aug. Vindelic., Brunsv., Dresdam et Schandau, Francof. et Glogaviam.

Glyptotelles Zell.

986. Leacaerinella Ti. HS. IV. 101. f. 188. Speciem hanc legi aliquot speciminibus sub finem Junii prope R. g. in coll. betuleto Lwowiec (una cum : 460 etc.) et prope L. in querceis fruticetis Zapole in H. (vide : 238, 690). Omnia exemplaria degabant in Quercubus Alnisque.

Reperitur secus circa Glogaviam et Dresdam. Rara.

Nyctegretis Zell.

987. Achatinella Hüb. 451; Zell. Is. 177; HS. IV. 102. Hucusque semel exemplar unicum 30. Junii in Quercu inter coll. frutecta Zapole prope Hołosko. Quoad comites (vide 238 et 690).

Secus in Curlandia, Polonia, circa Ratisbonam, Megalopolim Francofurtum a. O. Glogaviam.

M y e l o i s H.

988. Cribrella H. 67; (*Cribrum SV.*). Zell. Is. 76. HS. IV. 104; OT IX. 1. 205. Ex duobus exempl., quae mihi hucusque invenire contigit, latitabat unum in Carduo ad viam inter L. et Wi., alterum in Cirsio in pratulo humido P. L circa Radłowice górne. Junio.

989. Compositella Tr. X. 3. 171; HS. IV. 92. f. 128; Zell Is. 177. Semel exemplar unicum (sociis: 1309 etc.) in Quercu 12. Junii prope J. in collinis Szyp.

990. Advenella Zink. Zell. Is. 177; HS. IV. 97. f. 201; OT. IX. 1. 184. In dumeto ad betuleti Krzywezyce marginem exemplar unicum 30. Junii (vide 238 et 690).

Cibr. reperitur secus per Eur. usque ad Germ. boreal. et Curlandiam; in Ukraina, ad Aug. Vindelic., Francof., Berolinum, Glogaviam, Vindob. — Comp.: in Hung., Austria, Helvetia, ad Ratib. — Adv.: in Brit., Curlandia, ad Brunsv., Francof. Glog., Ratib., Vindob.

Hypoehalcia H.

991. Ahenella SV. Zell. Is. 178; H. 41. 58; HS. IV. 86; OT. IX. 1. 144. Volitat frequenter in pratulo fruticosisque ad be-

tuleti *Krzywczycę* marginem; praeterea solitarie in pratis circa *R. g.* (vide 158), *Cz et J.* (sociis 1309, 998 etc.). Junio Julioque.

992. Melanella Tr. IX. 1. 146; Zell. Is. 187; HS. IV. 86. f. 72. 73. Exemplaria duo (sociis 1300 etc.) 5. Junii in prato humido *Pod Lwowcem*, ubi cum priore prima vesperi prope humum vagabantur.

Ahenella provenit secus in *Brit. Curlandia, ad Brunsv., Francof., Glog., Aug. Vindelic., Dresden et Bautzen Saxonum, in Austria, Bohemia, Hung.* — *Mel:* in *Curlandia, ad Dresden, Megalopolim, in Dalm., Carinthia, Bohemia, Hung.*

A n c y l o s i s Z.

993. Dilutella Hüb. 69. (*Cinnamomella* Dup.). Zell. Is. 178; HS. IV. 94. f. 58—61; OT. IX. 1. 164. Hucusque obvia mihi fuerunt exemplaria duo in varietatibus in coll. silvaticorum Radl. górne virguletis; primum 22., secundum 26. Maji (sociis: 1, 9, 25, 26, 32, 41, 53, 66, 72, 97, 100, 102, 107, 112, 156, 166, 211, 226, 227, 229, 236, 245, 252, 259, 290, 293, 298, 299, 327, 330, 368, 397, 398, 412 — 414, 428, 453, 467, 472, 474, 478, 480, 487, 490, 501, 510, 513, 514, 528, 544, 550, 567, 572, 580, 587, 596, 610, 612, 613, 620, 623, 628, 637, 644, 649, 652, 677, 682, 683, 686, 691, 666, 700, 705 717, 728, 734, 755, 775, 777, 780, 782, 783, 792, 803, 814, 816, 819, 820, 836, 842, 847, 845, 852, 855, 861, 871, 873, 875, 896, 894, 899, 900 — 902, 926, 928, 931, 937, 947, 953, 994, 1017, 1027, 1040, 1043, 1047, 1045, 1054, 1060, 1076, 1095, 1121, 1136, 1148, 1164, 1178, 1189, 1190, 1244, 1247, 1248, 1250, 1253, 1258, 1259, 1260, 1273, 1274, 1295, 1319).

Secus per Eur. usque ad *Curlandiam*; circa *Ratisb., Glog., Berol., Francof., Aug. Vindelic., in Hung.*

N e p h o p t e r y x H.

994. Rhenella Zinck. Zell. Is. 179; FR. 29; HS. IV. 80. f. 130; OT. IX. 1. 175. *Vulgaris Majo Junioque Leopoli* in sepi-minibus, rara autem in silvis circumjacentibus. Urbi *Samboriae* penitus deest, et in silvaticis *R. g.* reperi per sex annos semel exemplar unicum (sociis 158, 490, 993 etc.).

995. Similella Zink. (*Contigua Heyd.*). HS. IV. 81. f. 69. Hucusque spec. duo circa *L*; alterum 29. Maji in querceto

supra e. Lis. (simul cum : 19, 24, 35, 80, 189, 427, 431, 446, 463, 491, 544, 550, 613, 621 — 623, 636, 637, 641, 650, 691, 700, 777, 816, 830, 875, 894 — 897, 900 — 904, 928, 980, 1038, 1049, 1045, 1059, 1060, 1075, 1076, 1125, 1253, 1319), alterum 6. Junii in querecto B. (comitibus : 900, 902, 895, 820, 802, 800 etc.). In utraque regione latitabat Simil. in Quercuum ramis.

996. Abietella SV. Zell. Is. 178; H. 74; HS. IV. 79. f. 43; OT. IX. 1. 177. Singula spec. 12. Junii (una cum 1309 etc.) et 3. Julii (sociis 998, etc.) prope Janow in Pinis silv. in collinis Szyp. Prodit primum pervesperi ex latebris.

997. Janthinella H. 374, 375; Zell. Is. 179; FR. 28; HS. IV. 81. f. 131; OT. IX. 1. 188.

998. Argyrella SV. H. 64; HS. IV. 81; Zell. Is. 179; OT. IX. 1. 152.

Ambas has species in Halicia raras inveni singulas 3. Julii prope J. in calcareorum collinorum Próchnik — Szyp. declivibus, ubi luce jam obscura prope humum per humiles plantas in Pinorum silv. vicinia vagabantur. Una cum Janth. et Argyr. inveni in his regionibus a meridie ad noctem sequentes lepidopterorum species : 16, 20, 27, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 57, 65, 67, 68, 69, 71, 87, 92, 93, 95, 104, 118, 193, 197, 403, 408, 434, 430, 438, 444, 447, 457, 458, 470, 481, 484, 494, 506, 511, 529, 549, 552, 554, 558, 570, 563, 584, 585, 587, 592, 634, 658, 666, 667, 673, 684, 699, 704, 739, 749, 760, 762, 770, 774, 779, 784, 788, 793, 794, 798, 801, 806, 819, 824, 828, 856, 858, 885, 900, 902, 927, 928, 946 — 949, 951, 952, 958, 959, 960, 965, 971, 977, 982, 996, 999, 1000, 1004, 1046, 1055, 1074, 1078 — 1080, 1097, 1103, 1111, 1133, 1146, 1150, 1160, 1161, 1165, 1166, 1169, 1182, 1198, 1234, 1264, 1322, 1335, et 1336. Species 12. Junii inter Janow et Lelechówka lectas, adduxi omnes ad unam infra sub 1309.

Rhen. occurrit secus in Brit., Germania, Brandenb., ad Aug. Vindelic., Berol., Francof., Vindob. alibique in Austria, in Bohemia, Hung. — Simil.: circa Ratisb., Gunzenhausen, Brunsv. Francof., Berol., in Livonia. — Abiet.: in Gallia, Suecia, circa Berol., Ratisb., Aug. Vindelic., Brunsv., Francof., Dresden et Schandau, Glog., in Austria. — Janth.: usque ad Livoniam et Hungariam; in Germ., ad Brunsv., Aug. Vindelic., Dresden, Francof., Glog., Ratisb., in Brandenb., Bohemia. — Argyr.: usque ad Brit., Livoniam et Hungariam; circa Dresden Francof., Ratisb., Brunsv., Rigam, Glog., Vindob.

595, 580, 578, 535, 512, 492 — 490, 472, 471, 468, 467, 446, 431, 429, 426 — 428, 424, 405, 387, 320, 314 — 316, 332, 299, 297, 269, 188, 187, 143, 97, 96, 94, 91, 89, 80, 59, 53, 41, 35, 32, 27, 26, 23.

(*Tineola HS.*)

1023. Biseliella Hummel. *Crinella Tr. IX.* 1 12; *HS. V.* 81. f. 280; *Zell. Linn. VI.* 166. *et Is.* 184. Aderat copise sub finem Junii in *Samboriensis Gymnasi* museo in vulpis cauda.

(*Lampronia Steph.*)

1024. Variella Fab. *FR. 82;* *HS. V.* 65; *Zell. Is.* 203. *et Linn. VI.* 193; *OT. X.* 3. 206. *et* 292. Reperitur solitarie *Leopoli* in sepimentis, porro in Alnis glut. silvaticorum circa *Leopolim et R. g. Extremo Majo* initioque Junii (sociis 1086, 1019 etc.).

1025. Praelatella SV. *Luzella Tr. X.* 3. 204 *et* 291; *HS. V.* 65; *f. 294;* *Zell. Linn. VI.* 189. *et Is.* 183. Sat frequens Junio in coryletis silvarum *Radl. górne et Zapust.*

1026. Flavimitrella H; 429. *HS. V.* 64. *f. 292;* *Zell. Linn. VI.* 184. Hucusque semel 3. Junii unicum exemplar obsoletum (sociis 1216 etc.) in Pruno pado in campestri betuleto *Zubrze.*

(*Incurvaria Haw.*)

1027. Oehlmaniella *Tr. IX.* 2. 122; *Zell. Is.* 183. *et Linn. V.* 314; *HS. V.* 66. *fig. 296. 297.* Quotannis frequentissime a fine Maji ad Julium in coryletis silvarum per terr. cunctum usque ad montosa (*Magóra*).

1028. Capitella L. *HS. V.* 67. *fig. 293;* *Zell. Is.* 183 *et Linn. V.* 317. Plura exemplaria (sociis: 863 etc.) 1. Junii inter zizania saltus paludos in frondosa silva *Zapust* prope munimenta pagi *Stupnica.*

1029. Masculella SV. *Zell. Is.* 183. *et Linn. V.* 303; H. 125; *HS. V.* 66; *OT. IX.* 2. 120. Hucusque exemplar unicum 15. Maji (sociis: 1304 etc.) in betuleti *Zubrze* coryletis.

(*Xysmatodoma Zell.*)

1030. Melanella Haw. (*Stelliferella FR. 59.*). *Zell. Linn. VII.* 363; *HS. V.* 89. Initio Junii exemplaria plura circa Leo-

polim in sepimentis et silvis, ubi de fruticibus et Quercubus a me excitata sunt.

(*Blapophanes Zell.*)

1031. Imella Hüb. 347; HS. V. 79. f. 323; Zell. Is. 183. et Linn. VI. 103. Exemplaria plura in Alno glut. ad betuleti *Zubrže marginem* (sociis: 256), porro in rosetis inter *L.* et *W.* Ultimis Maji diebus sub vesperum.

1032. Monachella H. 143; Zell. Linn. VI. 111. et Is. 184; HS. V. 79. Singula exemplaria 30. Maji et 3. Junii (comitibus: 1086, 99 etc.) in florido pratulo intersilvatico in *R. g.* ad dextram viae stratae pagum *Szady* versus. Ex latebris primum sole occidente prodit.

1033. Ferruginella H. 348; Zell. Linn. VI. 105. et Is. 183; HS. V. 79; OT. IX. 2. 265. Reperitur solitarie a fine Maji ad Julium circa *L.* in dumosis et ad silvarum margines.

(*Swammerdammia HS.*)

1034. Compunetella FR. HS. V. 281. f. 325. Solitarie Junio et Julio in coll. fruticosis excisi betuleti *Lwowiec* mixtarumque silvarum inter *L.* et *Wi.*, ubi sole occidente in posteriorum societate fruticum cacumina circumvolat.

1035. Comptella H. 89; Zell. Is. 184; HS. V. 280. f. 281. b. Exemplaria duo (comitibus: 1309 etc.) 12. Junii 1859 in *Pino silv.* et *Quercu* prope *Janow* in collinis *Szyp.*

1036. Oxyacanthella Mann. HS. V. 281. f. 327. Solitarie Majo et Junio in betuleti *Lwowiec* fruticosis, ubi praecipue *Crataegum oxyae* incolit et vesperi circumvolat.

1037. Cerasiella H. Zell. Is. 184; HS. V. 281. f. 328. Aliquot exemplaria Junio cum priore.

1038. Caesiella Hüb. Zell. Is. 184; HS. V. 280. f. 326. Frequentissime ab extremo Majo ad Aug. per omne terr. in promontoria usque in fructectis silvarum lucidarum et dumetorum, quae pervesperi socialiter gregatimque circumvolat. Incolit praeterea *Samboriae Leopolisque* pometa hortosque.

(*Seythropia HV.*)

1039. Crataegella L. H. 257; HS. V. 90; Zell. Is.

184. Unicum exemplar 15. Junii 1853 (sociis: 185 etc.) *Samboriae* in sepe viva pone *Synagogam*.

Rust. reperitur secus per cunctam fere Eur.; ad Vindob., Francof., Berol., Glog. etc., in Brit.? — *Arc.*: circa Ingolstadium, in Anglia, ad Megalop., Dresdam, Berol., Francof., in Palat. superiore, ad Labacum Carniolae, Nixdorf in Boh. — *Tap.*: per cunctam fere Eur. usque ad Lapp.; in domiciliis. — *Quercic.*: circa Vindob.; rara. — *Gran.*: per omnem Eur. — *Misella*: in domiciliis per omnem Eur.; ad Berol., Glog. etc. — *Parasit.*: praetipue in Eur. bor.; in Anglia, ad Aug. Vindelic., Francof., Berol., Vindob. — *Spret.* et *Pell.*: per omnem Eur. — *Ganom.*: circa Schandau in Saxonie, Nixdorf in Bohemia, Polnisch-Lissa in provincia Posnania, Glegaviam in Silesia. — *Bisel.*: in domiciliis per cunctam Eur.; circa Petropolim, Rigam, Dresdam, Francof., Glog., Vindobonam; porro in Brasilia. — *Var.*: circa Neustrelitz, Berolinum, Francof., ad Halam et Schandau Saxonum, in Helvetia, Alpibus, Rossia. — *Prael.*: in Anglia, circa Aug. Vindelic., Neustrelitz, in Semmerringo in Austria. — *Flavim.*: Vindobonae circa Brigittenau in urticetis rubetisque. — *Oehlm.*: in Anglia, circa Dresdam, Lipsiam, Francof., Glog., Vindob. — *Capit.*: circa Parisios, in Anglia, Suecia, circa Berol., Polnisch-Lissa; infrequens. — *Masc.*: in Anglia, circa Dresdam, Francof., Glegaviam, in Austria, Ukraina; infrequens. — *Melan.*: Vindobonae in septis. — *Imella*: circa Berol., Francof., Glog., in Bohemia. — *Monach.*: in Anglia, Germ. bor., Bavaria, ad Aug. Vindelic., Francof., Berol., in Austria. — *Ferrug.*: in Brit., circa Dresdam, Glog., Nixdorf in Bohemia, in Austriaco monte Kahlenberg. — *Comp.*: in Alpibus. — *Comptella*: in Anglia, circa Francof., Aug. Vindelic. etc.; infrequens. — *Oxyac.*: solitatem in plurimis Eur. regionibus. — *Ceras.* et *Caesiella*: in Anglia, circa Dresdam, Francof., Glog., in Bohemia, Austria. — *Crat.*: in Gallia, Brit., Suecia, ad Brunsv., Dresdam, Baden in Austria, in Bohemia.

Micropteryx Zell.

1040. Calthella L. Zell. Linn. V. 323. et Is. 185; HS. V. 391. fig. 1; OT. IX. 2. 117. Frequens gregatimque in variis plantis florentibus in pratulis inter - et subsilvaticis circa R. g., Stup. et L. Majo, Junio.

1041. Aruncella Seop. (*Podevinella* Hüb. 342.). Zell. Linn. V. 325. et Is. 185; HS. V. 391. f. 2; OT. IX. 2. 119. Volitat frequenter Junio per ericeta ad dextram viae stratae in fine silvarum coll. ditionis R. g., ubi inter multas alias species degunt Ericinella et Zieglerella.

1042. Alionella Fab. (*Ammanella* H. 388.). Zell. Linn. V. 330 et Is. 185; HS. V. 392. fig. 6; OT. IX. 2. 125. Plura specimina Junio in coryletis frond, silvarum circa R. g. et mixtarium abieginearum in Stupnicu (vide 863 etc.). A pluribus annis in conspectum mihi non venit.

1043. Rubrifasciella Haw. Zell. Linn. V. 334 et *Anderschella Isis* 185; HS. V. 392; OT. IX. 2. 126. Volitat numerose Majo per coryleta in silva R. g.; praeterea frequenter prope *Leopolim* in fruticosis herbidis querceti pone c. *Lis.*

1044. Fastuosella Zell. Linn. V. 340. et Is. 185; HS. V. 393. Plura specimina ad margines betuleti Zubrze (sociis 360, 1255 etc.) et mixtarum silvarum circa R. g. Latitat in Alnis glut. et Betulis. Initio Maji.

Calth. : provenit secus in Anglia, Suecia, ad Brunsv., Dresdam, Berol., Glog., in Bohemia, Austria. — *Arunc.* : circa Glog., Vindob., in Alpibus, in Carniola, Bohemia. — *All.* : in Italia, Pedemontio, circa Schandau, Reichstadt, Vindob., Kilonium, Chateaudun, in Alpibus; rara. — *Rubrif.* : in Austria, Bohemia, Helv. — *Fast.* : in Livonia, circa Ratisb., Erlangam, Glog., in Bohemia, Austria.

Nemophora H.

1045. Swammerdammella L. Zell. Linn. V. 348 et Is. 185; HS. V. 76; OT. IX. 2. 150; H. 410. 411. Quotannis vulgatissime Majo et Junio in frond. silvarum lucorumque frutec-tis, porro in dumetis per omne terr humilius. Latitat sub foliis libertissime in umbrosis.

1046. Pilulella Hüb. 409; Zell. Linn. V. 354 et Is. 186; HS. V. 78. fig. 215; OT. IX. 1. 153.

1047. Pilella SV. Zell. Is. 186 et Linn. V. 355; Hüb. 235; HS. V. 77. fig. 217.

Vulgares prioris socii. Ambae species incolunt silvas frond. et acerosas, herbosa dumeta floridaque pratula subsilvatica, ubi in plantis humilioribus frequenter reperiuntur.

Swam. volitat secus in Anglia, circa Stockholmiam in Suecia, in Dania, circa Schandau et Dresdam, Berol., Francof., Glog., in Helv., Boh., Austria. — *Pilellus* : in Silesia, Boh., Helv., circa Dresdam et Schandau in Saxoniam. — *Pilellus* : ad Aug. Vindelic., Francof., in Helv., in montosis Austriae.

Adela Latr.

1048. Fibulella SV. Zell. Linn. VIII. 3 et Is. 186; HS. V. 100. f. 236.

1049. Bimaculella FR. 68; *Leucocerella* Scop. Zell. Linn. VIII. 7; HS. V. 100; *Conformella* Zell. Is. 186.

Proveniunt Majo initioque Junii ubique in pratalis silvaticis fruticosorumque herbosis soli expositis, ubi mixtim gregatimque aut diversis floribus (Calthae, Ajugae, Veronicae, Ranunculi etc.) incident, aut circa hos solito Adelarum more culicum instar lusorie volitant. Anno 1854. observavi Fibulellam mense Julio.

1050. Tombacinella FR. *Violella* Tr. IX. 2. 139; Zell. Is. 186. et Linn. VIII. 16; HS. V. 102. f. 240. Sat multa Julio initioque Aug. in herbosis pratalis subsilvaticis coll. ditionum R. g., Stup. et L., porro in prato foenario Z. P. montani pagi Wolcze (hic sociis 6. etc.).

1051. Sulzeriella Zell. Is. 186. et Linn. VIII. 25; *Sulzella* H. 121; HS. V. 104. f. 227; OT. IX. 2. 132. Reperitur frequenter socialiterque Junio in umbrosis fructetis coll. silvarum frond. et acer. in R. g., Stup. et ubivis circa L.

1052. Degeerella L. Zell. Is. 187. et Linn. VIII. 30; H. 130. 446; FR. 66; HS. V. 104; OT. IX. 2. 131. Quotannis innumerosa toto Junio in fruticetis silvarum frond. et in dumetis per omne terr. in promontoria usque.

1053. Oehsenheimerella H. 359. Zell. Is. 187. et Linn. VIII. 35; HS. V. 105; OT. IX. 2. 134. Plura specimina Junio in pieca silvula Jedlina prope munimenta in Stup. (socia 1042.), in silvis frond. circa R. g. et L. et in pinetis prope J.

1054. Viridella Scop. Zell. Is. 187. et Linn. VIII. 37; H. 129; HS. V. 102. f. 218. OT. IX. 2. 148. Reperitur vulgate sed localiter per cuncti terr. humilioris silvatica, in quibus gregatim frutices, arbuseulas vel altiores ramos soli expositos lusorie circumvolat. Majo initioque Junii.

Fib. et Bimac. proveniunt secus in Anglia, circa Francof., Berol., Glog., in Boh., Austria. — Tombac.: circa Vindob., Reichstadt in Boh., Glog., in Hung. — Suls.: in Gallia, Anglia, circa Aug. Vindelic., Francof., Berol., Polnisch-Lissa, Carniola, Boh., Austria. — Deg.: per cunctam fere Eur.; in Anglia, Suecia, ad Aug. Vindelic., Dresdam, Berol., Francof., Glog., in Carniola (Idria), Austria, Helv., Calabria. — Ochs.: in Austria, circa Nizdorf in Boh., Schandau et Leucopetram in Saxonie, Probsthein in Silesia Borussica. — Virid.: in Suecia, Anglia, Germ., ad Aug. Vindelic., Schandau et Dresdam, Berol., Francof., Glog., Idriam Carniolae, in Austria, Hung., Italia.

Nematois Hüb.

1055. Scabiosellus Scop. Zell. Is. 187. et Linn. VIII. 47; HS. V. 97; f. 229; OT. IX. 2. 146; H. 128. Speciem hanc inveni frequentem sub capitulis florentis Scabiosae arvensis 24. Julii in pratis Kam. et Z. P. in vallibus montanis circa W., porro solitariae Junio circa L. et J. In coll. ditione R. g., eujus prata Scabiosis abuadant, frustra per annos Scabiosellum quaeasivi.

1056. Schiffermüllerellus SV. Zell. Linn. VIII. 69. et Is. 187; HS. V. 98. f. 233; OT. IX. 2. 135; H. 132. Reperitur sat frequenter Julio praecipue in apricis supra floribus plantarum variarum per coll. ditiones R. g. Stup. D. et L.

1057. Violellus FR. Zell. Linn. VIII. 61; HS. V. 79. f. 230. 231. Aliquot exemplaria Julio in coll. silvae Radl. górné virgultis marginalibus.

1058. Minimellus SV. Zell. Linn. VIII. 76; HS. V. 99. f. 235. Plura spec. Julio inter frutices in coll. silvaticis R. g. et in prato foenario Kaminka vallium monte circa Wołcze (hic sociis: 1055. 6. etc.)

Scab. inhabitat secus Brit., Bavar., Dresdam, Glog., Helvetiam, Bohemiam, Carniolam, Hung., Italiam, Dalmatiam. — Schiff. inventur in Brit., Borussia, ad Francof., Glog., in Austria, Hung. — Violell.: hinc inde per Eur. — Minim.: in Hung., ad Dresdam, Francof., Ratisb. etc.

Euplocamus Latr.

1059. Füsslinellus Sulz. (*Anthracinella* H. 224.). Zell. Linn. VI. 86. et Is. 187; HS. V. 82. f. 241—243; OT. IX. 1. 5. Decorum hoc lepidopteron provenit vulgate sub fine Maji initioque Junii ubivis in silvaticis circa Leopolim, frequentissime vero in umbrosis fruticosarum Fagorum in excisis quereteti pone c. Liš. Singulis speciminiis inveni praeterea Füss. in fruticosis quereteti P. (sociis 99. 54 etc.) et in Pino silv. prope Janow. Feminae difficulter inveniuntur.

(*Scardia Tr.*)

1060. Choragellus Zell. Is. 187. et Boleti F. Linn. VI. 91; Mediella OT. IX. 1. 5. IV. 51. 195; HS. V. 63. f. 314. Volitat copiose sub vesperum ultimis diebus Maji initioque Junii,

minore numero speciminibusque obsoletis per totum Junium Juliumque, per fruticeta circa *R. g.* in betuleto *Lwowiee* et circa *L. praecipue* in querceto supra *c. Lis.* Plura exemplaria inveni etiam in *Samboriae Leopolisque* septis.

Füssl. provenit secus in Anglia, ad Aug. Vindel., Vindob., Brunam, in Carniola, Hung. etc. — Chorag. in Anglia, circa Francof., Aug. Vindelic., Berol., Glog., Reichstadt in Bohemia, in Austria alibique.

Pluteella Schrk.

1061. Xylostella L. Zell. Is. 188; H. 119; HS. V. 106; f. 350. Frequentissime a Majo ad Nov. inter zizania, in hortis, in pratibus fruticosisque herbidis per cunctum terr. usque ad mont. ditiones.

1062. (Var?) Cruciferarum Zell. Ent. Z. 1843; HS. V. 106? (*Xylostella Tr.*). Plura exemplaria 11. Aug. (sociis: 1152 etc.) in pomario pagi *Modrycz* et 29. Oct. (comitibus: 1122 etc.) inter fructecta betuleti Z. Haec exempl. appropinquant se quidem aliquo modo varietatibus *Xylostellae* quoad signaturas coloresque, sunt autem tantae magnitudinis, ad quam *Xyl.* (saltem in nostratis) nunquam pervenit. Specimina talia, quibus *Xyl.* et *Cruc.* sine dubio unirentur, hucusque non inveni.

1063. Porrectella L. Zell. Is. 188; H. 169; HS. V. 107; OT. IX. 2. 27. Semel exemplar unicum (sociis: 158 etc.) 19. Junii 1854. in agris Trifolio consitis pone silvam *R. g.*

(*Rhinosia Tr.* *Harpapteryx Tr.*)

1064. Asperella L. Zell. Is. 189; H. 101. 329; HS. V. 148; OT. IX. 2. 4. Reperitur solitarie quidem sed universim satis frequenter primum vere, tum Aug.—Nov. in hortorum septis truncisque arborum silvaticarum in promontoria usque.

1065. Horridella Kuhlw. Zell. Is. 189; HS. V. 148. f. 373; OT. X. 3. 119. Hucusque spec. plura Julio in arboribus pomiferis pometorum *Samborinae* (sociis: 321 etc.) et montani pagi *Wolze* (hic una cum: 1147, 6 etc.).

1066. Antennella SV. H. 99; Zell. Is. 189; HS. V. 149; OT. IX. 2. 8. Reperitur vulgate ad marginem coll. quereti *Zuh in Rak.* (una cum: 1070, 750, 1067, 1288, 1195, 757, 754 etc.), porro solitarie in silvaticis circa *R. g.* et *L.* Volitat

Julio; plura spec. parva inveni etiam Sept. in querceto *Bednarówka* prope *Leopolim*. Omnia fere exempl. excitavi de *Quercubus*.

1067. Silvella L. Zell. Is. 188; H. 420; HS. V. 149; OT. IX. 2. 16. Singula spec. in querceto *Łuh* prope *Rak.* (sociis: 1195, 1066 etc.), in betuleto *Z.* prope *L.* (simul cum: 922 etc.) et in mixtis silvaticis *Dąbrowa* prope *M.* (comitibus: 1152 etc.). Augusto, Septembri.

1068. Harpella SV. Zell. Is. 189; H. 110; HS. V. 150; OT. IX. 2. 37. Hucusque duo exemplaria Julio; alterum in coll. silvae *R. g. Populo*, alterum inter densa trutecta abruptorum in montibus prope *Wolcze* Quoad consocios (vide 258 et 6.).

1069. Fissella H. 108; Zell. Is. 188; OT. IX. 2. 30; HS. V. 150. f. 391. 376. Reperitur in truncis silvaticorum, hortorum, arbusterumque per terr. cunctum a pl. in promontoria usque (*Bubniscze*, vide 532). Numerose obvia mihi fuit Fiss. Julio, satis frequenter etiam Aprili (in copula), Majo et Aug. — Nov. Praeter varietates: **Byssinella** Hüb. 380, **Lutarella** H. 168, **Variella** H. 106 aliasque a Clariss. Zellerio et Schäffero descriptas, possideo multa alia uno eodemque die (13. Julii) in silva *R. g.* (simul cum: 776 etc.) lecta exemplaria, quae excepto puncto fusco ante angulum analem penitus inter se differunt.

1070. Costella F. Zell. Is. 188; H. 107; HS. V. 151. Aliquot exemplaria in varietatibus; primum Julio in coll. queretis pagorum *Cz.*, *R. g.* et *Rak.*, tum Octobri in querceto *B.* (hic sociis: 603, 851, 855, 906, 910, 911, 913, 919, 921, 914, 1006, 1206, 577, 517, 516, 366, 275.).

1071. Sequella Clerck. Zell. Is. 188; H. 103; HS. V. 151; OT. IX. 1. 229. Sub finem Junii exemplaria duo *Leopoli* in pomarii septo adversus hortum botanicum.

1072. Vitella Clerck. Zell. Is. 188; H. 349; HS. V. 152. f. 392; OT. IX. 2. 88. Reperitur solitarie Julio in fissuris truncorum Pop. tremulae aliarumque arborum in *Leopolitanis* ambulacris. Ex varietatibus possideo illas, quas Clariss. Zeller in Iside sub literis c. f. et l. descriptis.

(*Theristis* H.)

1073. Cultrella Hüb. 109. Zell. Is. 189; HS. V. 152; OT. IX. 2. 41. Hucusque exemplaria duo; alterum 30. Maji 1852

(sociis 1086 etc.) in prato humido *P. L.*, alterum 2. Junii 1859, in florido pratulo sicco ad betuleti *K. marginem* (vide 205.).

(*Eidophasia Steph.*)

1074. Hufnagelii Zell. Is. 188. *Alis anter. albidis brunnescenti impuris, basi, macula una costali, una dorsali limboque laete brunneis, costa a basi ad 1/3 alae alba.*" HS. V. 84, f. 344. Lautum hunc papiliunculum inveni quinque speciminibus 12. Junii et 3. Julii prope J., in calcareorum collinorum Szyp delibibus siccis, speciatim vero loco florido fruticosis Quercubus, Pinis silv. et coryletis cincto. Ex latebris primum post solis occasum prodit vagaturque tunc per flores Thymi serp., Prunellae vulg., Sedi acris., Gnaph. dioici aliarumque humilium plantarum (sociis: 1078, 1079, 1080, 1161, 1180, praeterea vide 998 et 1309).

*Xylot. invenitur secus in Gallia, Anglia, Suecia, Dania, Bavaria, Sax; circa Berol. Francof., Glog., in Helvetia, Austria. — Porrect.: in Gallia, Anglia, Suecia, Dania, Sax., circa Francof., Berol., Glog., Vindob. — Asp.: in Gallia, Anglia, ad Upsalam in Suecia, ad Dresden, Francof., Glog., in Helv., Austria, ad Reichstadt in Bohemia, in Hung. — Horr.: in Anglia, Helvetia, circa Glogaviam, Reichstadt, alibi. — Antenn.: in Austria, Boh., ad Dresden, Glog., Francof. — Silv.: in Anglia, ad Upsalam Sueciae, in Bavaria, Sax., ad Megalop., Francof., Glog.. in Boh., Hung., ad Mödling et Vindob. — Harp.: in Austria, Bohemia, Helv., ad Megalop., Aug. Vindelic., in Anglia; rara. — Fiss.: in Gallia, Anglia, Germ., Austria, Hung., ad Constantinopolim. — Cost.: in Gallia, Anglia, Bavaria, ad Dresden, Glog., Neostreliciam, Francof., Berol., in Austria, Syrmia. — Sequella: in Gallia, Anglia, Suecia, Saxonia, Austria, Hung. — Vit.: in Anglia, Suecia, Saxonia, ad Berol., Francof., Glog., in Austria, Silesia, Bohemia, in Montibus metalliferis, in Hung. — Cultr.: circa Parisios, in Anglia, Borussia, ad Dresden et Schandau Saxonum, ad Ratisb., Francof., Vindob., in Bohemia, Hung. — *Hufnagelii*: de geogr. ejus distrib. scribit Inclitus Schäffer „Aus Preussen?“ et Clariss. Zeller in Iside 1839: „Das Vaterland ist vielleicht das südliche Europa.“ Rarissima. —*

Y p s o l o p h u s Fabr.

1075. Ustulellus F. „*Alis anter. brunneis, area versus medium costae et ciliis ochraceis.*“ H. 159; Zell. Is. 190; HS. V. 154; OT. IX. 2. 11. Reperitur solitarie Majo Junioque in dumosis, nemoribus silvisque frond. praecipue quercetis circa *R. g.* et *L.* In copula inveni *Ustulellum* semel 3. Junii.

1076. Fasciellus H. 111. Zell. Is. 190; HS. V. 154; IX. 2. 10. Volitat in prioris societate, est autem semper et ubivis multo frequentior.

(*Gelechia H.*).

1077. Verbascellus SV. H. 98; HS. V. 163. f. 583; OT. IX. 1. 253; Zell. Is. 190. Hucusque exemplaria plura; unum in Quercu in mixto nemore adversus betuletum K. (sociis: 151 etc.), alia in sabuletis herbosis circa L. et J. Junio.

(*Sophronia Hüb.*)

1078. Semicostellus H. 396. *Parenthesellus*. L. HS. V. 155; OT. IX. 2. 49; Zell. Is. 189. Volitavit satis frequenter (socialiterque una cum 1074 1079, 1080 etc.) vesperi 12. Jun. et 3. Julii per calcareorum collinorum Szyp herbosa declivia. Praeter hanc ditionem obvia mihi fuerunt per sex annos specimina tria in coll. betuleti Liwowiec herbosis, id est: 6. 8. et 13. Julii (simul cum 553, 452, 776.).

1079. Humerellus SV. Zell. Is. 189; HS. V. 156. f. 372, H. 292. Specimina plura cum priore Junio et Julio in floridis de- clivibus collinorum Szyp. Volitat similiter ac prior et posterior prope ipsam humum.

1080. Consanguinellus FR. „Alis anter. nigris, costa et dorso albis, lineis ambabus apicis acute falcatis albis in angulum acutum convergentibus; capite thoraceque albis. Aequat magnitudine Semicostellum.“ HS. V. 156. f. 369. Vagabatur frequenter et in pulcherrimis exemplaribus vesperi 12. Junii et 3. Julii per humillimas herbas siccas eodem in loco ac Hufnagelii, Humerellus, Semicostellus, (ceterum vide 1309 et 998).

(*Mesophleps Hüb.*)

1081. Silacellus H. 117; HS. V. 203, Specimen singulum 1. Julii (sociis 945 etc.) in monticulo Cz. sk., 1304 p. v. (Kbg.) elato. Latebat inter herbas.

(*Eupleuris Hüb.* *Megacraspedus* Zell.)

1082. Striatellus SV. HS. V. 204. f. 563; OT. IX. 2. 24; Zell. Is. 190; H. 288. Exemplar unicum, quod in collectione habeo, excitatum est a me de Pt. aquilina 30. Junii prope H. in collinorum Zapole querceo fructecto (vide 238).

1083. Coenulentellus FR. (*Fuscoapicellus* FR.). „Alis anter. lutescentibus, costa apiceque fuscescentibus, linea obliqua a

$\frac{2}{3}$ costae versus angulum ani striolaque dorsali vix conspicua albis; palpis, capite thoraceque osseis. HS. V. 204. Venustum hunc papiliunculum inveni prope L. ab 29. Junii ad 11. Julii (sociis: 151, 985, 967 etc.) 5. speciminibus, quae in arido pratulo nemorali adversus betuletum K. aut luce obseura per florentia Hyperica perf. vagabantur, aut interdiu in nemoris Quercubus marginalibus abdita latebant hisque percussis a me excitata sunt.

Ustul. invenitur secus circa Dornbach et Mödling in Austria, in Hung. Italia, Helv.; rarus. — Fasc.: in Anglia, Suecia, ad Dresdam et Schandau, Francof., Glog., Vindob., in Hung., Boh. — Verb.: in Anglia, Bavaria, circa Dresdam et Schandau, Berol., Francof., Glog., in Austria, Helv. — Semic.: circa Reichstadt in Bohemia, Vindob., Dresden, Francof., Ratisb., in Helvetia. — Hummer: in Anglia, in Alpibus, ad Glog., Ratisb., Megalop., Francof., Vindob. — Consang.: hucusque circa Vindob. et Ratisb. inventus; rarissimus — Silacellus: solitarie in Hung., circa Vindob. et Ratisb. — Striatellus: circa Vindob., in Hung., Helvetia, ad Polnisch-Lissa, Francof., Glog. — Coenulentellus: in Anglia, ad Megalopolim, Reichstadt in Bohemia. Rarissimus.

Anchinia H.

1084. Verrucella SV. „Alis anter. violaceo - cinereis, maculis disci (altera ante, altera post medium) transversis scabris atris, basi, ambitu maculae anterioris et ante apicem lateritio-purpureis, serie limbalium punctorum nigrorum.“ Zell. Is. 191; HS. V. 143; OT. IX. 1. 181; H. 315. Plura exemplaria sub finem Junii Julioque in Quercubus coll. nemoris pone betuletum K. et in querceto R. g. Secus in Austria, circa Aug. Vindelic et Gunzenhausen in Bavaria. Rara.

Harpella Schrank.

1085. Proboscidella Sulz. „Alis anter. cinnamomeo-ferrugineis, vitta e basi in angulum ani excurrente maculaque obliqua costali flavissimis.“ H. 120; Zell. Is. 191; OT. IX. 2. 58; HS. V. 139. f. 407. Decorum hunc papiliunculum inveni hucusque speciminibus duobus; alterum 30. Junii (sociis: 690, 238 etc.), alterum 11. Julii (simil cum: 985 etc.); ambo prope L. in excisis coll. querceti supra c. Liš., ubi in fruticosa Fago et Quercu abdita latebant.

Secus in Sax., Bavaria, circa Berol., Francof., Glog., in Helvetia, Carniola, Austria, Boh. Hung.

Oecophora Latr. (Butalis Tr.)

1086. Curtisella Donov. (Coenobitella Hüb.). HS. V. 263; Zell. Is. 194. „Alis anter. albis, macula costali permagna (in meo spec. a basi. ad $\frac{2}{3}$ costae) limboque fuscis, pustulis tribus limbā-

libus atris; poster. fuscogriseis." Hucusque semel specimen singulum 30. Maji 1853. in silvae Radl. górné coryleto. Uno tempore obvia mihi fuerunt sequentia lepidoptera: 32, 35, 41, 53, 59, 97, 102, 156, 160, 176, 178, 200, 208, 222, 224, 232, 254, 291, 315, 327, 330, 398, 410, 413, 427, 428, 431, 445, 453, 467, 474, 478, 480, 483, 486, 488, 491, 492, 510, 512, 519, 547, 550, 535, 557, 587, 598, 612, 613, 620, 623, 637, 659, 660, 677, 683, 685, 686, 700-702, 726-724, 728, 736, 748, 730, 777, 778, 782, 795, 803, 819, 816, 820, 821, 825, 835, 836, 845, 842, 852, 853, 865, 871, 873, 875, 894-896, 900-902, 938, 928, 941, 943, 947, 953, 1012, 1013, 1024, 1027, 1032, 1038, 1045, 1046, 1049, 1040, 1043, 1052, 1054, 1060, 1073, 1076, 1105, 1125, 1148, 1153, 1164, 1176, 1189, 1225, 1287, 1248, 1307, 1305, 1316, 1318-1320, 1324, 1325.).

1087. Restigerella Metzn. „*Alis anter. nitidis fusco-cinereis, vitta e basi media albida, ante limbum evanescente.*“ Zell. Linn. X. 238. et Is. 193; FR. 92; HS. V. 264. Unicum exemplar (sociis: 985 etc.) 11. Julii percussione herbarum in excisis coll. queretci supra c. Liš.

1088. Esperella H. 255. *Extensella* Hub. „*Maxima, alis anter. olivaceis flavo-virescenti nitentibus, posteriores latitudine subaequantibus, apice laete cupreo; feminae abdomine infra macula emarginata flava.*“ HS. V. 266; Zell. Linn. X. 173. et Is. 192. Tres mares et unam feminam 30. Junii (simul cum 238 etc.) in florido prato aperto prope H. et 1. Julii (comitibus 945 etc.) in herbosis mixtae silvae ad pedem monticuli Cz. sk. pagum Lisienice versus. Ex latebris primum luce obscura prodit.

1089. Seliniella Zell. Is. 193. et Linn. X. 182; HS. V. 267. f. 931. Duos mares vesperi 1. Julii (cum priore, 945 etc.) in herbosis in summo monticulo Cz. sk.

1090. Armatella Schlaeg. *Fallacella* Zell. Linn. X. 184. HS. V. 267. f. 934. Priori simillima. Volitavit frequenter per Hyperica perforata sub vesperum 29. Junii in sicco pratulo nemorali prope coll. betuletum K. (vide 151). Capta spec. sunt soli mares.

1091. Vagabundella Zell. Linn. X. 200; HS. V. 269. Specimina singula pervesperi 9 et 30. Junii in pagi Hołosko pra-

tulo, ibidem in angusta vallicula penes molam sito. Quoad comites (vide 328 et 238).

1092. Laminella SV. Zell. Is. 193. et Linn. X. 220; HS. V. 270. f. 935?; OT. IX. 2. 114; H. 139. Vagabundellae simillima. Exemplaria plura in excisis coll. betuleti *Lwowiec* (simul cum: 158, 632, 149 etc.), in supra commemorato prato prope *Hołosko* (comitibus: 238 etc.) alibique circa *L.* in pratis. Altera parte Junii. Latitat in herbosis.

1093. Chenopodiella H. 320. „*Alis anter. olivaceo fuscis nitentibus, apice dorsique maculis tribus irregularibus flavicantibus.*“ *Tristella* Tr. IX. 2. 109; Zell. Linn. X. 243. et Is. 193; HS. V. 264. Provenit solitarie sub finem Maji initioque Junii *Leopoli* in muris sepibusque suburbii *Stryensis* (comitibus: 116, 121, 208, 246, 814, 900, 994, 1148, 1260, 1294, 246, 290 etc.). *Samboriae* et in apertis obvia mihi non sunt. Varietates, de quibus in variis operibus commemoratur, hucusque invenire mihi non contigit.

1093½. Cuspidella SV. „*Alis anter. nitidis olivaceis, maculis duabus (altera costali baseos obliqua, altera apicali) punctoque disci ad 2/3 vitellinis albisve; collari vitellino.*“ HS. V. 263; OT. IX. 2. 110; Zell. Is. 193; H. 242, 385, 386. Volitavit frequenter vesperi 29. Junii (una cum: *Laminella*, *Semicostello*, *Humerello*, *Pratana*, *Pollinariella*, *Cinerella*, *Terrella*, *Ligulella* etc.) prope *L.* per muscosum nardetum ante campestre betuletum *Zubrze*. Quieta culmis insidet. Varietates sine macula apicali et puncto disci sunt frequentes. Feminae rariores esse videntur.

(*Hypatima* H.)

1094. Inunetella Ti. „*Alis anter. fusco-luteis nitidulis, punto centrali post medium fusco obsoleto.*“ Zell. Is. 193. et Linn. X. 266; HS. V. 212. f. 419. Duo exempl. (sociis: 266 etc.) 8. Aug. in pago *D.* in parietibus domicilii pone pomarium siti. Item exemplaria duo 19. Julii (simul cum: 258 etc.) in collini betuleti *Lwowiec* fruticosis. (*Lypusa* Zell.)

1095. Maurella SV. „*Nigra, alis anter. nitidulis.*“ Zell. Is. 192. et Linn. VII. 334; H. 122; HS. V. 63; OT. IX. 2. 113. Hucusque exemplaria 4 sub finem Maji initioque Junii percussione *Quercum* in silvaticis *R. g.* (sociis: 993 etc.), *Lisienice* (simul cum: 689 etc.) et *Korycina* (comitibus: 328 etc.). Secunda Junii 1857. vidi eam ad marg. *quercei* *R. g.* sole occidente supra *Quercum* cæcumina sat frequenter socialiterque vagantem.

(*Pancalia* Steph.)

1096. Leuvenhoekella SV. „*Alis anter. rubro-aureis, fascia pone basin obliqua maculisque quattuor alternatim oppositis argyreis; antennis ante apicem albis.*“ *Schmidtella* Tr. IX. 2. 167; *Zell. Is.* 192; *HS. V.* 210; *H.* 261. Specimina plura 1. Junii 1853. in mixtae silvae *R. g. coryleto* (sociis: 863 etc.).

(*Lamprus* Tr.)

1097. Minutella L. „*Alis anter. nitidulis fuscis, maculis duabus posticis oppositis flavidis, dorsali majore; capite palpisque fuscescenti-luteis.*“ *Zell. Is.* 192; *H.* 141; *HS. V.* 140; *OT. IX.* 2. 120. Volitat solitarie Junio initioque Julii inter Ahos glut. ad marginem coll. silvae *R. g.*, porro in hortis sepulcretisque Samboriae, Leopolis et Janoviae.

1098. Cinnamomea Zell. *Minorella* Zell. *Is.* 192; *HS. V.* 139. f. 415. „*Alis anter. laete cinnamomeis, striga ex media basi ad medium dorsum maculisque duabus posticis oppositis; capillis flavis, vertice cinnamomeo, palpis flavis.*“ Bellum hunc papiliunculum inveni specimine unico prope *H.* 30. Junii in Quereu pumilescente inter collinorum Mostki frutices mixtos. Quoad comites (vide 238 et 690).

1099. Fulviguttella FR. „*Alis anter. fuscescenti-luteis, maculis duabus flavis, altera in dorsi medio obsoletiore, altera pone disci medium distincta.*“ *HS. V.* 140; *Zell. Is.* 193. Vagatur solitarie Aug. in rubetis fruticosisque mixtis ad margines coll. silvaticorum Radl. g. (sociis: 674, 85 etc.) et Dąbrowa prope Modrycz. (hic una cum: 1152 etc.).

1100. Sulphurella Hüb. 150. „*Alis anter. fuscis sulphureo pulvereis, macula una longitudinali e media basi, una dorsali, una in angulo postico, una costali anteapicali flavidis; capillis ferrugineis, palporum dorso flavido.*“ *Tigrella*. *Zell. Is.* 192; *H.* 336; *HS. V.* 139. Tria specimina Junio in piceto Swińka prope *H.* (sociis: 328) et in pinetis prope Janow (una cum: 1309 etc.).

1101. Tinetella H. 214. „*Alis anter. unicoloribus ochraceis; costae basi fusca.*“ *Zell. Is.* 192; *HS. V.* 138; *OT. IX.* 2. 21. Vagatur copiose socialiterque extremo Majo per coryleta campestris querctei *B.* prope *L.* Solitarie obvia mihi fuit *Tinctella* praeterea Junio Julioque in virguletis silvaticorum circa *R. g.* et *J.*

1102. Schaefferella L. „*Alis anter. laete aurantiacis, striga, lineolis tribus longitudinalibus parallelis pustulisque tribus ferreis, nigro-cinctis; basi, limbo ciliisque nigris.*“ *Zell. Is.* 192; *H.* 136; *HS. V.* 141; *OT. 2.* 127. Duo exemplaria pulcherrima 29. Maji 1859. *Leopoli*

(sociis: 1024, 1019, 814, 380, 286 etc.) in pomarii septo adversus hortum botanicum.

1103. Procerella SV. „*Alis anter. miniatis, strigis duabus ante costam coeuntibus ferreis, fascia postica arcuata maculaque apicali in angulo ani convergentibus fuscis.*” Zell. Is. 192; H. 137; HS. V. 141. Hucusque exemplaria quinque; duo (sociis 748 etc.) in *Stupnica* ad piceti *Jedlina* marginem in Alno glut., unum in pariete muscoso Ecclesiae in pago D. (vide 1195), unum prope Janow in querecto P. R. (una cum 998 etc.), unum denique (comitibus 752 etc.) in *Corylo* avell. in querecto R. g. Julio.

1104. Formosella SV. Zell. Is. 192. „*Alis anter. vitellinis, fascia lata obliqua, albo marginata maculaque costae anteapicali ferrugineis.*” H. 248; HS. V. 141; OT. IX. 2. 170. Initio Julii 1859. in herbosis montieuli Cz. sk. prope lapicidinas exemplaria duo in societate specierum: 832, 945, 482, 481, 1081, 1088, 1232, 70 etc.

1105. Flavifrontella SV. „*Alis anter. flavidо-cineris, pustulis duabus obliquis ad $\frac{1}{3}$, una majore ad $\frac{2}{3}$ disci fuscocrescentibus; capillis ferrugineis, abdomine flavescente.*” Zell. Is. 192, H. 126; HS. V. 138; OT. IX. 2. 262. Plura specimina ab 29. Maii ad 10. Julii inter frutices in excisis betuleti *Lwowiec* et querecti *Pawłówka*. In latebris ad solis occasum delitesit. Capta exemplaria vagabantur per herbosa, plura etiam de fruticibus excitavi. (*Endrosis* H.)

1106. Lacteella SV. *Betulinella* H. 20. 448; OT. IX. 1. 9; HS. V. 262; Zell. Is. 192. *Vulgaris* incola domorum. Invenitur Majo — Octobri (et hieme) per cunctum terr. usque ad alpestres regiones (*Usrzyki górne, Skole*). Singulatim obvia mihi fuit Laet. et in silvaticis circa R. g., M. et L.

Curtisella reperitur secus in Anglia, Hannovera et circa Aug. Vindelicorum. In museo Palat. Vindob. addita est ei adnotatio „*Styria*”. Rarissima. — Restig.: circa Vindob. et in Hung. — Esper.: in Livonia, Alpilus, ad Lebacum in Carniola, in montosis Silesiae, in Hung. — Selin.: circa Glog., Vindob., Ischl alibiisque. — Armat.: circa Ratisb. — Vagabundella circa Fiume, in montosis Nanos, in Histria, Dalm., ad Brussum. — Lamin.: in Ukraina, Saxoniam, circa Brunsv., Ratisb., Glog. et Glatz, Reichenhall, Ischl, Vindob., Reichstadt et Nixdorf, in Styriae Alpibus, silva Hercynia, montibus Sudetis, Hung. — Chenop.: in Eur. media; in Gallia Anglia, Suecia, ad Petropolim, circa Polnisch-Lissa, Berol., Francof., Glog., Aug. Vindelic., Vindob., in Carinthia, Styria, ad Syracusas in Sicilia. — Cuspidella: circa Mödling in Austria, Schandau in Sax., Ratisb., in Bohemia. — Inunct.: circa Glogaviam, Posnaniam, Dresdam, Vratislaviam. — Maurella: in Toscana Hungaria, Austria, Germ. merid., ad Ratisb., Aug. Vindel. in Bavaria,

porro in Casano. Bohemiae deesse dicitur. — Leuw.: in Livonia, circa Ratisb., Dresdnam, in monte Cetio (Kahlenberg) et circa Mödling prope Vindobonam, in Bohemia, Carinthia, Hung. — Minut.: in Anglia, Schonia, Ukraina, circa Dresdnam et Schandau, Francof., Ratisb., Neustrelitz, in Bohemia, ad Vindob. — Cinnamomea: circa Neustrelitz, Berol., Glog., Ratisb., Schandau et Dresdnam, Vindob., in Bohemia. Rara. — Fulvig.: in Borussia, Austria, circa Megalopolim, Nixdorf in Bohemia. Rara. — Sulphur.: circa Mödling in Austria, Nixdorf, Dresdnam et Schandau, Francof., Berol., Glog. et Polnisch-Lissa in Silesia Borussica. — Tinct.: in Anglia, Saxoniam, circa Berol., Glog., Francof. a. O., Ratisb., Nixdorf, Vindob., in Carinthia? — Schäff.: in Gallia, Anglia, Schonia, circa Aug. Vindelic., Dresdnam, Francof., Berol., Glog., Vindob., in Hung. — Procer.: in Bohemia, circa Vindob., Schandau, Francof., Berol., Aug. Vindel., Ratisb. — Formos.: circa Megalop., Francof. a. M., Berol., Glog., Vindob. in Saxoniam, Helvetia, Bohemia, Hung. — Flavifr.: in Gallia, Helvetia Saxonum, in Alpibus, circa Ratisb., Nixdorf et Reichstadt, in Austria, Hung. — Lact. denique per cunctam Eur.

Yponomeuta Latr.

1107. Plumbellus SV. „Alis anter. albis, punctis numerosis seriatis, macula versus medium dorsi apiceque nigris.“ Zell. Is. 194; H. 86; HS. V. 91; OT. IX. 1. 213. Frequens sub finem Aug. locis collucatis in mixta silva R. g., ubi sub vesperum prope humum per herbosa vagatur.

1108. Evonymellus L. „Alis anter. lacteis, punctulis (circa 50) nigris 4 - 5 seriatis, ciliis concoloribus.“ Tr. Zell Is. 194; H. 88; HS. V. 92; OT. IX. 1. 215. Unicum exemplar (sociis 1300 etc.) 5. Junii in Pruno pado in coll. silva R. g.

1109. Cognatellus Tr. Zell. Is. 194; H. 87. 391. 392; HS. V. 92; OT. IX. 1. 220. Frequens Samboriae in pometis Julio. In silva Radl. g. Julio et Aug. solitarie in Pyro communi et malo.

1110. Padellus L. Zell. Is. 194; H. 393 — 395; HS. V. 91; OT. IX. 1. 217. Unum par in copula (sociis 752 etc.) 31. Julii in silva Radl. g. percussione Pyri mali.

Plumb. invenitur secus in Anglia, Bavaria, circa Francof., Berol., Glog. in Austria. — Eton.: in Anglia, Suecia, Bavaria, Silesia Borussica, circa Berlinum, Francof., in Carniola, Austria. — Cogn.: in Bavaria, circa Berol., Francof., Glog. in Austria. — Padellus denique per omnem fere Eur. medium.

Psecadia H.

1111. Scalella Scop. „Alis anter. niveis, vitta media longitudinali utrimque sinuata limbum non attingente, pustulis punctisque atris; poster. antice griseis, postice albis; capite, thorace ab domineque albis.“ Lithospermella Tr. IX. 1. 209; Zell. Is. 194; H. 104; HS. V. 132. Tria specimina 3. Julii (sociis 998 etc.) prope Janow in silvaticis inter Romanówka et Szyp in arborum truncis et fruticibus.

1112. Echiella SV. „*Alis anter. albis, dimidio costali majore postice dentato nigro; abdomine flavo.*“ Paulo minor priore. Zell. Is. 194; II. 105; HS. V. 132; OT. IX. I. 211. Reperitur satis frequenter altera parte Maji Leopoli in sepiminibus. In silvis circumiacentibus rara.

1113. Funerella. Fabr. „*Alis anter. nigerrimis, macula magna costali post medium vittaque dorsali lata irregulari nigropustulata albis.*“ $8\frac{1}{2}.$ “ Zell Is. 194; II. 85; HS. V. 131; OT. IX. I. 213. Satis frequens in silvis frond. per omnes humiliores regiones. In Samboriae Leopolisque pometis quoque adest. A fine Maji usque ad Aug.

1114. Decemguttella II. 303; Zell. Is. 194; HS. V. 132; OT. IX. I. 225. „*Alis ant. albido-plumbeis, punctis 10 nigris, anali maximo.*“ Magnitudo Funerellae. Exemplar unicum 29. Junii in Quercu nemorali ad betuletum K. (vide 151).

Scalella provenit secus in Carniola, Austria, Bav., Sax., alibique in Germ.—*Ech.* in Austria, Hung., Helvætia, circa Dresden et Schandau, Polska — Lysa, Berol., Francof., Glog.—*Funer.* in Anglia, Hung., Sax., Carniola, circa Mödling, Polska-Lysa, Francof., Aug. Vindelic.—*Decemgut.* in Anglia et hic illic in Germ.

Depressaria. Tr.

1115. Al bipunctella H. 149; Zell. Is. 196 et Linn. IX. 319; HS. V. 119; OT. IX. I. 245. Exemplaria quatuor; duo Augusto in arboribus pomiferis in pago M. (sociis 1152 etc.), terrium 29. Sept. (simul cum 1186 etc.) in Betula in silva Z., quartum vesperi Augusto prope S. in saliceto ad fluminis Dniester ripas, ubi locis excisis Rubus caesius spisse ingentique crevit numero.

1116. Appланетта Fabr. Zell. Linn. IX. 270 et Is. 195; Cicutella Tr. IX. I. 248; H. 419; HS. V. 118. Siugula exemplaria (sociis 674, 1115, 1152, 239 etc.) 16. Maji Samboriae in septo, 19 Aug. in silvaticorum R. g. Populo tremula, 8. Aug. in pagi M. pomario et 15. Sept. in Betula sylvae betulinae Z.

1117. Laterella SV. Zell. Is. 195 et Linn. IX. 263; HS. V. 125; Heractiella Tr. IX. I. 250; H. 417. Specimina plura Samboriae in pometis, porro in silvaticis fructetisque circa R. g., B. et Lis. 18 Maji — 8. Oct.

1118. Arenella SV. FR. 33; Zell. Linn. IX. 226 et Is. 195; H. 96; HS. V. 124; OT. IX. I. 258. Exemplaria lura Samboriae in sepiminibus, in aluetis vepretisque circa R. g. Majo.

*

1119. Propinguella Tr. X. 3. 184; Zell. Is. 195. et Linn. IX. 232; FR. 33; HS. V. 124; Plura exemplaria in truncis diversarum arborum in silvaticis R. g. 18 Maji — 3 Junii.

1120. Assimilella FR. 31. 32; Zell. Is. 195. et Linn. IX. 212; HS. V. 121; OT. IX. 1. 259. Exemplar alterum 12. Junii in Pino silv. in collinis Szyp, alterum 6. Julii in Quercu nemoris ad betuletum K. (Sociis 1309. 967. 1137 etc.).

1121. Impurella Metzn. Zell. Is. 196 et Linn. IX. 257. FR. 48; HS. V. 128; OT. X. 3. 178. et 279. In betuleto Ž. interveni eam pluribus speciminibus Sept., Oct. medioque Martio (simul cum: 76, 240, 375, 518, 523, 600, 829, 921, 1008, 1011 575, 572, 524, 519, 518, 437 etc.). Specimina duo cepi praeterea sub finem Maji (sociis 993 etc.) in silvaticis R. g. Insideat Alnorum Betularumque truncis plerumque ad radices, quam ob rem difficerter conspicitur et excitatur.

1122. Vaccinella H. 416; Zell. Is. 195 et Purpurea Hav. Linn. IX. 240; HS. V. 117; OT. I. 236. Exemplar unum 27. Oct. in Betulae trunco in betuleto Z. (simul cum 1121, 906, 907, 910, 911, 908, 913, 914, 919, 921, 851, 855, 877, 603, 577, 517, 372, 14).

1123. Pimpinellae Zell. Is. 196. et Linn. IX. 298; HS. V. 130. f. 439. Semel exemplar unicum 6 Julii (una cum 967 etc.) in pumiloseenti Fago in mixto nemore ad betuletum K.

Albipunctella reperitur secus in Hung., Austria, Germ. etc.; usque ad Angliam et Livoniam. — *Appl.*: in media borealique Europa usque ad 64°; orientem versus usque ad Casanum. — *Later.*: in Austria, Germ. etc.; usque ad Liv. et Toscanam. — *Aren.*: per Eur. u. ad Helsingfors et Abo, Livoniam, Angliam, Galiam, Toscanam, Casanum, prov. Orenburg. — *Prop.*: in Casano, Uralo, Livonia, Anglia, Germ, Hung, Boh. — *Assim.*: in Eur. media; usque ad Angliam et Neapolim. — *Impur.*: circa Vindob., Reichstadt, Berol., Glog., Ratisb., Dresdam, Francof. ad O., Jenam, Friburgum, Hesychiam Carolinam. — *Vacc.*: ad Berol., Francof. ad O., Glog etc.; usque ad Liv., Tosc., Hispaniam. — *Pimp.*: in Casano, Finlandia, Liv., Prussia ad Francof. ad M., ad Jenam, in Anglia merid., in Austria.

Gelechia H.

1124. Gibbosella Zell. Is. 202. *Alis anter. fuscescenti-cinereis, fusco nigroque marmoratis, lineola basali transversa nigra,*

striga antelimbali unangula albida, tuberculis 4 asperis. " 8." " Muscosellae simillima. HS. V. 165. Exemplar unum (sociis: 1115, 1116, 1147, 1157, 1152 etc.) 11. Aug. in trunco Pyri in pago Modrycz.

1125. Aleella Fab. „*Alis anter. niveis, fascia pone basim obliqua, maculis 4 marginalibus pluribusque disci punctis nigerrimis.* " 6." " Zell. Is. 200; HS. V. 165; Bicolorella Tr. IX. 1. 233; H. 151. Vulgaris Majo et Junio, rarior Julio, in quercetis R. g. et Kor., porro in silvaticis mixtis ad pedem monticuli Cz. sk.

1126. Albicipitella Zell. Is. 202. „*Alis anter. nigris, fascia obliqua pone basim, maculis costae duabus, dorso capillisque niveis.* " 4." " HS. V. 165. f. 476. (*Albiceps FR.*). Reperitur solitam in fruticibus ad margines silvaticorum circa R. g. et in querceeto supra e. Liss. (sociis 553, 776, 335 etc.) Junio, Julio.

1127. Lepidella FR. „*Alis anter. niveis, maculis (una humerali, una ante costae medium, duabus dorsalibus remotis) fasciaque maculari integrare obliqua post medium (basin versus directa et dorsum attingente) nigris.* " 4½." " Zell. Is. 202; HS. V. 165. f. 488. Exemplaria duo in silvarum R. g. marginali fruticeto florido, tertium in Fraxino penes Ecclesiam in pago M. Augusto (sociis 85, 1151 etc.).

1128. Blandella FR. „*Alis anter. albidis, fusco irroratis, fascia obliqua pone basim (dorsum non attingente et versus angulum analem directa) nigerrima; capillis albis.* " 5." " HS. V. 166. f. 503. Medio Augusto tria exemplaria paulo obsoleta inter fructes prosilvii in pago R. g.

1129. Alburnella Ti. „*Alis anter. albis, cinerascenti-subnebulosis tuberculatoque-scabris, lineola costali obliqua post medium nigra, tuberculo crasso obliquo supra dorsum in tertia alae parte basali fuscescens.* " 6." " Zell. Is. 200; HS. V. 168. f. 489. 490. Exemplaria singula 27. Junii et 8. Aug. in Quercubus silvaticorum circa R. g. et Rak. (comitibus 49. 266 etc.).

1130. Cytisella Ti. „*Alis anter. sordide albis, macula maxima verticali vd 1/3 dorsi, punctis duobus post disci medium humerisque nigris ustulatis.* " 7½." " Zell. Is. 200; HS. V. 186. f. 491.

OT IX. 299. Initio Junii plura specimina prope L. in querceis frutectis collinorum Mki. et in florido margine betuleti K. (sociis: 892, 328, 1268. etc.).

1131. Krösmanniella Mann. „Alis anter. cinerascentibus albidisve, fuscescenti-nebulosis, maculis quatuor (duabus costalibus, tertia plicae ante medium, quarta media) separatis umbrave obsoletissima connexis punctisque disci pluribus nigris.“ 6.” HS. V. 166 f. 581. Provenit satis multa in pomario pagi M. et in querceo R. g. 13 Julii - 8 Aug. (sociis 776, 258, 1152 etc.).

1132. Luculella H. 397. „Alis anter. nigricantibus, maculis duabus costalibus (priore ante medium magna lunata striolamque nigram costalem continente, posteriore anteapicali parva pustulaeformi) albis flavisve.“ 5½.” Zell. Is. 202; HS V. 167. f. 497. Aliquot exemplaria Junio in Quercubus querceti R. g. et in querceo fruticeto collinorum Zap. (sociis 892, 561, etc.).

1133. Apicistrigella FR. „Alis anter. cinereis, subferrugineo-mixtis, juxta dorsum trituberculatis, fascia tenui ad ¼ costae (saepe maculari, extrosum obliqua), tertia alae parte media strigaque obliqua ex apice in alae medium nigris fuscisve; fronte palpisque cibis, horum articulo ultimo nigro-biannulato.“ 5—6.” HS. V. 167. f. 483. Invenitur frequenter socialiterque in Quercubus mixti nemoris ad betuletum K. Specimina plura inveni etiam in collinorum Szyp Pinis silv. (una cum 996, 1150, 1100, 1142, 1207, 1208 etc.) Junio.

1134. ? Pisticella Heyden. „Alis anter. cinereis flavescentibusve, tuberculatis, parte alae media maculaeformi, striga apicis juxta limbum, punctis limbalibus palporumque articulo ultimo nigris, striga postica unangula ad ¾ alba, ante hanc macula centrali flava et striola longitudinali atra.“—Paulo major priore, cui quodammodo est similis. Area basalis tota et dorsum ultra medium flavescentia cinereave. Macula media permagna est pone aream basalem nigerrima, strigam posticam versus dilutior; in ejus medio invenitur antice striola longit. atra et post hanc macula flavidia strigae posticae annata, quam tamen non interrupit. Latus maculae inferius habet magnum sinum, qui angustius saepe costam versus continuatur maculamque in duas minores subdividit. Fascia nigra pone basim, Apicistrigellae propria, omnibus meis speci-

minibus deest; striga apicis vero juxta limbum tendit et non sicuti apud Apicistrigellam versus alae medium.

Vulgaris in silvaticorum *R. g.* Alnis glutinosis, Pop. tremulis et Quercubus, quas socialiter incolit. Exemplar unum obvium mihi fuit etiam ad marginem quereti *L.* in *R.* Julio initioque Augusti (sociis: 1129, 1195 etc.).

1135. Triparella Metzn. „*Alis anter. gilvescentibus, cinerascenti-subnebulosis, maculis tribus costalibus obsoletis obscurioribus, striga postica pallidiore, paribus tribus tuberculorum disci nigrorum oblique positorum.*“ 6.” Zell. Is. 200; HS. V. 170, f. 482. Reperitur frequenter in silvis et frutetosis circa *L.*, porro in querecto pagi *R. g.* Toto Junio.

1136. Proximella H. 228. „*Alis anter. albo-cinerascentibus, tenerrime obscurius irroratis, punctis striolisque disci elevatis atris, anterioribus valde oblique subseriatis, posteriore verticaliter duplice, litura costali post medium obsoleta fuscescenti.*“ 6—7.” Zell. Is. 200; HS. V. 169; f. 492; OT. IX. 2. 90. Vulgaris sed valde dispersa ubivis in silvis fruticosisque circa *L.* In silvaticis circa pagum *R. g.* rarissima. Reperitur ultimis diebus Maji totoque Junio.

1138. Wagae sp. n.

Alis anterioribus nitidulis obscure cinereis, maculis costae tribus obsoletis obscurioribus, seriebus duabus tuberculorum (2—4) regularibus obliquis ante, puncto duplice scabro subverticali pone medium, punctis limbalibus unoque ad basim nigerrimis; posterioribus canescensibus; ciliis alarum omnium unicoloribus dilute cinereis.“

Novam hanc Gelechiam dedico Celeberrimo Varsaviensi Professori **Antonio Waga**, rerum entomologicarum in terris suis disquisitori exactissimo scriptoriique meritissimo.

Inveni eam pluribus speciminiibus (3 pulchris, 4 decoloratis) altera parte Maji primisque diebus Junii in collinis ditionibus circa Radlowice górne, Czaple et Leopolim. Habitat in frondosis silvis mixtis degitque praeceipue in Coryli avellanae fruticibus, ex quibus plura meorum exemplarium excitavi. Circa pagum Radlowice górne inveni eam etiam in impenetrabilibus Populi tremulae fruticetis, quae nunc loca in betuleto Lwowiec excisa spisse convesti- verunt. Lepidoptera eodem tempore in commemoratis regionibus

volantia ad Hesp. Malyarum, Heliam Calvarialem, Graph. Ustulanam, Anc. Dilutellam, Tin. Clematellam, Cocc. Comitanam et Ephipp. Coniferanam enumeravi.

Quod similitudinem cum aliis meae collectionis Gelechiis adtinet, Wagae medium inter Triparellam et Proximellam tenet. Ex Gelechiis, quae mihi ex descriptionibus sunt notae, sola Euratella (Notatella Tr.) ei quodammodo aemulatur.

Magnitudo diversa, $5\frac{1}{2}$ — 7"; specimina majora Proximellam, minoria Triparellam adaequant.

Antennae fuscae, tenerime albido annulatae, costa multo breviores. Palpi cinerei, articulus ultimus subulatus nigrobiannulatus, penultimus crassus. Caput, thorax et scapulae obscure cinerea alisque concolora. Abdomen fuscum Pedes externe fuscescentes interne exalbidi; tarsi fusco et flavido annulati.

Forma alarum omnium eadem est ac apud Proximellam. Costa ad apicem ciliata dorso multo longior; limbus valde obliquus. Apex alarum anter. rotundatus, poster. productus; angulus analis obsoletus.

Alae anteriores subaequilatae ($\frac{8}{12}$ ") constant obscure cinereae, passim subnebulosae, nigerrimo tuberculatae et punctulatae, in aliquot specimenibus ante limbum paulo dilutiore. In costa conspiciuntur tres umbrae inaequales maculeformes, prima ad $\frac{1}{5}$ (saepe puncto nigro indicata), secunda ad $\frac{2}{5}$, tertia ad $\frac{3}{4}$. Sub ambis maculis anterioribus tendunt in angulum analem conversae series singulæ punctorum scabrorum, quarum prior 2—3, posterior 3—4 punctis constat. Sub macula vero tertia adest in disco fere medio tuberculum duplex subverticale.

Maculae costales saepe dorsum versus continuantur exhibentque quasi fascias tres obsoletissimas seriatotuberculatas. Series vero tuberculorum oblique in alis non distensis ita connivent, ut areus in costis incipientes, alias ambas percurrentes basimque versus concavos conficer videantur.

Striga postica angulata multis Gelechiis propria omnibus meis specimenibus penitus deest et nullae eam indicant signatae. Apici costae totique limbo incident plura puncta nigra, quae tamen aequa ac tubercula discoidalia neque cineta neque signata sunt colore pallidiore.

Diffr. igitur primo aspectu:

a Proximella colore obscure-cinereo, tuberculis regulariter et minus oblique positis, defectu strigae posticae;

a Triparella colore cinereo, alis subangustioribus, majore numero tuberculorum, defectu strigae posticae, punctis omnibus pallidius non signatis; ab Euratella, quam Clarissimus Schäffer Proximellae similem at colore obscure-cinereo et signaturis minus determinatis distinctam esse docet, disci punctis regulariter in series collocatis.

1137. Kneri sp. n.

"Alis anterioribus rufescenti nigro-fuscis, passim obsolete flavo intermixtis, limbo late obscuriore nigricanti, punctis disci quatuor subobsoletis nigris in trapezium positis, basi marginis interioris, macula costali ad apicem, thorace, capite palpisque (nigro terminatis) laete vitellinis; posterioribus unicoloribus obscurius cinereis; ciliis alis subconcoloribus."

Pulchrum hunc papiliunculum insignio nomine Illustrissimi Doctoris **Rudolphi Kner**, C. R. Academiae Vindobonensis Zoologiae Professoris, olim Leopoliensis, rerum palaeontologicarum Haliciensium disquisitoris indefessi, scriptoris meritissimi meique quondam Praeceptoris honoratissimi.

Ex duobus speciminibus ad id tempus inventis, alterum paulo decoloratum 12. Junii in campestri-collino tractu Janow, alterum pulcherrimum 6. Julii prope Leopolim in mixto luco ad vicum Krzywczycę pertinente detexi. In utraque regione delitebat Kneri in Coryli avellanae fruticibus. Quod ceterum alia lepidoptera eodem tempore volantia adtinet, inspiciant lectores Crambum Warringtoni et Cemistomam Salaciellam.

Latitudo 5°, longitudo 1½°.

Antennae nigrofuscae, ¾ costae adaequantes. Scapulae alis concolores. Pedes fumati aculeati, tarsi obsoletissime luteo-annulati. Abdomen fusco-nigrum.

Palpi magni vitellini, articulus eorum penultimus crassus, omnino innotatus, articulus ultimus satis magnus apice nigricans.

Alae anteriores basi coarctatae (6/12") limbus versus dilatatae (1"), costa earum dorso vix longior, limbus parum obliquus. Alae posteriores latitudinem anteriorum non excedunt; earum apex productus.

Alae anteriores rufescenti-fusco sunt coloratae et juxta plicam a basi ultra medium tenerrime obsoletius flavo mixtae. Limbus earum colore fundi multo est obscurior et similiter ac apud Dimidiellam late nigricans. In disco dantur 4 puncta obsoleta nigra quarum ambo superiores in linea longitudinali media, ambo inferiores in plica sunt posita, ita ut omnia trapezium efficere videantur. Ex his punctis centrale est distinctissimum et maximum, ambo antica minora et obsoletiora, quartum denique anteale centralique subjectum vix conspicuum.

Striga postica multis Gelechiis propria in nostra specie solum parva macula costali indicatur.

Cilia alarum anteriorum obscure fusca, linea eoram dividens nigerima; posteriorum obscure cinerea.

Pagina inferior alarum omnium subunicolor griseo-fusca. Cilia fuscescenti-cinerea. Macula costalis conspicua flavescentia. Cesta nigricans.

1139. Vulgella SV. „*Alis anter. fuscocinereis, costa obscurius maculata, punctis duobus ante, striolaque transversa post medium supradorsalibus scabris atris.*“ Vix 6.” Zell. Is. 201; H. 346; HS. V. 169. f. 500. Singula specimina in Quercubus 8. Junii et 7. Julii in silvaticis circa R. g. et Lis. (sociis: 452, 878 etc.).

1140. Fugitivella Z. Is. 200. „*Alis anter. cinereis, fuscescenti-nebulosis, passim tuberculato asperis, striola obliqua ex humero, maculis costae punctisque disci nigris.*“ 5½.” Proximellae simillima. HS. V. 168; f. 571. Exemplaria duo in arbustis Leopolitanorum ambulacrorum. Julio.

1141. Fugacella Zell. Is. 200; HS. V. 169. „*Alis lationibus cinerascenti-fuscis, nigro variegatis, striola obliqua ex humero atra, punctis sparsis nigris.*“ Magnitudo prioris. Speciem hanc Clarissimus Schäffer pro varietate Fugitivellae habet. Exemplaria duo in truncis arborum in Leopolis ambulaeis Julio.

1142. Dodecella L. „*Alis anter. cinereis, obsolete fuscescenti transverse nebulosis (quasi fasciis pluribus), humeris punctisque tribus supradorsalibus inter se distantibus scabris atris.*“ 5.” Fa-villaticella Zell. Is. 200; HS. V. 169. f. 501. Exemplaria duo (simil cum 1150, 1120, 996, 1309 etc.) 12. Junii in fruticosis Pinis silvestribus et Quercubus in collinis Szyp.

1143. Humeralis Zell. Is. 1847. pag. 832. „*Alis anter. angustis fuscogriseis, humeris, maculis costalibus 2 striolisque disci 3 obliquis (posteriore scabriuscula) nigris.*“ Vix 6.” HS. V. 170; f. 477, 478. Incretella Zell. Is. 1839 pag. 200. Singula exemplaria in truncis Quercuum in querceto B. 15. Sept. et 8. Oct. (una cum: 239, porro 184, 503, 603, 851, 855, 877, 906, 910, 911, 914, 919, 921, 1117, 1181, 1121, 1013, 1069, 1070, 1064, 1249, 1250, 1301.).

1144. Pietella Zell. Is. 202. „*Alis anter. nigrofuscis, fasciis 3 obliquis (posteriore limbum versus cuspidem) maculaque apicis argenteis; antennis fuscis, apice albis.*“ 4½.” Serratellae si-

milis. HS. V. 188. f. 545. Exemplar unum 12. Junii in calea-
reorum collinorum Szyp pratulo florido. Vagabatur sub vespe-
rum prope ipsam humum una cum: 1142, 1180, 447, 1080,
1074, 1146 (ceterum 1309 etc.).

1145. Murinella Mann. „Alis anter. obscure cinereis, ae-
qualiter fusco-irroratis, punctis obscurioribus.“ Vix 4.” Posteriori
et Anthyllidellae similis. HS. V. 178. f. 535. Unum exemplar 24.
Julii ante solis occasum in siccis floridisque declivibus montium
cirea W. (sociis Artemisiella, Anthyllidella etc.).

1146. Artemissiella Ti. „Alis anter. fusco-cinereis, dense
fusco-irroratis; lineis longitud. ferrugineis puncta atra subscabra con-
tinentibus obsoletis.“ 5.” Zell. Is. 201; HS. V. 172; OT. IX. 2. 97.
Speciem hanc inveni copiosam ubique in siccaneis apricisque inter
pineta prope Janow, porro in declivibus montium circa W. Cirea
Leopolim minus frequens. Dagit gregatim in plantis humilioribus,
praecipue in Thymo serpylo. Junio, Julio.

1147. Rhombella SV. Zell. Is. 200. „Alis anter. fus-
co-griseis, macula una humerali, una costae ante apicem duabusque
disci (postica uncinata) longitudinaliter positis nigris.“ 7½.” H
277; HS. V. 170. f. 479; OT. IX. 2. 93. Satis multa in arboribus
pomiferis hortorum Samboriae pagorumque M. et W. Junio-Aug.
(sociis: 321, 1065, 1124, etc.). Versus regiones montanas fre-
quentior esse videtur.

1148. Obsoletella FR. 79. „Alis anter. pallide griseo-
testaceis, fusco-irroratis, signaturis indeterminatis obsoletis, abdo-
minis segmentis 1—3 flavescens.“ Vix 6.” HS. V. 172. Aliquot
exemplaria sub finem Maji Samboriae Leopolique in pomariorum septis.

1149. Terrella SV. „Varians; alis anter. nitidulis lute-
scenti-cinereis griseisve, punctis disci tribus nigris, striga postica
angulata diluta; alis poster. ante apicem productum profundius retu-
sis.“ 7.” Zell. Is. 199; FR. 80. 96; H. 170; HS. V. 173 OT.
X. 3. 199. Quotannis innumerosa ubique locorum usque ad regio-
nes mont. per cunctam Haliciam perlustratam. Junio, Julio.

1150. Distinetella FR. 80. „Varians, alis anter. niti-
dulis lutescenti fuscis, nigro-nebulosis, punctis disci 3 nigris albo-

notatis, striga postica angulata diluta. "8." *Terrella et posteriori similis.* HS. V. 173; Zell. Is. 199. Reperi eam frequenter et in numerosis varietatibus 12. Junii et 3. Julii in collinis P.—S., ubi (sociis 1299, 1207, 1208, 1264, etc.) solas Pinos silvestres inhabitat. Latitat usque ad vesperum in latebris venitque primum obscura luce in conspectum.

1151. Solutella FR. 5. „*Alis anter. fuscis, pustulis disci 3 longitud. nigris, striga postica macula diluta costali indicata.*" 9." Zell. Is. 199; HS. V. 175. f. 519, 520; OT. IX. 2. 77. Unam feminam 12. Junii cum priore in Pino silvestri.

1152. Velocella Ti. „*Alis anter. griseo-fuscis, maculis 2 oppositis albidis obsoletissimis.*" 7½." Puncta disci venaque nigrae meo specimine Haliciano, locali verisimiliter varietati, desunt. **Gallinella**, quodammodo et Alacellae similis. Zell. Is. 198; FR. 77; HS. V. 179; *Subsequella* Tr. IX. 2. 83. Semel exemplar unicum initio Aug. in Quercus trunko ad marginem mixtae silvae Dq. prope pagum Modrycz, in cuius ambitu commemorato tempore (2—11 Aug.) sequentes obviae mihi fuerunt species: 1350, 1339, 1306, 1301, 1290, 1276, 1263, 1257, 1247, 1206, 1197, 1196, 1178, 1171, 1166, 1157, 1147, 1131, 1127, 1124, 1106, 1115, 1113, 1099, 1070, 1067, 1062, 1061, 1038, 1018, 969, 968, 963, 948, 947, 877, 874, 873, 865, 857, 847, 818, 800, 797, 663, 647, 625, 616, 613, 599, 598, 596, 513, 509, 480, 478, 472, 461, 448, 433, 179, 83, 73—78½, 35, 12, 10, 8, 5, 4, 1.

1153. Gallinella Ti. „*Alis anter. rufesceni-fuscis, punctis disci tribus et limbalibus nigris, albido vix terminatis.*" 7." Zell. Is. 198; HS. V. 182. f. 575; H. 470; OT. IX. 2. 79. Plura exemplaria in Quercubus ad margines sylvaticorum R. g. et Zap. initio Junii (comitibus 863, 568, 353, 930 etc.).

1154. Pinguinella Tr. IX. 1. 245. et X. 3. 288. „*Alis anter. fuscescentibus, flavidо-nebulosis, obscure-striolatis, maculis 2 costalibus obscurioribus, tribus disci longitud.; abdominis basi flavidā, barbae analis macula fusca.*" 8." *Turpella* HS. V. 182; Zell. Is. 200. *Nebulea* Steph.; *Vicinella* Dougl. Tria exempl. 24. Julii in pometo montani pagi Wołcze (sociis Rhombella etc.).

1155. Cautella Zell. Is. 206. „*Alis anter. nigris, cincereo-irroratis, obscure striolatis, macula costali, striga postica fracta*

fronteque albidiioribus; punctis disci obsoletissimis.“ Magnitudo prioris; *Muscosella* similis. HS. V. 182. f. 509. Aliquot exemplaria in truncis diversarum arborum in mixto nemore ad betuleum K. initio Julii (sociis 967 etc.).

1156. *Muscosella* FR. „*Alis anter. cinereis, fuscescenti-nebulosis, dorsi basi, fasciis obsoletis tribus (maculis in costa indi-catis, angulum posticum versus directis) serieque punctorum limba-lium obscurioribus, striga postica pallida acutangula; palpis longissimis.“ 8.” Analogia *Gibbosellae*, *Cautellae*, *Nebuleae*. Zell. Is. 197; HS. V. 183. f. 586. Semel exemplar unicum (sociis 158 etc.) 19. Junii in trunco Alni glut. in mixtis silvaticis circa R. g.*

1157. *Sororeculella* H. 440. „*Alis anter. obscure-cinereis, squamis fuscis in maculas duas permagnas (unam ante, unam post medium) condensatis, punctis disci 2 longitud. nigris (priore striolae albicanti annato).“ 5½.” HS. V. 183; OT. IX. 1. 238; Zell. Is. 198. Exemplar unicum 11. Aug. in pomario pagi Modrycz (sociis *Gibbosella*, *Albipunctella*, *Rhombella*, etc.).*

1158. *Manniella* FR. „*Alis anter. ferrugineo-cinereis, atro-signatis, fascia latiuscula ad ¼ basim versus albo-marginata et ad angulum ani vergente, striola longitudinali centrali oblique usque ad dorsum producta apiceque atris, macula disci obsoletiore ferruginea (quae fasciam posticam distinctam albam in medio sub-sinuatam attingit, non interrupit); capite fuso.“ 4½.” Zell. Is. 198?; *Vicinella Dougl*; HS. V. 184? Singula spec. in piceto Jed., porro in quercetis B. et R. g. 1. et 16. Maji, porro 13. Julii (sociis: 360, 148, 776 etc.). Exemplar Julio captum est pulcherimum, ambo alia obsoleta.*

1159. *Kiningerella* Mann. „*Alis anter. nigricantibus, basi nigropunctata, fascia media obliqua obsoletissima strigaque obtusangula ad ¾, fronte palporumque articulo medio intus albis, puncto apieis atro albo-semicincto.“ HS. V. 186; f. 471. Semel exemplar singulum 12. Julii (cum priore, 277 etc.) in Populo tremula mixtarum silvarum frondosarum circa pagum R. g.*

Gibbosella occurrit secus in Anglia, circa Parisios, Leucopetram Saxonum, Berol., Glog., Reichstadt Bohemorum, Vindob. — *Aleella*: in Anglia, Sax., Hung., Banatu, cirea Francof. ad O., Berol., Glog., Ratisb., Leucopetram. — *Albic.* in Anglia, ad Dresdam, Megalop., Berol., Glog., Neostrelitziam, Ratisb. — *Lepid.* in Bah.,

circa Vindob., Glog., Ratisb., Francof., Gunzenhausen. — *Bland.: in Anglia, Hanovera, circa Berol., Friburgum., Neost.* — *Alburn.: in Boh., ad Vindob., Francof. ad O., Glog., Dresdam, Neost., Gunzenh., Ratisb.* — *Cytis.: in Hung., circa Schandau et Ratisb.* — *Krösm.: in Hannovera.* — *Luc.: circa Megalop., Berol., Glog., Francof., Dresdam, Ratisb., Vindob.* — *Apicist.: circa Ratisb., Vindob. ad Baden et in monte Schneeberga.* — *Trip.: ad Nixdorf, Francof., Glog.* — *Prox.: in Boh., Sax., Austria, Hung., ad Berol., Francof. ad O. et M., Glog., Ratisb.* — *Vulg.: circa Vindob., Reichstadt, Dresdam, Glog.* — *Fugit.: ad Glog., Berol., Vindob., Neost., Megalop. et in Saxonum montibus metalliferis.* — *Dod.: circa Berol., Glog., Reichstadt alibique.* — *Humer.: in Alpibus, circa Reichstadt, Glog., Vindob., Neost.* — *Pict.: ad Ratisb., Megalop., Glog., Reichst., in Borussia, Anglia.* — *Murin.: ad Ratisb. et Vindob.* — *Artem.: circa Nixd., Glog., in Germ. — Rhomb.: in Anglia, Sax., Austria, Boh., ad Ratisb., Francof., Glog., Brunsvigam.* — *Obsol.: in Anglia, Austria etc.* — *Terr.: per omnem Europam.* — *Dist.: in Alpibus, Boh., Hung., ad Berol., Glog., Ratisb., Francof., Offenbach.* — *Solut.: in Hung., ad Vindob., Dresdam, Labacum, Ratisb.* — *Veloc.: in Helvetia, circa Francof., Ratisb., Dresdam, Berol., Glog.* — *Gall. ad Dresdam et Schandau, Vindob., Nixd., Glog., Ratisb., in Hung., in Alpibus.* — *Ping.: in Anglia, in Alpibus, ad Vindob., Nixd. et Reichst., Berol., Francof., Glog., Ratisb., Aug. Vindelic.* — *Caut. ad Nixd. et Reichst., Dresdam, Berol., Francof., Vindob., Neost.* — *Ratisb., Glog.* — *Musc.: in Austria, Boh., ad Glog.* — *Sorore.: ad Nixdorf, Ratisb., Aug. Vindelic. alibique per Germ.* — *Mann.: in Boh., ad Dresdam, Berol., Glog.* — *Kining: Vindobonae in hortis.*

Anacampsis H.

(Gelechia.)

1160. Alacella Zell. Is. 199. „*Alis anter. anthracinis, punctis disci 3 nigris obsoletissime albido-cinctis, maculis 2 posticis oppositis (interiore obsoletiore) punctoque apicis albidis; palporum articulo ultimo albo terminato.*“ $6\frac{1}{2}$.“” Posteriori similis. HS. V. 191. f. 485. Exemplar unicum 3 Julii in collinorum Szyp declivibus floridis (vide 998).

1161. Coronilella Ti. „*Alis anter. nigris nitidulis, maculis 2 posticis oppositis flavidis, punctis disci 3 obsoletissimis.*“ Vix 6.“” Zell. Is. 201; HS. V. 193. f. 522; OT. IX. 2. 87. Vagabatur frequenter vesperi 12. Junii et 3. Julii in collinorum Szyp herbosis una cum Alacella, Hufnagelii (ceterum vide: 1309 et 998).

1162. Anthyllidella H. 330. „*Alis anter. fusco-nigris, macula costali postica albida.*“ $4\frac{1}{2}$.“” HS. V. 195. f. 525; *Caliginosella* FR. Zell. Is. 201. Hucusque plura specimina in pratis intersilvaticis circa R. g. et L., porro in vallibus montanis circa W. 18. Maii—24 Julii (sociis: 1253, 1005, 1192, 1180, 1187, 1146, 1145, 1055, 1163, 1165 etc.).

1163. Tenebrella H. 434. „*Alis anter. unicoloribus nigris, cupreo-nitentibus, antennis nigris totis.*“ 5.” Coleophoris Mayrella et Aleyonipennella similis. Zell. Is. 201; HS. V. 196; OT. X. 3. 216. Speciem hanc legi in pratulo nemorali ad betulum K., in floridis collinis Szyp, in herbosis betuleti Lw. et in montanis pratis circa W. Volat Junio, Julio (sociis 1309 553, 1163, 1162, 6 etc.), Satis frequens.

1164. Vorticella Scop. „*Alis anter. nigris, angustioribus, fascia angusta post medium recta nivea, infra ad costam pellucente.*“ Minor posteriore; 5.” Zell. Is. 201; HS. V. 194; OT. 2. 104. Hucusque semel exemplar unicum (sociis 1086 etc.) extremo Majo in Quercu in mixtis silvaticis circa R. g.

1165. Ligulella SV. „*Alis anter. nigris, latioribus, fascia angusta latioreve post medium basim versus plerumque subconvexa nivea, subtus ad costam pellucente.*“ Plerumque major quam Vorticella; 4—6.” Zell. Is. 201; HS. V. 194. Cinctella H. 142. Multam inveni eam in Quercubus ad marginem querceti Ł. in R. (sociis 1195, 1066, 1167 etc.), solitariam in silvis frondosis pratisque subsilvaticis aut apertis inter L. et Wi., circa R. g., W. et J. A fine Maji usque ad Julium.

1166. Cinerella L. „*Alis anter. unicoloribus griseofuscis nitidulis, omnino innotatis.*“ 8.” Zell. Is. 198; H. 173, 437; HS. V. 200; OT. IX. 2. 81. Iuvenitur copiose Junio, minore numero Julio, ubique in silvaticis et fructicis per omne terr. a planicie in elatiores montes usque (Mag., W. R.).

1167. Tripunctella SV. „*Alis anter. lutescenti-cinereis, punctis disci tribus.*“ 7—9.” Priori similis. Zell. Is. 197; H. 217; HS. V. 202, f. 462; OT. IX. 2. 14. Hucusque specimina plura inter virgulta in querceto Ł. in R. et in herbosis mont. vallium circa Wołcze. Julio (sociis 6, 1195 etc.).

1168. Ferrugella SV. „*Alis anter. ferrugineis, maculis 3 costalibus (vel fasciis 2 obliquis mediis maculaque apicis) striataque ad ipsum limbum obscurioribus, punctis disci 3 fuscis.*“ 5.”— Macula prima parva ad $\frac{1}{3}$ continuatur saepe usque ad anterius par punctorum, quod omnino obtagit; secunda magna ad $\frac{2}{3}$ tangit punctum centrale perecurritque saepe alam usque ad angulum;

analem, tertia in ipso apice umbram versus alae medium emittit. *Tr. IX* 2. 19; *Zell. Is.* 197; *HS. V.* 137; *Coriacella Koll. II.* 233. Copiosa sub finem Junii in nemore ad betuletum *K.* Insidet socialiter libentissimeque Filicibus et Pteridibus; ad eas etiam, si percussione excitata est avolavitque, cito affugit. Alibi circa *Leopolim* eam ad id tempus non conspexi.

1169. Flammella Hüb. „*Alis anter. croceis, lineolis longitud. vitellinis (ad basim 2, in medio 3, ante limbum 2) quasi in fascias tres digestis; angulo ani obsoleto*“ 6” *Zell. Is.* 201; *HS. V.* 198; *OT. IX.* 2. 20; *Formosella* Hüb. 160. Semel exemplar unicum in collinorum *Szyp floridis* declivibus 3. Julii (sociis: 1163, 1165, 998 etc.).

1170. Gerronella Z. *Is.* 201. „*Alis anter. luteis, fusco-nebulosis, plica ad basim, fascia media et antelimbali (interne convergentibus) obscurioribus, inter has macula costali pallidiore basim versus obscure marginata*“ 4½” *HS. V.* 203. f. 464. In excisis betuleti *Lwowiec* herbosis reperi 13. Julii duo spec. pulchra, quae tempore vespertino prope humum per flores vagabantur. (vide 776).

1171. Populella L. „*Varians, alis anter. cinereis, fusco-conspersis, punctis disci nigris, fascia postica trifacta albida.*“ 8½.” *Zell. Is.* 197; *FR.* 76. 77; *HS. V.* 191; *OT. IX.* 1. 242. Communissima in arborum truncis, in sepiminibus, hortis silvaticisque per cunctum terr. humilius. Variat magnopere aequem ac Ferrugana, Fissella, Vitella. Praeter varietates: Tremellam SV., Listerellam SV., Betulellam SV. illasque a Clariss. Zellerio in Iside descriptas, posideo plures alias, quibus omnes priores optime uniuntur. Volat Julio-Septembri.

1172. Isabella FR. „*Alis anter. unicoloribus pallide ochraceis, omnino innotatis.*“ 7.” *HS. V.* 201, f. 457. Hucusque semel spec. unicum 13. Julii (sociis 776 etc.) inter virgulta silvicorum *Radłowice górne* tali loco, ubi variae arbores crescent promiscue.

1173. Scintillella FR. 77. „*Alis anter. fuscis, limbum versus cupreo-tinctis, punctis disci et limbalibus nigris, puncto costali et opposito dorsali albidis.*“ 6.” *Coronillellae* et *Alacellae* similis. *HS. V.* 193. Duo spec. (sociis 985, 1334, 1210 etc.) 11. Julii percussis Quercubus in mixto nemore ad betuletum *K.*

1174. Ericinella Zell. Is. 202. „*Alis anter. rufis, juxta dimidium costale omnino passimve nigris, punctis limbalibus fasciisque 4 plumbeis (quarum mediae pone dorsum conflunt, quartu ad costam est alba).*“ Vix 6.” HS. V. 197; OT. IX. 2. 176. *Micella* Hüb. 2. 10. *Volat frequenter (comite Zieglerella) toto Julio per ericeta in fine silvarum R. g. ad dextram viae stratae pagum Szady versus ducentis.*

1175. Stipella H. 138. „*Minima generis; alis ant. nigricantibus, plumbeo-mixtis. macula costali ante apicem albida, fascia pone basim, macula dorsi medii et centrali discoidalis citrino-aureis.*“ Vix 4.” HS. V. 197; *Naevulella* Zell. Is. 202; OT. IX. 2. 124. *Reperitur quotannis raro in Samboriae Leopolisque septis. Exemplar unum excitavi semel de fruticibus in querceto supra c. Lis. Majo initioque Junii (sociis 1182, 1148, 1176, 994, 878 etc.).*

1176. Naeviferella Zell. Is. 202 „*Alis ant. nigricantibus, plumbeo-micantibus, macula una costali albida ad $\frac{3}{4}$, una maiore in dorso medio unaque disci minima ad $\frac{2}{3}$ citrino-aureis.*“ Magnitudo prioris HS. V. 196; f. 547. *Hucusque exemplaria duo Samboriae in pomariorum sepibus Majo (sociis 1086 etc.).*

1177. Micella SV. „*Alis ant. fusco-aureis, punctis limbalibus guttisque 7 sparsis coeruleo-argenteis, (quarum tres anticae in strigam pone basim, duae mediae oblique in disco et dorso, duae posticae in costa et angulo ani sunt positae).*“ $5\frac{1}{2}$ ” Zell. Is. 202; HS. V. 198. f. 543. *Asterella* Tr. IX. 2. 172. *Singula exempl. in Pyro malo in betuleto Z., in silvae R. g. rubeto et in fruticoso alneto ad marginem piceti Jedlina; 30. Junii, 19. Julii et 1. Aug. (sociis: 258, 748, 1103 etc.).*

1178. Hermanella Fabr. „*Alis anter. aurantiaco-aureis, marginibus nigro-notatis, fascia ante medium pluribusque maculis sparsis strigisve longitudinalibus (una ex apice versus alae medium) argenteis.*“ 4.” Zell. Is. 202; HS. V. 198; OT. IX. 2. 174; H. 401. 402. *Venustum hunc papiliunculum cepi in pomario pagi Modrycz exemplaribus tribus inter zizania ibidem sub horreo crescentia, 11. Augusti (sociis 1152 etc.).*

1179. Dissonella FR. „*Alis anter. albidis, tenuissime fusco-irroratis, dimidio dorsali minori ad basim et angulum ani*

apiceque costae fuscescentibus, lineolis disci 2 longitud. versus apicem nigricantibus, puncto apicis atro. " 5." HS. V. 200. f. 553. Provenit solitarie in silvaticis circa R. g., D. et Liš. Julio (sociis: 460, 1167, 1195 etc.). Degit praecipue in Quercubus.

1180. Dimidiella H. „*Alis ant. vitellinis, costa ultra medium, limbo toto maculaque dorsi medii fuscis, punctis disci 3 nigris.*" 4½." HS. V. 202; Zell. Is. 204. Volat acervatim Junio initioque Julii per herbosa collinorum Szyp declivia (comitibus: 1074, 1078–1080, 1309, 998 etc.), porro in prato florido ad marginem betuleti K. (sociis 1183, 785 etc.). Interdiu socialiter in Thymo serp., Pruuella vulg., Galio vero aliisque plantis delitescit.

(*Chelaria* Haw.)

1181. Conscriptella H. „*Alis anter. cinereis, passim obscurius nebulosis, macula costae mediae magna triangulari lineolaque apicis nigerrimis.*" 8½." Zell. Is. 201; HS. V. 205. Reperitur perraro sub finem Aug. in silvaticis R. g. (vide 674), satis multa autem Sept., Oct. initioque Novembribus ad betuleti Z. marginem. Viget in Corylis, Alnis, Salicibus, rarius in Pop. tremulis una cum pluribus speciebus ex generibus Teras, Gracilaria etc.

(*Recurvaria* Haw.)

1182. Leucatella L. „*Alis ant. nigricantibus, fascia pone basim lata, maculis 2 oppositis ante apicem, capite palpisque albis, punctis disci scabris et limbalibus atris.*" 6½." Zell. Is. 199; HS. V. 205; OT. IX. 2. 101. Frequens Samboriae Leopolique in hortorum sepiminiibus, solitaria in silvaticis circa R. g et J. Volat Junio, Julio.

(*Metzneria* Zell.; *Parasia* Dup.)

1183. Paucipunetella Metz. „*Alis anter. fuscescentibus, tenerrime cinereo-irroratis, dorso ad basim, vitta ex basi media postice furcata fasciaque unangula antelimbali ochraceis, punctis vittae 4 distinctis liturisque 2 subcostalibus adbasim obsoletioribus nigris.*" 7—9." Superior vittae ramus duo fert puncta interrumpitque fasciam antelimbalem; ramus inferior angulo ani finitur. In numerosis meis exemplaribus Haliciensibus praevalet color ochraceus, et alae in solis marginibus fusco-cinereo sunt irroratae. — Zell. Is. 202; HS. V. 206, f. 557. Volat gregatim (sociis 1180, 785

etc.) prope *L.* in florido pratulo ad betuletum *K.*, rarius *Leopoli* in sepulcreto suburbii Łyczakow. Junio. Latitat interdiu in primis in Gallio vero, quod vesperi, quando in conspectum venit, libenter circumvolare solet.

1184. Neuropterella FR. „*Alis ant. luteis, obscurius venosis; palpis cinnamomeis.*“ 7.” Zell. Is. 202; HS. V. 207. f. 556. Specimina duo 21. Julii in herbosis excisi betuleti *Lwowiec* (simil cum 477, 499, 752, 810, 924, 1233, 1174, 1171, 1165, 1196 etc.). Volabat jam post solis occasum.

(*Enicostema Steph.*)

1185. Lobella SV „*Alis ant. fusco-cinereis, tuberculis lisci 3 ante, 2 pone medium nigerrimis.*“ 9.” Zell. Is. 197; HS. V. 143; OT. X. 3. 196. Thunbergana Fabr. Hüb. 238. Provenit solitariae initio Junii (sociis 878, 1193, 1253, 1254, 1268, 730, etc.) in fruticibus in dumetis vepretisque ad betuletum *Krzywezyce*.

Alacella reperitur secus in Anglia, ad Dresdam, Ratisb., Berol., Francof., Glog., Rawicz in prov. Posnania, Reichstadt. — Coron et Anth. ad Dresdam et Schandau, Francof., Glog. alibique. — Tenetr.: in Boh., ad Vindob., Glog., Dresdam, Neostr. — Vort.: in Anglia, Boh., Carniola, ad Berol., Glog. — Lig.: in Anglia, Germ., Boh., Austria. — Ciner.: in Anglia, Suecia, Dania, Germ., Hung., Boh., Silesia, Alpibus. — Trip.: in Austria, Hung., Carniola ad Labacum, Alpibus et montibus Sudetis. — Ferrug.: ad Francof., Dresdam, Glog., Megalop. et Genevam, in Hung., montibus Austriacis, Alpibus. — Flam.: in Austria, Hung., ad Genevam. — Gerr.: ad Glog., Neostr., in Banatu Angliaque. — Pop.: per omnem Eur. — Isab.: ad Neostr., Vindob., Friburgum, Liburnum Portum. — Scint.: in Germ. alibique. — Eric.: in Sax., Austria, Hung., Carniola, Boh., ad Lipsiam, Francof., Glog., Ratisb., Megalop. — Stip.: in Anglia, Ukraina, ad Vindob., Ratisb. — Nacif.: in Anglia, Boh., ad Vindob., Berol., Glog., Francof. ad M., Ratisb. — Mic.: in Austria, Boh., Hele, ad Dresdam, Megalop., Berol. — Herm.: in Anglia, Palat. super., ad Hamburg, Dresd., Francof., Berol., Glog., Megalop., Ratisb., Nixdorf. — Diss.: in Anglia, Alpibus, Austria, ad Ratisb. — Dimid.: ad Vindob., Labacum, Glog., Dresdam, Ratisb. — Conscript.: in Anglia, ad Reichst., Francof., Neostr., Gedanum, Ratisb., Friburgum. — Leuc.: in Anglia, Gallia, Dania, Helvetia, Polonia, Austria, ad Rawicz in prov. Posnania, ad Berol., Francof., Ratisb., Aug. Vindelic., Reichstadt. — Paucip.: in Hung., Helvetia, ad Francof., Glog. — Neuropt.: in Anglia, Hung., ad Vindob. — Lobella: in Anglia, Hung., ad Friburgum, Ratisb., Francof., Reichstadt.

Roeslerstammia Zell.

1186. Heleniella Kuh!w. „*Alis anter. luteo-fuscis, nigro alboque irroratis, macula dorsi media diluta obsoleta; ciliis*

in medio albo-sectis, eorum linea dividente et apicali fuscis; capillis flavis. " 5." Zell. Is. 203; HS. V. 105, f. 346. Exemplar unum in Quercu ad quereti B. marginem 29. Sept. (comitibus 1206, 1171, 1121, 1115, 1013, 921-918, 914, 911, 910, 906, 905, 874, 877, 855, 853, 498, 591, 242, 239, 25, 12, 4).

1187. Cariosella Zell. Is. 203. „*Alis ant. albis, striolis transversis obscurius —, maculis pluribus (saepe confluentibus fasciasque mentientibus) dilutius-ochraceis; ciliis in medio albo-bi-divisis, lineis eorum duabus dividentibus et apicali fuscis; capite niveo.* " 6." HS. V. 105; Reticulella Tr. IX. 1, 233. H. 171. Invenitur satis frequenter a fine Maji usque ad Julium in subsilvaticis pratulis circa L. et in apertis herbosis betuleti Lwowiec circa pagum R. g. (sociis 1253, 1280, 1022 etc.).

1188. Erxlebeniella Zell. Is. 203. „*Alis ant. ac thore aeneo-aureis innotatis, poster, et abdome fuscis, capillis ferrugineis, antennis nigris apice albis, ciliis innotatis.* " 6½." Chrysitella Tr. IX. 2. 114; HS. V. 137, f. 355. Specimina duo in Tiliis Leopoli 6. Maji (sociis 1059, 491, 550, 547, 623, 564, 782 etc.).

Heleniella occurrit secus circa Berolinum, Francof. ad M., Polska-Lysa in prov. Posnania. — *Carios:* in Alpibus usque ad 7000', hinc inde in Saxonie et Bohemia. — *Erxleb.:* ad Vindob., Gottingam, Glog., Leucopet., Reichst., in Helvetia.

Glyphipteryx Hüb.

1189. Bergstraesserella F. „*Alis anter. aureis, marginibus anguste nigricantibus, strigulis 6 costae et 3 dorsi albis interne coeruleo-argenteis (quarta costali ab apice cum anteanali confluentibus), maculis 4 posticis laete coeruleo-argenteis, nigrocinctis; ciliis in apice et ad angulum analem nigricantibus, ceterum albis.* " 6½." FR. 81; HS. V. 92; Vibratricella Zell. Is. 203; Linneella Hüb. 436. Volitat copiose sub finem Maji initioque Junii (sociis 993, 1086, 1190, 863 etc.) per densa Populi tremulae fruticeta in betuleto Lwowiec. Circa L. annis 1859. et 1860. rarissima erat.

Secus in Alpibus, Regno Wurtemb., circa Schandau Ratisb., Glog., Vindob.

Aechmia Tr.

1190. Oculatella Zell. Ent. Z. 1850, p. 157. „*Alis ant. obscuris aurato-fuscis, hamulis 5 costalibus strigisque dorsi duabus*

(anteriore mediū magnā, posteriore anali minuta) albīs, macula apicali rotunda nigra argenteo-pupillata, puncto ad incisuram pluribusque pone angulum ani argyreis.^{“ 4½.”} Strigae ‘dorsales’ mediae in alīs non distensis ita convergunt, ut lunam medium basim versus convexam efficiunt. — HS. V. 93. f. 265. Volitat eodem ac prior tempore in betuleto Lw., in fruticosis silvaticisque mixtis circa L. et in querceto P. R. Dagit similiter ac prior in fruticibus.

1191. Thrassonella Scop. „Alis ant. aurato-brunneis, strigulis 6 costalibus (quarta et quinta alam percurrentibus) albīs interne coeruleo-argentatis, macula una apicis innotata rotunda, una anteanali longitudinali rubido-argyreo tripustulata atris, puncto ad incisuram coeruleo rubido-argenteo.^{“ 5—6.”} Zell. Is. 203; HS. V. 93; Equitella Tr. IX. 2. 71; FR. 83; H. 223. 431. Innumerōsam reperi eam 4. Junii 1856. in pratulo humido in querceto P. Volat praeterea satis multa toto Junio in pratis humidis inter L. et Wi., circa R. g. et D.

Oculatella reperitur secus in Italia, ad Brunsvigam. — Thrass.: in Anglia, Gallia, Carniola, Bohemia, Austria, Silesia, Saxonia.

Tinagma Zell.

1192. Perdicella Ti. Alis ant. nigricantibus, tenerrime albo-irroratis, dimidio basali postice albo-marginato, fascia maculosa indeterminata ad $\frac{3}{4}$ apiceque obscurioribus.^{“ Vix 5”} Zell. Is. 204; FR. 83; HS. V. 259. Hucusque specimina tria in herbosis betuleti Lw. et collinorum Szyp Junio (sociis 425 $\frac{1}{2}$, 904, 1309 etc.).

1193. Borghauseniella v. Heyden HS. V. 251. „Alis ant. nigro-plumbeis, tenerrime cum ciliis albo-nigroque irroratis.^{“ 4.”} — Maenula dorsalis albida, quam Clariss. Schäfferius commemorat, meis speciminibus, localibus verisimiliter varietatibus, deest. — Aliquot exemplaria Junio (sociis 878, 1185, 1253 etc.) prope L. in dumosis floridisque ad betuleti K. marginem.

1194. Saltatricella FR. 84. HS. V. 260. „Alis ant. fusco-cupreis, nitidis; ciliis innotatis. Magnitudo prioris. — Exemplar unum 5. Junii (sociis 1300 etc.) inter frutices marginales silvarum circa pagum Radłowice górnę.

Perdicella reperitur secus in Bohemia, Saxoniam etc. — Balt.: ad Francos. ad M. Ratish. — Saltrat.: circa Vindob., Ratish., Neostreticiam.

Argyresthia Hub.

1195. Dzieduszyckii sp. n.

,Minuta; capillis niveis, alis anterioribus nitidissimis fusco-caesiis, dorso subanguste obsolete-argyreto, antice transverse fuscesceni-strigulato, postice fascia lata fusca interrupto, strigulis 3 costalibus mediis albis."

Lautissimum hunc papiliunculum minutulum dedico Illustrissimo **Vladimiro Comiti Dzieduszycki**, Zoologo, quippe qui locupletissimum pulcherrimumque avium Austro-Haliciensium museum Leopoli instituerat.

Unicum exemplar pulchrum, quod hucusque invenire mihi contigit, 2. Julii in coll. ditione Rakowiec prope pagum Dobrowłany detexi. Delitescebat ibidem in altioribus ramis Quercus in margine vetustissimi querceti, quod frequentibus Alnis, Populis Corylisque est intermixtum et ab incolis speciali nomine Luh vocatur. In hoc querceto eique adjacenti humido prato foenario Stawki w luhu collegi eodem die sequentia lepidoptera: 1326, 1308, 1288, 1263, 1250, 1218, 1211, 1204 - 1206, 1196, 1191, 1179, 1165-1167, 1149, 1113, 1103, 1069, 1066, 1056, 1045, 1012, 972, 968, 947, 928, 901, 891, 884, 877, 873, 870, 847, 843, 836, 828, 822-824, 817, 803, 801, 800, 796, 788, 777, 778, 774, 769, 766, 764, 755, 758, 757, 754, 750, 749, 747, 737, 727, 708, 702, 695, 685, 681-683, 677, 670, 664, 663, 659, 656, 627, 625, 589, 587, 581, 565, 438, 431, 406, 319, 186-188, 197, 179, 170, 150, 136, 105, 98, 93, 83, 67, 64, 47, 33, 19, 16. Mense Augusto iterum in pagum Dobrowłany excucurri; lepidoptera tunc inventa speciei 266 adjeci.

Inter meas Argyresthias nullam posideo speciem, quam Dzieduszyckii bene comparari possit. Ex omnibus aliis Argyresthiis, quae in variis describuntur operibus, sola Glaucinella (Zell. Isis 1839 pag. 205 et Linnaea Entom. 1847, vol II. p. 265; HS. V. 277) meo specimine Haliciano magnopere se appropinguat.

Minima inter Argyresthias; tota latitudo vix 4^{mm}; long. corporis 1⁶/₁₂.

Capilli nivei; frons argyrea, nitida. Antennae albidae nitidae inannulatae, costa breviores, articulus basalis incrassatus lutescens. Palpi graciles, penduli, exalbidi, nitidi. Scapulae fuscescentes. Pedes calcarati, pallide straminei, nitidi, extrorsum fuscescenti-fasciolati, tarsi obsoletissime annulati. Abdomen fuscum; anus lutescens. De colore thoracis, qui acu omnino est laesus, nihil certi afferre possum.

Alae anteriores $1\frac{1}{2}$ " longae et $\frac{6}{12}$ " latae, nitidissimae fusco-caesiae, per medium et ad apicem subobscuiores. Color fundi est argenteus et bene conspicitur, si alae in certam diriguntur partem.

Vitta dorsalis subangusta albida est obsoletissima passimque tantum conspicitur. Ad basim magis quam postice coaretatur, plicam versus inacutius quam apud alias Argyresthias determinatur, in parte basali 5 striulis transversis rivulive subobsoletis fuscescensibus dissecatum, in medio vero fascia fusca interrumpitur. Pars ejus inter fasciam et angulum analem, in maculam albidam dilatata, bene est conspicua continuaturque indeterminate et obsolete versus alarum medium, quae hic similiter ac ad basim paulo sunt dilutiores.

Fascia lata fusca, dorsum interrumpens, est subverticalis ascenditque distinete in ipsam costam medium, ubi utrumque magis obscuratur maculasque duas rotundatas nigricantes efficere videtur. Latera ejus parallela in dorso sunt verticalia, superne autem subtiliter in costae partem apicalem se convertunt. Ante fasciam invenitur in costa basim versus iterum locus obscurior, qui maculam tertiam mentitur et obsoletius usque ad inferius fasciae dimidium continuatur, quam ob rem haec superne ampliata, versus marginem interiorem autem coaretata esse videtur.

In media costali parte tertia dantur tres strigulae albae, ad dorsum vergentes. Ambae priores magis distantes se junguntur fascia media, quam similiter ac apud Tetrapodellam utrumque in costa simul determinant. Strigula tertia est magnopere secundae appropinguata efficitque cum ea strigulam geminatam. Pars costae apicalis, quae apud Cojugellam una, apud Tetrapodellam tribus est insignita strigulis, in specimine meo omnibus vacat signaturis nullaeque hic conspicuntur strigulae, etiamsi alae in diversissimas diriguntur partes.

Alae posterioros lanceolatae, nitidulae, grisecentes.

Cilia alarum anteriorum in parte apicali fusca, ad angulum analem grisea; posteriorum omnino grisea.

Pagina inferior alarum anteriorum est nigrescenti-fusca; in dorso earum medio pellucet macula obsoletissima exalbida, qua media paginae superioris fascia indicatur; ceterum nullae dantur hie signatae. Alae posteriores omnino innotatae, anterioribus paulo dilutiores.

Difert igitur ab Glaucinella Zelleriana sequentibus praecipue characteribus:

- a) capillis niveis, qui apud Glaucinellam sunt exalbidi;
- b) fronde argyrea capillis obscurore, quae apud Glauc. albidior est capillis;
- c) antennis albidis inannulatis, quae apud Glaucinellam obsoleto fuso sunt semiannulatae;
- d) fascia media distinctissime usque ad costam continuata, quae apud Glaucinellam vix alae dimidium attingit.

1196. Nitidella Fabr. „Capillis ac thorace niveis; alis *

anter. nitidis pallidis, apice obscuriore, dorso niveo fascia in apicem conversa cinnamomea interrupto, vitta disci ex media basi cinnamomea. 5." Zell. Linn. II. 250 et Pruniella Is. 204 var. a; Maritella FR; HS. V. 275. Copiosa Julio initioque Aug. ubivis in dumosis, prunetis silvaticisque per eunctum fere terr. perlustratum. 26 Julii vidi eam frequentem in superioribus Fagi regionibus in monte Hušla.

1197. Tetrapodella L. „Capillis ac thorace niveis; alis anter. fusco-caesiis, basi ochracea, costa albo-maculata, dorso niveo fascia fuscescenti (in costa utrimque albo-signata) interrupto.“ 5." Conjugellae similis. Zell. Is. 205 et Linn. II. 262; HS. V. 277. Mendicella Haw; Caesiella Tr. IX. 2. 157. Vulgaris Junio Julioque ubique locorum in vepretis et frutetos ad margines silvarum in promontoria usque.

1198. Pruniella L. „Capillis ac thorace niveis; alis anter. nitidis, ferrugineo-ochraceis, costa punctulata, strigulis costae ante apicem 3-4 pallidis, dorso niveo postice fascia parum obliqua cinnamomea interrupto.“ 4½." Zell. Is. 204. var. b et Linn. II. 243; HS. V. 276; OT. IX. 2. 156; Ephippella Fabr. Vulgatissima Julio iisdem ac prior locis per omne terr. humilius.

1199. Conjugella Zell. Is. 204 et Linn. II. 258; HS. V. 279. „Capillis ac thorace flavidis; alis anter. cinereo-brunnescens-tibus, violaceo nitidulis, dorso fascia brunnea interrupto exalbido, striga costae ante apicem maculari exalbida.“ 5½." Ultimis diebus Maji initioque Junii inveni aliquot exempl. (sociis 256 etc.) in betuleti Z. diversis arboribus marginalibus.

1200. Spiniella FR. „Capillis ac thorace niveis; alis anter. violaceo-cinnamomeis, dorso niveo semel distinctissime interrupto, strigulis costae ante apicem duabus albidis subobsoletis.“ 6." Zell. Linn. II. 254 et Is. 204; HS. V. 276. Invenitur satis frequenter ad margines silvarum R. g. in Quercubus, quae socialiter incolit. Plura spec. obvia mihi fuerunt etiam in fagetis promontiorum Bubniscze. Volat Augusto. Quoad consocios videant lectores species 532, 85, 674.

1201. Fagetella Moritz. „Capillis ac thorace niveis; alis anter. fuscescenti-ferrugineis, violaceo-micantibus, dorso angustius

niveo semel interrupto.[“] 4³/₄.[”] Zell. Is. 204 et Linn. II. 256; HS. V. 278. Satis multa in nemore ad betuletum K., ubi socialiter praecipue Fagos inhabitat. Sub finem Junii (sociis 151, 1242, 1083 etc.).

1202. Denudatella FR. ?, *Alis anter, unicoloribus, osseo-albis, subargenteis, limbo ciliisque lutescentibus.*[“] 4.[”] Semel spec. unicum 25. Maji *Samboriae* in Pyro malo. — A Celeberrimis Zellerio et Schäfferio *Denudatella* FR. pro *Nitidella* habetur varietate. Specimen meum, quod Amicissimus mihi Mann pro *Denudatella* FR. habet, vix qua varietas cum *Nitidella* conjungi potest. Melius cum eo *Ismene Ossea* Stephens („*Alis ant. osseo-albis, lucidis, subargenteis, stria abbreviata tenuissime obliqua ciliisque lutescentibus*“) congruere videtur, de qua Clariss. Zellerius in *Linnæae Ent.* vol. II. p. 254 in adnotatione tertia facit mentionem.

1203. Fundella Ti. „*Capillis et thorace niveis; alis anter. albis nitidulis, fuscescenti transverse striolatis, striolis apicem versus densioribus, puncto apicis nigro.*“ 4.[”] HS. V. 273; Zell. Is. 205 et Linn. II. 267; OT. X. 3. 211 et 294. Specimen unum inter frutices in mixtis silvaticis R. g. 23. Junii (sociis 561 etc.).

(*Argyrosetia* Stephens.)

1204. Cornella Tr. IX. 2. 162. „*Capillis, thorace alisque anter. niveis nitidulis, his rare brunneo transverse striolatis, macula dorsi prope basim, fascia media apiceque brunneis.*“ 5.[”] *Curvella* L.; *Sparsella* SV.; HS. V. 274; Zell. Linn. II. 273 et Is. 205. *Vulgaris* Julio in silvaticis circa L., R. g., D., porro in pomatis *Samboriae*.

1205. Retinella Zell. Is. 205 et Linn. II. 269; HS. V. 273. „*Capillis ac thorace niveis; alis anter. albis nitidulis fuscescenti transverse striolatis, striolis in disco, praecipue post medium et in apice congestis, puncto apicis nigro.*“ *Vix 4½.*[”] *Fundellæ simillima.* Aliquot exemplaria sub finem Junii Julioque in silvaticis pagorum Rak., R. g., et H.

1206. Goedartella L. „*Capillis ac thorace pallidis; alis anter. nitidissimis niveis, fasciis 3 aureis, prima integra, secunda antice late fureata, tertia limbali maculas duas albas includente.*“ *Vix 6.*[”] HS. V. 274; Zell. Linn. II. 282 et Is. 205; OT.

IX. 2. 162. Apparet copiose Junio volatque decrescente numero usque ad Novembrim. Legi eam in variis silvis frondosis per cunctum terr. usque ad montanas regiones. Querceta libentissime incolit, rarius betuleta silvulasque aut fructecta Alni glutinosae. Varietates omnino aureae rarius inveniuntur.

Nitidella provenit secus circa Vindob., Glog., Neustadt - Eberswalde — Tetrap.: in Galia, Anglia, Suecia, Liv., ad Dresdam, Francof., Ratisb., Glog., Reichstadt — Prun.: certe ad Vindob., Aug. Vindelic., Nixdorf, Glog., — Conjug.: circa Vindob., Reichst. et Nixd., Kreisewitz et Glog., porro in Liv. — *Spiniella*: in Livonia, ad Vindob., Reichst., Warmbrunn in Silesia — Faget.: circa Posnaniam, Glog., Salzbrunn, Reichst. et Nixd., Bruns., Fr. a. O. — Fund.: in Livonia, circa Gedanum, Dresdam, Ratisb., in montibus Silesiacis, ad Reichst. — Corn.: circa Londinum, Ratisb., Dresdam, Schandau, Gedanum, Reichst. et Nixd., Vindob., in Helvetia, porro in prov. Casanensi et Orenburg — Ret.: circa Glog., Gedanum, Schandau, Ratisb. — Goed.: per cunctam medium localiterque et bor. Eur.

Cedestis Zeller.

1207. **Gysseleniella** Kuhlw., Capillis ac thorace griseis; alis ant. subopacis albis, griseo-pulvereis, fasciis 3 luteis, prima prope basim, secunda distincta ante, tertia indeterminata post medium." Vix 6."¹ Zell. Zs. 205 et Linn. II. 295; HS. V. 279. Plura spec. 12. Junii simul cum posteriore in Pinis silvestribus.

Volat secus in Liv., ad Dresdam, Salzbrunn, Glog., Vindob., Reichst. et Nixd.

Ocnerostoma Zeller.

1208. **Argentella** L. „Alis anter. nitidis cinereis, innotatis, capillis cum antennis cinereis.“ 5."¹ Piniariella Zell. Linn. II. 299 et Is. 205; HS V. 283. Plura spec. in collinorum Szyp Pinis silv. 12. Junii (sociis 1207, 1150, 996, 1299, 1264, 1309 etc.).

Occurit secus in Liconia, circa Dresdam, Francof. ad M. et O., Berol., Glog.

Coleophora *) Hübner.

(*Metalloscia* Steph.)

1209. **Mayrella** H. Zell. Is. 206, et Linn IV. 200; HS. V. 229. „Palporum articulo ultimo crassiusculo, antennis dimidiis

*) Omnes Coleophoras adductas collegi sub vesperum, quo tempore sua volant sponte, in herbosis floridisque illorum locorum, quae circa singulas species commemoravi. In quibus plantis haec species videntur vel libentissime commorantur notare ad id tempus neglexi.

fere chalybeo-pilosis, ceterum niveo atroque annulatis; alis anter. orichalceis, nitidis, apice cupreο.“ 6 $\frac{1}{2}$.” Provenit solitarie Junio initioque Julii in silvaticis circa R. g. et L.

1210. Deauratella Lienig. „Antennis supra articulum basalem per squamas breviter incrassatis, ceterum nigris, apice albo; anter. orichalceis nitidis, apice cupreο.“ 5—7.” *Alcedinella* FR.; HS. V. 329; Zell. Linn. IV. 204. Frequens Junio Julioque in silvaticis inter. L. et Wi. In pago R. g. obvium mihi fuit per 6 annos exemplar unum.

1211. Aleyonipennella Koll. Antennis articulo basali incrassato, articulis sequentibus vix incrassatis, ceterum fuscis, apice albo; alis anter. orichalceis, nitidis, apice cupreο.“ Vix 5 $\frac{1}{2}$.” Zell. Is. 208 et Linn. IV. 208; HS. V. 229. Reperitur Junio Julioque per terr. cunctum usque ad montanas valles. (*Wolze etc.*). In pago R. g. frequens, alibi rarer.

1212. Trochilipennella Costa. Zell. Linn. IV. 204. „Antennis ad medium usque chalybeo-pilosis, ceterum albis; alis ant. orichalceis nitidis, apice cupreο.“ 5 $\frac{1}{4}$.” Exemplar unicum (comitibus: 1210. 1268 etc.) 10. Junii in dumeto pone betuleti K.

1213. Paripennella FR. HS. V. 230; Zell. IV. 211. „Antennis supra articulum basalem crassiusculum nitidulum non incrassatis fuscis, apice albo; alis ant. metallice fusco-virescentibus.“ 4 $\frac{1}{2}$.” Invenitur solitam sub finem Maji totoque Junio circa R.g. et L.

(*Porrectaria Haw*; *Eupista H.*, *Apista H.*, *Coleophora H.*, *Astyages St.*)

1214. Fuseedinella Zell. Linn. IV. 383; HS. V. 231. „Antennis albidis, fusco annulatis, apice albido, articulo basali brevi incrassato fusco; alis ant. fuscis vix schistaceo-nitidulis, grosse squamatis.“ 5 $\frac{1}{2}$.” Semel exemplar unicum ad betuleti K. marginem 23. Junii (simul cum: 1213. 1304. 759. 258. 215 etc.).

1215. Lividella Mann. Albitarsella Zell. Linn. IV. 378; HS. V. 230. „Antennis candidis, fusco annulatis, apice longe albo, articulo basali subpenicillato, pluribus flagelli articulis primis capiteque nigricantibus nitidis; pedibus fuscis, tarsis sericeo-exalbidis; alis ant. schistaceo-fuscis nitidis, innotatis.“ 5 $\frac{1}{2}$.” Similis est Coracipennellae, Paripennellae et Laricellae. Specimina duo

in betuletis *Lwowiec et Krzywczycze* Junio (comitibus 460, 1268, 1185, 1210, 1212, 1297 etc.).

1216. Laricella Hüb. „Antennis unicoloribus fusco-cinereis, articulo basali subincrassato sine penicillo; alis ant. fuscescenti-cinereis nitidulis.“ 5.” Zell. Is. 208 et Linn. IV. 376; HS. V. 230. Unicum exemplar in betuleto Zubrze 3. Junii (sociis: 21, 28, 27, 35, 143, 187, 188, 266, 299, 320, 405, 413, 427, 483, 484, 531, 609, 615, 623, 639, 655, 700, 728, 729, 734, 745, 749, 764, 767, 774, 778, 783, 800, 802, 803, 828, 850, 873, 875, 888, 895, 900, 902, 937, 947, 948, 1026, 1027, 1030, 1051, 1052, 1136, 1163, 1197-1198, 1200, 1222, 1274, 1294, 1313, 1315 1327.)

1217. Coracipennella Hüb. „Antennis totis albo nigroque variis, articulo basali murino; palpis crassiusculis; tibiis posticis externe cum ciliis griseis, interne cum tarsis pallidis; alis ant. schistaceo-fuscis.“ 6½.” Zell. Is. 208 et Linn. IV. 379; HS. V. 232. Singula exemplaria in betuleto *Lw.* et in querceto pone c. Liś.; 8 et 16 Junii (sociis 878, 1014 etc.).

1218. Orbitella Zell. Linn. IV. 385; HS. V. 232. „Antennis albis fusco-annulatis, apice albo, articulo basali graciliore fusco; oculis superne albido-marginatis; alis ant. dilutius fuscis laevigatis.“ 5—6.” Extremo Junio initioque Julii exemplaria 4 in pagis R. g. et D. (sociis 460, 1195).

1219. Serenella Ti. „Antennis albis, fusco annulatis, supra basim breviter pilosis, articulo basali penicillum longitudine superante; alis ant. dilute flavis, postice saturatis, lineis tribus niveis nitidulis tenuissimis, costali latiore.“ 6.” Zell. Linn. IV. 269; *Ornix gallipennella* Tr. X. 2. 215; HS. V. 240. Spec. duo inter frutices collinorum Mostki 4. Junii (sociis: 432, 892, 1240, 195 etc.).

1220. Alticolella Mann. „Antennis albis, articulo basali grisescente albido sine penicillo; palporum fasciculo dimidium articulum terminalem subaequante; alis anter. sublaevigatis lutescentibus, venis postice subobscuriis, costa dimidia angustissime alba.“ 4½.” *Cespitiella* Zell. Linn. IV. 341; HS. V. 248. Semel exemplar singulum in querceto pone c. Liś. 30. Junii (simil. cum 690 etc.).

1221. Lacunicolella Mann. „Antennis albis, obsoletis-

sime griseo-annulatis, articulo basali albido sine penicillo; palporum fasciculo dimidium articulum terminalem subaequante; alis anter. exalbidis laevigatis impunctatis, venis distinctioribus lutescentibus, costa tenuiter albida. "Vix 5." Zell. Linn. IV. 343; HS. V. 251. Vulgaris Junio Julioque circa R. g. et L.

1222. Niveicostella FR. „*Antennis albis, articulo basali incrassato, non penicillato, subochraceo; palporum fasciculo articulum terminalem subaequante; alis anter. luteo-ochraceis, linea costali ex basi, tenui, postice ampliata, nivea.*" 6." Zell. Is. 208 et Linn. IV. 299; HS. V. 236. Frequens toto Junio circa R. g. et L.

1223. Albicostella Dup. „*Antennis albis fusco-annulatis, articulis flagelli tribus primis luteo squamatis, penicillo articuli basalis lutei brevi acuto; alis ant. ochraceis, juxta vittam costae niveam brunnescens.*" 6." Zell. Linn. IV. 275; HS. V. 237. Niveicostellae similis. Exemplar unum in silvaticis inter L. et Wi. 22. Junii (sociis 335 etc.).

1224. Lutipennella Zell. Is. 208. et Linn. IV. 398, HS. V. 235. „*Antennis albis brunneo fuscove annulatis totis, articulo basali incrassato brevi flagellique basi lutescentibus; alis ant. grosse squamatis luteo-ochraceis; poster. griseis, ciliis dilutioribus.*" 6." Volat satis multa Junio ubivis circa Radłowiec górne et Leopolim.

1225. Oriolella FR. „*Antennis albis fusco annulatis, supra basim breviter pilosis, penicillo ochraceo breviusculo articulum basalem longitudine aequante; alis anter. dilute flavis, lineis tribus (una costali) niveis nitidulis tenuissimis.*" 6." HS. V. 240. Flaviella Zell. Linn. IV. 258. Singula exempl. ad R. g. et in monticulo Cz. sk.; 29 Maji, 8 Junii, 11 Julii (sociis 1086, 425 $\frac{1}{2}$, 985 etc.)

1226. Obscenella FR. „*Antennis albis distinctius fusco-annulatis, apice albido, penicillo nullo; palporum fasciculo dimidium articulum terminalem subaequante; alis ant. latiusculis acutis albidis passim fusco squamulatis, venis omnibus dilatatis luteis, linea costali tenui alba.*" 5 $\frac{1}{2}$." HS. V. 256. Granulatella Zell. Linn. IV. 371. Unicum exemplar circa R. g. 30. Junii simul cum 460 etc.

1227. Binderella Koll. „*Antennis albidis, annulis fuscis ante apicem evanescensibus, articulo basali brevi incrassato fusco;*

alis ant. luteo-fuscis vel brunneo-luteis grossius squamatis." 5." Zell. Is. 208 et Linn. IV. 388; HS. V. 232. Plura spec. in alnetis ante silvas in pago R. g. Julio.

1228. Luseiniaepennella Tr. IX. 2. 213 „*Antennis niveis nigro fuscove annulatis totis, articulo basali graciliore fuscescenti; alis laevigatis, maris obscure griseis, feminae dilutius ochraceo-griseis.*" Vix 6." HS. V. 233; Zell. Is. 208 et Linn. IV. 390. Provenit solitarie Junio Julioque circa R. g. et L.

1229. Limosipennella FR. „*Antennis albo fuscoque annulatis, apice albido, articulo basali incrassato brevi; alis ant. fusco-luteis, costa vittae instar albida.*" 6." Zell. Linn. IV. 406; HS. V. 235. *Diluticostella* Mann. *Vulgaris* circa Radłowice górne et Leopotim. Volat per totum Junium.

1230. Zelleri sp. n.

„*Antennis flagello albo fuscoque annulato, apice albido, articulo basati incrassato non penicillato, capite, palpis thoraceque aureolis; alis anterioribus nitidis luteis, passim schistaceo-squamulosis, costa nihilo insignita alis concolore, puncto disci ad $\frac{3}{4}$ fuso; alis post. dilutius schistaceis; ciliis alarum omnium cinereis.*"

Novam hanc Coleophoram, quam Celeberrimo Professori P. C. **Zellerio**, Viro de Entomologia meritissimo, dedicare audeo, 21. Julii in collina ditione Radłowice górne detexi, quum ibidem florida silvulae betulineae Lwowiec loca excisa perscrutabar. Unicum specimen pulchrum, quod mihi tunc invenire contigit, tempore vespertino cepi, quum sua sponte varios per flores in societate Conspicuelleae, Microdactylae, Spilodactylae aliarumque specierum Zonosomae Poratae adjectarum vagabatur.

Inter centum et quinque Coleophoras, quas Clarissimus Zellerius in Linnaeae Entomologicae volumine quarto describit, certe nulla invenitur species, cuius descriptio in exemplar meum ad unguem quadraret et cum qua id posterius saltem qua varietatem conjungere possem. Aliquot characteribus, nisi fallor, species mea Unipunctellae FR. proxima esse videatur; ex Coleophoris meae collectionis vero Zelleri cum Limosipennella FR. remotiorem habet similitudinem.

Antennae distinctissime sunt albo fuscoque annulatae, apice vero longiuscule albent. Articulus basalis non penicillatus, dimidio fere longior quam latus, squamis appressis aureolis incrassatur. Articuli flagelli

basales aequae ac articuli superpositi sunt gracilliores, alternatim albi et fusi nullibique lutescentes gerunt squamas. Longitudo denique antennarum tres quartas costae partes non excedit.

Frons capilli et palpi aureola; hi sunt gracieles, externe subfumati, articulus eorum penultimus breviusculam fert barbulam capiti concolorum, quae articuli terminalis basim vix excedit. Pedes sericei, omnino straminei. Abdomen fuscum; anus lutescens. Latitudo papiliunculi extensi $5\frac{9}{12}$, " longitudo corporis 2."

Alae anteriores acuminatae apice vix subfalcato, $2\frac{9}{12}$ " longae et $\frac{5}{12}$ " latae, grossiuscule squamatae; nitidae, luteae, passim schistaceo-adspersae. Lineolae disci longitudinales hic nullae dantur, similiter et costa, disco omnino concolor, nihilo est insignita. Post disci medium conspicitur dorso proprius quam costa punctulum fuscum, quo specimen meum Unipunctellae se appropinguat, ab ea vero et reliquis affinibus costa neque albida neque lutescente differt.

Alae posteriores acuminatae, pallide schistaceae nitidulae innotatae. Cilia alarum omnium unicolora cinerea innotata, juxta dorsum longissima. Pagina denique inferior alarum omnium schistacea, subnitidula.

1231. Albifuseella Zell. Is. 206. et Linn. IV. 294; „Antennis non penicillatis albis (interdum cinereo subannulatis), infra lutescenti pilosis; palporum fasciculo articulum terminalem excedente; alis ant. nigro-fuscis, linea costalini vea. " $9\frac{1}{2}$," HS. V. 238. Reperitu solitarie in declivibus silvigerorum collinorum inter L. et Wi. Majo simul cum 689. 825. 1112. 499 etc.

1232. Gallipennella H. Zell. Linn. IV. 263 et Is. 207; HS. V. 237; OT. IX. 2. 215. „Antennis albis subtus fusco-punctatis, penicillo exalbido longiore; atis ant. dilute flavis, postice ferrugineo-brunneis, costa lineaque plicali angustis niveis." 9—10." Elegantem hunc papiliunculum inveni sub finem Juai initioque Iulii 4 speciminibus in sylvaticis inter L. et Wi. Uno tempore volant etiam species 1338. 1242. 1137. 1104. 1083. 1081. 1088. 1089. 967. 945. 832. 812. 841. 842. 807. 687. 679. 626. 481. 424. 439. 479. 343. 310. 243. 130. 151. 153. 70. 27. 22. etc.

1233. Conspicuella Mann. Zell. Linn. IV. 236 et Is. 207. ?; HS. V. 244. „Antennis albis nudis, penicillo basali longo pallidissime ochraceo; alis ant. pallidis, lineis 4 argenteis: prima juxta costam medianam obliqua, secunda disci postica brevi rectiuscula spatium interjectum brunnescens marginante, tertia plicali, quar-

ta dorsali." *Vix. 9.*" Semel exemplar unicum 21. Julii (sociis: 477, 810, 924, 1184 etc) in excisis betuleti *Lwowiec*.

1234. *Ornatipennella* Hüb. „*Antennarum articulis decem supra basim in dorso parce pilosis; alis ant. apice longe producto incurvo dilute sulphureis longitudinaliter argenteo-lineatis.*“ 10—11." Zell. Linn. IV. 227 et Is. 206; OT. IX. 2. 217; HS. V. 245. Sex exempl. in collinorum *Szyp* declivibus, septimum in betuleto *Lw.*; Julio (sociis 998, 776 etc).

1235. *Lixella* Zell. Linn. IV. 231; HS. V. 245. „*Antennarum articulis 14 supra basim in dorso crebrius pilosis; alis ant. apice longe producto incurvo flavidis longitudinaliter argenteo-lineatis, lineis omnibus fusco-marginatis.*“ 7½." Exemplar unicum in betuleto *Lwowiec* 13. Julii (cum priore, 1172, 1170, 1269, 1163, 1126, 1078, 1051, 776. etc).

1236. *Onosmella* Brahm. „*Antennis albis, subtus fusco punctatis, articulo basali vix subpenicillato; alis ant. acutis niveis, tenuiter ochraceo-venosis.*“ 8—9." Zell. Linn. IV. 314 et Is. 207; HS. V. 246. *Struthiopennella* OT. IX. 2. 219. Spec. 5 in silvaticis ditionis *Leopolitanae* sub finem Junii initioque Julii (similis cum 1286, 1297, 1137, 967, 335, 257 etc).

1237. *Cionella* FR. HS. V. 252. „*Antennis albis totis, articulo basali vix incrassato non penicillato; palporum barba articulum terminalem subaequante; alis anterioribus acuminatis pallide lutescentibus, distincte albo-strigulatis.*“ 7½." — Speciem hanc Clarissimus Zellerius qua varietatem cum *Millefolli* conjugit (Linn. IV. pag. 365). Incliti Schäfferius et Mannius eam pro distincta habent specie. Exemplaria mea sine omni dubio specificab minore *Millefolii* differunt.—Plura specimina in silvaticis circa *Leopolim* Junio (sociis 892, 328, 690 etc).

1238. *Tiliella* Schrank. „*Antennis albis fuscescenti annulatis, articulorum flagelli inferiorum dorso albo, penicillo longiore grisecente; alis anter. albis upicem versus fuscescenti-pulverosis, ciliis fusco cinereis.*“ 7½." Zell. Linn. IV. 278 et Is. 207; HS. V. 257; OT. IX. 2. 210. *Anatipennella* H; *Albidella* SV. Exemplar unicum 24. Junii in betuleto *Lwowiec* (sociis 1296, 1283, 1279, 1250, 1240, 1166, 1138, 1136, 1125, 1012, 991, 947, 928, 902,

900, 888, 894—896, 875, 873, 850, 847, 845, 843, 828, 823, 816, 803, 800, 802, 786, 783, 780, 778, 777, 774, 773, 771, 767, 766, 764, 763, 755, 750, 749, 747, 734, 733, 729, 728, 722, 721, 718, 717, 700, 693, 686, 677, 672, 671, 669, 670, 663, 623—621, 613, 593, 578, 550, 529, 505, 493, 486, 488, 443, 441, 429, 425 $\frac{1}{2}$, 320, 315, 314, 197, 188, 187, 152, 147, 91, 89, 53—51, 47, 43, 28, 27, 23, 21, 19, 7, 5, 4).

1239. Palliatella Zinck. „Antennis albis fusco annulatis, basi alba, penicillo longiore externe griseo; alis ant. albis, in apice obsoletius luteo-fuscescenti venosis.“ 6.” Zell. Linn. IV. 282 et Is. 207; HS. V. 257. *Palliipennella* OT. IX. 212. Exemplaria duo in pago R. g., tertium in collinis Szyp; Junio (sociis 460, 1261, 1309, etc.).

1240. Millefolii Zell. Linn. IV. 360; HS. V. 253. „Antennis albis fusco annulatis, dorso toto albo, articulo basali subincrassato sine penicillo; palporum fasciculo articulum terminalem breviusculum subaequante; alis ant. longius acuminatis albis, squamulis nigris adspersis, venis diffuse lutescenti-griseis.“ 7.” Reperitur solitarie prope Leopolim volatque in Hołosko et Cz. sk. Junio (sociis 328, 892, 1268 etc.).

1241. Currucepennella FR. Zell. Linn. IV. 286 et Is. 207; HS. V. 248. „Antennis albis fusco annulatis, flagelli basi alba, penicillo longiore griseo; alis ant. albis, venis late luteis, apicem versus obscurioribus, dilatatis, subconfluentibus.“ 7.” Hucusque exempl. 5. in betuleto Lwowiec et in silvaticis circa Leopolim. Volat sub finem Junii (sociis 632, 149, 460, 151, 238 etc.).

1242. Therinella Tengst. „Antennis albidis griseo-anulatis, apice albido, articulo basali crassiusculo sine penicillo; palporum fasciculo dimidium articulum terminalem subaequante; alis anter. angustulis albidis impunctatis, costa anguste alba, venis lutescentibus dilatatis apicem versus subconfluentibus.“ 6—7.” Zell. Linn. IV. 319; HS. V. 250. *Trochilella* FR. Exempl. duo 29. Junii in nemore ad betuletum K. (sociis: 890, 1077, 1083, 1090, 1033, 1114, 1201, 1206, 1232, 1338, 626, 424, 243, 153, 151 etc.)

1243. Troglodytella FR. „Anntennis albis vel albo-

*fuscoque annulatis, apice albido, articulo basali crassiusculo sine penicillo; palporum fasciculo dimidium articulum terminalem aequante; alis ant. latiusculis albidis impunctatis, costa anguste alba, venis lutescentibus dilatatis apicem versus non vel subconfluentibus.[“] 6½.” Zell. Linn. IV. 322; HS. V. 249. Duo exemplaria in betuleto *Lwowiec* 6. Junii (una cum: 32, 53, 41, 94, 96, 97, 491, 472, 428, 405, 468, 492, 446, 578, 535, 597, 628, 612, 512, 717, 777, 733, 747, 749, 750, 718, 741, 816, 928, 953, 947, 948, 966, 968, 1045, 1125, 1054, 1138, 1189 etc.).*

1244. Murinipennella FR. „*Antennis albis fusco-annulatis, feminece apice albido, articulo basali albido sine penicillo; palporum fasciculo dimidium articulum terminalem breviusculum paulo excedente; alis ant. angustulis sordide albis impunctatis, venis dilatatis dilute fuscescentibus, costa anguste albida.*“ *Vix 6.*” Zell. Linn. IV. 334; HS. V. 249. *Vulgaris Majo Junioque circa R. g. et L.*

1245. Virgatella Zell. Linn. IV. 291; HS. V. 247. „*Antennis albis, penicillo breviore griseo; alis ant. albis acuminatis, venis omnibus, linea circa margines, plica lineaque cellulae disoidalis luteo-fuscis distinctissimis, poster. obscure cinereis.*“ 7.” Exemplar unum 6. Julii (sociis: 967 etc) in querecto supra c *Liš.*

1246. Gnaphalii Zell. Linn. IV. 357; HS. V. 256. „*Antennis albis fusco annulatis, articulo basali subincrassato sine penicillo; palpis superne albis, fasciculo rix dimidium articulum terminalem aequante; alis ant. costa latius nivea brunnescentibus, interstitiis venarum diffuse albis nigro punctulatis.*“ 4½.” Exemplar unum in coll. betuleto *Lw.* 27. Junii (comitibus: 1213, 1215, 1218, 1221, 1222, 1224, 1225, 1228, 1239, 1241, 1262, 1113, 1032, 1248, 1350, 1346, 1337, 1336, 1206, 1346, 1209, 1036, 1228, 947, 948, 950, 966, 827, 835, 840, 717, 749, 783, 646, 656, 513, 583, 557, 406, 409, 413, 428, 442, 443, 485, 288, 156, 1-7, 136, 143, 152, 197, 149).

Mayrella invenitur secus circa *Glog.*, *Berol.*, *Ratisb.*, *Brunsv.*, *Dresden*, *Schandau*, *Vindob.*, in *Litonia*, *Finlandia*, *Anglia*, *Toscana*. — *Deaur.*: in media et bor. *Eur.*; in *Suecia*, *Finl.*, *Liv.*, circa *Posnaniam*, *Jenam*, *Leucop.*, *Glog.*, *Vindob.* — *Aleyron.*: per *Eur.* usque ad *Finl.*, *Liv.* et *Toscanam*. — *Trochil.*: circa *Camaldoli* prope *Neapolim.* — *Parip.*: circa *Reichst.*, *Vind.*, in *Liv.*,

Finl. Fusced: in *Anglia*, *Liv.*, ad *Glog.*, *Fr.* ad *M.*, *Vinariam*, *Gedanum*, *Vratisl.*, in *Boh.* — *Livid.*: in *Silesia Borussica*, circa *Ischl.* — *Laric.*: ad *Helsingfors* in *Finl.*, ad *Glog.*, *Ratisb.*, *Fr.* ad *M.*, *Vind.*, *Reichstadt.* — *Corac.*: in *Anglia*, circa *Aug.* *Vindelic.*, *Fr.* ad *M.*, *Turicum*, *Vratisl.*, *Glog.*, *Vindob.*, in *Toscana*. — *Orbit.*: circa *Glog.*, *Vindob.*, *Reichstadt.* — *Seren.*: ad *Dresdam*, *Fr.* ad *M.*, *Ratisb.*, *Vindob.*, *Nixd.*, in *Hannovera*, *Toscana*, — *Altic.*: in *Liv.*, *Silesia Boruss.*, ad *Ratisb.*, *Brunsv.*, *Vratisl.*, *Vindob.*, in *Toscana*; usque ad *Pini Mughi* regiones. — *Lacun.*: ad *Glog.*, *Vindob.* — *Niveic.*: ad *Vindob.*, *Reichst.*, *Glog.*, *Reinerz*, *Ratisb.*, *Vratisl.*, *Ged.*, *Brunsv.*, *Fr.* ad *M.* — *Albic.*: circa *Vind.*, *Neustrelitz*, *Thorunium*, in *Tyroli*, *Italia*. — *Lutip.*: in *Gallia*, *Suecia*, *Fr.* ad *M.*, *Brunsv.*, *Vratisl.*, *Salsbrunn*, *Glog.*, *Neustr.*, *Vind.*, *Reichst.* — *Oriol.*: ad *Vindob.*, *Fr.* ad *M.*, *Ssexard* in *Hung.* — *Obscen.*: ad *Vindob.*, *Glog.*, *Vratisl.*, *Ratisb.*, *Brunsv.* — *Bind.*: in *Finl.*, *Boh.*, ad *Ged.*, *Brunsv.*, *Fr.* ad *M.*, *Glog.*, *Vindob.* — *Lusc.*: ad *Ratisb.*, *Berol.*, *Ged.*, *Brunsv.*, *Jenam*, *Glog.*, *Fr.* ad *M.*, *Reichst.*, *Vindob.* — *Limosip.*: ad *Parisios*, *Brunsv.*, *Vratisl.*, *Glog.*, *Vind.*, portum *Liburnum*, in *Helvetia*. — *Albifusc.*: in *Liv.*, ad *Ratisb.*, *Heidelbergam*, *Thermas Mattiacas*, *Fr.* ad *M.*, *Jenam*, *Vind.*, in *Hung.* — *Gallip.*: circa *Giog.*, *Ged.*, *Fr.* ad *M.*, *Jenam*, *Vindob.* — *Conspic.*: circa *Vindob.* et *Fr.* ad *M.* — *Ornat.*: certe ad *Fr.* ad *M.*, *Thermas Matt.*, *Jenam*, *Mödling* prope *Vindob.* — *Lixella* certe ad *Vind.*, *Glog.*, *Aurimontium*, *Vratisl.*, *Schreiberhau*, *Ged.*, *Fr.* ad *M.* — *Onosm.*: in *Uralo*, *Liv.*, *Suecia*, *Anglia*, *Gallia*, *Italia*, *Hung.*, *Germ.*, *Austria*. — *Tiliella* in *Anglia*, *Gallia*, *Suecia*, *Liv.*, *Germ.*, *Silesia*, *Austria*. — *Palliat.*: in *Gallia*, *Italia*, *Germ.*, *Austria*, *Boh.*, *Silesia*. — *Milles.*: in *Liv.*, circa *Ged.*, *Glog.*, *Jenam*, *Vindob.* — *Curruc.*: circa *Vindob.*, *Reichst.*, *Vratisl.*, *Lauban*, *Salsbrunn*, *Glog.*, *Dresdam*, *Helmsiedt*, *Swinemünde*, *Fr.* ad *M.*, porro in *Hele.* et *Gallia*. — *Therin.*: in *Finl.*, *Liv.*, ad *Berol.*, *Vratisl.*, *Glog.*, *Fr.* ad *M.*, *Leucopetram*, *Reichstadt*. — *Troglod.*: in *Finl.*, ad *Ssexard* in *Hung.*, circa *Vindob.*, *Vratisl.*, *Fr.* ad *M.* — *Murinip.*: circa *Vindob.*, *Ged.*, *Brunsv.*, *Glog.* — *Virgat.*: in *Silesia*, *Germ.* merid. — *Gnaph.*: circa *Ratisb.*, *Dresdam*, *Ged.*, *Glog.*, *Megalop.*; in *Finlandia*

Gracilaria Haworth.

1247. Stigmatella F. „*Alis ant. rufis purpureo nitidulis*, triangulo costali exalbido intus in dentem exeunte, plicam tangentem; palpis externe rufescentibus, basi apiceque exalbidis.“ 5—6½.” Zell. Is. 209 et Linn. II. 319; HS. V. 285. *Upupaepennella* Tr. IX. 2. 195. Satis frequens vere autumnoque in fruticibus ad margines silvarum circa *R. g.*, *B.* et *M.* Invenitur praeterea in hortis, hieme etiam in domiciliis, ubi hiemare videtur.

1248. Franekella H. „*Alis anter. rufis, violaceo-nitidis*, macula costali triangulari maxima dorsoque ad basim aureoflavis.“ 5—6.” Zell. Is. 209 et Linn. II. 314; HS. V. 285. *Hilaripennella* Tr. IX. 2. 196. Vulgatissima Majo Junioque in silvaticis cuncti

terr. humilioris. Inhabitat praeceps Quercus et Alnos inveniturque exemplaribus decoloratis solitariis usque ad serum autumnum.

1249. Falconipennella H., *Alis ant. griseo-brunneis, triangulo costali dilutiore obsoleto, costa fusco striolato-punctata; palpis externe fuscis apice exalbido.* "7¹/₂." Zell. Linn. II. 323 et Is. 209; HS. V. 287; OT. IX. 2. 203. Volat frequenter Sept. et Oct. inter Rubos ad betuleti Z. marginem. Plura spec. obsoleta obvia mihi fuerunt Majo in fruticosis silvaticorum circa R. g. et B.

1250. Elongella L., *Alis ant. rufis postice purpurascentibus, innotatis; femoribus tibiisque quatuor anterioribus brunneo-vel cinereo-rufis, coxis post. apice albidis.* "7." Zell. Is. 209 et Linn. II. 333. *Signipennella* Tr. IX. 2. 200; HS. V. 289. Vulgaris Aprilis—Oct. in silvaticis virguletisque per omne terr. usque ad promontoria. Tempus volatura autumnum esse videtur, quum exemplaria prius lecta plerumque sunt decolorata et laesa.

1251. Populetorum Zell. Linn. II. 330 et Is. 209. *, Alis ant. osseis, griseo nebulosis, puncto costali pone medium duobusque distantibus in plica nigris; palpis basi apiceque pallidis.* "6." *Tetraonipennella* HS. V. 288. Singula exemplaria Septembri et Oct. inter Rubos ad betuleti Z. marginem (cum prioribus, porro 905—920, 874, 877, 855, 851, 1302, 1255, 1306, 498, 367, 363, 1122, 1302, 1143, 1006 etc.).

1252. Lacertella FR., *Alis anter. nitidulis violaceo-fuscescentibus, maculis 4 alternatim oppositis aureolis; pectore flavo-maculato.* "4." *Euspilapteryx Lac.* HS. V. 291. Zell. Is. 209 et Linn. II. 347. Satis frequens Majo (solitarie usque ad Aug). in herbosis betuleti Lw. et in silvaticis inter L. et Wi. (sociis: 1231, 1047, 1045, 1043, 953, 901, 900, 896, 894, 853, 852, 777 etc.).

1253. Imperialella Mann., *Alis ant. fusco-aureis, fascia prope basim ante dorsum evanescente, strigis tribus costalibus distinctis, tribus dorsalibus obsoletioribus oblique oppositis apiceque argenteis.* "3¹/₂—4."— Strigae costales (ad $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$ positae) cum dorsalibus (dimidio limbali insidentibus) fascias tres in medio disco late interruptas efficere et alae quadrifasciatae esse videntur. Ambae priores strigulae dorsales sunt bene conspicuae, postica obsoletissima. Nigri fasciarum (ad angulum ana-

lem spectantium) margines in certis solum directionibus conspi-
ciuntur. Capilli obscuri, frons argentea.—Zell. Linn. II. 365; Eu-
spilapteryx Imp. HS. V. 292. Invenitur satis frequenter (in societa-
te specierum 99, 995, 1014 etc) ab ultimis diebus Maji usque
ad medium Junium in floridis fruticosis circa R. g. et L. Interdiu
in fruticibus latitat, vesperi per flores vagatur. Ego possideo exem-
plaria 7, plura alia Amicissimo mihi Mann cum multis aliis specie-
bus rarib (Sieversi, Flavicaria, Affinitaria, Luctuali etc) dono misi.

1254. Kollarieilla FR. „Alis ant. caudulatis, brunneis,
dorso, strigulis 5 costalibus capiteque niveis.“ *Vix 5.*” Zell. Is.
209 et Linn. II. 363; *Euspilapteryx* Koll. HS. V. 293. Reperitur
satis frequenter sed disperse praecipue per quercea frutecta circa
L. et J. Volat Junio (sociis 878, 1309 etc).

Stigmatella occurit secus in orientali Rossia media, in Germ., Boh.,
Liv., Suecia, Anglia, Gallia. — Franch.: per Eur. usque ad Parisios, Livoniam,
Hungariam, Austriam et Bavariam. — Fal.: circa Vindob., Glog., Ged., Berol.,
Francof., Ratisb., Kokenhusen in Liv., in Boh. — Elong.: in Gallia, Anglia,
Suecia, Liv., porro in Hung., circa Vindob., Ged., Vratisl., Glog., Francof.,
Berol., Ratisb., Aug., Vindelic. — Popul.: in Livonia, Boh., circa Fr. ad
O., Glog. — Lacert.: in Liv., Boh., circa Dresdam et Schandau, eiroa Glog.,
Messanam in Sicilia. — *Kollarieilla* circa Vindob. et Ratisb. — *Imperialella* detexit
D. Mann Vindobonae depinxitque eam Suae Apostolicae Majestati, Serenissimo ac Augustissimo Nostro Imperatori. Teste Clarissimo Schäfferio volat *Imperialella* etiam
in Saxonia et circa Bonnam.

Coriscium Zeller.

1255. Querectellum Zell. Is. 210 et Linn. II. 366.
„Alis ant. caudulatis griseo-luteis, striolis 4 obliquis costae, 2 dorsi
albis, intus nigro marginatis, primo pari in angulum conuncto.“ *Bronniardellum* F. HS. V. 284. Singula specimina 1. Maji et 16. Sept. in
Quercubus ad marginem querceti B. (sociis 360, 1044, 918 etc).

Secus circa Berol., Francof., Glog., Vindob., Parisios.

Ornix Treitschke.

1256. Finimitella Z. HS. V. 297. „Alis ant. nigrofuscis,
subviolaceis, ad basim dilutioribus, macula dorsi subtriangulari stri-
gulisque costae latioribus inaequalibus albis; capillis luteis ad an-
tennas nigrescentibus; ciliorum lineis dividentibus (una abbreviata

pone medium, una apicali integra) nigris.“ 5.” Exemplar unum in coryletis sylvaticorum R. g. 2. Junii (sociis 863 etc).

1257. Meleagripennella Z. Linn. II. 374 et Is. 210. HS. V. 297; OT. IX. 2. 207. „*Alis ant. fusco cinereis, dorso albo-farinato, strigulis costae crebris albidis, lituris plicae 2 fuscis; capillis dilutis, ad antennas fuscis; ciliorum linea dividente et apicali (postice furcata) nigricantibus.“ 4.*” Frequens ubivis in virgultis, dumosis silvisque per omne terr. usque ad promontoria. Volat Majo et Junio; plura spec. eepi semel Augusto.

1259. Torquilella Z. HS. V. 295. „*Alis anter. fuscescenti-cinereis, subviolaceis, costa albo-strigulata, lunula disci pone medium exalbida; capillis lutescentibus antrorsum fuscis; palpis innotatis; ciliorum lineis dividentibus 3 nigris in medio limbo passim albo-interruptis.“ 4 $\frac{3}{12}$.*” Specimina plura in variis fruticibus sylvaticis circa pagum Radłowiec górne.

1260. Guttiferella Z. Linn. II. 378 et Is. 210; HS. V. 298. „*Alis anter. violaceo-fuscis, fascia ad basim (vel 2 maculis), maculis 4 costalibus (2 anter. magnis, 2 apicis parvis), una dorsali anteanali albis nitidulis; capillis ferrugineis.“ 6.*” Vulgaris Samboriae Leopolique in pamoriorum septis e tabulis factis; Majo, Junio. In montano pago Wołcze inveni eam Julio. In sylvaticis rarissima.

1261. Caudulatella Z. Is. 210 et Linn. II. 380; HS. V. 298. „*Alis ant. nigro-caudulatis albidis, in plica nigro-striolatis, apice nigricante strigam coeruleam continentem.“ 8 $\frac{1}{2}$.*” Apparuit satis multa initio Julii 1853. in mixtis sylvaticis frondosis collinae ditionis R. g. delitebatque ibidem in variis marginum aut prosilviorum fruticibus. Annis sequentibus jam nunquam et necubi eam conspicere mihi contigit possideoque tria tantum specimina, quae in R. g. eepi. Aliae species quae eodem tempore volabant, hae sunt: 1333, 1331, 1330, 1239, 1171, 1166, 857, 659, 434, 471, 397, 287, 581 595, 555, 529, 298, 319, 179, 147, 96, 93.

Meleagrip: volat secus per Eur. usque ad Angliam et Liv. — Torg. ad. Ratisb. alibique. — Guttif.: circa Ber., Glog., Francof., Polska — Łysa, Dresd et Schandau, in Liv., Gallia. — Caud.: circa Budam, Glog., Posnaniam et Rawies, Kokenhussen in Livonia. Rara.

Cosmopteryx Hübner.

1262. Zieglerella H. Z. Is. 210; HS. V. 284. „*Alis ant. atris, basi orichalcea, fascia media miniata orichalceo-marginata, linea apicis lilacino argyrea.*“ 4½.” Mirum hoc microlepidopteron volat frequenter (sociis 1041, 1174 etc) post solis occasum sub finem Junii initioque Julii per ericeta in fine silvarum pagi R. g. ad dextram vix stratae versus pagum Szady ducentis. Circa Leopolim cepi aliquot tantum specimina inter quercea frutecta circa H. et c. Liś.

1263. Turdipennella Ti. Z. Is. 210; *Batrachedra Turd.* HS. V. 283. „*Alis ant. griseis, nigro-irroratis, lineolis longit. (2 in plica, 2 in linea longit. media distinclissimis) nigris.*“ 7.” Vulgaris Junio-Sept. in truncis arborum per silvatica in humiliores montes usque. In pamariis et ambulaerorum arbustis quoque invenitur (sociis Populella etc).

1264. Pinicolella Z. Is. 210; *Batrachedra Pinic.* HS. V. 283. „*Alis ant. ochraceo-testaceis osseis, punctulo ad angulum analem fusco.*“ 5.” Provenit frequenter in fruticosis Pinis sylvestribus collinorum P.-S., porro in Abietis pectinatae silvula Swińska. Plura specimina cepi prope L. etiam in querceto pone c. Liś., ubi non ulla crescit Pinus. Volat sub finem Junii initioque Julii (sociis 238, 690, 998, etc).

1265. Pedella L. Z. Is. 210; *Stathmopoda Ped.* HS. V. 283; *Angustipennella* Tr. IX. 2. 198. „*Alis ant. oehraceis, basi, apice fasciisque 2 linea longit. fuscis conjunctis fuscis.*“ 6.” Exemplar unum in umbrosis humidiusculi alneti arborescentis ad viam stratam in pago R. g. 19. Julii (sociis 258 etc).

Zieglerella volat secus in monte Kahlenberg prope Wind., circa Dresden, Gorliciam. — *Turd.*: ad Wind., Ber., Glog., Francof. — *Pinic.*: ad Nixdorf, Glog., Dresden — *Ped.*: in Suecia, circa Vindob., Glog., Berol., Francof.

Poeciloptilia Hübner.
(*Elachista* Tr.)

1266. Pollinariella Z. Is. 213; Frey Lim. XIII. 287; HS. V. 311. „*Alis ant. albis, fascis 3 obsoletissimis (una ad basim, una media, una ante apicem) dilute luteis, squamis crebris distinc-*

*

tissimis nigris, longitudinaliter subseriatis; linea ciliarum nigrescente." 4." Disertellae simillima. Provenit vulgatissime in pratis et floridis per omne terr. in promontoria usque. Volat socialiter post solis occasum sub finem Maji Junioque simul cum Cygnipennella, Disertella, Paucipunctella, Rosetana etc.

1267. Anserinella FR. Z. Is. 213; Frey Linn. XIII. 298. HS. V. 311. „*Alis ant. albidis, gilvo-nebulosis (quasi maculis indeterminatis, una ad basim, una in medio, una ante appicem), squamis nigris nullis, linea in ciliis e squamis fuscescentibus.*" 4 $\frac{1}{2}$." Priori et posteriori similis. Exemplar unum in Cor. avellana in fruticosis collinis Mostki 4. Junii (sociis 892 etc).

1268. Disertella FR. Frey Linn. XIII. 285; HS. V. 311. „*Alis ant. albis, fasciis 3 obsoletioribus (una ad basim, una media, una antepicali) ochreis, costam versus obscurioribus, squamis punctisve minutulis parcis subobsoletis nigris, inordinate positis; linea ciliarum nigra.*" 4 $\frac{3}{4}$." Pollinariellae simillima. Exemplar unum in florido pratulo ad marginem betuleti Krzywezyce 10. Junii (sociis 1346, 1336, 1322, 1298, 1297, 1265, 1240, 1236, 1222, 1215, 1212, 1210, 1185, 1183, 1165, 1130, 1018, 1012, 991, 951, 939, 936, 934, 928, 902, 900, 895, 888, 878, 873, 828, 803, 802, 800, 798, 785, 783, 778, 777, 767, 763, 739, 735, 729, 728, 700, 672, 647, 623, 493, 296, 187, 188 $\frac{1}{2}$, 188, 113, 89, 70).

1269. Bisulella FR. Frey Linn. XIII. 273; HS. V. 303; Zonariella Tengström. „*Alis ant. fusco-nigris, dilutius squamatis, fascia media latiuscula exalbida, ad dorsum diffluenta; capite griseo, ciliis apicis flavido albis, linea dividente nigra.*" 4 $\frac{1}{4}$." Gelechiis Ligulella et Vorticella nec non speciei posteriori similis. Specimen unum circa R. g. in pascuis virgultis mixtis secundum marginem silvarum crescentibus; 13. Julii (sociis 776 etc).

1270. Cinetella Z. Is. 213; Frey Linn. XIII. 265; HS. V. 303. „*Alis ant. obscure fuscis, grosse nigro-squamatis, fascia media tenui subrecta albida; capite atbo; ciliis albo-cinereis, linea dividente fusca.*" 4 $\frac{3}{4}$." Priori similis. Provenit satis multa in supra commemeratis fruticosis volatque sub finem Junii initioque Julii (sociis 632, 460, 339 etc).

1271. Gangabella FR. Frey Linn. XIII. 271; HS. V.

304. „*Alis ant. latiusculis nigris, fascia media rectiuscula flavida, costam versus tenui, in dorso ampliata; ciliis nigro-griseis totis, capite nigrescente.*“ $4\frac{1}{2}$.” Bisulellae similis. Exemplar unum in Quercu mixti nemoris ad betuletum K; 2. Junii (sociis 205 etc).

1272. Pulella FR. Frey Linn. XIII. 230; HS. V. 304. „*Alis ant. angustulis nigrogriseis, area basali paululum dilutiore, fascia latiori indeterminata ante medium maculisque 2 oppositis ante apicem (confluentibus) candidulis obsoletis; ciliis apicis griseis, anguli analis fuscescente-griseis, linea squamarum nigra divisa; capite sordide albo.*“ $3\frac{2}{12}$.” Specimen unum inter fructecta ad margines silvarum circa R. g. 29. Junii (comitibus 149 etc).

1273. Parvulella FR. HS. V. 304. Priori simillima; *alis ant. dilutius nigrogriseis, grossius squamatis, fascia ante medium maculisque 2 oppositis ante apicem (sejunctis confluentibusve) albidis, striola plicae pone basim nigra, capite sordide albo.*“ 3.” Reperitur satis frequenter in silvaticis circa R. g. et L., ubi diversos inhabitat fruticulos. Plura specimina, quae in collectione habeo, Majo, Junio et Augusto sunt capta.

1274. Pullicomella Z. Is. 212; Frey Linn. XIII. 243; HS. V. 305. „*Alis ant. nigris, grossiuscule squamatis, fascia ante medium subrecta maculisque duabus ante apicem oblique oppositis (vel: fasciis 2 interne convergentibus) distinctis albis; ciliis apice albis, linea squamarum nigrarum divisa, anguli analis obscuris; capite griseo.*“ Magnitudo Pulellae, quacum magnam habet similitudinem. Agit vitam solitariam in Salicibus secundum margines silvarum circa R. g. et L. Volat sub finem Maji initioque Junii (sociis 1216, 993 etc).

1275. Squamosella FR. Frey Linn. XIII. 294; HS. V. 305. „*Alis ant. impure albidis, squamis crebris fuscescentibus conspersis, in apice ipso congestis, ante medium et apicem transverse vix conspicue dilutioribus; palpis, fronte, capillis ac thorace albis; ciliis griseis linea dividente nigra*“ $4\frac{2}{12}$.” Fascia ante medium et maculae oppositae, de quibus Clariis. Frey loquitur, in specimen meo, quod Amicissimus mihi Mann determinavit, vix obsoletissime sunt indicata.— Exemplar unum in pumilescenti Carpinio in margine querecti B. 30. Maji (sociis 26, 35, 94, 97, 80,

156, 189, 329, 405, 442, 446, 467, 493, 504, 513, 514, 535, 559, 571, 587, 599, 600, 619, 621—623, 639, 700, 716, 718, 777, 819, 820, 75, 895, 900, 901, 925, 928, 931, 980, 1038, 1061, 1101, 1222, 1266, 1248, 1296, 1310, 1319, 1327).

1276. Albifrontella H. Frey Linn. XIII. 204; Z. Is. 212; HS. V. 306. „*Alis ant. nigris, fascia ante medium curvata, maculis 2 oppositis posticis, capite palpisque argenteis; ciliis nigrogriseis, nigro-cinctis.*“ 4.” Provenit solitarie disperseque in dumosis silvarumque marginibus circa L., R. g., D. Exemplaria mea cepi initio Junii, 6. Julii et 8. Augusti (sociis 99, 1014, 878, 553, 266 etc).

1278. Tetragonella HS. V. 308; Frey Linn. XIII. 189. „*Alis ant. fuscis, maculis 4 albis nitidis, una in plicae medio, duabus posticis oblique oppositis (costali maxima), quarta apicis; ciliis griseis capite albo.*“ 4.” Volabat frequenter 30. Junii inter frutices in exciso querceto pone c. Lis. Prodit ex latebris primum sole occidente vagaturque sua sponte prope humum varios per flores, quibus ad nectar sugendum paulisper insidet. Alias species eodem die captas Cled. Acuminali addidi.

1279. Quadrella H. Frey Linn. XIII. 187; HS. V. 309. *Tetrastictella* Z. Is. 212. „*Alis ant. auratonigris, punctis 4 niveis nitidis, uno ad $\frac{1}{3}$ costae (plerumque deficiente), uno plicae ante medium, duobus verticaliter oppositis ante apicem.*“ 5.” Elegantem hunc papiliunculum inveni frequentem toto Junio in silvaticis pagi R. g.

1280. Magnificella Z. Frey Linn. XIII. 196; HS. V. 309. „*Alis ant. atris, fascia prope basim, macula dupli transversa in disco medio maculisque 2 posticis oblique oppositis (costali majore posteriore) distinctissimis argenteis.*“ $3\frac{2}{12}$.“ Specimen unum 6. Julii (sociis 553 etc) in Salice vepreti ante betuletum Lwowiec.

1281. Geminatella HS. V. 309. „*Priori simillima; alis ant. nigrofuscis, basi, fascia media curvata alam percurrente maculisque posticis oppositis argenteis obsoletioribus.*“ Fascia media efficit in alis non distensis cingulum continuum, quod in una costa incipit, in altera finitur. Magnitudo prioris. Clarissimus Frey Geminatellam cum Magnificella coniunxit. — Plura specimina Junio (sociis 460, 1014 etc) ad margines silvarum circa R. g.

1283. Illigerella H. Z. Is. 211; *Calotrypis Illig.* HS. V. 207; OT. IX. 2. 32. „*Alis ant. gilvis, maculis diffluentibus cinnamonomeis, punctis disci ad $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$ nigris, apice falcato; ciliis ter fusco divisis.*“ 7.” Neuropterellae et Paucipunctellae similis. Volat frequenter luce obseura toto Junio (solitarie Julio) per herbosa declivia in betuleto Lwowiec sociis: 741, 931, 1243, 1187, 1300, 1225, 1022, 809, 863 etc.

1284. Pontificella H. Z. Is. 211; *Calotrypis Pont.* HS. V. 208; OT. IX. 2. 33. „*Alis ant. obtusis cinnamonomeis, costa, 2 maculis disci medii apiceque plumbeis.*“ 6.” Exemplar unum 19. Junii Samboriae prope Synagogam in sepiis vivaes *Crataego oxyacantha*.

1285. Testacella H. Z. Is. 211; *Tichotripis Test.* HS. V. 213. „*Alis anter. impure griseis, apice subfalcato fasciaque media lata indeterminata fuscescentibus, punctis 2 mediis minutis albis, dorso dentibus 4 squamosis.*“ 5 $\frac{1}{2}$.” Specimina duo in quer-ceto B. 6. Maji (comitibus: 10, 155, 211, 527, 536, 514, 575, 513, 853, 901, 912, 1247—1250, 1252, 1294, 1304).

1286. Rhamniella Z. Is. 211. *Mompha Rh.* HS. V. 210. „*Alis ant. fuscescentibus, gibberibus disci 4 (1, 2, 1) magnis pluribusque punctis apicis nigris.*“ 5.” Reperitur frequenter socialiterque in arboribus et fruticibus lucorum silvarumque circa L. et R. g. Volat Junio-Aug. (comitibus 335, 985, 85 etc). Plura specimina inveni medio Augusto in septis hortorum oppiduli Kałusz (sociis Woeberiana, Minutana, Amataria, Ferrugata, Leucocrinella, Bimaculosa).

1287. Sturnipennella Ti. Z. Is. 212; *Mompha Sturn.* HS. V. 209; OT. IX. 2. 209. „*Alis ant. nigricantibus, fasciis 2 (ad $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$) introrsum convergentibus albis, striolis longit. dissec-tis nigris.*“ 4—5 $\frac{1}{4}$.” Posteriori similis. Plura specimina pulchra inveni Leopoli (simul cum 1322, 363) sub finem Oct. in cloacae fenestra, penes quam crescent Populi pyramidales. Duo exemplaria decolorata laceraque cepi etiam 29. Maji et 19. Junii (comitibus 1086, 158 etc) inter frutices sylvaticorum pagi R. g.

1288. Divisella Wocke. *Gemmella* Z. *Mompha Div.* HS. V. 209, fig. 970. „*Alis ant. nigricantibus, ferrugineo-mixtis, dorso ultra medium fasciisque 2 introrsum convergentibus niveis, anteriore*

tetnui pone medium, posteriore latiore ante apicem punctum medium nigrum continente posticeque strigam latam longit. ferrugineam interrumpente. "4²/₁₂." Venustum hunc papiliunculum rarum 2. Julii in querceto L. in R. detexi. Unicum specimen, quod mihi capere contigit, inter ramos *Quercus marginalis* additum latebat (comitibus 1195, 1165, 1167, 1066, 1070, 1204, 1103, 884, 824, 801, 670, 668, 627 etc.).

1289. Putripennella FR. Z. Is. 211; Tebenna Putr. HS. V. 214. „*Alis ant. fuscescentibus, strigis 2 longit. flavidis (altera juxta plicam versus basim, altera media), tuberculis 2 nigris albido marginatis, uno in media plica, altero ad angulum unalem.* "4³/₄." Specimina duo paulo decolorata in *Pruno spinosa* ad marginem querceti L. in R. 8. Augusti (sociis Alburnella, Pisticella, Funerella etc.).

1290. Miscella H. Tebenna Misc. HS. V. 214. „*Alis ant. fuscis, flavo mixtis, maculis 2 in dimidio costae apicali (anteriore obsoletiore flavescente albave, posteriore alba), tuberculis 2 magnis nigris, uno ad plicae medium, uno ad ang. analem antennarum articulis binis semper nigris, tertio albo.* "Vix 3¹/₂." Seecimina tria pulchra inter coryleta et dumeta circa Leopolim et Janow Junio (sociis 1309, 335 etc.).

1291. Festivella SV. Z. Is. 211; Tebenna Fest. HS. V. 215; Tr. IX. 2. 169. „*Alis ant. flavis, passim argenteo strigulatis, costa ad basim fuscescente, tuberculis 2 maximis nigris, antico pone medium fasciaeformi, postico ad ang. analem; capite cum thorace argenteis, antennis longissimis.* "8." Lautissimum hunc papiliunculum cepi spec. unico in florido pratulo sicco, querceto P. interposito, tempore pomeridianio 23. Junii (simul cum 654 etc). Delitebat prope humum inter herbas, quibus percussis perterrefactum est et in vicina fructecta aufugere conabatur.

1292. Linneella Clerck. Z. Is. 212; Psacophora Linn. HS. V. 215. „*Alis ant. basi, costa tenue apieque nigris, disco aurantiaco, hoc maculis 3 rotundatis separatis plumbeis nigro pupillatis; antennarum nigrarum apice albo.* "6¹/₂." Schäfferellae similis. Elegantem hanc speciem inveni semel duobus speciminibus 8. Julii in Tilia horti botanici Leopoliensis.

1293. Locupletella SV. *Psacophora* Loc. HS. V. 266; *Schrankella* H. Z. Is. 212, adnot. 3. „*Alis ant. basi apiceque nigris, disco aurantiaco, hoc maculis 4 marginalibus irregularibus, duabus dorsi cohaerentibus tertiaque costata antica (interne argenteata) plumbeis, quarta ad 2/3 costae alba (cum antica effusa cohaerente); antennis nigris totis.*“ De hac specie dicit Clariss. Schäfferius „*major Linneella;*“ quum vero mea specimina vix $5\frac{1}{2}$ “ sunt lata, *Locupletella* in variis regionibus magnitudinem mutare videtur. — Duo exemplaria pulchra 5. Junii (sociis 1300, 1295, 1296, 1283, 1213, 1194, 1135, 1108 etc) inter coryleta silvarum pagi Radlowice górne.

1294. Festaliella H. Z. Is. 212; *Schreckensteinia Fest.* HS. V. 262; OT. X. 3. 213. „*Alis ant. aeneogriseis, marginibus omnibus strigisque longit. fuscescentibus, media fortiore ex basi in apicem ducta (postice 2 ramos versus ang. ani emittente).*“ $5\frac{1}{2}$ “ Reperitur vulgate socialiterque in rubetis sylvaticorum circa L. et R. g., porro in fageto montis Magóra. Volat frequenter sub finem Maji initioque Junii, rare Julio. Specimina Julio capta sunt decolorata. Quoad comites videant lectores species 1304, 1285, 795.

1295. Modestella D. *Metriotes* Mod. HS. V. 214. „*Alis ant. lithargyreis, innotatis, tibiis poster. ochraceis.*“ $4\frac{1}{2}$ —5.“ Vulgaris per sylvatica et dumosa in promontoria usque. Anno 1856. vidi eam innumerosam per florentes Anem. nemoras per cunctam silvam pagi R. g. vagantem. Volat Majo, solitatum Junio.

1296. Cygnipennella H. Frey Linn XIII. 305; Z. Is. 213; *Cyenodia Cygn.* HS. V. 211; *Cygrella* Tr. IX. 2. 117. „*Alis ant. capite palpisque niveis, antennis albidis, ciliis albis; alis poster. griseis albisve; subtus omnibus fuscescentibus.*“ 5—6.“ Decorum hoc microlepidopteron reperitur vulgate in pratis silvarumque herbosis circa L. et R. g. Apparet altero dimidio Maji volatque per totum Junium simul cum Pollinariella. Anno 1859. inveni eam magna copia prope Leopolim in humidiusculo nardeto museoso pone betuletum Zubrze.

1297. Eehii Z. *Douglasia Echii* HS. V. 259. „*Alis ant. cinereis, cervino irroratis, ceterum innotatis.*“ 4.“ Volat satis frequenter prope Leopolim per dumosa pone betuletum K. Junio (sociis: 205, 257, 335, 1236, 1268, 1286 etc).

1298. Serratella Tr. IX. 2. 168; *Argentosella* FR. Z. Is. 212; *Stagmatophora Serr.* HS. V. 217, „*Alis ant. aurato-nigris, strigis 3 macularibus (in costa interdum niveis), punctis limbi apicisque 5—7 argyreis; capillis palpisque albis.*“ 5.” *Gelechia Pictellae proxima.* Provenit satis frequenter Junio in virgultis silvaticis circa Leopolim.

1299. Letella H. Z. Is. 212; *Ochromolopis* Jct. HS. V. 213; OT. IX. 2. 204. „*Alis ant. nigroplumbeis, vittis 2 latis luteis, una e basi ultra medium plicae, altera supera intus nigro-trituberculata ab $\frac{1}{3}$ ad apicem ducta.*“ 5½.” Exemplaria 8 in Finis silvestribus in collinis Próchnik 12. Junii (sociis Gysseleniella, Argentella, Distinctella, Neph. Abietella etc.).

1300. Aeratella Z. Is. 212; *Augasma Aer.* HS. V. 260. „*Alis ant. virescenti-aeneis, palpis brevibus subulatis, antennis costae dimidium subaequantibus.*“ 4½.” Gel. *Tenebrellae* similis. Specimina duo obsoleta in floridis frutectorum ad marginem silvarum circa pagum R. g. 5. et 6. Junii (sociis 1022 etc.; porro 1327, 1331, 1296, 1295, 1293, 1283, 1248, 1213, 1194, 1166, 1135, 1125, 1117, 1113, 1108, 1101, 1076, 1060, 1054, 1053, 1045—1047, 1038, 1028, 1022, 1017, 1013, 1003, 992, 991, 947, 943, 934, 833, 928, 901, 894—896, 888, 882, 875, 873, 871, 867, 861, 853, 852, 847, 845, 843, 836, 835, 820, 817, 816, 809, 802—804, 782, 777, 761, 745, 734, 733, 728, 718, 700, 694, 686, 683, 677, 652, 650, 623, 613, 612, 636, 564, 512, 491, 480, 478, 467, 445, 429, 427, 426, 423, 422, 411, 409, 398, 314—316, 320, 290, 269, 208, 206, 197, 188, 187, 143, 155, 94, 97, 91, 89, 61, 53, 35, 32, 23, 26, 27).

Pollinariella vivit secus in Finl., Liv., circa Berol., Glog. Fr. ad M. et O., Gottingam, Wippach, Ratisb., Dresd., Vind., Reichst., in Toscana.—*Anser.*: circa Austam in Boh., Turicum, Vind., Antiguano in Tosc. — *Disert.*: in Anglia, ad Vind., Turicum, Bremgarten — *Bisule.*: circa Fochabers in Scotia bor. alibique in Brit., Abo in Finl., Ratisb., Erlangam, Lahr et Glog., Vind., Turicum.—*Cinct.*: circa Glog., Pisas, — *Gang.*: ad Ratisb., Fr. ad M., Pisas, in Anglia. *Heleciiae deest.* — *Pulei*: ad Vind., Turic., Glog., Frib., Leucop., Fr. ad M., Rat., Brunsv., — *Publiei*: ad Vind., Glog., Rat., Fr. ad M., Vratisl.—*Squamos.*: ad Vind., Austam.—*Albiffr.*: in Angl., Finl., Liv., Silesia, Helv., ad Gotting., Hes. Carol. et Friburg., Fr. ad M., in Tosc. — *Tetrag.*: ad Fr. ad M., Reichenhall, in Helv. — *Quadr.*: in Liv., Sil., ad Rat., Frib., Tur., in Tosc.; Angliae deest.—*Magnific.*: in Angl., Finl., Sil., circa Rat., Fr. ad M., Tur. — *Illig.*: ad Nixdorf, Glog. —

Pont.: in Austria, Hung., ad Labacum, Rat.—Test.: ad Glog., Francof., in Boh.—Rhæm.: circa Berol., Glog.—Sturnip.: in Boh., Silesia alibique—Divisella circa Ratisb., Fr. ad M., Vratisl.—Putrip.: in Boh., ad Rawicz—Misc.: ad Ratisb. alibique.—Festiv.: ad Vind., Fr. ad O., in Hung.—Linn.: in Suecia, Germ., ad Nixdorf.—Loculip.: in Angl., ad Fr. ad M., Turic., in Boh.—Festal.: in Boh. montosis, in Silesia, ad Bér., Francof.—Modest.: in Gallia, Anglia, Germ., Austria.—Cygnip.: per Eur. usque ad Galliam, Angliam, Livoniam, Italianam.—Echii ad Glog., Fr. ad M., in Anglia.—Serrat.: ad Vind., Rat., Budam, Dresdam.—Ict.: in Austria, Hung., ad Rat.—Acratella denique in Anglia, circa Glog., Reichstadt, Fr. ad M., Rat., Vind.

Lyonetia Hübner.

1301. Clerekella L. Z. Is. 216 et Linn. III. 252; HS. V. 261; OT. IX. 2. 191. „Alis unter. argenteo-niveis, macula elongata pone medium disci aureo-fusca, altera minori anguli analis, costa tenne fusca postice albo-strigulata, puncto apicis ante caudulam nigram atro.“ $4 - 3\frac{1}{2}$ mm. Hucusque inveni specimen duo; alterum (sociis 1152 etc) 11. Augusti in mixta silva Dąbrowa alterum (comitibus 1143 etc) 8. Octobris in querceto B. In utraque regione latitabant ambo specimen in marginalibus Alas glutinosis. Varietatem **Aereella** Tr., quae obscuriores habet alas, cepi specimen unico 11. Aug. simul cum specie primaria in commemorata silvula Dąbrowa.

1302. Albella Eversmann. Miram hanc speciem Celeberinus Eversmann in Fauna Volgo-Uralensi, pag. 600, sic describit: „Antennæ nigrae; caput hirtum et thorax alba; alae anticae ad costam nigro-fuscae, ad marginem posticum argenteae, fasciis duabus valde obliquis nigris, saepe marginem posticum non attingentibus; ciliis candido fuscoque variis, puncto apicali atro; posticæ griseentes. Volat in provincia Casanensi Octobri.“

Specimen meum hoc modo aspicitur:

Antennæ nigrae, costam longitudine excedentes, concha majuscula nivea. Capilli nivei, antrorsum in duos fasciculos acutos fusco-terminatos condensati. Frons et thorax nivea, hic lateribus nigris.

Tota latitudo 4%, ala antica $2\frac{2}{12}$ longa, $5\frac{1}{12}$ lata. Costa alarum anteriorum antice angustissime griseo-argentea, ad apicem latius nivea fuscoque quadrigularia. Dimidium costale est nigro fasciis terminatur que introrsus margine subdentato. Dimidium vero dorsale est argenteo-niveum interrumpiturque fascia lata fusca, quae ad $\frac{2}{3}$ dorsi incipit, valde obliqua ad apicem vertitur, in fusco vero dimidio costali mox eva-

nescit. Post hanc fasciam datur ad angulum posticum macula majuscula fusca, quae ad limbum vergit. Tam fascia quam macula in meo specimine dorsum attingunt. In apice conspicitur ante caudulam nigram pustula parva atra.

Cilia apieis brevissima fusca; postice longiora, basi anguste fusca, reliqua parte alba et hic per medium lineola squamarum fusca, quae ad medium limbum flectitur, signata; ad angulum denique posticum et juxta dorsum longissima unicolora grisecentia. Alae posticae cum ciliis longissimis grisecentes.

Clarissimus Herrich-Schäffer de Albella Eversmannii suspicatur, eam Padifoliellae esse varietatem. Jeni Albellae in ejus opere (tab. 107. f. 853) cum meo specimine satis congruit, icones vero et descriptiones Padifoliellae, Prunifoliellae earumque varietatum (HS. V. p. 261, tab. 107. fig. 854. 855; Zell. Linn. III. p. 259 et Is. 1839, p. 216) in id minime quadrant, quam ob rem me affirmare posse puto, neque Albellam Eversmannii neque meum specimen varietates solum commemoratarum esse specierum.

Specimen unicum pulcherrimum, quod in mea habeo collectione, prope Leopolim in campestri betuleto Zubrze detxi. Excitatum et captum est a me 6. Octobris anni 1858., quum tempore pomeridiano in commemoratae silvulae margine Alnos glutinosas, promiscue cum Salicibus, Quercubus et rubetis crescentes, percutiebam. Eodem die collegi hic sequentes alias lepidopterorum species: 1287, 1251, 1249, 1186, 1181, 1143, 1121, 1122, 1006, 926, 918,—922, 914, 912—910, 908—906, 877, 874, 855, 853, 851, 603, 367, 239, 184, 25, 12. Anno 1859. quotidie fere mensibus Sept. et Oct. in hanc regionem, quae multa egregia, inter alia et Odontosiam Sieversi producit, excucurri, sed ne unum quidem exemplar Albella mihi jam obvium fuit.

Clerckella invenitur secus in Gallia, Anglia, Suecia, Austria, Bavaria, Saxonia, Silesia, Austria, Bohemia.— Albellam detexit Clariss. Eversmann mense Octobri in provincia Casanensi.

Nepticula Heyden.

1303. Samiatella Z. Linn. III. 303 et Is. 215 (semina ?); **Ruficapitella** Haw. HS. V. 348. n. 1089. „Alis ant. flavo-virentiaeneis apice violascentibus; antennarum brevium conchula exalbita nitida, capillis aurantiacis.“ $2\frac{5}{12}$ ” lata, $1\frac{1}{12}$ ” longa. Exemplar

unum pulcherrimum in rubeto ad marginem mixtarum silvarum circa pagum R. g. 30. Junii (sociis 460 etc).

1304. Argentipedella Z. Linn. III. 316 et Is. 245; HS. V. 353. „*Alis ant. fuscis, violaceo-nitidulis, fascia pone medium alba nitida; capillis ferrugineis; conchula antennarum exalbida.*“ $2\frac{3}{12}$. Specimina duo pulchra ad marginem querceti B.; alterum 15. Maji (sociis 2, 5, 13, 76, 90, 100, 351, 478, 547, 572, 600, 700, 777, 831, 852, 853, 836, 900, 901, 953, 1029, 1045, 1047, 1054, 1248, 1250, 1252, 1257, 1273, 1260, 1285, 1294, 1295, 1319, 1320), alterum 23. Junii (similis cum 215 etc).

1305. Albicornella Kollar (non *Rufella* Zeller). „*Alis ant. flavidis fuscoque mixtis, apice nigricante, fascia post medium, ciliis, antennisque albidis, harum conchula flavescens; capillis ferrugineis.*“ Minima in tota mea collectione; vix $2\frac{1}{2}$. Exemplar unum paulo obsoletum 29. Maji (sociis 1086 etc) in rubetis ad margines silvarum circa pagum R. g.

Phylloenistis Zeller.

1306. Suffusella Z. Linn. III. 266; HS. V. 341; *Trematella* FR. „*Alis ant. caudulatis antice albis, postice flavidis, ciliis nitidis, costae albis fusco-strigulatis; ex puncto apicis atro tres radii fusci.*“ $2\frac{2}{12}$. Strigula a basi prima valde est obliqua, secunda recte alam percurrit, ambae sequentes subverticales. Ab consimili *Saligna* absentia lineae longitudinalis ex humero excurrentis differt. — Exemplaria singula Aug. et Oct (sociis 1152, 1143 etc.) ad margines mixtae silvulae *Dąbrowa* et querceti B.

Volat secus circa Vindob. Berol. Francof., Glog., Warmbrunn in Toscana.

Cemostoma Zeller.

1307. Spartifoliella H. Z. Linn. III. 273 et Is. 214; HS. V. 342. „*Alis ant. caudulatis niveis, fascia costali obliqua pone medium apiceque in margine strigulato luteolis, macula ad angulum ani atra argyreo-pupillata.*“ $3\frac{1}{2}$. In costae apice conspicuntur 7 strigulae; 1 et 2 commemoratam fasciam luteolam alae vix dimidium attingentem et ad angulum analem spectantem includunt, spatium inter 2 et 3 colore quoque luteolo repletrum,

quam ob rem alae bifasciatae esse videntur. — Formosissimum hoc microlepidopteron obvenit in nostratis satis frequenter in fruticosis et ad margines silvarum circa *R. g.* et *L.* Volat ab ultimis diebus Maji usque ad finem Junii (sociis 1086, 690 etc).

Viget secus in Gallia bor., ad Londinum, Dresdam, Glog., Reichst., in Toscana.

Opostega Zeller.

1308. Crepusculella FR. Z. Linn. III. 284 et Is. 214; HS. V. 360. „*Alis ant. niveis, puncto apicis atro, strigula costae mediae strigaque fracta intralimbali obsoletis lutescentibus; posterioribus cinerascentibus.*“ $3\frac{1}{2}$ —4. Volat sub vesperum infinito prope numero in uliginosis silvarum circa *R. g.*, in udo prato *St. w. t.* et in pratis foenariis montanarum vallium circa *Wołce*; 25. Junii—24. Julii (sociis 460, 1195, 6 etc).

1309. Salaciella Tr. IX. 2. 180; Z. Linn. III. 280 et Is. 214; HS. V. 360. „*Alis nitidis, ant. niveis, poster. exalbidis, antennis lutescentibus, capillis antice elevatis niveis*“ $4\frac{1}{2}$. Mino-ribus Cygnipennellae exemplaribus similis. Exemplar unum 12. Junii prope oppidulum Janow in collinis P. P. Volabat sub vesperum per humiles plantas in aridissimis sterilibus arenosis, Pinis silvestribus parce obsitis. In campestri-collino tractu Janow, speciatim vero in regionibus inter oppidulum ejusdem nominis pagumque Lelechówka, in quibus campestre pinetum *R.*, quercetum *P. R.*, calcareo arenosa collina *Pr.*, *P. P.*, *Szyr*, porro sabuleta aperta pratumque humidum Max. 12. et 13. Junii perscrutabar, obvia mihi fuerunt sequentia lepidoptera: 7, 27—29, 32, 35, 42, 47, 55, 57, 73, 76, 80, 87, 89, 91, 94, 97, 100, 101, 152, 187, 188, 176, 189, 194, 197, 201, 251, 269, 320, 395, 340, 404, 407, 408, 411, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 446, 447, 461, 463, 464, 467, 468, 478, 486, 493, 505, 506, 512, 515, 531, 545, 548, 549, 544, 550, 557, 559, 564, 566, 570, 597, 599, 599 $\frac{1}{2}$, 609, 613, 623, 625, 627, 645, 656, 674, 680, 683, 697, 698, 700, 704, 716, 719, 722, 728, 729, 733, 734, 743, 749, 763, 767, 760, 774, 777, 779, 781, 783, 785, 794, 799, 798, 800—803, 816, 817, 828, 834, 840, 843, 873, 875, 877, 886, 888, 895, 900—902, 904, 928, 947, 948, 951, 953, 955—957, 965, 968, 982, 989, 996, 1003, 1035, 1053, 1074, 1078, 1080,

1100, 1101, 1120, 1133, 1137, 1142, 1144, 1146, 1149, 1150,
1151, 1161, 1163, 1166, 1180, 1190, 1192, 1207, 1208, 1211,
1239, 1254, 1290, 1299, 1309, 1311, 1319, 1328, 1336, 1339,
1346. Initio Julii easdem regiones, insectis et pulcherrimis et
rarrissimis vel localibus superbientes, iterata vice visitabam; lepi-
doptera hoc tempore conquisita speciei Neph. Argyrella (998) adjeci.

Crepusculella obvenit secus in Anglia, Liv., ad Glog., Warmbrunn,
Reichst., Pisac.: in Liv., ad Dresdam, Glog., Ratisb., Nixdorf,
Vindob., Pisac.

Bucculatrix Ti. (Ceroclastis Z.)

1310. Cristatella FR. Z. Linn. III. 300 et Is. 214;
HS. V. 337. „Alis ant. sericeis griseis; capillis fusco-luteis, anten-
nis griseis, conchula modica dilute grisea.“ $3\frac{3}{4}$.“ Exemplar unum in
pratulo, betuleto Zubrze interposito, 30. Maji (comitibus 1275, 1266,
1296, 980, 925 etc.).

1311. Gnaphaliella Tr. IX. 2. 180; Z. Is. 218 et
Linn. III. 293; HS. V. 340. „Alis ant. albis, maculis obsoletis
lutescentibus parce fusco-squamulatis; capillis luteo fuscis; anten-
nis griseis.“ $3\frac{1}{2}$.“ Specimen unum in frutice ad marginem quer-
certi P. R. 12. Junii simul cum Salaciella etc.

1312. Hippocastanella Dup. Z. Is. 216 et Linn. III.
297; HS. V. 338. „Alis ant. flavis, maculis 3 cinnamomeis, linea a
medio in apicem fusca; capillis flavidis, conchula pallida.“ $3\frac{1}{4}$.“
Plura specimina in Tiliis prope quectum B. sub finem Maji.

1313. Frangulella Goeze. Z. Is. 216 et Linn. III. 295;
HS. V. 341; *Rhamnifoliella* Tr. IX. 2. 183. „Alis ant. niveis, ma-
culis costae, fascia apiceque confluentibus luteolis fusco-pulverosis;
capillis niveis; antennis albo fuscoque annulatis, conchula modica.“
 $3\frac{3}{4}$.“ *Vulgaris* ad margines frond silvarum circa Radlowice
górne et Leopolim. Viget Junio Julioque.

1314. Cidarella Ti. Z. Is. 216 et Linn. III. 287; HS.
V. 338. „Alis ant. grosse squamatibus fuscescentibus, guttarum al-
bidarum paribus duobus oppositis; capillis ferrugineis, conchula an-
tennarum epistomioque exalbidis.“ 3.“ Reperitur satis frequenter
Junio in Alnis glut. ad margines silvarum circa R. g. et L.

Crtstatella volat secus in Boh., ad Vindob., Glog., Ratisb. — *Gnaph.: in, Liv., ad Berol., Glog., Dresdam, Ratisb.* — *Hippoc.: in Suecia, Liv., ad Berol. Jenam, Glog., Warmbrunn, Nixdorf.* — *Frang.: in Suecia media, Liv., ad Fran-
cof., Dresdam et Schandau, Jenam, Ratisb., in Silesia, Boh., ad Pisas.* — *Cidar.: in Liv., ad Berol., Glog., Vindob., Reichst. et Nixd., in Toscana.*

Trifurcula Zeller.

1315. **Pallidella** FR. Z. Linn. III. 332; HS. V. 359.

„*Alis ant. exalbidis, obscurius grosse squamatis; post. cinerascen-
tibus exalbido-ciliatis; capillis dilute ferrugineis.*“ 4.” Specimina duo
in herbosis fruticosorum antesilvaticorum circa Leopolim Junio.

Invenitur secus ad Glog., Ratisb., Vindob., Reichst., in Toscana.

Lithocolletis H.

1316. **Roboris** Z. Linn. I. 174 et Is. 217; HS. V. 322.

„*Alis ant. caudulatis nitide niveis, fascia baseos crocea, postice lu-
teolis, strigulis costae 3, dorsi unica fuseescentibus, puncto apicis
atro.*“ 3½.” Reperitur frequenter in querectis per terr. cunctum
usque ad promontoria. Volat Majo et Julio.

1317. **Quercifolletta** FR Z. Linn. I. 218 et Is. 217;
HS. V. 323. „*Alis ant. aureis, linea disci tenui alba ex basi ultra
medium producta, strigulis costae 4, dorsi 3 albis fusco-marginatis,
puncto ante marginem lilacinum nigro.*“ 4.” Volat satis multa
Majo in silvis frond. circa R. g. et L

1318. **Salietella** Z. Linn. I. 207; HS. V. 328; *Iteophagella*
Mann. „*Alis ant. croceis postice fusco squamatis, linea baseos
longitudinali alba, strigulis costae 4, dorsi 3 (ultimis obsoletis)
niveis, apice nigro squamato.*“ 4.” Specimina 3 in variis arboribus
marginalibus silvarum circa pagum R. g.

1319. **Frölichiella** Z. Linn. I. 243 et Is. 218; HS.
V. 333. „*Alis ant. saturate croceis, strigis 2 strigulisque 3 costae,
2 dorsi argenteis introrsus fusco marginatis, apice atro squamate;
antennis cinereis, apice albidis.*“ 4½.” Mirus hic papiliunculus
reperitur vulgate socialiterque in querectis circa R. g., L., J.
Volat Majo et Junio.

1320. **Ulminella** Z. Linn. I. 246; HS. V. 332. „*Alis*

ant. saturate croceis, strigis 2 strigulisque 2 oppositis argenteis introrsus fusco-marginatis, striola apicis argentea; antennis cinereis, apice albis. "Vix $3\frac{1}{2}$." Frequens a Majo in Aug. usque in quercetis et betuletis circa *R. g.* et *L.*

1321. Cavella Z. Linn. I. 213; HS. V. 326. „*Alis ant. aureis, lineola baseos longitudinali, striga fracta utrimque incrassata, strigulisque costae 3, dorsi 2 niveis, lineola apicis albo-excavata.*" $3\frac{1}{4}$.“ Aliquot specimina Junio simul cum priore in silvaticis pagi *R. g.*

1322. Populifoliella Tr. IX. 2. 188. Z. Linn. I. 255; HS. V. 334; *Fritillella* Ti. „*Alis ant. albis, maculis marginalibus subquadratis brunneis fusco pulvereis, striola apicis nigra.*" $3\frac{3}{4}$.“

Procreatur a pluribus annis *Leopoli* et in omnibus vicinis regionibus infinito prope numero inveniturque a primo vere usque ad Novembris ubique locorum per silvatica, hortos, ambulacrum arbusta etc. Longiore mala tempestate saepius eam innumera sub septorum tegulis et in arborum truncis latenter obser-vandi occasio mihi fuit. Ineunte hieme gregatim ex *Populis*, quas ante omnia diligit et quaerit, in finitima domicilia se recipit, in quorum fenestris per totam hiemem, saepius simul cum allis micropteris domicolis, ab languente cupidissimeque aestatem exspectante collectore hilari inspectatur animo. Excepta ditione *Leopolitana* obvia mihi fuit *Populifolella* 26. Augusti etiam in pago *Zimnawoda*, unum circiter milliare a *Leopoli* distante, ubi solitaria Pyrum pone cauponam crescentem, acervatim sole occidente circumvolabat. In urbe *Samboria* ejusque ambitu est hoc animalculum perrarum; in omnibus reliquis regionibus perlustratis, montibus Carpathicis propioribus, omnino desse videtur.

1323. Comparella FR. Z. Linn. I. 257; HS. V. 334. „*Alis ant. albis, maculis marginalibus obliquis brunnescensibus fusco pulvereis, linea apicis nigra.*" $3\frac{4}{5}$.“ Priori consimilis. Specimen unum sub Betulae cortice prope *Leopolim* in betuleto *Zubrze* sub finem Martii simul cum *Odontosia Sieversi*.

1324. Cramerella Fabr. Z. Is. 217 et Linn. I. 234; HS. V. 323. „*Alis ant. niveis nitidis postice aureolis, strigulis costae 3, dorsi 2 fuscescentibus postice albo-marginatis, puncto api-*

cis rotundato atro; post. canis." Reperitur frequenter Majo et autumno ad margines silvarum circa *R. g.* et *L.*

1325. Amyotella Dup. Z. Linn. I. 180; HS. V. 322; Müllerella Z. Is. 1839. 217. „*Alis ant. caudulatis nitidis croceis, macula dorsi prope basim, 2 paribus macularum oppositarum maculaque apicis obliquis albis fusco-marginatis; caudula fusca; capillis flavidis.*" $3\frac{3}{4}.$ " Satis frequens Majo ac Junio praecipue in Quercubus silvaticorum circa *R. g.* et *L.*

1326. Rajella L. Z. Linn. I. 185 et Is. 217; HS. V. 324. „*Alis ant. aureis, linea basali alba utrimque fusco-marginata, strigulis costae 4, dorsi 3 albis fusco marginatis (prima costali ultra oppositam producta), striola ovata apicis atra.*" $3\frac{1}{2}$ —4." Reperitur frequenter Julio atque Aug. in Alnis et Quercubus silvaticorum cuncti terr. usque ad promontoria.

Roboris inventur secus circa Berol. Fr. ad O., Glog., Dresdam, Reichst., Vindob.—Quercif.; ad Reichst., Vindob., Vratisl. Glog. — Salict.: ad Vindob., Fr. ad M., Turicum. — Fröhl.: in Liv., ad Glog., Gedanum, Fr. ad O., Vindob. — Ulmin.: ad Glog., Vindob., Fr. ad M. — Cav.: ad Glog., Fr. ad M., Ratisb. — Fritill.: ad Dresdam, Glog., Ratisb., Vindob., Reichstadt. — Cramer.: in Anglia, Liv., ad Ged., Berol., Glog., Vindob., Reichstadt. — Amyot.: circa Parisios, Glog., Vindob. Reichstadt. — Rajella denique in Suecia, Liv., ad Vindob., Gedanum.

Tischeria Zeller.

1327. Complanella H. Z. Is. 219 et Linn. III. 335; HS. V. 337. „*Alis ant. luteo-vitellinis, costa postice ac limbo maris vix fuscescentibus.*" 5." Vulgatissima Junio in quercetis aliisque silvis per omne terr. usque ad promontoria.

Volat secus per Eur. usque ad Uralum, Liv., Galliam, Toscanam.

Pterophoridae Zeller.

Alucita L.

(Platyptilus Zeller).

1328. Rhododactyla SV. Z. Linn. VI. 326; HS. V. 366. „*Alis ant. dilute brunnescenti-ferrugineis, laciniis pallidioribus,*

striga ante fissuram albida; digito tertio albido, apice brunnescenti-ferrugineo.“ 10.”” Exemplar unum 12. Junii simul cum: 1074, 1078, 1180, 1336, 1390 etc. in floridis declivibus fruticosis collinorum Próchnik in ditione campestri-collina Janow, quae non paucas species ei fere proprias et in reliqua Halicia aut non aut rarissime et parcissime occurrentes numerat.

1329. Zetterstedtii Z. Linn. VI. 333; HS. V. 368.

„*Alis ant. dilute ochraceis, marginibus brunnescentibus, triangulo ante fissuram brunneo, striga laciniarum pallida; digito primo subtus striga pallida notato, tertii dorso medio in ciliis atro squamato.*“ 11½.”” Duo specimina decolorata Julio (simul cum 339, 1172 etc) in herbosis collini betuleti Lwowiec, plura millaria a montibus Carpathicis distante.

1333. Gonodactyla SV. Z. Linn. VI. 330; HS. V.

368. „*Alis ant. ochraceo-griseis, costa fuscescenti, triangulo costali ante fissuram obscure brunneo, striga laciniarum pallida, ciliis laciniæ anterioris posticis puncto albo notatis; digitii tertii ciliis dorsibus in medio nigro-squamatis.*“ 10.”” Exemplar unum cum priore.

1334. Nemoralis Z. Linn. VI. 335; HS. V. 368. „*Alis*

ant. dilute ochraceis, marginibus brunnescentibus, triangulo costali ante fissuram brunneo, striga laciniarum pallidissima; digito primo subtus sine striga pallida, tertii dorso medio in ciliis atro-squamato.“ 12½.”” Unum specimen pulchrum in apertis herbosis silvaticorum collinae ditionis R. g. 14. Augusti simul cum Satyro Semele etc.

1332. Fischeri Z. Linn. VI. 337; HS. V. 369. „*Alis*

ant. fuscescenti-cinereis, strigula fusca triangulo costali adnata ante fissuram plagamque albidam, striga laciniarum albida; digitii tertii dorso medio in ciliis atro-squamato.“ 8.”” Exemplaria duo in pratulis subsilvaticis circa pagos R. g. et Liš.; volat Junio simul cum Pectinella, Ustulana etc.

1333. Acanthodactyla H. Z. Linn. VI. 369. „*Alis*

ant. brunneo-cinereis, obscure nebulosis, triangulo costali fusco ante fissuram plagamque flavescentem, striga laciniarum albida; digitii tertii dente e squamis atris dorsati.“ 10.”” Exemplar unum Junio simul cum Obscura, Hieracio etc. Habitatio in pratulo iotrasilvatico in quercteo Pawłówka.

(*Oxyptylus* Zeller).

1334. Pilosellae Z. Linn. VI. 349; HS. V. 372. „*Alis ant. minus quam ad medium fassis, rufesceni-cinnamomeis, laci- niis albido bistrigatis, ciliis dorsalibus ante apicem laciniae poste- rioris lineam albidam indistinctam in basi gerentibus; digito tertio cinnamomeo, paulo ante apicem utrimque atro-squamato.*“ *Vix 10.*” Plura specimina in floridis ad betuleta *Lwowiec et Krzywczycy*. Tempus vigendi menses Junius et Julius.

1335. Hieracii Z. Linn. VI. 350; HS. V. 371. „*Alis ant. minus quam ad medium fassis, laete brunneis, laciiniis niveo- bistrigatis, ciliis dorsalibus ante apicem laciniae posterioris lineam albidam, distinctam in basi gerentibus; digiti tertii dorso paulo ante apicem atro squamato.*“ *9.*” Volat frequenter sub finem Junii initioque Julii in herbosis sub- et intrasylvaticis circa *L. et J.*

1336. Obscura Z. Linn. VI. 354; HS. V. 372. „*Alis ant. minus quam ad medium fassis brunneo-fuscis, laciiniis niveo- bistrigatis; ciliis costae ante apicem niveis, litura in ciliis laciniae posterioris alba; digiti tertii apice utrimque atro squamato.*“ *5½—6.*” *Vulgaris Junio Julioque in herbosis cuncti terr. humilioris.*

(*Pterophorus* Geoff.).

1337. Graphodaetyla Tr. Z. Linn. VI. 370; HS. V. 377. „*Alis ant. ochraceo fuscescentibus, dorso, fissura plagaque laciniae anterioris gilvescentibus, striola media, puncto gemino ante fissuram lituraque laciniae anterioris fuscis, ciliis circa apicem albis; ciliis digiti tertii breviusculis.*“ *10½.*” Duo specimina in floridis excisi betuleti *Lwowiec* sub finem Junii simul cum: 460, 149, 632 etc.

1338. Fusca Retz. *Ptilodactyla* Tr. Z. Linn. VI. 371; HS. V. 375. „*Alis ant. fuscescenti-luteis, juxta costam obscurioribus, dorso late gilvescente, puncto gemino fusco ad fissuram, costae totius linea externa angustissima albida; ciliis digiti tertii breviusculis.*“ *Vix 11.*” Plura specimina in herbosis betuleti *Lwowiec et silvicorum* circa *Leopolim*. Volat eodem tem- pore ac prior, *Pectinella* etc.

1339. Pterodaetyla L. Z. Linn. VI. 377; HS. V. 379. „*Alis elongatis, ant. rufescenti-griseis giltivisve, puncto fusco ante*

fissuram punctulisque nonnullis marginis postici; ciliis digitii tertii longissimis. "11 $\frac{1}{2}$." Communissima Aug.-Nov. in silvaticis, hortis et fruticosis per cunctum terr. humilius.

1340. Tephra daetyla Hüb. Z. Linn. VI. 381; HS. V. 380. „Collari epistomioque cinnamomeis, corpore exalbido; alis ant. exalbidis, atomis fuscescentibus, punctis 2 distantibus paulo ante fissuram, uno costali post laciniae anterioris medium aliisque circa laciniarum apices fuscis.“ 10.” Reperitur vulgate Julio ubi vis circa R. g. et L.

1341. Carphodaetyla H. Z. Linn. VI. 386; HS. V. 381. „Collari epistomioque brunnescens, corpore alisque ant. dilutissime sulphureis, his striola costali post laciniae anterioris originem, punto uno ad fissuram aliisque in laciniarum apicibus fuscis.“ 8.” Exemplar unum in betuleto Lwowiec 13. Julii in societate Tortricis Viburnanae etc.

1342. Microdaetyla H. Z. Linn. VI. 388; HS. V. 380. „Collari epistomioque cinnamomeis; alis ant. dilutissime sulphureis, atomis fuscis crebrioribus, punctis costatis laciniae ant. 2, uno obsoleto ad fissuram aliisque circa laciniarum apicis fuscis.“ 8.” Specimen unum in supra commemorata silvula 21. Julii sociis Porata etc.

1343. Osteodaetyla Z. Linn. VI. 388; HS. V. 381. „Collari epistomioque brunnescens, corpore alisque ant. dilutissime sulphureis, his punto ad fissuram fusco, litura costali laciniae anterioris fuscescente.“ 9 $\frac{1}{2}$.” Specimina duo in herbosis betuleti Lwowiec 11. Julii comitibus Acidalia Moniliata etc.

1344. Brachydaetyla Koll. Z. Linn. VI. 389; HS. V. 381. „Alis fuscis, costa ant. ciliisque albido maculatis.“ 8 $\frac{1}{2}$.” Specimina 3 ultimis Junii diebus initioque Julii Leopoli in monticulo Wysoki zamek et in silvaticis inter L. et Wi.

(Acoptilus Zeller).

1345. Spilodaetyla Curt. Z. Linn. VI. 391; HS. V. 383. „Alis ant. albidis basi griseo-pulverulenta, litura ad fissuram fuscescenti; poster. cinereis, ciliis omnibus albis fuscescenti maculatis.“ Specimen unum simul cum Microdaetyla.

1346. Tetradactyla L. Z. Linn. VI. 394; HS. V. 385.

„Capite cinnamomeo; alis ant. vix ad medium fissis, exalbidis ante lutescentibus, laciniis albidis, costa laciniae ant. praeter apicem fusca.“ $10\frac{1}{2}$.“ Frequentissima omnium Alucitarum. Volat sub finem Junii totoque Julio per cunctum terr. usque ad valles montanas.

1352. °) Pentadaetyla L. Z. Linn. VI. 397; HS. V. 385.

„Tota nivea.“ 13 .“ ^{°)} Reperitur frequenter Junio-Aug. in hortis circa S. et L. In silvaticis rarer.

Rhodod. et Fischeri reperiuntur secus hinc inde per Eur. usque ad Galliam, Angliam, Sueciam, Livonię, Finlandiam, Toscanam.— Zett: u. ad Angl., Lapponię, Tosc.; in m. Sudetis, in Alpibus.— Gonod.: u. ad Angl., Liv., Tosc. — Nemor.: in Alpibus, m. Sudetis, in Bohemia, Bavaria — Acanth.: u. ad Sicilię, Sinum Bothnicum, prov. Orenburg, Brussam in Asia minori, Gall. et Angl. — Pilos.: u. ad Angl. et Lapp. — Hicracii a Liv. u. ad Italiam. — Obscura u. ad Angl., Liv., Finl., Ital., Asiam min.— Graphod. in Alpibus. — Fusca u. ad Liv., Suev., Casanum, Dalmatię — Pterod.: u. ad Gall et Angl., Schoniam et Gothlandiam, Casanum, Sicilię. — Tephrad.: ad Vindob., in Silesia, Liv., — Carphod.: in Austria, Germ., Silesia, Hung., Sicilia in Casano. — Microd.: u. ad Angl., Liv., Asiam min. — Ostsod.: u. ad Lapp., Angl., Tosc.; in m. Sudetis, in Alpibus. — Brachyd.: u. ad Angl., Germ., Asiam min. (Brussa). — Spilod.: u. ad Hispaniam merid., Parisios, Angl., prov. Orenburg, Italiam. — Tetrad.: u. ad Carniolam, Parisios, Angl., prov. Uralensia, Finl. — Pentad.: u. ad Sueciam merid Casanum, Caucasum, Neapolim, Brussam.

^{°)} Propter commissos errores in numerandis speciebus (vide numeros 78, 188, 425, 501, 566, 599, 607, 629, 1093, 1259, 1277, 1282) sequitur nunc numerus 1352, non 1347.

^{°)} Ad determinationem magnitudinis seu adcuratius dictum: longitudinis inter alas expansas pollex Vindobonensis in 12 lineas divisus, adhibitus est.

Geometrae.

1369. Crocallis Elinguaria L. HS. III. 44; OT. VI.

1. 153. „Alis ant. flavis, fascia lata obscuriore, lunula media magna nigra; post. pallidioribus; linea transversa obsoletissima, puncto medio fusco.“ 18.” Unum marem in pruneto ad marginem silvaram inter L. et Wi. initio Junii (sociis Imperialella, Fröhlichella, Pollinariella etc. (vide 1435).

1370. Boarmia Lichenaria Hufgl. HS. III. 82; OT.

VI. 220. „Femina: alis viridi cinereoque variis, strigis 2 nigris albo-marginatis aream medium latam includentibus, anteriore recurva, poster. tota acute dentata et in alas poster. continuata.“ 14.” Unam feminam in sepulcreto oppiduli Bursztyu 18. Julii (sociis 92, 397, 480, 544, 682, 685, 739, 749, 803, 820, 888, 932, 1069, 1149, 1166, 1197, 1339, 1352).

1371. Synopsia Sociaria H. HS. III. 78, OT. VI.

1. 215. „Mas: alis fusco-griseis, strigis duabus obliquis nigris dilutam aream medium subangustam includentibus, anteriore ante costae medium, posteriore ad $\frac{3}{4}$ excurrentibus, hac antice bis, postice semel fracta alasque poster. limbo multo propius pereurrente.“ 15.” Differt ab consimili Ciuctaria defectu strigae mediae. Unum marem interfrutecta queret P. R. 29. Junii (sociis 1351 etc.).

1372. Cidaria Firmata H. HS. III. 171; OT. X. 2.

197. „Alis ant. cervinis, basi cum fascia media subferrugineis, hac strigis simplicibus sinuatis terminata, apice non diviso; alis post. innotatis subcarneo-albis; antennis pectinatis.“ 14.” Unum marem in Corylo avellana ad marginem betuleti Zubrze Septembri sociis 12, 78 $\frac{1}{2}$, 856, 874, 1116, 1181, 1379, 1381, 1383.

1373. Cidaria Alaudaria Freyer. Culmaria HS. III.

155. „Alis albis, capite, thorace, area basali parva, macula costali media (in lineas continuata) areaque limbali (linea undulata albida divisa) fuscescentibus.“ 13.” Magnam habet enim majore Procellata (15”) similitudinem. Striga postica duplex non conspicua; area media alba in aream limbalem fuscam in cellulis 2 et 3 fere ad lineam undulatam usque continuatur; apud Procellatam interrupit color albus aream limbalem fuscam post lineam undulatam in cellulis 3 et 4. Pulchram hanc speciem, quae testante

Dn. Schäfferio Alpes Styriae et Austriae inhabitat, in Halicia in agro Podolico Leopolitano speciatim vero in collinis silvaticis circa pagos Hołosko et Lisiencice inveni. Ex tribus speciminibus, quae mihi ad id tempus obvia fuerunt, cepi unum 20. Maji in floridis mixtarum silvarum frond. ad pedem monticuli Czartowska skala, duo alia 23. Junii in Genista tinctoria et Cytiso nigricante in prosylvio pieti Świńska prope pagum Hołosko, ad quem tunc tempore pomeridiano comite Dn. Zimmermann excueurri,

1374. Cidaria Aptata H. HS. III. 148; OT. VI. 142.

„Alis albidis, atomis virescentibus, striga baseos fasciaque media (lineata, pone medium majore cuspide) fuscis, striga posteriore duplice lata alba, maculis 4 nigricantibus versus apicem in linea undulata alba.” 11.” Medium inter Olivatam et Ocellatam tenet. Exemplar unum 21. Julii in montani oppiduli Peczyniżyna floralibus. Volabat ibidem tempore vespertino per flores simul cum: 116, 293, 226, 303, 372, 392, 397, 394, 424, 473, 511, 584, 559, 596, 625, 631, 670, 681, 685, 1340, 1394, 1376. In alvearibus reperi hic porro Alveariam, Mellonellam et Anellam, in domiciliis et in apertis species: 4, 45, 126, 165.

1375. Eupithecia Absynthiata L. Minutata SV; HS.

III. 120 et 131; OT. VI. 105. „Alis subhepaticis, costa nigro maculata, lunula media magna nigra, linea undulata postice bis niveo dilatata.” 8.” Exemplar unum Leopoli in sepe viva Mayo. Eodem mense reperiuntur Leopoli et per silvatica circumjacentia sequentes lepidopterorum species: 1. 2. 9. 13. 24-26. 35. 41. 44. 50. 52. 60. 61. 72. 80. 89. 90. 94. 97. 100. 102. 107. 114. 120. 146. 155. 156. 160. 189. 196. 208. 210. 249. 252. 279. 298. 299. 324. 398. 410. 414. 431. 472. 474. 477. 479. 480. 485. 486. 491. 511. 512. 535. 550. 551. 559. 568. 572. 607. 622. 636. 644. 646. 649. 661. 683. 691. 700. 707. 708. 730. 735. 777. 783. 790. 803. 805. 814. 820. 825. 826. 828. 829. 831. 840. 853. 856. 868. 874. 897. 899-903. 926. 928. 932. 940. 942. 981. 1017. 1019. 1031. 1038. 1040. 1043. 1046. 1047. 1054. 1075. 1076. 1077. 1112. 1135. 1144. 1162. 1163. 1185. 1214. 1231. 1244. 1247. 1248. 1252-1257. 1259. 1268. 1273. 1290. 1295. 1298. 1304. 1307. 1316. 1317. 1324-1327. 1354. 1367. 1373. 1375. 1396. 1410. 1421. 1431-1433. 1451-1455. 1457. 1458. 1460-1465. 1467-1470. 1472. 1474.

Noctuae.

1376. Clidia Geographica F. HS. II. 178. „Alis griseo-ochraceis, strigis ambabus angulatis albis, extus fusco terminatis, ciliis albo fuscoque variis.“ 12.” Habet remotiorem oum Scopula Dentali similitudinem. Exemplar unum in floralibus oppiduli Peczynizyn 21. Julii simul cum Cidaria Aptata etc.

1377. Bryophila Perla F. HS. II. 185; OT. VI. 1. 61. „Alis exalbidis, strigis transversis undatis maculisque duabus fuscis; alis post. maculis limbalibus intercostalibus albis.“ Vix 12.” Exemplaria tria medio Augusto in domiciliis in oppidulo Kołomyja.

1378. a. Mythimna Virens L. HS. II. 193; OT. V. 2. 276. „Capite, thorace aliquae anter. laete viridibus, hae lunula perparva media alba; abdomine ac aliis post. albis.“ 18.” Tria specimina (duo pulcherrima, tertium decoloratum) in ruinis arcis oppiduli Halicz 19. Julii (sociis: 2, 4, 6, 73, 76, 92, 397, 663, 800, 803, 857, 1061).

1378. b. Caradrina Ambigua SV. OT. V. 2. 262. Plantaginis Hüb. HS. II. 211. „Alis aut. flavo-griseis, fusco adspersis, strigis 2 transversis (ex punctis) nigris (anteriore obsoletiore), venis postice griseis, maculis solitis magnis fundo subobscurioribus pallideque flavo cinctis, linea undulata intus obscurius terminata, aliis post. albidis, punctis fuscis juxta limbum.“ 15.” Feminam unam initio Julii Leopoli in monticolo W. z. (sociis 1389 etc).

1379. Xanthia Aurago F. HS. II. 216; OT. V. 363. „Alis ant. area basali et limbali suberasinisi, strigis ambabus dilutiorem aream medianam terminantibus maculaque apieis (in linam undulatam continuata) flavis, maculis disci solitis obsoletissimis; poster. flavidis juxta limbum rubentibus.“ 14.” Exemplar unum Sept. in novellis fagetis inter L. et W. (vide 1372).

1380. Xanthia Silago H. (Togata Esp); HS. II. 217; OT. V. 2. 367. „Alis ant. citrinis, maculis radio purpureis (2 anticis costalibus, posticis in fasciam latam conflaxis), striga punctorum fuscorum antelimbali.“ 14.” Exemplaria duo in silvaticis circa Leopolin; alterum inveni ego in Filice a marginem nemoris Krzywczyce, alterum Dr. Zimmermann in Corylo ad mar-

ginem betuleti Zubrze; sub finem Augusti (comitibus 362, 434, 497, 498, 548, 593, 908, 910, 911, 912, 916, 921, 1069).

1381. Xanthia Sulphurago F. HS. II. 218; OT. V. 2. 365. „Alis ant. pallide-ochraceis, fusco punctulatis, strigis ferrugineis, loco maculae reniformis duobus annulis fuscis; post. exalbidis.“ 14.” Exemplar unum Septembri in querceto Bednarówka prope Leopolim (vide 1372).

1382. Hydroecia Citrago L. HS. II. 221; OT. V. 2. 357. „Alis ant. citrinis, ferrugineo adspersis, strigis, ambitu macularum venisque ferrugineis; post. albido-flavis.“ 16.” Exemplar unum sub finem Augusti in vetustissimo querceto ante oppidum Ottynija simul cum **Crambo silvello**.

1383. Xanthia Lineago Guen. Lederer Noctuinen Europas p. 148, „Alis ant. rufo-griseis, strigis ambabus et undulata, ambitu macularum venisque postice dilutioribus, punctulo maculae reniformis distinctissimo albo; post. albis, juxta dorsum obscurioribus.“ 16.” (An varietas speciei **Gilvago** SV. ? „Alis ant. flavis, strigis macularibus ad basim et medium seriebusque punctorum in area limbali fuscescentibus; post. exalbidis.“).—Exemplar unum Sept in fruticosis herbidis ad betuletum K. (vide 1372).

1384. Oporina Croceago SV. HS. II. 320; OT. V. 2. 360. „Alis ant. flavo-ferrugineis, maculis solitis vix dilutioribus, strigis obscurioribus, costa extus albo quinquemaculata.“ 15.” Exemplar unum in querceto B. Septembri (simul cum 1381).

1385. Mesogona Oxalina H. HS. II. 221; OT. V. 2. 178. „Alis ant. subviolaceo-griseis medio obscurioribus, ambitu macularum magnarum, strigis ambabus mediis (aream medianam terminantibus) versus dorsum valde convergentibus strigaque undulata pallidioribus“ 18.” Exemplar unum satis pulchrum involavit noctu 16. Aug. in pago Biłoberezka ex pomario in domicilium, in quo domum rediens, pernoctabam (vide 1359 et 1353).

1386. Mesogona Acetosellae SV. HS. II. 221; OT. V. 2. 179. „Alis ant. helvolis totis, ambitu macularum strigisque ambabus postice convergentibus cinereis, subflavo adnatis; posticis fuscescentibus margine brunneo.“ 19 $\frac{1}{2}$.” Strigae ambae aream

medium terminantes in dorsum ita excent, ut hoc in 3 aequales dividitur partes. Exemplar unum 21. Augusti Samboriae in floribus. Volabat sub noctem (in societate specierum 264, 391, 393, 396, 397, 434, 483, 583, 688, 815, 954, 969, 978, 1117, 1339, 1352, ceterum vide 1366) per flores, quibus ad nectar su-
gendum paulisper insidet.

1387. *Cosmia Fulvago* SV. HS. II. 223; OT. V. 380.
„Alis ant. flavo-ochraceis, strigis ambabus subparalellis ferrugineis, maculis ambabus pallidioribus, reniforme macula nigra, punctis limbalibus nigris.“ 19.” Exemplar unum medio Augusto in Populo tremula in betuleto inter Bednarów et Kałusz.

1388. *Polia Flaviechineta* F. HS. II. 259; OT. V. 2.
27. „Alis cinereis, griseo et fulvo-mixtis, maculis solitis inde-
terminatis, area media subangusta, strigis ambabus et undulata
obscurioribus.“ 19.” Dysedeae similis. Exemplar unum obsoletum
in pomarii septo in montano oppidulo Kutt.

1389. *Polia Dysodea* H. HS. II. 266; OT. V. 2. 16.
„Varians; alis ant. cinereis, area media obscuriore strigis dentatis terminata, his, maculis orbiculari et reniforme lineaque undulata laete aurantiaco adumbratis.“ 15—14.” Volat pervesperi Leopoli in monticulo Wysoki zamek per florida inculta imprimis Echio, Auchusa, Salvia, Alyssum incau, Coronilla, Oenothera et Trifolio convestita; initio Julii (sociis 23, 99, 118, 119, 120, 193, 244, 273, 280, 282, 287, 302, 303, 333, 343, 360, 380, 386, 387, 400, 444, 511, 538, 540, 561, 676, 680, 699, 789, 849, 878, 968, 1000, 1133, 1154, 1170, 1219, 1234, 1378 b, 1391, 1392, 1394, 1398, 1402, 1403, 1418, 1430, 1434, 1446, 1447, ceterum vide 1412 etc.). Monticulum Wysoki zamek hoc anno comite D. Zimmermann noctisque et vesperi saepius perserutabar. Quotiescumque hic fui, semper plura lepidoptera exoptata et nova capere mihi contigit, quae numerum inventarum a me hactenus specierum non medio criter ampliaverunt.

1390. *Apamea Captiuncula* Tr. V. 2. 96; HS. II.
283. „Alis ant. fuscis, strigis ambabus albidis, posteriore maculam reniformem amplectente.“ 7.” Specimina duo 8. Augusti in Mughi regionibus in montosis Czornahora. Volabant per florida

*

ad tugarium pastoris alpinj in societate Pyrrhae, Alpestrana, Alpinelli, Taenielli, Pauperelli, Furunculae. Per declivia vero summaque cacumina alpinorum tumulorum Howerla, Szpyci et Pohane misce vagabantur praeterea species: 101, 397, 448, 541, 542, 597, 606, 618, 619, 664, 665, 800, 808, 973, 974. Posteriora haec lepidoptora etiam in aliis alpibus visitatis observavi.

1391. Apamea Furuncula SV. HS. II. 284; OT. V. 2. 92. „Area basali et limbo fuscis, medio albido, in hoc macula reniforme puncto nigro.“ 10—11.” Volat satis multa Julio per florida in Leopolitano monticulo Wysoki zamek simul cum Dysodea etc., porro Augusto in alpinis Czornahora in societate specierum Captiunculae adjectarum.

1392. Apamea Suffuruncula Tr. V. 2. 97; Erraticula II. HS. II. 285. „Alis ant. violaceo cinereis subunicoloribus, signaturis obsoletissimis.“ 9½.” Exemplar unum Julio Leopoli in floridis monticuli W. z. (sociis 1389 etc.).

1393. Miselia Bimaculosa L. HS. II. 289; OT. V. I. 408. „Alis ant. cinereis fusco mixtis, macula reniforme albidiore; poster. duabus maculis magnis fuscis.“ 21.” Exemplar unum medio Augusto in septo oppiduli Kalusz (sociis 1286 etc.).

1394. Neuria Saponariae Esp. HS. II. 293; OT. V. 1. 303. „Alis fuscis, roseo mixtis, costis usque ad strigam posticam, hac, maculis rotunda et reniforme lineaque undulata (signum W formante) pallidioribus.“ 17.” Volat satis frequenter sub noctem Julio Leopoli in monticulo W. z. (sociis 1389 etc.), porro in floralibus oppiduli Peczynizyn (vide 1374).

1395. Chariptera Culta F. HS. II. 294; OT. V. 1. 395. „Alis ant. fusco-griseis, strigis, maculis ambabus (rotundata duplicita), lineaque undulata niveis, nigro cinctis; posterioribus albis, macula postica nigra.“ 17½.” Pulcherrimam hanc Noctuam reperi specimen unico in sepulcreti septo in oppidulo Janow 29. Junii (sociis 1361 etc.).

1396. Valeria Oleagina F. HS. II. 294; OT. V. 1. 401. „Alis ant. viridibus, maculis ambabus albis, rotunda nigro pupillata; poster. albis limbo fusco.“ 19.” Unum

marem Leopoli in septo pomarii adversus hortum botanicum Majo (vide 1375 etc.).

1397. *Cucullia Absynthii* L. HS. II. 310; OT. V. 3.

92. „Alis ant. canis, strigis ambabus (anteriore duplice) punctisque loco macularum et limbalibus nigris“ 18.” Exemplar unum ultimis Julii diebus in pago Žabie in Tamarice germanica frequenter ad fluminis Czeremosz ripam sinistram crescente (vide 1353).

1398. *Plusia Asclepiadis* SV. HS. II. 391; OT. V.

3. 142. „Alis ant. ex fusco nigris antibus, area basali et limbali roseo-mixtis, costis post lineam undulatam tenue nigris.“ 15.” Exemplar unum Julio sub noctem in floridis monticuli Wysoki zamek sociis: Dysodea etc.

1399. *Herminia Grisealis* H. HS. II. 383; OT. VII.

9. „Alis ant. testaceo-griseis, striga anteriore rectissima, posteriore flexuosa lineaque undulata intus subconvexa fuscis, hac in a. ant. in apicem excurrente, in a. post. ad ang. ani obtuse fracta.“ 10—12.” Volat frequenter toto Junio simul cum aliis Herminiis in silvaticis et fruticosis circa R. g. et L.

1400. *Acontia Solaris* SV. (Lucida Hsgl). HS. II. 418;

OT. V. 3. 244. „Alis nigris, anter. macula una ad apicem costali, una ad angulum posticum albis, basi alba plumbave, macula reniforme numerum 8mentiente; poster. dimidio basali cum ciliis albis vel nigris fascia maculari alba.“ 13.” Exemplaria duo in varietatibus Julio in fruticosis herbidis circa pagum Bileze.

Tortrices.

1401. *Tortrix Palleana* Mazz. HS. IV. 172; OT.

VIII. 99. „Alis ant. stramineis nitidulis, post. dilutioribus; omnibus innotatis.“ 9½.” Exemplar unum medio Julio in Quercu in Leopoliensi horto botanico (vide 1412).

1402. *Eupoecilia Dipoltana* H. HS. IV. 180; OT.

IX. 2. 127. „Alis ant. argenteis, fasciis 4 irregularibus transversis albis; post. fuscescentibus.“ 6—7.” Volat satis frequenter Leopoli per sterilia sabuleta in monticulo W. z. Junio et Julio (similis cum Citrana, Rosetana, Graphana, Strigana, Foeneana, Ru-

sticella, Niveata, Ornatipennella, Argyrella (frequens), Achatinella (copiosa), Humerello, ceterum vide 1412 et 1435.

1403. Cochylis Kindermanniana Tr. VIII. 276; HS. IV. 184. „Alis ant. stramineis argenteo mixtis, fascia obliqua ante medium maculisque post medium (una costali, una dorsi triangulari ad angulum rufis; post. fuscaceous).“ 6.” Plura specimina Leopoli in vervactis floridis monticuli W. z. initio Julii (simul cum priore, Dysodea etc.).

1404. Sciaphila Penziana H. HS. IV. 198; OT. VIII. 186. „Alis ant. lacteis, fascia una pone basim postice fracta, una media lacera maculisque pluribus areae limbalis obscurioribus; post. albidis.“ 10.” Exemplar unum in Pino silvestri in collinis Próchnik prope Janow 29. Junii sociis: Gysseleniella, Abietella, Olivana, Assimilella, Chrysanthemana, Wahlbomiana, Minusculana, Strobilana, Ingratella et Nebulali (quas ambas species ad id tempus solum in alpibus Pikuj, Zelemiu et Szpyci inveni), Mercurella etc. (vide 1361).

1405. Sericoris Flavipalpana FR. HS. IV. 213. „Alis subferrugineis, cinereo mixtis, basi, fascia media, macula una dorsi anteanali, una ex medio limbo oblique costam versus (hanc non attingente) obscurioribus; palpis flavis.“ 7.” Magnopere minori Cespitanae (6”) se appropinguat, quae tamen colore alarum obscuriore palpisque fuscis est insignita. Volat toto Junio simul cum Cespitana in pratis et sabuletis aridissimis circa Leopolim et Janow (vide 1435, 1355, 1361).

1406. Sericoris Olivana Tr. VIII. 151; HS. IV. 214. „Alis ferrugineis, fusco adspersis, fasciis aream medianam terminantibus subargenteis; ciliis in medio albis, in apice et ad angulum obscuris albo-sectis.“ 7 $\frac{3}{4}$.“ Reperitur frequenter sub finem Junii in collinis Próchnik-Szyp prope Janow. Plura specimina capta dia de Pinis silvestribus excitavi, alia vesperi per herbosa declivia variis fruticibus obsita sua sponte volabant. Quoad comites videant lectores species 1355, 1361.

1407. Soricoris Lueivagana Zell. (Lucana Guen.); HS. IV. 217. „Alis ant. basi, fascia media apiceque lata subolivaceo-fuscis, fasciis duabus aream medianam terminantibus albidis;

ciliis obscuris, in medio et angulo aui albis." 7." Macula limbalis in apicem diffunditur, quare hic obscurus; fascia posterior alba in angulum analem continuatur, fascia obscura media in medio subflavo interrupta. — Exemplar unum in dumosis ad marginem betuleti Lwowiec 30. Junii (simul cum 460 etc.).

1408. Coeeyx Clausthaliana Ratzeb. HS. IV. 220; Hercyniana Tr. VIII. 130. „Alis ant. fuliginosis, strigulis punctisque numerosis subargenteis, vix in rivulos transversos saepe geminatos condensatis, punctis ocellaribus duobus." 7." Resinanae similis. Exemplar alterum sub finem Julii in Abiete excelsa prope Źabie, alterum 23. Junii in Pino silvestri in campestri collina ditione Janow. (vide 1353 et 1355)

1409. Coeeyx Nanana Tr. X. 3. 80; HS. IV. 220. „Alis fuscis, cupreο subnitentibus, signaturis confusis, punctis ocellaribus in cellula 5, 6 et 1b cilia non dividentibus; capite testaceo-cinereo." 4½." Exemplar unum in piceto Šwinka 9. Junii (comitibus Kollarieilla, Retinella, Fundella, Seratella, Diffuella, Tenebrella etc.).

1410. Coeeyx Turionana L. HS. IV. 222; OT. VIII. 136. „Alis ant. cinnamomeo rufescentibus, strigis crebris intricatis argenteis; post. albis apice obseurioribus; capite cinnamomeo." 9." Pudendanae similis. Exemplaria duo in piceto Šwinka 19. Maji sociis: Abiegnana, Fagieolella, Parvulella, Argentipedella, Anthyllidella, Caesiella, Longestriatella, Trilinearia, ceterum vide speciem 1375.

1411. Penthina Ochroleucana H. HS. IV. 227; OT. X. 3. 48. „Alis ant. parte interna majore nigricante fasciamque iuerruptam ochroleucam continente, parte apicali ochroleuca ferrugineo-fusco notata; post. fusco-cinereis." 9." Exemplar unum in dumetis ad betuletum Krzywezyce 11. Julii simul cum Mayrella, Peelinella, Margaritaria, Begrandaria etc. (vide 1412).

1412. Penthina Roborana SV. HS. IV. 233; OT. VIII. 30. „Alis ant. albis, basi juxta costam effusa maculaque dorsi anteanali atro terminata fuscis, puncto medio didymo atro, apice rufescente pustulisque tribus atris." 9." Exemplar unum Leopoli in roseto monticuli W. z. initio Julii (sociis 1389 etc).

Mense Julio leguntur Leopoli et in silvis circumjacentibus sequentes lepidopterorum species ; 23, 27, 38, 86, 99, 104, 118, 119, 120, 151, 152, 169, 177, 179, 186, 193, 201, 202, 241, 244, 249, 252, 261, 269, 273, 274, 280, 282, 287, 293, 294, 299, 302, 303, 312, 320, 322, 329, 334, 333, 343, 360, 380, 386, 387, 391, 396, 397, 400, 402, 429, 433, 434, 448, 471, 483, 485, 495, 511, 513, 538, 540, 544, 560, 561, 570, 599, 614, 620, 625, 631, 646, 656, 658, 659, 667, 676, 680, 681, 682, 686, 699, 728, 739, 749, 760, 761, 769, 770, 778, 779, 789, 801, 810, 818, 819, 823, 824, 840, 849, 874, 878, 900, 929, 950, 954, 968, 975, 977, 987, 988, 998-1001, 1057, 1066, 1079, 1089, 1133, 1154, 1155, 1166, 1168, 1170, 1182, 1183, 1196, 1201, 1209, 1219, 1234, 1236, 1358, 1360, 1378 b, 1389, 1391, 1392, 1394, 1401, 1402, 1403, 1412, 1411, 1415, 1417, 1418, 1430, 1434, 1437, 1438, 1439, 1446, 1447, 1476.

1413. Semasia Messingiana FR. HS. IV. 244.

„Alis albido-ochraceis, speculo oblongo in costam producto, striulis 2 supradorsalibus longitud., una ex apice duabusque costalibus post haec (basim versus spectantibus), nigris; post. ciaereis albo ciliatis.“ 11.” Exemplar unum Leopoli in aridis sabuletis monticuli Wysoki zamek 24. Augusti (comitibus 6, 229, 480, 686, 760, 785, 926, 963, 1352, 1423).

1414. Semasia Albidulana FR. HS. IV. 245 „Capite, thorace aliquae ant. albidis, his juxta lineam medianam longit. lutescenti griseis, striga ex apice nulla, hamulis ad ang. ani vergeatibus, speculo nigro bipustulato; post. griseis albo-ciliatis.“ 8.” Exemplar unum prope J. in sabulosis declivibus collinorum P. P. 29. Junii comitibus: Seliniella, Pomposella, Adornatella, Subornatella, Caelebipennella, Galiipennella, Aridello, Hieracio, Baliodactyo, Fasciaria (carnnea), Sebro, W-albo etc.

1415. Semasia Citrana H. HS. IV. 245; OT. VIII.

273. „Capite thoraceque albis, alis ant. citrinis, striga ex apice versus alae medium maculisque disci binis ante et pone medium (saepe in fascias plus minus percurrentes ampliatis) flavicantibus, hamulis ad ang. ani directis; speculo coeco aut nigro punctato.“ 8-9.” Reperitur gregatim Leopoli in sterilibus sabulosis monticuli W. z. Volat vesperi sub finem Junii initioque Julii in societate Dipoltanae, Adornatellae, Ornativennellae, Graphanae, Rosetanae, Striganae, Sexpunctellae, Lotellae etc. (vide 1389).

1416. Roxana Boisduvaliana Zell. HS. IV. 250.

„Alis ant. olivaceo-ferrugineis, maris crebre, feminae dense punctis nigris conspersis (quare hae quasi nigro fuscae), strigis 5 coeruleo-plumbeis, 1 et 2 ad basim verticalibus, posterioribus obliquis; post. fuscis albido ciliatis.“ Mas 6, fem. $7\frac{1}{2}$.“ Speciem hanc, quae testante D. Schäfferio in Livonia obvenit Abietesque pect. ibidem inhabitat, 30. Junii satis multam prope L. in humidiusculo nardeto ad betuletum Zubrze in tali igitur inveni regione, in qua nulli dantur Abies pectinatae. Specimina capta vagabantur jam post solis occasum prope ipsam humum in societate Cuspidellae, Ligulellae, Laminellae, Pollinariellae, Cygnipennellae, Pomposellae, Micellae etc.

1417. Grapholitha Roseticolana Zell. HS. IV. 256.

„Alis ant. fuscis, costa ad apicem 8 hamulis albis lineisque chalybeis, puncto ocellari pallido cilia plumbea linea dividenta (basis propiore) acute nigra dissecante, speculo nigro punctato, extus plumbeo-cineto.“ $6\frac{1}{2}$.“ Volat solitarie Junio, frequentius Julio, per herbosa et dumeta ubique locorum usque ad valles montanas. (L., I., Czp., R. g., W.).

1418. Grapholitha Monticolana Mann. „Alis ant. fuscis parce aurantiaco adspersis, lineis plumbeis ex hamulis costalibus albidis, punctis majoribus juxta limbum duobusque minutulis speculi plumbeo-cineti nigris; puncto ocellari nullo.“ 6.“ Exemplar unum initio Julii in pruneto Leopoliensis monticuli Wysoki zamek simul cum Roborana, Bergmanniana, Chrysanthemana etc. (vide 1389).

1419. Grapholitha Alpestrana FR. (Montanana FR.). HS. IV. 260. „Capite et thorace luteis, alis ant. lutescenti griseis, pallide transverse rivulosis, macula dorsi medii pallida obsoleta fusco partita, punctis limbalibus nigris; ciliis basi apice-fuscis, in medio niveis.“ $6\frac{1}{4}$.“ Volabat frequenter in Mughi regione in alpinis Czornahora per florida ad tugurium pastoris alpini 8. Augusti in societate Captiunculae, Pauperelli, Taenielli etc.

1420. Grapholitha Strobilana L. HS. IV. 273; OT. VIII. 133. „Alis ant. olivaceo fuscis, costa postice 5 paribus hamulorum argenteorum, in strigas plumbeas continuatorum, linea limbalis nigerrima, punctis ocellaribus bis interrupta; post. fuscis al-

bido ciliatis.“ Vix 6.” Specimina duo prope Janow in Pinis silvestribus in collinis Próchnik—Szyp comitibus Penziana et.

1421. Steganoptyla Abiegana FR. HS. IV.

281. „Alis cinerascentibus, fascia ex media costa versus angulum ani directa acutangula obscuriore, speculo dense nigro-lineato, puncto ocellari subobsoleto; post. albidis innotatis.“ 5.” Plura specimina in piceto Świńska 19. Maji simul cum Turionana etc.

Crambina.

1422. Crambus Silvellus H. HS. IV. 54; Adipellus

Zinek. Zell. Is. 173; OT. IX. 1. 73. „Alis ant. dilute ochraceis, vitta submedia non dentata maculaque apici vittae contigua limbum tangente niveis nitidis, venis fuscis, linea antelimbali obtusangula metallica, limbo antice, linea postice 5 punctis nigris.“ 10.” Pascuello simillimus. Exemplaria duo sub finem Augusti in humido prato subsilvatico ad oppidulum Ottynija.

1423. Crambus Alpinellus H. HS. IV. 55; Zell.

Is. 171; OT. IX. 1. 72. „Alis ant. brunnneis dorso dilutoribus, vitta media alba nec dentata nec appendiculata, strigis 2 fuscis oblique interrupta, posteriore trifracta lineae fractae antelimbali albae annata.“ 8½.” Specimina tria Augusto: duo simul cum Captiuncula in alpinis Czornahora, tertium socia Messingiana in sterilibus sabuletis Leopolitani monticuli Wysoki zamek.

1324. Crambus Taeniellus Kuhl. HS. IV. 60;

Zell. Is. 174. „Alis ant. olivaceo-griseis, vitta tenui media postice quadrisida alba, striga postica obscuriore obsoletissima extus albido marginata; linea limbali inter venas nigra; cilia linea dividente una fusa.“ 12.” Specimina duo in alpinis Czornahora 8. Augusti in societate prioris, Captiunculae etc.

1425. Crambus Pauperellus Tr. IX. 1. 101; HS.

IV. 63; Zell. Is. 173. „Alis aut. obscure luteis, fascia media medio late interrupta, apice acuto partis posterioris subovatae medium limbum spectante, linea antelimbali nulla; palpis extus fusciscentibus; alis post. fusco-griseis, subtus omnibus fuscis.“ 11.” Stentziello simillimus. Plura specimina cum priore et Captiuncula ad tugurium pastoris alpini in montosis Czornahora.

1426. Pempelia Perfluella Zinck. HS. IV. 74; Zell. Is. 179. „Alis ant. dimidio basali nigricante, dimidio limbali griseis, hoc lunula submedia nigra strigaque pallida utrimque obscurius adumbrata; linea limbali nigro-signata; ciliis lineis 3 obscurioribus.“ 8.” Striga anterior in meo specimine solum umbra parva supra dorsi medium est indicata.— Exemplar unum in fruticosa Betula mixti luci ad betuletum Krzywezyce, 21. Junii simul cum: Berberidella, Woeberiana, Pyralella, Coronilella, Mercurella, Virgaureana, Minusculana, Chrysanth., Fallacella, Seliarella, Hermanella, Tenebrella, Arenella, Apieistrigella, Alacella, Ornatipennella etc.

1427. Eucarphia Vinetella H. HS. IV. 89; Zell. Is. 177; OT. IX. 1. 152. „Alis ant. griseo-ochraceis, costa, dorso strigisque disci 3 longit. argenteis.“ 14.” Specimina duo in prato foenario ad fluminis Czeremosz ripam sub monte Kostrzyca in pago Żabie (Ilcia) sub finem Julii in societate Bicostellae, Daucellae, Carnellae, Seabioselli, Literalis etc. (vide 1353)

1428. Homoeosoma Tetricella SV. HS. IV. 103; Chrysorrhoeella Zinck; Zell. Is. 176; OT. IX. 2. 270. „Alis ant. obscure fumatis, parce tenerrime laeteo-irroratis, ano luteo.“ 9—10.” Specimina tria in Pinis silvestribus in collinis P.—S. 20. Maji (simul cum: 19, 26, 97, 148, 151, 380, 410, 549, 706, 716, 719, 790, 819, 831, 926, 1031, 1044, 1047, 1096, 1152, 1188, 1231, 1448, 1456).

1429. Aehroa Alvearia F. (Grisella F.); HS. IV. 112. „Alis aut. unicoloribus griseis, innotatis, capite luteo.“ 8.” Exemplar unum 21. Julii in oppidulo Peczynizyn in alveario comitibus: Mellonella, Anella, et Coleoptero Tribolio (Tenebrione) Madente Charp. (ceterum vide speciem 1374).

1430. Melissoblaptes Anella SV. HS. IV. 113; Zell. Is. 180; OT. IX. 1, 44. „Alis ant. griseis, juxta costam latius sublateritiis, pustulis disci 2 fuscis albo-pupillalis in vitta pallidiore submedia positis, striga postica lineolis venalibus nigris.“ 11.” Specimina duo Julio; alterum cum priore in alveario in oppidulo Peczynizyn, alterum in vervactis floridis Leopoliensis monticuli Wysoki zamek, ubi in societate Moritzellae, Berberidellae, Dipoltanae, Citranae, Dysodeae etc. pervesperi prope humum volabat.

*

Tineacea.

1431. Incurvaria Vetulella Ztsdt HS. V. 67; Zell. Linn. V. 311; Circulella Ztsdt. Zell. Linn. V. 312. „Alis ant. aureo-fuscis, maculis tribus minoribus exalbidis, duabus dorsi, una costali ante apicem.“ 7.” Magnam habet cum Capitella similitudinem. — Exemplar unum Leopoli in sepe viva 24. Maji simul cum: Schreibersiana, Cynosbana, Ulrella, Boyerella, Communana, Absynthiata, Castigata, Flavicaria etc. (vide 1375).

1432. Tinea Fulvimitrella Sodoff. HS. V. 68; Zell. Is. 184 et Linn. VI. 114. „Alis ant. nigris, strigula baseos, maculis 2 costalibus, 2 dorsi oblique oppositis albis (costali ad apicem posteriore); capillis ferrugineis; ciliis basi alis subconcoloribus, apice pluries albo interruptis.“ 8.” Exemplar unum 14. Maji in dumeto ad betuletum Krzywezyce in societate Terreanae, Cuphanae, Quadranae, Finimitellae, Torquilellae, Imperialellae, Anthyllidellae, Complanellae, Quercifoliellae, Fagicoellae, Heegeriellae, Seitellae, Serratellae, Parvulellae etc.

1433. Tinea Corticella Curt. HS. V. 70. Zell. Linn. VI. 124; Emortnella Zell. Is. 184. „Alis ant. albis, brunnescenti variegatis, maculis costae irregularibus 4—7 strigaque intralimbali una duabusve nigro-fuscis; capillis albidis; ciliis a basi usque ad apicem albo-sectis.“ 7.” Reperitur Leopoli gregatim in hortorum sepibus e tabulis factis sub finem Maji initioque Junii simul cum: Echiella, Flavicaria, Niveata, Cribrella, Foencana etc. Dagit interdiu in fissuris libertissime ad ipsam humum.

1434. Depressaria ?

Inter meas Depressarias possideo unum specimen formosissimum, in floridis Leopoliensis monticuli Wysoki zamek sub vesperam 10. Julii (simul cum Dysodea etc.) captum, quocum neque ullae descriptiones neque ullae figurae illustratae DD. Zelleri, Schäfferi, Hübneri, Fischeri, congruere videntur; ego saltem identitatem invenire non possum.

Aspicitur hoc animalculum sequenti modo:

Latitudo inter alas expansas $7\frac{3}{4}$;” ala ant. $3\frac{1}{2}$ ” longa, $1\frac{1}{2}$ ” lata; long. corporis $3\frac{1}{4}$.” Antennae fuscae. Caput, collare et palpi griseo flavicantia; horum articulus penultimus subtus

squamis longis fusco terminatis et canaliculato-congregatis, arti-
ulus apicalis basi et sub apice fusco-cinetus.

Alae ant. lutescenti fusco-griseae, pallidissime cupreo-tinc-
tae. Apex rotundatus. Venae in toto suo decursu latiuscule nigro
exalbidoque variegatae. Color venarum exalbidus ad alae $\frac{3}{4}$ aeu-
tangulam efficere videtur strigam, puncta nigra gerentem, crure
superiore ad costam medianam, inferiore ad plicae finem porrigen-
tem. Angulus venae mediae furcatae longiuscule item exalbido
repletur continetque punctum nigrum. Linea limbalis punctis
crassis nigris est insignita. Cilia basi alis concolora, minore
parte apicali dilutiora.

Alae post. cum ciliis albido-cinereae, ad apicem vix obscu-
riores. Pagina inferior alarum omnium innotata; anteriorum fu-
sea, poster. dilutior. Abdomen pallidum. Pedes straminei, fusco
adspersi, tarsi fusco luteoque vari.

Si forte descriptum hoc loco specimen novam constituet spe-
ciem, eam *Anchusellam* nominandam propono.

1435. DePress. Alstroemeriana L. HS. V. 134;
Zell. Is. 195 et Linn IX. 238. „Alis ant. albidis fuscouscenti-im-
puris, punctis 2 oblique positis atris ante maculam costae me-
diae fuscum infra striola coccinea terminatam.“ 7.” Specimen
unum Leopoli sub horto in vervacto, in quo Cannabis sativa,
Sysymbrium Sophia et Dipsacus fullonum spisseque et promiscue
crescant. Volabat ibidem ante solis occasum 3. Junii simul cum
Moritzella, Xylostella, Niveata, Frumentali, Forficuli, Tischerana
ete. Mense Junio procreantur Leopoli, et in silvis circumja-
centibus, sequentia lepidoptera: 24, 32, 35, 38, 77, 113, 182,
203, 207, 232, 245, 255, 269, 286, 291, 304, 324, 329, 332, 386,
407, 425 $\frac{1}{2}$, 444, 480, 481, 484, 506, 526, 557, 568, 616,
625, 636, 646, 649, 658, 661, 682, 685, 688, 695, 717,
727, 747, 760, 770, 778, 779, 785, 798, 801, 803,
805, 815, 817, 818, 822, 823, 835, 840, 842, 849, 856,
868, 873, 903, 904, 926, 946, 948, 949, 950, 951, 965, 969,
972, 977, 987, 988, 1013, 1019, 1024, 1031, 1040, 1047,
1053, 1059, 1060, 1089, 1090, 1092, 1093 $\frac{1}{2}$, 1118, 1126, 1133,
1141, 1160-1163, 1165, 1177, 1178, 1183, 1196, 1203, 1205,
1214, 1219, 1329, 1234, 1236, 1253, 1254, 1256, 1257, 1266,

1268, 1286, 1289, 1298, 1315, 1319, 1336, 1338, 1344, 1346, 1352, 1362, 1363, 1364, 1368, 1369, 1373, 1399, 1402, 1405, 1409, 1415, 1416, 1417, 1426, 1433, 1435, 1438, 1447, 1459, 1440, 1449, 1476.

1436. Depress. Daucella SV. HS. V. 129; Zell. Is. 196. Nervosa Haw. Zell. Linn. IX. 339. „Palporum articulo terminali nigro-bicineto; alis ant. valde elongatis, apice rotundatis, rubricantibus, striga postica diluta peracute fracta, crure superiore valde obliqua; punctis limbalibus subobsoletis.“ 10.” Specimina duo in florido prato foenario pagi Żabie (Ilcia) sub finem Julii simul cum Vinetella etc.

1437. Psecadia Sexpunctella H. HS. V. 132 Zell. Is. 194. „Alis ant. albis, costa cum dorso plumbeis, punctis 6 disci et limbalibus nigris.“ $8\frac{1}{2}$.“ Specimina duo Leopoli in sabuletis sterilibus monticuli Wysoki zamek 2. Julii una cum: Seliniella, Kindermanniana, Citrana, Dipoltana, Roborana, Adornatella, Ornatipennella etc. (vide 1389).

1438. Carposina Berberidella Mann. HS. V. 142. „Alis ant. cinereis, tuberculis fuscis, ante medium dispersis, ad $\frac{2}{3}$ in fasciam macularem congestis.“ $6\frac{1}{2}$.“ Margines tuberculorum sunt ita elevati, ac apothecia Lichenum. — Hucusque inveni specimena duo; alterum (simul cum Perfluella) 21. Junii in Betula mixti luci ad betuletum Krzywczycę, alterum (sociis Dysodea etc). 10. Julii sub vesperum in floridis monticuli Wysoki zamek.

1439. Topeutis Criella Ti. HS. V. 144; Zell. Is. 191. OT. IX. 2. 47. „Alis ant. exalbidis brunneo-pulvereis, obscurius venosis, palpis brunnescentibus abdominis longitudine.“ $8\frac{1}{2}$.“ Unam feminam Leopoli in sepulcreto suburbii Łyczakow initio Julii simul cum Paucipunctella, Humerello etc. (vide 1389).

1440. Pleurota Rostrella H. HS. V. 146; Zell. Is. 191; OT. IX. 2. 52. „Alis ant. apice producto, opacis brunneis dorso latissime dilutis, costa anguste alba.“ 11.” Duos mares in sterilibus sabulosis inter pineta circa oppidulum Janow 23. Junii (sociis 1355 etc.).

1441. Pleurota Pyropella SV. HS. V. 146; Zell. Is. 191; OT. IX. 2. 54. „Alis ant. nitidis stramineis, vitta ex ba-

si juxta costam ad apicem perducta fuscescenti." 8." Exemplar unum in pago Żabie (Hęia) sub finem Julii (vide 1353). Habitat in florido pratulo montano.

1442. Pleurota Bicostella L. HS. V. 147; Zell. Is. 191. „Alis ant. nitidulis cinereis, punctis disci duobus ante, uno post medium nigris, vitta ex basi ad apicem juxta costam niveam fusca." 9 — 10." Specimina 3 in florido prato foenario ad flumen Czeremosz in pago Hęia sub finem Julii simul cum Vinetella etc.

1443. Anacampsis Aggretella Zell. „Alis ant. nigro-fuscis, maculis 2 disci unaque costae ante apicem obsoletis exalbidis." 4½." Quoad similitudinem medium inter Artemisiellam et Anthyllidellam tenet.—Unum specimen in Pino silvestri in collinis Próchnik 5. Junii (sociis: 25, 37, 52, 60, 80, 324, 404, 411, 570, 691, 716, 819, 821, 831, 834, 840, 900, 904, 926, 932, 946, 947, 949, 982, 1100, 1161, 1191, 1298, 1299, 1334, 1354, 1443, 1444, 1475. Alia mense Junio circa Janow conquisita lepidoptera speciebus 1355 et 1361 alligavi).

1444. Gelechia Seabidella Zell. Is. 189; HS. V. 167. „Alis ant. griseis, costa obscurius maculata, fascia baseos punctisque 3 disci solitis nigris ferrugineo-cinctis, striga postica acutangula diluta." 6½." Plura spec. in Pinis silvestribus cum priore.

1445. Gelechia Lentiginosella FR. HS. V. 179; Zell. Is. 198. „Alis ant. fuscis, maculis disci 3 unaque costae rufescensibus." 7." Exemplar unum in Pino silvestri in collinis Próchnik 23. Junii (sociis 1355 etc).

1446. Gelechia Scotinella Metz, HS. V. 181. „Alis ant. luteo-fuscis, punctis disci nigris, horum interstitiis maculaque costae ante apicem lutescentibus." 5½." Exemplar unum tempore verspertino in floridis Leopoliensis monticuli Wysocki zamek. Volabat initio Julii in societate Geronellae, Apicistrigellae, Moritzellae, Seliniellae, Berberidellae, Cautellae, Nebuleae, Kindermannianae, Dipoltanae, Dysodeae etc.

1447. Gelechia Moritzella FR. tab. 30. f. 1; HS. V. 187; Zell. Is. 199. „Alis ant. nigrofuscis, capite palpis et alarum ant. dimidio costali ferrugineis, striga postica pallida."

6." Exemplaria duo Leopoli; alterum pulcherius (socia Alstroemerella) 3. Junii in vervaeto, spisse Sisymbrio Sophia et Cannabe sativa convestito, alterum decoloratum 10. Julii (una cum Scotinella) in floridis monticuli Wysoki zamek. Volat circa vesperam.

1448. Calotrypis Dentosella FR. HS. V. 208. „Alis ant. plumbeis, disco maculis flavidis ter interrupto; ciliis obscuris, lineis dividentibus 2 percurrentibus nigris.” 5½.” Volabat satis multa sole occidente 20. Maji et 5. Junii per florida declivia fruticosa calcareo-arenosorum collinorum Próchnik. (vide 1428 et 1443).

1449. Stigmatophora Pomposella FR. HH. V. 217; Zell. Is. 213. „Alis ant. auratonigris, maculis 7—8 et fronte argenteis, capillis fuscis.” Vix 4.” Exemplar alterum in supra commemorata regione sociis Transversella, Dodecella, Olivana etc. (vide 1361), alterum prope Leopolim in nardeto ad betuletum Zubrze simul cum Boisduvaliana, Cuspidella etc. Ultimis Junii diebus.

1450. Coleophora Caelebipennella Ti. HS. V. 244; Zell. Linn. IV. 238 et Is. 206. „Antennis albis nudis, penicillo longo flavescenti; alis ant. pallidis, lineis 3 argenteis: prima costali basim non attingente, interne acuminata, secunda disci postica (spatio interjecto fuscescenti in costa ad basim producto), tertia plicata.” 6½.” Exemplar unum in collinis Szyp prope Janow 29. Junii simul cum priore etc. Habitatio in fruticosorum, declivium floridis v. ntis non expositis.

1451. Coleophora Linearrella. FR. HS. V. 250; Zell. Linn. IV. 329. „Antennis albis fuso annulatis, articulo basali griseo sine penicillo; palporum fasciculo brevi, articuli secundi apice dorsoque ultimi albidos; alis ant. acuminatis dilute brunneis albido lineatis, linea costae tenui alba.” 6—7.” Plura specimina 19. Junii inter quercea fructecta collinorum Mostki (vide 1375). Indigena pratorum floridorum.

1452. Tinagma Transversella Zell. Is. 204; HS. V. 260. „Alis ant. viridi metallicis, ad limbum punctulis albis irroratis, maculis 2 superpositis pone medium (una dorsali, una disci) albis.” Vix 4.” Specimina plura in variis arboribus ad margines fagitorum mixtarumque silvarum inter L. et Wi. in societate Maleagripennella, Finimitellae, Rubrifasciellae, Calthellae,

Lacertellae, Ulmifoliellae, Quercifoliellae, Fagicoellae, Amyotellae, Heegeriellae, Cramerellae, Roboris, Seitellae, Quercetelli, Mespilellae, Pomifoliellae, Incanellae, Modestellae, Caesiellae, Quadranae etc. (vide 1375). Tempus vigendi mensis Majus.

1454. Ornix Caelatella Zell. Linn. II. 585; HS. V. 298. „Alis ant. brunneis; striga ante medium in plica fracta, macula quadrata media strigulisque costalibus (ad limbum vergentibus) tribus argenteis, capillis griseo fuscoque mixtis.“ $4\frac{1}{4}$ mm. Specimen unum paulo obsoletum in Quercu ad marginem querceti Bednarówka. Viget medio Majo simul cum: Kleemanella, Ulmifoliella, Sparmanella, Rajella, Quercifoliella, Roboris, Meleagripennella etc. (vide 1375).

1455. Elachista Incanella FR. HS. V. 308; Frey Linn. XIII. 253; „Antennis griseis, obscurius annulatis, capite, fronte palpisque albidis, alis ant. longiusculis (apice subacute), leviter squamatis, dilute griseis, fusco intermixtis, linea plicae obscuriore, fascia ante medium maculisque 2 oppositis, indistinctis dilutioribus; ciliis albo-griseis, ad basim rubescientibus, linea squamarum nigra.“ $3\frac{1}{4}$ mm. Specimen unum ad margines silvarum inter L. et Wi. simul cum Transversella etc. Excitatum est a mede Evonymo europaeo (qui per cunctae fere Haliciae silvatica in copia invenitur).

1456. Heliozetta Metallicella Zell. Is. 204; HS. V. 315. „Capite ac alis ant. olivaceo metallicis, his guttula ad angulum ani albida obsoleta.“ $3\frac{1}{6}$ mm. Speciem hanc inveni satis frequentem prope J. in Corylis pineti R. non procul ab querceto P. R. 25. Maji simul cum Tetricella etc.

1457. Bucculatrix Boyerella Dup. Zell Linn. III. 291; HS. V. 341. „Alis ant. niveis fusco-pulvereis, lituris 3 costae obliquis, una dorsi postica cinnamomeis fusco pulverosis, lineola apicis longitudinali nigra; capillis cum conchula niveis, antenuis fusco annulatis.“ $3\frac{1}{2}$ mm. Specimen unum Leopoli in Pruno pago dumeti ad hortorum margines 24. Maji in societate: Schreibersianae, Ulmellae, Circulellae, Cynosbanae, Communanae, Absynthiatae, Castigatae.

1458. Bucculatrix Crataegi Z. Linn. III; 290;

HS. V. 339. „Alis ant. exalbidis fusco pulvereis, lituris 3 costae cinnamomeis, fusco pulverosis, lineola ante apicem longit. atra; capillis albidis fuscisque, antennis annulatis.“ $3\frac{1}{2}.$ ” Unum spec. ad margines mixtarum silvarum inter L. et Wi. Viget ibidem Majo in societate Transversellae etc.

1459. Bucculatrix Nigricomella Z. Linn. III. 299 et Is. 215; HS. V. 338. „Alis ant. virescenti aeneis; capillis nigris, antennis fuscis, apice albis conchula majuscula nitide albida.“ $3\frac{1}{2}.$ ” Exemplar unum 21. Junii ad marginem querceti Bednarówka. Habitatio in Quercu.

1460. Bucculatrix Ulmella Mann Zell. Linn. III. 288; HS. V. 339. „Alis ant. pallide ochraceis, maculis costae obliquis obscurioribus, fusco pulveratis, macula dorsi medii fusca nigro-squamata, capillis ferrugineis, conchula antennarum epistomioque flavescentibus.“ 3.” Exemplar unum Leopoli in Pruno pado 24. Maji sociis Boyerella etc.

1461. Lithocletis Kleemanella F. Zell. (Linn. I. 244 et Is. 218; HS. V. 333. „Alis ant. saturate croceis, strigis duabus paribusque duobus strigularum oppositarum argenteis introrsus fusco-marginatis, pustula apicis atra; antennis cinereis apice albis.“ $3\frac{1}{2}.$ ” Exemplar unum (similis cum Caelatella etc.) in querceto Bednarówka. Tempus vigendi mensis Majus.

1462. Lith. Ulmifoliella H. Zell, Linn. I. 210 et Is. 218; HS. V. 324; Tr. IX. 2. 187. „Alis ant. croceis, lineola baseos longitudinali, striga obtuse fracta strigulisque costae 3, dorsi 2 niveis, puncto rotundo atro ante apicem atrum.“ $3\frac{1}{2}$ ” Unum exemplar in querceto Bednarówka Majo cum priore.

1463. Lith. Faginella Mann. Fagicolella HS. V. 327; Zell, Linn. I. 204. adnot. 3. „Alis ant. croceis, striola baseos longit. recta nivea, strigulis costae 4, dorsi 3 niveis (pari primo in fasciam acute fractam juncto), striola apicis nigra.“ $3\frac{1}{2}$ —4.” Habitatio in silvis fagineis inter L. et Wi. Tempus vigendi est mensis Majus.

1464. Lith. Heegeriella Zell. Linn. I. 232; HS. V. 323. „Alis ant. nitidis albidis, postice aureolis, strigis costae 4, dorsi 2 fuscescentibus postice albo marginatis, linea longit. ex basi fuscescenti, puncto apicis oblongo atro.“ 3.” Duo specimena cum priore. Commoratur in Fagis silvaticis.

1466. Lith. Pomifoliella Ti. Zell. Linn. I. 196; HS. V. 330. (*Mespilella* H.). „Alis ant. obscure croceis, striola basali long., strigulis costae 4, dorsi 3 niveis (prima dorsali magna subulata), striola apicis atra; tarsis albis nigro annulatis.” 4.” Exemplar unum cum prioribus.

1467. Lith. Tremulae Zell. Linn. I. 251 et *Populifoliella* Is. 218; HS. V. 334. „Alis ant. angustioribus dilute brunnescentibus, strigulis marginalibus fuscis postice albido marginatis, linea apicis nigra.” 3 $\frac{1}{4}$.” Exemplar unum Aprili in querceto Beduarówka. Latebat in *Corylo avellana*.

1470. Cemistoma Seitella Mtzn. Zell. Linn. III. 278 et Is. 214; HS. V. 343. „Alis ant. nitidis canis, postice croceis striolisque costalibus fuscis, macula marginis postici atra metallice lilacino pupillata” Vix 3.” Exemplar unum inter fructecta betulinea ad betuletum Krzywczycę. Volat Majo simul cum *Transversella*, etc.

1471. Phyllocoenistis Saligna Zeller Linn. III. 270 et Is. 214; HS. V. 344. Alis ant. angustulis nitidis albis, linea longit. gemina fusca ex humero, apice flavido in costa fusco-stri-gulato, puncto apicis atro.” 3.” Pulcherrimum hoc animale illum inveni specimin unico in *Alno glutinosa* ad marginem betuleti Zubrze Octobri simul cum: pluribus *Gracilaria*, *Conscriptella*, *Emargana*, *Caudana*, *Albella*, *Tragopogone*, *Cassinia*, *Ferruginea*, *Psittacata*, *Boreata*. Postiores tres species volabant hoc anno usque ad finem Novembris.

1472. Micropteryx Sparmanella F. Zell. Linn. V. 338 et Is. 185; HS. V. 393. „Alis ant. aureis, crebre et grosse purpureo reticulatim irroratis, macula anali aurea; post. violaceen-tibus; ciliis luteo griseis.” 4.” Exemplar unum in mixto prosilvio betuleti Zubrze. Viget initio Maji incolitque *Alnos glutinosas*.

Pterophoridae.

1473. Alucita Ochrodaetyla SV; Zell. Linn. VI. 327; HS. V. 367. „Capillis in fasciculum longum frontalem pro-ductis; alis ant. pallide ochraceis, obscurius lituratis, apice la-cinia anterioris elongato.” 11.” Specimina 2 in floridis in exci-sis pineti Romanówka 23. Junii in societate Ericelli etc. (vide 1355).

1474. a. Alucita Stigmodactyla Zell. Linn. VI. 374; HS. V. 375. „Alis ant. luteo-griseis dorso gilvescente, ciliis costalibus laciniae anterioris externe albis, punctis 2 oblique positis nigris ad fissuram; ciliis digitii tertii breviuseulis.“ 9.” Exemplar unum Majo (vide 1375) in graminosis silvaticorum inter L. et Wi.

1475. Alucita Mictodaetyla SV. Zell. Linn. VI. 258; HS. V. 376. „Alis ant. fuscescenti-cinereis, antice obscurioribus, ciliis costalibus fuscis, striola media, macula diffluente ad fissuram lituraque laciniae anterioris longit. nigro-fuscis; digitii tertii ciliis breviuseulis.“ 9.” Exemplar unum in pratulo sub querecto P. R. 5. Junii (sociis 1443 etc).

1476. Alucita Lienigiana Zell. Linn. VI. 380; HS. V. 379. „Collari epistomioque brunneis; alis ant. gilvescenti-albidis, strigula obliqua ad fissuram, striola punctoque majore in ciliis costalibus laciniae anterioris punctisque in laciniarum apicibus fusco-nigris distinctis.“ 9½.” Obvenit satis frequenter Junio et Julio circa R. g. et L. Jneola locorum herbosorum.

1474. b. *) Alucita Baliodactyla FR. Zell. Linn. VI. 393. HS. V. 384. „Capite praeter lineam transversam albidam brunnecente; abdomine exalbido luteo-trilineato; alis ant. exalbidis, costae striola in laciniae anterioris origine nigra ciliorumque litura longit. fusca, ciliis dorsalibus apicem versus iufuscatis.“ 12.” Exemplar unum in declivibus collinorum Prochnik 29. Junii simul cum Theela W. albo etc. Hospitatetur in herbosis inter mixta fruticeta.

Finito demum labore hoc opusculum, qualecumque ad finem adductum est, in manus Tuas, Candide Lector, jam trado, rogans, ut Tibi persuasum habeas, me in illo elaborando tantum dilectissimae mihi scientiae incrementum spectavisse, non vero lucri studio ductum fuisse, quum per 10 annos omnes impensas in excursiones aliaque ex propriis fecerim.



*) In dinumerandis speciebus, in Postscriptum introductis, invitus numeros 1453, 1465, 1468, 1469 omisi, numerum 1378 bis repetivi. Ne igitur falsam lepidopterorum Haliciensium dem summam generalem, Baliodactylam repetito numero 1474 designavi.

Postscriptum.

Mille trecenta quinquaginta duo lepidoptera, quae in praeposita Enumeratione laudavi, annis 1850. ad 1859. collegi. Anno vero 1860. excurrens in varias regiones, quas usquedum non aut festinanter perscrutabar, multa cepi lepidoptera, quae me ad hunc demum annum latuerunt. Haec jam lepidoptera in separato afferro appendice, et quidem properea, quod eadem in Enumeratione, quam initio anni 1860. typis edendam tradideram, collocare non potui.

Papiliones.

1353. Hypermnestra Apollo L. HS. I. 145; OT. I. 133. „Alis albis, ant. maculis 5 nigris, post. ocellis 2 rubris maculaque anali nigra rubrave nigro-ciaeta.“ 36—40.” Specimina 3 sub finem Julii in humilioribus montibus circa Jasienow prope Žabie. Volabat pluribus exemplaribus inter fructecta frondosa per aprica declivia lapidosa. In convalle inter Kutty et Žabie (Heia), per quam flumen Czeremosz labitur, inveni variis locis sub finem Julii simul cum Apolline sequentes species: 2, 4, 6, 49, 60, 71, 73, 74, 75, 76, 394, 417, 454, 559, 663, 691, 798, 802, 803, 976, 999, 1055, 1116, 2022, 1397, 1408, 1427, 1436, 1441, 1442 (ceterum vide 1390).

1354. Colias Myrmidone Esp. HS. I. 105; OT. I. 177. „Alis saturate aurantiacis, limbo maris tenuiori fusco nullis venis flavis.“ 21—23.” Paulo minor Edusa. Specimina plura in vervactis intrasylvaticis prope Hołosko et in pratulis subsylvaticis circa Janow. Volat sub fine Maji et ineunte Junio. Verisimile est, hunc papilionem in nostratis esse frequentem; quum tamen si volat pro Edusa, ejus est consimilis, haberi potest, mirum non est eum me animadvententem adhuc usque fugisse.

1355. Polyommatus Helle SV. HS. I. 130; OT. I. 68. „Alis fuscis seriatu nigro-maculatis, maris coeruleo nitidis,

anter. feminae disco fulvo; subtus numerose seriato-ocellatis, ant. fulvis, post. fuscogriseis fascia limbali rubra." 10—11." Unum par pulchrum inter mixta fruticeta collinorum Próchnik 23. Junii (sociis 7, 120, 414, 549, 704, 716. 801, 819, 960, 977, 1077, 1078, 1080, 1096, 1151, 1298, 1405, 1406, 1408, 1440, 1444, 1445, 1473; vide etiam species 1361, 1443, porro 1309 et 997).

1356. Lycaena Sebrus B. HS. I. 116; OT. X. 1.

65. „Femina: alis supra fuscis, squamis laete argenteo-coeruleis (praecipue basim versus densius) conspersis; subtus albido-cineris basi cyaneo-viridi, lunula media serieque (limbo subparalella) punctorum nigrorum albo-cinctorum." 11." Lycaenam hanc minori Also (8—9½") consimilem, quae testante Dr. Schäfferio in Gallia meridionali, Sardinia Asiaque minori volat, in Halicie in campestri-collina ditione Janow detexi, quum ibidem comite Amicissimo mihi Zimmermann 29. Junii calcareo-arenosa collina Próchnik perscrutabar. Ambae feminae, quas hoc die cepi, quietae tempore vespertino in plantarum floribus sedebant. Alia lepidoptera simul cum Sebro in his regionibus captata Theclae W-albo adjeci.

1357. Erebia Pyrrha SV. HS. I. 64; OT. I. 267.

„Alis fuscis, fascia rufa utrimque conspicua, dorsum versus attenuata, anteriorum ad costam nigro-bipunctata, post. innotata, infra maculari, subtus continua." 18." Volabat gregatim per florida pratala silvatica in superioribus regionibus immensarum Abietis excelsae silvarum in montosis Kostrzyca 8. Augusti (similis cum Herciniana, Janira, Caesiata, alliacea Fasciaria (Prasinaria, cuius in pinetis circa Janow solum carnea reperiuntur exemplaria). In regione Mughi alpinisque cacuminibus contermini tractus montosi Czornahora aliquot tantum conspici exemplaria volitantia (vide 1390).

1358. Satyrus Alejone SV. HS. I. 73; OT. I. 176.

„Alis fuscis, fascia exalbida subfuscata, ant. ocellis 2, post. nullis; subtus basi al. post. fuscocroceo submarmorata, postice in cellula media in magnum sinum protracta, fascia lactea irrorata ocello unico." 26." Exemplaria 4 prope L. inter fruticosa aprica in summo monticulo Cz. sk. Volat Julio evdemque tempore cum speciebus, quas Penthinae Roboranae (1412) addidi.

1359. Satyrus Brizeis L. HS. I. 74; OT. I. 170.

„Alis fuscis viridi submicantibus, anter. costa albida, fascia ma-

culari alba biocellata, poster. fascia lata alba; subtus fascia al.
post. obsoleta irrorata in medio basim versus effusa.“ 30.” Unum
marem medio Augusto in fraticosis ad flumen Czeremosz in pago
Biłoberezka prope Żabie (vide 1353).

1360. Epinephele Eudora F. (Lycaon Hufgl.). HS. I. 82; OT. I. 223. „Alis fuscis viridi submicantibus, anter. puncto
maris unico, feminae oculis 2 magnis coecis fulvo-cinctis, subtus
disco fulvo, ocello maris unico, feminae 2; poster. utrimque
inocellatis, subtus fuscescenti-griseis fascia subconcolore obsole-
tissima.“ 19—20.” Minor Janira, cui par esse videtur. Speci-
mina plura Julio inter graminosa virguleta juxta margines silva-
ticorum inter L. et W. In his novellis plerumque fagineis silvis
degunt inter multa alia lepidoptera rariora etiam Aceris, Egeria,
Laodice (quem Dn. Zimmermann hoc anno a fine Julii usque ad
finem Aug. 25 cepit spec.), Matronula, Oenotherae, Margaritaria etc.

1361. Thecla W-album Knoch. HS. I. 136; OT. I. 109. „Alis infra furvis, subtus fuscescenti-griseis, post. fascia
rubra limbali, linea media alba fracta literamque W mentiente.“
11.” Illici consimilis. Exemplar unum inter fruticeta frondosa in
collinis Próchnik 29. Junii (sociis 33 38, 304, 408, 438, 444,
447, 464, 481, 494, 658, 665, 667, 694, 704, 708, 714, 737,
765, 770, 793, 801, 812, 818, 819, 820, 822, 828, 831,
892, 950, 960, 968, 969, 974, 996, 998, 1001, 1004, 1078, 1079,
1080, 1089, 1120, 1142, 1161, 1182, 1207, 1219, 1335, 1356,
1371, 1395, 1404, 1405, 1406, 1414, 1420, 1449, 1450, 1452, 1477).

Sphinges et Bombyces.

1362. Sesia Sphegiformis SV. (Sphegiformis H.);
HS. II. 74; OT. II. 134. „Abdominis segmento secundo infra,
quarto subtus citrino-marginatis.“ 13.” Exemplar unum 30. Junii
in floridis ad marginem betuleti Zubrze (vide 1435).

1363. Sesia Stomoxoxyformis Schrk. (Culiciformis
Scop.) HS. II. 80; OT. II. 157. “ Capite cum palpis nigris, pectore
utrinque macula magna abdominisque segmento quarto miniaceis, tar-
sis fuscis.“ 10½.” Sesiae Culiciformi L. consimilis, quae tamen
palpis subtus miniaceis tarsisque exalbidis est insignita. Exemplar
unum in Leopoliensis horti botanici floridis sub finem Junii (vide 1435).

1364. Sesia Myopaeformis Brkh. HS. II. 80. Muttiaeformis Lasp. OT. II. 162. „Mas: palpis infra nigris, subtus candidis, pectore macula utrimque magna abdominisque cingulo fulvis, hoc subtus albido versus anum effuso; barba anali subtus albida; alarum anter. marginibus cum macula subtus saturate minaceis.“ 9.” Sesiae Culiciformi L. similima. Unum marem 6. Junii Leopoli in floralium septo (vide 1435)

1365. Naelia Ancilla L. HS. II. 50; OT. III. 157. „Alis ant. cinnamomeis, pustulis 3—4 posticis albis subhyalinis, poster. maris anterioribus concoloribus innotatis, feminae flavis, limbo cum cellula media late fuscis; abdomine ochraceo juxta dorsum serie punctorum nigrorum.“ 11—12.” Specimina duo 19. Julii in fruticetis querceti prope oppidum Halicz (vide 1378).

1366. Lithosia Muscerda H. HS. II. 160; OT. III. 143. „Alis albido-cinereis, anter. puncto duplice paulo supra dorsum medium punctisque 3 posticis (supremo costali) oblique transverse positis.“ Vix 14.” Exemplar unum paulo decoloratum inter fructecta, marginem betuleti Lwowie vestientia, 21. Augusti (sociis 14, 25, 59, 452, 455, 462, 570, 602, 789, 919, 962, 1108, ceterum vide 1383).

1367. Harpyia Bisida H. HS. II. 118; OT. III. 29. „Alis albido-cinereis, basi limboque nigro-punctatis, fascia transversa intus linea recta, extus areu nigerrimo terminata, linea transversa postica sesquitertia.“ 19.” Differt ab minore Furcula (16”) fascia extus margine flexuoso terminata et linea postica transversa triplici. Specimina tria (2 mares, 1 fem.) medio Majo Leopoli in hortorum septis. Pulchras hujus speciei erucas invenit D. Zimmermann satis frequentes Septembri circa Leopolim in Populis et Salicibus.

1368. Notodonta Tritophus SV. HS. II. 124; OT. III. 46. „Femina: „Alis ant. nigro-fuscis, macula media sublunari ferruginea albido cineta, striga intralimbali subferruginea pallidius late marginata; post. albescentibus, angulo anali angusto nigro.“ 26.” Sub finem Junii terminam uoram Leopoli in horti septo (sociis Stomoxiformi etc.).

Index specierum.

1

- Abiecta 321. Abietaria 528. Abietella 996. Abildgardana 906. Abrotani 388. Acanthodoctyla 1333. Aceriana 740. Aceris 50, 245. Achata 903. Achatinella 987. Achilleae 133. Acis 27. Acuminalis 690. Acuminatana 866. Adippe 69. Adjunctana 762. Adonis 37. Adornatella 1001. Adustata 485. Advena 287. Advenaria 510. Advenella 990. Aegon 38. Aenea 410. Aenealis 666. Aeratella 1300. Aeruginaria 446. Aeruginosa 307. Aescularia 520. Aesculi 144. Aestivaria 443. Affinitaria 612. Aglaja 67. Ahenella 991. Alacella 1160. Albella 1302. Albiceps 1126. Albicillata 609. Albicipitella 1126. Albifrontella 1276. Albifuscella 1231. Albimacularia 635. Albicornella 1305. Albicostella 1223. Albidella 1239. Albiocellaria 477. Albipuneta 337. Albipunctella 1115. Albulalis 713. Albulata 619. Alburnella 1129. Alcedinella 1210. Alchemillata 614. Alchymista 414. Aleiphron 23. Aleon 42. Alcyonipennella 1211. Aleella 1125. Alexis 35. Alienella 1011. Allionella 1042. Alni 247. Atniaria 497. Alpestralis 711. Alpinalis 664. Alpinana 889. Alsines 343. Alsus 40. Alternalis 702. Alternata 514. Alticolana 821. A ticoletta 1220. Alveolus 102. Alveus 101. Amataria 480. Ambigualis 968. Ambiguana 937, 929, 940. Ambiguella 935. Ameriana 747. Amiantana 784. Ammanella 1042. Amoenana 736. Ampliatella 1258. Amyntas 26. Amyotella 1325. Anachoreta 230. Anastomosis 232. Anatipennella 1238. Anderschella 1043. Angelicae 135. Anguinalis 716. Angularia 496. Angulata 561. Angustalis 657. Angustana 930. Angustipennella 1265. Anserinella 1267. Antennella 1066. Anthracinella 1059. Anthracinellus 1059. Anthyllidella 1162. Antiopa 75. Antiqua 184. Apiciaria 508. Apicistrigella 1133. Apiformis 109. Appendicularia 574. Applanella 1116. Aprilina 308. Aquilaria 635. Aquilellus 963. Arachne 82. Arbuti 398. Arcania 96. Arcas 34. Arcella 1014. Arctata 635. Arcuana 816. Arenacearia 552. Arenella 1118. Argentea 387. Argentella 1208. Argentipedella 1304. Argentula 405. Argestes 36. Argillaecaria 654. Argiolus 41. Argus 32. Argusaria 476. Argyrella 998. Aridellus 960. Arion 43. Armatella 1090. Armigera 401. Artemis 53.

II

Artemisiae 387, 388. Artemisiella 1146. Aruncella 1041. Asellus 153. Asiliformis 110. Asperana 916. Asperella 1064. Aspidiscana 871. Assimilella 1120. Asteris 383. Atalanta 78. Athalia 52. Atomaria 544. Atomella 1008. Atralis 720. Atratula 408. Atriplicis 329. Atropos 126. Augur 259. Augustana 869. Augustipennella 1265. Aulica 205. Aurantiaria 516. Aurelia 58. Aureola 189. Aureolaria 447. Auriflua 178. Auroralis 452. Auroraria 452. Austerata 652. Avellanella 1010. Aversata 461.

B.

Badiana 896. Badiata 629. Baja 263. Bajularia 441. Balteolella 1193. Bankiana 405. Barbalis 431. Basilinea 315. Batis 234. Battus 30. Baumaniana 782. Begrandaria 646. Bella 266. Berberata 629. Bergmanniana 770. Bergstraesserella 1189. Besseri 746. Betulae 14. Betularia 526. Betulella 1171. Betulifolia 156. Betulinella 1106. Bicolora 222. Bicolorata 588. Bicolorella 1125. Bidentata 502. Bifasciana 810. Bilineata 625. Bimaculata 487. Bimaculella 1049. Binaria 160. Binderella 1227. Bipuncta 237. Bipunctana 807. Bipunctaria 562. Birivia 281. Biselliella 1023. Bisetata 455. Bisulella 1269. Blandella 1128. Blandiata 617. Blepharana 882. Bombycella 147. Bombyliformis 115. Boreata 577. Boscana 913. Brahydactylus 1344. Brassicæ 4, 293. Brizae 131. Brogniardellum 1255. Brumata 576. Brunnea 267. Brunnearia 594. Brunneata 548. Brunneichiana 843. Bucephala 227. Bucephaloïdes 228. Buoliona 793. Bupleuraria 444. Byssinata 453.

C.

Caecimacula 305. Caersiella 1037. Caesista 604. Caesiella 1038, 1197. Caja 202. Calabra 482. Calabria 482. C-album 78 ½. Caliginosella 1162. Calthella 1040. Calvaria 425 ½. Calvella 149. Camelina 224. Campoliana 875. Canapennella 1283. Candidata 622. Candidula 407. Canifoliella 1282. Capitella 1028. Capreana 728. Capsincola 302. Cararia 490. Carbonaria 425. Carbonariella 1002. Cardamines 9. Carduana 939. Cardui 73. Cariosella 1187. Carnella 999. Carpini 161. Casciata 569. Cassinia 379. Castigata 636. Caudana 919. Caudulatella 1261. Cautella 1155. Cavella 1321. Centaureata 644. Cerago 566. Ceramanthæ 381. Cerasana 764. Cerasiella 1037. Certata 579. Cerusana 913. Cernellus 951. Cervinata 579. Cespitalis 708. Cespitanæ 801. Cespitellus 950. Cespitiella 1220. Chaerophyllata 565. Chamomilla 384. Chaonia 219. Charpentierana 808. Chenopodiata 631. Chenopodiella 1093. Chenopodii 299. Chiron 33. Chloros 137. Choragellus 1060. Chrysanthemana 818. Chryseis 21. Chrysitella 1188. Chrysitis 396. Chrysonuchellus 953. Chrysorrhœa 177. Ciconiella 1237. Cicutella 1116. Cidarella 1314. Cinctalis 679. Cinetana 787. Cinetaria 527. Cinctella 1270, 1165. Cineraria 538. Cinerea 279. Cinerella 1166. Cingulalis 715. Cinnamomea 1098. Cinnamomeana 765. Cinnamomella 993. Cinxia 55. Circe 24. Circellaris 362. Circumflexa 395. Cirsiana 842. Clathrata 550. Clavis 275. Clema-

tella 1014. Clerckella 1301. Clorana 724. *C. nigrum* 264. Clytie 46. Coenobitella 1086. Coenulentellus 1083. Coeruleophala 242. Cognatellus 1109. Colonella 976. Comitana 790. Comua 106. Comunana 820. Comparana 911. Comparella 1323. Complana 190. Complanella 1327. Compsona 891. Compositella 989. Comptella 1035. Compunetella 1034. Comta 300. Conchana 800. Conformella 1049. Conformis 374. Congeneraria 524. Coniferana 892. Conjugella 1199. Connexa 323. Consanguinellus 1080. Conscriptella 1181. Consimilana 754. Consociella 985. Consonaria 534. Consortaria 531. Conspersa 301. Conspicillaris 377. Conspicuella 1233. Contaminana 918. Contiguella 995. Convolvuli 123. Coracipennella 1217. Coriacella 1168. Cornella 1204. Coronilella 1161. Corticana 856. Corticea 280. Corydon 38. Corylana 768. Corylata 628. Coryli 243. Costana 761. Costella 1070. Crabroniformis 109. Cramerella 1324. Crassalis 432. Crataegana 750. Crataegata 506. Crataegella 139, 970, 1039. Crataegi 7, 172. Crenata 220. Crepuscularia 533. Crepusculella 1308. Cretaceana 745. Cribrella 988. Cribrum 988. Crinella 1023. Cristana 905. Cristatella 1310. Cruciana 869. Cruciferarum 1062. Cruda 347. Cruentana 930. Cubicularis 241. Cucubali 303. Cucullata 608. Cucullatella 714. Cucullina 225. Culiciformis 112. Culmellus 961. Cultrella 1073. Cuphana 826. Currucipennella 1241. Curtisella 1086. Curtula 231. Curvatula 157. Curvelia 1204. Cuspidana 899. Cuspis 254. Cygnella 1296. Cygnipennella 1296. Cyllarus 35. Cynosbana 735. Cytisana 887. Cytisaria 438. Cytisella 1130.

D.

Dadlorfiana 860. Daphne 65. Daphnis 39. Daplidice 6. Davus 98. Dealbana 739. Dealbata 557. Deauratella 1210. Decemguttella 1114. Deceptoria 408. Decimana 780. Decolorata 620. Decorana 874. Decussata 566. Deflexana 885. Defoliaria 517. Degeerella 1052. Dejanira 91. Delitana 839. Demariana 838. Dentalis 658. Dentaria 502. Dentina 298. Denudatella 1202. Depressa 192. Derasa 233. Derasana 895. Derivalis 430. Dia 61. Dictaea 216. Dictynna 51. Didyma 57, 319. Diffusana 890. Dilectaria 489. Dilucidaria 541. Diluta 239. Dilutaria 459. Dilutata 603. Dilutella 993. Diluticoslella 1229. Dimidiana 732. Dimidiata 473. Dimidiella 1180. Diomedes 42. Dipsacea 399. Dipsaceana 933. Disertella 1268. Dispar 179. Dissimilana 837. Dissolutana 939. Dissonella 1179. Distinctella 1110. Ditrapezium 265. Diversana 755. Divisella 1288. Dodecella 1142. Dolabaria 504. Dominula 199. Dorilis 24. Dorsana 884. Dorylas 36. Dromedarius 218. Druryella 1262. Dubitana 928. Dubitata 580. Dubitelus 972. Dumetana 752. Dumetellus 946. Duplaris 237. Dzieduszyckii 1195.

E.

Eborina 188. Echiella 1112. Echii 304, 1297. Edusa 11. Egeria 90. Electa 420. Elocata 416. Elongella 1250. Elpenor 119. Elutella 978. Emargana 920. Emarginata 462. Emortualis 427. Ephippella 1198. Epi-

linana 932. Equitella 1191. Erebos 34. Ericellus 949. Ericetana 904. Ericetata 618. Ericinella 1174. Erminea 213. Erosaria 498. Erutana 907. Erxlebeniella 1188. Esperella 1088. Eumedon 33. Euphorbiae 251. Euphorbiata 564. Euphrosyne 60. Euryale 84. Eurydice 21. Evonymellus 1108. Exanthemata 492. Exclamationis 269. Exiguata 637. Exoleta 376. Extersaria 535.

F.

Fabriciana 702. Fagella 1007. Fagetella 1201. Fagi 215. Faleatoria 156. Falconipennella 1249. Faleula 156. Fallacella 1090. Falsellus 954. Farinalis 696. Farinata 568. Fascellina 182. Fasciaria 494. Fasicellus 1076. Fastuosella 1044. Favillaceana 908. Favillacearia 553. Fenestrina 108. Ferrugalis 675. Ferrugana 912. Ferrugata 599. Ferrugella 1168. Ferruginea 362. Ferruginella 1033. Festaliella 1294. Festivella 1291. Festucae 393. Fibulella 1048. Filipendulae 132. Fimbria 258. Fimbrialis 698. Fimbriata 443. Finimitella 1256. Fischerana 926, 943. Fischeri 1332. Fissana 890. Fissella 1069. Flagellana 924. Flammatra 282. Flammealis 699. Flamella 1169. Flavalis 680. Flavicaria 511. Flavicornis 240. Flaviella 1225. Flavitrontella 1105. Flavilaticella 1142. Flayimitrella 1026. Flexula 424. Flexulana 904. Fluctigerana 898. Fluetnata 596. Fluetuosa 238. Fluidana 834. Foeneana 849. Forficalis 688. Forficellus 945. Formosella 1104. Forskaeleana 771. Franckella 1248. Frangulella 1313. Fraudatricula 255. Fraxini 415. Freyeriana 876. Freyeriella 1277. Fribolus 321. Fritillella 1322. Fritillum 101. Fröhlichiella 1319. Frumentalis 661. Frutetana 853. Fuciformis 114. Fugacella 1141. Fugitivella 1140. Fuligana 846. Fuliginaria 425. Fuliginosa 211. Fulvago 366. Fulvalis 676. Fulvata 366, 586. Fulvifrontana 861. Fulviguttella 1099. Fumosa 272. Fundella 1203, 1205. Funebrana 865. Funerella 1113. Fureifera 374. Furcula 214. Furvata 539. Fusca 1338. Fuscalis 677. Fuscata 564. Fuscedinella 1214. Fuscepunctella 1020. Fuscoapicellus 1083. Fuscula 409. Füsslinellus 1059.

G.

Galathea 79. Galiata 607. Galii 121. Gallinella 1153. Gallipennella 1219, 1232. Gamma 397. Gangabella 1271. Ganomella 1022. Gelatella 1005. Gemina 318. Geminatella 1281. Gemmella 1288. Gemmiferana 868. Genistae 297. Gentianana 733. Germarana 866. Gerningana 753. Gerrenella 1170. Gibbosella 1124. Gigantellus 944. Gilvago 367. Gilvaria 554. Glabrarria 532. Glarearia 549. Glaucinalis 697. Globulariae 137. Glyphica 413. Gnaphaliella 1311. Gnaphalii 1246. Gnomana 761. Goanthe 81. Goedartella 1206. Gonodactyla 1330. Gothicā 346. Gouana 789. Graminella 146. Grammica 195. Granella 1017. Granulatella 1226. Graphana 840. Graphodactyla 1337. Griseata 567. Grossulariata 483. Grotiana 758. Gruneriana 862. Gundiana 891. Guttiferella 1260. Gysseleniella 1207.

H.

Halterata 572. *Hamana* 778. *Hamula* 160. *Harpana* 901. *Harpella* 1068. *Hartmanniana* 726. *Hebe* 204. *Hecate* 63. *Hectus* 143. *Heleniella* 1186. *Heliaca* 398. *Helveola* 191. *Heparana* 766. *Heparata* 623. *Hepatica* 317. *Hepaticana* 835. *Hera* 200. *Heracliella* 1117. *Herbida* 276. *Hermanella* 1178. *Hero* 94. *Hexapterata* 572. *Hiemana* 829. *Hiera* 88. *Hieracii* 1335. *Hilaripennella* 1248. *Hippocastani* 1312. *Hipponoe* 23. *Hipothoe* 22. *Hirsutella* 149. *Hirtarius* 524. *Hispidarius* 522. *Hohenwartiana* 870. *Holmiana* 769. *Holosericealis* 710. *Holosericeata* 458. *Hordidella* 1065. *Hortuellus* 950. *Hospita* 198. *Hospitata* 638. *Hutnagelii* 1074. *Humeralis* 1143. *Humerellus* 1079. *Humidana* 934. *Humuli* 139. *Hyale* 12. *Hyaloalis* 681. *Hybridalis* 686. *Hybridella* 939. *Hyemana* 829. *Hylas* 29. *Hyperanthus* 93. *Hyperieana* 873. *Hyperiei* 326.

I.

Iacobaeae 196. *Ianira* 92. *Ianthinella* 997. *Icarus* 35. *Ictella* 1299. *Ilia* 46. *Illeis* 16. *Iligerella* 1283. *Illunaria* 499. *Illustraria* 501. *Imbecilla* 339. *Imella* 1031. *Immorata* 463. *Immundana* 852. *Immundata* 654. *Immutata* 465. *Imperialella* 1253. *Impurella* 1121. *Incanata* 454. *Incarnatana* 736. *Incerta* 349. *Incertana* 817. *Incretella* 1143. *Infesta* 314. *Ingratella* 974. *Innotata* 642. *Ino* 64. *Inquinatellus* 962. *Instabilis* 349. *Interjectaria* 459. *Interpunctalis* 659. *Interruptana* 886. *Inunctella* 1094. *Inundana* 832. *Io* 74. *Iota* 394. *Iphis* 95. *Iris* 45. *Irregularis* 304. *Irrorella* 188½. *Isabella* 1172. *Iteophagella* 1318. *Juniperata* 589.

K.

Kiningerella 1159. *Kneri* 1137. *Kollariella* 1254. *Kroesmaniella* 1131.

L.

Laccata 410. *Lacertella* 1252. *Lacertinaria* 155. *Lacertula* 155. *Lactearia* 446. *Lacteella* 1106. *Lactueae* 386. *Lacunana* 803. *Lacunicolella* 1221. *Laevigana* 751. *Laevis* 365. *L-album* 336. *Laminella* 1092. *Lancealis* 669. *Lanceata* 638. *Lanceolana* 902. *Lanestris* 173. *Lao-die* 70. *Laquearia* 653. *Laricella* 1216. *Laterella* 1117. *Lateritia* 322. *Latonia* 66. *Lecheana* 773. *Lediana* 731. *Lemnalis* 692. *Lepidella* 1127. *Leporina* 244. *Leucacrinella* 986. *Lenatella* 1182. *Leucocerella* 1049. *Leucographa* 354. *Leucophaea* 286. *Leucophaearia* 519. *Leuwenhoeckella* 1096. *Levana* 72. *Libatrix* 372. *Lienigiana* 731. *Ligea* 84. *Ligniperda* 145. *Ligulella* 1165. *Ligustrata* 598. *Ligustri* 124, 253. *Limosipennella* 1229. *Linariae* 380. *Linariata* 645. *Linea* 103. *Lineata* 122. *Lineola* 104. *Lineolata* 563. *Linneella* 1189, 1292. *Listerella* 1171. *Literalis* 691. *Lithospermella* 1111. *Lithoxylea* 313. *Liturata* 515. *Lividella* 1215. *Li-*

vornica 122. Lixella 1235. Łobarzewskii 813. Lobella 1185. Lobulata 575. Locupletella 1235. Loderana 883. Loefflingiana 772. Lonicerae 134. Lota 361. Lotella 977. Lubricipedida 206. Lucilla 49. Lucina 44. Lucipara 330. Luctualis 717. Luctuata 611. Luctuosa 403. Luctuosana 845. Luctuosella 1215. Luculella 1132. Lunaria 500. Lunula 380. Lupulinus 142. Lusciniaepennella 1228. Lusoria 422. Lutearia 556. Luteata 621. Luteellus 965. Lutipennella 1224. Luzella 1025.

M.

Machan 2. Macularia 512. Maera 87. Magnificella 1280. Malvorum 99. Manniana 938. Manniella 1158. Margaritalis 667. Margaritaria 495. Margaritellus 959. Marginata 402, 486. Maritella 1196. Masculella 1029. Matronula 201. Matura 54. Maurana 786. Maurella 1095. Mayrella 1209. Medea 83. Mediella 1060. Medusa 80. Megacephala 246. Megaera 89. Melanella 992. 1030. Meleagripennella 1257. Mellonella 975. Mendica 210. Mendicella 1197. Mensuraria 560. Menthastris 208. Mercurella 969. Mesomella 188. Meticulosa 331. Metzneriana 872. Mi 412. Maria 593. Micella 1177. Millefolii 1240. Miniata 187. Minimellus 1058. Ministrana 777. Minorana 822. Minorata 618. Minorella 1098. Minusculana 822. Minutana 878. Minutella 1097. Miscella 1290. Misella 1018. Mitterpacheriana 894, 877. Mnemosyne 3. Modestella 1295. Moeniaria 561. Monacha 180. Monachella 1032. Moneta 392. Moniliata 451. Montanata 597. Motacillana 887. Munda 350. Muricata 452. Murinella 1145. Murinipennella 1244. Muscosella 1156. Musculana 831. Mussehliana 936. Mutata 466. Müllerella 1325. Mygindana 799. Mytilellus 956.

N.

Naeviferella 1176. Naevulella 1175. Nanata 643. Napi 5. Nebritana 864. Nebulalis 665. Nebulana 922. Nebulata 605. Nebulea 1154. Nebulella 980. Nebulosa 289. Nemoralis 700, 1331. Nemoraria 418. Neuropterella 1184. Neustria 170. Nictitans 333. Nigrella 1277. Nigricana 791. Nigricans 321, 272. Nigropunctata 471. Nimbella 981. Niobe 68. Nitidella 1196. 150. Niveata 568. Niveicostella 1222. Normalis 709. Notata 513. Notha 437. Nubeculosa 378. Nubilana 830. Nubilosana 941. Nupta 417. Nymphaealis 694.

O.

Oblitella 979. Obliterata 623. Obrutaria 655. Obscenella 1226. Obscurata 540. Obscurus 1336. Obsoleta 335. Obsoletella 1148. Occulta 284. Ocellana 738. Ocellata 587, 128. Ochrealis 971. Ochreana 759. Ochreata 449. Ochroleuca 311. Ochsenheimerella 1053. Octogesima 235. Octomaculalis 718. Ocularis 235. Oculatella 1190. Oculea 319. Oehlmanniella 1027. Oenotherae 117. Oleracea 296. Olivalis 662. Olivata 592. Omieronaria 475. Onosmella 1236. Operaria 542. Ophtalmicana 855.

Opima 351. *Oppressana* 858. *Or* 236. *Orana* 756. *Orbitella* 1218. *Oriolella* 1225. *Orion* 256. *Ornata* 472. *Ornatella* 1000. *Ornatipennella* 1234. *Osseata* 457. *Osteodactyla* 1343. *Ostrinalis* 706. *Oxyacanthae* 309. *Oxyacanthella* 1036.

P.

Padellus 1110. *Palealis* 687. *Pallipennella* 1239. *Pallens* 334. *Palliatella* 1239. *Pallidalis* 678. *Pallidana* 929. *Pallidata* 453. *Pallidella* 1315. *Palliolalis* 714. *Palpina* 226. *Paludata* 472. *Palumbaria* 559. *Palumbella* 1003. *Pamphylus* 97. *Pandalis* 683. *Pandora* 62. *Paniscus* 107. *Paphia* 71. *Papilonaria* 439. *Parallelaria* 509. *Paronympha* 421. *Parasitella* 1019. *Parenthesellus* 1078. *Parialis* 701. *Pariana* 701. *Paripennella* 1213. *Parisiana* 917. *Parmatana* 851. *Parthenias* 436. *Parthenie* 58. *Parvulella* 1273. *Pascuellus* 948. *Pasivana* 824. *Paucipunctella* 1183. *Paula* 404. *Peetinitaria* 593. *Pedella* 1265. *Pellionella* 1021. *Pendularia* 474. *Penkleriana* 877, 894. *Pennaria* 503. *Pentadaetyla* 1350. *Perdicella* 1192. *Perlellus* 966. *Permixtana* 943. *Perochrearia* 448. *Persicariae* 294. *Perspicillaris* 327. *Petiverana* 888. *Petrana* 874. *Petraria* 551. *Petrificata* 373. *Petrorhiza* 325. *Phaedra* 86. *Phegea* 130. *Phlaeas* 25. *Phoebe* 56. *Phryganella* 1006. *Picata* 607. *Piceana* 738. *Pictella* 1144. *Pietruskii* 833. *Pilella* 1047. *Pilleriana* 757. *Pilosaria* 521. *Pilosellae* 1334. *Pilulella* 1046. *Pimpinellae* 1123. *Pimpinellata* 640. *Pinastri* 125, 324. *Pinetaria* 548. *Pinguinalis* 656. *Pinguinella* 1154. *Pinetellus* 958. *Pini* 167. *Piniariella* 1208. *Piniarius* 545. *Pinicolella* 1264. *Piniperda* 353. *Pisi* 292. *Pistacina* 364. *Pisticella* 1134. *Plagiata* 570. *Plantaginis* 198. *Plecta* 278. *Plumaria* 546. *Plumbagana* 867. *Plumbana* 772. *Plumbaria* 559. *Plumbatana* 881. *Plumbellus* 1107. *Plumigera* 221. *Podalirius* 1. *Podevinella* 1041. *Politalis* 673. *Pollinalis* 719. *Pollinariella* 1266. *Polychloros* 77. *Polyodon* 312. *Polysperchon* 26. *Pomonana* 814. *Pomonarius* 523. *Ponticella* 1284. *Popularis* 285. *Populata* 584. *Populella* 1171. *Populeti* 348. *Populetorum* 1251. *Populi* 47, 129, 171. *Populifolia* 165. *Populifoliella* 1322. *Porata* 477. *Porcellus* 118. *Porrectella* 1063. *Porrinata* 442. *Posterana* 940. *Postremana* 940. *Potamogalis* 695. *Potatoria* 169. *Praecox* 277. *Praeformata* 569. *Praelatella* 1025. *Prasinana* 721. *Pratana* 788. *Prataria* 471. *Pratellus* 947. *Pratorum* 947. *Prenanthis* 581. *Proboscidalis* 434. *Proboscidella* 1085. *Procellata* 610. *Procerella* 1103. *Prodromaria* 525. *Profundana* 857. *Progemmaaria* 518. *Promissa* 419. *Pronoë* 82. *Pronuba* 261. *Propinquella* 1119. *Propugnata* 602. *Prorsa* 72. *Protea* 306. *Proximella* 1136. *Pruinata* 438. *Prunalis* 659. *Prunaria* 505. *Pru-nata* 583. *Pruni* 15, 168, 138. *Pruniana* 730. *Pruniella* 1196, 1198. *Pseudobombycella* 1012. *Psi* 250. *Psittacata* 590. *Pteridis* 328. *Pterodactyla* 1339. *Pudendana* 794. *Pudibunda* 183. *Pulla* 148. *Pullella* 1272. *Pullicomella* 1274. *Pulmonaris* 342. *Pulveraria* 493. *Pumilana* 937. *Punetaria* 478, 477. *Punetata* 488. *Punetulata* 536. *Punicealis* 707. *Purpuralis* 706, 705. *Purpuraria* 558. *Purpurea* 207. *Pusaria* 491. *Puschii* 1230. *Pusilla* 650. *Pustulata* 441. *Putataria* 445. *Putripennella* 1289. *Putris* 268.

Pygmaeana 795. *Pyralella* 972. *Pyraliata* 585. *Pyralina* 356. *Pyramidea* 344. *Pyramidellus* 957. *Pyrarga* 409. *Pyrophila* 271.

Q.

Quadrana 825. *Quadrella* 1279. *Quadrifasciaria* 601. *Quadriguttella* 1279. *Quercana* 722. *Quercetulum* 1255. *Quercicolella* 1016. *Quercifoliella* 1317. *Quercus* 18, 175. *Quinquaria* 548.

R.

Rajella 1326. *Ramana* 744. *Rapae* 8. *Ratana* 851. *Ratzeburgiana* 859. *Ravida* 260. *Ravulana* 841. *Reclusa* 229. *Rectangulata* 647. *Remissa* 318. *Remutata* 467. *Remyana* 848. *Repandalis* 661, 678. *Repanda* 529. *Resinana* 792. *Restigerella* 1087. *Reticularis* 691. *Reticulella* 1187. *Retinella* 1205. *Retusa* 360. *Revayana* 725. *Rhamnata* 582. *Rhamni* 13. *Rhamniella* 1286. *Rhenella* 994. *Rhizolitha* 375. *Rhododaetyla* 1328. *Rhombella* 1147. *Ribeana* 767. *Ribesaria* 583. *Ridens* 241. *Rigana* 923. *Riguata* 626. *Rivata* 615. *Rivulata* 616. *Roboraria* 530. *Roberis* 1316. *Roraria* 543. *Rorellus* 952. *Rosea* 187. *Roseomaculana* 742. *Roserana* 935. *Rosetana* 785. *Rostralis* 433. *Rotundana* 796. *Rubellana* 931. *Rubi* 19, 176, 266. *Rubidata* 630. *Rubigana* 783. *Rubiginalis* 674. *Rubiginata* 588. *Rubiginea* 369. *Rubiginosana* 854. *Rubricata* 464. *Rubrieollis* 194. *Rubricosa* 355. *Rubrifasciella* 1043. *Rubrotibiella* 984. *Rufaria* 450. *Ruficornis* 219. *Rufillaria* 460. *Rufimitrana* 811. *Rufina* 363. *Rufularia* 460. *Rumicis* 252. *Rupestrata* 606. *Rupicolalis* 710. *Ruptata* 628. *Ruréa* 316. *Rurestrana* 804. *Russata* 591. *Russula* 197. *Rusticana* 775. *Rusticata* 456. *Rusticella* 1013.

S.

Salaciella 1309. *Salicalis* 428. *Salicana* 727. *Salicis* 186. *Salicella* 1318. *Saltatricella* 1194. *Sambuealis* 671. *Sambuearia* 507. *Samiatella* 1303. *Sanguinalis* 704. *Satellitia* 371. *Satyrata* 639. *Saucia* 270. *Sauciana* 743. *Scabiosellus* 1055. *Scabrina* 915. *Scalella* 1111. *Schaefferella* 1102. *Schalleriana* 910. *Schiffermüllerellus* 1056. *Schmidtella* 1096. *Schrankella* 1293. *Schrankiana* 883. *Schreberella* 1320. *Schreberiana* 850. *Schreibersiana* 942. *Scintilella* 1173. *Scintilulalis* 703. *Scintilulana* 703. *Scripturaria* 624. *Scutosa* 400. *Scutulana* 836. *Scutulata* 473. *Segatum* 275. *Selasellus* 964. *Selene* 59. *Selenitica* 181. *Seliniella* 1089. *Sellana* 734. *Semele* 85. *Semicostellus* 1078. *Separatana* 892. *Sepiaria* 538. *Sequella* 1071. *Serenella* 1219. *Sericinalis* 435. *Serpilletorum* 1004. *Serratella* 1298. *Serata* 574. *Servillana* 941. *Sexalata* 571. *Sexalisata* 571. *Sibylla* 48. *Sicula* 158. *Siculana* 900. *Sieversi* 223. *Sigma* 257. *Signipennella* 1250. *Silacealis* 670. *Silaceaata* 627. *Silaceillus* 971, 1081. *Silenaria* 651. *Silenata* 651. *Silene* 368. *Siliceana* 874. *Silvanus* 105. *Silvata* 595. *Silvella* 1067. *Silvestrata* 469. *Silvinus* 140. *Similana* 834.

Simplana 741. *Similella* 995. *Simulans* 271. *Sinapis* 10. *Sinuata* 608. *Sinuella* 982. *Siterata* 590. *Smeathmanniana* 925. *Socia* 373. *Solutella* 1151. *Sophialis* 660. *Sorbiana* 763. *Sordidana* 851. *Sororeulella* 1157. *Spadicearia* 599½. *Sparsana* 909. *Sparsata* 648. *Sparsella* 1204. *Spartiaria* 543. *Spartifoliella* 1307. *Sphinx* 379. *Spilodactyla* 1345. *Spini* 17. *Spinella* 1200. *Spinula* 154. *Splendens* 295. *Sponsa* 418. *Spretella* 1020. *Squalidana* 847. *Squamosella* 1275. *Stabilis* 352. *Stachydalis* 672. *Statices* 136. *Steinkellnerella* 1009. *Stellatarum* 116. *Stelliferella* 1030. *Stentziellus* 955. *Sticticalis* 663. *Stigmatella* 1247. *Stipella* 1175. *Stromatalis* 668. *Stratarius* 525. *Stratiotalis* 693. *Striana* 798. *Striatellus* 1082. *Strigana* 760. *Strigaria* 470. *Strigilis* 320. *Strigillaria* 555. *Strigosa* 248. *Strigulalis* 712. *Strigulatella* 1326. *Strobilata* 649. *Struthiopennella* 1236. *Sturnipennella* 1287. *Suasa* 291. *Sublimana* 844. *Subornatella* 1004. *Subpunctaria* 468. *Subsequella* 1152. *Subumbrata* 653. *Subtusa* 359. *Succedana* 879. *Sudetica* 973. *Suffumata* 600. *Suffusa* 274. *Suffusana* 737. *Suffusella* 1306. *Sulphuralis* 411. *Sulphurea* 411. *Sulphurella* 1100. *Sulzella* 1051. *Sulzeriella* 1051. *Swammerdammella* 1045. *Syringaria* 501½.

T.

Tabaniformis 110. *Tages* 100. *Taminata* 487. *Tanaceti* 385. *Tapetiella* 1015. *Tarsicinalis* 426. *Tau* 162. *Taumas* 103. *Temerata* 488. *Tenebrata* 398. *Tenebrella* 1163. *Tentaculalis* 429. *Tentacularis* 429. *Tenthrediniformis* 113. *Tenujata* 641. *Tephradactyla* 1340. *Terreana* 828. *Terrella* 1149. *Tersata* 632. *Tesserana* 781. *Testacea* 310. *Testacella* 1285. *Testudo* 152. *Tetradactyla* 1346. *Tetragonella* 1278. *Tetraonipenna* 1250. *Tetrapodella* 1197. *Tetrastictella* 1279. *Textana* 809. *Thalassina* 290. *Therinella* 1242. *Thrassonella* 1191. *Thunbergana* 1185. *Thymiaria* 444. *Tibialata* 566. *Tigrella* 1100. *Tiliae* 127. *Tiliella* 1238. *Tineta* 288. *Tinctaria* 556. *Tinctella* 1101. *Tipuliformis* 111. *Tiresias* 26. *Tombacinella* 1050. *Torquilella* 1259. *Tragopogonis* 345. *Transversata* 582. *Trapezina* 357. *Tremella* 1171. *Tremulae* 47. *Treueriana* 921. *Triangulum* 262. *Tridens* 249. *Trifoliana* 797. *Trifolii* 174. *Trigrammica* 340. *Trilinea* 340. *Trilinearia* 479. *Trinalis* 684. *Triparella* 1135. *Triplasia* 391. *Tripunktana* 735. *Tripunetella* 1164. *Triquetra* 744. *Tristata* 613. *Tristella* 1093. *Tristellus* 963. *Tristigma* 265. *Tritici* 273. *Trochilipennella* 1212. *Troglodytella* 1243. *Truncata* 591. *Tumidella* 983. *Turca* 338. *Turdipennella* 1263. *Turpellia* 1154. *Typea* 332.

U.

Udmanniana 812. *Ulmana* 827. *Ulmata* 484. *Ulminella* 1320. *Umbrä* 402. *Umbrana* 914. *Umbratica* 389. *Umbrosana* 802. *Uncea* 406, 897. *Undulana* 725. *Undulata* 578. *Unguicola* 159. *Unicolor* 146. *Upupaepennella* 1247. *Upupana* 893. *Urticae* 76, 209, 390. *Urticalis* 685. *Urticana* 805. *Ustulana* 863. *Ustulellus* 1075.

**

X

Vaccinella 1122. Vacciniana 880. Vaccinii 370. Vagabundella 1091. Valligera 283. Variata 634. Variegana 729. Variella 1024. Velleda 141. Velocella 1152. Venustana 806. Verbascellus 1077. Verbasei 382. Vernalis 72. Vernana 723. Vernaria 440. Verrucella 1084. Versicolora 163. Verticalis 682. Vespertaria 509, 594. Vestigalis 283. Vetulata 581. Vibicaria 481. Vibratricella 1189. Viburnana 776. Viciae 423. Vicinella 1154. Viduata 537. Vigeliana 796. Villica 203. Vinula 212. Violella 1050. Violellus 1057. Viretata 573. Virgata 563. Virgatella 1245. Virgaurea 20. Virgaureana 823. Viridana 774. Viridata 442. Viridella 1054. V-nigrum 185. Vitalbata 633. Vitella 1072. Vorticella 1164. Vulgata 652. Vulgella 1139.

W.

Wagae 1138. Wahlbomiana 819. Warringtonellus 967. Wawaria 547. Woeberiana 815.

X.

Xanthoceros 241. Xylosteana 749. Xylastella 1061, 1062.

Y.

Ypsilon 358.

Z.

Zachana 868. Zephyrana 927. Zetterstedtii 1329. Ziezac 217. Zieglerella 1262. Zoegana 779. Zonariella 1269. Zonata 560.

Fauna lepidopterologica Samboriensis *).

1, 2, 4—15, 18, 19, 21—28, 32—37, 41—48, 50—54, 57—64,
66—69, 71—87, 89, 91—100, 102—107, 110—112, 116, 118—129,
132, 136, 139, 143—149, 152—166, 172, 176—180, 183—190,
193, 194, 197—200, 202, 203, 206, 208, 209, 211—222, 224—
238, 240—242, 244—250, 252—256, 258, 259, 261, 262, 264,
268—271, 274, 276—278, 280, 281, 287, 294, 296—299, 301—
303, 308, 309, 312, 314—316, 318—322, 327, 329—332, 337—
339, 341, 342, 344, 346, 348, 349, 352, 354—358, 361, 362, 366,
368—375, 378, 379, 381, 383, 384, 386, 387, 389—401, 405—
407, 409—418, 420, 431, 433—435, 438—443, 445, 446, 448—
456, 459—469, 471—478, 480, 483—493, 495, 498, 499, 501—
510, 512—531, 533, 535, 536, 538, 540, 543, 544, 547, 550, 551,
553, 555, 557, 559—561, 564, 565, 567, 569, 570, 572—578,
580—584, 587, 588, 590, 593, 595, 603, 607—614, 616, 619—
625, 627—632, 636, 639, 641, 643—648, 650—652, 654—660,
662, 663, 665, 667—672, 674—677, 681—686, 688, 689, 691—
697, 700—703, 705—708, 714, 717, 718, 720—722, 724—752,
754—758, 761—771, 773—783, 786, 789, 791, 792, 795—798,
800—806, 809—825, 827—829, 831, 835, 836, 838—847, 849—
859, 861—863, 865—877, 881, 882, 884, 888—891, 893—904,
906—912, 915, 919—921, 924, 926, 928, 931—938, 941, 943,
946—948, 950, 953, 954, 961, 963, 966, 968—970, 972, 975,
976, 978, 979, 981, 983, 984, 986, 988, 991—994, 1000—1003,
1005, 1007—1017, 1020—1025, 1027, 1028, 1032—1034, 1036—
1066, 1068—1070, 1073, 1075—1079, 1084, 1086, 1092, 1094—
1097, 1099, 1101, 1103, 1105—1110, 1113, 1116—1119, 1121,
1125—1129, 1131, 1132, 1134—1136, 1138, 1139, 1146—1149,
1153, 1156, 1158—1166, 1170—1172, 1174—1179, 1181, 1182,
1184, 1187, 1189—1206, 1209—1211, 1213, 1215, 1217, 1218,
1221, 1222, 1224—1229, 1233—1235, 1238—1241, 1243, 1244,
1246, 1250, 1252, 1253, 1256—1270, 1272—1277, 1279—1287,
1291, 1293—1296, 1300, 1303, 1305, 1307, 1308, 1313, 1314,
1316—1327, 1329—1334, 1336—1346, 1350,

*) Fines territorii: Czaple — Radłowice górne — Stupnica — Kali-
nów — Koninszki.

Fauna lepidopterologica Leopoliensis *).

- 1—5. 9. 10. 12—16. 19. 21—28. 31—33. 35. 41. 43—45.
 47. 48. 50. 51. 53. 56. 57. 59—61. 66. 67. 70—73. 75—80. 83.
 86. 88—109. 112—121. 123—135. 137—141. 143—145. 150—156.
 160—165. 167—169. 171. 173. 174. 176. 177. 179—184. 186—
 192. 194—208. 210—216. 218. 219. 221—224. 226—231. 235—
 250. 252. 253. 255—260. 263—267. 269. 271. 273. 275. 279.
 280. 282—284. 286—311. 313. 315—317. 319. 320. 323. 324—
 336. 341. 343. 345—351. 353. 357. 360. 362—367. 369—383.
 385. 387. 388. 390—399. 402. 405—407. 409—417. 419—421.
 424. 425. 427—434. 436—439. 442. 446. 452. 453. 455. 457.
 458. 462. 463. 465—468. 471. 472. 474. 478—488. 490—493.
 496. 498—508. 510. 512—527. 529—531. 533—539. 542. 544—
 548. 550. 551. 557. 559. 562. 564. 566. 568. 570—573. 575.
 577—582. 584—591. 594. 596—604. 609. 610. 612—616. 619—
 628. 631—633. 635—642. 644. 646. 647. 649—652. 655. 661.
 663. 666. 667. 669. 671. 672. 677. 679. 681—687. 689—692.
 695. 700—702. 705—708. 713. 715—718. 721—723. 725. 727—
 731. 733—735. 737—739. 743—745. 747. 749. 751. 753—756.
 758. 759. 763—768. 772—780. 782. 783. 785. 790. 792. 796.
 798—800. 802. 803. 807. 812. 814—817. 819. 820. 822—825.
 828. 832. 835—837. 842. 846. 847. 850—858. 860. 861. 864.
 865. 868. 871. 873—875. 878—881. 883. 886—888. 890—892.
 894—897. 899—923. 925. 926. 928—931. 934—937. 939. 940.
 942—945. 947. 948. 950. 951. 953. 955. 962—969. 972. 976. 979.
 980. 982. 985—988. 990—995. 999—1002. 1006—1013. 1017—
 1021. 1023. 1024. 1026. 1027. 1029—1031. 1033. 1034. 1036—
 1038. 1040. 1043—1045. 1047. 1056. 1059—1062. 1064. 1066.
 1067. 1069—1071. 1073. 1075. 1077. 1079. 1081—1085. 1087—
 1093 $\frac{1}{2}$. 1095. 1098. 1100—1102. 1104—1107. 1112—1123. 1125.
 1126. 1130. 1132. 1133. 1135—1141. 1143. 1148. 1149. 1153.
 1155. 1158. 1162—1165. 1168. 1169. 1171. 1173. 1175. 1176.
 1178—1183. 1185—1191. 1193. 1196—1201. 1204—1206. 1209—
 1217. 1219—1225. 1228. 1229. 1231. 1232. 1236. 1237. 1240—
 1242. 1244. 1245. 1247—1255. 1257—1260. 1262—1264. 1266.

*) Fines territorii: Holesko — Bednarówka — Zubrze — Winniki
 Lisienice — Krzywczyce.

Index specierum ad Postscriptum.

- Abiegneria* 1421.
Absynthiata 1375.
Absynthii 1397.
Acetosellae 1386.
Adippelius 1422.
Aggregella 1443.
Alaudaria 1373.
Albidulana 1414.
Alcyone 1358.
Alpestrana 1419.
Alpinellus 1423.
Alstroemeriana 1435.
Alvearia 1429.
Ambigua 1378. b.
Anchusella 1434.
Ancilla 1365.
Anella 1430.
Apollo 1353.
Aptata 1374.
Asclepiadis 1398.
Aurago 1379.
Baliodactyla 1474. b.
Berberidella 1438.
Bicostella 1442.
Bifida 1367.
Bimaculosa 1393.
Boisduvaliana 1416.
Boyerella 1457.
Brizeis 1359.
Caelatella 1454.
Caelebipennella 1450.
Captiuncula 1390.
Circulella 1431.
Citrago 1282.
Citrana 1415.
Clausthaliana 1408.
Corticella 1433.
Crataegi 1458.
Criella 1439.
Croceago 1384.
Caliciformis 1363.
Culmaria 1373.
Culta 1395.
Cuspidella 1093^{1/2}.
Daucella 1436.
Dentosella 1448.
Dipoltana 1402.
Dysodaea 1389.
Elinguaria 1369.
Emortuella 1433.
Eudora 1360.
Fagicolella 1463.
Faginella 1463.
Firmata 1372.
Flavicinetia 1388.
Flavipalpana 1405.
Fulvimitrella 1432.
Fulvago 1387.
Furuncula 1391.
Geographica 1376.
Grisealis 1399.
Grisella 1429.
Heegeriella 1464.
Helle 1355.
Incanella 1455.
Kindermanniana 1403.
Kleemanella 1461.
Lentiginosella 1445.
Lichenaria 1370.
Lienigiana 1476.
Lineago 1383.
Linearilla 1451.
Lucana 1407.
Lucida 1400.
Lucivagana 1407.
Mespilella 1466.
Messingiana 1413.
Metallicella 1456.
Mictodactyla 1475.
Minutata 1375.
Montanana 1419.
Monticolana 1418.
Moritzella 1447.
Muscerala 1366.
Myopaeformis 1364.
Myrmidone 1354.

- Nanana 1409.
 Nervosa 1436.
 Nigricomella 1459.
 Ochrodactyla 1473.
 Ochroleucana 1411.
 Oleagina 1396.
 Olivana 1406.
 Oxalina 1385.
 Palleana 1401.
 Pauperellus 1425.
 Pectinella 151.
 Penziana 1404.
 Perfluella 1426.
 Perla 1377.
 Pomifoliella 1466.
 Pomposella 1449.
 Populifoliella 1467.
 Pyropella 1441.
 Pyrrha 1357.
 Roborana 1412.
 Roseticolana 1417.
 Rostrella 1440.
 Saligna 1471.
 Saponariae 1394.
 Scabidella 1444.
 Seitella 1470.
 Scotinella 1446.
 Sebrus 1356.
- Sexpunctella 1437.
 Silago 1380.
 Silvellus 1422.
 Sociaria 1371.
 Solaris 1400.
 Sparmanella 1472.
 Spheciformis 1362.
 Sphegiformis 1362.
 Stigmodaetla 1474. a.
 Stomoxoformis 1363.
 Strobilana 1420.
 Suffuruneula 1392.
 Sulphurago 1381.
 Taeniellus 1324.
 Tetricella 1428.
 Tischerana 926
 Togata 1380.
 Transversella 1452.
 Tremulae 1467.
 Turionana 1410.
 Ulmella 1460.
 Ulmifoliella 1462.
 Vetelella 1431.
 Vinetella 1427.
 Virens 1378. a.
 W—album 1361.
 Zelleri 1230.
-

Graviora emendanda vel addenda in hoc opusculo non inveniuntur, leviora errata typographica benevolus Lector Ipse benigne corriget. Series numeri pagina- rum bis abrupta est; numeri scilicet 141—144, tum 237—240 bis repetuntur.

1268. 1271. 1273—1278. 1282. 1285—1287. 1290. 1292. 1294—
1298. 1301. 1302. 1304. 1306. 1307. 1310. 1312. 1313. 1315—
1320. 1322—1327. 1332. 1334—1336. 1338—1340. 1344. 1346. 1350.

Tempora volitatus.

Martio et Aprili.

13. 66. 74—78½. 141. 142. 161—163. 173. 211. 221. 223.
231. 236. 240. 241. 317. 331. 348. 350. 352. 354. 355. 369. 370—
375. 377—379. 390. 433. 436. 437. 493. 518—525. 527. 533—
535. 544. 547. 572. 573. 575. 577. 580. 590. 599. 600. 601. 629.
692. 712. 722. 829. 860. 881. 909. 912. 914. 915. 921. 1007—1011.
1051. 1064. 1069. 1106. 1121. 1250. 1023. 1247. 1285. 1317. 1322.

Majo.

1. 2. 4. 5. 9. 10. 12. 13. 19. 23—26. 31. 32. 34. 35. 41.
44. 50. 52. 53. 59—61. 66. 67. 71—78½. 80. 88—90. 94. 97.
100—103. 107. 112. 114. 116. 121. 128. 129. 140. 144. 148. 154—
156. 160. 162. 166. 171. 175. 176. 178. 181. 189. 197. 199. 200.
208. 211. 213. 214. 216. 219. 221. 222. 224—227. 229—232. 234—
236. 242. 244—246. 248—254. 256. 259. 260. 279. 280. 284. 286.
289—291. 293. 298. 299. 315. 327. 329—331. 346. 347. 349. 351.
360. 368. 370. 372. 373. 375. 380. 384. 388. 395. 397. 398. 405.
410. 412—414. 427. 428. 431. 433. 442. 445. 446. 453. 467. 472.
474. 478. 480. 483. 485—488. 490—493. 499—502. 504—506.
510. 512—514. 519. 527—529. 533. 535. 536. 544. 547. 550. 551.
557. 559. 564. 567. 571. 572. 575. 579. 580. 582. 587. 596. 598—
601. 610. 612—614. 619—623. 625. 628. 632. 636—639. 641. 643.
644. 649. 650—652. 659. 660. 663. 666. 677. 682. 683. 685. 686.
689. 691. 692. 695. 700—702. 706—708. 712. 716—718. 724—
726. 728. 730. 731. 733. 734. 736. 739. 743. 748. 749. 755. 775.
777. 778. 780. 782. 783. 790. 792. 795. 803. 814. 816. 819—821.
825. 826. 828—831. 835. 836. 842. 844—847. 852—855. 860—
862. 865. 871. 873. 875. 880. 883. 891. 893—897. 899—904. 912.
914. 923. 925. 926. 928. 931. 936—941. 943. 947. 953. 979. 980.
993—995. 1007. 1012. 1013. 1017. 1019. 1020. 1024. 1027—1029.
1031. 1032. 1036. 1038. 1040. 1043—1049. 1052. 1054. 1059—
1061. 1064. 1069. 1073. 1075. 1076. 1086. 1093. 1095. 1101. 1102.

1105. 1106. 1112. 1113. 1116—1119. 1121. 1125. 1135. 1136.
 1138. 1140. 1148. 1153. 1158. 1164. 1165. 1175. 1176. 1178.
 1189. 1190. 1244. 1247—1250. 1252. 1253. 1255. 1257—1260.
 1266. 1273—1275. 1277. 1285. 1287. 1294—1296. 1187. 1188.
 1199. 1200. 1202. 1213. 1225. 1231. 1304. 1305. 1307. 1310. 1312.
 1316—1320. 1322. 1324. 1325.

Junio.

1. 3—5. 7. 8. 10. 13. 15. 19. 21. 23—30. 32. 35. 37. 41—
 47. 50—56. 58—61. 63. 64. 67. 70. 71. 73. 76. 78. 80. 87. 89.
 91. 93—103. 105—116. 118. 119. 124. 125. 127—130. 134. 136.
 139. 141. 143. 145—160. 164. 169. 174. 176. 182. 183. 185—190.
 192—199. 201—210. 212. 213. 215. 218. 220. 222. 224. 226. 227.
 228. 230. 233. 236—239. 243—245. 247—253. 255—259. 261—
 269. 271—276. 278. 280. 282. 283. 288—291. 293—304. 307. 311.
 312. 314—318. 320. 322. 324. 326. 328—330. 332. 335—337. 340.
 345. 353. 356. 358. 362. 369. 372. 379. 381—384. 386. 387. 389—
 392. 395—400. 404—409. 411—414. 420—435. 441—447. 450.
 453—456. 458. 460. 461. 463—469. 471. 472. 474—476. 478. 480.
 483—486. 488—493. 502. 504—506. 509. 510. 512—516. 526.
 529—531. 535. 539—551. 557—566. 568—570. 575. 578. 580. 581.
 583. 584. 586—588. 593. 595—600. 602. 604. 605. 607—609.
 611—615. 617. 619—628. 630. 632. 635—637. 639. 641—643.
 645—648. 650—652. 654—656. 661—663. 667. 668—674. 677.
 679—686. 688—700. 702—708. 712. 714—722. 727—730. 732—
 735. 737—741. 743—747. 749—751. 754. 755. 758—761. 763—
 767. 770—775. 777—786. 788—791. 796—807. 809. 812—820.
 822—824. 827. 828. 832—836. 838—847. 749—854. 856. 858.
 860—868. 871—873. 875. 877—880. 882. 883. 886—892. 894—
 904. 908. 912. 928—939. 942—944. 946—951. 953. 955—957.
 962. 965. 966. 968. 969. 972. 975. 976. 978. 979. 981. 982. 986—
 992. 994—996. 1002. 1003. 1005—1007. 1012—1014. 1016—1020.
 1022—1030. 1032—1042. 1045—1049. 1051—1055. 1059—1063.
 1066. 1069. 1071. 1073. 1074—1077. 1080. 1082—1085. 1088.
 1090—1093. 1095—1098. 1100. 1101. 1105. 1106. 1108. 1113.
 1114. 1117. 1125. 1126. 1129. 1131. 1135. 1136. 1138. 1139. 1142.
 1144. 1146. 1147. 1149—1151. 1153. 1156. 1160—1163. 1165.
 1166. 1170. 1171. 1175. 1179. 1180. 1182. 1183. 1185. 1187. 1189—
 1194. 1196. 1197. 1199—1211. 1213—1222. 1224—1226. 1228.

1229. 1236—1244. 1246. 1248—1250. 1253. 1254. 1256. 1257.
 1260. 1262. 1264. 1266—1268. 1270—1274. 1276. 1278—1281.
 1283—1287. 1290. 1291. 1293—1300. 1303. 1304. 1307—1309.
 1311. 1313—1316. 1319—1321. 1325. 1327. 1328. 1331. 1332.
 1336—1339. 1346. 1350.

Julio.

2. 4—7. 10. 12. 13. 16—20. 22. 26. 27. 30. 33—40. 43.
 45. 46—50. 52. 56. 57. 59. 60. 62. 64. 65. 67—79. 81—84. 86.
 87. 89. 91—93. 95. 96. 98. 103—105. 116—118. 130—133. 136—
 139. 145. 147. 150. 152. 153. 155. 156. 164. 165. 167. 168. 170.
 172. 175. 177—180. 184. 186—188. 193. 194. 197. 199. 200. 206.
 208. 213. 227. 237. 238. 246. 249. 258. 270. 276. 277. 281. 287.
 288. 290—292. 294. 298. 299. 303. 305. 306. 310. 312—316. 319—
 323. 325. 329. 333. 338—340. 342—344. 357. 362. 365. 372.
 385—387. 390. 391. 394—397. 402—406. 408. 410. 413. 415. 416.
 421. 424—425 $\frac{1}{2}$. 428—431. 433—435. 438. 439. 441—444. 447.
 448. 451. 452. 454. 455. 457—459. 461—463. 465. 469—473.
 477—486. 491—495. 498. 499. 501 $\frac{1}{2}$. 504. 508. 509. 511. 513.
 526. 529. 535—538. 541. 544. 545. 547. 549. 550. 552—558. 560.
 562. 563. 565. 570. 578. 581. 583—585. 587—589. 592. 593. 595—
 599. 602. 604. 606—608. 614. 616—618. 623. 625. 627. 631. 633.
 634. 646. 647. 656—659. 662—673. 675—677. 679. 681—687. 691.
 692. 695—697. 699. 701—706. 708—711. 713. 714. 717. 718. 725.
 727. 737—739. 747. 749—758. 760. 762. 764. 766. 768—770. 774.
 776—779. 781—784. 786—789. 793. 794. 796—798. 800—803.
 806—808. 810—812. 814. 817—820. 822—824. 827. 828. 832. 836.
 842. 843. 847—851. 853. 856—859. 864. 867. 869—871. 873—877.
 884. 885. 888—891. 896. 900—903. 908. 912. 924. 227. 828. 931.
 932. 936. 945—952. 954. 958—961. 964—974. 976. 977. 982—985.
 991. 996—1001. 1004. 1012. 1014. 1016. 1020. 1021. 1027. 1033.
 1034. 1038. 1045. 1046. 1050—1052. 1054—1058. 1060. 1061. 1065.
 1066. 1068—1070. 1072. 1074. 1075. 1078—1081. 1083—1085.
 1087—1089. 1094. 1097. 1101. 1103—1111. 1113. 1117. 1120. 1121.
 1123. 1125. 1126. 1131. 1133. 1134. 1136. 1137. 1139. 1145—1147.
 1149. 1150. 1154. 1155. 1158. 1160—1163. 1165—1172. 1174. 1177.
 1180. 1182. 1184. 1191. 1195—1198. 1204—1206. 1209—1211. 1218.
 1224. 1225. 1227. 1228. 1232—1236. 1239. 1245. 1248. 1250. 1259—
 1265. 1269. 1281—1283. 1286. 1288. 1294. 1308. 1313. 1316. 1320.

1322. 1326. 1329. 1330. 1333—1337. 1340—1343. 1345. 1346.
 1348. 1350. 1351. 1351—1351. 1351—1351. 1351. 1351—1351.
 1351—1351. 1351. 1351. **Augusto.**

1. 2. 4—14. 18. 26. 35. 43. 59. 66—69. 71—78½. 83. 85. 86.
 89. 92. 93. 97. 104. 116. 120—123. 132. 135. 142. 150. 155. 156. 178.
 179. 187. 217. 227. 250. 266. 285. 291. 299. 303. 318. 357. 359. 360.
 362. 372. 390. 391. 397. 417. 418. 420. 424. 431. 433—435. 439. 448.
 449. 455. 461. 462. 469. 472. 478. 480. 491. 492. 508. 509. 513. 532. 544.
 550. 560. 582. 596. 598. 599. 613. 614. 616. 625. 640. 647. 653. 663. 674.
 676—678. 681. 682. 691. 692. 695. 697. 702. 703. 723. 728. 733. 734.
 738. 742. 744. 747—749. 764. 766. 768. 769. 778. 779. 787. 797. 800.
 818. 827. 847. 851. 856. 857. 873. 874. 877. 891. 896. 900. 910—912.
 919. 920. 936. 947. 948. 961—963. 968. 969. 976. 1012. 1015. 1016.
 1018. 1020. 1021. 1038. 1048. 1050. 1057. 1061. 1062. 1064. 1067.
 1069. 1070. 1094. 1099. 1103. 1106. 1107. 1109. 1113. 1117. 1127—
 1129. 1131. 1134. 1147. 1152. 1157. 1166. 1171. 1177. 1178. 1181.
 1196. 1197. 1199. 1200. 1201. 1206. 1240. 1247. 1250. 1252. 1257.
 1258. 1263. 1273. 1276. 1277. 1286. 1289. 1290. 1301. 1306. 1319.
1320. 1322. 1326. 1331. 1339. 1350.

Septembri.

4—6. 10. 12—14. 25. 66. 67. 71. 73. 76. 78. 78½. 123. 171. 215.
 239. 242. 271. 309. 334. 341. 357. 360—362. 366. 372. 375. 376. 393.
 397. 399—401. 415. 417. 419. 431. 433. 435. 440. 448. 496. 498. 517.
 574. 583. 588. 591. 594. 596. 599. 614. 625. 663. 665. 702. 744. 764. 768.
 800. 835. 837. 851. 853. 855. 856. 857. 874. 877. 905—912. 914. 916—
 922. 926. 963. 1013. 1064. 1066. 1067. 1069. 1106. 1107. 1115—1117.
 1121. 1143. 1169. 1171. 1181. 1186. 1206. 1249. 1250. 1251. 1255.
 1263. 1306. 1322. 1324. 1329. 1339.

Octobri.

3—6. 10. 12—14. 25. 73. 76. 181. 184. 242. 308. 341. 357. 362—
 364. 366. 367. 372. 375. 397. 448. 497. 503. 516—518. 576. 577. 591.
 596. 599. 603. 614. 749. 851. 855—857. 874. 877. 905—908. 910—914.
 919—922. 1006. 1013. 1062. 1064. 1069. 1070. 1106. 1117. 1121. 1122.
 1143. 1181. 1206. 1207. 1249. 1250. 1251. 1287. 1301. 1302. 1306.
1322. 1324. 1339.

Novembri.

76. 907. 908. 910—912. 914. 921. 1005. 1061. 1064. 1069. 1106. 1181.
 1261. 1311. 1311. 1361. 1421. 1421. 1421. 1421. 1421. 1421. 1421.




Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8. magn. nat.

Fig. 1. *Tortrix Besseri*. de Non.

Fig. 5. *Gelechia Wagae*. de Non.

Fig. 2. *Carpocapsa Lobariensis*. de Non.

Fig. 6. *Argyresthia Drieduszyckii*. de Non.

Fig. 3. *Paedisca Petrushki*. de Non.

Fig. 7. *Lyonezia Albella*. Eversmann.

Fig. 4. *Gelechia Kneri*. de Non.

Fig. 8. *Odontosia Sieversi*. Menetries.

Biblioteka Muzeum i Inst. Zoologii PAN

K. 1915



100000000338