



Nr. inv. 456
Szafa: 1
Półka: 7

SPECIES PLANTARUM.

Tomus III. Pars II.



Lin. Sp. Plant. Tom. III, P. II.

A



Classis XVII.

D I A D E L P H I A.
P E N T A N D R I A.

1310. MONNIERIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ringens.
Filamentum superius antheris 2; inferius 3. *Capſulae* 5.

H E X A N D R I A.

1312. FUMARIA. *Cal.* 2-phillus. *Cor.* ringens, basi gibbosa nectarifera. *Filamenta* antheris 3.
1311. SARACA. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida. *Filamenta* utrinque tria connexa.

O C T A N D R I A.

1313. POLYGALA. *Cal.* 2 laciniae alaeformes. *Cor.* vexillum cylindricum. *Stam.* connexa. *Capſ.* obcordata, 2-locularis.
1315. SECURIDACA. *Cal.* 3-phillus. *Vexillum* diphyllum. *Legumen* 1-spermum ala ligulata.
1314. BREDEMEYREA. *Cal.* 3-phillus. *Vexillum* diphyllum. *Drupa* nuce biloculari.

D E C A N D R I A.

* *Stamina omnia connexa.*

1316. NISSOLIA. *Legum.* 1-spermum, terminatum ala ligulata.
1320. DIPTERIX. *Legumen* 1-spermum nudum. *Cal.* laciniae binae alaeformes.
1318. PTEROCARPUS. *Legum.* 1-foliaceum falcatum evalve.
1319. AMERIMNUM. *Legumen* bivalve 3-4-spermum foliaceum lanceolatum.
1339. AMORPHA. *Alae Carinaque nullae.*
1328. TRIGONIA. *Canira* dipetala. *Capſ.* 3-valvis 1-locularis polysperma.

1322. ERYTHRINA. *Alae carinaque brevissimae, Cal. poro mellifero. Legumen torulosum.*
1324. RUDOLPHIA. *Alae carinaque brevissimae. Legumen compressum polyspermum.*
1323. BUTEA. *Alae carinaque brevissimae. Legumen foliaceum apice monospermum.*
1321. ABRUS. *Filamenta 9 basi infima connexa, latere superiore distincta. Sem. sphaerica.*
1334. LEBECKIA. *Cal. 5-partitus sinubus rotundatis. Legumen cylindricum Polyspermum.*
1332. SPARTIUM. *Filam. adhaerentia germini. Stigma adnatum, villosum.*
1333. GENISTA. *Pistillum deprimens carinam. Stigma involutum.*
1335. RAFNIA. *Cal. bilabiatus. Legumen lanceolatum compressum.*
1347. LUPINUS. *Antherae alternae rotundae: alternae oblongae. Legum. coriaceum.*
1341. TETRAMNUS. *Filamenta 5 sterilia cum 5 fertilibus longioribus alternantia. Legumen lineare compressum.*
1345. ANTHYLLIS. *Cal. turgidus, includens siliquam.*
1326. PISCIDIA. *Legumen alis 4 longitudinalibus.*
1325. WIBORGIA. *Legumen turgidum sulcatum alatum.*
1337. SARCOPHYLLUM. *Legumen acinaciforme acutum. Cal. 5-partitus regularis.*
1329. BORBONIA. *Legumen mucronatum. Stigma emarginatum.*
1331. OEDMANNIA. *Cal. bilabiatus, labium superius bifidum, inferius setaceum.*

VOLUBILES: *Phaseolus, Dolichos, Clitoria, Glycine.*

PINNATAE absque impari: *Orobus, Pisum, Lathyrus, Vicia, Ervum, Arachis.*

PINNATAE cum impari: *Biserrula, Astragalus, Phaca, Hedysarum, Glyceria, Indigofera, Galega, Colutea, Amorpha, Piscidia.*

TRIFOLIATAE: *Trifolium, Lotus, Medicago, Erythrina, Genista, Cytisus, Ononis, Trigonella, Phaseolus, Dolichos, Clitoria.*

1338. ULEX. *Cal.* diphyllus. *Legumen* vix calyce longius.
 1346. ARACHIS. *Cor.* resupinata. *Legumen* coriacum.
 1336. ASPALATHUS. *Legum.* muticum, ovatum
subdispermum.
 1344. ONONIS. *Legum.* rhombeum, sessile. *Vexil-*
lum striatum.
 1342. BOSSIAEA. *Legumen* pedicellatum compres-
sum. *Carina* dipetala.
 1343. CROTALARIA. *Legumen* pedicellatum, tur-
gidum.
 1327. PLATYLOBIUM. *Legumen* compressum dorso
alatum.

* * *Stigma pubescens.* (Nec priorum notae.)

1365. COLUTEA. *Legum.* inflatum, supra basin dehi-
scens.
 1348. PHASEOLUS. *Carina stylusque spirales.*
 1349. DOLICHOS. *Vexillum* bali callis duobus.
 1354. OROBUS. *Stylus* linearis, teretusculus, supra
villosum.
 1353. PISUM. *Stylus* supra carinatus villosusque.
 1355. LATYRUS. *Stylus* supra planus villosusque.
 1356. Vicia. *Stylus* sub stigmate barbatus.

*** *Legumen subbiloculare* (nec priorum.)

1379. ASTRAGALUS. *Legumen* 2-loculare, rotun-
datum.
 1380. BISERRULA. *Legumen* 2-loculare, planum,
dentatum.
 1378. PHACA. *Legum.* semibiloculare.

**** *Legumina submonosperma* (nec priorum.)

1317. DALBERGIA. *Cal.* obsolete dentatus. *Legum.*
foliaceum.
 1381. DALEA. *Alae* *Carinaque* staminum columnae in-
sertae.
 1382. PSORALEA. *Carina* dipetala. *Legumen* acu-
minatum.
 1383. TRIFOLIUM. *Legumen* vix calyce longius; 1-f.
2-spermum. *Flores* capitati.

1385. DORYCNIUM. *Cal.* 5-dentatus. *Legum.* turgidum
1374. HALLIA. *Cal.* 5-partitus regularis. *Legumen*
compressum.
1373. STYLOSANTHES. *Cal.* basi tubulatus corollifer.
1351. CYLISTA. *Cal.* bilabiatus corolla longior.
1366. GLYCYYRHIZA. *Cal.* 2-labiatus: superiore
3-fido.
1340. DIMORPHA. *Cal.* 4-partitus. *Alae carinaque*
nullae.

* * * * * *Lomentum in articulos secedens* *)

1372. AESCHYNOMENE. *Lomentum isthmis interceptum.* *Cal.* bilabiatus.
1361. MULLERA. *Lomentum moniliforme.* *Cal.* 4-dentatus.
1375. HEDYSARUM. *Lomentum articulis subrotundis, compressis.* *Carina obtusissima.*
1371. SMITHIA. *Lomentum articulatum, articulis stylo laterali cohaerentibus.* *Cal.* bilabiatus.
1367. CORONILLA. *Lomentum articulatum teres rectum.*
1368 ORNITHOPUS. *Lomentum articulatum, arcuatum.*
1370. SCORPIURUS. *Lomentum isthmis interceptum, teretiusculum, involutum.*
1369. HIPPOCREPIS. *Lomentum compresso-membranaceum: altera sutura emarginaturis ad medium excisa.*

* * * * * *Legumen uniloculare polyspermum*
(nec priorum.)

1386. TRIGONELLA. *Vexillum Alaeque patentes*
quasi tripetae. *Carina minuta.*
1350. GLYCINE. *Cor. vexillum reflectens.*
1352. CLITORIA. *Vexillum amplum alas obtegens.*
Corolla resupinata.

*) UMBELLATAE: *Lotus, Dorycnium, Coronilla, Ornithopus,*
Hippocratepis, Scorpisurus.

1364. ROBINIA. *Vexillum reflexo-patens*, subrotundum.
1376. INDIGOFERA. *Carina utrinque denticulo.*
1358. CICER. *Calycis 4 laciniae superiores vexillo in-*
cumbentes.
1357. ERVUM. *Cal. 5-partitus*, subaequalis, longitu-
dine fere corollae.
1359. LIPARIA. *Calycis lacinia infima elongata. Alae*
inferius bilobae.
1330. ACHYRONIA. *Cal. 5-dentatus*, dente inferiore
elongato bifido.
1360. CYTISUS. *Legumen pedicellatum. Calyx bila-*
biatus.
1363. CIPHYSA. *Legumen lineare utrinque vesica lon-*
gitudinali adnata inflatum.
1377. GALEGA. *Legumen lineare striis oblique trans-*
verbis.
1384. LOTUS. *Legumen teres*, farctum seminibus cy-
lindricis.
1387. MEDICAGO. *Legumen spirale membranaceum*
comprellum. *Pistillum carinam deprimens.*
1362. GEOFFROYA. *Drupa nucleo ligneo.*
-

P E N T A N D R I A.

1310. M O N N I E R I A.

Gen. pl. ed. Scrb. n. 1152.

Cal. 5-partitus: lacinia superiore longa. Corolla ringens. Stam. 2: superiore Antheras 2, inferiore 3. Capsulae 5, monospermae.

I. MONNIERIA trifolia.

Monnieria trifolia *Sp. pl. 986. Loefl. itin. 197.* Aubl. guj. 2. p. 731. t. 793.**

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 466.

Dreyblättrige Monnierie. W.

Habitat in Cumanae, Gujanæ et Cajennæ pratis. ⊙

Caulis dichotomus. Folia ternata. Flores albi, spica bifida.

H E X A N D R I A.

1311. S A R A C A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1153.

Cal. 0. Cor. infundibulif. 4-fida. Filamenta 3 utrinque fauca. Legumen pedicellatum.

I. SARACA indica.

Saraca. *Mant. 98. Burm. ind. 85. t. 25. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 183.

Ostindische Saraca. W.

Habat in India. Kleynhoff. 5

Arboris Folia alterna, pinnata sine impari, trijugaf. quadrijuga: Foliolis oblongis, petiolatis. Panicula racemis f. spicis alternis: Bracteis subimbricatis, ovato lanceolatis, oppositis binis, binisque. Lomentacea planta.

1312. FUMARIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1154.**Cal. diphyllo. Cor. ringens. Filamenta 2,
membranacea, singula Antheris 3.*** Corollis bicalcaratis.*I. FUMARIA *Cucullaria.**F. acaulis. scapo nudo, racemo secundo, corollis basi bi-
calcaratis.* W.*F. scapo nudo. Mant. 437. Hort. cliff. 351. Gron.
virg. 103. Roy. lugdb. 393. Mill. dict. n. 9.**F. tuberosa insipida. Corn. canad. 127.**F. siliquosa, radice grumosa, flore bicorporeo ad labia
conjuncto, virginiana. Pluk. alm. 162. t. 90. f. 3.
Rai. suppl. 475.**Capnorhynchus americana. Boerh. lugd. I. p. 309.**Bicucullata canadensis, radice tuberosa squamata. Act.
parif. 1733.**Houttuyn Linn. Pfl. Syst. 8. p. 467.**Kappenförmiger Erdrauch. W.**Habitat in Virginia; Canada. 24 (v. s.)*

*Folia radicalia, bina, triternata, incisa, laevia,
tenuia. Petioli rubicundi. Scapus simplex, teres, lon-
gitudine folii, rufus. Racemus terminalis, simplex
floribus pendulis: Pedicelli uniflori: Bracteis binis, op-
positis, ovatis, acutis, rubicundis, parvis, flori ap-
proximatis. Calyx ovatus, appressus, parvus, albus.
Corolla alba: Limbus flavus, bilabiatus: Labii aequa-
libus, concavis, reflexis, ovatis, integris. Faux clau-
sa, flavens, lateribus margine dilatatis, nectare hu-
mentibus. Calcaria duo, aequalia, distantia, compref-
suscula, longitudine fere corollae. Stamina: Filamen-
ta utrinque tria distincta.*

* 2. FUMARIA *fungosa.**F. caule scandente, corymbis axillaribus, corollis basi
bigibbis. W.**F. floribus basi bigibbis, siliquis linearibus ancipitibus
corolla fungofo-inflata tectis, foliis scandentibus. Ait.
Kew. 3. p. 1.**Kleiternder Erdrauch. W.*

Habitat in Pennsylvania. ♂ (v. v.)

Caulis quadripedalis et ultra scandens sulcatus. Folia triternata, foliolis cuneatis trilobis obtusis. Racemi exillares corymbosi 5-8 flori. Flores violacei penduli. Ait. l. c.

Corolla basi bigibba majuscula persistens. W.

3. FUMARIA spectabilis.

F. caule erecto, racemo terminali ebracteato, corollis basi bilobis. W.

F. floribus postice bilobis, caule folioso. Amoen. acad. 7. t. 7. Gmel. fib. 4. p. 63. n. 90.

Houttuyn Linn. Pfl. Syst. 8. p. 468.

Ansehnlicher Erdrauch. W.

Habitat in Sibiria ad fines Chiae. D. Demidov. 24

Planta eximia floribus speciosissimis, maximis. Habitus Fumariae bulbosae, sed majora omnia. Rami ex alis rariores. Caulis erectus. Racemus absque bracteis. Corollae magnitudine extimi articuli pollicis, posicte in duos lobos aequales, rotundatos divisae.

** * Corollis unicalcaratis.*

4. FUMARIA nobilis.

F. caule simplici, racemo terminali, bracteis oblongis acutis flore brevioribus, foliis pinatis, foliolis tripartito laciniatis. W.

F. caulibus simplicibus, bracteis flore brevioribus indiuis. Syst. Veg. p. 529. Iacq. hort. t. 116.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 469.

Schöner Erdrauch. W.

Habitat in Sibiria. 24 (v. v.)

Simillima F. bulbolae, sed multo major. Folia radicalia 7-9. spithamea, bipinnata. Scapi 1 f. 2, obliqui. pentagoni. Folia caulina 4, sessilia, composita. Racemus secundus, obtusissimus. Bracteae ovato-lanceolatae, integrae. Flores P. bulbosae duplo maiores, albi, limbo luteo, odore Primulae veris, labiis nec emarginatis, nec ferratis. Faux apice nigra. Calyx minutus, dentatus.

* 5. FUMARIA bracteata.

F. caule simplici, racemo terminali, bracteis cuneatis digitatis florum longitudine, foliis binternatis tripartitis. W.

Fumaria bracteata Stephan. in litt.

Beblätterter Erdrauch.

Habitat in Sibiria. 24 (v. f.)

Simillia praecedenti, sed distinctissima: calcare floris longiore nec curvato, bracteis cuneatis multipartitis longitudine florum, et foliis bibernatis, foliolis lanceolatis tripartitis. Reliquae partes et magnitudo convenient. W.

* 6. FUMARIA incisa.

F. caule simplici, racemo terminali, bracteis oblongis inciso-serratis pedunculo brevioribus, foliis bibernatis inciso-serratis. W.

F. (incisa) bracteis inciso-serratis pedunculo bevioribus.

*Thunb. Nov. Act. Petrop. 12. p. 104. t. D.**

Eingeschnittener Erdrauch. W.

Habitat in Japonia.

Caulis spithameus erectus simplex. Folia bibernata vel decomposita, foliolis oblongis trifidis vel pinatifidis dentatis, dentibus acuminatis. Racemus palmaris erectus simplex. Bracteae oblongae, inferiores subcuneatae inciso-dentatae, dentibus acuminatis. Pedunculi capillares bracteis longiores. Corollae flavae calcare recto. Differt a praecedentibus binis: dentibus foliorum acuminatis, bracteis inciso-dentatis pedunculo brevioribus. W.

* 7. FUMARIA paeoniaefolia.

F. caule ramoso, racemo terminali, bracteis lanceolatis flore brevioribus, foliis bibernatis ovatis tripartitis. W.

Fumaria paeoniaefolia Stephan. in litt.

F. caule ramoso, foliis pinatis, foliolis extimis lobatis, capsulis ovatis pendulis. *Gmel. fib. 4. p. 66. t. 34.*

Paeonienblättriger Erdrauch. W.

Habitat in paludosis Sibirae ad Lenam fluvium. 24 (v. f.)

Caulis erectus ramosus fragilis. Folia exakte Paeoniae albiflorae subtus glauca. Racemi bini vel tres in apice caulis: solitarii vel bini in ramorum apice. Flores facie praecedentium sed purpurei. Bracteae lanceolatae angustae longitudine pedunculi vel breviores. Differ ta praecedentibus binis praccipue

caule ramoso, racemis non solitariis, bracteis lanceolatis et florum colore: W.

* 8. FUMARIA *longiflora*. W.

F. caule simplici, racemo terminali, bracteis lanceolatis pedunculo brevioribus, calcare floris subulato recurvo, foliis tritennatis, radice tuberosa. W.

F. (*Schangini*) radice tuberosa, caule simplici folioso, bracteis flore dimidio brevioribus. *Pall. Act. Petrop.* 1779. 2. p. 267. t. 14. f. 1-3.*

F. (*caudata*) foliis compositis, pinnis trifoliatis, calcari incurvo flore longiore. *Lamarck encycl.* 3. p. 563? *Langblütiger Erdrauch*. W.

Habitat in alpibus Altaicis Sibiriae. 24 (v. f.)

Radix tuberosa subrotunda solida. Caulis simplex erectus. Folia glauca triternata, foliolis tripartitis oblongo-lanceolatis acutis. Racemus caule longior terminalis simplex. Bracteae lanceolatae pedunculo breviores. Corolla purpurea. Calcar subulatum recurvum corolla longius. Siliquae lineares utrinque attenuato stylo et stigmate persistenti coronatae. W.

* 9. FUMARIA *Marschalliana*.

F. caule simplici, racemo terminali, bracteis ovatis flore longioribus, foliis bitemnatis ellipticis, radice tuberosa. W.

Fumaria Marschalliana. *Pall. Nov. Act. Petrop.* 10. p. 315

Marschallischer Erdrauch. W.

Habitat in Tauria. 24 (v. f.)

Statura F. bulbosae sed duplo major. Bracteae ovatooblongae floribus longiores. Flores purpurascentes, alis flavis. W.

10. FUMARIA *bulbosa*.

F. caule simplici, racemo terminali, bracteis oblongis pedunculo longioribus, foliis bitemnatis oblongis acutiusculis, radice tuberosa cava. W.

F. caule simplici, bracteis longitudine florum. *Mat. med.* 168. *Crantz. aust.* p. 435. *Scop. carn.* n. 864.

- F. caule simplicissimo diphylo, floribus calyce destitutis.
Hort. cliff. 351. *Vir. cliff.* 70. *Fl. Suec.* 385. 631.
var. γ. *Roy. lugdb.* 394.
- F. (cava) caule simplici, foliolis obtusifusculis, calcare recurvo, bracteis lanceolatis acutis, radice cava. *Retz. prod. scand. ed. 2. n.* 860. *Hoffm. germ.* 248. *Ehrh. Beitr.* 6. p. 145.
- F. (major) radice bulbosa, caule simplici, bracteis integrerrimis ovato-lanceolatis floribus brevioribus. *Roth. germ.* I. 300. II. 151.
- F. radice bulbosa, cava, caule simplici bifolio, bracteis ovato-lanceolatis. *Hall. helv.* n. 848.
- F. caule simplici subangulato, pedunculis bractea brevioribus racemisque solitariis multifloris. *Neck. gallob.* p. 298.
- F. bulbosa major. *Reich. francof.* n. 492. *Leers. herb.* n. 548. *Kniph. cent.* I. n. 31. et 32. *Flor. dan.* t. 605. *Plackw.* t. 534.
- F. bulbosa, radice cava, major. *Bauh. pin.* 143.
- F. radice cava major, flore purpureo et albo. *Moris. hist.* 2. f. 3. p. 261. t. 12. f. 6.
- Pistolechia. *Fuchſ. hist.* 91.
- Radix cava. *Dod. pempt.* 327.
- Radix cava herbariorum. *Lob. ic.* I. t. 759.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 469.
- Hohwurzlicher Erdranch. W.
- Habitat in nemoribus umbrosis Europae, Sibiriae, Camtschatae.* 24 (v. v.)

* II. FUMARIA pauciflora.

- F. caule simplici, racemo terminali, bracteis ovatis acutis pedunculo longioribus, foliis biernatis foliolis trilobis mucronatis imbricatis, radice tuberosa. W.
- Fumaria pauciflora. *Stephan in litt.*
- Wenigblütiger Erdranch. W.
- Habitat in montibus Altaicis Sibiriae.* 24 (v. f.)
- Radix tuberosa. Foliolum radicale unum alterumve, caulinam bina, biernata. Pedunculi divisiones brevissimae. Foliola sesilia subrotunda triloba obtusifuscula mucronata. Racemus terminalis bi- vel sexflorus. Bracteae ovatae striatae acutae pedunculo longiores. Calyx coloratus dentatus. Corollae calcar uncina-

tum. *Simillima praecedenti, sed diversa: foliolis sessilibus imbricatis apice mucrone admodum parvo instructis, bracteis ovatis acutis, racemo paucifloro.* W.

* 12. FUMARIA fabacea.

F. caule simplici, racemo terminali, bracteis subrotundis longitudine florum, calcare corollae recto, foliis biernatis, radice tuberosa. W.

F. (*fabacea*) caule simplici, foliolis obtusis, calcare recto, bracteis ovatis obtusis integris, radice solida. Retz. prod. Fl. scand. ed. 2. n. 859. (exclus. Jynonymo Fl. danicae.)

F. (*intermedia*) caule simplicissimo subtriphylo, bracteis subrotundis indivisis, corollarum labio inferiore adscendente, calcare recto, siliquis lanceolatis erectis.

Ehrh. Beitr. 6. p. 146.

Fumaria bulbosa. 3 Fl. suec. n. 831.

Bohnenartiger Erdrauch. W.

Habitat in umbrosis Sueciae Germaniae. 4 (v. v.)

A F. bulbosa cui similis diversa: radice solida, bracteis subrotundis longitudine florum, calcare floris recto, racemo paucifloro, statura minori et florescencia praecociori. W.

* 13. FUMARIA decumbens.

F. caule simplici decumbente, racemo terminali, bracteis ovatis longitudine pedunculi, calcare corollae recto, foliis biernatis, radice tuberosa. W.

F. (*decumbens*) bracteis ovato - ellipticis longitudine pedunculi. Thunb. Nov. Act. Petrop. 12. p. 102. t. A.*

Fumaria bulbosa. Thunb. jap. 277.

Nonigi. Kaempf. amoen. 909.

Liegender Erdrauch. W.

Habitat in Japonia. 2

Caulis decumbens palmaris simplex. Folia biernata, foliolis cuneiformibus apice tridentatis. Racemi tri - quadriflori. Bracteae ovatae acutae longitudine pedunculi. Corollae luteae longitudine calcaris. W.

* 14. FUMARIA Halleri.

- F. caule simplici, racemo terminali, bracteis cuneatis digitatis pedunculo longioribus, foliis biernatis, radice tuberosa. Willd. prod. n. 704. Fl. dan. t. 1224.
- F. (*solida*) caule subsimplici erecto, foliis biernatis, bracteis palmatis pedunculo longioribus. Smith. brit. 2. p. 748. Curt. mag. t. 231. Ehrh. Beitr. 6. p. 146. Hoffm. germ. 248.
- F. (*bulbosa*) caule simplici, calcare recto, bracteis cuneatis fissis, foliolis acutis, radice solida. Retz. prod. scand. ed. 2. n. 858.
- F. (*minor*) radice bulbosa solida, caule simplici, bracteis digitatis longitudine florum. Roth. germ. I. 300. II. 153.
- Fumaria bulbosa & Fl. Suec. n. 631. Pollich palat. n. 662.
- Fumaria bulbosa minor Leers herb. n. 549. Reich. francof. n. 493.
- F. radice bulbosa solida, caule simplici multifolio, bracteis digitatis. Hall. helv. n. 349.
- F. bulbosa radice non cava minor. Bauh. p. 144.
- F. bulbosa radice non cava minor. Morif. hist. 2. f. 3. p. 261. t. 12. f. 8.
- Fabacea radice capnos altera. Lob. ic. I. t. 759.
- Radix cava minor. Dod. pempt. 327.
- β. F. tuberosa, flore viridi. Morif. hist. 2. f. 3. t. 261. t. 12. f. 7.
- Radix cava viridi flore. Lob. ic. I. t. 760.
- Hallerscher Erdrauch. W.
- Habitat in Europae umbrosis. 24 (v. v.)*
- Variat foliis triternatis et bracteis pedunculo brevioribus. W.*

15. FUMARIA sempervirens.

- F. caule ramoso erecto, siliquis linearibus pedunculo triplo longioribus. W.
- F. siliquis linearibus paniculatis, caule erecto. Hort. upf. 207. Mill. dict. n. 12. Kniph. cent. II. n. 47.
- F. caule erecto ramoso, siliquis filiformibus corymbosis. Hort. cliff. 352. Roy. lugdb. 394.
- F. siliquula sempervirens. Corn. canad. 57. t. 57. Morif. hist. 2. p. 259. f. 3. t. 12. f. 1.

Capnoides T. *Mill. dict. t. 79.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 472.

Immergrüner Erdrauch. W.

Habitat in Canada, Virginia. ⊙ (v. v.)

Color Corollae proprius cum populari suo Aquilegia canadensis.

16. FUMARIA *fibirica.*

F. caule ramoso erectiusculo, siliquis ellipticis compressis acutis. W.

F. siliquis ovalibus, caulis patulis, foliolis oblongis. *Lin. suppl. 314.*

Fumaria impatiens. Pall. it. ed. min. 3. p. 233.

F. siliulis ovatis compressis, caule quinquangulo. *Gmel. fib. 4. p. 65. t. 33.*

F. tenuifolia floribus luteis. *Amman. ruth. 173. t. 20.*

Sibirischer Erdrauch. W.

Habitat in Transbaicalenibus regionibus Sibiriae. ⊙

Caules herbacei ramosi pentagoni fragiles erectiusculi patuli. Folia alterna supradecomposita, foliolis oblongis. Flores flavi. Legumina ovalia compressa laevia subelastica.

* 17. FUMARIA *racemosa.* +

F. caule ramoso erecto, bracteis subulatis longitudine fere corollae, foliis bipinnatis, foliolis ovatis trilobis dentatis. W.

F. (*racemosa*) bracteis filiformibus. *Thunb. Nov. Act. Petrop. 12. p. 103. t. B. **

Jamadofin. *Clayer. jap. t. 31.*

Traubentragender Erdrauch. W.

Habitat in Japoniae muris antiquis et rupibus.

Fructus forma hujus est ignota. Clayer in manucripto Florae japanicae, quod possedeo, dixit l. c. flores sequuntur semina parva fusca; an itaque siliquae monospermae? Differt a Fumaria lutea cui quoad floris colorem similis: Foliis bipinnatis, foliolis ovatis obtuse trilobis dentatis, Racemis duplo longioribus, Bracteis subulatis longitudine fere corollae, denique Calcare duplo breviore obsoleto. W.

* 18. FU-

* 18. FUMARIA pallida.

F. caule subramoso debili, bracteis oblongis dentatis, foliis bipinnatis, foliolis acuminatis trifidis summis confluentibus. W.

F. (*pallida*) bracteis inciso-serratis pedunculo brevioribus. Thunb. Nov. Act. Petrop. 12. p. 103. t. C.*

Fumaria lutea. Thunb. jap. 277.

Nonigi altera. Kaempf. amoen. 910.

Bleicher Erdrauch. W.

Habitat in Japonia.

Fructus etiam ignotus. Calcar obtusum longitudine corollae. Differt a Fumaria lutea et semper virente: foliis bipinnatis nec triternatis, racemis quadrifloris, bracteis acute dentatis, calcare longo. W.

19. FUMARIA lutea.

F. caule ramoso diffuso obtusangulo, siliquis linearis terebribus pedunculo brevioribus. W.

F. siliquis teretibus, caulis diffusis: angulis obtusis. Mant. 258. Mill. illustr. Smith brit. I. p. 749.*

F. capnoides. Mill. dict. n. 4. R.

F. lutea. Bauh. pin. 143.

F. lutea montana. Dalech. hist. 1294.

F. tingitana, radice fibrosa, perennis, flore albo flavescente siliquis curtis. Pluk. alm. 262. t. 90. f. 2. bona.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 472.

Gelber Erdrauch. W.

Habitat in Mauritania, Anglia. 24 (v. v.)

Simillima F. capnoidi, sed perennis. Corollae calcar rotundatum, tubo dimidio brevior. Racemi absque bracteis.

Bracteae linearis-subulatae parvae in racemis. W.

* 20. FUMARIA acaulis.

F. acaulis, siliquis linearibus, foliis biternatis trilobis. W.

F. (*acaulis*) scapis nudis foliorum longitudine, foliis pinnatis, pinnis trilobis. Jacq. ic. 3. t. 554. Collect 2. p. 203.*

Stielofer Erdrauch. W.

Habitat Tergesti. ⊙

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

B

Simillima praecedenti foliis et florum colore et differt solummodo quod acaulis sit; an varietas? W.

21. FUMARIA Capnoides.

F. caule ramoso diffuso acutangulo, siliquis linearibus tetragonis pedunculo longioribus. W.

F. siliquis linearibus tetragonis, caulis diffusis acutangulis. Sp. pl. 984. Scop. carn. n. 865. Kniph. cent. II. n. 46. Hoffm. germ. 248. Roth. germ. I. 300. II. 154. Jacq. Collect. I. p. 273.*

F. caule ramoso diffuso, siliquis oblongis, radice perenni. Hort. cliff. 352. Roy. lugdb. 394.

F. alba. Mill. dict. n. 3.

F. foliis pinnatis, - pinnis pinnatis, pinnulis lobatis, ovatis, siliquis brevibus incrassatis. Hall. helv. n. 347.

F. tempercirens et florens, flore albo. Herm. bat.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 473.

Weisser Erdrauch. W.

Habitat in Helvetia, Gallia, Italia, Carniola, in muris Göttingae. Weber spicil. p. 20. ⊙ (v. v.)

Semper diandram, multoties examinata reperit Weber l. c. R.

Differt a F. lutea praeter floris colorem, foliis angustioribus acutioribus, siliquis linearibus tetragonis, calcare floris subulato, racemis paucifloris, et radice annua. W.

22. FUMARIA enneaphylla.

F. caule erecto ramoso, foliis biternatis, foliolis ovato-cordatis indivisis acutis. W.

F. foliis triternatis: foliolis cordatis. Mill. dict. n. II.

F. hispanica saxatilis, foliis amplioribus cordiformibus, femine compresso. Tournef. inst. 422.

F. enneaphyllos hispanica saxatilis. Bocc. mus. 2. p. 83. t. 73. Rai. suppl. 474. Barr. ic. 42.

F. radice fibrosa, foliis ad petiolum sinuatis crassioribus. Pluk. alm. 162.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 473.

Neunblättriger Erdrauch. W.

Habitat in Hispaniae, Siciliae saxosis. 4 (v. f.).

*23. FUMARIA *crassifolia*.

F. caule ramoſo diſſuſo, foliis carnoſis ſimplicibus ternatiſque longiſſime petiolatis. W.

F. foliis ſimplicibus ternatiſque carnoſis ovatis longe petiolatis. Desf. alt. 2. p. 126. t. 173.*

Dickblättriger Erdrauch. W.

Habitat in rupium fifturis prope Tlemsem in Barbaria. 2.

Discrepat ab omnibus cognitis: Foliis ſimplicibus et ſimpliciter ternatis longiſſime petiolatis carnoſis. Flores in racemis paucifloris corymboforū nutantibus, pallide flavi. W.

*24. FUMARIA *corymbosa*.

F. acaulis, foliis pinnatis, pinnis tripartito-incisis, filiis monospermis compressis ovatis acutis rugofolis. W.

F. foliis pinnatis, foliolis flabelliformibus lobatis incisis, floribus spicato-corymbosis, ſiliculis tuberculosis monospermis, pedicellis detlexis. Desf. Act. Soc. Hift. nat. parif. 1. p. 26. t. 6.* Desf. atl. 2. p. 124.*

F. (*africana*) foliis pinnato-quinatis, foliolis latiusculis subcuneatis incisis, corymbis foliis brevioribus. Lamiarck encycl. 2. p. 563.*

Doldentraubiger Erdrauch. W.

Habitat in rupium fifturis Algeriae. 2 (v. f.)

Planta plerumque acaulis quandoque caule breviffimo vix unciali iſtructa. Scapi breves, foliis breviores, racemo corymboſo-terminati. Pedunculi longiſſimi. W.

25. FUMARIA *officinalis*.

F. caule ramoſo diſſuſo, ſiliqvis globoforis monospermis retufis, foliis ſupradecompositis, foliolis cuneiformi-lanceolatis incisis. W.

F. pericarpis monospermis racemosis, caule diſſuſo. Sp. pl. 984. Mat. med. 168. Mill. dict. u. I. Scop. carn. u. 866. Pollich. pal. n. 663. Ludw. ect. t. 83. Blackw. t. 237. Kniph. cent. I. n. 33. Hoff. germ. 248. Roth germ. I. 300. II. 154.

- F. spicis laxis, siliquis monospermis globosis emarginatis, caule diffuso, foliorum laciniis dilatatis. *Smith brit. 2. p. 750.*
- F. pericarpiis monospermis. *Hort. cliff. 252. Fl. suec. 584; 630. Roy. lugdb. 394.*
- F. foliis multifidis, subrotunde lanceolatis, fructibus monospermis. *Hall. helv. n. 346.*
- F. officinarum et dioscoridis. *Bauh. pin. 143.*
- Fumaria.** *Fuchs. hist. 338. Cam. epit. 690. Riv. tetrap. t. I.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 474.
Gemeiner Erdrauch. W.
Habitat in Europae agris cultis. ⊖ (v. v.)

26. FUMARIA capreolata.

- F. caule ramoso scandente, siliquis globosis monospermis, foliis triternatis, foliolis obovato-cuneatis incisis, petiolis partialibus cirrhofo-convolutis. *W.*
- F. pericarpiis monospermis racemosis, foliis scandentibus subcircularis. *Spl. pl. 985. Mill. dict. n. 6. Hoffm. germ. 248.*
- F. spicis laxis, siliquis monospermis globosis, caule petiolis contortis scandente, foliolis cuneatis lobatis. *Smith brit. 2. p. 751.*
- F. viticulis et capreolis plantis vicinis adhaerens. *Bauh. pin. 143.*
- F. major scandens, flore pallidiore. *Rai. hist. 405.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 476.
Rankender Erdrauch. W.
Habitat in G. Narbonensi, Anglia ⊖ (v. v.)

Pedunculi partiales recurvati sunt, et Foliola extrema in cirrhos transeunt.

Varietas Fum. officinalis Gerard. at singulare, quod non obcurrat in Sueciae agris J. frutetis, ubi F. officinalis frequens.

* 27. FUMARIA parviflora.

- F. caule ramoso diffuso, siliquis globosis acutis monospermis, foliis subradecompositis, foliolis tripartitis linearibus caniculatis. *W.*

F. spicis laxis, siliquis monospermis globosis acuminatis, caule diffuso, foliolorum laciniis linearibus canaliculatis. *Smith brit.* 2. p. 750. *

F. siliculis globosis monospermis, foliis tenuissime divisis, laciniis ultimis angustis subfalcatis. *Lamarck encycl.* 2. p. 561. *

Fumaria spicata. β *Syst. nat. ed.* 13. p. 470.

F. foliis tenuissimis, floribus albis circa *Monspelium* nascens. *Vaill. paris.* 56. t. 10. f. 5.

F. minor tenuifolia, caulis procumbentibus et caducis. *Bauh. pin.* 194. *Morif. hist.* 2. f. 3. p. 261. t. 12. f. II.

Kleinblütiger Erdrauch. W.

Habitat in arvis Germaniae, Galliae, Angliae. ⊙
(v. f.)

28. FUMARIA *spicata.*

F. caule ramoso erecto, siliquis oblongis compressis monospermis, foliis supradecompositis, foliolis tripartitis filiformibus. W.

F. pericarpiis monospermis spicatis, caule erecto, foliis filiformibus. *Sp. pl.* 985. *Sauv. monsp.* 263. *Mill. dict. n.* 2.

F. tenuifolia erecta hispanica purpurea. *Barr. ic.* 41.

F. minor tenuifolia praecox, semine lini. *Morif. hist.* 2. p. 262. f. 3. t. 12. f. 13.

Capnos tenuifolia. *Clus. hist.* 2. p. 208.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 477.

Aehrentragender Erdrauch. W.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Veronae ad agros, vias. ⊙ (v. v.)

Spica ex flosculis arcte congestis est. Folia glauca. Flores vernalis.

Siliquae oblongae acute compressae, margine incrassatae. W.

29. FUMARIA *claviculata.*

F. caule ramoso scandente, siliquis oblongis compressis dispermis, foliis inferioribus biternatis, rameis simpli-citer ternatis cirrhosis. W.

F. siliquis linearibus, foliis cirriferis. Sp. pl. 985.
Mill. dict. n. 5. Flor. dan. t. 340. Hoffm. germ.
248. Roth. germ. I. 300. II. 155.

F. foliis cirriferis, floribus spicatis. Hort. cliff. 351.*
Roy. lugdb. 394. Gort. gelr. 413.

F. claviculis donata. Bauh. pin. 143. Moris. hist. 2.
p. 266. f. 3.t. 12.f. 3.

F. alba latifolia. Raj. angl. 3. p. 335.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 477.

Gabelntragender Erdrauch. W.

Habitat in Angliae locis uliginosis saxosis; in Dania.
 ⊙ (v. f.)

Cirrus foliorum terminalis.

Caulis semipedalis. Folia inferiora biternata; ramea ternata; foliolis ovatis indivisis submucronatis.
Ramorum apicis et Folia sunt cirrhosa. W.

30. FUMARIA vesicaria.

F. caule ramofo scandente, siliquis globosis inflatis reticulatis, petiolis cirrhosis. W.

F. siliquis globosis acutis inflatis, foliis cirriferis. Sp. pl. 985. Hort. upf. 207. Mill. dict. n. 10.

F. foliis cirriferis, siliquis ovatis inflatis pendulis. Hort. cliff. 351. Roy. lugdb. 394.

F. alba vesicaria, capreolis donata, sub exitum autumni florens, aethiopica. Pluk. alm. 400. t. 335. f. 3.

Cysticapnos africana scandens. Boerh. lugdb. 1. p. 310. t. 310.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 478.

Blasentragender Erdrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ⊙ (v.v.)

Foliorum Foliola terminalia protrahuntur in cirros.
Pedunculi oppositifolii floribus 1-4. Siliquae ovatae,
magnae, inflatae, pendulae, s. potius Siliquae lanceolatae,
tectae pericarpio baccato cavo.

O C T A N D R I A.

1313. P O L Y G A L A.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1154.

Cal. 5-phyllus: foliolis duobus alaeformibus, coloratis. *Legumen* obcordatum, biloculare.

* *Cristatae (floribus appendice penicilliformi.)*

1. POLYGALA *incarnata*.

P. floribus cristatis spicatis, caule herbaceo ramoso erecto, foliis alternis subulatis. *Sp. pl.* 986.

P. mariana, angustiori folio, flore purpureo. *Pluk. mant.* 153. *t.* 438. *f.* 5.

P. marilandica, foliis tenuissimis, spica parva compacta in summo caule flosculis carneis. *Rai. suppl.* 639.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. *p.* 479.

Fleischfarbene Polygala. W.

Habitat in Virginia, Canada. ⊙ (*v. s.*)

Caulis spithameus, *pedalis*, *erectus*, *filiformis*, *angulatus*. *Rami* communiter tres, in aliis summis, longi, angusti. *Folia* subulata, plana, acutissima, remota, saepius vix in caule octo. *Spicae terminales*, solitariae, oblongae, vividissime *incarnatae*; *Corolla*e, aliis calycinis triplo longiores, instructae Penicillo multifido, dilatato, *incarnato*, uti corollae *erecto*.

Folia parva adpressa sparsa rara. *Corollae angustae elongatae*. W.

2. POLYGALA *ajpalatha*.

P. floribus cristatis capitatis, caulis simplicissimis, foliis setaceis sparvis. *Mant.* 99.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. *p.* 480.

Witschenartige Polygala. W.

Habitat in Brasilia, Arduini. (*v. s.*)

Caules simplicissimi, subpedales. *Folia* sparsa, filiformia, acuminata, patentia, pollicaria: *superiora* breviora. *Flores* subcapitati, terminales: *pedicellis* longitudine florum. *Bracteae* subjectae singulis lanceo-

lato-subulatae, longitudine pedicelli, coloratae. Corolla alba, alis lanceolatis, carina penicillata. Facies Aspalathi.

3. POLYGALA brasiliensis.

P. floribus cristatis subspicatis, caulis simplicissimis, foliis lanceolatis sparsis. Mant. 99.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 480.

Brasilische Polygala. W.

Habitat in Brasilia (v. f.)

Caulis simplices, palmates; filiformes, prostrati: Ramo rarius laterali. Spica recta, terminalis, alba: Floribus brevissime pedicellatis, absque bracteis. Alae ovatae, obtuse; Carina penicillata. Capsulae seminibus solitariis. Pedunculus spicae elongatur deciduis inferioribus floribus, unde rachis denticulata.

4. POLYGALA trichosperma.

P. floribus cristatis spicatis, caulis virgatis striatis, foliis linearibus. Mant. 259.

P. floribus tuberistatis spicatis, foliis subulatis sparsis, seminibus aristis circumvallatis. Jacq. obs. 3. p. 16. t. 67.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 481.

Haarsame Poligala. W.

Habitat in regno Novae Granadae. 4

Radix perennat. Caulis erecti, striati, laeves, virgati. Folia sparsa, lanceolata-subulata, acuta, remota, glabra. Spicae terminales, oblongae, inferne denticulatae a casu florum. Florum carina absque crista, sed ejus loco apex multifariam scissus. Corolla minuta, alba. Seminum aristae deorsum spectantes, setaceae, numerosae.

5. POLYGALA amara.

P. floribus cristatis, racemosis, alis calycinis trinerviis obtusis corolla longioribus, caulis erectiusculis, foliis obtusis, radicalibus obovatis. W.

P. floribus cristatis racemosis, caulis erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. Sp. pl. 987. Jacq. vind. 262. Scop. carn. n. 868. Hoffm. germ. 249. Roth germ. I. 301. II. 156.

- P. procumbens, foliis imis subrotundis, supremis linearibus. *Hall. helv. n. 343.*
- P. (*amarella*) foliis circa radicem sparsis obovatis magnis. *Crantz austr. p. 438.*
- P. vulgaris, foliis circa radicem rotundioribus, flore coeruleo sapore admodum amaro. *Bauh. pin. 215.*
- P. buxi minoris folio. *Vaill. paris. 161. t. 32. f. 2.*
Houttuyn. Lin. Pfl. Syst. 8. p. 482.
- Bittere Poligala. W.
Habitat in Galliae, Germaniae, Austriae subalpinis montosis. 24 (v. v.)
- Filia P. vulgaris, sed Folia majora: radicalibus decuplo majora, caeterum nimis affinis.*
- Amaritie mox distinguitur a P. vulgari simili.

6. POLYGALA vulgaris.

- P. floribus cristatis racemosis, alis calycinis trinerviis obtusis longitudine corollae, caulibus procumbentibus, foliis linearis-lanceolatis acutiusculis. W.
- P. floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearis-lanceolatis. *Amoen. acad. 2. p. 136.* *Mill. dict. n. 1.* *Crantz austr. p. 437.* *Scop. carn. n. 867.* *Pollich pal. n. 664.* *Flor. dan. t. 516.* *Hoffm. germ. 249.* *Roth germ. I. 301. II. 157.*
- P. foliis linearis-lanceolatis, caulibus diffusis herbaceis. *Vir. cliff. 70.* *Hort. cliff. 352.* *Fl. suec. 586; 632.* *Roy. lugdb. 393.*
- P. caule erecto, foliis linearibus acutis. *Hall. helv. n. 344.*
- P. caulibus fructescensibus declinatis, floribus racemosis, cristatis, subsecundis: capsulis obcordatis. *Neck. gallob. p. 300.*
- P. major. *Bauh. pin. 215.*
- P. vulgaris major 2. *Clus. hist. 1. p. 325.* *Vaill. paris. 161. t. 32. f. 1.*
- β. P. vulgaris. *Bauh. pin. 215.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 486.
- Gemeine Polygala. W.
Habitat in Europae pratis, et pascuis siccis. 24 (v. v.)
- Apud nos nunquam fere erecta, sed procumbens.*

*7. POLYGALA major.

P. floribus cristatis racemosis, alis calycinis multinerviis obtusis mucronatis corolla brevioribus, caulis erectis, foliis linear-lanceolatis acutis. W.

P. (major) floribus cristatis racemosis, caulis herbaceis suberectis, foliis linear-lanceolatis. Murr. syst. veg. ed. 14. p. 638. Jacq. austr. 5. t. 413. Host. synop. 387.

P. orientalis linifolia, flore magno purpureo. Tournef. cor. 10. Buxb. cent. 3. p. 40. t. 70. f. L.

P. vulgaris major. I. Clus. hist. I. p. 324.

Grosse Polygala. W.

Habitat in Austriae, Pannoniae, Orientis pratis herbis. 24 (v.f.)

Simillima praecedenti, differt vero: caulis erectis longioribus, floribus duplo majoribus roseo-purpureis, alis calycinis magnis obtusis mucronatis multinerviis semper corolla brevioribus. W.

8. POLYGALA monspeliaca.

P. floribus cristatis racemosis, alis calycinis reticulatis acutis corolla longioribus, foliis linear-lanceolatis acutis. W.

P. floribus cristatis racemosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis. Sauv. monsp. 53. Mill. dict. n. 2.

P. annua erecta angustifolia, floribus coloris obsoleti carneis lineis virgatis. Magn. monsp. 208.

P. acutioribus foliis monspeliaca. Bauh. pin. 207.

P. vulgaris coloris obsoleti, foliis angustissimis. Bauh. hist. 3. p. 318. Raj. hist. 1336.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 488.

Französische Polygala. W.

Habitat Monspelii in collibus sterilibus. 24 (v.f.)

Varietas vulgaris secundum Gerard.

Simillis P. vulgari tamen abunde diversa: alis calycinis reticulato-venosis calyce longioribus acutis. In specimine meo flores sunt coerulei et racemus sub apice caulis egreditur. W.

* 9. POLYGALA rubella. W.

P. floribus cristatis racemosis ebracteatis, alis calycinis trinerviis obtusis corolla longioribus, caulis erectis, foliis caulinis linearibus obtusis radicalibus ovatis. W.

Röthliche Polygala. W.

Habitat in Pensylvania. 24 (v. f.)

Caules simplicissimi quadriunciales erecti plures ex una radice. Folia radicalia ovata parva petiolata; caulinis linearis obtusa sessilia. Racemus terminalis. Bracteae nullae, in speciebus 5. 6. 7. 8. vero tres ad basin eiususque pedunculi adsunt. Flores pallide rubri. Similis P. vulgari, sed defectu bractearum, alis calycinis corolla majoribus, flore minore, foliis caulinis linearibus, cauleque erecto diversa. W.

* 10. POLYGALA rosea.

P. floribus cristatis racemosis, alis calycinis nervoso-venosis obtusis corolla brevioribus, caule fruticoso, foliis obtusis superioribus linearibus, inferioribus lanceolatis. W.

P. (rosea) caule basi fruticoso virgato simplici, foliis lanceolatis, floribus laxe racemosis, corollis fimbriatis, Desf. atl. 2. p. 128. t. 179.*

Rosenrote Polygala. W.

Habitat in Atlante prope Tlemsem. 5 (v. f.)

Simillima P. majori, differt tamen: caule basi frutescente duplo majore, floribus majoribus, alis calycinis nervoso-venosis. W.

* 11. POLYGALA andrachnoides. W.

P. floribus cristatis racemosis, alis calycinis trinerviis obtusis corolla longioribus, caulis ramosus procumbentibus, foliis obovatis subretulatis. W.

P. (supina) floribus cristatis racemosis, caulis procumbentibus ramosus, foliis ovalibus. Schreb. dec. p. 19. t. 10.*

P. orientalis supina myrtifolia, fiore coeruleo et purpureo. Tournef. cor. 10. Buxb. cent. 3. p. 40. t. 70. f. 2.

Andrachneartige Polygala. W.

Habitat in Armeniae glareosis inque Tauriae montosis. 24 (v. f.)

Caules digitales ramosi procumbentes. Folia obovata obtusa, inferiora minora retusa. Racemi terminales 8-12-flori. Folia in iconē Schreberei sunt oblonga acuta, in planta nostra vero semper obtusa et retusa. W.

* 12. POLYGALA *oxyccoides*.

P. floribus cristatis umbellato-racemosis, alis calycinis venosis ovatis longitudine corollae, caule ramulo fruticoso procumbente, foliis ellipticis obtusis. W.

P. (oxyccoides) caule fruticoso procumbente, foliis ellipticis obtusis crassiusculis. Desf. atl. 2. p. 127. t. 174.*

Moosbeerenartige Polygala. W.

Habitat in Atlantis fissuris rupium. 3 (v. f.)

Folia crassiuscula elliptica obtusa obsolete mucronata. Racemi terminales quadri vel-quinqueflori. Affinis praecedenti. W.

* 13. POLYGALA *telephioides*. W.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus, caule simplici erecto, foliis oblongis obtusis basi attenuatis. W.

Telephienartige Polygala. W.

Habitat in India orientali. 3 (v. f.)

Caulis simplicissimus erectus spithameus. Folia alterna, inferiora minora et angustiora, superiora oblonga obtusa brevissime mucronata, basi attenuata. Racemi axillares foliis duplo breviores. Flores virides. Capsula obcordata margine ciliata. Habitu P. ciliatae similis. W.

* 14. POLYGALA *arvensis*. W.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus folio longioribus, caulis procumbentibus, foliis obovatis mucronatis. W.

Acker Polygala. W.

Habitat in India orientali. 24 (v. f.)

Caules plures digitales basi ramosi procumbentes hirti ex una radice. Folia obovata trilinearia obtusa mucronata hirta. Racemi axillares simplices vel ra-

mosi semiunciales et longiores. Flores parvi virides subsessiles. W.

* 15. POLYGALA linearifolia. W.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus paucifloris, caule ramoso virgato erecto, foliis linearibus strictis. W. Schmalblättrige Polygala. W.

Habitat in insula Mindanao. (v. f.)

Caulis ut videtur herbaceus erectus sesquipedalis ramosus, ramis virgatis. Folia sesquiuncialia linearia angusta acutiuscula submucronata margine revoluta brevissime petiolata stricta. Racemi axillares foliis multo breviores sex- vel octoflori. Capitula obcordata margine ciliata. W.

* 16. POLYGALA thesioides. W.

P. floribus cristatis, racemis terminalibus multifloris, caulis erectis superne ramosis, foliis linearibus confertis. W.

P. coerulea angustis et densioribus foliis. *Feuill. peruv.*

I. t. 13.

Thesiumartige Polygala. W.

Habitat in Monte Video in Brasilia. (v. f.)

Caules spithamei erecti inferne simplices apice ramosi, ramis simplicibus erectis. Folia conferta linearia semiuncialia acutiuscula angusta, margine scabriusculta patentia, brevissime petiolata. Racemi terminales unciales erecti multiflori. Flores conferti coerulei. W.

17. POLYGALA paniculata.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus longissime pendulatis, caulis erectis superne ramosis, foliis linearibus acutis. W.

P. floribus cristatis, racemis nudis, caulis herbaceis erectis superne ramosis, foliis linearibus. *Amoen. acad. 5. p. 402. * Swartz obj. 272. t. 6. f. 2. **

P. herbacea minor erecta, foliis linearibus, spica multiplex terminali foliosa. *Brown jam. 287.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 489.

Rispentengliche Polygala. W.

Habitat in Jamaicæ, Hispaniolæ et Panamæ umbrosis ad rivos. ♂ (v. f.)

* 18. POLYGALA *tenella*. W.

P. floribus cristatis, racemis terminalibus longissime pedunculatis, caulis erectis superne ramosis, foliis linearibus ovatis mucronatis. W.

Zarte Polygala. W.

Habitat in Panama. ♂ (v. f.)

Caulis erecti paniculati laeves. Folia linearia acuta mucronata. Racemi terminales longissime pedunculati. Flores parvi incarnati. Capsulae subrotundæ emarginatae. Semina pilosa. Simillima praecedenti, differt vero: habitu teneriori, foliis angustioribus mucronatis, racemis terminalibus, et capsulis subrotundis emarginatis nec lanceolato-ovatis emarginatis. W.

* 19. POLYGALA *fulcata*. W.

P. floribus cristatis, racemis terminalibus pedunculatis, caulis erectis fulcatis superne ramosis, foliis linearibus adpressis. W.

Gefurchte Polygala. W.

Habitat in Monte Video in Brasilia. ♂ (v. f.)

Caulis sesquipedalis erectus fulcatus apice ramosus, ramis virgatis. Folia linearia mucronata adpressa vix semiuncinata, ramea remota brevissima subulata. Racemi terminales pedunculati. Flores violacei. Differt a binis praecedentibus caule fulcato, foliis rameis brevissimis, floribus duplo majoribus. W.

* 20. POLYGALA *gnidioides*. W.

P. floribus cristatis, racemis terminalibus paucifloris, caulis fruticosis ramosis diffusis, foliis linearibus obtutis. W.

Guidienartige Polygala. W.

Habitat in Chili in alpibus. ♂ (v. f.)

Frutex parvus facie Guidiae vel Passerinae, ramis digitalibus. Folia sessilia linearia 4 lineas longa angusta obtusa. Flores parvi virescentes in racemo terminali tri-vel quadrifloro sessili. W.

21. POLYGALA *sibirica*.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus pedunculatis, caulis basi subramosis, foliis lanceolatis. W.

P. floribus cristatis, racemo laterali nudo, caulis herbaceis, foliis lanceolatis. Sp. pl. 987. Gmel. sib. 4. p. 64. t. 32.

P. multicaulis longius radicata floribus ex foliorum alis. Amm. ruth. p. 33. n. 43.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 489.

Sibirische Polygala. W.

Habitat in Siberia. 24 D. Gmelin. (v. f.)

Folia inferiora ovata; superiora lanceolata. Racemus unus (raro duo), lateralis, laxus, absque bracteis, ad exortum pedicellorum partialium.

*22. POLYGALA *tenuifolia*. W.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus pedunculatis, caulis basi ramosis, foliis linearibus mucronatis. W.

P. multicaulis angustissimis foliis, floribus corneis. Amm. ruth. p. 34. n. 44.

3. P. ramosa angusto praelongo folio, flore coeruleo pulcherrime fimbriata. Amm. ruth. p. 34. n. 45.

Dünnbärtige Polygala. W.

Habitat in Siberia. 24 (v. f.)

Simillima praecedenti, differt: foliis angustissimis linearibus mucronatis, alisque calycinis obtusis, nec ut in P. sibirica mucronatis. Vix varietas ob habatum diversissimum. W.

*23. POLYGALA *elongata*.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus, caule basi ramoso, foliis linearibus obtusis mucronatis margine ciliatis. W.

Polygala elongata. Klein in litt.

Verlängerte Polygala. W.

Habitat in India orientali prope Hyderabad. ○ (v. f.)

Caulis spithameus basi ramosus erectus, ramis simplicibus. Folia linearia basi in petiolum attenuata obtusa mucronata, margine sub lente adspelta, tenuisime ciliata. Racemi biunciales valde elongati axillares. W.

*24. POLYGALA *cinearia*. W.

P. floribus cristatis, racemis terminalibus, caule erecto ramoso, foliis lanceolatis cinereo-hirsutis. W.

P. (*violacea*) floribus cristatis, foliis hirsutis lanceolatis. *Aubl. guj. 2. p. 735. t. 294.**

Grane Polygala. W.

Habitat in pratis Gujanæ et Cajennæ. ○

*25. POLYGALA *paucifolia*. W.

P. floribus cristatis terminalibus ternis, caulis simplissimis erectis inferne nudis, foliis ovatis. W.

Polygala pauciflora. *Mühlenb. in litt.*

Armblättrige Polygala. W.

Habitat in Pensylvania. 2. (v. f.)

Radix alba filiformis repens. Caules erecti simplissimi digitales, inferne aphylli squamis tribus remotis ovatis parvis adpresso, apice foliis tribus ovatis acutis semiuncialibus membranaceis muniti. Flores purpurei tres in apice caulis magnitudine P. myrtifoliae. W.

*26. POLYGALA *arenaria*. W.

P. floribus cristatis, spicis axillaribus ellipticis imbricatis, caule procumbente, foliis lanceolatis obtusis pubescentibus. W.

Sand Polygala. W.

Habitat in Guinea. ○ (v. f.)

Radix filiformis simplicissima perpendicularis. Caulis basi ramosus procumbens, ramis apice adscendentibus pubescentibus. Folia oblongo-lanceolata obtusa, brevissime petiolata, pubescentia. Spicae brevissime pedunculatae axillares ellipticae obtusae crassae, floribus reflexis imbricatis. W.

*27. POLYGALA *lupulina*. W.

P. floribus cristatis, spicis terminalibus cylindraceis imbricatis, caule erecto ramoso, foliis oblongis acutis. W.

P. (*Timoutou*) floribus cristatis purpurascenscentibus, foliis lanceolatis. *Aubl. guj. 2. p. 737. t. 295.**

Hopfenartige Polygala. W.

Habitat in pratis paludosis Gujanæ. ○

Spicae

Spicae ut in praecedente sed longiores cylindra-
ceae, W.

*28. POLYGALA japonica.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus, caule erecto her-
 baceo, foliis inferioribus subrotundis obtusis, superio-
 ribus ovatis acutis. W.

Polygala japonica. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 488.*
t. 62. f. 1.

Japanische Polygala. W.

Habitat in Japonia.

29. POLYGALA bracteolata.

P. floribus cristatis, racemis terminalibus, alis calycinis
 cuspidatis multinerviis, caule erecto fruticoso, foliis
 linearis-lanceolatis glabris. W.

P. floribus cristatis racemosis, bracteis triphyllis, foliis
 linearis-lanceolatis, caule fruticoso. *Sp. pl. 987. Berg.*
cap. 182. Buxb. cent. 3. p. 41. t. 71.

P. floribus cristatis racemosis, bracteis triphyllis, foliis
 linearis-lanceolatis. *Thunb. prod. cap. 120.*

P. floribus cristatis racemosis, carina cristis longiore,
 caule suffruticoso, foliis linearis-lanceolatis. *Amoen.*
acad. 2. p. 137.

P. africana glabra, florum galea binis cristis fimbriatis
 ornata, ex involucro magno dipetalo erumpente
Pluck. alm. 300. t. 53. f. 2.

P. frutescens angustifolia ramosa, floribus in summita-
 te velut umbellatis. *Raj. suppl. 640.*

β. P. floribus cristatis racemosis: carina cristis breviore, cau-
 le suffruticoso, foliis linearis-subulatis. *Amoen. acad.*
2. p. 137.

P. foliis linearis-subulatis. *Hort. cliff. 353.*

P. frutescens, foliis linearibus, flore majore purpureo.
Burm. afric. 202. t. 73. f. 2.

γ. P. floribus cristatis alternis, caule erecto suffruticoso ra-
 moso, foliis linearibus obtusis scabris. *Amoen. acad. 2.*
p. 138.

P. folio linearis-obtuso, flore albente minimo. *Burm.*
afric. 204. t. 73. f. 4.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 172.

Beblätterte Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Bracteae in plerisque Polygalis sunt triphyllae. Variat haec. species forma foliorum. W.

*30. POLYGALA cernua. +

P. floribus cristatis racemosis, foliis lanceolatis glabris.
Thunb. prod. 120.

Hängende Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

Quomodo sit a praecedente diversa, me penitus fugit. W.

31. POLYGALA teretifolia.

P. floribus cristatis, racemis terminalibus paucifloris,
alis calycinis ovatis acutiusculis multinerviis, caule fru-
ticoso, foliis linearis - subulatis. W.

P. floribus cristatis, foliis filiformibus. Thunb. prod.
120.

P. floribus cristatis lateralibus, caule fruticoso ramoso,
foliis filiformibus falcatis. Lin. suppl. 316.

β P. floribus cristatis racemosis, caule erecto fuffruticoso
simplicissimo, foliis subulatis. Amoen. acad. 2.
p. 137.

P. aethiopica angustis hirsutis foliis, flore obsolete pur-
pureo. Pluk. mant. 153. t. 440. f. 6.

P. foliis linearibus acutis, flore purpleo minore. Burm.
afr. 203. t. 73. f. 3. Breyn. cent. t. 49.

Fichtenblättrige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. v.)

Caulis fruticosus ramosus, ramuli tomentoso - pubes-
centes. Folia linearis - subulata incurvata. Racemus
terminalis pauciflorus. Planta sub β notata potius
huc, quam ad P. bracteolatam pertinet, vel species
est diversissima. W.

*32. POLYGALA guineensis. W.

P. floribus cristatis, racemis axillaribus secundis, caule
ramoso herbaceo, foliis filiformibus. W.

Guineensische Polygala. W.

Habitat in Guinea. (v. f.)

Caulis ramosus herbaceus. Folia filiformia erecta acuta uncialia. Racemi bi-triunciales, floribus parvis nutantibus secundis. W.

*33. POLYGALA *saxatilis*.

P. *floribus cristatis, racemis subterminalibus paucifloris, caule fruticoso decumbente, foliis oblongo-lanceolatis mucronatis.* W.

P. (*saxatilis*) *caule fruticoso decumbente, ramulis pubescentibus, foliis lanceolatis acutis, floribus capitato-racemosis.* Desf. atl. 2. p. 128. t. 175.*

Stein Polygala. W.

Habitat in fissuris rupium Atlantis. ♂ (v. f.)

Frutex parvus decumbens, ramis pubescentibus. Folia oblongo-lanceolata coriacea mucronata. Racemi trivel quadriflori plerumque terminales quandoque axillares. Alae calycinae ellipticae acutae nervoso-venosae, medio linea lata viridi notatae. W.

34. POLYGALA *umbellata*.

P. *floribus cristatis, racemis axillaribus in apice caulis confertis, foliis linearibus subciliatis.* W.

P. *floribus cristatis subumbellatis, foliis linearibus subciliatis.* Maut. 259.

P. *floribus cristatis axillaribus, foliis lanceolatis villosis.* Thunb. prod. 120.

P. *foliis oblongis acutis, flore purpureo latiore.* Burm. afr. 204. t. 73. f. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 174.

Doldentragende Polygala. W.

Habitat in Cap. B. spei montibus. ♂ (v. f.)

Caulis vix suffruticosus, spithameus, subramosus, erectus. Folia sparsa, linearia, acuta, erecta, vix manifeste ciliata. Flores terminales, subumbellati, copiosi. Pedunculi filiformes, uniflori, laeves, subaequales. Petala calycina ovata, acuta. Affinis P. bracteolatae.

*35. POLYGALA *virgata*. †

P. *floribus cristatis racemosis, bracteis triphyllis, foliis obovato-oblongis.* Thunb. prod. 120.

Rutenförmige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*36. POLYGALA amoena. †

P. floribus cristatis lateralibus, foliis obovatis obtusis glabris. *Thunb. prod. 120.*

Liebliche Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

37. POLYGALA myrtifolia.

P. floribus cristatis, racemis paucifloris terminalibus, carina falcata, caule fruticoso, foliis oblongis obiusculis glabris. W.

P. floribus cristatis carina lunulata, caule fruticoso, foliis laevibus oblongis obtusis. *Amoen. acad. 2. p. 138.*

*Mill. dict. n. 3. et illustr. syst. Jacq. fragm. 1. p. 18.**

P. floribus cristatis lateralibus, foliis ovato-oblongis acutis glabris. *Thunb. prod. 120.*

P. foliis lanceolatis obtusis, caule frutescente. *Hort. cliff. 353.*

P. arborea myrtifolia, floribus albis: intus purpureis. *Comm. hort. 1. p. 87. t. 46. Raj. Suppl. 640.*

P. arborea myrtilli subrotundis foliis, fructu magno tor-dylii. *Pluck. mant. 153. t. 437. f. 4.*

P. frutescens, foliis oblongis glabris, flore purpureo. *Burm. afr. 200. t. 73. f. 1.*

P. frutescens, folio buxi, flore maximo. *Tournef. inst. 175. R.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 174.

Myrtenblättrige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. v.)

*38. POLYGALA tinctoria.

P. villosis, floribus cristatis, bracteis triphyllis, foliis obovatis, caule fruticoso. *Vahl. symb. 1. p. 50.**

P. (bracteolata) foliis alternis obovato-cuneatis integris subvillois pollicaribus. *Forsk. desc. 213.**

Färbende Polygala. W.

Habitat in montibus Hadie Arabiae felicis. ৎ

Tota planta villosa. Maxime affinis P. myrtifoliae, differt: figura foliorum, villostate, floribus duplo

minoribus, alis rotundatis, non vero ovato-rhomboidalibus acutis. Vahl. l. c.

39. POLYGALA oppositifolia.

P. floribus cristatis, caule fruticoso, foliis oppositis ovatis acutis. Mant. 259.

P. floribus cristatis racemoso-terminalibus, foliis ovatis mucronatis. Thunb. prod. 120.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 175.

Paarblättrige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei, in montosis, Augusto florens. ḥ

Frutex bipedalis, superne ramosus: Ramis alternis, erectis, absque cicatricibus. Folia opposita, sessilia, ovata, acuta, integerrima, glabra. Racemi terminales, breves. Petala calycina subcordata, rubra, magna. Capsula (*Thlaspeos*) compressa, orbiculata, emarginata, marginata. *Affinis* P. myrtifoliae; *Folia Penaeae.*

* 40. POLYGALA cordifolia.

P. floribus cristatis, racemo terminali, caule fruticoso, ramis pubescens, foliis cordatis mucronatis oppositis. W.

P. (*cordifolia*) floribus cristatis, foliis cordatis glabris. Thunb. prod. 120.

P. (*fruticosa*) floribus cristatis subumbellatis, foliis oppositis cordato-lanceolatis acutis, caule fruticoso. Berg. cap. 183.

Herzblättrige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. v.)

Rami longi virgati pubescentes. Folia cordata acuminata mucronata opposita. Racemi pauciflori terminalis. W.

* 41. POLYGALA tomentosa.

P. floribus cristatis verticillatis, foliis cordatis subtus tomentosis. Thunb. prod. 120.

Filzige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

42. POLYGALA *spinosa*.

P. floribus cristatis axillaribus solitariis, caule fruticoso spinoso, foliis ovalibus obtusis mucronatis. W.

P. floribus cristatis lateralibus, caule spinoso fruticoso, foliis ovalibus mucronatis. Mant. 437.

P. floribus imberbibus lateralibus, caule arboreo spinoso, foliis ovalibus mucronatis. Amoen. acad. 2. p. 141.* Spec. pl. 2. p. 989.

P. floribus cristatis lateralibus, ramis spinescentibus, foliis oblongis mucronatis. Thunb. prod. 120.

β P. foliis lanceolato-linearibus glabris acutis, ramis ramicisque florigeris. Ait. Kew. 3. p. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 175.

Stachliche Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Frutex validus: Ramis spina robusta terminatis.

Flores axillares, sessiles, parvi, albi carina rubra.

Fructus Bacca esculenta. D. Tulbagh.

* * Imberbes (flores absque penicillo carinali) frutescentes.

43. POLYGALA *theezans*.

P. floribus imberbibus, pedunculis unifloris, caule fruticoso, foliis alternis lanceolatis. Mant. 260. Burm. ind. 154.

P. frutescens, lavendulae folio viridi, flore coeruleo. Burm. zeyl. 195. t. 85.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 176.

Theegebende Polygala. W.

Habitat in Japonia, Java. ৎ

Caulis inferne albus, ut in Betula.

44. POLYGALA *Penaea*.

P. floribus imberbibus lateralibus solitariis, caule arboreo, foliis obtusis petiolatis. Amoen. acad. 2. p. 140.

Penaea arborescens, buxi folio aspero. Plum. Spec. 22. ic. 214. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 176.

Buxbaumartige Polygala. W.

Habitat in America meridionali. 5

45. POLYGALA *diversifolia*.

P. floribus imberbibus, racemis axillaribus petiolo longioribus, caule arboreo, foliis oblongis acuminatis. W.

P. floribus imberbibus racemosis, caule arboreo, foliis senioribus oblongo-ovatis, recentibus subovatis. *Amoen. acad. 2. p. 140. Swartz obs. 273.**

P. foliis ramorum proiectiorum oblongo-ovatis, tenuellorum subovatis, caule arboreo. *Hort. cliff. 353. **

P. fruticosa, foliis glabris, ovatis capsulis subrotundis emarginatis, racemis minoribus laxis alaribus. *Brown jam. 287. t. 5. f. 3. 4.*

Genistae affinis flore coluteae anonyma arbor buxi folio. *Sloan. jam. 141. hist. 2. p. 32. t. 170. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 177.

Verschiedenblättrige Polygala. W.

Habitat in America calidore. 5

*46. POLYGALA *acuminata*. W.

P. floribus imberbibus, racemis lateralibus oppositifoliis foliis longioribus, caule fruticoso, foliis oblongis acuminatis. W.

Zugespitzte Polygala. W.

Habitat in Nova Hispania. 5 (v. f.)

Caulis fruticosus, ramis subangulatis. Folia sesqui-pollucaria alterna petiolata oblonga subovata acuminata. Racemi biunciales et ultra foliis longiores, laterales foliis oppositi. Simillis P. diversifoliae differt tantum, racemis foliis longioribus et oppositi foliis. W.

47. POLYGALA *aestuans*.

P. floribus imberbibus racemosis, foliis lanceolatis petiolatis, caule fruticoso. *Lin. suppl. 315.*

Warme Polygala. W.

Habitat in Nova Granada. *Mutis.* 5

Caulis fruticulosus substriatus. Folia alterna distincta petiolata lanceolata avenia nuda pollicaria, petiolo quasi inarticulata. Racemi terminales duo s. tres foliis saepe longiores. Corollae vexillum coeruleum. Capsulae ovatae rugosae pendulae purae biloculares. Semina solitaria.

* 48. POLYGALA mucronata.

P. floribus imberbibus, racemis terminalibus, caule fruticoso, ramis pilosis, foliis lanceolatis mucronatis subtus pubescentibus. W.

Spitzige Polygala. W.

Habitat in America meridionali. t̄ (v. f.)

Rami valde pilosi. Folia alterna petiolata oblongo-lanceolata sesquiancialia mucronata obsolete ramosa, subtus pubescentia. Racemi terminales bini vel tres folio longiores, floribus coeruleis. Fructus mihi ignotus. Affinis videtur praecedenti, sed rami pilosi, et folia evidenter mucronata subtus pubescentia. W.

* 49. POLYGALA violacea.

P. floribus imberbibus, racemis terminalibus lateraliibusque, caule fruticoso, ramis pubescentibus, foliis oblongis obtusis subtus pubescentibus. W.

*P. floribus imberbibus racemosis lateralibus terminalibusque, caule fruticoso piloso, foliis oblongis Vahl symb. 2 p. 79.**

Violette Polygala. W.

Habitat in Cajenna. t̄ (v. f.)

Rami piloso-pubescentes. Folia oblonga obtusa venosa uncialia subtus pubescentia. Racemi terminales vel laterales oppositifolii tri-vel quadriunciales, floribus nutantibus. Differt a praecedenti: ramis minus pilosis, foliis oblongis obtusis multo minoribus evidenter venosis non mucronatis, floribus majoribus nutantibus, denique racemis lateralibus oppositi foliis. W.

50. POLYGALA microphilla.

P. floribus imberbibus racemosis, caulis fruticosis, foliis minutissimis ellipticis. Sp. pl. 989.

P. (*microphylla*) floribus imberbibus racemosis, foliis ovatis inermibus. *Thumb. prod.* 121.?

P. lusitanica frutescens, magno flore, foliis minimis. *Tournef. inst.* 175.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 177.

Kleinblättrige Polygala. W.

Habitat in Lusitania, Hispania. Alstroemer. 5

Caules fruticosi, virgati, pedales, filiformes, virides, dentati basibus foliorum deciduorum. Folia omnium minutissima, alterna, remota, sessilia, subulata s. elliptica, caduca. Racemi terminales, breves. Flores majusculi.

51. POLYGALA chinensis.

P. floribus imberbibus spicatis axillaribus, caulis suffruticosis, foliis ovalibus. *Sp. pl.* 989.

P. arborea, foliis lanceolato-ovatis, capsulis compressis bilobis ultra medietatem divisis. *Brown jam.* 287.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 178.

Chinesische Polygala. W.

Habitat in India. 5

Caules pedales, decumbentes, lignosi, non glabri. Folia ovalia, integerrima, magnitudine extimi pollicis, subpetiolata, nuda, obtusa cum mucrone. Rami laterales, rarissimi. Spicae laterales, foliis saepe longiores, virides.

* 52. POLYGALA myrtilloides. W.

P. floribus imberbibus, racemis oppositifoliis, caule fruticoso procumbente, foliis subrotundo-ovatis reticulato-venosis. W.

Heidelbeerblättrige Polygala. W.

Habitat in America australi. 5 (v. f.)

Frutex parvus, ramis procumbentibus, facie Vaccinii Vitis Ideae. Folia rigida subrotundo-ovata obtusa glabra reticulato-venosa. Racemi oppositifoliis foliis longiores. Capsulae subrotundae emarginatae ciliatae. W.

53. POLYGALA *Chamaebuxus*.

P. floribus imberbibus, pedunculis terminalibus axillaribusque subbifloris, caule fruticoso, foliis oblongo-lanceolatis acutis. W.

P. floribus imberbibus sparsis: carina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis. *Amoen. acad.* 2. p. 140. *Jacq. vind.* 126. *avstr. t.* 233. *Mill. dict.* n. 4. *Nov. Act. A. N. C. IV. app.* 13. *Hoffm. germ.* 249. *Roth. germ. I.* 382. *II.* 158.

Polygaloides procumbens, foliis duris, ovatis, nervo aristato. *Hall. helv.* n. 345.

Chamaebuxus flore coluteae. *Bauh. pin.* 471.

Anonymos flore coluteae. *Clus. hist.* I. p. 105. *bona. Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 178.

Oestreichische Polygala. W.

Habitat in Austriae, Helvetiae, Alsatiae montanis. Etiam in Germania. ♂ (v. v.)

*54. POLYGALA *thymifolia*.

P. floribus imberbibus pedunculis solitariis axillaribus foliis fasciculatis oblongo-lanceolatis mucronatis denticulatis glabris. W.

P. floribus imberbibus lateralibus solitariis, foliis fasciculatis oblongis mucronatis glabris. *Thunb. prod.* 121. Thymianblättrige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

Frutex ramis divaricatis. Folia parva conferta fasciculata rigida margine tenuissime denticulata, glabra carinata. Facies ceterum sequentis. W.

55. POLYGALA *alopecuroides*.

P. floribus imberbibus, pedunculis solitariis axillaribus foliis fasciculatis ovatis mucronatis margine ciliatis. W.

P. floribus imberbibus sessilibus, foliis confertis ovatis acutis, carinatis pilosis. *Mant.* 260.

P. floribus imberbibus lateralibus, foliis fasciculatis lanceolatis mucronatis villosis. *Thunb. prod.* 121.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 179.

Fuchschwanzartige Polygala. W.

Habitat in Cap. b. spei montibus. ♂ (v. f.)

Caulis fruticosus, procumbens, ramosus: Ramis tectis foliis floribusque. Folia confertissima, ad singula puncta 3 s. 5, sessilia, ovata, acuta, carinata, herbacea (nec rigida), subtus margineque pilosa. Flores inter folia, sessiles, folio breviores. Calyx glumosus, glaber, P. Heisteriae.

56. POLYGALA Heisteria.

P. floribus imberbibus lateralibus, caule arborecente, foliis triquetris mucronato-spinosis. Sp. pl. 989.
 P. floribus imberbibus lateralibus, foliis fasciculatis trigonis reflexis mucronato-spinosis. Thumb. prod. 121.

Thymbra capensis, nepetae theophrasti foliis aculeatis, flore parvo purpureo. Pluk. alm. 366. t. 229 f. 5.

Heisteria. Hort. cliff. 352. * Roy. lugdb. 393.

Heisteria pungens. Berg. cap. 185.

Thymbra africana, foliis spinosis. Barth. alt. 1673. p. 57.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 180.

Heisterische Polygala. W.

Habitat in Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Polymorpha planta: Tenera ab adulta facie diversissima: α) Foliis ovatis margine carinaque ciliatis — β) Foliis linearibus scabris — γ) Foliis subulatis spinosis. — Fructus quadricornis. Berg.

57. POLYGALA mixta.

P. floribus imberbibus sessilibus, foliis teretibus mucronatis confertissimis. Lin. suppl. 316.

P. floribus imberbibus lateralibus, foliis fasciculatis trigonis erectis mucronato-spinosis. Thumb.-prod. 121.

Gemischte Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Frutex adeo similis P. alopecuroidi ut nihil similis, sed folia omnino P. Heisteriae teretia confertissima mucronata laevia nec ovato-lanceolata s. ciliata s. plana. Flores similes P. alopecuroidi nec P. Heisteriae.

* 58. POLYGALA *phylicoides*.

P. floribus imberbibus axillaribus, foliis alternis linearilanceolatis mucronatis subtus pubescentibus, margine revolutis. W.

P. floribus imberbibus, foliis convolutis trigonis pubescentibus, caule fruticoso. Thunb. prod. 121.

Phylicaartige Polygala. W

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Ramu'i pubescentes. Flores solitarii axillares ad ramorum apices. W.

* 59. POLYGALA *filiformis*. +

P. floribus imberbibus lateralibus, foliis solitariis trigonis mucronatis. Thunb. prod. 121.

Fadenförmige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

* 60. POLYGALA *micrantha*.

P. floribus imberbibus axillari-sessilibus, foliis linearibus mucronatis. Thunb. prod. 121.

Kleinblumige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

61. POLYGALA *stipulacea*,

P. floribus imberbibus lateralibus, caule suffruticoso, foliis ternis linearibus acutis. Mant. 260. Burm. prod. 20.

P. floribus imberbibus lateralibus, foliis solitariis filiformibus mucronatis glabris. Thunb. prod. 121.

Heisteria mitior. Berg. cap. 187.

Spartium africanum frutescens, ericae folio. Comm. hort. 2. p. 193. t. 97.

Suffrutex ericae forma, flore rubro elegantissimo. Seb. mus. 2. p. 63. t. 62. f. 8.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 180.

Dreiblättrige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Filia P. Heisteriae, suffruticosa, filiformis. Folia sessilia, ternata, linearis subulata, planiuscula, mucronata; intermedio longiori. Calyx glumosus P. Heisteriae, nec in petala enatus. Fructus in hoc genere

diversus saepe est in diversis speciebus; hujus vero nimis affinis P. Heisteriae, cuius olim filia.

Folia inferiora saepius alterna, superiora plerumque terna. W.

*62. POLYGALA *striata.* †

P. floribus imberibus lateralibus, foliis subteretibus inermibus. Thunb. prod. 121.

Gestreifte Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*63. POLYGALA *pauciflora.* †

P. floribus imberibus axillaribus pedunculatis, foliis linearibus mucronatis. Thunb. prod. 121.

Wenigblütige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*64. POLYGALA *laxa.*

P. floribus imberibus racemosis, foliis solitariis lanceolatis mucronatis. Thunb. prod. 121.

Schlaffe Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

65. POLYGALA *squarrofa.*

P. floribus imberibus, caule fruticoso, foliis aggregatis lanceolatis patulis. Lin. suppl. 315.

P. floribus imberibus, foliis fasciculatis lanceolatis recurvis. Thunb. prod. 121.

Sparrige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. § (v. f.).

Caulis frutescens virgatus. Gemmae alternae e singulis setis. Folia numerosa lanceolata sessilia pandentia f. reflexa unguicularia, rigidula u. Androsaces. Flos e rosulis foliaceis, saepe solitarius, purpurascens ut P. Heisteriae.

Folia mucronata inferiora reflexa superiora patentissima. W.

66. POLYGALA *trinervia*.

P. floribus imberibus, pedunculis, unifloris, foliis alternis cordatis cuspidatis trinerviis, caule fruticoso angulato. *Lin. suppl.* 315.

P. floribus imberibus axillaribus solitariis, foliis ovatis mucronatis glabris, ramis angulatis. *Thunb. prod.* 121.

Dreynervige Polygala. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Caulis fruticosus viridis angulatus laevis ramosus altus. Folia sessilia alterna cordata subtus nervosa acuta parva. Pedunculi axillares setacei uniflori. Fores parvi absque crista. Capsulae oblongae apice bicornes.

* * * *Imberbes: herbaceae, caule simplicissimo.*

67. POLYGALA *Senega*.

P. floribus imberibus, spica terminali filiformi, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis oblongo-lanceolatis. W.

P. floribus imberibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lanceolatis. *Amoen. acad.* 2. p. 139. t. 2.* *Mat. med.* 169. *Mill. dict. tom. 3.* t. 5. *Gron. virg.* 103.

P. caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis alternis integerrimis, racemo terminali erecto. *Gron. virg.* 1. p. 80.*

Plantula marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari e flosculis albis composta. *Raj. suppl.* 640.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 490.

Giftwiderstehende Polygala. W.

Habitat in Virginia, Pensylvania, Marilandia. 24 (v. f.)

68. POLYGALA *lutea*.

P. floribus imberibus, racemo cylindraceo-capitato terminali, caule simplicissimo herbaceo, foliis oblongo-lanceolatis acutis. W.

P. floribus imberbibus oblogo - capitatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis acutis. *Amoen. acad. 2. p. 140.*

P. floridana lutea, floribus in capitulum congestis. *Pluk. amalh. 175. t. 438. f. 6.*

Polygala f. Flos Amberualis floribus luteis in capitulum oblongum congestis. *Pluk. alm. 301. Raj. suppl. 639.*

P. virginiana, flore luteo capitato. *Pet. sicc. 58.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 494.

Gelbe Polygala. W.

Habitat in Virginia. ○ (v. f.)

69. POLYGALA virideſcens.

P. floribus imberbibus globoſo - capitatis terminalibus, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis linearibus obtusiusculis. W.

P. floribus imberbibus globoſo capitatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis obtusiusculis. *Amoen. acad. 2. p. 140. Gron. virg. 104.*

P. foliis lanceolatis alternis, caule simplicissimo, corymbo terminali capitato. *Gron. virg. 1. p. 80?*

P. rubra virginiana, spica parva compacta. *Pluk. alm. 300.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 494.

Grünliche Polygala. W.

Habitat in Virginia. ○ (v. f.)

Caulis spithameus f. pedalis, angulatus, absque ramis, erectus. Folia alterna, linearia f. lineari-lanceolata, laevia, integerrima. Capitulum terminale, subglobosum, ex albo viride, cum obsolete rubri mixtura in alis florum.

70. POLYGALA triflora.

P. floribus imberbibus, pedunculis subtrifloris, caule herbaceo erecto, foliis linearibus alternis. *Fl. zeyl. 269.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 495.

Dreyblumige Polygala. W.

Habitat in Zeylona. ○

71. POLYGALA *glaucoides*.

P. floribus imberbibus, pedunculis multifloris laterali-
bus, caulis diffusis herbaceis, foliis lanceolatis
mucronatis. W.

P. floribus imberbibus, pedunculis multifloris laterali-
bus, caulis diffusis herbaceis, foliis acutis. Fl.
zeyl. 270.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 496.

Milchkrantartige Polygala. W.

Habitat in Zeylona inque Philippinis. 24 (v. f.)

Caules simplices plures ex una radice procumbentes
et adscendentibus. Folia oblonga obtusa mucronata. Pe-
dunculi uniflori axillares vel racemosi oppositifolii.
Variat foliis inferioribus oblongis, superioribus linea-
ribus et omnibus linearibus. W.

*72. POLYGALA *prostrata*. W.

P. floribus imberbibus, pedunculis multifloris, cauli-
bus diffusis herbaceis, foliis lanceolatis obtusis. W.

Liegende Polygala. W.

Habitat in India orientali. ① (v. f.)

Caules plures simplices ex una radice prostrati. Fo-
lia oblongo-lanceolata obtusa. Capsula obcordata
margine ciliata. Similis praecedenti. W.

* * * * Imberbes: herbaceae, ramosae.

73. POLYGALA *ciliata*.

P. floribus imberbibus racemosis, capsulis ciliato-dentatis,
caule ramoso herbaceo erecto pedunculisque pi-
losis, foliis lanceolatis obtusis. W.

P. floribus imberbibus, capsulis ciliato-dentatis, caule
herbaceo erecto. Fl. zeyl. 268.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 496.

Gefranzte Polygala. W.

Habitat in India orientali. ① (v. f.)

Variat foliis cordatis, Caulibus semipedalibus, ra-
mosis.

74. POLYGALA *sanguinea*.

P. floribus imberbibus, pedunculis squarroso-fusco-
tomentosis, caule herbaceo ramoso erecto. Sp. pl. 991.

P. maria-

P. mariana, angustiori folio, flore purpureo. *Pluk. mant. 153. t. 437. f. 5.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 496.

Blutfarbene Polygala. W.

Habitat in Virginia. Kalm. ♂ (v. s.)

Caulis *spithameus* f. *pedalis*, *fimus*; *angulatus*, *ramosus*, *erectus*, *ramis caule altioribus*. Folia alterna, *angusto-lanceolata*. Spicae terminales, *laxae*, *sanguineae*, *ovatae*; decidunt enim flosculi inferiores maturi, dum novelli accrescunt, unde *Pedunculus laccerus* J. *squarrofus*.

75. POLYGALA verticillata.

P. floribus imberbibus spatio remotis, foliis linearibus verticillatis, caule herbaceo ramoso. *Sp. plant. 991.*

Gron. virg. 103.

P. caulibus filiformibus; foliis linearibus alternis, pedunculis spicatis. *Gron. virg. I. p. 172.*

P. floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo filiformi ramoso, foliis linearibus. *Amoen. acad. 2. p. 139.*

P. mariana quadrifolia minor, spica parva albicante. *Pluk. mant. 153. t. 438. f. 4.*

P. quadrifolia minima marilandica, spicis florum parvis albentibus. *Raj. suppl. 639.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 497.

Wirtelblättrige Polygala. W.

Habitat in Virginia. ♂ (v. s.)

Folia saepius quina ad genicula, interdum alterna. Spicae albae, angustissimae flosculis remotis. Caulis tenuis.

Variat floribus carneis foliisque omnibus alternis. W.

76. POLYGALA cruciata.

P. floribus imberbibus capitato-spicatis, foliis quaternis linear-lanceolatis canle subramoso erecto. W.

P. floribus imberbibus, foliis quaternis. *Amoen. acad. 2. p. 138. Gron. virg. 103.*

P. quadrifolia f. cruciata, floribus ex viridi rubentibus in globum compactis. *Pluk. alm. 301. Raj. suppl. 639.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 497.
Kreuzförmige Polygala. W.
Habitat in Virginia. ⊖ (v. f.)
Capitulum viridi rufescens.

*1314. BREDEMAYERA. W.

Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut.
Berol. 3. p. 411.

Cal. 3 - phyllus. Cor. papilionacea: vexillo di-
phylo. Drupa unce biloculari.

*I. BREDEMAYERA floribunda. W.

B. floribunda. Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut.
*Berol. 3. p. 412. t. 6.**

Vielblütige Bredemeere. W.

Habitat in Caracas ad sylvarum margines. h (v. f.)
Frutex 5-8-pedalis ramosus. Folia subalterna ob-
longo-lanceolata integerrima glabra venosa bi-tripol-
ticaria breviter petiolata. Flores parvi flavi ter-
minales paniculati. Panicula ramosissima pyramidalis
multiflora. Bractae linearis-subulatae ad pedicello-
rum basi. W.

1315. SECURIDACA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1156.

Cal. 3 - phyllus. Cor. papilionacea: vexillo di-
phylo intra alas. Legumen ovatum, 1 -
loculare, 1 - spermum, definens in alam
ligulatam.

I. SECURIDACA erecta.

S. caule erecto, foliis oblongis. W.

S. caule erecto. Sp. pl. 992. Jacq. amer. 197. t. 183.
f. 39. Swartz obs. 274.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 182.
Aufrechter Beilstrauch. W.

Habitat in Hispaniolae faxofis. ♂ (v. f.)

Differt a S. virgata foliis oblongis, ramis crassioribus strictioribus erectionibusque. Swartz l. c.

2. SECURIDACA volubilis.

S. caule scandente, foliis oblongis acutis. W.

S. caule scandente. Sp. pl. 992. Jacq. Amer. 197. t. 183. f. 38.

S. foliis oblongis, spicis ramosis. Brown jam. 241.

Spartium scandens, fructu cristato et elato, flore rubro.

Plum. spec. ic. 247. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 183.

Steigender Beilstrauch. W.

Habitat in America meridionali. ♂ (v. f.)

Ramuli juniores in cirrhos mutantur. Folia ovata, obtusa, subpetiolata. Fructus cultratus dorso lateribusque baseos cristatus. Diff. alt. de pl. Surin. 1776.

*3. SECURIDACA virgata.

S. caule scandente, foliis subrotundis obtusissimis. W.

S. caule scandente, ramis virgatis, foliis subrotundis. Swartz prod. 104.

S. fruticosa foliis subrotundis, ramulis tenuissimis, spicis laxis terminalibus. Brown. jam. 287.

Spartium alterum scandens, fructu alato, flore variegato. Plum. spec. ic. 248. f. 1.

Ruthenförmig r Beilstrauch. W.

Habitat in Hispaniola. ♂

D E C A N D R I A.

1316. NISSOLIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1157.

Cal. 5-dentatus. Legumen 1-spermum, definens in alam ligulatam.

1. NISSOLIA arborea.

N. caule arboreo erecto, foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis subtus subpubescentibus. W.

N. caule arboreo erecto. Sp. pl. 992. Jacq. amer. 199.
t. 174. f. 48.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 184.

Baumartige Nissolie. W.

Habitat in Carthaginæ et Martinicæ sylvis. ৎ. (v. f.)
f. fl.)

Rami reclinati. Folia quino-pinnata. Jacq.

* 2. NISSLIA ferruginea. W.

N. caule fruticoso volubili, foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis subtus ferrugineo-tomentosis. W.

Nissolia Quinata. Aubl. guj. 2 p. 743. t. 297.*

Rothfarbige Nissolie. W.

Habitat in Guiana ad fluviorum-ripas. ৎ

Similis praecedenti, sed foliorum acumen brevius et mucronatum, superficies inferior foliorum et legumen ferrugineo-tomentosum. W.

3. NISSLIA fructicosa.

N. caule fruticoso-volubili, foliis pinnatis, foliolis ovatis acutis glabriusculis. W.

N. caule fruticoso volubili. Sp. pl. 992. Jacq. amer. 198. t. 179. f. 44. hort. t. 167.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 185.

Strauchartige Nissolie. W.

Habitat in Charthaginæ sylvis. ৎ (v. f.)

1317. DALBERGIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1158.

Cal. obsolete 5-dentatus. Legumen foliaceum planum non dehiscens. Semina solitaria vel bina.

1. DALBERGIA Monetaria.

D. foliis ternatis, foliolis glabris ovatis, fructibus ovalibus aveniis. Lin. suppl. 317.

Bebe-boom Surinam.

Rundfrüchtige Dalbergie. W.

Habitat in Surinami locis humentibus. ৎ (v. f.)

Fru^tex. Folia ternata. Folia ovata petiolata integrim^a glabra venosa acuminata alterna. Pedunculi axillares plures spicati secundi, inferne a casu florum dentati. Flores minutissimi albi. Perianthium monophyllum campanulatum subquinquedentatum obtusum, dentibus aequalibus. Corolla alis dente reverso. Filamenta duo lateralia aequalia, apice quadrifida et tertium simplex sub germine, hijs filamenta novem. Antherae novem globosae didymae. Stylus filiformis erectus. Stigma simplex capitatum. Fructus est ligula ovalis figura nummi, magnitudine extimi pollicis compressa, interne cartilaginea unilocularis decidua nec dehiscens. Semen unicum compressum reniforme.

Radix truncata succo purpureo scatet. Lignum rubrum. Resinam dat Sanguinem Draconis aemulatorem.

Folia coriacea nitida. Racemi tres vel octo axillares petiolo communi breviores. W

* 2. DALBERGIA heterophylla. W

D. foliis ternatis pinnatisque, foliolis glabris ovatis, fructibus reniformi-ovalibus venosis. W.

Verschiedenblättrige Dalbergie. W.

Habitat in India orientali. h (v. f.)

Fru^tex scandens, ramis verrucosis. Folia ternata vel quinato-pinnata. Foliola opposita petiolata ovata obtusa venosa glabra coriacea. Racemi solitarii axillares foliis longiores. Perianthium subquinquedentatum, dentibus brevissimis aequalibus acutis. Corolla duplo major quam in praecedente. Filamenta decem in unicum corpus coalita. Legumen compressum ovale magnitudine praecedentis reticulato-venosum, latere inferiore levissime emarginatum carinatum. Semen unicum reniforme compressum latere exteriore subalatum. W.

* 3. DALBERGIA arborea.

D. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, fructibus ovalibus acutis aeniis. W.

Galedupa (*indica*) foliis impari-pinnatis, racemis axillaribus, siliquis elliptico-falcatis planis submonosper-

mis. Lamarck encycl. 2. p. 588. (*excluso synonymo Rumphii.*)

Crista pavonis monospermos tertia f. arbōr vespertilionis maxima indicā *inglandis folio majore, floribus spicatis albicantibus odoratis, siliqua nonnihil falcata, semine renali latissimo.* Breyn. prod. 58. Commel. malab. 95.

Pongam f. Minari. Rheed. malab. 6. p. 5. t. 3.

Baumartige Dalbergie. W.

Habitat in India orientali. ♂ (v.f.)

Arbor excelsa. Folia alterna pinnata. Foliola quinque petiolata opposita ovata acuminata venosa glabra, bi vel tripolligaria. Racemi axillares solitarii longitudine foliorum, quandoque longiores. Perianthium monophyllum truncatum. Filamenta decem in cylindrum superne fissum coalita. Germen pilosum, Stigma simplex capitatum. Legumen oblongum utrinque acutum submonospermum. W.

*4. DALBERGIA latifolia.

D. foliis pinnatis, foliolis subrotundis emarginatis, fructibus lanceolatis. W.

Dalbergia latifolia. Roxb. corom. 2. p. 7. t. 113.*

Breitblättrige Dalbergie. W.

Habitat in montibus Coromandeliae. ♂

Arbor magna. Folia pinnata. Foliola quinque biuncialia subrotunda emarginata venosa, superne glabra subtus subpubescentia alterna petiolata. Corymbi paniculati brevissimi axillares. Perianthium subquinqe dentatum, dentibus acutis. Filamenta decem in cylindrum superne fissum coalita. Legumen oblongo-lanceolatum utrinque attenuatum submonospermum marginatum. W.

*5. DALBERGIA rubiginosa.

D. foliis pinnatis, foliolis oblongis obtusis, ramis petiolisque tomentosis. W.

Dalbergia rubiginosa. Roxb. corom. 2. p. 9. t. 115.*

Rostfarbige Dalbergie. W.

Habitat in montosis Coromandeliae. ♂

Frutex scandens, ramulis tomentosis. Folia pinnata. Foliola septena biuncialia oblonga obtusa venosa

glabra brevissime petiolata alterna. Petiolus communis tomentosus. Racemi axillares comoositi brevissimi, pedunculis calycibusque tomentosis. Perianthium quinquedentatum, dentibus acutis. Corolla alba. Filamenta decem in cylindrum connata. Fructus ignotus. W.

*6. DALBERGIA paniculata.

D. foliis pinnatis, foliolis ellipticis emarginatis glabris, panicula terminalis, fructibus lanceolatis. W.

Dalbergia paniculata. Roxb. corom. 2 p. 8. t. 114. Rispenblütige Dalbergie. W.*

Habitat in montosis Coromandeliae. Ȑ

Arbor ramis patentibus adscendentibus. Folia pinnata. Foliola novem vel decem alterna elliptica utrinque rotundata venosa emarginata petiolata. Penicula divaricata terminalis e racemis brevibus composita. Perianthium quinquedentatum, dentibus aequalibus acutis. Corolla alba. Filamenta duo aequalia quinqefida. Antherae ellipticae biloculares. Legumen oblongo-lanceolatum utrinque attenuatum marginatum mono vel dispermum. W.

Similis sequenti, sed diversa: foliolis utrinque rotundatis glabris, panicula terminali ramosa. W.

7. DALBERGIA Lanceolaria.

D. foliis pinnatis, foliolis elongatis subtus pilosis, racemis elongatis axillaribus, fructibus lanceolatis. W.

D. foliis pinnatis, foliolis ellipticis subtus pilosis, fructibus lanceolatis. *Lin. suppl. 316. Vahl symb. 3. p. 87.*

Noel valli. *Rheed. mal. 6. p. 39. t. 22.*

Lanzenfrüchtige Dalbergie. W.

Habitat in Zeylona, Malabarria. Ȑ (v. f.)

Arbor ramulis virgatis pendulis, una cum petiolis pilosis. Folia alterna pinnata cum impari: foliolis ellipticis alternis remotoribus decem f. sedecim integrerrimis undulatis supra glabris subtus hirsutis arenis parvis. Racemi axillares pilosi ramosi. Flores farruginei. Perianthium campanulatum hirtum, dentibus subaequalibus. Corolla D. Monetariae major. Vexillum magis dilatatum. Filamenta duo lateralia,

apice quadrifido cum rudimento quinti utrinque,¹ sed absque filamento libero uno ut in D. Monetaria. Sy^tus sursum reflexus. Stigma simplex. Fructus est membranula exacte figura Lanteolae basi attenuata non dehiscens, nec cultro in duas epidermides dividⁱ potest, longitudine digiti s. minore. In medio hujus membranulae Semen unicum compressum ovale immisum est; si Semina bina, tunc spatio remota per longitudinem posita.

Foliola oblonga basi apiceque angustiora obtusa retusa. Racemi longissimi axillares et terminales. Figura horti malabarici non optima. W.

1318. PTEROCARPUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1159.

Cal. 5-dentatus. Legumen falcatum foliaceum varicosum ala cinctum, non dehiscens.
Sem. aliquot solitaria.

I. PTEROCARPUS *Draco*.

P. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis, stipulis oblongis obtusis, fructibus obtusis. W.

P. foliis pinnatis. Mat. med. 169. Swartz. obs. 275. Pterocarpus officinalis. Jacq. amer. 283. t. 183. f. 92. Draco arbor. Loefl. it. 266, 273. n. 147, 168.

Moutouchi suberosa. Aubl. guj. 2. p. 748. t. 299. *
Draco arbor indica siliquosa, populi folio. Comm. hort.

I. p. 213. t. 109.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 187.

Americanische Flügelfrucht. W.

Habitat in America meridionali. t (v. f.)

*2. PTEROCARPUS *indicus*. W. †

P. foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis, stipulis nullis, fructibus acutis. W.

Lingoum. Rumph. amb. 2. p. 205. t. 70.

Indische Flügelfrucht. W.

Habitat in India orientali. t

A praecedente diversissima, ex iconē Rumphii mīlitantum nota species. W.

*3. PTEROCARPUS *Marsupium*.

P. foliis pinnatis, foliolis ellipticis emarginatis, stipulis nullis, panicula terminali. W

Pterocarpus Marsupium. *Roxb. corom.* 2. p. 9. t. 116.*

Ansgerandete Flügelfrucht. W.

Habitat in montibus Coromandeliae. ḥ

Arbor magna ligno duro aurantii coloris. Folia pinnata, foliolis ellipticis alternis petiolatis emarginatis. Panicula terminalis ampla. Flores albi. Filamenta decem in cylindrum bipartitum connata. Legumen falcatum acutum ala cinetum mono- vel dispernum. W.

*4. PTEROCARPUS *Rohrii*.

P. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminate, stipulis nullis, fructibus orbiculatis. W.

P. (*Rohrii*) foliis oblongis abrupte acuminatis, legumine undique subaequali basi emarginato glabro exstipitato. *Richard. Act. Soc. Hist. Nat. Parif.* I. p. III.

Apalatoa. *Aubl. guj.* I. p. 382. t. 147.*

Tellerförmige Flügelfrucht. W.

Habitat in Gujanæ sylvis. ḥ (v. f.)

Crudia spicata in editione nostra Specierum plantarum II. p. 539, quam ex icona et descriptione Aubletii indicavi, est delenda; Aubletius enim, flores ad aliam plantam pertinentes, huic perperam addidit. *Crudiae* genus itaque unica gaudet specie, nempe *C. aromaticæ*, ab hac planta toto coelo diversa. W.

Foliola oblongo-lanceolata acuminata basi subcordata. W.

5. PTEROCARPUS *lunatus*

P. foliis pinnatis, spinis stipularibus, fructibus lunatis. *Lin. suppl.* 317.

Medicago leguminibus Lunatis. *Plum. ic. t. 201. f. 2.*

Mondförmige Flügelfrucht. W.

Habitat in America meridionali. C. G. Dalberg. ḥ

Frutex rigidulus: Spinae stipulares geminae robustae recurvatae. Folia inter spinas inserta alterna pinnata cum impari: foliolis 5 ad 7 alternis sub sessilibus oblongis obtusis. Panicula terminalis pubescens ferruginea ex pedunculis sub spicatis secundis, hinc a casu florum altero latere dentatis. Spicae deflexae incurvae ut in asperifoliis. Calyx campanulatus, limbo dilatato piano quinquedentato. Corolla alba. Vexillum reflexum cordatum emarginatum. Alae oblongae obliquae, dente reverso. Stamina decem cohaerentia in unguem. Pistillum brevissimum. Germen pedicellatum compressum oblongum. Stylus adscendens brevissimus. Stigma simplex. Legumen compressum reniforme s. lunatum, apice tangente fere basin evalve, absque carina foliacea. Semen reniforme compressum maximum magnitudine totius leguminis.

6. PTEROCARPUS santalinus.

P. foliis ternatis subrotundis retusis glaberrimis, petalis crenatis undulatis. *Lin. suppl.* 318.

Sandelholzgebende Flügelfrucht. W.

Habitat in montibus Palicatenibus Indiae, inter montes Nageri et Nair Haevram et in Zeylonensibus, juga montium amans. Koenig. 5

Arbor altissima, cortice Alni, ramis alternis. Folia alterna petiolata terciata, rarius pinnata, foliolis quatuor s. quinque alternis petiolatis, superioribus in eadem prima majoribus ovato-orbiculatis s. oblongis integerrimis emarginatis s. retusis, supra glaberrimis subtus canis. Stipulae nullae. Racemi axillares simplices s. ramosi erecti. Bractae nullae. Calyx fuscus. Corolla papilionacea. Vexillum obcordatum erectum, lateribus ad dorsum reflexis, denticulatum crispato-undulatum flavum, venis rubris striatum. Alae patentes, margine denticulato-undulatae flavae. Carina oblonga parum inflata, apice ut reliqua crista, brevis. Filamenta decem diadelpha flava. Antherae globosae albae. Germen pedicellatum oblongum compressum hirsutum. Stylus curvus. Stigma obtusum. Legumen subrotundum pedicellatum sursum salcatum compressum glabrum margine inferiori carinatum, carina membranacea subundulata, sub epidermide venis

varicosa non dehiscens. Semen unicum orbiculatum compressum vix emarginatum. Variat figura foliorum in diversis.

Hoc verum est Santalum rubrum, quod Koenig in montibus supra nominatis primum detexit, suamque mihi misit descriptionem, herbam siccām et lignum saturate rubrum venis atris immixtum grave densum, polituram siatim admittens, in aqua submergens attritu humido pulchre rubrum tingens. Succus dat speciem Sanguis Draconis Officinarum.

Nondum novimus omnes illas arbores, quae succo sanguineo abundant, eodem modo ac Lactescentes succo albo. Sanguifluæ sunt et Crotona varia.

7. PTEROCARPUS Ecastaphyllum.

P. foliis simplicibus ovatis acuminatis subtus sericeis.
*Syst. nat. ed. 12. p. 439. Swartz obs. 275.**

P. leguminibus suborbiculatis obtusis planis, foliis alternis ovatis subtus villosis. *Berg. Act. Stockh. 1769. t. 4. **

Hedysarum Ecastaphyllum. Spec. ed. 2. p. 1052. Amoen. acad. 5. p. 403. Mill. dict. n. 20.*

Ecastaphyllum frutescens reclinatum, foliis ovatis acuminatis integris. Brown jam. 299. t. 32. f. 1.

Spartium scandens, citri foliis, floribus albis ad nodos confertim nascentibus. Plum. Spec. 19. ic. 246. f. 2.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 2. p. 189.

Einfachblättrige Flügelfrucht. W.

Habitat in America meridionali. h (v. f.)

* 1319. AMERIMNUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1160.

Cal. subbilabiatus. *Legumen compresso-folia-*
ceum bivalve dehiscens. Semina aliquot
solitaria.

+ *Foliis simplicibus.*

* 1. AMERIMNUM *Brownii.*

A. inerme, foliis petiolatis alternis subcordato-ovatis,
 racemis compositis axillaribus lateralibusque. *Swartz*
prod. 204.

A. (*Brownii*) foliis simplicibus. *Jacq. Amer. 199. t. 180.*
*f. 58. **

A. fruticosum, foliis nitidis simplicibus cordato-acumi-
 natis. *Brown. jam. 288. t. 31. f. 3.*

Westindisches Amerimnon. W.

*Habitat in Jamaicæ, Hispaniolæ, Carthagenaæ frutice-
 tis densis.* H.

2. AMERIMNUM *Ebenus.*

A. spinosum, foliis subsessilibus aggregatis obovato-ob-
 longis, pedunculis bifloris. *Swartz prod. 104.*

Pterocarpus (buxifolius) foliis simplicibus aggregatis
 obovatis aveniis. *Mirr. syst. veg. 642.*

Pterocarpus glabra. *Sp. pl. ed. R. 3. p. 395.*

Aspalathus (Ebenus) foliis aggregatis obovato-oblongis
 subtus tomentosis, leguminibus bilobis dispermibus.
Sp. pl. 1001.

Aspalathus arboreus f. *Pseudo-Ebenus buxi* folio, flore
 luteo patulo, siliqua lata brevi chartacea. *Sloan. jam.*
140. hist. 2. p. 30. t. 175. f. 1.

Brya arborescens erecta spinosa, foliis confertis, floribus
 geminatis. *Brown. jam. 299. t. 31. f. 2.*

Spartium portulacae foliis aculeatum, ebeni materie.
Plum. sp. 19. ic. 246. f. 1.

Ebenus jamaicensis, arbuscula buxi foliis spinosa, flore
 luteo papilionaceo, siliquifera. *Pluk. phytopog. t. 89.*
f. 1.

Buchsbaumblättriges Amerimnon. W.

Habitat in America calidore. ḥ

† † *Foliis pinnatis.*

*3. AMERIMNUM *latifolium.* W.

A. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis, caule arboreo. W.

A. (*pinnatum*) foliis pinnatis. *Jacq. amer.* 200. t. 177. f. 50.*

Breitblättriges Amerimnon. W.

Habitat in Carthaginæ Americes sylvis. ḥ (v. f. e. fr.)

Arbuscula erecta duodecimpedalis, ramis debilibus subreclinatis. Folia impari-pinnata. Foliola septem petiolata ovata acuminata tripolligaria utrinque glabra. Racemi axillares solitarii quadripolligares. W.

*4. AMERIMNUM *pubescens.* W.

A. foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis subtus pubescentibus, caule arboreo. W.

Behaartes Amerimnum. W.

Habitat in Caracas ad ripas torrentum locis montosis.

ḥ (v. f.)

Arbor magna cortice cinereo. Folia alterna impari pinnata. Foliola 11 ad 13 ovato-lanceolata acuminata obliqua opposita petiolata superne glabra, inferne pubescentia, exteriora majora triuncialia, inferiora sesqui-vel biuncialia. Racemi filiformes axillares longitudine foliorum vix longiores, interdum basi ramosi semper solitarii. Pedunculi partiales bifidi. Flores parvi violacei. Bracteae binae caducae basi calycis insertae. Calyx oblique truncatus vix manifeste quinquedentatus. Filamenta decem connata. Legumen planum bivalve polyspermum. W.

Hujus et sequentis specimina et descriptiones bene volle mecum communicavit Clarisf. Bredemeyer. W.

*5. AMERIMNUM *scandens.*

A. foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis glabris, caule fruticoso scandente. W.

Kletterndes Amerimnon. W.

Habitat in Caracas. ḥ (v. f.)

Frutex arbores scandens. Folia alterna impari-pinnata. Foliola 7. 9 vel 11 oblonga acuminata opposita petiolata glabra exteriora majora sesquiuncialia, inferiora uncialia. Racemi solitarii axillares foliis longiores simplices. Pedunculi partiales bifidi. Flores duplo maiores violacei. Bractae nullae. Calyx oblique truncatus. Filamenta diadelpha. W.

*1320. DIPTERIX.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1161.

Calycis laciniae binae alaeformes. Legumen uniculare monospermum coriaceum bivalve.

*1. DIPTERIX odorata.

D. foliis alternis, racemo terminali. W.

Coumarouna odorata. Aubl. guj. 2. p. 740. t. 296. Wahre Toncabohne.* W.

Habitat in Gujanæ sylvis. ৎ

Arbor sexagintapedalis. Folia alterna ampla pinnata. Foliola petiolata alterna oblonga acuta 6—8 uncialia. Petiolus communis canaliculatus apice lanceolatus. Legumen carnosum flavescens. Semen unicum odoratum testa fragili tectum, sub nomine Faba de Tonca notum. W.

*2. DIPTERIX oppositifolia.

D. foliis oppositis, floribus paniculatis. W.

Taralea oppositifolia. Aubl. guj. 2. p. 745. t. 298. Falsche Toncabohne.* W.

Habitat in sylvis Cajennæ. ৎ

Arbor 60-pedalis. Folia opposita pinnata. Foliola quadri-f. quinquejuga subopposita oblonga acuminata 6—8 uncialia petiolata. Panicula ramosa terminalis vel axillaris. Filamenta decem connata. Legumen coriaceum virescens. Semen unicum subrotundo - oblongum. W.

1321. A B R U S.

Gen pl. edit. Schreb. 1162.

Cal. obsolete quadrilobus: superiore latiore. Filamenta 9, basi infima connata, dorso hiantia. Stigma obtusum. Semina sphaerica.

I. ABRUS *precatorius.*

A. *precatorius. Syst. veg. 533.*

Glycine (*Abrus*) foliis abrupte pinnatis, pinnis numero-obtusis. *Sp. pl. 1025. Forst. descr. 138. Mill. dict. n. 3.*

Glycine foliis pinnatis geminis, pinnis ovatis oblongis obtusis. *Fl. zeyl. 284.* Hort. upf. 228.*

Glycine scandens, foliis pinnatis, spicis nodosis axillariibus. *Brown jam. 297.*

Phaseolus Glycyrrhizites folio alato, pilo coccineo atra macula notato. *Sloan. jam. 70. hist. I. p. 180. t. 112. f. 4. 5. 6.*

Phaseolus arborescens alatus et volubilis major orientalis, fructo coccineo hilo nigro notato. *Pluk. alm. 294. t. 214. f. 5.*

Pisum indicum minus coccineum. *Bauh. pin. 212.*

Abrus. *Vesl. aegypt. 25. Hort. cliff. 488. Hill. anat. 21. Rumph. amb. 5. p. 57. t. 32.*

Konni. *Rheed. mal. 3. p. 71. t. 39. Burm. ind. 161.*

Phaseolus ruber, Abrus vocatus. *Alp. aegypt. 40. t. 40.*

Glycyrrhiza indica vulgo. *Herm. lugdb. 494.*

Orobus indicus Abrus Alpini. *Burm. zeyl. 177.*

Orobus americanus fructu coccineo nigra macula notato. *Tournef. inst. 393.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 4. p. 184. t. 27. f. 3.*

Gemeine Paternostererbse. W.

Habitat in India argillosis lapidosis. ৎ (v.. v. f. fl.)

Variat seminibus sanguineis et albis. Statura et ipsa Facies distincti generis plantam esse suadent, quibus accedunt Semina pulcherrima, maxime deleteria,

1322. ERYTHRINA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1163.

Cal. bilabiatus: $\frac{1}{2}$. *Cor. vexillum longissimum lanceolatum. Legumen torulosum.*

1. ERYTHRINA *herbacea.*

E. foliis ternatis rhombeis glabris, caule herbaceo inermi, calycibus truncatis. W.

E. foliis ternatis, caulis simplicissimis fruticoso-annuis. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.* 373. *Mill. dict. n. 1.*

Corallodendron folie ternatis, caule simplicissimo inermi. *Trew. ehret. t. 58.*

Coral carolinensis, hastato folio. *Dill. elth.* 107. *t. 90. f. 106.*

Corallodendron humile, spica florum longissima, radice crassissima. *Catesb. car.* 49. *t. 49.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 577.

Krautartiger Corallenbaum. W.

Habitat in Carolina, Mississipi. 24 (v. v.)

Caules bipedales, vix ramosi, interdum perennantes. Petioli subtus saepius aculeati; aculeus communiter sub petiolo communi in caule, rarius unus alterve aculeus in caule sparsus. Racemi erecti: Pedicelli terni, uniflori. Calyx indivisus absque glandula mellifera sub basi. Corollae vexillum saturate rubrum. Alae carinae brevissima. Stamen decimum distinctum. Gerumen pedicellatum.

2. ERYTHRINA *carnea.*

E. foliis ternatis glabris, caule arboreo subaculeato, calycibus campanulatis truncatis. *Ait. Kew. 3. p. 8.*

Erythrina americana. *Mill. dict. n. 2.*

Corallodendron triphyllum americanum non spinosum, foliis magis acuminatis, flore pallide rubente. *Trew. ehret. t. 8.*

Fleischfarbener Corallenbaum. W.

Habitat in Vera Cruce. 5

3. ERY-

3. ERYTHRINA *Corallodendrum*.

- E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato, calycibus truncatis quinquedentatis. *Ait. Kew.* 3. p. 8.
 E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato. *Hort. cliff.* 354. *Hort. upf.* 207. *Fl. zeyl.* 275. *Roy. lugdb.* 373. *Fabric. helmst.* 423.
 E. caule arboreo subaculeato, calyce subtruncato aequalli, staminibus corollam vix aequantibus. *Lamarck. encycl.* 2. p. 387.*
 E. spinosa. *Mill. dict.* n. 3.
 E. arborea spinosa et non spinosa, foliis rhombeis ternatis. *Brown. jam.* 288.
 Ceratia f. Siliqua sylvestris spinosa arbor indica. *Bauh. pin.* 402.
 Coral arbor americana. *Comm. hort.* I. p. 211. t. 108.
Houttuyn Lin. Pfl. Synt. 2. p. 192.
 Gemeiner Corallenbaum. W.
Habitat in Antillen. ♂ (v. f.)

*4. ERYTHRINA *indica*.

- E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato, calycibus spathaceis. W.
 E. (*indica*) caule arboreo aculeato, calyce obliquato spathaformi latere dehiscente, staminibus corolla longioribus. *Lamarck encycl.* 2. p. 387.*
 Erythrina orientalis. *Murr. in Comment. goett.* 8. p. 35. t. I.*
 Erythrina Corallodendrum. β. *Sp. pl.* 993. *Loureiro cochin.* 519.*
 Gelala littorea. *Rumph. amb.* 2. p. 230. t. 76.
 Mouricou. *Rheed. mal.* 6. p. 13. t. 7.
 Kuara. *Bruce itin.* 5. p. 65. c. *icon. Ed. germ.* 5. p. 74. tab. 14.
 Indischer Corallenbaum. W.
Habitat in India orientali. ♂ (v. v. f. fl.)

*5. ERYTHRINA *fusca*. †

- E. foliis ternatis inermibus lanceolatis, caule arboreo aculeato, calycibus bifidis. W.
 E. (*fusca*) foliis ternatis inermibus lanceolatis, corallorum vexillis convolutis. *Loureiro cochin.* 519.*

Gelala aquatica. Rumph. amb. 2. p. 235. t. 78.

Braunrother Corallenbaum. W.

Habitat ad Indiae et Cochinchinae ripas fluviiorum. ḥ
Corollae rubro-fuscae. W.

*6. ERYTHRINA caffra. †

E. foliis ternatis inermibus, foliolis obtusis, caule arboreo aculeato. Thunb. prod. 121.

Cafierscher Corallenbaum. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

7. ERYTHRINA picta.

E. foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato. Sp.
pl. 993. Mill. dict. n. 4.

Gelala alba. Rumph. amb. 2. p. 234. t. 77. Burm. ind.
154.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 195.

Bunter Corallenbaum. W.

Habitat in India. ḥ (v. v. f. fl.)

Planta mea etiannum tenera unius anni, simillima E. Corallodendro, a qua differt foliolis alba rachi conflisque et aculeis minoribus in utraque pagina, cum illici foliola viridia et inermia sint. Illi glandulae duas ad basin folioli impares, huic vero nullae; caeterum utriusque et caulis petioli aculeati.

Arbores horti nostri botanici foliis gaudent viridis aculeatis. W.

*8. ERYTHRINA velutina. W.

E. foliis ternatis inermibus pubescentibus, caule arboreo aculeato. Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. p. 426.*

Sammetartiger Corallenbaum. W.

Habitat in Terra firma. ḥ (v. f. f. fl.)

Arbor aculeata. Folia alterna inermia longe petiolata ternata, foliolis cordato-triangularibus obtusis integerrimis tomentosisusculis. Petiolo terminali biglandulofo, lateralibus viriglandulosis, glandulis minimis oblongis obtusis. Flores rosei racemosi, racemis

simplicibus, pedicellis ternis. Legumina cylindracea longa loculosa tomentosa. Semina oblonga teretia rubra. W.

*9. ERYTHRINA glauca. W.

E. foliis ternatis inermibus subtus glaucis, petiolis sub-
inermis, caule arboreo aculeato. Willd. Nov. Act.
Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. p. 428.*

Graner Corallenbaum. W.

Habitat ad Caracas. ৎ

*Arbor aculeata. Folia alterna ternata, foliolis ova-
tis glabris subtus glaucis, medio majore. Petoli ra-
rissime aculeati, terminali biglanduloso, lateralibus
uniglandulosis. Flores crocei racemosi, racemis sub
apice ramorum axillaribus erectis. Calyx fuscus bi-
labiatus. Vexillum maximum subcuneiforme patens
pallide croceum. Alae triplo breviores latae obtusae
concavae pallidae apice croceae. Carina alis longior
ventricosa obtusa. Stamina decem inaequalia basi con-
nata adscendentia viridia carina longiora. Legumina
longa teretia torulosa glabra. Semina oblonga teretia
cinerea lineis atris conspersa.* W.

*10. ERYTHRINA mitis.

E. foliis ternatis canaque arboreo inermibus. Willd.
Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. p. 429.*

E. tota inermis, foliis ternatis, caule arboreo. Jacq.
Schoenb. 2. p. 47. t. 216.*

Wehrlofer Corallenbaum. W.

Habitat ad Caracas. ৎ

*Arbor altissima tota inermis. Flores coccinei, caly-
ce truncato.* W.

*11. ERYTHRINA isopetala.

E. foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis, petalis un-
guiculatis longitudine subaequalibus. Lamarck en-
cycl. 2. p: 388.*

Brasilischer Corallenbaum. W.

Habitat in Brasilia. 5

Rami scandentes teretes glabri forte lignosi. Folia alterna ternata, foliolis ovato-lanceolatis glabris, fere ut in sequenti specie. Racemi axillares multiflori densi triplicares. Pedunculi breves geminati. Flores sesquipollicares. Calyx campanulatus quinquelobus, dentibus brevibus inaequalibus. Vexillum lanceolatum. Alae unguiculatae longitudine fere vexilli. Carina unguiculata dipetala longitudine alarum. Lamarck l. c.

12. ERYTHRINA *Crista galli*.

E. foliis ternatis: petiolis subaculeatis glandulosis, caule arboreo inermi. *Syst. nat. XII.* 473.

E. laurifolia. *Jacq. obs. 3. p. 1. t. 51.*

Coral arbor non spinosa trifolia. *Pet. mus. 76. Raj. dendr. 100.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 196.

Lorbeerblättriger Corallenbaum. W.

Habitat in Brasilia. D. Vandelli. 5

Arbor altissima caudice inermi. Rami stricti. Folia ternata: foliolis ovato oblongis, integerrimis: Petiolis elongatis, subtus aculeo saepe uno altero recurvo; in hoc petiolo ad pedicellorum exortum utrinque glandula, ut et glandulae binae in medio pedicelli intermedii. Flores 2, l. 3, axillares, purpurei pedunculis propriis, resupinati. Calyx campanulatus, bilabiatus; labio inferiore mucronato. Vexillum ovato-cordatum reflexum, emarginatum. Alae minimae, subovatae, calyce breviores. Carina stricta, subfalcata, acuta, compressa, longitudine fere vexilli. Stamina diadelpha, inferiora 9 fere tota coalita, longitudine carinae. Antherae oblongae. Germen oblongum, villosum. Stylus subulatus. Stigma puncto minuto. H. V.

* 1323. B U T E A.

Roxb. Corom. I. p. 22:

Cal. subbilabiatus. *Corollae vexillum longissimum lanceolatum. Legumen compressum membranaceum apice monospermum.*

* 1. BUTEA *frondosa*.

B. ramulis pubescentibus, foliolis subrotundis emarginatis. W.

*Butea frondosa. Roxb. corom. I. p. 21. t. 21.**

Erythrina (monosperma) caule arboreo inermi, foliis ternatis, leguminibus compressis monospermis pubescentibus. *Lamarck encycl. 2. p. 388.**

Arbor siliquosa trifolia indica, flore papilionaceo, siliqua grandi pilosa unicam fabam continentem. *Raj. hist. 1721.*

Plaso. Rheed. mal. 6. p. 29. t. 16. 17.

Belaubte Butea. W.

Habitat in montibus Coromandeliae. Ȣ (v. f.)

* 2. BUTEA *superba*.

B. ramulis glabris, foliolis obovato-subrotundis obtusis. W

*Butea superba. Roxb. corom. I. p. 23. t. 22.**

Stolze Butea. W.

Habitat in montibus Coromandeliae. Ȣ (v. f.)

Arbor ramis scandentibus foliis ternatis, floribus que racemosis amplis coccineis ut praecedens species, cui simillima, differt: foliis triplo majoribus: foliolis pedalibus non emarginatis, basi attenuatis, quae in antecendente quadriuncialia emarginata et basi rotunda sunt. W.

* 1324. RUDOLPHIA.

Willd. Act. Soc. N. S. Berol. 3. p. 151.

Cal. bilabiatus. *Corollae vexillum longissimum lanceolatum. Legumen planum polyspermum.*

*1. RUDOLPHIA *volutabilis*. W.

R. foliis cordatis ovatis acuminatis subpeltatis. *Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. p. 452.**

Windende Rudolphie. W.

Habitat in Portorico in montibus altissimis. Ȣ (v. f.)

Caulis fruticosus inermis volubilis arbores scandens, cortice nigro verrucoso, ramis et foliis junioribus pubescentibus. Folia simplicia alterna petiolata subpeltata rigida, superne nitida, ovata cordata acuminata integerrima. Petioli bigeniculati, supra intra geniculos canaliculati. Racemi sparsi foliis triplo longiores, pedunculis ternis. Flores coccinei. W.

*2. RUDOLPHIA *peltata*. W.

R. foliis subcordatis oblongo-lanceolatis peltatis. *Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. p. 453.*

Erythrina (*planiflqua*) foliis simplicibus oblongis. Sp. pl. 993.

Erythrina (*planiflqua*) scandens, foliis simplicibus oblongis, racemis longe pedunculatis. Lamarck encycl. 2. p. 388.

Corallodendrum folio singulari oblongo, siliqua plana. Plum. spec. 21. ic. 102. f. 1.

Schildblättrige Rudolphié. W.

Habitat in St. Domingo. Ȣ

A praecedente diversa: foliis peltatis oblongo-lanceolatis, pedunculo communis sesquipedali apice ramoso. W.

* 1325. WIBORGIA. †

Thunb. prod. Pars 2.

Cal. 5 - dentatus, sinubus rotundatis. *Legumen turgidum sulcatum acatum.*

* 1. WIBORGIA *obcordata.*

W. foliolis glabris obtusis, ramis elongatis laxis. *Thunb. prod. 121.*

Stumpfblättrige Wiborgie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

* 2. WIBORGIA *fusca.*

W. foliolis glabris mucronatis, ramis virgatis erectis.

Thunb. prod. 121.

Braune Wiborgie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v.f.)

* 3. WIBORGIA *jericea.*

W. foliolis ramisque virgatis pubescentibus. *Thunb.*

prod. 121.

Seidenartige Wiborgie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

1326. PISCIDIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1164.

Stigma acutum. Legumen quadrifariam alatum.

1. PISCIDIA *Erythrina.*

P. foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis. W.

P. foliolis ovatis. *Sp. pl. 993. Jacq. amer. 206. Loefl. it. 275. Mill. dict. n. I. Swartz obs. 277.* *

Erythrina foliis pinnatis, leguminibus membranaceo-te-tragonis. Spec. pl. I. n. 707.

Ichtyomethia foliis pinnatis ovatis, racemis terminalibus, siliquis quadrialatis. Brown. jam. 296.

Coral arbor polyphylla non spinosa, fraxini folio siliqua
alis foliaceis exstantibus rotae molendinariae fluviati-
lis aucta. *Sloan. jam. 143. hist. 2. p. 39. t. 176. f. 45.*
Raj. dendr. 108.

Pseundo - Acacia filiquis alatis. *Plum. spec. 19. ic. 233.*
f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 198.

Gemeiner Fischfänger. W.

Habitat in America calidiore. ♂ (v. f.)

Pisces inebriat. *Jacq.*

2. PISCIDIA *carthaginensis.*

P. foliis impari - pinnatis, foliolis obovatis. W.

P. foliolis obovatis. *Sp. pl. 993.* *Jacq. amer. 210.*
Mill. dict. n. 2.

Phaseolis accedens Coral arbor polyphyllos, foliis durior-
ibus non spinosa. *Pluk. alm. 293. t. 214. f. 4.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 200.

Carthagenerischer Fischfänger. W.

Habitat in America calidiore. ♂

An varietas prioris?

*3. PISCIDIA *punicea.*

**P. foliis abrupte - pinnatis, foliolis oblongis obtu-
fis.** W.

**P. fruticosa, foliis pinnatis, pinnulis ovatis, legumini-
bus pendulis.** *Cavan. ic. 4. p. 8. t. 316.**

Schamrother Fischfänger. W.

Habitat in America calidiore. ♂

*4. PISCIDIA *longifolia.* W. †

**P. foliis abrupte pinnatis, foliolis lanceolatis acu-
tis.** W.

**Aeschynomene (*longifolia*) caule fruticoso, foliis pin-
natis, pinnulis lanceolatis, calycis limbo inflexo.** *Ca-
van. ic. 4. p. 8. t. 315.**

Langblättriger Fischfänger. W.

Habitat in Nova Hispania. ♂

Fructus hujus adhuc ignotus. Similis praecedenti;
differt: foliolis lanceolatis acutis, floribusque minori-
bus luteis. W.

* 1327. PLATYLOBIUM.

Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 350

Cal. campanulatus - 5 fidus, laciniis duabus supremis maximis obtusis. *Legumen* pedicellatum compressum dorso alatum Polyspermum.

*1. PLATYLOBIUM *formosum*.

P. foliis cordato-ovatis, germine piloso. *Smith. Nov. Holl. 1. p. 17. t. 6. * Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 350.*

Zierliche Plattschote. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♂ (v. f.)

*2. PLATYLOBIUM *parviflorum*.

P. foliis lanceolato-ovatis, germine glabro. *Smith. Nov. Holl. 1. p. 18.*

Kleinblütige Plattschote. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♂

Simillis praecedenti, differt: floribus minoribus, foliis longioribus angustioribusque, et germine glabro.
Smith l. c.

* 1328. TRIGONIA

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1178.

Cal. 5-partitus *Corollae vexillum* basi intus foveolatum. *Nect. squamae* 2 ad basin germinis. *Filamenta* nonnulla sterilia. *Capula* leguminosa trigona trilocularis trivalvis.

*1. TRIGONIA *villosa*.

T. foliis obovatis subtus tomentosis incanis. *Vahl eclog. 2. p. 53. **

T. foliis ovatis integerrimis, fructu longo rufescente.
*Anbl. guj. I. p. 388. t. 149.**
Haariger Dreykant. W.
Habitat in Cajenna. ৎ

*2. TRIGONIA laevis.

T. foliis oblongis utrinque glabris nitidis. *Vahl eclog.*
*2. v. 53.**
T. foliis ovatis, fructu brevi aspero. *Aubl. guj. I. p.*
*390. t. 150.**
Glatter Dreykant. W.
Habitat in Guiana. ৎ

1329. B O R B O N I A.

Gen. pl. ed. Schreb. 1165.

Stigma emarginatum. *Cal.* acuminato - spinosus
Legumen mucronatum.

1. BORBONIA ericifolia.

B. foliis sublinearibus acutis subtus villosis, capitulis terminalibus. *Amoen. acad. 6. afr. 29. **
Genista africana ericae folio, floribus parvis luteis in capitula congestis. Raj. suppl. 105.
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 187.
Heideblättrige Borbonie. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v s.)

2. BORBONIA trinervia.

B. foliis lanceolatis trinerviis integrerimis. *Sp. pl. 994.*
Berg. cap. 188. Mill. dict. n. 3.
B. foliis lanceolatis trinerviis integris glabris. *Thunb. prod. 122.*
B. foliis lanceolatis acuminatis trinerviis. *Hort. cliff. 494.*
Frutex aethiopicus, rufci angusto et minore folio. Pluk. alm. 158. t. 297. f. 4.
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 188.
Dreynervige Borbonie. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*3. BORBONIA lanceolata.

- B. foliis lanceolatis multinerviis integerrimis. Sp. pl. 994. Mill. dict. n. 1. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 48. t. 217. *
- B. foliis lanceolatis multinerviis integris glabris. Thunb. prod. 122.
- Genista africana frutescens, rufi nervosis foliis. Tournef. inst. 644.
- Spartium africanum frutescens, rufi folio caule amplexante. Comm. hort. 2. p. 195. t. 98. Raj. dendr. 107.
- Frutex aethiopicus, foliis rufi, floribus papilionaceis sericea lanagine fusca villotis. Pluk alm. 159. t. 297. f. 3.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 189.
- Lanzettblättrige Borbonie. W.
- Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)
Caulis glaber est.

*4. BORBONIA perfoliata.

- B. foliis amplexicaulibus integerrimis reticulatis. Thunb. prod. 122.
- Durchwachsene Borbonie. W.
- Habitat in Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

5. BORBONIA ciliata. W.

- B. foliis cordatis amplexicaulibus obtusis multinerviis integerrimis ciliatis. W.
- B. (perforata) foliis amplexicaulibus ciliatis, caule decumbente. Thunb. prod. 122.
- Crotalaria (perforata) foliis perfoliatis cordatis denticulatis. Mont. 439.
- Crotalaria foliis perfoliatis ovatis margine scabris. Sp. pl. 1003. Amoen. acad. 6. afr 38. *
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8 p. 499. t. 62. f. 2.
- Gefranzte Borbonie. W.
- Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)
Caulis teres glaber. Folia ovata obtusa integerima profunde cordata amplexicaulia multinervia uncialia, margine pilis tenuibus longis ciliata. Pedunculi axillares filiformes apice multiflori. W.

*6. BORBONIA *undulata*.

B. foliis amplexicaulibus undulatis mucrone reflexo.
Thunb. prod. 122.

Wellenförmige Borbonie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

7. BORBONIA *cordata*.

B. foliis cordatis multinerviis integerimis Sp. pl. 994. Mill. dict. u. 2. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 48. t. 218.*

B. foliis cordatis multinerviis crenatis glabris. Thunb. prod. 122?

B. foliis cordatis acuminatis integerimis multinerviis. Hort. cliff. 494. Roy. lugdb. 372.

Genista africana frutescens, rufci foliis nervosis, flore lateo. Seb. thes. 1. p. 38. t. 24. f. 3.

Planta leguminosa aethiopica, foliis rufci. Breyn. cent. t. 28.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 189.

Herzblättrige Borbonie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Calyx quinquefidus, subaequalis, hirsutus: laciniis spinosis. Corollae totae extus tomentosae.

Rami villosi. Folia ovato-lanceolata basi levissime cordata sessilia integerima glabra multinervia. W.

8. BORBONIA *crenata*.

B. foliis cordatis multinerviis denticulatis. Sp. pl. 994. Berg. cap. 191.

B. foliis cordatis multinerviis amplexicaulibus subrotundis acutis denticulatis, caule erecto. Thunb. prod. 122.

Frutex aethiopicus leguminosus, foliis rufci majoribus in ambitu spinulis fimbriatis. Pluk. alm. 159.

Planta leguminosa aethiopica, foliis rufci. Breyn. cent. 69. t. 28.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 190.

Gezähnte Borbonie. W.

Habitat in Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Folia cordata, amplexicaulia, reticulofo-venosa, glabra, denticulata, mucronata. Flores racemosi.

* 1330. ACHYRONIA.

Wendl. obs. bot. 39.

*Cal. 5-dentatus, dente inferiore elongato bifido.
Legumen compressum polyspermum.*

* I. ACHYRONIA *villofa.*

A. *villofa.* *Wendl. obs. bot. p. 40.* Ejusd. hort. herrenhus. I. p. 16. t. 12.**

Haarige Achyronie. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♂ (v. f.)

Facies Borboniae. Frutex bipedalis erectus, ramis teretibus pilis sparsis sericeis longis patulis obfisis. Folia lanceolata rigidiuscula acuta integerrima glabra pilis sericeis longis margine instructa. Pedunculi axillares uniflori. Calyx villosus. Corolla flava. W.

* 1331. OEDMANNIA.

Thunb. prod. 2. praef.

Cal. bilabiatus; Labium superius bifidum, inferius setaceum.

* I. OEDMANNIA *lancea.*

O. *lancea.* *Thunb. prod. 122. Thunb. Act. holm. 1800.
p. 281. t. 4.**

Lanzenblättrige Oedmannie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 2.

Caulis subherbaceus adscendens erectiusculus glaber simplex pedalis fuscus. Folia lanceolata sesquipollucaria integerrima alterna glabra. Pedunculi axillares uniflori foliis multo breviores solitarii. W.

1332. SPARTIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1166.

Stigma longitudinale, supra villosum. Filamenta germini adhaerentia. Cal. deorsum productus.

* *Foliis simplicibus.*

1. SPARTIUM junceum.

S. ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 356. *Hort. upf.* 208. *Roy. lug db.* 370. *Sauv. monsp.* 60. *Gron. orient.* 211. *Mill. dict. n. I.* *Medic. in obs. Soc. oecon. Lutr.* 1774. p. 276. *Kniph. cent.* I. n. 83. *Willd. arb.* 368. *Jacq. Collect.* 3. p. 81.*

S. arborescens, semenibus lenti similibus. *Bauh. pin.* 396.

S. macrolobium. *Renealm. spec.* 34. t. 33.

Genista juncea. *Bauh. hist.* I. p. 395. *Scop. carn. ed.* 2. n. 870. *Duham. arb.* I. p. 257. t. 103.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 192.

Binzenartige Pfriemen. W.

Habitat in G. Narbonensi, Italia, Sicilia, Turcia, Carniola. ḥ (v. v.)

2. SPARTIUM aphyllum.

S. ramis teretibus strictis glabris virgatis, foliis linearibus brevissimis suffultis. *Lin. suppl.* 320. *Pall. itin.* 3. app. n. 106. t. V. f. 2.*

Blattlose Pfriemen. W

Habitat in arena mobili deserti Volgensis. ḥ

Ramis et eorum ramificationibus in simplicissimos filiformes et attenuatos floriferos ramulos refert S. junceum. Folia nulla in toto caute, nisi unicum parvum, (quod potius stipulam refert) lineare ad singulam divisionem ramuli, quod cito marceficit. Bracteae ad singulum florem parvae subulatae. Flores parvi pedicellati ad latera ramulorum racemum formantes. Corollae violaceae. Leguminina brevia compressa cana disperma. W.

3. SPARTIUM *monospermum*.

S. ramis teretibus striatis, racemis lateralibus paucifloris, floribus subaggregatis, foliis lanceolatis sericeis.
Ait. Kew. 3. p. 10.

S. ramis angulatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis. Hort. cliff. 355. Roy. lugdb. 370. Sauv. monsp. 60. Osb. it. 37. Mill. dict. n. 3. Desf. atl. 2. p. 130.*

S. tertium flore albo. Bauh. pin. 369.

S. tertium hispanicum. Clus. hist. 1. p. 103.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 191.

Einfärmige Pflriemen. W.

Habitat in Hispaniae sterilioribus. ♂ (v. f.)

Flores albi.

4. SPARTIUM *sphaerocarpon*.

S. ramis teretibus striatis, racemis lateralibus multifloris, floribus remotis, foliis lanceolatis sessilibus subtus pubescentibus. Ait. Kew. 3. p. 11.

S. ramis teretibus, foliis lanceolatis sessilibus subtus pubescentibus. Mant. 571. Desf. atl. 2. p. 129.*

S. alterum monospermum, semine reni simili. Bauh. pin. 396.

S. hypolphaerolobium. Reneal. Spec. 35. t. 33.

Spartium 2. hispanicum. Clus. hist. 1. p. 103.

Spartium frutex majus. Dod. pent. 764.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 192.

Rundfrüchtige Pflriemen. W.

Habitat in Europa australi. ♂ (v. f.)

Caulis erecti, ramis teretibus, vix striatis. Flores lutei; adeoque a praecedenti distinctissimum.

5. SPARTIUM *cinereum*.

S. ramis teretibus decemfulcatis, floribus axillaribus solitariis pubescentibus, foliis lanceolatis sessilibus sericeis. W.

Spartium cinereum. Villars prospect. 40.

Genista (*Scoparia*) foliis simplicibus hirsutis, ramis decem angulatis cinereis. Vill. delph. 3. p. 420.* Bel. lard. app. ad fl. ped. p. 34.*

Graue Pflriemen. W.

*Habitat in Delphinatu inque comitatu Nicaeensi. ḥ
(v. f.)*

Rami stricti virgati virides striis decem albis notati. Folia subsessilia lanceolata sericea sparsa. Pedunculi brevissimi uniflori in ramis sparsi. Flores ochroleuci magnitudine sequentis. Differt a *S. purganti*: ramis virgatis strictis, nec divaricatis patentibus, foliis simplicibus, floribus brevissime pedunculatis, qui pedunculo longo filiformi in *S. purganti* sunt suffulti. W.

*6. SPARTIUM *virgatum*.

S. ramis teretibus striatis, floribus axillaribus solitariis subracemosis, vexillis carinaque pubescentibus, foliis oblongo-lanceolatis sericeis. W.

S. (*virgatum*) ramis teretibus striatis, foliis lanceolato-oblongis sericeis, calycibus infundibuliformibus bilabiatis hirtis, vexillo carinaque pubescentibus. Ait.
Kew. 3. p. II.

Cytisus (*tener*) foliis simplicibus lanceolatis, ramis teretibus. Jacq. ic. rar. I. t. 147. Collect. I. p. 40.*

Ruthenförmige Pfriemen. W.

Habitat in Madera. ḥ (v. v.)

*7. SPARTIUM *ramosissimum*.

S. ramis teretibus fulcatis strictis, floribus axillaribus geminis ternisve, vexillis carinaque pilosis, foliis lanceolatis alternis fasciculatisque pilosis. W.

S. inerme ramosissimum, ramis tuberculosis, foliis lanceolatis villosis ternis simplicibusque, floribus glomeratis confertis axillaribus subsessilibus, corollis sericeis.

Dcsf. atl. 2. p. 132. t. 178.*

Vielästige Pfriemen. W.

Habitat in Atlante prope Tlemcen. ḥ (v. f.)

Rami teretes fulcati stricti, seniores aphylli verrucosi. Folia lanceolata acutiuscula pilosa, in ramulis junioribus alternis in reliquis ternis quaternisve fasciculatis, nunquam vero ternata, subsessilia vel brevissime petiolata pilosa. Flores axillares externe pilosi brevissime pedunculati geminati vel terni. W.

8. SPAR-

8. SPARTIUM *purgans*.

S. ramis teretibus striatis, floribus axillaribus solitariis, foliis lanceolatis sericeis subfessilibus. W.

S. ramis teretibus striatis, foliis lanceolatis subfessilibus pubescentibus. *Syst. Nat. ed 13. p. 474.* Ger. prov. 480. *Gouan. monsp. 474.*

Genista purgans. *Spec. pl. 2. p. 999.* *Mill. dict. n. 2.* *Bulliard herb. t. 115.*

Genista s. spartium purgans. *Bauh. hist. I. p. 404.* *Tournef. inst 644.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 193.

Purgier-Pfriemen. W.

Habitat Monspelii. ḥ

Rami inermes. Legumina ovata, pendula, hinc sinuata.

Flores ochroleuci magnitudine *S. multiflori.* W.

*9. SPARTIUM *umbellatum*.

S. ramis teretibus striatis, floribus terminalibus capitatis, foliis linear-lanceolatis sericeis. W.

S. ramosissimum, foliis ternatis et simplicibus, floribus capitatis terminalibus, corollis leguminibusque sericeis. *Desf. atl. 2. p. 133. t. 180.**

S. foliis ternatis simplicibusve, ramis oppositis alternisque, floribus capitatis terminalibus. *l'Herit. stirp. 183.*

Doldenblütige Pfriemen. W.

Habitat in maritimis Barbariae prope Arzeau. ḥ (v. f.)

Folia simplicia rarissime ternata. *Diversissimum floribus capitatis.* W.

10. SPARTIUM *Scorpius*.

S. ramis teretibus striatis patentibus spinosis, pedunculis axillaribus multifloris, foliis oblongis acutis sericeis. W.

S. ramis spinosis patentibus, foliis ovatis. *Sp. pl. 995.* *Gouan. monsp. 355.* *Ger. prov. 480.*

Genista spartium spinosum majus, flore luteo. *Bauh. pin. 394.*

Aspalathus secunda monspeliensis. *Bauh. hist. I. p. 402.*

- Aspalathus alter* 3. *Clus. hist. p. 106.*
β. *Genista spartium spinosum majus secundum, flore pallido.* *Bauh. pin. 394.*
γ. *Genista spartium spinosum majus tertium hirsutum.*
Bauh. pin. 394.
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 194.
Dornige Pfriemen. W.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ḥ (v. f.)
Frutex totus ex spinis alternis, quibus flores insident.

* II. SPARTIUM *aspalathoides*.

- S.* *ramis angulatis tuberculatis spinosis, pedunculis unifloris axillaribus, foliis lanceolatis sericeis.* *W.*
S. *ramulis arcuatis glabris tuberculosis floriferis, foliis linearis-lanceolatis simplicibus, floribus axillaribus pedicellatis, calyce tripartito, corollis sericeis.* *Desf. atl. 2. p. 136.**
Genista (aspalathoides) foliis linearis-lanceolatis subsericeis, ramis striatis tuberculatis apice spinosis floribus axillaribus. *Lamarck encycl. 2. p. 614.* *Poiret itin. 2. p. 209.*
Witschenartige Pfriemen. W.
Habitat in Barbaria. ḥ (v. f.)

* * *Foliis ternatis.*

* 12. SPARTIUM *multiflorum*.

- S.* *foliis ternatis simplicibus sericeis, virgulatis strictis striatis undique floridis.* *Ait. Kew. 3. p. 11. l'Herit. stirp. 183.* *Willd. arb. 368.**
S. *(album) foliis ternatis sericeis, virgultis strictis undique floridis,* *Desf. atl. 2. p. 132.**
S. *(dispermum) ramis angulatis strictis, foliis petiolatis, floribus solitariis geminatisque.* *Willd. in bot. mag. 4. p. 35. t. 2.**
Cytisus lusitanicus, foliis minimis argenteis, parvo flore albo. *Tournef. inst. 648.*
Genista alba. *Tabern. hist. 1100.*
Vielblumige Pfriemen. W.
Habitat in Lusitania, Barbaria. ḥ (v. v.)
Folia plerumque simplicia, rarius ternata. *W.*

13. SPARTIUM *angulatum*.

S. foliis solitariis ternatisque linearis-lanceolatis canis, ramis sexangularibus apice floriferis. W.

S. foliis solitariis ternatisque, ramis sexangularibus apice floriferis. Sp. pl. 996. Mill. dict. n. 8.

Spartium orientale, siliqua compressa glabra et annulata. Tournef. cor. 44.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 194.

Eckige Pfriemen. W.

Habitat in Oriente. ḥ (v. f.)

Anguli tres decurrent per ramos a singulo folio.

*14. SPARTIUM *perficum*. W. †

S. foliis ternatis linearis-lanceolatis petiolatis, ramis teretibus divaricatis, floribus lateralibus solitariis cernuis. W.

Cytisus (perficus) ramis strictis divaricatis, floribus solitariis sparsis, foliis linearis-lanceolatis, medio duplo longiore. Burm. ind. 163. t. 51. f. 1.

Perlsche Pfriemen W.

Habitat in Persia. ḥ

Flores magnitudine *S. multiflori*. W.

15. SPARTIUM *patens*.

S. foliis ternatis petiolatis obovatis, ramis teretibus striatis, floribus lateralibus geminis nutantibus. W.

S. foliis ternatis, ramis virgatis, floribus lateralibus geminis cernuis. Syst. Veg. 535. Cavan. ic. 2. p. 58. t. 176.*

Cytisus (patens) floribus pedunculatis subbinatis lateribus nutantibus. Syst. Veg. 555.

Cytisus (pendulinus) floribus subbinatis pedunculatis lateralibus nutantibus secundis. Lin. suppl. 328.*

Cytisus lusitanicus, medicae folio, floribus in foliorum alis. Tournef. instl. 648.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 195.

Ausgebreitete Pfriemen.

Habitat in Lusitania, Hispania. ḥ (v. f.)

Frutex Ramis virgatis, patentibus, striatis. Folia ternata, parva: foliolis obovatis, subaequalibus, subtus subpubescentibus. Flores laterales, magni, tumi-

di, flavissimi, penduli deorsum, bini: vexilli dorso macula fulva. Semen hirsutum.

16. SPARTIUM *nubigenum*.

S. foliis ternatis lanceolatis pilosis petiolatis, floribus lateralibus fasciculatis, leguminibus glabris, ramis teretibus striatis. *Ait. Kew. 3. p. 13.*

S. (*supranubium*) foliis ternatis, floribus axillaribus pluribus pedunculatis, ramis virgatis sulcatis canis, leguminibus glabris. *Lin. suppl. 319.*

Wolken-Pfriemen. W.

Habitat in summis cacuminum lateribus montis Pico insulae Teneriffae. ḥ

Refert exacte primo visu S. junceum, sed folia ternata ramique sulcati. apices ramorum jaepē aphylli. Frutex pulcherrimus ob copiam florum alborum fragrantissimorum. Folia petiolata ternata linearia parva. Pedunculi in axillis foliorum plures congesti uniflori. Flores albi odoratissimi parvi. Legumina compressa glabra, dum siccantur nigra.

*17. SPARTIUM *biflorum*.

S. foliis ternatis lineariformibus petiolatis, floribus terminalibus subgeminis, leguminibus glabris, ramis angulatis. W.

S. inerme, ramulis angulosis, foliis petiolatis ternis linearibus subvillosis, floribus geminis terminalibus.

Desf. atl. 2. p. 133. t. 179. *

Zweyblumige Pfriemen. W.

Habitat in Atlante prope Tlemcen. ḥ (v. f.)

Flores stavi magnitudine S. scoparii in apice ramosum solitarii vel gemini. W.

18. SPARTIUM *linifolium*.

S. foliis ternatis sessilibus linearibus subtus sericeis, racemo terminali, ramis teretibus sulcatis. W.

S. (*linifolium*) inerme ramis angulatis, foliis sessilibus ternatis, foliis linearibus subtus incanis, floribus racemosis terminalibus. *Desf. atl. 2. p. 134. t. 181.* *

Genista (linifolia) foliis ternatis sessilibus linearibus subtus sericeis. Sp. pl. 405.

Genista tinctoria hispanica. Cluf. hist. I. p. 101.

Cytisus argenteus linifolius insularum stoechadum. Tournef. inst. 648. Garid. aix. 147. Ger. prov. 485.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 202.

Flachsblättrige Ptiemen. W.

Habitat in Gallia australi, Hispania, Barbaria, Oriente. ḥ (v. v.)

Frutex parvus (tri-vel quadripedalis IV.): Ramis nodosis, dentibus a foliorum casu remanentibus; Ramulis foliatis angulatis erectis sericeis. Folia sessilia ternata confertiora alterna; Foliolis linearibus subaequalibus acutis, margine revolutis, subitus tomentosof sericeis. Racemi terminales. Calyx tripartitus, infima trifida. Corollae Genistae tinctoriae. Legumina villosa.

19. SPARTIUM scoparium.

S. foliis ternatis solitariisque oblongis, floribus axillari bus, leguminibus margine pilosis, ramis angulatis. W.

S. foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. Hort. cliff. 356. Fl. suec. 589; 633. Roy. lugdb. 370. Gort. gelr. 415. Mill. dict. n. 4. Pollich. pal. 665. Du Roi herb. 2. p. 425. Leers herb. n. 522. Gmel. tub. 214. Willd. arb. 369. * Oeder dan. t. 313. Hoffm. germ. 250. Roth. germ. I. 302. II. 159.

S. foliis inferioribus ternatis hirsutis, superioribus simplicibus. Hall. helv. n. 354.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo. Tournef. inst. 649. Du Ham. arb. I. t. 84. R.

Genista angulosa et scoparia. Bauh. pin. 395.

Genista. Dod. pempt. 761. Riv. t. 65. Balckw. t. 344.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 196.

Gemeine Ptiemen. W.

Habitat in Europae australioris arenosis. ḥ (v. v.)

***20. SPARTIUM arboreum.**

S. foliis ternatis obovatis, floribus axillaribus, leguminibus villosis, ramis teretibus fulcatis. W.

S. foliis ternatis obovatis, ramis striatis, floribus aggregatis axillaribus nutantibus, leguminibus villosis, villosis adpressis. *Desf. atl. 2. p. 131. t. 177.**

Cytisus foliis subrotundis glabris, floribus amplis gloomeratis pendulis. *Shav. afr. n. 191.*

Baumartige Pfriemen. W.

Habitat in Barbaria *prope* Algeriam *inque* Atlante. Ȣ (v. f.)

Frutex 8 vel 10-pedalis crassitie fere brachii. Flores magni flavi. W.

21. SPARTIUM radiatum.

S. foliis ternatis linearibus, petiolis dilatatis persistentibus, racemis capitatis terminalibus, ramis angulatis oppositis confertis. W.

S. foliis ternatis linearibus sessilibus, petiolis persistentibus, ramis oppositis angulatis. *Sp. pl. 996. Mill. dict. n. 2. et. ic. t. 249. f. 1. Jacq. Collect. 3. p. 83.**

S. aequicolorum minimum montanum triphyllum. *Col. ephr. 1. p. 295. t. 294.*

Genista radiata. Scop. carn. n. 871.

Genista radiata f. stellaris. Bauh. hist. 1. p. 399.

Houftuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 198.

Gefrahlté Pfriemen. W.

Habitat in Italia, Carniola. Ȣ (v. v.)

Caules humiles: Ramis oppositis, tetragonis. Folia opposita, ternata, subsessilia: Foliolis sessilibus, linearibus, tenuibus, subpubescentibus. Petoli omnium brevissimi, persistentes, trigoni, gibbi, obtusissimi rameo fulciendo crassiores. Flores terminales, terni, sessiles, Bractea acuta, decidua suffulti.

***22. SPARTIUM ferox.**

S. foliis ternatis simplicibusque oblongis mucronatis, racemo terminali, ramis striatis teretibus spinescentibus. W.

S. (ferox) spinosum, foliis ternatis simplicibusque mucronatis, floribus racemosis, leguminibus compressis, subtorulofis elongata lanugine brevissima canescensibus. Desf. atl. 2. p. 136. t. 182. *

S. (ferox) foliis sparsis simplicibus sessilibus, ramis striatis spinosis, racemis foliosis lateralibus. Poiret itin. 2. p. 206.

S. (heterophyllum) foliis ternatis simplicibusque, floribus spicatis terminalibus, ramis striatis spinescentibus. l' Herit. stirp. 183.

Cytisus foliis oblongis sessilibus glabris, siliquis compressis incanis. Shaw. afr. n. 194.

Wilde Pfriemen. W.

Habitat in Barbaria. ৎ. (v. f. f. fl.)

Corolla flava magnitudine sequentis. W.

23. SPARTIUM *spinosum.*

S. foliis ternatis obovatis, pedunculis axillaribus, calycibus leguminibusque glabris, ramis angulatis spinosis. W.

S. foliis ternatis, ramis angulatis spinosis. Hort. cliff. 356. Hort. upf. 208. Roy. lugdb. 370. Sauv. monsp. 191. Gron. orient. 212. Mill. dict. n. 9. Desf. atl. 2. p. 135.

Acacia trifolia. Bauh. pin. 392.

Apalathus secunda trifolia. Bauh. hist. 1. p. 375.

Acacia altera Dioscoridis. Dod. pempt. 753. Lobel. ic. 2. p. 95. Tabern. hist. 1089.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 199.

Starkdornige Pfriemen W.

Habitat in Italia, Hispania, Barbaria. ৎ (v. f.)

*24. SPARTIUM *villosum.*

S. foliis ternatis oblongo-obovatis, pedunculis axillariibus, calycibus leguminibusque villosis, ramis angulatis spinosis. W.

S. (villosum) foliis ternatis, ramis spinosis, calycibus leguminibusque hirsutis. Vahl symb. 2. p. 80. Poiret itin. 2. p. 207. *

S. (lanigerum) foliis ternis, ramis spinosis, leguminibus crassis villoso-lanuginosis. Desf. atl. 2. p. 135.

Cytisus spinosus creticus, siliquis villis densissimis longissimis et incanis obducta. *Tournef. cor. 44.*
Haarige Pfriemen. W

Habitat in Barbaria, Creta. ḥ (v. f.)

Simile S. spinoso differt vero: foliolis parum longioribus, calycibus incano-pubescentibus, leguminibusque albo-villosum. W.

*25. SPARTIUM horridum.

S. foliis ternatis linearibus complicatis, floribus subgeminis terminalibus, ramis angulatis spinosis oppositis. W.

S. foliis ternatis complicatis fericeis, ramulis teretibus spinosis oppositis. *Vahl symb. 1. p. 51.* *

Langdornige Pfriemen. W.

Habitat in Arragonia. ḥ (v. f.)

Rami sexfulcati spinosi. *Facies Ulicis. W.*

1333. G E N I S T A.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1167.

Cla. bilabiatus: $\frac{3}{2}$ dentibus binis superioribus brevissimis. *Vexillum oblongum a pistilio staminibusque deorsum reflexum.*

* *Inermes.*

I. GENISTA canariensis.

G. foliis ternatis oblongis subtus pubescentibus pilis patulis, pedunculis multifloris terminalibus, ramis angulatis. W.

G. foliis ternatis utrinque pubescentibus, ramis angulatis. *Syst. Veg. p. 536.*

G. foliis ternatis tomentosis petiolatis, ramis angulatis. *Hort. cliff. 355. Mat. med. 170. Roy. lugdb. 371. Kniph. cent. 1. n. 35.*

Cytisus minoribus foliis, ramulis tenellis villosis. *Bauh. pin. 390.*

Cytisus 1. *Cluf. hist. 1. p. 94.*

* 3 *Cytisus canariensis sempervirens et incanus.* *Comm. hort. 2. p. 103. t. 52.*

Cytisus canariensis, flore candido et citrino. *Seb. thes. 2. p. 6. t. 4. f. 6. 7.*

Cytisus canariensis microphyllus angustifolius prorsus incanus. *Pluk. alm. 128. t. 277. f. 6.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 200.

Canarischer Ginster. W.

Habitat in Hispania, Canariis. h (v. s.)

Folia obovata, submucronata, utrinque pubescentia, at floralia subeffilia, minuta. Calyx trifidus: infima tridentata. Corymbi 5. f. 6-flori. Legumina albo-villosa. Fores fragrantes.

2. GENISTA *candicans.*

G. foliis ternatis obovatis pubescentibus pilis adpresso-sis, pedunculis multifloris terminalibus, ramis angula-tis. W.

G. foliis ternatis subtus villosis, pedunculis lateralibus subquinquefloris foliatis, leguminibus hirsutis. *Amoen. acad. 4. p. 284.* Mill. dict. n. 5.*

Cytisus floribus lateralibus, foliis hirsutis, caule erecto striato. *Sauv. monsp. 191. Sp. pl. I. p. 740.*

Cytisus monspessulanus, medicae folio, siliquis dense congestis et villosis. *Tournef. insi. 648.*

Cytisus sylvestris candicans. *Caesalp. plant. 113.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 201.

Weisslicher Ginster. W.

Habitat in Italia, Monspelii. h (v. v.)

Similis G. canariensi, sed Foliola majora, ovalia, subtus pubescentia, utrinque acuta. Ramuli laterales breves. Calyces trifidi. Flores inodori. Folia floralia petiolata, vix minora.

Similis praecedenti sed folia duplo majora obovata utrinque pilis adpresso-sis tecta. In G. canariensi ramii et folia subtus pilis patentibus sunt obsoita. W.

* 3. GENISTA *viscosa.* W.

G. foliis ternatis oblongis glabris, racemo terminali, ca-lycibus leguminibusque glandulofo-viscolis, ramis teretibus striatis. W.

Klebriger Ginster. W.

Habitat in Canariis? t̄ (v. f.)

Rami teretes striati, juniores tenuissime pubescentes. Folia ternata petiolata. Foliola oblonga mucronata basi atenuata glabra. Racemi tri- vel quadriplicares terminales. Calyces glandulis pedicellatis tecti. Corolla flava praecedentis. Legumen lineare glandulis obsitum. Differt a binis praecedentibus: foliis glabris, racemis longis, calycibus leguminibusque glandulosis. W.

*4. GENISTA triquetra.

G. foliis ternatis, summis simplicibus, ramis triquetris procumbentibus. Ait. Kew. 3. p. 14. l' Herit. stirp. 183. Willd. arb. 127.*

G. foliis ternatis simplicibusque ovato-lanceolatis pilosis, caulinis triquetris, racemis brevibus et terminalibus. Lamarck encycl. 2. p. 616.

Dreikantiger Ginster. W.

Habitat in insula Corsica. t̄ (v. v.)

5. GENISTA sagittalis.

G. ramis ancipitibus membranaceis articulatis, foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 355. Roy. lugdb. 371. Mill. ic. t. 259. f. 2. Crantz aust. p. 367. Jacq. aust. t. 209. Scop. carn. n. 872. Pollich pal. n. 666. Doerr. nass. p. 259. Hoffm. germ. 250.

G. foliis adpressis, ellipticis, fine lanceolato-patente. Hall. helv. n. 353.

Spartium sagittale. Roth germ. I. 302. II. 159.

G. herbacea s. Chamae-spartium. Bauh. hist. I. p. 393.

Chamae-Genista sagittalis. Bauh. pin. 395.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 203.

Geflügelter Ginster. W.

Habitat in Germaniae, Galliae arenosis sterilibus. 24 (v. v.)

Siliqua tetrasperma. R.

6. GENISTA tridentata.

G. ramis triquetris membranaceis subarticulatis, foliis tricuspidatis. Sp. p. 998. Mill. dict. n. 6.

Genistella fruticosa lusitanica latifolia. *Tournef. inst.*
646.

Chamae-Genista peregrina. *Dalechamp. hist.* 177.

Chamae-Genista caule foliato. *Bauh. pin.* 396.

β *Genista fruticosa lusitanica angustifolia.* *Tournef. inst.*
646.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 204.

Dreyzähniger Ginster. W.

Habitat in Lusitania. *Loefl.* 5

Praecedenti valde affinis, at majora omnia et articuli ramorum in folium laterale terminati, non integri, sed tricuspidati. *Legumina albo-lanata.*

*7. GENISTA triangularis.

G. foliis lanceolatis mucronatis glabris, ramis triquetris adscendentibus, leguminibus glabris. W.

Genista triquetra. *Waldst. et Kitaihel pl. rar. hung.*

Dreyeckiger Ginster. W.

Habitat in Banatu. 5 (v. f.)

Caules adscendentes glabri, ramis triquetris. Folia lanceolata integerrima glabra acuta mucronata subsessilia. Flores axillares. Legumina compressa mucronata glabra. Similis G. tinctoriae sed ramis et foliis distincta. W.

8. GENISTA tinctoria.

G. foliis lanceolatis glabris, ramis teretibus striatis erectis, leguminibus glabris. W.

G. foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Hort. cliff* 355. *Fl. suec.* 587; 634. *Mat. med.* 170. *Roy. lugdb.* 371. *Gort. gelr.* 416. *Crantz austr.* 366. *Scop. carn.* n. 873. *Gmel. tub.* 215. *Du Roi harbk.* I. p. 291. *Pollich pal.* n. 667. *Pall. it.* I. p. 63. *Willd. arb.* 128. *Hoffm. germ.* 251. *Kniph. cent.* 6. n. 42. *Mill. dict.* n. 3.

Spartium tinctorium. *Roth germ.* I. 302. II. 160.

G. inermis, foliis glabris, confertis, ellipticis, lanceolatis, floribus sessilibus, spicatis. *Hall. helv.* n. 350.

G. tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395.

G. tinctoria vulgaris. *Clus. hist.* I. p. 101.

Genistella. *Riv. t.* 67. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 204.

Färbender Ginster. W.

Habitat in Germania, Anglia. ḥ (v. v.)

Stamina 8 et 10 habet. Scop. Du Roi. R.

*9. GENISTA ovata.

G. foliis oblongo-ovatis leguminibus pue hirsutis, ramis teretibus striatis. W.

Genista ovata. Waldfst. et Kitaib. pl. rar. hung.

Eysförmiger Ginster. W.

Habitat in Slavoniae et Banatus collibus. ḥ (v. f.)

Caulis basi frutescens ramosus erectus vel adscendens semipedalis et pedalis, ramis teretibus striatis hirtis. Folia oblongo-ovata acuta utrinque hirsuta. Flores axillares in apice caulis racemosi ut in praecedente. Legumina compressa pollicaria acuta pilis albis tecta. Simillima G. tinctoriae sed foliis leguminibusque hirsutis abunde distincta. W.

10. GENISTA sibirica.

G. foliis lanceolatis glabris, ramis aequalibus teretibus erectis. Mant. 571. (Jacq. hort. t. 190. R.)

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 206.

Sibirischer Ginster. W.

Habitat in Siberia. ḥ

Similis G. tinctoriae, sed Caules non striati aut angulosi, vix lineati, neque villositas ulla in caule aut foliis. Folia angustiora nonnihil. Flores multum remoti, spicis paniculatis.

11. GENISTA florida.

G. foliis lanceolatis sericeis, ramis striatis teretibus, racemis secundis. Sp. pl. 998. Mill. dict. n. 2.

G. tinctoria frutescens, foliis incanis. Bauk. pin. 395.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 206.

Blühender Ginster. W.

Habitat in Hispania. ḥ (v. f.)

*12. GENISTA procumbens.

G. foliis lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus ternis foliis longioribus, corollis glabris, ramis teretibus striatis. W.

Genista procumbens. Waldst. et Kitaib. pl. rar. Hung.
Liegender Ginster. W.

Habitat in sylvis Hungariae, Moraviae. ḥ (v. f.)

Rami procumbentes pedales vel sesquipedales teretes striati pubescentes. Folia lanceolata acuta utrinque pilis raris adpresso obsoita, in ramis senioribus fasciculata, in junioribus alterna. Pedunculi plerumque terni foliis longiores. Corolla glabra magnitudine et facie Cytisi supini. W.

*13. GENISTA decumbens. W.

G. foliis lanceolatis obtusis mucronatis subtus sericeis, pedunculis axillaribus folio aequalibus, corollis sericeis, ramis angulatis. W.

G. (*prostrata*) caulis prostratis ramosissimis, foliis oblongo-ovalibus villosis, floribus longe pedunculatis solitariis lateralibus. Lamarck encycl. 2. p. 612.

G. (*pedunculata*) foliis simplicibus, pedunculis folio aequalibus, caulis prostratis. l'Herit stirp. 184.

Spartium (*decumbens*) caule decumbente ramoso, foliis solitariis ovatis, floribus longe petiolatis. Ait. Kew. 3. p. II. Hall. helv. n. 355.

Gestreckter Ginster W.

Habitat in Gallia, Helvetia. ḥ (v. f.)

Simillima praecedenti sed satis diversa: caulis brevioribus ramosissimis, foliis obtusis mucronatis subtus sericeis, floribus minoribus pallidioribus, vexillo carinaque sericeo-pilosis. W.

14. GENISTA pilosa.

G. foliis lanceolatis complicatis, pedunculis axillaribus brevissimis, corollis pilosis, caule tuberculato striato procumbente. W.

G. foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. Hort. cliff. 355. Fl. suec. 588; 635. Roy. lugdb. 371. Mill. dict. n. 7. Crantz austr. p. 365. Jacq. aust. t. 208. Scop. earn. n. 874. Pollich. pal. n. 668. Doerr. nass. p. 259. Kniph. cent. 5. n. 33. Hoffm. germ. 251. Wyld. arb. 129.

G. inermis, procumbens, foliis duris, subhirsutis, spicis brevibus, foliolis. Hall. helv. n. 351.

- Spartium pilosum.** *Roth. germ. I. 303. II. 161.**
G. ramosa, foliis hyperici. *Bauh. pin. 395.*
Chamae-Genista foliis genistae vulgaris. *Bauh. pin.*
 395.
Chamae-Genista montana hispida. *Bauh. pin. 396.*
Genistella pilosa. *Bauh. hist. I. P. 2. p. 393. Hall. R.*
Chamae-Genista prima. *Cuf. hist. I. p. 103. pann. 49.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 207.
Haariger Ginster. W.
Habitat in Pannonina, G. Narbonensi, Germania. 5

*15. GENISTA humifusa.

- G. foliis lanceolatis planis utrinque pilosis, pedunculis axillaribus brevissimis, corollis sericeis, caule tuberculato-striato procumbente.** W.
G. foliis lanceolatis ciliatis, ramis prostratis striatis villosis. Sp. pl. 998.
G. orientalis minima humifusa, foliis subrotundis ad oras pilosis. *Tournef. cor. 44.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 208.
Zwerg-Ginster. W.
Habitat in Oriente. D. Gerard. 5 (v. f.)
Valde affinis antecedenti, at satis distincta: foliis planis acutis utrinque valde pilosis. W.

*16. GENISTA albida. W.

- G. foliis lanceolatis albido-villosis, floribus axillaribus sessilibus, corollis villosis, caule procumbente sulcato.** W.
Weißlicher Ginster. W.
Habitat in Tauria. 5 (v. f.)
Caulis procumbens ramosus sulcatus. Folia lanceolata villosa albida brevissime petiolata. Flores sessiles axillares. Corollae flavae externe pilis sericeis patulis tectae. A praecedenti diversa: foliis albido-vilosis, floribusque majoribus sessilibus. W.

*17. GENISTA diffusa. W.

- G. foliis lanceolatis glabris subciliatis, pedunculis axillaribus, corollis glabris ramis triquetris procumbentibus.** W.

G. (*humifusa*) foliis obtuse lanceolatis, per oras pilosociliatis, ramis in orbem prostratis striatis pubentibus, floribus erectis pedunculatis interrupto-fasciculatis. leguminibus glabris. *Wulfen in Jacq. Collect. 2.* p. 169.*

Spartium decumbens. *Hort. synop. 388.* *Jacq. ic. rar.* 3. t. 555.

Ausgebreiteter Ginster. W.

Habitat Tergesti in et apricis, in Styria. (v. f.)

A Genisia decumbente longe diversa caule triquetro, corollis glabris et toto habitu. W.

*18. GENISTA sericea.

G. foliis lanceolatis subtus sericeis, floribus terminalibus subracemosis, corollis sericeis, ramis erectis teretibus. W.

G. foliis lanceolatis subtus villosis, ramis teretibus striatis erectis, racemis paucifloris secundis, bracteis calyce longioribus. *Wulfen in Jacq. Collect. 2. p. 167.* *Jacq. ic. rar. 3. t. 556.* *Hort. synop. 390.*

Seidenartiger Ginster. W.

Habitat in Austria littorali. ḥ (v. f.)

Ab affinibus abunde discrepat: foliis uncialibus utrinque attenuatis subtus sericeis, pedunculis terminalibus subracemosis secundis. W.

* * *Spinofae.*

19. GENISTA anglica.

G. spinis simplicibus compositis, ramis floriferis inermibus, foliis oblongis glabris, racemis foliosis terminalibus, corollis glabris. W.

G. spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 355.* *Roy. lugdb. 371.* *Mill. dict. n. 8.* *Flor. dan t. 619.* *Hoffm. germ. 251.* *Roth germ. I. 303. II. 162.*

G. spinis simplicibus compositisque, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis acutis mucronatis glabris. *Willd. arb. 129.**

G. minor asphaltoides. *Bauh. pin. 395.* *prodr. 157.*

Genistella aculeata. *Lob. ic. 2. t. 93.*

Genistella. Dod. pempt. 670.

Genista - Spartium minus anglicum. Tournef. inst. 645. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 208.

Englischer Ginster. W.

*Habitat in Angliae, Germaniae ericetis humidiusculis.
h (v. v.)*

*20. GENISTA germanica.

G. spinis verrucoso-compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis hirsutis, racemis terminalibus nudis, carina pubescente. W.

G. spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. Sp. pl. 999. Roy. lugdb. 371. Gort. gelr. 417. Crantz aufir. p. 364. Scop. carn. n. 876. Gmel. tub. p. 216. Pollich pal. 669. Hoffm. germ. 251. Roth. germ. I. 303. II. 163.

G. foliis ovato-lanceolatis, hirsutis, spinis ramosis, in ramis fenescentibus. Hall. helv. n. 352.

*G. spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis acutis pilosis. Willd. arb. 130.**

G. spinosa major germanica. Bauh. pin. 395.

Genistella spinosa. Riv. tetr. 67. aculeata. Tabern. 1102.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 209.

Deutscher Ginster. W.

Habitat in Germania, Gallia. h (v. v.)

*21. GENISTA sylvestris.

G. spinis ramosis inermibus flexilibus, foliis linearilanceolatis subtus sericeis, racemo terminali elongato. W.

G. (sylvestris) caulis striatis, spinis foliaceis inermibus, racemo florali longo laxe. Scop. carn. n. 875.

Genista hispanica. Wulfen in Jacq. Collect. 2. p. 165.
Jacq. ic. rar. 3. t. 557. Host. synop. 390.*

*Genistella montis ventosi spinula. Bauh. hist. I. p. 400.
Wald-Ginster. W.*

Habitat in Croatiae, Carnioliae calidioris, herbidis montanis. h (v. f.)

A Genista hispanica diversissima: spinis elongatis mollibus flexilibus, nec rigidis pungentibus, foliis linear-lanceolatis supra glabris, denique racemis elongatis. W.

*22. GENISTA *hispanica*.

G. spinis compositis pungentibus, foliis lanceolatis villosis, racemo terminali subcapitato. W.

G. spinis decompositis, ramis floriferis inermibus, foliis linearibus pilosis. Sp. pl. 999. Mill. dict. n. 9. Gér. prov. 483. Gouan. monsp. 357. Villars delph. 3. p. 423.

G. spinis decompositis, foliis pilosis lanceolato-linearibus. Cavan. ic. 3. p. 6. t. 211.*

Genista spinosa minor hispanica villosissima. Bauh. pin. 395.

Genistella monspeliaca spinosa. Bauh. prodr. 157.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 210.

Spanischer Ginster. W.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ḥ.

Spinae innocuae. G. germanicae adfinis.

*23. GENISTA *hirsuta*.

G. spinis trifidis striatis, foliis lanceolatis ramisque hirsutis, spicis terminalibus, corollis pilosis. W.

G. spinis ternatis decussatis, foliis simplicibus lanceolatis, spicis terminalibus hirsutis. Vahl symbol. I. p. 51.*

Genista-Spartium lusitanicum lanuginosum, aculeis tridentatis longioribus munitum. Tournef. inst. 645.

Rauhäriger Ginster. W.

Habitat in Hispania, Lusitania. ḥ (v. f.)

*24. GENISTA *tricuspidata*.

G. spinis trifidis angulatis, foliis lanceolatis ramisque glabris, racemo terminali, corollis glabris. W.

G. spinis tetragonis tricuspidatis simplicibusque, foliis lanceolatis acutis subvillotis, floribus racemosis, carina recta, vexillo duplo longiore. Desf. atl. 2. p. 138. t. 183.*

Dreyfritziger Ginster. W.

Habitat in Algeriae collibus incultis. ḥ (v. f.)
Affinis praecedenti. W.

25. GENISTA lusitanica.

G. caule aphylo, spinis decussatis. *Sp. pl.* 999.
Genista spartium spinosum minus. Bauh. pin. 394.
Scorpius secundus. Clus. hist. I. p. 107. Bauh. hist. I.
p. 403.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 210.
Portugiesischer Ginster.
Habitat in Lusitania, Hispania. ḥ (v. f.)
Folia sunt linearia caduca. W.

* 1334. **LEBECKIA.**

Thunb. prod. praef. tom. 2.

Cal. 5 - partitus, laciniis acutis, finibus rotundatis. *Legumen cylindrium polyspermum.*

† *Foliis simplicibus.*

I. LEBECKIA contaminata.

L. foliis simplicibus linear - filiformibus glabris, floribus umbellatis. *Thunb. prod. 122.*
Spartium (contaminatum) ramis teretibus, foliis alternis filiformibus basi contaminatis. Mant. 268.

Genista africana frutescens, foliis linariae angustioribus glaucis flore luteo. Raj. dendr. 104.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 191.

Gefleckte Lebeckie. W.

Habitat in Cap. b. spei arenosis. ḥ

Caulis fruticosus virgatus basi ramosus teres laevis. Folia alterna (non sparsa) remota filiformia teretia supra planiuscula basi purpurea, apice subferrugineo patulo, erecta digitalia. Racemus longus erectus terminalis, floribus alternis. Flores fulvi, carina flava.

Differt a L. sepiaria stamine decimo non distincto. Foliis non confertis sparsis quadruplo angustioribus. Basis foliorum in hac nota evidentissima colore purpureo est.

2. LEBECKIA *sepiaria*.

L. foliis simplicibus filiformibus glabris, floribus racemosis. *Thunb. prod.* 122.

Spartium (Sepiarium) ramis scabris, foliis superioribus confertis filiformibus. *Sp. pl.* 995. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 27. *

Spartium foliis sparsis filiformibus longissimis approximatis. *Berg. cap.* 196.

Sparium capense luteum, foliis capillaceis, *Pet. gaz. t.* 183. f. 3.

Genista africana foliis linariae angustissimis glaucis, floribus spicatis luteis. *Raj. dendr.* 145.

Genista foliis Genistae hispanicae, superioribus junceis. *Herm. afr.* II.

Lathyroides lineariae folio aethiopicus. *Pluk. mant.* 114. t. 404. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 191.

Hecken-Lebeckie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

*3. LEBECKIA *pungens*.

L. foliis simplicibus obovatis, ramis ramulisque spinoscentibus tomentosis, floribus solitariis. *Thunb. prod.* 122.

Stechende Lebeckie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

† † *Foliis ternatis.*

*4. LEBECKIA *armata*.

L. foliis ternatis, ramis spinescentibus teretibus cinereis, floribus racemolis. *Thunb. prod.* 122.

Dornige Lebeckie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*5. LEBECKIA *densa*.

L. foliis ternatis villosis, foliolis convolutis oblongis, floribus racemolis remotis. *Thunb. prod.* 122.

Dichtblättrige Lebeckie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*6. LEBECKIA *humilis*.

L. foliis ternatis villosis, foliolis linearibus oblongis, floribus racemosis reflexis, ramis incurvis. Thunb. prod. 122.

Niedrige Lebeckie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5

*7. LEBECKIA *sericea*.

L. foliis ternatis sericeis, foliolis linearibus, floribus racemosis. Thunb. prod. 122.

Spartium (*jericeum*) inerme sericeum foliis ternatis, foliolis linearibus, racemis terminalibus, ramis angustatis. Ait. Kew. 3. p. 12.

Seidenartige Lebeckie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5

8. LEBECKIA *cytisoides*.

L. foliis ternatis villosis, racemo longo terminali. Thunb. prod. 122.

Spartium (*cytisoides*) fruticosum sericeum, foliis petiolatis ternato-linearibus integerrimis, ramis teretibus, racemis terminalibus. Lin. suppl. 320.

Spartium inerme sericeum, foliis ternatis, foliolis lanceolatis obtusiusculis, racemis terminalibus, ramis teretibus. Ait. Kew. 3. p. 12.

Spartium foliis alternis petiolatis ternatis, foliolis linearibus obtusis adpresso villosis, floribus racemosis. Berg. cap. 193.

Ebenus (*capensis*) foliis ternatis. Mant. 264.

Lotus major africanus longioribus et angustis foliis. Pluk. almath. 133.

Trifolium africanum fruticans, folio angustiore, flore rubicante. Com. hort. 2. p. 213. t. 107.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 237.

Cytisusartige Lebeckie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5

Caulis fruticosus. Rami pubescentes sericei. Folia ternata, longius petiolata. Foliola linearia adpresso villosa. Racemi terminales, floribus rubicundis. Corollae vexillum magnum nervosum basi jubatus bicallosum. Alae lineares semifagittatae vexillo breviores

striis arcuatis. Carina foliata alis longior apice villosa. Stamina connata. Stigma obtusum.

* 1335. R A F N I A.

Thunb. prod. praef. tom. 2.

*Cal. ringens, labio superiore bifido, inferiore di-
varicato - trifido, dente medio angustiori.
Legumen lanceolatum compressum.*

1. RAFNIA *perfoliata.*

R. foliis perfoliatis cordato-ovatis, pedunculis axillari-
bus unifloris. W.

*Crotalaria (perfoliata) foliis perfoliatis, cordato-ovatis.
Sp. pl. 1003. Mill. dict. n. 6.*

*Crotalaria perfoliata folio. Dill. elth. 122. t. 102.
f. 122.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 499.

Durchwachsene Rafnie. W.

Habitat in Carolina. 4

2. RAFNIA *amplexicaulis.*

R. foliis amplexicaulibus orbiculatis, caulinis alternis,
floralibus oppositis corolatis. *Thunb. prod. 123.*

*Crotalaria (amplexicaulis) foliis caulinis amplexicauli-
bus cordatis alternis, floralibus oppositis reniformi-
bus coloratis, floribus solitariis. Sp. pl. 1003. Amoen.
acad. 6. afr. 39. **

*Genista perfoliata orbiculatis foliis. Seb. thes. 1. t. 24.
f. 5.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 500.

Stengelumfassende Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5

* 3. RAFNIA *elliptica.*

R. foliis ovato-ellipticis acutis, caulinis alternis, flora-
libus oppositis. *Thunb. prod. 123.*

Borbonia cordata. Andrews reposit. 1. p. 31. t. 31?

Elliptische Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5

* 4. RAFNIA *cuneifolia*.

R. foliis cuneiformi-ovobatis, ramis angulatis, flöribus terminalibus. *Thunb. prod.* 123.

Spartium (ovatum) ramis striatis, foliis alternis ovatis acuminatis in petiolos desinentibus, floribus terminalibus. *Berg. cap.* 197.

Keilblättrige Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

5. RAFNIA *triflora*.

R. foliis ovatis glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis unifloris. *Thunb. prod.* 123.

Crotalaria (triflora) foliis simplicibus ovatis sessilibus glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis lateralibus unifloris. *Sp. pl.* 1004. *Berg. cap.* 193.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 503.

Dreyblumige Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

Folia fere palmaria. Bracteae ex alis foliorum versus summitatem ternae, foliis paulo minores longitudo florum.

6. RAFNIA *opposita*.

R. foliis lanceolatis alternis, pedunculis lateralibus. *Thunb. prod.* 123.

Crotalaria (opposita) glabra exstipulata, foliis oblongis sessilibus, pedunculis axillaribus diphyllis. *Lin. supp!* 322.

Liparia (opposita) floribus solitariis, foliis floralibus oppositis. *Syst. veg. ed.* 13. p. 554.

Spartium (capense) ramis lateralibus alternis, foliis alternis lanceolatis. *Sp. pl.* 995. *Amoen. acad.* 6. afr. 28.*

Cytisus (capensis) foliis sparsis linear-lanceolatis, ramis teretibus, pedunculis axillaribus bifoliis subunifloris. *Berg. cap.* 217.*

Genista foliis Genistae tinctoriae majoribus. *Herm. afr.* II.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 239.

Pfriemenartige Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

Caules simplices glaberrimi. Folia oblonga sessilia obtusa erecta. Pedunculi in summo caulis, axillares

elongati versus florem diphylli, foliis oppositis caulinis similibus. Flos inter folia pedunculi exiens unicus nutans luteus. Planta siccata nigrescit. Lin. suppl. I. c.

*7. RAFNIA *axillaris.*

R. foliis lanceolatis alternis oppositisque, floribus terminalibus. Thunb. prod. 123.

Winkel-Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

*8. RAFNIA *angulata.*

R. foliis lanceolatis alternis, pedunculis lateralibus, caule angulato. Thunb. prod. 123.

Eckige Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

*9. RAFNIA *spicata.*

R. foliis lanceolatis alternis, floribus axillaribus racemosis. Thunb. prod. 123.

Aehrenblütige Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

*10. RAFNIA *angustifolia.*

R. foliis lanceolatis alternis, pedunculis lateralibus caule tereti. Thunb. prod. 123.

Schmalblättrige Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

*11. RAFNIA *filifolia.*

R. foliis linear-lanceolatis alternis, floribus axillaribus. Thunb. prod. 123.

Fadenblättrige Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

*12. RAFNIA *retroflexa.*

R. foliis obovatis, ramis reflexis retroflexisque. Thunb. prod. 123.

Zurückgebogene Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

*13. RAFNIA *erecta.*

R. foliis oblongis, floribus lateralibus caule erecto. Thunb. prod. 123.

Aufrechte Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 14. RAFNIA *diffusa*.

R. foliis ovatis glabris, caule decumbente. Thunb.
prod. 123.

Ausgebreitete Rafnie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

1336. ASPALATHUS.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1168.

Cal. 5-fidus: lacinia superiore majore. Legum.
ovatum, muticum, subdispermum.

1. ASPALATHUS *spinosa*.

A. foliis fasciculatis linearibus glabris, floribus axillari-
bus gemmis spinosis. Thunb. prod. 128.

A. foliis fasciculatis linearibus nndis spinam gemmaceam
circumstantibus. Sp. pl. 1000.

Ganistella spinosa africana, laricis folio. Breyen cent. t. 26.
Pluk. phyt. 297. f. 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 211.

Stachliche Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

Flores laterales, vix foliis longiores.

* 2. ASPALATHUS *aculeata*.

A. foliis fasciculatis linearibus hirtis, floribus capitatis,
gimmis aculeatis. Thunb. prod. 128.

Kurztachliche Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

* 3. ASPALATHUS *spinescens*.

A. foliis fasciculatis carnolis glabris, floribus lateralibus,
ramis spinescentibus. Thunb. prod. 129.

Dornige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 4. ASPALATHUS *pungens*.

A. foliis fasciculatis subulatis, floribus lateralibus, ramis
ramulisque spinescentibus. Thunb. prod. 129.

Stechende Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

5. ASPALATHUS verrucosa.

- A. foliis fasciculatis filiformibus mucronatis incurvis
 glabris, floribus lateralibus. *Thunb. prod. 128.*
 A. foliis fasciculatis filiformibus, gemmis verrucosis to-
 mentosis nudis. *Syst. veg. 537.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 212.

Warzige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

*Frutex bipedalis, lignosus, gemmis f. verrucis ma-
 gnis. Folia carnoса, glabra, acutiuscula, pollicaria.
 Flores laterales, foliis breviores, subjeffiles. Calyx
 pubescens. Vexillum villosum.*

6. ASPALATHUS capitata.

- A. foliis fasciculatis trigonis mucronatis pilosis, capitu-
 lis glabris. *Thunb. prod. 126.*
 A. foliis fasciculatis linearibus acutis, floribus capita-
 tis, bracteis nudis. *Amoen. acad. 6. afr. 30.* Berg.
 cap. 202. Pluk. phyt. 397. f. 6. Seb. mus. I. t. 23.
 f. 6.*

B. A. (*glomerata*) foliis fasciculatis linearibus acutis villosis
 incurvatis, floribus capitatis, calycinis laciniis ovatis,
 corollis glabris. *Lin. suppl. 321.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 212.

Kopfförmige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

*Folia pubescentia. Flores spicato-capitati, ferrugi-
 neo-pubescentes. Calyx laciniis subulatis.*

7. ASPALATHUS astroites.

- A. foliis fasciculatis subulatis reflexis glabris, floribus
 lateralibus. *Thunb. prod. 128.*
 A. foliis fasciculatis subulatis mucronatis glabris, caule
 villoso, floribus sparsis. *Sp. pl. 1000.*
*Genista astroites, juniperinis pungentibus foliis, aethio-
 pica, floribus saturate luteis. Pluk. mant. 88. t. 413.
 f. 2. Raj. dendr. 104. Seb. mus. I. t. 24. f. 6.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 213.
 Sternförmige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Facies Juniperi.

8. ASPALATHUS *Chenopoda.*

A. foliis fasciculatis trigonis mucronatis rigidis pilosis, capitatis hirsutis. *Thunb. prod.* 126.

A. foliis fasciculatis subulatis mucronatis hirtis, floribus capitatis hirsutissimis. *Sp. pl.* 1000, *Berg. cap.* 200. *Mill. dict. n.* I.

Genista africana lutea, floribus hirsutis in capitula lanuginosa congregatis, foliis corrudae aculeatis subhirsutis. *Herm. afr.* II.

Chamaelarix f. *Chenopoda monomapatensis.* *Breyn. cent.* 23. t. II. *Seb. mus.* I. t. 23. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 213.

Rauhköpfige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

Folia juniperina pungentia.

9. ASPALATHUS *albens.*

A. foliis fasciculatis filiformibus argenteis muticis, racemis foliosis, corollis glabris. *Thunb. prod.* 126.

A. foliis fasciculatis subulatis sericeis apice patulis, fasciculis floreis sparsis. *Mant.* 261.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 214.

Weißliche Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Caulis frutescens, erectus cortice fusco rimofo: Ramulis ultimis subtomentosis. Folia fasciculata, 5, subulata, apice acuta patulaque, sericeo-albida. Fasciculi terminales, albo-sericei, parvi, plures, glomerati, pedunculati. Calyx pubescens. Bractea nulla calycina, sed 1 sub pedicello. Corolla tomentosa, alba.

* 10. ASPALATHUS *armata.*

A. foliis fasciculatis filiformibus argenteis mucronatis, racemis aphyllis, corollis tomentosis. *Thunb. prod.* 126.

Bewaffnete Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

II. ASPALATHUS *Hystrix*.

A. foliis fasciculatis filiformibus sericeis mucronatis, floribus lateralibus sessilibus. *Thunb. prod.* 126.

A. foliis fasciculatis filiformibus rigidis spinosis sericeis, floribus lateralibus sessilibus solitariis, corollis villosis.

Lin. Suppl. 322.

Igelartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

Frutex distinctissimus, foliis referentibus spinas sericeas candidas.

* 12. ASPALATHUS *incurva*.

A. foliis fasciculatis subulatis pilosis, floribus lateralibus.

Thunb. prod. 127.

Krumme Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 13. ASPALATHUS *spicata*.

A. foliis fasciculatis subulatis subpilosis, floribus spicatis.

Thunb. prod. 127.

Aehrenblütige Witschen.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

14. ASPALATHUS *thymifolia*.

A. foliis fasciculatis filiformi-subulatis pilosis, floribus lateralibus, ramis incurvis. *Thunb. prod. 127.*

A. foliis fasciculatis subulatis inermibus glabris brevissimis, floribus alternis. *Sp. pl. 1000.*

Genista minima aethiopica, foliis thymi confertis splendentibus glabris. Pluk. mant. 88. t. 413. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 214.

Thymianblättrige Witschen. W.

Habitat ad Cap. spei. ♂ (v. f.)

15. ASPALATHUS *ericifolia*.

A. foliis fasciculatis filiformibus obtusis hirsutis, floribus subracemosis. *Thunb. prod. 127.*

A. foliis fasciculatis linearibus. *Sp. pl. 1000. Berg, cap. 205.*

Genista aethiopica non spinosa, foliis ericae villosis, floribus parvis spicatis luteis: calycibus longioribus immersis. Pluk. mant. 88. t. 413. f. 6.

Heideblättrige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

*Fruticulus pubescens aut hirsutissimus, ramosissimus.
Folia minuta, linearia. Flores laterales, vix foliis
longiores: vexillum villosum.*

* 16. ASPALATHUS *hispida*.

A. foliis fasciculatis filiformibus obtusis piloso-hispidis,
floribus axillaribus, laciniis calycis flore brevioribus.
Thunb. prod. 127.

Behaarte Witschen. W.

Habitat in Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

* 17. ASPALATHUS *Flexuosa*.

A. foliis fasciculatis filiformibus obtusis piloso-hispidis,
floribus axillaribus, laciniis calycis flore longioribus.
Thunb. prod. 127.

Gebogene Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

* 18. ASPALATHUS *parviflora*.

A. foliis fasciculatis filiformibus pubescentibus, floribus
terminalibus ternis. *Thunb. prod. 127.*

Kleinblütige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

* 19. ASPALATHUS *incomta*.

A. foliis fasciculatis filiformibus obtusis sericeis, floribus
lateralibus. *Thunb. prod. 127.*

Prunklose Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

20. ASPALATHUS *asparagoides*.

A. foliis fasciculatis trigonis mucronatis pilosis, floribus
lateralibus. *Thunb. prod. 127.*

A. foliis fasciculatis setaceis pilosiusculis, calycibus
foliiformibus longitudine corollae solitariis. *Lin.
suppl. 321.*

Spargelartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

*Frutex ramosissimus subpubescens. Verrucae parvae
a casu foliorum pubescentes. Folia fasciculata filiformia
f. setacea acuta, raris pilis adspersa, vix digitii*

minimi transversi longitudine, minime stricta. Flores solitarii sessiles. Calycis dentes longitudine fere corollae, similiter pilosi. Corollae vexillum vix pubescens.

21. ASPALATHUS nigra.

A. foliis fasciculatis filiformibus glabris, spicis ovatis.
Thunb. prod. 128.

A. foliis falciculatis linearibus obtusiusculis, floribus capitato-spicatis pubescentibus. Mant. 262.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 215.

Schwarze Witschen. W.

Habitat in Cap. b. spei montibus. Ȑ

Caulis fruticosus, ramosissimus, tripedalis: Ramos interdum pubescentibus: geminis confertis pubescentibus. Folia fasciculata; minuta, linearia, obtusiuscula, glabra s. pubescens, exsiccatione nigra. Flores terminales, primo capitati, demum spicati, sessiles. Calyx pubescens. Bracteae binae, angustae. Corolla pubescens tota, flava.

***22. ASPALATHUS multiflora.**

A. foliis fasciculatis teretibus glabris, floribus subspicatis, calycibus ebracteatis. Thunb. prod. 128.

Vielblumige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. Ȑ

***23. ASPALATHUS pinguis.**

A. foliis fasciculatis carnosis trigonis glabris, floribus lateralibus, Thunb. prod. 127.

Fette Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. Ȑ

24. ASPALATHUS carnosa.

A. foliis fasciculatis carnosis teretibus glabris, floribus lateralibus terminalibusque, calycibus bracteis. Thunb. prod. 127.

A. foliis fasciculatis teretiusculis obtusis, calycibus subpubescentibus acutis, corollis glabris. Mant. 261.

A. (carnosa) foliis fasciculatis carnosis teretibus glabris sursum incrassatis obtusis, floribus quaternis terminalibus. Berg. cap. 206.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 216.

Fleischige Witschen. W.

Habitat in Cap. b. spei campis arenosis. ♂ (v. f.)

Caulis fruticosus, ramosissimus, tripedalis, nudus, determinate ramosus. Folia fasciculata, 4, 7, subcylindrica, carnosa, incurva, glabra, obtusa. Flores terminales, umbellati, 4. f. 6: pedunculis brevissimis, pubescentibus. Calyx campanulatus, vix manifeste pubescens, acutus: Bracteis 3, ovato-lanceolatis. Corolla glabra, lutea.

*25. ASPALATHUS *affinis*.

A. foliis fasciculatis carnosis teretibus glabris, floribus lateralibus ebracteatis luteis, ramis virgatis. Thunb. prod. 127.

Aehnliche Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

*26. ASPALATHUS *sanguinea*.

A. foliis fasciculatis carnosis teretibus glabris, floribus lateralibus ebracteatis sanguineis, ramis fastigiatis. Thunb. prod. 127.

Blutrothe Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

*27. ASPALATHUS *lactea*.

A. foliis fasciculatis filiformibus glabris, floribus lateralibus ebracteatis. Thunb. prod. 127.

Milchfarbige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

28. ASPALATHUS *ciliaris*.

A. foliis fasciculatis scabris subpilosis, capitulis terminalibus. Thunb. prod. 127.

A. foliis fasciculatis filiformibus scabris, floribus terminalibus sessilibus, vexillis pubescentibus. Mant. 262.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 216.

Gefranzte Witschen. W.

Habitat in Cap. b. spei campis arenosis. ♂ (v. f.)

Caulis fruticosus, bipedalis, determinate ramosus, verrucis nudis, ramis subpilosis. Folia fasciculata, laevia, teretiuscula, acutiuscula, erecta, supra plana, subtus scabra: tenella ciliata, et extus adspersa villis raris. Flores sessiles, 3 - 5, terminales. Calyx pilosus.

fus: dentibus subulatis, spinosis, longitudine fere corollae. Corolla lutea: vexillo cinereo, pubescente.

29. ASPALATHUS genistoides.

A. foliis fasciculatis filiformibus glabris, racemis terminalibus. Thunb. prod. 128.

A. foliis fasciculatis filiformibus laevibus, calycibus subracemosis pendulis corollisque glabris. Mant. 261.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 217.

Ginsterartige Witschen. W.

Habitat in Cap. b. spei, e fissuris rupium. ♂

Caulis frutescens, 9-pedalis, erectus, simpliciter ramosus, cortice reticulato; gemmis albo-villoso. Folia fasciculata, filiformia, glabra, suberetia, semipollicaria. Flores terminales, subracemosi, 3. f. 4, penduli. Calyx glaber, dentibus brevibus: Bracteis 2, minutis. Corolla glabra, lutea. Stylus exsertus.

***30. ASPALATHUS squarrosa.**

A. foliis fasciculatis filiformibus reflexis glabris, floribus solitariis terminalibus. Thunb. prod. 128.

Sparrige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

31. ASPALATHUS galiooides.

A. foliis fasciculatis subulatis glabris, floribus binis terminalibus. Thunb. prod. 128.

A. foliis fasciculatis linearibus laevibus, pedunculis bifloris elongatis apice foliosis. Mant. 260.

A. (*galiooides*) foliis fasciculatis subulatis inermibus glabris, gemmis remotis, caule procumbente. Berg. cap. 210.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 217.

Waldstrohartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

Caulis bipedalis, decumbens, ramosus, laevis. Gemmarum verrucae remotae, parvae, tomentosae. Folia fasciculata, linearia, acuta (Asparagi), laevia. Pedunculi foliis multo longiores, laeves, apice foliis fasciculatis, inter quae Flores 2, sessiles. Calyx monophyllus, laevis: dentibus longitudine corollae. Corolla glabra, lutea. Legumen ovato-lanceolatum, laeviusculum.

*32. ASPALATHUS *bracteata*.

A. foliis fasciculatis filiformibus mucronatis glabris, floribus pedunculatis solitariis. *Thunb. prod.* 128.

A. (*pedunculata*) foliis fasciculatis subulatis glabris, pedunculis filiformibus folio duplo longioribus. *Ait.*
Kew. 3. p. 16?

Beblätterte Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

33. ASPALATHUS *retroflexa*.

A. foliis fasciculatis subulatis glabris, ramulis retroflexis, floribus terminalibus. *Thunb. prod.* 128.

A. foliis fasciculatis subulatis glabris minimis, ramis filiformibus patentissimis, floribus solitariis terminalibus. *Sp. pl. 1001.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 218.

Zurückgebogene Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei ḥ (v. f.)

*34. ASPALATHUS *vulnerans*.

A. foliis fasciculatis filiformibus mucronatis patentibus glabris, floribus lateralibus. *Thunb. prod.* 128.

Verwundende Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

35. ASPALATHUS *uniflora*.

A. foliis fasciculatis filiformibus mucronatis glabris, floribus lateralibus. *Thunb. prod.* 128.

A. foliis fasciculatis linearibus inermibus, stipulis acutis persistens, floribus solitariis, calycibus laciniis cymbiformibus. *Sp. pl. 1001.*

Genista aethiopica glabra, longioribus foliis ex uno punto plurimis, flore majore luteo. *Pluk. mant. 88. t. 414. f. 7.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 218.

Einblumige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Frutex ramis alternis, confertis, tomentosis. Flores terminales 1 f. 2, pubescentes. Calycis lacinia ova-tae, concavae, longitudine calycis. Corollae carina tomentosa.

*36. ASPALATHUS *pinea*.

A. foliis fasciculatis filiformibus mucronatis erectis glabris, floribus lateralibus comosis. *Thunb. prod. 128.*
Fichtenartige Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*37. ASPALATHUS *divaricata*.

A. foliis fasciculatis teretibus mucronatis glabris, floribus racemoso-terminalibus. *Thunb. prod. 128.*
Ausgebreitete Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*38. ASPALATHUS *subulata*.

A. foliis fasciculatis trigonis mucronatis glabris. *Thunb. prod. 128.*
Pfriemenförmige Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*39. ASPALATHUS *laricifolia*.

A. foliis fasciculatis teretibus mucronatis glabris, floribus lateralibus lanatis. *Thunb. prod. 128.*
Lerchenbaumblättrige Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*40. ASPALATHUS *juniperina*.

A. foliis fasciculatis teretibus mucronatis glabris, floribus terminalibus glabris. *Thunb. prod. 128.*
Wachholderartige Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*41. ASPALATHUS *abietina*.

A. foliis fasciculatis filiformibus spinosis glabris, floribus lateralibus, ramis striatis. *Thunb. prod. 128.*
Tannenartige Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*42. ASPALATHUS *trigona*.

A. foliis fasciculatis trigonis mucronatis glabris, floribus lateralibus. *Thunb. prod. 128.*
Dreykantige Witschen. W.
Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

43. ASPALATHUS *araneosa*.

A. foliis fasciculatis filiformibus laxis pilosis, capitulis hirsutis. *Thunb. prod. 126.*

A. foliis fasciculatis setaceis inermibus hispidis, floribus capitatis. *Sp. pl. 1001.*

A. capitata humilior. *Berg. cap. 203. R.*

Genista aethiopica, flore flavo, foliolis inflexis et araneosa lanagine fimbriatis: summo ramulo circa flores globigeratis. *Pluk. mant. 87. t. 414. f. 4. Seb. the. f. I. p. 38. t. 23. f. 6.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 218.

Spinnenwebenartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei ȳ (v. f.)

Folia, dentis pilis longis helvolis vagis, undique tuberculis scabra. Vexillum extus pilosum.

*44. ASPALATHUS *comosa*.

A. foliis fasciculatis filiformibus pilosis, floribus lateribus comosis. *Thunb. prod. 126.*

Schopfartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ȳ (v. f.)

*45. ASPALATHUS *cephalotes*.

A. foliis fasciculatis filiformibus obtusis subvillosis, capitulis hirsutis. *Thunb. prod. 126.*

Kugliche Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ȳ

*46. ASPALATHUS *triquetra*.

A. foliis fasciculatis trigonis obtusis pilosis rugosis, capitulis terminalibus. *Thunb. prod. 127.*

Dreyeckige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ȳ

47. ASPALATHUS *caneascens*.

A. foliis fasciculatis filiformibus sericeis mucronatis, floribus terminalibus, vexillis tomentosis. *Thunb. prod. 126.*

A. foliis fasciculatis subulatis tomentolo-sericeis, floribus lateralibus, vexillis pubescentibus. *Mant. 262.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 219.

Grauliche Witschen. W.

Habitat in Cap. b. spei montosis. ȳ (v. f.)

Caulis fruticosus, erectus, rigidus, subcanescens ramis alternis. Folia fasciculata, tomentoso-canescens, acutiuscula. Flores ad apices ramorum laterales, sessiles. Calyx campanulatus, pubescens: dentibus subulatis, remotis, ventre brevioribus. Bractae 2. Jefaceae, breves. Corolla lutea, vexillo cano, pubescente. Proxima A. araneosae, cui lacinia calycis ventre quadruplo longiores.

48. ASPALATHUS indica.

A. foliis quinatis sessilibus, pedunculis unifloris. Sp. pl. 1001. Mill. dict. n. 2.

Genista foliis quinatis sessilibus, pedunculis axillariibus capillaribus unifloris, floribus minimis. Fl. zeyl. 271. *

Lotus tenuifolius madera spatanus, siliqua singulari glabra. Pluk. alm. 225. t. 201. f. 2.

Dorycnium indicum, floribus singularibus rubris in pedicellis oblongis, siliquis perexiguis. Raj. suppl. 471.

Manelli. Rheed. mal. 9. p. 69. t. 37. Burm. ind. 155.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 221.

Ostindische Witschen.

Habitat in India orientali. ♂ (v. f.)

49. ASPALATHUS quinquefolia.

A. foliis ternis fasciculatisque, capitulis hirsutis, corollis glabris. Thunb. prod. 126.

A. foliis quinis sessilibus, pedunculis spicatis. Amoen. acad. 6. afr. 31. *

Cytisus, angustis parvis acutioribus et incanis foliis, aethiopica, floribus fulva lanugine hirsutis. Pluck. alm. 128. t. 278. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 223.

Fünfblättrige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

50. ASPALATHUS heterophylla.

A. foliis ternis fasciculatisque pilosis, floribus spicatis. Thunb. prod. 126.

A. foliis ramorum fasciculatis, ramulorum ternatis linearibus hirtis, spicis terminalibus, calyce corollisque villosis. Lin. suppl. 321.

Verschiedenblättrige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Singularis, quod Folia inferiora fasciculata, superiora ternata. Spicae longiores. Flores lutei. Rudimenta ramulorum in ramis faciunt folia fasciculata.

51. ASPALATHUS tridentata.

A. foliis ternis lanceolatis villosis, aculeis trifidis. *Thunb. prod. 126.*

A. foliis trinilanceolatis glabris, stipulis tridentatis mucronatis, floribus capitatis. *Sp. pl. 1002.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 223.

Dreyfritzige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

*52. ASPALATHUS lotoides.

A. foliis ternis lanceolatis villosis, gemmis inermibus, corollis tomentosis. *Thunb. prod. 126.*

Schotenkleeartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

53. ASPALATHUS pilosa.

A. foliis ternis linearibus villosis, capitulis terminalibus pilosissimis, corollis pubescentibus. *Mant. 263.*

A. (*villosa*) foliis ternatis ovatis acutis capitulis terminalibus. *Thunb. prod. 125?*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 223.

Haarige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

Caules fruticosi, simplices, palmares, subpilosii. Folia ternata, sessilia, linearia, acuta, patentia, subpubescentia. Capitulum terminale, hirsutissimum, bracteis calycibusque pilis albis obvallatum. Calyx 5-partitus, pilosissimus: laciniis lanceolato-linearibus. Bracteae 3, lineares, pilosae, acutae. Corollae petala omnia extus pubescentia.

*54. ASPALATHUS obtusata.

A. foliis ternis obovatis obtusis, floribus axillaribus solitariis. *Thunb. prod. 125.*

Stumpfe Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

55. ASPALATHUS *sericea*.

A. foliis ternis oblongis sericeis, racemis terminalibus.
Thunb. prod. 125.

A. foliis fasciculatis lanceolatis sericeis; pedunculis terminalibus bifloris, vexillo nudiusculo. Lin. suppl. 321.
Seidenartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. t̄

Simillima A. asparagoidi, sed folia hujus plana, capitellis florum nullis, flores maiores glabri, vexillum non villosum, nisi parum in carina dorsali.

*56. ASPALATHUS *cinerea*.

A. foliis ternis oblongis planis acutis tomentosis, capitulis terminalibus. Thunb. prod. 125.

Graue Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. t̄

57. ASPALATHUS *anthylloides*.

A. foliis ternis ovatis, capitulis terminalibus. Thunb. prod. 125.

A. foliis trinis lanceolatis aequalibus subpubescentibus, stipulis nullis, capitulis terminalibus. Sp. pl. 1002.
Berg. cap. 211.

Anthyllis aspalathoides fruticosa, foliis ternatis aequalibus, capitulis terminalibus sessilibus. Amoen. acad. 4.
p. 326.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 224.

Wollblumenartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. t̄

Capitula oblonga.

58. ASPALATHUS *laxata*.

A. foliis ternis linearibus villosis, floribus fasciculatis quinis, calycibus lanatis, caulis prostratis teretibus.
Mant. 263.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 225.

Liegende Witschen.

Habitat ad Cap. b. spei rupibus.

Caulis subherbaceus, decumbens, teres, flexilis, pubescens: ramis alternis. Folia ternata, petiolata, linearia, laxa, pilosa: petiolis brevissimis. Flores terminales, sessiles, 5 in capitulum. Calyx corolla dimi-

dio minor, lanatus, dentibus subulatis. Bractea calycina propria nulla. Corolla glabra, lutea.

59. ASPALATHUS argentea.

A. foliis ternis fasciculatisque ovatis sericeis, capitulis tomentosis, caule dichotomo. *Thunb. prod. 126.*
 A. foliis trinis linearibus sericeis, stipulis simplicibus mucronatis, floribus sparsis tomentosis. *Sp. pl. 1002. Mill. dict. n. 3.*

A. sericea. *Berg. cap. 212.*

Cytisus africanus angustifolius sericea lanugine argentatus, spica lagopoide. Pluk. mant. 63.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 225.

Siberartige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

Folia ternata aut fasciculata, lanceolata, sericea ut tota planta. Flores spicati, seu sparsi, laterales, villoso. Figura Cytisi.

***60. ASPALATHUS virgata.**

A. foliis ternis fasciculatisque ovatis sericeis, capitulis hirsutis, caule virgato. *Thunb. prod. 126.*

Rutenförmige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

***61. ASPALATHUS rubens.**

A. foliis fasciculatis subulatis sericeis, floribus sericeis. *Thunb. prod. 126.*

Röthliche Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

***62. ASPALATHUS nivea.**

A. foliis fasciculatis linearibus argenteis, floribus solitariis. *Thunb. prod. 126.*

Schneeweisse Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

63. ASPALATHUS callofa.

A. foliis ternis trigonis glabris, spicis ovatis. *Thunb. prod. 125.*

A. foliis trinis subulatis aequalibus, stipulis subrotundis callosis, floribus spicatis glabris. *Sp. pl. 1002. Berg. cap. 209.*

Cytisus trifoliatus, juniperinis foliis, floribus luteis
in spicam densiorem adactis. *Pluk. mant.* 63. t.
345. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 226.

Schwielichte Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ȳ D. Royen.

Fruticulus *Ramis a casu foliorum adspersis Callis*
rotundatis, sinu villofis. Folia terna, basi callosae
insidentia, sessilia, subulato-linearia, juniperina,
acuta, glabra, plana, subtus convexa. Spicae laxae,
terminales. Bractae propriae monophyllae, subula-
tiae, longitudine calycis, utrinque ad basin calycis so-
litariae. Calyces glabri dentibus subulatis. Corollae
flavae, glabrae.

* 64. ASPALATHUS *acuminata*.

A. foliis ternis ovatis obtusis ramis ramulisque spinescen-
tibus. *Thunb. prod.* 125.

Zugelpitzte Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ȳ

* 65. ASPALATHUS *rugosa*.

A. foliis ternis ellipticis rugosis glabris, umbellis termina-
libus. *Thunb. prod.* 125.

Runzliche Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ȳ

* 66. ASPALATHUS *fusca*.

A. foliis ternis lanceolatis ramisque glabris, floribus ter-
minalibus. *Thunb. prod.* 125.

Braune Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ȳ

* 67. ASPALATHUS *orientalis*.

A. foliis ternis lanceolatis pubescentibus, floribus fasci-
culatis quinis, calycibus pubescentibus, caulis erectis angulatis. *Mant.* 263.

Cytisus orientalis, floribus amplis glomeratis. *Tournef.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 226.

Levantische Witschen. W.

Habitat in Oriente. ȳ

Caulis fruticosus, erectus: ramulis angulatis: pu-
bescentibus, pedalibus. Folia ternata, sessilia, linea-

ri-lanceolata (*Lini*), *acuminata*, *pubescentia*, *interstiiis longiora*. *Flores terminales*, *sessiles*, *subquini*, *erecti*, *fasciculati*. *Calyx pubescens*, *denuibus subulatis*. *Corolla lutea*, *obtusa*, *magnitudine Laburni*. *Stamina connata*.

68. ASPALATHUS mucronata.

A. *foliis ternatis*, *foliolis obtusis*, *ramis spinescentibus*.
Thunb. prod. 125.

A. *foliis ternatis laevibus*, *ramis acuminatis*, *floribus racemosis*. *Lin. suppl. 320.*

Dreyblättrige Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. Spei. 5

Caulis laevis remote ramosus absque verrucis. *Rami sensim attenuati quasi spinosi*. *Folia ternata lanceolata subaequalia glabra brevissime petiolata*. *Racemi terminales erecti*, *pedicellis brevissimis*. *Calycis dentes minutti*. *Corollae glabrae*.

69. ASAPLATHUS pinnata.

A. *foliis pinnato-quinatis obcordatis pedunculis capitatis*. *Amoen. acad. 6. afr. 32.**

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 227.

Gefiederte Witschen. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

Species Aspalathi numerosae nondum characteribus certis sunt definitae; hinc monographia totius generis iconibus illustrata praeprimis est optanda. W.

* 1337. SARCOPOHYLLUM. +

Thunb. prod. 2. praef.

Cal. campanulatus 5-partitus regularis. Legumen acinaciforme acutum.

* I. SARCOPOHYLLUM carnosum. +

Sarcophyllum carnosus.

Capisches Fleischblatt. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

1338. U L E X.

- *Gen. pl. edit. Schreb. n. 1169.*

Cal. 2-phyllo. Legumen vix calyce longius.

I. U L E X *europaeus.*

U. dentibus calycinis obsoletis conniventibus, bracteis ovatis laxis, ramulis erectis. *Smith brit. p. 756.**

U. foliis villosis acutis, spinis sparsis. *Sp. pl. 1045. Mill. dict. n. I. Willd. arb. 390. Neck. gallob. 311. Fl. dan. t. 608. Hoffm. germ. 251. Roth. germ. I. 304. II. 165.*

U. folio sub singulis spinis subulato piano acuto. *Hort. cliff. 356. Hort. upj. 212. Roy. lugdb. 372.*

U. foliis lanceolatis villosis acutis, spinis sparsis, calycis foliolo inferiore integro. *Roth. catalect. I. p. 83.*

Genista spinosa major, longioribus aculeis. Bauh. pin. 394.

Genista spinosa. Dod. pempt. 659.

Genistellae spinosae affinis, Nepa quibusdam. Bauh. hist. I. p. 2. 400.

Scorpius primus. Clus. hist. I. p. 106.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 228.

Europäischer Hecksfame. W.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Dania, Brabantia. Ȣ (v. v.)

*2. U L E X *nanus.*

U. dentibus calycinis lanceolatis distantibus, bracteis minutis adpressis, ramulis decumbentibus. *Smith brit. 2. p. 757.**

U. (*minor*) foliis linearibus glabris acutis, spinis sparsis, calycis foliolo inferiore tridentato. *Roth. catalect. I. p. 33.**

Ulex europaeus. B. Sp. pl. 1045.

Genista spinosa minor, Raj. synop. 475.

Genista spinosa major, brevioribus aculeis. Bauh. pin. 394.

Nepa Theophrasti. Lob. ic. 788.

Zwerg-Hecksfame. W.

Habitat in Angliae, Galliae, ericetis elationibus. Ȣ (v. f.)

1339. AMORPHA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1170.

Cal. campanulatus 5-fidus. *Cor.* vexillum ovatum, concavum. *Alae o.* *Carina o.* *Legumen* dispermum falcatum.

I. AMORPHA *fruticosa*.

A. dentibus calycinis quatnōr obtusis, unico acuminato. W.

A. floribus pedunculatis, calycibus glabris, dentibus quatnōr obtusis, Willd. arb. 16.*

Amorpha. Hort. cliff. 353. t. 19. Hort. upf. 208. Roy. lugdb. 393. Mill. dict. et ic. t. 27. Duham. arb. I. t. 46. Du Roi. harbk. I. p. 43. Kniph. cent. 10. n. 6.

A. suffruticosa, foliis pinnatis sublaevibus. Walt. carol. 179.

Barba jovi americana, pseudo-acaciae flosculis purpureis minimis. Anglic. hort. II. t. 4.

β. A. calycibus canis, foliolis emarginatis. W.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 230.

Strauchartige Uniform. W.

Habitat in Carolina. 5 (v. v.)

Variet. foliis majoribus et minoribus, foetidis ac inodoris. Varietas β differt foliolis emarginatis et calycibus cano-pubescentibus. W.

* 2. AMORPHA *pubescens*. W.

A. dentibus calycinis acuminatis. W.

A. floribus subsessilibus, calycibus pubescentibus, dentibus omnibus acuminatis. Willd. arb. 17.*

A. (herbacea) caule annuo, foliis cauleque tomentosis. Walt. carol. 179.

Haarige Uniform. W.

Habitat in Carolina. 24 (v. v.)

Caulis tripedalis herbaceus teres cano-pubescent laevissime striatus. Folia 15-vel 30-juga. Foliola elliptica obtusa cano-pubescentia mucronata apicem versus decrescentia. Spiae terminales. Flores duplo minores albo-coerulecentes. Calyx cano-pubescent subsessilis, dentibus acuminatis. W.

* 1340. DIMORPHA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1179.

Cal. 3-f. 4-fidus. Vexillum amplissimum crenulatum. Alae o. Carina o. Legumen 1-spermum compressum magnum.

*1. DIMORPHA *grandiflora*.

D. foliis pari-pinnatis, legumine glabro. W.

Parivoa *grandiflora*. *Aubl. jug. 2. p. 757. t. 303.**

Grossblumige Zweyform. W.

Habitat ad fluviorum ripas Gujanæ. h

Arbor 30-pedalis ligno compacto obscure rubente. Folia pari-pinnata, foliolis oblongis oppositis petiolatis acuminatis glabris. Racemus terminalis. Flores ampli purpurei. Legumen oblongum acutum lignosum magnum monospermum. W.

*2. DIMORPHA *tomentosa*.

D. foliis ternatis pinnatisque, legumine tomentoso. W.

Parivoa *tomentosa*. *Aubl. guj. 2. p. 759. t. 304.**

Filzige Zweyform. W.

Habitat in sylvis Gujanæ. W.

Arbor 20-pedalis. Folia ternata vel imparipinnata e foliolis quinque oblongis acuminatis glabris basi obliquis composita. Racemus terminalis. Flores purpurei. Legumen obovatum obtusum coriaceum crassum tomentoso-ferrugineum. W.

* 1341. TERAMNUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1171.

Carina minima calyce recondita. Stam. alterna 5 sterilia. Stigma sessile capitatum.

1. TERAMNUS *volubilis*.

T. foliolis ovato-lanceolatis pubescentibus. *Swartz prod. 105.*

T. triphyllus subhirsutus, foliolis oblongo-ovatis, siliquis gracilibus compressis, spicis laxioribus alaribus. *Brown jam. 290.*

Dolichos (uncinatus) volubilis, pedunculis multifloris, leguminibus cylindricis hirsutis apice unguiculato subulato hamato, caule hirto. *Sp. pl. 1019. Mill. dict. n. 2.*

Phaseolus hirsutus, siliquis erectis et aduncis. *Plum. sp. 8. ic. 221.*

Phaseolus sylvestris minor flore minori. *Sloan. hist. I. p. 182.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 511.

Rankende Laubenbohne. W.

Habitat in Jamaica. ৎ

* 2. TERAMNUS *uncinatus.*

T. foliolis oblongis subtus sericeis. *Swartz prod. 105.*

Hakenförmige Laubenbohne. W.

Habitat in Jamaica. ৎ

* 1242. BOSSIAEA.

Ventenat. descr. pl. nov. I. p. 7.

Cal. bilabiatus, labio superiore obcordato. Vexillum basi biglandulosum. Carina dipetala. Legumen pediculatum compressum polyspermum.

* I. BOSSIAEA *heterophylla.*

B. heterophylla. Ventenat descr. pl. nov. I. p. 7. t. 7. Verschiedenblättrige Bossiae. W.*

Habitat in Nova Hollandia. ৎ

Frutex bipedalis ramis compressis. Folia alterna glabra petiolata inferiora elliptica superiora lanceolata. Pedunculi uniflori axillares. Vexillum et Alae flavae. Carina purpurea. W.

1343. CROTALARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1172.

Legumen turgidum, inflatum, pedicellatum. Filamenta connata cum fissura dorsali.

† *Foliis simplicibus.*

I. CROTALARIA *sagittalis.*

C. foliis simplicibus oblongo-lanceolatis, stipulis lan-

ceoalatis acuminatis decurrentibus, racemis oppositi-foliis. W.

C. foliis simplicibus lanceolatis, stipulis decurrentibus solitariis bidentatis. *Hort. cliff.* 357. * *Gron. virg.* 105. *Roy. lugdb.* 374. *Mill. dict.* n. 3. *Swartz obs.* 278. *

C. americana, caule alato, foliis pilosis, floribus in thyrsoluteis. *Mart. cent.* 43. t. 43.

C. hirsuta minor americana herbacea, caule ad summum sagittato. *Herm. lugdb.* 202. t. 203. *Pluk. alm.* 122. t. 169. f. 6.

β. *Crotalaria sagittalis glabra*, longioribus foliis, americana. *Pluk. alm.* 122. t. 277. f. 2.

Houttyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 500.

Pfeilförmige Klapperschote. W.

Habitat in aridis Jamaicae, Martinicae. ○ (v. f.)

Stipulae etiam inferiores decurrentes, superiores vero lanceolatae acuminatae subfalcatae. W.

*2. CROTALARIA parviflora.

C. foliis simplicibus lanceolatis, stipulis superioribus decurrentibus brevissime bidentatis, racemis oppositi-foliis. W.

C. (*parviflora*) foliis simplicibus petiolatis, inferioribus oblongo-ovatis, caule tereti pilosis, stipulis floralibus superioribus decurrentibus, racemis lateralibus nudis, corollis calyce minoribus. *Roth. catal.* I. p. 83.

II. p. 84.

Kleinblütige Klapperschote. W.

Habitat in Virginia, Carolina. ○ (v. v.)

Simillima praecedenti, differt vero: magnitudine omnium partium, stipulis summi, decurrentibus brevissimis oblongis acutis. Corolla in hac et praecedente calyce minor. W.

*3. CROTALARIA rubiginosa. W.

C. foliis simplicibus lanceolatis villosis, stipulis superioribus lanceolatis decurrentibus, racemis oppositi-foliis, calycibus villotis. W.

Rostfarbige Klapperschote. W.

Habitat in India orientali (v. f.)

Planta digitalis ramosa villosa. Caulis et rami prae-sertim juniores pilis numerosis ferrugineis patentibus

obſiti. Folia uncialia oblongo-lanceolata breviffime petiolata. Stipulae in ſummo caule verſus florem oblongo-lanceolate baſi decurrentes. Racemi ſubquadriflori oppofitifolii. Calyx villis ferrugineis tectus. Corolla flava longitudine calycis vel minor. Legumen turgidum obtufum ſtylo perſiſtenti mucronatum. W.

4. CROTALARIA chinensis.

C. foliis simplicibus ovatis ſubpetiolatis, ſtipulis minutissimis. Sp. pl. 1003.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 501.

Chinesiſche Klapperschote. W.

Habitat in China. ৎ

Caules et Rami pubescentes, teretes. Folia ovata, obtusiuscula, integerrima, utrinque ſubpilosa. Racemi pauciflori, hirti: bracteis lanceolatis, longitudine pedunculorum. Calyces hirti, longitudine corollae. Corollae luteae: vexillo ſtriato. Stipulae minutiffimae, ſubulatae.

*5. CROTALARIA glauca. W. †

C. foliis simplicibus linearis lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus ſubtrifloris. W.

Grau grüne Klapperschote.

Habitat in Guinea. (v. f.)

Caulis erectus pedalis baſi ramosus, ramis erectis. Folia ſequiuncialia ſubſeffilia glauca utrinque glabra linearis lanceolata. Stipulae vix manifestae. Pedunculi axillares foliis duplo longiores uni-bi-tri-vel quadriflori. Corolla calyce major. Legumen non vidi. W.

6. CROTALARIA juncea.

C. foliis simplicibus lanceolatis ſubſeffilibus, leguminibus glabris, racemo terminali, caule fulcato. W.

C. foliis simplicibus lanceolatis petiolato-ſeffilibus, caule ſtriato. Hort. cliff. 357.* Hort. upf. 210. Roy. lugdb. 374. Trew. ehret. t. 47. Mill. dict. n. 5.

C. benghalensis, foliis geniftae hirsutis. Pluk. alm. 122. t. 169. f. 5.

Tandale - cottii. Rheed. mal. 9. p. 47. t. 26.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 501.

Binsenartige Klapperschote.

Habitat in India. ⊙ (v. f.)

*Caulis tripedales, juncei, stricti, basi ramosi. Calyx
cis labium superius bipartitum; L. inferius cymbi-
forme, obsolete tridentatum. Corollae facie Spartii jun-
cei, lutei, alarum axillis nigris.*

*7. CROTALARIA sericea.

*C. foliis simplicibus lanceolatis subtus leguminibusque
sericeis, racemo terminali, caule sulcato. W.*

*C. (sericea) foliis simplicibus lanceolatis acutis subtus
sericeis, florim racemis elongatis. Retz. obs. 5. p. 16.*
Seidenartige Klapperschote. W.*

Habitat in India orientali. ⊙ (v. f.)

*Stipulae semicordatae acuminate. Crotalaria seri-
cea Burmanni a nostra differre videtur, floribus multo
minoribus. Similis C. juncea W.*

8. CROTALARIA linifolia.

*C. foliis linearibus sericeis obtusis mucronatis, racemo
terminati, leguminibus glabris vix calyce majoribus,
caule substriato. W.*

*C. hirsuta, foliis linearibus obtusis hirsutis petiolatis ex-
stipulatis, caule angulato, racemo terminali. Lin.
suppl. 322.*

Flachsblättrige Klapperschote. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

*Caules erecti filiformes juncei simplices hirsuti cani.
Folia linearia obtusa brevissime petiolata, breviora.
Racemi longi. Flores nutantes lutei. Legumina bre-
via obtusa. Sat similis C. juncea.*

*Planta valde varians caule sesquipedali et semipeda-
li, foliis longioribus et brevioribus W.*

9. CROTALARIA imbricata.

*C. foliis simplicibus oblongis sericeo-nitentibus, flori-
bus axillaribus sessilibus, ramis apice floriferis. W.*

*C. foliis simplicibus ovatis acutis villosis sessilibus, flori-
bus subsessilibus. Amoen. acad. 6. afr. 40.* Berg.
cap. 192. **

*C. foliis ovato-ellipticis acutis sericeo-nitentibus, flori-
bus axillari-subspicatis. Thunb. prod. 124.*

Cytisus affinis. Pluk. mant. 63. t. 388. f. 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 502.

Dachziegelblättrige Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

Folia parva sericea nitentia. Spica terminalis e floribus axillaribus ad ramorum apices sessilibus composita. W.

* 10. CROTALARIA *parvifolia*.

C. foliis ovatis acutis tomentosis, floribus axillaribus subsessilibus, leguminibus ovatis. Thunb. prod. 124.

Kleinblättrige Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 11. CROTALARIA *lanata*.

C. foliis ovatis acutis lanatis, floribus axillaribus subsessilibus. Thunb. prod. 124.

Wollige Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 12. CROTALARIA *reflexa*.

C. foliis ovatis acutis tomentosis reflexis, floribus capitatis, ramis retroflexis. Thunb. prod. 125.

Zurückgebogene Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

13. CROTALARIA *retusa*.

C. foliis simplicibus oblongis cuneiformibus retusis, rameo terminali. W.

C. foliis simplicibus oblongis cuneiformibus retusis. Fl. zeyl. 276.*. Mill. dict. n. 7. Vahl symb. I. p. 53.

C. aliatica, floribus luteis, folio singulari cordiformi. Herm. lugdb. 200. t. 201.

C. major. Rumph. amb. 5. p. 278. t. 96. f. 1.

Dolichos (*cuneifolius*) foliis simplicibus, siliquis racemosis pendulis ensiformibus cornutis. Forst. descr. 134.

Tandale-Cotti. Rheed. mal. 9. p. 54. t. 25.

Houttuyn Lin. Pf. Syst. 8. p. 502.

Ausgerandete Klapperschote. W.

Habitat in India. ♂ (v. f.)

Folia obovata mucrone recurvato, unde retusa. Stipulae minimae, subulatae, exstantes. Flores lutei: vexillo supra jaepi purpurascente. Legumen cylindricum, glabrum, horizontale.

Possider varietatem, foliis cuneiformibus apice acutiusculis mucronatis non retusis, subtus cano-pubescentibus. An species distincta? W.

14. CROTALARIA *sessiliflora*.

C. foliis simplicibus lanceoatis subsessilibus, floribus sessilibus lateralibus, caule aequali. Sp. pl. 1004.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 508.

Sitzende Klapperschote. W.

Habitat in China. ⊙

Planta vix pedalis, Caule erecto, tereti, minus ramoso, striato-sulcato. Folia lanceolata, fere sessilia, supra glabra, subtus pilosa. Stipulae vix manifestae. Flores axillares, sessiles, coerulei: bracteae duae, oblongiusculae.

15. CROTALARIA *verrucosa*.

C. foliis simplicibus ovatis retusis, stipulis lunatis declinatis, racemo terminali, ramis tetragonis. W.

C. foliis simplicibus ovatis, stipulis lunatis declinatis, ramis tetragonis. Fl. zeyl. 277.* Mill. dict. n. I.

C. foliis ovatis, petiolis dupli stipula auctis, ramis tetragonis. Hort. cliff. 357.*

C. (*coerulea*) foliis simplicibus ovatis basi attenuatis sessilibus subretusis, stipulis falcatis amplexantibus caulem, caule tetragono. Jaeq. ic. rar. t. 144. Collect. I. p. 67.*

C. (*angulosa*) foliis simplicibus subovatis, stipulis lunatis amplexicaulibus, caulis quadrangularibus falcatis. Lamarck encycl. 2. p. 196. Cavan. ic. 4. p. 10. t. 321.

C. foliis solitariis ovatis acutis, caule sulcato. Burm. zeyl. 81. t. 34.

C. alatica, folio singulari verrucoso, floribus coeruleis. Herm. lugdb. 199. Raj. hist. 1893.

Pee-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 53. t. 29.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 504.

Vierkantige Klapperschote. W.

Habitat in Malabaria, Zeylonā, Java, Philippinis. ⊙
(v. f.)

* 16. CROTALARIA *semperflorens*.

C. foliis simplicibus ovatis emarginatis, stipulis lunatis declinatis, racemo terminali, ramis teretibus striatis. W.

C. caulis suffruticosus teretibus striatis, foliis ovalibus emarginatis mucronatis, stipulis lunatis amplexicaulibus. Ventenat descr. pl nov. 17. t. 17.*

Immerblühende Klapperschote. W.

Habitat in India orientali. ḫ

Similis praecedenti, differt caule suffruticoso tereti, stipulis augustinoribus, corollis flavis. W.

* 17. CROTALARIA *hirsuta*. W.

C. foliis simplicibus ovatis acutis, stipulis subulatis reflexis, racemo subterminali, leguminibus hirsutis, caule hirto. W.

Rauhfrüchtige Klapperschote. W.

Habitat in India orientali prope Hyderabad. ○ (v. f.)

Caulis bipedalis erectus ramosus subteres hirtus. Folia breve petiolata ovata acuta bipollicaria supra glabra subtus subpubescentia. Stipulae linearis-subulatae reflexae. Racemi pauciflori subterminales. Legumina pollicaria pilis sparsis patentibus obsita. W.

18. CROTALARIA *biflora*.

C. foliis simplicibus oblongis obtusis pilosis, caulis prostratis herbaceis, pedunculis bi-triflorisve axillaris. W.

C. foliis simplicibus obtusis, caulis prostratis herbaceis, pedunculis bifloris. Mant. 560. 570.

C. (*nana*), foliis simplicibus oblongis sessilibus glabris, pedunculis lateralibus trifloris. Burm. ind. 156. t. 48. f. 2.

C. maderaspat. pilosellae folio. Pet. gaz. t. 30. f. 10.

Astragalus biflorus. Mat. alt. 273.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 504.

Zweiblumige Klapperschote. W.

Habitat in Insula St. Johanna. Koenig. (v. f.)

Caulis erectus, palmaris, teres, pilosus, terminatus pedunculo. Rami e basi caulis, plures, alterni, decumbentes, simplices, caule erecto multo longiores.

Folia alterna, brevissime petiolata, elliptica s. ovali-

oblonga, obtusa, avenia, pilosiuscula, pollicaria. Pedunculi biflori, terminales, sed in ramis ramus ulterius excrescit, ut evadant laterales. Corolla lutea. Stamina Crotalariae. Fructus fere globosus, in hortis subcylindricus evadit.

CAL. perianthium monophyllum, subquinquepartitum: lacinias lanceolatis: superiore bifida.

COR. papilionacea. Vexillum ovatum, adscendens, longitudine calycis. Alae oblongae, adpressoae. Carina ventricosa, rostrata, basi deorsum gibba.

STAM. Filamenta decem (basi membrana truncata connata, superne hian'e) alternis brevioribus. Antherae oblongiusculae; filamentis sterilibus rotundae.

PIST. Germen ovatum. Stylus adscendens. Stigma villosum.

PER. Legumen didymo-globosum, inflatum, uniloculare.

SEM. plura, reniformia, pedicellis setaceis, rigidis.

Obs. Legumen est uniloculare, et Stamen nullum distinctum, sed alterna breviora.

Enata nuper e seminibus longe alienam faciem induit in horto, quam quae in natali lecta.

*19. CROTALARIA Nummularia. W.

C. foliis simplicibus subrotundo-ovatis lanceolatisve obtusis subtus pilosis, pedunculis axillaribus uni-biflorisve, caule procumbente. W.

Rundblättrige Klapperschöte. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caules plures e radice subdivisi pedales procumbentes hirti. Folia in plerisque ramis semipollicaria orbiculato-ovata obtusa brevissime petiolata; in nonnullis fere uncialia lanceolata obtusa. Pedunculi univel biflori foliis quadruplo longiores hirti. Legumina quadri-linearia subrotundo-ovata obtusa pubescentia. Simillima praecedenti, at differt: foliis orbiculatis, pedunculis elongatis et habitu. W.

20. CROTALARIA bifaria.

C. foliis simplicibus inferioribus orbiculatis, superioribus ovato-lanceolatis, stipulis reflexis, pedunculo terminali unifloro. W.

C. pubescens diffusa stipulata, foliis bifariis, inferioribus orbiculatis, superioribus oblongis, pedunculis unifloris.
Lin. suppl. 322.

Zweyzeilige Klapperschote. W.

Habitat in horto Reginae Tanschaurensis Amma-Koil dicto, in umbrosis. Koenig. (v. f.)

Caules diffusi teretes pubescentes. Folia bifaria breve petiolata patentissima. Stipulae ovatae subulatae reflexae. Pedunculi terminales erecti uniflori longi filiformes. Bractae binae prope florem in pedunculo oppositae stipulaeformes. Corollae coerulescentes maiores. Legumina oblonga cum acumine hispida. Variat figura foliorum.

Legumina pollicaria pubescentia. W.

*21. CROTALARIA paniculata. W.

C. foliis oblongis obtusis sericeo - villosis, stipulis linearisubulatis reflexis, panicula terminali bracteata. W.

C. (chinensis) villoso - sericea, foliis ovato - oblongis obtusis subpetiolatis, stipulis subulatis, stylo basi tortoreflexo. Lamarck encycl. 2. p. 194.*

Rispenblütige Klapperschote. W.

Habitat in Malabaria, Java. Ȣ (v. f.)

Frutex ramosissimus, ramis teretibus pilosis, pilis apice glanduliferis. Folia oblonga basi angustiora obtusa subsessilia utrinque sericeo - villosa. Stipulae subfasciculatae linearisubulatae reflexo - patentes. Panicula terminalis pedalis e racemis tri - vel quadrifloris composita. Bractae linearisubulatae patentes in ramorum paniculae basi fasciculatae, ad pedunculorum basin solitariae et in pedunculo binae. Corolla carina falcata acuta. Stamina connata, antheris quinque subrotundis, quinque linearibus. Legumen semi-pollicare pubescens. W.

† † *Foliis compositis.*

22. CROTALARIA lotifolia.

C. foliis ternatis, foliolis cuneiformibus emarginatis subtus villoso - subsericeis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. Vah. eclog. 2. p. 54.*

C. foliis ternatis obovatis, floribus lateralibus subraccemosis. Sp. pl. 1005.

C. loti folio, flore parvo variegato. *Dill. elth.* 121. *t.*
102. *f.* 121.

C. trifolia fruticosa, foliis glabris, flore e luteo viridi
minore. *Sloan. jam.* 114. *hist.* 2. *p.* 33. *t.* 176.
f. 1. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. *p.* 505.

Schotenkleeb'lättrige Klapperschote. W.

Habitat in Jamaica et insula St. Crucis. ḥ

Planta glabra. Legumina calyce sessilia.

*23. CROTALARIA pubera.

C. foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis subtus legumi-
nibusque racemosis villosis. *Vahl eclog.* 2. *p.* 55.

Feinbehaarte Klapperschote. W.

Habitat in insula St. Martha. ḥ

Rami lignosi teretes filiformes ope lentis subvilloso.
Folia petiolata ternata; folia brevissime petiolata
subovata basi acuta avenia enervia pallide viridia
mucronata, supra glabra, subtus villis adpresso frequentibus
subcanescens unguicularia, lateralia pa-
rum minora. Petioli universales semipollicares teretes.
Stipulae subulatae minutae deciduae. Racemi axilla-
res et terminales folio longiores. Flores parvi remoti
ope lentis extus villosi. Bracteae minutae setaceae.
Calycis laciniae lanceolatae. Legumina oblonga pen-
dula vix unguicularia. *Vahl. l. c.*

*24. CROTALARIA argentea. +

C. foliis ternatis lanceolatis incanis, pedunculis uniflo-
ris subterminalibus oppositifoliis. W.

C. foliis ternatis, foliolis lanceolatis incanis, pedunculis
unifloris, solitariis, calycibus tripartitis. *Jacq. hort.*
Schoenb. 2. *p.* 50. *t.* 200. *

Silberfarbene Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

Frutex tripedalis ramis incanis flexuosis facie Coro-
nillae. Folia incana ternata, foliolis lanceolatis ob-
tusifolis petiolo brevioribus. Pedunculi uniflori sol-
itarii ad ramorum apices folio oppositi. Calyx tri-
partitus, longitudine corollae. Corolla flava. Legu-
men lanceolatum compressiusculum. W.

25. CROTALARIA *lunaris*.

C. foliis ternatis ovatis acutis, stipulis semicordatis lunatis. *Sp. pl.* 1005.

C. foliis ternatis: foliolis sessilibus, petiolis stipula duplice auctis. *Hort. cliff.* 357.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 506.

Mondförmige Klapperschote. W.

Habitat in Africa.

Foliola singula ovata acuminata sessilia in petiolo communi, aequalia, supina parte glabra viridia, prona vero albida villosa nitida. Flos solitarius pedunculum terminat, cuius Involucrum triphyllum perianthio brevius. *Hort. cliff.*

26. CROTALARIA *laburnifolia*.

C. foliis ternatis ovatis acuminatis glabris, stipulis nullis, racemo terminali, leguminibus pedicellatis pendulis. W.

C. foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis nullis, leguminibus pedicellatis. *Fl. zeyl.* 278.* *Mill. dict.* n. 10.

C. asiatica frutescens, foliis luteis amplis, trifolia. *Herm. lugdb.* 196. t. 197. *Raj. hist.* 1893.

C. arborescens trifoliata glabra viridis. *Burm. zeyl.* 82. t. 35.

Nella tandale - cotti. *Rheed. mal.* 9. p. 49. t. 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 506.

Bohnenbaumblättrige Klapperschote. W.

Habitat in Asia. ☽

Planta glabra. Legumen in calyce pedunculatum.

Corollae carina lata compressa rostrata. Alae vexillo et carina dimidio breviores.

*27. CROTALARIA *macrophylla*. W.

C. foliis ternatis oblongo-ovatis subtus pubescentibus, racemis axillaribus aggregatis petiolo brevioribus. W. Grossblättrige Klapperschote. W.

Habitat in India orientali. ፩ (v. f.)

Rami teretes. Folia alterna petiolata ternata. Foliola quadriuncialia trinervia venosa, superne glabriuscula inferne pubescentia, intermedium basi angustatum, lateralia obliqua. Petiolus communis biun-

cialis. Racemi *pollicares* subcompositi numerosi *axillares.* Calyx *bilabiatus.* Corolla *falcata.* Legumen *semipollicare oblongum acutum turgidum submonospermum.* Semen *parvum subrotundum.* Facies fere *Hedysari* sed *flos et fructus Crotalariae.* W.

*28. CROTALARIA laevigata.

C. foliis ternatis oblongis glabris, racemis lateralibus subtrifloris, leguminibus pedicellatis. W.

C. fruticosa glabra, foliis ternatis glabris oblongo-ellipticis, racemis lateralibus paucifloris, leguminibus in calyce pedicellatis. Lamarck encycl. 2. p. 197.*

Glatte Klapperschote. W.

Habitat in Madagascar. h (v. f.)

Rami teretes, glabri. Folia alterna ternata utrinque glabra, foliolis oblongis obtusiusculis basi attenuatis. Racemi axillares ad ramorum apices bi-tri vel quadriflori. Pedunculi bractea subulata suffulti. Corolla flava. Legumen semipollicare obtusum turgidum pedicellatum. W.

*29. CROTALARIA Trifoliastrum. W.

C. foliis ternatis cuneatis emarginatis petioli communi brevioribus, racemis terminalibus. W.

Kleeartige Klapperschote. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Herba facie *Meilioti.* Rami simplices bipedales teretes erecti. Folia ternata. Foliola pollicaria obovato-cuneiformia emarginata superne glabra, inferne, sub lente adspecta, pilis adpressis tecta. Petiolus communis foliolis longior. Stipulae setaceo-subulatae. Racemi tri-vel quadripollicares, quandoque et pedunculi uni-vel biflori in foliorum axillis. Flores flavvi. Legumen bilineari subrotundum turgidum pubescens. W.

30. CROTALARIA cordifolia.

C. foliis ternatis obcordatis mucronatis, floribus corymbosis, caule fruticoso. Mant. 266.

Spartium (*Sophoroides*) foliis petiolatis ternatis, foliolis cuneiformibus truncatis cum acumine conduplicatis, floribus racemosis. Berg. cap. 198.*

Hypocalyptus (obcordatus) foliis ternatis, foliolis obcordatis. Thunb. prod. 124.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 507.

Herzblättrige Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei rupibus. ♂ (v. f.)

Frutex 8 pedalis, ramosus: ramis subangulatis, cicuticibus truncatis. Folia ternata, petiolata: Foliola obcordata, sinu mucronata, glabra, basi acuta, subaequalia. Perioli foliis breviores. Stipulae setaceae, minutae. Corymbi terminales, solitarii, ovati: pedunculis calyibus corollisque violaceis. Flos similis Sophorae biflorae. Stamina connata.

*31. CROTALARIA pilosa. +

C. foliis ternatis pilosis, foliolis mucronatis, floribus terminalibus. Thunb. prod. 125.

Haarige Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*32. CROTALARIA villosa. +

C. foliis ternis villosis, foliolis obtusis, spicis terminalibus. Thunb. prod. 125.

Zottige Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*33. CROTALARIA axillaris.

C. foliis ternatis oblongo-lanceolatis acutis subtus sericeo-pilosis, stipulis lanceolato-subulatis, pedunculis axillaribus geminis unifloris. W.

C. foliis ternatis ovato-ellipticis subtus pilosis, stipulis subulatis minutis, pedunculis axillaribus geminis unifloris. Ait. Kew. 3. p. 20.

Zweyblütige Klapperschote. W.

Habitat in Guinea. ♂ (v. f.)

Kami fulcati. Folia ternata alterna. Foliola oblongo-lanceolata acuta mucronata, superne glabra, inferne sericeo-pilosa. Stipulae pilosae admodum parvae lanceolato subulatae. Pedunculi uniflori pollicares geminati axillares. Flores flavi. Legumina pilosa. W.

34. CROTALARIA incanescens.

C. foliis ternatis boyatis, stipulis foliiformibus petiolatis, racemis terminalibus, leguminibus pedicellatis. Ait. Kew. 3. p. 20.

- C. (*incanescens*) foliis ternatis obtusis stipulis foliaceis, ramis incanis. *Lin. Suppl.* 323.
- C. (*capensis*) foliis ternatis, foliolis obtusis, stipulis foliaceis, ramis incanis. *Thunb. prod.* 125. *Jacq. hort.* 3. p. 36. t. 64.
- C. (*arborescens*) caule arborecente, foliis ternatis obtusis, stipulis petiolatis obcordatis foliaceis. *Lamarck encycl.* 2. p. 198.*
- Grauästige Klapperschote. W.
Habitat ad Cap. b. spei inque insula Mauritii et Borbonia. ♂ (v. f.)
- Caulis fruticosus orgyalis, ramis incanis. Folia petiolata ternata. Foliola bipollucaria obcordata nuda. Petiolus communis canescens longitudine foliorum. Stipulae in ramis senioribus semipollucares obcordatae petiolatae in ramis vero junioribus lanceolato-subulatae. Racemi terminalis semipedales erecti. Flores lutei.* W.

35. CROTALARIA incana.

- C. foliis ternatis ovalibus subtus villosis, racemis spiciformibus, carina margine tomentosa, leguminibus sessilibus hirsutis. *Ait. Kew.* 3. p. 20.
- C. foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis setaceis, leguminibus hirsutis. *Sp. pl.* 1005. *Jacq. obs.* 4. p. 4. t. 82. *Swartz obs.* 278.* *Cavan. ic.* 4. p. 11. t. 322.*
- C. foliis ternatis petiolis nudis. *Hort. cliff.* 358.* *Hort. upf.* 210. *Roy. lugdb* 375.
- C. trifolia fruticosa, foliis rotundis incanis, floribus spicatis e viridi luteis, fructu pubescente. *Sloan. jam.* 141. *hist.* 2. p. 34. t. 179. f. 1. *Raj. suppl.* 466.
- C. trifolia. *Riv. pent.* 138.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 507.
- Graue Klapperschote. W.
Habitat in Jamaica, Caribaeis. ☽ (v. v.)

Caulis ringens, pubescens uti Petioli. Foliola ovalia, supra laevia, subtus pubescentia. Stipulae solitariae, deciduae. Bracteae 2, setaceae juxta calycem. Flores racemosi. Corollae luteae; Vexillum supra fulvum. Alae suberectae. Carinae margines albo-lanatae. Stamina connata.

*36. CROTALARIA pallida.

C. foliis ternatis lanceolatis glabris, - racemis terminalibus spiciformibus. Ait. Kew. 3. p. 20.

Bleiche Klapperschote. W.

Habitat in Africa. ○

*37. CROTALARIA longifolia.

C. foliis ternatis lanceolatis, pedunculis unifloris axillaribus aggregatis, leguminibus tetragonis. W.

C. (*longifolia*) foliis ternatis oblongo-lanceolatis petiolatis glabris, leguminibus tetragonis axillaribus. Lamark encycl. 2. p. 200.

C. (*gujanensis*) foliis ternatis oblongis, legumine quadrangulari, flore purpurascente. Aubl. guj. 2. p. 761. t. 305.*

Längblättrige Klapperschote. W.

Habitat in pratis Gujanae. 2

Foliota quadripollucaria lanceolata obtusa mucronata glabra, intermedium reliquis longius. Petiolus brevissimus. Stipulae lanceolatae binae ad basin petioli et binae ad basin cujusque folioli. Pedunculi 2 vel 4 uniflori in foliorum axillis. W.

*38. CROTALARIA angustifolia.

C. foliis ternatis lanceolatis incanis sericeis petiolo brevioribus, racemo terminali. W.

C. (*angustifolia*) foliis ternatis, foliolis linear-lanceolatis sericeis, floribus racemosis. Jacq. hort. schönbr. 2. p. 49. t. 219.*

C. (*elongata*) foliis ternatis, foliolis ovatis argenteis, spicis longissimis. Thunb. prod. 125?

Schmalblättrige Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 3

Folia incano-sericea. Racemus 8-pollicaris. Flores ochroleuci. W.

*39. CROTALARIA lineata. +

C. foliis ternatis subtus tomentosis nervosis, caule decumbente. Thunb. prod. 125.

Gefärbte Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*40. CROTALARIA *genistoides*. W.

C. foliis ternatis linear-i-cuneatis emarginatis, racemo terminali. W.

Ginsterartige Klapperschote. W.

Habitat in aridis Indiae orientalis. (v. f.)

Rami videntur lignosi, sunt ramosi. Folia unguiculata ternata pubescentia ut tota planta. Foliola linear-i-cuneiformia emarginata. Petiolus communis brevissimus. Stipulae subulatae. Racemi terminales quadri vel sexflori. Flores parvi flavi. Legumina parva unguicularia subrotundo-ovata acuminata. *Habitus Genistae.* W.

*41. CROTALARIA *microphylla*.

C. foliis ternatis oblongis, pedunculis lateralibus bifloris, caule decumbente. *Vahl symb. I. p. 52.**

Arabische Klapperschote. W.

Habitat in Arabia felici.

Caulis lignosus decumbens filiformis teres ramosus glaber pedalis. Folia petiolata remota ternata. Foliola oblonga subseffilia glabra crassiuscula bilinearia, lateralia minora submucronata. Petiolus longitudine foliorum. Stipulae setaceae patulae petiolo duplo breviores. Pedunculi terminales sed cum ramus excrescit, laterales et oppositifolii sunt biflori. floribus pedicellatis. Legumen oblongum pedicellatum glabrum, pedicello brevissimo. *Vahl I. c.*

*42. CROTALARIA *volubilis*.

C. foliis ternatis glabris, foliolis obovatis obtusis, floribus axillaribus solitariis. *Thunb. prod. 125.*

Windende Klapperschote. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

43. CROTALARIA *heterophylla*.

C. foliis ternatis ellipticis emarginatis, inferioribus simplicibus. *Lin. suppl. 323.*

Verschiedenblättrige Klapperschote. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis erectus pedalis laevis superne subramosus. Folia caulina inferiora simplicia elliptica oleracea emarginata laevia nervis costata; superiora ternata obovata similia. Petioli brevissimi canaliculati. Stipulae

parvae subulatae patulae. Racemus florens termina-
lis, demum frutescens lateralis. Corollae flavae extus
subtestaceae striato-nervosae. Legumina laevia.

44. CROTALARIA quinquefolia.

C. foliis quinatis. Sp. pl. 1006.

Wellia-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 51. t. 28. Raj.
suppl. 465.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 508.

Fünfblättrige Klapperschote. W.

Habitat in India. ⊙ (v. f.)

Foliola angusto-lanceolata, obtusa, saepe retusa,
subnuda lateralibus brevioribus. Calyces campanula-
ti. Flores racemosi, alterni, glabri.

1344. O N O N I S.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1173.

Cal. 5-partitus: laciniis linearibus. Vexillum stria-
tum. Legumen turgidum, sessile. Filamen-
ta connata absque fissura.

† *Floribus subferrilibus.*

I. ONONIS antiquorum.

O. floribus solitariis foliolo majoribus, foliis inferioribus
ternatis lanceolatis apice dentatis, ramisque spinosis
glabris. W.

O. floribus solitariis foliolo majoribus, foliis inferiori-
bus ternatis; ramis laeviusculis spinosis. Sp. pl. 1006.
Lamarck encycl. 1. p. 499. *

Anonis legitima antiquorum. Tournef. cor. 28.

Anonis Aegipyros Cratevae. Lob. ic. p. 28. Dod.
pempt. 743.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 509.

Vieldornige Hauhechel. W.

Habitat in Europa australi. 4 (v. f.)

Similis O. spinosae, sed brevior, rigidior, magis
spinosa, fere glabra: pedunculis solitariis, bractea
duplo longioribus.

2. ONONIS *spinosa*.

O. floribus subgeminatis axillaribus, foliis inferioribus ternatis lanceolatis ferratis, ramisque spinosis villosis. W.

O. (*spinosa*) floribus axillaribus geminatis, foliis ternatis superioribus solitariis, ramisque villosis. Ait. Kew. 3. p. 21. Willd. arb. 200.*

O. (*spinosa*) floribus racemosis solitariis, foliis ternatis solitariisque, ramis spinosis. Syst. veg. ed. Murr. 14. p. 651. Hoffm. germ. 252. Roth. germ. I. 304. II. 166. Retz obs. bot. I. p. 23. 2. p. 21. Fl. dan. 783.

Ononis *spinosa*. B Sp. pl. 1006.

O. floribus subfessilibus laterilibus, caule spinoso. Hort. cliff. 359. Crantz aust. 369. Pollich. pal. n. 670. Blackw. 301.

Anonis caule decumbente, ramis senescentibus spinosis. Hall. helv. n. 356.

Anonis *spinosa* flore purpureo. Bauh. pin. 389.

Anonis sive Resta bovis vulgaris purpurea. Bauh. hist. 2. p. 395.

Anonis. Fuchs hist. 60. Riv. t. 69.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 510.

Stachliche Hauhechel. W.

Habitat in Europae aridis. 24 (v.v.)

Clariss. Smith in flora britannica 2. p. 758. hanc cum O. repente conjunxit et varietatem inermem a sequente diversam indicavit, atque O. antiquorum vix differre putat. O. *spinosa* nostra nunquam spinis caret et nullibi O. repente in nostris regionibus, nec in maritimis Germaniae, observavi. O. antiquorum est species diversissima glabritie omnium partium, foliis apice tantum dentatis, floribus longius penduculatis, cauleque erecto spinosiore. W.

3. ONONIS *hircina*.

O. floribus geminatis, foliis inferioribus ternatis ellipticis ferratis pubescentibus, caule inermi villos-viscolo. W.

O. (*hircina*) floribus subspicatis geminatis, foliis inferioribus ternatis, superioribus solitariis villotiusculis, ramis piloso-villoso. Ait. Kew. 3. p. 21. Willd. arb. 201.* Jacq. hort. I. p. 40. t. 93.

- O. (*carvensis*) floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosois. *Syst. veg. ed. Murr.* 14. p. 651. *Hoffm. germ.* 252. *Roth. germ.* I. 304. II. 167. *Retz obs. bot.* 2. p. 21. *Ononis foetens.* *Allion. pedem.* I. n. 1164. t. 41. f. 1. O. (*altissima*) caulis erectis villosis ramosis, ramis apice spicatis, stipulis latis ferratis amplexicaulibus. *Lamarck encycl.* I. p. 500.*
- O. (*spinosa & mitis*) floribus subsessilibus solitariis lateribus, ramis inermibus. *Sp. pl.* 1006. *Hort. cliff.* 359. *Fl. suec.* 622. *Roy. lugdb.* 375. *Anonis spinis carens purpurea.* *Bauh. pin.* 389. *Anonis mitior.* I. *Clus. hist.* 99. *Besl. eyst. aest.* 10. t. 2. f. 2. *Anonis non spinosa.* flore thyrsoidae carneo, polonica. *Barr. ic.* 1214. *Anonis non spinosa purpureo flore.* *Bauh. hist.* 2. p. 393. *Ger. emac.* 1322. *Stinkende Hauhechel.* W. *Habitat in Suecia, Germania, Gallia, Italia, Hungaria.* 24 (v. v.) *Folia in caule ternata; Floralia vero simplicia. Flores duo propriis pedunculis exeunt simul. Planta pubescenti subviscida.*

4. ONONIS repens.

- O. floribus solitariis axillaribus, foliis inferioribus ternatis subrotundis serratis, ramisque adscendentibus spinosis villosis. W. O. caulis diffusis, ramis erectis: foliis superioribus solitariis, stipulis ovatis. *Sp. pl.* 1006. *Mill. dict.* n. 3. *Anonis maritima procumbens,* foliis hirsutie pubescentibus. *Pluk. alm.* 33. *Dill. elth.* 29. t. 25. f. 28. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 512. *Kriechende Hauhechel.* W. *Habitat in Angliae litoribus maris, Oriente.* 24 (v. f.) *Affinis admodum praecedenti, differt caulis pro- cumbentibus undique diffusis, et quod minor; Flores ex aliis solitarii.* *Ab O. spinosa diversa: caule procumbente ramis adscendentibus, foliolis subrotundis, calycinis taciniis lanceolatis latioribus, nec linearis - subulatis, pedunculisque solitariis.* W.

*5. ONONIS *caduca*.

O. floribus ternis racemosis, foliis inferioribus ternatis oblongis ferratis, ramisque diffusis spinosis villosis. W.

O. (*caduca*) spinosa, foliis subrotundis caducis, floribus ternatis. *Vill. delph.* 3. p. 428. *

Hinällige Hauhechel W.

Habitat in montibus Delphinatus. 24. (v. f.)

Rami villoso-viscidi. Folia inferiora ternata, foliolis oblongis ferratis pubescentibus. Flores in racemo terminali. Pedunculi brevissimi terni. Folia flora simplicia lanceolata subdentata stipulis binis connatis absque petiolo inserta. Similis *O. spinosae* sed floribus racemosis, pedunculis ternis, floribus minoribus, foliisque floralibus diversa. Foliola foliorum inferiorum in specimine a *Clariss. Villars misso*, sunt oblonga nec subrotunda. W.

*6. ONONIS *hispida*.

O. floribus solitariis subsessilibus racemosis, foliis ternatis obovatis ferratis pubescentibus, caule erecto hirto. W.

O. foliis ternis obovatis ferratis, floribus solitariis subsessilibus racemosis, calycibus pilosis, laciniis calycinis lanceolatis corollam aequantibus. *Desf. atl.* 2. p. 146. t. 189.*

Ranftielige Hauhechel. W.

Habitat in arvis Barbariae.

Dignoscitur facile: foliolis obovatis racemo terminali, bracteis parvis ovatis acuminatis sessilibus, floribus alternis subsessilibus, caule erecto. W.

*7. ONONIS *serrata*.

O. floribus subsessilibus solitariis, foliis inferioribus serrato-dentatis cuneiformibus, apice subtridentatis. *Vahl symb.* 1. p. 52.

O. (*serrata*) pedunculis axillaribus unifloris, foliis ternatis serrato-dentatis, flore albo, vexillo rubicundo. *Forst. descr.* 130.

Gefägte Hauhechel. W.

Tota planta pubescenti-viscida. Caulis herbaceus teres decumbens subdichotomus Rami tenues. Folia inferiora ternata, superiora simplicia, ad apices ra-

morum vix ulla, omnia petiolata. Foliala cuneiforme linearia serrato-dentata, dentibus utrinque tribus, apice transversa tridentata, rarius quinquedentata, semiunguicularia, lateralia minora. Petiolus longitudine foliorum: Stipulae petiolo utrinque adnatae eoque dimidio breviores ovato-lanceolatae striatae denticulatae. Flores axillares solitarii subsessiles, inferiores remotiores, supremi pauci stipula suffulti. Calyx quinquefidus striatus, lacinis lanceolato-linearibus longitudine corollae. Legumen villosum oblongum tetraspermum longitudine calycis. Vahl. I. c.

8. ONONIS minutissima.

- O. floribus subsessilibus lateralibus, foliis ternatis cuneatis glabris, stipulis setaceis integerrimis, calycibus scarioribus corolla longioribus. W.
- O. floribus subsessilibus lateralibus, foliis ternatis glabris, stipulis ensiformibus, calycibus scarioribus corolla longioribus. Sp. pl. 1007.
- O. (*saxatilis*) foliis ternatis glabris, stipulis longis setaceis, floribus axillaribus subsessilibus erectis. Lamarck encycl. I. p. 503.*
- O. (*barbata*) foliis ternatis ovatis serratis glabris, superioribus solitariis, calycis lacinis subulato-setosis corolla longioribus. Cav. ic. 2. p. 42. t. 143.*
- Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis et stipulis longas setas exerentibus. Sauv. monsp. 190.
- Anonis putilla glabra angustifolia lutea. Tournef. inst. 409.
- Anonis lutea montana non spinosa minima. Barr. ic. 1107.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 512.

Kleinste Hauhechel. W.

Habitat in Italia, Monspelii. ♂ (v. f.)

Caules filiformes, diffusi, glabri, suffruticosi. Stipulae acuminatissimae, subbipartitae, integerrimae. Folia ternata, laevia, petiolata: Foliolis oblongiusculis, rigidulis, serratis, recurvatis, vix mucronatis. Petoli brevissimi. Flores axillares, solitarii. Calices glabri, subscariosi, profunde quinquefidi, recti, subulati, corolla longiores. Corollae luteae. Legumen ovatum, fuscum, calyce brevius. Folia floralia superiora simplicia.

*9. ONONIS *Columnae*.

- O. floribus subsessilibus lateralibus, foliis ternatis oblongis pubescentibus, stipulis lanceolatis denticulatis, calycibus scarioribus corolla longioribus. W.
 O. (*Columnae*) floribus sessilibus, foliis omnibus ternatis, stipulis lanceolatis dentatis. *Allion. ped.* I. n. 1166. t. 20. f. 3.
 O. (*parviflora*) floribus sessilibus lateralibus, foliis inferioribus ternatis, superioribus simplicibus longe petiolatis, calycibus basi scarioribus corolla longioribus. *La-marc encycl.* I. p. 504.* *Cavan. ic.* 2. p. 42. t. 154. f. 1.*
 O. (*subocculta*) multicaulis inermis hirsuta subviscida, foliolis orbiculatis, stipulis ferratis, floribus sessilibus. *Villars delph.* 3. p. 429.*
Ononis minutissima. *Jacq. austr.* t. 240.
 O. floribus lateralibus sessilibus solitariis, petiolis longissimis. *Roy. lugdb.* 175.
Anonis foliis ternatis ovatis ferratis hirsutis, floribus sessilibus, calycibus hiantibus. *Hall. helv.* n. 359.
 O. lutea sylvestris minima. *Col. ecphr.* I. p. 304. t. 301.
Anonis flore luteo parvo. *Tournef. inst.* 409.
 Berg - Hauhechel. W.
Habitat in rupibus Austriae, Hungariae, Helvetiae, Galliae, Hispaniae. 24 (v. f.)
Variat foliis omnibus ternatis et foliis summis simplicibus. W.

*10. ONONIS *capitata*.

- O. floribus subsessilibus lateralibus subcapitatis, foliis ternatis oblongis, stipulis lanceolato-subalatis calycibus corolla brevioribus. W.
 O. (*capitata*) caulinis prostratis ramosis filiformibus, foliis ternatis, floribus capitatis. *Cav. ic.* 2. p. 45. t. 159. f. 2.*
 Kopfförmige Hauhechel. W.
Habitat in regni Valentini montibus Saguntinis, Sacetabiniis. 24
Flores axillares ad apices ramorum aggregati subcapitati lutei. Similis *O. minutissimae*, sed foliis oblongis, floribus terminalibus, et corollis calyce majoribus diverja. W.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

K

II. ONONIS *mitissima*.

O. floribus sessilibus spicatis bracteis stipularibus ovatis ventricosis scariosis imbricatis. Sp. pl. 1007. Mill. dict. n. 12.

O. stipulis floribus ovatis membranaceis integerrimis. Roy. lugdb. 376.

Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. Dill. eth. 23. 24 f. 27.

Anonis purpurea spicata erecta annua latifolia, siliquis rectis lentiformibus. Morf. hist. 2. p. 169. f. 2. t. 17. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 513.

Hautige Hauhechel. W.

Habitat in Barbados, Lusitania. ○ (v. v.)

Folia Caulina ternata; floralia simplicia. Stipulae et Bracteae amplexicaules, membranaceo - cartilagineae, laeves, ovatae, concavae ad flores imbricatae in spicam, calyces obtengentes. Calycis laciniae ovatae, lateribus reflexae, intus adspersae jetis viscosis ut siliqua.

* 12. ONONIS *villofissima*.

O. floribus lateralibus subsessilibus subspicatis, foliis inferioribus ternatis ovatis acutis cauleque villoso-viscosis, corollis leguminibusque calyce minoribus. W.

O. villofissima viscosa, foliis ternatis, floribus racemosis confertis sessilibus, corollis leguminibusque calyce brevioribus. Desf. atl. 2. p. 147. t. 192.*

Klebrige Hauhechel. W.

Habitat in arvis Algeriae.

Tota planta villoso-viscosa. Folia inferiora ternata ovata acuta parva ferrata, intermedium majus, superiora simplicia. Stipulae ovatae dentatae. Flores rosei subsessiles ad ramorum apices. Corollae calyce breviores. Legumina subrotundo - ovata trisperma calyce breviora.

13. ONONIS *alopecuroides*.

O. floribus subsessilibus lateralibus subspicatis, foliis simplicibus ovatis obtusis, stipulis dilatatis, calycibus corolla glabra majoribus. W.

O. spicis foliosis, foliis simplicibus ovatis obtusis, stipulis dilatatis. *Sp. pl.* 1008. *Mill. dict.* n. 13. *Kniph. cent.* 8. n. 75.

O. foliis simplicibus apice rotundatis, stipulis maximis, spicis foliosis villosis, calycibus corolla longioribus. *Desf. atl.* 2. p. 146.*

O. floribus spicatis. *Hort. cliff.* 358. *Roy. lugdb.* 376. *Anonis sicula alopecuroides.* *Tournef. inst.* 408.

Anonis spicata f. alopecuroides lusitanica non spinosa. *Raj. suppl.* 468.

Anonis purpurea spicata alopecuroides major, *Boerh. lugdb.* 2. p. 33.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 513.

Fuchsfchwanzartige Hauhechel. W.

Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania, Barbaria. ⊙
(v. v.)

* 14. ONONIS *monophylla.*

O. floribus subsessilibus lateralibus subspicatis, foliis simplicibus oblongis acutiusculis stipulis dilatatis, corollis pubescentibus calycem aequantibus. W.

O. foliis simplicibus ellipticis, stipulis ferratis maximis, floribus sessilibus racemosis, corollis calycem aequantibus. *Desf. atl.* 2. p. 145. t. 188.*

Einblättrige Hauhechel. W.

Habitat in arvis Barbariae.

Valde affinis praecedenti. W.

* 15. ONONIS *spicata.*

O. foliis simplicibus stipulatis ovatis sericeis, caule erecto, floribus spicatis. *Thunb. prod.* 129.

Aehrenblütige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ.

* 16. ONONIS *euphrasiaefolia.*

O. floribus subsessilibus spicatis, foliis simplicibus linear-lanceolatis ferratis, stipulis oblongo-lanceolatis aristatis dentatis, caule erecto. W.

O. caule erecto villoso, foliis simplicibus linear-lanceolatis, stipulis acuminatis, bracteis ovatis acutis, floribus racemosis subsessilibus. *Desf. atl.* 2. p. 141. t. 184.*

Augentrostartige Hauhechel. W.

Habitat in arenosis Barbariae prope Mascar. ⊙ (v. f.)

Facies Euphrasiae. Corollae flavae calyce duplo longiores. W.

*17. ONONIS variegata.

O. floribus subpedunculatis axillaribus, foliis simplicibus obovatis striatis serratis, stipulis ovatis dentatis, caule procumbente. W.

O. stipulis bracteisque dentatis, foliis simplicibus striatis, floribus subpedunculatis. Sp. pl. 1008. Roy. lugdb. 376.*

O. caule procumbente, stipulis dentatis, foliis glabris nervosis obovatis simplicibus, floribus axillaribus. Desf. atl. 2. p. 142. t. 185.*

Anonis lutea, trixaginis folio, maritima. Barr. ic. 776. mala.

Anonis maritima mitis, folio lucido ferrato. Bocc. sic. 7. t. 38. f. 3.

Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia maritima. Tournef. inst. 409.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 514.

Weisse Hauhechel. W.

Habitat in maritimis Hispaniae, Barbariae. ○ (v. f.)

Facies Euphrasiae palmaris, ramosa, diffusa, viscosa-pubescentia. Stipulae cordatae, latissime, plicatae, dentatae, emarginatae, foliis latiores. Folia simplicia, cuneiformi obovata, plicata, argute denticulata. Flores axillares, solitarii, subpedunculati. Calyces corolla breviores.

*18. ONONIS alba.

O. pedunculis muticis brevissimis, foliis simplicibus, stipulis dilatatis superne serratis. Vahl symb. 2. p. 80.*

O. (alba) caule erecto villoso, foliis simplicibus oblongis serrulatis glabris, floribus racemosis solitariis, calycibus pubescentibus corollam subaequantibus. Desf. atl. 2. p. 145.

O. (alba) floribus sessilibus racemosis, foliis simplicibus. Poiret. itin. 2. p. 210.

Weisse Hauhechel. W.

Habitat in maritimis Barbariae.

Media inter O. alopecuroidem et O. pubescens. Stipulis serratis, foliis floralibus structura foliorum

caulis, modo minoribus nec linearibus basin versus angustioribus ab O. alopecuroide differt. Folii omnibus simplicibus, stipulis serratis distinguitur ab O. pubescenti. Vahl. l. c.

* 19. ONONIS fasciculata.

O. foliis fasciculatis lanceolatis crenatis, floribus spicatis, caule erecto. Thunb. prod. 130.

Büschelblättrige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

† † *Floribus pedunculatis: pedunculo mutico.*

20. ONONIS pubescens.

O. pedunculis muticis brevissimis, foliis superioribus simplicibus, stipulis ovato-lanceolatis integerrimis. Mant. 267.

O. (*Morifffoni*) pedunculis unifloris nudis, foliis ovatis: imis ternatis, summis simplicibus, calycibus maximis. Goyan. illustr. p. 47. R.

Anonis purpurea procumbens verna s. praecox fruticosa annua viscosa, filiis crassioribus lentiformibus rariis dispositis. Morison hist. 2. p. 168.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 515.

Zarthelige Hauhechel. W.

Habitat in Europa australi. Ex Insulis balearicis. Gouan.

Caulis pedalis, ramosus, diffusus, teres, uti tota planta pubescenti-viscidus, Ramorum apicibus congestis foliis floribusque, qui sensim remotiores evadunt. Folia inferiora ternata: reliqua simplicia. Foliola ovata s. ovalia, obtusa, acute serrata. Stipulae ovato-lanceolatae, petiolo adnatae ejusque longitudinis, integerrimae. Petioli longitudine foliorum. Pedunculi axillares, mutici, longitudine petiolorum. Calyces lanceolati, obtusiusculi, longitudine corollae.

* 21. ONONIS persica. †

O. pedunculis muticis bifloris racemosis, foliis ternatis linearibus truncatis serratis, stipulis integerrimis. W.

O. (*persica*) stipulis integerrimis lanceolatis, foliis ternatis cuneiformibus tridentatis, spica foliosa terminali. Burm. ind. 157. t. 49. f. 1.*

Perſische Hauhechel. W.

Habitat in Persia.

*22. ONONIS cernua.

O. racemis strictis, foliis cuneiformibus, leguminibus cernuis linearibus recurvatis. *Syst. Veg.* 542.

O. spicis ſeſſilibrus, leguminibus nutantibus linearibus pilosis. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 42. * *Sp. pl.* 2. p. 1011.

Lotus africana annua hirsuta, floribus luteis. Comm. hort. 2. p. 163. t. 82.

B. *Cytisus (aethiopicus) racemis lateralibus strictis, ramis angulatis, foliolis cuneiformibus. Spec. 2. p. 1042.*

Cytisus aethiopicus, subrotundis incanis minoribus foliis, floribus parvis luteis. Pluk. alm. 128. t. 278. f. 3. an?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 515.

Krumfrüchtige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

Frutex facie *Genijiae canariensis*. Rami teretes, purpurascentes, ad persi pilis albidis. Folia ternata, petiolata, parva, subtus purpurascens: Foliola ſeffilia, subcuneiformia, obtusa, vix emarginata. Racemi erecti, pilosi, uti Calyces. Corollae parvae, luteae. Stamina connata, supra rima difiecta. Legumen lineare, cernuum, refalcatum, compressum, torulofsum.

*23. ONONIS micrantha. †

O. foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis, florum umbellis terminalibus, caule decumbente. *Thunb. prod.* 130.

Feinblütige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

*24. ONONIS parviflora. †

O. foliis ternatis villosis, umbellis lateralibus, caule herbaceo villoſo. *Thunb. prod.* 129.

Feinblütige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

An eadem ac Anthyllis quinqueflora? W.

25. ONONIS umbellata.

O. pedunculis muticis umbellatis, foliis ternatis emarginatis, caulis prostratis. *Mant.* 266.

O. foliis ternatis villosis, foliolis oblongis obtusis, floribus umbellatis, caule decumbente. *Thunb. prod.* 130.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 516.

Doldentragende Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h

Caulis pedales, ramosi, virgati, numerosi, prostrati, filiformes. Folia ternata, petiolata: Foliola sessilia, obcordata s. obovata; obtusa, nuda. Petioli longitudine foliorum, vix pubescentes. Stipulae minutae, lanceolatae. Umbellae subquinquesflorae (floribus 4-8) rarius flores 2 sub umbella, absque evidenti involucro. Pedunculi communes axillares et terminales, longissimi, filiformes. Calyces pubescentes. Filamenta connata. Legumen futura dorsali scabra.

26. ONONIS involucrata.

O. hirsuta prostrata, pedunculis umbellatis muticis involucratis, involucro tetraphyllo, foliis ternatis cuneiformibus. *Lin. suppl.* 324. *Berg. cap.* 123.

O. foliis ternatis villosis, foliolis oblongis obtusis, floribus umbellatis involucratis, caule decumbente. *Thunb. prod.* 130.

Anthyllis (involucrata) subl. erbacea, foliis ternatis petiolatis stipulatis ensiformibus, floribus capitatis. *Maut.* 265.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 531.

Eingehüllte Hauhechel.

Habitat ad Cap. spei. (v. f.)

Caulis herbaceus procumbens hirsutus pedalis. Rami erecti simplices floriferi. Folia ternata petiolata. Foliola lanceolata pilosa. Stipulae magnitudine foliorum. Capitula subrotunda involucrata, Bracteis binis tripartitis, flore vix longioribus. Flores lutei.

Facie convenit cum O. umbellata. Suppl.

*27. ONONIS secunda.

O. foliis ternatis glabris, foliolis oblongis acutis, umbellis terminalibus, caule decumbente herbaceo. *Thunb. prod.* 130.

Einseitige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*28. *ONONIS glabra.*

O. foliis ternatis glabris, foliolis ovatis obtusis, floribus umbellatis, caule decumbente. *Thunb. prod. 130.*

Glatte Hanhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

29. *ONONIS filiformis.*

O. pedunculis muticis subtrifloris, foliis ternatis subsessilibus: foliolis ovatis mucronatis. *Mant. 266.*

Lotus exstipulatus, leguminibus subracemosis distantibus glabris, pedunculis axillaribus longissimis, foliolis ternis ovatis mucronatis. *Berg. cap. 227.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 517.

Fadenförmige Hanhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 24

Statura *Loti corniculati*. Radix *simplex, descendens*. Caules numerosi, ramosi, duriusculi, filiformes, diffusi, *spithamei*. Folia subjessilia. Foliola ovata, mucronata, parva, subpubescentia. Stipulae nullae. Pedunculi axillares, filiformes, foliis multo longiores, apice subtriflori: Floribus alternis, pedicellatis. Legumen *cylindricum, acutum.*

30. *ONONIS capensis.*

O. racemis pedunculatis longis, foliis ternatis suborbicularis. *Amoen. acad. 6. afr. 41. **

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 518.

Capische Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ○

*31. *ONONIS excisa.*

O. pedunculis muticis unifloris longissimis, foliis ternatis obovatis emarginatis, stipulis subulatis, caule prostrato. W.

O. (*excisa*) foliis ternatis subtus pubescentibus, floribus binis terminalibus, caule decumbente. *Thunb. prod. 129.*

Ansgerandete Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. (v. f.)

32. *ONONIS prostrata*.

O. pedunculis muticis unifloris longissimis, foliis ternatis acutis, stipulis subulatis, caulis prostratis.
Mant. 266.

Lotus prostratus. Spec. pl. 2. p. 1090.

Houttuyn Lin. Pfl Syst. 8. p. 518.

Liegende Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 2 (v. f.)

Caules numerosi, spithamei, filiformes, debiler, prostrati, herbacei. Folia petiolata, ternata, lanceolata, utrinque mucronata, glabra, subtus pubescentia. Stipulae minutissimae, acuminatae. Pedunculi filiformes longissimi, uniflori, infra apicem geniculati. Calyx magnitudine foliorum. Legumen subtomentosum, mucronatum, horizontale, calyce duplo longius.

Genus agnoscit Ononidis, uti patet ex staminibus coalitis.

*33. *ONONIS geminata*.

O. foliis ternatis obovatis, pedunculis lateralibus bifloris.

Ait. Kew. 3. p. 23.

Zweiblütige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 2

Affinis videtur O. excisa. W.

*34. *ONONIS elongata*.

O. foliis ternatis hirsutis, foliolis ovatis acutis, pedunculis lateralibus unifloris, caule decumbente. Thunb. prod. 129.

Verlängerte Hauhechel. W.

Habitat in Cap. b. spei.

*35. *ONONIS capillaris*. †

O. foliis ternatis linearibus glabris, pedunculis axillari- bus unifloris, caule erectiusculo. Thunb. prod. 129.

Haarförmige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*36. *ONONIS villosa*. †

O. foliis ternatis lanceolatis, pedunculi lateralibus uni- floris, caule decumbente. Thunb. prod. 129.

Zottige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*37. ONONIS *heterophylla*.

O. foliis ternatis, foliolis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, floribus solitariis pedunculatis. Thunb. prod. 129.

Verschiedenblättrige Hauhechel. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

*38. ONONIS *laxiflora*.

O. pedunculis muticis unifloris folio longioribus, foliis ternatis obovatis serratis, stipulis subrotundis, leguminibus villosis nutantibus. W.

O. (*laxiflora*) foliis ternatis, pedicellis folio longioribus, calycibus corollam aequantibus, leguminibus elongatis exsertis nutantibus. Desf. atl. 2. p. 146. t. 190. *

Schlafblütige Hauhechel. W.

Habitat in collibus incultis Algeriae. ⊖

Caulis erectus villosus. Folia glabriuscula. Stipulae subrotundae ferratae. Corolla coerulescens longitudine calycis. Legumina pollicaria calyce longiora. W.

*39. ONONIS *pendula*.

O. pedunculis muticis unifloris subracemosis cernuis, foliis ternatis obovatis apice ferratis, stipulis ovatis ferratis, leguminibus villosis nutantibus. W.

O. (*pendula*) foliis ternatis obovatis apice rotundatis, floribus racemosis cernuis, pedicellis striatis, leguminibus villosis calyce longioribus. Desf. atl. 2. p. 147. t. 191. *

Hängende Hauhechel. W.

Habitat in Barbaria prope Mascar in arvis. ⊖

Caulis erectus villosus. Folia glabra. Stipulae ovatae obtusae. Flores axillares in apice caulis racemum formant. Calyx villosus. Corolla pallide coerulescens. W.

40. ONONIS *reclinata*.

O. pedunculis muticis unifloris, foliis ternatis subrotundis crenatis, leguminibus cernuis. Sp. pl. 1011.

Anonis pulilla hirsuta, flore ex albo et rubro colore mixto. Morif. hisl. 2. p. 171.

Anonis annua pumila, flore purpurascente. Tournef.
infl. 408.

Houttuyn Lin. Pl. Synt. 8. p. 512.

Zurückgebeugte Hauhechel. W.

Habitat in maritimis Galliae australis, inque Hispania,
Italia. ⊖

Planta viscosa-pubescentia, parva, diffusa, patula.
Folia petiolata, ternata, orbiculata, crassifolia, pli-
cata, crenata, viscosa-pubescentia. Stipulae ovates,
patulae, obtusae. serratae. Pedunculi axillares, uni-
flori, mutici, longitudine vix foliorum. Calycis lon-
gitudine pedunculi obtusi. Corollae albidae vexillo
sabutus purpureo. Calyx defloratus reflectitur apice ad
caulem. Legumen calycé sesquilongius, villosum.

41. ONONIS cenista.

O. pedunculis muticis unifloris, foliis ternis cuneatis,
 stipulis ferratis, caulis prostratis. *Mant. 267.*
Allion. pedem. I. n. 1173. t. 10. f. 2. Vill. delph. 3.
*p. 433.**

Anonis inermis glabra, vaginis lanceolatis cristatis, pe-
tiolis longis unifloris. Allion. spec. pedem. 47. t. 10.
f. 3. bona.

Anonis purpurea non spinosa minor. Barr. ic. 354.

Anonis luteo-purpurea minima angustifolia. Barr. ic.
833. t. 1104.

Houttuyn Lin. Pl. Synt. 8. p. 519.

Cenistica Hauhechel. W.

Habitat in montosis Delphinatus et Italiae, praecipue
ad radices montis Cenii. 24 (v. f.)

Caules prostrati, digitales, subramosi, laeves. Fo-
lia ternata: Foliola laevia, cuneata, apice rotundata,
argute tenuissimeque ferrata. Stipulae lanceolatae,
serratae. Pedunculi laterales, uniflori, mutici, foliis
multo longiores. Flores Calyce brevi, laevi: Corollis
Vexillo purpureo, siliato.

† † † *Pedunculis aristatis.*

*42. ONONIS vaginalis.

O. pedunculis unifloris aristatis, foliis sessilibus ter-

nis stipulisque vaginantibus dentatis. *Vahl symb. I.*
p. 53.

O. (*Cherleri*) pedunculis unifloris filo appendiculatis, caulis imbricatis compressis, laciis foliorum tomentosis dentatis. *Forsk. desc.* 130.*

Scheidenartige Hauhechel. W.

Habitat in Aegyptio. ḥ (v. f.)

Villoso viscosa, caule lignoso. Folia ternata. Folia cuneiformia striata dentata versus basin integerima, lateralia minora. Stipulae cucullatae totum caulem tegentes striatae versus caulem oblique, extus bifidae vaginantes striatae dentatae, inferiores aridae. Pedunculi alterni, a medietate caulis usque ad apicem solitarii uniflori, parum infra calycem folio linearri longitudine calycis aristatis erecti pollicares. Calyx striatus, laciis lanceolatis corolla-brevioribus. Corolla flava. Vexillum purpureo-striatum. Legumen reflexum Diverso tempore anni faciem alienam induit, ut facile pro distincta specie haberetur: ramulis confertis semipollicaribus aphyllis, stipulis minoribus dense imbricatis.. Vahl. I. c.

43. ONONIS Cherleri.

O. pedunculis unifloris subaristatis, foliis ternatis cuneiformibus apice dentatis villoso-viscosis, calycibus corolla longioribus. W.

O. pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis, stipulis serratis. *Sp. pl.* 1007. *Ger. prov.* 487.

O. foliis ternatis, floribus axitlaribus nutantibus folio brevioribus, calyce villoso corolla longiore. *Desf. atl.* 2. p. 148.*

Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis, stipulis longas setas exferentibus. Sauv. monsp. 189.

Anonis pusilla villosa et viscosa, purpurascente flore. Tournef. inst. 408.

Anonis trifoliis affinis minima hirsuta Cherleri. Bauh. hist. 2. p. 394.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 520.

Cherlerische Hauhechel. W.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia, Barbaria.

○ (v. f.)

Affinis O. minutissimae, sed Folia subtus villoso-viscida, nec glabra. Stipulae divergentes, serratae, apice lanceolatae, nec vaginantes, integerrimae s. setaceae. Calyces pubescentes, longitudine corollae; nec glabri, corolla longiores.

44. ONONIS *viscosa*.

- O. pedunculis unifloris aristatis longitudine foliorum, foliis simplicibus oblongis serratis viscosis, infimis ternatis. W.
 O. pedunculis unifloris aristatis, foliis simplicibus: infimis ternatis. Sp. pl. 1009. Mill. dict. n. 7. Ger. prov. 486.
 O. pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis simplicibusque. Sauv. monsp. 189?
Anonis lutea viscosa latifolia minor, flore pallido. Barr. rar. 840. t. 1239.
Anonis viscosa, spinis carens lutea. Magn. monsp. 21?
β. Anonis annua erectior latifolia glutinosa lulitanica. Tournef. insl. 409.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 520.
 Drülige Hanhechel. W.
Habitat Monspelii, et in Hispania. ⊙ (v. f.)
 Varietes β major et Calyces corolla longiores.

*45. ONONIS *biflora*.

- O. pedunculis bifloris aristatis petiolo longioribus, foliolis ternatis oblongis, leguminibus inflatis cernuis. W.
 O. foliis ternatis, foliolis oblongis serratis pubescentibus, pedunculis bifloris nutantibus aristatis petiolo longioribus. Desf. atl. 2. p. 143.
 Zwillingsblüige Hanhechel. W.
Habitat in Barbaria.
 Planta pubescens ramosa. Folia ternata magnitudo ne O. Natricis, foliolis obverse ovato-oblongis truncatis serratis. Stipulae magnae acutae utrinque in petiolum deurrentes. Flore axillares pedicellati. Pedicelli aristati biflori petiolo longiores. Corolla lutea lineolis longitudinalibus picta, magnitudine O. arvensis. Calyx profunde quinquepartitus, laciniis fere setiformibus villosis. Legumen inflatum nutans pubescens. Desf. I. c.

46. ONONIS *ornithopodioides*.

- O. pedunculis bifloris aristatis petiolo brevioribus, foliis ternatis oblongis, leguminibus linearibus cernuis. W.
 O. pedunculis bifloris aristatis, leguminibus linearibus

cernuis. *Sp. pl. 1009. Roy. lugdb. 376. Mill. dict. n. 10. Cav. ic. 2. p. 74. t. 92.**
Anonis siliquis ornithopodii. Boerh. lugdb. 2. p. 34.
Foenum graeum siculum, siliquis ornithopodii. Tournef. inst. 409.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 521.
Vogelfußartige Hauhechel. W.
Habitat in Sicilia ad Capa paffaro, inque regno Valentino. ☽ (v. f.)
Caulis erectus, flexuosus: Ramis alternis, brevibus.
Folia petiolis oblongis, viscosa: foliolis obovatis serratis: intermedio duplo majore. Stipulae semicordatae. Pedunculi petiolo longiores. Legumina linearia, compressa, toruosa, cernua. Calycis foliola filiformia.

*47. ONONIS ramosissima.

O. pedunculis unifloris aristatis folio duplo longioribus, foliis ternatis linearis-ovatis, stipulis oblongis, caule ramosissimo. W.
O. (*ramosissima*) pubescens, foliis ternis linearis-ovatis, pedicellis aristatis folio longioribus persistentibus, floribus cernuis. Desf. atl. 2. p. 142. t. 186*
Anonis non spinosa flore luteo variegato, angustifolia maritima. Tournef. inst. 409.

Vielästige Haukechel. W.

Habitat in maritimis arenosis Barbariae. 4

Tota planta pubescens et viscosa. Caulis erectus.
Corolla lutea duplo minor quam in O. Natrice. Vexillum venulis purpurascens longitudinaliter pictum.
Legumen tenue lineare pendulum inflatum pubescens acuminatum calyce triplo longius polyspermum. Desf. l. c.

*48. ONONIS picta.

O. pedunculis multifloris aristatis folio longioribus, foliis ternatis oblongis, stipulis ovato-lanceolatis. W.
O. (*picta*) villoso-viscosa, foliolis ternis oblongis, pedicellis aristatis folio longioribus, leguminibus villosis exsertis, calycibus corollam subaequantibus. Desf. atl. 2. p. 144. t. 187.*

Bunte Hauhechel. W.

Habitat in arvis Barbariae prope Mascar.

Planta tota villosa et viscosa. Caulis erectus ramosus. Calyx corolla vix brevior. Corolla lutea. Vexillum venis purpurascens eleganter pictum. Legumen nutans exsertum lineare villosum. Affinis O. Natrici, differt: corolla duplo minore calycem vix superante. Desf. l. c.

49. ONONIS pinguis.

O. pedunculis unifloris aristatis folio longioribus, aristis longitudine corollae, foliis ternatis lanceolatis apice ferratis, stipulis lanceolato-subulatis. W.

O. pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis lanceolatis, stipulis integerrimis. Sp. pl. 1009.

Anonis non spinosa, flore luteo variegato. Bauh. pin. 389.

Anonis lutea non spinosa, Natrix Plinii. Dalech. hist. 449.

β Anonis lutea mitis oxytriphylla ad foliorum petiolos capitulo preolata. Pluk. alm. 33. t. 135. f. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 521.

Fette Hanhechel. W.

Habitat in Europa australi. ḥ (v. s.)

Simillima O. Natrici, sed Caulis succosior, magis angulatus; Folia majora, lanceoto-oblonga; Aristae peduncularum longitudine floris, quam in sequenti breviores. Varietas O. Natricis secundum Gerard.

*50. ONONIS -cuspidata. †

O. pedunculis unifloris aristatis, aristis superne latioribus, foliis ternatis summis simplicibus oblongis, stipulis ovato-lanceolatis ferrulatis. W.

O. (*-cuspidata*) villosa, foliis inferioribus ternatis, summis simplicibus, foliolis oblongis ferratis, pedicellis unifloris, aristis superne latioribus. Desf. atl. 2. p. 144.*

Zugespitzte Hauhechel. W.

Habitat in arvis Algeriae.

Affinis O. Natrici, differt: foliis non viscosis, aristis superne latioribus, villis longioribus, corolla duplo ferme minore. Desf. l. c.

51. ONONIS Natrix.

O. pedunculis unifloris aristatis folio longioribus, foliis

- ternatis viscosis oblongis apice dentatis obtusis, stipulis oblongo-lanceolatis, caule suffruticoso.* W.
O. pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis viscosis, stipulis integrerrimis, caule fruicoso. Hort. cliff. 358.
**Roy. lugdb. 375. Sauv. monsp. 189. Mill. dict. n. 6. ic. t. 33.*
- Anonis viscosa, foliis petiolatis ternatis, petiolis unifloris.* Hall. helv. n. 358.
- Anonis Natrix.* Scop. carn. n. 878.
- Anonis viscosa spinis carens lutea major.* Bauh. pin. 389.
- Ononis lutea.* Cam. epit. 445.
- Natrix.* Riv. tetr. 68. Lob. ic. 2. p. 28.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 523.*
- Gelbe Hauhechel. W.
- Habitat in G. Narbonensi, Hispania, inter segetes.* 24
 (v. v.)
- Planta graveolens, odore theriacae, parum viscosa.*
Folia ovalia, planiuscula, apice tantum ferrata, non carnosa. Pedunculus aristae longitudine. Calyces viscidii.

52. ONONIS hispanica. †

- O. pedunculis aristatis subunifloris, foliis omnibus ternatis canaliculatis recurvatis totaliter serratis.* Lin. suppl. 324.

Anonis non spinosa villosa et viscosa hispanica. Barr. ic. 775.

Spanische Hauhechel. W.

Habitat in Hispania. †

Planta suffruticosa stricta viscosa inodora. Folia omnia ternata, secundum totam longitudinem ferrata erasiuscula recurva, O. Natrixis minora, sed crassiora. Stipulae patentes recurvatae. Pedunculi laterales, aristae longitidine petioli, uni-f. biflori. Flores similes O. Natrixis lutei rubro-striati. An O. crispae varietas?

† † † † *Fruticofae.*

53. ONONIS tridentata.

- O. fruticosa, foliis ternatis carnosis sublinearibus tridentatis, pedunculis bifloris.* Sp. pl. 1009. Mill. dict. n. 4. Cav. ic. 2. p. 41. 152.*

Anonis hispanica frutescens, folio tridentato carnoso.
Tournef. inst. 404. Magn. hort. 16. t. 16. Raj. suppl. 466.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 523.

Dreyzähnige Hauhechel. W.

Habitat in Hispania. ♂ (v. f.)

Caulis erectus, paniculatus. Stipulae subulatae, minutae. Foliola linearia, cariosa, subcanaliculata, apice tridentata, ad latera denticulis obsoletis. Racemus terminalis, parvus hispido-glutinosus: pedunculis bifloris. Flos purpureus.

* 54. *ONONIS strigosa.*

O. foliis ternatis subtus villosis, foliolis ovatis obtusis, umbellis terminalibus, caule decumbente frutescente.
Thunb. prod. 130.

Strieglichte Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 55. *ONONIS stipulata.*

O. foliis ternatis villosis, floribus spicatis, caule frutescente.
Thunb. prod. 129.

Beblätterte Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 56. *ONONIS juncea.* †

O. fruticosa, foliis ternatis subrotundis ferrulatis, superioribus simplicibus, stipulis ventricosis, floribus sessilibus spicatis. W.

O. (juncea) fruticosa, stipulis imbricatis ventricosis, floribus spicatis sessilibus, calycibus vexilla aequantibus.

*Affo synop. 96. t. 5. f. 2.**

Binßenartige Hauhechel. W.

Habitat in aridis Aragoniae. ♂

57. *ONONIS crispa.*

O. fruticosa, foliis ternatis subrotundis undulatis dentatis viscofo-pubescentibus, pedunculis unifloris muticis. Sp. pl. 1010. *Wendland in Roem. Arch. I. 3. p. 106. t. I.**

Anonis hispanica frutescens, folio rotundiore. Magn. monsp. 17. t. 17. Raj. suppl. 466.

β *Anonis hispanica frutescens, folio rosae sylvestris.* Tournéf. inst. 409.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

L

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 523.

Kranse Hauhechel. W.

Habitat in Hispaniae monte Mariola prope Valentiam.

† (v. f.)

Caulis erectus, paniculatus, pubescenti-viscosus.
*Foliola obovata, obtusa, recurvata, canaliculata, pli-
 cata, subdentata, crispa. Stipulae bifidae, amplexi-
 caules, dentatae, uti tota planta piloso-viscidae.*
*Flores laterales, axillares, solitarii, pedunculo bre-
 vissimo. Calyx quinquepartitus: laciniis corolla di-
 midio brevioribus, subaequalibus, tridentatis. Corol-
 la flava, magnitudine foliorum: vexillo extus sanguineo-
 striato, ut in *O. Natrice*, cui simillima, sed cri-
 spa, mogis viscosa et pedunculis muticis, quosque de-
 florata valde recurvat, ut fructus cauli approximetur.*
Magnolius flores spicatos pingit.

*58. ONONIS arborescens.

*O. fruticosa, foliis ternatis obovatis, stipulis ovatis acutis,
 racemo terminali, ramis tuberculatis. W.*

*O. (arborescens) ramis tuberculosis, foliis ternatis obo-
 vatis villosis, floribus racemosis sessilibus, legumi-
 bus calycem aequantibus. Desf: atl. 2. p. 149. t.
 193.**

Baumartige Hauhechel. W.

Habitat in montibus incultis Barbariae prope Arzeau. †
*Similis O. fruticosae, distinguitur facile: foliis pe-
 tiolatis obovatis, stipulis distinctis, floribus subsessi-
 libus. W.*

59. ONONIS fruticosa.

*O. fruticosa, foliis sessilibus ternatis lanceolatis serra-
 tis, stipulis vaginalibus, pedunculis subtrifloris. Ger.
 prov. 486.*

*O. fruticosa, floribus paniculatis, pedunculis subtriflo-
 ris. Hort. cliff. 358.* Roy. lugdb. 376. Mill.
 dict. n. 5.*

*Anonis purpurea frutescens non spinosa. Dodart. mem.
 57. t. 57.*

*Anonis purpurea verna praecox frutescens, flore rubro
 ampio. Moris. hist. 2. p. 170. Mill. dict. t. 36. Du-
 ham. arb. I. t. 58.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 524.

Strauchartige Hauhechel. W.

Habitat in montibus Delphinatus. ḥ (v. v.)

Stipulae vaginantes quadriaristatae, aridae.

*60. ONONIS aragonensis.

O. fruticosa, foliis ternatis subrotundis serratis, racemo terminali nudo, pedunculis geminatis. W.

O. (aragonensis) fruticosa, floribus geminatis bracteatis conjugationibus inferne remotioribus. *Affo synop.*
96. t. 6. f. 2. *

Aragonilche Hauhechel. W.

Habitat in Aragonia. ḥ

Racemi nudi Pedunculi geminati bractea ovata suffulti. Corollae magnae flavae. *Differt ab O. rotundifolia racemo terminali, stipulis ovatis, florum colore. W.*

61. ONONIS rotundifolia.

O. fruticosa, foliis ternatis ovatis dentatis, calycibus triphylo-bracteatis, pedunculis subtrifloris. *Ger. prov.* 488. *Jacq. aust. 5. p. 55. tab. app. 49.*

O. fruticosa, pedunculis trifloris, calycibus triphylo-bracteatis, foliis ternatis subrotundis. *Hort. cliff.* 348.* *Roy. lugdb.* 376. *Mill. dict. n. II.*

Anonis foliis subrotundis serratis, ternatis, petiolis multifloris. *Hall. helv. n. 357.*

Cicer sylvestre latifolium triphyllum. *Bauh. pin.* 347.

Cicer sylvestre tertium. *Dod. pempt.* 525.

Cicer sylvestre verius. *Lob. ic. 2. p. 73.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 525.

Rundblättrige Hauhechel. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Carinthiae. ḥ (v. v.)

Vexillum pubescens. Alae carina breviores. Calyces cincti bracteis 3, cordatis, approximatis, brevioribus. Stipulae virentes.

62. ONONIS microphylla.

O. fruticosa spinosa, foliis minutis integerrimis, leguminibus recurvis. *Lin. suppl.* 324.

O. foliis ternatis scabris, floribus axillaribus, ramis ramulique spinosis. *Thunb. prod.* 129.

Kleinblättrige Hauhechel. W.

Habitat ad Cap. b spei. ḥ

Frutex lignosus ramosissimus patulatus spinosus, spinis validis. Folia petiolata ternata. Foliola oblonga

integerrima obtusiuscula laevia admodum parva. Legumina petiolata linearia recurva torulosa acuta laevia. Semina quinque s. sex.

† † † † † *Dubiae.*

* 63. *ONONIS hirsuta.*

O. foliis simplicibus lanceolatis hirsutis, caule decumbente. Thunb. prod. 129,
Haarige Hauhechel. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

* 64. *ONONIS decumbens.*

O. foliis ternatis pubescentibus, foliolis acutis, floribus solitariis lateralibus, caule decumbente. Thunb. prod. 129.
Liegende Hauhechel. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

* 65. *ONONIS sericea.*

O. foliis ternatis, foliolis oblongis subtus villosis, florum spica secunda triflora. Thunb. prod. 129.
Seidenartige Hauhechel. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

* 66. *ONONIS racemosa.*

O. foliis ternatis subtus pubescentibus, foliolis oblongis, floribus racemosis, caule decumbente. Thunb. prod. 129.
Traubenartige Hauhechel. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

* 67. *ONONIS Lagopus.*

O. foliis ternatis lanceolatis villosis, spica foliosa, caule erecto. Thunb. prod. 129.
Hasenfuß - Hauhechel. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

* 68. *ONONIS quinata.*

O. foliis quinatis, foliolis lanceolatis convolutis, floribus lateralibus, caule decumbente. Thunb. prod. 130.
Fünfblättrige Hauhechel. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

1345. ANTHYLLIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1174.

Cal. ventricosus. Legumen subrotundum, tectum mono - f. trispernum.

* *Herbaceae.*

1. ANTHYLLIS *tetraphylla.*

A. herbacea, foliis quaterno-pinnatis, floribus laterali-bus. *Hort. upf.* 221. * *Sauv. monsp.* 237. *Mill. dict. n. I.*

A. foliis quinato-pinnatis inaequalibus, floribus laterali-bus. *Hort. cliff.* 371. *Roy. lugdb.* 389.

Lotus pentaphyllos velicaria. *Bauh. pin.* 332.

Trifolium halicacabum. *Cam. hort.* 171. t. 47.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 527.

Vierblättrige Wollblume. W.

Habitat in Italia, Sicilia. ☺ (v. v.)

Folium pinnatum tetraphyllum loco pentaphylli, cum foliolum infimum opposito careat. Stamina dia-delpha.

2. ANTHYLLIS *Vulneraria.*

A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo du-plicato. *Sp. pl.* 1012. *Crantz austr.* 370. *Pollich. pal. n.* 671. *Hoffm. germ.* 252. *Roth. germ. I.* 303. *II.* 164.

Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus: terminali majore. *Hort. cliff.* 371. *Fl. suec.* 594; 638. *Roy. lugdb.* 289.

Vulneraria foliis radicalibus ovatis, caulinis pinnatis, um-bellis transversis. *Hall. helv.* n. 398.

Vulneraria Anthyllis. *Scop. caru.* n. 879.

Anthyllis. *Riv. t.* 18.

Loto affinis Vulneraria pratensis. *Bauh. pin.* 332.

Lagopodium flore luteo. *Tabern. ic.* 925.

β. *Vulneraria supina, flore coccineo.* *Dill. elth.* 431. t. 320. f. 413.

Loto affinis hirsuta, flore rubente. *Bauh. pin.* 332.

γ. *Vulneraria rustica, flore albo.* *Touruef. inst.* 291.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 527.

Gemeine Wollblume. W.

Habitat in pratis Europae borealioris. 24 (v. v.)

3. ANTHYLLIS *montana*.

A. herbacea, foliis pinnatis aequalibus, capitulo terminali secundo, floribus obliquatis. *Sp. pl.* 1012. *Mill. dict. n. 4.* *Jacq. aust. t. 334.*

Vulneraria caule procumbente, foliis pinnatis sericeis, ovato-lanceolatis, umbellis globosis. *Hall. helv. n. 397.*

Vulneraria montana. *Scop. carn. n. 880.*

Vulneraria foliis pinnatis aequalibus: sub umbella palmatis. *Sauv. monsp. 237.*

Barba jovis pumila villosa, flore globoſo, purpurea. Br. *Garid. aix. 55. t. 13.* *Quer. flor. hispan. 3. t. 50.*

Astragalus incanus tomentosus, pallido globoſo flore, italicus. *Barr. rar. 1391. t. 722.*

Astragalus villosus, floribus globoſis. *Bauh. pin. 351.*

Astragalus purpureus. *Dalech. hist. 1347.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 529.

Berg-Wollblume. W.

Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Galloprovinciae rupe Victoriae, Austria, in monte Nanas Carnioliae. 24 (v. f.)

Caulis simplices, prostrati. Folia subduodecimjuga: impari vix majore. Capituli folia floralia 2, palmata, ut in A. *Vulneraria.* Corollae saturate purpureae, bracteis non longiores. Flores semiresupinati s. vexillo ad latus, nec sursum, spectante.

* 4. ANTHYLLIS *sericea*. W.

A. herbacea, foliis pinnatis aequalibus sericeis, spica pendunculata ovata. W.

Ebenus (pinnata) foliis pinnatis quadrijugis, spicis axillaribus longissime pedunculatis, *Ait. Kew. 3. p. 27.*

*Desf. Act. Soc. Hist. nat. Paris. 1. p. 21. t. 3.**

Ebenus (pinnata) caule herbaceo, foliis impari-pinnatis sericeis incanis, pedunculis axillaribus longissimis aphyllis, spica ovata villosissima. *Desf. atl. 2. 152.**

Hedysarum (sericeum) foliis pinnatis, leguminibus monospermis rigidis, spicis ovatis pilosissimis, caulibus erectis pilosis. *Vahl symb. 2. p. 83. t. 41.**

Onobrychys orientalis, argentea, fructu echinato minimo.

Tournef. eor. 26. Shaw. itin. n. 431.

Seidenartige Wollblume. W.

Habitat in collibus incultis Barbariae et Orientalis. ♂
(v. f.)

* 5. *ANTHYLLIS polycephala.*

A. herbacea, foliis pinnatis aequalibus villosis, capitulis sessilibus alternis. W.

A. (*polycephala*) villosissima, foliis pinnatis, foliolis aequalibus longe ellipticis, capitulis distinctis sessilibus alternis. Desf. atl. 2. p. 150. t. 195.*

Vielköpfige Wollblume. W.

Habitat in fissuris rupium Atlantis prope Tlemcen. ♀
(v. f.)

6. *ANTHYLLIS cornicina.*

A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo solitario pedunculato, leguminibus hamosis obtusis calyce brevioribus. W.

A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulis solitariis. Sp. pl. 1012. Mill. dict. n. 5. Cav. ic. 1. p. 27. t. 39. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 530.

Krähenfußartige Wollblume. W.

Habitat in Hispania. Loefl. ○ (v. v.)

Caules basi, e radice, decussatim excurrent. Planta albo-pilosa. Flores 7-9, albi, calyce longiores. Calyxces ovati.

* 7. *ANTHYLLIS hamosa.*

A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulis pedunculatis alternis, leguminibus hamosis acuminatis calyce villoso longioribus. W.

A. (*hamosa*) foliis pinnatis, capitulis pedunculatis, leguminibus hamosis calyce hirsutissimo longioribus.

Desf. atl. 2. p. 151.

Hakenfrüchtige Wollblume. W.

Habitat in collibus Estremadurae, inque Barbaria. ○
(v. f.)

8. *ANTHYLLIS lotoides.*

A. herbacea, foliis caulinis ternatis, radicalibus pinnatis inaequalibus, trifidis, simplicibusque. W.

A. herbacea, foliis tripartitis, calycibus prismaticis fasciculatis longitudine leguminum. Sp. pl. 1012. Cav. ic. 1. p. 28. t. 40. *

Lotus pentaphyllos, filiisque curvis pedes corvinos referentibus. Bauh. pin. 332.

Coronopus ex cod. caesareo. Dod. pempt. 109. male.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 530.

Schotenkleeartige Wollblume. W.

Habitat in Hispania. Loefl. ○ (v. f.)

Planta pilosa, procumbens. Folia caulinæ ternata, lateralibus basi coadunatis in unum cuneiforme; intermedio subsessili. Stipulae magnitudine et figura foliorum. Folia floralia ternata, sessilia, absque stipulis. Capitulum ex 5, s. 6 floribus, Calycibus admodum oblongis ratione plantae angustis, prismaticis, parallelis, pilosis. Flores lutei. Legumina cylindrica, longitudine calycis, eoque vestita. Stamen decinum distinctum. Habitus ita antecedentium, ut facies vetet genere distinguere.

Legumina arcuata calyce longiora obtusa. W.

9. ANTHYLLIS Gerardi.

A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis. Mant. 100. Ger. prov. 490. t. 90. +

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 531.

Gerardische Wollblume. W.

Habitat in Galloprovinciae maritimis versus S. Tropes sub pinubus. ○

Canes multi, prostrati, glabri. Folia alternato-pinnata, sublinearia. Stipulae magnitudine foliorum.

*10. ANTHYLLIS onobrychioides.

A. herbacea, foliis pinnatis aequalibus, ramis ternatis, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis, stipulis obsoletis. W.

A. (onobrychioides) caule fruticoso brevi, ramis erectis, foliis pinnatis, pinnis sublinearibus. Cav. ic. 2. p. 40. t. 150. *

Hahnenkopfartige Wollblume. W.

Habitat in montosis Hispaniae. 24 (v. f.)

Valde affinis antecedenti, differt: pinnis fibaequalibus, foliis rameis ternatis, stipulis obsoletis nec foliacis, capitulis paucifloris, corollis majoribus. W.

*II. ANTHYLLIS *incisa*. W.

A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus ternatisque cuneiformibus inciso-deniatis. W.

Barba jovis graeca humillima ciceris folio, flore purpureo violaceo. *Tournef. cor.* 44.

Eingeschnittene Wollblume. W.

Habitat in insulis Archipelagi. (v.f.)

Planta admodum parva altitudine digiti minoris. Caules plures e radice, erecti ramosi levissime pubescentes. Folia pinnata e quinque foliolis composita vel etiam ternata. Foliola cuneiformia bilinearia apice trisida uno alterove dente notata. Stipulae magnitudine foliorum ovatae. Capitulum parvum in apice ramorum folio suffultum. W.

*12. ANTHYLLIS *quinqueflora*. +

A. herbacea, foliis ternatis linearibus, capitulo subquinquefloro. *Lin. suppl.* 325.

Fünfblumige Wollblume. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

Planta spithamea ramosa adscendens. Folia ternata petiolata, foliolis linearibus obtusis pilosis. Pedunculi terminales biplicares. Capitulum floribus quatuor s. quinque subpedicellatis. Bracteae tres lanceolatae longitudine florum. Calyx ventricosus quinquedentatus minor pilosus. Corolla lutea. Stamina diadelpha. Ononis parviflora forte non diversa. W.

* * Fruticosae.

13. ANTHYLLIS *linifolia*.

A. fruticosa, foliis ternatis sessilibus ensiformibus, floribus capitatis. *Mant.* 265.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 232.

Leinblättrige Wollblume. W.

Habitat ad Cap. b. spei rupibus. 5

Caulis 8-pedalis, fruticosus, teres, aequalis: ramulis pubescenti-incanis. Folia ternata, sessilia, remota: Foliola ensiformia s. longo-lanceolata, subaequalia, vix pubescentia, basi angustiora. Stipulae nullae. Capitula terminalia, subgeminata, pedunculata, subrotunda, involucrata Bracteis variis, ternatis, albo-villosis, longitudine florum. Flores lutei. Calyces sessiles, albo-vilosii.

*14. ANTHYLLIS *visciflora*.

A. foliis digitato-pinnatis, calycibus hirsutis. Lin.
suppl. 325.

Klebrige Wollblume. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ᄁ

Caules spithamei fruticosi prostrati. Folia composita petiolata. Folia linearia ovata glabra inaequalia, duo sessilia opposita, tria petiolata inter priora, lateralia ternata, intermedium pinnatum, foliolis quinque. Pedunculi aphylli longitudine foliorum. Capitulum quinque-f. sexflorum. Calyces minores hirsuti viscosi. Corollae luteae calyce duplo longiores.

15. ANTHYLLIS *Barba Jovis*.

A. fruticosa, foliis pinnatis aequalibus sericeo-tomentosis, bracteis capitula globosa multiflora aequantibus. W.

A. fruticosa, foliis pinnatis aequalibus tomentosis, floribus capitatis. Hort. cliff. 371. Hort. upf. 221. Roy. lugdb. 379. Sauv. monsp. 237. Mill. dict. n. 6. ic. t. 41. f. 2. Kniph. cent. II. n. 7.

Barba jovis. Bauh. pin. 397.

Barba jovis lentifolia incana flore luteo. Barr. ic. 378.

Barba jovis pulchre lucens. Bauh. hist. I. p. 385.

Honttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 232.

Silberblättrige Wollblume. W.

Habitat in Italiae, Hispaniae, Orientis rupibus. ᄁ
(v. v.)

*16. ANTHYLLIS *splendens*. W.

A. fruticosa, foliis pinnatis aequalibus sericeo-tomentosis, bractea capitulis dimidiatis paucifloris longiore. W.

Glanzende Wollblume. W.

Habitat in Creta. ᄁ (v. f.)

Folia A. Barbae jovis. Capitulum breve pedunculatum dimidiatum e quinque vel decem floribus compostum, Bractea ternata vel pinnata capitulo longiore suffultum. Calyces ovati pedunculati sericei nec villosi. Similis praecedenti, sed infloresceritia abunde differt. W.

17. ANTHYLLIS *cretica*.

A. fruticosa, foliis pinnatis aequalibus ternatisque villo-
sis, floribus spicatis. W.

A. (cretica) fruticosa, foliis pinnato-quinatis tomen-
tosis, floribus dense spicatis. Lamarck encycl. I.
p. 203.

Ebenus (*cretica*) foliis quinatis. Mant. 451. Alp.
exot. 279. t. 228. Pon. ital. 128.

A. fruticosa, foliis ternatis ac quinatis lanceolatis to-
mentosis. Sauv. meth. 237.

Trifolium spicis ovatis villosis, caule fruticoso. Roy.
lugdb. 380.

Barba jovis cytisi folio, flore rubello. Barr. rar. 1389.
t. 377. et. 913.

Loto affinis alata, folio et facie pentaphylloidis fruticosi,
floribus in spicam longiorem positis. Pluk. alm. 227.
t. 67. f. 5.

Cytisus incanus creticus. Bauh. pin. 390.

Cytisi genus missum. Bauh. hist. I. p. 374.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 236.

Cretische Wollblume. W.

Habitat in Creta. ḥ (v. f.)

Folia ternata s. pinnato-quinata lanceolata. Bracteae
ovatae acutae scariorae. Calyces sessiles dentibus se-
taceis villosis longitudine florum.

18. ANTHYLLIS *heterophylla*.

A. fruticosa, foliis pinnatis: floralibus ternatis. Sp. pl.
1013. Mill. dict. n. 10.

Barba jovis minor lusitanica, flore minimo variegato.
Tournef. infi. 651.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 233.

Verschiedenblättrige Wollblume. W.

Habitat in Lusitania, Hispania. Alstroemer. ḥ

Suffrutex procumbens, teres, *incanus*, subpubescens,
Folia pinnata, octojuga cum impari, lanceolata, acu-
ta, sericea: Floralia sessilia, ternata, remota, lanceo-
lata. obtusiuscula. Pedunculi breves, apice termi-
nati foliolis tribus floribusque saepius 2, sessilibus,
minutis.

19. ANTHYLLIS *cytisoides*.

- A. fruticosa, foliis ternatis inaequalibus, calycibus lateralis lateralibus. *Sp. pl.* 1013. *Gouan. hort.* 362. *illust. 47.* *Mill. dict. n. 7.*
- A. fruticosa, foliis ternatis: intermedio productiore. *Hort. upf.* 221.
- Cytisus* foliis ovatis acutis nitidis, floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 370.
- Cytisus incanus*, folio medio longiore. *Bauh. pin.* 390. *Cytisns VI.* *Cluf. hist.* 1. p. 96.
- Spartium latifolium*, parvo flore. *Barr. ic.* 1182. *Barba jovis incana hispanica.* *Tournef. inst.* 651. R. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 234. *Bohnenbaumartige Wollblume.* W.
- Habitat in Hispania, Monspelii.* ḥ (v. f.)
- Folia summa simplicia, sessilia, e quorum alis Pedunculi solitarii, triflori: Bractea ovata, terminali. Stamina omnia connata.*

20. ANTHYLLIS *Hermanniae*.

- A. fruticosa, foliis ternatis linearis cuneatis subpetiolatis, calycibus campanulatis, ramis spinescentibus. *Vahl symb.* 3. p. 88.
- A. fruticosa, foliis ternatis subpedunculatis, calycibus nudis. *Sp. pl.* 1014. *Mill. dict. n. 9.*
- Aspalathus (cretica)* foliis trinis cuneiformibus glabris, lateralibus brevioribus, stipulis obsoletis, floribus congestis. *Sp. pl.* 1002.
- Dorycnium* foliis solitariis, floribus ad alas confertis. *Hort. cliff.* 370. * *Barba jovis cretica, linariae folio, flore luteo parvo.* *Tournef. cor.* 44.
- Barba jovis cretica.* *Riv. tetr.*
- Genista arborea cretica*, foliis sempervirentibus. *Zann. hist.* 99. t. 39.
- Spartium spinosum.* *Alp. exot.* 27. t. 26.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 234. *Flachsblättrige Wollblume.* W.
- Habitat in Graecia, Creta, Palaestina.* ḥ (v. f.)
- Calyces in hac vix ventricosi, at Habitus cum praecedenti idem. Flores 4, pedunculis propriis brevissimis. Rami in spinam desinentes.*

21. ANTHYLLIS *Erinacea*.

A. fructicosa spinosa, foliis simplicibus. Sp. pl. 1014.
Mill. dict. n. 8. And. repos. 1. p. 15. t. 15. Desf.
atl. 2. p. 152.*

Genista spartum spinosum, foliis lenticulae, floribus ex
coeruleo purpurascens. Banh. pin. 394.

Erinacea. Clus. hist. 1. p. 107. hisp. 213. t. 214.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 235.

Vieldornige Wollblume. W.

Habitat in Hispania, Barbaria. ♂ (v. f.)

Tota confiat spinis; ad ramorum exortum squama
ovata: Folia oblongo-ovata, tomentosa, ad flores po-
sita saepius terna.

1346. A R A C H I S.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1177.

Cal. 2 - labiatus. Cor. supinata. Filamenta con-
nexa. Legum. gibbum, torulosum, veno-
sum, coriaceum.

1. ARACHIS *hypogaea*.

Arachis. Hort. cliff. 353. Hort. upf. 228. Roy. lugdb.
390. Mill. dict.

Archidna quadrifolia villosa flore luteo. Plum. gen. 49.
Ehret. pict. t. 3. f. 3.

Senna tetraphylla f. Absi congener hirsuta maderaspas-
tentis, folliculos sub terra condens. Pluk. alm. 341.
t. 60. f. 2.

Chamaebalanus japonica. Rumph. amb. 4. p. 426. t. 156.

Mundubi. Marcgr. bras. 37.

β Arachidnoides americana. Niss. act. 1723. p. 387. t. 19.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 561.

Unterirdische Erdeichel. W.

Habitat Surinami in Bratilia, Peru. ⊙ (v. v.)

Flores monoici.

Clarif. Loureiro in Flora cochinchinensis p. 522. binas
hujus generis species distinxit, nempe asiaticam, quae
stipulis bifidis, atque africanam, quae stipulis indivisis
est distincta. Sed in specimine asiatico et americano
stipulas vidi indivisas. Asiatica est valde hirsuta,
americana fere glabra. W.

1347. LUPINUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1176.

Cal. 2-labiatus. Antherae 5 oblongae; 5 subrotundae. Legum. coriaceum torulosum compressum.

+ *Herbacei foliis digitatis.*

1. LUPINUS perennis.

L. calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore emarginato; inferiore integro. Sp. pl. 1014. Mill. dict. n. 6. et t. 170. f. 1. Kalm. it. 3. p. 96. Gron. virg. 104. Walt. carol. 180.

L. calycibus alternis, radice perenni repente. Gron. virg. I. p. 172.

L. radice reptatrice perenni. Roy. lugdb. 531.

L. coeruleus minor perennis virginianus repens. Moris. hist. 2. p. 87. f. 2. t. 7. f. 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 533.

Ausdauernde Feigbohne. W.

Habitat in Canada, Virginia, Carolina. 24 (v. f.)

Folia ex foliolis 8, lanceolatis, obtusis, glabris. Racemi longissimi floribus alternis, saepe 2 ex singulo alterno puncto, pedicellis propriis insidentibus. Flores coerulei.

Foliola 10 f. 11. angusta lanceolata. Stipulae setaceae. Flores semiverticillati. W.

2. LUPINUS albus.

L. calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore integro; inferiore tridentato. Hort. cliff. 499. Hort. upf. 209. Mat. med. 171. Roy. lugdb. 366. Mill. dict. n. 5. Ludw. ect. t. 191. Blackw. t. 282. Kniph. cent. 4. n. 43. Regn. bot.

L. caule composito. Hort. cliff. 359.

L. sativus, flore albo. Bauh. pin. 347. Clus. hist. 2. p. 228.

L. flore albo. Riv. tetr.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 534.

Weisse Feigbohne. W.

Habitat in Oriente. 2 (v. v.)

Flores albi. Semina compressa, orbiculata.

3. LUPINUS *Termis.*

L. calycibus alternis appendiculatis, labio superiore integro, inferiore subtridentato. W.

L. (*Termis*) calycibus alternis appendiculatis, labio utroque integro acuto. *Forst. descr.* 131 *

L. (*prolifer*) calycibus alternis appendiculatis, labio superiore integro, inferiore subtridentato. *Lamarck encycl.* 3. p. 595.

Aegyptische Feigbohne. W.

Habitat in Aegypto. ☽ (v. v.)

Calyces appendiculati Labium superius integrum, interdum obsolete bidendatum; inferius videtur primo intuitu integrum, sed est re vera tridentatum. Corolla alba. vexillo apice coerulescente. Similis L. albo, dignoscitur tamen facile: ramo alari breviori, ramis longioribus, calyce appendiculato, et florum colore. W.

4. LUPINUS *varius.*

L. calycibus semiverticillatis appendiculatis: labio superiore bifido; inferiore subtridentato. *Hort. cliff.* 499.

Hort. upf. 367. *Mill. dict.* n. 1. *Willich. in Nov. Act. A. N. C. IV.* p. 115. *Kniph. cent.* 7. n. 47.

L. (*semiverticillatus*) calycibus semiverticillatis appendiculatis, supra bifidis, infra vix tridentatis. *Lamarck encycl.* 3. p. 596. *

L. sylvestris, flore coerulo. *Bauh. pin.* 348.

L. sylvestris, flore purpureo, semine rotundo vario. *Bauh. hist.* 2. p. 291.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 535.

Bunte Feigbohne. W.

Habitat Messanae, Monspelii inter segetes. ☽ (v. v.)

Flores rubri. Foliola linearia.

5. LUPINUS *hirsutus.*

L. calycibus alternis appendiculatis: labio superiore bipartito; inferiore tridentato. *Hort. cliff.* 499. *Hort. upf.* 209. *Mill. dict.* n. 4.

L. lanuginosus latifolius humilis, flore coeruleo purpurascente, stoloniferus. *Shaw. ofr.* 393.

L. peregrinus major f. villosus coeruleus major. *Bauh. pin.* 348. *prod.* 148.

L. exoticus hirsutissimus. *Bauh. hist.* 2. p. 289.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 536.

Rauhe Feigbohne. W.

*Habitat in Arabia, Archipelagi insulis, Hispania. ⊖
(v. v.)*

*Sylvestris foliis quinatis, longe petiolatis. Foliola
spatulata. Flores coerulei. Legumina, uti tota plan-
ta, vestita pilis ferrugineis densis, longis. Flores huic
saepe laterales.*

*6. LUPINUS bracteolaris.

*L. calycibus alternis appendiculatis, supra bipartitis, in-
fra trifidis, stipulis ovato-lanceolatis. Lamarck en-
cycl. 3, p. 595.*

Beblätterte Feigbohne. W.

Habitat in Monte video Brasiliae.

*Tota planta pilis ferrugineis densis tecta. Radix
dura fusiformis. Caules plures teretes ramosi diffusi
sex vel octo-pollicares. Folia alterna parva e quinque
foliolis composita. Foliola ovato-oblonga obtusiuscu-
la utrinque pilosa 8 f. 9 lineas longa, 2 f. 3 lineas la-
ta, sessilia. Petioli longitudine foliorum. Stipulae
ovato-lanceolatae latiores quam in reliquis. Flores
brevissime pedunculati alterni in racemo terminali.
Bracteae ovato-lanceolatae persistentes calyce longio-
res. Calyx villosus, labio superiore bifido, inferiore
trifido, lacinia intermedia longiore. Legumen com-
pressum villosum pollicare vel sesquipolllicare septem-
vel octospermum. Lamarck. l. c.*

7. LUPINUS pilosus.

*L. calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore
bipartito, inferiore integro. Syst. Veg. 545.*

L. peregrinus major, flore vario. Herm. lugdb. 386.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 536.

Haarige Feigbohne. W.

Habitat in Europa australi. ⊖ (v. v.)

Statura *L. hirsuti*. Planta pilosa. Corollae incar-
nato-albidae, vexilli medio rubro. Folia lanceolata,
obtusiuscula.

8. LUPINUS angustifoliis.

*L. calycibus alternis appendiculatis, labio superiore bifido,
inferiore integro, foliolis linear-lanceolatis pla-
nis. W.*

L. calycibus alternis appendiculatis : labio superiore bipartito : inferiore integro. *Mill. dict. n. 2.* *Kniph. cent. 4. n. 46.* *Knorr. del. 2. t. L. 7.*

L. foliolis septem lanceolatis planisculis, calycis labio inferiore integro, seminibus ovalibus. *Roth. Abhand. p. 15.**

L. angustifolius coeruleus elatior. *Raj. hist. 908.*

L. flore coeruleo minore. *Riv. tetr.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 437.

Schmalblättrige Feigbohne. W.

Habitat in Hispania, Mellanae inter segetes ⊙ (v. v.)
Foliola linearia. Flores coerulei.

*9. LUPINUS linifolius.

L. calycibus alternis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore subtrifido, foliolis linearibus canaliculatis. W.

L. (*linifolius*) foliolis novenis lineari-lanceolatis canaliculatis, calycis labio inferiore bifido, seminibus rotundis. *Roth. Abh. p. 14. t. 5.**

Flachsblättrige Feigbohne. W.

Habitat — — — — ⊙ (v. v.)

Calycis labium superius bifidum, inferius bi- vel trifidum. Corollae minor quam in praecedente. W.

10. LUPINUS luteus.

L. calycibus verticillatis appendiculatis: labio superiore bipartito, inferiore tridentato. *Hort. cliff. 499.* *Hort. upf. 209.* *Roy. lugdb. 367.* *Sauv. mons. 215.* *Mill. dict. n. 3.* *Kniph. cent. 4. n. 47.*

L. sylvestris, flore luteo. *Bauh. nin. 348.* *Riv. tetr.*

L. flore luteo, semine compresso vario. *Bauh. hist. 2. p. 291.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 537.

Gelbe Feigbohne. W.

Habitat in Siciliae arenosis. ⊙ (v. v.)

Huic flores lutei: subeffiles, odorati, bracteis ovatis.

† † *Fruticosi foliis digitatis.*

*11. LUPINUS multiflorus.

L. fruticosus, foliolis lanceolatis, calycibus alternis ap-
Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. M

pendiculatis, labio superiore bifido, inferiore tridentato. W.

L. tomentosus, foliolis septenis lanceolatis acutis, calycibus appendiculatis sparsis, spica longissima. Lamarch encycl. 3. p. 597.*

Vielblumige Feigbohne. W.

Habitat in Monte Video Brasiliæ. 3.

Caulis erectus teres substriatus ramosus, ut tota planta pilis adpressoſe sericeis teclus. Folia alterna longe petiolata. Foliola plerumque septem lanceolata acuta sericea molia bipolligaria et ultra, 3 f. 4 lineas lata. Petioli bi- vel tripolligares basi parum dilatati fere amplexicaules. Stipulae breves setaceae. Flores pulchri subſeffiles sparsi, in racemo longo terminali, numerosiores quam in reliquis speciebus. Racemi ante florum explicationem pyramidales. Bracteae parvae ovatae acutae caducae. Calycis labium superius bifidum, inferius tridentatum dentibus aequalibus. Corolla calyce duplo longior. Vexillum et carina externe flavescentes. Alae carina longiores coeruleae. Antherae eroceae. Lam. l. c.

*12. LUPINUS linearis.

L. foliolis linearibus, calycibus alternis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore tridentato, dentibus inaequalibus. W.

L. foliolis linearibus angustissimis, floribus alternis laxe spicatis, calycis labio inferiore tridentato. Lam. encycl. 3. p. 598.*

Linienblättrige Feigbohne. W.

Habitat in Monte Vedo - Brasiliæ.

Caulis videtur herbaceus erectus teres valde ramosus divaricatus subtomentosus. Folia alterna petiolata. Foliola 8 vel 11, linearia acuta lineam lata, canaliculata sesqui vel bipolligaria superne glabra inferne pilis adpressoſe tecta. Petioli bipolligares et ultra. Flores azurei parvi alterni in racemo terminali vix foliis longiore. Calycis labium superius bifidum, inferius tridentatum, dente intermedio reliquis multo longiore. Corolla longitudine calycis, vexillo externe flavescente. Legumen sesquiunciale sericeo-villosum. Lam. l. c.

*13. LUPINUS *microphyllus*.

L. suffruticosus, foliolis linearibus, calycibus subcapitatis inappendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore integro. W.

L. suffruticosus, foliolis minimis, calycibus inappendiculatis, supra bipartitis infra integris. Lamarck encycl. 3. p. 696.*

Kleinblättrige Feigbohne. W.

Habitat in Peru. ৎ

Caules teretes lignosi valde ramosi diffusi basi glabri et aphylli superne pubescentes foliosi. Folia omnium specierum Lupini minutissima, numerosa alterna petiolata. Foliola 6 vel 9 canaliculata binas vel tres lineas longa et quadrante lineae lata, pilis tenuibus sericeis adpresso tecta. Petiolus semipollucaris basi dilatatus subamplexicaulis. Stipulae setaceae. Flores coeruleoscentes in apice ramorum subcapitati vel brevissime spicati. Bractea lanceolata calyce brevior ad basin cuiusque pedunculi. Calyx villosus bilabiatus, labium superius profunde bipartitum, inferius indistinctum. Legumen ovatum acuminatum pubescens semipollucare. Lam. l. c.

*14. LUPINUS *paniculatus*.

L. fruticosus, foliolis lanceolatis, calycibus alternis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore integro. W.

L. foliolis superne glabris, calycibus alternis appendiculatis, supra bifidis, infra integris. Lamarck encycl. 3. p. 598.*

Rispenförmige Feigbohne. W.

Habitat in Peru. ৎ

Caulis teres ramosus paniculatus erectus pubescens basi frutescens. Folia alterna petiolata. Foliola 6 vel 7 lanceolata apice parum latiora obtusiflora mucronata, superne glabra inferne pilis sericeis adpresso tecta. Petiolus pollucaris. Stipulae linearis setaceae. Racemus terminalis elongatus. Bracteae lanceolatae calyce breviores caducae. Lamarck l. c.

*15. LUPINUS *farmentosus*.

L. fruticosus scandens, foliolis lanceolatis, calycibus verticillatis inappendiculatis, labio superiore bifido, inferiore integro. W.

L. fruticosus farmentosus, calycibus inappendiculatis supra bipartitis, infra integris, spica brevi. Lamarck encycl. 3. p. 597. *

Kletternde Feigbohne. W.

Habitat in Peru. h

Caulis lignosus teres tenuis debilis scandens fere volubilis ramosus foliosus apicem versus pubescens, pedalis. Folia alterna petiolata. Foliola 7 seu 9 lanceolata acuta, apice parum latiora, superne glabra, inferne pilis sericeis adpressis tecta, semipollicaria. Petiolus canaliculatus pubescens, fere uncialis. Stipulae lanceolatae basi decurrentes dilatatae subamplexicaules. Flores e rubro et coeruleo videntur variegati. Racemos brevis ovatus 8-seu 12-florus verticillatus. Pedunculi 3 vel 4 in quolibet verticillo. Bracteae lanceolatae sericeae calyce parvum longiores. Calyces sericei, labium superius ad basin usque bipartitum, inferius integrum. Corolla calyce duplo longior, vexillo reliquis petalis breviore. Legumen fere pollicare villosum lanceolatum compressum mucronatum. Lam. l. c.

* 16. LUPINUS bimaculatus +

L. fruticosus farmentosus incanus, verticillis trifloris spicatis, vexillo basi bicalloso. Lamarck encycl. 3. p. 597.

Zweyfleckige Feigbohne. W.

Habitat in Peru. h

Caulis gracilis albidus foliosus parum ramosus tripedalis debilis et fere scandens. Folia parva digitata albida. Flores in racemo terminali. Corolla violaceo-coerulea. Vexillum reflexum carina parum longius basi maculis binis callosis flavis notatum. Alae carinae, quae dipetala videntur, adpressoae. Bracteae parvae. Flores minores quam in L. vario 9 vel 10 in racemo, quorum 3 semper in verticillo sunt positi et pedunculo 4 lineas longo suffulti. Lamarck l. c.

* 17. LUPINUS alopecuroides. +

L. foliolis ovato-lanceolatis, calycibus appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore integro, bracteis corolla duplo longioribus. W.

L. floribus densissime spicatis, bracteis corolla duplo longioribus. Lamarck encycl. 3. p. 597.*

Fuchsschwanzartige Feigbohne. W.

Habitat in Peru.

Folia ampla. Foliola 10 f. 12 ovato-lanceolata. Racemus longus densus conicus valde crassus. Bracteæ lineares acutæ villosæ corolla duplo longiores. Calycis labium superius profunde bipartitum inferius indivisum. Corolla videtur e rubro et violaceo variegata.
Lam. l. c.

† † † *Herbacei, foliis simplicibus.*

* 18. **LUPINUS villosus.** W.

L. calycibus semiverticillatis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore indiviso, foliis simplicibus oblongis villosis. W.

L. (pilosus) calycibus alternis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore integro acuto longo, foliis simplicibus argenteo villosis, stipulis lanceolatis a petiolo enatis. Walt. carol. 180.

Zottige Feigbohne. W.

Habitat in Carolina et in insula Trinitatis. (v. f.)

Caulis semipedalis valde villosus. Folia oblonga basi angustata acutiuscula 3-f. 4-pollicaria utrinque valde villosa. Petioli triunciales. Stipulae linearifubulatae valde villosae. Racemus terminalis canule longior multiflorus. Calyces semiverticillati villosissimi. Corollæ rubicundæ. Vexillum interne apicem versus macula violacea notatum. Certe diversus a sequente. W.

19. **LUPINUS integrifolius.**

L. calycibus alternis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore indiviso, foliis simplicibus oblongis villosis. W.

L. calycibus alternis appendiculatis, foliis simplicibus oblongis villosis. Amoen. acad. 6. afr. 43.

L. foliis simplicibus oblongis sericeis. Thunb. prod. 130.
Einfachblättrige Feigbohne. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ☽

Caulis herbaceus villosus. Folia alterna petiolata lanceolato-ovata f. ovali-oblonga integerrima acuta, utrinque valde villosa. Racemi simplices erecti uti Calyces villosi. Calycis labium superius bifidum; inferius integrum. Corollæ coeruleæ. Amoen. acad.

1348. PHASEOLUS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1180.**Carina cum staminibus styloque spiraliter tortis.**+ scandentes.*

I. PHASEOLUS vulgaris.

P. caule volubili, racemo solitario folijs breviore, pedunculis geminatis, bracteis calyce minoribus patentibus, leguminibus pendulis. W.

P. caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. Sp. pl. 1016. Mat. med. 171. Mill: dict. n. 5. Retz obs. 3. p. 38.

P. caule volubili, floribus racemosis, bracteis calycinis patentibus. Lamarck encycl. 3. p. 68.

P. radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis compressis torosis. Roy. lugdb. 367. Hort. upf. 213.

P. major f. Smilax hortensis. Morif. hist. 2. p. 68. f. 2. t. 5. f. 1.

Dolichos f. Phaseolus. Dod. pempt. 519.

P. vulgaris. Lob. ic. 59. Hort. cliff. 359.

Smilax hortensis f. Phaseolus major. Bauh. pin. 339.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 538.

Schneide. Böhne. W.

Habitat in India orientali. ⊙ (v. v.)

*2. PHASEOLUS multiflorus.

P. caule volubili, racemo solitario longitudine foliorum, pedunculis geminatis, bracteis calyce minoribus adpressis, leguminibus pendulis. W.

P. caule volubili, floribus racemosis, bracteis calycinis adpressis. Lamarck encycl. 3. p. 67. *

Phaseolus vulgaris β coccineus. Sp. pl. 1016.

P. (coccineus) volubilis, floribus racemosis geminis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis. Kniph. cent. 12. n. 75.

P. puniceo flore. Cornut. canad. 184.

P. indicus flore coccineo f. puniceo. Morif. hist. 2. p. 69. f. 2. t. 5. f. 4.

P. flore coccineo. Raj. hist. 884.

β . Floribus seminibusque albis. Lamark l. c.

Vielblumige Bohne. W.

Habitat in America calidiore? (v. v.)

*3. PHASEOLUS perennis.

P. caule volubili, racemis geminatis folio longioribus, pedunculis geminatis, bracteis obsoletis, leguminibus pendulis. W.

P. (*perennis*) caule volubili, radice perenni, floribus racemosis geminis, pedunculis longitudine florum, bracteis minimis, leguminibus pendulis, corollis purpureo-rubris. Walt. carol. 182.

Ausdaurende Bohne. W.

Habitat in Carolina. 24 (v. f.)

Cauis pubescens. Folia P. vulgaris tenuiora acuminate subtus pubescentia. Racemi foliis longiores axillares geminati. Pedunculi filiformes geminati longitudo florum. Bractea lanceolata acuta solitaria ad geminos pedunculos, quibus duplo brevior. Bracteae binae admodum parvae ad basin calycis. An Dolichos polystachyos eadem planta? W.

*4. PHASEOLUS lunatus.

P. caule volubili, leguminibus acinaciformibus sublunatis laevibus. Sp. pl. 1016.

P. benghalensis scandens, siliquae acinaciformi, semine ovato compresso striato. Berg. viadr. 99.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 541. t. 63. f. 1.

Mondförmige Bohne. W.

Habitat in Bengala. ♂ (v. f.)

Foliola lateralia exteriori latere duplo latiora. Flores minimi, virides; alis albis concavis, dein flavescens; carina spirali.

*5. PHASEOLUS Pallar. †

P. caule volubili, leguminibus pendulis cylindricis torulosis. Molin. chil. ed. germ. 108.

Pallari-Bohne. W.

Habitat in Chili.

6. PHASEOLUS inamoenus.

P. caule volubili, florum vexillo revoluto, calycibus concolore. Hort. cliff. 359.* Jacq. hort. t. 66.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 541.

Schlechte Bohne. W.

Habitat in Africa. ○

- *Folia longiora: intermedio ovato-lanceolato.*

7. PHASEOLUS farinosus.

P. caule volubili, pedunculis subcapitatis, seminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Hort. upf. 214.*
Mill. dict. n. 4.

P. peregrinus, flore roseo, semine tomentoso. *Niss. act. 1730. p. 577. t. 42.*

P. indicus, hederae folio anguloso, semine oblongo lanuginoso. *Raj. suppl. 348.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 542.

Bestäubte Bohne. W.

Habitat in India.

8. PHASEOLUS vexillatus.

P. caule volubili, pedunculis petiolō crassioribus capitatis, alis subfalcatis difformibus, leguminibus linearibus strictis. *Sp. pl. 1017. Jacq. hort. t. 102. Mill. dict. n. 3.*

P. radice annua, leguminibus strictis erectis toresis linearibus, caule hirsuto. *Roy. lugdb. 367.*

P. flore odorato, vexillo ampio patulo. *Dill. elth. 313. t. 234. f. 302.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 542.

Großfahnige Bohne. W.

Habitat Havanae. ○

Stipulae basi solutae, bifidae. Pedunculi glabri, reliquis partibus pilosiss. Pedunculus petiolis crassior. Flores aliquot sessiles, odorati. Calyx bracteis 2 minimis. Vexillum emarginatum, latum, reflexum, pagina interiore lineatum. Alae subfalcatae: dextra ad basin lobo distincta a basi, quod non in sinistra, unde flos obliquus. Carina falcata, parum oblique, rotunda, apice bifido. Legumen linearia. Planta media inter Phaseolos et Dolichos.

9. PHASEOLUS helvolus.

P. caule volubili, floribus capitatis, calycibus bracteatis, vexillis brevibus, alis expansis maximis, folidolis deltoidibus oblongis. *Sp. pl. 1017.*

P. radice annua, leguminibus rectis linearibus teretibus glabris. *Roy. lugdb.* 568.

P. flore helvolo, alis amplis patulis. *Dill. elth.* 312. t. 233. f. 300.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 543.

Blasrothe Bohne. W.

Habitat in Carolina. ○

*10. PHASEOLUS hirtus.

P. caule semivolubili, leguminibus teretibus, carina sinistrosum cornuta. *Retz. obf.* 3. p. 38.*

Rauhe Bohne. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ○ (v. f.)

Caulis angulatus hispidus 1-3 pedalis flexuosus debilis nec rectus neque volubilis. Petioli longi hispidae compressi supra canaliculati basi nodosi. Stipulae oblongae semicordatae adnatae ciliatae. Folia repanda acuta utrinque hispida, lateralia oblique ovata, terminale ovato-lanceolatum. Pedunculi axillares 2-3-pollicares hispidae, subcapitati quidem, licet raro plus quam duos gerit flores fructificantes, singulus ad pedicellorum exortum nodosus. Stipulis hi ad basin instruuntur foliolorum similibus. Bracteae. sub flore parva caduca, binae aliae angustiae carinatae acuminatae, ciliatae, calycis lateribus arcte appressis illiusque longitudine. Flores sordide flavi, superiore impennis vexilli parte fuscescente. *Retz. l. c.*

II. PHASEOLUS semierectus.

P. caule semivolubili, floribus spicatis, calycibus ebracteatis, alis expansis majoribus, foliolis ovatis. *Mant.* 100. *Jacq. ic.* 3. t. 558. *Collect.* I. p. 134.*

P. strumosa radice, flore purpureo, siliqua angustissima. *Plum. spec.* 8. *Amoen. acad.* 4. p. 347.

P. barbadensis erectior, siliqua angustissima, tinctorius. *Dill. elth.* 312. t. 233. f. 301.

P. subhirsutus americanus exitiosus, siliquis longis caulinis insidentibus. *Pluk. alm.* 290. t. 214. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 544.

Halbwindende Bohne. W.

Habitat in America calidiore. ○

Caulis erectus, tripedalis, demum superius volubilis, teres, substriatus, subpubescens. Folia ternata, ova-

ta, nuda, obtusifcula, submucronata, longitudine petioli. Stipulae subensiformes. Pedunculi longi, pedales, stricti, erecti. Spica rario, floribus gemellis sessilibus. Calyx cylindricus. Corollae vexillum et carina pallidiores. Alae triplo majores, convexae, rubrae, basi coerulescentes, conniventes. Carina contorta. H. U.

12. PHASEOLUS *alatus.*

P. caule volubili, floribus laxe spicatis, alis longitudine vexilli. *Sp. pl. 1017. Mill. dict. n. 1.*

Phaseolus flore purpureo: alis amplis longe protensis. *Dill. elth. 314. t. 235. f. 303.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 543.

Gestügelte Bohne. W.

Habitat — — — ◎

13. PHASEOLUS *Caracalla.*

P. caule volubili, vexillis carinaque spiraliter convolutis. *Sp. pl. 1017. Mill. dict. n. 2. Trew. rar. 14. t. 10.*

P. radice perenni subrotunda, leguminibus folio longioribus teretiusculis glabris. *Roy. lugdb. 367.*

P. indicus, cochleato flore. *Triumph. obs. 93. t. 94. Raj. hist. 1890.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 545.

Schneckenförmige Bohne. W.

Habitat in India orientali. 24

*14. PHASEOLUS *Astellus.* †

P. caule volubili, foliolis, sagittatis seminibus globosis. *Molin. chil. ed. germ. 108.*

Pfeilblättrige Bohne. W.

Habitat in Chili.

† † *Erecti.*

15. PHASEOLUS *aconitifolius.*

P. caule subvolubili hirto, foliolis lateralibus trilobis, terminali quinquepartito, laciniis lanceolatis, pedunculis subtrifloris petiolo brevioribus, stipulis lanceolatis. W.

P. caule volubili, foliis quinquepartitis. *Lin. suppl. 325.*

P. volubilis pedunculis subracemosis, foliolis profunde lobatis. *Jacq. obs. 3. p. 2. t. 52.* Vahl. symb. I. p. 53.*

Phaseolus palmatus. *Forst. descr. 214.*

Eisenblutblättrige Bohne. W.

Habitat in Tranquebaria. (v. f.)

Caulis erectus vix volubilis hirtus. Stipulae lanceolatae. Foliola profunde partita, laciniis lanceolatis acutiusculis. W.

*16. PHASELUS trilobus.

P. caule subvolubili glabro, foliolis lateralibus bilobis, terminali trilobo, laciniis ovatis, pedunculis subtifloris petiolo longioribus, stipulis ovatis. W.

P. (trilobus) caule semivolubili decumbente subglabro, foliolis trilobis, lobis ovatis, stipulis ovatis, leguminibus cylindraceis. *Ait. Kew. 3. p. 30.*

Dolichos (trilobus) foliolis lateralibus extrorsum gibbis, intermedio trilobo. *Sp. pl. 1021. Hort. cliff. 360.* Burm. Ind. 160. t. 50. f. 1.*

P. maderaspatanus, foliis glabris trilobis, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem punto geminis. *Pluk. alm. 292. t. 214. f. 3.*

Dreylappige Bohne. W.

Habitat in India orientali. ○ (v. f.)

*17. PHASEOLUS stipularis.

P. caule erecto glabro, foliolis obtusis lateralibus sinuosis, terminali hastato-trilobo, pedunculis folio longioribus spicatis, stipulis ovatis. W.

P. (stipularis) caule erecto, foliolis terminalibus sinuato-trilobis, leguminibus cylindricis horizontalibus. *Lamarck encycl. 3. p. 71.**

Spontonblättrige Bohne. W.

Habitat in Peru. ○

Spica brevis. Corollae sessiles vexillo brunneo, alis flavis, carina alba contorta. Lam. l. c.

*18. PHASEOLUS capensis.

P. caule filiformi decumbente, pedunculis unifloris, foliolis lanceolatis. *Thunb. prod. 130.*

Capitche Bohne. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

19. PHASEOLUS *nanus*.

P. caule erecto laevi, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis compressis rugosis. *Hort. upf.* 213.
Amoen. acad. 4. p. 284.

P. vulgaris italicus humilis f. minor, albus cum orbita nigricante. *Bauh. hist.* 2. p. 358. *Raj. hist.* 885.
Smilax siliqua sursum rigente f. *Phaseolus parvus italicus*. *Bauh. pin.* 339.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 545.

Brechbohne. W.

Habitat in India. ⊙ (v. v.)

20. PHASEOLUS *radiatus*.

P. caule erecto tereti, floribus capitatis, leguminibus cylindricis horizontalibus. *Act. Stockh.* 1742. p. 202. t. 7. f. 2. *Hort. upf.* 213. *Fl. zeyl.* 281.

P. zeylonicus, siliquis radiatum digestis. *Dill. elth.* 315. t. 235. f. 304.

P. minimus. *Rumph. amb.* 6. p. 386. t. 139. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 546.

Strahlfrüchtige Bohne. W.

Habitat in China, Zeylona. ⊙ (v. v.)

21. PHASEOLUS *Max.*

P. caule erecto angulo hispido, leguminibus pendulis hirtis. *Hort. cliff.* 499. *Roy. lugdb.* 367. *Fl. zeyl.* 280. *Gron. orient.* 217.

P. orthocaulis, Mungo persarum. *Hern. mex.* 887.

Fructus niger, coriandro similis. *Bauh. pin.* 413.

Cadelium. *Rumph. amb.* 5. p. 388. t. 140.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 546.

Schnabelfrüchtige Bohne. W.

Habitat in India. ⊙

Legumen rostro incurvo.

22. PHASEOLS *Mungo*.

P. caule flexuoso tereti hirsuto, leguminibus capitatis hirtis. *Mant.* 101.

P. hirsutus flexicaulis Mungo affinis maderasp. caule tereti. *Pluk. atm.* 290.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 547.

Rauhfrüchtige Bohne. W.

Habitat in India orientali. ⊙ (v. f.)

Caulis erectus, flexuosus, parum scandens, ut tota planta pilosus hirsutus helvola. Foliola lateralia late-re exteriore dimidiato-cordata; interiore lanceolata. Stipulae foliorum ovali-oblongae, medio adnatae, nudae, ciliatae: foliorum vero lanceolatae, attenuatae in setam. Pedunculi longitudine foliorum, terminati Receptaculo ovato, glabro, ferente Capitulum floribus sessilibus luteis. Siliquae hirsutae. H. U.

23. PHASEOLUS lathyroides.

P. caule erecto, foliolis oblongis acuminatis, pedunculis elongatis, leguminibus tereti-subulatis. *Swartz obf.* 280. *

P. caule erecto, foliolis lanceolatis. *Sp. pl.* 1018.

P. minor erectus pratinus, foliis oblongis, vexillo minore, siliquis gracilibus. *Brown. jam.* 291.

P. erectus lathyroides, flore amplio coccineo. *Sloan jam.* 71. *hist.* I. p. 183. t. 116. f. 1.

Platterbsenartige Bohne. W.

Habitat in Jamaiae fabulosis humidis. ◎

24. PHASEOLUS sphaerospermus.

P. Caule erecto, seminibus globoſis hilo tincto. *Sp. pl.* 1018. †

P. erectus, siliquis gracilibus teretibus polyspermis, seminibus subrotundis hilo nigro. *Brown. jam.* 392.

P. erectus minor, semine sphaerico albido hilo nigro. *Sloan jam.* 72. *hist.* I. 185. t. 117. f. 1. 2. 3.

P. indicus, fructu stricto albo minore nigra macula. *Pluk. alm.* 290.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 548.

Rundsamige Bohne. W.

Habitat in America calidiore. ◎

1349. DOLICHOS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1181.

Vexilli basis callis 2, parallelis, oblongis, alas sub-tus comprimentibus.

† *Volubiles.*

I. DOLICHOS Lablab.

D. volubilis, leguminibus ovato-acinaciformibus, semi-

nibus ovatis hilo arcuato versus alteram extremitatem.
Roy. lugdb. 368. *Hort. upf.* 214. *Hasselquist.* 483.
Mill. dict. n. I. *Kniph. cent.* 6. n. 87.

Phaseolus aegyptius, nigro semine. *Bauh. pin.* 341.
Phaseolus niger *Lablab.* *Alp. aegypt.* 74. t. 75. *Vestl. aegypt.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 549.
Aegyptische Faseln. W.

Habitat in Aegypto. ○ (v. v.)

Legumina dorso scabra. *Caules ramique teretes, retrorsum scabri.* *Pedunculi semiverticillati.*

*2. DOLICHOS *benghalensis*.

D. volubilis frutescens, leguminibus longe mucronatis.
Murr. syst. veg. ed. 14. p. 657. *Jacq. hort.* 2. t. 124.

Bengalische Faseln. W.

Habitat in Benghalia. ḫ

3. DOLICHOS *sinensis*.

D. volubilis, leguminibus pendulis cylindricis torulosis,
 pedunculis erectis multifloris. *Amoen. acad.* 4. p. 326. *
Petz obs. 4. p. 30. *

Dolichos sinensis. *Rumph. amb.* 5. p. 375. t. 134.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 550.

Chinesische Faseln. W.

Habitat in India. ○ (v. v.)

*4. DOLICHOS *luteolus*.

D. volubilis, leguminibus capitatis pluribus cylindricis,
 feminibus rotundatis. *Murr. syst. veg. et* 14. p. 657.
Jacq. hort. 1. t. 90.

Gebliche Faseln. W.

Habitat in America torrida. ○

*5. DOLICHOS *umbellatus*.

D. volubilis, leguminibus subcylindricis rectis glabris.
Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 339.

Dolichos unguiculatus. *Thunb. jap.* 279.

Safagi. *Kaempf Amoen.* 836.

Doldenblütige Faseln. W.

Habitat in Japonia.

Caulis volubilis striatus villosus. *Folia petiolata ternata.* *Foliola ovata acuminata integra villosa,* *lateralia brevius, terminale longius petiolata, palmaria.*

Flores subumbellato-racemosi, pedunculis petiolis longioribus fluxuosis palmaribus. Legumina cylindrica recta glabra pollicaria et ultra. Thunb. Act. l. c.

6. DOLICHOS unguiculatus.

D. volubilis, leguminibus capitatis subcylindricis: apice recurvo concavo. Hort. upf. 214.. Jacq. hort. t. 23.

Cacara nigra. Rumph. amb. 5. p. 381. t. 138?

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 551.

Hakige Faseln. W.

Habitat in Barbados.

*7. DOLICHOS tranquebaricus.

D. volubilis, leguminibus capitatis paucis cylindricis, apice mucronato recto. Murr. syst. veg. ed. 14. p. 657. Jacq. hort. 2. t. 70.

Tanquebarische Faseln. W.

Habitat in Tranquebaria.

*8. DOLICHOS cultratus.

D. volubilis, leguminibus racemosis oblongis acinaciformibus dorso tricarinatis apice uncinatis. W.

D. (cultratus) leguminibus cultratis dorso carinatis, caule flexuoso. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 320. Banks Icon. Kaempf. t. 25.

Dolichos ensiformis. Thunb. jap. 279.

Messerförmige Faseln. W.

Habitat in Japonia.

*9. DOLICHOS gladiatus.

D. volubilis, leguminibus racemosis ensiformibus dorso tricarinatis apice rectis, seminibus arillatis. W.

D. (gladiatus) volubilis, leguminibus gladiatis dorso tricarinatis in mucronem rectum terminatis, seminibus arillatis. Jacq. ic. rar. 3. t. 560. Collect. 2. p. 276.*

Lobus machaeroides. Rumph. amb. 5. p. 376. t. 135. f. 1.

Bara mareka. Rheed. mal. 8. t. 44.

Säbelförmige Faseln. W.

Habitat in India orientali. ⊙ (v. f.)

Flores albido-rubicundi vel rosei. Semina fusca. In Banksii Iconibus Kaempferi t. 39. est figura Doli-

chi huic similis, sed hujus racemi breviores seminaque multo majora. W.

* 10. DOLICHOS incurvus.

D. volubilis, leguminibus solitariis incurvis tricarinatis.

Thunb. *jap.* 280.*

Krummfrüchtige Faseln. W.

Habitat in Japonia.

Flores axillares solitarii pedunculati. Thunb. I. c.

11. DOLICHOS tetragonolobus.

D. volubilis, leguminibus membranaceo - quadrangulatis. *Sp. pl.* 1020.

Lobus quadrangularis. *Rumph. amb.* 5. p. 374. t. 133.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 553.

Vierflügliche Faseln. W.

Habitat in India.

12. DOLICHOS sesquipedalis.

D. volubilis, leguminibus subcylindricis laevibus longissimis. *Sp. pl.* 1019. *Jacq. hort.* t. 67.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 553.

Langfrüchtige Faseln. W.

Habitat in America. ○ (v. v.)

Facies Phaseoli. Flores vexillo supra pallido, intus rufescente. Legumen ultra sesquipedale, teretiusculum apice unguiculo obtuso gibbo.

* 13. DOLICHOS rotundifolius.

D. volubilis, leguminibus, racemosis compressis pilosifusculis ensiformibus, foliolis ovali - subrotundis glabris.

Vahl symb. 2. p. 81.

D. (*emarginatus*) volubilis frutescens, foliolis rotundatis emarginatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 2. p. 50. t. 221?

Katu - tsjandi. *Rheed. mal.* 8. p. 83. t. 43.

Rundblättrige Faseln. W.

Habitat in Caribaeis. 5

Caulis glaber lignosus superne angulatus. Folia petiolata ternata. Foliola petiolata palmaria ovalia, terminale subrotundum, integra emarginata venosa utrinque glabra. Petiolus universalis foliolis pavum longior vix pilosus, petioluli purpurascentes pilosi. Racemus

axillaris semipedalis. Pedunculus remote tuberculatus superne purpurascens: tuberculi magnitudine fere seminis Coriandri. Flores 2-3 in singulo tuberculo brevissime pedicellati. Bractae duae subrotundae caducae ad basin floris. Calyx campanulatus glaber: lacinia superior rotunda reliquis major, inferiores ovatae. Corolla magna purpurea. Legumina tripollaria unguem lata, basi apiceque obliqua acuta, adsparsa pilis minutissimis adpresso. *D. altissimus* differt calycibus alisque basi villosis. Vahl. l. 2.

14. DOLICHOS altissimus.

D. volubilis, leguminibus racemosis hirtis aequalibus, seminibus hilo cinetis, foliis utrinque glabris. Sp. pl. 1019. Jacq. amer. 203. t. 182. f. 85.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 553.

Höchste Faseln. W.

Habitat in Martinicae sylvis, altissimas arbores scandens. ᄃ

Flores violacei.

* 15. DOLICHOS giganteus. W. †

D. volubilis, leguminibus racemosis hirtis aequalibus, seminibus hilo cinctis, foliis utrinque glabris, calycibus hirsutis campanulatis. W.

Kaku - Valli. Rheed. mal. 8. p. 63. t. 36.

Riesen - Faseln. W.

Habitat in India orientali. ᄃ

Valde affinis D. altissimo, differt foliolis oblongo-ovatis acutis, nec subrotundo-ovatis acuminatis, racemis corymbosif, calycibus campanulatis, corollis glabris albo-virescentibus. W.

16. DOLICHOS pruriens.

D. volubilis, leguminibus racemosis: valvulis subcarnatis hirtis, pedunculis ternis. Sp. pl. 1019. Jacq. amer. 201. t. 122.* Mill. dict. n. 3.

Phaseolus americanus, folio molli lanugine obsito, siliquis pungentibus, semine fusco punctato. Pluk. phyt. 214. f. 1.

Phaseolus utriusque Indiae lobis villosis pungentibus minor. Sloan.

Strizolobium spicis multis pendulis alaribus, floribus ternis. *Brown. jam.* 290.

Cacara pruritus. *Rumph. amb.* 6. p. 393. t. 142.

Nai corana. *Rheed. mal.* 9. p. 61. t. 35. *Fl. zeyl.* 539.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 554.

Juckende Faseln. W.

Habitat in Indiis. ♂ (v. f.)

Foliola subtus hirta. Calyx campanulatus, 5-dentatus: medio breviore. Corollae vexillum brevissimum, reliquis petalis triplo minus, ovatum. Carina linearis, acuta, apice naviculari. Stamina diadelpha. Filamenta 4 alterna subclavata, majora. Legumen compressum, basi inflexum, apice reflexum, (adeo literam f. flexura refert). Hujus et sequentis legumina hirta urunt.

17. DOLICHOS urens.

D. volubilis, leguminibus racemosis transversim lamellosis hirtis, seminibus hilo cinctis. W.

D. volubilis, leguminibus racemosis: sulcis transversim lanceolatis, seminibus hilo cinctis. *Sp. pl.* 1020.

Jacq. amer. 202. t. 182. f. 84. *Mill. dict.* n. 4.

Phaseolus americanus frutescens, foliis glabris, lobis pluribus villosis pungentibus, fructu orbiculari plano hilo nigro ambiente. *Pluk. phyt.* 213. f. 2.

Phaseolus brasiliensis frutescens, lobis villosis pungentibus maximis. *Sloan. jam.* 68. hist. I. p. 178.

Phaseolus siliquis latis hispidis rugosis, fructu nigro. *Plum. ic.* t. 107.

Zeophthalmum siliquis majoribus hirtis transverse sulcatis, pedunculis communibus longissimis flexilibus. *Brown. jam.* 295.

Macuna. *Marcgr. bras.* 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 557.

Brennende Faseln. W.

Habitat in America meridionali. ♂

Legumina magna, rugosa. Semina hilo cincta. Folia subtus tomentoso-nitida.

*18. DOLICHOS articulatus.

D. volubilis, leguminibus racemosis articulatis hirtis, foliolis dentatis. W.

D. (*articulatus*) volubilis, foliolis angulo-dentatis.

leguminibus racemosis compressis articulosis et hirsutis. *Lamarek encycl.* 2. p. 294.*

Phaseolus hirsutus, *filiquis articulosis.* *Plum. sp. 8.*
ic. 222.

Gegliederte Faseln. W.

Habitat in St. Domingo. t̄

Ab antecedente distinctus legumininus non lamello-
sis foliolisque dentatis. W.

*19. DOLICHOS hirsutus.

D. *volubilis, leguminibus racemosis comprassis hirsutis,*
foliolis exterioribus bilobis. *Thunb. Act. Soc. Lin.*
Lond. 2. p. 339.

Radsane. *Banks ic. Kaempf. t. 41.*

Rauhe Faseln. W.

Habitat in Japonia

Caulis volubilis tomentosus. Folia petiolata ternata. Foliola lateralia brevissime petiolata biloba subrotunda, lobis mucronatis, subtus pallide reticulata, utrinque tenuissime villosa palmaria, intermedium petiolatum indivisum majus. Petiolus communis spithameus, intermedii folioli pollicaris. Flores racemosi plurimi purpurei. Racemus sensim florens spithameus vel ultra. Pedunculi tomentosi unguiculares. Legumina linearia compressa hirsuta, villo longo flavescente, cuspidata stylo curvo persistente, digitalia. Thunb. l. c.

*20. DOLICHOS pilosus.

D. *volubilis, leguminibus subracemosis linearibus hirtis,*
foliolis ovato-lanceolatis pubescentibus. W.

Dolichos pilosus. Klein in litt.

Behaarte Faseln. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis volubilis teres pilis rarissimis tenuibus ad-
pressis tectus. Folia petiolata ternata. Foliola quadri-
pollicaria ovato-lanceolata obtusiuscula mucronata, su-
perne scabra, inferne tenuissime pubescentia. Racemi
unciales vel sesquiunciales tri-vel sexlори. Legumi-
na tripollicaria et ultra linearia compressa apice uncini-
nata, pilis ferrugineis obsita. W.

21. DOLICHOS *minimus*.

- D. *volubilis*, leguminibus racemosis compressis tetraspermis, foliis rhombeis. *Sp. pl. 1020. Jacq. obs. I. p. 34. t. 22.* *
- D. *minimus*, floribus luteis. *Hort. cliff. 369. t. 21.* *
Hort. upf. 214.
- D. *minimus* foetidus repens, siliulis bispermibus. *Brown. jam. 394.*
- Phaseolus minimus* foetidus, floribus spicatis e viridi luteis, semine maculato. *Sloan. hist. I. p. 182. t. 115 f. 1.*
- Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 558.*
- Kleinste Faseln. W.
- Habitat in Jamaica.*

*22. DOLICHOS *tetraspermus*. W.

- D. *volubilis*, leguminibus racemosis acinaciformibus tetraspermis, foliolis rhombeis glabris. W.
- Viersamige Faseln. W.
- Habitat in India orientali. (v. f.)*
- Caulis *volubilis*. Foliola *sesquipollucaria glabra rhomboe-subrotunda brevissime acuminata obtusa mucronata*. Racemi foliis longiores. Flores alterni subgeminati subseffiles parvi. Legumina acinaciformia *sesquipollucaria*, pollicem demidium lata, oblonga cuspidata *compreffa tetrasperma*. W.

*23 DOLICHOS *medicagineus*.

- D. *volubilis*, leguminibus racemosis oblongis dispermis compressis, foliolis subrotundis obovatis. W.
- D. (*medicagineus*) *volubilis*, foliolis cuneato-subrotundis obtusissimis, calycibus acutis, leguminibus racemosis compressis subdispermis. *Lamarck encycl. 2. p. 294.* *
- Phaseolus exiguus glaber*, trifolii foliis, siliqua plana compressa. *Burm. zeyl. 188. t. 84. f. 2.*
- Schneckenkleeartige Faseln.
- Habitat in Zeylona.*

*24. DOLICHOS *lineatus*.

- D. *volubilis*, leguminibus racemosis oblongis tricarinatis. *Thunb. jap. 280.* *
- Reedsu. *Kaempf. amoen. 236.*

Gestreifte Faseln. W.

Habitat in Japonia.

Caulis volubilis vel scandens herbaceus subangulatus glaber. Folia ternata glabra. Foliola ovata obtusa cum acumine obsolete integra lineata aequalia fessquipollicaria, lateralia breviter, intermedium longo petiolatum. Stipulae minimae setaceae. Flores racemosi. Legumen oblongum anterius rotundatum, dorso rectum, trilineatum, lineis lateralibus majoribus acutum glabrum bipollicare. Thunb. l. c.

*25. DOLICHOS ruber.

D. volubilis, leguminibus racemosis compressis, calycibus quadrifidis. *Jacq. amer. 204. t. 123.**

Rothe Faseln. W.

Habitat in sylvis et fruticetis Martinicae. Ȣ

Caules volubiles teretes intorti glabri, vicina ad duodecim pedum altitudine scandent. Folia ternata, foliolis ovatis integerrimis acutis glabris. Racemi simplices laxissimi patuli stricti axillares foliis duplo longiores plus minus decemflori. Flores inodori pollincares petalis rubris, in quovis fere racemo steriles aliquot, quibus stylus est brevissimus et stigma reflexum. Legumen fuscum oblongum compressum acuminatum. Semina nigricantia. *Jacq. l. c.*

*26. DOLICHOS subracemosus.

D. caule perenni, pedunculis subracemosis, leguminibus strictis linearibus glabris. *Jacq. amer. 205.*

Dünntaubige Faseln. W.

Habitat in sylvaticis arenosis maritimis Carthagena.

Ȣ (v. f.)

Planta perennis volubilis tota uitida. Folia ovato-lanceolata acuta bipollicaria, laterale pagina interior valde oblitterata. Stipulae lanceolatae acuminatae integerrimae. Pedunculi foliorum circiter longitudine tres quatuorve flores racematis sustinent. Calyci ad latera adfident bracteae duae ovato-acuminatae. *Jacq. l. c.*

*27. DOLICHOS tuberosus.

D. caule volubili tetragono, leguminibus compressis

hirsutis racemosis, foliis subrotundo - rhomboides acuminatis. W.

D. (*tuberosus*) *volubilis foliolis rotundatis acuminatis integerrimis, leguminibus longis falcatis subcompressis villosis.* *Lamarch encycl. 2. p. 293.* *

Phaseolus radice tuberosa esculenta, siliquis quasi articulatis hirsutis. *Plum. sp. 8. ic. 220.*

Knollige Faseln. W.

Habitat in Martinica. 4

28. DOLICHOS capensis.

D. *volubilis, pedunculis subbifloris, leguminibus ellipticis compressis, foliis glabris.* *Amoen. acad. 6. afr. 44.* *

D. *pedunculis unifloris, foliolis acuminatis, leguminibus acinaciformibus glabris.* *Thunb. prod. 130.*

Phaseolus africanus luteus, siliquis brevibus depresso-
Herm. afr. 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 558.

Capische Faseln. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

29. DOLICHOS scarabaeoides.

D. *volubilis, foliis ovatis tomentosis, floribus solitariis, seminibus bicornibus.* *Fl. zeyl. 282.* *

Phaseolus minimus bisnagaricus, foliis argenteo-villosis, siliquis torosis brevibus spadicea hirsutie pubescentibus, fructu parvo scarabaeoide nigro. *Pluk. alm. 290. t. 52. f. 3.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 559.

Käferartige Faseln. W.

Habitat in India orientali. ⊖

***30. DOLICHOS reticulatus.**

D. *volubilis, foliis ovatis acutis rugosis reticulatis villosis, racemis paucifloris.* *Ait. Kew. 3. p. 33.*

Netzblättrige Faseln. W.

Habitat in Nova Hollandia. 5

31. DOLICHOS bulbosus.

D. *volubilis, foliis glabris multangulis dentatis.* *Sp. pl. 1021.*

Phaseolus nervicensis, foliis multangulis, tuberosa radice. *Pluk. alm.* 292. t. 52. f. 4.

Caraca bulbosa. *Rumph. amb.* 5. p. 373. t. 132.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 559.

Zwiebliche Faseln. W.

Habitat in Indiis.

*32. DOLICHOS *falcatus*.

D. volubilis, foliolis subrotundo-ovatis acuminatis glabris, terminali trilobo, pedunculis bifloris. W.

Dolichos falcatus. *Klein in litt.*

Sichelförmige Faseln. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis filiformis volubilis pilosusculus. Foliis ternatis. Foliola subrotunda ovata acuminata, lateralia erterne gibba subbiloba: intermedium hastato-trilobum. Stipulae parvae lanceolatae. Pedunculi petiolo breviores axillares biflori. Flores magnitudine *D. sinensis*. Leguminia compressa bi-vel triuncialia falcata polysperma. W.

*33. DOLICHOS *lobatus*. W.

D. volubilis, foliolis lateralibus bilobis, terminali trilobo, lobo intermedio mucronato, floribus racemosis. W.

Dolichos trilobus. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 560. t. 64. f. 1.

D. (trilobus) floribus capitatis subbinis, foliolis trilobis, leguminibus cylindricis. *Thunb. prod.* 130?

Lappige Faseln. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

Folia ternata. Foliola lateralia biloba lobis oblongis obtusis interiore apice mucrone incurvato instructo, intermedium trilobum, lobo intermedio mucronato mucrone incurvo. Racemi multiflori axillares. *Diversissimus a Phaseolo trilobo*. W.

*34. DOLICHOS *argenteus*. W.

D. volubilis, pedunculis bifloris, leguminibus hirsutis, foliolis subangulatis, terminali trilobo, subtus sericeo-villosis. W.

Silberfarbene Faseln. W.

Habitat in Guinea. (v. f.)

Caulis ferrugineo-villosus. Folia petiolata ternata. Foliola subangulata subdentata superne viridia pilis sparsis adpresso teeta, inferne pilis sericeis albis copiosis nitentibus obsita, lateralia subrotunda basi cuneata obtusa; terminale trilobum rhombeum. Petioli foliis longiores ferruginei villosi. Stipulae ovato-lanceolatae. Pedunculi petiolis breviores subbiflori, ut calyx, ferrugineo-vilosus. Legumina oblonga ferrugineo-hirsuta pollicaria. W.

35. DOLICHO S aristatus.

D. volubilis, pedunculis bifloris axillaribus, leguminibus linearibus compressis, arista terminali recta. Sp. pl. 1021.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 560.

Gegrannte Faseln. W.

Habitat in America. ☺

Caulis teres. Foliola laevia, ovato-oblonga, acuminata. Pedunculi axillares, gemini s. biflori. Legumina stricta, terminata Arista filiformi, stricta, recta, acuta, pollicari longitudine.

36. DOLICHO S filiformis.

D. volubilis, foliolis linearibus obtusis mucronatis glabris subtus pubescentibus. Amoen. acad. 5. p. 402.

Dolichos herbaceus minor, foliis linearibus, siliqua polysperma compressa. Brown jam. 294.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 561.

Fadenförmige Faseln. W.

Habitat in Jamaica.

37. DOLICHO S purpureus.

D. volubilis, caule glabro, petiolis pubescentibus, corollae alis patentibus. Sp. pl. 1021.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 561.

Purpurrothe Faseln. W.

Habitat in Indiis. ☺ (v. v.)

Caulis purpurascens. Foliola subcordata glabra subtus venis purpureis reticulata. Calyces obtecti bracteis duabus. Corolla laete purpurea. Alae horizontaliter patulæ. Carina sub apice violacea. Legumen compressum.

38. DOLICHOS *regularis*.

D. volubilis, foliis ovatis obtusis, pedunculis multifloris, petalis aequalis magnitudinis figuraeque. Sp. pl. 1022.
Gron. virg. 82.

Houttuyn Lin. Pf. Syst. 8. p. 562.

Regelmässige Faseln. W.

Habitat in Virginia.

*39. DOLICHOS *ciliatus*.

D. volubilis, pedunculis axillaribus subquadrifloris, foliolis oblongis margine ciliatis. W.

Dolichos ciliatus. Klein in litt.

Gefranzte Faseln. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis filiformis volubilis. Folia ternata. Foliola oblonga tripollicaria obtusa mucronata glabra margine ciliata. Pedunculi tri- vel quadri-ori petiolis breviores. Legumina acinaciformia glabra pollicaria vel sesquipollicaria. W.

40. DOLICHOS *lignosus*.

D. volubilis, caule perenni, pedunculis capitatis, leguminibus strictis linearibus. Sp. pl. 1022.

D. caule perenni lignoso. Hort. cliff. 360. t. 20.

Phaseolus indicus perennis, floribus pupurascensibus.

Eichr. carol. 36.

Cacara f. Phaseolus perennis. Rumph. amb. 5. p. 378.
t. 136.

Houttuyn Lin. Pf. Syst. 8. p. 562.

Holzige Faseln. W.

Habitat in India orientali. ḥ (v. v.)

41. DOLICHOS *polystachyos*.

D. volubilis, caule perenni, spicis longissimis, pedicellis geminis, leguminibus acuminatis compressis. Sp. pl. 1022. Gron. virg. 2. p. 106.

Dolichos caule lignoso, pedunculis ex ala plurimis, floribus spicatis, legumine longo apice sursum acuminato. Gron. virg. 1. p. 172.

Vielährige Faseln. W.

Habitat in Virginia.

Flores purpurei.

An diversus a Phaseolu perenni? Clariss. Thunberg
Sub hoc nomine in Flora japonica p. 281. plantam foliis
pinnatis descripsit, quae Glycines species est. W.

*42. DOLICHOS luteus.

D. volubilis, floribus subspicatis, leguminibus subcy-
 lindricis glabris, foliis subrotundo-rhombeis obtusis
 integris glabris. Swartz prod. 105.

Gelbe Faseln. W.

Habitat in Jamaica. ♂

† † Erecti.

43. DOLICHOS ensiformis.

D. caule suberecto, leguminibus acinaciformibus trica-
 rinatis. Syst. veg. 547. Hort. cliff. 360.

D. (acinaciformis) volubilis, leguminibus gladiatis
 dorso tricarinatis mucrone recurvo terminatis, semi-
 nibus arillatis. Jacq. ic. rar. 3. t. 559. Collect. I.
 p. 114.*

Phaseolus suberectus major, siliquis maximis oblongis
 glabris, sutura altera nervo majore utrinque. Brown
 jam. 291.

Phaseolus maximus, siliqua ensiformi nervis insignita,
 semine albo membranula inclusa. Sloan. hist. I. p.
 177. t. 114. f. I. 2. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 552.

Schwerdtförmige Faseln. W.

Habitat in Jamaica. ⊙

*44. DOLICHOS pubescens. W.

D. caule erecto subvolubili, leguminibus subgeminatis
 foliisque pubescentibus. W.

Weichbehaarte Faseln. W.

Habitat in India orientali. ⊙ (v. f.)

Caulis pedalis erectus pubescens ramis erectis sub-
 volubilibus. Folia ternata. Foliola ovato-acuta pu-
 bescentia. Stipulae lanceolatae. Pedunculi geminati
 uniflori interdum biflori stipularum longitudine. Flo-
 res flavescentes. Legumina linearia ensiformia com-
 pressa sesquiuncialia pubescentia. W.

45. DOLICHOS *Soja*.

D. caule erecto flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Fl. zeyl.*
*534. Mat. med. 171. Jacq. ic. rar. I. t. 145. Collect. I. p. 46.**

Phaseolus erectus, siliquis lupini, fructu pisii majoribus candido. *Kaempf. amoen. 837. t. 838.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 564.

Soja - *Faseln. W.*

Habitat in India orientali, Japonia. ○ (v. v.)

Corollae vix calyce maiores. Flores subsessiles 3-5.

Legumina disperma.

46. DOLICHOS *Catiang.*

D. caule erecto, leguminibus geminis linearibus erecti-
 usculis. *Mant. 269. Burm. ind. 161.*

Phaseolus minor. Rumph. amb. 5. p. 383. t. 139.

Peru. Rheed. mal. 3. p. 75. t. 41.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 566.

Schmalfrüchtige Faseln. W.

Habitat in India orientali. ○ (v. v.)

*47. DOLICHOS *angularis*. *W.*

D. caule erecto hirsuto, pedunculis bifloris, legumini-
 bus pendulis, foliolis exterioribus subangulatis. *W.*

Alsuki. Banks. ic. Kaempf. t. 40.

Eckige Faseln. W.

Habitat in Japonia.

*Folia rhomboe-o-vata acuminata, lateralibus externe
 subangulatis. Pedunculi biflori petiolo breviores.
 Legumina bipollicaria linearia pendula. W.*

48. DOLICHOS *biflorus*.

D. caule perenni laevi, pedunculis bifloris, legumini-
 bus erectis. *Sp. pl. 1023. Roy. lugdb. 368.*

*Phaseolus vulgaris Lablab effigie, flore parvo ochro-
 leuco, siliquis falcatis gemellis. Pluk. alm. 291. t.
 213. f. 4.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 566.

Zweyblütige Faseln. W.

Habitat in India.

49. *DOLICHOS repens.*

D. caule repente, foliis pubescentibus, ovatis, floribus racemosis geminis, leguminibus linearibus teretibus.
Amoen. acad. 5. t. 402.

D. maritimus minor repens, pedunculis longioribus, siliquis polyspermibus gracilibus teretibus. *Brown jam. 293.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 567.

Kriechende Faseln. W.

Habitat in Jamaicae maritimis.

* 50. *DOLICHOS roseus.*

D. caule repente adscendente, foliolis subrotundis nitidis, floribus racemosis, leguminibus dorso tricarinatis. *Swartz prod. 105.*

D. maritimus repens, foliis orbiculatis nitidis, siliquis compressis futura altera trigona. *Brown jam. 293.*

Rosenfarbige Faseln. W.

Habitat in Jamaica.

51. *DOLICHOS fabaeformis.*

D. caule erecto angulato, foliis glaucis mucronato-dentatis, leguminibus strictis subtetragonis. W.

D. (fabaeformis) caule erecto angulato, foliis villosis glaucis, leguminibus strictis subtetragonis. *l'Herit. Stirp. 163. t. 78.* *

D. (psoraloides) caule superne anguloso, foliolis oblongis supra lineatis subdentatis, leguminibus glabris erectis oblongis ad latera carinatis. *Lamarek encycl. 2. p. 297.* *

Floralea (tetragonoloba) foliis ternatis dentatis, caule flexuoso, spicis lateralibus, leguminibus strictis quadrangularibus. *Mant. 104.*

Lupinus (trifoliatus) caule herbaceo, foliis ternatis, leguminibus spicatis erectis. *Cavan. ic. 1. p. 43. t. 59.* *

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 710.

Viereckige Faseln. W.

Habitat in Arabia et India orientali. ⊖ (v. f.)

Caulis herbaceus erectus flexuosus angulatus crassitie pennae. Folia magnitudine Meliloti, majora, ternata, impari petiolato. Foliola ovata acuminata ra-

rius profundus serrata s. subdentata, utrinque vix pubescentia. Stipulae setaceae. Racemi axillares erecti pedunculati longitudine foliorum. Bracteae setaceae flore fere longiores. Flores alterni brevissime pedicellati, Indigoferae paulo maiores, carina acuta absque corniculis lateralibus Indigoferae. Legumina magna longitudine foliorum compressa, futura utraque utrinque membranaceo-angulata acuminata, acumine elongato. Semina 4 s. 5.

† † † Dubii.

* 52. DOLICHOS gibbosus. +

D. floribus racemosis, foliolis acuminatis glabris. Thunb. prod. 130.

Hoeckrige Fafeln. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 53. DOLICHOS decumbens. +

D. floribus umbellatus lateralibus, foliolis ovatis obtusis glabris. Thunb. prod. 130.

Liegende Fafeln. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

1350. G L Y C I N E.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1182.

Cal. 2-labiatus. Corollae carina apice vexillum reflectens.

I. GLYCINE subterranea.

G. foliis ternatis radicalibus, caulis prostratis flexuosis, pedunculis bitloris. *Linn. dec. 37. t. 17.*

Arachis africana. Burm. ind. 22.

Phaseoloides mariana procumbens, angustiori folio trichophyllum, flore gemello. Raj. suppl. 437.

Phaseolos canadensis minimus, tiliquam terra condens. Hort. paris. 140.

Arachidna phaseoloides americana. Herm. prodr. 314.

Mandubi de angola. Marcgr. bras. 43. Raj. hist. 919.

Manobi. Laet. amer. c. 13.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 570.

Unterirdische Glycine. W.

Habitat in Brasilia, Surinamo. C. Dahlberg. Ⓣ

Folia ternata, radicalia: foliolis oblongis, nudis, obtusiusculis: petiolo erecto, palmari, triquetro. Caules palmares, plures, terrae arte adpresso, flexuosi, rarius foliosi. Pedunculi axillares, brevissimi, cernui, biflori. Flores sessiles. Bracteae 2-ovatae, calyci in-cumbentes. Calyx quadriditus: superiore emarginata. Corolla flava: Vexillum obovatum, emarginatum, striatum. Alae longitudine vexilli, oblongae, obtusae. Carina conformis. Stamina diadelpha. Germen ob-longum. Stylus latere superiore hirsutus. Stigma obtusum. Defloratus Pedunculus penetrat terram ut in Trifolio subterraneo, Arachi hypogaea. Legumen sub-lentiforme, utrinque acutiusculum.

*2. GLYCINE clandestina.

G. foliis ternatis lanceolatis subtus sericeis, pedunculis ternis axillaribus, calycibus clausis corolla tripetala majoribus, leguminibus linearibus teretiusculis. W.
G. (*clandestina*) caule volubili filiformi sericeo, foliis ternatis sublanceolatis sericeis, floribus axillaribus ternis, calyce subclauso dentaio sericeo, corolla tripetala inclusa, leguminibus longis sericeis nigris semitereti-bus apice recurvis. *Wendl. obs. 54.**

Heimlichblühende Glycine. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♂ (v. v.)

Caulis volubilis teres sericeo-villosum. Folia alterna petiolata ternata. Foliola lanceolata angustia obtusa superne glabriuscula inferne pilis adpresso obsoita, la-teralia sesquipollucaria, terminale bipollucare. Petio-lus communis sericeo - villosus sesquipollucaris. Flores fere inconspicui in axillis foliorum ad apicem ramorum juniorum brevissime pedunculati terni, magnitudine capituli acus. Bracteae binae lanceolatae villo-sae in quolibet pedunculo. Calyx villosus quinqueden-tatus. Corolla tripetala calyce minor. Stamina con-nata quorum quinque longiora. Germen villosum. Stylus ascendens, Stigma capitatum. Legumen li-neare teretiusculum subarcuatum pilosum. Semina 9 nigra. W.

*3. GLYCINE *farmentosa*.

G. foliis ternatis ovatis glabris, racemis filiformibus subtritloris, floribus apetalis, leguminibus oblongis dispermis. W.

G. (*farmentosa*) apetala, caule volubili, foliis ternatis, ramis divergentibus, farmentis nudis fructiferis longissime propendentibus. Roth. catalect. 2. p. 87. *

Glycine monoica. Schuhr. bot. Annal. 12. p. 20. t. 2. *

Fadenblütige Glycine. W.

Habitat in Carolina. ⊙ (v. f.)

Caulis volubilis. Folia ternata, foliolis ovatis acutis sesquipolligariibus. Apices ramorum filiformes dependentes floriferi. Flores magnitudine praecedentes. Calyx villosus clausus quadridentatus. Corolla nulla. Stamina praecedentis. Legumen oblongum compressum subfalcatum quadrilineare dispermum. Semina grisea nigro-punctata. W.

4. GLYCINE *monoica*.

G. foliis ternatis ovatis glabris, caule piloso, racemis caulinis pendulis corollatis sterilibus, pedunculis radicibus apetalis fructiferis. W.

G. foliis ternatis nudiusculis, caulibus pilosis, racemis pendulis, floribus fructiferis apetalis. Sp. pl. 1023.

Wendl. in Roem. Archiv. 3. p. 103. t. 2. *

G. bracteata. Sp. pl. 1. p. 754.

Phaseolus americanus supra et infra terram fructus gerens. Boerh. lugdb. 2. p. 28.

Glycine foliis ternatis, pedicellis bracteatis. Gron. virg. 127.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 571.

Verschiedenblütige Glycine. W.

Habitat in Americae septentrionalis umbris madidis.

⊙ (v. f.)

Caulis retrorsum griseo-pilosus. Stipulae ovatae, erectae. Racemi nutantes, multiflori: Flores facie Viiae Craccae: Vexillo pallide violaceo; Alis Carinoque albis; Staminibus Pistilloque instructi, sed, effetu Masculi absque fructu. Pedunculi inferiores longiores, dependentes, uniflori: Flos Calycis et Pistilli rudimento, sed mutilatus apetalus, e quo Legumen se-

mine uno alterove; adeoque nuptiae leges ut in Viola mirabili.

Sub terra etiam fructificat, ut Lathyrus subterraneus.

* 5. GLYCINE *angulosa*.

G. foliis ternatis, foliolis lateralibus bilobis, terminali parabolico, pedunculo foliis longiore, floribus capitatis. W.

Glycine angulosa. *Mühlens. in litt.*

Eckige Glycine. W.

Habitat in Pensylvania. (v. f.)

Caulis forte decumbens. Folia petiolata ternata. Foliola glabra sesquipollicaria ovata obtusa mucronata, lateralia biloba, terminale parabolicum obsolete trilobum. Petioli bipollicares. Pedunculus axillaris quinquepollicaris folio longior. Flores 5 f. 7 capitati. W.

6. GLYCINE *triloba*. +

G. foliis ternatis; foliolis lobatis, caule prostrato, pedunculis bitloris. *Mant. 516.*

Phaeoleolus maderaspitanus, caulinis pilosis, scandens, passiflorae modo trilobatus. *Pluk. alm. 292. t. 120. f. 7.*

Dolichos tribolatus. *Mant. I. p. 101.*

Houttuyn Lin. Pfl. Synt. 8. p. 512.

Dreylappige Glycine. W.

Habitat in India. ○

Pedunculi subbiflori. Flores lutei, parvi. Leguminis cylindrica. Caules prostrati. Tota planta prostrata, nec scandens.

* 7. GLYCINE *villosa*.

G. foliis ternatis trilobis villosis, racemis axillaribus.

Thunb. jap. 283.

Zottige Glycine. W.

Habitat in Japonia.

Caulis filiformis angulatus volubilis flexuosus uti tota planta tomentosus. Folia petiolata ternata. Foliola omnia imprimis terminale, triloba acuta nervosa semipollicaria, intermedium majus et longius petiolatum. Flores axillares racemosi. Racemus peduncula-

tus, floribus 2, 4 seu 5. Legumen etiam tomentosum.
Thunb. l. c.

8. GLYCINE *javanica.*

G. foliis ternatis, caule villosa, petiolis hirsutis, bracteis lanceolatis minutis Sp. pl. 1024. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 340.

Houttyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 573.

Javanische Glycine. W.

Habitat in India orientali, Japonia.

Caulis volubilis Ph. seoli, adspersus pilis flavis retroflexis. Folia Phaseoli. Pedicelli flavi pilis densis. Stipulae ad petiolos ovali oblongae, ad pedunculos vero lanceolatae. Pedunculi longitudine foliorum, terminati. Spica ovato oblonga, densa: Floribus nutantibus, violaceis, interstinctis Bracteis minutissimis.

*9. GLYCINE *angustifolia.*

G. caule fructuoso volubili, foliis ternatis, foliolis linear-lanceolatis sericeis, floribus axillaribus solitariis, leguminibus dispermis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 55. t. 231.*

Schmalblättrige Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

Caulis volubilis teres. Foliola linear-lanceolata obtusiuscula sericea. Stipulae ovatae acutae. Pedunculi axillares brevissimi uniflori. Flores flavi. Legumen semipollicare oblongum teres dispermum mucronatum. Semina nigra hilo cinereo. W.

*10. GLYCINE *heterophylla.*

G. foliis ternatis glabris oblongis linearibusque, floribus umbellatis, caule decumbente. Thunb. prod. 131.

Verschiedenblättrige Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

II. GLYCINE *argentea.*

G. foliis ternatis argenteis, floribus umbellatis, caule volubili. Thunb. prod. 131.

Ononis (*argentea*) volubilis, pedunculis muticis umbellatis, foliis ternatis, foliolis sessilibus argenteo-tomentosis. Lin. suppl. 324.

Silberfarbene Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. O

* 12. GLYCINE glandulosa.

G. foliis ternatis reticulatis, foliolis ovatis glabris, pedunculis lateralibus unifloris, caule decumbente.
Thunb. prod. 131.

Driinge Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

* 13. GLYCINE totta.

G. foliis ternatis reticulatis, foliolis ovatis ciliatis, caule decumbente. Thunb. prod. 131.

Hottentotten Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h.

* 14. GLYCINE erecta.

G. foliis ternatis villosis, foliolis oblongis, floribus umbellatis, caule erecto. Thunb. prod. 131.

Aufrechte Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

15. GLYCINE comosa. +

G. foliis ternatis hirsutis, racemis lateralibus. Sp. pl.

1024. Gron. virg. 107.

G. foliis ternatis. Gron. virg. I. p. 85.

Phaseolus marianus scandens, floribus comosis. Pet. muf. 455.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 573.

Schopfartige Glycine. W.

Habitat in Virginiae umbrosis madidis.

Flores coerulei. Semina maculis purpureis.

* 16. GLYCINE umbellata.

G. foliis ternatis ovatis glabris, pedunculis umbellatis petiolo longioribus, leguminibus linearibus. W.

Glycine umbellata. Mühlenberg in litt.

Doldenblütige Glycine. W.

Habitat in Pennsylvania. 24 (v. f.)

Caulis volubilis parce pilosus. Folia alterna ternata. Foliola ovata acuminata mucronata glabra, lateralia sesquipollucaria, intermedium bipollucare. Petiolus uncialis subpilosus. Stipulae parvae oblongae acutae. Pedunculus axillaris petiolo longior apice floribus 3, 4 vel 5 umbellatim positis instructus. Legumen lineare acutum. W.

* 17. GLYCINE *sericea*.

G. foliis ternatis ovatis retusis subtus sericeis, racemis folio longioribus. W.

Seidenartige Glycine. W.

Habitat in Guinea. ḥ (v. f.)

Caulis volubilis teres. Folia ternata alterna. Foliola ovata obtusa retusa mucronata, superne glabra subtus sericea. Racemi foliis longiores. Flores in sicco specimine rubicundi. Legumina immatura linearia acuminata sericea alba. Habitus Clitoriae sed vexillum angustum oblongo-ovatum reflexum. W.

* 18. GLYCINE *tenuiflora*.

G. foliis ternatis oblongis mucronatis nitidis subtus pilosis, racemis axillaribus filiformibus, leguminibus linearibus compressis. W.

Glycine tenuiflora. Klein in litt.

Dünndlütige Glycine. W.

Habitat in collibus Indiae orientalis prope Pondicherry. ḥ (v. f.)

Caulis volubilis teres. Folia alterna ternata. Foliola oblonga pollicaria vel sesqui-pollicaria obtusa, quandoque retusa, mucronata superne glabra, seniora nitida inferne pilis minutissimis adpresso tecta. Racemi filiformes foliis longiores. Flores parvi magnitudine Ervi tetraspermi geminati remoti brevissime penduculati. Bractae oblongae minutae. Legumina sesquipollicaria linearia compressa acuta subfalcata pilis sparsis minutis adpresso tecta. W.

* 19. GLYCINE *parviflora*.

G. foliis ternatis oblongo-ovatis acutis subtus pilosis, racemis folio brevioribus, leguminibus linearibus compressis uncinato-mucronatis. W.

G. (*parviflora*) volubilis, foliis ternatis ovatis subhirsutis, racemis axillaribus, leguminibus linearibus apice uncinato-mucronatis. Lamarck encycl. 2. p. 729. *

Kleinblütige Glycine. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis volubilis teres filiformis. Folia alterna ternata. Foliola oblonga ovata, pollicaria vel sesquipollicaria, acuta, supra glabra, infra pilis sparsis ad-

pressis tecta. Racemi filiformes sex-vel octoflori, foliis breviores. Flores geminati magnitudine praecedentis. Legumina sesqui-vel biuncialia linearia compressa pilis raris adpressis obsita, mucrone uncinata terminata. W.

*20. GLYCINE *debilis*. +

G. foliis ternatis, foliolis ovalibus subtus pilosis, leguminibus subfolitariis linearibus polyspermis, stylo persistenti recto. Ait. Kew. 3. p. 34.

Schwache Glycine. W.

Habitat in India orientali. ♂.

*21. GLYCINE *hedyaroides*. W.

G. foliis ternatis ovatis obtusis mucronatis subtus pilosis, floribus axillaribus subquinis, leguminibus linearibus. W.

Hahnenkopfartige Glycine. W.

Habitat in Guinea. ♂ (v. f.)

Caulis fruticosus erectus tomentosus, ramis subvolubilibus. Folia ternata. Foliola oblongo-ovata pollicaria obtusa mucronata superne glabra subtus pilis adpressis tecta. Flores axillares aggregati 2-5 brevissime pedunculati. Legumina linearia compressa sesquipollicaria apicem versus latiora, mucrone obtuso erecto. W.

*22. GLYCINE *phaseoloides*.

G. foliis ternatis subtus villosis, racemis terminalibus. Swartz prod. 125.

G. sylvestris scandens, foliis pinnato-ternatis, floribus spicatis, siliquis bispermibus medio coarctatis. Brown. jam. 298.

Phaseolus florum spica pyramidata, semine coccineo, nigra macula notato. Plum. cat. 12.

Bohnenartige Glycine. W.

Habitat in Jamaica, Hispaniola. ♂

*23. GLYCINE *lucida*.

G. volubilis, foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis integrerrimis, racemis terminalibus glandulosis, pedicellis ternis, leguminibus inflatis dispermis. Forst. prod. n. 272.

Glänzende Glycine. W.
Habitat in Societatis insulis.

24. GLYCINE *labialis.*

G. volubilis, foliis ternatis obovatis subcanis, floribus axillaribus congestis, corolla subbilabiata. *Lin. suppl. 325.*

Lippenartige Glycine. W.

Habitat in India orientali. t.

Caulis volubilis crassitie filii. Folia ternata petiolata, foliolis obuvatis obtusis aequalibus, vix subtus tomentosis. Stipulae nullae. Flores congesti in axillis, pedunculo brevissimo. Calyx tubulosus quinquedentatus subaequalis. Corolla alba magnitudine lantis. Vexillum emarginatum erectiusculum lateribus revolutum albido. Alae deflexae in labium, latere interiori extrorsum verso incarnato. Carina subrotunda brevis dipetala, apice cohaerens, hinc flos labiatus. Stamina diadelpha. Antherae luteae, paucae perfectae. Stylos brevis. Stigma obtusum. Legumen lineare compressum quasi articulatum, mucrone erecto, si futuram superiorem respicias, rigido. Semina septem ad novem subrotunda compressa flava.

25. GLYCINE *tomentosa.*

G. foliis ternatis tomentosis, racemis axillaribus brevissimis, leguminibus dispermis. *Gron. virg. 106. Mill. dict. n. 5.*

Ononis caule volubili. *Gron. virg. I. p. 31.*

Anonis phaseoloides scandens, floribus flavis sessilibus. *Dill. elth. 30. t. 26. f. 29.*

β Dolichos (*pubescens*) volubilis, caule pubescente, leguminibus ternis subsessilibus compressis pilosis nutantibus. *Spec. 2. p. 1021.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 573.

Filzige Glycine. W.

Habitat in America boreali. 24 (v. f.)

Dolichos pubescens forte hujus est varietas, quem vexillum non sit reflexum. Statura var. β est Phaseoli vulgaris, sed tota plantà mollior, pubescens. Foliola supra nudiuscula: intermedio subrhombœ; lateralibus extus gibbis, intus lanceolatis. Flores axillares, ter-

*ni, sessiles, albo - flavescentes macula fusca in vexillo.
Legumina oblonga. pubescentia, parum recurvata.*

*26. GLYCINE reticulata.

G. foliis ternatis ovato - rhombeis pubescentibus, subtus reticulato - venosis tomentosis, racemis axillaribus, leguminibus subpubescentibus, caule volubili. W.

G. foliis ternatis ovato - oblongis subrhomboides pubescentibus, subtus reticulato - venosis, racemis axillaribus subfessilis, leguminibus oblongis compressis. Vahl symb. 3. p. 88.*

G. foliis ternatis oblongo - lanceolatis pubescentibus subtus reticulato - venosis, racemis axillaribus subfessilis, leguminibus oblongis compressis. Swartz prod. 105. Ait. Kew. 3. p. 35.

Netzblättrige Glycine. W.

Habitat in Jamaica. h (v. f.)

Legumina pilis minutissimis adpresso obsoita. W.

*27. GLYCINE mollis. W.

G. foliis ternatis ellipticis utrinque obtusis pubescentibus, subtus reticulato - venosis tomentosis, pedunculis axillaribus unifloris, leguminibus villosis, caule volubili. W.

Weichblättrige Glycine. W.

Habitat in Guinea? (v. f.)

Folia molissima ternata petiolata. Foliola elliptica utrinque obtusa subtus tomentosa albida reticulato - venosa, lateralia uncialia, intermedium sesquunciale. Petiolus fere uncialis. Pedunculi axillares solitarii uniflori petiolo dimidio breviores. Legumina oblonga octolinearia pilis patentibus rufis tecta trisperma. Simum illa G. reticulatae, sed foliolis ellipticis utrinque octusis, pedunculis unifloris, leguminibus villosis trispermis distincta. W.

*28. GLYCINE picta.

G. foliis ternatis lanceolatis pubescentibus, subtus reticulato - venosis tomentosis, racemis axillaribus, leguminibus villosis, caule erecto. W.

G. (picta) foliis ternatis lanceolatis villosis, racemis axillaribus pedunculatis, caule erecto fruticoso. Vahl symb. 2. p. 81.*

Cytisus (violaceus) foliis ternatis oblongis angustis hir-

sutis supra viridibus subtus rufescentibus, leguminibus compressis. *Aubl. guj. 2. p. 766. t. 306.**

Bunte Glycine. W.

Habitat in pratis Gujanæ inque insula Trinitatis. ḥ

*29. GLYCINE cana.

G. foliis ternatis subrotundo-ovatis subtus tomentosocanis, pedunculis axillaribus bifloris, leguminibus oblongis glabris, caule erecto. W.

Habitat in India orientali. ḥ (v. f.)

Caulis erectus ramosus pubescens. Folia alterna ternata. Foliola subrotundo-ovata obtusa brevissime mucronata superne tenuissime pubescentia, subtus tomentoso-cana, uncialia, lateralia minora. Petiolus uncialis. Pedunculi biflori petiolo breviores. Legumen oblongum glabriuscum dispermum. W.

30. GLYCINE suaveolens.

G. foliis ternatis ovatis acutis poloſo-viscosis, pedunculis articulatis uni-biflorisve leguminibus oblongis, caule erecto. W.

G. fruticosa erecta incana, foliis ternatis ovatis acutis, floribus axillaribus solitariis, leguminibus dispermibus.

Lin. suppl. 326.

Wohiriechende Glycine. W.

Habitat inter rupes prope Madras. ḥ (v. f.)

Frutex totus incanus viscosus et suaveolens. Folia petiolata. Stipulae subulatae. Pedunculi axillares erecti filiformes, in medio articulati et bracteati uniflori. Bracteae binae subulatae caducae. Flores cernui. Calyx campanulatus quadripartitus. Laciniae subulatae, superior bifida. Vexillum orbiculatum erectum flavum, supra unguem siriis sanguineis pictum. Carina Indigoferae. Stamina diadelpha. Stigma obtusum planum. Legumen compressum lineare breve, nt fere rhombeum incanum, sulco transversali dispermum. Semina nigra glabra, corculo calloso albidio.

31. GLYCINE striata

G. volubilis, foliis ternatis oblongis mollissime incanis, racemis axillaribus foliorum longitudine, leguminibus hirsutissimis. *Lin. suppl. 326. Jacq. hort. I. p. 37. t. 76.*

Gestreifte Glycine. W.

Habitat in America torrida.

* 32. GLYCINE *caribaea*.

G. foliis ternatis ovato-rhombeis subtus resinoso-punctatis, racemis folio longioribus, leguminibus acinaciformibus dispermis hirsutis, caule volubili. W.

G. (caribaea) foliis ternatis subvillotis, foliolis rhombeis, racemis patulis, leguminibus hirsutis, caule fruticoso volubili. *Jacq. ic. rar. I. t. 146. Collect. I. p. 66.**

Caraibische Glycine. W.

Habitat in Caribaeis. ♀ (v. v.)

Foliola subrotundo-ovata rhombea superne pilis raris adpresso tecta, subtus punctis resinosis, sub lente visibilibus obsita. Flores flavi. Legumina parva compressa acinaciformia disperma uncialia. W.

33. GLYCINE *bituminosa*.

G. foliis ternatis, floribus racemosis, leguminibus tumidis villosis. Sp. pl. 1024.

G. foliis ternatis pubescentibus, floribus racemosis, leguminibus hirsutis. Thunb. prod. 131.

Phaseolus africanus hirsutus bituminosus, siliquis bullatis, flore flavo. Herm. lugdb. 492. t. 493.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 574.

Harzige Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♀ (v. v.)

Caulis volubilis, obtusangulus, pubescens. Foliola ovata, glabra, subtus subpubescentia. Stipulae ovatae, acuminatae, nervosae. Racemi axillares, folio longiores, pubescentes. Corollae luteae, strictae, extus apiceque carinae violaceae, obtusissimae Hedyari. Stamina diadelpha, non Ononidis. Legumina hirta, bullata Crotolariae.

* 34. GLYCINE *secunda*.

G. foliis ternatis subtus scabris, floribus racemosis secundis. Thunb. prod. 131.

Einseitige Glycine. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

* 35. GLYCINE *rosea*. +

G. volubilis, foliis ternatis, foliolis cordato-ovatis acu-

tis integerrimis, pedunculis trifloris, leguminibus compressis carinatis monospermis. *Forst. prod. n. 271.*
Rosenfarbene Glycine. W.

Habitat in insulis Societatis.

*36. GLYCINE rubicunda.

G. foliis ternatis oblongis subtus sericeis, pedunculis trifloris, caule volubili fruticoso. W.

G. (*rubicunda*) caule perenni volubili, foliis ternatis foliolis subovalibus integerrimis, pedunculis subtrifloris. *Curt. mag. 268 **

Dunkelrothe Glycine. W.

Habitat in Nova Hollandia. h (v. v.)

Foliola oblonga obsufuscata subtus pilis adpressoſſe-
ricea, praefertim juniora. Corolla purpurea uncia-
lis. W.

*37. GLYCINE coccinea.

G. foliis ternatis subrotundis undulatis subtus villosis,
pedunculis unifloris, caule volubili fruticoso. W.

G. (*coccinea*) foliis ternatis, foliolis subrotundis undu-
latis. *Curt. mag. 270.*

Scharlachrothe Glycine. W.

Habitat in Nova Hollandia. h (v. v.)

Caulis volubilis. Folia ternata petiolata. Foliola
semipollicaria subrotunda obtusa margine undulata
superne glabriuscula, inferne villosa, intermedio lon-
ge petiolato. Petiolus pilosus pollicaris. Stipulae
cordatae acutae. Pedunculi uniflori axillares fere lon-
gitudine petioli vel breviores, medio articulati et
Bractea amplexicauli dentata instructi. Corolla coc-
cinea, vexillo basi maculis binis flavis notato. W.

*38. GLYCINE rhombifolia. W.

G. foliis ternatis subrotundo-rhombeis glabris, subtus
resinoso-punctatis, racemis secundis folio longioribus,
leguminibus oblongis dispermis, caule volubili. W.

Ranthenblättrige Glycine. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis volubilis. Folia ternata petiolata. Foliola
subrotundo-rhombea acuta glabra subtus punctis fla-
vis resinosis conspersa, lateralia semipollicaria, inter-
medium longe petiolatum majus. Stipulae subulatae.
Racemi axillares tripollicares octo-vel decemflori se-

cundi. Legumina semipollicaria oblonga acuta compressa glabra disperma. W.

*39. GLYCINE punctata. W.

G. foliis ternatis obovatis retusis pellucidō - punctatis, racemis longitudine foliorum, caule volubili. W.

Punctirte Glycine, W.

Habitat in insula St. Dominici. (v. f.)

Habitus Medicaginis. Caulis volubilis. Folia ternata. Foliola trilinearia obovata retusa glabra more Hyperici punctis diaphanis conspersa. Racemi vix foliis longiores sex - vel octoflori. Pedunculi filiformes, bractea minutissima oblonga basi suffulti. W.

40. GLYCINE Nummularia.

G. foliis ternatis obtusissimis, racemis floribus geminis, leguminibus sessilibus suborbiculatis compressis. Mant. 571.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 575.

Kreisblättrige Glycine. W.

Habitat in India orientali.

Caulis herbaceus, volubilis, angulatus, pubescens. Foliā alterna, remota, ternata, pubescentia. Foliola cuneato-orbiculata, aequalia, obtusissima, latiora quam longa, subpubescentia; lateralia sessilia. Petioli longitudine foliorum. Stipulae ovatae, deciduae. Pedunculi axillares, solitarii, filiformes, foliis longiores, exstantes, simplicissimi. Flores trium parium, remotissimi, sessiles, reflexi, parvi. Legumina orbiculata, styllo mucronata, compressissima, magnitudine Seminis Lupini albi, monosperma, sessilia in pedunculo communi.

*41. GLYCINE floribunda. W.

G. foliis impari-pinnatis undenis ovatis, racemis folio longioribus, caule frutescente volubili. W.

Dolichos polystachyos. Thunb. jap. 281. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 563. t. 64. f. 2.

Blüthenreiche Glycine. W.

Habitat in Japonia. ৎ

A Dolicho physiachyo certe diversissima. W.

42. GLYCINE *Apios*.

G. foliis impari-pinnatis septenatis ovato-lanceolatis, racemis folio brevioribus, caule herbaceo volubili. W.

G. foliis impari-pinnatis ovato-lanceolatis: foliolis septenatis. *Hort. upf.* 227. *Mill. dict. n. 1.* *Willd. arb.* 135.*

G. radice tuberosa. *Hort. cliff.* 365. *Gron. virg.* 107. *Roy. lugdb.* 391.

Apios americana. *Corn. canad.* 200. t. 201. *Stiff. bot.* 29. t. 29.

Astragalus perennis spicatus americanus scandens caulis, radice tuberosa. *Morif. hist.* 2. p. 102. f. 2. t. 9. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 576.

Knollige Glycine. W.

Habitat in Virginia. ○ (v. v.)

Genus dubium, forte proprius Astragalus, sed corolla diversa, imprimis carina lineari maxime falcata. Flores atropurpurei: modo reliquis congener.

43. GLYCINE *frutescens*.

G. foliis impari-pinnatis novenis ovatis, racemis bracteatis, caule frutescente volubili. W.

G. foliis impari-pinnatis, caule perenni. *Hort. cliff.* 361. *Roy. lugdb.* 391. *Mill. dict. n. 2.*

G. foliis impari-pinnatis, caule perenni, spica terminata alopecuroidaea. *Lamarck encycl.* 2. p. 730.*

Phaseoloides frutescens caroliniana, foliis pinnatis, floribus coeruleis conglomeratis. *Hort. angl.* 55. t. 15.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 576.

Strauchartige Glycine. W.

Habitat in Carolina. δ

Legumen uti praecedentis bilocularē.

*44. GLYCINE *bimaculata*.

G. foliis simplicibus evato-lanceolatis obtusis mucronatis, floribus racemosis, caule volubili fruticoso. W.

G. (*bimaculata*) caule volubili laevi, foliis simplicibus cordato-oblongis, racemis multifloris. *Curt. mag.* 263.

Zweifleckige Glycine. W.

Habitat in Nova Hollandia. δ (v. v.)

Caulis volubilis fruticosus. Folia simplicia ovato-lanceolata, basi rotundata, apice obtusa mucronata, glabra, subtus subpubescentia, tripolligaria. Petioli unciales versus folii basin stipulis binis subulatis brevibus muniti. Racemi multiflori, pedunculis geminatis, bi- vel tripolligares terminales et axillares, quandoque compositi. Corolla coerulea, vexillo maculis binis virecentibus notato. W.

*1351. CYLISTA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1759.

Cal. 4-fidus corolla major, lacinia suprema apice bifida, infima maxima. Cor. persistens. Legumen subdispermum.

*I. CYLISTA scariofa.

C. scariofa. Roxb. corom. I. p. 64. t. 92.
Ostindischer Kelchbeutel. W.*

Habitat in montibus Coromandeliae. ḥ

Caulis volubilis fruticosus. Folia ternata Phaseoli pubescentia. Stipulae parvae lanceolato subulatae. Racemi axillares longitudine foliorum. Calyces virides venosi. Corolla lutea. W.

Cylista villosa Ait. Kew. 3. p. 36. est mihi ignota, hinc differentiam indicare non potui. W.

1352. CLITORIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1183.

Cor. supinata: vexillo maximo patente alas obumbrante.

I. CLITORIA Ternatea.

C. foliis quinato-pinnatis, pedunculis axillaribus unifloris. W.

*C. foliis pinnatis. Hort. cliff. 360. Hort. upf. 214.
Fl. zeyl. 283.* Mill. dict. n. I.*

Flos coerules. Rumph. amb. 5. p. 56. t. 31.

Schlunga-Cuspi. *Rheed. mal.* 8. p. 69. t. 38.

β Flos Clitoridis ternatenibus. *Breyn cent.* 67. t. 31.

γ Phaseolus indicus glycyrrhizae foliis, flore ampio coeruleo pleno. *Comm. hort.* 1. p. 47. t. 24.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 579.

Molukkische Clitorisblume. W.

Habitat in India orientali. 2 (v. f.)

Flores *Hyleranthi*.

Varietas α est major, foliis oblongis obtusis; in β folia ovata acuta minora; γ vero habet flores plenos. Variat etiam floribus coeruleis et albis. W.

* 2. CLITORIA multiflora.

C. foliis pinnatis multijugis subtus sericeis, racemis axillaribus multifloris. W.

C. foliis pinnatis, foliolis subtus sericeis, racemis axillaribus multifloris. *Swartz prod.* 106.

Vielblütige Clitorisblume. W.

Habitat in Domingo. 3 (v. f.)

3. CLITORIA brasiliiana.

C. foliis ternatis, calycibus solitariis campanulatis. *Hort. upf.* 215. *Mill. dict.* n. 2.

C. foliis ternatis. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugd.* 369.

Planta leguminosa brasiliiana, phaseoli flore purpureo maximo. *Breyn cent.* 78. t. 32.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 579.

Brasilische Clitorisblume. W.

Habitat in Brasilia.

4. CLITORIA virginiana.

C. foliis ternatis, calycibus geminis campanulatis. *Sp. pl.* 1026. *Gron. virg.* III. *Swartz obs.* 282.*

C. major scandens, floribus geminatis. *Brown jam.* 298.

Clitorius trifolius, flore minore coeruleo. *Dill. elth.* 90. t. 76. f. 87.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 580.

Virginische Clitorisblume. W.

Habitat in Virginia, Jamaica. 2 (v. v.)

Clitoria amoena Roth catalect. 2. p. 92. t. 3. est sola hujus speciei varietas. Vidi plures varietates,

foliis angustioribus latioribusque, corollis coeruleis et albis, vexillis externe pubescentibus et glabriusculis. W.

5. CLITORIA *mariana*.

C. foliis ternatis, calycibus cylindricis. Sp. pl. 1026.

Gron. virg. III. Mill. dict. 4.

Clitorius marianus trifolius subtus glaucus. Pet. sicc. 243.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 580.

Maryländische Clitorisblume. W.

Habitat in America septentrionali. (v. f.)

6. CLITORIA *Galactia*.

C. foliis ternatis, racemo erecto, floribus pendulis. Sp. pl. 1026.

Galactia foliis ovatis glabris pinnato-ternatis, spicis oblongis. Brown. jam. 298. t. 32. f. 2.

Phaseolus minor lactescens, flore purpureo. Sloan. jam. 71. hist. I. p. 182. t. 114. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 580.

Westindische Clitorisblume. W.

Habitat in Jamaica.

Perianthium quadridentatum: Lacinia superiore et inferiore majore, obtectum Bracteis duabus, minimis, deciduis. Corolla pentapetala: petalis omnibus oblongis angustis; Vexillo caeteris latiore incumbente. Stigma obtusum. Legumen teres. Semina subrotunda. Racemi floribus geminis pluribusve.

1353. P I S U M.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1184.

Stylus triangulus, supra carinatus pubescens. Calyx lacimiae superiores 2 breviiores.

I. PISUM *sativum*.

P. petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. Hort. upf. 215. Mill. dict. n. I. Ludw. ect. t. 169.

P. stipulis crenatis. Hort. cliff. 359. Mat. med. 172.

Pisum. Cam. epit. 213. Blackw. t. 83.

β Pisum hortense majus. Bauh. pin. 342.

γ Pisum sine cortice duriore. Bauh. pin. 343.

Pisum umbellatum. *Bauh. pin.* 344.

P. (umbellatum) stipulis quadrifidis acutis, pedunculis multifloris terminalibus. *Mill. dict. n. 3.*

¶ *Pisum (quadratum) majus quadratum.* *Bauh. pin.* 342.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 581.

Gemeine Erbse. W.

Habitat in Europae agris ⊖ (v. v.)
Foliola conduplicata.

2. PISUM arvense.

P. petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis unifloris. *It. w. goth. 107.* Fl. suec. 2. n. 638. Gunn. norv. n. 76. Hoffm. germ. 252. Roth. germ. I. 306. II. 172.*

P. pulchrum, folio anguloſo. *Bauh. hist. 2. p. 297. Morif. hist. 2. p. 47. f. 2. t. 1. f. 4.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 583.

Wilde Erbse. W.

Habitat inter Europae segetes ⊖ (v. f.)

3. PISUM maritimum.

P. petiolis supra planiusculis, caule angulato, stipulis sagittatis: pedunculis multifloris. *Fl. suec. 608. 640. It. w. goth. 190.* Mill. dict. n. 4. Flor. dan. t. 338. Roth. germ. II. 173.*

P. stipulis integrerrimis. *Hort. cliff. 368.*

P. marinum. *Raj. hist. 892. Fl. lapp. 272.*

P. spontaneum perenne repens humile. *Morif. hist. 2. p. 47. f. 2. t. 1. f. 5.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 583.

Meerstrands-Erbse. W.

Habitat in Europae, Canadae borealis litoribus maris arenosis. 24 (v. v.)

Europaea planta tota, excepta foliorum pagina superiore, leviter pubescens. Canadenis vero tota glabra et duplo major. Utraque foliolis convolutis.

4. PISUM Ochrus.

P. petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *Hort. cliff. 370. Hort. upf. 215. Mill. dict. n. 6. Kniph. cent. 10. n. 71.*

Ochrus folio integro capreolos emitte. *Bauh. pin.* 343.

Ervilia sylvestris. *Dod. pempt.* 522.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 584.

Italienische Erbse. W.

Habitat inter segetes Cretae, Italiae. ⊖ (v. v.)
Foliola convoluta.

1354. O R O B U S.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1185.

Stylus linearis. *Cal.* basi obtusus: laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.

1. OROBUS lathyroides.

O. foliis conjugatis subfessilibus, stipulis dentatis. *Hort. upf.* 220. *Gmel. fib.* 4. p. 12. *Pall. it.* 2. p. 559. *Mill. dict.* 6.

Lathyroides erecta, folio ovato acuminato, coeruleis viciae floribus et siliquis, sibirica. *Amm. ruth.* 151. t. 7. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 585.

Sibirische Walderbse. W.

Habitat in Siberia. 24 (v. v.)

2. OROBUS hirsutus.

O. foliis conjugatis petiolatis, stipulis integris. *Sp. pl.* 1027.

O. caule simplicissimo, foliolis binis ovatis. *Hort. cliff.* 366.*

O. latifolius repens, flore coeruleo, foliis et siliquis hirsutis. *Boerh. lugdb.* 2. p. 46.

O. sylvaticus, foliis circa caulem auriculatis. *Buxb. cent.* 3. p. 22. t. 41.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 586.

Orientalische Walderbse. W.

Habitat in Tracia. 24 (v. f.)

Tota planta hirsuta. Caulis pedalis basi subramosus erectus flexuosus angulato-siliatus. Folia conjugata petiolata ovata acuta nervosa venosa sesquipollucaria. Petiolus pollicaris. Stipulae sagittatae obliquae ovatae acuminatae integerrimae magnitudine fere foliorum. Racemi secundi foliis longiores 10-12-

flori. Calyces hirsuti, dentibus lanceolatis acuminatis longitudine fere corollae. W.

3. OROBUS luteus.

- O. foliis pinnatis quadri- vel quinquejugis oblongis sub-
tus glaucis, stipulis semisagittatis balii dentatis, caule
simplici. W.
- O. foliis pinnatis ovato-oblongis, stipulis rotundato-
lunatis dentatis, caule simplici. Sp. pl. 1028. Mill.
dict. n. 7.
- O. foliis ovato-lanceolatis, stipulis triangulis, caule ra-
moso herbaceo. Gmel. sib. 4. p. 13. t. 4.
- O. caule ramoso erecto, foliis ovato-lanceolatis. Hall.
helv. n. 419.
- O. foliis quinatis: foliolis ovato-oblongis, stipulis fe-
misagittatis, pedunculis longissimis, caule simplici.
Ger. prov. 492.
- O. alpinus latifolius. Bauh. pin. 351. prod. 149.
Burf. XIX. 151.
- O. sylvaticus pallido flore. Bauh. pin. 351.
- Galega montana Dalechampi. Bauh. hist. 2, p. 343.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 586
- Gelbe Walderbse. W.
- Habitat in Siberiae, Helvetiae, Veronae, Pyrenaeorum
alpinis. 24 (v. f.).*
- Caulis bicubitalis, simplex s. ramosus. Foliola sub-
tus glauca. Stipulae semifagittatae, integerimae,
minimae subrotundo-lunatae, aut dentatae. Flores lu-
tei. Turra.

4. OROBUS vernus.

- O. foliis pinnatis trijugis ovatis acuminatis, stipulis fe-
misagittatis integerimis, caule simplici. W.
- O. foliis pinnatis ovatis, stipulis semifagittatis integeri-
mis, caule simplici. Sp. pl. 1028. Mill. dict. n. 1.
Reyg. ged. 2. p. 115. Crantz austri. p. 373. Scop.
carn. n. 882. Gunn. norv. n. 236. Pallas it. 1. p.
160. Pollich. pal. n. 672. Riv. t. 58. Hoffm. germ.
253. Roth. germ. I. 305. II. 169.
- O. caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis acutis.
Hort. cliff. 366. Fl. suec. 595; 641. Roy. lugdb.
366. Hall. helv. n. 416.

O. sylvaticus purpureus vernus. *Bauh. pin.* 351. *Thal. herc.* 80. t. 6. *Blackw.* t. 208. f. 1. 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 587.
Frühlings-Walderbse. W.
Habitat in Europae borealis nemoribus. 24 (v. v.)
Variat flore albo, W.

5. OROBUS tuberosus.

O. foliis pinnatis tri-quadrijugisve lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule alato. W.
O. foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. Sp. pl. 1028. Mill. dict. n. 2. Scop. carn. n. 883. Weigel. pom. 459. Pollich pal. n. 673. Hoffm. germ. 253. Roth. germ. I. 305. II. 170.
O. caule simplicissimo, foliolis pluribus lanceolatis integris. Hort. cliff. 366. Fl. suec. 596; 642. Roy. lugdb. 366.
O. caule simplici, foliis senis, ellipticis, radice tuberosa. Hall. helv. n. 417.
O. foliis imis ovatis, superioribus lanceolatis, caule alato simplici. Crantz austr. p. 377.
O. radice tuberosa. Riv. t. 59. R.
Astragalus sylvaticus, foliis oblongis glabris. Bauh. pin. 351.
Astragalus sylvaticus. Thal. herc. 7. t. 1.
Lathyrus angustifolius, radice tuberosa. Loef. pruss. 138. t. 37.
β *O. (tenuifolius) caule inferne quadrangulo, superne alato, foliis bi- seu trijugis linearibus, stipulis semi-sagittatis.* Roth. germ. I. 305. II. 170. Hoffm. germ. 253.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 588.
Knollige Walderbse. W.
Habitat in Europae borealis pratis et sylvis 24 (v. v.)

6. OROBUS albus.

O. foliis bijugis ensiformibus petiolatis, stipulis simpli-cibus, caule simplici. Lin suppl. 327. Host. symb. 394.
O. (pannonicus) foliis bijugis sublinearibus, stipulis lanceolato-linearibus semisagittatis, caule simplici. Jacq. vind. 128. Kram. aust. I. p. 213. Jacq. aust. I. p. 25. t. 39.

O. (*austriacus*) foliis bi - seu trijugis erectis longe lanceolatis, radicibus tuberosis cylindricis. *Crantz austi.* 374.
t. I. f. I.

Weisse Walderbse. W.

Habitat in Austria, Pannonia, Sibiria. 24 (v. f.)

Radices tuberosae sessiles.

Simillimus O. angustifolio, sed folia petiolata nec subsessilia; flores albi nec lutei, racemi absque filo terminali, quod in O. angustifolio.

7. OROBUS angustifolius.

O. foliis bijugis ensiformibus, stipulis subulatis, caule simplici. *Sp. pl.* 1028. *Gmel. sib.* 4. p. 14. t. 5. *Pall.* it. I. p. 176.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 588.

Schmalblättrige Walderbse. W.

Habitat in Sibiria. 24

Habitus O. tuberosi, sed Folia ensiformi-lanceolata et pinnata ex 2 f. 3. oppositionibus absque cirrho. Racemi floribus paucis luteis.

8. OROBUS canescens.

O. caule ramoso, foliis bijugis linearibus, stipulis semisagittatis subulatis. *Lin. suppl.* 327.

Orobus angustifolius β *Syst. veg. ed.* 13. p. 550.

O. caule ramoso, foliis quaterno pinnatis linearibus, stipulis semisagittatis subulatis. *Ger. prov.* 493.

O. orientalis, foliis angustissimis costae brevissimae. *Tournef. cor.* 29.

Araci f. Apios leguminosae species tassano carolo. Bauh. hist. 2. p. 326.

Französische Walderbse. W.

Habitat in Gallia. 24

Similis O. angustifolio, sed caulis ramosus, flores albo-coerulei.

*9. OROBUS atropurpureus.

O. foliis subtrijugis linearibus, stipulis semisagittatis aristatis, caule tereti simplici. W.

O. (*atropurpureus*) caule tereti indiviso, foliis subtrijugis linearibus acutis, stipulis semisagittatis, floribus racemosis secundis nutantibus. *Desf. atl.* 2. p. 157. t. 196.*

Schwarzrothe Walderbse. W.

Habitat in arvis incultis Algeriae. 24 (v. f.)

Folia bi- vel trijuga linearia acuta. Stipulae semisagittatae, lobo laterali aristato. Flores atropurpurei.

A congeneribus florum colore stipulis aristatis et caule tereti striato abunde diversus. W.

10. OROBUS niger.

O. caule ramoso, foliis sexjugis ovato - oblongis. *Hort. cliff.* 366. *Fl. suec.* 597; 643. *Roy. lugdb.* 366. *Mill. dict. n. 4.* *Crantz aust.* p. 372. *Scop. carn. n. 884.* *Pollich pal. n. 674.* *Kniph. cent. 3. n. 69.* *Hoffm. germ.* 253. *Roth germ I.* 306. *II* 171.

O. caule ramoso, foliis ovatis duodenis. *Hall. helv. n. 418.*

O. sylvaticus, viciae foliis. *Bauh. pin.* 352. *Riv. t. 60.*

O. pannonicus 2. *Cluf. hist. 2. p. 230.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 589.

Schwarze Walderbse. W.

Habitat in Europae borealis montosis. 24 (v. v.)

Foliola convoluta.

11. OROBUS pyrenaicus.

O. caule ramoso, foliis bijugis lanceolatis nervosis, stipulis subspinosis. *Sp. pl.* 1029. *Mill. dict. n. 5.* *Scop. carn. n. 885.*

O. caule ramoso, foliis trijugis lanceolatis nervosis. *Sauv. monsp.* 235.

O. pyrenaicus, foliis nervosis. *Tournef. inst.* 235.

O. pyrenaicus latifolius nervosus. *Pluk. phyt.* 210. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 589.

Pyrenäische Walderbse. W.

Habitat in Pyrenaeis. 24

12. OROBUS sylvaticus.

O. foliis pinnatis hirsutis multijugis ovato - lanceolatis, stipulis semisagittatis, caule ramoso decumbente hirsuto. W.

O. caulibus decumbentibus hirsutis ramosis. *Syst. veg.* 550. *Lightfoot Scot.* I. p. 390. n. 2. t. 16.

O. caulis decumbensibus hirsutis ramosis, foliis numerosis. *Smith brit.* 2. p. 762. *

O. caule ramoso hirsuto decumbente, foliis subseptemjugis. *Amoen. acad.* 4. p. 284. n. 66. + *Sp. pl.* 2. p. 1029.

Vicia cassubica. *Fl. dan.* t. 28. secundum *Smith.*

O. sylvaticus nostras. *Raj. angl.* 3. p. 324. *hist.* 1892. *Act. parif.* 1706. p. 87. t. 90.

Houttuyn Lin. *Pfl. Syst.* 8. p. 590.

Liegende Walderbse. W.

Habitat in Anglia, Gallia. 24

Jcon Floraæ danicae huic simillima, sed omnes partes glabrae sunt, quod forte pictoris culpa. W.

* 13. OROBUS ochroleucus.

O. foliis pinnatis glabris multijugis ellipticis, stipulis ovato-lanceolatis, caule ramoso erecto hirsuto. W.

Orobos ochroleucus. *Waldstein et Kitaib.* pl. rar. hung.

Weißlichgelbe Walderbse. W.

Habitat in Hungaria. 24 (v. f.)

Caulis bipedalis erectus superne ramosus teres stria-
tus parce hirsutus. Folia pinnata multijuga. Foliola
12 vel 19 subopposita elliptica obtusa mucronata gla-
bra. Petiolus communis pilosus in apicem brevem ter-
minatus. Stipulae ovato-lanceolatae, nec semisagit-
tatae. Racemi axillares secundi longitudine foliorum
vel longiores. Corollae ochroleucae. Similis praece-
denti, sed notis indicatis diversissimus. W.

1355. LATHYRUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1186.

Stylus planus, supra villosus, superne latior. *Cal.*
laciniae superiores 2 breviores.

* *Pedunculis unifloris.*

1. LATHYRUS Aphaca.

L. pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagitta-
 to-cordatis. *Sp. pl.* 1029. *Mill. dict.* n. 13. ic. t. 43.

Scop. carn. n. 887. Pollich pal. n. 675. Mec. gallob. 305. Hoffm. germ. 253. Roth. germ. I. 306. II. 174.

L. aphyllus, stipulis sagittatis latissimis. Hall. helv. n. 442. L. cirrhis aphyllis. Hort. cliff. 367. Hort. upf. 218. Roy. lugdb. 392. Dalib. paris. 217.

Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. Bauh. pin. 345. Aphaba. Lob. ic. 2. p. 70.

Elatine 3. Tabernaem. p. 116. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 591.

Blattlose Platterbse. W.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia, Helvetia, Germania, inter segetes. ⊖ (v. v.)

Cirrhos interdum aliquis gerit Foliola conjugata, 2, lanceolata, reliquis Lathyris simillima, at hoc rarissime.

Variat pedunculis bifloris.

2. LATHYRUS Nissolia.

L. pedunculis multifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis. Sp. pl. 1029. Neck. gallob. 306. Scop. carn. n. 888. Roth. germ. I. 307. II. 174. Scholl. barb. n. 1013. Pollich pal. n. 676. Hoffm. germ. 254.

L. pedunculis unifloris, foliis gramineis, stipulis minimis. Hall. helv. n. 441.

L. foliis solitariis lentiformibns. Vir. cliff. 74. Hort. cliff. 566. Roy. lugdb. 263. Dalib. paris. 218.

L. sylvestris minor. Bauh. pin. 344.

L. angustifolius erectus, folio singulare, sine capreolis, nissoli. Magn. hort. 112. t. 112.

Nissolia parva, flore purpureo. Buxb. cent. 3. p. 84. t. 45. f. 1.

Nissolia vulgaris. Lindern. hort. 73. cum. ic.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 592.

Einfachblättrige Platterbse. W.

Habitat in Gallia, Anglia, Germania. etc. ⊖ (v. v.)

Cirri nulli. Caulis erectus, Stipulae minimae, subulatae.

3. LATHYRUS amphicarpos.

L. pedunculis unifloris calyce longiores, cirrhis diphyllis simplicissimis. Sp. pl. 1029. Mill. dict. n. 17.

L. amphicarpos f. *supra* infraque terram siliquas gerens.
Moris. hisp. 2. p. 51. f. 2. t. 23. f. 1.

L. edunculis unifloris, cirrhis diphyllic, radicibus etiam subterra fructificantibus. *Hort. cliff.* 367.* *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 262. *Sauv. monsp.* 192.

Viciae similis supra et infra terram siliquas gerens. *Bauh. pin.* 345.

Arachidna f. *Arachoides honorii belli*. *Bauh. hisp.* 2. p. 323.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 593.

Unterirdische Platterbse. W.

Habitat in Syria. ○

Non confundendus cum Vicia amphicarpa. W.

4. LATHYRUS Cicera.

L. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllic, leguminibus ovatis compressis: dorso canaliculatis. *Sp. pl.* 1030. *Mill. dict.* n. 2. *Scop. carn. ed.* 2. n. 891.

L. foliis lanceolatis, stipulis latissimis, scapis brevibus, unifloris, siliquis brevissime alatis. *Hall. helv.* n. 339.

L. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllic, foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv. monsp.* 193.

L. sativus flore purpureo. *Bauh. pin.* 344.

L. flore rubro. *Bauh. hisp.* 2. p. 507. R.

Aracus f. *Cicera*. *Dod. pent.* 523.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 594.

Rothe Platterbse. W.

Habitat in Hispania. ○ (v. f.)

Medius inter antecedentem et sequentem magnitudine. Petioli latere non membranacei. Corollae rubrae. Legumina dorso canaliculata, at non marginibus acutis, uti antecedens et insequens. Legumen latum, ovali-oblongum.

5. LATHYRUS sativus.

L. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllic tetraphyllisque, leguminibus ovatis compressis dorso bimarginatis. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 363. *Dalib. paris.* 216. *Sauv. meth.* 193.* *Mill. dict.* n. 1. *Scop. carn.* n. 889. *Neck. gallob.* p. 306. *Kniph. cent.* 5. n. 49.

- L. foliis geminis, gramineis, stipulis folii latitudine, petiolis unifloris, siliquis alatis. *Hall. helv.* n. 438.
 L. siliqua latiori. *Riv. t. 47. Hall.* R.
 L. angustifolio semine. *Bauh. hist. 2. p. 306. Hall.* R.
 L. annuus, flore coeruleo, ochri siliqua. *Herm. lugdb.* 357.
 B. L. sativus, flore fructuque albo. *Bauh. pin.* 343.
Lathyrus f. Cicercula. Dod. pempt. 522.
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 594.
 Elsbare Platterbse. W.
Habitat in Hispania, Gallia, Helvetia, etc. ⊙ (v. v.)

6. LATHYRUS inconspicuus.

- L. pedunculis unifloris calyce brevioribus, cirrhis diphyllis, simplicibus, foliolis lanceolatis. *Sp. pl. 1030. Jacq. hort.* 86.
 L. (*parviflorus*) pedunculis unifloris calyci aequalibus, petiolis diphyllis, foliolis lanceolatis, leguminibus linearibus scabriusculis mucronatis. *Roth. catal. 1. p. 88.*
 L. orientalis, flore vix conspicuo. *Boerh. lugd. 2. p. 42. Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 596.*
 Kleinblütige Platterbse. W.
Habitat in Oriente. ⊙ (v. v.)

Planta parva, spithamea f. *pedalis*. Caules obsolete triangulares. Stipulae subulato-lanceolatae: dente posito acuto. Petioli brevissimi: inferiores terminati seta subulata, brevissima; superiores in cirrhum filiformem elongati. Foliola bina. lanceolata, subitus striata, acuminata. Calyx minimus et stipulis brevior ex aliis petiolorum, pedunculo vix manifesto insidens. Corolla tam parva ut vix calyce longior, pallida. Legumen longitudine ferme foliorum, sed latius, glabrum, strictum.

7. LATHYRUS setifolius.

- L. pedunculis unitoris, cirrhis diphyllis, foliolis setaceo-linearibus. *Sp. pl. 1031. Allion. niceens. 143. Mill. dict. n. 3. Ger. prov. 495.*
 L. pedunculis unitoris, cirrhis diphyllis: foliolis linearibus, stipulis subulatis, caulis nudis. *Sauv. monsp. 193.*
 L. foliis angustis, floribus singularibus coccineis. *Seguver. 2. p. 82.*

L. baldi. *Riv. tetr.*

L. folio tenuiore, floribus rubris. *Bauh. hist.* 2. p. 308.

L. sylvestris major, angustissimo folio. *Bauh. pin.* 344.

L. angustissimo l. capillaceo folio. *Bauh. prodr.* 148.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 596.

Borstenblättrige Pflanze. W.

Habitat in Monspelii, in Baldo, Italia. ⊖ (v. f.)

Canes *subsolitarii*. Foliota *subavenia*. Stipulae *appendiculatae*. Petiolus *trifidus*, *stipula triplo longior*.

Legumen *ovatum*, *turgidum*. *Gerard.*

*8. LATHYRUS *sphaericus*.

L. pedunculis unifloris aristatis, cirrhis diphyllis simplissimis ensiformibus. *Retz. obs.* 3. p. 39.

L. (*axillaris*) pedunculis unifloris stipulis brevioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis, leguminibus teretiusculis subtorosi, longitudinaliter venosis. *Lamarek encycl.* 2. p. 698.*

Lathyrus coccineus. *Allion. ped.* I. n. 1222.

L. flore coccineo. *Raj. hist.* 896. n. 17.

L. foliis angustis, floribus singularibus coccineis. *Segu. veron.* 2. p. 82.

Rundsamoige Platterbse. W.

Habitat in Gallia *australi*, Italia. ⊖ (v. f.)

Planta annua tota glabra. Caulis angulatus, superne triquetus. Folia binata petiolata linearis-ensiformia acuta nervosa. Petioli superiores cirrhiferi, circrho simplicissimo. Stipulae lineares (*semisagittatae* W.) utrinque acutae. Pedunculi uniflori aristati. Flos parvus L. *Nisfoliae*. Legumen teretiusculum longitudinaliter rugosum longe acuminatum torulosum, dorso leviter carinato fusco-violaceo, polyspermum. Semina 10-12 *sphaerica* glabra fusca punctis obscurioribus adspersa. *Retz. l. c.*

9. LATHYRUS *angulatus*.

L. pedunculis unifloris aristatis, cirrhis diphyllis, simplicissimis, foliolis linearibus. *Sp. pl.* 1031. *Ger. prov.* 495. *Scop. carn.* n. 890.

L. foliis gramineis, petiolis unifloris setigeris, siliquis longis erectis. *Hall. helv.* n. 440.

L. pedunculis unifloris cirrhosis, foliolis linearibus, seminibus angulatis. *Dalib. paris.* 217.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllois, foliolis capillaceis. Sauv. monsp. 193.

Lathyrus angustissimo folio, semine angulofo. Tournef. inst. 395.

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. Buxb. cent. 3. p. 23. t. 42. f. 2.

Lathyrus angustifolius leptolobus, semine hexaëdro, flore caeruleo. Moris. blaef. 279.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 597.

Eckigfamige Platterbse. W.

Habitat in Gallia, Hispania, Oriente, etc. ⊖ (v. v.)

Caules multi. Foliola nervosa. Stipulae lanceolatae. Petiolus vix stipula longior. Legumen oblongum, compressum. Ger.

* IO. LATHYRUS tumidus.

L. pedunculis unifloris stipulis brevioribus, cirrhis diphyllois tetraphyllisque, stipulis dentatis, leguminibus erectis turgidis et villosis. Lamarck encycl. 2. p. 698.

Aufgeblasene Platterbse. W.

Habitat — — — — ⊖

Caules debiles septem-vel octopollicares simplices angulosi, juniores pubescentes. Folia inferiora binata subrotunda, vel ovato-rotundata. Petoli communes cirrho simplici terminati. Folia superiora quaterna ovata et ovato-lanceolata. Cirrhi bifidi. Stipulae semilunatae grosse dentatae. Pedunculi solitarii uniflori bilineares. Legumina erecta inflata ut in Ononde trisperma. Semina globosa. Lamarck l. c.

* II. LATHYRUS hirtus.

L. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllois, foliolis oblongo-ellipticis obtusis setula mucronatis, leguminibus piloso-hirtis. Lamarck encycl. 2. p. 698.

L. pratensis foliis viciae, flore purpureo. Buxb. cent. 3. p. 23. t. 43. f. 1? *sed folia obtusiora et legumina hirsutiora.*

Behaarte Platterbse. W.

Habitat — — — — ⊖

Caulis gracilis angulosus ramosus 5-f. 6-pollicaris. Cirrhi simplices superiores trifidi diphyllo. Folia oblonga obtusa setacea-mucronata. Stipulae lanceolatae

semisagittatae integerrimae. Pedunculi longi pilosi.
Corollae purpureo-violaceae. Legumina pollicaria
compressa pilosa. Semina 4 vel 5 globoſa. W.

12. LATHYRUS monanthos.

L. pedunculis unifloris aristatis, cyrrhis polyphyllis, foliolis linearibus truncatis mucronatis. W.

Ervum (*monanthos*) pedunculis unifloris. Sp. pl. 1040.
 Mill. dict. n. 3. Hoffm. germ. 257. Roth. germ. I.
 321. II. 221.

Vicia pedunculis unifloris, foliolis integerrimis, stipulis alternis dentatis. Hort. upf. 219.*

Lens monanthos. Herm. lugdb. 360.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 627.

Einblumige Platterbse. W.

Habitat in Asia ruthenica, Germania. ♂ (v. v.)
 Folia convoluta.

13. LATHYRUS articulatus.

L. pedunculis subunitloris, cirrhis polyphyllis, foliolis alternis lanceolatis, petiolis alatis. W.

L. pedunculis subunitloris, cirrhis polyphyllis, foliolis alternis. Hort. cliff. 368. Hort. upf. 217.* Roy.
 lugd. 363.

L. hispanicus. Mill. dict. n. 5. et ic. t. 96.

L. angustissimo folio, americanus variegatus. Bauh.
 pin. 344.

Clymenum hispanicum, flore vario, siliqua articulata.
 Tournef. inst. 396.

β. Lathyrus angustifolius humilior. Bauh. pin. 344.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 598.

Gegliederte Platterbse. W.

Habitat in Baetica, Monspelii. ♂ (v. v.)

Folia saepius tetraphylla; inferiores petioli lanceolati aphylli. Stipulae utrinque mucronatae. Florum carina Pisi, lateribus undulatis, nec obliqua Lathyri.
 Vexillum purpureum alis et carina albis.

† † Pedunculis bifloris.

14. LATHYRUS odoratus.

L. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. Hort. cliff. 368. Hort.
 upf. 216. Roy. lugdb. 363.

α . *Lathyrus sicutius*.

Lathyrus sicutius. *Rupp. jen.* 210.

L. distoplatifolios hirsutus mollis, magno et peramoeno flore odoro. *Comm. hort.* 2. p. 219. t. 80.

β . *Lathyrus zeylanicus*.

L. zeylanicus, odorato flore amoeno ex albo et rubore vario. *Burm. zeyl.* 138. *Kniph. cent.* 4. n. 37.

γ . *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 598.

Wohlriechende Platterbse. W.

Habitat α in Sicilia, β in Zeylona. \odot (v. v.)

Foliola involuta.

15. LATHYRUS annuus.

L. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis bipartitis. *Amoen. acad.* 3. p. 417. *Mill. dict.* n. 9.

L. hispanicus. *Riv. tetrap.* 158.

L. hispanicus flore luteo. *Herm. lugdb.* 357.

L. luteus latifolius. *Magn. monsp.* 150.

Lathyri species lutea. *Bauh. hist.* 2. p. 304.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 599.

Jährige Platterbse. W.

Habitat in Hispania, Monspelii. \odot (v. v.)

16. LATHYRUS tingitanus.

L. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis: foliolis alternis lanceolatis glabris, stipulis lunatis. *Roy. lugdb.* 263. *Mill. dict.* n. 8. *Jacq. hort.* t. 46. *Kniph. cent.* 5. n. 50. *Desf. atl.* 2. p. 160.*

L. tingitanus, siliquis orobi, flore ampio ruberrimo. *Morif. hist.* 2. p. 55.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 600.

Africanische Platterbse. W.

Habitat in Mauritania. \odot (v. v.)

*17. LATHYRUS subulatus.

L. pedunculis bifloris longissimis, cirrhis diphyllis simplicibus, foliolis linearis-subulatis villosis subtus nervoso-striatis. *Lamarck encycl.* 2. p. 699.

β . *pedunculis trifloris*. *Lamarck l. c.*

Pfriemenartige Walderbse. W.

Habitat in monte Video Brasiliae.

Caules debiles quadri-vel quinquepollicares villosi

simplices vel ramosi caespitosi. Foliola bina linearis-subulata villosa erecta pollicaria subtus nervosae striata. Petiolus communis in foliis inferioribus apice mucronatus, in superioribus cirrho simplici terminatus. Stipulae ut folia linearis subulatae basi auriculatae. Pedunculi longissimi erecti axillares avice floribus binis purpureis numerosibus instructi. Similis *L. tomentosum* sed multo minor, foliis erectis et cirrhis simplicissimis. Lamarck l. c.

18. LATHYRUS Clymenum.

L. pedunculis bifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis lanceolatis, stipulis dentatis. W.

L. pedunculis bitoris, cirrhis polyphyllis, stipulis dentatis. Hort. cliff. 368. Hort. upf. 217. Roy. lugdb. 364. Desf. atl. 2. p. 160.*

L. vicioides, vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus coeruleis. Moris. hist. 2. p. 46. Pluk. phyt. 114. f. 6.

Clymenum hispanicum, flore vario, siliqua plana. Tournef. inst. 396.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 600.

Orientalische Pflanze. W.

Habitat in Mauritania, Oriente. ☺

*19. LATHYRUS tenuifolia.

L. pedunculis subbifloris, petiolis alatis, inferioribus aphyllis, superioribus polyphyllis, foliolis linearibus. Desf. atl. 2. p. 160.

Dünnblättrige Platterbse. W.

Habitat in Algeria.

Planta glaberrima. Caules graciles alati bipedales et ultra decumbentes nonnumquam ramosi. Petioli alati, inferiores aphylli linearis-lanceolati acuti, foliolo similes, in cirrhum simplicissimum abeuntes, superiores ditetra aut hexaphylli, foliolis alternis remotis linearibus acutis. Cirrhi ramosi. Stipulae semihaftatae, inferiores minimae acutae, superiores latae foliaceae. Pedunculi filiformes uni-aut biflori. Calyx quinque-dentatus, dentibus acutis. Corolla coerulea magnitudine *L. sativi*. Legumen glabrum oblongum compressum. Desf. l. c.

† † † *Pedunculis multifloris.*

20. LATHYRUS hirsutus.

L. pedunculis subtrifloris, cirrhis diphyllis, foliis lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *Syst. Veg.* 552. *Pollich. pal.* n. 677. *Hoffm. germ.* 254. *Roth. germ.* I. 307. II. 175.

L. foliis geminis, ellipticis, floribus solitariis et geminis, siliquis hirsutis. *Hall. helv.* n. 437.

L. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis linearilanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *Spec. pl.* 2. p. 1032. *Roy. lugd.* 368. *Dalib. paris.* 216. *Sauv. monsp.* 113. *Mill. dict.* n. 7.

L. angustifolius, siliqua hirsuta. *Bauh. pin.* 344.

L. siliqua hirsuta. *Bauh. hist.* 2. p. 305. *Riv. tetr.* t. 41.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 601.

Haarige Platterbse. W.

Habitat inter Angliae, Galliae, Germaniae etc. Segetes. ○ (v. v.)

Pedunculi saepius triflori sunt. Flores purpurei.

***21 LATHYRUS magellanicus.**

L. pedunculis longis multifloris, stipulis latis cordato-sagittatis, cirrhis diphyllis. *Lamarck encycl.* 2. p. 700.

Magellanische Platterbse. W.

Habitat ad fretum Magellanicum.

Planta glabra exsiccatione nigrescens more Orobi, similis Lathyris europaeis, sed stipulis folio latioribus distincta. Caulis pedalis parum ramosus non alatus. Stipulae subcordatae fere sagittatae iis L. Aphaca simillimae. Foliola bina ovata vel ovato-oblonga pollicaria. Cirri multifidi. Pedunculi axillares 3-f. 6-pollicares tri-vel quadriflori. Calyx glaber, dente superiore brevissimo. Lamarck l. c.

22. LATHYRUS nervosus.

L. pedunculis multifloris spicatis, stipulis sagittatis, cirrhis diphyllis, foliolis ovato-acutis nervosis glaberrimis. *Lamarck encycl.* 2. p. 700.

Nervige Platterbse. W.

Habitat in monte video Brasiliae.

Planta omnibus partibus glaberrima, satis distincta stipulis foliolisque nervosis ut in Borbonia cordata. Caulis pedalis plerumque simplex, glaber striatus, internodiis folio brevioribus. Folia bina subsessilia lato-ovata acuta glabra nervosa reticulata. Petiolus communis longitudine lineae cirrho trifido terminatus. Stipulae sagittatae nervosae magnae. Pedunculi axillares solitarii bipollicares 5-vel 6-flori. Legumen lineare bipollicare glabrum 7-f. 8-spermum. Lam. l. c.

* 23. LATHYRUS sericeus.

L. pedunculis multifloris; cirrhis diphyllis brevissimis simplicibus, foliolis linearibus, stipulis longitudine foliorum. Lamarck. encycl. 2. p. 700.

Seidenartige Platterbse. W.

Habitat in monte Vide Brasiliae.

Tota planta tomento sericeo rufescente tecta. Caulis sexpollicaris erectus simplex tomentosus foliosus caespitosus, basin versus stipulis, superne foliis binatis instructus. Foliola linearia tomentoso-sericea tenuissime nervosa fere pollicaria. Petiolus communis cirrho sericeo uncinato simplici terminatus. Stipulae longitudine et figura foliorum basi semifagittatae. Pedunculi axillares solitarii pollicares sericei 5-f. 6-flori. Calyx tomentoso-sericeus. Lam. l. c.

* 24. LATHYRUS tomentosus.

L. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicibus et bifidis, foliolis linearibus, leguminibus tomentosos-sericeis. Lam. encycl. 2. p. 700.

Filzige Platterbse. W.

Habitat in Bonaria.

Tomento sericeo ut praecedens sed minus copioso tectus. Caulis pedalis subangulatus vel striatus ramis brevibus alternis nonnullis instructus. Foliola linearia acuta fere bipollicaria subtus striato-nervosa parce villosa, juniora sericea. Petiolus foliorum inferiorum filo brevi incurvo, superiorum cirrho longo plerumque bifido instructus. Stipulae lanceolatae foliis latiores sed breviores basi semifagittatae. Pedunculi longi axillares solitarii floribus 4-f. 5. magnis subcapi-tatis apice instructi. Calyx quinquedendatus tomento

*sericeo rufescente tectus. Legumen oblongo-lineare
rectum sericeo-tomentosum sesquipollicare apice stylo
basi torto persistenti instructum.* Lamarck l. c.

25. LATHYRUS tuberosus.

L. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 364. *Dalib. paris.* 217. *Sauv. monsp.* 194. *Gort. gelr.* 421. *Gmel. fib.* 4. p. 6. *Mill. dict. n.* 10. *Pall. it.* I. p. 329. *Pollich pal.* n. 678. *Mattusch. fil.* n. 523. *Kniph. cent.* 5. n. 51. *Hoffm. germ.* 254. *Roth. germ.* I. 307. II. 175.

L. scapis multifloris, foliis ovatis, capreolis trifidis. *Hall. helv.* n. 435.

L. foliis binatis ovatis, radice tuberosa; pedunculis multifloris. *Crantz aust.* p. 381.

L. arvensis. *Riv. tetr.* t. 42. *Hall. R.*

L. arvensis repens tuberosus. *Bauh. pin.* 144.

Arachidna Theophrasti. *Colum. ephr.* 301. 304. R.

Terrae glandes. *Dodon. cer.* 168. *Hall. R.*

Apios. *Fuchf. hisi.* 131.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 601.

Knollige Platterbse. W.

Habitat inter Belgii, Genevae, Germaniae, Tatariae segetes, locis argillofisis. 24 (v. v.)

Foliola involuta. Corolla tota rubra.

***26. LATHYRUS rotundifolius.** W.

L. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis subrotundis, internodiis membranaceis. W.

Rundblättrige Platterbse. W.

Habitat in Tauria. (v. f.)

Caulis sesquipedalis anceps alatus crassitie fili emporetici subflexuosus, ramis alternis brevibus. Foliola uncialia vel sesquiuncialia lata subrotunda obtusissima mucronata nervoso-venosa glabra ut tota planta Cirri biunciales bifidi. Petiolus fere uncialis marginatus. Stipulae lanceolatae semifagittatae cuspidatae. Pedunculus triuncialis apice quinqueflorus. Accedit ad L. tuberosum sed folia subrotunda majora et latiora, flores majores et internodia membranacea. W.

27. LATHYRUS *pratensis*.

L. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllois simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 367. *Fl. suec.* 599; 647. *Roy. lugāb.* 364. *Dalib. paris.* 217. *Gmel. fib.* 4. p. 5. *Mill. dict. n.* II. *Scop. carn. n.* 893. *Pollich. pal. n.* 679. *Hor. dan.* 527. *Kniph. cent.* II. n. 63. *Hoffm. germ.* 254. *Roth germ.* I. 307. II. 176.

L. scapis multifloris, foliis lanceolatis, capreolis simplicibus. *Hall. helv.* n. 436.

L. foliis binatis utrinque acutis, pedunculis multifloris, floribus luteis. *Crantz austr.* 379. R.

L. *pratensis*. *Riv. tetr. t.* 43.

L. *sylvestris* luteus, foliis viciae. *Bauh. pin.* 344.

L. *luteus sylvestris* dumetorum. *Bauh. hist.* 2. p. 304. t. 304.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 603.

Gelbe Platterbse. W.

Habitat in Europae pratis. 24 (v. v.)

Cirrhi quidem interdum trifidi sunt, at saepius simplicissimi. Foliola convoluto-involuta.

28. LATHYRUS *sylvestris*.

L. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllois: foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Hort. cliff.* 367. *Fl. suec.* 598; 644. *Dalib. paris.* 216. *Crantz austr.* p. 378. *Pollich. pal. n.* 680. *Fl. dan.* t. 325. *Hoffm. germ.* 254. *Roth. germ.* I. 307. II. 177.

L. caule alato, foliis geminis ensiformibus. *Hall. helv.* n. 434.

L. *sylvestris major*. *Bauh. pin.* 433.

L. *sylvestris*. *Clus. hist.* 2. p. 129. *Dod. pempt.* 523. *Riv. tetr. t.* 39.

β L. (*platyphyllus*) foliolis latioribus. *Retz. prod. fl. scand. ed.* 2. n. 882. *Fl. dan. t.* 785.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 604.

Wald - Platterbse. W.

Habitat in Europae pratis montosis. 24 (v. v.)

29. LATHYRUS *latifolius*.

L. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllois: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Hort. cliff.* 367.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. Q

- Hort. upf.* 217. *Fl. suec.* 1139: 645. *It. scan.* 251.
Mill. dict. n. 13. *Reyg. ged.* 2. p. 116. *Scholl. barb.*
 n. 580. *Mattuich. fil.* n. 526. *Kniph. cent.* 7. n. 40.
Hoffm. germ. 254. *Roth. germ.* I. 308. II. 177.
L. caule alato, foliis ovato-lanceolatis, rigidis, scapis
 multifloris. *Hall. helv.* n. 433.
L. pedunculis multifloris, caule alato, foliis et floribus
 max mis. *Crantz aust.* p. 383. R.
L. narbonensis. *Riv. tetr.* t. 40. R.
L. latifolius. *Bauh. pin.* 344. *Garid. prov.* 271.
t. 271.
L. major latifolius, flore purpureo, speciosior. *Bauh.*
hist. 2. p. 301.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 605.
 Breitblättrige Platterbse. W.
Habitat in Europae sepibus. 24 (v. v.)
Foliola involuta, elliptica.

30. LATHYRUS heterophyllus.

- L.** pedunculis multifloris, cirrhus diphylloides tetraphylloides
 que: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis.
It. w-goth. 75. *Fl. suec.* 2. n. 046. *Mill. dict.* n.
 12. *Reyg. ged.* 2. p. 116. *Doerr. naß.* p. 139.
Roth. germ. I. 308. II. 178. *Hoff. germ.* 254.
L. caule alato, foliis quaternis et binis, lanceolatis, sca-
 pis multilobis. *Hall. helv.* n. 432.
L. pedunculis multifloris, cirrhis diphylloides: foliolis gra-
 mineis trinerviis, internodiis membranaceis. *Sauv.*
monsp. 193.
L. major narbonensis angustifolius. *Bauh. hist.* 2.
p. 304.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 606.
 Verschiedenblättrige Platterbse. W.
Habitat ad radices montium Europae. 24

*31. LATHYRUS palustris.

- L.** pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis li-
 neari-lanceolatis acutis, stipulis semifagittatis lanceo-
 latis, internodiis membranaceis. W.
L. pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis
 lanceolatis. *Hort. cliff.* 368. *Fl. suec.* 600, 648. *Roy.*
lugdb. 364. *Dalib. parif.* 217. *Reyg. ged.* 2. p. 116.
Pollich pal. n. 681. *Mattusch. fil.* n. 527. *Weber.*

- spicil.* p. 20. *Fl. dan.* 399. *Hoffm. germ.* 255. *Roth.*
germ. I. 308. II. 178.
L. foliis senis, floribus racemosis. *Hall. helv.* n. 431.
L. pedunculis multifloris, cirrhis 3-4-phyllis, stipu-
 lis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Crantz*
aust. p. 382.
L. foliis pinnatis, pedunculis multifloris. *Fl. lapp.* 221.
L. palustris, flore orobi nemorensis verni. *Rupp. jen.*
 210. t. 1.
L. peregrinus, foliis viciae, flore subcoeruleo pallideve
 purpurascente flore. *Bauh. pin.* 344.
Vicia lathyroides f. *Lathyrus viciaeformis*. *Pluk. alm.*
 387. t. 71. f. 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 607.
 Sumpf-Platterbse. W.
Habitat in Europae borealis pascuis paludosis. 24
 (v. v.)

*32. LATHYRUS incurvus.

- L.* pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis
 lanceolato-oblongis obtusis mucronatis, internodiis
 membranaceis, leguminibus curvatis. W.
L. (*curvus*) pedunculis multifloris, caule quadrangulo,
 angulis duobus alatis omnibus ciliatis, leguminibus
 incurvis. *Roth abh.* 13. t. 4.
Vicia (incurva) pedunculis multifloris, caule quadran-
 gulo, angulis duobus alatis omnibus ciliatis. *Roth.*
Beytr. 2. p. 98.*
L. paribus foliorum quinque, floribus racemosis, siliquis
 incurvis. *Hall. Comment. goett.* 2. p. 341.*
 Krummfrüchtige Platterbse. W.
Habitat in Sibiria? 24 (v. f.).
 Caulis tetragonii, angulis binis alatis plerumque ci-
 liatis, interdum vero nudis. Similis *L. palustri*, sed
 omnibus partibus major, foliola oblongo-lanceolata ob-
 tusa mucronata numerosiora. Stipulae semifagittatae
 oblongo-lanceolatae, et Legumina curvata. W.

*33. LATHYRUS myrtifolius.

- L.* pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis
 oblongo-lanceolatis acutiusculis, internodiis nudis te-
 tragonis. W.

Lathyrus myrtifolius. Mühlenb. in litt.

Myrtenblättrige Platterbse. W.

Habitat in Pennsylvania, 24 (v. f.)

Caulis debilis flexuosus pedalis filiformis tetragonus non alatus. Folia pinnata, foliolis oppositis bijugis, quandoque trijugis oblongo-lanceolatis pollicaribus utrinque angustatis obtusiusculis mucronatis rigidiusculis glabris venoso striatis. Cirri trifidi. Stipulae semifagittatae lanceolatae acuminatae margine scabrae. Racemi tri-vel quadriglori foliis longiores. *Habitus similis L. palustris.* W.

*34. *LATHYRUS venosus.*

L. pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis ovatis obtusis, stipulis semifagittatis ovatis. W.

Lathyrus venosus. Mühlenberg in litt.

Adlige Platterbse. W.

Habitat in Pennsylvania. W.

Caulis tetragonus non alatus flexuosus. Folia pinnata. Foliola numerosa fere sesquipollicaria plerumque alterna ovata obtusa mucronata glabra venosa. Cirri trifidi. Stipulae semipollicares et ultra ovatae semifagittatae acuminatae. Racemi quinque-vel decemflori foliis breviores. *Similis L. pisiformi sed stipulae multo minores, foliola latiora ovata et corollae maiores.* W.

*35. *LATHYRUS japonicus.* W.

L. pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis ellipticis acutis, stipulis sagittatis amplexicaulibus latitudine foliorum. W.

Lathyrus pisiformis. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 608.
t. 65. f. 1.

Japanische Platterbse. W.

Habitat in Japonia.

Simillimus L. pisiformi, differt vero: foliolis quadrijugis acutis, stipulis latitudine tantum foliorum sed brevioribus et sagittatis amplexicaulibus nec semifagittatis, floribus majoribus. W.

36. *LATHYRUS pisiformis.*

L. pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis ellipticis obtusis, stipulis semifagittatis ovatis foliolo latioribus. W.

L. pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis ovatis foliolo latioribus. *Linn. dec. 39. t. 20.* *Leers herb. n. 564.* *Kniph. cent. II. n. 62.*

Vicia pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis ovatis: basi acutis. *Sp. ed. pr. p. 1034.* *Mill. dict. n. 15.*

L. pedunculis multifloris, cirrhis heterophyllis, foliis ovatis, stipulis maximis. *Gmel. sib. 4. p. 7. n 4. t. I.*

Vicia pedunculis multifloris, foliis ovatis, stipulis maximis. *Hall. goett. 295.*

Erblesenförmige Platterbse. W.

Habitat in Sibiria, Germania. 24 (v. v.)

Planta ut *Pisum crescens*. Caules acute angulati. Petioli cirrhoi, saepe hexaphylli: folios ovato oblongis, acutis. Stipulae folios latiores, ovatae, basi acuminate, vix angulatae. Pedunculi longitudine foliorum, multiflori. Flores vexillo et alis albidi venis purpureis. Vexillum parvum, carina Pisi, nec obliqua. Stylus supra longitudinaliter barbatus. Foliola convoluta ut in *Piso maritimo* et *Ochro*, nec involuta ut in plerisque *Lathyris*; minus conduplicata ut in *Piso sativo*.

1356. V I C I A

Gen. pl. ed. Schreb. 1187.

Stigma latere inferiore transverse barbatum.

† *Pedunculis elongatis.*

I. VICIA pisiformis.

V. pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis: infimis sessilibus. *Hort. cliff. 369.* Roy. lugdb. 365.* *Crantz aust. p. 384.* *Pall. it. I. p. 192.* *Jacq. aust. t. 364.* *Pollich. pal. n. 682.* *Mattusch. fil. n. 528.* *Kniph. cent. 10. n. 99.* *Hoffm. germ. 255.* *Roth. germ. I. 308. II. 179.*

V. foliis ovatis maximis, siliquis racemosis pendulis. *Hall. helv. n. 428.*

Pisum sylvestre perenne. *Bauh. pin. 343.*

Pisum sylvestre. *Clus. hist.* 2. p. 129.

Cracca flore ochroleuco. *Riv. tetr.* t. 52.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 609.

Erbseartige Wicke. W.

Habitat in Pannoniae, Austriae, Germaniae sylvis. 24
(v. v.)

Foliola petiolorum infima sunt cauli approximata,
fessilia, stipulas minimas occultantia. Flores ochro-
leuci.

*2. Vicia caroliniana.

V. pedunculis multifloris, floribus distantibus, foliolis lanceolatis, stipulis integerrimis, caule glabro. W.

V. (*caroliniana*) pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis subalternis lanceolatis mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis integris, pedunculis axillariis 26-floris, floribus albidis nigro-maculatis. *Walt. carol.* 182.

Carolinische Wicke. W.

Habitat in Carolina. 24 (v. f.)

Caulis angulato-falcatus glaber. Folia pinnato-cirrho simplici terminata. Foliola 8 vel 10 et plura elliptico-lanceolata obtusa mucronata subglabra. Stipulae parvae ovato-lanceolatae integerrimae. Racemi axillares triunciales et ultra. Flores secundi pedunculati nutantes et distantes. Corolla albida vexillo apice nigro, minor et angustior quam in V. *Cracca.* W.

*3. Vicia pontica. W.

V. pedunculis multifloris, floribus confertis, foliolis lanceolatis, stipulis lanceolato-ensiformibus integerrimis, caule pubescente. W.

V. multiflora spicata, floribus albidis, calyce purpureo.

Tournef. car. 27.

Pontische Wicke. W.

Habitat in Ponto.

Caulis angulato-falcatus pubescens. Folia pinnata apice cirrho trifido terminata. Foliola 20 vel 27 elliptico-lanceolata uncialia et longiora, obtusa mucronata pilis adpresso sparsis praesertim subtus obsita. Stipulae fere semiunciales ensiformi-lanceolatae integerrimae pilosae nervosae. Racemi axillares semipedatae

les inferiores pedales. Flores secundi pedunculati nuntantes conferti, magnitudine V. Craccae. W.

4. VICIA dumetorum.

- V. pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis mucronatis, stipulis subdentatis. *Sp. pl. 1035. Gmel. fib. 4. p. 9. Reyg. ged. 2. p. 216. Crantz austr. 385. Gmel. tub. p. 221. Hoffm. germ. 255. Roth germ. I. 309. II. 180.*
- V. pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis: foliolis alternis ovatis, stipulis dentatis. *Fl. suec. 604; 649. Dalib. parif. 219. Sauv. monsp. 234.*
- V. foliis ovatis oblongis, stipulis ferratis, siliquis racemosis pendulis. *Hall. helv. n. 427.*
- V. maxima dumetorum. *Bauh. pin. 345.*
- V. sylvatica maxima pisiformis similis. *Bauh. hist. 2. p. 315.*
- Cracca sylvatica. Riv. tetr. 50.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 610.*
- Heckenwicke. W.*

Habitat in Gallia, Germania, etc. 24 (v. f.)

Diffrerit a V. pisiformi Corollis non flavis, Foliolis longioribus, nec infimis cauli approximatis.

Foliola angustiora et breviora quam in V. pisiformi. Pedunculi subsexflori. W.

5. VICIA sylvatica.

- V. pedunculis multifloris folio longioribus, foliolis ellipticis, stipulis lunatis setaceo-dentatis. *W.*
- V. pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. *Sp. pl. 1035. Mill. dict. n. 2. Gmel. fib. 4. p. 11. Reyg. ged. 2. p. 117. Pall. it. 1. p. 370. Scop. carn. n. 898. Gunn. norv. n. 16. Leers. herb. n. 565. Mattusch. fil. n. 529. Flor. dan. t. 277. Hoffm. 255. Roth germ. I. 309. II. 181.*
- V. pedunculis multifloris, foliolis ellipticis, stipulis lunatis dentatis. *Smith brit. 2. p. 768.**
- V. pedunculis multifloris, stipulis crenatis. *Fl. lapp. 270. Fl. suec. 603; 650. Roy. lugdb. 365. Sauv. monsp. 234.*
- V. foliis ovatis, stipulis argute dentatis, siliquis racemosis pendulis. *Hall. helv. n. 426. t. 12. R.*
- V. multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus

*albentibus: lineis coeruleis notatis. Pluk. alm. 387.
t. 71. f. 1.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 611.

Wald Wicke. W.

*Habitat in Sueciae, Germaniae etc. sylvis. 4
(v. f.)*

*6. Vicia americana.

*V. pedunculis multifloris folio brevioribus, foliolis el-
liptico-lanceolatis, stipulis semigittatis dentatis. W.
Vicia americana. Mühlenberg in litt.*

Habitat in Pennsylvania. 4 (v. f.)

*Caulis subtetragonus striatus. Folia pinnata cirrho
tri vel multifido terminata. Foliola 8-12 elliptico-
lanceolata obtusa glabra mucronata. Stipulae semi-
gittatae profunde dentatae. Racemi tri-vel octoflo-
ri folio breviores interdum at rarius longitudine folii.
Flores magnitudine praecedentis. Differt a V. sylva-
tica. Foliolis longioribus elliptico-lanceolatis, Sti-
pulis semifagittatis profunde dentatis, dentibus non
aristatis, Racemis paucifloris folio nunquam longiori-
bus. W.*

*7. Vicia variegata.

*V. pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis
ellipticis villotis, stipulis basi bipartitis ovato-lanceo-
latis. W.*

*V. orientalis multiflora argentea, flore variegato. Tour-
nef. cor. 27.*

Bunte Wicke. W.

Habitat in Oriente. 4 (v. f.)

*Canis pedalis et ultra basi ramosus tetragonus striatus villosus. Folia pinnata cirrho brevi bipartito ter-
minata. Foliola 14-20 utrinque villosa albida elliptica obtusa, inferiora obovata emarginata, mucronata conserata. Petiolus communis dilatatus semiteres. Sti-
pulae basi bipartitae ovato-lanceolatae acuminatae. Racemi folio parum longiores. Flores magnitudine V.
sativae secundi imbricati. W.*

8. Vicia caffubica.

V. pedunculis multifloris folio brevioribus, foliolis ob-

- longis subpubescentibus, stipulis semisagittatis integrerrimis lanceolatis. W.
- V. pedunculis subflexuosis, foliolis denis ovatis acutis, stipulis integris. Sp. pl. 1035. Fl. suec. 653. Mill. dict. n. 3. Hoffm. germ. 255. Roth. I. 309. II. 181. Retz. obs. 1. p. 24 3. p. 33.
- V. (Gerardi) pedunculis multifloris, foliolis oblongis subpubescentibus, stipulis integris caule erecto. Murr. Syst. veg. ed. 14. p. 664. Jacq. aust. 3. t. 229. Alion. ped. n. 1197.
- Vicia militans. Crantz aust. 388. t. 1. f. 2.
- Vicia multiflora. Pollich. pallat. n. 683.
- V. pedunculis multifloris, caule fruticoso. Hort. cliff. 369. Roy. lugd. 364.
- V. pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis villosis, stipulis acutis integris appendiculatis. Ger. prov. 497. t. 19.
- V. multiflora cassubica frutescens, siliqua lentis. Pluk. alm. 387. t. 72. f. 2.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 612.
- Cassubische Wicke. W.
- Habitat in Germania, Gallia. 2 (v. v.)*

*9. VICIA atropurpurea.

- V. pedunculis multifloris folio brevioribus, dentibus calycinis setaceis villosissimis, foliolis lanceolatis villosis, stipulis semisagittatis profunde dentatis.
- V. foliolis linearis-lanceolatis, racemis multifloris secundis, calycibus villosissimis, dentibus setaceis, leguminibus ovato-oblongis cernuis hirsutissimis. Desf. att. 2. p. 164. *

Schwarzrothe Wicke. W.

Habitat in insulis Stoechadibus, Algeria. (v. f.)

Tota planta villosa. Caulis tetragonus striatus. Foliola lanceolata obtusiuscula mucronata 8 vel 12. Stipulae ovatae profunde dentatae, dentibus linearis-lanceolatis acuminatis. Racemi folio breviores vel ejusdem longitudinis. Calyx pilis longis patentibus obtusus, dentibus filiformi-setaceis. Corolla V. benghalensis facie et colore. Legumen pilis brevibus rufescientibus tectum. A sequenti diversissima habitu et characteribus indicatis. W.

***10. VICIA villosa.**

V. pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis oblongo-ovatis villosis, stipulis semi-sagittatis ovatis basi obtuse dentatis. W.

V. pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis ovalibus villosis, stipulis nervosis basi dentatis. Roth germ. II. 182. Host. synop. 399.

Behaarte Wicke. W.

Habitat in Germania, Austria, Hungaria. ⊙ (v. v.)

Foliola elliptica vel ovata obtusa mucronata villosa.

Flores purpureo-violacei majores quam in V. Cracca.

Calycis dentes setacei. W.

***II. VICIA polyphylla.**

V. pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis linearis lanceolatis acutis, stipulis semi-sagittatis lanceolatis integerrimis. W.

V. (*polyphylla*) foliis linearis lanceolatis mucronatis villosis, pedunculis axillaribus folio longioribus, floribus confertis secundis racemolis. Desf. atl. 2. p. 162.*

V. orientalis multiflora incana angustissimo folio. Tour. nef. cor. 27.

Vielblättrige Wicke. W.

Habitat in Hungaria, Oriente et Algeria. (v. s.)

Caulis et Folia villosa. Similis praecedenti, cuius forte varietas, sed Foliola linearis-lanceolata acuta mucronata, Stipulae lanceolatae semifagittatae basi non dentatae. W.

12. VICIA Cracca.

V. pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis obtusis, stipulis semi-sagittatis linearis subulatis integerrimis. W.

V. pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. Sp. pl. 1035. Mill. dict. n. 1. Pollich pal. n. 684. Kniph. cent. 10. n. 98. Hoffm. germ. 256. Roth germ. I. 309. II. 183.

V. pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. Hort. cliff. 368. Fl. suec. 705; 652. Roy. lugdb. 364. Dalib. paris. 220. Sauv. monsp. 234.

- V. foliis linearibus sericeis, racemis multifloris reflexis, stipulis integerrimis. *Hall. helv. n. 424.*
- V. racemis folio brevioribus; floribus imbricatis, pendulis: foliolis lanceolatis, pubescentibus. *Scop. carn. I. p. 539.*
- V. foliis linearibus hirsutis, pedunculis multifloris, filiis subhirsutis longis. *Crantz austr. p. 387.*
- V. sylvestris spicata. *Bauh. pin. 345.*
- V. multiflora. *Bauh. pin. 343.*
- Cracca.** *Riv. tetr. 49.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 612.
- Vogel-Wicke. W.
Habitat in Europae pratis, agris. 24 (v. v.)
Foliola involuta. Variat floribus albis.

* 13. Vicia tenuifolia.

- V. pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis linearibus glabriusculis trinerviis, stipulis linearibus integerrimis. W.
- V. pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis linearibus trinerviis acuminatis, stipulis linearibus integris, caule erecto flexuoso. *Roth. germ. I. 309. II. 183. Hoffm. germ. 256.*
- V. (*Gerardi*) pedunculis multifloris, foliolis linearibus obtusis trinerviis, stipulis integris, caule erecto. *Willd. prod. n. 736.*

Dreynervige Wicke. W.

Habitat in collibus arenosis Germaniae inque Tauria. (v. v.)

Simillima praecedenti sed diversa: Caule humiliore basi ramosissimo, Foliolis linearibus subpubescentibus, Stipulis inferioribus semifagittatis, superioribus simplicibus linearibus, Floribns violaceis, Leguminibus duplo minoribus. W.

14. Vicia onobrychoides.

- V. pedunculis multifloris folio longioribus, floribus distantibus, foliolis linearibus, stipulis semifagittatis linearis lanceolatis basi dentatis. W.
- V. pedunculis multifloris, floribus distantibus, foliolis linearibus, stipulis inferne denticulatis. *Sp. pl. 1036. Allion. pedem n. 1198. t. 42. f. 1. Desf. atl. 2. p. 163.**

V. foliis ellipticis, floribus racemosis erectis, stipulis
argute dentatis. *Hall. helv. n. 425.*

V. pedunculis multifloris, stipulis crenatis, foliolis line-
aribus. *Sauv. monsp. 235.*

V. onobrychidis flore. *Bauh. pin. 345. prodr. 149.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 613.

Hahnenkopfartige Wicke. W.

*Habitat in Helvetia, Italia, Gallia australi inque Bar-
baria. ♂ (v. f.)*

Statura *Viciae Graccae*. Folia pinnata, cirrhosa: folioliis saepius 14, linearibus, angustissimis: oppositionibus distantibus. Pedunculi axillares, foliis triplo longiores, striati, Floribus 10 f. 12, subeffilibus, remotissimis, Craccae triplo majoribus, purpureis. Legu-
mina latissima.

* 15. Vicia biennis.

V. pedunculis multifloris, petiolis sulcatis subdodecaphyl-
lis, foliolis lanceolatis glabris, stipulis semisagittatis
petiolatis. W.

V. pedunculis multifloris, petiolis sulcatis subdodeca-
phyllis, foliolis lanceolatis glabris. *Sp. pl. 1036.*
Mill. dict. n. 4. Gmel. fib. 4. p. 10. t. 2.

V. pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis
lanceolatis glabris. *Hort. upf. 219.**

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 614.

Zweijährige Wicke. W.

Habitat in Sibira. ♂ (v. v.)

Foliola involuta. Planta biennis: maxima ultra 12
pedes alta.

* 16. Vicia altissima.

V. pedunculis multifloris, petiolis subdodecaphyllis, fo-
liolis ellipticis truncatis glabris, stipulis dentatis. W.

V. (*altissima*) stipulis dentatis, foliolis ellipticis truncata-
tis glaberrimis, floribus racemosis petiolo longioribus.
Desf. atl. 2. p. 163.

Höchste Wicke. W.

Habitat in Barbaria prope Arzeau. 24

Planta tota glaberrima. Caulis scandens siliatus
sexpedalis. Pinnulae 10-12 brevitere petiolatae el-
lipticae truncatae alternae. Stipulae dentatae. Pe-
dunculi axillares angulosi folio longiores. Flores nume-

rofi racemosi unilaterales pedicellati nutantes. Calyx quinquedentatus, dentibus minutis, tribus inferioribus acutis longioribus; superioribus brevissimis. Corolla pallide coerulescens magnitudine V. sepium, aut vix major. Stigma barbatum. Legumen lanceolatum compressum polyspermum. Affinis Z. bienni, differt: foliolis apice truncatis, stipulis dentatis. Dest. l. c.

17. Vicia nissoliana.

V. pedunculis multifloris, foliolis oblongis, stipulis integris, leguminibus villosis ovato-oblongis. Sp. pl. 1036.

V. leguminibus sessilibus binis ternisve subovatis nutantibus, stipulis nullis. Roy. lugdb. 14?

V. orientalis: flore suave rubente, siliquis brevissimis. Boerh. lugdb. 2. p. 44?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 614.

Orientalische Wicke. W.

Habitat in Oriente. ⊙ (v. v.)

Caulis fileatus. Cirrhi foliolis 6 paribus, oblongis, vix retusis, acumine terminatis, subvillosis. Stipulae lanceolatae, augustissimae. Pedunculi floribus 5 f. 6, minimis, atropurpureis. Legumina nutantia, compressa, ovato-oblonga, villosa, pentasperma.

18. Vicia benghalensis.

V. pedunculis multifloris, foliis integerrimis, stipulis integris, leguminibus erectiusculis. Sp. pl. 1036.

Kniph. cent. 4. n. 97.

V. pedunculis subquinquefloris longitudine foliorum.

Hort. cliff. 368. Hort. upf. 219. Roy. lugdb. 365.

V. benghalensis hirsuta et incana, siliquis pilis. Herm.

lugdb. 624. t. 625.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 615.

Bengalische Wicke. W.

Habitat in Benghalia. ⊙ (v. f.)

Corollae intensissimae puniceae, carinae apice nigro.

*19. Vicia canescens.

V. pedunculis elongatis multifloris, foliis superioribus subcircularibus, stipulis semisagittatis integris, foliolis ovali-oblongis, lanugine canescensibus. Billard. ic. pl. Syriae 17. t. 7.*

Graue Wicke. W.

Habitat versus cacumen montis Libani. ○

Planta tota lanugine canescens. Caulis herbaceus erectus pedalis et altior tetragonus subsirriatus. Folia inferiora impari pinnata, superiora filamento subcirrhofo. Foliola 5 - 22 aut 23 alterna, alia opposita sessilia ovato-oblonga. Stipulae semisagittatae integræ. Flores laxe spicati secundi, e pedunculo axillari elongato, coerulei. Legumen tomentosum. Semina 3 - 4 subrotunda. Billard. l. c.

*20. Vicia capensis.

V. pedunculis multifloris elongatis, foliis non cirrhosis, foliolis oblongo-lanceolatis subtus sericeis, stipulis lanceolatis integris. W.

V. (capensis) pedunculis elongatis multifloris, racemis subrotundis, petiolis polyphyllis, cirrhis nullis. Berg. cap. 215.*

V. (capensis) pinnis obovatis mucronatis, stipulis integris, caule angulato. Thunb. prod. 135.

Capische Wicke. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 24 (v. f.)

*21. Vicia pellucida.

V. pedunculis multifloris folio non cirrhofo brevioribus, foliolis obovatis emarginatis, stipulis oblongis. W.

V. (pellucida) pedunculis subquadrifloris, leguminibus falcatis pellucidis. Jacq. hort. schoenb. 2. p. 50. t. 222.*

Durchsichtige Wiche. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 24

A praecedenti diversa: Foliolis oblongo-obovatis emarginatis, Racemis folio brevioribus, Leguminibus que falcatis. W.

*22. Vicia fruticosa. W.

V. pedunculis subbitloris folio non cirrhofo brevioribus, foliolis ellipticis tomentosis, stipulis lanceolatis, caule fruticoso. W.

Lathyrus (tomentosus) caule fruticoso, pedunculis bifloris, foliis pinnatis tomentosis. Cavan. ic. I. p. 58. t. 84.*

Stranchartige Wicke. W.

Habitat in Peru. ♂ (v. f.)

Caulis fruticosus tomentosus. Folia pari-pinnata, foliolis numerosissimis oblongis utrinque albo-tomentosis: Pedunculi bi-vel triflori. Flores flavi. W.

*23. VICIA Ervilia.

V. pedunculis subbifloris aristatis folio brevioribus, foliolis oblongis truncatis glabris, stipulis hastatis. W.

Ervum (Ervilia) germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. Hort. upf. 224. Mat. med. 173. Sauv. monsp. 237. Mill. dict. n. I. Leers herb. n. 591. Hoffm. germ. 258. Roth. germ. I. 322. II. 222.

Ervium leguminibus pendulis. Hort. cliff. 370.

Ervium. Cam. epit. 215. Hall. helv. n. 420. Riv. tetr. t. 6. Blackw. t. 208. f. 3.

Orobus siliquis articulatis, flore majore. Bauh. pin. 346.

Lens minor. Cam. epit. p. 211.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 628.

Ervenartige Wicke. W.

Habitat in Gallia, Italia, Oriente. ♀ (v. v.)

Folia cirrhis destituta. Pedunculi subbiflori.

Folia pari-pinnata cirrho brevissimo simplici instrueta. Stipulae lanceolatae basi utrinque dente recto, hinc hastatae. W.

*24. VICIA biflora.

V. pedunculis bifloris aristatis folio brevioribus, foliolis linearibus utrinque attenuatis, stipulis semifagittatis. W.

V. foliis linearibus, pedunculis bifloris axillaribus. Desf. atl. 2. p. 166. t. 197.*

Zweyblumige Wicke. W.

Habitat in Algeria.

Folia cirrhosa. Foliola angustissima alterna. Flores magnitudine V. sepium coerulei. W.

*25. VICIA oroboides.

V. pedunculis subquadritfloris folio brevioribus, foliolis ovatis acuminatis bi-triugisve, stipulis semifagittatis basi dentatis. W.

V. (*oroboides*) pedunculis multifloris, caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Wulfen in Jacq. Collect.* 4. p. 323. *Hofst. synop.* 399.

Orobus pannonicus quartus. *Clus. hist.* 2. p. 231. Breitblättrige Wicke. W.

Habitat in subalpinis Croatiae, Carnioliae. 24 (v. f.)
Facies Orobii. Folia pari pinnata bi- vel trijugata.
Petiolae seta terminati. Pedunculi tri- quadri- vel quinqueflori. W.

† † *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

26. Vicia sativa.

V. leguminibus sessilibus subbinatis, foliolis oblongo-ovatis truncatis mucronatis, stipulis dentatis notatis. W.

V. leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis. Sp. pl. 1037. Crantz aust. p. 391. Mill. dict. n. 5. Flor. dan. t. 552. Kniph. cent. I. n. 96. Hoffm. germ. 256. Roth. germ. I. 310. II. 185.

V. leguminibus erectis, petiolis polyphyllis: foliolis acuminis emarginatis, stipulis denticulatis. Hort. cliff. 368. Hort. upf. 218. Fl. suec. 601, 654. Roy. lugdb. 365. Dalib. paris. 218.

V. sativa vulgaris, semine nigro. Bauh. pin. 344.

V. sativa alba. Bauh. pin. 344.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 616.

Futter-Wicke. W.

Habitat inter segetes Europae. ⊙ (v. v.)

Stipulae subtus macula quasi inusta notatae.

*27 Vicia globosa.

V. leguminibus subsessilibus solitariis, foliolis ovatis, stipulis notatis quadridentatis. Retz. obs. 3. p. 39. Rundfrüchtige Wicke. W.

Habitat — — — — ⊙ (v. v.)

Caulis angulatus nudus. Stipulae praeter utramque apicem dentes habent binos, notatae. Cirri simplices. Foliola 4-8 ovata pubescentia seta reflexa terminata. Flores axillares solitarii erecti brevi pedunculo insidentes V. sativae sed coerulecentes. Calyx

pentagonus, lacinii longis linearibus lanceolatis ci-
liatis. Legumina patentia teretia nuda seminibus glo-
bosis. V. sativae similis differt: Stipulis, longiore
Calyce, forma et numero Leguminum, paucioribus
foliis. Retz. l. c.

*28 **VICIA angustifolia.**

V. leguminibus sessilibus subbinatis patentibus, foliolis
imis ovatis retusis emarginatis, superioribus linearibus
apice integerrimis, stipulis dentatis, seminibus globo-
sis. Roth germ. I. 310. II. 186. Hoffm. germ. 256.

Vicia sativa β nigra. Sp. pl. 1037.

V. semine rotundo nigro. Bauh. pin. 345.

V. foliis imis ovatis, superioribus linearibus, scapis bre-
vissimis, bifloris. Hall. helv. n. 430. Pollich pal.
n. 685. Willich obs. n. 119.

Vicia sativa. Scopoli carn. n. 895.

V. vulgaris, acutiore folio, semine parvo nigro. Bauh.
pin. 345.

V. folio angustiore, flore rubro. Dill. app. 47.

V. angustifolia. Riv. tetr. tab. 54.

Schmalblättrige Wicke. W.

Habitat inter segetes inque nemoribus Germaniae. ◎
(v. v.)

*29. **VICIA amphicarpa.**

V. leguminibus sessilibus, inferioribus subterraneis, fo-
liolis linearibus truncatis, stipulis semifagittatis. W.

Vicia amphicarpa. Dorthes in Journ. phys. 35.
*p. 131.**

V. amphicarpa: aracus homojon. Cluf. exot. 87. t. 88.

Unterirdische Wicke. W.

Habitat in Provincia. ◎ (v. f.)

Caulis bast ramosus. Folia pinnata cirrho simplici
terminata trijuga. Foliola inferiora obovata emargi-
nata, superiora linearia truncata mucronata. Stipu-
lae semifagittatae lanceolatae integerrimae. Flores
magnitudine V. sativae coerulei solitarii sessiles. Ra-
mi inferiores in terram descendunt et fructificant. Le-
gumina subterranea ovata, Legumina vero extra ter-
ram maturescantia sunt linearia quadruplo longiora
apice uncinatae. W.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

R

*30. *VICIA pustilla.*

V. leguminibus solitariis pedunculatis, foliolis subfreniis lanceolatis, stipulis semifagittatis integerrimis. W.
Vicia pustilla. Mühlenberg in litt.
Kleinste Wicke. W.

Habitat in Pensylvania. ⊙ (v. f.)

Caulis quadri - vel quinquepollicaris ascendens. Folia pinnata, inferiora cirrho simplici, superiora cirrho longissimo bipartito instructa. Foliola 6 interdum octo subopposita linear-lanceolata obtusiuscula mucronata. Stipulae lanceolatae semifagittatae integerrimae. Pedunculi uniflori longi capillares. Legumen parvum oblongum glabrum. W.

31. *VICIA lathyroides.*

V. leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliis senis, inferioribus obcordatis. Sp. pl. 1037 Reyg. ged. 2. p. 117. Gouan. hort. 371. Crantz austri. 392. Pollich pal. n. 686. Leers herb. n. 568. Mattusch. fil. n. 532. Fl. dan. t. 58. Kniph. cent. 3. n. 96. Hoffm. germ. 257. Roth. germ. I. 310. II. 187. Jacq. misc. 2. p. 299. t. 18.

Ervum (solonense) pedunculis subbifloris aristatis, petiolis acuminatis, foliolis obtusis. Sp. pl. 1040. (descriptio pessima a Guettardo desumpta.)

V. lathyroides, purpureo-coeruleis floribus. Herm. par. 242. t. 242.

V. montana minima, flosculo purpureo. Amoen. acad. I. p. 167.

Vicia minima. Riv. tetr. 169.

V. praecox verna minima soloniensis, semine hexaedro. Moris. blaef. 321. hist. 2. p. 63. Raj. hist. 902.

V. minima praecox parisiensium. Tournef. inst. 397.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 618. 627.

Platterbsenartige Wicke. W.

Habitat in Scotia, Norvegia, Germania, Gallia. ⊙ (v. v.)

Vicia lathyroides Allion ped. n. 1202. t. 59. f. 2. valde a nostra magnitudine omnium partium et foliorum forma differre videtur. W.

32. Vicia lutea.

V. leguminibus sessilibus solitariis reflexis pilosis, caulinibus diffusis, stipulis coloratis, vexillo glabro, Smith brit. 2. p. 227.*

V. leguminibus sessilibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollae vexillis glabris. Sp. pl. 1037. Pollich pal. n. 687. Hoffm. germ. 257. Roth germ. I. 310. II. 188.

V. foliis subsessilibus obverse ovatis apice emarginatis, leguminibus solitariis villosis. Dalib. parif. 219.

V. leguminibus solitariis deorsum fixis hirsutis. Sauv. monsp. 235.

V. sylvestris lutea, siliqua hirsuta. Bauh. pin. 345.

V. flore luteo pallido, siliquis hirsutis crassis brevibus propendentibus. Morif. hist. 2. p. 62. f. 2. t. 21. f. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 618.

Gebe Wicke. W.

Habitat in Gallia, Germania, Hispania, Italia, Oriente.

○ (v. f.)

Variat foliis lanceolatis et retusis. Leguminibus hirsutis et subglabris. Stipulae alternativim integerrimae et tridentatae.

33. Vicia hybrida.

V. leguminibus sessilibus reflexis pilosis pentaspermis, corollae vexillis villosis. Sp. pl. 1037. Jacq. aust. t. 146.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 619.

Bastard-Wicke. W.

Habitat Monspelii, Massiliae, Angliae, Austriae. ○ (v. v.)

Affinis R. luteae. Foliola obovata, retusa, parva, pilis adpersa. Stipulae non ad caulem fuscae, sed totae virides. Flores flavi, supra subgrisei, pilosi. Cetera V. luteae.

*34. Vicia pannonica.

V. leguminibus pedunculatis subternis vexillisque pilosis, stipulis lanceolatis notatis. W.

V. (pannonica) pedunculis subtrifloris, corollae vexillis villotis, leguminibus pilosis, stipulis integerrimis notatis. Host. synop. 400. Jacq. aust. t. 34.

V. sylvestris albo flore. *Clus. hist.* 2. p. 235.
β. floribus violaceis. W.

Viciodes uncinata. *Moench method.* 136.
 Ungarische Wicke. W.

Habitat in Austriae, Hungariae pratis. ○ (v. v.)
Varietas β differre videtur, nam color floris cultura non mutatur. W.

*35. *VICIA laevigata.* +

V. leguminibus sessilibus solitariis reflexis glabris, canibus erectiusculis, foliis glaberrimis. *Smith brit.* 2. p. 773.

Vicia hybrida. *Huds. angl.* 319.
 Glatte Wicke. W.

Habitat in petrofis maritimis Angliae, 2

Habitus V. luteae, sed caules breviores et fere erecti ramosi. Tota planta glaberrima. Foliola elliptico-lanceolata mucronulata, vix unquam retusa. Stipulae virides vel subfuscæ. Dentes calycini subaequales. Flores cinereo-flavescentes, interdum dilute purpurei. Legumen pentaspermum fuscum undique laeve atque glaberrimum. Smith. I. c.

*36. *VICIA fordida.*

V. leguminibus subsessilibus geminatis reflexis glabris, foliolis oblongo-ovatis retusis, stipulis notatis. W.

Vicia fordida. *Waldstein et Kitaib. pl. rar. hung.*
 Schmutzige Wicke. W.

Habitat in Hungariae pratis. ○ (v. v.)

Caulis simplex sulcatus glaber. Foliola oblonga ova-ta emarginata mucronata in culta planta glabra, in spontanea minora subpubescentia. Flores axillares geminati fordide flavi brevissime pedunculati. Legumi-na glabra reflexa vel patentia. W.

An distincta a praecedente? differre videtur: caule non ramoso, foliolis semper emarginatis, radice annua. W.

37. *VICIA peregrina.*

V. leguminibus subsessilibus pendulis glabris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis. Sp. pl. 1038.

V. peregrina angustissimis foliis, siliqua lata glabra. Pluk. alm. 386. t. 233. f. 6.

V. angustifolia purpureo - violacea siliqua lata glabra.

Magn. monsp. 276.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 619.

Fremde Wicke. W.

Habitat in Gallia. D. Sauvages. ○

*38. Vicia monantha.

V. pedunculis unifloris aristatis, foliolis lanceolatis obtusis, stipulis bifidis. *Retz. obs.* 3. p. 39.

V. (*calcarata*) foliolis linearis-lanceolatis obtusis, stipulis furcatis, pedunculis calcaratis unifloris folio brevioribus, leguminibus glabris cernuis. *Desf. atl.* 2. p. 166. *

Einblumige Wicke. W.

Habitat in Barbaria. ○ (v. v.)

Planta annua glabra. Caulis decumbens bipedalis subtetragonus. Stipulae bifidae. Cirri polyphylli. Foliola 12, 13 decrementia obtusa cum acumine. Pedunculus cirrho dimidio brevior, uniflorus aristatus. Flos ruber venis coerulecentibus, magnitudine *V. sativae*. Legumen glabrum 6-7 spermum. *Retz. l. c.*

39. Vicia sepium.

V. leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrementibus.

Sp. pl. 1038. *Crantz aust.* p. 391. *Pollich. pal.* n. 688. *Flor. dan.* t. 699. *Kniph. cent.* 5. n. 100. *Hoffm. germ.* 257. *Roth germ.* I. 311. II. 189.

V. foliis ovatis oblongis, scapis brevibus quadrifloris. *Hall. helv.* n. 428.

V. axillis subquadrifloris; floribus erectis, pedunculatis; foliis ovatis, stipulis dentatis. *Scop. carn.* I. p. 539. ed. 2. n. 897.

V. leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 362. *Fl. suec.* 602, 651. *Roy. lugdb.* 365. *Dalib. paris.* 219. *Sauv. monsp.* 234.

Cracca major. *Tabern.* p. 506.

Vicia sepium perennis. *Bauh. hist.* 2. p. 313. R.

V. sepium, folio rotundiore acuto. *Bauh. pin.* 345.

V. sepium. *Riv. tetr.* 56.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 619.

Zaun-Wicke. W.

Habitat in Europae sepibus. 4 (v. v.)

Folia conduplicata. Racemi foliis breviores, subquadriiflori. Floribus albis variat.

40. Vicia bithynica.

V. leguminibus pedunculatis solitariis erectis, foliolis quaternis ovali-lanceolatis, stipulis dentatis. Sp. pl. 1038. Jacq. hort. t. 147. Allion pedem. n. 1199. t. 26. f. 2.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyllis, stipulis dentatis. Roy. lugdb. 363.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyllis, stipulis setaceis, caule auncipi. Amoen. acad. I. p. 166.

Cracca floribus albis, foliis circa radicem denticulatis. Buxb. cent. 3. p. 23. t. 45. f. 2.

Clymenum bithynicum, siliqua singulari, flore minore. Boerh. lugdb. 2. p. 43.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 620.

Bithynische Wicke. W.

Habitat in Italiae, Bavariae arvis. ⊙ (v. v.)

Caules angulati. Cirri foliis bijugis, lato-lanceolatis. Stipulae valde dentatae. Flores axillares, solitarii, Calyce longitudine pedunculi; Corolla vexillo violaceo, alis albidis. Legumen compressum, ovato-oblongum, villosum. Semina circiter 6. Viciam esse Stigma extus barbatum et Stipulae subtus poro glanduloso evincunt.

***41. Vicia platycarpos.**

V. leguminibus subsessilibus subinflatibus compressis subinflatibus, foliis ovatis apice dentatis, stipulis ciliato-dentatis. W.

V. leguminibus subsessilibus subinflatibus gibbis, seminibus protuberantibus glabris margine scabris, stipulis dentato-ciliatis. Roth abhand. 10. t. 1.*

Aracus fabaceus et Faba Keyrina, cui semina minor. Bauh. hist. 2. p. 286.

Höckrige Wicke. W.

Habitat — — — ⊙ (v. f.)

42. Vicia narbonensis.

V. leguminibus subsessilibus subternatis compressis, foliis ovatis integerrimis, stipulis ciliatis basi dentatis. W.

- V. leguminibus subsessilibus subternatis erectis, foliolis senis subovatis, stipulis denticulatis. *Hort. upf.* 218.
Sauv. monsp. 234. *Gouan. illūsir.* 48. *Kniph. cent.* 4. n. 98. *Knorr. del.* 2. t. L. I.
- V. leguminibus erectis subsessilibus compressis hirtis, margine pilosissimis, stipulis basi dentatis, apice integris ciliatis. *Roth. Abh.* 10. t. 2.*
- V. petiolis inferioribus tetraphyllis: superioribus polyphyllis, foliolis ovatis cirrhiferis. *Roy. lugdb.* 365.
- V. petiolis tetraphyllis cirrhosis. *Hort. cliff.* 369.
- V. narbonensis. *Riv. tetr.* t. 40.
- Faba sylvestris, fructu rotundo atro. *Bauh. pin.* 338.
- Bona sylvestris. *Dod. pempt.* 516.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 621.
- Französische Wicke. W.
- Habitat in Gallia, Anglia, Sibiria.* ⊖ (v. v.)
- Folia conduplicata ut in V. sepium, nec involuta ut in plerisque Viciis. Pedunculi uniflori in macris, triflori in fertilibus. Corollae atropurpureae.*

43. VICIA Faba.

- V. leguminibus subsessilibus ternis torulosis, foliolis ovatis integerrimis, petiolis absque cirrhis, stipulis sagittatis basi dentatis. W.
- V. caule erecto, peti lis absque cirrhis. *Hort. cliff.* 369.
Hort. upf. 218. *Mat. med.* 172. *Roy. lugdb.* 366.
Dalib. paris. 220. *Ludw. ect.* t. 159. *Regn. bot.*
Faba. *Bauh. pin.* 338. *Mill. dict.* *Blackw.* t. 19.
Bona f. Phaseolus. *Dod. pempt.* 513.
- β Fabā minor f. equina. *Bauh. pin.* 338.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 622.
- Sau - Wicke. W.
- Habitat non procul a mari Caspio in confiniis Persiae.*
D. Lerche. ⊖ (v. v.)
Corollarum alae in medio macula atra holosericæa.
Foliola convoluta.

* 44. VICIA ferratifolia.

- V. leguminibus subsessilibus ternis, foliis stipulisque serratis. W.
- V. caule erecto, petiolis absque cirrho, foliolis ferratis.
Murr. syst. veg. ed. 14. p. 665. *Jacq. austr. app.* *
t. 8.

Gesägte Wicke. W.

Habitat in humidis Pannoniae. ♂ (v. f.)

1357. E R V U M.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1188.

Cal. 5-partitus. *Stigma capitatum undique pilosum.*

1. ERVUN *tetraspermum.*

E. pedunculis subbitloris leguminibus glabris tetraspermis, foliolis oblongis truncatis. W.

E. pedunculis subbitloris, semenibus globosis quaternis.

Fl. suec. 606, 655. *Scop. carn. n.* 902. *Pollich pal.* n. 689. *Hoffm. germ.* 257. *Roth germ.* I. 321.

II. 220.

Vicia foliis linearibus, siliquis gemellis glabris. *Hall. helv.* n. 823.

Vicia (gemella) foliis linearibus, siliquis obtusis gemellis, semenibus globosis quaternis. *Crantz austr.* 389.

Vicia foliolis quadri-quinquejugis linearibus utrinque attenuatis: pedunculis filiformibus, subquinqefloris. *Neck. gallob.* p. 308.

Cracca minor cum siliquis gemellis. *Riv. tetr.* 167.

Vicia segetum, singularibus siliquis glabris. *Bauh. pin.* 345.

Vicia minor segetum, cum siliquis paucis glabris. *Morris. hist.* 2. p. 64. f. 2. t. 4. f. 16.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 625.

Viersaamige Erve. W.

Habitat inter Europae segetes. ♂ (v. v.)

Caulis subtetragonus, anceps. Folia foliolis saepius 10 plerumque alternis. Pedunculus fere capillaris tenuitatis, uniflorus s. biflorus. Flos minutus, saepe sanguineus, alias violaceus. Legumen opali-oblongum, laeve.

*2. ERVUM *vicioides.*

E. pedunculis subquadrifloris, leguminibus sericeis dispermis, foliolis ovatis obtusiusculis. W.

E. (*vicioides*) hirsutum, floribus racemosis, legumini-

bus rhomboideis dispermis, feminibus subrotundis.

Desf. atl. 2. p. 198. *

Wickenartige Erve. W.

Habitat in sepibus Algeriae.

3. ERVUM *hirsutum*.

E. pedunculis multifloris, leguminibus hirsutis dispermis, foliolis linearibus obtusis. W.

E. pedunculis multifloris, seminibus globosis binis.
Sp. pl. 1039. Crantz aust. p. 403. Pollich pal. n. 690. Scop. carn. n. 901. Fl. dan. t. 639. Hoffm. germ. 257. Roth germ. I. 321. II. 221.

Cicer pedunculis multifloris, seminibus globosis. *Hort. cliff. 370. Fl. suec. 607; 556. Roy. lugdb. 389. Da- lib. paris. 228. Sauv. monsp. 233.*

Vicia foliis linearibus, siliquis racemosis, dispermis, hirsutis. *Hall. helv. n. 422.*

Vicia racemis folio longioribus; floribus imbricatis, se- cundis, pendulis; foliolis lanceolatis, superne villosis.
Scop carn. ed. 1. p. 540. n. 4.

Ervum foliolis integerrimis linearibus apice subtrunca- tis: pedunculis suboctofloris. *Neck. gallob. p. 308.*

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bauh. pin. 345.*

Cracca minor. *Tabern. ic. 507. - Riv. tetr. t. 53.*

Houttuyn Liu. Pfl. Syst. 8. p. 625.

Behaarte Erve. W.

Habitat in Europae agris, Oriente. ⊙ (v. v.)

1358. C I C E R.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1189.

Cal. 5-partitus, longitudine corollae: laciniis 4 su- perioribus vexillo incumbentibus. Legumen turgidum, dispermum.

1. CICER *arietinum*.

C. pedunculis unifloris, seminibus globosis gibbis, folio- lis serratis. W.

C. foliolis serratis. *Hort. cliff. 370. Hort. upf. 224. Mat. med. 173. Hall. helv. n. 399. Mill. dict. Blackw.*

- t. 557. Ludw. ect. t. 53. Kniph. cent. 7. n. II.
Regn. bot.*
- C. sativum.** *Bauh. pin. 347. Camer. epit. p. 204.
C. arietinum. Dod. pempt. 525. Riv. t. 19.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 629.
Gemeine Kicher. W.
Habitat inter Hispaniae, Italiae, Orientis segetes. ⊖
(v. v.)*
- Folia pinnata cum impari. Pedunculus uniflorus,
recurvatus.*

2. CICER *Lens.*

- C. pedunculis subbifloris, seminibus compressis, foliolis integerrimis. W.**
- Ervum (Lens) pedunculis subbifloris, seminibus compressis convexis.** *Mat. med. 172. Mill. dict. n. 2.
Scop. carn. n. 900. Leers herb. n. 587. Ludw.
ectyp. t. 141. Kniph. cent. 9. n. 35. Hoffm. germ.
257. Roth germ. I. 321. II. 219.*
- C. pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, stipulis in-**
divisis. *Hort. upf. 224. Sauv. monsp. 233.*
- C. pedunculis bifloris, seminibus compressis.** *Hort.
cliff. 370. Dalib. paris. 346.*
- Lens vulgaris.** *Bauh. pin. 346.*
- Lens.** *Dod. pempt. 526. Hall. helv. n. 421. Riv.
tetr. t. 35.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 624.
Linsen-Kichern. W
Habitat inter segetes Germaniae, Carnioliae, Helvetiae,
Galliae. ⊖ (v. v.)*

1359. L I P A R I A.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1189.

*Cal. 5-fidus: lacinia infima elongata. Cor. alae
inferius bilobae. Staminis majoris dentes
tres breviores. Legumen ovatum.*

1. LIPARIA *sphaerica.*

*L. floribus capitatis, foliis lanceolatis nervosis glabris.
Mant. 268. Thunb. prod. 124.*

Genista africana, rufi foliis longioribus, floribus luteis
in globum congestis. *Raj. dendr.* 107.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 238.

Kugelrunde Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

Frutex floribus speciosissimis. Caulis 4-pedalis, robustus laevis. Folia alterna, sessilia, remota, latolanceolata (*Borboniae*), nervosa, glabra, integerrima, acuta, rigida, mucronata, pungentia. Capitulum terminale, sessile, glabrum, magnitudine *Cynarae calycis*, foliis tanquam calyce, longitudine corollularum circum. Calycis lacinia infima longitudine totius corollae, ejusque latitudine, colorata s. petaloidea, apice emarginato-trifida. Corolla fulva. Alae margine inferiore bilobae; ala altera ante explicationem floris obvolvit alteram alam cum carina, et vicissim involvitur ab altera, quod singulare.

Obs. Charakterem generis haec suppeditavit species.
Distincta est a *Borbonii*s stamine decimo separato. Aestivatio singularis.

* 2. **LIPARIA capitata,**

L. floribus capitatis, capitulo erecto, foliis lanceolatis glabris laevibus. *Thunb. prod.* 124.

Kopfförmige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 3. **LIPARIA tomentosa.**

L. floribus capitatis, foliis lanceolatis tomentosis. *Thunb. prod.* 124.

Filzige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

* 4. **LIPARIA vestita.**

L. floribus capitatis, foliis ovatis concavis subtus lanatis. *Thunb. prod.* 124.

Bekleidete Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

5. **LIPARIA graminifolia.**

L. floribus spicatis hirsutis, foliis lanceolatis cauleque angulato glabris. *Thunb. prod.* 124.

L. floribus capitatis, foliis linearibus alternis acutis sessilibus, calycibus villosis. Mant. 268.

Genista africana, foliis pinastris, floribus spicatis luteis,
Raj. dendr. 105.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 239.

Graßblättrige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei arenosis ♂

Caulis fruticosus, determinate ramosus, laevis, angulatus. Folia linearia (Graminea,) plana, acuminate, stricta, laevia, uninervia, alterna, interstitiis multo longiora, dorso et marginibus subdecurrentia. Stipulae minutae, geminae, subulatae. Capitulum e racemo confectum, terminale, sessile, foliis non longius. Calyx canescens, pilosus: lacinia inferiore longiore. Corolla lutea. Stamen dorsale distinctum. Germen hirsutum. Stigma simplex.

*6. LIPARIA myrtifolia.

L. floribus terminalibus, foliis oblongis glabris. Thunb. prod. 123.

Myrtenblättrige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

7. LIPARIA laevigata.

L. floribus umbellatis involucratis, foliis oblongis glabris. Thunb. prod. 123.

L. (umbellata) floribus umbellatis, foliolis lanceolatis laevis. Mant. 110.

Borbonia (laevigata) foliis lanceolatis enerviis glabris, involucris calycibusque hirtis. Mant. 100.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 188.

Glatte Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂

Rami teretes superne subvilloosi. Folia alterna sessilia lanceolata enervia mucronata glabra. Umbellae terminales brevissime pedunculatae. Involucrum tetraphyllum ovatum concavum erectum pilosum. Pedicelli quaternii involucris breviores. Calyx campanulatus basi planus quinquefidus, fissura superiore minore, acutus pilosus corolla brevior. Corolla lutea. Stamina diadelphiha. Germen hirsutum. Intra calycem aliquot Squamæ nectareæ.

* 8. LIPARIA *umbellifera*.

L. floribus subumbellatis, foliis lanceolatis villosis, ramis umbellatis. Thunb. prod. 124.

Doldenästige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ.

9. LIPARIA *villoso*.

L. floribus fasciculatis, foliis ovatis villoso-tomentosis. Mant. 438.

L. foliis lanceolatis villosis, floribus capitatis. Thunb. prod. 124.

Borbonia (*tomentosa*) foliis obovatis villosis. Spec. 2. p. 994. Berg. cap. 190.

Genista africana tomentosa, folio cochleariformi, flore luteo. Seb. thes. I. p. 38. t. 24. f. 1.

β Genista africana arboreſcens, folio argentea lanigine vestito. Seb. thes. I. p. 38. t. 24. f. 2.

γ Lotus fruticosus. Syst. nat. 10. p. 1179.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 240.

Wollige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

Folia absque stipulis. Flores fasciculati. Corollae laeves. Stamina vere diadelpha. Germina hirsuta. Similis Indigoferae sericeae, sed absque corollis calcaratis, ut puto.

* 10. LIPARIA *teres*.

L. floribus racemosis hirsutis, foliis obovato-oblongis cauleque tereti glabris. Thunb. prod. 124.

Rundstiellige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

* 11. LIPARIA *hirsuta*.

L. floribus racemosis, foliis obovato-oblongis glabris, caule hirsuto. Thunb. prod. 124.

Rauhstiellige Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

* 12. LIPARIA *tecta*.

L. floribus axillaribus pedunculatis, foliis ovatis concavis patulis tomentosis. Thunb. prod. 124.

Bedeckte Liparie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

13. LIPARIA *sericea*. †

L. floribus subspicatis, foliis ovatis villosis tomentosis.
Syst. veg. 555.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 242.

Seidenartige Liparie. W.

Habitat — — — —

Lipariae villosae affinis.

1360. C Y T I S U S.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1191.

Cal. 2-labiatus: $\frac{2}{3}$. *Legumen* basi attenuatum.

1. CYTISUS *Laburnum*.

C. racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 354. *Hort. upf.* 210. *Roy lugdb.* 369. *Hall. helv.* n. 360. *Mill dict.* n. 1. *Scop. carn.* n. 903. *Du Roi harbk.* 1. p. 205. *Jacq. aust.* t. 306. *Hoffm. germ.* 258. *Roth. germ.* I. 322. II. 222. *Willd. arb.* 93.

Anagyris non foetida major alpina. *Bauh. pin.* 391.

Anagyris non foetens minor. *Bauh. pin.* 391.

Laburnum arbor trifolia *anagyridi* similis. *Bauh. hist.* 2. p. 361. *Nov. Act. A. N. C.* vol. I. t. 2. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 242.

Gemeiner Bohnenbaum. W.

Habitat in Helvetia, Sabaudia. (v. v.)

2. CYTISUS *nigricans*.

C. racemis terminalibus erectis, calycibus pilosis, denticulis minutis, foliolis ellipticis pilosis. *Ait. Kew.* 3. p. 49. *Willd. arb.* 93.

C. racemis simplicibus erectis, foliolis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.* 369. *Sauv. monsp.* 190. *Mill. dict.* n. 3. et ic. t. 117. f. 1. *Crantz aust.* p. 394. *Scop. carn.* n. 904. *Jacqu. aust.* t. 387. *Gmel. tub.* p. 223. *Kniph. cent.* 10. p. 37. *Hoffm. germ.* 258. *Roth. germ.* I. 322. II. 223.

C. foliis ovatis nitidis, floribus spicatis, cernuis, calycibus et siliquis sericeis. *Hall. helv.* n. 361.

C. glaber *nigricans*. *Bauh. pin.* 390. *Tournef. inst.* 648.

Cytisus IV. *Cluf. hist.* I. p. 95.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 244.

Schwärzlicher Bohnenbaum. W.

Habitat in Austria, Pannonia, Bohemia, Italia, Germania, etc. ḥ (v. v.)

Folia subtus pilis canescens, supra glabra, impari majore.

*3. CYTISUS foliolosus.

C. racemis terminalibus erectis, calycibus villosis, laci-niis falcatis, foliolis obovato - oblongis. *Ait. Kew.* 3. p. 49.

C. racemis terminalibus erectis, foliis ramulisque con-fertissimis hirsutis, leguminibus glanduloso-murica-tis. *l'Herit. Stirp.* 184.

C. canariensis microphyllus angustifolius prorsus incanus. *Pluk. alm.* 128. t. 277. f. 6.

Beblätterter Bohnenbaum. W.

Habitat in Canariis. ḥ (v. f.)

Folia ternata valde conferta parva. Foliola obova-ta acuta complicata. Racemus pauciflorus terminalis. Alae obtuse carina longiores. Simillimus Genista viscosa (quae Cytisus anagyrus l' Herit.) sed foliola minora confertissima, rami conferti et calyces non glanduloso-viscosi. W.

4. CYTISUS divaricatus.

C. racemis terminalibus erectis, calycibus leguminibus-que ramentaceo-viscidis, foliolis oblongis. *Ait. Kew.* 3. p. 50.

C. (*divaricatus*) racemis terminalibus erectis, ramis divaricatis canis, leguminibus glanduloso-muricatis. *l'Herit. Stirp.* 184.

Spartium (complicatum) foliis ternatis, foliolis condu-plicatis, caulis inermibus prostratis glabris, legumi-nibus scabris. *Sp. pl.* 996.

C. ramis humifusis albidis, floribus capitatis termi-nalibus, foliolis ovalibus glabris aggestis. *Sauv. monsp.* 190.

C. foliis incanis angustis quasi complicatis. *Bauh. pin.* 390. *Guett. Stamp.* 2. p. 417.

C. montis calcaris. *Bauh. hist.* I. p. 370.

Cytisus II. *Cluf. hist.* I. p. 94. *hispl.* 190. *ic.* 192.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 195.

Ausgebreiteter Bohnenbaum. W.

Habitat in Hispania, Gallia australiore. t̄ (v. f.)

Caules pubescentes. Foliola lanceolata nunquam explicata. Stamina alterna antheris magnis; alterna parvis. Legumina nigra asperata setis truncatis sparsis obtusis viscidis.

*5. CYTISUS ponticus. W.

C. racemis terminalibus erectis, calycibus villosis, foliolis ellipticis obtusis ramisque fulcatis pubescentibus. W.

C. orientalis humifusus magno flore ex luteo-purpureo scente. Tournef. cor. 44.

Pontischer Bohnenbaum. W.

Habitat in Ponte t̄ (v. f.)

Rami adscendentibus teretes fulcati pubescentes. Folia ternata parva pubescentia petiolata. Foliola elliptica obtusa. Racemus terminalis bi- vel tripolliticaris. Vexillum apice rotundatum. Alae obtusae carina breviore. Carina falcata obtusa. Similis Genistae viscosae. W.

6. CYTISUS sessilifolius.

*C. racemis erectis, calycibus bractea triplici, foliis floribus sessilibus. Sp. pl. 1041. Mill. dict. n. 4. Du Roi harb. I. p. 209. Willd. arb. 95.**

C. foliis saepius sessilibus, calycibus squamula triplici auctis. Vir. cliff. 71. Hort. cliff. 355. Roy. lugdb. 369. Sauv. monsp. 193. Gouan. monsp. 375.*

C. glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis. Bauh. pin. 390. Du Ham. arb. I.

C. glaber, siliqua lata. Bauh. hist. I. p. 373.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 245.

Italiänischer Bohnenbaum. W.

Habitat in Italia, Galloprovincia. t̄ (v. v.)

Folia longius petiolata, at in ramulis sessilia. Legumina nigricantia.

7. CYTISUS volgaricus.

C. racemis terminalibus secundis, foliis pinnatis canescensibus, foliolis subrotundo-ellipticis. W.

C. (volgaricus) canus, racemis simplicibus erectis, flo-

ribus secundis, foliis pinnatis, foliolis subrotundis, stipulis subulatis. *Lin. Suppl.* 327.

C. (pinnatus) foliis impari-pinnatis, foliolis orbiculatis, floribus racemosis. *Pall. ross.* I. p. 73. t. 47.*

Cytisus nigricans. *Pall. itin.* 3. p. 754. t. G. g. f. 3.
Wolgarischer Bohnenbaum. W.

Habitat in collibus siccis et solo arido circa Wolgam.
ḥ (v. f.)

Frutex pulcherrimus. Folia pinnata. Foliola sex-f. septemjuga cum impari fere orbiculata argentea. Flores intensius flavi.

*8. CYTISUS hispidus. W.

C. racemis axillaribus, foliis pinnatis glabris, foliolis ellipticis, calycibus ramulisque hispidis. W.

Africanischer Bohnenbaum. W.

Habitat in Guinea. ḥ (v. f.)

Arbor magna. Rami laeves cinerascentes. Ramuli novelli et Petioli hispidi. Folia impari-pinnata. Foliola 11 vel 13 elliptica petiolata mucronata glabra alterna. Stipulae linearis subulatae longae persistentes. Racemi axillares 6-vel 8 flori. Bractea oblonga acuta ad basin et binae aliae in medio in quolibet pedunculo. Calyces flororum inexplicatorum hispidi, in floribus explicatis vix hispidi. W.

*9. CYTISUS sericeus. W.

C. racemis terminalibus, foliolis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis subtus sericeis. W.

Seidenartiger Bohnenbaum. W.

Habitat in Tranquebaria. ḥ (v. f.)

Arbuscula ramis teretibus laevis cinerascentibus. Folia impari-pinnata. Foliola sesquipollucaria 13 oblongo-lanceolata obtusa petiolata subopposita superne glabra inferne sericeo-tomentosa. Racemi tripollulares terminales. Legumen bi-vel tripollucare compressum acuminatum sericeum. Similis sequenti, sed foliis pinnatis angustioribus subtus sericeis et racemis terminalibus diversus. W.

10. CYTISUS Cajan.

C. racemis axillaribus erectis, foliolis sublanceolatis tomentosis: intermedio longius petiolato. Fl. zeyl.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

S

- 354.* *Hort. upf.* 211. *Mill. dict.* n. 11. *Hugb. barb.* 199. t. 19. *Jacq. obs.* 1. p. 1. *Burm. ind.* 163. *Swartz obs.* 283.
C. foliolis ovato lanceolatis: intermedio petiolato. pedunculo ex alis multifloro. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugd.* 369.
C. folio molli incano, siliquis orobi contortis et acutis. *Burm. zeyl.* 86. t. 37.
C. fruticosus erectus ramosus triphyllus, foliis subcineraceis oblongis, vexillo variegato, siliqua compressa ad semina torosa. *Brown. jam.* 296.
Cytisus frutescens. *Plum. spec.* 19. ic. 114. f. 2.
Laburnum humilius, siliqua inter grana et grana juncta, semine esculento. *Sloan. jam.* 139. hist. 2. p. 31.
Phaseolus erectus incanus, siliquis torotis. *Pluk. alm.* 293. t. 213. f. 3.
Thora paeru. *Rheed. mal.* 6. p. 23. t. 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 246.
Indischer Bohnenbaum. W.
Habitat in Zeylona, Java, nunc etiam in America calidore. Ȣ (v. f.)
Folia mollissima, certo respectu alba. Racemus erectus. Calyx subpubescens. Corolla flava. Vexillum erectum. Alae horizontaliter planae. Carina obtusa. Stamina diadelpha. Legumen striis oblique transversis interceptum.

II. CYTISUS hirsutus.

- C.** pedunculis aggregatis subterminalibus, calycibus hirsutis trifidis, foliolis obovatis mucronatis subtus hirsutis. W.
C. pedunculis simplicibus lateralibus, calycibus hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis. *Hort. upf.* 211.* *Mill. dict.* n. 5. *Jacq. obs.* 4. p. 11. t. 96.*
C. calycibus hirsutis sessilibus, pedunculis simplicibus brevissimis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugd.* 370. *Sauv. monsp.* 190.
C. incanus, siliqua longiore. *Bauh. pin.* 390.
C. foliis subrufa lanagine hirsutis. *Bauh. pin.* 390.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 349.
Haariger Bohnenbaum. W.
Habitat in Hispania, Italia. Ȣ.

Rami decumbentes, ut in sequenti. Folia subtus hirsuta Calyces hirsutissimi.

Habitus *Genistae candicantis*. Flores aggregati subcapitati plerumque in ramorum apice rarius in axillis. Flores minores quam in *C. supino*. Legumina pollicaria *hirsuta* linearia incurvata mucronata. W.

In *Cytiso Laburno*, *sessilifolio et capitato* Stamina omnia connata cum cel. Crantzio observat ill. Medicus in obs. Soc. oecon. Lutr. 1774. p. 192. R.

12. CYTISUS capitatus.

C. floribus capitatis, ramis erectis strictis teretibus villoso-foliolis ovato-ellipticis villoso-foliolis, bractea linearis subcalycina. Ait. Kew. 3. p. 51. Willd. arb. 95. *

Cytisus capitatus. Murr. Syst. ed. 14. p. 666. Jacq. austri. I. p. 22. t. 33. Host. synop. 402.

C. (*supinus*) floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliolis ovatis. Syst. veg. 555. Mattusch. fil. n. 536.

C. (*supinus*) floribus umbellatis terminalibus, ramis decumbentibus, foliolis ovatis. Sp. pl. 1042. Roy. lugdb. 376. Hort. upf. 211. Mill. dict. n. 7.

C. (*hirsutus*) foliis ovatis, ramis decumbentibus, floribus capitato-umbellatis. Crantz. austri. p. 398.

Cytisus V. species altera. Clus. hist. I. p. 96.

Cytisus VII. species altera. Clus. hist. I. p. 97.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 249.

Kopfförmiger Bohnenbaum. W.

Habitat in Austria, Italia, Sicilia, Galloprovincia. 5. (v. v.)

Caulis petiolique pubescentia, folia laeviuscula. Calyx tubulosus, ventricosus, pubescens, bilabiatus.

Jam Aprili Majo oriuntur ex axillis foliorum flores solitarii, modo bini, quandoque terni. Junio ex ipsa ramorum summitate exoritur florum breviter pedunculatorum numero incerto capitulum, five umbella.
Host. l. c.

13. CYTISUS austriacus.

C. floribus umbellatis terminalibus, caulis erectis, foliolis lanceolatis utrinque attenuatis strigoso-pubescentibus. W.

- C.** floribus umbellatis terminalibus, caulis erectis, foliolis lanceolatis. *Sp. pl.* 1042. *Crantz aust.* 396. *Jacq. aust.* 1. p. 16. t. 21. *Pall. ross.* 1. p. 73. *itin.* 3. *app. n.* 123. *t. G. g. f. 2.* *Willd. arb.* 96.*
- C.** floribus capitatis, foliolis ovato-oblongis, caule fruticolo. *Mill. dict.* *t. 107. f. 2.* *ed. germ.* *t. 117. f. 2.*
- C.** incanus, folio oblongo, austriacus. *Bauh. pin.* 390. *Cytisus V.* *Cluf. hist.* 1. p. 195. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 250. Oestreichischer Bohnenbaum. W. *Habitat in Sibiria, Austria, Italia.* ৎ (v. v.) *Similis C. capitato, sed Caules erecti, ramosissimi, paniculati. Foliola lanceolata, nec ovata.* *Stamina etiam omnia connata sunt.* *Crantz. l. c.* R.

*14. CYTISUS leucanthus.

- C.** floribus umbellatis terminalibus, caulis erectis, foliolis ellipticis glabris acutis. W. *Cytisus leucanthus.* *Waldstein et Kitaibel pl. rar. hung.* Weißblumiger Bohnenbaum. W. *Habitat in fruticetis et sylvis Banatus.* ৎ (v. f.) *Rami teretes tenuissime pubescentes. Folia ternata petiolata. Foliola oblonga semipollicaria basi angustiora apice obtusa mucronata superne glabra subtus pilis raris adpresso obsoita. Flores capitati terminales. Calyces cylindracei trifidi pubescentes. Leguminæ pollicaria oblongo-linearia villosa. A C. austriaco diversus glabritie et forma foliorum, florum colore, ramisque tenuioribus virgatis.* W.

*15. CYTISUS purpureus.

- C.** floribus axillaribus solitariis pedunculis, caulis procumbentibus, foliolis obovatis leguminibusque linearibus subrepandis. W. *C.* floribus pedunculatis solitariis, foliis glabris, caulis decumbentibus frutescentibus, leguminibus superne falcatis. *Murr. syst. veg. ed 14. p. 667.* *Jacq. aust.* 5. *app. t. 48.* *Hofst. synop.* 403. *Cytisus purpureus.* *Scop. carn. n. 905. t. 43.** *Zann. hist.* p. 83. t. 2. 10.

Rother Bohnenbaum. W.

Habitat in Carnioliae, Croatiae, Forijulii apicis asperis herbidis ᄁ (v. v.)

Tota planta glabra. Foliola oblongo-ovata mucronata interdum subpubescentia. Legumina linearia glabra margine superiore subrepanda subfalcata, mucronata. W.

* 16. CYTISUS *supinus*.

C. floribus pedunculatis subbinatis axillaribus, caule decumbente, foliolis obovato-obtusis. Willd. arb. 97. *

C. (*supinus*) floribus pedunculatis subbinatis, caulis decumbentibus frutescentibus. Murr. syst. veg. ed. 14. p. 667. Jacq. aust. I. p. 15. t. 20.

C. calycibus hirsutis subfessilibus, pedunculis simplicibus brevissimis. Gmel. fib. 4. p. 17. t. 6. f. 2.

Cytisus hirsutus. Pall. ross. I. p. 74.

C. *supinus* foliis infra et siliquis molli lanugine pubescens. Bauh. pin. 390.

Cytisus VII. Clus. hist. I. p. 97.

Niedriger Bohnenbaum. W.

Habitat in collibus apicis Austriae, Pannoniae, Sibiriæ. ᄁ (v. v.)

* 17. CYTISUS *biflorus*.

C. pedunculis sabbinnatis axillaribus, caulis diffuso-erectis, foliolis oblongo-lanceolatis. l'Herit. stirp. 184. Willd. arb. 197. *

C. (*biflorus*) pedunculis subbinatis lateralibus, calycibus oblongis villosis bilabiatus, labio superiore bifido, foliolis oblongo-ellipticis. Ait. Kew. 3. p. 52.

C. (*glaber*) foliis ternatis, floribus lateralibus solitariis subfessilibus pendulis. Lin. suppl. 328. *

C. glaber, siliquis angustis. Bauh. hist. I. 2. p. 373.

Zweyblumiger Bohnenbaum. W.

Habitat in Hungaria. ᄁ (v. v.)

* 18. CYTISUS *triflorus*.

C. floribus pedunculis axillaribus subternis, calycibus campanulatis, foliolis obovatis obtusis hirsutis. W.

C. (*triflorus*) foliolis ternis obovatis hirtis mucronatis,

floribus axillaribus pedicellatis, calyce abbreviato, leguminibus villofissimis. Desf. atl. 2. p. 139. *

C. (*triflorus*) *pedunculis lateralibus subternatis filiformibus, calycibus abbreviatis hirtis, foliis hirsutis.* l'Herit. stirp. 184.

Cytisus hispanicus. Tabern. ic. 1099.

Cytisus III. Clus. hist. I. p. 94.

Cytisus hispanicus arboreus. Park. theat 1472.

Pseudo - cytisus hirtus. Ger. emac. 1308.

Dreyblumiger Bohnenbaum. W.

Habitat in Barbaria. Hispania. ḥ (v. f.)

Foliola oblonga ovata obtusa mucronata hirsuta. Pedunculi filiformes plerumque terni longiores quam in praecedentibus. Calyces trifidi campanulati nec tubulosi. W.

19. CYTISUS proliferus.

C. *floribus umbellatis lateralibus, caulis erectis, foliis ellipticis erectis subtus sericeis, calycibus lanatis.* Ait.

Kew. 3. p. 51.

C. *umbellis axillaribus sessilibus proliferis, foliis ternatis petiolatis, foliolis lanceolatis sericeis, bracteis filiformibus.* Lin. suppl 328.

C. *floribus in medio gemmarum verticillatis, foliolis ovali-lanceolatis sericeis, staminibus monadelphis.* Ventenat. descr. pl. nov. 13. t. 13. *

Scobon. Teneriff.

Habitat in sylvis montosis Teneriffae. Franc. Masson. ḥ (v. f.)

Refert C. argenteum. Caules hirsutie fere tomentosi imprimis ramuli. Folia alterna petiolata ternata. Foliola lanceolata utrinque attenuata pilosa, pilis appressis, subtus inde argentea. Pedunculi in axillis foliorum quatuor ad octo aequales uniflori petiolo parum longiores filiformes villosi, prope florem bracteati. Bracteae binæ oppositae filiformes. Calyces villosi. Corollæ majores albae. Peracta florescentia in centro pedunculorum excrescit ramus.

*20. CYTICUS paucifloris.

C. *pedunculis subquadrifloris terminalibus, foliolis obovatis subtus pubescentibus, calycibus profunde tritartitis.* W.

Cytisus pauciflorus. *Marschall flora taur. caucas.*

Wenigblütiger Bohnenbaum. W.

Habitat in Persia boreali. 5 (v. f.)

Similis *C. leucantho* sed Capitulum florum tantum quadrisflorum interdum modo bi- vel triflorum, Calyces profunde partiti, Petioli longitudine foliorum. W.

*21. **CYTISUS lotoides.** W.

C. floribus capitatis, foliolis subrotundellipticis, caule simplici herbaceo decumbente. W.

C. orientalis humifusus, facie trifolii pratensis. *Tournef. cor. 44.*

Schotenkleeartiger Bohnenbaum. W.

Habitat in Galatia. 4 (v. f.)

Radix lignosa ramosa perennis. Caules plures semipedales herbacei decumbentes simplices levissime pubescentes. Folia petiolata ternata. Foliola subrotundo-elliptica utrinque acuta pubescentia. Stipulae oblongae acutae pilosae. Capitulum suboctoflorum pedunculatum durante florescentia in apice caulis, postea axillare. Calyces profunde trifidi longitudine fere corollae. W.

*22. **CYTISUS pygmaeus.** W.

C. pedunculis subtornis terminalibus, foliolis oblongo-lanceolatis sericeis, leguminibus oblongis villosis, caulis decumbentibus. W.

Zwerg-Bohnenbaum. W.

Habitat in Galatia. 5 (v. f.)

Caules rumerosi suffruticosi procumbentes ramosi digitales et ultra. Folia ternata petiolata. Foliola oblongo-lanceolata acutiuscula sericeo villosa. Petiolus folio longior. Stipulae ovatae parvae. Flores terminales pedunculati terni. Legumina oblongo linearia villosa stylo aristata. Simillimus sequenti sed foliola parum latiora. Legumina oblongo-linearia villosa, nec linearia angusta sericea. In nosiro ob pilos copiosos impressiones seminum haud visibles sunt, quae vero in sequenti facile animadvertes. Figura Morisoni forte ob legumina villosa ad hunc pertinet. W.

23. CYTISUS *argenteus*.

- C. pedunculis subternis terminalibus, foliolis oblongo-lanceolatis sericeis, leguminibus linearibus sericeis, caulinibus decumbentibus. W.
- C. floribus subsessilibus subbinatis, foliis tomentosis, caulinibus decumbentibus, stipulis minutis. Sp. pl. 1043.
Ger. prov. 484. n. 4. Gouan. hort. 377. Mill. dict. n. 6. Scop. carn. n. 910.
- C. acaulis, floribus solitariis: foliolis sericeis lanceolatis. Sauv. monsp. 191.
- Lotus fruticosus incanus siliquosus. Bauh. pin. 332.
- Lotus asperior fruticosa narbonensis incana. Lob. ic. 2. p. 41.
- Trifolium argenteum, floribus luteis. Bauh. hist. 2. p. 359. bona.
- Lotus perennis oligoceratos incana Narbonensium. Moris. hist. 2. p. 175. t. 18. f. 2.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 251.
- Siberfarbiger Bohnenbaum. W.
- Habitat in G. Narbonensis. Carniola. ḥ (v. f.)*
- Planta incana, nitida. Rami versus radicem frumentantes, superne herbacei. Bracteae 2 f. 3 calycis basi adnatae. Calycis laciniae longiores, quam in congeneribus. Legumina hirsuta.

24. CYTISUS *graecus*.

- C. foliis simplicibus lancolato-linearibus, ramis angustatis. Sp. pl. 1043. Mill. dict. n. 10.
- Barba jovis, linariae folio, flore luteo parvo. Tournef. cor. 44.?
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 251.
- Griechischer Bohnenbaum. W.
- Habitat in Archipelagi insulis. ḥ*

1361. MÜLLERA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1192.

Cal. 4-dentatus. Lomentum moniliforme, globulis carnosis monospermis filo caharentibus.

I. MÜLLERA *moniliformis*.

M. *moniliformis*. Lin. Suppl. 329.

Coronilla americana arborescens, floribus dilute rubescen-
tibus. Merian. furin. p. 35. t. 35.

Rosenkranzförmige Müllere. W.

Habitat in Surinamo. Dalberg. 5

Arbor ramis ferrugineis subverrucosis. Folia alter-
na petiolata pinnata bijuga cum impari. Foliola qui-
na aequalia opposita petiolata ovato-oblonga ligu-
strina integerrima acuta supra glabra subtus sericea
plana venosa. Petioli elongati teretes, basi ad inser-
tionem articulo incrassato. Stipulae nullae. Racemi
axillares et terminales simplices longitudine petiolo-
rum. Bracteae nullae. Flores sparsi nutantes magni-
tudine Cytisi Laburni.

Peracta florescentia cadunt petala permanente caly-
ce, excrescit germen, in flore visible; tamen in fru-
ctum non mutatur, sed excrescunt germine elongato,
quasi e receptaculo, globuli plures concatenati com-
pressi usculi, (cujus nullum vesigium in flore) magnitu-
dine primum semina Ervi, et perfecta magnitudine
Pruna majora aemulantes. Globuli hi exakte globoſi,
glaberrimi, a receptaculo petiolati. Ex apice alte-
rius globuli exit petiolus brevis, qui alterum combi-
nat, et sic ultra. Nulla sutura in globulis visibilis,
nec finduntur ut in Leguminibus, sed fructus substam-
tia crassa duriori consiat, in cuius medio cavitas; ut in
prunis oblongis, repleta semine unico reniformi ma-
gnitudine Phaseoli majoris, hilo affixo angulo, ut
in Leguminibus. Mirae structurae certe hic fructus.
Raro in racemo constat pericarpium ex uno globulo.

Magnam cum Sophoris habet similitudinem at illis
associari negant stamina perfecte diadelpa et fructus
non leguminosus, h. e. longitudinaliter rumpens.

1362. G E O F F R O Y A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1193.

Cal. 5-fidus. Drupa ovata. Nucleus compressus.

I. GEOFFROYA spinosa.

G. spinosa, foliolis oblongis obtusis. Swartz prod. 106.
Geoffraea. Sp. pl. 1043. Jacq. amer. 207. t. 180. f. 62.

Umari. *Marcgr. bras.* 121. *Raj. hist.* 1518.

Houttuyn Lin. Pl. Syss. 2. p. 201.

Stachliche Geoffroye. W.

Habitat in Brasilia. ȳ

Arbor spinosa, Foliis pinnatis, Fructibus drupaceis;
persiciformibus.

*2. GEOFFROYA *surinamensis*.

G. inermis, foliolis oblongis obtusis emarginatis. W.

G. (*surinamensis*) inermis, foliolis ovalibus obtusis seu retusis, carina dipetala. *Bondt. Monogr.* p. 13. *cum icono.**

Surinamische Geoffroye. W.

Habitat Surinamo. ȳ

*3. GEOFFROYA *inermis*.

G. inermis, foliolis lanceolatis. *Swartz prod.* 106.

G. inermis jamaicensis. *Wright. Act. angl.* 1777. vol. 67. p. 512. t. 10.

Westindische Geoffroye. W.

Habitat in Jamaica, Martinica. ȳ (v. f.)

* 1363. D I P H Y S A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1194.

Cal. 5-fidus inaequalis. *Legumen uniloculare polyspermum compressum utrinque vesica longitudinali maxima cinctum.*

*1. DIPHYSA *carthagenerensis*.

D. *carthagenerensis*. *Jacq. amer.* 208. t. 181. f. 51.*

Carthagenerische Blasenschote. W.

Habitat in Carthagena Americes. ȳ

Arbuscula decempedalis ramosa facie Mimosae arborecentis. Folia impari-pinnata bipinnicaria, foliolis 5-jugis oblongis emarginatis. Pedunculi axillares bi-f. triflori longitudine foliorum. Corolla flavia. W.

1364. R O B I N I A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1195.

Cal. 4-fidus, lacinia superiore bipartita. Legumen gibbum, elongatum.

1. ROBINIA *Pseudacacia*.

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, stipulis spinosis, leguminibus laevibus. W.

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari pinnatis, stipulis spinosis. *Hort. upf.* 212. *Muting.* t. 8. *Mill. dict.* n. 1. *Du Ttoi. harbk.* 2. p. 320. *Kniph. cent.* 3. n. 76. *Willd. arb.* 298.* *Wangeh. amer.* 16. t. 7. f. 19.*

R. aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 354. *Gron. virg.* 105. *Roy. lugdb.* 372. *Du ham. arb.* 2. t. 42.

Acacia americana, siliquies glabris. *Raj. hist.* 1719. *Seb. mus.* 1. t. 15. f. 1.

Acacie affinis virginiana spinosa, siliqua membranacea plana. *Pluk alm.* 9. p. 73. t. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 203.

Gemeine Robinie. W.

Habitat in America boreali. ḥ (v. v.)

Racemi penduli albi.

*2. ROBINIA *viscosa*.

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, ramis leguminibusque glanduloso-viscosis. W.

R. (*viscosa*) ramis axillaribus ovatis erectis, foliis impari-pinnatis, ramis visco-glandulosis. *Ventenat. desc. pl. nov.* 4. t. 4.*

Klebrige Robinie. W.

Habitat in Carolina meridionali ad scaturigines fluminis Savannah. ḥ (v. v.)

Arbor facie praecedentis. Rami juniores glanduloso-viscosi stipulis persistentibus muniti, seniores laeves.

Folia praecedentis. Racemi axillares erecti. Flores ex albo rubicundi. Legumina glandulis viscosis tecta. W.

3. ROBINIA *violacea*.

R. racemis pedicellis bifloris, calycibus truncatis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. W.

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Sp. pl.* 1044.

R. inermis, pedunculis racemosis, partialibus bifloris, foliis impari-pinnatis. *Jacq. amer.* 210. t. 77. f. 40.*
Pseudacacia floribus violaceis. *Plum. Spec.* 19.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 26.
 Violette Robinie. W.
Habitat in Carthagene Americes fruticetis. 5

*4. ROBINIA striata. W.

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis subtus pubescentibus, caule inermi. W.
 Gestreifte Robinie. W.
Habitat ad Caracas in collibus aprices. 5 (v. f.)
 Frutex magnus ramis pallidis verucosis inermibus. Folia semipedalia impari-pinnata. Foliola 15-25 pollicaria oblonga utrinque rotundata apice mucronata striato-venosa superne nitida inferne pilis adpressis tecta. Stipulae lanceolatae caducae. Racemi foliis breviores pedicellis unifloris. Bracteae brevissimae subulatae. Calyces campanulati ut pedunculi pubescentes, quadrifidi, laenia suprema bipartita. Corollae flavae. *Hanc speciem detexit Clariss.* Brede-meyer. W.

5. ROBINIA hispida.

R. racemis axillaribus, foliis impari-pinnatis, caule inermi hispido. *Mant.* 101. *Du Roi harbk.* 2. p. 325. *Willd. arb.* 298.* *Wangenh. amer.* 58.
 R. foliis impari-pinnatis: foliolis ovatis, ramis pedunculisque hispidis. *Mill. ic.* 163. t. 244.
Pseudoacacia hispida, floribus roseis. *Catesb. car.* 3. p. 20. t. 20.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 207.

Stachliche Robinie. W.

Habitat in Florida, Carolina, Virginia, Pensylvania. 5 (v. v.)

Simillima R. Pseudacacia, sed Flores majores, rosei, ramuli pedunculi calycesque hispidi, Foliola magis ovalia et ovata.

*6. ROBINIA sepium.

R. racemis pedicellis subbifloris, foliis impari-pinnatis, foliolis acuminatis, caule inermi. W.

R. inermis, pedunculis racemosis, partialibus bifloris,
foliis impari-pinnatis, pinnis ovatis acuminatis
Swartz prod. 106.

R. inermis pedunculis racemosis, partialibus unifloris,
foliis impari-pinnatis. *Jacq. amer. 221. t. 179. f.*
*101.**

Zaun-Robinie. W.

Habitat Carthaginæ, et in Hispaniola. ৎ

*7. ROBINIA squamata.

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis,
foliolis ovalibus spinoso-mucronatis, petiolis inermi-
bus. *Vahl. symb. 3. p. 88. t. 69.*

Schuppige Robinie. W.

Habitat in insula St. Thomae Americes. ৎ

Rami teretes glabri, cortice purpurascenti-griseo,
inferne aphylli, superne foliosi, infra folia squamosi.
Ramuli alterni pollicares vel breviores e squamis ova-
tis acuminatis imbricatis tetragonii. Folia alterna di-
stantia, ramulorum ex ipso apice vel parum infra, in-
terdum 2 f. 3; omnia petiolata pinnata cum impari,
novemjuga. Foliola brevissime petiolata alterna un-
guicularia, extima parum minora, omnia ovalia f. sub-
rotunda, utrinque glabra nitida, simpliciter venosa
subretusa, costa ultra foliolum in spinam excrescens.
Petiolus inermis. Stipulae unguiculares rigidae spino-
sae erecto-patentes persistentes. Pedunculi axillares
solitarii filiformes pubescentes folio breviores. Pedi-
celli quatuor vel quinque distantes sub flore genicu-
lati. Bractea parva linearis ad basin pedicellorum.
Calyx glaber, lacinias lanceolatis. Legumen compres-
sum lineare erectum acutum, interdum subarticula-
tum, interdum inter semina coarctatum, 2-5-spermum.
Vahl. I. c.

*8. ROBINIA uliginosa.

R. racemis pedicellis trifloris, foliis ternatis oblongis acu-
minatis, ramis inermibus scandentibus. W.

Robinia uliginosa. Roxburgh.

Schnpf-Robinie. W.

Habitat in India orientali. ৎ (v. f.)

Rami teretes glabri scandentes. Folia alterna ter-

nata. Foliola sesquipollucaria acuminata glabra. Racemi tripollucares, pedunculis trifloris, in ramis vetustis. Flores videntur albi. W.

Robinia mitis Sp. pl. 1044. est nostra Dalbergia arborea supra, p. 901. descripta. W.

* 9. ROBINIA scandens. W. +

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-oblongis acuminatis, ramis inermibus scandentibus. W.

R. (*Nicou*) floribus purpureis spicatis, ramulis scandentibus. *Aub. guj. 2. p. 771 t. 308.**

Kletternde Robinie. W.

Habitat in Gujanæ sylvis. ḥ

Frutex ramosus, ramis scandentibus. Folia impari-pinnata, Foliola septem ovato-oblonga acuminata tri-vel quadripollucaria glabra. W.

* 10. ROBINIA tomentosa. W.

R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis tomentosis, caule inermi. W.

R. (*Panacoco*) foliis tomentosis, floribus purpurascensibus. *Aubl. guj. 2. p. 768. t. 307.**

Filzige Robinie. W.

Habitat in sylvis Cajennæ et Gujanæ. ḥ

Arbor 60-pedalis truncu et ramis angulatis. Folia impari-pinnata rigida. Foliola 13 oblonga acuta bi-f. tripollucaria tomentosa, basi subcordata. Stipulae ampliae subrotundae. W.

* 11. ROBINIA florida.

R. pedunculis simplicibus unifloris, foliis abrupte pinna-tis, petiolis stipulisque inermibus. *Vahl. symb. 3. p. 89. t. 70.*

Vielblütige Robinie. W.

Habitat in insula Krabben Eiland et in sepibus insulae St. Johannis Americes. ḥ (v. f.)

Frutex pulcherrimus, tempore florescentiae aphyllus, floribus tantum totus tectus. Rami teretes glabri purpurascenti-cinerei punctati glabri. Folia inferiora e gemma praeteriti anni post casum florum, plerumque duo vel tria approximata digitalia, foliolis vix un-

guicularibus, superne et in ramis junioribus solitaria alterna remotiora, inferioribus dimidio longiora, foliolis vix pollicaribus omnia petiolata opposita glabra oblonga venosa mucronata, superiora parum minora. Petiolus inermis. Stipulae lanceolatae parvae attenuatae inerme flexiles persistentes. Petonculi 4 vel 5 e singula genma unguiculares capillares uniflori sub flore geniculati. Calyx cyathiformis margine integro ad lentem villosus. Corolla magna purpurascens. Ungues petalorum longitudine calycis. Germen glabrum.

Vahl. l. c.

*12. ROBINIA *Caragana.*

R. pedunculis simplicibus plurimis, foliis abrupte pinnatis subquadrijugis, petiolis inermibus, leguminibus cylindricis. *l'Herit. stirp. 160. Willd. arb. 299.**

R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, petiolis inermibus. *Hort. upf. p. 212. Mill. dict. n. II. Fabric. helv. 421. Gmel. fib. 4. p. 17. n. 22. Du Roi harb. 2. p. 327. Kniph. cent. 5. n. 76.*

R. (*Altagana*) pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, stipulis spinefcentibus. *Pall. rosf. 68. t. 42. fig. intermedia.*

Afpalathus arborescens, pinnis foliorum crebrioribus oblongis. *Amm. ruth. 285.*

Pseudo-Acacia foliorum pinnis crebrioribus. *Du ham. arb. 3.*

Caragana sibirica. Roy. lugdb. 537.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 252.

Sibirische Robinie. W.

Habitat in Siberia. h (v. v.)

Folia quinque vel sexjuga. Stipulae et petioli apex subspinefcentes, ut in sequentibus. Flores sex, ad gemmam praeteriti anni, propriis pedunculis. Color florum luteus.

*13. ROBINIA *Altagana.*

R. pedunculis simplicibus solitariis, foliis abrupte pinnatis suboctojugis, stipulis spinefcentibus, leguminibus compressis. *l'Herit. stirp. 159. t. 76.**

Robinia Altagana β *Pall. rosf. 69. t. 42. figurae laterales.*

Sand-Robinie. W.

Habitat in Danuriae arenosis. ḥ (v. f.)

Similis praecedenti sed diversa: Foliolis duplo numerosioribus et minoribus obovatis emarginatis. Pedunculis solitariis nec aggregatis, Leguminibus compressis. IV.

* 14. ROBINIA jubata.

R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis multijugis foliolis lanceolatis pubescentibus, petiolis filiformibus spinescentibus, ramis villosis. W.

R. (*jubata*) ramis abbreviatis villosis, petiolis elongatis spinescentibus confertis, pedunculis unifloris. Pall.

*Nov. Act. Petrop. 10. p. 370. t. 6**

Mähnenartige Robinie. W.

Habitat ad lacum Baical in Sibiria. ḥ

Frutex parvus sesqui- vel bipedalis facie prorsus aliena. Rami villosi et petiolis praeteriti anni filiformibus spinescentibus reflexis obfisi. Foliola lanceolata angustia pubescentia. Flores purpurascentes. Legmina cylindracea dura testacea. W.

* 15. ROBINIA tragacanthoides.

R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis bijugis, foliolis oblongo-lanceolatis sericeis, stipulis petiolisque spinescentibus. W.

R. (*tragacanthoides*) ramosissima, foliis bijugis, petiolis spinescentibus, spinis reflexo-patentibus, pedunculis unifloris. Pall. *Nov. Act. Petrop. 10. p. 371. t. 7.**

Traganthartige Robinie. W.

Habitat in rupestribus granitosis Sibiriae transbaicalensis. ḥ (v. f.)

Frutex parvus ramosissimus. Rami spinis validis recurvatis tecti, pubescentes. Folia bijuga. Foliola parva oblongo-lanceolata, utrinque attenuata apice mucrone pugente instructa, sericeo-cana. Flores flavi. Legumen cylindraceo-compressum pubescens. W.

16 ROBINIA spinosa.

R. pedunculis simplicibus, foliolis abrupte pinnatis, subquadrijugis, foliolis cuneatis glabris, stipulis petiolisque spinescentibus. W.

R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, stipulis petiolisque spinescentibus. *Mant.* 269.

R. pedunculis simplicibus subsolitariis, foliis abrupte pinnatis multiungis, petiolis spinescentibus. *l'Herit. Stirp.* 160. *Willd. arb.* 300.

Robinia ferox. *Pall. ross.* I. p. 70. t. 44.* *Ejusd. itin.* 3. app. n. 125. t. E. e. f. 2. 3.

R. (*spinosissima*) foliis junioris plantae sparsis, abrupte pinnatis, stipulatis petiolo persistente, arboreo, inque spinam acutissimam exerente: adultae vero plantae foliis quadernatis, subpetiolatis, fasciculatis, floribus sessilibus. *Laxm. Nov. Act. Petrop.* vol XV. p. 558. t. 30. f. 4.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 254.

Dornige Robinie. W.

Habitat in Sibiriae montibus arenosis siccissimis Salengiae et Kiachae. Ȑ *D. Laxmann.* (v. v.)

Similis R. Caraganae, sed stipulis petiolisque rigentibus f. spinosis. Frutex ultra humanae altitudinis. Folia abrupte pinnata: foliola 6 f. 8. Petiolus communis lignosus, totus perennis, apice spinosus. Foliola ovata, laevia. Stipulae subulatae, spinosae, perennes.

Usus pro sepibus vivis, ad excludendum Animalia, omnium praestantissima.

17. ROBINIA *Halodendron.*

R. pedunculis trifloris, foliis abrupte - pinnatis bijugis sericeis, petiolis spinescentibus persistentibus, leguminibus vesicariis. *l'Herit. Stirp. nov.* 162. *Willd. arb.* 321.*

R. racemis axillaribus trifloris, petiolis spinescentibus, foliis ternatis petiolatis, foliolis cuneiformibus spinosus cuspidatis. *Lin. suppl.* 330.

R. pedunculis trifloris, foliis bijugis incanis, petiolis spinescentibus. *Pall. ross.* I. p. 72. t. 46.* *Ejusd. itin.* 2. app. 117. t. W.

Ȑ R. (*triflora*) pedunculis trifloris, foliis abrupte pinnatis bijugis glabris petiolis stipulisque rigescientibus. *l'Herit. Stirp. nov.* 162.

Graue Robinie. W.

Habitat in Sibiria ad salicinosa ad Irtine copiose. Ȑ (v. v.)

* 18. ROBINIA *Chamlagu.*

R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis bijugis, foliolis obovatis glabris, stipulis petiolisque spine-scentibus. W.

R. pedunculis simplicibus subsolitariis, foliis abrupte pinnatis bijugis, petiolis stipulisque spinescentibus.
l' Herit. stirp. 161. t. 77. *

Glänzende Robinie. W.

Habitat in China. ხ (v. f.)

19. ROBINIA *frutescens.*

R. pedunculis simplicibus, foliis quaternatis subpetiolatis, terminatis spina inermi. *Hort. upf. 212. Mill. dict. n. 10. Gmel. fib. 4. p. 16. Du Roi. harbk. 2. p. 330. Willd. arb. 302.* *

R. pedunculis simplicibus, foliis quaternatis, petiolo stipulisque spinescentibus. *Pall. ross. I. p. 69. t. 43.* *

Aspalathus frutescens major latifolius, cortice aureo.
Anm. ruth. 293. Du Ham. arb. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 254.

Strauchartige Robinie. W.

Habitat in Sibiria, Tataria. ხ (v. v.)

Folia quaternata, sed inter intima petioli apex spinosus, uti stipulae. Pedunculi ad gemmam prioris anni tantum duo. Flores lutei.

* 20. ROBINIA *pygmaea.*

R. pedunculis simplicibus, foliis quaternatis sessilibus.
Hort. upf. 212. Mill. dict. n. 12. Pall. it. 2. p. 687. Du Roi. harbk. 2. p. 332. Gmel. fib. 4. p. 16. n. 21. Pall. ross. I. p. 71. t. 45. * *Willd. arb. 302.* *

Aspalathus frutescens minor angustifolius, cortice aureo.

Anm. ruth. 282. t. 35. Du Ham. arb. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 257.

Niedrige Robinie. W.

Habitat in Sibiria. ხ (v. v.)

Simillima priori, sed pygmaea, magis spinosa; Foliis cuneiformibus obtusissimis duris culis

Stipulae in foliis primordialibus foliaceae lanceolatae in hac tantum specie; in omnibus sibiricis folia primordalia terna sunt. Flores lutei.

1365. C O L U T E A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1196.

Cal. 5-fidus. Legumen inflatum, basi superiore dehiscens.

† *Fruticosae.*

1. COLUTEA *arborescens.*

C. foliolis ellipticis retusis, vexilli gibbis abbreviatis, caule fruticoso. W.

C. arborea, foliolis obcordatis. *Hort. cliff.* 365. *Hort. upf.* 228. *Roy. lugdb.* 374. *Mill. dict. n. I.* *Scop. carn. n. 881.* *Du Roi harbk. I. p. 157.* *Medic. in obs.* *Soc. oec. Lutr. 174. p. 172.* *Kniph. cent. 5. n. 24.* *Hoffm. germ. 259.*

C. foliolis ovali-obcordatis, vexilli gibbis abbreviatis. *Ait. Kew. 3. p. 55.* *Willd. arb. 70.**

C. (*hirfuta*) arborescens, foliolis obcordato-oblongis, stipulis lanceolatis, racemis hirsutis, leguminibus apice clausis. *Roth germ. I. 305. II. 168.*

C. foliis ovatis emarginatis, floribus racemosis. *Hall. helv. n. 400.* R.

C. vesicaria. *Bauh. pin. 396.*

Colutea. *Dod. pempt. 784.* *Riv. t. 20.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 258.

Baumartiger Blätenstrauch. W.

Habitat in Anglia, G. Narbonensi, Italia, etc. copiose ad Vesuvium. h (v. v.)

Arbor foliolis fere obovatis, floribus luteis.

*2. COLUTEA *cruenta.*

C. foliolis obovatis emarginatis glaucis, vexilli gibbis obtusis minimis, leguminibus apice apertis, caule fruticoso. W.

C. (*cruenta*) *fruticosa*, foliolis cuneiformi-obcordatis, vexillis gibbis obtusis minimis. *Ait. Kew. 3. p. 55.* *Willd. arb. 70.**

C. (*orientalis*) foliis cordatis minoribus, caule fruticoso. *Du Roi harbk. I. p. 159.*

C. (*orientalis*) *fruticosa*, foliolis cordatis glaucis, floribus sanguineis. *Lamarek encycl. I. p. 349.*

- C.** (*orientalis*) caule fruticoso, foliis impari-pinnatis, pinnulis novem ovato-rotundatis emarginatis glabris glaucis, floribus sanguineis. *Cav. ic. 4. p. 4. t. 307.**
C. (*orientalis*) arborescens, foliis obcordatis rotundatis subcarnosis, stipulis minimis denticularibus, racemis glabris, leguminibus apice superne hiantibus. *Roth. germ. I. 305. II. 169. Hoffm. germ. 359.*
C. (*sanguinea*) foliolis glaberrimis, petiolis subexstipulatis. *Pall. ross. 2. p. 174.*
C. (*humilis*) fruticosa, foliolis obcordatis, carinae apice truncata. *Scop. infub. 2. p. 23 t. 12.*
C. *africana*, sennae foliis, flore sanguineo. *Comm. rar. II. t. II.*
C. *orientalis*, flore sanguinei coloris, lutea macula notata. *Tournef. cor. 44.*
Rother Blasenstrauch. W.
Habitat in Germania australi, Italia, Tauria, Oriente.
 ḥ (v. v.)

*3. COLUTEA Pocockii.

- C.** foliolis subrotundo-ellipticis obtusissimis mucronatis, vexilli gibbis elongatis adscendentibus, caule fruticoso. W.
C. (*Pocockii*) fruticosa, foliolis ovatis, vexilli gibbis elongatis adscendentibus. *Ait. Kew. 3. p. 55.*
C. (*halepica*) fruticosa, foliis ovatis integerrimis, pendunculis subbifloris. *Lamarck encycl. I. p. 349.**
C. (*istria*) foliolis ovatis integerrimis, caule fruticoso. *Mill. dict. t. 100.*
Aleppischer Blasenstrauch. W.
Habitat in Oriente. ḥ (v. v.)
Folia non emarginata, juniora incano-pubescentia, adulta glabriuscula. Flores flavi. W.

4. COLUTEA frutescens.

- C.** foliolis oblongis retinis subtus incanis, caule fruticoso, ramis sericeo-tomentosis. W.
C. fruticosa, foliolis ovato-oblongis. *Hort. cliff. 366.*
Hort. upf. 228. Mill. dict. n. 4. Pall. it. I. p. 101.
Berg. cap. 216. Kniph. cent. 5. n. 25.
C. pinnis ovatis subtus pubescentibus, caule fruticoso, ramis incanis. *Thunb. prod. 134.*

C. aethiopica, flore purpureo. *Breyn. cent.* 70. t. 29.

Mill. ic. 99.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 260.

Graner Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. v.)

Frutex incanus, foliolis tomentosis supra glabris. Floribus rubris: Vexillis carina brevioribus; alis minutissimis, ut fere nullis. Legumina inflata, dorsalis futurae basi hiantia.

*5. COLUTEA rigida.

C. pinis lanceolatis glabris, caule fruticoso erecto glabro. *Thunb. prod.* 134.

Steifer Ballenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

*6. COLUTEA obtusata.

C. pinnis linearibus, caule frutescente erecto, floribus racemosis reflexis. *Thunb. prod.* 134.

Stumpfer Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

† † *Herbaceae.*

*7. COLUTEA linearis. +

C. pinnis linearibus acutis, caule herbaceo erecto, racemis terminalibus incurvis. *Thunb. prod.* 135.

Linienblättriger Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

8. COLUTEA herbacea.

C. foliolis linearibus emarginatis glabris, caule debili herbaceo, racemis axillaribus. W.

C. herbacea, foliolis linearibus glabris. *Hort. upf.* 266. *Roy. lugdb.* 366. *Mill. dict. n.* 6.

C. (*annua*) herbacea, racemis distantibus, foliis linearibus. *Murray in nov. Comm. Goett.* V. p. 40. t. 7. f. 12. 13.

C. africana annua, foliolis parvis mucronatis, vesiculis compressis. *Comm. hort.* 2. p. 87. t. 44.

C. africana, vesiculis compressis, flosculis atrorubentibus. *Volk. norib.* 118. t. 118.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 260.

Krautiger Blasenstrauch. W.

Habitat in Cap. b. spei ♂ (v. v.)

Annua, rarius caule perennus, glabra. Flores atro-sanguinei vexillo striato, longitudine alarum et carinae. Legumina compressa.

*9. COLUTEA perennans.

C. foliolis oblongis pubescentibus, caule herbaceo erecto, racemis terminalibus. W.

C. (*perennans*) herbacea, foliolis ovato-oblongis pubescentibus. Ait. Kew. 3. p. 56.

C. (*perennans*) herbacea, foliolis ovato-oblongis. Jacq. vindb. 311. hort. 3. p. 5. t. 3.

C. (*perennans*) herbacea, racemis approximatis, foliolis ovalibus. Murr. syst. veg. 14. p. 668.

C. (*fistulosa*) caule herbaceo foliolis ovatis complicatis subtus pubescentibus. Retz. obs. 3. p. 40.*

C. (*pubescens*) pinnis lanceolatis villosis, caule herbaceo erecto pubescente, racemis terminalibus. Thunb. prod. 134?

Weichhaariger Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 2 (v. v.)

*10. COLUTEA prostrata.

C. pinnis lanceolatis villosis, caule herbaceo diffuso, pendulis axiliaribus subbifloris. Thunb. prod. 134.

Gestreckter Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*11. COLUTEA excisa.. +

C. pinnis ovatis excisis, caule herbaceo decumbente, racemis terminalibus. Thunb. prod. 134.

Ausgerandeter Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*12. COLUTEA vesicaria. +

C. pinnis ovatis, caule herbaceo decumbente villoso, leguminibus orbiculatis inflatis. Thunb. prod. 135.

Kreisfrüchtiger Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*13. COLUTEA tomentosa.

C. pinnis ovatis incanis, caule herbaceo tomenso, floribus racemosis. Thunb. prod. 135.

Filziger Blasenstrauch. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

1366. G L Y C Y R R H I Z A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1197.

Cal. bilabiatus: 3. *Legumen ovatum, compresum.*

1. GLYCYRRHIZA echinata.

G. leguminibus echinatis, floribus capitatis stipulis lanceolatis, foliolis glabris oblongis mucronatis. W.

G. leguminibus echinatis, foliis stipulatis, foliolo impari sessili. Roy. lugdb. 386. Hort. upf. 230. Mill. dict. n. 2. Jacq. hort. t. 95. Pall. it. I. app. n. 118. Kniph. cent. 5. n. 37.

G. capite echinato. Bauh. pin. 352.

Dulcis radix. Cam. epit. 423.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 631.

Stachliches Süßholz. W.

Habitat in Gargano Apuliae, in deserto Nagico Tata- riae. 24 (v. v.)

Petiolus communis marginatus margine distincto medianante nervo. Foliola lanceolato-ovata: impari sessili. Stipulae ensiformes. Spica subrotunda capitata.

Stipulae parvae, oblongae, non ensiformes. Gmel. it. I. p. 155. R.

*2. GLYCYRRHIZA foetida.

G. leguminibus echinatis, floribus racemosis, stipulis lanceolatis, foliolis oblongis mucronatis subtus lepidotis. W.

G. (foetida) floribus spicatis, leguminibus ovalibus mucronatis echinatis. Desf. atl. 2. p. 170. t. 199.*

Stinkendes Süßholz. W.

Habitat in Atlante et in arvis prope Mayane. 24 (v. f.)

Folia impari-pinnata. Foliola oblonga mucronata glabra subtus lepidota e. i. squamis parvis cinereis

adpresso tecta, impari brevissime petiolato. Stipulae lanceolatae. Flores racemosi pallide lutei. Legumina semiipollicaria oblonga mucronata setis rigidis tecta, di vel trisperma W,

*3. GLYCYRRHIZA glandulifera.

G. leguminibus glandulolo - echinatis, floribus racemosis, stipulis marcescentibus, foliolis oblongo-lanceolatis emarginatis subtus glutinoso - pubescentibus. W.

G. (*glandulifera*) leguminibus echinatis, setis glanduliferis, foliolo impari petiolato. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. I. p. 20 t. 21.*

Drüsiges Süßholz. W.

Habitat in Hungaria. 24 (v. v.)

Foliola oblongo-lanceolata emarginata glabra subtus subpubescentia glutinosa nitida. Stipulae admodum parvae marcescentes. Flores racemosi violacei. Legumina oblonga setis parvis apice capitatis sparsis tecta. W.

4. GLYCYRRHIZA glabra.

G. leguminibus glabris, floribus racemosis, stipulis nullis, foliolis ovatis subretusis subtus subglutinosis. W.

G. leguminibus glabris, stipulis nullis, foliolo impari petiolato, Hort. cliff. 490. Mat. med. 173. Roy. lugdb. 386. Sauv. monsp. 232. Mill. dict. n. I. Gmel. it. I. p. 155. Ludw. ect. t. 64. Kniph. cent. 4. n. 29. Regn. bot.

G. laevis. Pall. it. I. app. n. 120.*

G. filiformis et germanica. Bauh. pin. 352.

G. vulgaris. Dod. pempt 341.

Houttuyn Lin. Pfl Syst. 8. p. 632.

Gemeines Süßholz. W.

Habitat in Fraconia, Callia, Hispania, Italia. 24 (v. v.)

Petiolus communis ultra ultimum foliorum par elongatus. Foliola ovata; impari petiolato. Stipulae nullae. Spicae oblongae floribus distantibus.

5. GLYCYRRHIZA asperrima.

G. leguminibus glabris moniliformibus, racemo terminali, stipulis lanceolatis, foliolis obovatis emarginatis subtus cauleque scabris. W.

G. leguminibus glabris, foliis ellipticis cuspidatis, caule hispido scabro. Lin. suppl. 330.

Glycyrrhiza aspera. Pall. itin. I. app. n. 121. t. M. f. 3.

Glycyrrhiza hispida. Pall. itin. 3. app. n. 127. t. G. g. f. I. 2.

Scharfblättriges Süßholz. W.

Habitat in arenosis, colles et praerupta arenosa impritis amans, inter Wolgam et Isicum. 24 (v. J.)

Radix gracilis longissima, praesertim vere dulcissima. Flores pallide violacei.

Foliola obovata emarginata subtus ad costam et margines hispido-scabra. Caules juniores hispidi, seniores laeves. Racemus terminalis. Legumina glabra mucronata moniliformia tri-vel tetrasperma. W.

6. GLYCYRRHIZA hirsuta.

G. leguminibus hirsutis, foliolis oblongo-lanceolatis, floribus racemosis. W.

G. leguminibus hirsutis, foliolo impari petiolato. Roy. lugdb. 386. Mill. dict. n. 3. Pall. it. 1. app. n. 119.* it. 2. p. 461. Gmel. it. 1. p. 155.

G. orientalis siliquis hirsutissimis. Tournef. cor. 26.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 633.

Haariges Süßholz. W.

Habitat in Oriente. 24

1367. C O R O N I L L A

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1198.

Cal. 2-labiatus: $\frac{2}{3}$: dentibus superioribus connatis. Vexillum vix alis longius. Lomentum teres articulatum rectum.

+ *Floribus racemosis.*

I. CORONILLA grandiflora. W.

C. racemis subtrifloris, foliolis oblongis emarginatis glabris, lomentis filiformibus rectis compressis, caule arboreo. W.

Aeschynomene (grandiflora) caule arboreo, floribus maximis, leguminibus filiformibus. Sp. pl. 1060. Mill.

dict. n. 6. Swartz obs. 283. Vahl. symb. I.
p. 53.**

*Robinia pedunculis subdivisis, foliis pinnatis, floribus
folio majoribus. Sp. pl. I. p. 722.*

*Dolichos (arboreus) floribus ferrugineis, caudice arbo-
reo. Forst. descr. 134.*

*Sesban affinis arbor indiae orientalis. Breyn. prod.
I. p. 47. Comm. malab. 244.*

*Galegae affinis malabarica arborescens, siliquis majoribus
umbellatis. Raj. hisi. 1734.*

Turia. Rumph. amb. I. p. 188. t. 76.

Agaty. Rheed. malab. I. p. 95. t. 51.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 210.

Grossblütige Peltischen. W.

Habitat in India orientali. Ȑ (v. f.)

*Foliola obtusa. Flores inter omnes Papilionaceos
maximi, magnitudine ovi gallinacei, reliquis partibus
plantaे majores. Vexillum ovatum patens. Alae ova-
to-oblongae versus apicem sursum falcatae. Carina
alis conformis. Stamina diadelpha, sursum reflexa.
Stigma obtusum.*

2. CORONILLA coccinea. W.

*C. racemis subtrifloris, foliis oblongis emarginatis pul-
verulentis, lomentis subarcuato-filiformibus com-
pressiusculis, caule arboreo. W.*

*Aeschynomene (coccinea) arborea, foliis pinnatis, fo-
liolis numerosis linearibus obtusis pulverulentis, legu-
minibus compressis aequalibus. Lin. suupl. 330.*

*Aeschynomene (coccinea) caule arboreo, foliis pinnatis,
foliolis ovali-oblongis obtusis mucronatis, legumi-
nibus subarcuato-filiformibus compressiusculis. Forst.
prod. n. 273.*

Toeri-Mera. Rumph. amb. I. p. 190. t. 77.

Rothe Peltischen. W.

*Habitat in India orientali inque insulis Societatis et
Botanices insula. Ȑ (v. f.)*

Flores majores rubri.

*Simillima praecedenti, Flores ejusdem magnitudinis
sed rubri, Folia pulverulenta. W.*

*3. CORONILLA *occidentalis*. W. †

C. racemis paucifloris, foliolis ellipticis, lomentis teretibus filiformibus, caule fruticoso. W.

Emerus siliquis longissimus angustissimus. *Plum. spec. 19. ic. 125. f. 1.*

Westindische Peltischen. W.

Habitat in India occidentali. ৎ

Simillima sequenti, sed Racemi pauciflori et Foliola elliptica minus numeroſa. W.

4. CORONILLA *Sesban*.

C. racemis multifloris, foliolis linearibus obtusis mucronatis rachi foliorum laevi, lomentis filiformibus teretibus, caule fruticoso. W.

Aeschynomene (Sesban) caule herbaceo laevi, leguminibus cylindricis aequalibus, foliotis obtusis. *Sp. pl. 1061. Mill. dict. n. 4. Vahl symb. I. p. 54.**

Dolichos Aeschynomene Sesban. *Forsk. descr. 134.**

Galega aegyptiaca, siliquis articulatis. *Bauh. pin. 352.*

Sesban. *Alpin. aegypt. 81. t. 82.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 643.

Aegyptische Peltischen. W.

Habitat in Aegypti sepibus. ৎ

*5 CORONILLA *aculeata*. W.

C. racemis paucifloris, folioplis linearibus obtusis mucronatis, rachi foliorum aculeata, lomentis filiformibus teretibus caule herbaceo. W.

Aeschynomene (bispinosa) caule herbaceo strigis rarissimis armato, foliolis glabris, costa spinulosa, leguminibus teretibus longissimis glabris. *Jacq. ic. rar. 3. t. 564.*

Aeschynomene Sesban. *Jacq. Collect. 2. p. 283.**

Emerus siliquis geminatis longissimis. *Burm. zeyl. 93. t. 41.*

Galega indica frutescens spinosa, siliquis angustis longissimis, folio Mimosae. *Burm. zeyl. n. 3.*

Colutea exotica angustifolia, floribus luteis aduersa parte eleganter punctatis. *Pluk. phytog. t. 164. f. 5.*

Colutea Sesban Aegyptiae foliis accedens maderaspatana.

Pluk. phytog. t. 164. f. 2.

Kedangu. *Rheed. mal. 6. p. 49. t. 27.*

Stachliche Peletschen. W.

Habitat in Zeylona, Malabaria. ♂ (v. v.)

Similis praecedenti, differt vero radice annua, rachi foliorum aculeata, pedunculis paucifloris. W.

*6. CORONILLA *cannabina*. W.

C. pedunculis unifloris subgeminatis, foliolis linearibus obtusis mucronatis, rachi foliorum laevi, lomentis filiformibus compressis, caule herbaceo. W.

Aeschynomene (cannabina) caule herbaceo, foliolis obtusis acuminatis, pedunculis solitariis, leguminibus compressis laevibus. Retz. obj. 5. p. 26.*

Hanfartige Peletschen. W.

Habitat in Malabaria. ♂ (v. f.)

Differt a praecedenti: foliis minoribus, rachi non aculeata, pedunculis unifloris solitariis vel geminatis, floribus minoribus, lomentis compressis tetragonis. W.

*7. CORONILLA *picta*. W.

C. racemis multifloris pendulis, foliolis linearibus obtusis, lomentis filiformibus teretibus moniliformibus, caule herbaceo. W.

Aeschynomene (picta) foliis pinnatis, pinnulis linearibus obtusis, floribus racemosis, vexillo postice picto.

*Cavan. ic. 4. p. 7. t. 314.**

Bunte Peletschen. W.

Habitat in Nova Hispania. ♂

Corolla flava vexillo externe punctis nigris variegato. Differt a C. aculeata; racemis multifloris pendulis, vexillo tantum punctato, lomentis moniliformibus et rachi foliorum non aculeata. W.

*8. CORONILLA *virgata*. W.

C. racemis multifloris, foliolis ellipticis, lomentis linearis - ensiformibus compressis tetragonis, caule herbaceo. W.

Aeschynomene (virgata) caule virgato, leguminibus tetragonis erectis. Cavan. ic. 3. p. 47. t. 293.*

Ruthenförmige Peletschen. W.

Habitat in Nova Hispania.

Corolla flava. Lomentum C. Securidaceae. W.

† † *Floribus umbellatis.*

9. CORONILLA *Emerus.*

C. fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum nnguibus calyce triplo longioribus, caule angustato. *Sp. pl.* 1046. *Roy. lugdb.* 387. *Hort. cliff.* 363. *Fl. suec.* 590. 636. *It. gotl.* 229. *Scop. carn.* 911. *Crantz aust.* p. 430. *Kniph. cent.* 3. n. 33. *Willd. arb.* 78. *Hoffm. germ.* 260.

C. frutescens, foliis retusis, septenis, siliquis longissimis, obiter articulatis. *Hall. helv.* n. 389.

C. major. *Riv.* t. 97. R.

Emerus major. *Mill. dict.* n. 1. et *ic.* t. 132. f. 1.

Colutea siliquosa f. *scorpioides major.* *Bauh. pin.* 397.

Colutea scorpioides. *Cam. epit.* 541.

β *Colutea siliquosa minor.* *Bauh. pin.* 397.

Emerus minor. *Mill. dict.* n. 2. et *ic.* t. 123. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 261.

Scorpions Peltischen. W.

Habitat Genevae, Monspelii, Salerni, Viennae. ḥ.
(v. v.)

10. CORONILLA *juncea.*

C. fruticosa, foliolis quinatis ternatisque linear-lanceolatis subcarnosis obtusis. *Sp. pl.* 1047. *Mill. dict.* n. 9.

Dorychnium luteum hispanicum carnosius. *Bar. ic.* 133.

Colutea caule genistae fungoso. *Bauh. hist.* 1. p. 383.

Polygala major massiliotica. *Bauh. prn.* 349.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 262.

Binzenartige Peltischen. W.

Habitat Massiliae, Monspelii. ḥ (v. v.)

Caules Spartii. Folia parva, subcarnosa.

11. CORONILLA *valentina.*

C. fruticosa, foliolis subcovenis, stipulis suborbiculatis. *Sp. pl.* 1047. *Mill. dict.* n. 3. *ic.* t. 107. *Guett. stamp.* 1. p. 231. *Gouan. monsp.* 377. *Ger. prov.* 501. *Retz obs.* 2. p. 22.*

Coronilla fruticosa, leguminibus teretibus, pedunculis multifloris, caule fruticoso. *Hort. upf.* 234. *Roy. lugdb.* 386. *Sauv. monsp.* 235.

C. leguminibus teretibus, unguibus corollae brevibus, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 363.

C. leguminibus teretibus, unguibus corollae brevibus, pinnis ad summum enneaphyllis, foliolis ovatis. *Guett. stamp.* I. p. 231.

Polygala altera *Bauh. pin.* 349. *Riv. tetr.* 206.

Polygala valentina. *Clus. hist.* I. p. 98.

Coronilla f. *Colutea minima*. *Lob. ic.* 2. p. 78. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 263.

Valençinische Peletschen. W.

Habitat in Hispania, Italia. h (v. v.)

Odor florum graveolens, noctu magis. Umbellae vexilla connivent in capitulum flavum, quae insiā rādii cingunt fulvae Carinae cum alis. Folia primo vere colore Rutaē: Foliola mucrone reflexo, unde retusa apparet. Florens stipulas dejicit.

12. CORONILLA glauca.

C. fruticosa, foliolis septenis obtusissimis, stipulis lanceolatis. *Amoen. acad.* 4. p. 285.* *Mill. dict. n.* I.

C. fruticosa, leguminibus crassioribus. *Mill. ic. t.* 289. f. 2.

C. maritima, glauca folio. *Tournef. inst.* 650.

Colutea scorpioides maritima, glauco folio. Bauh. pin. 327. *prodr.* 157.

Colutea scorpioides altera. Clus. pann. ic. 46. *Gouan. monsp.* 378. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 264.

Eisengraue Peletschen. W.

Habitat in Gallia Narbonensi. h (v. v.)

Flores noctu inodori, die suavissime fragrantes. Cau- lis erectus, ramis rubris. Foliola 5 f. 7, cuneiformia, obtusa cum mucrone. Stipulae lanceolatae, pa- tulae.

*13. CORONILLA squamata.

C. herbacea, foliolis undenis obovatis subtomentosis, stipulis lanceolatis, lomentis furfuraceo-squamatis. W.

C. caule herbaceo erecto, foliis undenis ovatis subtomentosis, leguminibus pendulis squamatis. *Cavan. ic.* I. p. 43. t. 153.*

Schuppige Peitschen. W.

Habitat in Hispania. 24

14. CORONILLA *coronata*.

C. suffruticosa, foliolis novenis ellipticis internis cauli approximatis, stipulis oppositifoliis lanceolatis. W.

C. fruticosa, foliolis novenis obovatis: internis cauli approximatis, stipula oppositifolia bipartita. Sp. pl. 1047. Jacq. aust. t. 95. Crantz aust. v. 431. Hoffm. germ. 260. Roth germ. I. 318. II. 212.

C. montana. Riv. tetr. 207. Scop. carn. ed. 2. n. 912. t. 44.

C. caule erecto, foliis undenis ovatis, floribus umbellatis, siliquis articulatis pendulis. Hall. helv. n. 388.

Colutea scorpioides minor coronata. Bauh. pin. 397.

Colutea scorpioides II. Clus. hist. I. p. 98.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 265.

Gekrönte Peitschen. W.

Habitat in Europa australi. 24 (v. v.)

Foliola obovata, distantia: infimo petiolorum partem arcte cauli approximato, ut in Vicia pisiformi, tandem stipulae non sunt haec foliola.

Caulis suffruticosus, sesquipedalis, erectus.

15. CORONILLA *minima*.

C. suffruticosa procumbens, foliolis novenis ovatis, stipula oppositifolia emarginata, leguminibus angulatis nodosis. Sp. pl. 1048. Jacq. aust. t. 271. De la Chenal. Act. helv. 8. p. 142. Mill. dict. n. 5. Hoffm. germ. 260. Roth germ. II. 213.

C. caulibus lignosis procumbentibus, foliis ovatis, floribus umbellatis, siliquis alatis. Hall. helv. n. 390.

C. procumbens, foliolis novenis lanceolatis, stipulis oppositifoliis emarginatis, leguminibus angulatis nodosis. Amoen. acad. 4. p. 327.*

Ferrum equinum, siliquis in summitate. Bauh. pin. 349.

Polygalum Cortisi. Bauh. hist. 2. p. 351.

Lotus enneaphyllos. Dalech. hist. 510.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 266.

Kleinste Peitschen. W.

Habitat in Gallia australi: Helvetia, Italia, Hispania. 24 (v. f.)

Caulis suffruticosus, prostratus, teres, siatura Loti corniculati. Foliola infima petiolorum cauli approximata (uti C. coronatae f. variae) Stipularum instar, patentia, in plano expansa, reliquis non minora. Foliola ovata, acutinscula.

Obl. *Cur varietas C. valentinae dicta fuit Tournefortio, Gerardo? anne C. coronatam pro C. valentina assumere?*

*16. CORONILLA pentaphylla.

C. fruticosa, foliolis subquinis cuneiformibus emarginatis, stipulis ovatis. W.

C. foliolis quinis aut septenis cuneiformibus emarginatis, stipulis ovatis deciduis. Desf. atl. 2. p. 171.

Fünfblättrige Peltischen. W.

Habitat in Algeriae collibus. h

Frutex glaberrimus 2-f. 3-pedalis erectus ramosissimus. Pinnulae quinque rarius septem cuneiformes emarginatae, nonnullae integerrimae. Stipulae magnae ovatae deciduae. Pedunculi nudi. Flores lutei umbellati decem ad viginti. Desf. 1. c.

17. CORONILLA argentea.

C. fruticosa, foliolis undenis sericeis extimo majore.

Sp. pl. 1048. Mill. dict. n. 2. Mill. ic. t. 289. f. 1. Thunb. prod. 131?

C. (stipularis) fruticosa, foliis undenis glaucissimis glabris, internis a caule remotis, stipulis superioribus majoribus subrotundis mucronatis. Lamarck encycl. 2. p. 120?

Colutea scorpioides odorata. *Alp. exot. 17.*

Colutea argentea cretica. *Tournef. inst. 650. R.*

Houttuyn Lii. Pfl. Syst. 4. p. 266.

Silberfarbige Peltischen. W.

Habitat in Creta. h.

*18. CORONILLA cappadocica. W.

C. herbacea, foliolis novenis obcordatis, stipulis subrotundo-cuneatis. W.

C. orientalis herbacea, flore magno luteo. Tournef. cor. 44.

Cappadocische Peltischen. W.

Habitat in Cappadocia.

Folia pinnata subtus glauca. Foliola 9 obcordata. Stipulae parvae persistentes subrotundo-cuneatae retusae. Similis *C. valentinae* sed stipulae minores et cuneatae, caulisque herbaceus, lomenta mihi ignota. W.

*19. **CORONILLA vaginalis.** +

C. suffruticosa, foliolis subundenis obovatis, stipulis monophyllis vaginatis emarginatis oppositifoliis. W.
C. suffruticosa minima, foliolis subundenis obovatis, infimis a caule remotis, stipulis oppositifoliis monophyllis emarginatis vaginantibus. *Lamarch encycl.* 2. p. 121.*

Polygala montana italica flore aureo. *Barrel. ic.* 721? Scheidenartige Peltischen. W.

Habitat in Italia. 4

20. **CORONILLA Securidaca.**

C. herbacea, foliolis plurimis oblongo-cuneatis, lomentis compressis ensiformibus. W.
C. herbacea, leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. *Hort. cliff.* 363. *Hort. upf.* 334. *Roy. lugdb.* 386. *Sauv. monsp.* 235.

Securidaca lutea. *Mill. dict.*

Securidaca lutea major. *Bauh. pin.* 398.

Hedysarum primum. *Dod. pent.* 546.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 267.

Beikrautartige Peltischen. W.

Habitat inter Hispaniae segetes ☺ (v. v.)

Dormit foliolis supra petiolum conniventibus, versusque petioli basin flexis.

21. **CORONILLA varia.**

C. herbacea, foliolis plurimis lanceolatis glabris, lomentis teretibus erectis. W.

C. herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *Hort. cliff.* 363. *Hort. upf.* 235. *Roy. lugdb.* 386. *Dalib. paris.* 232. *Sauv. monsp.* 235. *Mill. dict.* n. 6. *Crantz austr.* t. 432. *Scop. carn.* n. 913. *Pollich pal.* n. 991. *Kniph. cent.* n. 16. *Hoffm. germ.* 269. *Roth germt.* I. 318. II. 212.

C. caule brachiato angulato, foliis vigenis, aristatis, floribus umbellatis. *Hall. helv.* n. 387.

C. flore vario. *Riv. tetr.* t. 94. R.

Hedysarum purpureum. Tabern.

Securidaca dumetorum major, flore vario, si quis articulatis. *Bauh. pin.* 349.

Securidaca 2. altera species. *Cluf. hist.* 2. p. 237.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 267.

Bunte Peltischen. W.

Habitat in Lusatia, Bohemia, Dania, Gallia, Germania etc. (v. v.)

Foliola in petiolo communi infima cauli, uti stipulae, approximata saepius sunt, quemadmodum in C. coronata, aut minima. Caules prostrati. Pedunculi longitudo foliorum.

*22. CORONILLA *globosa*.

C. herbacea, foliolis plurimis ellipticis, umbellis glabris, lomentis teretibus pendulis. W.

C. herbacea, umbellis globolis, leguminibus plurimis pendulis teretibus articulatis. *Lamarck encycl.* 2. p. 122.*

C. cretica herbacea, flore magno candido. *Tournef. cor.* 44.

Hedysarum argenteum. *Alp. exot.* 314.

Kugelblütige Peltischen. W.

Habitat in Crete 2. (v. f.)

Simillima praecedenti, cuius forte varietas, differt: foliolis latioribus et majoribus, umbellis globosis, floribus candidis, lomentis pendulis. W.

22. CORONILLA *cretica*.

C. heracea, foliolis quindenitis cuneatis retusis, lomentis teretibus erectis quinis. W.

C. herbacea, leguminibus quinis erectis teretibus articulatis, foliolis undenis. *Sp. pl.* 1048. *Roy. lugdb.* 387. *Mill. dict.* n. 7. *Jacq. hort.* t. 25. *Rietz. obs.* 1. p. 24.

C. cretica herbacea, flore parvo purpurascente. *Tournef. cor.* 44.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 268.

Cretische Peltischen. W.

Habitat in Creta. ⊙ (v. v.)

*Caules adscendentes, angulati, laeves. Foliola 15,
glabra, obtusissima cum mucrone, impari non majore.
Stipulae parvae, patulae. Involucra minima, polyphylla,
apice sphacelata. Corollae sanguineae: Vexillum
venis purpureis; Alae extus convexae; Carina apice
atropurpurea. Legumina incurva.*

*24. CORONILLA parviflora. W.

C. herbacea, foliolis novenis cuneatis emarginatis, lo-
mentis teretibus arcuatissimis, caule hispido. W.

C. cretica herbacea, flore luteo parvo. Tournef. cor. 44.
Kleinblumige Peltischen. W.

Habitat in Creta. ♀ (v. f.)

*Caulis semipedalis herbaceus ramosissimus pilis rigi-
dis parvis parvis reflexis tectus. Folia pinnata glabra.
Foliola 9 cuneiformia et arginata. Stipulae minutissi-
mae ovatae. Umbellae subquinqueflorae. Flores ma-
gnitudine praecedentis vel parum majores flavi. Lo-
menta filiformia teretia patentia arcuata. W.*

25. CORONILLA scandens.

C. caule scandente flaccido. Sp. pl. 1048. Roy.
Lugdb. 387.

C. scandens pentaphylla. Plum. spec. 19. ic. 107. f. 3.
Houttuyn Lin. Pst. Synt. 4. p. 269.

Steigende Peltischen. W.

Habitat in America calidiore.

1368. ORNITHOPUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1199.

Lomentum articulatum, teres, arcuatum.

I. ORNITHOPUS perpusillus.

O. foliis pinnatis, floribus capitatis bractea suffultis, lo-
mentis teretiuseculis incurvatis. W.

O. foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. Hort. upf.
234. Sauv. monsp. 236. Rey. ged. I. p. 182. Mill.
dict. n. I. Neck. gallob. p. 309. Scholl. barb.
n. 604. Pollich. pal. n. 692. Reich. franc. n. 528.

- Flor. dan.* 730. *Hoffm. germ.* 260. *Roth. germ.* I.
318. II. 214.
- O. foliis pinnatis, articulis leguminum subrotundis lae-
vibus. *Hort. cliff.* 364. *Roy. lugdb.* 383. *Dalib.*
parif. 232. *Gort. gelr.* 438.
- Ornithopodium caule prostrato, foliis pinnatis, siliquis
umbellatis, articulatis. *Hall. helv.* n. 393.
- Ornithopodium minus. *Bauh. pin.* 350.
- Ornithopodium perpusillum. *Dalech. hist.* 487.
- β O. (*intermedius*) caulibus repentibus longissimis, foliis
pinnatis, bractea pinnata leguminibus incurvatis ma-
jore. *Roth. germ.* I. 319. II. 215. *Hoffm. germ.* 261.
- Ornithopodium majus. *Bauh. pin.* 350.
- γ Ornithopodium radice tuberculis nodosa. *Bauh. pin.* 250.
Kniph. cent. 7. n. 66.
- Ornithopus (*nodosus*) foliis pinnatis, leguminibus con-
ferris pedunculatis. *Mill. dict.* n. 2. R.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 634.
- Liegender Vogelfuß. W.
- Habitat in Angliae, Belgii, Germaniae, Galliae, Hispa-
niae etc. arenosis.* \odot (v. v.)
- Planta glabra, procumbens. Folia petiolata. Pedun-
culi longitudine foliorum. Flores 3 f. 4 lutei, vexillo
rubro reticulato.
- Planta tota hirsuta. Legamina incurvata. R.
- Varietas β differt foliis et floribus triplo majoribus,
bractea lomentis longiore. W.

2. ORNITHOPUS *compressus*.

- O. foliis pinnatis, floribus capitatis bractea suffultis, lo-
mentis compressis recurvatis rugosis. W.
- O. foliis pinnatis, leguminibus recurvatis compressis
rugosis, bractea pinnata. *Syst. Veg.* 558.
- O. foliis pinnatis, leguminibus compressis rugosis, *Spec.*
2. p. 1049. *Hort. cliff.* 364. *Roy. lugdb.* 383. *Sauv.*
monsp. 236. *Mill. dict.* n. 3.
- Ornithopedio affinis hirsuta scorpioides. *Bauh. pin.* 350.
Scorpioides leguminosa. *Dalech. hist.* 493.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 635.
- Flachfruchtiger Vogelfuß. W.
- Habitat in Italia, Sicilia.* \odot (v. v.)
- Planta tomentosa. Foliola sessilia. Pedunculi folio-

*breviores: Bractea pinnata. Flores saepius 2, flavi.
Legumina recurva.*

*3. ORNITHOPUS durus.

- O. foliis pinnatis, floribus capitatis nudis, lomentis teretibus recurvatis. W.
O. caule suffruticoso, foliis pinnatis glaucis subcarnosis pedunculo brevioribus. *Cavan. ic. I. p. 31. t. 41. f. 2. **

Hartstieliger Vogelfuß. W.

Habitat in collibus regni Valentini. 24 (v. f.)

Folia hujus glauca glabra, quae in praecedentibus pubescentia, Flores absque bractea pinnata.

4. ORNITHOPUS scorpioides.

- O. foliis ternatis sublessilibus: impari maximo. *Hort. clifl. 364. Hort. upf. 234. Roy. lugdb. 383. Mill. dict. n. 4. Scop. carn. n. 914. Kniph. cent. 10. n. 67. Cavan. ic. I. p. 26. t. 37. **

Telephium Dioscoridis s. Scorpioides. *Bauh. pin. 287.*

Scorpioides portulacae folio. Bauh. pin. 287.

Scorpioides Matthioli. Dod. pempt. 71. Riv. tetr. 210.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 635.

Dreyblättriger Vogelfuß. W.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia inter segetes.

○ (v. v.)

Folia ternata s. potius simplicia, petiolata, stipulis subrotundis. Planta erecta. Pedunculi aphylli, subquadriflori.

5. ORNITHOPUS tetraphyllus.

- O. foliis quaternatis, floribus solitariis. *Amoen. acad. 5. p. 402.*

Quadrifolium erectum, flore luteo. Sloan. jam. 84. hist. I. p. 186. t. 116. f. 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 636.

Vierblättriger Vogelfuß. W.

Habitat in Jamaica.

Alienam plantam a congeneribus, et siccam ad aptius genus referre aut novum construere non licuit.

1369. HIPPOCREPIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1200.

Lomentum compressum, altera futura pluries emarginatum, curvum.

1. HIPPOCREPIS *unifiliquosa*.

H. leguminibus sessilibus solitariis erectis. Hort. cliff.

364. *Hort. upf. 233. Roy. lugdb. 384. Sauv. monsp.*

236. *Gron. orient. 229. Mill. dict. n. 1.*

Ferrum equinum siliquis solitariis lunatim excisis. Hall. helv. n. 392.

Ferrum equinum siliqua singulari. Bauh. pin. 349. Garid. t. 114.

Ferrum equinum vulgare. Col. ecpchr. I. p. 302. t. 300. R/v. tetr. t. 98.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 636.

Einfrüchtige Pferdehufschote. W.

Habitat in Italia, Helvetia. ⊙ (v. v.)

2. HIPPOCREPIS *multifiliquosa*.

H. leguminibus pedunculatis confertis circularibus: margine altero lobatis. Hort. cliff. 364. Hort. upf. 233. Roy. lugdb. 384. Sauv. monsp. 239. Mill. diet. n. 3.

Ferrum equinum siliqua multiplici. Bauh. pin. 346.

Ferrum equinum alterum polyceraton. Col. ecpchr. I. t. 300.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 637.

Vielfruchtige Pferdehufschote. W.

Habitat in G. Narbonensis, Hispaniae, Italiae cretaceis. ⊙ (v. v.)

3. HIPPOCREPIS *balearica*.

H. leguminibus pedunculatis confertis glabris margine exteriore lobatis, foliis calycibusque pilosiusculis, caulis ancipitibus. Ait. Kew. 3. p. 61.

*H. (balearica) leguminibus pedunculatis confertis arcuatibus margine exteriore repandis lanceolatis, caule suffructicoso. Jacq. ic. I. t. 149. Mise. 2. p. 305.**

Strauchartige Pferdehufschote. W.

Habitat in Minorca. ḥ (v. f.)

4. HIPPOCREPIS *comosa*.

H. leguminibus pedunculatis confertis arcuatis: scabris utroque margine sinuatis. Ait. Kew. 3. p. 61.

H. leguminibus pedunculatis confertis arenatis: margine exteriore repandis. Roy. lugdb. 384. Dalib. paris. 232. Mill. dict. n. 2. Crantz austr. p. 429. Scop. carn. n. 915. Neck. gallob. p. 310. Pollich pal. n. 693. Hoffm. germ. 261. Roth germ. I. 319. II. 215.

H. leguminibus pedunculatis confertis: margine exteriore lobatis. Hort. cliff. 364.

Ferrum equinum siliquis umbellatis, undulatis. Hall. helv. n. 391.

Ferrum equinum germanicum, siliquis in summitate. Bauh. pin. 346.

Ferrum equinum comosum, s. capitatum. Col. ecphr. I. p. 302. t. 301. Riv. tetr. 97.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 637.

Deutsche Pferdehufschote. W.

Habitat in Germaniae, Italiae, Galliae, Angliae cretaceis.

2 (v. v.)

Canes plures, adscendentes, spithamei, laeves. Stipulae quasi decurrentes. Foliola 15, ovali-linearia, patentia, consistentia. Pedunculi angulato-striati. foliis longiores, e summis alis 2. f. 3. Umbellae orbicularis. 8-flora: Vexillum subfornicatum, subtus siriatum, lateribus non reflexum, praeter basin, quae retusa, unde quasi poros utrinque.

1370. SCORPIURUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1201.

Lomentum isthmis interceptum, revolutum, teres.

1. SCORPIURUS *vermiculata*.

S. pedunculis unifloris, leguminibus tectis undique squamis obtusis. Sp. pl. 1050. Mill. dict. n. 1. Scop. carn. n. 916. Riv. tetr. 210.

Scorpioides siliqua crassa Boëllii. *Tournef. inst.* 402.
Scorpioides bupleuri folio, corniculis crassioribus et magis spongiosis instar litui contortis et in se convolutis.
Moris. hist. 2. p. 127. f. 2. t. II. f. III.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 637.
Wurmförmiges Scorpionkraut. W.
Habitat in Europa australi. ⊖ (v. v.)

*2. SCORPIURUS *purpurea*.

S. pedunculis unifloris, leguminibus brevissime munitis. *Desf. atl.* 2. p. 174.
Rothblühendes Scorpionkraut. W.
Habitat in Algeria. ⊖
Canles et Folia hirsuta. *Pedunculi longi uniflori.*
Corolla purpurea. *Legumen sulcatum muricatum nec squamatum ut in S. vermiculata cui affinis.* *Desf. l. c.*

3. SCORPIURUS *muricata*.

S. pedunculis bifloris, leguminibus extrorsum obtuse aculeatis. *Sp. pl.* 1050. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn.* n. 917. *Kniph. cent.* 8. n. 82.
Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis et rugosis f. rigidis, striatis f. sulcatis litui instar contortis et in se convolutis. *Moris. hist.* 2. p. 127. f. 2. t. II. f. IV.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 640.
Stumpfstächliches Scorpionkraut. W.
Habitat in Europa australi. ⊖ (v. v.)

4. SCORPIURUS *sulcata*.

S. pedunculis subtrifloris, leguminibus extrorsum spinis distinctis acutis. *Sp. pl.* 1050. *Mill. dict. n.* 3. *Desf. atl.* 2. p. 1. f. 4.
Scorpiurus. *Hort. cliff.* 364. *Hort. upf.* 233. *Roy. lugdb.* 383.
Scorpioides bupleuri folio. *Bauh. pin.* 287.
Scorpioides prius. *Dod. pentpt.* 71.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 640.
Gefurchtes Scorpionkraut. W.
Habitat in Europa australi. ⊖ (v. v.)

5. SCORPIURUS *subvillofa*.

S. pedunculis subquadrifloris, leguminibus extrorsum spinis confertis acutis. Sp. pl. 1050. Mill. dict. n. 4.

Kniph. cent. 9. n. 96. *Desf. atl.* 2. p. 173.

Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis in se contortis et convolutis. *Moris. hist.* 2. p. 127. f. 2. t. 11. f. II.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 641.

Feinstachliches Scorpionkraut. W.

Habitat in Europa australi. ☺

Species hasce omnes olim ex una specie ortas esse dubium non est, nec sufficit locus harum generationi, qui tum mutatus easdem redderet; quae itaque mixtura harum produxerit constantes plantas? Qui has omnes aut conjungat aut distinguat, videtur argumentis inniti.

* 1371. S M I T H I A.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1760.

Cal. bifidus bilabiatus. *Stam.* divisa in 2 phalanges aequales. *Lomenti articulis distinctis monospermis stylo lateralili connexis.*

* 1. SMITHIA *sensitiva*.

S. sensitiva. *Ait. Kew.* 3. p. 496. t. 13.

Empfindliche Smithie. W.

Habitat in India orientali. ☺

Caulis decumbens teres laevis. Rami patentissimi. Folia alterna abrupte pinnata 4-10-juga. Foliola obovato-oblonga, margine et subtus secundum costam setosa. Petiolus brevissimus. Rachis setosa. Stipulae binae persistentes, supra insertionem semi-lanceolatae integerrimae acuminatae, infra insertionem bifidae; lacinia altera obtusa, altera longiore acuminata. Racemi axillares 3-6-flori. Pedunculus petiolo longior filiformis. Pedicelli calyce breviores. Bracteae sub singulis pedicellis solitariae stipulis semiles; sed minus dearsum productae; bracteae sub calyce binae, calycem exteriorem simulantes ovato-lanceolatae

muricatae. Calyx tuberculis-setiferis muricatus. Corolla lutea. Ait. I. c.

1371. AESCHYNOMENE.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1202.

Cal. bilabiatus. Lomentum compressum articulis truncatis, monospermis.

1. AESCHYNOMENE *arborea.*

AE. caule arboreo laevi, leguminum articulis semicordatis glabris. Sp. pl. 1060. Roy. lugdb. 384. Mill. dict. n. 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 211.

Baumartige Schampflanze. W.

Habitat in India. ♂ (v. f.)

*2. AESCHYNOMENE *aristata.*

AE. caule arboreo spinoso, foliolis subrotundis emarginatis mucronatis, pedunculis trifloris. W.

*AE. caule arboreo, foliis pinnatis, foliolis subrotundis aristatis. Jacq. hort. schoenb. 2. p. 59. t. 237.**

Gegrannte Schampflanze. W.

Habitat in Domingo et insula St. Crucis. ♂

Caulis arboreus. Folia alterna impari pinnata. Folia numerosa alterua subrotunda emarginata, longissime mucronata, parva. Stipulae subulatae spinescentes persistentes. Pedunculi axillares triflori. Corollae flavae. Lomentum tuberculato-scabrum, articulis oblongis. W.

*3. AESCHYNOMENE *sensitiva.*

AE. caule fruticoflo laevi, foliolis linearibus obtusis, racemis paucifloris, lomentis laevibus. W.

AE. caule fruticoflo glabro, foliolis obtusis, leguminibus laevibus obtusis, stipulis acutis deciduis. Swartz prod. 107.

Hedysarum arborescens foliis mimosae. Plum. cat. I. ic. 149. f. 2.

Empfindliche Schampflanze. W.

Habitat in Jamaica, Martinica. ♂ (v. f.)

Habitu similis sequenti, sed caulis fruticosus, racemi

simplices, pedunculi *glabri*, et lomenta *laevia*. Folia *sensitiva*, ut in *Mimosa pudica*. W.

4. AESCHYNOMENE *aspera*.

AE. caule herbaceo inferne scabro, foliolis linearibus obtusis, racemis compotitis hispidis, lomenti articulis medio scabris. W.

AE. caule herbaceo scabro, leguminum articulis medio scabris. Sp. pl. 1060. Mill. dict. n. I.

AE. caule scabro, folio infimo quadripinni. Hort. cliff. 365. Hort. upf. 233. Fl. zeyl. 298.* Roy. lugdb. 384.

Mimosa non spinosa major zeylanica. Breyn cent. 51. t. 52. Raj. hst. 982.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 641.

Scharfstielige Schampflanze. W.

Habitat in India orientali. ⊙ (v. f.)

Pedunculi *hispidi*. Caulis *inferne scaber*, quandoque *glaber*. Stipulae *magnae semisagittatae caduciae*. W.

*5. AESCHYNOMENE *hispida*. W.

AE. caule herbaceo hispido, foliolis linearibus obtusis, racemis simplicibus, lomentis hispidis. W.

Aeschynomene *aspera*. Mühlenberg in litt.

Rauhfrüchtige Schampflanze. W.

Habitat in America boreali. ⊙ (v. f.)

Caulis *herbaceus hispidus*. Folia *pinnata*. Foliola *linearia obtusa brevissime mucronata glabra*. Stipulae *semisagittatae magnae*. Racemi *simplices*. Bracteae *ovatae acutae pedunculo breviore*. Lomentum *lineare articulatum latere superiore repandum hispidum*. A praecedente disinctum: Foliolis *multo majoribus et latioribus sed minus numerosis*, Racemis *simplicibus*, Lomentis *angustioribus hispidis*, denique Caule *hispido*. W.

6. AESCHYNOMENE *americana*.

AE. caule herbaceo hispido, foliolis linearis falcatis acuminatis, racemis simplicibus, lomenti articulis subrotundis distinctis glabris. W.

AE. caule herbaceo hispido, leguminum articulis semi-

cordatis, foliolis acuminatis, bracteis ciliatis. Sp. pl. 1061. Act. Petrop. 1763. p. 321. t. 12. Mill. dict. n. 2. Kniph. cent. 10. n. 2.
Hedysarum caule hirsuto, mimosae foliis alatis: pinnis acutis minime gramineis. Sloan. jam. 74. hist. 1. p. 186. t. 118 f. 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 642.
Westindische Schampflanze. W.
Habitat in Jamaica. ☽ (v. v.)
Stipulae utrinque lanceolatae.

7. AESCHYNOMENE *indica*.

AE. caule herbaceo laevi, leguminibus laevibus: hinc torosis obtusis, foliolis obtusis. Sp. pl. 1061. Roy. lugdb. 385.
Cajatus. Rumph. amb. 4. p. 64. t. 24.
Neli-tali. Rheed. mal. 9. p. 31. t. 18.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 643.
Indische Schampflanze. W.
Habitat in India.

* 8. AESCHYNOMENE *diffusa*. †

AE. caule herbaceo laevi, foliolis linearibus obtusis, pedunculis unifloris, lomentis hinc repandis, articulis medio scabris. W.

Aeschynomene diffusa. Klein in litt.

Ausgebreitete Schampflanze. W.

Habitat in Tranquebaria. ☽ (v. f.)

Caules plures basi ramosi sesqui- vel bipedales diffusi glabri e radice simplici. Folia pinnata uncialia vel sesquiuncialia. Foliola linearia obtusa. Stipulae semisagittatae oblongo-lanceolatae caducae. Pedunculi uniflori elongati hispidi. Bracteae binae semisagittatae serratae altera ad basin, altera in medio pedunculi. Lomentum lineare margine superiore repandum pollicare, articulis medio scabris. Videtur diversa ab Aeschynomene indica pedunculis unifloris, articulis que lomenti medio scabris. Figura Horti malabarici 9. t. 18. a nostra differt: lomentis glabris arcuatis et pedunculis racemosis; figura Rumphii plantam longe majorem a nostra habitu diversissimam repraesentat.

A sequenti haec distincta: foliolis obtusis, et caule alteriori. W.

9. AESCHYNOMENE pumila.

AE. caule herbaceo laevi, foliolis acuminatis, leguminibus hinc terratis medio scabris. *Sp. pl. 1061. Mill. d. c. n. 5.*

Hedysarum annuum minus zeylanicum, mimosae foliis.

T. Fl. zeyl. 551.

Malam todda - vaddi. Rheed. mal. 9. p. 37. t. 21.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 644.

Kleine Schampfblanze. W.

Habitat in India. ☺

Planta semipedalis, inferne ramosa. Folia pinnata, lanceolata: foliolis confertis, linearibus, acuminatis. Leguminum futura ferrata: articulis medio scabris.

*1373. STYLOSANTHES.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1203.

Cal. tubulatus longissimus corollifer. *Germen sub corolla. Lomentum uni - f. diarticulatum hamatum.*

1. STYLOSANTHES procumbens.

S. foliolis ovato-lanceolatis glabris, spicis multifloris, bracteis laevibus mucronatis, caule procumbente pubescente. W.

S. foliis ternatis acuminatis lineatis glabris, spicis multifloris, caule procumbente. *Swartz prod. 180.*

S. foliis ovato-lanceolatis lineatis glabris, spicis multifloris, caule procumbente. *Swartz Act. holm. 1789. p. 280. t. 11. f. 1.**

Hedysarum (hamatum) foliis ternatis nervosis nudis, spicis sessilibus, leguminibus dispermis obtecas acumine uncinatis. Sp. pl. 1056. Amoen. acad. 5. p. 403. Trifolium procumbens, foliis nervosis, siliulis monospermibus acuminatis quinquestriatis. Brown. jam. 298.*

Anonis non spinoso minor glabra procumbens, flore lateo. Sloan. jam. 75. hisp. 1. p. 187. t. 110. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 656.

Liegende Säulenblume, W.

Habitat in graminosis Jamaicæ. 2 (v. f.)

2. STYLOSANTHES viscosa.

S. foliolis oblongo-ovatis utrinque viscofo-pubescentibus ciliatis, spicis paucifloris, bracteis ciliatis, caule erecto viscofo-pubescente. W.

S. foliis ternatis ovatis ciliatis hirsutis, spicis paucifloris, caule erecto. *Swartz prod. 108. Act. holm. 1789. p. 281. t. II. f. 3.**

Hedysarum hamatum. β Sp. pl. 1056.

Trifolium suberectum subhirsutum, siliculis minoribus singularibus. Brown jam. 299.

Loto pentaphyllo siliquoso similis, Anonis non spinosa, foliis cisti instar glutinolis et odoratis. Sloan. jam. 74. hisl. I. p. 186. t. 119. f. I.

Klebrige Säulenblume. W.

Habitat in arenosis montosis Jamaicæ. 2 (v. f.)

***3. STYLOSANTHES mucronata. W.**

S. foliolis oblongo-ovatis subus subpubescentibus ciliatis, spicis multifloris, bracteis ciliatis, caule erecto pubescente. W.

*Arachis (fruticosa) caule fruticoso erecto. Retz. obs. 5. p. 26.**

Trifolium procumbens zeylanicum hirsutum loti facie. Burm. zeyl. 226. t. 106. f. 2.

Zeylonische Säulenblume. W.

Habitat in Zeylonæ, Tranquebariae aridis. 2 (v. f.)

Tota planta viscositatis expers. Caulis erectus ramosus semipedalis usque pedalis pilis albicantibus absque ulla glandulis tectus, ramis subflexuosis. Folia ternata petiolata. Foliola oblongo-ovata mucronata superne glabra inferne pube tenuissima albicante absque glandulis praesertim in junioribus obsoita. Strigae nonnullæ sparsæ in superficie inferiori et ad marginem. Pétioles albo-pubescentes. Stipulae membranaceæ margine ciliatae pétiole adnatae. Spicae oblongae multiflora floriferae sessiles fructiferae pedunculatae. Bracteæ ovatae ciliatae pubescentes. A precedente distinctissima. W.

4. STYLOSANTHES *elatior*.

S. foliolis lanceolatis glabris, spicis paucifloris, bracteis lanceolatis ciliatis, caule erecto uno latere pubescente. W.

S. foliolis lanceolatis acutis glabris, spicis paucifloris, vaginis foliisque ciliatis, caule erecto. Swartz *Act. holm.* 1789. p. 283. t. II. f. 2.*

Trifolium (biflorum) spicis bifloris sessilibus, involucris hispidis infundibuliformibus, foliis lanceolatis. Sp. *pl.* 1088. *Gron. virg.* 109.

Trifolium caule piloso foliolis subferratis, floribus laterali bus subsolitariis, leguminibus ovatis. *Gron. virg.* I. p. 84.

Arachis (africa) foliis ternatis, caule erecto. Walt. *carol.* 182.

Anonis mariana lutea foliis angustioribus. Pet. *fic.* 84.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 745.

Aufrechte Säulenblume. W.

Habitat in Carolina, Virginia, Pensylvania. (v. f.)

Carlis erectiusculus. Folia ternata lanceolata. Petioli breves: Stipulis vaginalibus, dentibus duotus acuminatis longitudine vaginae. Capitula axillaria infundibuliformia sessilia, foliolis pluribus ovoluta leviter trifidis: lacinia media longiore. Flores duo alternatim prodeentes.

Folia floralia et Bracteae longe ciliatae. Diversissima foliolis longis lanceolatis et caule glabro linea laterali pilosa decurrente. W.

*5. STYLOSANTHES *gujanensis*.

S. foliolis lanceolato-acuminatis petiolo longioribus, spicis multitoris villotis, caule erecto hirsuto. Swartz *Act. holm.* 1789. p. 284.*

Trifolium (gujanense) hirsutie asperum flore luteo. Aubl. *guy.* 2. p. 770. t. 309*

Kopfschlättige Säulenblume. W.

Habitat in pratis Gujanæ.

*1374. H A L L I A.

Thunb. prod. praef. ad. part. 2.

Cal. 5-partitus regularis. Legumen monospermum bivalve.

*1. HALLIA *alata*.

H. foliis oblongis glabris, stipulis decurrentibus caule alato. *Thunb. prod. 131.*

Geflügelte Hallie. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*2. HALLIA *flaccida*.

H. foliis lanceolatis mucronatis glabris, pedunculis unifloris longitudine foliorum. *Thunb. prod. 131.*

Welke Hallie. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*3. HALLIA *virgata*.

H. foliis lanceolatis mucronatis glabris, pedunculis unifloris folio brevioribus. *Thunb. prod. 131.*

Ruthenförmige Hallie. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

4. HALLIA *cordata*.

H. foliis cordatis oblongis acutis glabris, pedunculis longitudine foliorum. *Thunb. prod. 131.*

*Hedysarum cordatum. Thunb. Nov. Act. upf. 6. p. 41. t. 1.**

*Hedysarum (cordatum) foliis simplicibus cordato-lanceolatis, pedunculis simplicibus filiformibus, stipulis divaricatis. Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 25. t. 296.**

Glycine (monophylla) foliis simplicibus cordatis, caule pubescente triquetro. Mant. 101.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 576.

Herzblättrige Hallie. W.

Habitat ad Cap. b. spei in campis graminosis ultra Svellendam. h.

Caules bipedales triquetri ramosi crassitie fili, prostrati et decumbentes pilosi. Stipulae binae. Folia cordata integerrima simplicia utrinque subpubescentia petiolis triplo longiora, apice mucrone inermi. Pedun-

culi axillares solitarii uniflori capillares petiolis longiores. Involucrum tenellum subtrifidum. Corollae violaceae. Germen oblongum villosum. W.

* 5. HALLIA Asarina.

H. foliis cordatis subrotundis mucronatis villosis, pedunculis longitudine foliorum. Thunb. prod. 131.

Crotalaria (Asarina) foliis petiolatis cordatis obtusis mucronatis, pedunculis axillaribus capillaribus, caule herbaceo. Berg. cap. 194.

Rundblättrige Hallie. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h

Caulis herbaceus filiformis longissimus flaccido-procumbens striato-angulatus pilis longis et raris hirsutus ramosus. Rami alterni filiformes longi simplicissimi. Folia alterna petiolata cordata obtusa cum acuminis pilosa venoso-reticulata, internodiis breviora patentia. Stipulae 2 ovato-acutae subpilosae reflexae. Flores parvi axillares solitarii pedunculati. Pedunculi capillares hirsuti foliis paulo breviores solitarii erecti. Calyx turbinatus hirsutus parvus 5-fidus, lacinias linearis-lanceolatis acutis erectis, infimam paulo majore. Vexillum obverse-ovatum superne violaceum venis pictum. Alae et Carina concolores. Berg. l. c.

* 6. HALLIA hirta.

H. foliis cordatis subrotundis ciliatis, floribus subsessilibus, caule exstipulato. W.

Lens Elatines folio singulari minor pilosa, floribus luteis e Maderaspatana. Pluk. amalh. 131. t. 454. f. 8.

Gefranzte Hallie. W.

Habitat in Tranquebaria. h (v. f.)

Caulis ramosus diffusus teretiusculus hirtus. Folia parva bi-vel trilinearia brevissime petiolata numerosa subrotunda cordata obtusiuscula vix manifeste mucronata, more Hyperici pellucido-punctata, pilis longis margine ciliata, in utraque superficie pili rari sunt sparsi. Stipulae nullae. Flores flavi brevissime pedunculati. Legumen monospermum bivalve ovatum glabrum. A praecedente parvitate foliorum, defectu stipularum, colore floris, brevitate pedunculi et glabritie leguminis diversa. W.

7. HALLIA imbricata.

K. foliis cordato-ovatis convolutis imbricatis, floribus axillaribus sessilibus. Thunb. prod. 131.

Hedysarum (imbricatum) foliis simplicibus cordatis sessilibus stipulatis, superioribus imbricatis floriferis.

Lin. Suppl. 330. Thunb. Nov. Act. upf. 6. p. 42. t. 1. f. 2.*

Vielblättrige Hallie. W.

Habitat in campis graminosis Cap. p. spei. ৎ (v. f.)

Caulis herbacei filiformes diffusi ramosi. Folia sessilia cordata integerrima acuta laevia, superiora majora simillima, etiam stipulata subimbricata. Stipulae semicordatae scariosae patulae. Flores inter folia superiore solitarii sessiles, breviores a foliis occultati.

Folia margine et costa media ciliata. Stipulae magnae lanceolatae. W.

8. HALLIA fororia. W.

H. foliis subrotundo reniformibus emarginatis glabris, floribus racemosis. W.

Hedysarum (fororium) foliis simplicibus reniformibus emarginatis, caule tripuedro. Mant. 270.

Glycine (monophyllum) caule volubili, floribus paniculatis lateribus. Burm. ind. 161. t. 50. f. 2.

Lens maderaspat. nummulariae folio. Petiv. gaz. t. 32. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 647.

Nierenblättrige Hallie. W.

Habitat in India orientali. ৎ (v. f.)

Caulis herbaceus farmentosus triqueter laevis pedalis. Folia simplicia petiolata reniformia emarginata laevia maculata. Petiolus longitudine fere folii. Stipulae duae ovales parvae petiolatae basi petiolorum insidentes, ut folium strictissime ternatum dicendum. Racemi laterales axillares capillares folio longiores, pedicellis geminis. Legumina elliptica laevia acuta, articulis binis, carina inferiore uno altero ve sine.

In speciminibus numerosis legumina semper monosperma bivalvia, quandoque in margine superiore basin versus sine parvo instructa, nunquam vero articulata vidi. W.

1375. H E D Y S A R U M.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1204.

Cal. 5-fidus. Cor. carina tranverse obtusa. Lo-
mentum articulis 1-spermis compressis.

* *Foliis simplicibus.*

1. HEDYSARUM *Alhagi.*

H. foliis simplicibus lanceolatis obtusis, caule fruticoso
spinoso. Sp. pl. 1051. Gron. orient. 228. Gmel.
it. 2. t. 29. Mill. dict. n. 18. Lerche in Nov. Act.
A. N. C. tom. 5. append. p. 167.

Genista spartum spinosum, foliis polygoni. Bauk.
pin. 394.

Genista-spinosa flore rubro. Wheel. itin.

Agul. Rauv. itin. 94. t. 94.

Houttuyn Lin. Pfl. Syfi. 4. p. 270.

Türkischer Hahnenkopf. W.

Habitat in Tataria, Persia, Syria, Mesopotamia. 5
(v. f.)

2. HEDYSARUM *bupleurifolium.*

H. foliis simplicibus lanceolatis acutis, caule inermi, sti-
pulis scariofisis. Sp. pl. 1051.

Ornithopodium maderaspantanum, bupleuri folio. Pet.
gaz. 18. t. 11. f. 12.

Scorpioides maderasp. graminis leucanthemi foliis, sili-
quis nodofisis. Pluk. amalth. 189. t. 443. f. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syfi. 8. p. 645.

Lanzettblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in India. (v. f.)

Stipulae longitudine petiolorum. Legumina laevia,
articulata, aequalia, erecta. Variat foliis lanceolatis
et cordato-oblongis.

Possideo specimem foliis oblongo-lanceolatis acutis,
stipulis linearis-lanceolatis scariofisis petiolo longiori-
bus, calycinis dentibus longis linearis lanceolatis mar-
gine ciliatis absque leguminibus. Figurae Petiveri et
Plukaneti forte ad sequentem speciem spectant? W.

* 3. HEDYSARUM gramineum.

H. foliis simplicibus linear-i-lanceolatis, stipulis scariosis,
racemis nudis, pedicellis bifloris, dentibus calycum
barbatis. Retz. obs. 5. p. 26.* Wendl. hort. her-
renhus. I. p. 7. t. 5.*

Grasartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Tranquebaria. ○ ȝ (v. f.)

Frutex determinate ramosus. Caules teretes stricti
articulati. Folia bipollucaria sesquilineam lata, li-
neari - lanceolata acuminata venosa petiolata, petiolis
brevibus fuscis. Stipulae lanceolatae acuminatae sca-
riosae juxta folia, alterum par ad equis articulum,
quod in adultioribus ramis in fibras resolvitur. Race-
mi stricti elongati aphylli. Pedunculi gemini uniflori
distantes. Calyx tubulosus angulatus scariosus, den-
tibus subulatis intus barbatis. Corolla parva purpu-
rea. Legumina convexa ancipitia glabra mucronata,
articulis 3 - 5, forte etiam pluribus. Retz. I. c.

* 4. HEDYSARUM glumaceum.

H. foliis simplicibus lanceolatis, stipulis calycibusque sca-
riosis, leguminibus rugosis. Vahl symb. I. p. 54.

H. (violaceum) folio simplici linear, caule annuo pro-
cumbente. Forsk. descr. 136.*

Sprengartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Arabia felici. ȝ

Caules lignosi procumbentes virgati teretes glabri
pedales ramosi. Rami caule breviores. Folia simplicia
breve petiolata patentia lanceolata acuminata glabra
pollicaria. Stipulae scariosae lanceolato - ovatae lon-
gitudine petioli. Racemus terminalis floriferus elon-
gatus. Flores plerumque gemini rarius solitarii. Ca-
lyx quinquepartitus scariosus siliatus margine apice-
que pilosus. Legumen pollicare articulatum, articuli
4 - 6 compressi subrotundi rugosi stylo persistenti termi-
nali. Vahl. I. c.

* 5. HEDYSARUM rugosum.

H. foliis simplicibus linear-i-lanceolatis, stipulis calycibus-
que scariosis, caule erectiusculo piloso, lomenti articu-
lis transversim rugosis. W.

Runzlicher Hahnenkopf. W.

Habitat in Guinea. 24 (v. f.)

Rami sesquipedales teretiusculi glabri linea decurrenti pilosa notati. Folia linearis-lanceolata sesquivel bipollicaria obtusa mucronata subtus subpubescentia marginis ciliata. Stipulae membranaceae oblongo-lanceolatae acuminatae fere pollicares petiolo duplo longiores. Racemi terminales et axillares nudi, terminales semipedales, axillares tri-vel quadripollicares. Pedunculi plerumque geminati. Calyces profunde quinquepartiti, lacinias linearis-lanceolatis striatis margine ciliatis. Lomentum bi-vel trilineare longitudine calycis; articulis 4-5 subrotundis compressis transversim elevato-rugosis, terminatis styllo persistenti. A praecedenti, cui affine, differre videtur. W.

6. HEDYSARUM nummularifolium.

H. foliis simplicibus obovato-subrotundis, stipulis scariosis petiolo brevioribus, lomentis glabris reticulatis. W.

H. foliis simplicibus cuneiformibus. Fl. zeyl. 288.*
Burm. ind. 64.

Onobrychis maderaspat. nummulariae folio, ornithopodi filiis. Pet. gaz. 41. t. 26. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 645.

Pfennigkrautblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. 24 (v. f.)

7. HEDYSARUM moniliferum.

H. foliis elliptico-subrotundis subtus pubescentibus, stipulis scariosis petiolo longioribus, articulis lomentis globosis pubescentibus. W.

H. foliis simplicibus orbiculatis, leguminibus moniliformibus globo-articulatis. Mant. 102. Burm. ind. t. 52. f. 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 646.

Perlenschnurartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. 24 (v. f.)

Caules spithamei, prostrati, palmates. Stipulae bipartitae, striatae, acutae, scariorae. Folia orbiculata, parva, petiolata, laevia, obtusa. Capitula axil-

*laria. Legumina subfasciculata, pedunculata, recta,
articulis saepe 5, globosis, pubescentibus (lente visis
pube uncinata.) majusculis.*

Caulis villosus. Folia subtus pubescentia. W.

8. HEDYSARUM *styracifolium.*

*H. foliis simplicibus cordato-orbiculatis retusis supra
glabris, subtus tomentosis. Sp. pl. 1052.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 647.

Storaxblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in Asia. Ḥ

*Caulis fruticosus, ut tota planta villosus. Stipulae
lanceolatae.*

9. HEDYSARUM *reniforme.*

*H. foliis simplicibus reniformibus, caule tereti. Sp. pl.
1051. Burm. ind. t. 52, f. 1.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 647.

Nierenblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in India.

*Caules filiformes. Folia figura Asari, sed parva,
saepe retusa, nuda, longius petiolata. Stipulae minu-
tae. Racemus terminalis floribus geminis, vel Flos 1
f. in summis alis. Legumina laevia articulata arti-
culis plurimis.*

* 10. HEDYSARUM *velutinum.* W.

*H. folie simplicibus ovatis tomentosis, stipulis bracteis-
que filiformibus, lomentis villoso-tomentosis. W.*

Sammetartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in America calidiore. Ḥ (v. f.)

*Rami lignosi teretes pubescentes. Folia tripollica-
ria late ovata obtusa mucronata utrinque mollia to-
mentosa. Stipulae filiformes petiolo breviores. Race-
mi simplices quadri vel quinquepollicares terminales
et axillares. Flores parvi volacei subsessiles. Brac-
teae tenues capillares calyce longiores. Calyx pro-
funde quinquepartitus villosus. Lomenta semipolli-
caria villosa-tomentosa, articulis oblongis compres-
sis. W.*

11. HEDYSARUM *gangeticum*.

H. foliis simplicibus ovatis acutis stipulatis. Syst. Veg. 560. Mill. dict. n. 21.

H. monophyllum latifolium, siliculis plurimis spica longa digestis. Burm. zeyl. 113. t. 49. f. 2.

Onobrychis gangetica monophyllos, siliculis singularibus laevibus: foliatim per internodia discriminatis. Plnk. alm. 270. t. 50. f. 3.

Onobrychis zeylanica, folio singulari oblongo rotundo. Raj. suppl. 453.

Phaseolus montanus. Rumph. amb. 6. p. 146. t. 66. Burm. ind. 164.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 472.

Gangetischer Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. ☉ (v. f.)

Folia palmaria, oblonga-ovata. Caulis suffruticosus, inclinatus, ramosus. Legumina articulata, serrata. Flores minuti, luteoli. Affinis *H. styracifolio*, sed majus.

Folia ob'ongo-ovata acuta subtus pilis adpresso-seta. Petiolus supra medium stipulis binis filiformibus instructus. Lomenti articuli subrotundi compressi pilosiusculi. W.

12. HEDYSARUM *maculatum*.

H. foliis simplicibus ovatis obtusis. Hort. cliff. 449.

Hort. upf. 233. Fl. zeyl. 290. Roy. lugdb. 385. Mill. dict. n. 15.

H. humile, capparidis folio maculato. Dill. elth. 170. t. 141. f. 168.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 648.

Gefleckter Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. ☉ (v. f.)

Folia maculata.

Valde affinis praecedenti, sed statura minor, folia obtusa subrotundo - ovata maculata. W.

13. HEDYSARUM *latebrosum*.

H. foliis simplicibus ovatis serrulatis, leguminibus occultatis bractea fornicate supina scariosa. Mant. 270.

Lens maderasp. elatines folio. Pet. gaz. t. 30. f. II.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 648.

Versteckter Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. ȏ

Caulis suffruticosus, nudus: ramis raris, virgatis, divaricatis, teretibus. Folia simplicia, alterna, petiolata remota, ovata, vix manifera serrulata serraturis spinosis, glabra, magnitudine Vaccinii Myrtilli. Flores axillares: Pedunculus brevissimus, biflorus, bractea foliacea: Bractea supinata, fornicate, cymbiformis, occultans fructificationem, ferruginea folioli instar siccii corrugati (scariofa), aves eludens. Legumen monospermum, subrhombeum, mucronatum.

14. HEDYSARUM *vaginale.*

*H. foliis simplicibus cordato-oblongis, petiolis simplicibus, stipulis vaginalibus. Fl. zeyl. 287. **

Genista articulata repens, foliis crassiusculis planis acutis. Burm. zeyl. 104. t. 49. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 649.

Scheidenartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. ȏ (v. f.)

Affine *H. bupleurifolio.* Variat foliis lanceolatis.

Lomenti articuli cylindracei compressi glabri reticulati. W.

15. HEDYSARUM *triquetrum.*

H. foliis simplicibus cordato-oblongis petiolatis alatis, ramis triquetris. Fl. zeyl. Burm. ind. t. 52. f. 2.*

Onobrychis zeylanica monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. Burm. zeyl. 176. t. 81.

Onobrychis zeylanica, aurantii folio. Pet. sicc. 247. Raj. suppl. 247.

Phase latus montanus. 7. Rumph. amb. 6. p. 146.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 650.

Dreykantiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali.

Legumina articulata, non ferrata.

16. HEDYSARUM *strobiliferum.*

*L. foliis simplicibus, bracteis strobilorum inflatis cordatis obtusis. Fl. zeyl. 287. t. 3. * Burm. ind. 165.*

Onobrychis indiae orientalis, fagi foliis alternis, siliulis
spica longa dispositis. *Raj. suppl.* 234.

Carpinus zeylanica siliquosa. *Burm. zeyl.* 54. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 273.

Zapfentragender Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. ♂ (v. f.)

Folia oblongo-ovata acuta glabra. Racemi terminales et axillares simplices flexuosi Bracteis magnis inflatis subrotundo-cordatis acutis reticulato-venosis, flores et lomenta tegentibus, obfisi. W.

17. HEDYSARUM *Vespertilionis*.

H. foliis simplicibus ternatisque, intermedio bilobo, lobis patentibus lanceolatis, lomenti articulis flexuofollicatis. W.

H. foliis simplicibus ternatisque, foliolis intermediis bilobis, lobis lanceolatis divaricatis, leguminibus plicatis. *Ait. Kew.* 3. p. 63.

H. foliis simplicibus lunatis, lobis retrofalcatis, racemo terminali, leguminibus retrofractis in calyce inflato inclusis. *Lin. suppl.* 331. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 566.
Collect. 2. p. 329.* *Loureiro cochin.* 546.*

Zeylappiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Cochinchina. ♂ (v. v.)

Planta distinctissima annua. Caulis simplex filiformis, pilis minutissimis hispidus. Postquam provenit racemus terminalis, exirent ex alis foliorum superiorum ramuli brevissimi. Folia alterna petiolata horizontalia simplicia lunata rubicunda. Lobi versus apicem retrofalcati obtusiusculi bi-aut trinervii. Rarius variat foliis ternatis, dum lateralia parva oblique cuneiformia. Racemus terminalis, floribus binatis, bractea lanceolata communi decidua suffultis. Flos apertus. Calyx campanulatus. Corolla alba adeo patens, ut columna staminum nuda sit et recta. Alae et Carina refractae. Stamina coalita. Germen lineare. Peracta florescentia clauduntur dentes calycis et hic more *Phy-salidis* inflatur, unde premente pistillo apicem flectitur per articulos tenerum germeu. Legumen retrofractum.

* * *Foliis conjugatis.*

18. HEDYSARUM diphyllum.

H. foliis binatis ovato-lanceolatis, bracteis geminis subciliatis lomenti articulis pubescentibus aculeatis. W.

H. foliis binatis petiolatis, bracteis geminis ovatis acutis sessilibus. *Syst. veg.* 560.

H. foliis binatis petiolatis: floralibus sessilibus. *Fl. zeyl.* 291. * *Mill. dict. n.* 5.

Onobrychis maderaspatana diphyllus, sicutulis clypeatis hirsutis; minor. *Pluk. alm.* 270. t. 246. f. 6.

Nelam-mari. *Rheed. mal.* 9. p. 161. t. 82. *Raj. suppl.* 404.

β. Hedyarum diphyllum. *Swarz. obs.* 285.*

H. herbaceum procumbens, foliis geminatis, spicis foliatis terminalibus. *Brown. jam.* 301.

H. minus diphyllum. *Sloan jam.* 73. *hist.* I. p. 185. *Raj. suppl.* 450.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 651. t. 65. f. 2.

Zweyblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali β in Antillis. ⊙ (v. f.)
Legumina occultata inter bracteas.

In pluribus speciminiibus Indiae orientalis et occidentalis nullam video notam conuantem. Varietatem majorem ex insula Portorico habeo, bracteis ciliatis et foliis subtus strigosis. W.

*** 19. HEDYSARUM conjugatum. W.**

H. foliis binatis ovatis, bracteis geminis ciliatis, lomenti articulis glabris aculeatis. W.

Hedyarum diphyllum β *Sp. pl.* 1053.

H. diphyllum, foliolis ovatis, sicutulis asperis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. t. 50. f. 1.

Onobrychis maderaspatana diphyllos, sicutulis asperis. *Pluk. phytog.* t. 102. f. 1.

Doppelblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in Zeylona. ⊙ (v. f.)

Simillimum praecedenti at diversum: Caule altiore erecto nec procumbente, Foliolis ovatis, Bracteis margine albo-ciliatis, denique Lomentis multiarticulatis glabris aculeatis, nunquam pubescentibus. W.

* * * *Foliis ternatis.*

20. HEDYSARUM pulchellum.

H. foliis ternatis: bracteis geminis conjugatis orbiculatis lineatis. *Syst. veg.* p. 560. *Burm. ind.* 165.

H. foliis ternatis: bracteis strobilarum orbiculatis conjugatis. *Fl. zeyl.* 292.* *Spec. 2. t.* 1053.

H. trifoliatum frutescens, flore et fructu inter duo foliola absconditis. *Burm. zeyl.* 116. f. 52.

Onobrychis maderasp. triphylla, siliculis eleganter foliaceis. *Ray. suppl.* 234.

Onobrychis indica triphyllus, foliis amplis mucronatis, silique parvis in spicam longam ex alis inter bina foliola circinata arcte conniventia reconditis. *Pluk. amalh.* 161. 433. f. 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 274.

Schöner Hahnenkopf. W.

Habitat in India. ♂ (v. f.)

Legumina occultata inter bracteas orbiculares.

Racemi terminales et axillares simplices. Bracteae orbiculatae geminatae flores subaggregatos occultantes. *Lomenta biarticulata glabra.* W.

21. HEDYSARUM spartium.

H. foliis ternatis simplicibusque linearis-lanceolatis subtomentosis, pedunculis unifloris axillaribus subgeminatis, lomentis hispidis. W.

H. foliis ternatis simplicibusque subtomentosis, caule dichotomo, floribus geminis, leguminibus articulatis hispidis. *Mant.* 271. *Burm. ind.* 166. t. 51. f. 2. †

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 274.

Pfriemenartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. ♂

22. HEDYSARUM lineatum.

H. foliis ternatis oblongis venoso-lineatis, stipulis lanceolatis, racemis axillaribus nutantibus, lomentis monospermis. W.

H. foliis ternatis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis. *Sp. pl.* 1054. *Burm. i. d.* 167. t. 53. f. 1.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 275.

Gestrichelter Hahnenkopf. W.

Habitat in Zeylona. Burmann.

Caulis rectus. Folia supra lneis secundum nervos exarata. Racemi subindivisi, longitudine foliorum: floribus pendulis ex laxis pedicellis. Legumina rhombica, uniarticulata, monosperma.

* 23. *HEDYSARUM diffusum. W.*

H. foliis ternatis oblongis ovatis subtus canis, stipulis oblique cordatis, caule adscendente triquetro, racemis erectis paniculatis, lomentis multiarticulatis planis repandis hirtis. W.

Ausgebreiteter Hahnenkopf. W.

Habitat in Tranquebaria. ḥ (v. f.)

Caules adscendentes bi- vel tripedales ramis diffusis triquetris angulatis pilosis. Folia ternata. Foliola inferiora tripolligaria superiora sesquipolligaria oblongo-ovata obtusissima tenuissime mucronata pubescentia, superne viridia, inferne cana. Stipulae ad foliorum basin oblongae acuminatae, ad petioli basin oblique cordatae acutae. Racemi erecti in apice ramorum paniculati, in axillis simplices folio breviores. Bracteae cordatae deciduae. Calyces pedunculi et petioli albo-pilosii. Lomenta quinquearticulata compressa hirta erecta, articulis subrotundis inferne apicem versus subangulatis. W.

* 24. *HEDYSARUM incanum.*

H. foliis ternatis ova- is acuminatis subtus incanis, caule tereti ramoso erecto, racemis terminalibus erectis, leguminibus declinatis hirtis. Swartz prod. 107.

Hedysarum canescens. Mill. dict. n. 7.

H. triphyllum majus et minus. Plum. ic. 149. f. 1.

Grauer Hahnenkopf. W.

Habitat in Jamaica, Hispaniola. ḥ (v. f.)

Caules teretes glabri. Foliola oblongo-ovata acuta superne nitida, inferne cano- pubescentia. Stipulae lanceolatae acuminatae. W.

* 25. *HEDYSARUM dichotomum.*

H. foliis ternatis ellipticis obtusis pubescentibus subtus

canis, stipulis ovatis, caule dichotomo triquetro, racemis elongatis, lomentis repandis hirtis. W.

Hedysarum dichotomum. Klein in litt.

Gabelästiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Tranquebaria. ♂ (v. f.)

Caulis erectus dichotomus triquierter pubescens. Folia petiolata ternata. Foliola pollicaria vel sesquipollicaria elliptica utrinque obtusa pubescentia subtus cana. - Stipulae ovatae. Racemi simplices erecti pedales, pedunculis ternis. Bractae ovatae deciduae. Lomenta sexarticulata compressa hirta utrinque repanda. Similie *H. diffuso*, differt vero, caule dichotomo non angulato, sed tantum triquetro, racemis simplicibus elongatis, stipulis minoribus ovatis. W.

*26. HEDYSARUM tomentosum.

H. foliis ternatis subtus tomentosis, caule angulato tomentoso, racemis axillaribus. Thunb. jap. 288.

Filziger Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia.

Planta tota, excepta pagina superiori foliorum, tomentosa. Caulis herbaceus angulatus flexuosus erectus pedalis et ultra. Folia petiolata ternata. Foliola ovato-oblonga obtusa cum acumine, integerrima marginata, lineato-venosa, lateralia brevissime petiolata duplo minora, terminale pollicare. Petiolus suctatus erectus pollicaris. Stipulae ad basin petioli duae basi latae setaceae. Racemi florum axillares. Thunb. l. c.

27. HEDYSARUM retroflexum.

H. foliis ternatis subrotundo-ovatis subtus sericeo-tomentolis, racemis erectis elongatis axillaribus, lomentis reflexis repandis. W.

H. foliis ternatis, racemis erectis, leguminibus pendulis multi-articulatis. Mant. 103.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 275.

Zurückgebogener Hahnenkopf. W.

Habitat in India. ♂

Frutex. Folia ternata, ovata, subtus tomentofo-sericea. Racemi laterales terminalesque pedunculis pen-

dulis, filiformibus. Legumina compressa, altero margine repanda, 4-7 articulis.

Simillimum H. lineato, sed Legumina multiarticulata.

*28. *HEDYSARUM striatum.*

H. foliis ternatis oblongis stipulatis, caule herbaceo, floribus axillaribus solitariis. Thunb. jap. 289.

Gestreifter Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia.

Caulis herbaceus polygonus pilosus erectiusculus debilis ramosus pedalis et ultra. Rami alterni virgati frequentes patentes simplices. Folia breviter petiolata ternata stipulata. Foliola oblonga obtusa subretusa setula acuminata integrerrima parallelo-siriata glabra, linea dorsali pilosa, unguicularia, intermedium vix majus. Stipulae ad basin petioli ovatae membranaceae ferrugineae adpresso. Flores axillares solitarii pedunculati. Pedunculus ex axillis foliorum brevissimus. Calix pilosus. Corolla purpurascens. Thunb. l. c.

*29. *HEDYSARUM sericeum.*

H. foliis ternatis emarginatis villosis, caule frutescente erecto, floribus axillaribus solitariis. Thunb. jap. 289.

Seidenartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia. ৎ

Caulis frutescens multisiriatus erectus, angulis villosus, bipedalis et ultra ramosus. Rami alterni frequentissimi virgati erecti subramulosi cauli similes. Folia frequentissima breviter petiolata ternata utrinque sericeo-tomentosa. Foliola oblonga inferne attenuata retusa cum acumine subseffilia erecta semipollucaria, intermedium longius. Stipulae setaceae. Flores axillares solitarii brevissime pedunculati. Calices sericeo-tomentosi. Differt ab H. siriato: Stipulis setaceis non adpresso, Foliis longioribus retusis sericeis non striatis, Caule stricto frutescente. Thunb. l. c.

30. *HEDYSARUM umbellatum.*

H. foliis ternatis subrotundo-ovatis ramisque triquetris

hirsutis, pedunculis umbellatis axillaribus petiolo brevioribus, caule fruticoso. W.

H. foliis ternatis, pedunculis umbelliferis, caule fruticoso. Fl. zeyl. 293.* Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 26. t. 297.* bona.

H. trifoliatum arborescens, floribus ex alis foliorum, siliquies copiosis glabris. Burm. zeyl. 115. t. 51.

Folium crocodili. Rumph. amb. 4. p. 112. t. 52.

Houttuyn Lin. Pfl. Syri. 4. p. 276.

Doldentragender Hahnenkopf. W.

Habitat in littoribus Zeylona, Javae et insulae Mauritii. h (v. f.)

Umbellae foliis breviores, axillares.

Rami triquetri *hirsuti*. Foliola *subrotundo-ovata* *praecipue subitus hirsuta*. Pedunculi *umbellati petiolis breviores*. Calyces *hirsutissimi*. Corolla *alba*. W.

*31. HEDYSARUM *australe*. W. +

H. foliis ternatis oblongis ramisque triquetris sericeis, pedunculis umbellatis axillaribus petiolo brevioribus, caule fruticoso. W.

Hedysarum umbellatum. Forst. prod. n. 274.

Südlicher Hahnenkopf. W.

Habitat in insula Tanna et Nova Caledonia. h (v. f.)

Simile praecedenti cuius forte varietas sed Foliola oblonga duplo minora, subitus sericea et lineato-venosa. Petoli Rami Pedunculi et Calyces sericeo-villoso, nee pilis patulis obsiti. Habitus diversus. Fructus hujus ignotus. W.

*32. HEDYSARUM *squarrosum*.

H. foliis ternatis ovatis subtus nervosis tomentosis, floribus spicatis reflexis. Thumb. prod. 132.

Sparriger Hahnenkopf. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

33. HEDYSARUM *biarticulatum*.

H. foliis ternatis oblongis, caule suffruticoso ramoso, racemo terminali, lomentis biarticulatis strigosis. W.

H. foliis ternatis, caule suffruticoso, leguminibus biarticulatis. Fl. zeyl. 296.*

H. triphyllum, siliculis glabris peltatis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. t. 50. f. 2.

Onobrychis zeylanica trifolia minor perennis. *Raj.*
suppl. 457.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 277.

Zweysaamiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. Ȣ (v. f.)

Foliola oblonga parva angustia apice obtusa basi attenuata glabra subtus pilis sparsis adpresso tecta.
Stipulae lanceolatae acuminatae, altera apice bifida.
Racemus tenuis terminalis. W.

*34. HEDYSARUM lappaceum.

H. foliis ternatis obcordatis, caule suffruticoso ramoso divaricato, floribus axillaribus subsolitariis, lomentis biarticulatis hamoso-aculeatis. W.

H. foliis ternatis obcordatis, floribus axillaribus subsolitariis, leguminibus biarticulatis setis hamosis. *Vahl symb.* I. p. 54.

H. foliis ternatis obcordatis, caulis procumbentibus, siliquis compressis spinosis. *Forsk. descr.* 136.*

Klettenartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Arabia felici. Ȣ (v. f.)

Caules suffruticosi prostrati pubescentes teretes crassatio pennae columbinae ramosissimi. Folia ternata brevissime petiolata. Foliola obcordata sessilia crassa villosa parva, apice mucrone reflexo, lateralia minoria. Stipulae minutae subulatae. Flores axillares breve pedunculati solitarii rarius bini. Bractea subulata in singulo pedunculo. Calyx quinquefidus villosus, laciniis subulatis. Vexillum et Carina calyce duplo longior. Alae lineares longitudine calycis. Germen villosum. Legumen semipollicare biarticulatum. Articuli orbiculati compressi villoso-setosi, setis rigidis, apice reflexo-hamosis. *Vahl.* I. c.

35. HEDYSARUM heterocarpon.

H. foliis ternatis ellipticis obtusis subtus canis, racemis axillaribus, lomentis scabris, inferioribus multiarticulatis superioribus multiarticulatis. W.

H. foliis ternatis, floribus spicatis, leguminibus articulatis: infimo monospermo, stipulis setaceis. *Fl. zeyl.* 298.*

H. trifoliatum, filiculis inferioribus solitariis: superioribus articulatis. *Burm. zeyl.* 117. t. 53. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syri. 4. p. 277.

Verschiedenfrüchtiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. 5

*36. HEDYSARUM *adscendens*.

H. foliis ternatis subrotundis subtus pubescentibus, caule tereti, ramis declinatis adscendentibus pilosis, racemis simplicibus erectis axillaribus. *Swartz prod.* 106.

Aufwärtssteigender Hahnenkopf. W.

Habitat in Jamaica. 5 (v. s.)

Foliola vix uncialia elliptico - subrotunda obtusa, subtus cana. Bracteae imbricatae oblongo-lanceolatae pilosae calyce longiores. W.

*37. HEDYSARUM *mauritianum*. W.

H. foliis ternatis subtus pubescentibus, foliolis inferioribus subrotundis emarginatis, superioribus oblongis, racemo terminali, lomentis tomentoso-scabris inferne repandis nutantibus. W.

Mauritanischer Hahnenkopf. W.

Habitat in insula Mauritii. 24 (v. s.)

Radix repens. Caules simpli es adscendentes erecti dig tales vel semipedales teretes pubescentes. Folia ternata petiolata. Foliola glabra utrinque viridia, subtus pubescentia, in foliis inferioribus duplo minora subrotunda emarginata, in foliis superioribus oblonga obtusa. Racemus terminalis digitalis. Pedunculi geminati distantes bracteis parvis suffulti. Flores cernui. Lomenta linearia albo-scabia margine exteriore repando. W.

38. HEDYSARUM *gyrans*.

H. foliis ternatis ovali-lanceolatis obtusis, lateralibus minutissimis, panicula terminali, lomentis inferne repandis scabriusculis pendulis. W.

H. foliis ternatis. *Lin. suppl.* 332.* *Swartz obf* 289.*

H. foliis ternatis glabris, foliolis oblongis, lateralibus parvis, racemo composito terminali. *Jacq. ic. var. 3. t. 565. Collect. 8. p. 181.**

H. foliis ternatis ovali-lanceolatis obtusis, lateralibus minutis. Ait. Kew. 3. p. 64.

Buram Chadali Bengal.

Beweglicher Hahnenkopf. W.

Habitat in Bengalia ad Gangem. ♂ (v. s.)

Radix ramosa biennis. Caulis ramosus tripedalis teres glaber. Folia ternata petiolata. Folium terminale elliptico-lanceolatum utrinque obtusum glabrum; subtus pilis raris adpresso tectum, triplacare, longe petiolatum. Foliola lateralia semipollicaria oblonga basi angustiora brevissime petiolata. Petoli ciliati. Stipulae oblongo-acuminatae. Panicula terminalis e racemis rectangule patentibus composita. Vexillum rubicundum margine exteriore coerulescens. Alae et Carina rubicundae. Lomenta pendula sesquipollicaria margine exteriore repanda pilis brevibus obsita. W.

Miraculosa planta motu suo quasi arbitrario, qui nullo modo tactu, irritatione sive motu aëris causatus ut in Mimosis, Oxalide et Dionaea, nec adeo avanscens ac in Amorpha. Postquam e cotyledonibus prima protulit folia terna, foliola huc et illuc moveri incipiunt, motu per totam vegetationem non cessante, nullum observando tempus, ordinem s. directionem; saepe unum foliolum gyratur, dum alterum in eodem petiolo quietum permanet; alia vice pauca foliola herbae, altera vice fere omnia gyrantur; rarissime vidi totam plantam agitari, quod solummodo observavi primo anno, dum vivacior quasi erat. Nunc altero anno crescit, eundem conservans motum prioris anni similem nec per hyemem quieta. Unde oritur hic motus? magis miror, quam in floribus fere omnibus circa conceptionis tempus visibilem et notissimum illum in herbis sensitivis. Facultatem hujus motoriam a nulla causa externa oriri, nec ulla arte excitari posse, fere persuasus sum; insensibilis mihi semper visa est. A solis radiis non mutatus, nam amat umbram et diebus pluviosis et per noctes bene gyrat; in ventoso aere et nimis radiis solaribus exposita tranquilla est. Forte pars aliqua est in vegetabilius ut in animalibus, in qua causa motus residet. Sed hoc aliis explicandum relinquo, mihi magis curae erit, ad proprietatis rerum attendere, quam earum causas fingere. Lin. suppl. l. c.

*39. HEDYSARUM *trigonum*.

H. foliis ternatis ovatis acutis hirtis, caule scandente trigono, racemis longissimis axillaribus, leguminibus tortuosis inflexis. *Swartz prod.* 107.

H. (*adhaerens*) foliis ternatis oblongis, racemis axillari- bus, leguminibus teretibus articulatis villosis. *Vahl symb.* 2. p. 82.

Hedysarum intortum. *Mill. dict.*

H. triphyllum maximum scandens, caule trigono hirtis uncinatis munito, spicis amplis terminalibus. *Brown jam.* 301.

Dreykantiger Hahnenkopf. W.

Habitat in monte/sis Jamaicae. 5

Canes debiles simplices triquetri pilosissimi. Folia petiolata ternata. Foliola petiolata pollicaria oblonga lateralia minora, utrinque adspersa pilis raris oblongis adpresso. Petioles sesquipollicares pilosi. Stipula semicordatae nervosae ciliatae acuminatae. Racemi axillares bi-f. tripollicares. Pedicelli alterni remoti. Bracteae lanceolatae nervosae in mucronem vix pungentem desinentes. Legumina pollicaria erecta parum incurvata articulata, artiulis oblongis tectis pilis hamosis quibus adhaerent. *Vahl l. c.*

40. HEDYSARUM *canadense*.

H. foliis ternatis oblongo-lanceolatis, stipulis filiformibus, floribus racemosis articulis lomenti, obtuse triangularis hispidis. W.

H. foliis simplicibus ternatisque, caule laevi, floribus racemosis. *Hort. upf.* 232. *Mill. dict.* n. 3.

H. foliis radicalibus simplicibus, caulinis ternatis, floribus laxe spicatis, leguminibus undulatis. *Hort. cliff.* 365. *Roy. lugdb.* 385.

H. triphyllum canadense. *Corn. canad.* 44. t. 45.

Onobrychis major perennis canadensis triphylla, siliculis articulatis alperis triangularis. *Moris. hist.* 2. p. 130. f. 2. t. 11. f. 9.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 278.

Canadischer Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia, Canada. 24 (v. v.)

Planta erecta, fere laevis. Foliola lanceolata. Stipulae subulatae. Caulis striato-angulatus.

Caulis superne pubescentia. Folia floralia quandoque simplicia. W.

*41. HEDYSARUM canescens.

H. foliis ternatis subrotundis subtus-pubescentibus, stipulis ovatis acuminatis, caule angulato ciliato hispido, racemis paniculatis, lomenti articulis triangularibus hispidis. W.

H. foliis ternatis subtus scabris, caule hispido, floribus racemosis conjugatis. *Hort. upf.* 232.

H. foliis ternatis solitariisque, caule hispido fruticoso. *Hort. cliff.* 365. *Gron. virg.* 108. *Roy. lugdb.* 385.

Onobrychis americana, floribus spicatis, foliis ternatis canescens, siliculis asperis. *Pluk. alm.* 270. t. 308. f. 5?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 279.

Graulichter Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia. 2 (v. f.)

*Simillima praecedenti. Planta erecta, pilosa. Folio-
la ovata. Stipulae subulatae (subcordatae. Flores albi.
Mant. 2. p. 447.)*

*Caulis angulatus ciliatus hispidus. Folia petiolata
ternata. Foliola subrotunda, terminali majore, sub-
tus pilis adpresso tecta. Stipulae ovatae acuminatae.
Racemi paniculati. Bractae cordatae. Corolla caly-
ce duplo major. Articuli lomenti triangulares hispidi.
Figura Plukenetii differre videtur a planta nostra,
quae H. canadensi non similis.* W.

*42. HEDYSARUM repandum.

H. foliis ternatis repando-crenatis, racemis terminali-
bus elongatis. *Vahl symb.* 2. p. 82.

Ausgeschweifter Hahnenkopf. W.

Habitat in Arabia felici. 5

*Caulis lignosus teres purpurascens apice pubescens.
Folia petiolata laxa ternata. Foliola petiolo brevi,
ovata inaequalia, lateralia minora, altero latere obli-
qua, terminale subrhombeum sesquipollicare, reliquis
sere duplo majus, omnia medio ad apicem repando-
crenata obtusa mucronata, subtus pallidiora, villosa.
Petiolus bipollicaris pubescens, basi articulatus cras-
sior, squamae duas setaceae inter foliola. Stipulae*

lanceolatae ciliatae. Pedunculis terminalis erectus semipedalis. Flores remotissimi purpurei ante florescentiam cernui. Pedicelli 2 f. 3 ad singulum nodum capillares pubescentes pollicares subviscosi. Calyces pubescentes. Alae lanceolatae carina breviores. Legumen lineare. Vahl. l. c.

*43. HEDYSARUM *capitatum*.

H. foliis ternatis subrotundo - obovatis obtusis subtus tomentosis, stipulis lanceolatis, racemis axillaribus, lomentis linearis - teretibus articulatis pendulis. W.

H. (*capitatum*) foliis ternatis subrotundis tomentosis, racemis capitatis calycibus glabris. Burm. ind. 167. t. 54. f. 1.

H. trifoliatum arborescens, floribus spicatis, foliis subrotundis subtus lanuginosis. Burm. zeyl 115.

Onobrychis Indiae orientalis triphylla, foliis surotundis venosis, aversa parte tenui undique lanugine tectis.

Pluk. amalth. 161. t. 433. f. 3.

Kopfartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Zeylona. ৎ

Caules frutescentes simplices albantes. Folia ternata subrotunda integerrima tomentosa. Petiolis folii medii stipulatis. Stipulae binae lanceolatae emarginatae ad alas foliorum, e quibus Pedunculi racemosi ante florescentiam capitato-conici. Burm. l. c.

44. HEDYSARUM *marilandicum*.

H. foliis ternatis oblongis subtus villosiusculis, stipulis subulatis, racemis paniculatis, lomentis triarticulatis, articulis rhombeis reticulatis pilosiusculis. W.

H. foliis ternatis: foliolis subrotundis, canle frutescente, ramosissimo, leguminibus articulatis laevibus. Sp. pl. 1055. Gron. virg. 109.

H. trifoliatum, siliqua breviore. Dill. elth. 174. t. 144. f. 171.

H. triphyllum marilandicum minus, siliquis compressis articulatis asperis brevioribus. Raj. suppl. 455.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 280.

Marilandischer Hahnenkopf. W.

Habitat in Carolina, Virginia. ৎ (v. f.)

Lomentum tri-vel quadriarticulatum, articulis rhomboidibus reticulatis pilosiusculis. W.

*45. HEDYSARUM obtusum.

H. foliis ternatis ovatis obtusis basi subcordatis, stipulis lanceolato-subulatis, panicula terminali, articulis lomenti semiorbiculatis reticulatis hispidis. W.

Hedysarum obtusum. Mühlenberg in litt.

Stumpfblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in Pennsylvania 24 (v. f.)

Caulis sesqui-vel bipedalis erectus pilis minutissimis obsitus, inferne teres superne trigonus. Folia petiolata ternata. Foliola ovata obtusa basi cordata pollicaria glabra, subtus scabriuscula, lateralia minoria. Stipulae lanceolato-subulatae caducae parvae. Panicula racemosa simplex terminalis erecta. Flores violacei. Lomentum triarticulatum, articulis semi-orbiculatis reticulatis hispidis. W.

*46. HEDYSARUM supinum.

H. foliis ternatis oblongis obtusiusculis superne nitidis subtus incanis, stipulis ovatis acuminatis, racemo simplici terminatis, lomenti articulis semiorbiculatis incanis. W.

H. foliis ovatis obtusiusculis subtus incano-villoso, caule ramoso procumbente, racemis simplicibus erectis terminalibus. Swartz prod. 106.

H. triphyllum fruticosum supinum flore purpureo. Sloan. jam. 73. hisp. 1. p. 185. t. 118. f. 2. Raj. suppl. 458.

Nedriger Hahnenkopf. W.

Habitat in Jamaica. h (v. f.)

*47. HEDYSARUM tortuosum.

H. foliis ternatis ovatis oblongis obtusis glabriusculis, racemis erectis axillaribus, leguminibus tortuolis compressis pubescentibus. Swartz prod. 107.

H. foliis ternatis ovato-lanceolatis glabris, racemis axillaribus terminalibusque, leguminibus compressis tortuosis. Vahl symb. 2. p. 82.

H. caulescens erectum triphyllum, floribus minimis, spicis laxis terminalibus. Brown jam. 301.

H. triphyllum erectum. Sloan. his. I. p. 184. t. 116.
f. 2.

Gewundener Hahnenkopf. W.

Habitat in India occidentali. Ȑ (v. s.)

Caules tenues glabri teretes ramosi. Folia petiolata ternata. Foliola unguicularia, lateralia minora ova-to-lanceolata obtusa mucronata utrinque glabra sub-avenia maculata. Stipulae setaceae. Racemi ex axillis vel apice ramorum elongati erecti. Pedunculus filiformis. Pedicelli capillares plerumque oppositi solitarii unguiculares. Bractea minuta setacea ad basin. Legumina articulata pubescentia torta, articulis sub-rhomboidalibus aequalibus. Vahl l. c.

*48. HEDYSARUM molle.

H. foliis ternatis ovatis attenuatis subtus villoso, race-mis terminalibus, pedicellis subternis, leguminibus tortuoso, Vahl symb. 2. p. 83.

Weichblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in insula St. Crucis. Ȑ

Simile antecedenti, differt: caule robustiore, foliis majoribus subtus molliter villoso, junioribus utrinque, minime maculatis. Pedicellis acuminatis saepe 4 vel 5, leguminibus duplo majoribus, articulo ultimo maxi-mo, respectu reliquorum. Vahl l. c.

*49. HEDYSARUM microphyllum.

H. foliis ternatis ovatis villoso, caule frutescente erecto glabro, floribus terminalibus paniculatis. Thunb. jap. 284.

Kleinblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia. Ȑ.

Caulis frutescens filiformis purpureus glaber erectus ramosus. Rami alterni erecti cauli similes ramuloso. Ramuli capillares breves reflexi. uti rami fere toti te-cti stipulis. Folia petiolata ternata. Foliola ovata acuta integra nervosa, supra glabra viridia, subtus villosa pallida, lateralia brevissime petiolata, inter-medium longius petiolatum. Petoli capillares purpu-rei glabri lineam longi. Stipulae sessiles ovatae subulatae membranaceae frequentes. Flores in ramulis ter-minales subpaniculati. Panicula pedicellis capillari-

bus alternis vel subdichotomis flexuosis purpureis hispidis. Calyx hirsutus. Corolla purpurea. Legumina triarticulata compressa villoso-scabra. Thunb. l. c.

50. HEDYSARUM *viridiflorum.*

H. foliis ternatis ovato-oblongis subtus scabris; stipulis lanceolato-cuspidatis, racemis paniculatis bracteatis, lomentis asperis. W.

H. foliis ternatis acutiusculis, caule erecto, racemis longissimis erectis. Sp. pl. 1055. Gron. virg. 109.

Onobrychis americana floribus spicatis, foliis ternis canescensibus, foliis asperis. Pluk. alm. 276. t. 308. f. 2.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 3. p. 280.

Gruenblattiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia. 24 (v. v.)

Caulis sulcatus pubescens. Folia ternata petiolata. Foliola sesqui-vel triplicaria ovato-oblonga acutiuscula, adulta subtus scabra, juniora subtus pubescentia. Racemi paniculati terminales ante anthesin obtecti bracteis ovatis acutis caducis. Calyces pilosi. Lomenta H. marilandici, cui simile, sed foliola longiora subtus scabra, flores parum minores et racemi nondum floridi bracteis obtecti. W.

* 51. HEDYSARUM *racemosum.*

H. foliis ternatis oblongis, stipulis glabris, caule frutescente erecto, racemis axillaribus erectis longissimis, leguminibus glabris. Thunb. jap. 285.

Traubenartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia. 5

Caulis frutescens erectus glaber ramosus. Rami alterni angulati glabri purpurei erecti. Folia alterna petiolata ternata. Foliola petiolata, intermedium longius, ovato-oblonga acuta integra patentia supra viridia subtus canescens, lateralia minora, intermedium duplo majus. Petiolus filiformis glaber pollicaris. Stipulae duas setaceae semilineam longae inter folia duo lateralia et infra impar. Racemi axillares saepe plures palmates et ultra erecto-patentes capillares glabri. Pedicelli solitarii vel bini uniflori brevis-

simi capillares. Legumina compressa acuminata laevia. Thunb. l. c.

52. HEDYSARUM *frutescens.*

H. foliis ternatis lanceolato-oblongis obtusis subtus sericeis, stipulis subulatis, racemis axillaribus ovatis folio brevioribus, lomentis uniarticulatis pilosis calyce brevioribus. W.

H. foliis ternatis subovatis subtus villosis, caule frutescente. Sp. pl. 1055. Gron. virg. 109.

H. foliis ternatis ovato-lanceolatis subtus villosis, caule frutescente villoso. Mill. dict. n. 16.

Medicago (*virginica*) caule erecto ramosissimo, floribus fasciculatis terminalibus. Sp. pl. 1096? Gron. virg. 86?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 280.

Strauchartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in America boreali. t̄ (v. f.)

Rami juniores sericeo-pubescentes, adultiores glabri teretiusculi. Folia ternata breviter petiolata. Foliola lanceolato oblonga obtusa mucronata superne glabra, inferne sericeo-pubescentia. Foliola juniora utrinque sericeo-pubescentia. Stipulae subulatae petiolo breviores patentes. Racemi pedunculati capitato-ovati axillares folio breviores. Calyces hirti profunde partiti, laciniis longis linear-lanceolatis. Lomentum uniarticulatum monospermum calyce brevius ovatum pilosum. W.

53. HEDYSARUM *hirtum.*

H. foliis ternatis subrotundo-ellipticis stipulis subulatis, racemis arillaribus oblongis folio longioribus, lomentisque uniarticulatis hirsutis. W.

H. foliis ternatis ovalibus, caule fruticoso, spicis oblongis, calycibus fructibusque hirsutis monospermis. Sp. pl. 1055. Gron. virg. 108.

Trifolium fruticosum hirtutum, spicis oblongis pedunculatis. Gron. virg. I. p. 173.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 281.

Rauher Hahnenkopf. W.

Habitat in America boreali. t̄ (v. f.)

Spicae oblongae. Legumina uniarticulata, ovata, acuta.

In hortis floret primo anno floribus mutilatis, tamen frugiferum; altero anno profert corollas albas.

Foliola subrotunda elliptica obtusa, juniora utrinque hirsuta, adulta glabriuscula. Racemi hirsuti pedunculati oblongi. Calyces longitudine corollae canes hirsuti. W.

* 54. HEDYSARUM *trichocarpum*.

H. foliis ternatis lanceolatis obtusis subtus strigosis, stipulis filiformibus, racemis subcapitatis, lomentis uniarticulatis calycē brevioribus villosis. W.

Hedysarum trichocarpum. Steph. in litt.

Haarfrüchtiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Siberia. ♂ (v. f.)

Rami striati glabri. Folia ternata petiolata. Foliola oblonge-lanceolata obtusa mucronata superne glabra, inferne pilis adpresso obsita, pollicaria; intermedium longe petiolatum. Stipulae filiformes patentissimae. Racemi axillares pedunculati subcapitati 6 vel 9-flori. Calyces pubescentes laciis subulatis longitudine fere corollae. Lomentum uniarticulatum ovatum acutum villosum. W.

55. HEDYSARUM *junceum*.

H. foliis ternatis linearibus basi attenuatis subtus strigoso-pubescentibus, racemis axillaribus, lomentis uniarticulatis ovatis laevibus calycis longitudine. W.

H. foliis ternatis lanceolatis, leguminibus uniarticulatis rhombeis, pedunculatis lateralibus subumbellatis.

*Linn. dec. I. t. 4.**

H. triphyllum, flosculis albis, polyanthos. Amm. ruth.

154.

Citysus saxatilis, meliloti folio ad cālēm appresso, floribus in foliorum alis. Amm. ruth. 281.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 654.

Binsenartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Siberia, Tataria. ☺ 24 (v. f.)

Simile H. violaceo, umbellae foliis breviores. Legumina monosperma. Flores albi.

* 56. HEDYSARUM *reticulatum*.

H. foliis ternatis linearibus subtus strigoso-pubescenti-

bus, racemis axillaribus, lomentis uniarticulatis ovatis reticulatis calyce majoribus. W.

Hedysarum reticulatum. Mühlenb. in litt.

Netzfrüchtiger Hahnenkopf. W.

Habitat in America boreali 24 (v. f.)

Simillimum H. juncea, sed diversum: foliolis basi non attenuatis, floribus minoribus, calycibus plerumque deciduis, lomentis ovatis acutis reticulatis calyce majoribus. W.

* 57. HEDYSARUM *villosum*. W.

H. foliis ternatis ellipticis mucronatis utrinque tomentosis, stipulis lanceolatis, racemis axillaribus. W.

Starkbehaarter Hahnenkopf. W.

Habitat — — — — (v. f.)

Rami tomentosi sulcati. Folia ternata petiolata. Foliola utrinque tomentosa mollia elliptico-obovata subretusa mucronata fere pollicaria. Stipulae lanceolatae breves. Racemi axillares foliis multo longiores. Calycis laciniae lanceolatae, cuspidatae hirtae. Corolla calyce major videtur flava. Lomentum ignotum. Habitu hirto et trichocarpo simile, sed racemi multo longiores. W.

58. HEDYSARUM *violaceum*.

H. foliis ternatis ellipticis obtusis, racemis umbellatis longitudine petioli, floribus geminatis, lomentis uniarticulatis rhombatis reticulatis glabris. W.

H. foliis ternatis ovatis, floribus geminatis, leguminibus nudis venosis articulatis rhombatis. Sp. pl. 1055.

Kniph. cent. 3. n. 49.

H. foliis ternatis lanceolatis, leguminibus monospermis. Gron. virg. 108.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 655.

Violetter Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia. (v. f.)

Foliola semipollicaria elliptica obtusa mucronata subtus pilis raris adpresso tecta. Racemi bilineares longitudine petioli subumbellati subsexflori, pedunculis geminatis. Descriptio sequens Linnaei respectu inflorescentiae ad hoc et ad H. divergens spectat. W.

Flores violacei, gemini, propriis pedicellis plerumque annexi, in aliis glomerati ex foliorum alis, in aliis vero filiformibus pedunculis hinc inde affixi. Leguminosa calyce triplo longiora, rhombea, compressa, acuta, glabra, reticulata, monosperma.

*59. HEDYSARUM *divergens*.

H. foliis ternatis oblongis obtusis, racemis petiolo longioribus, floribus geminatis, lomentis uniarticulatis ovatis reticulatis glabris. W.

Hedysarum divergens. Mühlenb. in litt.

Sparriger Hahnenkopf. W.

Habitat in America boreali. 24 (v. f.)

Folia sesquipollucaria oblonga obtusa mucronata subtus pilis raris adpresso tecta. Racemi pollicares vel sesquipollucares axillares plerumque petiolo parum longiores, occurunt et racemi tri-vel quadriflori in inferioribus axillis brevissimi. Lomentum ovatum reticulatum monospermum glabrum. Affine praecedenti, tamen abunde diversum. W.

*60. HEDYSARUM *ciliare*. W.

H. foliis ternatis ovatis subtus pubescentibus margine ciliatis, panicula terminali, lomenti articulatis semi-orbiculatis hispidis. W.

Hedysarum ciliare. Mühlenb. in litt.

Habitat in America boreali. 24 (v. f.)

Caulis teres erectus glaber apicem versus pubescens. Folia ternata breve petiolata. Foliola ovata obtusa mucronata semipollucaria subtus pubescentia margine tenuissime ciliata. Stipulae filiformes. Panicula terminalis. Flores parvi violacei. Lomenta bi-vel tri-articulata, articulis semi-orbiculatis pilis parvis uncinatis tectis. W.

61. HEDYSARUM *paniculatum*.

H. foliis ternatis oblongo-lanceolatis glabris, panicula terminali, lomenti articulis rhombeis pubescentibus. W.

H. foliis ternatis linearis lanceolatis floribus paniculatis, leguminibus rhombeis. Sp. pl. 1056. Gron. virg. 108.

Onobrychis mariana triphylla, passiflorae pentaphyllae angustiore folio et facie, siliquis dentatis alperis. Pluk. mant. 140. t. 432. f. 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 655.

Rispenblütiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia. 24 (v. f.)

Flores purpurei.

Foliola tripollicaria oblongo-lanceolata in foliis inferioribus, in summis vero pollicaria. Lomentum quadriarticulatum, articulis rhombeis. W.

*62. HEDYSARUM caudatum.

H. foliis ternatis oblongis glabris, caule herbaceo, panicula terminali, leguminibus tomentolis. Thunb. jap. 286.

Geschwänzter Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia.

Caulis herbaceus erectus glaber simplex pedalis vel ultra. Folia petiolata erecta ternata. Foliola oblonga acuta integra nervosa glabra, lateralia brevissime petiolata minora, intermedium longius petiolatum magius, sesquipollicaria. Petiolus semiteres canaliculatus pollicaris. Stipulae ad basin petioli inter folia lateralia et sub impar duae setaceae. Flores terminales paniculati. Panicula contracta villosa nutans spithamea. Calyx hirsutus. Corolla purpurea. Legumen sublineare ferrugineo-romentosum. Simile valde H. gangetico, sed folia huic ternata. Thunb. l. c.

*63. HEDYSARUM tuberosum.

H. foliis ternatis ovatis acutis, racemo terminali longiflomo, lomentis repandis villosis. W.

Hedysarum tuberosum. Roxb. in litt.

Knölliger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. 5

Rami lignosi, videntur scandes. Folia longe petiolata ternata. Foliola lata ovata tripollicaria acuta, adulta rigida subtus tenuissima sericea, juniora utrinque sericea subtus ob pilos copiosos splendida. Racemosus sesqui vel bipedalis simplex in apice ramulosus. Pedicelli subgeminati, ut pedunculus communis, sericeo-villoso. Calyces villoso-sericei. Flores nutantes. Lomenta immatura repanda villosa.

*64. HEDYSARUM *cuspidatum*.

H. foliis ternatis ovatis acuminatis, panicula terminali, articulis lomenti triangularibus reticulatis margine pubescentibus. W.

Hedysarum cuspidatum. Mühlenberg in litt.

Zugespitzter Hahnenkopf. W.

Habitat in America borealia. 24 (v. s.)

Caulis herbaceus fulcatus. Folia petiolata ternata. Foliola ovato-oblonga valde acuminata glabra margine scabriuscula, intermedium majus et longe petiolatum. Stipulae ovato-lanceolatae. Panicula terminalis. Flores violacei. Articuli lomenti triangulares reticulati glabri margine pubescentes. W.

*65. HEDYSARUM *glutinosum*.

H. foliis ternatis subrotundo-ovatis acuminatis, panicula scapiformi e caulis basi, pedunculis viscosis, lomenti articulis oblongo-triangularibus glabriusculis. W.

Hedysarum glutinosum. Mühlenb. in litt.

Klebriger Hahnenkopf. W

Habitat in America boreali. 24 (v. s.)

Caulis fulcatus foliosus. Folia ternata longe petiolata. Foliola triplicaria et ultra, lateralia oblonga ovata acuminata, intermedium majus longe petiolatum subrotundo-ovatum acuminatum. Panicula e basi caulis scapiformis. Pedunculi piloso-viscosi. Lomenti articuli triangulares oblongi obtusissimi distantes, pilis minutissimis sparsis tecti. Simile sequenti sed diversum: foliis majoribus, scapis viscosis e basi caulis nec e radice. W.

66. HEDYSARUM *nudiflorum*.

H. foliis ternatis subrotundo-ovatis acuminatis, scapo paniculato glabro radicali, lomenti articulis subrotundo-triangularibus glabriusculis. W.

H. foliis ternatis, scapo florifero nudo, caule folioso angulato. Sp. pl. 1056. Gron. virg. 107.

H. caule nudo: longissimo foliifero, florifero angulato. Gron. virg. I. p. 86.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 655.

Nacktblütiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia, Pensylvania. 24 (v. f.)

Flores purpurei.

Foliola subrotundo-ovata brevissime acuminata bipinnata. Scapus nudus paniculatus glaber e radice. Articuli lomenti distantibus triangulares pilis raris adpresso tecti et ut in praecedente reticulati. W.

*67. HEDYSARUM axillare.

H. foliis ternatis rhomboe- subrotundis, caule repente radicante, petiolis erectis, scapis axillaribus foliis longioribus. Swartz prod. 107.

H. triphyllum majus repens, scapis axillaribus assurgentibus inferne nudis superne spicatis. Brown, jam. 301.

Winkelblütiger Hahnenkopf. W.

Habitat in umbrosis montosis Jamaicae. 24

*68. HEDYSARUM pilosum.

H. foliis ternatis ovatis acuminatis, caule decumbente hirto, racemis axillaribus. Thunb. jap. 290.

Japanischer Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia.

Caulis herbaceus filiformis valde pilosus parum ramosus, ramis alternis brevibus caule similibus. Folia ternata petiolata utrinque villosa. Foliola breviter petiolata ovata obtusa cum acumine setaceo patentia vix unguicularia, impari paullo majore et longius petiolato. Flores axillares racemosi, ramemo subquadri-floro. Pedunculus capillaris vix longitudine petioli. Corollae purpureae. Thunb. l. c.

*69. HEDYSARUM spirale.

H. foliis ternatis ovatis obtusis glabris, caule ramosissimo, ramis diffusis, racemis laxis divaricatis, leguminibus spirali tortuosis. Swartz prod. 107.

Hedysarum procumbens. Mill. dict.

Spiralfrüchtiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Jamaica. 5 (v. f.)

Lomentum tri- vel quadriarticulatum, articulis rhomboidibus pilosiusculis distantibus, iunctis articulorum et basi articulorum spiraliter tortis. W.

*70. HEDYSARUM *Scorpiurus*.

H. foliis ternatis oblongis subtus hirsutis, caulis pro-
cumbentibus trigonis, racemis axillaribus legumini-
bus teretiusculis erectis. *Swarz prod.* 107.

H. triphyllum hirsutum minus repens, racemis strictis
hirsutis. *Brown jam.* 301.

Rundfrüchtiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Hispaniola, Jamaica. (v. f.)

Foliola oblongo-ovata semipollicaria obtusa, Ra-
cemi elongati. Lomentum fere Coronillae, articulis
compressiusculis oblongis. W.

*71. HEDYSARUM *biflorum*. W.

H. foliis ternatis ovatis tomentosis, caule volubili, pe-
dunculis bifloris longitudine petioli, lomentis hirsu-
tis. W.

Zweiblumiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis crassitie filii pubescens. Folia petiolata ter-
nata. Foliola utrinque tomentosa mollia, lateralia
elliptico ovata obtusa mucronata, terminale rhombeo-
ovatum mucronata. Pedunculi biflori brevissimi axil-
lares vix petiolo longiores. Lomentum 5-6-articu-
latum hirsutum compressum. W.

*72. HEDYSARUM *prostratum*.

H. foliis ternatis ellipticis obtusis, caule prostrato, race-
mis axillaribus, lomentis uniarticulatis ovatis. W.

Hedysarum prostratum. *Mühlenb. in litt.*

Liegender Hahnenkopf. W.

Habitat in Pennsylvania. 24 (v. f.)

Caules semipedales teretes pilis sparsis adpresso-
siti prostrati. Folia petiolata ternata. Foliola semi-
pollicaria elliptica obtusa mucronata subtus pilis albi-
cantibus raris adpresso tecta. Racemi folio longio-
res. Lomentum ovatum uniarticulatum pubescens.
Simile sequenti; sed foliorum forma, racemis folio lon-
gioribus diversum. An lomentum semper uniarticula-
tum? In H. repente interdum lomenta uniarticulata
vidi. W.

73. HEDYSARUM *repens*.

H. foliis ternatis subrotundo-ellipticis emarginatis, racemis axillaribus, lomentis repandis. W.

H. foliis ternatis obcordatis, caulinibus procumbentibus, racemis axillaribus. Sp. pl. 1056. Mill. dict. n. 14.

H. caulinibus procumbentibus, racemis lateralibus foliariis, petiolis pedunculo longioribus. Gron. virg. I. p. 86.

Trifolium procumbens, trifolii fragiferi folio. Dill. elth. 172. t. 142. f. 169.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 656.

Kriechender Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia. 24 (v. v.)

Flores variegati albo et rubro.

*74. HEDYSARUM *virgatum*.

H. foliis ternatis obtusis cum acumine, caule angulato piloso, pedunculis capillaribus trifloris. Thunb. jap. 288.

Ruthenförmiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia.

Caulis herbaceus angulatus, angulis pilosis, erectus purpurascens ramosus. Rami alterni filiformes angulati pilosi erecto patent virgati. Folia ternata brevissime petiolata. Foliola brevissime petiolata ovata obufa cum acumine setaceo, integerrima, margine reflexo, lineata, supra viridia glabra, subtus pallida pilosa; intermedium majus, semiunguicularia. Flores axillares pedunculati. Pedunculi capillares pilosi apice triflori patent reflexi pollicares. Thunb. l. c.

*75. HEDYSARUM *heterophyllum*. W.

H. foliis ternatis obovato-ellipticis obtusis, caule adscendente, pedunculis axillaribus unifloris, lomentis margine superiore repandis ciliatis. W.

Hedysarum triflorum B. Sp. pl. 1057.

H. trifoliatum repens folio ovali glabro, caule hirsuto, siliqua plana articulata. Burm. zeyl. 118. t. 54. f. 1.

Verschiedenblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat in Zeylona. 24 (v. f.)

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

Z.

Caulis sesqui-vel bipedalis pilosus, pilis patentissimis. Folia infima radici proxima simplicia, reliqua ternata petiolata. Foliola obovato-elliptica pollicaria et semipollicaria obovato-elliptica obtusa mucronata subtilis pilis adpressis obsita. Stipulae ovatae acuminatae. Pedunculi gemini vel terni filiformes axillares uni-vel biflori. Lomentum pilosiusculum 4 vel 5 articulatum ciliatum, margine superiore repandum. Ab. H. trifloro diversum: foliolis multo majoribus nunquam obcordatis, caule altiore et foliis inferioribus simplicibus. W.

76. HEDYSARUM triflorum.

H. foliis ternatis obcordatis, caule procumbente, pedunculis unifloris axillaribus, lomentis margine superiore repandis ciliatis. W.

*H. foliis ternatis obcordatis, caulinus procumbentibus, pedunculis unifloris ternis. Sp. pl. 1057. Fl. zeyl. 297. * Swartz obs. 288. t. 6. f. 1.**

H. (stipulaceum) caule procumbente, foliis ternatis obcordatis, ramulis stipulaceis, floribus solitariis. Burm. ind. 168. t. 54. f. 2.

H. trifoliatum repens, acetosellae folio glabro, caule hirsuto. Burm. zeyl. 119. t. 54. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syjt. 8. p. 657.

Dreyblumiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Malabar, Zeylona, China, Jamaica et Guiana. 4 (v. f.)

Planta americana ab asiatica non est diversa ut ex speciminibus harum regionum vidi. W.

*77. HEDYSARUM ciliatum.

*H. foliis ternatis, foliolis ovatis mucronatis pilosis, pedunculis axillaribus unifloris folio brevioribus. Thunb. prod. 132. Nov. Act. Ups. 6. p. 43. t. 2. f. 1.**

Capiicher Hahnenkopf. W.

Habitat ad Cap. b. spei graminosis. 4.

Foliola fere uncialia elliptica brevisime acuminata mucronata pilosa ciliata. Flores magni in pedunculis unifloris axillaribus. Variat foliis glabris. W.

*78. HEDYSARUM *tetraphyllum*.

H. foliis ternatis quadrinatisque, stipulis semifagittatis, racemis elongatis, bracteis geminis flore majoribus. W.

H. foliis ternatis quadrinatisque, stipulis sagittatis. Thunb. prod. 132. Nov. Act. upf. 6. p. 44. t. 3.*

Vierblättriger Hahnenkopf. W.

Habitat ad Cap. b. spei prope Galgenbosch et in interioribus regionibus.

Singularis species, satis distincta, ob foliola saepius quatuor in petiolo communi, et racemus ut in H. diphylo, cui ceterum affine. Bracteae ovatae acutae geminae nervosae flore longiores. Lomenta quadriarticulata moniliformia scabra. W.

79. HEDYSARUM *barbatum*.

H. foliis ternatis, racemis oblongis subramosis, leguminibus inflexis, calycibus pilosis. Syst. veg. 562.

Swartz obs. 287.*

H. foliis ternatis, floribus cernuis racemosis, calycibus pilosis, leguminibus biarticulatis. Sp. pl. 2. p. 1055.

Amoen. acad. 5. p. 403.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 658.

Bartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Jamaicæ fabulosis aridis.

80. HEDYSARUM *lagopodioides*.

H. foliis ternatis, racemis oblongis, leguminibus inflexis, calycibus hirsutis. Syst. veg. 562. Burm. ind. 68. t. 53. f. 2.

H. foliis ternatis ovatis obtusis, spicis hirsutis. Spec. pl. 2. p. 1057.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 658.

Hasenfußartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in China. Osbeck.

Foliola ovata, obtusa, nuda, terminata seta minima. Spicae ovatae, dense, hirsutae. Flores interflucti Bracteis ovatis, subulato-acuminatis, longitudo florum. Pedicelli hirsuti. Calyces brevissimi, terminati setis tribus hirsutis. Corollæ parvae. Legmina monosperma.

Affine H. barbato. *Commune huic cum barbato, quod quivis pedicellus defloratus inflectatur armatus calycis laciniis tribus majoribus pilosis reflexis, sic occultans Legumen laeve, 3 f. 4-articulatum.* Syst. Veget. 562.

* 81. HEDYSARUM *uncinatum.*

H. foliis ternatis ovatis villosis, caule frutescente scandente, racemis terminalibus. W.

H. foliis ternatis ovatis villosis, caule fruticoso, pilis uncinatis scandente, racemis terminalibus. Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 27. t. 298.*

Hakenhaariger Hahnenkopf. W.

Habitat ad Caracas. ḥ

Caulis scandens pilis uncinatis tectus. Folia utrinque villosa mollia. W.

82. HEDYSARUM *volubile.*

H. foliis ternatis lanceolatis obtusis, caule volubili, racemis axillaribus. W.

H. foliis ternatis ovato-oblongis, caule volubili. Hort. cliff. 409. Roy. lugdb. 385.

H. trifolium scandens, folio longiore splendente. Dill. elth. 173. t. 143. f. 170.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 658.

Kletternder Hahnenkopf. W.

Habitat in America septentrionali.

* * * *Foliis pinnatis.*

* 83. HEDYSARUM *pictum.*

H. caulescens, foliis pinnatis lanceolatis, racemo longissimo spicato, lomenti articulis ellipticis flexuoso-pliatis. W.

H. foliis pinnatis in facie disco pictis, racemo spicato erecto longissimo, bracteis coloratis caducis leguminibus retrofractis, caule suffruticoso. Jacq. ic. rar. 3. t. 567. Collect. 2. p. 262.*

Bunter Hahnenkopf. W.

Habitat in Guinea. ḥ (v. s. c. fr.)

Folia impari pinnata ampla. *Foliola lanceolata semipedalia atro-viridia cum macula flavescente in di-*

sco. *Stipulae ovato-lanceolatae.* *Racemus termina-*
lis cylindraceus sesquipedalis rectus, *Bracteis ovatis*
acuminatis albido-flavecentibus apice purpureis ante
florecentiam tectus. *Corollae purpureae.* *Lomenta-*
*ut in *H. Vespertilionis.* W.*

84. HEDYSARUM *argenteum.*

H. acaule, foliis pinnatis subrotundo-ovatis subtus sericeo-tomentosis, scapo aphylo, lomenti articulis rugosis villosis. W.

H. foliis pinnatis subtus sericeis lucidis, leguminibus articulatis, scapo aphylo. *Lin. suppl.* 333.

Astragalus (grandifloris) acaulis hirsutus, scapis erectis spicatis, foliolis ovatis obtusis villosis. *Sp. pl.* 1071.

Hedysarum grandiflorum. *Pall. it.* 2. *p.* 743. *t.* 9.

H. scapis radicatis. *Gmel. sib.* 4. *p.* 30. *t.* 13.

H. villosum argenteum non ramosum, floribus spicatis purpureo-violaceis. *Anm. ruth.* 115.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. *p.* 659.

Silberfarbiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Siberia. D. *Gmelin.* 24 (v. f.)

Folia spithamea: foliolis 17, ovalibus, obtusis, hirsutis praesertim subtus. Scapi crassi, pilosi, terminati Spica crassiuscula. Calyces hirsuti. Corollae magnae flavae.

Folia radicalia pinnata. Foliola septem ad novem vequalia ovata subtus tomentoso-sericea nitida. Scapi aphylli longitudine foliorum sive altiores subtomentosi albi. Spica terminalis. Foliola calycina subulata longitudine fere corollae. Corollae violaceae s. albae. Alae vexillo breviores. Legumen articulis duobus s. tribus lanuginosis intra florem aridum. *Lin. suppl.* 1. c.

Variat foliis utrinque sericeo-nitentibus vel tantum subtus, scapo erecto et adscendente, floribus dense laxiusve spicatis, corollis violaceis et albis. Hedysarum humicubum Pall. est hujus tantum varietas. W.

*85. HEDYSARUM *nitidum.* W.

H. caulescens foliis pinnatis ellipticis tomentosis sericeo-nitidis, lomenti articulis laevibus. W.

H. orientale argenteum flore luteo, siliqua glabra. Tournef. cor. 27.

Glänzender Hahnenkopf. W.

Habitat in America, 24 (v. f.)

Caulis flexuosus niveo tomentosus. Folia imparipinnata. Foliola 11 vel 13 elliptica brevissime petiolata utrinque tomentosa praesertim subtus supra nitido sericea. semipollicaria. Racemi axillares folio longiores. Pedunculus communis et partiales brevissimi albo tomentosi. Calyx canescens tomentosus. Corolla lutea quadruplo brevior. W.

*86. HEDYSARUM varium. W.

H. caulescens, foliis pinnatis ellipticis acutis subtus tomentosis, lomenti articulis asperis. W.

H. orientale incanum, flore vario magno, siliqua aspera. Tournef. cor. 27.

Verschiedenfarbiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

Caulis striatus adscendens tomentoso - canescens. Folia impari pinnata. Foliola 15 subeffilia elliptica acuta superne glabriuscula veridia subtus tomentosa cana. Stipulae vaginatae membranaceae. Racemi foliis triplo longiores. Calyces pubescentes brevissimi. W.

87. HEDYSARUM fruticosum.

H. frutescens, foliis pinnatis, foliolis ellipticis obtusis subtus pubescentibus alternis, lomenti articulis reticulatis. W.

H. foliis pinnatis, foliolis alternis oblongis mollibus, stipulis subulatis, racemis axillaribus, leguminum articulis reticulatis. Lin. suppl. 333.

Hedysarum fruticosum. Pall. it. 3. p. 753. t. 5. f. 1.

Astragalus caulis ramosis erectis, foliolis et floribus distis. Gmel. fib. 4. p. 45. t. 22.

Buschiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Sibiriae arenosis ad Selengam fluvium et in valle Chailassutu Davuriae. 3 (v. v.)

Folia caulina longe pinnata. Foliola alterna novem ad duodecim remota petiolata mollia cana. Racemi axillares pauciflori, foliis breviores. Corollae purpu-

reae. Legumina compressa articulata, articulis rugoso reticulatis. Speciosissima planta equis grata et ad firmandam arenam volatilem utilissima.

*88. HEDYSARUM *Sennoides*. W.

H. frutescens, foliis pinnatis, foliolis alternis glabris obovatis retusis, racemis axillaribus, paucifloris, lomenti articulis aculeatis. W.

Sennenartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. h (v. f.)

Frutex ramis striatis glabris, senioribus cicatrificatis. Folia impari pinnata. Foliola 7 vel 9 obovata retusa glabra alterna breve petiolata. Stipulae lanceolatae. Racemi axillares tri-quatri-vel quinque-flori, floribus longe pedunculatis. Bracteae binae lanceolatae in medio pedunculi partialis. Calycis laciniae lanceolatae corolla breviores. Lomentum sesquipollicare triarticulatum, articulis oblongis aculeatis. W.

89. HEDYSARUM *alpinum*.

H. caulescens erectum, foliis pinnatis ovato-lanceolatis glabris, racemis elongatis axillaribus, bracteis pedunculo brevioribus, articulis lomenti penduli glabris. W.

H. foliis pinnatis, leguminibus articulatis glabris pendulis caule erecto. *Hort. upf. 232. Gmel. fib. 4. p. 26. n. 35. t. 10.*

H. taxatile, siliqua laevi, floribus purpureis, inodorum. *Amm. ruth. 116. n. 152. 153.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 659.

Alpen-Hahnenkopf. W.

Habitat in Sibiria. 24

Caulis rectus; stipulae breves. Foliola 17, ovato-lanceolata.

Simillimum sequenti, sed diversum: caule altiore, foliolis ovato-lanceolatis, stipulis quidem vaginatis, sed in summo caule brevioribus, racemis elongatis potissimum vero bracteis pedunculo partiali brevioribus. Onobrychis semine clypeato laevi Bauh. pin. 350 ad sequentem speciem pertinere videtur. W.

90. HEDYSARUM *obscurum*.

- H. caulescens flexuosum, foliis pinnatis ovatis glabris, racemis axillaribus, bracteis pedunculo longioribus, articulis lomenti pedunculi glabris. W.
 H. foliis pinnatis, stipulis vaginalibus, caule erecto flexuoso, floribus racemosis pendulis. Sp. pl. 1057. Gmel. fib. 4. p. 29. t. 12. Jacq. austr. t. 168.
 H. alpinum. Jacq. vind. 266.
 H. caule erecto, ramoso, foliis ovatis, siliquis pendulis levissimis. Hall. helv. ed. 2. n. 395. t. 12.
 H. (*controversum*) foliis pinnatis; stipulis vaginalibus; floribus racemosis et leguminibus articulatis glabris, pendulis. Crantz austr. p. 425. t. 2. f. 3.
Astragalus caulescens erectus, stipulis vaginalibus. Sp. pl. 1. p. 756.
Astragalus caule erecto ramoso, spica purpurea nitente terminato. Hall. helv. ed. 1. 567. t. 14.
Houttuyn Lin. Psl. Syst. 8. p. 660.
 Gebirgs-Hahnenkopf. W.
Habitat in Helvetiae, Sabaudiae, Carinthiae, Austriae, alpibus. 24 (v. f.)
Caulis flexuosus. Stipulae amplexicaules, pollicares. Foliola exacte elliptica, mucronata setula. Fructus mihi ignotus.
 Ill. Hallerus eandem plantam, cum H. alpino, suam facit, at meum Specimen ex Helvetia optime representatur figura Halleriana; et est certe species distinctissima ab H. alpino meo sibirico.

*91. HEDYSARUM *tauricum*.

- H. caulescens erectum, foliis pinnatis lanceolato-lineariibus subtus pubescentibus, lomenti articulis subrotundis scabriusculis. W.
Hedysarum tauricum. Pall. nov. Act. Petrop. 10. p. 315.
 Taurischer Hahnenkopf. W.
Habitat in Tauria 24 (v. f.)
Caules plures e radice simplices vix ramo uno altero instructi semipedales erecti pilis adpressis tecti, cani. Folia pinnata cum impari. Foliola 13-17 linearia vel lineari-lanceolata subtus pilis albicantibus adpressis obsita. Stipulae lanceolatae marcidae, in basi

*caulis connatae et vaginatae. Racemi axillares foliis
multo longiores. Lomentum triarticulatum corolla
tectum, articulis subrotundis pilis albicantibus tectis,
rugisque transversalibus laevibus instructis. Variat
foliolis lanceolatis, et linearibus. W.*

*92. HEDYSARUM *incarnatum*. W.

*H. foliis pinnatis exstipulatis subtus incanis, caule ere-
cto, floribus racemosis cernuis.*

Hedysarum incanum. Thunb. jap. 289.

Fleischfarbiger Hahnenkopf. W.

Habitat in Japonia.

*Caulis herbaceus teres purpurascens erectus glaber.
Folia pinnata cum impari. Foliola brevissime petiolata
subquadrijuga oblonga acuta seta terminata integra
supra viridia subtus incana glabra patentia pollicaria,
superiora paullo majora. Flores axillares race-
mosi incarnati. Racemi spithamei pedunculis cernuis.
Differt ab H. obscuro, quod stipulae huic omnino nul-
lae. Thunb. l. c.*

*93. HEDYSARUM *carnosum*.

*H. caulescens procumbens, foliis pinnatis, foliolis obo-
vatis mucronatis carnosis glaberrimis. W.*

*H. caule procumbente, foliis pinnatis, foliolis carnosis
glaberrimis truncatis, floribus racemosis. Desf. atl.
2. p. 177. t. 200.**

Fleischiger Hahnenkopf. W.

Habitat in arenosis Barbariae ad rivulorum ripas. 24

*Radices longissimae ramosae, ramis filiformibus. Cau-
lis glaber procumbens siliatus crassus. Foliola 9-13
subopposita glaberrima carnosa mollia obverse cunei-
formia. Corolla rosea magnitudine H. coronarii.*

Fructus ignotus. Desf. l. c.

*Habitu simile H. nitido sed glabritie omnium par-
tium, foliorumque forma diversum. W.*

94. HEDYSARUM *coronarium*.

*H. caulescens diffusum, foliis pinnatis subrotundo-el-
lipticis, lomenti articulis subrotundis aculeatis nu-
dis. W.*

H. foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nu-

- dis rectis, caule diffuso.* *Hort. cliff.* 365. *Hort. upf.* 231. *Roy. lugdb.* 385. *Mill. dict. n. 1.* *Kniph. cent.* 3. *n. 45.*
Onobrychis, semine clypeato aspero, major. *Bauh.* *pin.* 350.
Onobrychis altera. *Dod. pempt.* 549.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. *p. 661.*
Italiänischer Hahnenkopf. W.
Habitat in Italiae pratis. 24 (v. v.)

95. HEDYSARUM *flexuosum.*

- H.** caulescens diffusum, foliis pinnatis oblongis, lomentis flexuosis, articulis aculeatis. W.
H. foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis flexuosis, caule diffuso. *Sp. pl.* 1058. *Mill. dict. n. 3.* *Kniph. cent.* 4. *n. 30.*
H. siliqua undulata. *Riv. tetr.* 213.
Onobrychis major annua, siliulis articulatis asperis clypeatis undulatum junctis, flore purpureo-rubente.
Morif. hist. 2. *p. 130.* *Raj. hist.* 929.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. *p. 661.*
Bogigfrüchtiger Hahnenkopf. W.
Habitat in Asia. 24 (v. v.)

*96. HEDYSARUM *pallidum.*

- H.** caulescens procumbens, foliis pinnatis ellipticis cano-pubescentibus, lomenti articulis subrotundis aculeatis. W.
H. caule procumbente, foliolis ellipticis pubescentibus, floribus racemosis, leguminibus muricatis articulatis.
Desf. atl. 2. *p. 177.* *
Bleicher Hahnenkopf. W.
Habitat in Atlante prope Mascar. 24
Caules herbacei procumbentes striati. Rami juniores pubescentes. Stipulae ovatae acutae siccae. Folia pinnata, foliolis 13-17. ellipticis lanugine brevissimo pubescentibus cinereis obtusis. Flores racemosi conferti. Corolla pallide rosea magnitudine *H. coronariae.*
Desf. l. c.

*97. HEDYSARUM *capitatum.*

- H.** caule decumbente, foliis pinnatis, foliolis obovatis,

floribus racemoſo-capitatis, pedunculis folio longioribus. Desf. atl. 2. p. 177.
Knaulformiger Hahnenkopf. W.
Habitat in Barbariae arenosis prope Caffam.

Caules decumbentes saepe plures ex eodem caespite striati pubescentes lanugine brevissima. Stipulae siccae ovatae acutae. Folia pinnata, pinnulis numerosis obovatis ellipticis obtusis, saepe truncatis et emarginatis. Pedunculi axillares striati folio duplo longiores. Flores racemoſo-capitati subſeffiles. Bracteae parvae ovatae acutae. Calyx quinquepartitus, lacinias ſubulatis. Corolla roſea magnitudine H. coronariae. Vexillum carina vix longius. Alae paululum breviores. Legumen non vidi. Desf. l. c.

98. HEDYSARUM humile.

H. cauleſcens procumbens, foliis pinnatis linearicuneiformibus, alis breviflaminis, lomenti articulis subrotundis hirsutis aculeatis. W.

H. foliis pinnatis, leguminibus articulatis asperis, corollae alis obfoletis, spicis hirsutis, caulis depressoſus. Sp. pl. 1058. Gouan. illuſtr. 48.

H. clypeatum minus, flore purpureo. Raj. hist. 929.
Onobrychis ſemine clypeato aspero, minor. Bauh. pin.

350. prodr. 149.

Polygalae gefneri affine Caput gallinaceum. Bauh. hist. 2. p. 336. figura bona.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 662. .

Zwerg-Hahnenkopf. W.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. 24 (v. f.)

Folia pinnata: foliolis ovato-oblongis, subtus villosis. Caules ſemipedales folio ramoque ſaepius unico. Spica ovata pubescentis. Corollae ſimiles *H. coronario*, ſed minores: alarum folis rudimentis. Legumina ſaepius biarticulata.

Radix perennis. Vexillum longitudine carinae. Alae vix ulla. Calyx hirsutus, corolla dimidio brevior, in ſetas terminatus.

Gerard vult varietatem *H. pumili*, ſed perperam.

Alae non obfoletae, ſed vexillo tantum triplo minores. Gouan. l. c. R.

*99. HEDYSARUM *muricatum*.

H. caulescens decumbens, foliis pinnatis, foliolis obovatis emarginatis, margine hispidis, racemo terminali, lomentis multiarticulatis repandis muricatis. W.

H. (*muricatum*) foliis pinnatis ad oras muricatis, pedunculis axillaribus unifloris, terminalibus racemosis, leguminibus muricatis, caule suffruticoso decumbente.

*Jacq. ic. rar. 3. t. 568. Collect. 5. p. 147.**

Weichspitziger Hahnenkopf. W.

Habitat in Patagonia ad Champion river. 24 (v. v.)

Caulis ramosus decumbentes pilosus-hispida. Folia impari et abrupte pinnata Aeschynonenes. Foliola obovata parva emarginata apice subdenticulata, margine setis parvis rigidis obsita. Pedunculi axillares uniflori, in apice caulis racemosi. Corolla parva flava. W.

100. HEDYSARUM *spinosissimum*.

H. caulescens diffusum, foliis pinnatis obovatis emarginatis, floribus racemoso-capitatis, lomenti articulis orbiculatis villosis aculeatis. W.

H. foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis tomentosis, caule diffuso. *Hort. upf. 231.* Mill. dict. n. 2.*

H. hispanicum supinum annum angustifolium, floribus parvis ex albo purpurascientibus. *Boerh. lugdb. 2. p. 51.*

Onobrychis minor, foliolis cordatis, siliquis magnis asperitis compressis. *Pluk. phyt. 50. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 663.

Vielstachlicher Hahnenkopf. W.

Habitat in Hispania. ① (v. f.)

Legumen saepius articulatis, orbiculatis, aequaliter aculeatis.

101. HEDYSARUM *virginicum*.

H. foliis pinnatis, caule fruticoso, leguminibus articulatis glabris pedunculatis erectis. *Sp. pl. 1058. Gron. virg. 174.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 281.

Virginischer Hahnenkopf. W.

Habitat in Virginia.

102. HEDYSARUM *pumilum*.

H. foliis pinnatis, caule suffruticoso, corollarum alis vexillo, vexilloque carina brevioribus, leguminibus monospermis. Mant. 448.

Haettuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 282.

Kleiner Hahnenkopf. W.

Habitat in Hispania. 5

Fruticulus palmaris. Folia pinnata, longitudine caulis: pinnis ovali-oblongis. Spica glabra. Florum vexillum carina dimidio brevius. Carina maxima, latissima obtusissima. Calyx laevis dentibus subulatis brevissimis.

* 103. HEDYSARUM *venosum*.

H. acaule, foliis pinnatis subrotundo-ellipticis subtus villosis, lomentis monospermis orbiculatis margine dentatis villosis. W.

H. foliolis venosis inferne villosis, scapo foliis longiore, leguminibus circinatis dentatis spinosis monospermis villosissimis. Desf. atl. 2. p. 179. t. 201.*

Adriger Hahnenkopf. W.

Habitat in regni Tunetani montibus Sbibae. 2

Caulis nullus aut brevis. Folia pinnatu, foliolis 7-13 sessilibus oppositis ovatis aut ellipticis, inferne villosis, superne venis purpurascientibus variegatis. Scapi floriferi pubescentes foliis longiores. Flores racemoso-spicati conferti terminales subsessiles. Corolla pallide lutea magnitudine H. Onobrychidis. Desf. l. c.

* 104. HEDYSARUM *circinatum*. W.

H. caulescens erectum, foliis pinnatis oblongis, lomentis monospermis orbiculatis reticulatis margine dentatis pubescentibus. W.

Onobrychis orientalis galegae foliis erectior, floribus linearis purpureis utrinque reticulatis. Tournef. cor. 26.

Onobrychis major fructu alato. Buxb. cent. 2. p. 38. t. 42.

Kreistrüchtiger Hahnenkopf.

Habitat in Cappadocia. 2 (v. f.)

Caulis erectus pilosus. Folia impari-pinnata. Fo-

liola 13 oblonga mucronata subtus pubescentia. Stipulae ovatae. Racemi longissimi axillares. Lomentum monospermum orbiculatum alatum centro reticulatum pubescens, margine dentatum. Fructus exakte praecedentis sed pilis minutissimis lente tantum conspicuis tectus. Alae hujus lanceolatae calyce parum breviores, praecedentis vero oblongae obtusae calycis longitudine. W.

*105. HEDYSARUM Tournefortii. W.

H. caule erecto pubescente, foliis pinnatis oblongo-lanceolatis subtus canis pubescentibus, alis falcatis calyce longioribus, lomentis monospermis villosis articulato-falcatis dentatis. W.

Onobrychis orientalis incana, flore luteo, fructu magno radiato. Tournef. cor. 26.

Tournefortischer Hahnenkopf. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

Caulis incanus pubescens. Foliola oblongo-lanceolata subtus canescens. Stipulae oblongae acuminatae. Racemi axillares foliis longiores. Corollae flavae magnitudine H. coronarii. Alae falcatae parvae calyce longiores. Lomentum villosissimum orbiculato-falcatum monospermum margine dentatum et aculeis tenuis inter lanam emergentibus sparsis obsitum. W.

*106. HEDYSARUM Pallasii.

H. caule erecto villoso, foliis pinnatis ovatis subtus tomentosis, alis obtusis calyce brevioribus. W.

Hedysarum Buxbaumianum. Pall. Nov. Act. Petrop. 10. p. 316.

Pallasischer Hahnenkopf. W.

Habitat in Tauria. 24 (v. f.)

Caulis valde villosus pilis patentibus. Folia imparipinnata. Foliola ovata subtus candida tomentosa villoja. Stipulae oblongae acuminatae. Racemi axillares foliis longiores. Corollae flavae venis purpureis. Alae oblongae obtusae calyce breviores. Fructus mihi ignotus. W.

Clariss. Pallas hanc speciem cum planta Buxbaumii (cent. 2. t. 42.) quae ad nostrum H. circinatum pertinet, confundere videtur. Differt caule villoso, qui

pilis raris tenuibus svarsis in H. circinato est obsitus, foliolis ovatis subtus tomentosis albis, floribus majoribus et forte fructu. Hedyaro Tournefortii similius est, sed in hoc pli caulis et foliorum sunt adpresso, foliola oblongo-lanceolata virenscentia, et alae falcatae calyce longiores. W.

* 107. HEDYSARUM *ornatum*. W.

H. caule erecto flexuoso pubescente, foliis pinnatis ovatis cuspidatis subtus cano-pubescentibus, alis lanceolatis carina duplo brevioribus lomentis monospermis semiorbiculatis villosis aculeatis. W.

Zierlicher Hahnenkopf. W.

Habitat in Galatia. 4 (v. s.)

Caulis erectus teres striatus flexuosus inferne glaber, superne pubescens. Folia impari pinnata. Foliola 7 vel 9 ovatae cuspidato-acuminata subtus canescens pubescentia. Stipulae marescentes oblongae. Racemi axillares longissimi. Alae lanceolatae calyce longiores, vexillo dimidio breviores. Lomentum semiorbiculatum villosum reticulatum aculeis longis patentibus obsitum. Binis praecedentibus simile sed fructu, foliis minoribus, caule rigido striato inferne glabro; aliisque notis abunde diversum. W.

108. HEDYSARUM *Onobrychis*.

H. caule erecto, foliis pinnatis cuneatis glabris, alis calycem aequantibus, lomentis glabris monospermis aculeato-dentatis. W.

H. foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calycem aequantibus, caule elongato, Sp. pl. 1059. Jacq. aust. t. 352. Gmel. sib. 4. p. 31. n. 48. Crantz aust. p. 424. Pollich pal. n. 694. Gouan. illustr. 48. Gmel. tub. 224. Hoffm. germ. 260. Roth. germ. I. 317. II. 211.

H. foliis pinnatis, leguminibus subrotundis aculeatis. Hort. cliff. 365. Hort. upf. 231. Roy. lugdb. 385. Sauv. monsp. 233.

Onobrychis caule erecto, ramoso, floribus spicatis. Hall. helv. n. 396.

Onobrychis. Riv. t. 2. viciaefolia. Scop. carn. 2. n. 918.

- Onobrychis folio viciae, fructu echinato, major. Bauh.
pin. 350.*
Caput gallinaceum belgarum. - Lob. ic. 2. p. 81.
 β *Onobrychis incana, foliis longioribus. C. B. Burser.
XIX. 138.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 663.
Futter-Hahnenkopf. W.
*Habitat in Sibiriae, Galliae, Angliae, Germaniae, Bo-
hemiae apriis, cretaceis. 24 (v. v.)*

* 109. HEDYSARUM *album*.

- H. caule erecto, foliis pinnatis linearibus subtus sericeis,
alis calyce brevioribus, lomentis pubescentibus mono-
permis aculeato-dentatis. W.*
*Hedysarum album. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung.
Weisser Hahnenkopf. W.*
Habitat in montibus calcareis Banatus. 24 (v. f.)
*Caulis teres striatus erectus pilis canis adpresso-
ctus. Folia pinnata, superiora sessilia. Foliola li-
nearia mucronata subtus sericeis pilis adpresso-
bifida. Racemi longi, floribus subsessilibus. Corolla alba ma-
gnitudine praecedentis, alis calyce brevioribus. Lo-
mentum pubescens monospermum aculeato-dentatum.
Abunde a praecedente et sequenti diversum. W.*

110. HEDYSARUM *saxatile*.

- H. caule adscendente, foliis pinnatis linearibus glabris,
alis calyce brevioribus, lomentis glabris monospermis
aculeatis. W.*
*H. foliis pinnatis, leguminibus monospermis sulcatis
muticis, corollarum alis brevissimis, scapis subradica-
tis. Sp. pl. 1059. Pall. it. 2. p. 107.*
*H. foliis pinnatis, foliolis linearibus, leguminibus mo-
nospermis sulcatis laevibus, petalis inaequalibus. Ger.
prov. 504.*
*Onobrychis saxatilis, foliis viciae angustioribus et longio-
ribus aquilegianis. Tournef. inst. 390. Garid. aix.
Allion. nicaeens. 124.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 665.
Stein-Hahnenkopf. W.
*Habitat in Galloprovincia et in agro Nicaeensi, Sibiria.
24 (v. f.)*

Caules sub terra lignosi. Caulis brevissimus, ut fere nullus; Scapi itaque fere radicati. Spica Onobrychidis, sed albida. Corollae alae calyce vix longiores, s. vexillo carinaque breviores. Folia linearia.

III. HEDYSARUM petraeum.

H. caule erectiusculo, foliis pinnatis oblongo-lanceolatis glabris, alis calyce duplo longioribus, lomentis pubescentibus monospermis dentatis. W.

Hedysarum petraeum. Marßhall ab Bieberstein caucas-taur.

Feien-Hahnenkopf. W.

Habitat in Caucaſi petroſis. 24 (v. f.)

Ab H. saxatili caule elongato, foliolis lanceolatis quandoque oblongis, corollis albis, alis calyce duplo longioribus, lomentorumque figura diverſum. W.

* III. HEDYSARUM confertum.

H. caule procumbente, foliis pinnatis ellipticis pubescentibus, racemo ovato, lomentis monospermis. W.

H. foliis pinnatis, foliolis subtus nervosis ellipticis, racemo conferto, pedunculis folio longioribus, legume monospermo. Desf. atl. 2. p. 178.

Gedrängter Hahnenkopf. W.

Habitat in regno Tunetano locis arenofis prope Sibam. 24

Caules plures ex eodem cespite pubescentes procumbentes quandoque erecti, longi striati. Stipulae ficcae ovatae acutae. Folia pinnata, foliolis pubescentibus ellipticis confertis obtusis, subtus striatis. Pedunculi axillares et terminales folio longiores aphylli striati pubescentes. Flores racemosi densi subſeffiles, racemo ovato. Bracteae parvae subulatae ficcae. Calyx quinquepartitus, laciniis setaceis. Corolla amoena rosea magnitudine H. Onobrychidis. Legumen monospermum. Desf. l. c.

III. HEDYSARUM Caput galli.

H. caule erecto, foliis pinnatis oblongis glabris, alis calyce brevioribus, lomentis monospermis aculeatis cristae dentibus subulatis spinolis. W.

H. foliis pinnatis, leguminibus monospermis cristae den-

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. A a

tibus subulatis, alis brevissimis, caule diffuso. *Sp. pl. 1059. Kniph. cent. 9. n. 44.*
H. foliis pinnatis, leguminibus aculeatis, corollarum alis minimis calyce brevioribus. Ger. prov. 504.
Onobrychis fructu echinato, minor. Bauh. pin. 350. prod. 149. Burf. XIX. 135.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 665.
Gemeiner Hahnenkopf. W.
Habitat in Galloprovincia. 24. (v. v.)
Legumen carina spinis aequalibus, acutis. Radix perennis.

114. HEDYSARUM *Crista galli.*

H. caule erecto, foliis pinnatis oblongis glabris, petalis subaequalibus, lomentis monospermis aculeatis, cristae dentibus lanceolatis denticulatis. W.
H. foliis pinnatis, leguminibus monospermis, aculeatis cristae laciniis lanceolatis denticulatis. Syst. Veg. 563.
Onobrychis f. Caput galli minus, fructu maximo insigniter echinato. Triumph. obf. 65.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 666.
Zerschlitzfrüchtiger Hahnenkopf. W.
Habitat in Europa australi. ① (v. v.)
Petala longitudine aequalia. Legumen carina spinis majoribus, lanceolatis, ferratis. Radix annua.

115. HEDYSARUM *crinitum.*

H. foliis pinnatis, racemis longis, leguminibus inflexis, caule fruticoso. Mant. 102. Burm. ind. t. 53.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 282.
Behaarter Hahnenkopf. W.
Habitat in India orientali. 5

Structura fructificationis adeo similis *H. lagopodioi*-
di et barbato, ac ovum ovo, et singularis, quod quivis
Pedicellus absoluta florescentia inflectatur arcuatus Ca-
lycys laciniis 3 majoribus pilosis reflexis, et sic occultet
Legumen laeve, complicatum intra pedicellos, ut non
conspicantur, perfecte ut in illis; at differt Caule al-
to, erecto, fruticoso, fereque arboreo, Foliisque pinna-
tis; foliolis 5, oblongis.

* 116. HEDYSARUM *comosum*.

H. foliis pinnatis lanceolatis, racemis elongatis cylindricis, caule fruticoso. Vahl symb. 2. p. 84.

Schopfartiger Hahnenkopf. W.

Habitat in India orientali. ḥ

Rami angulati villosi. Folia pinnata cum impartijuga. Foliola linear-lanceolata dodrantalia vel ultra utrinque glabra subaequalia venosa. Petiolus longitudine foliorum villosus. Petioluli brevissimi hirsuti. Stipulae ovatae acuminatae nervosae. Duae aliae subulatae ad singulum par foliorum petiolulo longiores. Racemus terminalis spithameus erectus terminatus bracteis plurimis lanceolatis attenuatis flore quadruplo longioribus in formam comae. Flores brevissime pedicellati conferti. Bracteae insimae ovatae acuminatae persistentes nervosae villosae, superiores deciduae exceptae terminali. Calyces hirsutissimi lacinis setaceis. An ab *H. crinito* satis distinctum, differt modo: foliis angustioribus longioribus, racemo tenuiori terminato bracteis in formam comae. Legmina in meo desiderantur ideoque incertus sum, num idem nec ne, praesertim calycis laciniae in meo sunt rectae nec incurvatae. Vahl. l. c.

117. HEDYSARUM *cornutum*.

H. foliis pinnatis linearibus, leguminibus monospermis laevibus, caule fruticoso, pedunculis persistenti-spinosis. Sp. pl. 1060. Pall. it. 1. p. 442.

Onocrychis orientalis frutescens spinosa, tragacanthae facie. Tournef. cor. 26. it. 2. p. 108. t. 108.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 283.

Gehörnter Hahnenkopf. W.

Habitat in Oriente. D. Gerard. ḥ (v. f.)

Caulis fruticosus, humilis, durus. Stipulae membranaceae, parvae, acuminatae. Folia pinnata: foliolis 7 f. 9, lanceolato-linearibus. Pedunculi axillares, solitarii, simplices, mucronati, persistentes in spinas teretes longitudine foliorum, a ramo divaricatas. Flores 3 f. 4, alterni, pedicellati, infra apicem pedunculi siti.

Figura refert Onobrychiden 2 Cluf. hist. 2. p. 239.

Hedysarum viscidum Sp. pl. 1054. ad *Glycines* genus pertinet, hoc cum aliis novis hujus generis speciebus in appendice describam. W.

1376. INDIGOFERA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1205.

Cal. patens. *Corollae* carina utrinque calcari subulato patulo! *Legumen* lineare.

† *Foliis simplicibus.*

* 1. INDIGOFERA *filifolia*.

I. foliis simplicibus filiformibus, floribus racemosis. Thnnb. prod. 132.

Fadenblättriger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

2. INDIGOFERA *linifolia*.

I. foliis simplicibus linearibus canis, leguminibus globosis. Vahl. symb. I. p. 55. Retz. obs. 4. p. 29. et 6. p. 33. t. 2. *

I. (*polygonoides*) caule herbaceo depresso sericeo, foliis alternis lanceolatis sericeis, stipulis minimis deciduis, floribus axillaribus racemosis, leguminibus globosis glabris monospermis. Wendl. obs. bot. p. 55.

Hedysarum (linifolium) foliis simplicibus linearibus canis, caule prostrato, leguminibus globosis. Lin. suppl. 331.

Flachsblättriger Indigo. W.

Habitat in Iudia orientali. ○ (v. f.)

Caules prostrati virgati incani. Folia alterna petiolata linearia acuta incana. Racemi brevissimi axillares. Legumina parva globosa nivea stylo permanente. W.

* 3. INDIGOFERA *simplificifolia*.

I. foliis simplicibus linearibus subnudis, leguminibus linearibus teretibus. W.

I. foliis simplicibus linearibus subnudis, racemis paucifloris foliis brevioribus. Lamarck encycl. 3. p. 241.

Einfachblättriger Indigo. W.

Habitat in Sierra Leona.

Caules vel remi simplices forte frutescentes, graciles foliosi, apicem versus striati pedates et ultra. Folia alterna linearia integerrima erecta subsessilia sesquipollicaria et sesqui lineam lata. Pedunculi axillares brevissimi floribus tribus vel quatuor parvis brevissime pedicellatis instructi. Legumina linearia teretia mucronata stricta erecta, fere glabra, pollicaria. Lamarck. l. c.

4. INDIGOFERA sericea.

I. foliis simplicibus lanceolatis sericeis, spicis sessilibus, caule fruticoso. *Mant. 271.*

I. foliis simplicibus lanceolatis sericeis, spicis terminalibus. *Thunb. prod. 132.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 284.

Seidenartiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. Spei campis arenosis, montosis, humeribus. t

Caules fruticosi, determinate ramosi s. proliferi, filiformes, a cicatriculis scabri, ramulis foliosis. Folia simplicia, conferta, elliptico-lanceolata, brevia, acuta, albo-sericea, pubescentia. Variant margine nudo colorato. Spica terminalis, sessilis, ovata, villosa, intersinuata Bracteis longitudine calycum. Corollae carina pedalis reliquis brevior, atro-purpurascens, longius unguiculata, utrinque calcarea. H. U.

Adeo similis fruticulo sub Lipari sericea notato. ut invitus separem, quamvis illa habet gibbum loco calcaris, at vix sufficientem.

*5. INDIGOFERA oblongifolia.

I. foliis simplicibus oblongis sericeis, racemis axillaribus, caule fruticoso. *Vahl symb. 1. p. 55.*

I. foliis simplicibus petiolatis ovali-oblongis, caule fruticoso inermi diffuso, florum racemis axillaribus. *Forsk. descr. 137.*

Länglichblättriger Indigo. W.

Habitat in Arabia felici. t

Frutex ramis tomentoso-sericeis. Folia simplicia subsessilia oblonga tomentoso-sericea remota bilineata.

ria. Rudimenta ramulorum in axillis. Stipulae minutaæ setaceæ. Racemi axillares folio triplo longiores. Flores numerosi. Calyx sericeo-tomentosus. Vexillum tenuissime villosum. Vahl. l. c.

6. INDIGOFERA *depressa*.

I. foliis simplicibus ovatis sericeis, ramis diversis. Thunb. prod. 132.

Ulex (capensis) foliis solitariis obtusis, spinis simplicibus terminalibus. Sp. pl. 1046. Roy. lugdb. 376. Mill. dict. n. 2.

Genista spartium bacciferum ericae foliis africanum. Pluck. alm. 166. t. 185. f. 6. *mala.* Petiv. gaz. 9. t. 83. f. 9.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 229.

Niedergedrückter Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

7. INDIGOFERA *ovata*.

I. foliis simplicibus ovatis villosis, floribus racemosis. Thunb. prod. 132.

I. herbacea, foliis simplicibus ovatis. Lin. suppl. 335.

Eyförmiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*8. INDIGOFERA *echinata*. W.

I. foliis simplicibus obovatis glabris, leguminibus falcatis echinatis. W.

Indigofera prostrata. Roxburgh.

Stalichter Indigo. W.

Habitat in pratis Tranquebariae. ☉ (v. f.)

Caules herbacei pedales vel sesquipedales ramosi prostrati ancipes vel tetragoni glabri. Folia alterna vix pollicaria brevissime petiolata, subrotundo-obovata glabra. Stipulae lanceolato-subulatae. Racemi axillares pollicares vel sesquipolllicares. Flores parvi. Legumina parva oblongo-falcata mucronata aculeis longis obsita. W.

†† *Foliis ternatis.*

9. INDIGOFERA *trifoliata*.

- I. *foliis ternatis, floribus sessilibus lateralibus.* *Syst. veg.* 563.
 I. *leguminibus subsessilibus compressis pendulis, foliis ternatis lanceolatis.* *Amoen. acad.* 4. p. 327.* *Spec. pl. 2. p. 1061.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 667.

Gedreyter Indigo. W.

Habitat in India.

Legumina linearia, reflexa, tetragona lateribus oppositis latioribus.

10. INDIGOFERA *psoraloides*.

- I. *foliis ternatis lanceolatis subtus sericeis, racemis folio longioribus, leguminibus pendulis.* W.
 I. *foliis ternatis lanceolatis, racemis longissimis, leguminibus cernuis.* *Syst. Nat.* 469.
 I. *foliis ternatis, foliolis lanceolatis sericeis, racemis terminalibus elongatis.* *Thunb. prod.* 132.
 I. (*racemosa*) *leguminibus cernuis, racemis elongatis, foliis ternatis.* *Sp. pl. 2. p. 1062. Amoen. acad. 6. afr. 37.**

Cytisus (psoraloides) spicis pubescentibus, ramis angustatis, foliis lanceolatis, caule suffruticoso. *Sp. 2. p. 1043. Amoen. acad. 6. afr. 33.**

Cytisus africanus. *Riv. tetr. 71. f. 135.*

Trifolium aethiopicum ex aliis spicatum. *Pluk. phyt. 320. f. 3.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 667.

Psoralienartiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. t̄ (v. f.)

Caulis perennans, angulatus a petiolis decurrentibus costis 3, subscaber. Pedunculus angulatus, foliis longior racemo multifloro. Pedicelli brevissimi. Bracteae propriae caducae. Calycis dentes superiores magis quam in aliis divaricati. Corollae rubrae. Alae horizontales, conniventem margine superiore. Carina utrinque in medio, dente subulato, concavo, reflexo. Stamina diadelpha. Antherae luteae. Germen cana-

liculatum. Stylus *purpureus.* Stigma *obtusum.* Semina *multa.*

* **11. INDIGOFE RA *candicans.***

I. foliis ternatis linearis lanceolatis subtus sericeis, racemis folio longioribus paucifloris, leguminibus rectis. W.

I. foliis ternatis lanceolato-linearibus subtus sericeis, spicis pedunculatis paucifloris, leguminibus cylindraceis rectis. Ait. Kew. 3. p. 67.

Weißlicher Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. f.)

Differt a praecedente: foliis angustioribus utrinque albidis, stipulis multo minoribus subulatis patentibus, racemis paucifloris, floribus subfessilibus majoribus, leguminibus rectangule patentibus nec pendulis. W.

* **12. INDIGOFE RA *amoena.***

I. foliis ternatis oblongis subtus pubescentibus, racemis folio longioribus, leguminibus reflexis adpresso. W.

I. (*amoena*) foliis ternatis, foliolis ovalibus pilosiusculis recurvato-mucronatis, racemis longissimis, calycibus laxis, caule frutescente. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 57. t. 234.*

I. (*amoena*) foliis ternatis ovalibus pilosiusculis, ramis teretibus, spicis pedunculatis, stipulis setaceis, calycibus laxis, caule frutescente. Ait. Kew. 3. p. 68.

I. (*heterophylla*) foliis ternatis, foliolis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, floribus racemosis. Thunb. prod. 133?

Hübscher Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5

Rami juniores angulati. Racemi longissimi multiflori. Calyces colorati patuli quinquedentati, dentibus tribus inferioribus longioribus. Legumina brevia reflexa pedunculo communi adpressa. W.

* **13. INDIGOFE RA *incana.***

I. foliis ternatis obovatis subtus sericeis, racemo terminali elongato, caule fruticoso decumbente. W.

I. foliis ternatis sericeis, foliolis ovatis acutis, racemis terminalibus, caule decumbente. Thunb. prod. 132.
Grauer Indig. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

Racemi terminales elongati solitarii, pedunculis geminis ternisve distantibus. W.

* 14. INDIGOFERA *cinerea*. W.

I. foliis ternatis oblongo-lanceolatis sericeis, racemis folia aequantibus caule erecto virgato cinereo. W.
Aschfarbener Indigo. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caulis erectus ramosus sericeus cinereus, ramis ob-solite angulatis. Folia ternata petiolata. Foliola ob-longo-lanceolata mucronata superne canescens sub-tus sericeo-cana. Racemi longitudine fere foliorum rarius longiores. Flores parvi. Legumina sericea linearia mucronata rectangule patentia. W.

* 15. INDIGOFERA *spinosa*.

I. fruticosa foliis ternatis obovatis, pedunculis spinescen-tibus, Vahl symb. I. p. 55.

I. leguminibus binatis teretibus scabris, caule fruticoso diffuso spinoso. Forsh. desc. 137.*

Dorniger Indigo. W.

Habitat in Arabia felici et India orientali. ৎ

Frutex cortice cinereo ramosissimus. Rami digita-ti attenuati apice truncati aphylli spinosissimi e pe-dunculis persistentibus spinescentes. Ramuli foliiferi sparsi in ramis senescentibus breves. Folia ternata brevissime petiolata. Foliola obovata sessilia cana ae-qualia minuta. Stipulae acerosae minutae. peduncu-li spinescentes unguiculares ex omnibus fere axillis persistentes biflori vel triflori folio duplo longiores. Ca-lyx villosus quinquesfidus. Corollae vexillum extus ca-nescens. Legumina teretiuscula villosa. Vahl l. c.

16. INDIGOFERA *procumbens*.

I. foliis ternatis obovatis subtilis strigoso pubescentibus, ramis folio longioribus, leguminibus cernuis, caule herbaco prostrato. W.

I. foliis ternatis obovatis, caule herbaceo prostrato, spicis pedunculatis. *Mant.* 271.

I. foliis ternatis, foliolis obovatis glabris, racemis axillaribus, caule flexuoso decumbente.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 668.

Liegender Indigo. W.

Habitat in Cap. b. spei montibus. 24 (v. f.)

Caules prostrati, herbacei, pedales, subangulati, nudiusculi. Folia ternata, alterna, petiolata, remota. Foliola obovata, aequalia, submucronata, supra vix pubescentia; subtus magis pubescentia pallidiora. Petiolus patens, foliorum longitudine. Stipulae subulatae, patulæ, petiolis breviores. Spica axillaris, lateralis, pedunculata, oblonga absque bracteis. Pedunculus foliis multo longior. Flores atropurpurei.

*17. INDIGOFERA prostrata. W.

I. foliis ternatis obovatis, racemis petiolo brevioribus, leguminibus pendulis, caule herbaceo prostrato. W. Gestreckter Indigo. W.

Habitat in Indiae orientalis cespitosis. (v. f.)

Caules filiformes prostrati subangulati pilis minutissimis adpresso obfitti. Folia ternata petiolata. Foliola obovata subtus albicanibus adpresso pilis tecta. Racemi 5-6 flori petiolo breviores. Legumina filiformia parva ut flores, pendula. W.

18. INDIGOFERA farmentosa.

I. foliis ternatis, foliolis ovatis mucronatis sessilibus, pedunculis axillaribus subbifloris, ramis filiformibus patulis. *Thunb. prod.* 132.

I. prostrata filiformis, foliis ternatis ovatis subsessilibus, pedunculis axillaribus bifloris. *Lin. suppl.* 334.

Ausgebreiteter Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

19. INDIGOFERA denudata.

I. foliis ternatis obcordatis glabris, racemis folio longioribus, leguminibus pendulis, caule erecto fraticoso. W.

I. fruticosa erecta, foliis ternatis ovatis glabris, racemis

pedunculatis folio longioribus. *Lin. suppl.* 334. *Jacq.*
hort. Schoenb. 2. p. 57. t. 233.*

I. foliis ternatis, foliolis ovatis glabris, racemis axillari-
bus folio longioribus, caule fruticoso erecto. *Thunb.*
prod. 132.

Nacktblättriger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*20. INDIGOFE RA *erecta*.

I. foliis ternatis, foliolis ovatis mucronatis, racemo axilla-
ri foliis longiore, caule erectiusculo herbaceo. *Thunb.*
prod. 133.

I. (*microphylla*) foliis ternatis obovatis brevissime pe-
tiolatis, pedunculis longis filiformibus, leguminibus
pendulis. *Lamarck. encycl.* 3. p. 240?

Aufrechter Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

21. INDIGOFE RA *mexicana*.

I. foliis ternatis, panicula ramosa in spicas, caule fruti-
coso. *Lin. suppl.* 335.

Mexicanischer Indigo. W.

Habitat in Nova Granada. ♂ *D. Mutis.*

Frutex ramis rufescentibus pubescentibus. Folia re-
mota ternata petiolata. Foliola ovata nuda subaequa-
lia subsessilia. Stipulae ovatae minutae. Panicula
terminalis e spicis octo s. novem pedunculatis. W.

*22. INDIGOFE RA *glandulosa*.

I. foliis ternatis oblongo-ovata subtus pilosis glandu-
loso-punctatis, racemis petiolo brevioribus, legumini-
bus muricatis. W.

Indigofera glandulosa. *Roxburgh.*

Drüfiger Indigo. W.

Habitat in India orientali. ☽ (v. f.)

Caulis herbaceus erectus pedalis et ultra ramosus,
ramis angulatis divaricatis pilosiusculis. Folia terma-
ta petiolata. Foliola oblongo-ovata obtusa superne
glabra, inferne pilosa canescens et glandulis nigri-
cantibus conspersa. Stipulae subulatae. Racemi par-
vi subcapitati petiolo multo breviores. Legumina mu-
ricata. W.

23. INDIGOFERA trita.

I. foliis ternatis ovatis acutis, racemis brevibus, caule erecto. *Lin. suppl.* 335.

Unansehnlicher Indigo. W.

Habitat in India orientali.

Caulis erectus viridis facie I. Anil, inferne ramosus. Folia ternata petiolata ovata lancicolata acuta viridia. Racemi laterales foliis breviores erecti rubicundi facie J. Anil.

*24. INDIGOFERA arcuata. W.

I. foliis ternatis ellipticis mucronatis subtus pubescentibus, racemis petiolum subaequantibus, leguminibus reflexis arcuatis tetragonis. W.

Krummfrüchtiger Indigo. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Rami angulati cano-pubescentes. Folia ternata petiolata. Foliola elliptica obtusa mucronata juniora utrinque, adulta subtus tautum tenui pube canescens. Stipulae filiformi-subulatae. Racemi longitudine petiolorum saepius tamen breviores. Flores parvus cernui. Legumina filiformi-tetragona canescens reflexa apice adscendentia. W.

† † † *Foliis quinatis.*

25. INDIGOFERA coriacea.

I. foliis quinatis obovatis mucronatis pilosis, stipulis subulatis, leguminibus rectis glabris. *Aiton. Kew.* 3. p. 68.

I (*mauritanica*) foliis quinatis subtus argenteis, floribus racemosis, caule decumbente. *Thunb. prod.* 133.

Lotus (*mauritanicus*) leguminibus racemosis, foliolis obovatis villosis, caule fruticoso erecto. *Sp. pl.* 1091.

Lotus (*fruticosus*) leguminibus racemosis brevibus, foliolis quinatis obovatis mucronatis villosis, stipulis subulatis, caule fruticoso. *Berg. cap.* 226.*

Ononis (*mauritanica*) fruticosa, foliis quinatis obovatis mucronatis subtus sericeis, stipulis filiformibus, pendunculis racemosis. *Mant.* 267.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 526.

Lederartiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

Folia quinata praeter stipulas minutas. Foliola obovata mucrone reflexo.

26. INDIGOFERA filiformis.

I. foliis quinatis, foliolis oblongis villosis, racemis terminalibus, ramis erectis filiformibus. *Thunb. prod. 133.*

I. erecta, foliis quinatis oblongis villosis, floribus spicatis pedunculatis, pedunculis ramisque filiformibus.

Lin. suppl. 334.

Fadenförmiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

27. INDIGOFERA digitata.

I. foliis digitato-multifidis, racemis terminalibus, caule suffruticoso. *Thunb. prod. 133.*

I. fruticosa, foliis digitatis, racemis pedunculatis. *Lin. suppl. 335.*

Gefingerter Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ

† † † † *Foliis pinnatis.*

28. INDIGOFERA enneaphylla.

I. foliis pinnatis cuneatis septenis, racemis folia aequantibus, leguminibus tetragonis dispermis, caule procumbente. W.

I. foliis pinnatis cuneatis septenis, caulis prostratis, spicis lateralibus. *Mant. 272.**

Hedysarum prostratum. *Mant. I. p. 102.* Burm. ind. 168. t. 55. f. 1.*

Colutea enneaphyllos lotoides ind. orient. siliquis congregatis. *Plnek. alm. 113. t. 166. f. 2.*

Colutea enneaphyllos siliquosa ind. orient. siliquis et foliis aversa parte pubescentibus. *Pluk. alm. 112. t. 166. f. 3.*

Colutea minima dispermos. *Pluk. phyt. t. 165. f. 4.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 669.

Kleiner Indigo. W.

Habitat in India orientali. ⊙ (v. v.)

Herba depressa ad terram. Caules plures, teretes, laeves, palmares: Ramis inferis depresso. Folia pinnata, depressa, patentia; Foliola 7, alterna, cuneata obtusiflora, canaliculata, laetitia. Spicae axillares, sessiles, subrotundae. Calix subquinquepartitus, lacinias lanceolato-subulatis. Corolla papilionacea, saturate purpurea, vexilli dorso pallidior; carina corniculis recurvis. Stamina diadelpha, 9 connata in cylindrum angustum. Mant. 2. p. 571.

Stipulae membranaceae, patulae, bifidae. Folia minuta, pinnata: Foliolis 5 f. 7, cuneatis, saepe retusis, supra glabris, subtus pilis imbricatis tomentosis cinereis. Legumina ovato-cylindrica, laetitia, aequalia, pistillo recto mucronata. Semina duo. Mant. I. p. 102.

29. INDIGOFERA pentaphylla.

I. foliis pinnatis, ovalibus quinis, caulis prostratis, pedunculis bifloris. Syst. Veg. 564.

Houttuin Lin. Pfl. Syst. 8. p. 670.

Fünfblättriger Indigo. W.

Habitat — — — — —

Simillima I. enneaphyllae. Herba depressa, divaricatissima. Foliola quina. Flores rubri. Petioli biflori. Planta duplo major.

*30. INDIGOFERA semitrijuga.

I. foliis pinnatis obcordatis quinis, leguminibus subspicatis, pendulis torulosis, caule prostrat osuffruticoso. Vahl symb. I. p. 56.*

I. (*semitrijuga*) foliis semitrijugis obcordatis subcomplicatis tomentosis. Forst. descr. 137.

I. (*argentea*) leguminibus subsessilibus torulosis, foliis ternis quinisque orbiculatis. Burm. ind. 171.

Arabischer Indigo. W.

Habitat in Arabia, et India orientali. ፩

Fruticulus prostratus ramosus, Rami teretes simplices villoso-incaui uti tota planta. Folia pinnata quinata. Foliola sessilia obcordata mucronata, impar reliquis majus, Stipulae lineares. Spicae axillares foliis longiores. Flores remotiusculi plerumque 11-13. Legumina oblonga pendula parva torulosa disperma. Vahl l. c.

*31. INDIGOFE RA *fragrans.*

I. foliis quinato-pinnatis, foliolis ovatis pilosis extimo majore, leguminibus tetragonis. *Retz. obs. 4. p. 29.*
Riechender Indigo. W.

Habitat in India orientali. (v. f.)

Caules teretes subpilos. Folia pinnata quinata utrinque pilosa. Foliola paria ovata; Folium impar obovatum majus. Stipulae lanceolatae acuminatae hirtae. Pedunculi folio longiores axillares 3-5-flori. Flores rubri, calycibus albido-pilos. Legumina linearia tetragona. *Retz l. c.*

32. INDIGOFE RA *glabra.*

I. foliis pinnatis ternatisque obovatis, racemis brevisimis, leguminibus horizontalibus teretibus. *Syst. Veg. 564.*

I. leguminibus horizontalibus teretibus, foliis pinnatis ternatisque. *Fl. zeyl. 274. Amoen. acad. I. p. 408. Spec. pl. 2. p. 1062.*

Colutea siliquosa glabra, ternis quinisve foliis, made raspataria, semine rubello. *Pluk. alm. 113. t. 166. f. 1.*

Nir pulli. *Rheed. mal. 9. t. 67. Raj. suppl. 470.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 670.

Glatter Indigo. W.

Habitat in India. ○

33. INDIGOFE RA *cytisoides.*

I. foliis pinnatis quinis septenisque oblongis utrinque angustatis, racemis folio longioribus, caule fruticoso. W.

I. foliis quinato-pinnatis ternatisque, racemis axillari bus, caule fruticoso. *Syst. Veg. 564.*

I. caule fruticoso erecto, foliis pinnatis subtrijugis, foliolis mucronatis asperiusculis, racemis axillaribus folio duplo longioribus. *Jacq. hort. schoenb. 2. p. 58. t. 235.**

I. foliis pinnatis glabris, pinnis obovatis, racemis axillaribus, caule fruticoso, ramis tomentosis. *Thunb. prod. 133.*

Floralea cytisoides. Spec. 2. p. 1076.

*Lotus africana frutescens, flore spicato rubicundo. Comm.
hort. 2. p. 167. p. 84.*

Genista capensis spinosa, ligustri folio, pentaphyllos, flaribus spicatis rubris. Plnk. phyt. 186. f. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 285.

Bohnenbaumartiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h

Frutex ramis angulatis. Folia infima ternata; superiore quinato-pinnata: foliolis oblongis, incanis, mucronatis, subaequalibus. Stipulae subulatae. Setulae 2 ad foliorum exortum. Racemi axillares, foliis longiores: bracteis ovatis, mucronatis, deciduis. Calyx corolla paulo brevior. Stamina diadelpha. Vexillum erectum. Legumen subcylindricum, isthmis semina distinguentibus. Spec. pl. 2. p. 1076.

34. INDIGOFERA frutescens.

I. foliis pinnatis quinis septenisque ellipticis subtus pubescentibus, racemis folio brevioribus, caule fruticoso. W.

I. fruticosa erecta, foliis pinnatis ovatis glabris, racemis axillaribus pedunculatis. *Lin. suppl. 334.*

I. foliis pinnatis glabris, pinnis obovatis, racemis axillaribus, caule fruticoso, ramis glabris. *Thunb. prod. 133.*

Strauchartiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h (v. f.)

Rami et superficies inferior foliorum pilis adpresso-sunt tecti. Folia sunt ternata et pinnata. Foliola elliptica interdum obovata. W.

35. INDIGOFERA stricta.

I. foliis pinnatis novenisque oblongis subtus pubescentibus, racemis subquinquefloris subfessilibus, caule fruticoso stricto. W.

I. fruticosa erecta, foliis pinnatis glabris oblongis, racemis axillaribus vix pedunculatis. *Lin. suppl. 334.*

I. fruticosa erecta, foliis pinnatis fessilibus, foliolis oblongis subtus villosis, racemis vix pedunculatis terminalibus, folio terminali suffultis. *Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 58. t. 236.**

I. foliis pinnatis glabris, pinnis sublanceolatis, racemis axillaribus, caule fruticoso stricto glabro. Thunb. prod. 133.

Steifästiger Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei. t̄

Racemi bi-vel quinque-flori brevissime pedunculati. Ramuli et Leguminis hirta. W.

*36. INDIGOERA hendecaphylla.

I. foliis pinnatis undenis oblongis glabris, racemis spicatis folio brevioribus, leguminibus tetragonis reflexis, caule herbaceo procumbente. W.

I. foliis pinnatis, floribus spicatis, leguminibus tetragonis pendulis villosis, caulis prostratis. Jacq. ic. rar. 3. t. 570. Collect. 2. p. 358.

Elfbätztriger Indigo. W.

Habitat in Guinea. ⊙

*37. INDIGOERA lateritia. W.

I. foliis pinnatis ternatisque obovatis viscoso-hirsutis, racemis folia subaequantibus, leguminibus tetragonis hirsutis. W.

Indigofera hirsuta. Jacq. ic. rar. 3 t. 569. Collect. 2. p. 359. *

Ziegeleiarbiger Indigo. W.

Habitat in Guinea. ⊙

Tota planta piloso-viscosa. Caulis erectus pedalis. Folia inferiora ternata superiora quinato pinnata. Foliola obovata. Stipulae lanceolatae. Racemi longitudine fere foliorum. Calyces hirti. Corollae lateritiae. Legumina tetragona hirta. I. hirsuta differt ab hac: Foliis inferioribus quinato-pinnatis, superioribus quadri et quinquejugis, Foliolis subtus albican-tibus, Stipulis filiformibus, Racemis duplo longioribus, Calycibus albo lanatis, denique Leguminibus villosis. I. hirsuta canescit, I. lateritia vero, licet pilosa sit, viridibus gaudet foliis. W.

38. INDIGOERA hirsuta.

I. foliis pinnatis quadri-vel quinquejugis subtus canis, racemis foliorum longitudine, spicatis, leguminibus tetragonis villosis. W.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

B b

- I. foliis pinnatis hirsutis, caule erecto, floribus spicatis, leguminibus pendulis lanatis. *Syst. Veg.* 504.
 I. indica. *Mill. dict.* n. 4.
 I. leguminibus pendulis lanatis tetragonis. *Fl. zeyl.* 272.*
Amoen. acad. 1. p. 408.
 Astragalus spicatus, siliquis pendulis hirsutis, foliis fericeis. *Burm. zeyl.* 37. t. 14. bona.
 Kattu-tagera. *Rheed. mal.* 9. p. 55. t. 30. mala.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 285.
 Weißhaariger Indigo. W.
Habitat in India orientali. Ȑ (v. f.)
 Stipulae setaceae, pollicares, Spicae valde hirsutae.
 Petala caduca.

*39. INDIGOFERA *spicata*.

- I. foliis pinnatis obovatis, floribus spicatis, leguminibus teretibus torulosis pendulis, caule decumbente. *Vahl symb.* 1. p. 56.
 I. foliolis alternis quadrijugis, leguminibus rectis pendulis subspicatis. *Forsk. descr.* 138.
 Aehrenträgender Indigo. W.
Habitat in Arabia felici.
 Caulis herbaceus decumbens villosus. Folia pinnata. Foliola 9 obovata subpetiolata, extima majora villosa. Stipulae lanceolato subulatae aridae. Spicae foliis longiores, fructiferae triplo majores. Legumina teretia pendula torulosa villosa. I. *hirsuta* differt: Caulis erecto fruticoso, Stipulis setaceis, Leguminibus hirsutissimis tetragonis. *Vahl l. c.*

40. INDIGOFERA *angustifolia*.

- I. foliis pinnatis, pinnis linearibus, racemis axillaribus, caule fruticoso tomentoso. *Thunb. prod.* 133.
 I. foliis pinnatis linearibus, racemis elongatis, caule fruticoso. *Mant.* 272.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 286.
 Schmalblättriger Indigo. W.
Habitat ad Cap. b. Spei, locis argillofis. Ȑ (v. f.)
 Caulis suffrutescens, laeviusculus: Ramis alternis, longitudine caulis. Folia pinnata, alterna, subsessilia: Foliola 9 f. II, aequalia, linearia, acuta, subpubescentia, margine revoluta. Stipulae acerosae, minu-

tæc. Racemi axillares, laterales, foliis multo longiores, Calycibus alternis, in canis. Corolla extus purpurascens cinerascens; Carina calcarata. Stamina angusta, ut in congeneribus.

*41. INDIGOERA *capillaris.*

I. foliis pinnatis glabris, pinnis filiformibus, racemis terminalibus, caule suffruticoso. *Thunb. prod. 133.*
Haarblättriger Indigo. W.
Habitat ad Cap. b. spei. 2

*42. INDIGOERA *dendroides.*

I. foliis pinnatis glabris multijugis lanceolatis, racemis folio longioribus filiformibus, vexillis strigoso-pilosis, leguminibus erectis. W.
I. (*dendroides*) foliis pinnatis glabris, racemis axillari-bus, leguminibus linearibus glabris, caule erecto annuo. *Jacq. ic. rar. 3. t. 571. Collect. 2. p. 357.**
Zwerg-Indigo. W.

Habitat in Guinea. ♂ (v. f.)

Planta annua semipedalis arbustulam referens, primo intuitu glabra, sed lentis ope adspelta pilis adpressis sparsis in caule foliis leguminibusque obsita. Folia pinnata cum impari 7 et 10 juga. Foliola unguicularia linearis-elliptica. Stipulae capillares breves. Racemi filiformes. Corolla rosea. Vexillum externe pilis adpressis copiosis tectum. W.

*43. INDIGOERA *australis.*

I. foliis pinnatis glabris multijugis oblongis, racemis folio brevioribus, -vexillis glabris, leguminibus patentibus. W.

Südlicher Indigo. W.

Habitat in Nova Hollandia? ♂ (v. v.)

Sub hoc nomine vidi Fruticem parvum, ramis teretibus flexuosis subpubescentibus. Folia pinnata cum impari 5 vel 7 juga. Foliola foliorum inferiorum elliptica unguicularia, superiorum vero oblonga semipollucaria, obtusa. Stipulae breves capillares. Racemi bipallidares foliis breviores. Corolla rosea. Legamina glabra sesquuncialia teretinscula patentissima. W.

*44. INDIGOFERA *punctata*. +

I. foliis pinnatis sericeis, pinnis oblongis, racemis axillaribus, caule herbaceo tomentoso. *Thunb. prod. 133.*
Punctirter Indigo. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*45. INDIGOFERA *viscosa*.

I. foliis pinnatis sexjugis obovatis strigoso-pubescentibus, racemis folio brevioribus, leguminibus pendulis, caule erecto piloso viscoso. W.

I. (*viscosa*) caule ramisque pubescenti-viscosis, foliis pinnatis subsexjugis, leguminibus rectis patentibus. *Lamarch encycl. 3. p. 237.*

I. (*graveolens*) pubescenti-viscosa, foliolis obovatis, racemis axillaribus, leguminibus teretiifloris pendulis. *Schrad. et Wendl. Jert. hanov. p. 20. t. 12.**

Klebriger Indigo. W.

Habitat in India orientali. ☽ (v. f.)

Caulis et Petioli pilis glandulosis patentibus dense obesi. Foliola obovata pilis adpresso praesertim subtus tecta. Stipulae longe filiformes patentes. Racemi in caule foliis breviores, in ramulis vero longiores. W.

*46. INDIGOFERA *inquinans*. W.

I. foliis pinnatis quadrijugis oblongis strigoso-canis, racemis folio brevioribus, leguminibus pendulis, caule piloso-viscoso. W.

Beschmuzender Indigo. W.

Habitat in insula St. Dominici. ☽ (v. f.)

Caulis erectus ramosus virgatus pilis glandulosis patentibus viscosis ex toto tectas. Folia pinnata cum impari 4 rarius 5-juga. Foliola elliptico-oblonga cana utrinque pilis atbis adpresso obsoita. Stipulae capillares breves caducae. Racemi pauciflori foliis breviores. Legumina teretiiflora pendula pilosa. Valde affinis I. *viscosa*, tameq; diversa: foliis quadri-rarius quinquejugis, foliolis duplo minoribus elliptico-oblongis canis, stipulis brevioribus caducis. W.

47. INDIGOFERA *Anil*.

I. foliis pinnatis oblongis trijugis, racemis folio brevioribus, leguminibus falcatis, caule fruticoso. W.

I. foliis pinnatis lanceolatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Mant.* 272.

I. foliis pinnatis, foliolis ellipticis acutiusculis, leguminibus declinatis recurvis, caule erecto. *Mant.* 2. p. 272.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 286.

Sichelfrüchtiger Indigo W.

Habitat in India orientali. h (v. f.)

Habitus et facies I. tinctoriae Carlis suffruticosus.
Folia pinnata, palmaria: foliola oblonga, obtusiuscula (recentiora acutiuscula), supra nuda, subtus incana, omnia aequalia. Racemi laterales, subspicati, foliis breviores. Legumina declinata, recurvata, teretiuscula, polysperma, futuro utraque gibboiore (*dehiscentia futura superiore recedente*), mucronata.

48. INDIGOFERA *tinctoria*.

I. foliis pinnatis oblongis glabris quadrijugis, racemis folio brevioribus, leguminibus teretibus subarcuatis, caule suffruticoso. W.

I. foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Syst. veg.* 564.

I. leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. *Fl. zeyl.* 273. *Amoen. acad.* I. p. 408. *Hort. upf.* 208. *Nat. med.* 174. *Mill. dict. n.* I. et. *ict.* 34. *Regn. bot. Blackw.* t. 596.

I. (*Hoover*) foliis semisexjugis auneatis, racemis folio brevioribus, leguminibus rectis teretibus villosis. *Forst. descr.* 137.

Indigofera foliis nudis. *Hort. cliff.* 487.

Itatis indica, foliis rosmarini, glasti affinis. *Bauh. pin.* 113.

Indicum. *Rumph. amb.* 5. p. 220. t. 80.

Anil, f. Nil indorum color. *Bauh. hist.* 2. n. 945.

Ameri. *Rheed. mal.* I. p. 101. t. 54.

Colutea indica humilis, ex qua Indigo, folio viridi. *Burm. zeyl.* 69.

Anil, f. Indigo americana. *March. paris.* 1718.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 287.

Gemeiner Indigo. W.

Habitat in India orientali. h (v. v.)

Dissert a praecedente: Foliolis obovatis, obtusis, utrinque nudis; Leguminibus teretibus, rectis, etiam

futura gibbosiore, subtorulosa; Racemis laxis, minutis.

49. INDIGOFERA *disperma*.

I. foliis pinnatis ovalibus, racemis elongatis, leguminibus dispermis. *Syst. Nat.* 3. p. 232.

I. Icupo infirmo, foliorum pinnis oblongis pillide virentibus glabris, pedunculis spicat longissimis, floribus laxe dispositis, leguminibus compressis brevibus subasperis dispermis. *Trew. ehret.* 24. t. 55.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 290.

Zweysaamiger Indigo. W.

Habitat in India.

Similis praecedenti, sed Racemi foliis compositis longiores. Legumina disperma.

50. INDIGOFERA *argentea*.

I. foliis simplicibus ternatis pinnatisque sericeis, leguminibus torulosis pendulis. *Vahl symb.* 1. p. 56.

I. foliis pinnatis tomentosis obovatis, caule fruticoso. *Mant.* 27.

I. foliis pinnatis ternatisque obovatis sericeis glaucis, leguminibus nodosis. *l'Herit. stirp. nov.* p. 165 t. 79.*

I. (*articulata*) leguminibus pendulis articulatis, foliis simplicibus ternatis pinnatis incanis. *Guoan ilust.* 49.*

I. (*glaucia*) foliis pinnatis subbijugis argenteo-glaucis, caule incano, leguminibus articulatis. *Lamarek encycl.* 3. p. 236.*

Indigofera tinctoria. Forst. descr. 138.

Anil leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus, caule fruticoso. *Mill. dict.* 1.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 290.

Silberfarbiger Indigo. W.

Habitat in Aegypto, Arabia, India orientali, &c (v. f.)

Tota planta tenuissime albo-tomentosa, etiam ramulis. Folia pinnata: Foliola obovata, obtusa, albida, sericea, quina, laeviuscula, utrinque similia: impari majore. Racemi laterales, folio breviores. Corollae purpureo-scentes, hiantes. Calyx planus. Stamen deci-

*mum distinctum. Legumina tomentosa, compressa, to-
rulosa, subarticulata, saepius trisperma.*

*51. INDIGOFERA pulchra.

I. foliis simplicibus ternatis pinnatis hue cuneatis hirsutis, floribus axillaribus solitariis terminalibus subcapi-tatis, leguminibus hirsutis. W.

Schöner Indigo. W.

Habitat in Guinea. (v. f.)

Caulis erectus ramosus striatus hirsutus. Folia cau-lina pinnata bijuga, ramea ternata et simplicia cunei-formia obtusa mucronata subtus cano-pubescentia. Sti-pulae subulatae. Pedunculi axillares brevissimi uni-flori, terminales aggregati subcapitati. Calyces hirsuti. Legumina parva brevia oblonga teretia. W.

1377. G A L E G A.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 1206.

Cal. dentibus subulatis, subaequalibus. Legumen striis obliquis, seminibus interjectis.

† *Foliis ternatis.*

*1. GALEGA filifolia.

G. foliis ternatis, foliolis filiformibus, floribus umbella-tis, caule erecto. †

Galega filiformis. Thunb. prod. 133.

Fadenblättrige Geisraute. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*2. GALEGA pusilla.

G. foliis ternatis subtus sericeis, foliolis ovatis mucrona-tis, floribus lateralibus, caule erecto. *Thunb. prod. 133.* †

Zwerg-Geisraute. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*3. GALEGA falcata.

G. foliis ternatis sericeis, leguminibus solitariis falcatis sericeis, caule erecto. *Thunb. prod. 134.* †

Sichelfrüchtige Geisraute.

Habitat ad Cap. b. spei.

*4. GALEGA *filiformis*.

G. foliis ternatis ellipticis obtusis nitidis, leguminibus falcatis caule volubili. W.

G. foliis ternatis, caule volubili, leguminibus recurvatis.
*Jacq. ic. rar. 3. t. 573. Collect. 2. p. 348.**

Fadenförmige Geisraute. W.

Habitat in America calidiore. †

Caulis *filiformis* volubilis. Foliola semiuncialia elliptica obtusa nitida, sub lente adspecta pilis raris adpresso obsoita. Stipulae parvae subulatae. Racemi filiformes, floribus violaceis ternis remotis. Legumina linearia falcata. W.

*5. GALEGA *sericea*.

G. foliis ternatis, foliolis ovatis tomentosis, floribus axillaribus solitariis. Thunb. prod. 134. †

Seidenartige Geisraute. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*6. GALEGA *totta*.

G. foliis ternatis hirsutis, foliolis oblongis, floribus subumbellatis, caule herbaceo. Thunb. prod. 134. †

Hottentotten-Geisraute W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*7. GALEGA *longifolia*.

G. foliis ternatis lanceolatis obtusis, leguminibus rectis villosis, caule volubili. W.

G. foliis ternatis, caule volubili, leguminibus rectis.
*Jacq. ic. rar. 3. t. 572. Collect. 2. p. 349.**

Langblättrige Geisraute. W.

Habitat in America calidiore. †

Caulis volubilis quadripedalis ramosus suffruticosus. Folia ternata, foliolis lineari-lanceolatis obtusis. lateralibus bipollicaribus, intermedio tripollicari, quatuor linearum latitudine. Stipulae parvae oblongae obtuseae. Racem filiformes pauciflori, floribus violacei, oppositis. Legumina linearia recta acuta villosa. W.

† † *Foliis pinnatis.*

8. GALEGA *officinalis.*

G. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis mucronatis glabris, stipulis lanceolatis sagittatis, leguminibus erectis striatis. W.

Galega leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. *Mat. med.* 174. *Mill. dict. n. I. et ic. t. 137.* *Hoffm. germ.*, 261. *Roth. germ. I.* 322. *II.* 225.

G. foliis ellipticis, spicis et siliquis erectis. *Hall. helv. n. 394.*

Galega. *Hort. cliff.* 362. *Hort. upf.* 208. *Riv. t. 72.* *Ludw. ed. t. 161.*

G. vulgaris. *Bauh. pin.* 352. *Morif. hist. 2. p. 91. f. 2.* *t. 7. f. 9.* *Blackw. t. 92.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 671.

Gemeine Geisraute. W.

Habitat in Hispania, Italia, Germania, Africa ad ver- furas. 24 (v. v.)

* 9. GALEGA *orientalis.*

G. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, stipulis ovatis, floribus cernnis. W.

G. (*orientalis*) foliolis ovato-acutis nervosis laevibus, stipulis ovatis integerrimis. *Lamarck encycl. 2. p. 589.**

G. *orientalis* latifolia altissima, flore coeruleo. *Tournef. cor. 27.*

Orientalische Geisraute. W.

Habitat in Oriente. W.

Caulis quadripedalis erectus. Folia impari-pinnata ampla sexjuga. Foliola Orobii verni ovata acuminata mucronata venosa glabra margine tenuissime ciliata. Stipulae amplae ovatae acutiusculae indivisae nervosae. Racemi longifloribus coeruleis praecedentis sed nutantibus. Legumina non vidi. W.

* 10. GALEGA *striata.* +

G. foliis pinnatis, floribus racemosis, caule herbaceo striato. *Thunb. prod.* 134.

Gestreifte Geisraute. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

* 11. GALEGA *davurica*.

G. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis utrinque attenuatis villosis, leguminibus linearibus subrecurvis. W.

Galega davurica. Pall. it. 3. app. n. 107. t. IV. f. I.*
Davurische Geisraute. W.

Habitat ad ripas arenosas fluviorum Davuriae. 24

Tota planta albo-pilosa. Folia pinnata cum impari quinque vel octojugae. Stipulae subulatae. Flores purplei. Legumina linearia erecto-subrecurva pubescentia. W.

12. GALEGA *cinerea*.

G. foliis pinnatis, foliolis obtusis mucronatis subtus villosis, stipulis lanceolatis, racemis oppositifoliis, leguminibus patentibus strictis. W.

G. leguminibus strictis patentibus pedunculatis, racemis oppositifoliis, foliolis mucronatis subtus villosis. Amoen. acad. 5. p. 403.* Jacq. ic. 3. t. 575. Collect. 2. p. 333.*

G. leguminibus patentibus strictis, racemis oppositifoliis, pedicellis solitariis, foliis subtus villosis, stipulis lanceolatis. Vahl symb. 2. p. 84.

Galega herbacea subcinerea villosa, foliis oblongis pinnatis, spicis laxioribus ad alas. Brown jam. 289.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 672.

Graue Greisraute. W.

Habitat in Jamaica. ○

* 13. GALEGA *tomentosa*.

G. foliis pinnatis, foliolis obtusis mucronatis subtus sericeis, stipulis subulatis, racemis oppositifoliis, leguminibus strictis adscendentibus. W.

G. leguminibus strictis adscendentibus villosis racemosis oppositifoliis pedicellis ternis, foliolis subtus sericeis, stipulis subulatis. Vahl symb. 2. p. 84.

Lathyrus (tomentosus) pedunculis unifloris ternatis. Forst. descr. 134.

Filzige Geisraute. W.

Habitat in Arabia felici.

Caulis villoso - subtomentosus angulatus. Folia 4 - 6-juga. Foliola pollicaria linearia obtusa mucronata basi acuta, supra glabra. Pedunculus oppositifolius dodrantalis. Flores remote pedicellati terni ad singulum dentem. Pedicelli villosi. Bracteae binae subulatae pedicello breviores. Calyx villosus. Corollae vexillum extus villoso - cinereum. Legumina bipollicaria. In paucis a G. cinerea differt, scilicet stipulis angustioribus, leguminibus ternis ad singulum dentem pedunculi. Vahl i. c.

* 14. GALÉGA littoralis.

G. foliis pinnatis, foliolis cuneato - oblongis emarginatis strigoso - villosis, stipulis subulatis, racemis folio triplo longioribus, leguminibus strictis patentibus. W.

G. leguminibus racemosis, tota villoso - tomentosa. Syst. Veg. 565.

Vicia (littoralis) pedunculis multifloris, foliolis oblongis tomentosis, stipulis integris, leguminibus sublinearibus. Jacq. amer. 206. t. 124.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 673.

Ufer - Geistrante. W.

Habitat in Carthagenaë littoribus arenosis marinis. 24
(v. f.)

Flores carnei.

Racemi longi terminales et axillares. Tota planta pilis canescentibus adpresso est tecta. W.

* 15. GALÉGA toxicaria.

G. foliis pinnatis, foliolis oblongo - lanceolatis obtusis subtilis villoso - tomentosis, racemo terminali elongato, leguminibus teretibus patentissimis. W.

G. (toxicaria) spicis - terminalibus pedunculatis, leguminibus teretibus, pedicellis patentibus, caule foliis que incano - tomentosis. Swartz prod. 108.

Cytisus fruticosus erectus et villosus, foliis plurimis pinnatis, spicis florum terminalibus. Brown. jam. 296.

G. frutescens, foliis sericeis. Plum. ic. 126. t. 135.

Giftige Geisraute. W.

Habitat in India occidentali. 5

16. GALEGA *virginiana*.

G. leguminibus retrofalcatis compressis villosis spicatis,
calycibus lanatis, foliolis ovali oblongis acuminatis.

Amoen. acad. 3. v. 18. Mill. dict. n. 4.

Cilioria foliis pinnatis, caule decumbente. *Hort. cliff.*
498. * *Gron. virg. III.*

Erebinthus. *Mant. gen. 210.*

Orobus *virginianus*, foliis fulva lanugine incanis, folio-
rum nervo in spinam abeunte. *Pluk. mant. 142.*

Cicer *astragaloides virginianus* hirsutie pubescens, flo-
ribus amplis subrubentibus. *Pluk. alm. 103. t. 23. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 673.

Virginische Geisraute. W.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis in loco natali erectus est. Flores 3 f. 4
rubri.

*17. GALEGA *grandiflora*.

G. foliis pinnatis, foliolis oblongis mucronatis subtus
pubescentibus, stipulis ovatis acuminatis, ramo sub-
quadrifloro terminali, leguminibus retrorsum ciliatis pen-
dulis. W.

G. leguminibus patentibus, stipulis ovato-lanceolatis,
foliolis oblongis nudiusculis aristatis. *Ait. Kew. 3.*
p. 70.

G. leguminibus retrofalcatis pendulis racemosis, foliolis
lanceolatis, stipulis ovatis acuminatis, vexillis subtus
sericeis. *Vahl symb. 2. p. 84.* *

G. foliis pinnatis, pinnis mucronatis nervosis villosis,
leguminibus ciliatis, racemis terminalibus caule ere-
cto fruticoso. *Thunb. prod. 134.*

Grosblütige Geisraute. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. v.)

*G. virginiana differt: caule villoso, foliis 10-12 ju-
gis, extrorsum non latioribus, bracteis subulatis, le-
guminibus ubique villosis.* Vahl l. c.

*18. GALEA *stricta*.

G. foliis pinnatis, foliolis cuneato-oblongis recurvato-
mucronatis, subtus villosis, stipulis subulatis, racemo-
paucifloro, leguminibus strictis pendulis. W.

- G. (*stricta*) leguminibus rectis villosis oblongis vexillis supra sericeis. *Ait. Kew.* 3. p. 70.
 G. (*mucronata*) foliis pinnatis, pinnis ovatis mucronatis villosis. caule erecto fruticoso, ramis pubescentibus. *Thunb. prod.* 134.
 G. (*pulchella*) leguminibus rectis villosis pendulis racemosis, stipulis subulatis, vexillis supra foliisque subtus villosis. *Vahl symb.* 2 p. 85.
 G. (*pulchella*) leguminibus rectis teretibus villosis, stipulis linearibus, foliis plerisque acuminatis, acumine reflexo. *Scop. del. infab.* I. p. 3. t. 3.*
 Steife Geisrante. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. v.)

Differt a G. grandiflora: ramulis angulatis villosis uti foliola subtus, stipuli subulatis parvis villosis, bracteis subulatis. Vahl l. c.

* 19. GALEGA pallens.

- G. leguminibus strictis patentibus ciliatis, stipulis subulatis, foliolis (9-11) oblongis acutis subtus pubescentibus. *Ait. Kew.* 3. p. 71.
 G. (*humilis*) foliis pinnatis, pinnis subquadrijugis hirsutis, leguminibus racemosis pubescentibus recurvis, caule pubescente. *Thunb. prod.* 134.

Bleiche Geisrante. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ.

20 GALEGA villosa.

- G. foliis pinnatis, foliolis lanceolato-cuneatis subretusis subtus sericeis, stipulis setaceis, leguminibus retrofalcatis villosis pendulis. W.
 G. leguminibus retrofalcatis villosis pendulis racemosis lateralibus, foliolis glabris lanceolatis. *Fl. ceyl.* 299.
 Securidaca madaraspensis, siliquis falcatis fulvis et villosis plurimis circum ramulos stellatim politis. *Pluk. alm.* 399. t. 59. f. 6.
 3 Coronilla ceylanica siliquis fuscis hirsutis pilosis, flore albo. *Burm. zeyl.* 78. t. 33.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 674.
 Zottige Geisraute, W.
Habitat in India orientali. ৎ (v. f.)

Planta procumbens, caule teretisculo. Folia pinnata ex 13 vel 17 foliolis oblongis inferioribus brevioribus et obverse ovatis omnibus obtusis cum acumine glabris, ad angulum acutum striatis. Spica ramos terminat pedunculata. Calyces hirsutie grisea vestiti. Legumina retrofalcata hirsutie cervina sive grisea vestita, praeter spicas in ultimis alis, ubi spicæ excurrent, flos aut legumen solitarium. Stipulae setaceae. Fl. ceyl. l. c.

Variat foliolis acutisculis et rotatis, superne glaberrimis inferne sericeis et superne subpubescentibus inferne canis. W.

*21. GALEGA Colutea.

G. foliis pinnatis tomentosis, foliolis oblongo obovatis retusis, stipulis lanceolatis, leguminibus strictis erectis. W.

G. (*Colutea*) leguminibus racemosis strictis adscendentibus rugosis, foliolis obovatis sericeis. Burm. Ind. 172.

Colutea siliquosa cuneaphyllos Indiae orientalis, siliquis et foliis averba parte pubescentibus. Pluk. alm. 112. t. 166. f. 3.

Weisse Geisraute. W.

Habitat in India orientali. ḥ (v. f.)

Caulis fruticosus ramosus, ramis teretibus canis, junioribus, ut tota planta, tomentosis. Folia imparipinnata quinque-vel septemjuga. Foliola oblongo obovata retusa superiora majora, utrinque cana tomentosa. Stipulae lanceolatae parvae tomentosae. Racemi terminales et axillares quadri-vel quinquepollicares. Pedunculi partiales brevissimi. Flores purpurei 3 vel 4 ex eodem puncto. Calyx et Pedunculi albomentosi. W.

22. GALEGA maxima.

G. leguminibus strictis adscendentibus glabris, stipulis lanceolatis, foliolis oblongis glabris striatis. Fl. zeyl. 300. * Amoen. acad. 3. p. 19.

Vicia foliis glabris venosis oblongis, floribus gemellis. Burm. zeyl. 228. t. 108. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 674.

Gröste Geisraute. W.

Habitat in Zeylona.

*23. GALEGA piscatoria.

G. leguminibus strictis adscendentibus subvillosois, stipulis subulatis, foliolis (11-13) oblongis obtusis suhtus pilosiusculis, pedunculis anciptibus. Ait. Kew. 3. p. 71.

Gal-ga littoralis. Forst. prod. n. 277.

Fischer-Geisraute. W.

Habitat in India orientali et in insulis Māris pacifici.

ḥ (v. f.)

24. GALEGA purpurea.

G. foliis pinnatis, foliolis oblongo - cuneatis emarginatis mucronatis glabris, stipulis subulatis, leguminibus racemosis strictis adscendentibus. W.

G. leguminibus strictis adscendentibus glabris racemosis terminalibus, stipulis subulatis, foliis oblongis glabris. Fl. zeyl. 301.* Amoen acad. 3. p. 19. Mill. dict. n. 5.

Coronilla zeylanica herbacea, flore purpurascente. Burm. zeyl. 77. t. 33.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 674.

Rothe Geisraute. W.

Habitat in Zeylona. ḥ (v. f.)

25. GALEGA caribaea.

G. foliis pinnatis, foliolis oblongis acutis subtus subpubescentibus, stipulis subulatis, leguminibus glabris racemosis pendulis. W.

G. leguminibus strictis glabris pendulis racemosis, foliolis glabris mucronatis, caule fruticoso. Syst. veg. 565. Jacq. amer. 212. t. 125.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 675.

Westindische Geisraute. W.

Habitat in Caribaeis. ḥ (v. f.)

Racemi foliis longiores.

*26. GALEGA ochroleuca.

G. foliis pinnatis, foliolis ovatis acutiusculis pubescenti-

bus, stipulis subulatis, leguminibus strictis pendulis
glabris racemosis. W.

G. leguminibus racemosis glabris pendulis, foliis triju-
gis, foliolis subovatis obtusis, caule fruticoso. *Jacq.*
*ic. rar. 1. t. 150. Collect. 1. p. 79.**

Gelblichweisse Geisraute. W.

Habitat — — — — — $\ddot{\text{h}}$ (v. v.)

Foliola magna ovata utrinque pubescentia. W.

27. GALEGA coerulea.

G. caule scabro, foliis octo-ad decemjugis, foliolis el-
lipticis, racemis terminalibus multifloris coarctatis.
Lin. suppl. 335.

Blau- Geisraute. W.

Habitat in America meridionali. *Mutis.*

Rami ferruginei tuberculati punctis nigris, in sum-
mitate caulis tomentosi. Folia pinnata octo-ad de-
cemjuga, foliolis ellipticis obtusis. Stipulae subulatae.
Racemi terminales erecti, *Astragalum alopecuroidem*
referentes, floribus numerosis congestis coerules. Le-
gumina non vidi nisi rudimenta, ideoque de genere
dubius.

28. GALEGA tinctoria.

G. foliis pinnatis, foliolis ellipticis emarginatis subtus
sericeis, stipulis lanceolatis, racemis pedunculatis axil-
laribus, leguminibus strictis glabris patentissimis. W.

G. spicis lateralibus pedunculatis, leguminibus strictis
pendulis, foliolis emarginatis subtus villosis. *Fl. zeyl.*
302. Amoen. acad. 3. p. 19.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 675.

Färber- Geisraute. W.

Habitat in Zeylona. $\ddot{\text{h}}$ (v. f.)

*29. GALEGA linearis. W.

G. foliis pinnatis, foliolis angustissimis linearibus sub-
tus sericeis, stipulis filiformibus, leguminibus racemo-
bus pendulis. W

Linienblättrige Geisraute. W.

Habitat in Guinea. (v. f.)

Racemi striati subpubescentes. Folia impari-pin-
nata quadri-vel quinquejuga. Foliola uncialia et ultra

linearia angustissime obtusiflora subtus sericea. Stipulae breves filiformes. Racemi axillares. Legumina bipinnata angusta linearia compressa pubescentia pendula. W.

*30. **G A L E G A domingenfis.** W.

G. foliis pinnatis, foliolis linearis-cuneatis obtusis mucronatis, stipulis lanceolatis, leguminibus racemosis pendulis. W.

Domingenische Geisraute. W.

Habitat in St. Domingo locis sterilibus siccis. ⊖ (v. f.)

Caulis flexuosus ramosus glaber obsolete angulatus. Folia impari pinnata septem vel novemjugata. Foliola linearis cuneata obtusa mucronata, mucrone reflexo, striato-venosa, pilis raris adpresso, lentis ope adspelta, tecta. Stipulae lanceolatae. Racemi axillares floribus parvis geminatis pallide rubris. Legumina linearia pendula pilis minutissimis raris obsita. Hanc speciem detexit Cläriss. Bredemeyer. W.

*31. **G A L E G A mimosoides.** W.

G. foliis pari-pinnatis multijugis, foliolis linearibus obtusis, racemis axillaribus pedunculatis, leguminibus pendulis. W.

Sinnpflanzenartige Geisraute. W.

Habitat in India orientali. ḥ (v. f.)

Frutex ramis teretibus scandentibus, junioribus pubescentibus. Folia pari-pinnata Cassiae nictitantis, duodecimjugata. Foliola parva linearis obtusa mucronata utrinque pilis adpresso obsita. Stipulae parvae lanceolato-subulatae. Racemi pedunculati axillares. Legumina sesquipollucaria oblongo-linearis compressa pendula, pilis adpresso obsita. W.

*32. **G A L E G A dubia.** +

G. foliis pinnatis multijugis, foliolis ellipticis obtusis incano-pubescentibus, stipulis oblongis, racemis multifloris. W.

G. (*dubia*) leguminibus racemosis, tota incano-viola, foliis subnovemjugis parvis. *Jacq. ic. rar. 3. t. 576.*

Collect. 4. p. 131. *

Zweitelhafte Geisraute. W.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

C c

Habitat ad Cap. b. spei.

Caulis prostrati ut tota planta incano-pubescentes. Folia impari-pinnata octo-vel novemjugata. Foliola parva elliptica obtusa submucronata. Stipulae minutae oblongae. Racemi longi multiflori terminales et axillares. Flores alterni purpurei. Legumen ignotum. W.

*33. GALEGA capensis.

G. foliis pinnatis, pinnis subquinquejugis oblongis, leguminibus racemosis villosis, caule decumbente suffruticolo. Thunb. prod. 134.

G. leguminibus teretibus villosulis, racemis filiformibus longissimis, floribus oppositis distantibus, foliolis glabris, caule decumbente suffruticolo. Jacq. ic. rar. 3. t. 574. Collect. 2. p. 292.*

Cäpische Geisraute. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

34. GALEGA spinosa.

G. foliis pinnatis, foliolis cuneatis emarginatis, stipulis spinescentibus, leguminibus falcatis axillaribus sub-solitariis. W.

G. caule diffuso, foliis cuneiformibus canis, stipulis spinescentibus, leguminibus solitariis retrofalcatis compressis. Lin. suppl. 335.

Dornige Geisraute. W.

Habitat in Coromandel ad margines agrorum. ḥ (v. f.)

Caulis s. Rami tomentosi albi. Folia pinnata cum impari, foliolis cuneiformibus canis. Stipulae binae patentibus spinescentes. Pedunculi axillares solitarii breves uniflori. Flores erecti parvi. Legumen dependens retrofalcatum compressum.

*35. GALEGA pinnata.

G. foliis pinnatis trijugis, floribus umbellatis. Thunb. prod. 34.

Doldentragende Geisraute. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*36. GALEGA pumila.

G. foliis pinnatis, foliolis oblongo-cuneatis retusis sub-

tus villosis, leguminibus strictis axillaribus solitariis, caule ramosissimo. W.

G. *leguminibus lateralibus solitariis villosis, foliolis cu-*
neiformibus emarginatis subtus villosis, caule ramo-
sissimo. Lamarck encycl. 2. p. 592. *

Kleine Geisraute. W.

Habitat in Guinea et Madagascar. (v. f.)

Caulis ramosissimus glaber, ramulis villosis. Folia
impari pinnata quadrijuga. Foliola oblonga cuneata
retusa mucronata pubescentia subtrus cana. Stipulae
lanceolatae. Pedunculi axillares uniflori brevissimi
solitarii. Legumen sesquipollicare lineare compres-
sum villosum dependens. W.

37. GALEGA senticosa.

G. *leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emar-*
ginatis subtus sericeis, caule fruticoso. Fl. zeyl. 303.

Amoen. acad. 3. p. 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 676.

Cassenartige Geisraute. W.

Habitat in Zeylona. ৎ

1378. PHACA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1207.

Calyx 5-dentatus, dentibus 2-superioribus remo-
tioribus. Legumen semibiloculare inflatum.

1. PHACA baetica.

P. *caulescens erecta pilosa, foliis pinnatis, foliolis ovali-*
buis acutis, stipulis lanceolatis, leguminibus oblongis
cymbiformibus compressis. W.

P. *cautescens erecta pilosa, leguminibus tereti-cymbifor-*
mibus. Sp. pl. 1064. Mill. dict. n. 1.

Phaca leguminibus rectis. Roy. lugdb. 390.

Astragalus baeticus lanuginosus, radice amplissima.

Bauh. pin. 351.

Astragalos baeticus. Clus. hist. 2. 234.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 677.

Spanische Berglinse. W.

Habitat in Hispania, Lusitania. ৎ (v. f.)

*2. PHACA *floridana*. W.

P. caulescens erecta glabra, foliis abrupte-pinnatis, foliolis oblongis obtusis mucronatis, stipulis lanceolato-subulatis, leguminibus oblongis compressis acuminatis. W.

Robinia (vesicaria) racemis axillaribus, foliis abrupte pinnatis. Jacq. ic. rar. I. t. 148. Collect. I. p. 105.*
Florianische Berglinse. W.

Habitat in Florida. ◎

Caulis erectus 3 vel 7-pedalis glaber. Folia paripinnata 10-16 juga. Foliola oblonga obtusa mucronata. Petiolus communis seto terminatus. Racemi penduculati foliis breviores 4 vel 5 flori, inter flores hirti. Corollae flavae. Legumina inflata compressa oblonga acuminata bilocularia. Planta dubii generis potius Phacae quam Robiniae species. W.

3. PHACA *salsula*.

P. caulescens erecta incana, foliis pinnatis, foliolis obovatis obtusis, stipulis oblongis obtusis, leguminibus globosis pendulis. W.

P. caulescens erecta canescens, foliis pinnatis, leguminibus pedunculatis globosis cernuis. Lin. suppl. 336.

Phaca *salsula*. Pall. itin. 3. app. n. 115. t. B. b.*
Salz-Berglinse. W.

Habitat in campis salsis circa lacum siccum Tarei Danuriae. 24

Simillima herba et figura leguminum Astragalo chinensi.

*4. PHACA *alpina*. W.

P. caulescens erecta pubescens, foliis pinnatis multijugis, foliolis oblongo-lanceolatis obtusis, leguminibus semiovatis acutis. W.

Phaca alpina. Jacq. ic. rar. I. t. 151. Misc. 2. p. 93.*
Villars delph. 3. p. 472.* Host. synop. 407.

P. leguminibus pendulis semiovatis. Gmel. fib. 4. p. 35. t. 14.

Astragalus caule erecto ramosissimo, foliis ellipticis hirsutis, siliquis vesicariis. Hall. helv. n. 401.

*Astragaloides elatior erecta viciae foliis floribus luteis fili-
quis pendulis.* Amm. ruth. 148.

*Astragaloides alpina hirsuta erecta, foliis viciae floribus
dilute luteis.* Till pis. 19. t. 14. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 278.

Alpen - Berglinse. W:

*Habitat in alpibus Helvetiae, Galliae, Sabaudiae, Au-
striae, Sibiriae 24 (v. f.)*

5. PHACA frigida.

*P. caulescens erecta indivisa, foliis pinnatis subquinque-
jugis, foliolis oblongis obtusis subciliatis, leguminibus ob-
longis inflatis.* W.

*P. (alpina) caulescens erecta glabra, leguminibus ob-
longis inflatis subpilosis.* Sp. pl. 1064. Fl. suec. n. 657.
Fl. lapp. 267. Fl. dan. t. 856.

Phaca frigida. Jacq. vind. 265.* *Fl. austr. t. 166.*
Host. synop. 407.

*Astragalus caule erecto, stipulis maximis, foliolis ovatis
novenis, leguminibus inflatis.* Hall. hist. n. 402.

Kalte Berglinse. W.

*Habitat in summis alpibus Laponiae, Norvegiae, Hel-
veticae, Salisburgi, Austriae, Styriae. 24 (v. f.)*

*Haec est vera P. alpina Linnaei, quae P. frigida in
Syst. nat. ed. 10. p. 1173. audit. Claris. Smith hanc a
Phaca frigida Jacquinii diversam credit, sed speci-
mina suecica, helvetica et austriaca inter se nullo mo-
do differunt. Figura Florae danicae ab omnibus a
me viis specimenibus est distincta: foliolis basi sub-
rotundis et levissime cordatis, quae semper basi atte-
nuata vidi.* W.

6. PHACA australis.

*P. caulescens ramosa adscendens, foliis pinnatis subocto-
jugis, foliolis lanceolatis, impari subsessili, alis corol-
iae bifidis.* W.

*P. caule ramoso prostrato, foliolis lanceolatis, florum
alis semibifidis.* Mant. 103. Jacq. misc. 2. p. 43. t. 3.*

*P. (Halleri) subprostrata caulescens, alis florum apice
bifidis.* Villars delph. 3. p. 473. t. 41.*

*P. caulescens diffusa, pedunculis longissimis, legumini-
bus semiovatis.* Gerard. prov. 519.?

Astragalus caule ramoso prostrato, foliolis lanceolatis, florum alis emarginatis. *Hall. helv. n. 304.*

Astragaloides alpina supina glabra, foliis acutioribus.
Til. pif. 19. t. 14. f. 1?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 679.

Südliche Berg'inf. W.

Habitat in alpinis Helvetiae, Austriae, Salisburgi, Italiæ, Galloprovinciae. 24 (v. f.)

Folia sexjuga circiter, cinerea, pilosa. Flores albidoo flavicon'es. Alae semibifidae, quod singulare. Legumina glabra. Carina corollæ violacea, nec ad apicem 2 maculis violaceis, ut in Ph. frigida, a qua parum differt.

Junior hirsuta, adultior glabra evadit, quasi distincta planta.

Plantam a Gerardo et Tilio inciatam separat Clariss Villars (delph. 3. p. 474.) sua titulo Phaca Gerardi, et alis florum linearibus distinxit. W.

*7. PHACA arenaria.

P. caulescens subramosa adscendens glabra, foliis pinnatis subquinquejugis, foliolis linearis lanceolatis impari subsessili, leguminibus obovatis inflatis erectis. W.

*Phaca arenaria. Pall. itin. 3. app. n. 116. t. A. a. fig. 1. 2. **

Sand Berg'inf. W.

Habitat in Sibiria ad Udam inque insulis Selengae et Baikalis. 24

*8. PHACA halicacaba. W.

P. caulescens procumbens, foliis pinnatis subquinquejugis oblongis acutis incanis, impari subsessili, calycibus inflatis ovatis reticulatis hirsutis. W.

Judenkirchenartige Berg'inf. W.

Habitat in Galatia. 24 (v. f.)

Caules plures e radice breves procumbentes. Folia impari pinnata 4-5-juga. Foliola oblongo-acuta utrinque alba villosa incana, impari subsessili. Racemi pedunculati axillares tri-vel quinqueflori. Bracteae ovatae membranaceae ad basin floris. Calyces ovati inflati magnitudine Grossularide, hirsuti reticulati, dentibus lanceolato-subulatis. Corolla flava

vexillo ovato obtuso. Similis P. incanae sed caule-scens, foliis minoribus acutis calycibus, floriferis majoribus, bracteisque majoribus diversa. W.

9. PHACA trifoliata.

P. foliis ternatis ovalibus obtusis, leguminibus semiorbiculatis. *Mant.* 270.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 679.

Dreyblättrig Berglinse.

Habitat in China.

Caules filiformes, ramosi. Folia ternata, petiolata: Foliola ternata, obtusa, subtus tomentosa, lineata nervis: medio majore. Stipulae lanolatae arescentes, acumine setaceo. Racemus terminalis: pedicellis geminatis, unifloris. Legumina semiorbiculata, ventricoso-inflata, obtusa, futura superiore excurrente in mucronem setaceum recurvum.

10. PHACA vesicaria.

P. acaulis glabra, calycibus fructiferis ovalibus inflatis, foliolis lanceolatis. *Vahl symb. I. p. 57.*

P. acaulis, calycibus fructiferis ovalibus inflatis glabris. *Mant. 103. Schreb. dec. 9. t. 7.**

Astragaloides orientalis vesicaria, foliis et fructibus glabris. Tournef. cor. 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 680.

Aufgeblasene Berglinse. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

Folia radicalia, pinnata, 12-juga et ultra. Folio-la lanceolata, glabra, acuminata. Scapi erecti, terminati racemo. Calyces ovales, inflati, alterni breviter pedunculati ac fructiferi quadruplo latiores, globosi, glabri, colorati. Legumen parvum intra caly-cem oblongum.

* 11. PHACA incana.

P. acaulis incana, calycibus fructiferis ovatis inflatis villosis, foliolis oblongis obtusis. *Vahl symb. I. p. 57.**

Astragaloides orientalis vesicaria, foliis et fructibus incanis. Tournef. cor. 27.

Graue Berglinse. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

*Differt a P. vesicaria: canitie, villofitate calycum
fructiferorum, foliolis oblongis obtusis approximatis.
Vahl l. c.*

1379. A S T R A G A L U S.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1208.

*Legumen plerumque biloculare, gibbum. Sem.
biseritalia.*

+ Caulibus foliosis erectis, floribus axillaribus.

1. ASTRAGALUS *christianus*.

A. caulescens erectus, foliolis ellipticis petiolatis, stipulis linearis-subulatis, pedunculis subtrifloris axillaribus glomeratis, leguminibus oblongis compressis pubescens. W.

A. caulescens erectus, floribus glomeratis subsessilibus ex omnibus axillis foliaceis. Sp. pl. 1064. Lamarck encycl. 1. p. 307.*

A. orientalis maximus incanus erectus, caule ab imo ad summum florido. Tournef. cor. 29. itin. 2. p. 254. t. 254.

A. diof. vulgo Christiana radix. Dalech. app. 26?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 682.

Armenischer Traganth. W.

Habitat in Armenia. 2 (v. f.)

Flores fere totum caulem cooperiunt.

*2. ASTRAGALUS *Sieverianus*.

A. caulescens erectus, foliolis oblongis petiolatis, stipulis ovatis acuminatis, pedunculis multifloris axillaribus glomeratis, leguminibus ovatis inflatis tomentosis. W.

A. caulescens adscendent - erectus, capitulis axillaribus paucifloris, leguminibus nudis ovato-callosis tomentosis. Pall. Astrag. p. 15. n. 18. t. 12.*

Sieverscher Traganth. W.

Habitat in Sibiria circa fluvium Ultschaar. 2

Similis A. christiano, notis indicatis tamen diversus. W.

*3. ASTRAGALUS *tomentosus*.

- A. caulescens erectus, foliolis subrotundo-cordatis sessilibus tomentosis, stipulis ovatis acuminatis, pedunculis unifloris axillaribus, leguminibus oblongis incurvis tomentosis. W.
 A. (*tomentosus*) caulescens tomentosus incanus, foliolis cordatis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. Lomarck encycl. I. p. 309.*
 A. (*fruticosus*) floribus axillaribus subsessilibus. Forst. descr. 139.
Astragalus christianus. Vahl symb. I. p. 57.*
 Filziger Taganth. W.
Habitat in Aegypto. 24
Similius A. christiano sed abunde distinctus: Folio is sessilibus incanis subrotundo cordatis apice emarginatis, Stipulis ovatis, Pedunculis axillaribus unifloris, Leguminibus arcuatis. W.

† † *Caulibus foliosis erectis, spicis cylindraceis axillaribus subsessilibus.*

4. ASTRAGALUS *alopecuroides*.

- A. caulescens erectus, foliolis ovato-lanceolatis pubescentibus, stipulis ovatis, spicis cylindricis subsessilibus, calycinis dentibus capillaceis lanatis longitudine corollae. W.
 A. caulescens, spicis cylindricis subsessilibus, calycibus leguminibusque lanatis. Sp. pl. 1064. Mill. dict. n. 3. t. 58. Pall. itin. I. p. 230.
 A. (*alopecurus*) caulescens erectus, capitulis florum axillaribus sessilibus ovatis, leguminibus calyce inclusis tetraspermis. Pall. astrag. p. II. n. 13. t. 8.*
 A. capitulis oblongis sessilibus, calycibus et leguminibus lanatis. Hort. cliff. 361.* Amoen. acad. 2. p. 359.* Roy. lugdb. 391.
 A. alpinus procerior alopecuroides. Tournef. inst. 416.
 A. Kirgisicus montanus, flore in capitulis ad foliorum alas cylindricie hirsutis, luteis odoratis. Amm. ruth. n. 171.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 681.
Fucheschwanzartiger Traganth. W.
Habitat in Sibiria, Hispania. 24 (v. v.)

*5. ASTRAGALUS *maximus*. W.

A. caulescens erectus, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis oblongo-lanceolatis, spica cylindrica sessili terminali, calycibus dentibus capillaceis lanatis corolla brevioribus. W.

A. orientalis maximus glaber alopecuroides flore luteo. *Tournef. cor. 29.*

Gröster Traganth. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

Statura praecedentis cui simillimus. Differt vero: Folios duplo angustioribus oblongo-lanceolatis vel lanceolatis, Stipulis oblongo-lanceolatis nec ovatis, Calycibus minus lanatis. dentibus brevioribus, Corollis calyce majoribus. In praecedente dentes calycis longitudine sunt corollae et spicae axillares. W.

*6. ASTRAGALUS *Alopecias*.

A. caulescens erectus, foliolis ellipticis villosis, stipulis lanceolatis, spicis cylindricis sessilibus foliorum longitudine, calycinis dentibus lanceolato-subulatis lanatis. W.

A. (*Alopecias*) caulescens erectus, florum capitulis axillaribus sessilibus cylindricis, leguminibus calyce lanteo inclusis polyspermis. *Pall. Astrag. p. 12. n. 14. t. 9.**

Langhaariger Traganth. W.

Habitat in Sibiria ad lacum vastum Alagul deserti Kirgiso-Songarici 24

Planta admodum speciosa ab affinibus abunde distincta: caule ulnari strictissimo, spicis tri-vel quadri-pollicaribus crassis cylindricis obtusis longitudine foliorum. W.

*7. ASTRAGALUS *narbonensis*.

A. caulescens erectus, foliolis oblongis retusis villosis, stipulis lanceolatis, spicis globosis subsessilibus, calycinis dentibus linearibus acuminatis lanatis. W.

A. (*narbonensis*) caulescens erectus, capitulis florum sessilibus axillaribus abbreviatis, corollis calyce majoribus. *Pall. Astrag. p. 13. n. 15. t. 10.**

A. (*narbonensis*) caulis erectis lanuginosis, capitulis

axillaribus sessilibus, leguminibus ovatis compressis.
Gouan. illus. 49.*

Französischer Traganth. W.

Habitat in Gallia australi, Hispania. 24 (v. f.)

*8. ASTRAGALUS *ponticus*.

A. caulescens erectus, foliolis oblongis emarginatis sub-hirsutis, stipulis lanceolatis, spicis globolis sessilibus, calycibus cylindricis lanatis, dentibus ovatis. W.

A. (*ponticus*) caulescens erectus glabriusculus, capitulis axillaribus densis subpedunculatis. Pall. *Astrag.* p. 14. n. 16. t. II. *

B. A. orientalis glaber galegae foliis, capitulis florum sphæricis ad alas positis. Tournef. cor. 29.

Pontischer Traganth. W.

Habitat in Tauria β in Armenia. 24 (v. f.)

Simillimus praecedenti, discrepat vero: caule fere glabro, in summo apice pubescente, foliis subhirsutis nec villosis, calycibus cylindricis dentibus brevissimis ovatis acutis, nec dentibus longissimis linearibus acuminatis lanatis. Varietas β differt tantum foliolis glabris longioribus non emarginatis. W.

*9. ASTRAGALUS *vulpius*. W.

A. caulescens erectus, foliolis ellipticis obtusis villosis, stipulis lanceolatis, spicis ovatis pedunculatis, calycinis dentibus capillaceis lanatis longitudine corollae. W.

A. (*alopecuroides*) caulescens erectus, florum capitulis pedunculatis globosis, leguminibus tetraspermis calyce lanato inclusis. Pall. *Astrag.* p. 9. n. 12. t. 7. *

Orobus syriacus hirsutus magno flore. Moriſ. hist. 2. p. 98. f. 2. t. 8. f. 2?

Fuchs-Traganth. W.

Habitat in collibus arenosis Sibiriae. 24 (v. f.)

Spicae ovatae pedunculatae Nucis Juglandis magnitudine. Calycis villosi, dentibus linear-capillaceis lanatis longitudine fere corollae. Ab A. *alopecuroides* forma foliolorum, stipularum et spicarum diversissimus, ab omnibus affinis praecedentibus vero spicis pedunculatis ovatis. W.

† † † *Caulibus foliosis erectis, spicis racemisque pedunculatis.*

* 10. ASTRAGALUS macrocephalus. W.

A. caulescens erectus, foliolis oblongo-lanceolatis glabris, stipulis ovatis dilatatis vaginantibus, spicis globosis pedunculatis, calycibus lanatis, dentibus lanceolato-subnatis. W.

Großköpfiger Traganth. W.

Habitat in Galatia. 24 (v. f.)

Caulis quadripedalis erectus crassitie fistulae fictilis solidus striatus glaber. Folia pinnata pedalia vel sesquipedalia superiora sensim breviora, summa longitudine digitii, multijuga. Foliola oblongo-lanceolata acuta, uncialia, in insimis foliis sesquiunialia, glabra. Stipulae amplae ovatae, unciales vel sesquiunciales ejusdemque latitudinis, vaginantes caulem, nervosae acutae glabrae. Flores flavi globo-capitati pedunculati. Capitulum magnitudine pomi minoris. Pedunculus crassus longitudine capituli striatus pilis longis rarissimis patulis obsitus. Calyces albo-lanati, dentibus linearis-subulatis. Legumen immaturum ovatum calyce brevius subtriquetrum sulco profundo apice excavatum villosum. W.

11. ASTRAGALUS capitatus.

A. caulescens, capitulis globosis, pedunculis longissimis, foliolis emarginatis. Hort. cliff. 360. Roy. lugdb. 391. Mill. dict. n. 20.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 683.

Kopfförmiger Traganth. W.

Habitat in Oriente.

* 12. ASTRAGALUS Dasyanthus.

A. caulescens erectus, foliolis ellipticis obtusis mucronatis villosis, stipulis lanceolatis, spicis subrotundo-capitatis pedunculatis, calycinis dentibus lanceolatis leguminibusque ovato-lanceolatis villosis. W.

A. (*Dasyanthus*) subcaulescens lanuginosus, pedunculis folia aequantibus, vexillo corollae pubescente. Pall. Astrag. p. 79. n. 86. t. 65.* Pall. itin. 3. app. n. 119. t. G. g. f. I.*

A. (*Eriocephalus*) caulescens erectus, capitulis globosis, pedunculis longissimis, foliolis integrerrimis acuminate. *Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. I. p. 45. t. 46.**

Rauchblumiger Traganth. W

Habitat in Sibiria, inque Caucaso atque Hungaria locis arenosis et calcareis. 24 (v. v.)

Planta tota pilis albis obsita. Occurrit interdum absque caule, tamen plerumque caulescens evadit, caule digitati et parum ultra. *Hungarica* planta ab *asiatica* nullo modo. comparatis pluribus speciminibus, est diversa; nisi caule pedunculisque rubicundis, quos virides semper in *asiatica* observav; quod forte a loco diverso natali oritur; nam *hungarica* in arenosis siccis, *asiatica* in humentibus crescit. Culta planta ex seminibus *hungaricis* caules petiolosque rubicundos conservat. W.

* 13. ASTRAGALUS fragiformis. W.

A. caulescens erectus, foliotis linear-lanceolatis glabris, stipulis lanceolatis, spica globosa pedunculata terminali, calycibus fructiferis inflatis globosis tomentosis. W.

A. (*anthylloides*) caulescens adscendens paucifolius glaber, capitulis terminalibus, calycibus fructificantibus inflatis tomentosis fauce nigricantibus. *Pall. Aſtrag. p. 15. n. 19. t. 13. **

Erdbeerförmiger Traganth. W.

Habitat in Sibiria circa promontoria Altaici jugi in desertis Kirgiscis. 24

Caules semipedales erecti vel adscendentis teretes glabri. Folia pinnata 5-6 juga. Foliola uncialia vel sesquiuncialia linear-lanceolata acuta glabra. Stipulae lanceolatae. Flores ochroleuci globo-capitati. Capitulum solitarium terminale longe pedunculatum. Calices fructiferi inflati globosi tomentosi, dentibus lanceolatis. Legumen ovatum styllo acuminatum calyce tectum. W.

* 14. ASTRAGALUS onobrychioides.

A. caulescens erectus, foliolis lanceolatis canis, stipulis

lanceolatis, spica capitata pedunculata terminali, leguminibus oblongis erectis calyce majoribus. W.

A. (*Onobrychiodes*) *caulescens* *erectus* *pubescentis*, foliis petiolatis, foliolis ellipticis, spicis subcapitatis longissime pedunculatis, calycinis dentibus bracteisque acuminatis, vexillo elongato, leguminibus oblongis erectis. *Marschall ab Bieberst. casp. p. 117. n. 25.* (*excluso synonymo Tournefortii*).

A. (*cephalotes*) *caulescens* *erectus*, *pedunculis longissimis* *fulcatis* *capitatis*, *vexillis* *corollae* *productis* *lineariibus*, *calycibus* *leguminibusque* *pilosis*. *Pall. Astrag. p. 29. n. 32. t. 24.** (*excluso synonymo Linnaei*.)

Perfischer Traganth. W.

Habitat in Persiae collibus lapidosis, imprimis circa Kurt Bulak. 4 (v. f.)

Totus canus. Foliola lanceolata. Flores purpurei capitati. Capitulum solitarium subrotundum longe pedunculatum in apice caulis. Vexillum longissimum lanceolatum. Calycis dentes lanceolati. Legumen oblongum calyce longius, pilosum, stylo reflexo persistenti terminatum. W.

15. ASTRAGALUS pilosus.

A. *caulescens* *erectus* *pilosus*, *foliolis lanceolatis acutis*, *stipulis lanceolatis*, *spicis pedunculatis* *folio longioribus*, *leguminibus subulatis pilosis*. W.

A. *caulescens* *erectus* *pilosus*, *floribus spicatis*, *leguminibus subulatis pilosis*. Sp. pl. 1065. Mill. dict. n. 17. Gmel. fib. 4. p. 39. t. 16. Crantz aust. p. 418. n. 5. Jacq. aust. t. 51. Hoffm. germ. 262. Roth germ. I. 311. II. 190.

A. *caulescens* *erectus*, *leguminibus erectiusculis pilosis subulatis*, *acumine erecto*. Hort. upf. 226.

A. *caulescens* *erectus* *villosus*, *pedunculis superiorum alarum folio longioribus strictis*, *leguminibus subulatis subpubescentibus strictis*. Pall. Astrag. n. 112. t. 80.

A. *caule erecto ramoso*, *ex aliis spicifero*, *siliquis teretibus*. Hall. helv. n. 411. Comm. goett. vol. 1. p. 340. t. 12.

A. *Kirgisicus montanus*. Amm. ruth. n. 171. Sec. Hall. Gmel. R.

A. *villosum erectum spicatum*, *floribus flavescentibus*.
Amm. ruth. 166.

Cicer montanum lanuginosum erectum. *Bauh. pin. 347.*
prodri. 148

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 683.

Haariger Traganth. W.

Habitat in Sibiria, Thuringia etc. 24 (v. v.)

*16. ASTRAGALUS dealbatus.

A. *caulescens suffruticosus erectus canus*, *foliis subtri-jugis lanceolatis acutis*, *stipulis oblongo-acuminatis*, *spicis pedunculatis folio longioribus*, *vexillis emarginatis*, *leguminibus oblongis canis*. W.

A. *suffruticoso-caulescens*, *foliis trijugis*, *spicis longe pedunculatis laxis*, *leguminibus oblongis mucronatis callosis pubescentibus*. *Pall. Astrag. p. 26. n. 30. t. 23. f. 2. 3. (exclusis synonymis et figura 1.)*

Weiß-werdender Traganth. W.

Habitat in Tauria et ad Caucasum. 3 (v. f.)

Tota planta pilis albis adpresso cana. Caules striati suffruticosi. Folia tri vel quadrijuga. Stipulae parvae. Variat floribus pallide flavis et albis. Plantae sub. figura 1. a Clarisj. Pallas depicta est diversissima ob pilos caulis patulos, folia multijuga, cauesque breviores herbaceos, quam autoptis ulterius examinare atque describere commendo. A. vesicarius ab hoc valde diversus. W.

17. ASTRAGALUS fulcatus.

A. *caulescens erectus striatus*, *foliolis linear-lanceolatis glabris*, *stipulis lanceolatis*, *racemis folio longioribus*, *leguminibus triquetris unilocularibus*. W.

A. *caulescens erectus glaber striatus strictus*, *foliolis linear-lanceolatis acutis*, *leguminibus triquetris*. *Murr. syst. veg. ed. 14. p. 681. Jacq. hort. 3. p. 23 t. 40.*

A. *caulescens erectus*, *caule glabro sulcato*, *foliis lanceolatis*, *leguminibus subtriquetris*. *Sp. pl. 1065.*

A. (*leptocephalus*) *caulescens erectus*, *pedunculis elongatis tenuissime spicatis*, *leguminibus triquetris subtus canaliculatis unilocularibus*. *Pall. Astrag. p. 50. n. 53. t. 40.**

Phaca caulescens erecta glabra sulcata, pedunculis folio longioribus, leguminibus erectis subtriquetris. Zinn. goett. 342.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 684.

Gefurchter Traganth. W.

Habitat in Sibiriae herbidis. 24 (v. v.)

Planta alta stricta glaberrima, Caule sulcato. Folia ex oppositionibus 8 f. 9. cum impari pinnata: foliolis glabris angusto-lanceolatis. Pedunculi erecti stricti foliis triplo longiores. Flores in spicam laxam sparsit violacei parvi, calyce brevissimo. Legumina oblonga erecta. Legumen uniloculare ut in Phacis, ad quas forte accedit.

* 18. ASTRAGALUS hedyfaroides. W.

A. *caulescens erectus, foliolis linearibus pubescentibus, stipulis ovatis acuminatis, spica pedunculata longissima terminali, calycibus tubulosis pilosis, vexillo acuto elongato.* W.

A. *orientalis Onobrychidis facie, spica florum longissima.* Tournef. cor. 28.

Hahnenkopfartiger Traganth. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

Caules tri-vel quadriplicares erecti. Folia pinnata bi-vel triuncialia multijuga. Foliola quadrilinearia angusta linearia obtusa pubescentia. Stipulae marcescentes ovatae acuminatae parvae. Flore brevissime pedunculati in spicam pedalem solitariam terminalem pedunculatam dispositi. Calyces cylindrici pilosi. Corollae vexillum alis carinaque longius acutum. Legumen non vidi. W.

* 19. ASTRAGALUS floribundus.

A. *caulescens erectus, foliolis linearibus utrinque acutis pubescentibus, stipulis lanceolatis, racemis axillaribus folio longioribus, calycinis dentibus linearis-subulatis, leguminibus oblongo-subulatis unilocularibus.* W.

A. *caulescens lanuginosus, pedunculis axillaribus caule longioribus laxe spicatis, leguminibus erectis oblongo-mucronatis unilocularibus.* Pall. Astrag. p. 47. n. 50. t. 37.*

Blumenreicher Traganth. W.

Habitat in Sibiriae campis arenosis ad Irtim fluvium.

24 (v. f.)

Tota planta pilis albicantibus tecta. Corollae laterritiae, exsiccatione coerulescentes. W.

*20. ASTRAGALUS *versicolor*.

A. caulescens erectus, foliolis linearibus acutis glabris, stipulis lanceolatis connatis, racemis axillaribus folio longioribus, calycinis dentibus brevissimis ovatis cuspidatis, leguminibus triquetro - subulatis. W.

A. caulescens erectus glaber, pedunculis confertim spicatis folio longioribus, floribus nutantibus, leguminibus triquetris. Pall. *Astrag. p. 45. n. 48. t. 35.* * (excluso synonymo *Linnaei*.)

A. caulescens erectus glaber, foliis linearibus, pedunculis elongatis triquetris. Gmel. *fib. 4. p. 43.*

Bunter Traganth. W.

Habitat in rupestribus et alpinis frigidis Sibiriae a Jenisea ad Lenam usque. 24

Similis praecedenti a quo diversus: glabritie caulis et foliorum, floribus coeruleis, dentibusque calycis brevissimis. Ab A. tenuifolio toto coelo disinctus; similior A. austriaco, qui vero in Sibiria haud provenit. W.

*21. ASTRAGALUS *leptocephalus*.

A. caulescens erexit, foliolis linearibus obtusis glabris, stipulis lanceolatis, racemis filiformibus caule longioribus, calycinis dentibus brevissimis ovatis acutis, leguminibus triquetris. W.

Astragalus leptostachys Sievers.

Schlankähriger Traganth. W.

Habitat in Sibiria. 24 (v. f.)

Species ab Ill. Pallas non indicata praecedenti et sequenti affinis. Caulis erectus glaber striatus. Folia impari-pinnata sexjuga. Foliola glabra linearia obtusa, inferiora remotiora et majora. Stipulae parvae lanceolatae acutae. Racemi semipedales et decemplicares filiformes. Flores brevissime pedunculati in sicca planta coerulei, nutantes. Calyces brevissime quinque-dentati, dentibus ovatis acutis. Legumina erecta ovata triquetra magnitudine sequentis speciei. Dif.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. Dd

fert ab *A. versicolore*: foliis sexjugis, cuius folia octo vel novemjuga, foliolis obtusis latioribus, racemis longissimis filiformibus, leguminibus brevioribus ovatis, denique toto habitu. Ab *A. melilotoides* diversus: foliis sexjugis angustioribus, leguminibus laevibus altisque notis. W.

*22. ASTRAGALUS melilotoides.

A. caulescens erectus paniculatus, foliis bi-triugisve, foliolis linearis-cuneatis retulatis glabris, racemis filiformibus leguminibus ovatis rugosis didymis. W.

A. caule ramoso erecto, foliolis quinatis, pedunculis spicatis elongatis axillaris, leguminibus didymis rugosis. *Pall. Astrag. p. 51. n. 54. t. 41. * Pall. itin. 3. app. n. 117. tab. D. d. f. 1. 2. **

A. caulinis erectis ramosissimis, pedunculis folio longioribus, foliolis quinatis, floribus taxe spicatis, leguminibus rotundis. *Gmel. fib. 4. p. 38.*

Lotus montana erecta, oblongo et angusto folio parvulo et siliqua meliloti, septo oblique transverso divisa bicapsulari. *Amm. ruth. n. 57.*

Melilotenartiger Traganth. W.

Habitat in montanis siccis apricis Sibiriae ad Jeniseam et praecipue in regionibus Trans-Baicalensis. 24 (v. f.)

Species ab omnibus facie Meliloti, caule paniculato erecto et leguminibus didymis rugosis diversa. W.

*23. ASTRAGALUS hyrcanus.

A. caulescens erectus fruticosus, foliis trijugis, foliolis linearibus acutis pubescentibus, racemis subquinquefloris, leguminibus oblongis mucronatis villosis. W.

A. fruticoso-caulescens erectus, foliis sparsis trijugis, pedunculis paucifloris, leguminibus oblongo-mucronatis pubescentibus. *Pall. Astrag. p. 25. n. 29. t. 22.*

Hyrcanicus Traganth. W.

Habitat in littoribus arenosis Maris Caspii ad Derbent. ḥ

Frutex parvus ramis herbaceis rigidis incano-pubescentibus. Folia impari-pinnata, trijuga, foliolis linearibus acutis. Stipulae ovatae acuminatae. Racemi

*pauciflori axillares, floribus 3-5 purpureis. Calyx
camp. mulatus dentibus ovatis acutis brevibus. Legu-
men oblongum villosum styllo mucronatum.* W.

*24. ASTRAGALUS *virgatus*

- A. caulescens erectus fruticosus, foliis subsexjugis linea-
ri - lanciolatis canescens, racemis spicatis elongatis,
leguminibus oblongis triquetris. W.
 A. (*virgatus*) fruticoso - caulescens erectus, foliolis sexju-
gis, spica longissime laxa, leguminibus oblongo-
riquetris mucronatis. *Pall. Astrag. p. 20. n. 25. t. 18.**
(excluso synomino Linnaei.)
 A. (*varius*) caulescens erectus, floribus longe spicatis
laxis erectis, stipulis nigricantibus. *Lamarck encycl.*
*I. p. 310.**
Astragalus varius. Gmel. jun. it. 2. p. 116. t. 17.
 A. caulis subramosis, floribus et foliis laxis. *Gmel.*
sib. 4. p. 50.
 A. incanus fruticosus, foliis viciae. *Buxb. cent. 3. p.*
21. t. 37.

Ruthenförmiger Traganth. W.

*Habitat in imperio Ruthenico versus Mare-Caspium
inque Hungaria. † (v f)*

*Frutex dodratalis, ramis herbaceis sesquipedalibus.
Folia impari-pinnata 6 ad 9 juga. Flores vio-
lacei subsessiles in racemo longissimo axillari.* W.

*25. ASTRAGALUS *Garbanzillo*.

- A. caulescens erectus fruticosus, foliis multijugis oblon-
go-linearibus emarginatis caulis, stipulis vaginatis bi-
fidis, racemis pedunculatis folio longioribus. W.
 A. (*Garbanzillo*) caule fruticoso erecto, pinnulis ovato-
oblongis subtomentosis sub 31, pedunculis nudis elon-
gatis. *Cav. ic. rar. I. p. 59. t. 85.**

Peruvianischer Traganth. W.

Habitat in Peru locis frigidis. †

*Caulis erectus fruticosus sesquipedalis. Folia impari-pinnata incana subtomentosa in tota planta. 10
ad 15 juga. Stipula solitaria folio opposita vaginata
apice bifida. Racem elongati pedunculati foliis lon-
giore floribus subsessilibus dilute violaceis. Legumen
ignotum.* W.

*26. ASTRAGALUS vimineus.

A. caulescens erectus fruticosus, foliis subquinquejugis, lanceolatis pubescentibus, spicis subcapitatis pedunculatis, leguminibus oblongo-lanceolatis villosis. W.

A. fruticoso-erectus, foliis quinquejugis hispidatis, pedunculatis, leguminibus oblongo-mucronatis villosis. Pall. Astrag. p. 24. n. 28. t. 21.*

Dünneisiger Traganth. W.

Habitat in Sibiriae clivosis praemontorii Uralensis et apries montium Altaicorum etiam circa Caucum. Ȣ

Frutex *pedalis* vel *sesquipedalis*, ramis herbaceis dodrantalibus. Folia impari-pinnata 4 5 juga rarius sexjuga. Foliola pilis adpresso canis tecta lanceolata utrinque acuta. Stipulae parvae marcescentes lanceolato-acuminatae. Spicae subcapitatae 8-14 florae, floribus sessilibus confertis violaceis. Pedunculus communis foliis longior. Legumen oblongo-lanceolatum latere exteriora sulco profundo exaratum, stylo persistenti mucronatum villosum subbiloculare. W.

*27. ASTRAGALUS Arbuscula.

A. caulescens erectus fruticosus, foliis subtrijugis linearibus canis, spicis subcapitatis pedunculatis, leguminibus linearibus triquetris. W.

A. fruticoso-caulescens erectus, foliolis subseptenis, pedunculis capitato-spicatis, leguminibus elongatis linearibus trisulco-canaliculatis. Pall. Astrag. p. 19. n. 24. t. 17.*

Büchiger Traganth. W.

Habitat in Sibiria inter Irtim fluvium et lacum Balchaskh. Ȣ (v. f.)

Frutex *bipedalis* facie Robiniae, ramis herbaceis virgatis pedalibus vel sesquipedalibus. Folia impari-pinnata bi-vel trijuga. Foliola linearia cana, basi angustiora, apice obtusiflora acuta. Stipulae parvae lanceolatae emarcidae. Spica subcapitata 6 ad 12 flora, floribus violaceis. Pedunculus communis foliis triplo et ultra longior. Legumina linearia sulco longitudinali profundo exarata, triquetra. W.

*28. ASTRAGALUS aduncus. W.

A. caulescens erectus fruticosus, foliis subsexjugis linearibus obtusis canescens, spicis subcapitatis pedunculatis, vexillis elongatis acuminatis, leguminibus aduncis. W.

A. orientalis ramosus fructu adunco. Tournef. cor. 29.
Krummfrüchtiger Traganth. W.

Habitat in Armenia. ḥ (v. f.)

Frutex parvus ramosus, ramis herbaceis sulcatis semipedalibus. Folia impari pinnata 5 6 vel 7 juga. Foliola pilis adpressis canescens, linearia basi parum angustiora, apice obtusiuscula. Stipulae parvae ovatae membranaceae connatae. Spicae subcapitatae 10-15 florae, floribus in sicco specimine violaceis. Pedunculus communis foliis multo altior, pilis adpressis testatus. Vexillum alis et carina duplo longius acuminatum obtusum. Legumen non vidi, ex relatione Tournefortii aduncum. Similis praecedenti: sed foliis subsexjugis, vexillo acuminato nec emarginato et legume diversus. In binis praecedentibus et in sequenti vexillum alis et corolla longius est, nec tam valde elongatum et angustum, quam in hac specie. W.

*29. ASTRAGALUS fruticosus.

A. caulescens erectus fruticosus, foliis septemjugis, foliolis oblongis obtusiusculis subpubescentibus, capitulis paucifloris pedunculatis, leguminibus oblongis villosis. W.

A. fruticoso-caulescens suberectus, pedunculis capitatis paucifloris, leguminibus ovato-mucronatis villosis.
*Pall. Astrag. p. 21. n. 26. t. 19.**

A. caulescens fruticosus, ramis herbaceis, floribus paucis subcapitatis, leguminibus villosis. *Gmel. sib. 4. p. 47. t. 24. f. A.*

A. humilis viciae folio oblongo et angusto, purpureis siliquis conglomeratis longiusculis subhirsutis. *Amm. ruth. n. 165.*

Strauchartiger Traganth. W.

Habitat in montibus saxosis regionum Transbaicalensis orientalis Sibiriae. ḥ (v. f.)

Frutex pedalis vel sesquipedalis, ramis annuis brevibus. Folia 6 vel 9 juga. Foliola seniora superne gla-

*bra subtus pilis adpresso tecta, juniora vero pubescen-
tia. Capitula pauciflora, floribus 4 ad 10 violaceis.
Legumen oblongum sulco exaratum mucronatum vil-
losum.* W.

*In Astragalis caule erecto fruticoso, sub n. 23 - 29 de-
scriptis, foliolum impar est subfessile.* W.

*30. ASTRAGALUS *vaginatus*.

A. caulescens erectus pubescens, foliolis lanceolatis utrin-
que attenuatis, stipulis oppositifoliis solitariis vagina-
tis, spicis pedunculatis folio longioribus. W.

A. caulescens erectus pubescens, pedunculis longissimis,
floribus nutantibus, leguminibus linearibus rectis.

Pall. Astrag. p. 46. n. 49. t. 36. *

Sch. diger Traganth. W.

Habitat in Sibiria ad Ubam et Jeniseam et circa lacum

B. cal. 2.

*Affinis A. versicolori distinctus vero : statura majori,
pubescencia et stipularum forma, quae solitariae oppo-
sitifoliae vaginatae acuminatae.* W.

31. ASTRAGALUS *tenuifolius*.

A. caulescens erectus, foliolis linearis-lanceolatis spicis
oblongis pedunculatis folio longioribus, vexillo alis
duplo longiore. W.

A. caulescens erectus, spicis pedunculatis, alis duplo lon-
giore, foliolis linearibus. *Ait. Kew. 3. p. 73.*

A. caulescens erectus glaber, foliis linearibus, peduncu-
lis elongatis triquetris. *Sp. pl. 1065.*

Astragalus Onobrychis β. *Murr. syst. veg. 14. p. 681.*

Dünnlässtiger Traganth. W.

Habitat in Sibiria, 24 (v. v.)

*32. ASTRAGALUS *peregrinus*.

A. caulescens erectus, spicis pedunculatis longitudine
foliorum, leguminibus arcuatissimis lanuginosis stylatis.

Vahl. symb. 1. p. 57.

Fremder Traganth. W.

Habitat in Oriente?

*Caulis erectus pilosissimus. Folia remota tripolica-
ria. Foliola 21 - 27 emarginata pilosa viridia, inferio-
ra subrotunda, superiora oblonga. Stipulae ovatae*

acuminatae. Spica axillaris. Flores inferiores remotiores, superiores contigui. Pedunculus longit. dñe foliorum. Bractae subulatae calyce duplo breviores. Calyx cylindricus pilosus, laciniis setaceis. Corolla ochroleuca. Legumina lanceolata arcuata lanuginosa obtusa, styllo persidente rigido legum nibus quadruplo breviore terminata. intus margine acuto, extus sulco exarata. Vahl l. c.

*33. ASTRAGALUS asper.

A. caulescens erectus asper, foliolis linear-lanceolatis, spicis pedunculatis folio longioribus strictis, leguminibus oblongo-lanceolatis triquetris. W.

A (asper) caulescens strictus subasper, floribus spicatis in pedunculis elongatis erectis, leguminibus oblongis. Jacq. ic. rar. I. t. 152. misc. 2. p. 335.* Host. synop. 408.

A. (chloranthus) caulescens erectus pedunculis strictissimis folio longioribus longe spicatis, leguminibus erectis callosis triedro-linearibus. Pall. Astrag. p. 30. n. 34. t. 25.

Scharfer Traganth. W.

Habitat in desertis ad Mare Caspium et in Hungaria.

24 (v. v.)

Figura Jacquinii optima. W.

*34. ASTRAGALUS galegiformis.

A. caulescens erectus strictus glaber, foliolis ellipticis obtusis, floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris laevibus utrinque mucronatis. W.

A. caulescens strictus glaber, floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris utrinque mucronatis. Sp. pl. 1066. Mill. dict. n. 13. Kniph. cent. 3. n. 17.

A. caule erecto paniculato, pedunculis folio longioribus, floribus sparlis. Hort. cliff. 362. Roy. lugd^b 391.

A. caulescens erectus, pedunculis axillaribus folio aequalibus crebris, floribus secundis cernuis, leguminibus pendulis triquetro-biventricosis pubescentibus. Pall. Astrag. p. 35. n. 38. t. 29.*

A. orientalis altissimus, galegae foliis angustioribus, flore e viridi flavescente. Tournef. cor. 29.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 685.

Geisrautenartiger Traganth. W.

Habitat in Armenia et ad Caucasum. 24 (v. v.)

Caulis bipedalis, strictissimus, glaber. Folia pinnata ex 25 ad 31 foliolis: petiolo basi tumido. Flores racemosi, penduli, flavo-albicantes. Legumina glabra, brevia, triquetra, acuta, intra calycem pedicellata. Semina utrinque 2.

35. ASTRAGALUS chinensis.

A. canescens erectus strictus glaber, foliolis ellipticis obtusis, floribus racemosis pendulis, leguminibus ovatis inflatis transversim rugosis utrinque mucronatis. W.

A. caulescens strictus glaber, floribus racemosis pendulis, leguminibus ovatis inflatis utrinque mucronatis.

Lin. decad. I. t. 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 686.

Chinesischer Traganth. W.

Habitat in China. 24

*36. ASTRAGALUS virescens.

A. caulescens erectus glaber, foliolis lanceolatis acutis, racemis folio longioribus, leguminibus compresso-triquetris falcatis acutis pendulis. W.

A. (*virescens*) caulescens erectus, leguminibus recurvatis, pedunculis multifloris folio longioribus, foliolis lanceolatis acutis. *Ait. Kew. 3. p. 73.*

A. (*falcatus*) caulescens erectus glaber, leguminibus racemosis pendulis falcatis. *Vahl symb. I. p. 58.**

A. (*falcatus*) caulescens erectus subglaber, floribus subspicatis, leguminibus pendulis compressis falcatis. *Lamarch encycl. I. p. 307.* Desf. atl. 2. p. 188. t. 206.**

A. (*falcatus*) caule adscendente ramoso, foliis patentillimis, pedunculis elongatis racemosis, leguminibus triquetris recurvis pendulis. *Pall. Astrag. p. 34. n. 37. t. 28.**

A. floribus racemosis pedunculis folio longioribus, calycibus glabris. *Gmel. fib. 4. p. 41.*

A. orientalis altissimus Galegae foliis amplioribus flore parvo flavescente. *Tournef. cor. 29.*

Grünlicher Traganth. W.

Habitat in apricis herbidis irriguis provinciae Iseten-

*sis Sibiriae, inque Armenia et in Algeria ad radices
Atlantis. 24 (v. f.)*

37. ASTRAGALUS uliginosus.

- A. caulescens erectus, foliolis oblongis pubescentibus, spicis pedunculatis, bracteis oblongis calycis longitudine, leguminibus oblongis tumidis recurvo-mucronatis. W.
 A. caulescens erectiusculus, floribus spicatis, leguminibus erectiusculis nudis tumidis tereti-depressis, mucrone reflexo. *Hort. upf. 226. Gmel. fib. 4. p. 40. t. 17. 18.*
 A. caulescens erectus, pedunculis supraaxillaribus sulcatis, leguminibus erectis cylindraceis fuscis. *Pall. Afrag. p. 31. n. 35. t. 26.**
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 687.
 Sumpf-Traganth. W.
Habitat in Sibiriae pratis subhumidis. D. Gmelin. 24 (v. v.)
Similis A. Ciceri, dematis leguminibus. Carina apice violaceo.

38. ASTRAGALUS carolinianus.

- A. caulescens erectus, foliolis oblongis subtus pubescens, spicis pedunculatis, bracteis lanceolatis pedunculi longitudine, leguminibus ovatis tumidis rostratis. W.
 A. caulescens erectus laevis, pedunculis spicatis, leguminibus ovato-cylindricis stylo acuminatis. *Mill. dict. n. 15. Walt. carol. 183.*
 A. floribus racemosis, pedunculis longitudine foliorum, caule erecto, calycibus glabris. *Roy lugdb. 391.*
 A. proceior non repens, flore viridi-flavescente. *Dill. elth. 45. t. 39. f. 45.*
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 7. p. 688.
 Carolinischer Traganth. W.
Habitat in Carolina. 24 (v. f.)
Folia subtus lanuginosa, parium saepe 20. Legumina ovata. Radix non repens.
Planta a praecedente certo diversa, praecipue: Bracteis brevissimis longitudine pedunculi, nec oblongis

*coloratis calycem aequantibus, et Legumine ovato
stylo longo erecto persistenti instructo.* W.

*39. ASTRAGALUS *Schanginianus.*

A. caulescens erectus pubescens, foliolis ovato-oblongis,
racemis subcapitatis petiolo brevioribus, leguminibus
oblongis pendulis. W.

A. subcaulescens lanuginosus, foliis quidecimjugis
elongatis, scapis folio brevioribus declinatis, corollis
flavis, leguminibus triquetro-cylindraceis acuminatis
pubescentibus callotis bilocularibus. Pall. Astrag. p.
77. n. 84. t. 63.*

Schanginischer Traganth. W.

Habitat in Sibiria, versus montes Altaicos. 24

Caules erecti triunciales. Folia impari-pinnata
sexpollicaria vel pedalia quidecimjuga. Foliola ova-
to-oblonga ut tota planta pilosa. Sipulae lanceola-
tae elongatae patulae laxae. Racemi axillares subca-
pitati petiolo breviores. Flores magnitudine praece-
dentium flavi. Legumina oblongo-cylindracea stylo
mucronata hirsuta. W.

+++ Caulibus foliosis, diffusis.

40. ASTRAGALUS *canadensis.*

A. caulescens diffusus, leguminibus subcylindricis mu-
cronatis, foliolis subtus nudiusculis. Gron. virg. 107.
Dodart. mem. t. 65. Mill. dict. n. 16.

A. caulescens diffusus, leguminibus subcylindricis mu-
cronatis, foliolis subtus villosis, floribus flavescentibus,
Walt. carol. 183.

A. canadensis, flore viridi flavescente. Tournef. inst. 416.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 688.

Canadicher Traganth. W.

Habitat in Virginia, Canada. 24

Caules prostrati, teretes. Pedunculi striati. Radix
repens. Foliola utrinque glabra, subtus glaucescentia,
parium 10. Calyx laevis, viridis, nec ullibi fuscus.
Corolla totae flavae. Antherae eroceae. Legumen
dorso inferiore concavo, cylindricum, oblongum, de-
presso styllo mucronatum.

Simillimus A. caroliniana.

* 41. ASTRAGALUS *odoratus*.

A. caulescens decumbens, foliolis glabriusculis oblongis acutiusculis, stipulis oppositotitiis solitariis bifidis, racemis folio longioribus, leguminibus cylindraceis glabris. W.

A. caulescens debilis, floribus leguminibusque erectis, bracteis subulatis. Lamarck encyl. I. p. 308.

A. orientalis angustifolius, caule pedali, flore ex viridi-flavescente odoratissimo. Tournef. cor. 29.

Wohlriechender Traganth. W.

Habitat in Oriente. 4 (v. s.)

Affinis praecedenti. Folia impari-pinnata decem-juga, foliolis lineari-ellipticis basi rotundatis apice acutis, superne glabris, inferne pilis adpresso tectis. Stipula solitaria lanceolata bifida oppositifolia membranacea. Racemi pedunculati axillares folio longiores. Flores virescentes ab initio erecti, demum reflexi. Legumina oblongo-cylindracea stylo longo persistente mucronata glabra, matura etiam reflexa. W.

42. ASTRAGALUS Cicer.

A. caulescens prostratus, foliolis glabriusculis oblongis obtusis mucronatis, stipulis lanceolatis, racemis pedunculatis folio longioribus, leguminibus subgloboso-inflatibus mucronatis pubescentibus. W.

A. caulescens prostratus, leguminibus subglobosis inflatis mucronatis pilosis. Hort. upf. 220. Mill. dict. n. 4. Crantz aust. p. 413. Jacq. aust. t. 251. Scholl. barb. n. 587. Kniph. cent. 8. n. 10. Hoffm. germ. 262. Roth germ. I. 311. II. 191.

A. leguminibus subglobosis, floribus spicatis, caule erecto. Hort. cliff. 362. Roy. lugdb. 392.

A. caulescens prostratus, pedunculis folio longioribus spicatis, leguminibus didymo inflatis pilosis bilocularibus. Pall. Afrag. p. 87. n. 42.

A. caule ramoso, diffuso, spicis erectis, siliquis inflatis, rotundis, unguiculatis. Hall. helv. n. 409.

Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis, majus. Bauh. pin. 247.

Cicer sylvestre. Cam. epit. 205.

Glaux. Riv. t. 108. Hall. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 689.

Kichernartiger Traganth. W.

Habitat in Austria, Helvetia, Italia, Germania, Russia.

24 (v. v.)

Foliola oblonga, sub lanceolata sunt.

Foliola subtus pilis adpressis obsita. W.

43. ASTRAGALUS glycyphyllos.

A. caulescens prostratus, foliolis glabris ovatis obtusis mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis, racemis pedunculatis folio brevioribus, leguminibus subtriquetris arcuatis. W.

A. caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. Sp. pl. 1067. Mill. dict. n. I. Neck. gallob. 312. Crantz austri. p. 414. Scop. carn. n. 919. Pollich. n. 695. Riv. t. 103. Hoffm. germ. 262. Roth. germ. I. 312. II. 192.

A. caulescens glaberrimus, foliolis ovalibus subquinque jugis, pedunculis subcapitatis paucifloris axillaribus, leguminibus falcatis triquetro-canaliculatis. Pall. Astrag. n. 102.

A. caule prostrato, foliis ovatis, scapis brevibus racemosis, siliquis subtriquetris incurvis. Hall. helv. n. 413.

A. leguminibus lunatis biventricosis, caulis procumbentibus. Hort. cliff. 362. Pl. suec. 591.; 658. Roy. lugdb. 392.

A. luteus perennis procumbens vulgaris. Morif. hist. p. 107.

Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescensibus. Bauh. pin. 352.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 690.

Süßholzblättriger Traganth. W.

Habitat in Europae nemoribus. 24 (v. v.)

*44. ASTRAGALUS lanatus. †

A. caulescens prostratus villoso-pubescentis, pedunculis ubique axillaribus folia aequantibus, leguminibus subulato-acuminatis villosis. Pall. Astrag. n. 113. t. 81. *

Astragaloides montana incana major flore albo. Barr. ic. 557.

Wolliger Traganth. W.

Habitat in Tauria. 24

Corolla flavescens alba major Suam in A. piloso nec Flores nutantes. Pall. l. c.

*45. ASTRAGALUS tunetanns. W.

A. caulescens prostratus, foliolis obcordatis, stipulis ovatis, racemis folio longioribus, leguminibus compressis falcatis. W.

A. (*leptophyllum*) caule procumbente, foliolis obcordatis, pedunculis axillaribus, floribus capitatis, leguminibus falcatis compressis nutantibus. Desf. atl. 2. p. 188. t. 207. *

Tunetanischer Traganth. W.

Habitat in regni Tunetani montibus Sibiae. 24

Caules ex eodem caespite plures pedales prostrati vel procumbentes, pubescentes villis brevissimis adpresso. Folia brevissime pubescentia. Pinnulae minimae obcordatae truncatae emarginatae. Stipulae parvae ovatae. Pedunculi axillares folio paulo breviores. Flores capitati terminales conferti subeffiles, magnitudine A. depressi. Calyx parvus quinquedentatus, dentibus acutis. Corolla alba. Vexillum elongatum obtusum, alas et carinam superans, margine sursum reflexo. Alae carina longiores. Legumen falcatum nutans compressum acutum magnitudine A. hamosi, junius pubescens. Desf. l. c.

46. ASTRAGALUS microphyllus.

A. caulescens prostrato-adscendens, foliolis ovatis pilosifusculis, stipulis solitariis oppositifoliis bipartitis, spicis pedunculatis folio longioribus, leguminibus subrotundis inflatis villosis. W.

A. caulescens erecto-patulus, foliolis ovalibus, calycibus tumidiifusculis, leguminibus subrotundis inflatis. Sp. pl. 1067. Hoffm. germ. 262. Roth. germ. I. 311. II. 191.

Cicer foliis oblongis hispidis minus. Bauh. pin. 347. Houittyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 690.

Kleinblättriger Traganth. W.

Habitat in Harcynia, Thuringia. 24 (v. s.)

Habitus A. Ciceris dicti, at quadruplo minor. Cau lis erectus flexuosus pedalis non glaber. Rami paten-

tes breviores. Folia pinnata: foliolis 13. f. 15, ova-
libus obtusis interdum emarginatis. Stipulae subula-
tæ minimaæ. Pédonc. à solitarii foliis longiores su-
perne floribus horizontalibus instructi. Calyxæ glabri
subrotundi parum ventricosi, pilis raris vix conspicuis
adspersi. Corolæ flavæ calyce duplo longiores. Le-
gumina subrotunda inflata villosa.

Specimen meum quod Clarisf. Floerke in Thuringia legit, convenit exacte cum descriptione, differt solummodo respectu stipularum, quae parvae solitariae oppositifoliae lanceolatae profunde bipartitæ. Folia pilis raris longis tenuibus sunt obsoleta; inferiora foliola obtusa, quandoque emarginata; superiora, acutiuscula gerunt. Reliqui characteres convenient; sed de flore nihil dicam, cum specimenia jam deflorata erant. Inter Astragalos Pall. sii hunc non reperio. W.

*47. ASTRAGALUS *parviflorus*.

A. caulescens adscendens, foliolis ovato-lanceolatis deflexis pilosis, spicis pedunculatis folio longioribus, leguminibus lanceolatis pendulis unilocularibus hirsutis. W.

A. (*parviflorus*) caulescens procumbens hirsutus, foliis pectiniformibus, spicis parvis longe pedunculatis. *Lamark encycl.* I. p. 310. *

A. (*hians*) caulescens adscendens villosus, leguminibus oblongis hamatis hirsutis, altera futura antice hiantibus. *Jacq. ic. rar.* I. t. 153. *Collect.* I. p. 87. *

A. (*retroflexus*) caulescens patens, foliolis floribusque reclinatis, leguminibus deflexis oblongo-mucronatis scaphoideis unilocularibus. *Pall. Astrag.* p. 33. n. 36. t. 27. *

Astragalus deflexus. *Pall. Act. Petrop* 1779. *Pars. 2.* p. 260. tab. 15. * *l' Herit. stirp.* 167. t. 80. *

Kleinblümiger Traganth. W.

Habitat in scaturiginosis frigidis alpium Transbaicalensium et circa lacum Baical. ♂ (p. v.)

Planta distinctissima filiolis deflexis. W.

48. ASTRAGALUS *trimestris*.

A. caulescens, scapis subbifloris, leguminibus hamatis subulatis bicarinatis. *Syst. veg.* 568. *Jacq. hort.* 2. p. 81. t. 174.

A. subacaulis, scapis subbifloris, leguminibus hamatis subulatis bicarinatis. Sp. pl. 1073

Phaca leguminibus arcuatis. Roy. lugdb. 390.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 700.

Dr. ymnatlicher Traganth. W.

Habitat in Aegypto. ○

Caules depresso ad terram rigentes spithamei rubri, pilis adpresso albis. Folia radicalia inter caules, caulina bifaria. Foliola emarginata. Flores stavi apice subfulvi Legumina subulata subscabra recurva, apice ipsam basin tangente.

Hanc cum sequenti conjungunt Clariss. Viri Lamarck et Pallas. Accepi saepius sub hoc nomine A. hamosum. W.

49. ASTRAGALUS hamosus.

A. caulescens procumbens, foliolis cuneatis emarginatis, stipulis ovatis, racemis paucifloris pedunculatis folio brevioribus, leguminibus hamatis subulatis glabris. W.

A. caulescens procumbens, leguminibus subulatis recurvatis glabris, foliolis obcordatis subtus villosis. Hort. upf. 226. Sauv. monsp. 237. Gron. orient. 223. Mill. dict. n. 2. Kniph. cent. II. n. 15. Desf. atl. 2. p. 187.*

A. leguminibus pendulis recurvis falcatis. Hort. cliff. 362. Roy. lugdb. 392.

A. caulescens, foliolis retuso emarginatis subdecemjugis, pedunculis axillaribus, leguminibus cylindrico-prismaticis sursum recurvis canaliculatis. Pall. Astrag. n. 109.

A. siliqua curva. Riv. tetr. 221.

A. monspeliacus. Clus. hist. 2. p. 234.

Securidaca lutea minor, corniculis recurvis. Bauh. pin. 349

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 691.

Hakenfrüchtiger Traganth. W.

Habitat in Mellanae, Monspelii, Barbariae arvis. ○
(v. v.)

Caulis saepius decumbens, rarius erectus. Foliola obcordata, subtus villosa. Pedunculi foliis aequales

aut longiores. Spicae pauciflorae, 4 s. 5 floribus. Flores leucophaei, remoti. Legumina declinato-hamosa, acutissima, apice a basi distincto.

Planta spontanea albo-pubescent, culta fere glabra. W.

*50. ASTRAGALUS annularis.

A. caulescens diffusus, leguminibus subulatis incurvis glabris, foliolis obovatis. *Vahl symb. I. p. 58.*

A. (*annularis*) caulescens diffusus, leguminibus hamatis compressis introrsum canaliculatis. *Forsk. descr. 139.**

A. (*maculatus*) caulescens pilosus, pedunculis subbifloris, leguminibus subulatis incurvis, maculis purpurentibus notatis. *Lamarch encycl. I. p. 313.**

Ringförmiger Traganth. W.

Habitat in Aegypto.

Pilosus. Habitus A. hamosi. Foliola 9 obovata alterna. Stipulae lanceolatae breves. Racemi pauciflori, floribus 3-4. Bractea setacea ad basin pedicellorum longitudine calycis. Legumina pollicaria compressa incurvata glabra purpureo-maculata. Vahl. l. c.

*51. ASTRAGALUS scorpioides.

A. caulescens erecto-patulus pubescens, foliolis oblongis obtusis emarginatis, stipulis lanceolatis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, leguminibus hamatis subulatis pubescentibus. W.

Astragalus scorpioides. Pourret.

Scorpions-Traganth. W.

Habitat in Hispania. ⊙ (v. f.)

Caules tres vel plures ex una radice perpendiculari simplici, pubescentes erecto-patuli. Folia impari-pinnata octojuga, foliolis oblongis obtusis emarginatis pubescentibus. Stipulae lanceolatae adpressoae. Flores coerulei axillares solitarii subsessiles. Legumina A. hamosi sed pubescentia. Similis A. hamoso, sed floribus axillaribus subsessilibus solitariis coeruleis majoribus et leguminum pubescentia diversus. W.

52. ASTRAGALUS *contortuplicatus*.

- A. caulescens procumbens pubescens, foliolis obovatis emarginatis, racemis pedunculatis, leguminibus arcuato-contortis pubescentibus. W.
 A. caulescens procumbens, leguminibus contortuplicatis canaliculatis villosis. Sp. pl. 1068. Pall. it. I. p. 154. Kniph. cent. 8. n. II.
 A. acaulis, scapo foliis breviore, leguminibus subulatis canaliculatis retortis hirsutis. Hort. upf. 227. Gmel. fib. 4. p. 57. t. 28.
 A. caulescens prostratus, foliolis suboctojugis emarginatis, pedunculis axillaribus brevissimis glomeratis, leguminibus flexuoso-contortis membranaceis. Pall. Astrag. n. 108. t. 79.*
 A. repens, siliquis undulatis. Buxb. cent. 3. p. 22. t. 39.
 A. siliquis recurvis depresso depressis hirsutis. Comment. goett. 2. p. 339. t. II.
 A. hirsutus procumbens, viciae foliis cordatis, siliquis incurvis. Amm. ruth. 164.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 692.
 Gedrehtfrüchtiger Traganth. W.
Habitat in Sibiriae, Hungariae locis falsuginosis herbis. ○ (v. v.)
Mire variat ex solo quoad magnitudinem et statu ram.

53. ASTRAGALUS *baeticus*.

- A. caulescens procumbens, foliolis oblongis obtusis mucronatis, spicis pedunculatis paucifloris, foliis brevioribus, leguminibus triquetris oblongis apice aduncis. W.
 A. caulescens procumbens, spicis pedunculatis, leguminibus prismatici rectis triquetris apice uncinatis. Hort. upf. 225. Mill. dict. n. 7. Kniph. cent. II. n. 14.
 A. caulescens, foliolis pubescentibus oblongis subduodecimjugis, pedunculis subcapitatis paucifloris axillaribus, leguminibus rectis triquetris uncinulo mucronatis. Pall. Astrag. n. 103.
 A. caule erecto, floribus spicatis, leguminibus oblongis acinaciformibus, apice recurvo. Roy. lugdb. 391.
Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. E e

- A. annuus**, foliis et siliquis longioribus glabris ad foliorum ortum communi pediculo innixis. *Pluk. alm.* 60.
A. lutens annuus baeticus maritimus rectus alter. *Morif. hist.* 2. p. 108. f. 2. t. 9. f. 11.
Securidaca sicula, siliquis foliaceis. *Boc. sic.* p. 7. t. 4. *Rai. hist.* 935.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 693.
Spanischer Traganth. W.
Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania, Tauria. ⊙
(v. v.)

54. ASTRAGALUS *Stella.*

- A. caulescens diffusus**, capitulis pedunculatis lateribus, leguminibus rectis subulatis mucronatis. *Syst. Veg.* 567. *Gouan illustr.* 50.
A. caulescens hirsutus, foliolis lanceolatis subdecemjugis, petiolis folio longioribus rigidis capitatis, leguminibus acuminatis subtriquetris hirsutis. *Pall. Afirag.* n. 105.
A. incanus villosus, foliolis linear-lanceolatis, pedunculis folio brevioribus leguminibus capitatis subulatis rectis stellatis sericeis. *Desf. atl.* 2. p. 187. *
A. annus maritimus procumbens latifolius, floribus pediculo insidentibus. *Tournef. inst.* 416.
A. hirsutus, corniculis plurimis uno pediculo stelliformiter adaptis. *Pluk. phyt.* 79. f. 4.
Astrag. annuus angustifolius flosculis pedunculis oblongis insidentibus. *Tournef.* 416.
Glauci leguminosae afunis. *Bauh. prodr.* 150.
Stella leguminosa. *Bauh. hist.* 2. p. 350. *Tabern. ic.* 512.
β A. (subulatus) caule prostrato villoso, foliolis obovatiss. incanis, pedunculis axillaribus folio longioribus, floribus capitatis, leguminibus rectis subulatis sericeis. *Desf. atl.* 2. p. 186. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 694.
Sternfrüchtiger Traganth. W.
Habitat in montosis siccis Galliae, Hispaniae, Africæ borealis. ⊙ (v. f.)
Differt ab A. sesameo Pedunculis elongatis leguminibusque plurimis.

55. ASTRAGALUS *sesameus*.

- A. caulescens diffusus, capitulis subsessilibus lateralibus leguminibus erectis subulatis acumine reflexis. *Hort. cliff.* 361. *Mill. dict.* n. 12.
- A. caulescens subpilosus, foliolis novemjugis emarginatis, capitulis axillaribus paucifloris subpedunculatis, leguminibus subulato-triquetris canaliculatis. *Pall. Astrag. n.* 104.
- A. annuus angustifolius, flosculis subcaeruleis. *Garid. aix.* 50. t. 12.
- A. annuus, foliis et siliquis hirsutis: plurimis in foliorum alis sessilibus. *Pluk. alm.* 60. t. 79. f. 3.
- Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato. *Bauh. pin.* 350.
- Vicia sesamea apnla. *Col. ecphr.* I. p. 303. t. 301.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 694.
- Sesamartiger Traganth. W.
- Habitat in G. Narbonensi, Italia.* ○ (v. v.)

Flores minutti, coerulescentes, axillares, sessiles, calyce non longiores. Legumina subterna, erecta, incurva, hispida, apice patula.

Flores luteos pronunciat *Gouan. illustr.* p. 50. n. 2. in nota. R.

*56. ASTRAGALUS *geniculatus*.

- A. caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, fructiferis deflexis, leguminibus oblongis triquetris villosis apice arcuatis. W.
- A. incanus, floribus capitatis, leguminibus hirsutis subarcuatis mucronatis dorso canaliculatis, pedunculis fructiferis deflexis. *Desf. atl.* 2. p. 186. t. 205.*
- Gegliederter Traganth. W.
- Habitat in Barbariae collibus aridis incultis prope Mafscar.* ○ (v. f.)

57. ASTRAGALUS *pentaglottis*.

- A. caulescens procumbens, foliolis oblongis retufis, capitulis pedunculatis folio brevioribus, leguminibus semiovatis compresso-triquetris acutis squamoso-echinatis. W.
- A. caulescens procumbens, leguminibus capitatis repli-

catis compressis conniventibus cristatis acumine reflexo.
Mant. 274.

A. (*dasyglottis*) *caulescens villoso-canus, foliolis retusis emarginatis subobtus-jugis, pedunculis capitatis folio brevioribus, leguminibus cordato-mucronatis.* *Pall. Astrag. n. III.*

A. (*echinatus*) *caulescens procumbens, leguminibus capitatis ovatis triquetris echinatis, apice hamoso.* *Murray. prod. 222. **

A. (*cristatus*) *caule diffuso, leguminibus capitatis hirsutis squamoso-strigolis ovato-triquetris.* *Gouan. ilustr. p. 50.*

A. *spinus tiliquis villosis glomeratis.* *Tournef. inst. 416.*
Gouan. R.

A. *hispanicus, siliqua epiglottidi simili, flore purpureo, major.* *Herm. lugdb. 74. t. 75.*

Glaux hispanica. *Riv. tetr. 223. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 695.

Fünftzlinger Traganth. W.

Habitat in Hispania. ☽ (v. v.)

Caules procumbentes, palmares. Folia pinnata: Foliola 15, oblonga, emarginata, subtus pubescentia. Perioli pilosi. Stipulae ovato-lanceolatae. Pedunculi axillares, decumbentes, foliis breviores, albo pilosi, capitati Floribus subquinis, terminalibus, purpureo-scentibus. Calyx subinflatus: dentibus longitudine tubi. Corolla subviolacea s. purpurascens. Legumina 5, ovata, compressa, exorosum conduplicata, incurva, verrucoso exasperata squamis, apice retrorsum hamata, conniventia.

58. ASRAGALUS epiglottis.

A. *caulescens procumbens, foliolis linearibus basi attenuatis, capitulis subfessilibus, leguminibus semioccatis acuminatis compressis reflexis pubescentibus.* W.

A. *caulescens procumbens, leguminibus capitatis fessilibus cernuis cordatis mucronatis replicatis nudis.* Mant. 274. Mill. dict. n. 5. Murray. prod. 173.

A. *siliquis cordatis acutis pendulis, lateribus conniventibus.* Hort. cliff. 362.

A. *caulescens annuus subpilosus, foliolis lanceolatis quinquejugis, capitulis axillaribus fessilibus, legumi-*

- nibus cordato acuminatis trigonis, subtus scrobe canali-
culatis. *Pall. Astrag. n. 110.*
- A. hispanicus**, siliqua epiglottidi simili, flore albo, mi-
nor. *Herm. lugdb. 76. t. 77.*
- Glaux minima**, *Riv. tetr. 223. f. 1.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 696.*
- Vielzunger Traganth. W.
- Habitat in Orientis, Hispaniae, Galloprovinciae sylvis
montosis. ⊖ (v. v.)*
- Corollae albae.*

59. ASTRAGALUS *hypoglottis.*

- A. caulescens procumbens**, foliis oblongis obtusis, spi-
cis ovatis pedunculatis folio longioribus, leguminibus
erectis ovatis canaliculatis pilosis. W.
- A. caulescens prostratus**, leguminibus capitatis ovatis
replicatis compressis pilosis acumine reflexo. *Mant.*
*474. Desf. atl. 2. p. 183. **
- A. caulescens prostratus**, floribus capitatis, leguminibus
ovatis dorso canaliculatis pilosis apice aduncis. *Smith.
brit. 3. p. 779. **
- A. (arenarius) caulescens debilis**, pedunculis folio lon-
gioribus, leguminibus ovato-acuminatis cano-villo-
sis. *Pall. Astrag. p. 43. n. 46. t. 34. **
- Astragalus arenarius.** *Huds. angl. 323. Relh. cantab.
278. Fl. dan. t. 614. Leyss. halens. n. 732.*
- A. (danicus) caulescens decumbens hirtus**, capitulis lon-
ge pedunculatis, leguminibus brevibus inflatis pilosis.
Retz obs. bot. 3. p. 41. Hoffm. germ. 263. Roth
germ. I. 312. II. 193.*
- Astragalus Glaux.** *Villars delph. 3. p. 459.*
- A. caulescens diffusus** capitulis pedunculatis imbricatis
ovatis, floribus erectis, leguminibus ovatis callosis.
Gmel. fib. 4. p. 46. t. 23. f. A.
- A. incanus parvus purpureus nostras.** *Raj. synop. 326.
t. 12 f. 3.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 696.*
- Wiesen-Traganth. W.
- Habitat in arenosis humidiisculis Germaniae, Galliae,
Rossiae, Daniae, Angliae inque montosis Barbariae.*
- 24 (v. v.)*
- Similitudinem gerit cum A. pentaglotto, sed magis*

caulescens. Capitula pedunculata pedunculo similiter elongato. Flores plures ad 8 f. 10, in capitulo rotundato more trifolii, coerulei aut purpurascentes. Legumina replicata, ovata (non subulata,) acumine duplice (in maturis,) subulato, recurvo; tecta pilis (non squamis furfuraceis) longis, albis, mollibus, minime autem in orbem expansa, quemadmodum in *A. Stella*, neque subulata, ut in *A. sesameo*.

Variat foliis glabris et pubescentibus. W.

60. ASTRAGALUS syriacus. †

A. *caulescens procumbens*, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomentosis ovato-oblongis.
Sp. pl. 1069.

A. *syriacus hirsutus.* *Bauh. pin. 351?*

A. *syriacus.* *Lob. ic. 79?*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 697.

Syrischer Traganth. W.

Habitat — — — — 4

Planta refert figuram authorum, sed altior est; facie proprie accedit ad *A. arenarium*, a quo differt Planta triplo majore, minus incana; Floribus numerosis capitato-spicatis, nec racemosis: Floribus triplo majoribus magis reflexis. Sunt etiam Folia linearis-lanceolata. Legumina oblonga, pilosa, erecta.

Planta valde obscura. W.

*61. ASTRAGALUS humifusus. W.

A. *caulescens prostratus*, foliolis oblongis obtusis villosis, capitulis paucifloris pedunculatis folio longioribus, leguminibus oblongis acutis erectis villosis. W.

A. *orientalis humifusus* foliis Viciae, flore parvo coeruleo, siliquis villosis. *Tournef. cor. 28.*

Gestreckter Traganth. W.

Habitat in Cappadocia. 4. (v. f.)

Caules filiformes prostrati basi ramosi quinquepollicares pubescentes. Folia impari-pinnata bipollicularia albo-villosa, undecimjuga. Foliola unguicularia parva oblonga obtusa, versus apicem petioli communis sensim parum minora. Flores magnetudine *A. hamosi coerulei* patentes 3 f. 6 in capitulum longe pedunculatum collecti. Calyx pilis albidis obsitus, dentibus

lanceolatis. Legumina villosa erecta fere ejusdem formae ac in A. baetico sed non compressa. W.

*62. ASTRAGALUS leontinus.

A. caulescens decumbens, foliolis ellipticis obtusis, spicis oblongis pedunculatis folio longioribus, leguminibus oblongis teretibus hirtis. W.

A. caulescens prostratus, leguminibus ovatis villosis, floribus spicatis erectis. *Jacq. ic. rar. I. t. 154. Misc. 2. p. 59.* Host. synop. 409.*

Tyroter Traganth. W.

Habitat in alpibus Tyrolensisbus, Helveticis. 24 (v. f.)

Caules breves decumbentes. Folia impari-pinnata. 9-s. 12 juga. Foliola elliptica obtusa glabra, subitus pilis adpresso tecta. Stipulae solitariae oppositifoliae bipartitiae lanceolatae marcescentes. Spica oblonga floribus laete coeruleis erectis. Calyces pilis nigricantibus obtuti, dentibus ovatis acutis. Pedunculus communis foliis longior pilis nigricantibus, praesertim sub spica tectus. Legumina calyce parum majora oblonga teretia nigro-pilosa. W.

*63. ASTRAGALUS tauricus.

A. caulescens patulus, foliolis linearibus tomentosis, spica pedunculata terminali, leguminibus ovatis acutis. W.

A. (*tauricus*) patulus subcaulescens, pedunculis floriferis folio multoties longioribus erectis spicatis, leguminibus ovato-acuminatis bilocularibus dispermis.

Pall. Astrag. p. 48. n. 51. t. 38. (exclusis synonymis.)*

Taurischer Traganth. W.

Habitat in glareoso-margaceis et cretaceis Tauriac.

24 (v. f.)

Caules numerosissimi basi divisi ex una radice cespitosi patuli albo-tomentosi. Folia impari-pinnata 5 s. 6 juga albo-tomentosa. Folia linearia acutiuscula vix petiolo communi latiora. Stipulae ovatae petiolo adnatae. Pedunculi solitarii albo-tomentosi foliis multoties longiores in apice caulis. Flores violacei laxe spicati in apice pedunculorum. Legumina ovata acuminata cana bilocularia, loculis monospermis. Di-

versissimus a praecedente, quo cum Illust. Pallas con-
junxit. W.

*64. ASTRAGALUS lunatus. †

A. caulescens glaber perennis, foliis sparsis pedunculo
brevioribus, leguminibus triquetro-lunatis. Pall.
Astrag. p. 44. n. 47.

A. parvus siliquis falcatis. *Buxb. cent.* 3. p. 20. t. 36.
f. 2?

Mondfrüchtiger Traganth. W.

Habitat in Persia. †

Planta circiter pedalis trunko sublignoso tenui pe-
renni subramoso. Folia pulchre pinnata, foliolis linea-
ri-lanceolatis crebris paucim alternis 15 saepe parium.
Pedunculi longissimi saepe axillares et terminales, vel
tantum terminales fulcati subdecemflori. Flores non
vidi. Legumina situ patula lunata triquetro-bilocu-
laria glabra cornea. Pall. l. c.

65. ASTRAGALUS austriacus.

A. caulescens procumbens, foliolis linearibus truncatis
emarginatis, racemis pedunculatis folio longioribus,
alis corollae bifidis, leguminibus triquetris lanceolatis
pendulis. W.

A. caulescens procumbens, floribus racemosis, legumi-
nibus utrinque acutis pilosis, foliolis linearibus emar-
ginatis. *Sp. pl.* 1070. *Jacq. vindb.* 263.* *Jacq. aust.*
t. 195. *Hosf. synops* 409.

A. (*dichopterus*) caulescens patulus, pedunculis flori-
feris axillaribus, alis corollae bifidis, leguminibus tri-
quetris acuminatis. Pall. *Astrag.* p. 49. n. 52. t. 39.*

Onobrychis floribus viae dilute coeruleis. *Bauh.*
pin. 351.

Onobrychis 2. *Cluf. hist.* 2. p. 239.

Oestreichischer Traganth. W.

*Habitat in Austria, Moravia, Hungaria, Rossia austri-
iore et in Tauria.* 24 (v. v.)

Diversus ab affinibus: alis corollae bifidis. W.

*66. ASTRAGALUS subulatus.

A. caulescens procumbens ultraicosus, foliolis linear-
lanceolatis tomentolis, racemis pedunculatis folio lon-

gioribus, leguminibus linearis - subulatis triquetris erectis. W.
A. caulescens suffruticosus, foliis linearibus paucijugis, pedunculis elongatis paucifloris, leguminibus linearibus subulatis canalculatis. *Pall. Astrag. p. 22. n. 27. t. 20. A. B.**

A. caulis subramosis prostratis, floribus capitatis, leguminibus subulatis. *Gmel. sib. 4. p. 51.*

Pfriemfrüchtiger Traganth. W.

*Habitat in Tauriae rupeſtribus, inque Sibiria. 5
(v. f.)*

Planta facie *A. arenarii polymorpha*, dignoscitur facile leguminibus linearis - subulatis, caneq e suffuticofo. *Taurica planta procerior vexillo violaceo basi albo, carina alisque rubris; altaica humilior floribus violaceis et albis.* Varietates vero *A. subulati uralensis et macilenti Tab. 20. C. B. depictae videntur dif-ferre.* W.

67. ASTRAGALUS arenarius.

A. caulescens ramosus prostratus, foliolis linearis lanceolatis sericeis complicatis, racemis subsexfloris foliolongioribus, leguminibus oblongis pubescentibus. W.

A. subcaulescens procumbens, floribus subracemosis erectis, foliolis tomentosis. *Fl. suec. 2. n. 659.*

A. caulescens ramosus erectus tomentoso-albus, foliolis complicatis, pedunculis subquadrifloris. *Retz. obs. 3. p. 41. t. 3.**

A. pedunculis folia villosa aequantibus, floribus erectis, caulis procumbentibus. *It. scan. 108.**

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. p. 698.

Sand-Traganth. W.

Habitat in arenosis Germaniae, Scaniae. 4 (v. v.)

Caules ramosi semipedales vel pedales humifusi nec erecti, ut tota planta albi sericei. Folia impari pin-nata 3-4-5 vel 6 juga. Foliola linearis-lanceolata complicata. Stipulae solitariae membranaceae oppositi foliae ovatae bifidae. Racemi quadri vel sexflori foliis parvum longiores. Corolla coerulea. Legumina oblonga teretiuscula sulco tenui exarata pubescentia styllo terminata, et levissime arcuata. W.

*68. ASTRAGALUS leucophaeus.

- A. caulescens procumbens, foliolis obcordatis subtus sericeis, racemis pedunculatis folia subaequantibus, leguminibus teretibus lanceolatis patentibus glabris. W.
 A. caulescens procumbens, leguminibus subcylindricis rectis glabris, foliolis obcordatis subtus villosis. Smith
Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 252.

Weissbrauner Traganth. W.

Habitat — — — — 2 (v. v.)

Caules breves digitales procumbentes. Folia imparipinnata 13-15 juga. Foliola obcordata superne glabra subtus sericeo-pubescentia obcordata, infima bina alterna. Stipulae ampliae membranaceae ovatae margine ciliatae. Racemi primum capitati, dein magis elongati unciales vel sesquiunciales longe pedunculati. Pedunculi inferiores foliis parum longiores superiores vere foliis breviores. Corolla albida, vexillo exterae et margine interiore livido-coerulecente. Legumina glabra patentia tereti-lanceolata. W.

Similis *A. depresso* sed caulis parum longior, foliola obcordata, racemi longe pedunculati foliorum fere longitudine. W.

69. ASTRAGALUS depressus.

- A. subcaulescens procumbens, foliolis obovatis, racemis petiolo brevioribus, leguminibus teretibus lanceolatis reflexis. W.
 A. acaulis, scapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis subemarginatis nudis. *Amoen. acad.* 4. p. 327.* *Allion. pedem.* n. 1277. t. 19. f. 3. *Villars delph.* 3. p. 455.
 A. subcaulescens, foliolis ovato retusis subduodecemjugis distantibus, pedunculis axillaribus brevissimis racemosis, leguminibus teretibus acuminatis cernuis. *Pall. Afrag.* n. 107.
 A. lupinus minor, flosculis albis. *Boerh. lugdb.* 2. p. 54.
 A. pyrenaicus foliis viae subrotundis non ramosus, flore ochroleuco glomerato. *Tournef. inst.* 417. *Pluk. phytog.* t. 79. f. 5.
 Niedergedrückter Traganth. W.

Habitat in Pyrenaeis inque alpibus Delphinatus, Sambardiae. 24. (v. v.)

Non est verus acaulis sed caule brevissimo gaudet. Plantae spontaneae albo-pubescentes, cultae fere glabrae. W.

70. ASTRAGALUS Glaux.

A. caulescens diffusus, capitulis pedunculatis imbricatis, ovatis, floribus erectis, leguminibus ovatis callosis inflatis. *Sp. pl. 1069.*

A. caulescens decumbens, pedunculis folio longioribus, spicis brevissimis confertis, leguminibus ovato-triquetratis mucronatis lanatis. *Pall. Astrag. p. 36. n. 41.**

Ciceri sylvestri minori affinis. Bauh. pin. 347.

Glaux dioscoroidis. Clus. hist. 2. p. 240. t. 241.

Houttireyn Lin. Pst. Syst. 8. p. 680.

Kleinköpfiger Traganth. W.

Habitat in Hispania. ○

Radix lignosa. Caules spithamei, plurimi, superne magis subvilloosi. Folia pinnata: foliolis 21 s. 23, minimis, ovali-oblongis, subtus pilis albis adspersis. Pedunculi ex summis foliorum alis, foliis saepius breviores, pilosi. Capitulum Trifolii facie, ovatum, calycibus ante et post florescentiam apicibus nigris. Corollae erectae, acuminatae, vexillo fere duplo longiores.

Planta vix digitalis tota pilosissima canescens. Folia pinnata paribus 8 ad 10. Foliola oblongo-linearia obtusa. Flores minuti sessiles densissime imbricati. Vexillum corollae valde elongatum lineare angustissimum. Legumina parva lanata brevissime ovato-mucronata bilocularia disperma. Pall. l. c.

Astragalus hypoglottis sub hoc nomine in hortis semper occurrit. W.

*71. ASTRAGALUS redundus. +

A. subcaulescens, foliolis quindecimjugis minutis, pedunculis folio longioribus depresso-depressis, leguminibus deorsum uncinatis. *Pall. Astrag. n. 114. t. 82.*

Astragalus hamosus. Pall. itin. 3. p. 655.

Krummschnablicher Traganth. W.

Habitat in imperio Ruthenico circa fluvium Cumam. 24

Opus Pallasii de Astragalis nondum ex toto editum, descriptionem hujus ulteriore adjicere haud permittit, hinc dubie proponam. W.

72. ASTRAGALUS. *sinicus.*

A. caulescens prostratus, umbellis pedunculatis, leguminibus prismaticis triquetris erectis apice subulatis.

Mant. 103. Mill. act. angl. 1765. p. 138.

A. (*lotoides*) caulescens glaber ramosus, foliolis subtriangularibus ovalibus, pedunculis axillaribus folio longioribus capitatis, leguminibus rectis triquetris acuminatis

Pall. Astrag. n. 106.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 699.

Peltischenartiger Traganth. W.

Habitat in China. ○ (v. f.)

Canes prostrati, spithamei, teretes. Folia pinnata: foliolis 7. f. 9. suborbiculatis, laevibus, tenuibus. Pedunculi adscendentibus, subangulati, foliis breviores. Flores umbellati, subsejiles, 9 f. 10. Vexillo emarginato, obcordato, lateribus reflexo, purpurascente; Alis albis; Carina purpurea. Legumen triquetrum, subitus planiusculum apice stylo uncinato reflexo. H. U.

Ab omnibus hucusque notis distinctus, floribus umbellatis ut in Coronillis. W.

*73. ASTRAGALUS *lineatus.*

A. caulescens prostratus, foliolis ellipticis obtusis villosis sericeis, spicis pedunculatis folio longioribus, vexillis elongatis, calycibus fructiferis inflatis ovatis nervosis. W.

A. caulescens decumbens, spicis pedunculatis, calycibus fructiferis ovalibus inflatis. *Vahl. symb. I. p. 59.* *

A. caulescens pumilus, foliolis obtusis villosis, floribus capitato-spicatis, calycibus defloratis vesicariis linearis. *Lamarck encycl. I. p. 311.* *

A. orientalis, calyce vesicario lineis rubris striato. *Tournef. cor. 29.*

Cest-eister Traganth. W.

Habitat in Oriente. 24 (v. f.)

Plantae Phacae vesicariae respectu calycis affinis,

Calices fructiferi inflati ovati legumen tegentes strüs decem rubris notati. Vexillum corollae oblongo-lanceolatum obtusum reliquis petalis duplo longius. W.

74. ASTRAGALUS albidus.

- A. caulescens diffusus suffruticosus canus, foliis quinquejugis, foliolis ellipticis obtusis, spicis pedunculatis folio longioribus, leguminibus oblongis villosis calycem aequantibus. W.
- A. (*albidus*) frutescens canus, caulis declinatis, floribus capitatis in pedunculis folia excedentibus, leguminibus ovatis hirsutis, calycibusque inflatis *Waldst.* et *Kitaibel pl. rar. hung.* I. p. 39. t. 40 * bona.
- A. (*vesicarius*) acaulos, scapis folio longioribus, floribus laxe spicatis, calycibus leguminibusque inflatis hirsutis. *Sp. pl. 1071.* *Allion. ped. n. 1269. t. 80. f. 1.*
- A. (*vesicarius*) ramosus canescens totus incanus, calycibus leguminibusque inflatis tomentosis, foliis subrotundis. *Villars delph.* 3. p. 563. t. 42. *
- A. alpinus tragan hae folio vesicarius. *Tournef. inst. 427. Magn. hort. 27. Kaj. suppl. 454.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syji.* 8. p. 702.
- Welschlicher Traganth. W.
- Habitat in alpibus Galliae, Italiae, Hungariae.* 5 (v. v.)
- Ab A. dealbato n. 16. abunde distinctus praeter alias notas, caule diffuso, et vexillo acuminato, nec emarginato, florumque colore. Est ceterum verus A. vesicularius Linnaei.* W.

*75. ASTRAGALUS nigrescens.

- A. canescens procumbens, foliolis oblongis hirtis, pedunculis bifloris, leguminibus oblongis inflatis pubescentibus unilocularibus. W.
- A. procumbens subcanescens, stipulis calycibusque nigro-villosis, pedunculis axillaribus bifloris, leguminibus maximis oblongo-inflatis pubescentibus unilocularibus. *Pall. Astrag. p. 65. n. 72. t. 53.* *
- Schwärzlicher Traganth. W.
- Habitat in imperio Ruthenico inter Aldaneum fluvium et Oceanum orientalem.* 4
- Caules plures ex una radice brevissimi procumbentes.*

Folia impari-pinnata uncialia quadri-f. quinquejuga, foliolis oblongis cano-hirtis. Pedunculi axillares bi-flori foliis breviores, Calyces nigro-pilos, dentibus lanceolatis. Corolla violacea. Legumen pollicare fuso-pubescent oblongum acutum inflatum uniloculare. W.

*76. ASTRAGALUS ornithopodioides.

- A. caulescens caespitosus, foliolis ovatis incanis, racemis pedunculatis, leguminibus subulatis recurvis hainatis, *Lamarck encycl. I. p. 305.**
- A. orientalis ramulos fructu adunco. *Tournef. cor. 29.*
Vogelfussartiger Traganth. W.
Habitat in Oriente. 24 (v. f.)

*77. ASTRAGALUS fragrans. W.

- A. caulescens procumbens, foliolis oblongis acutis pilos, spicis ovatis pedunculatis folia subaequantibus, bracteis ovatis membranaceis. W.
- A. orientalis minimus foliis viciae, flore ex viridi-flavescere odoratissimo. *Tournef. cor. 28.*
Schönriechender Traganth. W.
Habitat in Cappadocia. 24 (v. f.)
- Caules plures e radice, unciales procumbentes. Folia sesqui vel biuncialia impari pinnata 9 f. 10. juga, juniora incana, adulta viridia, foliolis oblongis utrinque acutis subtus pilis adpresso tectis. Stipulae magnae ovatae membranaceae adpresso arcte caulem tegentes. Bracteae ovatae membranaceae ad basin flororum. Calyces tubulosi pilis raris nigricantibus obsiti, dentibus subulatis nigro-pilos. Legumen non vidi. W.

*78. ASTRAGALUS declinatus. W.

- A. caulescens procumbens, foliolis oblongis obtusis pilos, racemis paucifloris confertis pedunculatis folio duplo brevioribus, leguminibus oblongis acutis pilos. W.
- A. orientalis acaulos fere, flore luteo. *Tournef. cor. 29.*
Gebeugter Traganth. W.
Habitat in Armenia. 24 (v. f.)
- Caules e radice plures diffusi brevissimi vix biuncia-

*les pilosi. Folia seminedalia et ultra impari-pinnata
15-juga. Foliola quadrilinearia oblonga obtusa ut pe-
tiolus communis pilosa obtusa, extrema sensim minora.
Racemi pedunculati vix triuncales 5-vel 8-flori. Ca-
lyces colorati pilosi, dentibus brevibus ovatis acumi-
natis. Corolla flavâ Legmina calyce duplo longiora
stylo persistenti acuminata pilosa.* W.

*Similis A. exscapo sed caulescens et floribus racemo-
fis distinctus. Huc pertinet Synonymon Tournefortii
a Linnaeo sub A. traganthoide citatum, non vero Bux-
baumii planta, quae a Tournefortiana diversissima.* W.

*79. ASTRAGALUS barbatus.

- A. caulescens decumbens, foliolis lanceolatis hispido-
villostis, spicis ovatis pedunculatis folia subaequantibus,
calycinis dentibus subulato-filiformibus corolla
longioribus hispido-villostis. W.
- A. caulescens diffusus hisutissimus, floribus capitatis,
pedunculis folia subaequantibus. Vahl. symb. I.
p. 58.*
- A. caulescens humilis dumosus villosissimus, spicis ova-
to subrotundis, foliolis oblongis integerrimis. La-
marck encycl. I. 311.*
- A. orientalis villosissimus, capitulis rotundioribus, flori-
bus purpureis. Tournef. cor. 29.
- β A. (*hispidus*) caulescens procumbens, foliolis legumini-
busque ovato-oblongis hispidis, corollis calyce brevio-
ribus. Billard. ic. pl. syn. dec. I. p. 18. t. 8.*

Bärtiger Traganth. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

*Tota planta pilis longis patentibus obsita et hispi-
do-villosa. Folia impari-pinnata 6-7. 8-juga, folio-
lis lanceolatis acutis. Stipulae lanceolatae setaceo-
acuminatae. Spicae ovatae pedunculatae, pedunculis
longitudine foliorum. Calyces tubulosi, dentibus fili-
formibus corolla longioribus hispido-villostis. Vexil-
lum corollae ovato-lanceolatum elongatum emarginatum.
Planta Billardieri differt modo, foliolis parum
obtusioribus, corollis flavescensibus, vexillo obtuso, et
est sola varietas.* W.

80. ASTRAGALUS *Onobrychis*.

- A. caulescens diffusus, pedunculis spicatis, vexillis flore duplo longioribus. *Sp. pl.* 1070. *Scop. carn.* n. 920. *Jacq. aust.* t. 38. *Hoffm. germ.* 262. *Roth. germ.* I. 311. II. 190.
 A. caulescens adscendens, vexillis corollae elongatis linearibus emarginatis. *Pall. Astrag.* p. 27. n. 31.*
 A. caule subrecto ramoso, foliis linearibus sericeis, vexillis longissimis. *Hall. helv.* n. 412.
Onobrychis spicata flore purpureo. *Bauh. pin.* 350.
Onobrychis quibusdam purpureo flore. *Bauh. hist.* 2. p. 537.
Onobrychis I. *Cluf. hist.* 2. p. 239.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 686.
 Langahniger Traganth. W.
Habitat in pratis siccis Helvetiae, Germaniae, Austriae, Sibiriae. 24 (v. v.)

*81. ASTRAGALUS *ad surgens*.

- A. caulescens adscendens, foliolis oblongis, spicis confertis pendiculatis terminalibus, leguminibus oblongo-lanceolatis canaliculato-triquetris pilotis. W.
 A. caulescens ramosus adscendens, spicis terminalibus confertis, leguminibus rectis triquetris canaliculatis. *Pall. Astrag.* p. 40. n. 44. t. 31.*
 A. caulis procumbentibus ramosissimis, pedunculis folio longioribus, floribus racemosis laxis, leguminibus glabris. *Gmel. fib.* 4. p. 37. t. 15.
 Aufsteigender Traganth. W.
Habitat in Sibiriae reginonibus Transbaicalensis. 24
 Caules adscendentes. Folia impari-pinnata 10-12-juga, foliolis oblongis acutis. Sipulae ovato-acuminatae. Spicae oblongae confertae longissime pedunculatae terminales. Flores purpurei. Leguminia oblongo-lanceolata triquetro canaliculata, pilis adpresso-raris obsita. Similis praecedenti. W.

82. ASTRAGALUS *Laxmanni*.

- A. caulescens procumbens, spicis elongatis, leguminibus oblongis trigonis fulco exaratis mucronatis villosis. *Lin. suppl.* 337. *Jacq. hort.* 3. p. 22. t. 38.*

A. caulescens decumbens, stipulis simplicibus, pedunculis axillaribus spicatis, leguminibus teretiusculis pilosis mucronatis. *Pall. Astrag. p. 38. n. 43. t. 30.*?

Laxmannischer Traganth. W.

Habitat in Siberia. 24

Caules diffusi. Folia pinnata 11 ad 12-juga. Pedunculi adscendentibus spicis longioribus. Bracteae setaceae. Calyx vilis atris decumbentibus nigrescens. Corolla coerulescens. Vexillum oblongum emarginatum. Legima parva villosa mucronata depressa ante in fulcum, dorso acuta, subbilocularia. Lin. suppl. l. c.

83. ASTRAGALUS alpinus.

A. caulescens procumbens, floribus pendulis racemosis, leguminibus utrinque acutis pilosis. *Sp. pl. 1070. Gmel. sib. 4. p. 45. Flor. dan. t. 51. Jacq. collect. I. p. 323.*

A. caulescens debilis, pedunculis axillaribus folio longioribus, calycibus leguminibusque nutantibus nigro-pubescentibus. *Pall. Astrag. p. 41. n. 45. t. 32.**

A. pedunculis folio longioribus, floribus laxe spicatis pendulis. *Hort. cliff. 362. Fl. Juec. 592.; 661. Roy. lugdb. 392.*

A. canis procumbente ramoso, foliis ovatis, siliquis intitatis, pendulis hirsutis. *Hall. helv. n. 404.*

A. a pinus minimus. *Fl. lapp. 267. t. 9. f. 1.*

A. a pinus, folio viciae. *Scheuch. alp. 509. f. 7.*

How tuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 700.

Alpen-Traganth. W.

Habitat in alpinus Lapponicus, Helveticis, Sibiricus. 24

(v. f.)

A. alpinus grandior ab Ill. Pallas. t. 32. depictus videtur species distincta. W.

*84. ASTRAGALUS pumilio.

A. subcaulescens prostratus, foliolis linear-lanceolatis subtus canis, pedunculis brevissimis bifloris folio brevioribus. W.

A. subacaulis foliis quadrijugis brevissimis, scapis folio brevioribus bifloris. *Pall. Astrag. p. 67. n. 74. t. 55.**

Zwerg-Traganth. W.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

F f

Habitat in insulis Curilis. 4

Caules brevissimi terrae adpresso. Flores majusculi coerulei. W.

* 85. ASTRAGALUS pygmaeus.

A. caulescens procumbens, foliolis lanceolatis pilosis, floribus axillaribus solitariis, leguminibus oblongo-lanceolatis pubescentibus. W.

A. caulescens prostratus, leguminibus exscapus solitariis oblongo-acuminatis inflatis unilocularibus. Pall.
*Astrag. p. 66. n. 73. t. 54.**

An gedrückter Traganth. W.

Habitat in terris arcticis Sibiriae ultimae orientalis. 4

Parvitate foliorum similis A. sanguinolento. n. 136. W.

86. ASTRAGALUS Ammodytes.

A. caulescens procumbens ramosissimus, foliis subquadrijugis sericeo-canis coniformibus obtusis, pedunculis axillaribus subgeminatis leguminibus ovatis didymis lanatis. W.

A. dichotomus, foliolis subnovenis inermibus cano-albidis, floribus lateralibus axillaribus subsolitariis. Pall.
Astrag. p. 7. n. 10. t. 5. Itin. 2. app. n. 119. t. X.**

A. caulescens suffruticosus, floribus geminis, leguminibus ovatis didymis lanatis. Lin. suppl. 338.

Mäuse Traganth. W.

Habitat in Sibiriae australis collibus arenosis. 4 (v. f.)

Radix profundissime demersa. Caules prostrati ramosissimi, lana intercepti. Folia pinnata longissime petiolata, foliolis quinque ad undecim oblongiusculis albo-lanatis. Flores laterales bini. Calyx albo lanatus. Corolla alba f. pallide violacea. Legumen ovatum ventricoso-didymum lanuginosum mucronatum. Semina reniformia lutea.

† † † † † *Caulescentes s. Acaules foliis verticillato-pinnatis.*

87. ASTRAGALUS dasyphyllus.

A. caulescens procumbens incanus, foliolis ternis verticillatis lanceolatis, spicis subcapitatis pedunculatis. W.

A. caulescens procumbens, foliolis ternatis subverticillatis tomentosis, leguminibus callosis lanatis inflato-ovatis. Pall. *Astrag. p. 91. n. 96. t. 75.* *

Phaca (sibirica) acaulis foliis pinnatis, foliolis digitatis.
Sp. pl. 1064.

A. radicibus caulescentibus, foliolis quaternis aut quinis caulem radiatim cingentibus. Gmel. *fib. 4. p. 63.*

Phaca lanata. Pall. *itin. 3. p. 746. t. A. a. f. 2. A.*

Phaca caulescens, foliolis quaternis lanceolatis obtusis sericeis, calyce villoso, dentibus setaceis. Lin. *suppl. 336.*

Astragaloides hirsuta minor non ramosa, floribus purpurascientibus. Amm. *ruth. 140. t. 19. f. I.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 681.

Wollenblättriger Traganth. W.

Habitat in arenosis aridissimis Sibiriae. 24 (v. f.)

Tota planta pilis albis mollibus vestita. Folia usque ad insertionem pinnata sericea. Pedunculi foliis breviores. Corollae purpureae. Legumina ovata lanata. Lin. *suppl. 1. c.*

88. ASTRAGALUS verticillaris.

A. acaulis, foliolis subulatis quaternis verticillatis pilosis, scapis spicatis folio longioribus, floribus inferioribus remotis, leguminibus lanceolatis tomentosis. W.

A. acaulis, foliolis aggregato-semiverticillatis. Mant. 275.

A. (myriophyllum) acaulis, foliis verticillatis pubescentibus, leguminibus callosis subulatis. Pall. *Astrag. p. 87. n. 93. t. 71.* *

Phaca myriophylla. Pall. *itin 3. app. n. 112. t. Z.*

A. pedunculis radicatis, foliolis linearioribus quaternis s. quinis radiatim caulem amplectentibus. Gmel. *fib. 4. p. 63.*

Astragaloides incana non ramosa, floribus carneis. Amm. *ruth. 150. t. 19. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 701.

Wirtelblättriger Traganth. W.

Habitat in Sibiriae arenosis. 24 (v. f.)

Folia pinnata, sed Foliola non ut in aliis solitaria, verum ad singulas insertiones 4. f. 5., unde folia erecta referunt caules fere verticillatos.

89. ASTRAGALUS *polyphyllus*. W.

A. acaulis, foliolis binis ternisque oblongis obtusis, scapo foliis longiore spica capitata, calycibus submuriatis. W.

A. (*microphyllus*) acaulis, foliolis binis ternisque ovatis minutis, calyce submuricato. Pall. *Astrag.* p. 92. n. 98. t. 76.

Phaca (microphyllea) acaulis, foliolis binatis ovatis obtusis villoso, calyce muricato epilofo, dentibus undique hispidis. Lin. *Suppl.* 337. Pall. *itin.* 3. app. n. 110. t. X. f. 1.*

Vielblättriger Traganth. W.

Habitat in Sibiriae insulis arenosis Selengae fluvii et lacus Baical. 24

Folia hujus pauciora breviora, petiolis villofissimis. Foliola minima. Scapi pubescentes erecti. Calyces glabri sed tuberculis scabri, dentibus pilosis, pilis nigris. Corolla magna purpurea. Lin. *Suppl.* l. c.

*90. ASTRAGALUS *sylvaticus*.

A. acaulis, foliolis inferioribus binatis superioribus simplicibus oblongis acutis, scapo foliis longiore, spicis ovatis, calycibus villoso, leguminibus inflatis. W.

A. (*sylvicolus*) acaulis, foliolis subduplicatis ovalibus lanuginosis, spica compacta, bracteis flore sublongioribus, leguminibus inflatis fusco-pilotis. Pall. *Astrag.* n. 100. t. 78.*

Phaca sylvatica. Pall. *itin.* 3. app. n. 109. t. IV. f. 2.
Wald-Traganth. W.

Habitat in pinetis Daguriae et sylvarum margines. 24 (v. f.)

91. ASTRAGALUS *muricatus*.

A. acaulis, foliolis ternis verticillatis linear-lanceolatis glabris, scapo folia aequante, spicis ovatis, leguminibus lanceolatis arcuatis muricatis. W.

A. (*muricatus*) acaulis, foliolis ternatis subverticillatis glabris, leguminibus callosis reflexo-cylindraceis maximis asperatis. Pall. *Astrag.* p. 89. n. 95. t. 73.*

Phaca (muricata) acaulis, foliolis ternis l. quaternis linear-lanceolatis subtus muricatis, calyce glabro, den-

tibus ciliatis Lin. suppl. 337. Pall. itin. 3. app. n. 113. t. A. a. f. I. B.

Baicalia flore ochroleuco, vexillo florum coerulescente. Gmel. fib. 4. p. 62.

Schafrüchtiger Traganth. W.

Habitat in campis montanis ad Jeniseam et lacum Bai-
cal. 24

Folia radicalia plura e cespite villoso radicali, longiora. Foliola quasi verticillata ternata quaterna lanceolata canaliculata intus glabra, extus tuberculis mucronata. Scapi erecti glabri. Bracteae Calycesque glabri. Corollae luteae. Legumina longa arcuata muricata. Lin. suppl. l. c.

92. ASTRAGALUS dalguricus.

A. acaulis, foliolis inferioribus binatis superioribus simplicibus linearibus sericeis, scapo foliis longiore declinato, spica capitata. W.

A. (daguricus) acaulis, foliolis binatis solitariisque inflexis, scapis reclinatis, vexilli area lutescente. Pall. Astrag. p. 88. n. 94. t. 72.*

Phaca (prostrata) acaulis, foliolis binatis linearibus sericeis, scapo procumbente, calyce villoso, dentibus lanceolatis brevibus. Lin. suppl. 336. Pall. itin 3. app. n. III. t. X. f. 2.

Dagurischer Traganth. W.

Habitat in arenoso - glareosis salsis Sibiriae circa la-
cum exsiccatum amarum Tarei. 24

Cespis radicalis, ex squamis villosissimis albis. Foliola pauciora longius petiolata subspicata, foliolis plerumque binatis. Scapi radicales laxi procumbentes fere glabri vix foliis maiores. Lin. suppl. l. c.

*93. ASTRAGALUS oxyphyllus.

A. acaulis, foliolis ternis lineari-acuminatis sericeis, scapo foliis longiore erecto, spica oblonga, leguminibus ovato-inflatis acuminatis pubescentibus. W.

A. subacaulis, foliolis ternatis acuminatis sericeis, leguminibus membranaceis ovato-inflatis reflexo-acuminatis pubescentibus. Pall. Astrag. p. 90. n. 96. t. 74.*

Phaca oxyphylla. Pall. itin. 3. app. n. 103. t. X. f. 2.*

Spitzblättriger Traganth. W.

Habitat in regionibus Transbaicalensibus Sibiriae. ♂
Species magis variabilis reliquis affinibus. [Pall.
 l. c.]

*94. ASTRAGALUS *Baicalia*.

A. acaulis, foliolis subbinatis, leguminibus inflatis ova-
 to-acuminatis membranaceis pubescentibus. Pall.
*Astrag. n. 99. t. 77. f. 1.**

- A. pedunculis radicatis, foliolis quaternis et quinis pe-
 tiolos amplexantibus, floribus ochroleucis. Gmel. fib.
 4. p. 62.

Kleiner Traganth. W.

Habitat in Sibiria ad lacum Baical. ♀

Affinis A. oxyphylo, a quo inflorescentia differt.
 Pall. l. c.

*95. ASTRAGALUS *linearius*.

A. acaulis, foliolis binis ternis quaternisve pubescenti-
 bus linearibus, scapo simplici paucifloro. Pall. *Astrag.*
 n. 101. t. 77. f. 2.

Linienblättriger Traganth. W.

Habitat in Sibiria in subalpinis Altaicis. ♀

† † † † † Scapo-nudo, absque caule folioso.

*96. ASTRAGALUS *cymbiformis*.

A. subacaulis, foliolis cuneiformibus retusis, floribus
 subsessilibus, leguminibus ovato-triquetris canalicu-
 latis glabris, floribus subapetalis. W.

Astragalus cymbiformis. Brotero.

Kahnförmiger Traganth. W.

Habitat in Lusitania ⊖ (v. v.)

In olla educatus acaulis sub diu vero disseminatus
caulescens, caule brevissimo decumbente. W.

97. ASTRAGALUS *montanus*.

A. acaulis, foliolis lanceolatis acutis subpilosis, scapis
 erectis folio longioribus, floribus laxe spicatis ere-
 ctis, leguminibus oblongis pubescentibus acumine in-
 flexo. W.

A. subacaulis, scapis folio longioribus, floribus laxe spi-

- catis erectis, leguminibus ovatis acumine infexo.** Roy.
lugdb. 392. *Jacq. vind.* 264.* *Mill. dict.* n. 6.
Jacq. aust. t. 167. *Scop. carn.* n. 922. t. 45.
- A. subcaulescens, pedunculis folio longioribus erectis,**
 corollis coeruleis subnutantibus, leguminibus cylindraceo-oblongis. *Pall. Astrag.* p. 65. n. 71.
- A. foliis ovato-lanceolatis, sericeis, siliquis erectis, inflatis, subhirsutis.** Hall. *helv.* n. 408.
- Phaca (montana) subacaulis procumbens hirsuta, scapo floribus erectis, leguminibus ovato-lanceolatis.** Crantz.
aust. 422.
- Astragaloides alpina purpurea villosa pumila, foliis brevioribus acuminatis.** Till. *pif.* p. 19. t. 14. f. 3. R.
- Astragalus quidam montanus vel Onobrychis aliis.**
Bauh. hist. 2. p. 240.
- Onobrychis floribus viciae majoribus caeruleo-purpurascensibus s. foliis tragacanthae.** *Bauh. pin.* 351.
- Onobrychis IV.** Cluf. *hist.* 2. p. 240.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.** 8. p. 701.
- Beig-Traganth. W.**
- Habitat in Helvetiae, Vallesiae, Austriae alpibus.** 24 (v. f.)
- Diffrert ab A. alpino quod caulis vix ac ne vix basti ramosus: quodque flores rubicundi, erecti: nec penduli.*
- 98. ASTRAGALUS physodes.**
- A. acaulis, foliolis ovatis glaucescentibus, scapis folio longioribus, floribus capitatis, leguminibus inflatis globosis membranaceis glabris.** W.
- A. acaulis, scapis folia aequantibus, leguminibus inflatis subglobosis nudis.** Mill. *dict.* n. 9. Pall. *it.* 2. p. 474.
- A. subcaulescens, scapis folio longioribus adscendentibus capitatis, leguminibus didymo-vesicariis coloratis glabris membranaceis.** Pall. *Astrag.* p. 71. n. 80. t. 58.*
- A. acaulos, leguminibus inflatis subglobosis.** Amoen. *acad.* 2. p. 359.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.** 8. p. 703.
- Geschwollener Traganth. W.**
- Habitat in Sibiriae aridissimis saltis, etiam ad mare.** Caspium et in Tauria 24 (v. f.)

Bracteae villosae; Fructus Coluteae, sed magis globosus. Flores purpurascentes.

Planta valde varians foliolis majoribus, minoribus, obtusis, acutis, glabris vel subtus tantum pilis adpresso tectis, scapis procumbentibus, adscendentibus erectiusculis, capitulis majoribus et minoribus. W.

*99. *ASTRAGALUS ampullatus.*

A. acaulis, foliolis lanceolatis sericeis, scapis folia aequantibus subtrifloris, leguminibus inflatis globo-ovatis tomentosis unilocularibus. W.

A. acaulis sericeus, scapis demum folio longioribus declinatis paucifloris, leguminibus inflatis ovato-mucronatis villosis unilocularibus. *Pall. Astrag. p. 69. n. 76. t. 56. f. 3.**

*Aragalus ampullatus. Pall. itin. 3. app. n. 122. t. CC. f. 4. 5.**

Blaesn Traganth. W.

Habitat in Sibiria ad Jeniseam et lacum Baical. 24 (v. f.)

*100. *ASTRAGALUS caespitosa.*

A. acanlis, foliolis oblongis glabris, scapis folia subaequantibus quinquefloris, leguminibus inflatis ovato-acuminatis pubescentibus unilocularibus. W.

A. acanlis, scapis folia glabra subaequantibus declinatis, capitulis quinquefloris, leguminibus velicariis ovato-acuminatis unilocularibus pubescentibus. *Pall. Astrag. p. 70. n. 79. t. 57.**

Rafen Traganth. W.

Habitat in glareosis rupestribus Davuriae. 24

*101. *ASTRAGALUS longiflorus.*

A. acaulis, foliolis ellipticis retusis subpilosis, scapis racemosis paucifloris folio duplo brevioribus, leguminibus ellipticis inflatis acuminatis glabris. W.

A. acaulis, scapis folio brevioribus paucifloris, floribus longissimi flavis, leguminibus callofis glabris bilocularib s. *Pall. Astrag. p. 73. n. 81. t. 60.**

A. pedunculis radicatis unifloris aut bifloris folio dimidio brevioribus, floribus longissimis, foliolis ovalibus hirsutissimis. *Gmel. fib. 4. p. 75. t. 27.*

Langblütiger Traganth. W.

Habitat sub 50^{mo} gradu totius Tatariae magnae a Tanae fluvio usque ad jugum Altaicum. 24 (v. f.)

Planta polymorpha in aridissimis siccis. Scapi sunt brevissimi decumbentes et folio pilosa. in humentibus scapi longiores erecti sculi et folia fere glabra. A. traganthoides Linnaei ab hoc differre videtur. W.

* 102. ASTRAGALUS utriger.

- A. acaulis, foliolis oblongis acutis pilosis, scapis racemosis, paucifloris folio duplo brevioribus, leguminibus ellipticis intatis acuminateis pubescentibus. W.
 A. acaulis, scapis folio brevioribus paucifloris, leguminibus maximis ovato-acuminatis pedunculatis subunilocularibus. *Pall. Astrag. p. 75. n. 82 t. 61.**

Schlauchartiger Traganth. W.

Habitat in montibus Uralensibus - inque Tauria. 24 (v. f.)

103. ASTRAGALUS caprinus.

- A. acaulis, foliolis ovato-oblongis acutis pilosis, scapis racemosis erectis folio duplo brevioribus, leguminibus ovatis tumidis villosis. W.
 A. acaulis, scapo erecto, foliolis ciliatis, leguminibus ovatis tumidis villosis. *Sp. pl. 1071. Desf. atl. 2. p. 181.**
 A. hirsutus, scapis brevissimis erectis, foliolis oblongis, leguminibus ovatis tumidis villosis. *Vahl. symb. I. p. 59.**

A. africanus, flore luteo odorato. *Breyn. cent. 72. Raj. hist. 396. Magn. monsp. 26. Raj. hist. 836.*

A. perennis, floribus hirsutis, caule erecto aphylo, flore ochroleuco odoratissimo. *Moris. hist. 2. p. 203. f. 2. t. 24. f. 3. Raj. hist. 940.*

Houttuyn Lin. Pst. Syst. 8. p. 703.

Ziegen-Traganth. W.

Habitat in Barbaria. 24 (v. f.)

Folia pedata impari-pinnata 23-juga. Foliola pollicaria ovato-oblonga acuta, ut petiolus communis, pilis sparsis longis patentibus obsita. Stipulae pollicares ovato-lanceolatae acuminatae membranaceae nervosae. Scap: 5 vel 6 pollicares erecti quinque-vel octoflori. Bracteae lanceolatae calyce breviores. Ca-

lyces colorati decemfriati, dentibus ovato-lanceolatis. Corolla flava. W.

* 104. ASTRAGALUS songaricus.

A. acaulis, foliolis lanceolatis sericeis, scapis erectis folio duplo longioribus, floribus spicatis distantibus, leguminibus lanceolatis. W.

A. acaulis scapis radicatis erectis spicis paucifloris laevibus, floribus remotis. Pall. Astrag. p. 63. n. 69. t. 51.*

Songarischer Traganth. W.

Habitat in Sibiriae campis elatis circa Promontoria Altaica. 24

Scapi erecti foliis multo longiores spicati, sex ad cemflori, floribus distantibus violaceis. W.

* 105. ASTRAGALUS caudatus.

A. acaulis, foliolis oblongis acutis superne glabris, scapis erectis folio duplo longioribus, floribus dense spicatis, calycibus cylindraceis. W.

A. acaulis scapis radicatis erectis sulcatis, spica elongata terminatis. Pall. Astrag. p. 62. n. 68. t. 50.*

Astragalus spicatus. Pall. it. 2. app. n. 118. t. W.

Geschwänzter Traganth. W.

Habitat in Sibiria ad montes Altaicos. 24

Flores purpurei. W.

* 106. ASTRAGALUS follicularis.

A. acaulis, foliolis ovatis acutis sericeo-pubescentibus, scapis erecto folio longioribus, floribus dense spicatis, calycibus ovatis inflatis. W.

A. acaulis, scapis erectis spicatis, calycibus vesicariis prostrato-pilosis. Pall. Astrag. p. 16. n. 20. t. 14.*

Rundkelchiger Traganth. W.

Habitat in Sibiriae desertis Kirgisorum arenosis. 24
(v. f.)

Distinctissimus ab affinibus calycibus inflatis ovatis, corollisque flavis. Scapi strictissimi sulcati foliis pa- rum longiores. W.

* 107. ASTRAGALUS densifolius.

A. acaulis, scapo erecto foliis longiore, foliolis oblongis

emarginatis, floribus capitato - spicatis. Vahl. symb.

I. p. 60.

A. *acaulis incanus, floribus capitatis pedunculatis, foliolis minimis dense congestis.* Lamarck encycl. I. p. 314. *

A. *foliis pinnatifidis, foliolis oppositis confertis leviter emarginatis.* Gron. orient. 91.

A. *orientalis incanus, foliorum conjugationibus densissimis.* Tournef. cor. 29.

Tragium alterum Dioscoridis, Secutes Arabum. Rauw. it. 123. t. 29.

B A. (*emarginatus*) *subacaulis scapis longissimis, capitulis globosis, leguminibus lanatis.* Billard. ic. pl. rar. Syr. I. p. 19. t. 9. *

Dichtblättriger Traganth. W.

Habitat in Oriente. 4 (v. f.)

Planta palmaris. Radix lignosa longissima pedalis, superne crassitie pennae columbinæ simplex. Folia pin-nata omentosa uti tota planta. Foliola numeroſa, interdum 51, ſeffilia conferta subopposita oblonga, un-dique ejusdem fere latitudinis, apice emarginata, intermedia majora, inferiora remotiuscula, exteriora imbricata. Stipulae ad exortum foliorum lanceolato-acuminatae tomentosae. Scapus foliis longior teres 3-4 - pollicaris. Flores capitati demum spicati. Bracteae lineares calyce breviores. Calyces pilosissimi tubulofi, dentibus fetaceis; fructiferi inflati globosi reticulati fere nudi. Corolla coerulea calyce parum lon-gior. Vahl l. c.

A. *emarginatus huic valde ſimilis, sed quadruplo major, foliolis longioribus remotioribus, vexillisque emarginatis.* W.

* 108. ASTRAGALUS hirsutus.

A. *acaulis, foliolis ellipticis incanis, scapis erectis folio longioribus, floribus globoſo - capitatis, leguminibus ovatis lanatis.* W.

A. *acaulis, scapis erectis folio longioribus, floribus capi-tatis, leguminibus globoſis hirsutissimis.* Vahl. symb. I. p. 59. *

A. *orientalis candidiflora et tomentosus.* Tournef. cor. 59.

Wollenfrüchtiger Traganth. W.

Habitat in Oriente. 24 (v. f.)

Folia impari pinnata incana sericea, 4-juga. Foliola elliatica acutinervia. Stipulae membranaceae lanceolatae petiolo adnatae. Scapi foliis longiores binnariales sulcati pubescentes. Flores capitato-spicati. Calyx villosi dentibus lanceolatis. Legumina subrotundo-ovata valde lanata calyce majora stylo persistenti terminata bilocularia. W.

* 109. ASTRAGALUS *globosus*.

A. acaulis, scapis erectis folio longioribus, capitulis globosis, bracteis linearibus calycem aequantibus. Vahl. Symb. I. p. 60.

A. orientalis foliis viciae argenteis, caule nudo erecto, floribus luteis. Tournef. cor. 28.

Kuglicher Traganth. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

Ab omnibus Astragalis affinis distinctus: bracteis linearibus longitudine calycis, floribusque globo-capitatis. W.

* 110. ASTRAGALUS *libanotis*. W.

A. acaulis, scapis folia aequantibus, floribus ovato-spicatis, leguminibus ovatis triquetris compressis acutis villosis. W.

A. (*lanatus*) acaulis scapo nudo longitidine foliorum leguminibus dense spicatis lanatis semicordatis triquetris subulatis, foliis villosis. Billard. ic. pl. rar. syr. I. p. 21. t. 10 *

Libanotischer Traganth. W.

Habitat in Libano. 24

Affinis praecedenti, sed scapi foliorum longitudine, flore ovato spicati, et bracteae lanceolatae calyce breviore. W.

* 111. ASTRAGALUS *bicolor*.

A. acaulis, scapis folio longioribus, floribus subrotundocapitatis, bracteis lanceolatis calycem aequantibus, vexillo lanceolato reliquis petalis duplo longiore. W.

A. acaulis, scapis erectis foliis longioribus, floribus capi-

tatis, bracteis lanceolatis, calyces hirsutissimos aequantibus. *Vahl. symb. I. p. 62* *

A. *incanus*, floribus capitatis pedunculatis, bracteis calyces villosos aequantibus, vexillis longis angustis. *Lamarck encycl. I. p. 314.* *

A. *orientalis incanus angustifolius*, floribus in eodem capitulo candidis et purpureis. *Tournef. cor. 28.*

Zweifarbig Traganth. W.

Habitat in Oriente. 24 (v. f.)

Ab affinibus vexillo longissimo abunde diversus. W.

* 112. ASTRAGALUS *psoraliooides*.

A. *acaulis*, foliolis incanis cuneatis emarginatis, scapis folio longioribus, floribus oblongo-capitatis, calycibus quinquestriatis, leguminibus oblongis hirsutissimis. W.

A. *acaulis*, scapis erectis foliis longioribus, floribus capitatis demum spicatis, leguminibus oblongis hirsutissimis. *Vahl. symb. I. p. 62* *

A. *acaulis canescens*, floribus capitatis pedunculatis vexillo obtuso emarginato. *Lamarck encycl. I. p. 314.* *

A. *orientalis canescens*, capitulis trifolii bituminosi. *Tournef. cor. 28.*

Floralienartiger Traganth. W.

Habitat in Oriente. 24 (v. f.)

Folia incana cuneiformia obtusa emarginata. Calyces striis quinque nigris notati, dentibus lanceolatis nigris. W.

* 113. ASTRAGALUS *Laguroides*.

B. *acaulis*, foliolis lanceolatis canis, scapis adscendentibus folio brevioribus, floribus globo-capitatis, calycibus fructiferis globosis inflatis pubercentibus. W.

Astragalus Laguroides. *Pall. itin. 3. app. n. 120. t. CC. f. 3.* *

A. (*Lagurus*) *acaulis prostrato-pilosus*, scapis suberectis spicato capitatis, calycibus sulcato-angulatis, demum inflatis legumen includentibus. *Pall. Ajrag. p. 18. n. 23. t. 16.* *

Hasenschwanzartiger Traganth. W

Habitat in aridissimis Sibiriae circa Selengam fluvium,
24 (v. f.)
Corolla coerulea. W.

* 114. ASTRAGALUS lupulinus.

- A. acaulis, foliolis oblongis emarginatis canis, scapis erectis folio brevioribus, floribus globo-capitatis, calycibus fructiferis globosis inflatis lanatis. W.
 A. scapis erectis foliisque pilosis, spica conferta, calycibus inflatis angustatis subsessilibus pilosissimi. Pall. *Astrag. p. 17. n. 22. t. 15.* Pall. itin. 3. app. n. 121.**
 Hopfenartiger Traganth. W.
Habitat in Sibiriae arenoso - glareosis ad Selengam flu-
vium et lacum Baical. 24
Corolla flava. Valde affinis praecedenti. W.

* 115. ASTRAGALUS leucanthus. +

- A. acaulis, foliolis lanceolatis glabris, scapis folia subaequantibus, floribus globo-capitatis. W.
 A. acaulis glaber, scapis radicatis folio vix longioribus capitatis paucifloris. Pall. *Astrag. p. 59. n. 65. t. 47.**
 Weißlichblühender Traganth. W.
Habitat in Sibiria orientali a fluvio Jenisea ad finum usque Ochotensem. 24
Corolla albido incarnata. Legumen ignotum. W.

* 116. ASTRAGALUS argentatus.

- A. acaulis, foliolis lanceolatis sericeo-argentatis, scapis folia aequalibus, floribus capitatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis sericei. W.
 A. subacaulis, scapis radicatis pilosis vix folio longioribus subcapitatis albifloris, foliis argentato-canis batis lanatis. Pall. *Astrag. p. 60. n. 66. t. 48.**
 Silberglänzender Traganth. W.
Habitat in Sibiriae desertis elatis ad Irtin et promon-
toria Altaica. 24 (v. f.)
Totus sericeo-splendidus. Capitula pauciflora, flo-
ribus albis. W.

* 117. ASTRAGALUS candicans.

- A. acaulis, foliolis ovato-lanceolatis pubescentibus, sca-

pis folio duplo longioribus, floribus spicatis, bracteis calycis longitudine leguminibus oblongo-lanceolatis acumine infexo. W.

A. acaulis scapis radicatis erectis folio duplo longioribus lanatis spicatis, leguminibus ovato-inflatis, stylo reflexo mucronato. *Pall. Astrag. p. 61. n. 66. t. 49.**

Weißlicher Traganth. W.

Habitat in Sibiria orientali ad Lenam fluvium. 24

Foliola subtus cana pilosa. Corollae albae. W.

* 118. ASTRAGALUS grandiflorus.

A. acaulis, foliolis oblongo-lanceolatis sericeis, scapis folio duplo longioribus, floribus laxe spicatis, vexillo profunde emarginato, leguminibus oblongo-lanceolatis pubescentibus. W.

A. acaulis sericeus, scapis elongatis, floribus laxe spicatis majusculis, leguminibus inflato-oblongis. *Pall. Astrag. p. 57. n. 59. t. 46.**

Großblütiger Traganth. W.

Habitat in Sibiria praefertim in regionibus Transbaicalensis. 24 (v. f.)

Pulcherrima et speciosa planta. Nulla magis variat statura, interdum pumila vix digitalis valde sericea et tota fere argentea, interdum subdodrantalis et sithamaea magis virens. In Transbaicalensis datur scapis pedalibus et ultra, floribus maximis speciosis. *Pall. l. c.*

* 119. ASTRAGALUS altaicus.

A. acaulis, foliolis lanceolatis glabris, scapis folia aequantibus hirsutis, floribus oblongo-capitatis leguminibus ovatis inflatis mucronatis pubescentibus. W.

A. subcaulescens glaber, scapis axillaribus folia aequantibus hirsutis, leguminibus inflatis ovato-acutis nigropubescentibus unilocularibus. *Pall. Astrag. p. 56. n. 58. t. 45.**

Altaischer Traganth. W.

Habitat in alpibus Altaicis Sibiriae. 24

* 120. ASTRAGALUS setosus. †

A. acaulis, foliolis lanceolatis trinerviis glabris, scapis folio longioribus, floribus ovato-capitatis, calycibus valde pilosis. W.

A. acaulis, scapis folio longioribus, calycibusque pilosissimis, foliis paucijugis glabris. *Pall. Astrag. p. 55. n. 57. t. 44.* *

Borstiger Traganth. W.

Habitat in montibus Altaicis Sibiriae. 2

* 121. ASTRAGALUS ambiguus.

A. acaulis, foliolis ovatis subpubescentibus, scapis folio longioribus, floribus spicatis, bracteis lanceolatis, leguminibus ovato-acuminatis unilocularibus. W.

A. acaulis nudiusculus, scapis folio longioribus longe spicatis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus ovato-acuminatis unilocularibus. *Pall. Astrag. p. 54. n. 56. t. 43.* *

A. pedunculis radicatis hirsutissimis folio longioribus, foliolis ovatis acutis saepe imbricatis, spica arctissima. *Gmel. fib. 4. p. 59. t. 30.*

A. non ramulos villosum et incannus spicatus, floribus purpureo-violaceis. *Amm. ruth. 167.*

Zweifelhafter Traganth. W.

Habitat per omnem Sibiriam. 2

Planta spontanea duplo minor spicis oblongis, culta vero magis glabra, spicis elongatis. W.

122. ASTRAGALUS uralensis.

A. acaulis, foliolis ovato-lanceolatis sericeo-villosum, scapis folio longioribus, calycibusque lanatis, capitulo oblongis, bracteis longitudine calycis, leguminibus ovatis acuminatis pubescentibus. W.

A. acaulis, scapo erecto foliis longiore, leguminibus subulatis inflatis villosum erectis. *Hort. upf. 226.* * *Mill. dict. n. 14.* * *Pall. it. 1. p. 148. Gonan. il-lusir. 50. Jacq. ic. rar. 1. t. 155. optima Misceil. 1. p. 250.* *

A. acaulis sericeo-pubescentis, scapis folio longioribus hirtis brevissime spicatis, bracteis calycem aequantibus, leguminibus intatis ovato-acuminatis bilocularibus. *Pall. Astrag. p. 53. n. 55. t. 42.* *

A. scapis aphyllis, foliis ovato-lanceolatis, sericeis, filiis turgidis, hirsutis, erectis, styliferis. *Hall. helv. n. 410. t. 14.*

- A. alpinus totus sericeus, foliis acuminatis. *Hall. it.*
83. t. 2. f. 2.
A. foliis ovato-lanceolatis sericeis splendentibus. *Hall.*
helv. ed. 1. p. 506. t. 5.
Phaca pedunculis radicatis hirsutissimis, foliolis ex ova-
to acutis saepe imbricatis. *Zinn. goett. 343.*
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 703.
Uralischer Traganth. W.
Habitat in Sibiria, Pyrenaeis, Helvetia, Carinthia. 24
(v. f.)
Corollae violaceae et coeruleae. W.

* 123. ASTRAGALUS *sordidus*. W.

- A. acaulis, foliolis lanceolatis sericeis, scapis folio longioribus calycibusque sericeis, capitulis paucitloris cernuis,
bracteis calyce brevioribus, leguminibus cylindraceo-
oblongis pubescentibus. W.
Astralagus uralensis. *Fl. dan. t. 1041. Lightf. scot.*
I. p. 401. I. 17. *Smith. britan. 2. p. 780. (excluso*
synonymo Halleri.)

Schmuziger Traganth. W.

Habitat in alpibus Scotiae, Norvegiae. 24 (v. f.)

Specimina quae mecum communicavit Clariss. Vahl
ab iis praecedentis ex Austria, Helvetia et Sibiria ac-
ceptis valde differunt. In hac specie scapi et calyces
sunt sericei nec villosi. In calyce pili nigri et albi
observantur, quod non in praecedente. Legumina lon-
giora oblongo-cylindracea nec brevia ovata. Figura
Florae danicae optima. Corollae sordide flavescunt,
vexillo violaceo. W.

* 124. ASTRAGALUS *baicalensis*.

- A. acaulis, foliolis lanceolatis sericeo-pubescentibus,
scapis folio duplo longioribus, floribus spicatis, legu-
minibus ovatis ventricosis acuminatis glabris. W.
A. acaulis, scapis radicatis folio longioribus, floribus ra-
cemolis nutantibus coeruleis, leguminibus inflato-
acuminatis membranaceis. *Pall. Astrag. p. 64. n. 70.*
*t. 52.**

Astragalus coeruleus. *Pall. itin. 3. p. 293.*

A. pedunculis radicatis, scapis folio aliquanto longiori-
bus, fosiolis oblongis glaberrimis, floribus imbricatis,
Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. G g

leguminibus vesicariis glabris. *Gmel. sib. 4. p. 55.*
t. 26. f. 2.

Baicalischer Traganth. W.

Habitat in Sibiriae altis montibus circa lacum Baical. 2

125. ASTRAGALUS monspellulanus.

A. acaulis, foliolis ellipticis obtusis, scapis racemosis declinatis folio longioribus, vexillis elongatis, leguminibus teretiusculis arcuatis. W.

A. acaulis, scapis declinatis, longitudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris.
Hort. upf. 227. Sauv. monsp. 238. Villars delph. 3. p. 453.

A. caule procumbente, scapis radicatis aphyllis, foliolis ovatis, vexillo longissimo, siliquis teretibus. *Hall. helv. n. 414.*

A. monspellulanus. *Bauh. hist. p. 338.*

A. purpureus perennis monspeliensis. *Moris. hist. 2. p. 106.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 704.

Französischer Traganth. W.

Habitat Monspelli, in Helvetia. 2 (v. p.)

Scapi foliis fere duplo longiores, procumbentes. Folia subovata, pubescentia. Bracteae solutae. Vexillum longissimum.

***126. ASTRAGALUS elongatus. W.**

A. acaulis, foliolis ellipticis acutis cano-pubescentibus, scapis racemosis erectis folio longioribus, leguminibus oblongis duris acutis pilotis pendulis. W.

Verlängerter Traganth. W.

Habitat in Galatia. 2 (v. f.)

Folia semipedalia impari-pinnata subquadrijuga. Foliola semiuncialia elliptica acuta canescens, pilis arcte adpresso tecta, terminata petiolatum. Petioli communes cani triquetri. Stipulae ovatae acuminatae villosae. Scapi pedales non sulcati, pilis raris adpresso obsoleti. Flores non vidi. Legumina semiuncialia pendula oblonga, valde dura, bilocularia, stylo mucronata et pilis adpresso tecta. W.

*127. ASTRAGALUS *latifolius*.

- A. acaulis, foliis simplicibus, ternatis pinnatisve, foliolis ovatis canis, scapis racemosis declinatis folio longioribus, leguminibus teretibus subulatis subarcuatis. W.
 A. acaulis, scapis declinatis foliis longioribus, leguminibus teretibus rectis, foliis simplicibus compositisque.
Vahl. symb. I. p. 61. *
- A. acaulis incanus, scapis declinatis folia aequantibus, foliolis ovatis latis subquinis, leguminibus subulatis rectiulatis. *Lamark encycl. I. p. 316.* *
- A. orientalis incanus humifusus amplissimo folio, spica longissima et angustissima. *Tournef. cor. 28.*
 Breitblättriger Traganth. W.
Habitat in Oriente. 4 (v. f.)

*128. ASTRAGALUS *cinereus*. W.

- A. acaulis, foliolis elliptico-subrotundis sericeo-canis, scapis erectis folio longioribus, floribus spicatis cernuis. W.
 A. orientalis folio subrotundo incano, flore ex viridi-flavescens. *Tournef. cor. 28.*

Aschfarbener Traganth. W.

Habitat in Armenia. 4 (v. f.)

Folia impari-pinnata sex vel octojuga quadripollincaria. Foliola elliptica subrotunda utrinque cana nitido-sericea, obtusa semipollincaria. Stipulae emarginatae oblongo-acuminatae. Scapus sex-vel octopollicaris, uti petiolus communis, canus. Spica oblonga elongata, floribus cernuis. Calyx tubulosus pilis adpresso albis et nigricantibus obsitus, dentibus subulatis. Bracteae subrotundae minutissimae. Legumen non vidi. W.

*129. ASTRAGALUS *alyssoides*.

- A. acaulis, foliolis linear-lanceolatis incanis, scapis folio longioribus adscendentibus, floribus spicatis, leguminibus oblongis hirsutis, calycem aequantibus. W.
 A. scapis erectis folio longioribus, floribus spicatis, leguminibus oblongis hirsutis longitudine calycis. *Vahl. symb. I. p. 61.* *

A. argenteus caespitosus, capitulis elongatis pedunculatis, dentibus calycinis setaceis. *Lamarek. encycl. I. p. 314.*

A. orientalis argenteus angustifolius flore leucophaeo. *Tournef. cor. 29.*

Steinkrautartiger Traganth. W.

Habitat in Oriente. 24 (v. f.)

Tota planta incana tripollicaris et parum ultra. Folia sesquipolicaria impari-pinnata sex-vel octojuga. Foliola parva linearis-lanceolata. Stipulae ovatae membranaceae ciliatae. Scapi tripollicares adscendentes. Spica oblonga imbricata. Flores parvi. Vexillum elongatum. Legumina oblonga acuta hirsuta longitudine calycis. W.

130. ASTRAGALUS incanus.

*caulis, scapis decumbentibus, foliolis ovatis subfusilibus subtus pubescentibus, leguminibus teretisubulatis apice infractis, ex pube prostrata fericeo-canis. Jacq. collect. I. p. 320.**

A. acaulis, scapis declinatis, foliolis tomentosis, leguminibus subulatis subarcuatis incanis apice incurvis. *Sp. pl. 1072. Gerard. prov. 522. Mill. dict. n. 19. Vill. delph. 3. p. 454.**

A. incanus, siliqua incurva. *Magn. monsp. 33. Allion. nicaeens. 158.*

Onobrychis incana. *Bauh. prodr. 149. foliis longioribus. Bauh. pin 350. Raj. hist. 928, 938.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 705.

Graner Traganth. W.

Habitat in Galloprovincia. 24

Scapi scabri, floribus saepe 20. Calyx florens non ventricosus. Vexillum replicatum, alis duplo longius. Folia incana. Legumina subincurva, turgida.

Differt ab A. monspellulato foliis rotundioribus, incanis; Leguminibus rectiusculis turgidioribus.

* 131. ASTRAGALUS incurvus.

A. acaulis, foliolis ellipticis mucronatis incanis, scapis folio longioribus, floribus spicatis, leguminibus oblongis basi attenuatis incurvis glabris. W.

A. acaulis, foliolis ellipticis incanis, floribus capitatis,

leguminibus erectis arcuatis glabris incrassatis. *Desf.*
atl. 2. p. 182. t. 203. *

Gebogener Traganth. W.

Habitat in Algeriae arenosis. 24

Paniculae 15 ad 25 obovatae aut ellipticae obtusae
 incanae confertae. Scapi pubescentes striati. Flores
 capitati sessiles magnitudine fere *A. monspessulanus*.
 Bracteae minimae membranaceae acutae. Calyx tubu-
 losus dentibus parvis acutis. Corolla pallide purpu-
 rea. Legumen crassum erectum glabrum incurvum. Af-
 finis *A. incano*, differt legumine crassiore. *Desf. l. c.*

*132. ASTRAGALUS rotundifolius. W.

A. acaulis, foliolis subrotundis incanis, scapis folio lon-
 gioribus, floribus spicatis, leguminibus ellipticis ven-
 tricosis sericeis. W.

A. (nummularius) acaulis, foliolis elliptico-orbiculatis
 incanis, pedunculis folio longioribus, floribus capita-
 tis, leguminibus obtusis teretibus sericeis. *Desf. atl.*
2. p. 182. t. 204. * (*exclusis synonymis.*)

Rundblättriger Traganth. W.

Habitat in arenosis regni Tunetani prope Sibam. 24

Distinctissimus ab A. nummulario, floribus spicatis
 pedunculatis pallide roseis, forma leguminis, foliolis-
 que incanis. W.

*133. ASTRAGALUS macrorhizus.

A. acaulis, foliolis ovatis acutis incanis, scapis folio lon-
 gioribus, floribus spicatis, leguminibus obovatis ven-
 tricosis pubescens acumine uncinato. W.

A. foliis radicalibus pinnatis, pinnulis lato-ovatis inca-
 nis, scapis radicalibus leguminibus ovatis. *Cavan.*
ic. 2. p. 28. t. 133. *

Grosswurzlicher Traganth. W.

Habitat in Hispania. 24

Corollae purpureae vexillum elongatum. W.

134. ASTRAGALUS campestris.

A. acaulis, calycibus leguminibusque villosis, foliolis
 lanceolatis acutis, scapo decumbente. *It. oel. 50. 662.* *
Fl. suec. 593. Jacq. collect. 1. p. 319. * *Hoffm. germ.*
263. Roth. germ. I. 312. II. 194.

- A. spicis aphylis, foliis lanceolatis hirsutis, siliquis erectis, inflatis, semibilocularibus. *Hall. helv. ed. 2. n. 406. t. 13.*
- A. acaulos, foliis purpureis, calyce et fructu villoso. *Hall. helv. ed. 1. p. 567. t. 13.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 705.*
- Feld-Traganth. W.
- Habitat in Oelandia, Germania, Gallia, Helvetia. 24 (v. f.)*
- Cerollae flavae Carina acuminata basi purpurascente.*

*135. ASTRAGALUS viscosus.

- A. acaulis, foliolis linearibus viscosis, scapis folio longioribus superne glanduloso-pilosis, spica pauciflora, leguminibus oblongis acutis pubescentibus. W.
- A. (*foetidus*) acaulis, foliis prostratis viscosis acutis linearibus, scapis suberectis paucifloris. *Vill. delph. 2. p. 468. t. 43.* Allion. ped. n. 1275.**
- β A. (*viscosus*) acaulis, scapo foliisque erectis, foliolis vigintijngi acutis linearibus, scapis paucifloris. *Vill. delph. 3 p. 469. t. 43.**
- Astragalus Halleri. Allion. pedem. n. 1276.*
- A. scapis aphylis, foliis ovato-lanceolatis glabris, siliquis inflatis hirsutis erectis. *Hall. helv. n. 407.*
- Klebriger Traganth. W.
- Habitat in alpibus Delphinatus, Helvetiae, Pedemontani. 24 (v. f.)*
- A foetidus et viscosus Villarsii sunt solummodo varietates unius ejusdem speciei, ut ex speciminibus variis vidi. W.*

*136. ASTRAGALUS leptophyllus.

- A. acaulis, foliolis linearis filiformibus, scapis folia aequalibus declinatis paucifloris, leguminibus subrotundo ovatis inflatis pubescentibus. W.
- A. acaulis glaber, foliolis paucijugis linearibus, scapis folia aequalibus declinatis paucifloris, leguminibus inflatis unilocularibus. *Pali. Astrag. p. 80. n. 87. t. 66. fig. A.* Pall. itin. 3. app. n. 118. t. X. fig. 3. B.*
- A. pedunculis radicatis, foliolis linearibus pluribus conjugatis glaberrimis. *Gmel. fib. 4. p. 53. t. 24. B.*

Fadenblättriger Traganth. W.

Habitat in Sibiriae apricis subsalsis inter fluvios Onon et Argun. 4 (v. f.)

Corolla intense rosea. W.

* 137. ASTRAGALUS sanguinolentus,

A. acaulis, foliolis obovatis mucronatis, scapis folio longioribus declinatis paucifloris, leguminibus oblongo-linearibus compressis. W.

A. (*sanguinolentus*) acaulis pubescens, scapis folio longioribus declinatis paucifloris, foliolis ellipticis supra glabris, leguminibus erectisculis oblongis arcuatish compressis. Marsch. ab Bieberst. casp. p. 117. n. 26.

Blutfarbiger Traganth. W.

Habitat in montibus altis versus mare Caspium. 4 (v. f.)

Foliola admodum parva, superne glabra, inferne pilis albicantibus adpresso tecta. W.

138. ASTRAGALUS uncatus.

A. acaulis exscapus, leguminibus subtilatis hamatis folio longioribus, foliolis obcordatis. Sp. pl. 1072.

Mill. dict. n. 22.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 706.

Krummhakiger Traganth. W.

Habitat in Aleppo. Russel. 4

Folia foliolis 19, obcordatis cum setula, viridia. Scapi nulli. Flores ad ipsam radicem, pauci, minutis, albi. Legumina valida, folio toto longiora, mucronata, arcuato-hamata. Afinis nimium A. trimestri.

* 139. ASTRAGALUS pauciflorus.

A. acaulis, foliolis lanceolatis obtusis sericeis canis, scapis subbifloris declinatis folia subaequantibus. W.

A. acaulis tomentosis, scapis folia aequantibus declinatis subbifloris, leguminibus teretibus. Pall. Astrag. p. 81. t. 88. t. 66. fig. B.*

Astragalus biflorus. Pall. itin. 3. p. 206.

A. caulinibus radicatis, scapis folia aequantibus, floribus gemellis, foliolis ovalibus sericeis, leguminibus teretibus glabris erectis. Gmel. fib. 4. p. 54. A. 26. f. 1.

Wenigblüthiger Traganth. W.

Habitat in pratis alpinis uidis Davuriae. 24 (v. f.)
Planta parva tota sericea cana. Flores purpurei. W.

* 140. **ASTRAGALUS buchtormensis.**

A. acaulis, foliolis oblongis obtusis pubescentibus, scapis subbitioris folio duplo brevioribus declinatis, leguminibus oblongis acuminatis. W.

A. acaulis, foliolis vigintijugis cano-pubescentibus, scapis declinatis brevissimis paucioribus, leguminibus callosis cylindrico-acuminatis semibilocularibus. Pall.

*Astrag. p. 76. n. 83. t. 62. f. A.**

Kurzschäftiger Traganth. W.

Habitat in Sibiria circa montes Altaicos. 24

Scapi brevissimi bi-vel triflori post florescentiam declinati. Flores flavi. W.

* 141. **ASTRAGALUS testiculatus.**

A. acaulis, foliolis lanceolatis sericeo-canis, floribus radicalibus subsessilibus aggregatis, leguminibus ovatis ventricosis albo-tomentosis. W.

A. scapis brevissimis, foliis calycibusque pilosis leguminibus inflatis calloso-lanatis. Pall. *Astrag. p. 82. n. 89. t. 67.**

A. subacaulis, floribus radicatis numerosis subsessilibus. Gmel. sib. 4. p. 52. (*exclusa varietate et synonymo Buxbaumii.*)

Weißfrüchtiger Traganth. W.

Habitat in limoso-arenosis versus Mare Caspium. 24 (v. f.)

* 142. **ASTRAGALUS rupifragus.**

A. acaulis, foliolis oblongis obtusis piloso-pubescentibus, floribus breve pedunculatis aggregatis, leguminibus oblongis acutis lanatis. W.

A. subexscapus, foliis septemjugis pilosissimis, calycibus glomeratis inaequaliter dentatis, leguminibus ovato-acuminatis triqueiro calloso-lanatis. Pall. *Astrag. p. 86. n. 92. t. 70*

Steinbrech-Traganth. W.

Habitat in rupibus aridis meridionalis Tauriae. 24 (v. f.)

Scapi brevissimi interdum nulli. Flores capitato-ag-

gregati purpurei. Varietas caulescens ab Ill. Pallas indicata, ab hoc differre videtur. W.

* 143. ASTRAGALUS diffusus. W.

A. acaulis, foliolis lanceolatis acutis piloso-pubescentibus, floribus subsessilibus aggregatis, calycinis dentibus subulatis, pilosis leguminibus oblongis subtriquetris lanatis. W.

A. (*dolichophyllum*) scapis brevissimis, foliis pilosis, calycum dentibus setaceis hirtis, leguminibus triquetris calloso-lanatis. Pall. *Astrag.* p. 84. n. 90. t. 68.*

Ausgebreiteter Traganth. W.

Habitat in desertis Maris Caspii et Tatariae magnae.

24 (v. f.)

Flores pallide flavi subsessiles aggregati. W.

* 144. ASTRAGALUS galactites.

A. acaulis, foliolis oblongis acutis subsericeis, floribus subsessilibus aggregatus, leguminibus ovatis dispermis calyce inclusis. W.

A. acaulis, foliis septemjugis canis, leguminibus minutis calyce villoso inclusis. Pall. *Astrag.* p. 85. n. 91. t. 69.*

A. repens Barbae jovis foliis, acaulos ferme polyanthos. Amm. ruth. 120.

Milchfarbiger Traganth. W.

Habitat in Sibiriae regionibus Transbaicalensis. 24 (v. f.)

Corolla lactea. An A. traganthoides Linnaei? sed descriptio non quadrat. W.

* 145. ASTRAGALUS nummularius.

A. acaulis, foliolis subrotundis emarginatis pilosis, floribus subsessilibus aggregatis, leguminibus ovatis pilosis. W.

A. floribus radicalibus subsessilibus, foliolis subrotundis emarginatis hirsutis. Vahl. *symb.* I. p. 60.

A. acaulis lanuginosus, floribus radicalibus subsessilibus, foliolis cordato-subrotundis pilosissimis. Lamarch *encycl.* I. p. 314.*

A. creticus nummulariae folio incanus, magno fructu. Tournef. *cor.* 28.

Ausgerandeter Traganth. W.

Habitat in Creta. 24 (v. f.)

Ab omnibus Astragalis exscapis foliolis obcordatis distinctus. W.

* 146. ASTRAGALUS lanigerus.

A. acaulis, foliolis elliptico - subrotundis lanatis, pedunculis brevissimis subquadrifloris, calycibus lanatis, leguminibus ovatis ventricosis pubescentibus. W.

A. acaulis villosissimus canescens, scapo brevissimo, leguminibus ovatis inflatis. *Desf. atl. 2. p. 181. t. 202.*

Wollreicher Traganth. W.

Habitat in arenosis Barbariae prope Caffam. 24 (v. f.)

Valde affinis A. exscapo, sed foliola minora, flores pedunculati leguminina majora calycesque lanati. W.

147. ASTRAGALUS exscapus.

A. acaulis, foliolis oblongis obtusis pilosis, floribus subpedunculatis aggregatis, calycibus adpresso-pilosis, leguminibus oblongis lanatis. W.

A. acaulis exscapus, leguminibus lanatis, foliis villosis. *Mant. 275. Hoffm. germ. 263. Roth. germ. I. 312. II. 195.*

A. subexscapus lanatus, foliolis sedecimjugis ovalibus, leguminibus ovato-mucronatis triquetris calloso-pubescentibus. *Pall. Astrag. p. 78. n. 85. t. 64.*

A. acaulis, foliis summae radici insidentibus, foliolis ovatis, petiolis tomentosissimis. *Hall. helv. n. 415.*

A. perennis supinus, foliis et siliquis hispidis. *Buxb. hal. 32.*

A. acaulos flore luteo. *Buxb. cent. 3. p. 21. t. 38. f. 2.?*
Glaux lanuginosa montana acaulos. *Rupp. jen. 2. p. 270.*

Glaux montana acaulos. *Bauh. pin. 347 prodr. 147. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 707.*

Schaftloser Traganth. W.

Habitat in rupestribus Helvetiae, Thuringiae, Austriae, Hungariae, Orientalis. 24 (v. v.)

Caulis aut Scapus nullus. Folia pinnata, spithamea, villosa: Foliola 21-33, ovata, obtusa, sessilia. Flores numerosi, radicales, subsessiles, lutei, demum flavi. Calyx ovatus, ventricosus, albo-vilosus, dentibus albis.

148. ASTRAGALUS *tragacanthoides*. †

A. subacaulis, floribus radicalibus numerosis subsessili-
bus. W.

A. orientalis acaulos, flore luteo. *Buxb. cent.* 3. p. 21.
t. 38. f. 2. (*excluso synonymo Tournefortii.*)

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 291.

Armenischer Traganth. W.

Habitat in Armenia. 2

Caulis aut Scapus nullus, sed radicis rami supra ter-
ram diffusi et depresso, vestiti Foliis pinnatiss, parvis
villoso. Flores aggregati ad radicem, sessiles. Caly-
ces hirsuti dentibus nigricantibus. Corollae flavae.
Legumina subrotunda, laevia.

Planta mihi ignota, nam inter cognitas species nul-
lam inveni, quam pro hac habere possim. W.

* 149. ASTRAGALUS *triphyllus*.

A. acaulis, foliis simplicibus ternatisque glabris, scapis
bifloris declinatis folio longioribus. W.

A. acaulis, scapis folia glabra ternata superantibus biflo-
ris declinatis. *Pall. Astrag. p. 68. n. 75. t. 56. f. A.*
Dreyblättriger Traganth. W.

Habitat in insulis arenosis lacus Baical. 2

Corolla purpurea. Foliis ab omnibus distinctus. W.

† † † † † † *Fruticosi et suffruticosi petiolis spi-
nescenscentibus persistentibus.*

* 150. ASTRAGALUS *Lagopodioides*.

A. frutescens, petiolis spinescenscentibus, foliolis spinoso-
mucronatis, spicis ovatis pedunculatis folio longiori-
bus, bracteis ovatis acutis deciduis. *Willd. Act. Acad.
Berol. 1794. p. 28 tab. 1. fig. 4.* *

A. (*Lagopodioides*) frutescens petiolis spinescenscentibus,
foliolis apice spinosis, floribus spicatis. *Vahl. symb.
I. p. 64.*

Astragalus Lagopodioides β. *Lamarck encycl. I. p. 319.*
*Tragacantha orientalis vesicularia floribus purpureis in ca-
pitulum pedunculo donatum congestis.* *Tournef.
cor. 30.*

Hasenfußartiger Traganth. W.

Habitat in Armenia. 2 (v. f.)

Caules ramosi fruticosi quadripollicares petiolis spinoscentibus obfiti. Folia pari-pinnata 4 vel 5-juga. Foliola oblonga pilis adpresso tecta mucrone valido armata. Pedunculi axillares foliis longiores pubescentes. Spica subovata. Bracteae membranaceae ovatae acutae diaphanae ante anthesin flores tegentes deciduae. Calyx valde pilosus tubulosus, dentibus filiformibus pilosis corolla purpurea parum brevioribus. W.

***I51. ASTRAGALUS Lagurus.** W.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliolis spinosomucronatis, spicis ovatis pedunculatis folio longioribus, bracteis ovatis acuminatis scariosis persistentibus. Willd. Act. Acad. Berol. 1794. p. 28. t. 1. f. 2. *

A. (*Lagopodiooides*) subcaulis pubescens, spica pedunculata lagopoidea, bracteis scariosis imbricatis, dentibus caudicinis subplumosis longitudine corollae. Lamarch encycl. I. p. 319. *

Tragacantha orientalis, floribus luteis in capitulum longo pedunculo donatum congestis. Tournef. cor. 30.

Hafenschwanz-Traganth. W.

Habitat in Armenia. Ḥ (v. f.)

Simillimus praecedenti sed Caules breviores subramosi, Spica magis compacta, Bracteae persistentes acuminatae scariosae nitidae longitudine floris, Corolla flava. W.

***I52. ASTRAGALUS angustifolius.**

A. frutescens, ramis junioribus tomentosis petiolis spinescentibus, foliolis lanceolatis, pedunculis subcorybosis sexfloris folia aequantibus. Willd. Act. Berol. 1794. p. 25.

A. caulibus tenuibus fruticulosis erectis superne tomentosis, pedunculis folia aequantibus. Lamarch encycl. I. p. 318. *

Tragacantha orientalis humillima, foliis argenteis angustissimis. Tournef. cor. 29.

Schmaler Traganth. W.

Habitat in Armenia. Ḥ (v. f.)

Folia sexjuga incana. Foliola oblongo-lanceolata basi angustata. Pedunculi foliorum longitudine. W.

*153. ASTRAGALUS pungens. W.

A. frutescens petiolis spinecentibus, foliolis oblongis ferriceis, pedunculo foliis longiore, floribus spicatis, dentibus calycinis subulatis. W.

Tragacantha humillima se spargens floribus spicatis.
Tournef. cor. 29.?

Stechender Traganth. W.

Habitat in Galatia. h (v. f.)

Frutex parvus semi-pedalis petiolis vetustis spinecentibus ut in reliquis speciebus tectus. Folia 7-8-juga foliolis oblongis basi angustatis acutis canis serratis. Pedunculi foliis longiores apice floribus magnis 8 vel 10 albis instructi. Bracteae lanceolatae calyce breviores. Calyces tubulosi pilis albis et nigricantibus adpresso tecti, dentibus rectis lanceolato-subulatis. Legumen ignotum. Accepit hanc speciem ab Abate Sejini cum pluribus aliis plantis orientalibus. Differt ab A. angustifolio foliis majoribus, et pedunculis folio longioribus spicatis. Valde affinis A. Tragacanthae cui foliola latiora pedunculi longitudine foliorum et calyces dentes ovati-breves nec lanceolato-subulati. W.

154. ASTRAGALUS Tragacantha.

A. frutescens, petiolis spinecentibus, foliolis ellipticis incanis, pedunculis subquadrifloris folia aequantibus, calycinis dentibus ovatis. W.

A. caudice arborecente, petiolis spinecentibus. Sp. pl. 1073. Mat. med. 174. Ludw. ect. t. 74. Desf. atl. 2. p. 189. Ger. prov. 523. n. I.

A. frutescens, spicis pedunculatis longitudine foliorum, petiolis spinecentibus. Vahl. symb. I. p. 63.* Willd. Act. Acad. Berol. 1794 p. 21. t. I. f. 5.*

A. (maffilienis) fruticosus ramosus incanus, racemis capitulo-pedunculatis, dentibus calycinis brevibus. Lamark encycl. I. p. 317. *

A. aculeatus fruticosus maffilienis. Pluk. alm. 60. Tragacantha. Bauh. pin. 388. Cam. epit. 446. Hort. cliff. 361. Blackw. t. 264. Clus. posth. 60. Mill. dict. Gouan. monsp. 386. Duham. arb. 2. p. 344. t. 100. Dalech. hist. 1478. f. I.

Tragacantha hircinos spirilos et aruncos imitata. *Lob.*
ic. 2. t. 27.

Tragacantha massiliensis. *Bauh. hist. I. p. 2. 407.* *Tour-*
nef. inst. 417.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 292.

Gemeiner Traganth. W.

Habitat in Aragonia, ad maris littora Galliae australis,
Siciliae et Barbariae. ḥ (v. v.)

Pedunculi foliorum longitudine tri quadri-vel quin-
queflori. Calycis dentes brevissimi ovati. W.

* 155. ASTRAGALUS echoioides.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliolis linearilanceolatis canis, pedunculis bifloris folio brevioribus. W.

A. (echoioides) fruticosus diffusus, foliolis sericeis, petiolis spinescentibus, pedunculis bifloris. b Herit.
stirp. 170.

A. (creticus) frutescens, pedunculis bifloris, foliolis lanceolatis acutis, petiolis spinescentibus. Willd. *Act.*
Acad. Berol. 1794. p. 23. t. 2. f. 2. (exclusis syno-*
nymis Tournefortii et Lamarckii.)

Tragacantha cretica, foliis minimis incanis flore majore
 albo. *Tournef. cor. 29.*

Tragacantha altera. *Alp. exot. 55. t. 54.?*

Vieldorniger Tragauth, W.

Habitat in Creta. ḥ (v. s.)

Descriptionem et iconem hujus dedi l. c. Flores
 vero in data icona triplo minores delineavit pictor,
 quam re vera sunt. Calyces sunt tubulosi brevissime
 dentati pilis adpresso tecti. Corolla magna albo vexillo
 ampio lineis rubris notato. Differt a reliquis spe-
 ciebus, penunculis bifloris, ab A. cretico diversissimis
 pedunculis bifloris calyceque tubuloso pilis adpresso
 tecto. W.

* 156. ASTRAGALUS retusus. W.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliolis obovatis
 subretusis, pedunculis quadrifloris folio brevioribus
 dentibus calycinis lanceolatis. W.

A. (retusus) frutescens racemis quadrifloris vexillo
 elongato, foliolis oblongis emarginatis petiolis spine-

scentibus. *Willd. Act. Acad. Berol.* 1794. p. 24.
t. 2. f. 3.*

Tragacantha orientalis erectior, foliis viciae glabris et ramis tomentosis. *Tournef. cor.* 29.

Stumpfblättriger Traganth. W.

Habitat in Oriente. Ȣ (v. f.)

Calyx tubulosus, pilis albis et nigricantibus adpresso tectus, dentibus lanceolatis. *Corolla* videtur rubicunda in secco specimine, vexillo elongato. *Stipulae ovatae*, acuminatae villosae persistentes et petiolo adnatae ut in omnibus *Tragacanthis* sed in ramis vetustis fere destructae. *Similis A. Tragacanthae*, sed minus incanus, foliolis obovatis levissime retusis, calycinis dentibus lanceolatis pedunculisque pilosis brevioribus distinctus. W.

*157. ASTRAGALUS Poterium.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliolis oblongis incanis, pedunculis brevissimis subbifloris. W.

A. frutescens floribus axillaribus sessilibus pitiolis spinescentibus, leguminibus longitudine calycis. *Vahl symb.* I. p. 63.* *Willd. Act. Acad. Berol.* 1794. p. 22.*

Astragalus Tragacantha B. *Sp. pl.* 1073.

A. (*granatensis*) fruticosus ramosus incanus, foliolis minutis acutis argenteis, pedunculis brevibus subbifloris. *Lamarch encycl.* I. p. 318.

Astragalus Poterium. *Pall. Astrag. p. I. n. I. t. I.?*

Tragacantha granatensis, foliis incanis caducis sive deciduis, flore albo. *Moris hist.* 2. p. 113. f. 2. t. 13. f. 2. *Gron. orient.* 226.

Tragacantha altera Poterium. *Cluf. hist.* I. p. 107. *Bauh. hist.* I. p. 2. 408. *Tournef. inst.* 417. *Lob. hist.* 492. *Lab. ic.* 2. t. 27.

Tragacantha affinis lanuginosa sive *Poterium*. *Bauh. pin.* 388.

Tragacantha II. *Taber.* 2. p. 245.

Granadischer Traganth. W.

Habitat in Granada et Orientis locis arenosis siccis. Ȣ (v. f.)

* 158. *ASTRAGALUS aristatus.*

- A. frutescens, petiolis spinecentibus, foliolis oblongis mucronatis pilosis, pedunculis brevissimis subquadri-floris, calycinis dentibus setaceis. W.
 A. (*aristatus*) frutescens, racemis foliis multo brevioribus, foliolis pilosis, dentibus calycinis capillaceis, petiolis spinecentibus. Willd. *Act. Acad. Berol.*
 1794. p. 25. *
 A. (*aristatus*) suffruticosus prostratus, foliis pilosis, calycibus cristatis. l'Herit. *flirp.* 170.
 A. (*sempervirens*) suffruticosus prostratus, foliis hirsutis viridantibus, calycibus lanatis, dentibus calycinis longis capillaribus. Lamarck *encycl.* 1. p. 317. *
 A. (*Pseudo-tragacantha*) frutescens, petiolis spinecentibus decemjugis, floribus capitato-glosteratis, leguminibus nudis tetraspermis. Pall. *Astrag.* p. 3. n. 3. t. 3. *

A. petiolis ramorum spinecentibus. Hall. *helv.* n. 405.
 Phaca Tragacantha. Allion. *pedem.* n. 1257.
Astragalus Tragantha B. Ger. prov. 523. n. II.
 Tragacantha alpina sempervirens, floribus purpurascen-tibus. Tournef. *inst.* 417. Garid. *aix.* p. 469. t. 104.
 Tragacantha sive hirci spina. Dod. *pempt.* 751.
 Tragacantha I. Tabern. 2. p. 245.
 Borstiger Traganth. W.

Habitat in alpibus Galloprovinciae Vallesiae, Pedemon-tanis et forte Sabaudiae locis sabulosis ad ripas tor-rentum, inque alpibus Hyrcaniae. ḥ (v. v.)

Ab omnibus abunde diversus foliis viridibus pilosis, floribus fere sessilibus in pedunculo brevissimo quadri-floro. Corolla in nostris purpuraescens, in Pallasii plan-ta alba. W.

* 159. *ASTRAGALUS amarus.*

- A. suffruticosus, petiolis spinecentibus, foliolis ovatis glabris, floribus spicatis, leguminibus falcatis. W.
 A. inermis, foliis plerumque impari-pinnatis, spicis axillaris, leguminibus subtrigonis mucronatis bilo-cularibus. Pall. *Astrag.* p. 8. n. 9. t. 6. *

Bitterer Traganth. W.

Habitat in deserto Caspio in promontorio torridissimo collium gypseorum Arsagar. 24.

Radix lignosa perennis. Caules herbacei semipedales. Folia pari-pinnata glabra petiolo aristato spinoscente. Foliola ovata obtusa. Stipulae semiocvalae falcatae. Spicae filiformes axillares folia aequantes. Legumina oblonga subtrigona falcata. Reliquis Tragacanthis affinis petiolo spinoscente, sed diversus caule herbaceo. W.

* 160. ASTRAGALUS coluteoides. W.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis sedecimjugis spica quinqueflora, calycibus inflatis villosis. Willd. *Act. Acad. Berol.* 1794. p. 27. *

Anthyllis (tragacanthoides) fruticosa, foliis pinnatis tomentosis, petiolis spinescentibus, floribus racemosis. Billard. *pl. rar. syr.* 2. p. 16. t. 9. *

Tragacantha culescens, pedunculis longitudine foliorum trifloris, foliolis oblongis obtusis. Gron. *orient.* 92. n. 227.

Tragacantha alterae genus. Rauw. *it.* 281. e. *icone.* Daelch. *hist.* 2. *app.* 32. Morif. *hist.* *app.* 2. t. 25.

Blasenstrauchartiger Traganth. W.

Habitat in Libano. ḥ

* 161. ASTRAGALUS tumidus. W.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis sexjugis, floribus subsolitariis pedunculatis, calycibus fructiferis inflatis villosis fetaceo-dentatis. Willd. *Act. Acad. Berol.* 1794. p. 26. *

A. (*Rauwolfii*) caudice arborescente, petiolis spinescentibus, floribus subsolitariis pedunculatis, calycibus fructiferis inflatis villosis. Vahl *symb.* 1. p. 63.

A. fruticosus, calycibus subfessilibus inflato-globosis, petiolis spinescentibus. Affo. *oryctog.* Arag. 177. t. 2. f. 2.

Tragacantha orientalis vesicaria erectior, caule ab imo ad summum florido. Ruffel. *alepp.* t. 3.

Colutea (spinosa) fruticosa, foliis ovato-oblongis, spinis filiformibus foliis duplo longioribus. Forst. *descr.* p. 131.

Bauchiger Traganth. W.

Habitat in Aragonia, Aegypto, Syria locis arenosis siccis. ḥ (v. f.)

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

H h

Rami juniores et Petioli tomentosi. Folia 4 vel 6-juga. Foliola oblonga canescens praesertim subius. Pedunculi uniflori. Calyces fructiferi inflati villosi, dentibus setaceis. W.

* 162. ASTRAGALUS armatus. W.

A. frutescens, petiolis spinecentibus, foliis octojugis, foliolis linearibus, floribus subfessilibus axillaribus aggregatis, carybus fructiferis inflatis villosis. W.

Anthyllis (tragacanthoides) fruticosa, petiolis spinecentibus, foliis pinnatis, floribus axillaribus subfessilibus, calyce vesicario. Desf. atl. 2. p. 150. t. 194.*
Bewäfneter Traganth. W.

Habitat in desertis arenosis Barbariae prope Caffam. ḥ
A precedente distinctus: foliis octojugis, foliolis linearibus, floribus aggregatis subfessilibus, calycisque dentibus brevioribus lanceolatis. Ab A. coluteoide diversus, foliolis linearibus floribus aggregatis axillari bus nec spicatis. W.

* 163. ASTRAGALUS creticus.

A. frutescens, petiolis spinecentibus, foliis tri-quadrifugisve foliolis lanceolatis incanis, floribus axillaribus fessilibus solitariis calyce lanato. W.

A. (creticus) fruticosus dense ramosus spinosissimus, caudicibus crassis nigricantibus, foliis brevibus, foliolis parvè acutiusculis tomentosis. Lamarck encycl. I. p. 318.*

Tragacantha cretica incana, flore parvo lineis purpureis striato. Tournef. cor. 29.

Echter Traganth. W.

Habitat in monte Ida Cretae. ḥ (v. s.)

Frutex bi-vel tripedalis ramosissimus caespitosus. Caulis nigricans petiolis spinecentibus denso objitus. Folia semipollicaria tri-vel quadrijuga. Foliola parva linear-lanceolata acuta sericeo-incana. Flores in apice ramorum axillares solitarii sessiles. Galyx lana alba involutus. Corolla alba lineis purpureis. Vexillum elongatum emarginatum. Legumen parvum ovatum biloculare incanum. W.

Ex hoc frutice legitur Gummi Tragacanthae album, ut ex itinerario Tournefortii patet. Reliquæ species,

excepto A. gummifero, qui Gummi flavescentis minoris praetii fundit, nullo scatent succo gummoso. W.

* 164. ASTRAGALUS leucophyllus. W.

A. frutescens petiolis spinescentibus, foliis sexjugis, foliolis oblongis obtusifolius incanis, floribus terminibus subfessilibus, calycibus tubulosis, dentibus ovatis. W.

A. (*olympicus*) frutescens, petiolis spinescentibus subseptemjugis leguminibus pedunculatis axillaribus cylindraceo-mucronatis. *Pall. Astrag. p. 4. n. 5. t. 4. f. 3.* *

Tragacantha orientalis humillima flore magno albo.
Tournef. cor. 29?

Weißblättriger Traganth. W.

Habitat in Armenia. ḥ (v. f.)

Frutex ramosissimus, ramis senioribus nigricantibus. Folia sex-vel septemjuga. Foliola oblonga obtusifolia villoso-alba. Flores albi brevissime pedunculati ex foliorum axillis in apice ramorum. Calyx tubulosus sericeus. W.

* 165. ASTRAGALUS caucasicus.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis subseptemjugis, foliolis lanceolatis mucronatis hirtis, floribus axillaribus geminatis fessilibus, calycibus campanulatis, dentibus lanceolatis. W.

A. fruticosus, petiolis spinescentibus rectissimis septemjugis remotis, floribus geminis axillaribus, leguminibus tetraspermis. *Pall. Astrag. p. 2. n. 2. t. 2.* *

Tragacantha orientalis humillima foliis Viciae costae pureae innascentibus. *Tournef. cor. 29.*

Caucasicus Traganth. W.

Habitat in rupibus alpestribus sterilissimis Caucasi ad fluvium Terek prope Tschim et in Armenia. ḥ (v. f.)

Folia viridia hirta septem vel octojuga. Foliola mucronata, mucrone valido. Petioli spinescentes flavopurpurecentes. Flores albi, infra apicem, geminati, ex omnibus foliorum axillis. W.

* 166. ASTRAGALUS gummifer.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis subsexjugis
H h 2

glabris, foliolis oblongis obtusiusculis, floribus axillaribus sessilibus aggregatis, calycibus glabris. W.

A. *frutescens, petiolis apice spinosis, foliolis ovato-lanceolatis glabris, floribus sessilibus in cylindrum dispositis coma foliacea.* Billard. Journal phys. 1790. p. 53. t. I. *

Gummitragender Traganth. W.

Habitat in Libano. ᄁ

Differt ab omnibus affinibus, foliis glabris, floribus que in ramis sessilibus axillaribus spicam cylindraceam formantibus. Flores sunt flavi. W.

*167. ASTRAGALUS *Erianthus.* W.

A. *frutescens, petiolis spinescentibus, folii subquinquejugis, foliolis oblongis acutis glabris, floribus axillaribus sessilibus aggregatis, calycibus globosis lanatis.* W.

Wollenblumiger Traganth. W.

Habitat in Armenia. ᄁ (v. f.)

Folia semipollucaria et ultra quadri-vel quinquejugia glabra. Foliola oblonga utrinque acuta glabra. Petioles persistentes spinoi pollucares flavescentes. Flores axillares sessiles numerosi. Calyx globofus lanugine densissima alba tectus. Ab omnibus affinibus calyce distinctus. W.

*168. ASTRAGALUS *microcephalus.* W.

A. *frutescens, petiolis spinescentibus, foliis quadrijugis, foliolis lanceolatis incanis mucronatis, floribus axillaribus sessilibus subcapitatis, calycibus lanatis.* W.

Tragacantha orientalis humillima argentea Barbae jovis folio. Tournef. cor. 29.

Kleinköpfiger Traganth. W.

Habitat in Armenia. ᄁ (v. f.)

Frutex semipedalis ramosissimus diffusus. Folia octolinearia quadrijuga. Foliola lanceolata utrinque albotoomentosa et attenuata, apice mucronata. Flore sessiles infra apicem caulis ex omnibus foliorum axillis capitulum parvum formantes. Calyx valde lanatus dentibus brevibus. Similis quoad calycem praecedenti, sed folius et floribus capitatis diversissimus. W

*169. ASTRAGALUS Eriocephalus. W.

A. frutescens petiolis spinescentibus, foliis subseptemjugis, foliolis lanceolatis villosis, floribus globo-capitatis, calycinis dentibus filiformibus lanato-plumosis corollam aequantibus. W.

A. orientalis, foliis angustissimis, capitulo purpurascente. Tournef. cor. 30.

Wollenköpfler Traganth. W.

Habitat in Armenia. ᄁ (v. f.)

Folia octo septem-vel sexjuga, Foliola lanceolata brevissime calloso-mucronata cano-villosa, Calyces corollam aequantes plumoso-villosi. W.

*170. ASTRAGALUS plumosus. W.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis quadrijugis, foliolis sericeo-incanis lanceolatis, floribus capitatis, calycinis dentibus filiformibus lanato-plumosis corolla brevioribus. W.

Fedriger Traganth. W.

Habitat in Galatia. ᄁ (v. f.)

A praecedente diversus: Foliolis angustioribus trivel quadrijugis sericeo-incanis, Capitulis majoribus magnitudine pruni minoris, Corollis majoribus, Calycibus minus lanatis dentibus vero plumosis. W.

Corolla purpurea. W.

*171. ASTRAGALUS aureus. W.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis subsexjugis, foliolis linear-lanceolatis glabriusculis, floribus globo-capitatis, calycinis dentibus subulatis villosis. W.

A. (aureus) frutescens, floribus glomerato-capitatis, calycibus villosis, petiolis spinescentibus, foliolis ovatis.

Willd. Act. Acad. Berol. 1794. p. 29. t. 1. f. 3. *

Tragacantha orientalis humilis, floribus luteis dense congestis in foliorum alis. Tournef. cor. 29.

Goldfarbiger Traganth. W.

Habitat in Armenia. ᄁ (v. f.)

*172. ASTRAGALUS compactus.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis quadrijugis, foliolis oblongis mucronatis villoso-incanis, flori-

bus globoso - capitatis, calycinis dentibus subulatis villosis. W.

A. (*compactus*) frutescens, floribus glomerato - capitatis, calycibus lanatis, petiolis spinescentibus, foliolis ovatis mucronatis. Willd. *Act. Acad. Berol.* 1794. p. 29. t. f. I. *

A. (*compactus*) frutescens, floribus glomerato - capitatis, petiolis spinescentibus, in fasciculum compactum et lanuginosum congestis. Lamarck *encycl.* I. p. 319. *

Tragacantha orientalis humilis candidissima et tomentosa. floribus in foliorum alis in capitulum densum na-

scentibus. *Tournef. cor.* 29.

β *Tragacantha orientalis humillima incana flore purpurea* scente. *Tournef. cor.* 29.

Gedrängter Traganth. W.

Habitat in Armenia. ḥ (v. f.)

Varietas β differt tantum capitulis florum minoribus ceterum nullo modo diversa. W.

* 173. ASTRAGALUS *longifolius*.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis decemjugis, foliolis lanceolatis mucronatis glabris, floribus oblongo - capitatis, calycinis dentibus filiformibus villo-

sis. W.

A. (*longifolius*) subacaulis, foliis longis glabriusculis, foliolis viridantibus lanceolatis apice spinosis, floribus glomeratis sessilibus. Lamarck *encycl.* I. p. 319. *

Tragacantha orientalis latifolia flore purpureo magno. *Tournef. cor.* 30.

Langblättriger Traganth. W.

Habitat in Armenia. ḥ (v. f.)

* 174. ASTRAGALUS *pugniformis*.

A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliis decemjugis, foliolis oblongis macronatis glabris, floribus globo-

capitatis calycinis dentibus linearie lanceolatis lanugi-

nosis. W.

A. (*pugniformis*) fruticosus procumbens, capitulis am-

plexicaulibus tomentosis, petiolis foliisque pungenti-

bus glabris. l'Herit. *flirp.* 170.

A. (*longifolius*) suffruticosus petiolis spinescentibus, fo-

liolis glabris lanceolato - acuminatis floribus glomera-

to - capitatis. *Willd. Act. Acad. Berol.* 1794. p. 30.
t. 2. f. 1. *

Tragacantha orientalis foliis oleae humillimae floribus in
capitulum congestis. *Tournef. cor.* 30.

Tragacantha orientalis. *Pocok. itin.* 3. p. 276. t. 88.

Faustförm ger *Traganth.* W.

Habitat in Armenia, Syria, Palaestina. ☰ (v. f.)

Simillimus praecedenti, sed Foliola latiora oblonga
plerumque 8 vel 10-juga, nec 10 vel 14-juga; Caly-
ces lana densissima intricata alba obsiti, dentibus li-
neari lanceolatis; Calyces praecedentis sunt cano-vil-
losi, dentibus longioribus filiformibus instructi. W.

Species 168—174 gaudent capitulis terminalibus,
sed durante florescentia surgit e medio capituli ramus
foliosus. W.

1380. B I S E R R U L A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1209.

Legumen biloculare, planum: dissepimento con-
trario, utrinque ferratum.

I. BISERRULA Pelecinus.

Biserrula. Hort. cliff. 361. Giseck. icon. fasc. 1. t. 17.
Mill. dict.

Astragalus purpureus annuus peregrinus, siliquis utrin-
que ferrae similibus. Morif. hist. 2. p. 107. f. 2. t. 9.
f. 6.

Securidaca siliquis planis utrinque dentatis. Bauh.
pin. 349.

Securidaca peregrina. Cluf. hist. 2. p. 238.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 707.

Gemeines Sägekraut. W.

Habitat in Sicilia, Hispania, Galloprovincia. ☺ (v. v.)

*1381. DALEA.

Ventenat. Act. Soc. Hist. nat. p. 112.

Alae et Carina columnae staminum adnatae. Stamina 5 ad 10 connata absque filamento libero. Legumen monospermum.

1. DALEA *cliffortiana*. W.

D. pentandra, spicis oblongis pedunculatis terminalibus, bracteis calycis longitudine, foliis subsexjugis linearicuneatis retusis apice subdentatis. W.

Dalea. *Hort. cliff.* 363. t. 22.*

Floralea (Dalea) foliis pinnatis, spicis terminalibus. Sp. pl. 1076.

Pteralea annua. Mill. dict. n. 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 711.

Cliffortische Dalea. W.

Habitat in Terra firma. 24 (v. f.)

In omnibus a me visis Daleis folia sunt impari-pinnata et foliola subtus punctata. Huic Caulis herbaeus sesquipedalis et ultra erectus ramosus glaber striatus teres, ramis divaricatis. Folia 4-5-vel 6-juga. Foliola linearicuneata retusa apicem versus levissime dentata, dentibus in utroque latere tribus vel quatuor. Spicae semirollicares et ultra densae solitariae terminales pedunculatae, Pedunculis uncialibus vel sesquiuncialibus nudis. Bractea longitudine calycis oblongo-lanceolatae glabrae margine membranaceae ciliatae. Calyces pilosi, dentibus linearifubulatis. Corolla coerulea. W.

*2. DALEA *alopecuroides*. W.

D. pentandra, spicis cylindricis pedunculatis terminalibus, bracteis calyce brevioribus, foliis subdecemjugis ellipticis retusis mucronatis. W.

Fuchsschwanzartige Dalea. W.

Habitat in America boreali. ♂ (v. v.)

Caulis pedalis erectus interdum et ascendens, apice ramoso teres striatus. Folia 10-12-juga, in olla educata. Sexjuga. Foliola linearicelliptica obtusa levissime retusa vel mucrone obtuso brevissimo instructa. Spi-

cae cylindricaes deniae sesqui-vel bipolllicares pedunculatae. Pedunculis brevissimis quadrilinearibus rarius, et tantum in spica primaria, semipollicularibus. Bracteae ovato-acuminatae calyce duplo breviores. Calyces villosi, dentibus linearis-subulatis. Corolla albido-coeruleascens. W.

*3. DALEA *candida*.

D. pentandra, spica cylindrica pedunculata bracteis flore longioribus, foliis trijugis lanceolatis. W.

Petalostemum candidum. Micheaux.

Weisse Dalea. W.

Habitat in America boreali. (v. f.)

Caulis teres striatus bipedalis. Folia inferiora trijuga superiore bijuga, summa ternata. Foliola lanceolata setaceo-mucronata. Spica terminalis bipollicularis densa longissime pedunculata. Pedunculo bivalve quadripolliculari nudo. Bracteae ovato-lanceolatae acuminatae flore longiores. Calyces glabri. Corolla candida. W.

*4. DALEA *violacea*. W.

D. pentandra, spica cylindrica pedunculata, bracteis calycem subaequantibus, foliis bijugis linearibus. W.

Petalostemum violaceum. Micheaux.

Veilchenrothe Dalea. W.

Habitat in America boreali. (v. f.)

Caulis sulcatus sesquipedalis. Folia bijuga rarius trijuga. Foliola linearia, in planta spontanea linearis-filiformia, in culta linearia duplo latiora, basi attenuata apice acuta. Spica cylindrica tripollicularis brevissime pedunculata interdum fere sessilis. Corolla purpurea. W.

*5. DALEA *Kuhnistera*. W.

D. pentandra, floribus capitatis bracteatis, pedunculis corymbosis. W.

Kuhnistera carolinensis. Lamarck encycl. 3. p. 357.*
Ventenat. Act. Soc. Hist. nat. 1. p. 113.

Kuhniae affinis (*pinnata*) caule subramoso bipedali, foliis impari-pinnatis, floribus corymbosis. Walt. carol. 103.

Kuhnienartige Dalea. W.

Habitat in Carolina.

Plantae hujus characterem nobis dedit Clariss. Ven-
tenat. l. c. W.

Calyx quinquesfidus, laciniis linearibus plumosis.
Corolla pentapetala. Vexillum Daleae. Alae et Ca-
rina columnae staminum insertae. Stamina quinque
monadelpha. Legumen monospermum calyce tectum,
cujus laciniae prominentes faciem pappi habent. Fo-
lia pinnata acuta. Flores aggregati corymbosi. Quod-
libet flororum Capitulum magno Bractearum numero est
tectum, quae calycem communem quasi represefiant
et totae plantae habitum Eupatorii conciliant. Act.
hist. nat. l. c.

6. DALEA enneaphylla. W.

D. decandra, spicis capitatis pedunculatis axillaribus, fo-
liis subquadrijugis oblongis obtusis. W.

Pforalea (*cuneaphylla*) foliis pinnatis, spicis axillaribus.
Sp. pl. 1076.

Pforalea carthaginensis. Jacq. amer. 206.* (excluso sy-
nonymo *Plukenetii*.)

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 203.

Neunblättrige Dalea. W.

Habitat in Carthaginæ. h (v. f.)

Foliola elliptica obtusa, punctis elevatis sparsis,
subtus magis gibba. Stamina omnia connata. Pianta
luteo-tinctoria.

Folia bi-tri-vel quadrijuga. Foliola oblonga obtu-
sa basi attenuata. Spicae capitatae pedunculatae
axillares. Pedunculi longitudine foliorum. Calycis
dentes capillacei pilosi. Alae staminum columnae in-
sertae. W.

*7. DALEA phymatodes. W. +

D. decandra, spicis capitatis pedunculatis axillaribus, fo-
liis suboctojugis ovatis. W.

Pforalea (*phymatodes*) foliis pinnatis, foliolis subtus
glandulosi tuberculatis, pedunculis spicatis axillaribus
et terminalibus. Jacq. ic. rar. 3. t. 563.

Pforalea emphytodes. Jacq. Collect. 4. p. 144.*

Aufgeblasene Dalea. W.

Habitat ad Caracas.

*8. DALEA *nutans*. W.

D. decandra, racemis axillaribus terminalibusque, floribus nutantibus, foliis multijugis ellipticis serrulatis. W.

Floralea (*nutans*) caule erecto, foliis impari-pinnatis, floribus nutantibus. *Cavan. ic. 3. p. 1. t. 201.**

Traubige Dalea. W.

Habitat in Nova Hispania. 2

Caulis *virgatus* *erectus* *tripedalis* apice *ramosus*. Folia *inferiora* 12-20 *juga*, summa 6-vel 5-juga. Foliola *elliptica* *acuta* *tenuissima* *serrulata*. Petiolus *communis* *articulatus*. Racemi *erecti* *terminales* et *axillares*. Flores *nutantes* dilute *violacei*. W.

*9. DALEA *citriodora*. W.

D. decandra, spicis capitatis pedunculatis terminalibus, foliis decemjugis obovatis. W.

Floralea (*citriodora*) foliis impari-pinnatis, pinnulis ovatis glabris eglandulosis, floribus spicato-capitatis.

*Cavan. ic. 3. p. 36. t. 271.**

Floralea (*foliolosa*) foliis pinnatis oblongis numerosis, spicis terminalibus bracteatis globose ovatis, calycibus compressis. *Ait. Kew. 3. p. 32.**

Wohlriechende Dalea. W.

Habitat in Nova Hispania. ○

Tota planta citrum redolens. Caulis *pedalis* *adscendens*. Folia *decemjuga*. Foliola *parva* *lanceolato-obovata* *eglandulosa*. Flores *capitato-spicati* *longe-pedunculati*. Corolla *alba* *alis* et *carina* apice *rubicundis*. W.

*10. DALEA *mutabilis*. W.

D. decandra, spicis cylindraceis terminalibus, foliis decemjugis obcordatis. W.

Floralea (*mutabilis*) foliis impari-pinnatis, pinnulis obovatis emarginatis glabris punctatis, spicis terminalibus. *Cavan. ic. 4. p. 65. t. 394.**

Veränderliche Dalea. W.

Habitat in insula Cuba et regno Mexicano. 5

Caulis jesquipedalis apice ramosus. Folia sex-ad decemjuga. Foliola obcordata. Spica terminalis cylindraceo-conica tripollicaris pedunculata. Calyx pubescens, dentibus ovatis brevissimis. Corolla primum alba deinde punctis violaceis conspersa, denique violacea. W.

* II. DALEA *Lagopus*. W.

D. decandra, spicis cylindricis terminalibus, foliis quindecimjngis lanceolatis obtusis. W.

Pforalea (*Lagopus*) foliis pinnatis, pinnulis numerosis oblongis glabris, aliis et carina basi ovalibus. Cavan. ic. I. p. 59. t. 86.*

Pforalea (*leporina*) foliis pinnatis oblongo-linearibus numerosissimis spicis oblongis villosis lanceolatis. Ait. Kew 3. p. 81.*

Hasenfußartige Dalea. W.

Habitat in Mexico. ◎

Caulis quadripedalis ramosus, ramis divaricatis. Folia quindecimjuga. Foliola lanceolata obtusa basi attenuata. Spicae jesquipollicares cylindricae longe pedunculatae. Calycis dentes lanceolati villosi. Corolla violacea. W.

* I2. DALEA *reclinata*. W.

D. decandra, spicis cylindricis terminalibus, foliis subsexjngis lanceolatis acutis pubescentibus, caule procumbente. W.

Pforalea (*reclinata*) caule procumbente, foliis pinnatis, floribus dense spicatis decandris, carina longiore. Cavan. ic. I. p. 60. t. 87.*

Liegende Dalea. W.

Habitat in Mexico.

Caules vix pedales procumbentes ramosi. Folia inferiora sexjuga summa trijuga. Foliola lanceolata utrinque attenuata acuta pubescentia. Spicae densae cylindricae jesqui- vel bipollicares. Calycis dentes lanceolato-subulati villosi. Gorolla dilute violacea. W.

Omnes praecedentes species gaudent foliis glaberrimis. W.

* 13. DALEA *lutea*. W.

D. decandra, spicis cylindricis terminalibus, carina alis duplo longiore, foliis octojugis tomentosis obovatis retusis, caule procumbente. W.

Pforalea (lutea) caule decumbente, floribus spicatis luteis, foliorum pinnulis ovatis subtomentosis. *Cavan.* ic. 4. p. 12. t. 325.*

Gelbe Dalea. W.

Habitat in Mexico. 4

Caules pedales procumbentes ramosi. Folia inferiora octojuga summa trijuga. Foliola parva tomentosa. ut tota planta, obovata retusa. Spicae sesquipollulares cylindricae terminales pedunculatae. Pedunculus longitudine fere spicae vel brevior. Bracteae lanceolatae calyce breviores. Calycis dentes ovati acuminati breves aequales. Corolla flava, alis obtusis carina duplo brevioribus. W.

* 14. DALEA *tomentosa*. W.

D. decandra, spicis cylindraceis terminalibus, foliis quadrijugis obovatis tomentosis, caule erecto. W.

Pforalea (tomentosa) caule virgato tomentoso, foliis pinnatis, floribus spicatis terminalibus. *Cavan. ic. 3.* p. 21. t. 240.*

Filzige Dalea. W.

Habitat in Mexico. 4

Canis virgatus, ut tota planta tomentosus, tripedalis. Folia quadrijuga summa bijuga. Foliola obovata obtusa. Spicae pollulares cylindraceae pedunculatae. Bracteae filiformes calyce longiores. Calycis dentes breves ovati acuti, duo inferiores longiores. Corolla violacea. Carina etiam alis longior nec tam valde elongata. W.

1382. F S O R A L E A.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1210.

Calyx longitudine Leguminis. *Stamina* diadelpha. *Legumen* monospermum subrostratum evalve.

1. PSORALEA *pinnata*.

P. foliis pinnatis bijugis linearibus, pedunculis axillari-
bus unifloris. W

P. foliis pinnatis linearibus, floribus axillaribus. *Hort.*
upf. 225.* *Mill. dict. n. 1.* *Berg. cap. 218.* *Weig.*
obf. p. 331. *Thunb. prod. 136.*

P. foliis pinnatis: foliolis linearibus acuminatis. *Roy.*
lugdb. 373.

Dorychnium caule fruticoso, foliis pinnatis: foliolis li-
nearibus. *Hort. cliff.* 370.

Spartium africanum. *Riv. tetr.* 5.

Genistae affinis arbor africana monospermos, flore coeru-
leo, foliis pinnatis. *Herm. lugdb.* 272. t. 273.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 294.

Gefiederte Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei rivulos. † (v. v.)

Pedunculi axillares, solitarii, eglumes, hirsuti.

2. PSORALEA *laevigata*. †

P. foliis pinnatis, stipulis solidis subacutis minutissimis.
Lin. suppl. 339.

Glatte Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. †

Frutex ramis laevibus striatis purpurascens. Folia pinnata. Foliola lanceolata septena vix manife-
ste subitus punctata. Stipulae nullae sed vix manife-
stum tuberculum acutiusculum utrinque loco stipulae.
Flores purpurei non striati. Pollen aureum nitens.
Differt a *P. pinnata*: foliis non semipalmaribus linea-
ribus acuminatis pubescentibus atropunctatis; stipulis
non paleaceis; ratis non pubescentibus; calycibus non
fuscis; corollis non striatis. *Lin. suppl.* l. c.

*Hujus non mentionem fecit Illust. Thunberg, an va-
rietas praecedentis?* W.

*3. PSORALEA *odoratissima*.

P. foliis pinnatis subseptemjugis, foliolis linear-lanceolatis, pedunculis unifloris axillaribus. *Jacq. hort. Schoenb.* 2. p. 54. t. 229.*

Wohlriechende Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

Similis S. pinnatae at diversa: foliis sex- vel septem-jugis, foliolis linear-lanceolatis utrinque attenuatis, floribus odoratissimis. Flores sunt ex albo-coerule-scentes striati. W.

*4. PSORALEA *verrucosa*. W.

P. foliis pinnatis ternatisque lanceolatis, pedunculis axillaribus solitariis trinisve uni- vel trifloris, ramis verrucosis. W.

P. (*angustifolia*) foliis ternatis linearibus, pedunculis axillaribus solitariis trinisve paucifloris. *Ait. Kew. 3. p. 79.*

P. (*angustifolia*) foliis ternatis pinnatisque, foliolis linear-lanceolatis, pedunculis axillaribus solitariis binis trinisve, uni- bi- vel trifloris. *Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 53. t. 226.**

P. (*triflora*) foliis ternatis simplicibusque elliptico-lanceolatis, floribus lateralibus ternis. *Thunb. prod. 135?* Warzige Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. v.)

Folia pinnata bijuga et terua. Foliola linear-lanceolata. Distinctissima ramis verrucosis. W.

5. PSORALEA *acuteata*.

P. foliis ternatis, foliolis cuneiformibus recurvato-mucronatis, floribus axillaribus solitariis approximatis. *Ait. Kew. 3. p. 79.*

P. foliis ternatis, foliolis cuneiformibus recurvo-mucronatis, capitulis terminalibus. *Sp. pl. 1074.*

P. foliis ternatis, foliolis trigonis mucronatis glabris, floribus capitatis. *Thunb. prod. 136.*

P. foliis ternatis minimis confertissimis recurvatis in spinulam definentibus. *Andrews repof. 3. p. 146. t. 146.*

Pforalea foliis ternis, foliolis cuneiformibus triquetris, aculeatis. *Roy. lugdb. 373.*

Genista Spartium africanum trifolium, floribus coeruleis, foliis minimis in spinulam desinentibus. *Raj. dendr.* 104.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 295. t. 29. f. 2.

Stachliche Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Frutex floribus lateralibus, solitariis, absque bracteis. Ram: angulati. Foliola cuneata.

6. PSORALEA bracteata.

P. foliis ternatis, foliolis obovatis recurvato-mucronatis pellucido-punctatis, spica terminali capitata, bracteis ciliatis. W.

*P. foliis ternatis obovatis recurvato-mucronatis, spicis ovatis. Mant. 264. Berg. cap. 224. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 52. t. 224.**

P. foliis ternatis, foliolis obovatis mucronatis glabris, spicis terminalibus bracteis ciliatis. Thunb. prod. 136.

Ononis (trifoliata) fruticosa, foliis sessilibus ternatis, spicis pedunculatis subvillosois. Syst. Nat. tom. II. p. 479.

Trifolium fruticans. Sp. pl. 2. p. 1085. Fabric. helm. 2. p. 305.

Trifolium spicis subrotundis: lacinia calycum infima maxima, foliis fere sessilibus. Hort. cliff. 373. Roy. lugdb. 378.*

Trifolium africanum fruticans, flore purpureo-scente. Comm. hort. 2. p. 211. t. 106.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 297.

Punctirte Flora ea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Caulis fruticosus, determinate ramosus: ramis teretibus, pubescentibus. Folia ternata, sessilia. Foliola obovata, laevia, punctata, apice spina patula mucronata. Stipulae paleaceae, lanceolatae, acuminatae, ciliatae. Spicae terminales, solitariae, ovatae, subvillose, pedunculatae. Flores interstincti Bracteis ovatis, acuminatis, ciliatis, longitudine fere florum. Corolla violacea; Carina alba antice macula violacea. Calyces pilosi: dentibus linearibus: infimo ovato majore.

*7. PSORALEA involucrata.

P. foliis ternatis, foliolis obovatis acutis rigidis glabris, floribus umbellatis terminalibus involucratis. W.

P. foliis ternatis, foliolis ovatis acutis glabris, umbellis terminalibus involucratis. Thunb. prod. 136.

Eingehüllte Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ৎ (v. f.)

8. PSORALEA spicata.

P. foliis ternatis foliolis obovatis recurvato-mucronatis subtus punctatis, spica terminali oblonga. W.

P. foliis ternatis oblongis obtusis, spicis cylindricis. Mant. 264.

P. foliis ternatis, foliolis oblongis mucronatis, spicis terminalibus. Thunb. prod. 135.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 197.

Aehrentragende Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei campis ৎ (v. f.)

Caulis fruticosus: ramis alternis, teretibus, erectis, pubescentibus. Folia ternata, petiolata: Foliola oblonga, obtusa (rarius mucrone minuto debili), punctata, obsolete pubescentia; intermedio longiore. Petio- li brevissimi. Stipulae angustiae, petiolo vix longiores. Spicae longiores, sessiles, cylindricae, solitariae. Flo- res coerulei, interstincti Bracteis linearibus, scariosis, vix calycis longitudine. Calyces pubescentes: denti- bus brevibus, subaequalibus, subulatis, obtusis.

Foliola revera mucronata, mucrone tenui reflexo, subtus punctata, sed puncta non pellucida sunt ut in P. bracteata. W.

9. PSORALEA aphylla.

P. foliis caulinis ramisque ternatis et simplicibus, ramu- lorum nullis, stipulis subimbricatis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 51. t. 223. *

P. foliis nullis, stipulis mucronatis brevissimis versus flores subimbricatis. Mant. 450.

P. aphilla stipulis mucronatis brevissimis. Thunb. prod. 135.

P. foliis nullis, stipulis ovatis sessilibus adpressis acutis. Amoen. acad. 6. afr. 34. *

Genista Spartium caeruleum Cap. b. spei. Breyne cent. t. 25.

β P. (decidua) foliis simplicibus linear-lanceolatis flori- bus lateralibus solitariis. Thunb. prod. 135.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. 1 i

P. (*decidua*) foliis linearis - subulatis deciduis, stipulis ovato-acutis persistentibus, floribus alternis subsessiliis terminalibus. *Berg. cap. 220.* *

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 298.

Blattlose Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. f.)

Frtex floribus lateralibus, subterminalibus. Folia nulla (at linearis-lanceolata. *Berg.*)

* 10. PSORALEA multicaulis.

P. foliis summis simplicibus reliquis ternatis, foliolis linearis lanceolatis mucronatis, pedunculis axillaribus aggregatis subcapitatis. *Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 55. t. 230.* *

Vielstengelige Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. f.)

Vexillum album. Alae et Carina violaceae. Similis *P. tenuifoliae* differt: caule herbaceo, pedunculis axillaribus aggregatis interdum capitatis. W.

II. PSORALEA tenuifolia.

P. foliis summis simplicibus, reliquis ternatis, foliolis linearis lanceolatis mucronatis, pedunculis axillaribus solitariis. W.

P. foliis inferioribus ternatis: superioribus simplicibus lanceolato - subulatis. *Sp. pl. 1074. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 52. t. 225.* *

P. foliis ternatis, foliolis linearis setaceis, floribus axillaribus. *Thunb. prod. 135.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 298.

Dünnblättrige Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. f.)

Pedunculi axillares, solitarii, glumosi. In aliis Pedunculi laterales conferti capillares, longitudine foliorum. Bracteae 2, setaceae, in medio pedunculo.

Pedunculi uniflori semper solitarii axillares, Bracteis binis lanceolatis medio suffulti. Vexillum apice coeruleum, Alae et Carina albae. W.

12. PSORALEA axillaris.

P. foliis ternatis, foliolis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Lin. Suppl. 338.*

P. (*linearis*) foliis ternatis, foliolis linearibus acutis, floribus lateralibus solitariis. Thunb. prod. 135.

Winkelblütige Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

Singularis pedunculis filiformibus unifloris.

*13. PSORALEA *decumbens*.

P. foliis ternatis, foliolis lanceolato-cuneatis recurvato-mucronatis, pedunculis axillaribus aggregatis. W.

P. (*decumbens*) foliis ternatis, foliolis cuneiformi-lanceolatis mucrone recurvo, floribus axillaribus. Ait. Kew. 3. p. 80.

P. (*mucronata*) foliis ternatis, foliolis obovatis mucronatis, floribus lateralibus. Thunb. prod. 135.

Liegende Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Ramorum cortex cinereus, juniores sericeo-canis.
Folia ternata. Foliola lanceolata basi attenuata apice mucronata, mucrone recurvo, glabra pellucido-punctata, costa media subtus pilosa. Pedunculi 4 f. 5 axillares aggregati. W.

14. PSORALEA *hirta*.

P. foliis ternatis, foliolis obovatis recurvato-mucronatis, floribus ternis spicatis, calycibus tomentosis. Ait.

Kew. 3. p. 80.

P. foliis ternatis, foliolis obovatis recurvato-mucronatis, floribus ternis sessilibus. Amoen. acad. 6. afr. 35.*

Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 54. t. 228.*

P. foliis ternatis, foliolis oblongis mucronatis subtus pubescentibus, umbellis lateralibus. Thunb. prod. 138.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 299.

Rauhe Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ (v. f.)

Calyces pubescentes.

Folia punctata subtus pilosa. Pedunculi axillares elongati floribus per intervalla ternis sessilibus, vel tantum tribus in apice. W.

15. PSORALEA *Stachydis*.

P. foliis ternatis petiolatis, foliolis oblongis mucronatis,

*spicis terminalibus interruptis, calycibus villosis. Lin.
Suppl. 338.*

*P. foliis ternatis, foliolis ovatis mucronatis utrinque
villosis, spicis terminalibus interruptis. Thunb.
prod. 136.*

Ziestariige Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

*Cantis hirsutus. Calyx fuscus villosissimus. Corolla
ferruginea.*

* 16. PSORALEA *striata*.

*P. foliis ternatis, foliolis oblongis mucronatis subtus pu-
bescens, racemis terminalibus interruptis. Thunb.
prod. 136.*

Gestreifte Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. f.)

* 17. PSORALEA *racemosa*.

*P. foliis ternatis, foliolis oblongis mucronatis, racemis
terminalibus elongatis. Thunb. prod. 135.*

Traubige Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

* 18. PSORALEA *argentea*.

*P. foliis ternatis, foliolis ovatis excisis mucronatis argen-
teis, racemis interruptis. Thunb. prod. 136.*

Silberfarbene Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

* 19. PSORALEA *tomentosa*.

*P. foliis ternatis, foliolis oblongis subtus tomentosis, ca-
pitulis terminalibus. Thunb. prod. 135.*

Filzige Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

20. PSORALEA *repens*.

*P. foliis ternatis obovatis emarginatis, caule repente, flo-
ribus subumbellatis. Mant. 263. Berg. cap. 223.*

*P. foliis ternatis, foliolis obovatis obtusis glabris, flor-
ibus umbellatis. Thunb. prod. 136.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 299.

Kriechende Pforalea. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ

Caules repentes, radicantes, sublignosi, ramosissimi, longissimi. Foliola ternata, petiolata. Foliola obovata, punctata, obtusa, nuda, sessilia. Petioli longitudine foliorum. Stipulae minutae, ovatae, acutae. Umbellae sessiles, inaequales, laterales terminalesque. Flores coerulei.

21. PSORALEA bituminosa.

P. foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis, petiolis pubescentibus laevibus, spicis capitatis pedunculatis axillaribus. W.

P. foliis omnibus ternatis, foliolis lanceolatis, petiolis laevibus, floribus capitatis. Sp. pl. 1075. Berg. cap. 221. Mitt. dict. n. 8. Fabric. helmsi. 307. Kniph. cent. 2. n. 63.

P. foliis omnibus ternatis: pedunculis capitatis. Hort. upf. 225. Spec. 2. p. 1075.

Trifolium capituliflorum subrotundis, calycibus ventricosis, caule arborecente. Hort. cliff. 373.

Trifolium bitumen redolens. Bauh. pin. 327.

Trifolium bituminosum. Dod. pempt. 566.

β. *Trifolium bitumen redolens angustifolium.* Boerh. lugdb. 2. p. 32.

Trifolium bituminosum inodorum. Besl. eyft. aest. t. II. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 300.

Harzige Psoralea. W.

Habitat in Siciliae, Italiae, Narbonae collibus maritimis. ḥ (v. v.)

Variat foliolis lanceolatis et ovatis. Spicae subrotundae. Caulis suffruticosus.

Varietas β differt: foliolis linearis-lanceolatis, vexillis elongatis et capitulis longissime pedunculatis; sed e seminibus degenerat in vulgarem. W.

22. PSORALEA glandulosa.

P. foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis, petiolis scabris, racemis axillaribus. W.

P. foliis omnibus ternatis: foliolis lanceolatis, petiolis scabris, floribus spicatis. Sp. pl. 1075. Gouan. illustr. p. 50.

Pforalea foliis omnibus ternatis, caule erecto arborescente, pedunculis spicatis, bracteis minimis ciliatis. *Arduin. spec. 24. t. 8.*

Barba jovis triphylla, flore ex albo et coeruleo. *Feuill. per. 7. t. 3.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 301.

Drüsige *Pforalea*. W.

Habitat in Peru. 5 (v. v.)

Similis P. americanae: sed Spicae elongatae fere racemosae, Bracteis minimis, nec calycum longitudine.

Odor rutae. Caulis suffruticosus.

23. PSORALEA *palaestina*.

P. foliis ternatis, foliolis ovatis, petiolis pubescentibus fulcatis, spicis capitatis pedunculatis axillaribus. W.

P. foliis omnibus ternatis: foliolis ovatis, petiolis pubescentibus, floribus capitalis. *Syst. Veg. 570. Suppl. pl. 339. Jacq. hort. 2. p. 86. t. 184.*

P. hirsuta, foliolis imis ovato-orbiculatis, summis lanceolatis, floribus capitatis, calycibus fructiferis inflatis. *Gouan. illustr. 51.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 709.

Orientalische *Pforalea*. W.

Habitat in Palaestina. 24 (v. v.)

Folia pilosa. Petioli multis striis. Stipulae patulae. Capiula depressa. Bracteae cinereae. Flores violacei, magni. Caulis herbaceus.

24. PSORALEA *americana*.

P. foliis ternatis, foliolis subrotundo-ovatis apice repandis, spicis interruptis axillaribus. W.

P. foliis ternatis: foliolis ovatis, dentato-angulatis, spicis lateralibus. *Syst. Veg. 571. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 53. t. 227. **

P. foliis ternatis: foliolis subrotundis angulatis, spicis pedunculatis. *Sp. 2. p. 1075.*

Trifolium americanum. *Lob. ic. 2. p. 31. Dod. pempt. 567. Bauh. pin. 327.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 709.

Maderasche *Pforalea*. W.

Habitat in Madera. 5

Caules diffusi, herbacei, punctis glandulosis adspersi.

Folia ternata: intermedio majore petiolato subrotundo, obtusissima, obsolete dentata aut angulata, adspersa punctis glandulosis, ut in congeneribus. Spicae axillares, oblongae, pedunculis longitudine foliorum. Lob et Dod. figurae bonaæ sunt.

25. PSORALEA capitata.

P. foliis ternatis simplicibusque linearibus, capitulo terminali. *Lin. suppl.* 339.

P. foliis simplicibus elliptico-linearibus, floribus spicatis. *Thunb. prod.* 135.

Kopfförmige Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

Rami striati. Folia petiolata ternata linearia digitalia punctis vix conspicuis confertissimis utrinque adspersa, suprema simplicia. Capitulum subrotundum terminale foliis saepe tribus simplicibus linearibus cinctum. Vexillum similibus punctis ut folia adspersum.

26. PSORALEA rotundifolia.

P. foliis simplicibus ovatis integerrimis, capitulis bracteisque villosis. *Lin. suppl.* 338.

P. foliis simplicibus ovatis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 135.

Rundblättrige Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

27. PSORALEA corylifolia.

P. foliis simplicibus ovatis, subdentatis: spicis ovatis. *Hort. upf.* 225. *Mill. dict. n. 10.* *Burm. ind. t. 49. f. 2.* *Vahl symb. I. p. 65.*

P. folio integro subrotundo. *Juss. act. 1744. p. 382.* *Trifolium (unifolium) leguminibus racemolis nudis monospermis, foliis simplicibus cordato-subrotundis repandis. Forsk. descr. 140.*

Dorychnium foliis simplicibus ovatis. *Roy. lugdb.* 389. *Loto affinis coryli folio. Dodart. act. 4. p. 289. t. 289.*

Pluk. alm. 227. t. 96. f. 5.

Houttayn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 710.

Hafelblättrige Psoralea. W.

Habitat in India orientali. ⊖ (v. v.)
Variat foliis superioribus ternatis. W.

28. PSORALEA pentaphylla.

P. foliis digitato - quinatis: foliolis inaequalibus. *Hort. upf.* 225.
 P. pentaphylla, radice crassa. *B. Juss. act.* 1744. p. 381.
 t. 17.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 711.

Fünfblättrige Psoralea. W.

Habitat in Mexico. 4

29. PSORALEA prostrata. †

P. foliis supradecompositis digitatis linearibus. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 36.*

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 711.

Gestreckte Psoralea. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

1383. T R I F O L I U M.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1211.

Flores subcapitati. *Legumen* vix calyce longius, non dehiscens, deciduum.

† *Meliloti leguminibus nudis polyspermis, floribus racemosis.*

I. TRIFOLIUM coeruleum.

T. racemis oblongis pedunculatis, leguminibus ventricosis seminudis dispermis mucronatis, caule erecto, stipulis lanceolatis membranaceis. W.

T. racemis ovatis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto, spicis oblongis. *Syst. Veg.* 571. *Doerr. n. 111.* p. 234. *Blackw. t. 284.* *Kniph. cent.* 5. n. 92. *Hoffm. germ.* 263.

T. spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 375. *Spec. 2. p. 1077.* *Roy. lugdb.* 381. *Mill. dict.* n. 12.

Lotus hortensis odorata. *Bauh.* 331.

Lotus sylvestris. *Cam. epit.* 724.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 713.

Schabzieger-Klee. W.

Habitat in Bohemia, Lybia. ⊙ (v. v.)

2. TRIFOLIUM *indicum.*

T. leguminibus racemosis nudis laevibus stylo mucronatis monospermis, caule erecto. W.

T. leguminibus racemosis nudis monospermis, caule erecto. *Hort. upf. 223. Kniph. cent. 10. n. 90.*

T. erectum, caule teretiusculo, pedunculis compresso-angulatis, pericarpiis racemosis rotundis rugosis nudisculis monospermis. *Fl. zeyl. 552.**

Melilotus lutea *indiae orientalis* *erecta*, folliculis rotundis parvis. *Pluk. alm. 246. t. 45. f. 4.*

β. *Melilotus humilis ex cta*, floribus exiguis odoratis albis. *Pluk. alm. 247. t. 45. f. 5.*

γ. *Melilotus vulgari nostrati affinis*, folio minore et angustiore. *Bauh. hist. 2. p. 371.*

Melilotus angustifolia repens, folliculis rotundis. *Bauh. pin. 331. prodr. 144.*

δ. *Melilotus lutea minor*, floribus et siliculis minoribus spicatum et dense dispositis. *Morif. hist. 2. p. 161.*

Melilotus nova Berardi f. *erecta*, folliculis rotundis minor. *Raj. hist. 951.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 714.

Indischer Klee. W.

Habitat in India, Africa. ⊙ (v. v.)

Varietates datas vix notae sufficietes distinguunt.

Varietatem δ absque charactere specifico distinxit Clariss. Desfontaines. W.

3. TRIFOLIUM *mesfanense.*

T. leguminibus monospermis ovatis acutis nudis arcuatim rugosis, racemis folio brevioribus, caule erecto. W.

T. leguminibus racemosis nudis monospermis arcuato-striatis semiovatis acutis, caule erecto. *Lin. suppl. 339.*

T. leguminibus arcuatim rugosis folio brevioribus, caule diffuso. *Mant. 275. Desf. atl. 2. p. 192.**

Melilotus mesfanensis procumbens, folliculis rugosis. *Raj. hist. 972.*

Messinascher Klee. W.

Habitat in Sicilia, Barbaria. ⊙ (v. v.)

Caulis erectus teres: Folia ternata obovata ferrulata. Racemi axillares breves erecti lutei. Legumina T. officinalis majora, sibi arcuatis parallelis, semi-ovata gibba.

* 4. *TRIFOLIUM mauritanicum.*

T. leguminibus monospermis obovatis obtusis nudis arcuatim rugosis, racemis folio longioribus caule difuso. W.

T. (M. mauritanica) leguminibus racemosis nudis monospermis subovatis arcuato-falcatis obtusis. Schousb. pl. maur. p. 196.

Melilotus (falcata) caule procumbente, floribus racemosis, leguminibus subroundis exsertis arcuatim striatis.

Desf. atl. 2. p. 193.?

Mauritanischer Klee. W.

Habitat in Barbaria. ⊙ (v. v.)

Affine praecedenti, sed notis indicatis abunde diversum. W.

* 5. *TRIFOLIUM macrorhizum.*

T. leguminibus racemosis nudis rugosis monospermis, caulis ramisque adscendentibus, foliolis linearibus.

*Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 1. p. 24. t. 26.**

Großwurzlicher Klee. W.

Habitat in subfalsis humidis Hungariae. 24 (v. v.)

Satis distinctum: Radice perenni, Caulibus adscendentibus, Foliolis linearibus, Leguminibus monospermis rugosis, Seminibus supra hilum dentatis. l. c.

6. *TRIFOLIUM polonicum.*

T. leguminibus racemosis nudis dispermis lanceolatis, caule erecto. Sp. pl. 1078. Reyg. ged. 2. p. 119. Gmel. it. 1. p. 139.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 714.

Potomischer Klee. W.

Habitat in Polonia. ⊙ (v. f.)

Differt a T. Meliloto officinali Caule omnino tereti: Folii minoribus, acuminatis, superne acute serratis. Racemo floribus remotis longiusque pedicellatis. Pedunculis teretibus, nec falcatis. Florum vexillis re-

plicatis, nec alis extrorsum marginibus longitudinaliter conniventibus, sed oblique divericatis: Leguminibus dispermis, parum rugosis, lanceolato-acuminatis, longioribus. Sæstra et Odor convenientiunt. Flores pallidissime flavescentes.

*7. TRIFOLIUM dentatum.

- T. leguminibus racemosis nudis dispermis subrugosis acutiusculis, stipulis basi dentatis, caule erecto. W.
 T. (*dentatum*) floribus racemosis leguminibus nudis subrugosis dispermis, stipulis dentato-partitis. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. I. p. 41. t. 42.*

Gezähnter Klee. W.

Habitat in pratis humidis Banatus. 24 (v. v.)

A sequente abunde diversum: Foliolis argute duplicito, denticulatis, Stipulisque basi partitis, dentatis. W.

8. TRIFOLIUM officinale.

- T. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, stipulis lanceolato-subulatis indivisis, caule erecto. W.
 T. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. Hort. cliff. 376. Hort. upf. 223. Fl. suec. 619, 673. Mat. med. 175. Roy. lugdb. 223. Dalib. paris. 225. Mill. dict. n. II. Gmel. fib. 4. p. 23. t. 7. Crantz. austri. p. 404. Pollich. pal. n. 697. Kniph. cent. 7. n. 95. Blackw. t. 80. Riv. t. 6. Hoffm. germ. 264. Roth. germ. I. 313. II. 165.

Melilotus siliquis racemosis, pendulis, acutis, rugosis, dispermis. Hall. helv. n. 362

Trifolium corollis polypetalis; racemis; siliquis monospermis, rugosis. Scop. carn. ed. I. p. 558. n. 9. ed. 2. n. 935.

T. odoratum f. Melilotus. Dod. pempt. 567.

Melilotus officinarum germaniae. Bauh. pin. 331.

β Melilotus officinarum germaniae, flore albo. Tournef. inst. 407.

Lotus sylvestris, flore albo. Tabern. hist. 893.

γ Melilotus vulgaris altissima frutescens, flore albo f. luteo, T. Raj. suppl. 407.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 715.

Meloten - Klee. W.

Habitat in Europae campesribus. ♂ (v. v.)

Varietas frutescens γ. radice bienni, caule altiori, floribus minoribus, vexillo lateribus deflexo.

9. TRIFOLIUM italicum.

T. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis integris. *Sp. pl. 1078. Desf. atl. 2. p. 192.*

Melilotus italicus, folliculis rotundis. Bauh. pin. 331.

Melilotus italicus. Cam. hort. 99. t. 29.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 717.

Italiäischer Klee. W.

Habitat in Italia, Barbaria. ♂ (v. v.)

10. TRIFOLIUM creticum.

T. leguminibus racemosis nudis dispermis membranaceis ovalibus, caule erectiusculo. *Sp. pl. 1078. Desf. atl. 2. p. 193.*

T. peltatum creticum. *Bauh. pin. 339. prodr. 142. t. 142.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 717.

Candischer Klee. W.

Habitat in Creta, Barbaria. ♂ (v. v.)

Habitus Meliloti italicae, foliis crassis, vix serratis, carnosis, inodoris, obtusis.

11. TRIFOLIUM ornithopodioides.

T. leguminibus nudis octospermis subternis calyce duplo longioribus, caulibus declinatis. *Sp. pl. 1078. Flor. dan. t. 368. Smith. brit. 2. p. 782.**

Medicago leguminibus ternatis erectis recurvis descendentibus, pedunculo communi. Hort. cliff. 376.

Trifolium siliquosum, lotus affine, siliquis ornithopodii. Pluk. alm. 375. t. 68. f. 1.

Foenum graecum humile repens, ornithopodii siliquis brevibus erectis. Raj. angl. 3. p. 331. t. 14. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 718.

Vogelfußartiger Klee. W.

Habitat in Anglia, Gallia, Dania. ♂

Racemos ovatus. Media inter Trifolia et Trigonellas.

† † Lotoidea leguminibus tectis, polyspermis.

12. TRIFOLIUM Lupinaſter.

T. capitulis dimidiatis, foliis quinatis sessilibus, leguminibus polyspermis. *Hort. upf.* 223. *Kniph. cent.* 5. n. 91.

T. leguminibus polyspermis, foliis pluribus. *Gmel. fib.* 4. p. 19. t. 6. f. 1.

Lupinaſter. Buxb. act. 2. p. 345. t. 20.

Lupinaſter floribus purpureis et albis, siliquis minoribus. Amm. ruth. 143: 144.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 8. p. 718.

Hopfenartiger Klee. W.

Habitat in Sibiria. 24 (v. v.)

13. TRIFOLIUM reflexum.

T. capitulis fructiferis reflexis, leguminibus trispermis, *Sp. pl.* 1079. *Gron. virg.* 2. n. 110.

T. leguminibus polyspermis, foliolis obverse ovatis denticulatis: floribus tetrapetalis, capitulis fructiferis reflexis. *Gron. virg.* 1. p. 84.

T. montano simile virginianum, floribus amoene purpureis amplioribus et magis patulis summo caule glomeratis per maturitatem reflexis. *Pluk. mant.* 285.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 8. p. 718.

Zurückgebogener Klee. W.

Habitat in Virginia. 24 (v. v.)

Folia mollia. Semina duo f. tria.

*14. TRIFOLIUM angulatum.

T. capitulis umbellaribus, fructiferis reflexis, leguminibus tetraspermis, caule decumbente angulato-fuscato flexuoso. W.

T. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caulis decumbentibus flexuosis. *Waldſt. et Kitaibel. pl. rar. hung.* 1. p. 26. t. 27.*

Eckiger Klee. W.

Habitat in locis salinis Hungariae. ⊙ (v. f.)

Caules decumbentes ramosi flexuosi angulato-fuscati

*glabri. Folia ternata. Foliola obovata argute denti-
culata mucronata emarginata. Stipulae petiolo adna-
tae lanceolato-acuminatae inferiores membranaceae.
Pedunculi axillares petiolo longiores. Capitula parva
floribus pedunculatis reflexis rubris. Calyx glaber den-
tibus subulatis subaequalibus. Legumen tetrasper-
num.* W.

* 15. TRIFOLIUM strictum.

*T. capitulis ellipticis, leguminibus dispermis, calycibus
longitudine corollae, foliolis lanceolatis obtusis ferru-
latis, stipulis rhombeis obtusis glanduloso-denticula-
tis.* W.

*T. capitulis globosis, leguminibus dispermis, calycibus
longitudine corollae, foliolis ferrulatis, stipulis rhom-
beis.* Sp. pl. 1079. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung.
1. p. 36. t. 37.*

*T. pratense annum minimum, foliis longis angustis ve-
nosis tenuissime ferratis, floribus albis congestis, fili-
quis minoribus dispermis.* Mich. gen. 29. t. 25.f. 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 719.

Steifer Klee. W.

*Habitat in Italiae, Hispaniae, Galliae, Hungariae pra-
tis, pascuis. ○ (v. f.)*

*Caulis inferne ramosus, patulus, laevis. Folia longe
petiolata, ternata, glabra, denticulata, striata in-
feriora obovata, superiora elliptica, demum lanceola-
ta. Stipulae latissimae, rhombeae, acumine subulato.
Pedunculi sulcati, axillares, pedunculo breviores.
Spicae rachi oblonga s. subglobosa. Calyx nudus den-
tibus subulatis: 2 superioribus corolla longioribus, post
anthesin reflexis dentibus patulis. Corolla valde par-
va. Bractae inter flores, lineares, acuminatae, vix
corollae longitudine.*

* 16. TRIFOLIUM laevigatum.

*T. capitulis ellipticis, calycibus corolla longioribus, fo-
liolis lanceolatis acuminatis ferrulatis, stipulis rhom-
beis acutis dentatis.* W.

*T. foliis lanceolatis ferratis, floribus capitatis peduncula-
tis, calycum dentibus setaceis glabris corolla longiori-
bus.* Desf. atl. 2. p. 195. t. 208.*

T. spicis glabris pedunculatis ovalibus, dentibus calycinis setaceis foliis cauleque glaberrimis. *Poiret. itin.*

2. p. 219.

Glatter Klee. W.

Habitat in pratis Barbariae.

Valde affine praecedentis. W.

*17. TRIFOLIUM caespitofum.

T. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, calycinis dentibus aequalibus, foliolis obovatis obtusis ferratis, caule erectinculo. W.

Trifolium caespitofum. *Reynier Mem. pour l'hist. nat. de la Suisse.* I. p. 162.

Trifolium (Thalii) caule suberecto, floribus erectis, leguminibus tetraspermis. *Vill. delph.* 3. p. 478. t. 41. *

Rasen-Klee. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Delphinatus. 24 (v. f.)

Simillimum T. hybrido, sed Caules breviores erecti-usculi, nullo modo repentes ut in T. repenti. Fl. liola apice subrotundo-truncata nec emarginata. Flores minores. W.

18. TRIFOLIUM hybridum.

T. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, calycinis dentibus subaequalibus, foliolis ovato-oblongis emarginatis ferrulatis, caule adscendente. W.

T. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. *Fl. suec.* 2. n. 664. *Pollich. pal.* n. 698. *Doerr. nass.* p. 235. *Hoffm. germ.* 264. *Roth. germ.* I. 313 II. 198.

Trifoliastrum pratense corymbiferum. *Mich. gen.* 28. t. 25. f. 2. 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 720.

Bastard-Klee. W.

Habitat in Europae cultis. 24 (v. v.)

19. TRIFOLIUM repens.

T. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, calycinis dentibus superioribus brevioribus, foliolis ovato-oblongis emarginatis ferrulatis, caule repente. W.

- T. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis,
caule repente. *Fl. suec.* 2. n. 665.* *Mat. med.* 175.
Mill. dict. 2. *Crantz. austr.* p. 405. *Pollich. pal.*
n. 699. *Kniph. cent.* 7. n. 96. *Hoffm. germ.* 264.
Roth. germ. I. 313. II. 198.
- T. capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, legumi-
nibus tetraspermis, caule procumbente. *Hort. cliff.*
375. *Fl. suec.* 612. *Roy. lugdb.* 378. *Gron. virg.*
85. *Dalib. paris.* 224.
- T. caule repente, spicis depresso-
siliquis depressis, siliquis tetraspermis.
Hall. helv. n. 367.
- T. corollis polypetalis: scapis axillaribus: siliquis tetra-
spermis; caule repente. *Scop. carni.* ed. 1. p. 528.
n. 8. ed. 2. n. 934.
- T. pratense album. *Bauh. pin.* 327.
- T. repens. *Riv. tetr.* 17. *Fl. lugdb.* 274.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 720.
Weisser Klee. W.
Habitat in Europae paucis. 24 (v. v.)

20. TRIFOLIUM comosum.

- T. capitulis umbellato-globosis imbricatis, vexillis de-
flexis persistentibus, leguminibus tetraspermis. *Roy.*
lugdb. 379.
- Lagopus americanus*, floribus majoribus comosis. *Pet.*
muf. 214.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 721.
Schöpfiger Klee. W.
Habitat in America.

21. TRIFOLIUM alpinum.

- T. capitulis umbellaribus, scapo nudo, leguminibus di-
spermis pendulis, foliis linear-lanceolatis. *Sp. pl.*
1080. *Pall. it.* 2. p. 123.
- T. scapis radicatis, floribus racemosis, foliis lanceolatis
nervosis. *Hall. helv.* n. 369.
- T. scapo nudo simplicissimo, foliis linear-lanceolatis.
Hort. cliff. 499. *Sauv. monsp.* 185.
- T. alpinum, flore magno, radice dulci. *Bauh. pin.* 328.
prodr. 143.
- T. angustifolium alpinum. *Pon. bald.* 340. t. 340.

Anonis acaulis, floribus longissimis, foliis non serratis.

Hall. helv. 588.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 722.

Alpen-Klee. W.

Habitat in alpibus Italicis, Helveticis, Pyrenaeis, Bal-
do. 24 (v. f.)

Variat alboflore. R.

† † † *Lagopoda calycibus villosis.*

22. TRIFOLIUM subterraneum.

T. capitulis villosis quinquefloris, coma centrali reflexa
rigida fructum obvolvente. *Hort. cliff.* 374.* *Hort.*
upf. 222. *Roy. lugdb.* 379. *Dalib. paris.* 224.

T. subterraneum. *Riv. tetr.*

T. pumilum supinum, flosculis longia albis. *Raj. angl.*
3. p. 317. et 478. t. 3. f. 2.

T. blefense. *Dodart. mem.* 4. p. 313.

T. album-tricoccum subterraneum gastonium reticula-

tum. *Hortif. hisp.* 2. p. 132. f. 2. t. 14. f. 5.

T. pratense supinum cathobleps. *Barr. ic.* 881.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 722.

Unterirdischer Klee. W.

Habitat in Gallia, Italia. ○ (v. v.)

Fructus capitula globosa terram penetrantia.

23. TRIFOLIUM globosum.

T. capitulis villosis globosis, calycibus superioribus flo-

sculo destitutis. *Hort. cliff.* 374.* *Roy. lugdb.* 379.

T. orientale, capitulo lanuginoso. *Tournef. cor.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 723.

Kuglicher Klee. W.

Habitat in Arabia, Syria. ○.

Caules filiformes, pedales, decumbentes. Capitula
lateralia, globosa, villosa, pedunculata. Flosculi tan-
tum inferiores corollati et fertiles; reliqui mutilati
in lanam extabescentes, replent capitulum et fertiles
calyces reflectum ad latera atque occultant.

*24. TRIFOLIUM hispidum.

T. capitulis villosis globosis terminalibus solitariis, caly-

cinis dentibus setaceis corolla brevioribus, caulis erectis, foliolis obovatis integerrimis. W.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

Kk

T. foliolis obovatis, capitulis florum involucratis terminalibus, dentibus calycinis setaceis villosis corolla brevioribus. Desf. atl. 2. p. 200. t. 209. f. 1. *

Scharshariger Klee. W.

Habitat in Barbaria prope Mascal inque Hispania. ⊖
(v. f.)

Tota planta piloso-hispida, pilis caulis reflexis. Capitula bracteis ovatis acutis involucrata. Corollae purpureae, vexillo lanceolato elongato. Valde simile sequenti, sed foliolis non emarginatis, corollis calyce longioribus, bracteisque capituli acutis diversum. W.

25. TRIFOLIUM Cherleri.

T. capitulis villosis globosis terminalibus solitariis, calycinis dentibus setaceis corolla longioribus, caulinibus procumbentibus, foliolis obcordatis integerrimis. W.

T. capitulis villosis globosis terminalibus solitariis, calycibus omnibus fertilibus, caulinibus procumbentibus, foliis obcordatis. Sp. pl. 1081. Roth. catalect. 2. p. 100.*

T. foliis emarginatis, capitulis rotundis involucratis terminalibus, dentibus calycinis setaceis villosissimis corollam aequantibus. Desf. atl. 2. p. 197.

T. capitulis globosis villosis, stipulis floralibus dilatatis cordatis, caulinibus procumbentibus. Gerard. prov. 509.

T. capitulis villosis hemisphaericis terminalibus bractea subcalyculatis, calycibus omnibus fertilibus. Amoen. acad. 4. p. 286.*

T. capitulis villosis globosis, calycibus omnibus fertilibus tomento connexis. Roy. lugd. 379.

T. capitulis villosis globosis terminalibus bractea orbiculata terminatis. Sauv. monsp. 184.

T. globosum repens. Bauh. pin. 329. prodr. 143.

T. glomerulis personatae cherleri. Bauh. hist. 2. p. 277.
Lagopus minor supinus, molli et compresso capite.

Barr. ic. 859.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 723.

Cherlerischer Klee. W.

Habitat in Gallia, Hispania, Barbaria. ⊖ (v. v.)

Affine T. lappaceo, sed Calyces toti pilosi. Caulicuii

tomentosiflora. Bracteae 3, maxima, cordatae, ad margines coloratae. Stipulae magnitudine foliorum. Ger.

Stipulae ovatae cuspidatae. Bracteae subrotundae obtuse magnae capitulum involventes. W.

*26. TRIFOLIUM pictum.

T. capitulis villosis subglobosis terminalibus solitariis, calycinis dentibus setaceis corolla brevioribus, caulis diffusis, foliolis obovatis denticulatis. W.

T. capitulis villosis subglobosis terminalibus solitariis sessilibus, bracteis tribus cordato-mucronatis, caulis diffusis, foliolis obovatis. Roth. catalect. 2. p. 101.* Bunter Klee. W.

Habitat — — — — ⊙ (v.v.)

Foliola juniora disco macula purpurea instructa. Corollae pupureae, vexillo lanceolato elongato. Bracteae ovatae acuminatae capitulum involventes. W.

*27. TRIFOLIUM sphaerocephalon.

T. capitulis villosis globosis terminalibus solitariis, calycinis dentibus setaceis corolla duplo longioribus, caulis procumbentibus, foliolis cuneatis integerrimis marginatis. W.

T. villosum, foliolis obcordatis, capitulis rotundis involucratis, laciniis calycinis setaceis corolla longioribus. Desf. atl. 2. p. 201. t. 209. f. 2.*

Lagopus minor molli et comprepresso capite, flore albo. Barr. ic. 859.

Kugelköpfiger Klee. W.

Habitat in Barbaria arvis prope Mascal.

Bracteae subrotundae capitulum involventes. Simile T. Cherleri sed minus, Foliola lanceolato-cuneata emarginata, Calycisque dentes corolla duplo longiores. W.

*28. TRIFOLIUM saxatile.

T. capitulis villosis subglobosis terminalibus lateralibusque solitariis, calycinis dentibus subulatis corollam aequantibus, caulis erectis, foliolis lanceolato-cuneatis emarginatis. W.

Trifolium saxatile. Allion. ped. n. 1108. t. 59. f. 3.

T. (thymiflorum) foliis obovatis hirsutis, capitulis late-

ralibus terminalibusque minutis, caule erecto. *Vil-lars-delph.* 3. p. 487. *

T. capitulis thymi. *Bauh. pin.* 329. *prod.* 140. *Tour-nef. inst.* 406.

T. parvum erectum flore glomerato cum unguiculis. *Bauh. hist.* 2. p. 378.

Stein-Klee. W.

Habitat ad ripas subulosa torrentum Helvetiae, Delphinas, Pedemontii. ♂ (v. f.)

Capitula bracteis ovatis acutis involucrata. Calyces tubulosi, villosi, dentibus brevibus subulatis. W.

*29. TRIFOLIUM *capense*. W. †

T. capitulis globosis lanatis involucratis, caule herbaceo decumbente, foliolis obovatis obtusis pilosis. W.

Trifolium diffusum. Thunb. prod. 136.

Capischer Klee. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*30. TRIFOLIUM *lanatum*. †

T. capitulis globosis lanatis ebracteatis, caule herbaceo decumbente, foliolis obovatis obtusis pilosis. *Thunb. prod.* 136.

Williger Klee. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

*31. TRIFOLIUM *hirsutum*. †

T. capitulis globosis hirsutis, caulis herbaceis diffusis, foliolis oblongis hirsutis. *Thunb prod.* 136.

Haariger Klee. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

32. TRIFOLIUM *lappaceum*.

T. capitulis subglobosis hispidis, dentibus calycinis subulatis corollam aequantibus, caule diffuso, foliolis obovatis retusis. W.

T. spicis subovatis, calycinis dentibus setaceis hispidis, caule patulo, foliis ovatis. *Sp. pl.* 1082.

T. globosum f. capitulo lagopi rotundiore. *Bauh. pin.* 329. *prod.* 143.

T. capitulo glomerato rigido. *Bauh. hist.* 2. p. 377.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 724.

Kletten - Klee. W.

Habitat Monspelii. ⊙ (v. v.)

Caulis divaricatus. Calyx laevis dentibus absoluto flore rigescens. Corollae 1-petalae, pallidae albae.

*33. TRIFOLIUM *diffusum.*

T. spicis subrotundo-ovatis villosis, calycinis dentibus inaequalibus setaceis corollam aequantibus, caule erecto, foliolis oblongis mucronatis subdenticulatis. W.

T. spicis villosis rotundato-ovatis, foliolis ovato-oblongis subintegerrimis, corollis monopetalis, calycinis dentibus inaequalibus, leguminibus circumscissis.

*Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. I p. 49. t. 50.**

T. radice annua, caule diffuso piloso, foliolis ovalibus subintegerrimis ciliatis, capitulis subglobosis terminalibus pedunculatis diphyllis pilosissimis, dentibus calycinis setaceis erectis inaequalibus, corollis monopetalis calyce vix longioribus, leguminibus subinclusis dispermis. *Erhrh. Beitr. 7. p. 165.*

Ausgebreiteter Klee. W.

Habitat in arenosis Hungariae, Sibiriae. ♂ (v. v.)

*34. TRIFOLIUM *Lagopus.*

T. spicis oblongis villosis terminalibus solitariis, calycinis dentibus setaceis corollam monopetalam aequantibus, caulinis diffusis, foliolis obovatis denticulatis. W.

Trifolium Lagopus. Pourret.

Hasenfuß - Klee. W.

Habitat in Hispania. ⊙ (v. f.)

Cáules plures simplices quadriplicares e radice filiformi, diffusi villosi. Foliola parva obovata denticulata obtusa non emarginata villosa. Stipulae ovatae ampliae nervosae petiolo adnatae denticulatae. Spicae octolineares oblongae villosae solitariae terminales folio suffultae. W.

*35. TRIFOLIUM *stipulaceum.* +

T. capitulis villosis ovatis terminalibus, caule herbaceo basi decumbente, foliolis excisis villosis. *Thunb. prod. 136.*

Ausgeschnittener Klee. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

36. TRIFOLIUM rubens.

T. spicis cylindraceo-oblongis, calycinis dentibus villosis, infimo longitudine corollae monopetalae inaequalis, stipulis ensiformibus, foliolis lanceolatis obtusis ferrulatis, caule erecto. W.

T. spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis ferrulatis. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 380. *Sauv. monsp.* 184. *Mill. dict.* n. 6. *Crantz aust.* p. 406. *Jacq. aust.* t. 385. *Scholl. barb.* n. 593. *Pollich. pal.* n. 700. *Gmel. tub.* 226. *Kniph. cent.* 5. n. 93. *Hoffm. germ.* 264. *Roth. germ.* I. 314. II. 199.

T. foliis nervosis, ciliatis, spicis ovatis, obesis, calycis denticulis plumosis, imo longissimo. *Hall. helv.* n. 375.

T. corollis monopetalis aequalibus, calycino imo dente nihilo longioribus, spicis oblongis, foliis ferrulatis. *Hall. helv.* n. 925.

T. montanum, spica longissima rubente. *Bauh. pin.* 328. *Lagopus major alter.* *Dod. pempt.* 578.

β Trifolium spica oblonga rubra. *Bauh. pin.* 328. *Houttuyn Lin. Pl. Syst.* 8. p. 725.

Rother Klee. W.

Habitat in Italia, G. Narbonensi, Helvetia etc. 24 (v. v.)
Dens calycis infimus longitudine corollae.

37. TRIFOLIUM pratense.

T. spicis densis ovatis, calycis dente infimo tubo corollae monopetalae inaequalis breviore, stipulis aristatis, foliolis ovalibus subintegerrimis, caule adscendente. W.

T. spicis globosis subvillosis, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. *Sp. pl.* 1082. *Mill. dict.* n. 1. *Crantz aust.* p. 407. *Neck. gallop.* 315. *Pollich. pal.* n. 701. *Knorr. del.* 2. t. T. 3. *Kniph. cent.* 1. n. 91. *Blackw. t.* 20. *Fl. dan.* 989. *Hoffm. germ.* 264. *Roth. germ.* I. 314. II. 200.

T. spicis densis, corollis inaequalibus, dentibus calyci-

- nis quatuor aequalibus, stipulis aristatis, caulis adscendentibus. *Afzel. Act. Soc. Lin. Lond.* I. p. 240.*
T. spicis villosis, caule diffuso, foliis integerrimis.
Hort. cliff. 375. *Fl. suec.* 615, 666. *Roy. lugdb.*
580. *Dalib. parif.* 222.
T. caule obliquo, foliis ovatis hirsutis, supremis conjugatis, vaginis aristatis. *Hall. helv.* n. 377.
T. corollis monopetalis, inaequalibus; spicis subrotundis; stipulis setaceis; foliis integerrimis. *Scop. carn.*
ed. I. p. 524. n. I. ed. 2. n. 923.
T. pratense, flore monopetalo. *L. Fl. lapp.* 273.
T. pratense purpureum. *Bauh. min.* 327.
T. pratense. *Cam. epit.* 582. *Riv. t.* II.
β. T. procumbens villosum. *Hall. helv.* n. 377. *δ. Villars*
delph. 3. p. 413. *β.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 726.
Feuter Klee. W.
Habitat in Europae graminosis β in summis alpibus.
γ (v. v.)
Spica sessilis inter Folia duo, opposita, sessilia, quo-
rum Stipulae membranaceae, dilatatae, calycem quasi
communem constituant.
Varietat β differt caule procumbente foliis spicis-
que villosis floribus pallidis. W.

38. TRIFOLIUM medium.

- T. spicis laxis subglobosis solitariis, calycis dente infimo*
tubum corollae monopetalae subaequalis aequante,
stipulis subnatis, foliolis ellipticis tenuissime ferrula-
tis stricto-venosis, caulis ramosis flexuosis. W.
T. (medium) spicis laxis corollis subaequalibus, stipulis
subnatis conniventibus, caulis flexuosis ramosis.
Afzel. Act. Soc. Lin. Lond. I. p. 237.*
Trifolium medium. *Lin. suec.* 2. p. 558. *Huds. angl.*
ad. I. p. 284.
Trifolium flexuosum. *Jacq. aust.* 4. p. 45. t. 386.*
Allion. ped. n. 1105. *Hoffm. germ.* 265. *Roth germ.*
I. 314. II. 201.
Trifolium alpestre. *Crantz. aust.* p. 407. *Scop. carn.*
n. 924. *Leers herb.* 575. *Pollich. palat.* n. 702.
T. foliis nervosis, supremis conjugatis, vaginis lanceo-
latis. *Hall. helv.* n. 376.

T. pratense majus. *Raj. hist.* I. p. 944.
Mittlerer Klee. W.

Habitat in nemorosis Europae. 24 (v. v.)

Foliola nudo oculo integerrima, armato vero ferrulata. W.

39. TRIFOLIUM alpestre.

T. spicis densis subglobosis subgeminatis, calycis dente infimo tubum corollae monopetalae subaequalis acquante, stipulis setaceis, foliolis lanceolatis tenuissime ferrulatis striato-venosis, caulis simplicissimis strictis. W.

T. spicis subglobosis villosis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis ferrulatis. Sp. pl. 1082. Jacq. obs.

3. P. 14. t. 64. aust. t. 433. Gmel. fib. 4. p. 22.
Hoffm. germ. 265. Roth. germ. I. 314. II. 201.

T. spicis densis corollis subaequalibus, stipulis setaceis divergentibus, foliolis lanceolatis, caulis strictis simplicissimis. Afzel. Act. Soc. Lin. Lond. I. p. 234.*

T. spica longiore, flore purpureo. Riv. t. 12.

T. montanum purpureum majus. Bauh. pin. 328.

T. majus 2. Cluf. hist. 2. p. 245. non album, sed rubrum. Bauh. hist. 2. p. 375.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 729.

Wald-Klee. W.

Habitat in Europa, etiam in Suecia. 24 (v. v.)

Simillimum T. pratensi, herba T. montani. Distinguitur a Tr. pratensi, quod hoc alpestre capitulis terminalibus 2, illud 1; hoc stipulis viridibus, illud scarriosis, venis rubris; hoc stipulis ultimis utrinque lanceolatis, illud subovatis.

Foliola armato oculo adspeta ferrulata. W.

40. TRIFOLIUM pannonicum.

T. spicis densis oblongo-ellipticis solitariis, calycis dente infimo tubo corollae monopetalae inaequalis breviore, stipulis subulatis, foliolis oblongo-lanceolatis integerimis emarginatis villosis, caulis simplicissimis strictis. W.

T. spicis villosis longis, corollis monopetalis, foliis integrerrimis cauleque erecto villosissimis. Mant. 276.
Jacq. obs. 2. p. 21. t. 42.

T. orientale majus villosissimum, floribus flavescentibus.
Tournef. cor. 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 730.

Hungarischer Klee. W.

Habitat in pratis roridis Hungariae inferioris inque Armenia. 24 (v. f.)

Statura Tr. pratensis, sed majora omnia, undique albo-villosa. Caules sesquipedales, erecti. Folia ternata, ovali-oblonga, in stipula sessilia. Spica ovato-oblonga, densa. Flores pollicares, albi.

*41. TRIFOLIUM elongatum. W.

T. spicis laxis ellipticis solitariis, calycis dente infimo longitudine alarum, corollis monopetalis, vexillo longissimo, stipulis lanceolatis, foliolis lanceolatis villosis, caule adscendente ramoso. W.

Langblumiger Klee. W.

Habitat in Galatia. 24 (v. f.)

Tota planta villosa. Caulis semipedalis basi ramosus adscendens teres striatus. Folia ternata. Foliola lanceolata levissime striato-venosa apice dentata, inferiora et summa emarginata mucronata. Stipulae petiolo adnatae inferne oblongae apice lanceolatae cuspidatae. Spicae terminales solitariae ellipticae. Calyces tubulosi villosi, dentibus setaceis, quatuor subaequalibus, infimo majore longitudine alarum corollae. Corolla monopetala, vexillo elongato lanceolato alis carinaque duplo longiore. A. T. alpestris foliis minoribus, vexillo longiore, caule ramoso adscendente et vilositate diversa. W.

*42. TRIFOLIUM canescens. W.

T. spicis ovatis laxis solitariis, calycis dentibus pilosis lanceolatis, corollis monopetalis, stipulis subulatis, foliolis obovatis emarginatis villosis, caule simplici adscendente. W.

T. orientale canescens, capitulo oblongo fordide albo.
Tournef. cor. 27.

Grauer Klee. W.

Habitat in Cappadocia. 24 (v. f.)

Caules digitales vel semipedales plures indivisi adscendentes pilis adpresso tecti. Foliola obovata emar-

ginata villosa integerrima sub lente adspecta quandoque denticulata, striato-venosa. Stipulae lanceolato-jubulatae. Spica solitaria terminalis laxa ovata. Calyces tubulosi glabri, dentibus pilosis basi dilatatis lanceolatis, infimo parum longiore. Corolla monopetala elongata. W.

*43. TRIFOLIUM maritimum.

T. spicis subglobosis densis, calycinis dentibus lanceolatis pilosis, corollis monopetalis, stipulis lanceolatis, foliolis lanceolato-obovatis apice serrulatis pilosis, caulis ramosis diffusis. W.

T. (*maritimum*) spicis pilosis globosis, dentibus calycinis foliaceis demum patentibus, stipulis lanceolatis, foliolis obovatis. *Smith. brit. 2. p. 786.**

Trifolium stellatum. *Huds. angl. 326.*

T. stellatum glabrum. *Raj. synop. 329. Pluk. phytog. t. 113. f. 4.*

T. spicatum minus, flore minore dilute purpureo. *Morif. hist. 2. f. 2. t. 14.*

Meerstrands-Klee. W.

Habitat in paludosis maritimis Angliae. ♂ (v. v.)

44. TRIFOLIUM squarrosum.

T. spicis oblongis subpilosis, calycum infimo dente longissimo reflexo, caule herbaceo erecto. *Sp. pl. 1082.*

T. purpureum lagopoides hirsutum annuum rotundifolium, spica dilute rubente. *Morif. hist. 2. p. 140. f. 2. t. 13. f. 1.*

T. hispanicum angustifolium, spica dilute rubente. *Bauh. pin. 328.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 731.

Sparriger Klee. W.

Habitat in Hispania. ♂

Habitus Trifolii pratensis. Folia suprema opposita, subpilosa, lanceolata aut ovalia, emarginata. Spicae terminales, ovatae; Calyces parum villosi; 5-dentati: dentibus nudis, setaceis; 4 erectis; 5to seu infimo reliquis triplo majore, reflexo, unde spica squarrosa uncinata valde existit.

Variat foliis ovalibus et lanceolatis.

45. TRIFOLIUM *incarnatum*.

- T. spicis oblongis villosis obtusis aphyllis, foliolis subrotundato-obcordatis ovatis crenatis villosis. W.
 T. spicis villosis oblongis obtusis aphyllis, foliolis subrotundis crenatis. Sp. pl. 1083. Roy. lugdb. 380. Hort. upf. 222. Dalib. paris. 225. Gouan. illustr. 51.
 T. foliis subrotundis, spicis cylindricis, calycibus plumosis. Hali. helv. 374.
 T. latifolium. Riv. t. 77. R.
 T. spica subrotunda rubra. Tournef. inst. 405. R.
 T. stellatum glabrum. Ei. ib. R.
 T. capitulo dipaci. Raj. hist. 194. R.
 T. spica rotunda rubra. Bauh. pin. 328.
 T. album incarnatum spicatum, f. Lagopus maximus.
Bauh. hist. 2. p. 376.

Lagopum maximum, folio et facie trifolii pratensis.
Lob. ic. 39.

Trifolium alopecurum latifolium, spica longa. Barr.
ic. 697.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 731.

Schönrother Klee. W.

Habitat in Italia, Helvetia, Gallia. ♂ (v. v.)

Spica maturo fructu ad latus inflexa. Calyx corolla brevior: dentibus subaequalibus hirsutis. Foliola crenulata.

*46. TRIFOLIUM *pallidum*.

T. spicis solitariis subrotundis, stipulis membranaceis summis oppositis, foliolis subrotundis, corollis monopetalis, calycis margine intus barbato, dentibus subaequalibus. Waldst. et. Kitaib. pl. rar. hung. I. p. 35. t. 36.*
 Bleicher Klee. W.

Habitat in pratis Banatus. ♂ ♂ (v. f.)

Cum T. pratensi et ochroleuco convenit corollis monopetalis, stipulisque membranaceis summis oppositis; sed a priori differt: foliis etiam summis petiolatis vexillo emarginato; a posteriore stipulis ovato-lanceolatis acumine longo terminatis et dentibus calycis subaequalibus; ab utroque autem praetera: radice annua vel bienni, foliis subrotundis, colore florum (albo), et tota facie. l. c.

47. TRIFOLIUM *ochroleucum*.

- T. spicis villosis ellipticis, caule erecto ramoso-pubescente, foliolis oblongis, infimis obcordatis. W.
 T. spicis villōlis, caule erecto pubescente, foliolis infimis obcordatis. *Syst. veg.* 583. *Jacq. austr.* I. t. 40. *Hoffm. germ.* 265. *Roth. germ.* I. 315. II. 202.
 T. caulinibus simplicissimis pubescentibus, spicis villosis globosis, foliis radicalibus obcordatis. *Gouan. illustr.* 51.
 T. caule erecto, foliis hirsutis, supremis conjugatis, spicis oblongis. *Hall. helv.* n. 378. *la Chenal. diff. inaug.* p. 2.
 T. album var. β. *Crantz fasc.* p. 409. *Jacq. R. Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 732.
 Bleichgelber Klee. W.
Habitat in Anglia, Helvetia, Austria, Monspelii. 24 (v. v.)
Folia integerrima: superiora linearia. Spicae pendunculatae, oblongae. Calycum dens inferior longior. Corollae ochroleucae. Hall.

48. TRIFOLIUM *augustifolium*.

- T. spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subaequalibus, foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 375. *Hort. usp.* 222. *Roy. lugdb.* 379. *Mill. dict.* n. 8. *Leers. herb.* n. 576. *Scop. carn.* n. 929. *Hoff. germ.* 265. *Roth. germ.* I. 315. II. 202.
 T. montanum angustifolium spicatum. *Bauh. pin* 328.
 T. alopecurum angustifolium elatis. *Barr. ic.* 698. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 733.
 Schmalblättriger Klee. W.
Habitat in G. Narbonensi, Italia, Germania, Carniola.
 Ⓛ (v. v.)
Calyses corolla longiores.
Variat corollis duplo majoribus colorationibusque in Palaestina. Calycis dens inferior longior: omnibus rectis, nec inflexis.

*49. TRIFOLIUM *involucratum*. W.

- T. capitulis subrotundis pedunculatis involucro orbiculato dentato cinctis, stipulis oblongis aristatis dentatis, caule erecto ramoso. W.

Eingehüllter Klee. W.

Habitat — — — — ⊙ (v. v.)

Planta ad sectionem praecedentem potius spectans, sed hic indicavi, quum *T. angustifolio* habitu sit affinis. Caulis pedalis erectus ramosus glaber, ut tota planta. Foliola linearis-lanceolata serrulata mucronata. Stipulae oblongo ovatae subulato-aristatae dentatae membranaceae. Capitula subrotunda longe pedunculata, Involucro orbiculato multifido-dentato, dentibus arestatis cincta. Calyces glabri. W.

50. TRIFOLIUM arvense.

T. spicis villosissimis subcylindraceis, dentibus calycinis setaceis corolla longioribus, foliolis obovato-linearibus.

*Smith. brit. 2. p. 787.**

T. spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis aequalibus. *Hort. cliff. 375. Fl. suec. 616; 668. Roy. lugdb. 379. Dalib. paris. 225. Mill. dict. n. 9. Pollich. pal. n. 703. Flor. dan. t. 724. Hoffm. germ. 265. Roth. germ. I. 315. II. 202.*

T. caule ramoso, foliis lanceolatis ferratis, spicis villosis ovatis. *Hall. helv. 373.*

T. spicis villosis ovalibus, calyce et denticulis plumosis. *Crantz aust. 405.*

T. corollis polypeta's, calyce minoribus, spicis cylindraceis villosis, caule dichotomico. *Scop. carn. I. p. 526. ed. 2. n. 930.*

T. Lagopus. *Neck. gallob. p. 315.*

T. arvense humile spicatum s. Lagopus. *Bauh. pin. 328. Lagopus.* *Fuchf. hist. 494. Cam. epit. 724. Riv. t. 15. Blackw. t. 450.*

Houttuyn Lin. Psl. Syst. 8. p. 733.

Acker-Klee. W.

Habitat in Europa et America septentrionali. ⊙ (v. v.)
Alae intus macula sanguinea.

51. TRIFOLIUM stellatum.

T. spicis pilosis ovatis, calycibus patentibus, caule difuso, foliolis obcordatis. *Sp. pl. 1083. Scop. carn. n. 926. Murray. prodr. 174.*

T. spicis ovatis pilosis, denticulis calycinis lanceolatis patulis. *Hort. cliff. 375.* Roy. lugdb. 738. Sauv. monsp. 184.*

- T. stellatum. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 143. *hist.* 2.
p. 376.
Lagopus minor erectus, capite globoſo ſtellato. *Barr.*
ic. 860. et 755.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 8. *p. 734.*
Sternförmiger Klee. W.
Habitat in Sicilia, Italia, G. Narbonensi, Carniola. ⊖
(v. v.)
Spicae ovatae. Calyx aequalis extus pilosus.

52. TRIFOLIUM clypeatum.

- T. spicis ovatis calycibus patulis, dente infimo maximo lanceolato, stipulis ovatis, foliolis obovatis. W.
T. spicis ovatis, calycibus patulis: lacinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis. *Hort. cliff.* 373.* *Roy. lugdb.* 377.
Trifolium clypeatum argenteum. *Alp. exot.* 307. *t. 306.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 8. *p. 735.*
Schildförmiger Klee. W.
Habitat in Oriente. ⊖ *(v. v.)*

* 53. TRIFOLIUM albidum.

- T. spicis subglobosis pedunculatis, calycibus patentibus, dente infimo subulato linearis, stipulis linearis-subulatis, foliolis oblongis. W.
T. spicis pilosis ovalibus pedunculatis ebracteatis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis ovatis. *Retz. obs.* 4. *p. 30.**
Weißlicher Klee. W.
Habitat — — — — ⊖ (v. v.)

54. TRIFOLIUM scabrum.

- T. capitulis ovatis axillaribus ſeffilibus, calycibus dentibus inaequalibus lanceolatis mucronatis rigidis recurvis, foliolis obovatis ferrulatis. W.
T. capitulis ſeffilibus lateralibus ovatis, calicibus inaequalibus rigidis persistentibus. *Sp. pl.* 1084. *Scop. carn.* n. 927. *Pollich. pal.* n. 704. *Scholl. barb.* n. 597. *Hoffm. germ.* 265. *Roth. germ.* I. 315. II. 203.
T. spicis ſeffilibus lateralibus ovatis ſcabris. *Hort. cliff.* 373.* *Roy. lugdb.* 377. *Dalib. paris.* 225. *Sauv. monsp.* 183.

- T. canibus prostratis, capitulis ovatis, in alis sessilibus, calycibus rigidis, segmentis rectis *Hall. helv.*
n. 371.
- T. capitulo oblongo aspero. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 140.
- T. cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. *Bauh. hist.* 2. *p.* 378.
- T. minus, capite subrotundo parvo albo echinato. *Barr. ic.* 870.
- T. dilute purpureum, glomerulis florum oblongis sine pediculis caulis adnatis. *Raj. cant.* 168.
- T. flosculis albis in glomerulis asperis caulinis adnatis. *Vaill. parif.* 196. *t.* 33. *f.* 1.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 735.
- Scharfer Klee. W.
- Habitat* in Anglia, Gallia, Italia, Germania etc. ⊙
(v. f.)

Caules minus ramosi. Foliola ovalia, crassiuscula, margine quasi crenata. Capitula axillaria, ovata, sessilia, dura, rigida, persistentia. Calycis dentes recurvi: exteriores longiores, validiores. Corollae albidae, angustae, longitudine calycis.

55. TRIFOLIUM *glomeratum.*

- T. capitulis hemisphaericis axillaribus sessilibus, calycinis dentibus aequalibus subulatis patulis rigidis, foliolis obovatis ferrulatis. W.
- T. capitulis sessilibus hemisphaericis rigidis, calycibus striatis patulis aequalibus. *Murr. prodr.* 174.
- T. capitulis aequalibus rigidis sessilibus, calycibus striatis patulis aequalibus. *Sp. pl.* 1084.
- T. capitulis sessilibus lateralibus subglobosis. *Hort. cliff.* 363. * *Roy. lugdb.* 577. *Sauv. meth.* 183.
- T. cum glomerulis ad caulum nodos rotundis. *Raj. angl.* 3. *p.* 329. *Pluk. phyt.* 113. *f.* 5.
- T. arvense supinum verticillatum. *Barr. ic.* 882.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 736.
- Kuglicher Klee. W.
- Habitat* in Anglia, Hispania. ⊙ (v. v.)

Caules decumbentes. Capitula hemisphaericā: Calycibus pulchro ordine digestis: laciniis rigidis patentibus interstitia reliquorum occupantibus.

* 56. TRIFOLIUM *parviflorum*.

T. capitulis glabris axillaribus pedunculatis, calycinis dentibus inaequalibus corolla longioribus, subulatis patulis recurvis, foliolis obovatis ferrulatis. W.
 T. radice anhua, caulis filiformibus procumbentibus, foliis glabris, foliolis obovatis ferratis, capitulis axillaribus pedunculatis aphyllis, bracteis fetaceis, calycibus subnudis, dentibus subulatis patentibus, corollis calyce brevioribus, leguminibus subinclusis monospermis f. subdispermis. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 165.

Kleinblumiger Klee. W.

Habitat in Hungaria, Sibiria. ☺ (v. v.)

57. TRIFOLIUM *striatum*.

T. capitulis terminalibus axillaribusque ovatis subsolitariis subsessilibus, ealyzibus striatis pilosis inaequalibus, foliolis obovatis subintegerrimis pubescentibus. W.

T. capitulis sessilibus sublateralibus ovatis, calycibus striatis rotundis. *Sp. pl.* 1085. *Gouan. illusfr.* 51. *Leers herb.* n. 578. *Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung.* I. p. 24. t. 25.* *Hoffm. germ.* 266. *Roth. germ.* I. 315. II. 204.

T. capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calycibus subrotundis villosis striatis. *Fl. suec.* 614.; 669. *Dalib. panif.* 225.

T. parvum hirsutum, flore parvo dilute purpureo in glomerulis mollioribus oblongis, semine magno. *Vaill. parif.* 196. t. 33. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 737.

Gestreifter Klee. W.

Habitat in Germania, Gallia, Hispania. ☺ (v. f.)

Calyces 10-striati, extus toti pilosi.

Foliola cano-pubescentia; inferiora obcordata integerrima; superiora oblonga apice denticulata. W.

* 58. TRIFOLIUM *gemellum*.

T. capitulis oblongis terminalibus geminatis calycibus villosis, dentibus fetaceis inaequalibus corolla longioribus, foliolis cuneatis emarginatis apice denticulatis caulis simplicibus. W.

Trifolium gemellum. Pourret.

Zwillings-Klee. W.

Habitat in Hispania. ⊙ (v. f.)

Caules digitales et ultra simplicissimi diffusi villosi. Folia villosa canescens lanceolato-cuneiformia emarginata apice denticulata, striato venosa. Stipulae lanceolato-cuspidatae membranaceae nervosae. Capitula oblonga geminata, altero sessili, altero pedunculato. Calyces villosi, dentibus setaceis longis villoso corolla majoribus. W.

*59. TRIFOLIUM phleoides.

T. capitulis oblongis, calycibus pilosis, dentibus lanceolato-subtulatis inaequalibus rigidis patentibus, foliolis oblongis subintegerrimis emarginatis, floralibus linearibus. W.

Trifolium phleoides. Pourret.

Lieschgrasartiger Klee. W.

Habitat in Hispania. ⊙ (v. f.)

Caules subsimplices fere semipedales pilis raris adpresso obsoleti. Folia oblonga basi attenuata emarginata pilis adpresso testa, oculo armato aspecta apicem versus denticulata. Foliola floralia linearia angustissima integerrima. Stipulae lanceolatae adnatae. Spicae oblongae subsessiles. Calyces pilosi dentibus lanceolato-subtulatis in simo longiore, patentibus rigidis. Spica Phleo haud assimilis. W.

60. TRIFOLIUM alexandrinum.

T. capitulis oblongis pedunculatis, calycibus villosis, dentibus subtilatis inaequalibus, caule flexuoso-erecto, foliis summis oppositis, foliolis ellipticis denticulatis. W.

T. capitulis oblongis pedunculatis, caule erecto, foliis oppositis. Amoen. acad. 4. p. 286. Forst. descr.*

139.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 737.

Alexandrinischer Klee. W.

Habitat in Aegypto. ⊙ (v. v.)

Capitula ovata. Calycis lacinia infima paulo longior.

Simile T. ochroleuco. W.

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II.

L I

*61. TRIFOLIUM *suffocatum*

T. capitulis sessilibus lateralibus subrotundis glabrinsecu-
lis, dentibus calycinis lanceolatis acutis recurvis corol-
la longioribus. *Smith. brit.* 2. p. 790.*

T. acaule exscapum, floribus subsessilibus radicalibus.
Mant. 276. *Jacq. hort. tab.* 60. *Act. Soc. Lin. Lond.*
2. p. 357.

T. minimum supinum flosculorum et seminum glomeru-
lis plurimis confertim ad radicem nascentibus. *Raj-
hisi.* I. p. 942.

T. epithymi capitulis inter genicula annum. *Capan.
hort. cath.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. 745.

Sand-Klee. W.

Habitat in arenosis maritimis Angliae, Siciliae. ○ (v. v.)

*Caules vix palmates multum ramosi in caespitem de-
prejti terraeque impressi ut vix ulli. Folia ternata
glabra obovata denticulata. Petioli erecti longitudine
totius plantae s. pollicares. Flores glomerulsi axilla-
ribus sessilibus quasi terrae innatis. Calyces oblongi
compressi glabri, quinquesidis laciniis recurvatis. Co-
rolla intra calycis tubum hyalina.*

62. TRIFOLIUM *uniflorum*.

T. acaule, pedunculis trifidis triflorisque stipula brevio-
ribus. *Amoen. acad.* 4. p. 285.*

T. acaule, pedunculis unifloris, floribus foliisque com-
mixtis. *Sp. pl.* I. p. 771.

T. vernum repens purpureum. *Buxb. cent.* 3. p. 17. t.
31. f. 1.

T. vernum repens, flore albo exiguo. *Buxb. cent.* 3. p.
17. t. 31. f. 2.

Melilotus cretica humillima humifusa, flore albo magno.
Tournef. cor. 28. ?

Spica trifolia. *Alp. exot.* 169. t. 168.?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 738.

Stielhofer Klee. W.

*Habitat in Syria, Arabia, Judaea, copiose Constantino-
poli, Creta.* (v. f.)

Folia denticulata. Pedicelli longi, floribus remotis.
Calyces longius tubulosi, 10-striati, aequales.

† † † † *Vesicaria calycibus inflatis ventricosif.*

63. TRIFOLIUM *spumosum.*

T. capitulis ovatis, calycibus fructiferis ovatis ventricosif glabris, dentibus setaceis recurvis, in involucris universalibus membranaceis pentaphyllis, caule erecto. W.

T. spicis ovatis, calycibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis. *Hort. cliff.* 373.* *Roy. lugdb.* 378.

T. capitulo spumoſo laevi. *Bauh. pin.* 329 *prodr.* 140.

T. caule nudo, glomerulis glabris. *Bauh. hist* 2. p. 379. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 8. p. 738.

Apulischer Klee. W.

Habitat in Gallia, Italia, Apulia. ⊙ (v. v.)

Legumina calyce longiora, apice subulata, calycem repletia, tetrasperma. Calyces apice setis 5 terminati. Corollae rubrae.

64. TRIFOLIUM *resupinatum.*

T. capitulis subrotundis, corollis resupinatis, calycibus fructiferis inflatis membranaceis pubescentibus, dentibus setaceis, caulis prostratis, foliolis obovatis acutis. W.

T. spicis subovatis, corollis resupinatis. calycibus inflatis dorso gibbis, caulis prostratis. *Hort. cliff.* 373.* *Roy. lugdb.* 378. *Gort. gelr.* 429. *Neck. gallob.* p. 314. *Hoffm. germ.* 266. *Roth. germ.* I. 315. II. 204.

T. pratense folliculatum. *Bauh. pin.* 329.

T. pratense folliculatum, flore inverso. *Barr. rar.* 824. t. 372.

T. folliculatum f. vesicarium minus purpureum. *Bauh. hist.* 2. p. 379.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 8. p. 739.

Verkehrtblumiger Klee. W.

Habitat in Germania, Belgio, Italia. ⊙ (v. v.)

Corollae resupinatae in hoc sunt, ut vexillum respicit peripheriam, carina entrum. Calyces inflati, ovato-oblongi, apice terminati setis 2 cum intermedia brevissima, inferiore latere longitudinaliter hiantes.

Legumina disperma, subrotunda, minima, in fundo calycis.

65. TRIFOLIUM tomentosum.

T. capitulis globosis, calycibus fructiferis inflatis membranaceis tomentosis, dentibus obliteratis, caulis prostratis. W.

T. capitulis sessilibus globosis tomentosis, calycibus inflatis obtusis. Sp. pl. 1086. Sauv. monsp. 175.* Gron. orient. 96.

T. capitulis sessilibus axillaribus tomentosis, calycibus fatis, foliis glabris, caulis decumbentibus. Ger. prov. 510.

T. fragiferum tomentosum. Magn. monsp. 265. t. 264.

T. glomeruliflorum tomentosum per caulum longitudinem. Bauh. hist. 2. p. 379.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 739.

Filziger Klee. W.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania, Mauritania. D. Sauvages. Loefling. 4 (v. v.)

Caules undique decumbentes, non repentes. Folia oblongata, denticulata, obtusa, glabra stipulis acuminatis. Pedunculi axillares, brevissimi. Capitula parva. Calyx dentes 3 superiores elongati, inferiores 2 parvi. Calyx. crassissimo tomento involutus, ut vase minime conspicatur. Accedit proprius T. resupinato, quam fragifero. Involucrum universale dodecaphyllum. Corollae fere resupinatae.

66. TRIFOLIUM fragiferum.

T. capitulis subrotundis, calycibus fructiferis inflatis membranaceis pubescentibus, dentibus setaceis binis reflexis, caulis repentibus, foliolis obovatis obtusis. W.

T. capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulis repentibus. Hort. cliff. 373.* Fl. suec. 613. 670. Roy. lugdb. 378. Dalib. paris. 224. Gort. gelr. 428. Mill. dict. n. 10. Crantz austri. p. 412. Neck. gallob. p. 314. Pollich. pal. n. 705. Hoffm. germ. 266. Roth. germ. I. 316. II. 205.

T. caule repente, spicis glabris, calycibus sericeis, amplexu pullescentibus. Hall. helv. n. 370.

- T. *capitulis subrotundis, calycibus defloratis inflatis, caule repente.* Crantz *ausr. 412.*
- T. *corollis polypetalis, spicis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis reticulatis.* Scop. carn. ed. I. p. 527. n. 7. ed. 2. n. 933.
- T. *fragiferum frisicum.* Bauh. pin. 329. Cluf. cur. app. 38. n. 39.
- T. *capitulo spumoso aspero minus.* Bauh. pin. 329. prodr. 140. sec. Hallerum.
- T. *fragiferum.* Vaill. parif. 195. t. 22. f. 2.
- T. *caule nudo, glomerulis glabris.* Bauh. hist. 2. p. 279. fig. majore.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 740.
- Erdbeeren - Klee. W.
- Habitat in Suecia, Germania, Gallia, Anglia etc. 2 (v. v.)*
- Pedunculi in hoc foliis longiores, et Caules radices agunt. Calyces parum pubescentes. Corollae albae, aut rubicundae uti apud exterios. Calyces subglobosi, villosi, bidentati, basi inferiore tridentata.

† † † † † Lupulina vexillis corollae inflexis.

67. TRIFOLIUM montanum.

- T. *spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarginatis, calycibus nudis, caule erecto.* Sp. pl. 1087. Gouan. illusir. 52. Pollich, pal. n. 706. Mat-tusch. fil. n. 544. Doerr. nass. p. 237. Hoffm. germ. 266. Roth. germ. I. 316. II. 286.
- T. *caulicolo paucifloro, foliis elliptico-lanceolatis, nervosis, subtus hirsutis.* Hall. helv. n. 372.
- T. (*album*) *foliis cauleque erecto hirsutis, corollis floribus erectis, vexillis subulatis in dorsum reclinatis.* Crantz *ausr. 408.*
- T. *corollis polypetalis, spicis terminalibus, subrotundis, foliis lanceolatis, caule erecto.* Scop. carn. I. p. 527. ed. 2. n. 932.
- T. *folio longiore, flore albo.* Riv. t. 12. Hall. R.
- T. *capitulis terminalibus, corollarum vexillis subulatis, caule erecto foliolis lanceolatis serrulatis.* Fl. suec. 611; 667. Dalib. parif. 223.
- T. *montanum album.* Bauh. pin. 328.

T. pratense album. *Fuchſ. hift.* 818.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 8. p. 741.

Berg-Klee. W.

Habitat in Europae pratis fuccis. 24 (v. v.)

Capitulum eſt vere Racemus coarctatus bracteis subulatis minimis interſlinctus.

*68. TRIFOLIUM speciosum. W.

T. spicis oblongis floribus reflexis, vexillis subrotundis planis denticulatis persistentibus, calycibus nudis, caule flexuoso prostrato. W.

T. creticum elegantissimum mogno flore. *Tournef. cor.* 27.

Anſcheinlicher Klee. W.

Habitat in Creta. (v. f.)

Caulis procumbens flexuosus ramosus pilosus. Foliola obovata emarginata denticulata glabra. Stipulae oblongae acuminatae nervosae ciliatae. Spicae oblongae floribus pedunculatis reflexis. Pedunculi pilosi. Calyx glaber quiuquedentatus, dentibus lanceolatis, tribus superioribus duplo longioribus. Corolla ampla spadicea persistens resupinata. Vexillum subrotundum planum nervosum denticulatum. Alae lanceolatae apice denticulatae. Carina angusta brevissima respectu vexilli. W.

69. TRIFOLIUM agrarium.

T. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycinis dentibus subulatis inaequalibus glabris, caule erecto, foliolis lanceolato - cuneatis, intermedio sessili. W.

T. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Fl. suec.* 617; 675. *Hort. cliff.* 374. *Roy. lugdb.* 378. *Dalib. parif.* 226. *Mill. dict.* n. 3. *Scop. carn.* n. 931. *Flor. dan.* t. 558. *Hoffm. germ.* 366. *Roth. germ.* I. 316. II. 207.

Trifolium aureum. *Pollich. pal.* n. 708.

T. (ſtrepens) racemis ovalibus strepentibus, vexillis deflexis persistentibus. *Crantz. austr.* 411. n. 8.

T. pratense luteum, capitulo lupuli s. agrarium. *Bauh. pin.* 328. *Vaill. parif.* 196. t. 22. f. 3.

T. agrarium, *Dod. pempt.* 576.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 742.

Gelarbener Klee. W.

Habitat in Europae pratis. ⊙ (v. v.)

Calyx ante flores entiam vix manifeste villosus s. uno altero ve pilo ad apices instructus. Corollae flavae nec spadiceae.

70. TRIFOIUM *spadiceum*.

T. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus dentibus subpilosis subulatis, binis superioribus ovatis brevissimis, caule erecto, foliolis obovatis, intermedio tellili. W.

T. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Fl. suec.* 2. n. 672.* *Gort. ingr.* 116. *Neck. gallob.* p. 313. *Pall. it.* 1. p. 72. *Doerr. nass.* p. 237. *Kniph. cent.* 9. n. 92. *Hoffm. germ.* 266. *Roth. germ.* I. 317. II. 209.

T. caule erecto, spicis strepentibus ovatis. *Hall. helv.* n. 365.

T. montanum lupulinum. *Bauh. pin.* 328. *prodr.* 140.

T. pratense, flore rufescente. *Vaill. paris.* 196.

Lupulinum montanum, capitulis spadiceis. *Rupp. jen.* 207.

Lotus montanus aureus, amplio lupuli capitulo, annuus. *Barr. ic.* 1024.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 742.

Brauner Klee. W.

Habitat in Europae pratis siccis. ⊙ (v. f.)

Differt a praecedenti Vexillis defloratis ferrugineis, calycibus praecipue ante florescentiam manifeste pilosissimis. Calycis dentes 2 superiores in hoc obsoleti, in priore vero longitudine reliquorum.

71. TRIFOLIUM *procumbens*.

T. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus fulcatis, caulis procumbentibus, foliolis obovatis. *Smith. brit.* 2. p. 792.*

T. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caulis procumbentibus. *Fl. suec.* 618; 673. *It. gotl.* 257. *Schreb. spicil.* 25. *Leers herb.* n. 582.

- Pollich. pal. n. 709. Gmel. tub. p. 229. Mattusch. fil. n. 546. Hoffm. germ. 267. Roth. germ. I. 317. II. 209.*
- T.** *caulibus diffinis, spicis ovatis strepentibus. Hall. helv. n. 363.*
- T.** *caulibus decumbentibus elongatis, florum vexillis deflexis. Neck. gallob. p. 313.*
- T.** *pratense luteo-croceum. Vaill. paris. 196.*
- T.** *lapulinum alterum minus. Raj. angl. 3. p. 330. t. 14. f. 3. Hall. opusc. 193.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 743.*
- Liegender Klee.
- Habitat in Europae campestribus. 24 (v. v.)*
- Similis sequenti, sed major floribus saepe 10 f. 12. Folia non stricta. Sata etiam evasit diversa a sequenti.*
- Semen 1, saepe 2. *Leers l. c. R.*

72. TRIFOLIUM siliforme.

- T.** *spicis capitatis hemisphaericis vexillis persistentibus laevibus, caulis procumbentibus, foliolis obcordatis. Smith. brit. 2. p. 792.**
- T.** *spicis subimbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pedicellatis, caulis procumbentibus. Fl. suec. 764.* Mill. dict. n. 4. Leers herb. n. 593. Mattusch. fil. n. 547. Doerr. nass. p. 238. Hoffm. germ. 267. Roth. germ. I. 317. II. 210.*
- T.** *caule erecto, spicis strepentibus paucifloris. Hall. helv. n. 364.*
- T.** *caulis filiformibus, spicis subquinquenfloris: flosculis pedicellatis. Neck. gallob. p. 314.*
- T.** *lapulinum minimum. Morif. hisp. 2. p. 142. Raj. angl. 3. p. 331. t. 14. f. 4. Hall. opusc. 87.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 744.*
- Fadensörmiger Klee. W.
- Habitat in Anglia, Germania. ⊙ (v. v.)*
- Caules filiformes, procumbentes. Pedunculi filiformes, foliis longiores, sustinentes Flores 3 ad 5, in fascis saepe 12 ad 15, deflexos: Calycibus fructum ferent.*

tibus insidentibus, manifestis pedicellis. Foliola emarginata, striata.

1348. L O T U S.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1212.

Legumen cylindricum, strictum. Filam cuneiformis. Alae sursum longitudinaliter convergentes. Gal. tubulosus.

+ *Leguminibus rarioribus, nec capitulum constituentibus.*

1. LOTUS maritimus.

L. leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulis, foliis glabris bracteis lanceolatis. Sp. pl. 1089. It. oel. 143.* Fl. suec. 610; 676.* Sauv. monsp. 188. Leyf. hal. 672. Mill. dict. n. 12. Kniph. cent. 7. n. 45. Hoffm. germ. 267.

Tetragonolobus maritimus. Roth. germ. I. 323. II. 225.

L. tetragonolobus maritimus, flore luteo. Barth. act. 2. p. 346.

L. siliquosa lutea siliquis pinnatis strictioribus et longioribus. Raj. hist. 967.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 746.

Meerstrands-Schotenklee. W.

Habitat in Europae maritimis. 24 (v. f.)

Affinis nimium L. siliquosa, ut forte varietas.

Trifolii character, utut genus habitu facillimum, difficillime eruitur.

Racemosa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Umbellata. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 21. 62.

Fasciculata. 22. 23.

Capitata. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 49. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Spicata. 15. 16. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 58. 59.

2. LOTUS *siliquofus*.

- L. leguminibus solitariis membranaceo - quadrangulis,
caulibus procumbentibus, foliis subtus pubescentibus.
Sp. pl. 1089. *Crantz. aust.* 399. *Jacq. aust.* t. 361.
Pollich pal. n. 710. *Hoffm. germ.* 267.
L. caule prostrato, scapis unifloris, siliquis alatis. *Hall.*
helv. n. 386.
Tetragonolobus siliquofus. *Roth. germ.* I. 323, II. 226.
Tetragonolobus Scandalida. *Scop. carn.* n. 938.
Lotus pratensis *siliquofus* lutescens. *Bauh. pin.* 332.
major et durior. *Tournef. inst.* 403. *Segn. ver.* 2.
p. 90.
L. tetragonolobus. *Riv. tetr.* 79. *bona*.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 747.
Wiesen-Schotenklee. W.
Habitat in Europae australioris pratis subhumidis. 24
(v. v.)
Caules humifusi, pedales. Folia et calyces hirsuta.

3. LOTUS *tetragonolobus*.

- L. leguminibus solitariis membranaceo - quadrangulis,
bracteis ovatis, caulis procumbentibus, folio intermedio subdentato. W.
L. leguminibus solitariis membranaceo - quadrangulis,
bracteis ovatis. *Hort. upf.* 220. *Mill. dict.* n. 14.
Kniph. cent. 5. n. 53.
L. leguminibus subsolitariis, angulis quatuor membranaceis. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 388.
L. ruber, siliqua angulosa. *Bauh. pin.* 332.
L. pulcherrima *tetragonolobus*. *Comm. hort.* 91. t. 26.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 748.
Habitat in Siciliae collibus. ♂ anno 1579. *Clusio.*
(v. v.)

4. LOTUS *conjugatus*.

- L. leguminibus conjugatis membranaceo - quadrangulis,
bracteis oblongo - ovatis. *Sp. pl.* 1089. *Mill. dict.*
n. 13.
L. uteus, siliqua angulosa. *Boerh. lugdb.* 2. p. 37.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 749.
Gepaarter Schotenklee. W.

Habitat Monspelii. ○ (v. v.)

Convenit cum 3 habitu, aetatae, foliis, hirsutie, leguminibus; differt vero Corollis duplo minor bus, Leguminibus duobus, Alis integris minus crassis, foliorum basi caulem non amplexante, sed ab opposito late re dehiscente.

*5. *LOTUS biflorus.*

L. leguminibus binatis ternatisve membranaceo-quadrangulis villosis, bracteis obovatis. W.

L. (*biflorus*) villosus, foliolis flabelliformibus apice rotundatis, stipulis ovatis, pedunculis folio longioribus subtrifloris, leguminibus villosis tetrapteris. Desf. atl. 2. p. 202. t. 210.*

L. (*biflorus*) pilosus, leguminibus conjugatis hirsutis membranaceo - quadrangulis, bracteis ovatis calyce tubulo brevioribus. Lamarck. encycl. 3. p. 578.*

Zweyblumiger Klee. W.

Habitat in pratis Algeriae. 2

Flores flavi. Similis *L. siliquofo* sed legmina villosa flores geminati vel ternati: et caules erecti. W.

6. *LOTUS tetraphyllus.*

L. leguminibus solitariis, foliolis orcordatis cuneatis, stipulis solitariis. Lin. suppl. 340.

L. leguminibus solitariis, foliis ternatis obcordato-cuneatis, stipula solitaria simili, bracteis monophyllis. Syft. Veg. 575.

Houttuyn Lin. Pfl. Syft. 8. p. 749.

Vierblättriger Schotenklee. W.

Habitat in Majorca. 2 (v. f.)

Caules filiformes. Stipulae in reliquis binae, in hac alterutra, s. unica ad latus, foliolo similis, sed lanceolato-oblonga. Bractea monophylla, rarius diphylla. Corolla flava vexilli dorso atropurpureo.

Caules plures decumbentes palmares filiformes herbae demum adscendentibus. Folia ternata petiolata, foliolis obcordatis cuneatis sessilibus laevibus. Stipulae solitariae nec pares (altera deficiente) foliaceae longitudine foliorum patentes lanceolato-oblongae obtuseae, quartum foliolum mentientes. Pedunculus e summitate

te uniflorus internodiis longior. Corolla lutea: vexillo venis purpureis extus rufo. Lin. suppl. I. c.

7. LOTUS edulis.

- L. leguminibus subsolitariis gibbis incurvis. *Hort. cliff.* 370. *Roy. lugdb.* 388. *Mill. dict. n. II.* *Cav. ic.* 2. p. 44. t. 157.*
 L. pentaphyllos, siliqua cornuta. *Bauh. pin.* 332.
 L. edulis cretica. *Raj. hist.* 967.
 L. oligoceratos cretica lutea, siliquis binis curvis propendentibus. *Moris. hist.* 2. p. 176. f. 2. t. 18. f. 5.
Trifolium corniculatum creticum. *Alp. exot.* t. 268.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 750.
 Geniesbarer Schotenklee. W.
Habitat in Italia, Hispania, Sicilia, Creta. ○ (v. v.)
Planta fere L. tetragonolobi. Caulis subvillosum.
Folia glabra. Stipulae ovatae. Pedunculi longi: bracteis, 3. ovatis, longitudine floris. Legumina Crotalariae, ovato-oblonga, gibba, sed futura dorsali recta.

8. LOTUS peregrinus.

- L. leguminibus subbinatis compressiusculis linearibus cernuis, foliolis obovatis pilosis, caule procumbente. W.
 L. leguminibus subbinatis linearibus compressis nutantibus. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 388. *Sauv. monsp.* 188. *Mill. dict. n. 9.* *Vahl. symb.* I. p. 65.
 L. (oligoceratos) leguminibus subbinatis compressiusculis: bracteae triphyllae, medio majore pedicellato. *Lamarck encycl.* 3. p. 579.* *Desf. atl.* 2. p. 206.*
Lotus villosa. Forstk. cat. pl. aegypt. p. 71. n. 386.
 L. siliquis geminis peregrina. *Boerh. lugdb.* 2. p. 38.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 750.
 Fremder Schotenklee. W.
Habitat in Europa australi, et Barbaria. ○ (v. v.)

*9. LOTUS glaucus.

- L. leguminibus subbinatis cylindraceis glabris, foliolis subcuneiformibus carnosis incanis, stipulis foliiformibus. *Ait. Kew.* 3. p. 92.

Grauer Schotenklee. W.

Habitat in Madera. ♂.

* 10. LOTUS *angustissimus*.

L. leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis. Sp. pl. 1090. Mill. dict. n. 2.

L. leguminibus saepius ternatis linearibus strictis erectis. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 388. Sauv. monsp. 188.

L. corniculata, siliquis singularibus l. binis, tenuis. Bauh. hist. 2. p. 356. f. 2.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 751.

Dünfrüchtiger Schotenklee. W.

Habitat in G. Narbonenfi. ○ (v. v.)

* 11. LOTUS *gracilis*.

L. leguminibus subternatis tereti-subulatis rectis, calycibus ciliatis, foliolis oblongis, caule erecto. W.

Lotus gracilis. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung.

Schlanker Schotenklee. W.

Habitat in pratis Hungariae. ○ (v. f.)

Caules teretes erecti basi adscendentibus pedales gracieles. Folia ternata pilis raris obsita. Foliola oblonga utrinque angustiora. Stipulae ovatae magnitudine foliorum. Pedunculi axillares folio longiores bi-vel triflori. Bractea triphylla sub floribus sessilis, foliolis lanceolatis. Calycis dentes linearis-subulati pilosi. Corolla flava. Legumina parva teretia recta. W.

* 12. LOTUS *diffusus*.

L. pedunculis subanifloris, caule ramosissimo decumbente, foliis calyceque pilosis, leguminibus teretibus strictis gracillimis. Smith. brit. 2. p. 794. *

L. pentaphyllos minor hirsutus, siliqua angustissima. Bauh. pin. 332.

Trifolium corniculatum minus pilosum. Bauh. prod.

I44.

Ausbreiteter Schotenklee. W.

Habitat in rupibus maritimis Angliae australioris. ○ (v. f.)

Distinctus a L. angustissimo leguminibus longioribus

duploque tenuioribus, foliis pilosis, floribus colore suturati oribus. Smith. I. c.

* 13. LOTUS coimbreensis.

L. pedunculis subunifloris, caule ramoso procumbente, foliolis obovatis glabris, leguminibus linearibus compressis. W.

Lotus c. imbreensis. Brotero.

Portugiesischer Schotenklee. W.

Habitat in Lusitania. ☽ (v. v.)

Caules ramosi digitales procumbentes diffusi. Folia ternata glaberrima ut tota planta glaucescentia. Foliola obovato-mucronata exteriora inaequalia. Stipulae ovatae acutae magnitudine foliorum. Pedunculi uni-vel biflori stipulae breviores. Bractea ternata pedicellata ad basin floris duplo minor folio. Corolla alba parva, vexillo extus sanguineis striis notato, carina apice violacea. Legumen tenue sesquiunciale lineare compressum erectiusculum. W.

14. LOTUS arabicus.

L. leguminibus cylindricis aristatis, caulis prostratis, pedunculis trifloris, bracteis monophyllis. Mant. 104.

Jacq. hort. t. 155. Vahl. symb. I. p. 65.

L. (rosea) caulis prostratis, pedunculis quadrifloris, foliis quinatis. Forsk. desc. 140.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 751.

Arabischer Schotenklee. W.

Habitat in Arabia. 4 D. Forskaehl (v. v.)

Caules plures, semipedales, prostrati, vix pubescentes. Folia ternata, petiolata. Foliola subpetiolata, obovata, obtusiuscula, subincana, fere glabra. Stipulae fere magnitudine figuraque foliorum. Petioli brevissimi. Pedunculi erecti, primi uniflori, reliqui triflori j. 4-flori, foliis saepe longiores. Flores pedicellati, nutantes, pallide rufescentes: vexillo venis rubris; alis includentibus carinam. Calyci dentes subulati, distantes. Bractea ad exortum Pedunculorum propriorum, monophylla, erecta, foliolis similis. Noctu dormit floribus arcte Pedunculo communi approximatis, super imposta bractea, Foliolis stipulisque conniventibus. Legumina cylindrica, aristata. H. U.

Pedunculus foliis duplo vel triplo longior 2-3-4-florus. Legumina glabra. Vahl. l. c.

* 15. LOTUS *Dioscoridis.*

L. leguminibus teretibus torulosis, caulis erectis, pedunculis subtrifloris, bracteis triphyllis. W.
L. caule erecto ramoso, pedunculis subbifloris, leguminibus teretibus ovatis torosis. *Alban. ped. n. 1131. t. 59. f. 1.*

L. *sylvestris dioscoridis.* *Pon. bald. 552.*

Italiänischer Schotenklee. W.

Habitat in comitatu Nicaenfi inque Creta. ☽ (v. f.)

Folia glauca glabra. Foliola obovata. Stipulae ovatae mucronatae foliolis minores. Pedunculi bi-tri vel quadriflori. Legumina teretiuscula torulosa ac si articulata essent. W.

16. LOTUS *ornithopodioides.*

L. leguminibus subternatis arcuatis compressis, caulis diffusis. *Hort. cliff. 372. Hort. upf. 220. Roy. lugdb. 388. Sauv. monsp. 188. Mill. dict. n. 8. Pall. it. 2. p. 523. Cavan. ic 2. p. 48. t. 163.**

L. siliquis ornithopodii. *Bauh. pin. 332.*

L. peculiaris si iquosa. *Camm. hort. 91. t. 25.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 752.

Vögelnsleariger Schotenklee. W.

Habitat in Siciliae, Hispaniae humidis. ☽ (v. v.)

Noctu dormit Bracteis flores occultantibus. *Amoen. acad. 2. p. 340.*

Caules laeves, erecto-diffusi. Folia glabra, obovata s. rhombea. Legumina 3 ad 5, linearia, refalcata, compressa, nodosa.

17. LOTUS *jacobaeus.*

L. leguminibus subternatis, caule herbaceo erecto, foliolis linearibus. *Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 388. Mill. dict. 16. et ic. t. 168. Kniph. cent. 1. n. 54.*

L. angustifolia, flore luteo purpurascente, insulae S. Jacobi. *Comm. hort. 2. p. 165. t. 83.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 752.

Schwarzer Schotenklee. W.

Habitat in Insula S. Jacobi. 24 (v. v.)

Caulis rarius frutescit et perennat. Foliola lanceo-lato-linearia. Flores terni s. quini, colore Antirrhini trifidis. Petioluli albi.

*18. *LOTUS persicus.*

L. pilosissimus, foliolis linearibus obtusifolnis, pedunculis terminalibus tubquadritloris, leguminibus turgidulis. *Lamarck encycl. 3. p. 582.**

L. leguminibus ternis terminalibus torulosis, foliis ternatis quinisve linearis-lanceolatis pilosis. *Burm. ind. 173. t. 49. f. 3.*

β L. minus pilosus, foliolis terminalibus superne latioribus et obtusioribus. *Lam. l. c.*

Persischer Schotenklee. W.

Habitat in Persia et India orientali.

19. *LOTUS creticus.*

L. leguminibus subternatis, caule suffrutescente, foliis sericeis nitidis. *Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 387. Mill. dict. n. 5. Cavan. ic. 2. p. 44. t. 156.**

L. argentea cretica. *Pluk. alm. 226. t. 43. f. 1.*

L. polyceratos fruticosa cretica argentea, tiliquis longissimis propendentibus rectis. *Morif. hist. 2. p. 177. Houittyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 753.*

Cretischer Schotenklee. W.

Habitat in Syria, Creta, Hispania. h (v. f.)

Planta suffruticosa, debilis, tota sericea pilis adpresso. Flores saepius terni, lutei. Legumina oblonga, cylindrica, cernua.

*20. *LOTUS arboreus.* †

L. leguminibus quinatis, foliolis obcordatis, caule arboreo. *Forst. prod. n. 2. 278.*

Baumartiger Schotenklee. W.

Habitat in Nova Zeelandia. h (v. f. c. fr.)

Legumina oblonga compressa cuspidata. Foliola obcordata parva mucronata. Flores non vidi. W.

† † Pedunculis multifloris in capitulum.

21. *LOTUS hirsutus.*

L. capitulis subrotundis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Hort. upf. 220. Sauv. monsp. 188. Mill. dict. n. 6. Kniph. cent. 8. n. 62.*

- L. caule fruticoso, florum capitulis depresso, calycibus lanigeris. *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 387.
 L. pentaphyllos siliquosus villosus. *Bauh. pin.* 372.
 L. polyceratos frutescens incana alba, siliquis erectis crassioribus et brevioribus rectis. *Morif. hist.* 2. p. 177. f. 2. t. 18. f. 14.
Lotus incana. *Riv. tetr.* 191.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 754.
Zottiger Schotenklee. W.
Habitat in G. Narbonensi, Italia, Oriente. 24 (v. v.)
Capitula floribus infra 10, foliolo majoribus.

22. LOTUS graecus.

- L. capitulis subrotundis, caule erecto, foliis quinatis, leguminibus ovatis. *Mant.* 104. *Vahl. symb.* 1. p. 65.
 L. graeca maritima, folio glauco et veluti argenteo. *Tournef. cor.* 27.
 L. (*belgradica*) foliolis quinatis cuneiformibus, caule erecto, siliquis calyce sesquilonioribus solitariis erectis glabris. *Forst. deser.* 215.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 754.
Griechischer Schotenklee. W.
Habitat in Oriente: in Graecia, Arabia. 24
Media inter L. hirsutum et rectum, ut cuinam propior vix dicendum. Caulis erectus, annuus, sed magis patule ramosus. Flores etiam albi, minores hirsuto, maiores recto. Legumina ovata.
Differt ab omnibus foliis quinatis (praeter stipulas,) nec ternatis. Stipulae oblongae, ut in L. hirsuto; nec cordatae, ut in recto. H. U.

23. LOTUS rectus.

- L. capitulis subglobosis, caule erecto laevi, leguminibus rectis glabris. *Hort. upf* 221. *Mill. dict.* n. 4.
Kniph. cent. 8. n. 63.
 L. caule fruticoso, florum capitulis globosis. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 387. *Sauv. monsp.* 188.
 L. siliquosus glaber, flore rotundo. *Bauh. pin.* 332.
 L. polyceratos frutescens hirsuta alba major latifolia, siliquis tenuibus curtis rectis. *Morif. hist.* 2. p. 177. f. 2. t. 18. f. 13.
 L. villosus attillimus, flore glomerato. *Tournef. inst.* 403.
Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. M m

L. lybica. Riv. tetr. 192.

Trifolium rectum monspessulanum. Bauh. hist. 2.

p. 359.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 755.

Calabrischer Schotenklee. W.

*Habitat in Gallia Narbonensi, Sicilia, Calabria. 24
(v. v.)*

Capitula floribus ultra 20, foliolis multoties minoribus.

*24. LOTUS palustris. W.

L. capitulis dimidiatis subquadrifloris, leguminibus teretibus glabris, caule ramoso erecto foliisque hirsuto. W.

L. cretica palustris altissima incana, flore luteo. Tournef. cor. 27.

Sumpf-Schotenklee. W.

Habitat in Creta. (v. f.)

Caulis erectus bipedalis ramosus villosus. Folia ternata villosa obovata acuta. Stipulae ovatae subcordatae magnitudine foliorum. Capitula dimidiata triquadri-vel quinqueflora. Bractea triphylla, foliolis lanceolatis binis lateralibus duplo minoribus. Legmina tereta glabra recta. Planta facie L. corniculati sed vilositate caule erecto ramoso, aliisque notis diversa. W.

*25. LOTUS parviflorus.

L. capitulis dimidiatis, leguminibus oblongis compres- sis, calycibus corollam aequantibus, bracteis monophyllis. W.

*L. hirsutus foliolis obovatis, stipulis subcordatis, pedunculis multifloris, calycibus corollam aequantibus. Desf. atl. 2. p. 206. t. 211. **

Kleinblumiger Schotenklee. W.

Habitat in Atlante prope Mayane Algeriae. ○ (v. f.)

Planta digitalis hirsuta. Capitula tri-quadri-quinque-vel sexflora. Bractea monophylla lanceolata. W.

*26. LOTUS pedunculatus.

L. capitulis depresso longissime pedunculatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis, stipulis ovatis. W.

L. caule herbaceo, foliolis lanceolatis medio petiolato, floribus longe pedunculatis. *Cavan. ic. 2. p. 52. t. 164.* *

Langgestielter Schotenklee. W.

Habitat in Hispania.

Satis distinctus pedunculis valde elongatis et foliorum forma. W.

*27. LOTUS prostratus. +.

L. caule procumbente ramosissimo, foliis glabris, pedunculis multifloris, leguminibus compressis torulosis patentibus. *Desf. atl. 2. p. 206.*

Liegender Schotenklee. W.

Habitat in Algeria. 24

Affinis L. corniculato. Differt: caule ramosissimo suffruticoso prostrato, leguminibus compressis torulosis patentibus. Desf. l. c.

28. LOTUS corniculatus.

L. capitulis depresso, caulinibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Sp. pl. 1092. Mill. dict. n. 1. p. 184. Crantz. austr. 400. Gunn. norv. 108. Pall. it. 1. p. 370. Pollich. pal. n. 711. Kniph. cent. 7. n. 44. Scop. carn. n. 937. Hoffm. germ. 268. Roth. germ. I. 227. II. 323.*

L. filiis umbellatis rectissimis, cylindricis. *Hall. helv. n. 385.*

L. caule herbaceo, florum capitulo depresso leguminibus decumbentibus teretibus. *Hort. cliff. 372. Fl. suec. 609; 675. Roy. lugdb. 388. Dalib. paris. 221.*

Lotus f. meliotus pentaphyllos minor glabra. *Bauh. pin. 332. Riv. t. 76.*

Trifolium corniculatum. *Dod. pempt. 573.*

β Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente. *Bauh. pin. 332. Pollich. l. c.*

γ Lotus (*tenuifolius*) pentaphyllos, frutescens, tenuissimis glabris foliis. *Bauh. pin. 332. Pollich. l. c.*

Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis foliis. *Bauh. prodr. 144. Burf. XVIII. 73.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 756.

Gemeiner Schotenklee. W.

Habitat in Europa. 24 (v. v.)

Corollae odoratissimae.

Hujus forte varietas etiam γ est, cuius Caules duplo longiores et angustiores. Folia linearia. et Legu na angustiora. Videtur in umbra nata; Burserus C. Bau hino hanc attulit.

29. LOTUS cytisoides.

L. capitatis dimidiatis, caule diffuso ramosissimo, foliis tomentosis. Sp. pl. 1092. Roy. lugdb. 387. Mill. dict. n. 15.

L. siliquosa maritima lutea, cytisi facie. Barr. rar. 71. t. 1031.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 758.

Weißlicher Schotenklee. W.

Habitat in maritimis Europae australis. 24 (v. f.)

***30. LOTUS medicaginoides. †.**

L. leguminibus umbellatis arcuatis, foliolis obcordatis denticulatis. Retz. obs. 2. p. 23.

Schneckenkleeartiger Schotenklee. W.

Habitat in Sibiria? ○

Radix annua. Caulis prostratus sulcatus hirtus. Folia ternata longe petiolata obcordata denticulata glabra lineata. Stipulae semifagiatae integrae basi lobato bidentato. Pedunculi axillares elongati 5-6-flori umbellati, flosculis parvis luteis. Legumina 4-6 linearia arcuata torulosa. Planta e seminibus Sibiricis enata, florens simillima Medicagini polymorphae licet minor, leguminibus Trigonellae. Dubius etiamnum sum, an revera Loti vel Trigonellae species. Retz. l. c.

***1385 DORYCNIUM.**

Villars delph. 3. p. 416.

Cal. 5-dentatus bilabiatus. Filamenta subulata.

Stigma capitatum. Legumen turgidum mono-vel dispermum.

I. DORYCNIUM monspeliacum. W.

D. foliolis linearis lanceolatis acutis, calycinis dentibus ovatis, caule fruticoso. W.

*D (suffruticosum) canibus suffruticosis erectis. Villars delph. 3. p. 416.**

- Lotus (Dorycnium) capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis.* Sp. pl. 1093. Mill. dict. n. 17.
D. foliis digitatis sessilibus. Hort. cliff. 371.* Roy. lugdb. 389. Sauv. monsp. 214.
D. hispanicum. Clus. hist. 2. p. 100. Hall. helv. n. 384. Parkf. theatr. 360.
D. montpelienium. Lob. ic. 2. t. 51. advers. 389. Tournef. inst. 391.
D. montpelianum fruticosum. Bauh. hist. 1. p. 388.
Lotus polyceratos incana, siliculis subrotundis erectis.
Morif. hist. 2. p. 178. f. 2. t. 18. f. 15.
Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulo congestis. Bauh. pin. 329.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 758.
Stranchartiges Dorycnium. W.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Helvetia. Ȣ (v. v.)

*2. DORYCNIUM *herbaceum.*

- D. foliolis obovatis obtusis, calycinis dentibus ovatis,* caule herbaceo. W.
D. (herbaceum) caule diffuso herbaceo. Vill. delph. 3. p. 417. t. 41.* Bellard. append. 35.*
Dorycnium majus. Tournef. inst. 391.
Lotus Dorycnium. Crantz. aust. 402. Hofst. synop. 416.
Krautartiges Dorycnium. W.
Habitat in Galliae australis Sebaudiae, Pedemontii, Austriae, Hungariae collibus. Ȣ (v. f.)
Caulis herbaceus ascendens, Folia latiora obovata obtusa. W.

*3. DORYCNIUM *latifolium.* W.

- D. foliolis obovatis obtusis, dentibus calycinis subulatis,* caule erecto fuscotricofo. W.
D. orientale latifolium villosum. Tournef. cor. 26.
Breitblättriges Dorycnium. W.
Habitat in Oriente. Ȣ (v. f.)
Tota planta villosa. Capitula septem-vel decemflo- ra, floribus reliquis duplo majoribus. Differt potissimum a cognitis hujus generis speciebus, dentibus caly- cis longioribus subulatis. W.

1386. TRIGONELLA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1213.

Vexillum et Alae subaequales, patentes, forma corollae tripetalae.

1. TRIGONELLA *ruthenica*.

T. leguminibus pedunculatis congestis oblongo-lineari-bus rectis, foliolis oblongis truncatis mucronatis. W.
T. leguminibus pedunculatis congestis pendulis linearibus rectis, foliolis sublanceolatis. Sp. pl. 1093. Mill. dict. n. 5. Gmel. fib. 4. p. 24. n. 33. t. 8.

T. leguminibus pedunculatis. Vir. cliff. 76. Hort. cliff. 378.* Roy. lugdb. 382.

Melilotus supina angustifolia, medicæ faciè, siliqua compressa. Amm. ruth. 159. et. n. 156.

Lotus montana humilior trifolia ad caulem alata lutea, siliqua modo recta, modo medicaginis instar falcata nigra. Amm. ruth. 119.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 760.

Russischer Kuhhornklee. W.

Habitat in Siberia. 24 (v. v.)

Foliola lanceolata, obtusissima, superne acute serrata, dentata. Stipulae integerrimae. Legumina linearia.

2. TRIGONELLA *platycarpos*.

T. leguminibus pedunculatis congestis pendulis ovalibus compressis, caule diffuso, foliolis subrotundis. Hort. upf. 229. Gmel. fib. 4. p. 25. t. 9. Kniph. cent. 9. n. 93.

Melilotus supina latifolia, siliqua lata membranacea compressa. Amm. ruth. 158. act. goett. I. p. 213. t. 13.

Melilotus siliqua membranacea compressa. Act. petrop. 8. p. 209. t. 12.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 761.

Flachsfrüchtiger Kuhhornklee. W.

Habitat in Siberia. ♂ (v. f.)

Foliola subovata, longitudinaliter acute ferrata.
Stipulae saepius dentatae. Legumina ovalia.

3. TRIGONELLA striata.

T. leguminibus pedunculatis folio longioribus. *Lin.*
Suppl. 340.

Gefreister Kuhhornklee. W.

Habitat in Abyssinia? ☉ (v. v.)

Folia praesertim juniora striis lateralibus. Pedunculus communis foliis longior erectus, apice muticus, floribus quinque seu sex terminalibus non racemosis fessilibus luteis. Leguminina umbellata fere erecta uti digitii erecti distantes in manu, linearia sessilia, quinque ad sex, parum introrsum arcuata.

4. TRIGONELLA polycerata.

T. leguminibus subfessilibus congestis erectis subrectis longis linearibus, pedunculatis muticis. *Sp. pl.* 1093.

Medicago leguminibus confertis fessilibus erectis. Roy.
lugdb. 382. *Sauv. monsp.* 187.

Medicago leguminibus confertis longis rectis parallelis,
pedunculo communi. Hort. cliff. 376.*

Foenum graecum sylvestre alterum polyceration. Bauh.
p. 348.

Foenum graecum sylvestre alterum. Dod. pempt. 547.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 761.

Vielkörniger Kuhhornklee. W.

Habitat in Hispania, Italia, Monspelii. ☉ (v. v.)

5. TRIGONELLA hamosa.

T. leguminibus pedunculatis racemosis declinatis hamosis teretibus, pedunculis spinolis foliolo longioribus. *Sp. pl.* 1094.

Foenum graecum, corniculis reflexis, minus et repens.
Boerh. lugdb. 2. p. 33.

Melilotus, corniculis reflexis, minor f. repens. Bauh.
pin. 331.

Melilotus aegyptius Achimelech vocatus. Alp. aegypt.
41. t. 124. Bauh. hist. 2. p. 357.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 762.

Hakiger Kuhhornklee. W.

Habitat in Aegypto. Hasselquist. ☉

Caules decumbentes, adscendentes. Folia ternata, obcvata, cuneiformia, dentata, venosa, pubescentia. Pedunculus folio longior, spina terminatus. Flores racemosi, quorum vexillum alis f. carina dimidio brevius. Legumina ad 10, filiformia, hamosa, dependentia, apice adscendentia versus calycem.

*6. TRIGONELLA *hirsuta*.

T. leguminibus racemosis reflexis, foliolis oblongis obtusis villosis. Thunb. prod. 137.
Ranher Kuhhornklee. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

*7. TRIGONELLA *villosa*.

T. leguminibus racemosis villosis, foliolis obovatis glabris. Thunb. prod. 137.
Rauchfrüchtiger Kuhhornklee. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

*8. TRIGONELLA *armata*.

T. leguminibus lateralibus pilosis, foliolis ovatis glabris, ramulis spinefertibus. Thunb. prod. 137.
Schehender Kuhhornklee. W.
Habitat ad Cap. b. spei.

9. TRIGONELLA *spinosa*.

T. leguminibus subpedunculatis congestis declinatis subfalcatis compressis, pedunculis spinosis brevissimis. Sp. pl. 1094. Mill. dict. n. 2.
Medicago leguminibus saepius ternatis sessilibus arcuatibus declinatis, spina ex alis. Hort. cliff. 377.
Foenum graecum sylvestre polyceratation creticum majus. Breyn. cent. 79. t. 35. f. 1.
Houttuyn Lin Pl. Syst. 8. p. 762.
Dorniger Kuhhornklee. W.
Habitat in Creta. ○ (v. f.)
Stipulae dentatae. Pedunculus fit spina rigida ad cuius basin saepe Legumina 5, venosa, glabra.

10. TRIGONELLA *corniculata*.

T. leguminibus pedunculatis congestis declinatis subfal-

catis, pedunculis longis subspinosis, caule erecto. Sp. pl. 1094.

Trifolium floribus spicatis, leguminibus nudis mucronatis falcatis declinatis. Hort. cliff. 376. Roy. lugdb. 381. Gort. gelr. 435. Gron. orient. 96.*

Melilotus, corniculis reflexis, major. Bauh. pin. 331. Melilotus lutea major, corniculis reflexis ex eodem centro ortis. Morif. hist. 2. p. 162. f. 2. t. 16. f. 11.

Trifolium corniculatum 2 Dod. pempt. 573.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 763.

Gekrümmter Kuhhornklee. W.

Habitat in Europa australi. ☽ (v. v.)

Caulis huic erectus. Stipulae simplices, subdentatae. Pedunculus tetragonus, folio longior, apice molliusculo spinoso, sub quo Legumina 10—12, falcata pedunculo breviora. Calyces ante explicationem obscuriores. Flores odoratissimi.

II. TRIGONELLA monspeliaca.

T. leguminibus sessilibus congestis arcuatis diuaricatis inclinatis brevibus, pedunculo mucronato inermi. Sp. pl. 1095. Vahl symb. 2. p. 85.

Medicago leguminibus confertis sessilibus arcuatis inclinatis. Hort. cliff. 377. Roy. lugdb. 382. Dalib. parif. 231. Sauv. monsp. 187.

Trigonella stellata. Forfk. descr. 140.

Foenum graecum polyceraton. Riv. tetr.

Foenum graecum sylvestre polyceratum monspeliacum. Breyn. cent. 80. t. 33. f. 2.

Hedysarum minimum. Dalech. hist. 446.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 763.

Französischer Kuhhornklee. W.

Habitat in Gallia australi, Hungaria. ☽ (v. v.)

Legumina 10 ad 12, declinata. Pedunculus brevisimus, molle mucronatus, folio non longior. Caules prostrati, terrae adpresso.

* 12. TRIGONELLA glabra.

T. leguminibus umbellatis reflexis glabris, foliolis ovatis dentatis glabris. Thunb. prod. 137.

Glatter Kuhhornklee. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

* 13. TRIGONELLA *tomentosa*.

T. leguminibus pedunculatis ternis, foliolis ramisque tomentosis. *Thunb. prod.* 137.

Filziger Kuhhornklee. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

14. TRIGONELLA *laciniata*.

T. leguminibus pedunculatis subumbellatis ellipticis, foliolis cuneiformibus dentatis; stipulis laciniatis. *Sp. pl.* 1095.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 764.

Schlitzblättriger Kuhhornklee. W.

Habitat in Aegypto. Burmannus.

Similis Medicagini laciniatae. Caules filiformes, laeves. Foliola laevia, retusa; argute dentata. Stipulae laciniato-dentatae. Pedunculi axillares, vix longitudine foliorum, spinula molli terminati, ferentes Flores aliquot sere umbellatos, luteos. Legumina fere Meliloti, ovalia, utrinque acuta, calyce duplo longiora.

* 15. TRIGONELLA *pinnatifida*.

T. leguminibus sessilibus subternis linearibus erectiusculis, foliis truncato-cuneatis pinnatifido-dentatis. W.

T. caule prostrato tetragono, leguminibus linearibus compressis erectis sessilibus. *Cavan. ic.* I. p. 26. t. 38.*

Tiefzähniger Kuhhornklee. W.

Habitat in Hispania. ⊙ (v. f.)

Stipulae oblongo-lanceolatae basi dentatae. W.

16. TRIGONELLA *Foenum graecum*.

T. leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. upf.* 229. *Mat. med.* 175. *Mill. dict.* n. I. *Blackw. t.* 38. *Ludw. ed. t.* 160.

T. leguminibus subsessilibus. *Vir. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 383. *Dalib. paris.* 228. *Sauv. monsp.* 187.

Buceras siliquis sessilibus, arcuatis undique divergentibus. *Hall. helv.* n. 379.

Medicago leguminibus subsolitariis sessilibus erectis reflexo-falcatis acuminatis. *Hort. cliff.* 376.

Foenum graecum sativum. *Bauh. pin.* 348.

Foenum graecum. *Euchf. hist.* 798. *Cam. epit.* 199.
Riv. t. 82.

β *Foenum græcum sylvestre.* *Bauh. pin.* 348.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 765.

Gemeiner Kuhhornklee. W.

Habitat Monspelii. ☽ (v. v.)

Sylvestre β. differt Stolonibus ad radicem longis, praeter erectum caulem, terrae adpresso. Foliolis obovatis, nec obtuse lanceolatis. Geniculis foliorum purpuraceentibus. Leguminibus magis hirsutis.

17. TRIGONELLA indica.

T. leguminibus sessilibus subsolitariis subfalcatis, foliolis integerimis, caule diffuso. *Fl. zeyl.* 285.*

Lotus maderaspatus villosus, ornithopodii filium singulari. *Pluk. alm.* 226. t. 200. f. 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 765.

Indischer Kuhhornklee. W.

Habitat in India orientali. ☽ (v. f.)

1387. M E D I C A G O.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1214.

Legumen compressum, cochleatum. Carina collae a vexillo deflectens.

† *Medicagine leguminibus lunatis subcontortis.*

I. MEDICAGO arborea.

M. leguminibus lunatis margine integerimis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 376. *Hort. upf.* 230. *Roy. lugdb.* 382. *Kniph. cent.* 5. n. 55.

Medica arborea. *Mill. dict.* n. 7.

Cytisus incanus, filique falcatis. *Bauh. pin.* 389.

Cytisus marante. *Lob. ic.* 2. p. 46.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 767.

Baumartiger Schneckenklee. W.

Habitat in Rhodo, Neapoli. ♂ (v. v.)

2. MEDICAGO *radiata*.

- M. leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 377.* *Hort. upf.* 230. *Roy. lugdb.* 381. *Berg. viadr.* 95. *Gron. orient.* 331. *Kniph. cent.* 10. n. 58. *Gaert. sem.* 2. p. 348. t. 155.
 M. annua, siliqua falcata striata. *Moris. hist.* 2. p. 158. f. 2. t. 16. f. 3.
Trifolium siliqua falcata. *Bauh. pin.* 330.
Lunaria radiata italorum. *Lob. ic.* 2. p. 38.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 768.
 Gestrahler Schneckenklee. W.
Habitat in Italia. ○ (v. v.)

3. MEDICAGO *circinnata*.

- M. leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 377.* *Hort. upf.* 230. *Roy. lugdb.* 382. *Murray. prodr.* 175.*
 Loto affinis siliquis hirsutis circinnatis. *Bauh. pin.* 333.
 Falcata foliis Anthylloides. *Riv. tetr.* 201.
 β M. leguminibus margine integerrimis.
 Medicago circinnata. *Gaert. sem.* 2. p. 348. t. 155.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8 p. 769.
 Kreisförmiger Schneckenklee. W.
Habitat in Hispania, Italia. ○ (α. v. f. β. v. v.)

4. MEDICAGO *sativa*.

- M. pedunculis racemosis, leguminibus laevibus cochleato-contortis, stipulis integerimis, foliolis oblongis dentatis. W.
 M. pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Hort. cliff.* 377. *Roy. lugdb.* 281. *Crantz. aust.* p. 434. *Neck. gallob.* p. 317. *Pollich. pal.* n. 712. *Pall. it.* 1. p. 370. *Kniph. cent.* 8. n. 67. *Hoffm. germ.* 269. *Roth. germ.* I. 319. II. 216.
 Medica caule erecto, foliis oblongis ferratis, racemis erectis, siliquis planis, iterato contortis. *Hall. helv.* n. 382.
 Medica legitima. *Clus. hist.* 1. p. 242.
 Medica sativa. *Moris. hist.* 2. p. 150. f. 2. t. 16. f. 2. *Mill. dict.* n. 1.

Foenum burgundicum. *Lob. ic. 2. p. 36.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 769.

Luzerner Schneckenklee. W.

Habitat in Hispaniae, Galliae etc. apricis. 24 (v. v.)

Datur varietas floribus pallide coeruleis demum flavescentibus. W.

5. MEDICAGO prostrata.

M. pedunculis racemosis, leguminibus laevibus cochleato-contortis, stipulis basi dentatis, foliolis linearibus apice dentatis. W.

Medicago prostrata. *Jacq. hort. I. v. 39. t. 89.*

M. diffusa, foliis ternatis cuneiformibus apice dentatis, stipulis setaceis integerrimis, leguminibus cochleatis integerrimis. *Lin. suppl. 340.*

Medica maritima saxatilis minima perennis, foliis angustioribus in apice incisis, fructu parvo non spinoso. *Till. pif. 110.*

Gestreckter Schneckenklee. W.

Habitat in saxosis apricis Hungariae, Italiae. 24 (v. f.)

Stipulae lanceolatae basi dentatae. *Fructus praecedentis.* Flores flavi sequentis. W.

6. MEDICAGO falcata.

M. pedunculis racemosis, leguminibus contorto-falcatis pubescentibus, foliolis oblongis apice dentatis. W.

M. pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Fl. suec. 620; 677.* *Dalib. paris. 229.* *Mill. dict. n. 2.* *Crantz aust. p. 434.* *Pollich. pal. n. 713.* *Doerr. nass. p. 150.* *Kniph. cent. II. p. 67.* *Fl. dan. t. 233.* *Hoffm. germ. 269.* *Roth. germ. I. 319. II 217.*

Medica foliis oblongis ferratis, siliquis racemosis falcatis. *Hall. helv. n. 381.*

Medicago racemis axillaribus, siliquis polyspermis, falcatis, compressis. *Scop. carn. ed. I. p. 529. ed. 2. n. 941.*

Trifolium sylvestre luteum, siliqua cornuta. *Bauh. pin. 330.*

Falcata. *Riv. t. 84.*

Lens major repens. *Tabern. p. 502.* *Hall.*

Medica flavo flore. *Cluf. hist. 2. p. 243.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 771.

Sichelfrüchtiger Schneckenklee. W.
Habitat in Europae pratis apricis, siccis. 24

*7. MEDICAGO *glutinosa*.

M. pedunculis racemosis, leguminibus contorto-falcatis calycibusque viscofo-villoso, foliolis obovatis apice dentatis. W.

M. pedunculis racemosis, leguminibus reniformi-cordatis calycibusque villoso-viscidis, caulis suberectis pubescentibus. Marschall. ab Bieberst. casp. p. 117.

Klebriger Schneckenklee. W.

Habitat in graminosis Tauriae. 2. (v. f.)

Valde similis praecedenti sed foliola obovata, legumina, calycesque villoso-viscosi. W.

8. MEDICAGO *lupulina*.

M. spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, stipulis integerrimis, foliolis obovatis. W.

M. spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulis procumbentibus. Fl. suec. 621; 678. Dalib. parif. 281. Crantz. aust., 433. Pollich. pal. n. 714. Kniph. cent. II. n. 68. Hoffm. germ. 269. Roth. germ. I. 320. II. 217.

Trifolium leguminibus spicatis reniformibus nudis monospermis, caule procumbente. Hort. cliff. 375. Roy. lugdb. 380. Gron. virg. 110.

Medica caule diffuso, capitulis haemisphaericis, siliquis reniformibus. Hall. helv. n. 330.

M. spicis axillaribus, ovatis, siliquis monospermis, rugosis. Scop. carn. ed. 1. p. 529. ed. 2. n. 940.

Trifolium pratense luteum, capitulo breviore. Bauh. pin. 328.

Trifolium pratense luteum. Fuchf. hist. 819.

Melilotus minima. Riv. t. 8. Hall. R.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. p. 772.

Hopfenartiger Schneckenklee. W.

Habitat in Europae, Americae borealis pratis. ♂ (v. v.)
Legumina striato-rugosa, pilis rigidis subhispidia.

*9. MEDICAGO *obscura*.

M. pedunculis racemosis, leguminibus reniformibus dispermis, stipulis dentatis, foliolis rhombo-ovatis. W.

M. pedunculis racemosis, leguminibus reniformibus integrermis, caule diffuso hirto. *Retz. obf. I. p. 24. t. I.**

Nierenförmiger Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi? ⊙ (v. v.)

Legumina parva reniformia imtegerrima disperma.
Stipulae ovatae profunde dentatae. W.

† † *Medicae leguminibus cochleatis.*

10. MEDICAGO orbicularis.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus inermibus cochleatis- orbiculatis planiusculis, stipulis setaceo- multifidis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha α *orbicularis.* *Sp. pl. 1097. Allion. pedem. n. 1150. Scop. carn. n. 942. Gaert. Sem. 2. p. 349. t. 155. Desf. atl. 2. p. 210. Villars delph. 3. p. 402.*

M. leguminibus solitariis cochleatis depressis planis, sti- pulis ciliatis, caule diffuso. *Sauv. monsp. 186.*

M. pedunculis unifloris aristatis, leguminibus cochleatis compressis rugosis nudis. *Ger. prov. 516.*

Medica major dicarpos, capsula compressa orbiculata ni- gra plana oris crispis. *Moris. hist. 2. p. 152. f. 2. t. 15. f. 1.*

Medica orbiculata. Bauh. hist. 2. p. 384. Raj. hist. 961.

Trifolium cochleatum f. *frutellatum*, folio latiore, fru- cta minuto obtuso. *Bauh. pin. 329. prodr. 140.*

β *Medica cochleata altera major* dicarpos, capsula com- pressa orbiculata nigra laevi sine oris crispis. *Moris. hist. 2. p. 152. f. 2. t. 15. f. 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 774.

Tellerförmiger Schneckenklee. W.

Habitat in arvis Galliae australis, Italiae, Carnioliae, Hungariae, Barbariae. ⊙ (v. v.)

Fructus solitarius, lentiformis, anfractibus inermi- mus planis. Pedunculi aristati. Stipulae ciliatae.

Variat pedunculis uni-vel bifloris aristatis, ut et multiploris, leguminibusque majoribus atque minori- bus. W.

*II. MEDICAGO elegans.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus inermibus cochleatis orbiculatis planis margine transversim rugosis, stipulis dentatis, foliolis rhombeo-obovatis dentatis. W.

Medicago elegans. Jacquin.

M. (*rugosa*) stipulis laciniato-ciliatis, pedunculis aristatis subbifloris, leguminibus cochleatis nudis rugosis lentiformibus. *Lamarck encycl. 3. p. 605.* *

Medica orbiculata elegans orbiculata circum oras rugosiss. Raj. hist. I. p. 962. Tournef. inst. 411.

Medica cochleata major dicarpos, capsula compressa orbiculata rugosa alba. Moris. hist. 2. p. 152. f. 2. t. 15. f. 4.

Schöner Schneckenklee. W.

Habitat in Sicilia. ⊙ (v. v.)

Legumina fere praecedentis sed margine incrassata et rugis elevatis transversis ornata. W.

12. MEDICAGO scutellata.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus inermibus cochleatis orbiculatis basi convexis superne planis, anfractibus concentrico-spiralibus stipulis dentatis, foliolis oblongis dentatis. W.

M. stipulis dentatis, pedunculis aristatis subbifloris, leguminibus cochleatis hemisphaericis scutellatis. *Lamarch encycl. 3. p. 605.* *

Medicago polymorpha scutellata. Sp. pl. 1097. Allion. pedem. n. 1155. Villars delph. 3. p. 403. Desf. atl. 2. p. 211. Gaert. Jem. 2. p. 349. t. 155.

Medica cochleata major dicarpos, capsula rotunda globosa scutellata. Moris. hist. 2. p. 152. f. 2. t. 15. f. 3.

M. pedunculis multiploris, leguminibus cochleatis globosis inermibus nudis. *Ger. prov. 516*

Trifolium cochleatum, fructu latiore. Bauh. pin. 329. Park. theatr. 1199.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 775.

Schildförmiger Schneckenklee. W.

Habitat inter segetes Italiae, Galliae australioris et Barbariae. ⊙ (v. v.)

Fructus solitarius, hemisphaericus: anfractibus inermibus concavis. Pedunculi aristati. Stipulae dentatae.

*13. MEDICAGO *Helix*. W.

M. pedunculis multifloris, leguminibus inermibus cochleatis orbiculatis planis, anfractibus distantibus, stipulis ciliato-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.
M. (laevis) foliolis obovatis, stipulis dentatis, pedunculis multifloris folio longioribus, leguminibus planis nervosis inermibus. *Desf. atl. 2. p. 213?*

Schnirkelartiger Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi? ☉ (v. v.)

Legumina fere ut in *M. obscura*, sed anfractibus binis non arce adpresso diversa. A. sequenti distincta leguminibus non cylindricis, anfractibus tantum binis. W.

14. MEDICAGO *tornata*.

M. pedunculis multifloris, leguminibus inermibus cochleatis cylindricis utrinque planis, anfractibus distantibus, stipulis ciliato-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha γ *tornata*. *Sp. pl. 1098. Retz. obf. 1. p. 26. Desf. atl. 2. p. 211.*

M. leguminibus cochleatis nudis cylindricis apice basique planiusculis. *Ger. prov. 517.*

Medica leguminibus tornatis inermibus, stipulis acute dentatis, foliolis ferratis. *Mll. dict. n. 3.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 775.

Gedrechselter Schneckenklee. W.

Habitat in Gallia australi, Hispania, Barbaria. ☉ (v. v.)

Fructus plures, subcylindrici; anfractibus inermibus planis. Stipulae dentatae.

Datur varietas fructibus majoribus et minoribus. W.

15. MEDICAGO *turbinata*.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus inermibus cochleatis cylindraceis utrinque convexis, anfractibus imbricatis, stipulis dentatis, foliolis rhombeo-obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha δ *turbinata*. *Sp. pl. 1098. Allion. ped. n. 1155.*

M. leguminibus cochleatis inermibus subcylindricis: extremitatibus complanatis. *Gouan monsp. 517.*

Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. Nn

Medicago fructu turbinato. *Sauv. monsp.* 187.

Medica dicarpos, *fructus capsula turbinata rugosa.* *Morif. hist.* 2. p. 153. f. 2. t. 15. f. 5.

Medica scutellata. *Bauh. hist.* 2. p. 384.

Trifolium cochleatum turbinatum, *fructu compresso oblongo.* *Bauh. pin.* 329.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 776.

Kreuzelförmiger Schneckenklee. W.

Habitat in agris Galliae australis et Italiae. ⊙ (v. v.)

*16. MEDICAGO tuberculata.

M. pedunculis subbifloris, *leguminibus inermibus cochleatis cylindricis utrinque planiusculis anfractibus tuberculatis,* *stipulis ciliato-dentatis,* *foliolis rhombeo-ovovatis dentatis.* W.

Medicago polymorpha tuberculata. *Retz obs.* 2. p. 23.*

Medica cochleata major dicarpos capsula turbinato-rugosa. *Morif. hist.* 2. p. 153. f. 2. t. 15. f. 6.

Medica magna turbinata. *Bauh. hist.* 2. p. 385.

Warziger Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi. ⊙ (v. v.)

Affinis praecedenti, *sed legumina tuberculis obtusis obsoleta.* W.

*17. MEDICAGO aculeata. W.

M. pedunculis subbifloris, *leguminibus cochleatis cylindraceis utrinque planiusculis,* *anfractibus margine muricatis,* *stipulis dentatis,* *foliolis rhombeo-ovovatis dentatis.* W.

Dickstachlicher Schneckenklee. W.

Habitat — — — — ⊙ (v. v.)

Simillima praecedenti, *sed diversa:* *leguminibus aculeis inaequalibus crassis brevissimis obsoletis.* W.

*18. MEDICAGO Murex. W.

M. pedunculis subbifloris, *leguminibus cochleatis cylindraceis utrinque convexiusculis aculeatis,* *aculeis rectis stipulis ciliato-dentatis,* *foliolis obovatis dentatis.* W.

Kurzstachlicher Schneckenklee. W.

Habitat — — — — ⊙ (v. v.)

Legumina cylindracea turbinata sed aculeis crassis subulatis obsoleta. *Differt a praecedente:* *Foliolis obo-*

vatis obtusis, inferioribus obcordatis. Stipulis linearibus, subulatis ciliato-dentatis, nec lanceolatis basi dentatis, Aculeis fructu longioribus. W.

19. MEDICAGO intertexta.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis ovalibus, aculeis pubescentibus setaceis distichis adpressis, stipulis ciliato-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha s. intertexta. Sp. pl. 1098. Alion. ped. n. 1152. Desf. atl. 2. p. 211. Gaert. sem. 2. p. 350. t. 153.

M. pedunculis unifloris, leguminibus cochleatis sphæricis, spinis longioribus divaricatis recurvis. Ger. prov. 518.

Medica leguminibus cochleatis spinosissimis, aculeis utrinque tendentibus. Mill. dict. n. 4.

Medica cochleata spinosa major dicarpos, capsula s. spinis longioribus sursum et deorsum tendentibus. Morf. hist. I. p. 153. f. 2. t. 15. f. 8. 9. 7. Knorr. del. 2. t. M. I. a.

Medica echinata spinosa, echinis magnis utrinque turbinate cum spinulis reflexis. Raj. hist. 962.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 776.

Verwebter Schneckenklee. W.

Habitat in Gallia, Hispania, Italia, Barbaria. ⊖ (v. v.)

Fructus 2 f. 4. ovati: anfractibus spinis setaceis reflexis. Stipulae dentatae.

20. MEDICAGO ciliaris.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis ovalibus, aculeis pubescentibus subulatis rectis, stipulis ciliato-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha s. ciliaris. Sp. pl. 1099?

Medica magna echinata. Raj. hist. I. p. 963.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 77

Gefranzter Schneckenklee. W.

Habitat in Gallia australi. ⊖ (v. v.)

Fructus plures ovales, anfractibus spinis rectis scutulis villosis. Stipulae ciliatae.

Planta nostra pedunculis gaudet bifloris, leguminibusque magnitudine praecedentis. Differt a M. inter-

texta : leguminum aculeis rectis crassiusculis subulatis. W.

*21. MEDICAGO carstiensis.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis utrinque compressis, aculeis subulatis rectis, stipulis dentatis, foliolis ovatis dentatis, caule erecto. W.

M. caule erecto, radice perenni reptante, floribus umbellatis, leguminibus cochleatis setosis. *Jacq. ic. rar. t. t. 156. Collect. I. p. 86.**

M. caule erecto, floribus umbellatis, leguminibus cochleatis setosis. *Hort. synop. 417.*

Medica cochleata polycarpos, capsula spinosa minore, perennis ciliaris. *Morif. hisp. 2. p. 154.*

Medica ciliaris Guitandini. *Raj. hisp. I. p. 965.*

Kärnthenscher Schneckenklee. W.

Habitat in alpibus Carinthiae. 24 (v. v.)

Flores umbellati demum racemosi. Ab omnibus affinis radice perenni et caule erecto diversa. W.

22. MEDICAGO maculata. W.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis utrinque compressis, aculeis subulatis arcuatis, stipulis dentatis, foliolis obcordatis dentatis maculatis. W.

M. (*cordata*) foliolis obcordatis, stipulis dentatis, pedunculis subtrifloris, leguminibus echinatis. *Lamark encycl. 3. v. 608.**

Medicago polymorpha η arabica. *Sp. pl. 1098. Allion. ped. n. 1153. Huds. augl. 331. Relh. cant. 386. Smith. brit. 2. p. 797. Desf. atl. 2. p. 211.*

M. pedunculis subtrifloris, leguminibus echinatis, foliolis obcordatis. *Gou. monsp. 516. Willich. obs. n. 119.*

Medica cochleata minor polycarpos annua, capsula maiore alba, folio cordato macula fusca. *Morif. hisp. 2. p. 154. f. 2. t. 15. f. 12.*

Medica arabica. *Cara. hort. 97. t. 27.*

Tritolium cochleatum, folio maculato cordato. *Bauh. pin. 329.*

Tritolium cordatum. *Park. theatr. 1190.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 776.

Gefleckter Schneckenklee. W.

Habitat in arenosis Angliae, Galliae, Italiae, Barbariae.

○ (v. v.)

Folia macula sanguinea lanceolata, quae in nupta disparet. Flores 4. f. 5. Fructus spinis longe divergentibus.

Mutavi nomen triviale, quum non in Arabia crescat. W.

*23. MEDICAGO tentaculata.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque planis, aculeis glabris lanceolatis distichis arce adpresso, stipulis dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago tentaculata. Gaert sem. 2. p. 350. t. 155.

Dichtdorniger Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi. ○ (v. v.)

Stipulae subulatae dentatae. Pedunculi biflori. Legumina cylindrica utrinque plana, aculeis lanceolatis distichis arce adpresso glabris. W.

24. MEDICAGO coronata.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque planis pubescentibus, aculeis distichis arce adpresso subulatis, stipulis basi dentatis, foliolis obcordatis dentatis. W.

M. stipulis subdentatis, foliolis obovato-emarginatis, floribus capitatis, leguminibus minimis coronaeformibus.

Lamarck. encycl. 3. p. 606.

Medicago polymorpha ð coronata. Sp. pl. 1098.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus compressis subspinosis, stipulis subulatis integerrimis. Gou. 204.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis compressis spinulis oppositis. Ger. 517.

M. fructu minimo, coronulam utrinque dentatam referente. Sauv monsp. 187.

Medicago cochleata polycarpos annua, capsula minima coronata. Moris. hist. 2. p. 155. f. 25. t. 15. f. 16. bona.

Medica coronata Cherleri parva. Bauh. hist. 2. p. 386.

Trifolium folio obtuso, folliculis cordatis. Bauh. pin. 329. prodr. 141. n. 13.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 777.

Kronenförmiger Schneckenklee. W.

Habitat in saxosis aridis Galliae Narbonensis. ⊙ (v. f.)

Flores minimi. Legumina spinis brevioribus erecti - usculis. Gouan.

Legumen anfractibus binis, parvum pubescentibus aculeis distichis arcte adpresso. W.

*25. MEDICAGO apiculata. W.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis utrinque planis, anfractibus tribus reticulatis margine muricatis, stipulis ciliato-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago coronata. Gaert. semi. 2. p. 349. t. 155. Morif. hist. 2. f. 2. t. 15. f. 14. *

Scharffrüchtiger Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi. ⊙ (v. v.)

Legumina parva compressa, anfractibus binis vel tribus, valde reticulata, margine tuberculis admodum parvis spinescentibus obsita. W.

*26. MEDICAGO denticulata. W.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis utrinque planis, anfractibus binis reticulatis margine aculeatis, aculeis divergentibus, stipulis ciliato-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Gezähnter Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi. ⊙ (v. v.)

Valde affinis praecedenti, differt solummodo: leguminum anfractibus aculeatis, aculeis armatis setaceis divergentibus. W.

27. MEDICAGO muricata.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis glabris utrinque planis, anfractibus quinque, aculeis subulatis brevissimis, stipulis ciliato-dentatis, foliolis rhombo-ovo-ovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha ζ muricata. Sp. pl. 1098. Allion. ped. n. 1158. Villars delph. 2. p. 403. Smith. brit. 2. p. 798. Morif. hist. 2. f. 2. t. 15. f. 11.

M. (muricata) stipulis fimbriato-laciniatis, leguminis utrinque depresso margine carinato, spinulis brevibus. Lamarck encycl. 3. p. 607?

Trifolium cochleatum módiolis spinosis. *Raj. synop.* 333.

Pluk. phytog. t. 113. f. 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 779.

Zackiger Schneckenklee. W.

Habitat in siccis Angliae, Galliae, Italiae. ⊙ (v. v.)

*28. MEDICAGO Gerardi.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis villosis, utrinque planis, anfractibus quinis, aculeis subulatis rectis uncinatis, stipulis setaceo-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago Gerardi. Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis subrotundis spinosis incanis, foliis villosis. Ger. prov. 516.

Medica cochleata dicarpos capsula spinosa rotunda minor, rarius spinis crassioribus et brevioribus armata.

Morif. hist. 2. p. 153. f. 2. t. 15. f. 18.

Gerardischer Schneckenklee. W.

Habitat in Hispania, Gallia Narbonensi, Hungaria. ⊙ (v. f.)

*29. MEDICAGO recta.

M. pedunculis unifloris, leguminibus cochleatis aculeis uncinatis, stipulis integerrimis, foliolis cuneiformibus dentatis pubescentibus, caule erecto. W.

M. pubescens, stipulis integris, pedunculis unifloris brevissimis, aculeis uncinatis. Desf. atl. 2. p. 212.

Aufrechter Schneckenklee. W.

Habitat in Barbaria. ⊙

Pianta pusilla quadripollucaris erecta villosa ferrea. Folia parva cuneiformia brevissime denticulata. Stipulae ovatae acutae. Flores brevissime pedicellati axillares. Legumen rotundum echinatum aculeis uncinatis. Desf. l. c.

30. MEDICAGO marina.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis subrotundis muricatis, stipulis indivisis foliolis tomentosis obovatis integerrimis. W.

M. pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. Sp. pl. 1097.

Hort. cliff. 378. Roy. lugdō. 381. Sauv. monsp.*

186. *Gron. orient.* 230. *Mill. dict. n.* 1. *Cavan.*
ic. 2. *p.* 26. *t.* 130. *Gaert. sem.* 2. *p.* 350. *t.* 155.
Allion ped. *n.* 1160. *Desf. atl.* 2. *p.* 210.
Medica marina. *Lob. ic.* 2. *p.* 38. *Clus. hist.* 2. *p.* 243.
Raj. hist. 1. *p.* 965. *Cam. hort.* 98. *t.* 28.
Medica incana. *Rivin.* 205.
Medica cochleata polycarpos capsula spinosa minore pe-
rennis incana maritima. *Moris. hist.* 2. *p.* 154. *f.* 2.
t. 15. *f.* 10.
Trifolium cochleatum maritimum tomentosum. *Bauh.*
pin. 329
Houttuyn Lin. Pl. Syst. 8. *p.* 773.
Meerstrands-Schneckenklee. W.
Habitat in arenosis maritimis Hispaniae, Galliae au-
siralis, Italiae, Graeciae, Orientis, Barbariae. 24
(v. v.)

*31. MEDICAGO *Terebellum.* W.

- M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis cy-*
lindricis utrinque planis, anfractibus quinis, aculeis
brevissimis distichis subulatis reflexis, stipulis ciliato-
dentatis, foliolis obovatis retusis dentatis. W.
Medicago aculeata. *Gaert. sem.* 2. *p.* 349. *t.* 155. *Mo-*
rif. hist. 2. *f.* 2. *t.* 15. *f.* 20. 21.
M. pedunculis multifloris, leguminibus congestis globo-
sis hispidis stipulis ciliatis. *Gouan. monsp.* 204.
M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis cilia-
tis. *Ger. prov.* 519.
Medicago leguminibus congestis globosis hispidis, stipu-
lis ciliatis. *Sauv. monsp.* 186.
Medica annua, fructu ciliari. *Tournef. inst.* 410.
Trifolium fructu cochleato ciliari. *Magn. monsp.* 269.
Bohrerförmiger Schneckenklee. W.
Habitat in Europa australi. ⊙ *(v. v.)*
Foliola obovata dentata, inferiora retusa. Legumi-
na cylindracea utrinque plana, aculeis brevissimis
craffis subulatis distichis reflexis armata. W.

*32. MEDICAGO *tribuloides.*

- M. pedunculis bifloris, leguminibus cochleatis cylindri-*
cis utrinque planis, aculeis conicis distichis reflexis, sti-
pulis dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

M. (tribuloides) stipulis dentatis, pedunculis aristatis subbitloris, leguminibus echinatis, aculeis conicis.
Lamarche encycl. 3. p. 607.*

Medica spinosa dicarpos, fructu ovali, spinulis brevibus et rigidioribus. Raj. hist. 963.

Bürzeldornartiger Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi. ⊙ (v. v.)

Legumina iis *M. tentaculatae* simillima, sed majora, aculeis longioribus non adpresso sed tantum reflexis. W.

*33. MEDICAGO uncinata. W.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis cylindraceis utrinque planis, anfractibus distantibus, aculeis distichis reflexis subulatis uncinatis, stipulis dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Hakenförmiger Schneckenklee. W.

Habitat in Europa australi? ⊙ (v. v.)

Affinis valde *M. rigidulae* et *nigrae*, sed differt potissimum, anfractibus distantibus; a *M. rigidula* adhuc, aculeis subulatis reflexis et floribus duplo minoribus; a *M. nigra*, aculeis brevioribus reflexis diversa. W.

34. MEDICAGO rigidula.

M. pedunculis submultifloris, leguminibus cochleatis cylindricis, aculeis conicis rectis patentibus, stipulis dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha rigidula. Sp. pl. 1098. Allion. ped. n. 1157. Desf. atl. 2. p. 212.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis intense aculeatis. Ger. prov. 518.

M. triphylla, leguminibus spinosis, foliolis interioribus cuneiformibus retusis, superioribus subrotundis. Dailib. paris. 231.

Medicago hirsuta, echinis rigidioribus. Bauh. hist. 2. p. 385.

Trifolium fructu compresso spinis horrido. Bauh. pin. 329.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 778.

Steifer Schneckenklee. W.

Habitat in arvis Galliae, Italiae, Barbariae. ⊙ (v. v.)

35. MEDICAGO *minima*.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis pilosis, aculeis subulatis rectis uncinatis, stipulis integrerimis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha μ *minima*. *Sp. pl.* 1099. *Smith brit.* 2. p. 798. *Hoffm. germ.* 269. *Roth. germ. I.* 320. *II.* 218.

M. leguminibus cochleatis subternatis, spinulis uncinatis, stipulis integris. *Gou. monsp.* 204. *Oed. dan.* 211. *Schreb. spicil.* 27. *Crantz. austr.* p. 434. n. 4. *Pollich. pal.* n. 715.

M. leguminibus cochleatis aculeis uncinatis alternis externe donatis, stipulis integris. *Guett. stamp.* 249. *Dalib. paris.* 230.

Medica foliis emarginatis, ferratis, racemis paucifloris, filiisque cochleatis globosis. *Hall. helv. u.* 383.

Cochleata echinata minima. *Riv. t.* 88.

Medica echinata minima. *Bauh. hist.* 2. p. 386.

Trifolium echinatum, fructu minore. *Bauh. pin.* 330.

β . *Medicago polymorpha* λ *hirsuta.* *Sp. pl.* 1099.

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis, spinulis hamatis, stipulis integris. *Ger. prov.* 518. *Hall. helv. n.* 383. β .

Medica echinata hirsuta. *Bauh. hist.* 2. p. 386.

Trifolium echinatum arvense. *Bauh. pin.* 329.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 778.

Kleinster Schneckenklee. W.

Habitat in agris lutofisis Germaniae, Hungariae, Angliae, Galliae. ⊖ (v. v.)

Fructus plures, vix semine Orobi majores: anfractibus hispidis: spinis lateraliter recurvatis. Stipulae integrae.

Tota planta albo-hirsuta, ramis longitudine digitata. *Varictas β est quadruplo major minus hirsuta.* W.

36. MEDICAGO *nigra*.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis cylindraceis, anfractibus approximatis, aculeis subulatis rectis uncinatis, stipulis ciliato-dentatis, foliolis obovatis dentatis. W.

Medicago polymorpha ν *nigra.* *Syst. plant. ed. R. 3.p.578.*

M. pedunculis paucifloris, leguminibus cochleatis, hamulis longitudine leguminum. *Ger. prov.* 518.
Medica cochleata polycarpos annua, capsula nigra hispidiore. *Morif. hist. 2. p. 154. f. 2. t. 15. f. 19.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 779.
Schwarzer Schneckenklee. W.
Habitat in Gallia australi. ⊙ (v. v.)

37. MEDICAGO *laciniata*.

M. pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis cylindraceis aculeis subulatis rectis uncinatis, stipulis ciliato dentatis, foliolis linearibus inciso-dentatis truncatis. W.
Medicago polymorpha v laciniata. *Sp. pl. 1099. Allion. ped. n. 1159. Desf. atl. 2. p. 212.*
M. leguminibus cochleatis spinosis, stipulis contortis, foliis oblongis duplicato-serratis. *Gron. orient. 95.*
M. fructu echinato, foliis linearibus dentatis. *Sauv. monsp. 187. Gouan. monsp. 400. **
Medica leguminibus cochleatis spinosis, foliolis acute dentatis tricuspidisque. *Mill. dict. n. 5.*
Trifolium fructu echinato, foliis eleganter dissectis.
Magn. monsp. 271. t. 270.
Trifolium cochleatum spinosum syriacum, foliis laciniosis. *Breyn. cent. 81. t. 34.*
Medicago syriaca. *Riv. tetr. 205.*
M. dicarpos laciniata foliis et fructu spinosis. *Pluk. alm. 245.*
Trifolium echinato capite. *Dodart. mem. 1. p. 123.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 779.
Zerschlizter Schneckenklee. W.
Habitat in Hispania, Gallia, Italia, Syria, Barbaria. ⊙ (v. v.)
Folia fere Trigonellae laciniatae, foliis quasi margine exesis a Larva. Foliola oblonga, emarginata et dentibus utrinque 2 longioribus pinnatifida. Pedunculi aristati, subbiflori, foliis breviores. Legumina spinosa.

*Classis XVIII.***P O L Y A D E L P H I A.***D E C A N D R I A.*

- 1388. THEOBROMA.** *Cal.* 5-phyllo. *Cor.* 4-petala. *Nect.* urceolatum 5-corniculatum. *Filam.* 5-biantherifera. *Styl.* 1. *Stigm.* 5-fidum. *Capf.* 5-locularis. *Sem.* in pulpa nidulantia.

D O D E C A N D R I A.

- 1389. BUBROMA.** *Cal.* 3-phyllo. *Cor.* 5-petala. *Nect.* 5-fidum. *Fil.* 5-triantherifera. *Styl.* 1-stigmate simplici. *Capf.* 5-locularis decupli serie foraminum pertusa.
- 1390. ABROMA.** *Cal.* 5-phyllo. *Cor.* 5-petala. *Nect.* 5-fidum. *Fil.* 5-triantherifera. *Styl.* 5. *Capf.* 5-alata, 5-locularis. *Sem.* arillata.

I C O S A N D R I A.

- 1391. CITRUS.** *Cal.* 5 dentatus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20 in cylindrum paßim connata. *Pist.* 1. *Bacca* locularis pulpa vesiculari.
- 1392. MELALEUCA.** *Cal.* 5-partitus, semisuperus. *Cor.* 5-petala. *Capf.* semiveftita calyce baccato.

P O L Y A N D R I A.

- 1394. LÜHEA.** *Cal.* duplex: exterior 9-phyllo; interior 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Nect.* 5-penicilliformia. *Styl.* 1.

1395. DURIO. *Cal.* 5 fidus, urceolatus, inferus. *Cor.*
5-petala, parva. *Stylus* 1. *Stam.* phalanges 5 ex
septem. *Pomum* 5-loculare.
1393. GLABRARIA. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Cor.*
5-petala. *Stylus* 1. *Stam.* phalanges 5 ex senis.
Drupa.
1396. SYMPLOCOS. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Cor.*
5-petala. *Stam.* 4-placi serie corollae adnata.
1397. HYPERICUM. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.*
5-petala. *Styli* 1, 3, f. 5. *Capf.* locularis.
1398. ASCYRUM. *Cal.* 2 phyllus, inferus. *Cor.* 4-
petala. *Styli* 2. *Capf.* 2-valvis.
-

DECANDRIA.

1388 THEOBROMA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1215.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, fornicata. *Nect.* urceolatum exserens 5 cornicula. *Filament.* 5, quolibet antheris 2 instructum. *Stylus* filiformis. *Stigma* 5-partitum. *Capsula* 5-locularis evalvis. *Sem.* in pulpa butyracea nidulantia.

I. THEOBROMA Cacao.

T. foliis integerrimis glabris. W.

T. foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 397. *Mat. med.* 176 *Jacq. obs.* I. p. 2.

Cacao (*sativa*) foliis integerrimis, fructibus ovato-oblongis acuminatis glabris decemstriatis. *Lamarch encycl.* I. p. 527.*

Cacao. *Clus. exot.* 55. *Sloan. jam.* 134. *hist.* 2. p. 15. t. 160. *Mer. surin.* 26. t. 26. et 63. *Geoffr. mat.* 409. *Catesb. car.* 3. p. 6. t. 6. *Blackw.* t. 373, *Mill. dict.*

Arbor cacauifera americana. *Pluk. alm.* 40. t. 268. f. 3.

Amygdalis similis guatimalensis. *Bauh. pin.* 442.

Houttuyn Lin. Pfl. Syfl. 2. p. 214. t. 14.

Wahrer Cacao. W.

Habitat in America meridionali, Antillis. (v. f.)

Galyx pentaphyllus, lanceolatus. Petala 5, *fornicata*, obovata, petiolata: *lacinia terminali patula*. *Stamina fertilia solitaria*, sub singulo petalo interno; *anthera quadruplici*. *Stamina alia* 5, *alterna*, *germini adpressa, castrata*. *Germen superum. Stylus simplex*. *Linn. diff. alt. de pl. surin.* 1776.

*2. THEOPROMA gujanensis.

T. foliis acuminatis repando-dentatis subtus tomentosis. W.

Cacao (*guyanensis*) foliis denticulatis, fructu ovato-quadrangulari tomentoso rufescente. *Lamarch encycl.* I. p. 529.* *Aubl. guy.* 2. p. 683. t. 275.*

Gnjanischer Cacao. W.

Habitat in sylvis paludosis Gujanæ. t̄

Cacao sylvestris Aubl. jug. 2. p. 687. t. 276. est Du-
roia Eriopila Lin. in Sp. pl. 2. p. 222. descripta. W.

DODECANDRIA.

*1389. BUBROMA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1216.

Cal. 3 phyllus. *Cor.* 5-petala, petalis bicornibus. *Nectar.* campanulatum 5-fidum. *Filam.* 5 nectario externe adnata, quodlibet antheris 3 instructum. *Stylus* simplex. *Caps.* lignosa tuberculata evalvis decuplici serie foraminulorum pertusa.

I. BUBROMA Guazuma.

Theobrama (*Guazuma*) foliis ferratis. *Hort. cliff.* 379.

Roy. lugdb. 47. *Mill. dict.* *Swartz obs.* 292.*

Guazuma (polybotra) caule fruticoso, foliis cordatis ova-to-acutis, ferraturis inaequalibus, florum racemis axillaribus pluribus. *Cavan. ic.* 3. *p. 51.* 299.*

Guazuma arbor ulmifolia, fructu ex purpureo nigro.

Plum. gen. 36. *ic.* 144.

Cenchrameda jamaicensis ulmifolia, fructu ovali integro verrucoso. *Pluk. alm.* 92. *t. 77. f. 2.*

Alni fructu morifolia arbor, flore pentapetalō flavo.

Sloan. jam. 135. *hist.* 2. *p. 18.* *Raj. dendr.* II.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. *p. 223.*

Schiefblättriger Ochsenfras. W.

Habitat in Jamaicae campestribus. t̄ (v. v.)

Rami tomento adspersi. Gemmae nullæ Foliatio sub-involuta margine ferraturis plicato-imbricatis. Folia alterna, petiolata, cordata, obtuse inaequaliter serrata, acuminata, subtrinervia, scabra, venosa, nitida, dependentia, facie Urticæ. Stipulae oppositæ, subulato-lanceolatae, ramis approximatae, extus poro mellifero. Petioli teretes, foliis sextuplo breviores, versus folium crassiores. Flores corymbosi, Ajeniac

similes. Petala lutea aristis geminis purpurascensibus. Antherae 3 (non 5), geminatae in singulo filamento, inter crenas nectarii campanulati. Stylus apice 5 fidus, acutus.

Dormit foliis omnino pendentibus in petiolis striatis.

An una vel plures species? Specimen meum jamaicensis cum icona a Clariſſ Cavanilles data convenit. Specimina ex India orientali, differunt inflorescentia ramosiore et foliis duplo majoribus. Ex seminibus Indiae orientalis excrevit mihi frutex jam florens, foliis et inflorescentia speciminis americanae plantae. Plumeri figura ob inflorescentiam valde elongatam, diversam speciem indicare videtur, nisi sit varietas loco pinguiore orta. W.

*1390. A B R O M A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1217.

Cal. 5 phyllus. Cor. 5 petala. Nectar. urceolatum 5 - fidum. Filam. 5 inter lacinias nectarii inferta, quodlibet antheris 3 instructum. Styli 5 subulati. Caps. membranacea 5 - alata, 5 - locularis. Semina alata.

I. ABROMA *augusta*.

A. foliis septangulatis, floralibus ovato-lanceolatis acuminate subdentatis, pedunculis axillaribus. W.

Abroma augusta. Lin. suppl. 341.

*Abroma fastuosum. Jacq. hort. 3 p. 3. t. I.**

Theobroma (augusta) foliis cordatis septemangularibus.

Syst. Nat. 3. p. 233. Mill. dict. illustr. Syst.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 224.

Prächtige Abroma. W.

Habitat in India orientali. ḥ (v. v.)

Caulis humanae altitudinis, lignosus, erectus; simplicissimus, teres, apice foliosus. Ramii nulli, sed rudimenta prodeunt in caule infra folia, dum floret. Folia (Hibisci mutabilis) magna, plus quam palmaria,

cordata, *7-nervosa*, *7-angulata*, *serrata*, *reticulata*, *supra glabra*, *subtus vix pubescentia*. Petoli teretes, longitudine foliorum. Stipulae lanceolatae. Pedunculi axillares foliorum, horizontales, ad latus flexi, teretes, longitudine petioli, bifidi; ramulo altero minore (opposito folio cordato petiolato ferrato) bifido, bifloro; involucello 4-phyllo, lanceolato; altero enascente ulterius similiter bifido, et sic ultra. Pedicelli nutantes Floribus cernuis. Perianthium 5-partitum, lanceolatum, acutum, patentissimum; foliolis planis COR. Nectarium exteribus urceolatum; squamis 5, ovatis, fornicate, introrsum concavis, obtusis, erectis, apice ciliatis, margine fuscis. Nectarium interius urceolatum: squamis 5, linearibus, erectis, obtusis, basi connatis, margine apiceque extrorsum recurvato-fornicatis. Petala 5, ovata, magna, triste purpurea, laxa, pendula, fluctuantia, ungue inserta nectarii exterioris squamae sub et intra ejus apicem. Filamenta 5, brevissima, ut fere nulla, triloba, inter squamas nectarii interioris, ut antherae extra rimas hujus nectarii nascentur. Antherae 3, didymae, divaricatae, reniformes, luteae. Germen superum, cylindricum. Styli 5, subulati, approximati. Stigmata acuta. Peric. 5-lokulare. Semina multa.

*2. ABROMA Wheleri.

A. foliis ovato-lanceolatis acuminatis subdentatis, pedunculis oppositifoliis. W.

A. foliis ovato-lanceolatis acuminatis subdentatis. Retz obf. 5. p. 27.

Whetersche Abroma. W.

Habitat in India orientali. 5

Frutex cortice fusco. Rami ultimi tomentosi. Folia alterna ovato-lanceolata hinc inde dentata, alia integra, nervis tomentosis. Pedunculi oppositi folii multiflori involucrati, articulo unico instructi, fructiferi recurvati lignosi. Involucrum polyphyllum, foliolis lanceolatis deciduis. Flores triste purpurei. Nectarium utrumque ciliato-barbatum; interius obcordatis squamis. Antherae ternatae sessiles in sinibus inter laciniias s. squamas nectarii interioris. Capsula magna quinquevalvis, valvulis membranaceis. Receptacu-

lum quinquepartitum barbatum, valvularum futuris adnatum. Semina ovata atra, punctis elevatis scabra. Retz l. c.

I C O S A N D R I A.

1391. CITRUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1218.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5, oblonga. *Antherae* 20, filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9-locularis.

1. CITRUS medica.

C. petiolis linearibus, foliis ovatis acuminatis. W.

C. petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *Hort. upf.* 236. *Mat. med.* 176. *Roy. lugdb.* 266. *Regn. bot.*

Malus Medica. *Bauh. pin.* 435. *Blackw. t.* 361.

β Citrus Limon.

Limon vulgaris. *Ferr. hefp.* 193. *Blackw. t.* 362. *Knorr. del. t. C. I.*

Malus Limonia acida. *Bauh. pin.* 436.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 227.

Gemeine Citrone W.

Habitat in Asia, Media, Assyria, Persia. ḥ (v. v.)

Varietates hujus hodie numerosissimae una cum sequenti mixtae, de quibus Hesperides confundendae.

Venit in Italiam post Virgilii et Plinii tempora, ante Paladii.

*2 CITRUS angulata. W. †

C. petiolis nudis, foliis ovatis acutis, fructibus angulosis. W.

Limonellus angulosus. *Rumph. amb.* 2. p. 110. t. 32.

Eckige Citrone. W.

Habitat in Amboina. ḥ

Species sine dubio diversissima. Fructus parvi glutinosi quadri- vel quinquangularares. Pedunculi solitarii axillares. Spinae binæ stipulares. W.

*3. CITRUS *japonica*.

C. petiolis alatis, foliis acutis, caule fruticoso. Thunb.
jap. 292. *Jcon. pl. jap.* t. 15.

Kin Kan. Kaempf. *amoen.* 801.

Japanische Citrone. W.

Habitat in Japonia. 5

Cauis fruticosus, compresso-angulatus erectus glaber vix pedalis. Rami et Ramuli alterni compresso-angulati spinosi glabri erecti virides. Spinae solitariae axillares in axillis foliorum erecto-patentes. Folia sparsa alato-petiolata ovata acutiuscula integerrima concaviuscula glabra, supra saturate viridia. subtus pallidiora, erecto-patentia pollicaria, voris tenuissimis. Petoli alati lineam longi. Flores axillares saepius solitarii, rarius binii pedunculati nutantes. Pedunculus glaber cernuus lineam longus. Perianthium monophyllosum viride glabrum minimum quinquedentatum. Petala 5 nivea oblonga concaviuscula patentia semiunguicularia. Filamenta 19 subulata compressa erecta in 5 corpora subcohaerentia connata, cylindrum formantia, corolla breviora subaequalia nivea. Antherae oblongae minutae flavae. Germen superum subrotundum glabrum. Stylus unicus cylindricus staminibus paulo brevior albo-virescens. Stigma simplex globosum flavum striatum intus multiloculare. *Bacca* cortice crasso, pulpa vesiculosa 9-locularis magnitudine Cerasi. *Fruitus* maturi mensibus Decembri et Januarii valde dulces grati et edules. Thunb. l. c.

4. CITRUS *Aurantium*.

C. petiolis alatis, foliis acuminatis, caule arboreo. Thunb.
jap. 293.*

C. petiolis alatis, foliis acuminatis. Hort. cliff. 379.
Hort. upf. 236. *Fl. zeyl.* 304. *Mat. med.* 177. *Roy. lugdb.* 266.

Aurantium. *Mill. dict.* *Blackw.* t. 349. *Kniph cent.* 9. n. 23. *Knorr del.* I. t. P. 4.

Malus Aurantia major. *Bauh. pin.* 436.

Aurantia mala. *Cam. epit.* 150.

B. Citrus Sinensis.

Malu aurantia cortice eduli. *Bauh. pin.* 436.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 229.

Pomeranzen - Citrone. W.
Habitat in India. † (v. v.)

5. CITRUS decumana.

C. petiolis alatis, foliis obtusis emarginatis. *Syst. Veg.*
 580. *Thunb. jap.* 293.*
Limo decumanus. *Rumph. amb.* 2. p. 96. t. 24. f. 2.
Citrus Aurantium var. γ *decumanus.* *Spec.* 2. p. 1100.
Malus aurantia fructu rotundo maximo pallidente caput
 humanum excedente. *Sloan. jam.* 212. *hist.* 1. p. 41.
 t. 12. f. 2. 3.
Pumpelmus. *Meist. itin.* 84.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 231.
Pumpelmus - Citrone. W.
Habitat in India. † (v. v.)
Differt ab Aurantio foliis fructibusque magnis, flo-
ribus magis racemosis, racemis subtomentosis.

6. CITRUS trifoliata.

C. foliis ternatis. *Sp. pl.* 1101. *Thunb. jap.* 294.*
Ssi f. Karatas. *Kaempf amoen.* 801. t. 802.
Dreyblättrige Citrone. W.
Habitat in Japonia. †
Folia ternata, serrata, petiolo membranaceo. Spinae
axillares. Flores axillares, solitarii. Fructus tetri
pulpa glutinosa.

1392. M E L A L E U C A.

Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 3. p. 273.

Cal 5-partitus, semifuperus. *Cor.* 5-petala. *Fi-*
lamenta multa, connata in 5 corpora. *Sty-*
lus 1. *Capf.* semivestita, 4.locularis.

† *Foliis alternis.*

1. MELALEUCA Leucadendron.

M. foliis alternis lanceolatis acuminatis falcato-obliquis
 quinquenerviis, ramulis petiolisque glabris. *Smith.*
Act. Soc. Lin. Lond. 3. p. 274.

Melaleuca Leucadendron. *Mant.* 105.

M. (*Leucadendron*) *polyadelphia*, foliis alternis lanceolatis subfalcatis quinque nerviis, spica elongata. *Lin.* *suppl.* 342

Myrus Leucadendra. *Spec. pl.* 2. *p.* 676. *Mat. med.* *p.* 177.

Arbor alba Caju Puti. *Rumph. amb.* 2. *p.* 72. *t.* 16.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2 *p.* 238. *t.* 15.

Weißblättriger Cajaputbaum. W.

Habitat in India orientali. ♂ (v. f.)

Arbor trunco nigro. Ramis albis. Folia alterna, lanceolata, versus alterum latus falcata, petiolata, integerrima, subavenia. Fructificationes sessiles, adglutinatae, sparcae, infra folia. Fructus ante maturitatem, capsula etiamnum calyce breviore, urceolata.

Ex hac destillatur verum Oleum Cajeput, quod colore viridi sapore Menthae piperitae fortiore frigidiore, odore therebinthiaceo cognoscitur et rarissime in Europa verum, sed plerumque varie adulteratum.

* 2. MELALEUCA *viridiflora*.

M. foliis alternis elliptico-lanceolatis coriaceis quinque nerviis, ramulis petiolisque pubescentibus. *Smith.* *Act. Soc. Lin. Lond.* 3. *p.* 275. *Gaert. Sem.* 1. *p.* 173. *t.* 33.

M. (*Leucadendron* β *angustifolia*) foliis angustioribus oblongis vix falcatis brevioribus obtusis glaucis. *Lin.* *suppl.* 342.

Metrosideros (quinquenervia) foliis lanceolatis alternis quinque nerviis, floribus polyadelphis in racemum conglomeratis. *Cavan. ic.* 4. *p.* 19. *t.* 333.

Grünblättriger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia et Nova Caledonia. ♂ (v. f.)

Species a praecedente distincta, qua cum confundit Linnaeus filius. Folia crassiora et rigidiora stricta nec falcata, non acuminata, pallidiora plerumque quinque-interdum septemnervia. Petoli et rami juniores pubescentes, quod non in praecedente. Smith. l. c.

* 3. MELALEUCA *laurina*.

M. foliis alternis obovato lanceolatis uninerviis, pedunculis axillaribus dichotomis pubescentibus. *Smith.* *Act. Soc. Lin. Lond.* 3. *p.* 275.

Lorbeerartiger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. ᄁ

Affinis M. suaveolenti Gaert. sem. I. t. 35, cui quoad inflorescentiam et fructificationem simillima, sed folia huic latiora et elliptica. M. suaveolens crescit in borealioribus regionibus Novae Hollandiae prope fluviū Endeavour. Habitu M. laurina valde similis est Daphni Laureolae. Smith. l. c.

*4. MELALEUCA *squarrofa.*

M. foliis sparsis oppositis ovatis muticis quinquenerviis, floribus lateralibus, dentibus calycinis laevibus.
Smith. *Act. Soc. Lin. Lond.* 6. p. 300.

Sprriger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. ᄁ

*5. MELALEUCA *stypheloides.*

M. foliis alternis ovatis mucronato-pungentibus multinerviis, floribus lateralibus, dentibus calycinis striatis mucronatis. Smith. *Act. Soc. Lin. Lond.* 3. p. 275.

Stechender Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. ᄁ (v. f.)

Rami juniores villoso seniores glabri. Folia parva unguicularia subrotunda ovata acuta pungentia septemnervia pellucido punctata glabra. Flores in ramis junioribus infra apicem caulem circumdant. — Filamenta basi tantum in 5 phalanges cohaerentia. W.

*6. MELALEUCA *ericifolia.*

M. foliis sparsis oppositis linearibus enerviis subrecurvatis, floribus lateralibus apicem versus ramulorum confertis. Smith. *Act. Soc. Lin. Lond.* 3. p. 276.

Haedoblättriger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. ᄁ (v. v.)

Folia secca saporem habent feminum Coriandri sativi. Flores albi ramulos circumdant ut in sequenti, sed ab apice magis remoti. Folia a M. nodosa diversissima, sunt multo angustiora neque pungentia neque rigida, sed parum recurvata. Rami juniores albo-sericei. Smith. l. c.

Folia linearis subulata semipollicaria. Flores in ramulis distantes nec arcte acervati ut in sequentibus. Filamenta basi tantum cohaerentia in phalanges. W.

* 7. MELALEUCA nodosa.

M. foliis sparsis linearibus mucronato-pungentibus rectis, floribus apicem versus ramulorum glomeratis.
Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 3. p. 276.

Metrosideros nodosa. *Gaert. Sem. I. p. 172. t. 34. f. 6.*
Metrosideros (nodosa) foliis linearibus confertis, floribus aggregati confertis in medio ramulorum nodosis.
*Cavan. ic. 4. p. 19. t. 334.**

Knotiger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. h (v. f. c. fr.)

Folia numerosa vix polycaria valde angusta, tamen latiora quam in M. ericifolia, rigida mucronata. Flores parvi albi in apice ramulorum glomerati et capitulum formantes. Post florescentiam ex apice capituli excrescit ramulus in quo capsulae persistentes annuli infiar remanent. W.

* 8. MELALEUCA armillaris.

M. foliis sparsis linearibus mucronatis apice recurvis, floribus lateralibus, filamentis longissimis linearibus apice radiato-multifidis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 3. p. 277.*

Metrosideros armillaris. *Gaert. Sem. I. p. 171. t. 34. f. 5.*

Metrosideros (armillaris) foliis linearibus angustissimis confertis, floribus dense spicatis in medio ramulorum.
Cavan. ic. 4 p. 19. t. 335.

Ringförmiger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. h (v. f.)

Habitu Diosmati quoad folia similis. Puncta resinosa in inferiore parte foliorum ad costam medium in culta planta magis visibilia, quam in spontanea. Flores sub apice ramulorum in formam spicae longae glomerati. Phalanges staminum triplo petalis longiores apice in filamenta divisae. *Smith. I. c.*

* 9. MALELUCA genistifolia.

M. foliis sparsis lanceolatis mucronatis trinerviis multi-

punctatis, ramulis floriferis terminalibus laxis, filamentis apice radiato multifidis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 3 p. 277.

Ginsterblättriger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. W.

Similis quodammodo M. nodosae, sed folia magis lanceolata quam linearia et ultra demidium breviora nec rigida mucronata. Spica laxa terminalis ex qua ut in reliquis surgit ramus. Flores geminati alterni sessiles albi Phalanges staminum corolla duplo longiores. Smith. l. c.

† † *Foliis oppositis.*

* IO. MELALEUCA *linariifolia.*

M. foliis oppositis linear-lanceolatis trinerviis subtus multipunctatis, ramulis floriferis terminalibus laxis, filamentis pinnatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 3 p. 278.

Metrosideros (hysopifolia) foliis linearibus oppositis punctatis, calycum laciiniis deciduis. *Cavan. ic. 4. p. 20. t. 336. f. 1.**

Linienblättriger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. ḥ (v. f. f. fl.)

Arbor magna cordice crasso spongioso. Rami conici foliis glaucescentibus tecti, quae triplo longiora quam in praecedente. In apice ramae oritur series florum solitariorum sessiliem oppositorum (in praecedente flores geminati alterni). Filamenta longissima ab apice ad basin pinnata antherifera. Smith. l. c.

* II. MELALEUCA *thymifolia.*

M. foliis oppositi elliptico-lanceolatis enerviis, ramulis floriferis lateralibus brevissimis paucifloris, filamentis medium usque ramosis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 3. p. 278.

Metrosideros (calycina) foliis oppositis enerviis punctatis lanceolatis, calycibus persistentibus. *Cavan. ic. 4. p. 20. t. 336. f. 2.*

Thymianblättriger Cajaputbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. ḥ (v. f.)

Flores purpurei in ramis praeteriti anni parvi oppo-

siti spicati. Ex spica oritur ramus ut in reliquis, in florescentia huic generis peculiaris. Melaleuca laurina et suaveolens (M. suaveolens est species nondum descripta IV.) gaudent pedunculis tantum axillaribus, sed nullam Melaleucam vidi floribus terminalibus.
Smith. I. c.

* 12. MELALEUCA *hypericifolia*.

M. foliis oppositis elliptico oblongis-uninerviis, floribus confertis, filamentis, longissimis linearibus, apice radiato-multifidis. Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 3. p. 279.

Johannisbaumblättriger Cajaputbaum. W.

Habitat in humidis Novae Hollandiae. H.

Pulcherrima hujus generis species. Flores similes iis Metrofideri lanceolatae, sed filamenta linearia obscure flava ut petala, multifido-radiata. Smith. I. c.

P O L Y A N D R I A.

1393. GLABRARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1219.

Cal. 5-fidus. Petala 5. Nectarium receptaculi setis longitudine calycis. Stam. 30: senis semper connexis. Drupa.

I. GLABRARIA *terfa*.

Glabraria terfa. Mant. 276.

Lignum laeve minus. Rumph. amb. 3. p. 71. t. 44.

Houttuyn Lin. Pfl. Syft. 2. p. 233.

Glattes Glattholz. W.

Habitat in India orientali. H.

Arbor similis quodammodo Lauro Camphorae. Folia alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integerima, glabra, acuminata, subtus subtomentosa, laevia tamen et glauca. Florum glomeruli axillares, subracemosi, aphylli, foliis multo breviores. Calyces colore Elaeagni.

*1494. LÜHEA.

Willd. N. Act. Soc. N. S. Berol. 3. p. 409.

Cal. duplex, exterior 9-phylloides, interior 5-partitus. **Cor.** 5 petala. **Nect.** 5 penicilliformia. **Styl.** 1.

*1. LÜHEA *speciosa*. W.

L. *speciosa*. *Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. p. 410. t. 5 **

Ansehnliche Lühea. W.

Habitat ad Caracas in altissimis montibus. ḥ (v. f.)

Arbor racemosa 20 ad 30 pedalis, ramis alternis fascis. Folia alterna petiolata oblonga obtusa, basi leviter cordata, margine inaequaliter dentata, trinervia venosa, inferne albo-tomentosa, nervis venisque prominentibus. Perioli breves crassi semiteretes pubescentes. Racemi terminales pauciflori, pedicellis incrassatis unifloris tomentosis brevibus. Calyces externe tomentosi. Petala alba. Fructus ignotus. W.

1395. DURIO.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1221.

Cal. 5-fidus, urceolatus, inferus. **Cor.** 5-petala, parva. **Stylus** 1. **Stam.** phalanges 5 ex septem. **Pomum** 5-loculare.

1. DURIO *zibethinus*. †

Durio zibethinus. Syst. veg. 698.

Durio. Rumph. amb. 1. p. 99. t. 29.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 235.

Sachel-rüchtige Durio. W.

Habitat in India orientali. ḥ (v. f.)

Arbor excelsa Floribus infra folia, quae alterna.

1396. SYMPLOCOS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1223.

Cal. 5-fidus, superus. *Cor.* 5-8-petala, petalis basi in tubum cohaerentibus. *Stamina* 4-plici serie tubo corollae accreta. *Drupa* ficca, 5-locularis.

1. SYMPLOCOS *martinicensis*.

S. pedunculis subracemosis, foliis glaberrimis crenulatis. *l'Herit. Act. Soc. Lin. Lond.* I. p. 175.

Symplocos martinicensis. *Sp. pl.* 747. *Jacq. amer.* 166. *Swartz obs.* 293. t. 7. f. I.*

Confer *Loef. it.* 309.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 246.

Martiniquischer Symplocos. W.

Habitat in Antillis. \ddagger (v. f.)

Folia ovata, petiolata, ferrata, nitida. Flores albi.

*2. SYMPLOCOS *Ciponima*.

S. pedunculis multifloris, foliis integris subtus villosis. *l'Herit. Act. Soc. Lin. Lond.* I. p. 175.

Ciponima gujanensis. *Aubl. guj.* I p. 567. t. 226.* *Cavan. diff.* 7. p. 371. t. 217.*

Haariger Symplocos. W.

Habitat in nemorosis Gujanæ. \ddagger (v. f.)

Turiones admodum villosi. Folia subtus plus minusve villosa, saepissime integra, raro laxissime denticulata. Nuces quinqueloculares. *l'Herit. l. c.*

*3. SYMPLOCOS *Arechea*.

S. pedunculis subquinquefloris, foliis serratis nudiusculis. *l'Herit. Act. Soc. Lin. Lond.* I. p. 176.

Peruvianischer Symplocos. W.

Habitat in Peru in sylvis. \ddagger

S. Arechea intermedia est S. martinicensis et Ciponimæ. Tres forte sunt varietates ejusdem plantæ. Attendant *Autoptae.* *l'Herit. l. c.*

*4. SYMPLOCOS *octopetala*.

S. pedunculis subbifloris, corollis octopetalis, foliis glaberrimis apice repando-dentatis. W.

S. (*octopetala*) floribus octopetalis. Swartz. prod. 109.
Achtheiliger Symplocos. W.

Habitat in Jamaica. Ȑ (v. f.)

5. SYMPLOCOS *tinctoria*.

S. floribus confertis sessilibus, foliis glaucinis. l'Herit.
Act. Soc. Lin. Lond. I. p. 176.

Hopea tinctoria. Mant. 105.

Arbor lauri folio floribus ex foliorum alis. Catesb. cor.
I. p. 54. t. 54. mala.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 245.

Färbender Symplocos. W.

Habitat in Carolina florens odore gratissimo primo vere. Ȑ

Arbor. Folia alterna petiolata simplicia oblonga lanceolato-ovata subserrata nitida enervia dulcia. Pedunculi e Gemmis ad summos ramulos erumpunt 8 f. 10: Pedicellis brevissimis unifloris, vestiti; Foliolis parvis concavis villosis. Fructus demum infra folia subsessiles in spicam brevissimam digesti.

Succus et Folia in decocto tingunt linteas et sericas lacte lutae.

6. SYMPLOCOS *Alstonia*.

S. floribus subdecapetalis sessilibus subternis. l'Herit.
Act. Soc. Lin. Lond. I. p. 176.

Alstonia theaeformis. Lin. suppl. 264.

Theeblättriger Symplocos. W.

Habitat in America meridionali. Mutis. Ȑ

Frutex glaberrimus. Theae Boheae similis habitu, foliis, calycibusque imbricatis, situ florum etc. Folia alterna brevissime petiolata approximata elliptica obtusiuscula, basi integra, a medio ad apicem obtusa serrata rigida venosa. Stipulae nullae. Flores axillares tres f. quatuor sessiles. Calyx glaberrimus: squamis rotundatis viridibus, margine membranaceis. Corollae albae patentibus. Lin. suppl. I. c.

*Folia siccata et masticata salivam tingunt viride-
scensem et saporem Theae omnino reddunt. An usui
Theae infervire possent?* Lin. suppl. l. c.

*Calyx Alstoniae imbricatus refert bracteas Symplo-
cos, quas pro calyce exteriori habere licet. Corollam
monopetalam in Alstonia dicebat Linnaeus, quia rever-
ra talis apparet in Symploco.* l'Herit. l. c.

1397. H Y P E R I C U M.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1224.

*Cal. 5 - partitus. Petala 5. Filamenta multa, in 5
phalanges basi connata. Capsula.*

† *Pentagyna.*

1. HYPERICUM balearicum.

*H. floribus pentagynis solitariis terminatis, foliis ob-
longis obtusis undulatis ramisque verrucosis.* W.

*H. floribus pentagynis, caule fruticoso, foliis ramisque
cicatrisatis.* Sp. pl. 1101. Mill. dict n. 5. et ic. t. 54.
Kniph. cent. 2. n. 35.

*H. frutescens verrucoso-glandulosum, foliis ovatis, mar-
gine flexuoso-tundulatis.* Lamarck encycl. 4 p. 137.*

H. floribus pentagynis, folio et ramis verrucolis. Hort.
cliff. 380. Roy. lugdb. 473.

Hypericum f. Ascyrum frutescens, magno flore. Magn.
char. 260.

Myrto-Cistus pennaei. Clus. hist. 1. p. 68.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 304.

Balearisches Hartheu. W.

Habitat in Majorca. h (v. v.)

*Caules tetragonii, punctis racemofo-glandulosis ad-
spersi. Folia flexuosa, margine glandulis verrucosis.
Flores solitarii, terminales.*

*2. HYPERICUM Brathys.

*H. floribus pentagynis monadelphis, caule fruticoso, fo-
liis subulatis imbricatis glabris.* Smith. ic. ined. 41.
t. 41.*

Brathys juniperina. Lin. suppl. 268.

Wachholderblättriges Harthen. W.

Habitat in Nova Granada. ḥ *Mutis.*

Frutex facie media inter Ericam et Juniperum, valde ramosus erectus, ramis foliis tectis. Folia opposita confertissima linearia acerosa pollicaria acuta inermia perennia. Flores terminales ramorum, nonnulli simul, sessiles.

*3. HYPERICUM *angustifolium.*

H. floribus pentagynis terminalibus solitariis, stylis coadunatis, foliis linearis-lanceolatis impunctatis basi reflexis, caule fruticoso. W.

H. frutescens, foliis linearis-lanceolatis basi reflexis, floribus solitariis terminalibus, stylis coadunatis. *Lamarche encycl. 4. p. 139.* *

Schmalblättriges Harthen. W.

Habitat in insula Borbonia. ḥ

*4. HYPERICUM *lanceolatum.*

H. floribus pentagynis terminalibus solitariis, stylis coadunatis, foliis lanceolatis margine punctatis caule fruticoso. W.

Hypericum frutescens, foliis lanceolatis ad oras punctatis, floribus solitariis terminalibus, stylis coadunatis. *Lamarche encycl. 4. p. 138.* *

Lanzenförmiges Hartheu. W.

Habitat in insula Borbonia. ḥ (v. f.)

Folia lanceolata, pollicaria glabra sessilia pellucido-punctata et ad margines serie punctorum fuscorum obsoleta. Flos solitarius terminalis in apice ramorum, ferre magnitudine H. Ascyrus. W.

5. HYPERICUM *kalmianum.*

H. floribus pentagynis corymbosis terminalibus, foliis linearis-lanceolatis, caule fruticoso. W.

H. floribus pentagynis, caule fruticoso, foliis linearis-lanceolatis. Sp. pl. 1101.

Hypericum (Bartramicum) floribus pentagynis, calycibus obtusis, staminibus corollam aequantibus, caule erecto herbaceo. Mill. dict. n. 10.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 305.

Kalmisches Harthen. W.

Habitat in Virginia. Kalm. 5

Frutex. Rami tetragoni. Folia Rosmarini aut Lavendulae, glabra. Flores in Corynbo dichotomo, terminali, ex tribus aut septem floribus. Capsula ovata, longitudine calycis. Calyx lanceolatus, obtusifuscus. Styli 5, tenuissimi.

6. HYPERICUM cajennense.

H. floribus pentagynis corymbosis terminalibus, corollis hirsutis, foliis oblongo-ovatis acuminatis glabris subtus punctato-scabris, caule fruticoso. W.

H. floribus pentagynis, corollis hirsutis, foliis ovatis, caule arboreo. Mant. 277. Jacq. amer. 213.

H. floribus pentagynis, corollis harbatis, calycibus striatis, foliis ovatis, caule fruticoso. Lin. suppl. 343.

*H. fruticosum foliis ovato-acuminatis petiolatis glaberrimis, gemma floris rotunda, corollis intus lanatis. Lamarck encycl. 4. p. 144.**

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 306.

Cajennisches Hartheu. W.

Habitat in Georgia et Cajenna. 5 (v. f.)

Arbor 18 pedalis. Folia ovata, petiolata, integerim scabra. Racemi compositi. Petala alba, interne hirsuta, ut in Gordonia Lasiandro. Nectarii glandulae 5, ovatae, longitudine germinis, alternantes cum staminum phalangibus. Filamenta quinque, apice in penicillum divisa. Antherae globoeae. Bacca jucco fulvo tinctorio. Semina numerosa.

Arbor ramis paniculatis. Folia opposita petiolata cordato-ovata oblonga supra laevia, subtus venosa s. scabra. Flore magnitudine H. perforati albi. Perianthium 5-phylum, foliis ovatis striatis erectis persistentibus. Petala 5 erecta lanceolata sessilia, limbo patula apice intus barbata multifida. Filamenta quinque linearia erecta longitudine pistilli apice capillaceo-multifida. Antherae singulis ramulis minutae subrotundae. Germen ovatum. Styli 5 erecti distantes longitudine staminum. Stigmata capitata. Bacca? globosa quinquelocularis succo fulvo tinctorio. Semina multa oblonga. Lin. suppl. l. c.

7. HYPERICUM *laurifolium*, W.

H. floribus pentagynis paniculatis terminalibus, petalis longitudine calycis, foliis ovatis glabris, caule fruticoso. W.

H. (petiolatum) floribus pentagynis, caule arboreo, foliis ovatis. Lin. suppl. 345.

Lorbeerartiges Hartheu. W.

Habitat in Nova Granada. D. Mutis. h.

Arbor facie Lauri. Folia opposita petiolata ovata integerrima glabra laurina, venis transversis. Panícula terminalis brachiata longitudine folii. Perianthium 5-partitum, valvulis ovato-lanceolatis concavis persistentibus. Petala 5 obovata huic rectiora longitudine calycis. Nectaria squamulae 5 cum staminibus alternatis minutae. Filamenta 5 pedicellata divisa in innumera capillaria. Antherae subrotundae minutae. Germen ovatum longitudine calycis. Styli 5 filiformes Stigmata obtusa. Bacca ovata 5-tortuosa 5-loicularis. Semina numerosa oblongiuscula. Arbor scatet succo croceo-viscojo.

8. HYPERICUM *bacciferum*.

H. floribus pentagynis paniculatis terminalibus, petalis hirsutis, foliis ovatis acuminatis subtus incanis, caule fruticoso. W.

H. floribus pentagynis, foliis integerrimis subtus incanis, caule arboreo, fructibus baccatis. Mant. 277.

H. floribus pentagynis, corollis barbatis, calycibus laevibus, foliis ovatis caule fruticoso. Lin. suppl. 344.

H. (gujanense) foliis ovato-oblongis acuminatis, petalis florum extus luteis, intus villosis candicantibus, fructu quinqueloculari. Aubl. guj. 2. p. 784. t. 311. *

Coa-opea. Marcgr. bras. 96. Pif. bras. 126.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 307.

Beerentragendes Hartheu. W.

Habitat in Guiana et Mexico. h (v. f.)

Frutex triorgyalis erectus, brachiatus: Ramis quadrangularibus. Folia opposita, ovata, acuminata, integerrima, subvenosa, nitida, subtus incano, spinthamaea: Petiolis brevibus, teretibus, supra canaliculatis. Flores terminales, paniculati, lutei; pedicellis

brevibus. Perianthium foliolis 5, ovatis, acutis, margine scariososis, patentibus; persistentibus. Petala 5, obovata, patentia. Filamenta numerosa, capillaria, digesta in 5 phalanges, quorum basis est Columna plana erecta, penicilliformis. Antherae subrotundae. Germen ovatum, pentagonum. Styli 5, filiformes, erecti, persistentes. Stigmata simplicia. Bacci ovata, acuminata, subpentagona, quinquelocularis. Semina numerosa, oblonga, serie dupli. Planta tota scatet succo croceo viscido tenaci.

D. Mutis querit, an sufficienter distinctum pro novo genere. Nectaria distincta, alternantia cum staminibus, habent etiam H. aegyptium, virginicum, et non nullae aliae species, non separandae.

Haec species affinis videtur H. petiolato, sed illis stamina multa enata ex ipsis squamis nectarii. Fructus baccatus non facile distinguitur ab hoc genere, cum capsulae variis speciebus coloratae, uti Androshaemi T.

* 9. HYPERICUM latifolium,

H. floribus pentagynis paniculatis terminalibus, foliis petiolatis cordatis oblongis acuminatis subtus tomentosis, caule fruticoso. W.

H. arborescens, foliis ovato-acuminatis subcordatis petiolatis, inferne tomentoso-rufescens. Lamarck encycl. 4. p. 142.

H. foliis cordatis acuminatis subtus rufescens. Aubl. guj. 2. p. 787. t. 312. f. 1.

Breitblättriges Hartheu. W.

Habitat in Guiana. h (v. f.).

Folia magna semipedalia interdum fere pedalia cordata oblonga acuminata subtus tomento tenui rufescente tecta. Panicula terminalis multiflora. W.

* 10. HYPERICUM sessilifolium.

H. floribus pentagynis paniculatis terminalibus, foliis sessilibus cordatis ovatis acuminatis, subtus tomentosis, caule fruticoso. W.

H. arborescens, foliis ovato-oblongis acuminatis basi emarginatis, subtus rufescens, gemma floris globosa. Lamarck encycl. 4. p. 143. *

H. foliis cordatis acuminatis subtus rufescens, fructuosa. Sp. Plant. Tom. III. P. II. Pp

etu magno quinqueloculari. *Aubl. guj.* 2. p. 787. t.
312. f. 2.*

Stielofes Hartheu. W.

Habitat in Guiana. ḥ

Simillimum praecedenti, sed folia sessilia vel subsessilia breviora, floresque majores. W.

II. HYPERICUM monogynum.

H. floribus pentagynis terminalibus subcorymbosis, stylis coadunatis, staminibus corolla longioribus, foliis oblongo-lanceolatis obtusis sessilibus glabris, caule fruticoso. W.

H. floribus monogynis staminibus corolla longioribus, calycibus coloratis caule fruticoso. *Sp. pl.* 1107. *Mill. dict. n.* 11. *ic. t.* 151. *f. 2.* *Thunb. jap.* 297.

Houttuyn Lin. Psl. Syst. 4. p. 316.

Indisches Harthen. W.

Habitat in China, Japonia et India orientali. ḥ (v. v.)

*12. HYPERICUM patulum.

H. floribus pentagynis solitariis terminalibus, caule frutescente laxo, foliis ovatis margine revolutis. *Thunb. jap.* 295. *Icon. plant. jap.* t. 17.

Ausgebreitetes Hartheu. W.

Habitat in Japonia. ḥ

Caulis frutescens. Rami teretes purpurascentes flexuoso-adjacentes patuli debiles glabri. Folia opposita sessilia ovata acuta integra margine revoluta subtus ferruginea, supra viridia horizontalia pollicaria internodiis duplo longiora. Flores in ramulis terminalibus solitarii. Calycis laciniae ovatae obtusissimae glabrae corolla duplo breviores. Corolla lutea subtus dorso rufescens. Styli quinque. Thunb 1. c.

Flores terminales solitarii vel terni. W.

13. HYPERICUM calycinum.

H. floribus pentagynis solitariis terminalibus, caule fusfruticoso ramolo, calycibus obovatis obtusissimis, foliis distichis oblongis. *Ait. Kew.* 3. p. 103.

H. floribus pentagynis solitariis terminalibus, caule tetragono fruticoso, foliis oblongo-ovatis obtusis coria-

ceis. Mant. 106. Gisecke. ic. fasc. 1. t. 18. Jacq.
fragm. bot. p. 110. t. 6. f. 4.*

Hypericum Ascyrion. Mill. dict. n. 7.

Androsaemum flore et theca quinquecapsulari omnium
maximis. Morif. hist. 2. p. 472. f. 5. t. 35.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 308.

Grosblumiges Hartheu. W.

Habitat in Graecia. ḥ (v. v.)

Caulis sempervirens, ramosus, ruber, tetragonus.
Folia ovato-oblonga, palmaria, consistentia, obtusa,
integerrima, subsessilia, internodiis 3 s. 4 longiora.
Flores terminales, pedunculati, solitarii. Calyx mem-
branaceus; foliis ovatis obtusis longitudine germinis,
duplo major in fructu maturo. Corolla lutea, calyce
duplo longior. Stamina flava, corolla breviora. Ger-
men rubrum. Habitus Hyp. Androsaemi.

* 14. HYPERICUM Ascyrroides. W.

H. floribus pentagynis terminalibus, stylis longitudine
staminum, calycinis foliolis ovato-lanceolatis, caule
tetragono herbaceo simplici, foliis sessilibus oblongis
acutis glabris. W.

Americanisches Hartheu. W.

Habitat in Pensylvania. 2 (v. f.)

Simillimum sequenti quo cum ante confuderat Lin-
naeus, quum H. Ascyrion etiam in America boreali ha-
bitare dixerit. Differt: stylis longitudine staminum vel
longioribus nunquam vero brevioribus, et caly-
folios ovato-lanceolatis, nec subrotundo-ovatis. W.

15. HYPERICUM Ascyrion.

H. floribus pentagynis terminalibus, stylis staminibus
brevioribus, calycinis foliolis subrotundo-ovatis, caule
tetragono herbaceo-simplici, foliis sessilibus oblongis
acutis glabris. W.

H. floribus pentagynis, caule tetragono herbaceo erecto
simplici, foliis laevibus integerrimis. Hort. upf. 236.
Gmel. sib. 4. p. 178. t. 69. Kniph. cent. 9. n. 50.

H. floribus pentagynis, foliis ovato-oblongis glabris in-
tegerrimis. Hort. cliff. 380. Roy. lugdb. 473.

Ascyrum magno flore. Bauh. pin. 280. prodr. 130.
Burf. VI. 25.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 308.

Sibirisches Hartheu. W.

Habitat in Sibiria, Pyrenaeis. 24 (v. v.)

Calycis foliola subrotundo-ovata, bina exteriora apicem versus parum attenuata, reliqua obtusissima. W.

*16. HYPERICUM *pyramidatum*.

H. floribus pentagynis terminalibus, stylis staminibus brevioribus, calycinis foliolis ovatis acutis, caule subtetragono herbacco ramoso, foliis sessilibus oblongis acutis glabris. W.

H. floribus pentagynis subpaniculatis, caule subtetragono herbaceo ramoso, calycibus ovatis acutis. Ait. Kew. 3. p. 103.

H. (amplexicaule) caule herbaceo, foliis ovato-oblongis amplexicanibus, calyce ovali acuto. Lamarch encycl. 4. p. 141.

Aescyrum erectum salicis folio, magno flore. Tournef. inst. 256.

Pyramidalisches Harthen. W.

Habitat in America boreali? 24 (v. v.)

Caulis herbaceus erectus sesquipedalis et ultra ramosus. Flores magnitudine H. Aescyri terminales in summitate caulis et ramorum. W.

*17. HYPERICUM *alternifolium*.

*H. floribus pentagynis axillaribus solitariis, foliis lanceolatis alternis, caule fruticoso. Vahl symb. 2. p. 83.
t. 42.*

Wechselblättriges Harthen. W.

Habitat in India orientali. 5

Caulis arborescens, cortice glabro cinereo. Rami sparsi teretes glabri. Folia sessilia bi s. tripollucaria sparsa coriacea lato-lanceolata basi angustiora obscure venosa glaberrima. Pedunculi axillares solitarii uniflori pollicares angulati, versus apicem foliolis tribus parvis, figura foliorum ramorum. Calycis foliola coriacea rotundata glabra corolla triplo breviora laevia. Petala integra. Germen pentagonum ovatum acuminatum glabrum. Styli quinque reflexi. Capsula quinquelocularis polysperma. Vahl l. c.

18. HYPERICUM *guineense*.

*H. floribus pentagynis subumbellatis, caule fruticoso,
ramis teretibus, foliis ovatis acutis.* Lin. suppl. 344.
Diff. de hyper. p. 4. t. I. f. I.

*H. frutescens, foliis ovatis acutis petiolatis, pedunculis
oppositis intrafoliaceis, floribus subumbellatis.* Lamarek encycl. 4. p. 145.

Guineisches Hartheu. W.

Habitat in Guinea. And. Berlin. §

Frutex cortice cinereo, in singulis ramis duae oppo-
sitiones foliorum: inferiori foliis minoribus. Rami lae-
ves, teretes. Folia opposita, petiolata, ovata, acumi-
nata, laevia, integerrima. Pedunculi oppositi ad la-
tera foliorum superioris partis, patuli, longitudine
plerumque folii, bifidi s. trifidi, multiflori subumbellati.
Calyx quinquepartitus, lanceolatus, concavus. Petala
erecta, supra medium patentia. Nectarium glandulis
quinque, ovatis. Filamenta brevia, basi in 5 phalan-
ges connata, petalorum basi adnata, petalis breviora.
Germen subrotundum. 5-angulare. Styli 5, filiformes.
Stigmata subcapitata. Capsula 5-angularis, 5-locu-
laris, 5-valvis.

*19. HYPERICUM *Richeri*.

*H. floribus pentagynis corymbosis terminalibus, caly-
cibus ciliato-dentatis, caule erecto herbaceo simplicis-
simo, foliis ovatis sessilibus margine punctatis.* W.

*H. (Richeri) caulibus teretibus erectis, floribus termi-
nalibus, calycum foliolis ciliatis eglandulosis, foliis
ovatis cauli adpressis.* Villars delph. 4. p. 501.
t. 44.*

*H. (fimbriatum) herbaceum glabrum, foliis ovatis am-
plexicaulibus, bracteis calycibusque fimbriato-ciliatis,
cyma terminali.* Lamarek encycl. 4. p. 141.*

H. alpinum magno flore nigris punctis insignito. Pluk.
alm. 189. t. 93. f. 6.

Richerisches Hartheu. W.

Habitat in alpibus Delphinatus. 4 (v. f.)

*Differt ab H. barbato: foliis subrotundo-ovatis
marginē tantum nigro punctatis, calycibus non barba-
tis, floribusque pentagynis.* Clariss. Villars perperam
tres styllos depinxit. W.

† † *Trigyna, calycibus integerrimis.*

*20. HYPERICUM *Androſaemum.*

H. floribus trigynis terminalibus, calycinis foliolis inaequalibus subrotundo-ovatis obtusis, fructibus baccatis, foliis ovatis sessilibus, caule fruticoso anticipati. W.

H. floribus trigynis, fructibus baccatis, caule fruticoso anticipati. Hort. upf. 237. Mill. dict. n. 9. Smith. brit. 2. p. 800.*

H. floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus. Hort. cliff. 380. Roy. lugdb. 374. Dalib. paris. 235.

Androſaemum maximum frutescens. Bauh. pin. 280.

Androſaemum. Dod. pempt. 78. Blackw. t. 94.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſi. 4. p. 309.

Englischē Harthen. W.

Habitat in Angliae, G. Narbonensis, Italiae humentibus.

† (v. v.)

*21. HYPERICUM *emarginatum.*

H. floribus trigynis terminalibus, calycinis foliolis lanceolatis, fructibus baccatis, foliis cordato-ovatis sessilibus emarginatis, caule fruticoso tereti. W.

H. frutescens, foliis ovato-oblongis obtusis amplexicaulis emarginatis, calycibus lanceolatis substriatis. Lamarck. encycl. 4. p. 147.*

Ausgerandetes Harthen. W.

Habitat — — — — — †

Simile H. Androſaemo sed primo intuitu foliis emarginatis diverſum. Lamarck. l. c.

*22. HYPERICUM *olympicum.*

H. floribus trigynis terminalibus, calycinis foliolis inaequalibus oblongis acutis, staminibus corolla brevioribus. foliis oblongo-lanceolatis sessilibus pellucido-punctatis. W.

H. floribus trigynis, calycibus acutis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso. Hort. cliff. 380. Roy. lugdb. 374. Mill. dict. n. 5. ic. t. 151. f. 1.

H. mentis olympi. Wheel. itin. 222. Dill. elth. 182. t. 151. f. 183.

H. orientale, flore magno. *Tournef. cor.* 19.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 301.

Olympisches Harthe. W.

Habitat in Pyrenaeis. Olympo. ♂ (v. v.)

Corolla magnitudine H. Asciri. W.

23. HYPERICUM petiolatum.

H. floribus trigynis, foliis ovatis petiolatis integerrimis subtus tomentosis, caule fructoso tetragono compresso.
Sp. pl. 1102.

Houttuyn Lin. Pl. Syst. 4. p. 311.

Gestieltes Hartheu. W.

Habitat in Brasilia. ♂

Statura et Stamina Gordoniae Lasianthi. Caulis tetragonus, obtusus. Stipulae nullae Folia Citri, petiolata, acuta, subtus obsolete tomentosa. Corymbus brachiatus. Staminum phalanges oblongae, maxime spectabiles.

*24. HYPERICUM arborescens.

H. floribus trigynis, corollis calycibusque laevibus glabris, foliis ellipticis, racemis brachiatis, caule arborecente. *Vahl. symb.* 2. p. 86. t. 43.

Baumartiges Hartheu. W.

Habitat in India orientali. ♂

Rami superne tetragoni, cortice purpurascente glabri. Folia petiolata bipinnicaria et ultra elliptica parum acuminata avenia coriacea integerrima, supra rorae glauco adspersa. Racemus terminalis compositus brachiatus spithameus. Pedunculus universalis partialesque compressi. Pedicelli 4 vel 5 ad singulum articulum pedunculi partialis breves. Calyx pentaphyllos, foliolis ovatis glabris integerrimis laevibus nudis. Petala quinque longitudine et figura calycis. Filamenta in tres phalanges usque ad apicem fere connata. Phalanges extus squarrosoae ex apicibus distinctis patulis filamentorum, tectae antheris numerosis, intus laeves. Germen trigonum glabrum ovatum. Habitus *H. guineensis*, diversum vero numero pistillorum et inflorescentia. *Vahl.* l. c.

*25. HYPERICUM foliosum.

H. floribus trigynis, staminibus longitudine petalorum, calycibus lanceolatis acutis, foliis ovato-oblongis sessilibus glabris. *Ait. Kew. 3. p. 104. Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 27. t. 299.**

Blattreiches Hartheu. W.

Habitat in insulis Azoricis. ♂ (v. v.)

*26. HYPERICUM floribundum.

H. floribus trigynis, calycibus ovatis acutis subciliatis, staminibus corolla brevioribus, foliis lanceolato-ellipticis, caule fruticoso. *Ait. Kew. 3. p. 104.*

H. frutescens canariense multiflorum. *Comm. hort. 2. p. 135. t. 68.*

H. f. Androshaemum magnum canariense ramosum capiolis floribus fruticosum. *Pluk. alm. 189. t. 302. f. I.*

Vielblumiges Hartheu. W.

Habitat in Madera. ♂

27. HYPERICUM canariense.

H. floribus trigynis, calycibus obtusis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso. *Syst. nat. ed. 13. p. 510. Ait. Kew. 3. p. 104.*

H. floribus trigynis, calycibus obtusis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso. *Hort. cliff. 381. Roy. lugdb. 375. Mill. dict. n. 4. Kniph. cent. 7. n. 35.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 311.

Canarisches Hartheu. W.

Habitat in Canariis. ♂

Synonymon Horti cliffortiani forte ad sequentem speciem pertinet. W.

*28. HYPERICUM elatum.

H. floribus trigynis, calycibus lanceolato-ovatis acutis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso, foliis ovato-oblongis. *Ait. Kew. 3. p. 104.*

Hohes Hartheu. W.

Habitat in America boreali. ♂ (v. v.)

29. HYPERICUM *hireinum*.

*H. floribus trigynis staminibus corolla longioribus, caly-
cibus lanceolatis acutis, foliis oblongis, caule suffru-
ticofo:* Ait. Kew. 3. p. 105.

*H. floribus trigynis, staminibus corolla longioribus, cau-
le fruticofo auncipiti.* Hort. cliff. 331. Hort. upf. 237.
Roy. lugdb. 374. Mill. dict. n. 3. Kniph. cent. 8.
n. 51.

H. foetidum frutescens majus. Dill. elth. 182. t. 151.
f. 182.

β . *H. foetidum frutescens minus.* Dill. elth. 182. t. 151.
f. 181.

*Androsaemum foetidum, capitulis longissimis filamentis
donatis.* Bauh. pin. 280.

Tragium. Clus. hist. 2. p. 205.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 312.

Stinkendes Hartheu. W.

Habitat in Sicilia, Calabria, Creta ad rivos. \ddagger (v. v.)

*30. HYPERICUM *inodorum*. W.

*H. floribus trigynis, staminibus longitudine corollae, ca-
lycibus lanceolatis acutis, foliis ovatis obtusiusculis,
caule fruticofo.* W.

H. orientale foetido simile sed inodorum. Tournef.
cor. 18.

Geruchloses Hartheu. W.

Habitat in Cappadocia. \ddagger (v. f.)

*Simillimum praecedenti, praecipue varietati β , sed
ex toto inodorum, ramis auncipitibus, et staminibus
longitudine corollae diversum.* W.

*31. HYPERICUM *chinense*.

*H. floribus trigynis, pedunculis axillaribus bifloris, fo-
liis ovato-lanceolatis integerrimis, caule fruticofo.*

Retz. obs. 5. p. 27.

Chinesisches Hartheu. W.

Habitat in China. \ddagger

*Arbuscula ramis alternis. Folia opposita petiolata
ovato-lanceolata acuta integerrima nuda bipinnicaria.
Pedunculi axillares solitarii oppositi bifidi triflori,
terminales multiflori. Flores flavi. Calyx laciniis sub-*

rotundis margine altero incumbentibus, coriaceis. Petala obovata striata calyce longiora. Filamenta tria lata in multa fila ab exteriore latere sensim altiora divisæ, quorum suprema sterilia exteriora antherifera. Germen trigoum. Styli tres latiusculi, stigmatibus simplicibus. Retz. l. c.

*32. HYPERICUM procumbens.

H. floribus trigynis, stylis coadunatis calycibus oblongo-lanceolatis acutis, petalis subfalcatis, foliis linearis lanceolatis, caulis herbaceis procumbentibus. W.

Hypericum procumbens. Desfont. in litt.

Liegender Hartheu. W.

Habitat in America boreali. 24 (v. f.)

Caules semipedales procumbentes obsolete tetragonoi. Folia pollicaria linearis lanceolata obtusiflora pellucido-punctata margine revoluta integrerrima glabra. Rami breves ex foliorum axillis. Corymbus terminalis foliosus. Calycis laciniae oblongo-lanceolatae acutae. Petala flava calyce vix longiora obovata subfalcata. Stamina petalis parum breviora. Germen oblongum triquetrum flavum. Styli tres ad apicem usque cohaerentes flavi. Habitat simile H. orientali, sed foliis calycibusque integrerrimis abunde diversum. W.

33. HYPERICUM scabrum.

H. floribus trigynis terminalibus, foliis lanceolatis, caule suffructicolo muricato. W.

*H. floribus trigynis, caule tereti suffructicoso muricato, foliis oblongis. Amoen. acad. 4. p. 287.**

H. orientale, caule aspero purpureo. Tournef. cor. 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 314.

Scharifstengliches Harthen. W.

Habitat in Arabia, Mauritania. 5 (v. f.)

*34. HYPERICUM rosmarinifolium. +

H. floribus trigynis, stylis coadunatis, pedunculis dichotomis terminalibus, calyce deciduo, foliis linearibus obtutis sessilibus, caule fruticoso. W.

*H. fruticosum foliis linearibus obtutis margine reflexis, pedunculis dichotomis, calyce deciduo, Lamarck encycl. 4. p. 152.**

Rosmarinblättriges Hartheu. W.

Habitat in Carolina. t̄

Flores in pedunculis dichotomis terminalibus. Lamarck. l. c.

*35. HYPERICUM *aspalathoides*. W.

H. floribus trigynis solitariis alaribus, stylis coadunatis, foliis fasciculatis linearibus acutis striatis, caule fruticoso dichotomo. W.

H. (fasciculatum) caule frutescente apice dichotomo, foliis linearibus acutis striatis, stylis coadunatis. Lamarck encycl. 4. p. 153. *

Witschenartiges Hartheu. W.

Habitat in Carolina. t̄

Simile H. Brathi. Flores solitarii flavi mediocres in axillis ramorum subeffiles. Lamarck. l. c.

*36. HYPERICUM *nitidum*.

H. floribus trigynis solitariis, stylis coadunatis, foliis oppositis linearibus recurvis, caule fruticoso. W.

H. frutescens erectum, foliis linearibus angustissimis, pistillo subulato staminibus breviore, stylis coadunatis. Lamarck encycl. 4. p. 153. *

Glänzendes Hartheu. W.

Habitat — — — — t̄

Valde affine praecedenti, sed Folia multo longiora nitida, minus rigida, plerumque arcuata. Flores solitarii axillares et terminales pedunculati. Lamarck. l. c.

*37. HYPERICUM *galioidis*.

H. floribus trigynis paniculatis terminalibus, stylis coadunatis, foliis linearibus sessilibus margine revolutis, caule suffruticoso. W.

H. suffruticosum, foliis angustissimis, panicula elongata terminali, stylis coadunatis. Lamarck encycl. 4. p. 154. *

Labkrautartiges Hartheu. W.

Habitat in Carolina meridionali. t̄

*38. HYPERICUM *empetrifolium*. W.

H. floribus trigynis corymbosis terminalibus, stylis divaricatis, foliis verticillatis ternis linearibus margine revolutis, caule fruticoso. W.

Rauschblättriges Hartheu. W.

Habitat in Oriente. ᄃ (v. f.)

Caulis fruticosus, ramis teretiusculis. Folia parva fere Empetri terna vel quaterna verticillata linearia obtusa margine revoluta petiolo brevissimo suffulta. Flores in corymbo terminali subarticulato. Calycis laciniae oblongae obtuse apicem versus ad marginem glandulosa sessilibus obfiteae. Corolla sexduplo calyce longior. Simile H. Coridi sed in hoc calycis laciniae lineares dentato-glandulosae et corolla duplo breviores. W.

*39. HYPERICUM *fasciculatum*.

H. floribus trigynis, stylis coadunatis, pedunculis trifloris axillaribus, foliis verticillatis linear-lanceolatis basi attenuatis petiolatis, caule suffruticoso. W.

Hypericum fasciculatum. Micheaux.

Buschblättriges Hartheu. W.

Habitat in America boreali. ᄃ (v. f.)

Caulis suffruticosus ramis teretibus. Folia verticillata quaterna, sena vel octona, floralia opposita linear-lanceolata basi attenuata petiolata margine revoluta punctis pellicidis adspersa. Pedunculi axillares in apice ramorum triflori, flore intermedio sessili. Calycis laciniae lanceolatae acutae reflexae. Corolla magnitudine H. perforati. W.

Hypericum axillare Lamarck encycl. 4. p. 153. huic videtur valde affine, et forte non diversum. W.

40. HYPERICUM *repens*.

H. floribus trigynis, caule tereti repente, foliis lanceolato-linearibus obtusis. Amoen. acad. 4. p. 287. Poir. intin. 2. p. 224.

H. frutescens caulis prostratis radicantibus, foliis lanceolato-linearibus obtusis, cymis terminalibus. Lamarck encycl. 1. p. 150. *

*H. caule tereti, foliis glaberrimis linearis ellipticis obtusis, floribus trigynis laxe corymbosis pedicellatis. Desf. atl. 2. p. 217.**

H. orientale, polygoni folio. Tournef. car. 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 312.

Kriechendes Hartheu. W.

Habitat in Oriente Barbaria. 24 (v. f.)

*41. HYPERICUM prolificum.

H. floribus trigynis corymbosis axillaribus et terminalibus, foliis lanceolato-linearibus obtusis, caule anticipati fruticoso. W.

H. floribus trigynis: primordialibus sessilibus, caule anticipati fruticoso, foliis lanceolato-linearibus. Mant. 106.

H. (Kalmianum) floribus trigynis, caule fruticoso, foliis linearis-lanceolatis marginibus revolutis. Du Roi. harbk. I. p. 310.

H. floribus semitrigynis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso sempervirente. Gron. virg. 112.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 315.

Sproßendes Hartheu. W.

Habitat in America septentrionali. 5 (v. v.)

Caulis recti, purpurascens. Folia saepius revoluta, unde angusta Rosmarini. Foliola ramulorum primordia ex alis plurima. Panicula parva, terminalis. Flores primae secundaeque dichotomiae sessiles; reliqui terminales, pedunculati, numero rarius ultra 7. Stamina petalis non longiora.

*42. HYPERICUM revolutum.

H. floribus trigynis solitariis terminalibus, stylis coadunatis, staminibus corolla brevioribus foliis linearis-lanceolatis basi revolutis, caule fruticoso. W.

H. floribus monogynis, foliis linearis-lanceolatis basi revolutis, staminibus corolla brevioribus. Vahl. symb. I. p. 66.

Hypericum Kalmianum. Forst. cat. pl. arab. 118.
n. 469.

Zurückgerolltes Hartheu. W.

Habitat in Arabia felici. 5

Caulis fruticosus glaber, cortice fuscо rugoso. Rami

oppositi e casu foliorum muricati articulati, articuli inferiores breviores obsolete tetragonoi, superiores alternatim compressi ancipites, versus apicem dilatati. Folia opposita sessilia internodiis longiora approximata linear-lanceolata integerrima avenia laevia basi revoluta semiunguicularia. Flores terminales solitarii magnitudine H. balearici. Pedunculus brevisimus. Corolla calyce longior. Filamenta corolla breviora. Germen ovatum Stylus unicus semitrifidus.

Vahl. l. c.

*43. HYPERICUM *angulosum*.

H. floribus trigynis solitariis axillaribus, stylis coadunatis, calycibus lanceolatis acutis longitudine corollae, foliis oblongis acutis. W.

Hypericum angulosum. Micheaux.

Eckiges Hartheu. W.

Habitat in Carolinae paludosis. (v. f.)

Caulis herbaceus ramosus anceps, ramis alternis. Folia unguicularia remota opposita oblonga, floralia in ramis linear-lanceolata breviora, non punctata. Flores solitarii pedunculati axillares nunquam oppositi. Calycis laciniae lanceolatae acutae carinatae longitudine corollae. Planta facie Buchnerae asiaticae. W.

*44. HYPERICUM *gramineum*.

H. floribus trigynis alaris pedunculatis solitariis, foliis sessilibus ovato-lanceolatis, caule herbaceo tetragono superne dichotomo. W.

H. floribus trigynis, foliis ovato-lanceolatis, caule herbaceo tetragono superne dichotomo. Vahl. symb. 2. p. 86.

H. floribus trigynis, foliis ovato-lanceolatis, caule herbaceo tetragono dichotomo, foliis oblongo-parabolicis.

Forst. prod. n. 281.

Gras-Hartheu. W.

Habitat in Nova Caledonia. (v. f.)

Caulis erectus inferne simplex, superne dichotome ramosus uti tota planta glaberrimus, e linea a latere singulo baseos folii decurrente tetragonus. Folia sessilia unguicularia (semipollicaria. W.) avenia subtus pallidiora, inferiora angustiora, superiora ovato-at-

tenuata eglandulosa impunctata (sub-lente adspecta pellicula punctata IV.) Pedunculi terminales et in dichotomia filiformes solitarii uniflori pollicares. Calyx foliola lanceolato-integerrima eglandulosa longitudine corollae. Stamina corollam aequantia. Vahl l. c.

*45. HYPERICUM japonicum.

H. floribus trigynis alaribus pedunculatis solitariis, foliis sessilibus oblongis obtusis nervolis, caule herbaceo tetragono superne dichotomo adscendentem. W.

H. floribus trigynis, foliis sessilibus ovatis integris, caule herbaceo tetragono basi decumbente. Thunb. *jap.* 295. t. 31.*

Japanisches Hartheu. W.

Habitat in Japonia.

Ajine H. gramineo et canadensi, sed foliis abunde diversum. W.

46. HYPERICUM canadense.

H. floribus trigynis alaribus pedunculatis solitariis, foliis sessilibus linearibus basi attenuatis, caule herbaceo tetragono superne dichotomo. W.

H. floribus trigynis, foliis linearis lanceolatis, caule quadrangulo, pericarpiae coloratis. Sp. pl. 1104.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 783.

Canadianches Harthen. W.

Habitat in Canada. Kalm. ⊖ (v. f.)

Facies Centaurii minoris.

Caules herbacei, teretes, ramosi, glabri. Folia linearia s. sublanceolata, integerrima, glabra. Panicula dichotoma, Floribus pedicellatis. Flores parvi admodum, magnitudine Spergulae. Pericarpium calyce duplo longius, conicum, rubrum.

Caules tetragoni a basi foliorum decurrente, superne dichotomi. W.

47. HYPERICUM virginicum.

H. floribus trigynis enneandris terminalibus, foliis ellipticis obtusis subcordatis amplexicaulibus, caule herbaceo compresso. W.

H. floribus trigynis enneandris, caule tereti, foliis ovatis amplexicaulibus. *Mant.* 455.

Gardenia Coldenia. *Act. edimb.* vol. 2. (1756) p. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 783.

Virginisches Harthen. W.

Habitat in Pensylvania. 24 (v. f.)

Caudis erectus, quasi fruticosus. Folia cordato-ovata puriculis pellucidis, sesquipolligaria. Petala pallide rubra. Filamenta 9, connata in tria corpora. Nectaria 3, staminibus alternantia, obtusa, crassa, extus gibba, intus concava.

Pedunculus terminalis subquinqueflorus. W.

*48. HYPERICUM nudiflorum.

H. floribus trigynis dichotomo-paniculatis terminalibus, stylis coadunatis, foliis oblongo-lanceolatis sessilibus, caule herbaceo tetragono. W.

Hypericum nudiflorum. Micheaux.

H. (laevigatum) floribus trigynis, foliis ovatis subamplexicaulibus, foliolis calycinis ovatis acutis panicula trichotoma, flore intermedio sessili. Ait. Fiew. 3. p. 106.?

Nacktblumiges Hartheu. W.

Habitat in America boreali. 24 (v. f.)

-Caulis herbaceus tetragonos. Folia opposita sessilia pollicaria et ultra oblongo-lanceolata obtusa venosa apice subtus punctis minutissimis nigricantibus conspersa. Panicula terminalis nuda dichotoma; Floribus in dichotomia solitariis subsessilibus. Calycis laciniae lanceolatae acutae pellucido-punctatae reflexae. Petala calyce triplo longiora. Styli tres coadunati. W.

*49. HYPERICUM parviflorum. W.

H. floribus trigynis dichotomo-corymbosis terminalibus, petalis calyce lanceolato brevioribus, foliis ellipticis obtusis sessilibus, caule herbaceo subtetragono. W.

H. (quinquenervium) floribus trigynis parvis, caule quadrangulo, foliis semiamplexicaulibus quinquenerviis. Wald. carol. 190.

Kleinblumiges Hartheu. W.

Habitat in Pensylvania, Carolina. (v. f.)

Caulis herbaceus ramosus lineis quatuor notatus sub-

tetragonus. Folia elliptica obtusa sessilia basi subcordata quinque nervia subtus punctis diaphanis notata. Pedunculus dichotomus terminalis. Floribus solitariis pedunculatis in dichotomia. Calycis laciniae lanceolatae acutiusculae corolla duplo longiores. W.

*50. HYPERICUM corymbosum.

H. floribus trigynis terminalibus corymbosis, calycibus lanceolatis acutis punctatis, foliis ellipticis obtulis sessilibus, caule herbaceo tereti. W.

Hypericum corymbosum. Mühlenberg in litt.

Doldentraubiges Hartheu. W.

Habitat in Pennsylvania. 24 (v. v.)

Caulis herbaceus erectus teres ramosus punctatus. Folia elliptica obtusa pollicaria vel sesquipollicaria sessilia venosa subtus punctis nigris obsita. Corymbi parvi terminales. Calycis laciniae lanceolatae acutae nigro-punctatae. Corolla pallide flava. W.

*51. HYPERICUM erectum.

H. floribus trigynis, foliis amplexicaulibus lanceolatis acutis, caule tereti herbaceo. Thunb. jap. 296.

Aufrechtes Hartheu. W.

Habitat in montibus Japoniae.

Caulis herbaceus teres erectus purpureus glaber, simplex vel apice tantum ramosus. Rami oppositi subfastigiati cauli similes. Folia opposita amplexicaulia lanceolata acuta integrerima, margine inflexo venosa glabra, cauli subadpressa, inferiora pollicaria internodiis longiora, superiora unguicularia internodiis breviora. Flores in caule et ramis terminales subternati. Pedunculi et Pedicelli filiformes cauli similes foliosi fastigiati. Calycis laciniae lanceolatae glabrae, longitudine fere corollae. Corolla lutea staminibus vix longior. Styli tres. Thunb. l. c.

*52. HYPERICUM connatum.

H. floribus trigynis dichotomo-paniculatis terminalibus, foliis deltoideis obtulis basi connatis, caule tereti fruticoso. W.

H. caule tereti frutescente, foliis connato-perfoliatis, Lin. Sp. Plant. Tom. III. P. II. Q q

paniculis dichotomis terminalibus. *Lamarck encycl.*

4. p. 160. *

Verwachsenes Hartheu. W.

Habitat in Brasilia in Monte Video. ৎ

* 53. HYPERICUM aethiopicum. +

H. floribus trigynis terminalibus, caule herbaceo basi decumbente, foliis ovatis glabris. *Thunb. prod.* 138.

Capisches Harthen. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

54. HYPERICUM reflexum.

H. floribus trigynis, foliis sessilibus lanceolatis approximatis reflexis, ramis tomentosis, panicula terminali.

Lin. suppl. 346. Ait. Kew. 3. p. 106.

Zurückgebogenes Hartheu. W.

Habitat in Teneriffa. ৎ

Frutex major, ramis divaricatis, alternis foliosis tomentosis. Folia integerrima reflexa incumbentia perforata, margine nigro-punctata. Panicula rotundata. Bracteae Calycesque subulatae. Corolla lutea.

55. HYPERICUM mexicanum.

H. floribus trigynis, ramis simplicibus, foliis imbricatis, ovatis. *Lin. suppl. 345. amoen. acad. 8. p. 322. t. 8. f. 2.*

Mexicanisches Hartheu. W.

Habitat in Nova Granada. *Mutis.* 4

Caules pedales, simplices, varicibus foliorum scabri, perennantes. Folia ovata, sessilia, opposita subimbricata, obtusa, avenia, laevia (*Citri.*) Corymbus terminalis, dichotomus, sessilis, foliis non longior. Petala linearia.

* 56. HYPERICUM caracasanum. W.

H. floribus trigynis geminatis terminalibus sessilibus, foliis ovatis approximatis subimbricatis, caule ramoso fruticoso. W.

Caracasianisches Hartheu. W.

Habitat ad Caracas. ৎ (v. f.)

Hanc speciem detexit Clariss. de Humboldt. Similimum H. mexicanum, sed habitu a figura hujus in Amoe-

nitatibus data, diversum. Folia approximata Veroniceae decussatae ovata, utrinque acuta, crassa, subtus punctata, non re vera imbricata, sed apice patula. Flores bini sessiles terminales. Post florescentiam excrescit ramus et tunc capsulae laterales evadunt. Rami teretes inferiores valde cicatrificati. W.

* 57. HYPERICUM articulatum.

H. floribus trigynis, pedunculis dichotomis axillaribus, foliis ovato-oblongis petiolatis, petiolis articulatis, caule fruticolo tetragono. W.

H. fruticosum glabrum, ramis tetragonis, foliis ovato-oblongis petiolatis, pedicellis articulatis. Lamarck encycl. 4. p. 161.*

Gegliedertes Hartheu. W.

Habitat in Madagascar. ৎ

Folia amplia. Flores ad apices ramorum in pedunculis dichotomis longitudine fere foliorum. Lamarck. 1. c.

* 58. HYPERICUM quadrangulare.

H. floribus trigynis, caule quadrangulo herbaceo, foliis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. Smith. brit 2. p. 801.*

H. floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. Hort. cliff.-380. Fl. svec. 624; 679. Roy. lugdb. 473. Dalib. paris. 234. Mill dict. n. 2. Scop. carn. n. 943. Leers herb. n. 593. Flor. dan. 640. Hoffm. germ. 270. Roth. germ. I. 324. II. 229.

H. caule quadrangulo, foliis ovatis perforatis, punctatis. Hall. helv. n. 1038.

H. calyce integro, foliis margine punctatis, caule quadrato herbaceo. Crantz. aust. 98.

Hypericum Ascyon dictum, caule quadrangulo. Bauh. hist. 3. p. 382.

H. vulgare minus, caule quadrangulo, foliis non perforatis. Bauh. pin. 279.

Ascyon. Dod. pempt. 78.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 784.

Vierkantiges Hartheu. W.

Habitat in Europae pratis. 4 (v. v.)

*Folia absque poris pellucidis esse verhibet Linnaeus
in diff. de hyper. p. 5, quod vero alti negant. R.*

*59. HYPERICUM *dubium*.

H. floribus trigynis, caule obsolete quadrangulo, foliis obtusis epunctatis, foliolis calycinis ellipticis. *Smith. brit. 2. p. 802.**

H. (*dubium*) floribus trigynis, caule subquadrato herbaeo, foliis ovatis, calycibus obtusissimis. *Leers herb. n. 594. Hoffm. germ. 270. Roth germ. I. 325. II. 230.*

*Hypericum maculatum. Allion. ped. n. 1433. t. 83. f. 1.
H. (fallax) floribus trigynis, foliis ovato-oblongis rugosis, calycisque laciniis ovatis obtusis, caule subquadrangulari. Grimm. fl. ifem. in Nov. Act. A. N. C. vol. 3. app. 362.*

Hypericum delphinense. Villars delph. 3. p. 497.
Zweifelhaftes Hartheu. W.*

Habitat in Germania, Italia, Anglia. 24 (v. v.)

60. HYPERICUM *perforatum*.

H. floribus tryginis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. *Smith. brit. 2. p. 801.*

H. floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. *Hort. cliff. 380. Fl. succ. 625; 680. Mat. med. p. 177. Roy. lugdb. 474. Dalib. paris. 233. Mill. dict. n. 1. Gmel. fib. 4. p. 179. n. 4. Pollich. pal. n. 717. Leers herb. n. 595. Hoffm. germ. 276. Blackw. t. 15. Ludw. ect. t. 11. Kniph. cent. 3. n. 46. Roth. germ. I. 325. II. 230.*

H. caule terete, alato, ramosissimo, foliis ovatis perforatis. *Hall. helv. n. 137.*

H. (*officinarum*) calyce integro, caule ancipiti ramosissimo, foliis confertis, pellucido-punctatis. *Crantz. austri. p. 99.*

H. floribus trigynis; petalis uno latere crenatis; caule ancipiti. *Scop. carn. 1. p. 310. ed. 2. n. 944.*

H. vulgare. *Bauh. pin. 279. Neck. gallob. p. 319.*

Hypericum. Dod. pempt. 76.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 788.

Gemeines Hartheu. W.

Habitat in Europae pratis. 2f (v. v.)

Anthrae puncto atro. Stigmata sanguinea.

*61. HYPERICUM afrom.

H. floribus trigynis, caule suffruticoso ancipiti, foliis linearis oblongis obtusis pellucido-punctatis, corymbo nudo ramosissimo, foliolis calycinis lanceolatis W.

H. glabrum suffruticosum, ramis ancipitibus, foliis oblongis obtusis punctato-glandulosis, corymbo ramosissimo. Desf. atl. 2. p. 215.

*H. frutescens erectum ramosissimum, ramis ancipitibus foliis oblongis obtusis pellucido-punctatis. Lamarck encycl. 4. p. 158.**

Hypericum perforatum. Poiret. itin. 2. p. 224.

Africanisches Hartheu. W.

Habitat in humidis Barbariae. 5 (v. f.)

Facies H. perforati, differt caule suffruticoso perennante, foliis margine crassis, floribus numerosissimis dense corymbosis. Desf. l. c.

62. HYPERICUM humifusum.

H. floribus trigynis terminalibus subcymosis, axillaribus solitariis, caulis prostratis ancipitibus herbaceis, foliis oblongis obtusis. W.

H. floribus trigynis axillaribus solitariis, caulis ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. Fl. suec. 2. n. 681. Neck. gallob. p. 319. Pollich. pal. n. 718. Mattusch. sil. n. 552. Doerr. naff. p. 131. Flor. dan. t. 141. Hoffm. germ. 270. Roth. germ. I. 325. II. 231.

H. foliis ovatis, caulis supinis. Guett. stamp. 2. p. 174. Dalib. parif. 234.

H. caule prostrato, foliis ovatis, calycibus serratis punctatis. Hall. helv. n. 1039.

H. minimum supinum. Bauh. hist. 2. p. 384. R.

H. minus supinum f. supinum glabrum. Bauh. pin. 279.

H. supinum III. minimum. Clus. hist. 2. p. 181.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 787.

Gestrecktes Hartheu. W.

Habitat in arvis Germaniae, Helvetiae, Galliae, Angliae.

2f (v. v.)

Flores axillares, solitarii. Folia absque punctis pellucidis.

*63. HYPERICUM dichotomum.

H. floribus trigynis axillaribus solitariis, caulis erectis teretibus dichotomis suffruticosis, foliis linear-lanceolatis obtusis. W.

H. suffruticosum erectum dichotome ramosissimum, foliis minimis, floribus solitariis pedunculatis. Lamarck encycl. 4. p. 159. *

Gabelästiges Hartheu. W.

Habitat in insula St. Dominici. †

64. HYPERICUM crispum.

H. floribus trigynis, caule tereti, foliis sessilibus lanceolatis basi undulato-dentatis. Mant. 106. Desf. atl. 2. p. 216. *

H. triquetrifolium. Turr. farf. 12.

H. crispum, triquetro et cuspidato folio. Bocc. mus. 2. p. 31. t. 12.

H. foliis parvis crassis f. sinuatis siccum. Raj. hist. 1019. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 788.

Krauses Hartheu. W.

Habitat in Calabria, Sicilia, Graecia, Barbaria. 24
(v. f.)

Folia minutissima, semiamplexicaulia, basi crassa.

65. HYPERICUM perfoliatum. +

H. floribus trigynis, caule subancipiti, foliis amplexicaulis ovatis, cyma floribus sessilibus. Syst. Veg. 584.

H. panicula subdichotoma. Diff. de hyper. p. 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 788.

Durchwachsenes Hartheu. W.

Habitat — — — — — 24

66. HYPERICUM barbatum.

H. floribus trigynis panicleatis, caule tereti herbaceo simplici, foliis oblongo-lanceolatis punctatis, calycibus ciliato-dentatis punctatis. W.

H. floribus trigynis, caule tereti, foliolis calycinis barbatis Lin. diff. de hyper. p. 6. Jacq. aust. t. 259.

Bartiges Hartheu. W.

Habitat in Austria. 24 (v. f.)

Folia punctis raris pellucidis obsita, in superficie vero inferiore, punctis opacis nigris copiosis tecta. Calyces punctis atris uti folia conspersa, margine dentibus longissimis ciliatis non glandulosis barbati. W.

† † † *Trygina; Calycibus Bracteisque ferrato-glandulosis.*

*67. HYPERICUM ciliatum.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule ancipiti herbaceo erecto, foliis amplexicaulibus ovatis pellucido-punctatis. W.

*H. caule ancipiti herbaceo, foliis ovatis pellucido-punctatis amplexicaulibus, bracteis calycibusque fimbriato-ciliatis. Lamarck encycl. 4. p. 162.**

H. amplio perfoliato folio. Tournef. inst. 255.

H. Sambach perfoliato folio. Bocc. mus. 2. p. 164. t. 127.

β. H. creticum amplissimo folio nitido. Tournef. cor. 18.

Gefranztes Hartheu. W.

Habitat in Oriente. 24 (v. f.)

68. HYPERICUM montanum.

H. floribus trigynis corymboso-paniculatis terminalibus calycibus ferrato-glandulosis, foliis oblongis amplexicaulibus impunctatis, margine nigro maculatis, caule tereti erecto. W.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. Flor. suec. 2. n. 683. Il. dan. t. 173. Pollich. pal. n. 716 Leers. herb. n. 596. Mattusch. sil. n. 553. Doerr. nass. p. 132. Hoffm. germ. 271. Roth. germ. I. 325. II. 232.

H. foliis ovatis, ora punctata, calycibus lanceolatis, serratis, glanduligeris. Hall. helv. n. 1042.

H. calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis glabris punctatis sessilibus. Crantz. aust. p. 99. n. 6.

H. elegantissimum non ramosum, folio lato. Bauh. hist. 3. p. 383.

H. caule simplici elegans latifolium. Hill. plant. 557. t. 14.

Androshaemum campoclarense. *Col. ephr.* I. p. 73.
t. 74.

Afryrum f. *Hypericum bifolium glabrum non perforatum.* *Bauh. pin.* 280. *It. w-goth.* 213.*

Afryrum. *Fuchf. hist.* 74.

Houttuyn Lin Pfl. Syst. 8. p. 789.

Berg Hartheu. W.

Habitat in Europae montibus. 24 (v. v.)

Bracteae etiam in summo caule glandulofo-ciliatae, et parvae, quod non in H. hirsuto.

Datur varietas foliis repandis. W.

*69. HYPERICUM punctatum. W.

H. floribus trigynis corymbolo-paniculatis terminalibus, calycibus ferrato-glandulosis, foliis oblongo-lanceolatis sessilibus impunctatis cauleque tereti erecto maculatis. W.

Punctirtes Hartheu. W.

Habitat in Galatia. 24 (v. f.)

Caules plures teretes erecti nigro-punctati e radice flava ramosa. Folia inferiora obovata subsessilia minuta unguicularia, superiora fere pollicaria oblongo-lanceolata obtusiuscula sessilia, vix punctis pellucidis conspicua, sed punctis magnis copiosis nigris per totam superficiem ornata. Calycis foliola lanceolata serrata, serraturis glandulosis. W.

*70. HYPERICUM glandulosum.

H. floribus trigynis, calycibus acutis ferrato-glandulosis, foliis oblongo-lanceolatis pellucido-punctatis, margine glandulosis, caule fruticoso. *Ait. Kew.* 3. p. 107.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, foliis lanceolatis margine glandulosis, caule fruticoso. *Vahl. symb.* 2. p. 86.

Druſiges Harthen. W.

Habitat in Madera. 5 (v. f.)

Rami obscure tetragonii glabri dichotomi. Folia sessilia unguicularia glabra, supra nervosa, secundum nervos subtilissime lineata utrinque punctata, apice ad basin acuta, margine glandulis sessilibus. Pedunculi ex axillis ultimis triflori, solitarius in dichotomia. Calyx corolla duplo brevior, margine glandulis

fusca. Corolla pallide flava punctis fusca irrorata.
Vahl l. c.

71. HYPERICUM *hirsutum*.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto pubescente, foliis oblongis basi attenuatis pellucido punctatis, subtus pubescentibus. W.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. Gmel. fib. 4. p. 178. n. 2. Leers. herb. n. 597. Pollich. pal. n. 720. Kniph. cent. 8. n. 52. Hoffm. germ. 271. Roth. germ. I. 325. II. 233.

H. foliis ovatis hirsutis, calycibus lanceolatis, serratis, glanduligeris. Hall. helv. n. 1043.

H. (*villosum*) calyce ferrato glanduloso, foliis pedicellatis, perforatis, caule tereti villoso. Crantz. austr. p. 96.

H. floribus trigynis; calycibus ferrato-glandulosis; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis; caule tereti. Scop. carn. I. p. 310. ed. 2. n. 945.

H. foliis lanceolatis, calycinis laciniis linearibus. Guett. stamp. 176.

H. floribus trigynis, calycum ferraturis capitatis, caule tereti. Hort. cliff. 380. Fl. Juec. 626; 682. Roy. lugdb. 474. Dalib. paris. 234.

B. H. foliis ovato-oblongis brevi pediculo donatis, calycinis laciniis oblongo-acutis. Guett. stamp. 178.

Androhaemum Ascyon dictum, caule rotundo hirsuto. Morif. hist. 2. p. 171. f. 5. t. 6. f. 11.

Androhaemum hirsutum. Bauh. pin. 280. caute.

Hypericum Androhaemum dictum. Bauh. hist. 3. p. 382.

Androhaemum alterum hirsutum. Col. ecphr. I., p. 74. 75.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 790.

Haariges Hartheu. W.

Habitat in Europae collibus et montibus. 24 (v. v.)

Flores noctu clauduntur, quod non in H. perforato.

*72. HYPERICUM *elodes*.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis glabris, foliis subrotundo-ovatis sessilibus pubescentibus, caule tereti repente. W.

H. floribus trigynis, caule tereti repente foliisque villoso subrotundis. Sp. pl. 1106. Neck. gallob. 391.
Lepech. it. 1. p. 78. Hoffm. germ. 271. Roth. germ. II. 232.

H. floribus trigynis, caule tereti repente foliisque villoso subrotundis, panicula pauciflori. Smith. brit. 2. p. 805.*

H. tomentosum. Lob. ic. 400. Germ. emac. 540.

Afcyrum supinum villosum palustre. Bauh. pin. 280.
Raj. synop. 344.

Afcyrum supinum elodes. Clus. hist. app. alt.

Caryophyllus palustris foliis subrotundis incanis, floribus aureis. Menz. pug. t. 7. f. 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 789.

Sumpf-Hartheu. W.

Habitat in paludosis spongiosis Frisiae, Belgii, Westphaliae, Galliae, Angliae, Sibiriae. 24 (v. f.)

Affine nimium H. tomentoso.

73. HYPERICUM tomentosum.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis villoso, foliis oblongis obtusis semiamplexicaulibus flexuosis tomentosis, caulinibus adscendentibus. W.

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, foliis semiamplexicaulibus flexuosis tomentosis, caulinibus prostratis. Sp. pl. 1106. Gouan. monsp. 402.

H. supinum tomentosum minus et monspeliacum. Bauh. pin. 279. Sauv. monsp. 149.

H. supinum tomentosum alterum. Clus. hist. 2. p. 181.

B. H. supinum tomentosum majus et hispanicum. Bauh. pin. 279.

H. supinum tomentosum hispanicum. Clus. hist. 2. p. 181.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 791.

Filziges Hartheu. W.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. 24 (v. v.)

Racemi terminales bifidi; Folia sessilia. Caulis teres. Stamina phalangibus tribus.

*74. HYPERICUM lanuginosum. +

H. floribus trigynis, calycibus obtusis ferrato-glandulosis, foliis amplexicaulibus ovato-oblongis tomentosis, caule tereti erecto. W.

H. (lanuginosum) tomentosum, caule tereti erecto simplici, foliis ovato oblongis amplexicaulibus, calyce ovato. Lam. encycl. 4. p. 163. *

Wolliges Hartheu. W.

Habitat in Oriente. 4

Simile H. montano sed caule foliisque tomentosis, calyceque obtuso diversum. Lamarck. l. c.

*75. HYPERICUM origanifolium.

H. floribus trigynis, calycibus linearibus serrato-glandulosis, foliis ovatis obtusis sessilibus tomentosis, caule tereti erecto, ramis sterilibus adscendentibus. W.

H. orientale saxatile Majoranae folio. Tournef. cor. 18. Dostenblättriges Hartheu. W.

Habitat in saxosis Armeniae. 4 (v. f.)

Radix ramosa intorta. Caules plures basi ramosi, floriferus digitalis erectus. Rami steriles supra radicem procumbentes vel adscendentes. Folia in caule florifero quadrilinearia ovata obtusa sessilia minime amplexicaulia, utrinque tomentosa cana. Folia in ramis sterilibus duplo minora obovata aggregata tomentosa cana. Flores in corymbo trichotomo terminali pauci-floro. Calycis laciniae lineares acutae glanduloso-serratae. W.

76. HYPERICUM orientale.

H. floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, foliis linear-lanceolatis ferrulatis, caulibus teretibus adscendentibus. W.

H. floribus trigynis, stipulis reflexis, foliis oblongis denticulato-crenatis. Sp. pl. 1103.

H. orientale Ptarmicae foliis. Tournef. cor. 18. itin. 2. p. 97. t. 97. bona.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 313.

Orientalisches Hartheu. W.

Habitat in Oriente. 4 (v. f.)

Folia Achilleae Ptarmicae, Flores pallide flavi. W.

77. HYPERICUM aegypticum.

H. floribus trigynis, nectariis petalorum lanceolatis, caulis suffruticosis compressis. Sp. pl. 1103. Amoen. acad. 8. p. 323. t. 8. f. 3.

H. suffruticosum ramosissimum, ramulis angulosis, foliis ovatis crassiusculis, petalis intus appendiculatis.

*Lamarek encycl. 4. p. 160.**

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 313.

Aegyptisches Hartheu. W.

Habitat in Aegypto. B. Jussieu. 5

Frutex spithameus, ramosissimus, brachiatus: ramulis compressis. Folia (Polygoni) ovata, minima, acuminata, avenia, sessilia, articulis ramorum longiora. Flores saepius bini in ramulis. Squamula necarifera oblonga. intra unguis cujusvis petali. Facies plantae arenariae.

78. HYPERICUM pulchrum.

H. floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule tereti, foliis amplexicaulibus cordatis glabris. Oed. dan. t. 75. Pollich. pal. n. 721. Curt. fl. Lond. fasc. I. Smith. brit. 804. Hoffm. germ. 271. Roth. germ. I. 326. II. 234.

H. foliis amplexicaulibus cordatis, calycibus ovatis, serratis glanduligeris. Hall. helv. n. 1041.

H. (elegantissimum) calyce serrato, foliis perfoliatis, margine punctatis, caule tereti glabro. Crantz. austri. p. 97. R.

H. foliis cordatis connatis, laciniis calycinis ovatis obtusis. Guett. stamp. 2. p. 175.

H. calyce serrato, foliis connatis. Hall. goett. 116.

H. minus erectum. Bauh. pin. 279.

H. minus glabrum erectum pulchrum. Moris. hist. 2. p. 470.

H. pulchrum tragi. Bauh. hist. 3. p. 383.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 792.

Schönstes Hartheu. W.

Habitat in nemoribus Germaniae, Galliae, Angliae. 24 (v. f.)

*79. HYPERICUM serpyllifolium.

H. floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, foliis obovatis obtusis sessilibus, caulis erectis teretibus fruticosis. W.

H. frutescens glabrum, caule tereti, foliis obovatis obtu-

- sis subsessilibus, bracteis denticulato-glandulosis. *Lamark encycl.* 4. p. 167.
H. folio breviore. *Bauh. pin.* 279. *Tournef. inst.* 255..
Moris. hist. 2. p. 469. f. 5. t. 6. f. 2.
H. syriacum et *alexandrinum*. *Bauh. hist.* 3. p. 383.
Lob. ic. 398. *Raj. hist.* 2. p. 1018.
H. alexandrinum. *Tabern. hist.* 864.
H. syriacum *Lobelii*. *Dalech. hist.* 2. p. 1155.
Quendelblättriges Hartheu. W.
Habitat in Orient. ৎ

80. HYPERICUM *nummularium*.

- H. floribus trigynis, calycibus obtusis ferrato-glandulosis, foliis orbiculatis subcordatis petiolatis glabris, caulis teretibus adscendentibus.* W
H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, foliis cordato-orbiculatis glabris. Sp. pl. 1106.
H. nummulariae folio. *Bauh. pin.* 279. *prodr.* 130.
H. fere orbiculato folio, floribus amplis pallide luteis, petalis in ambitu crenatis. *Pluk. alm.* 188. t. 93. f. 4.
Androfaemum supinum saxatile, nummulariae folio aversa parte rubente. *Bocc. mus.* 2. p. 134. t. 91.
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 793.
Rundblättriges Hartheu. W.
Habitat in Pyrenaeis. ৎ (v. f.)

*81. HYPERICUM *elegans*.

H. floribus trigynis, calycibus ovatis acutis glandulososerratis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis subcordatis amplexicaulibus, caule teretiusculo paniculato erecto. W.

Hypericum elegans. *Steph. in litt.*

Neues Hartheu. W.

Habitat in Sibiria. ৎ (v. f.)

Caulis sesquipedales erectus paniculatus teres lineata quandoque decurrente ad utrumque latus notatus. Folia oblongo-lanceolata acuminata obtusa basi cordata amplexicaulia pollicaria poris pellucidis perforata, subtus glaucescentia glabra. Pedunculi terminales corymbosi, axillares triflori, flore intermedio sessili. (Ca-

Lycis lacyniae ovatae acutae ferrato-glandulosae corolla duplo breviores. W.

*82. HYPERICUM linearifolium

H. floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis linearibus obtusis glabris. Vahl. symb. I. p. 65.

Frauenflachsblättriges Hartheu. W.

Habitat in erectis versus Bajonam inque Navarra Hispaniae. 4 (v. f.)

Caulis supra radicem lignosus teres laevissimus tenuis simplicissimus interdum basi ramosus, ramis altitudine fere caulis, pedalibus. Folia sessilia remota linearia glaberrima obtusa revoluta unguicularia. Pedunculi in summitate filiformes pauci patentes oppositi plerumque triflori. Calycis foliola lanceolata, denticulis nonnullis setaceis apice glandulosis dentata. Corolla parva calyce parum longior. Filamenta petalis breviora. Vahl. I. c.

*83. HYPERICUM hysopifolium.

H. floribus trigynis, calycibus obtusis glanduloso-dentatis, panicula pyramidata caule tereti longiore, foliis linearibus obtusis sessilibus glaucis. W.

H. erectiusculum glabrum, foliis subfasciculatis linearibus, floribus panniculato-spicatis, bracteis eglandulosis. Lamarck encycl. 4. p. 170.?

H. floribus spicato-racemosis, foliis linearibus fasciculatis, caule erecto tereti, calycibus glandulosis. Villars delph. 3. p. 505. t. 45.?

H. orientale Rosmarini folio glauco. Tournef. cor. 19. Hsopblättriges Harthen. W.

Habitat in Iberia, 4 (v. f.)

Caulis bipedalis teres erectus glaber ramis brevissimis strictis sterilibus in inferiore parte. Folia linearia pollicaria obtusa margine revoluta glauca. Panicula angusta pedalis vel sesquipedalis stricta, e pedunculis bifurcatis, flore intermedio subsessili. composta. Calycis laciniae oblongae obtusae glanduloso-dentatae corolla triplo breviores. H. hysopifolium Villarsii non differre videtur, sed inflorescentia in nostra valde elongata, et de glauco foliorum colore nullam men-

tionem fecerunt Clarissimi Viri Villars et Lamarch. W.

*84. HYPERICUM *ericoides*.

H. floribus trigynis, calycibus oblongis acutis serrato-glandulosis, foliis linearibus acutis sessilibus quaterni-imbricatis, caulis suffruticosus. W.

H. floribus trigynis, foliis linearibus imbricatis. Sp. pl. 1104. Cavan. ic. 2. p. 20. t. 122. *

H. ericoides minimum foliis cinereis. Pluk. alm. 189. t. 93. f. 5.

H. tomentosum lusitanicum minimum. Tournef. inst. 256.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 782.

Haidekrautartiges Hartheu. W.

Habitat in Hispania, Lusitania. 24 (v. f. f. fl.)

*85. HYPERICUM *Coris*.

H. floribus trigynis, calycibus linearibus obtusis ferrato-glandulosis, foliis linearibus margine revolutis quaternis, caulis fruticosus. W.

H. floribus trigynis: calycibus ferrato-glandulosis, foliis subverticillatis. Sp. pl. 1107. Gron. orient. 240.

H. foliis quaternis, linearibus, calyce ferrato, dentibus glanduligeris. Hall. helv. n. 1040.

H. f. Coris legitima ericae similis. Morif. hist. 2. p. 468. f. 5. t. 6. f. 4.

Hypericoides Coris quorundam. Bauh. hist. 3. p. 384.

Coris lutea. Bauh. pin. 280.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 793.

Vierblättriges Hartheu. W.

Habitat in Europae australis collibus siccis, et in Oriente. h (v. f.)

Stipulae utrinque solitariae f. ad singulum folium duae, magnitudine et figura foliorum, hinc, quum folia sint opposita, quasi sena articulos cingunt, quorum quatuor sunt stipulae.

† † † † *Digyna.*

86. HYPERICUM *mutilum*.

H. floribus digynis, foliis ovatis sessilibus. Gron. virg. 112.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 794.

Dichtblättriges Hartheu. W.

Habitat in Virginia, Canada.

Folia arcte cauli adpressa, vix conspicua.

87. HYPERICUM *setosum.*

H. floribus digynis, foliis linearibus. Gron. virg. 88.

*H. virginianum parvum fruticosum, ramulis equiseti.
Pluk. alm. 189.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 315.

Borstiges Hartheu. W.

Habitat in Virginia.

† † † † † *Jacerta.*

*88. HYPERICUM *verticillatum.* +

*H. floribus — — — caule herbaceo, foliis quatuor
verticillatis. Thunb. prod. 137.*

Wirtelblättriges Hartheu. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

1398. A S C Y R U M.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1225.

*Cal. 4 - phyllus. Petala 4. Filamenta multa, in
4 phalanges digesta.*

1. ASCYRUM *Crux Andreae.*

*A. foliis ovatis, caule tereti, panicula dichotoma. Sp.
pl. 1107. Mill. dict. n. 1.*

A. foliis ovatis. Hort. cliff. 494. Gron. virg. 113.

*Hypericoides ex terra mariana, floribus exiguis luteis.
Pluk. mant. 104. Raj. suppl. 496.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 317.

Andreas Ascyrum. W.

Habitat in Virginia. W.

*2. ASCYRUM *multicaule.*

A. foliis oblongis, ramis ancipitibus, corymbo terminali. W.

Aescyrum multicaule. *Micheaux.*

Vielstengeliches Aescyrum. W.

Habitat in America boreali. 2 (v. f.)

Folia oblonga obtusa basi attenuata. Flores terminales subcorymbosi et in apice ramorum axillares solitarii. W.

3. ASCYRUM hypericoides.

A. foliis oblongis, ramis ancipitibus, floribus terminalibus solitariis. W.

A. foliis oblongis, ramis ancipitibus. *Sp. pl.* 1108.
Mill. dict. 3. *Swartz. obs.* 294.*

A. fruticosum minus supradecompositum, ramulis gracilibus marginatis, foliis linearibus sessilibus basi biglandulatis. *Brow. jam.* 309.

Hypericoides frutescens erecta, flore luteo. *Plum. gen.* 51. t. 152. f. 1.

Hypericum primulum sempervirens, canle compresso ligneo ad bina latera alato, flore luteo tetrapetaloo. *Pluk. mant.* 104. *Raj. suppl.* 595.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 318.

Hartheuartiges Aescyrum. W.

Habitat in Virginia, Jamaica. 3 (v. f.)

Glandula utrinque infra basin foliorum.

*4. ASCYRUM stans.

A. foliis oblongis, ramis ancipitibus, pedunculis axillaribus. W.

Aescyrum stans. *Micheaux.*

Hypericum (tetrapetalum) frutescens, foliis ovato-oblongis amplexicaulibus, foliolis calycinis exterioribus cordatis. *Lamarck encycl.* 4. p. 146.*

Stehendes Aescyrum. W.

Habitat in America boreali. 3 (v. f.)

Folia oblonga obtusa basi rotundata longitudine internodiorum. Pedunculi axillares folio longiores unibi-vel triflori. W.

5. ASCYRUM *villosum*.

A. foliis oblongis pubescentibus adpresso, caule tereti stricto, floribus terminalibus. W.

A. foliis hirsutis, caule stricto. Sp. pl. 1108. Mill. dict. n. 2.

Hypericum (villosum) floribus trigynis paucis terminalibus, calycibus integris, caule erecto piloso, foliis subovatis adpresso pilosis. Walt. carol. 190.

Hypericum virginianum frutescens pilosissimum. Pluk. alm. 189. t. 245. f. 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 318.

Haariges Ascyrum. W.

Habitat in Virginia. 5 (v. s.)



556

