

Sup. Grach.

Nr 48/66

Utrwalony materiał:

Rozpoznanie kliniczne

Nazwisko

Alkohol

Formol

Arteriosclerosis univ. praecipue cerebri. Status lacunaris. Cardioneurosclerosis.

1. zwoje-
subst. nigra

2. subst.
nigra

3. lewe zwoje
podstawy z
lakuną

Rozpoznanie anatomiczne

Wiek 80 lat

Atrophia simplex cerebri. Hyperaemia passiva. Arteriosclerosis gradus mediocri.

Dzień śmierci

4.II.1966 r.

Rozpoznanie histologiczne

Status lacunaris.

Encephalomalacia recens.

Arteriosclerosis gradu majoris.

16

Sekcjonowany

w 24 godzin
po śmierci

kl. φ

Użyte metody barwienia

parafina, H-E, O.G.

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

Mikrofotografie, rysunki

R. Siekierska

pułt 78

Utworzony materiał:
Formol Alkohol

Rozpoznanie kliniczne

Świeże martwice gąbczaste w poprzecznie przeciętych pęczkach włókni-
stoty białej w części przyśrodkowej konarów mózgu /na ograniczonym pol-
bardziej nasilone po jednej stronie oraz nad substancją czarną w jądrach
czerwiennych. Wśród obrzękniętych i rozpadających się poprzecznie przec-
tych włókien nerwowych pojedyncze makrofagi trudne do określenia oraz d-
wybroczyny. Pod kolumną bocznie od jądra Reicherta po stronie lewej szer-
nowata lakuna około naczyniowa. Na brzegach jej znajdują się resztki i
łącznej /makrofagi, histiocyty, naczynia pojedyncze, limfocyty i komórki
plazmatyczne/.

Poza tym w prażkowiu małe jamki okołonaczyniowe. W całym układzie
ośrodkowym naczynia maksymalnie wypełnione krwią. W ścianach duże zmiany
miażdżycowe o charakterze szklisto-włóknistym. W przydancie lub w przest-
niach V.R. makrofagi z hemosyderyną. Pogranicze naczyniowo-tkankowe roz-
nione o charakterze gąbczastym.

4.II.1966 r.

Dr. M. Marciniak

Dr. K. Wiśniewska

vide Prof. E. Osetowska

12

Rozpoznanie histologiczne
Status laquearis.
Encephalomalacia resens.
Arteriosclerosis gradus majoris.

Użyte metody barwienia
parafina, H-E, O.G.

Ogłoszone lub demon-
strowane przez

Mikrofotografic, rysunki
R. Sikińska

8f 518ug