

Nr 86/66

Nazwisko

Wiek 42 lata

Dzień śmierci

3. IV. 1966r.

Sekcjonowany

w..... godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

puclis 80

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. Zakręty
oczodołowe
prawe

Użyte metody barwienia

Parafina; V.G., H-E,
PAS

Mikrofotografie, rysunki

Rozpoznanie kliniczne

Syp. Goch.
Encephalomalacia hemisphaerii sin.
cum hemiplegia dex. Status epi. Oede-
ma cerebri. Vitium cordis mit rale in
stadio insuff. circulatoriae cum fi-
brillatinae arteriorum et tachyaryth-
mia completa.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus encephalomalacia recens hemispha-
erii cerebri dex. Focus vasogenes in
regione nucleorum basaliu sinistro-
rum. Arteriosclerosis gradu minimo.

Rozpoznanie histologiczne

I 6
Encephalomalacia recens hemisphaerii
dex. Arteriosclerosis gradu mediocri.

Swieże ognisko malacyjne w korze, w za-
kręcie oczodołowym prawym. Ognisko
jest w fazie nawału leukocytnego
w wczesnej rozbiórki makrofagowej. Na-
czynia wypełnione maksymalnie krwią.
Poza naczyniami pojedyncze krwinki.
Tkanka w ognisku o obniżonej barwli-
wości, miejscami rozluźniona. Wyraźnie
zatarta warstwowa budowa kory. Widocz-
ne są tylko pojedyncze komórki bardzo
zmienione lub cienie komórkowe. W ko-
rze w istocie białej gdzieś de-
tryt komórkowy.

Nr 8646

Nazwisko
Kozicka
Janina

Wiek 42 lata

Dzień śmierci
3. IV. 1966r.

Sekcjonowany
w godzin
po śmierci

Ogłoszone lub demon-
strowane przez

prof. 80

Utworzony materiał:
Alkohol
Formol
1. Zakrety
Lek. M. Marciniak
we prawe

Użyte metody barwienia
Parafina; V.G., H-E,
PAS

Mikrofotografie, rysunki

Sprawdziła: dr. K. Wiśniewska

Rozpoznanie anatomiczne
Focus encephalomalacia recens hemisphaeri
erit cerebri dex. Focus vasogenes in
regione nucleorum basalem sinistro-
rum. Arteriosclerosia gradum minimo.

Rozpoznanie histologiczne
Encephalomalacia recens hemisphaerii
dex. Arteriosclerosia gradum medio.

Świeże ognisko malacyjne w korze, w za-
kreście oczodolowym prawym. Ognisko
jest w fazie nawąku leukocytarnego
i wczesnej rozpadki makroglowej. Na-
czynie wypełnione maksymalnie krwią.
Pozn naczyńkami pojedyncze barwi-
Tkanka w ognisku o obniżonej barwi-
wości, miejscami rozluźniona. Wyróżni-
szata warstwowo budowa kory. Widocz-
ne są tylko pojedyncze komórki barzo
zmienione lub cienie komórkowe. W ko-
rze w istocie białej gąźnienie gąźnie de-
kryt komórkowy.