

Nr 133/66

Nazwisko

Wiek

Dzień śmierci

17.VII. 1966

Sekcjonowany

w 48 godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

publto 80

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. Rozmiękanie /skroni lewa/
2. Ognisko pod-
stawy krwo-
toczne
zwoje post.

Rozpoznanie kliniczne

Syp. Groch.
Arteriosclerosis universalis pr.
cerebri. Haemorrhagia cerebro-
meningealis recidivans. Hemipare-
sis dextra minoris gradus cum apha-
sia completa. Carcinoma cutis reg.
conchae auriculae dex. operata.
Myodegeneratio in st. insuff. cir.

Rozpoznanie anatomiczne

Encephalomalacia haemorrhagica in
regione nucleorum basalem sinis-
trorum et encephalomalacia invete-
rata lobi frontalis et parietalis
sinistri. Arteriosclerosis gradu
magno.

Rozpoznanie histologiczne

T6
Encephalomalacia inveterata et ru-
bra recens. Haemorrhagia subarach-
noidealis. Hyperaemia et oedema
cerebri. Arteriosclerosis univer-
salis.

W płacie skroniowym lewym stare og-
nisko rozmiękania niszczące istotę
białą i dolne warstwy kory. Ognis-
ko jest w fazie organizacji glejo-
wo-mezodermalnej. W centrum ognis-
ka znaczne ubytki tkanki nerwowej
z tendencją do tworzenia jamy. Na
brzegach sieć łącznotkankowa, ma-
krofagi z hemosyderyną, gemistio-
cytarny glej oraz rozluźniona

bl
Użyte metody barwienia

H-E, v. G.

P-444
Mikrofotografie, rysunki

K. Staszewska

<http://rcin.org.pl>

struktura tkankowa. Poza tą jamą drone ognisko rozmięknieniowe w fa-
 zie organizacji glejowo-mezodermalnej. W lewych zwojach podstawy og-
 nisko martwicy krwotocznej niszczące część wyspy, torebkę ostatnią,
 przedmurze, torebkę zewnętrzną oraz zewnętrzną powierzchnię łupiny.
 Ognisko jest w fazie rozbiórki, stąd na brzegach ogniska znajdują się
 liczne makrofagi. Aktywacja i proliferacja tkanki mezodermalno-glejo-
 wej. Duże opustoszenia w korze we wszystkich okolicach badanych oraz
 komórki schorzone ischemicznie, zwyrodniałe tłuszczowo. W całym ukła-
 dzie nerwowym cechy obrzęku, przekrwienia, zmiany miażdżycowe.
 W oponach w przestrzeni podpajęczynówkowej krew, makrofagi, limfocyty.

lek. M. Marciniak

Sprawdziła dr med. K. Wiśniewska

Diagn. śmiertelny

17. VII. 1966

Sekcjonowany

w godzin

po śmiertelny

Użyte metody barwienia

Ogłoszone lub demon-
 strowane przez

H-E, v. G.

Mikrofotografic. rysunki

K. Staszewska

<http://rcin.org.pl>