

62. *Ulmus laevis* Pall. — Wiąz szypulkowy .

Gatunek europejski. Z mniejszymi lub większymi przerwami w zasięgu występuje począwszy od środkowej Francji aż po Ural, przy czym omija zarówno najbardziej północne, jak i południowe rejony kontynentu. Brak go również we wszystkich wyższych pasmach górskich. Granice Europy przekracza jedynie w dolinie rzeki Ural, poza tym na dwóch blisko względem siebie położonych stanowiskach rośnie w północno-zachodniej Turcji (Browicz, Zieliński, w Davis, Flora of Turkey 7, rękopis).

Zasięg *U. laevis* opracowali: T. Schmucker (1942, Silvae Orbis 4), A. Schreiber (1958, w Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 3, 1), H. Meusel, E. Jäger, E. Weinert (1965, Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora), J. Jalas, J. Suominen (1976, Atlas Florae Europaeae 3).

W Polsce *U. laevis* rośnie dość pospolicie jedynie w niżowej części kraju. Bardzo rzadki jest zarówno w Karpatach, w Sudetach, jak również na pogórzu. O ile wiadomo nie przekracza wysokości 600 - 700 m n.p.m. Występuje zwykle pojedynczo lub w niewielkich grupach, przy czym rośnie najczęściej na żyznych, wilgotnych siedliskach, często na terenach zalewowych. Jest jednym z gatunków wyróżniających zespoły legowe ze związku *Alno-Padion*. Wraz z *U. minor*, *Alnus glutinosa* i *Fraxinus excelsior* tworzy warstwę drzew w zbiorowiskach wydzielanych jako zespół *Fraxino-Ulmetum* (Medwecka-Kornaś, 1972, w Szata roślinna Polski 1).

Rozmieszczenie *U. laevis* w Polsce nie było dotychczas opracowane.

This is European species. With smaller and larger gaps in the range it occurs from central France to the Urals, avoiding both the most northern and most southerly parts of the continent. It is also absent from all mountain ranges. The limits of Europe are passed only in valley of river Ural, and besides it grows on two very close stands in northwestern Turkey (Browicz, Zieliński in Davis, Flora of Turkey 7, manuscript).

The range of *U. laevis* has been described by T. Schmucker (1942, Silvae Orbis 4), A. Schreiber (1958, in Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 3, 1), H. Meusel, E. Jäger and E. Weinert (1965, Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora), and J. Jalas and J. Suominen (1976, Atlas Florae Europaeae 3).

In Poland *U. laevis* grows quite commonly only in the lowlands of the country. The species is very rare both in the Carpathians, in the Sudety Mts and in the prealps. As far as is known it does not surpass 600 - 700 m elevation. It occurs usually singly or in small groups, and grows usually on rich moist sites frequently on flood areas. It is one of the species characterizing the carr associations from the alliance *Alno-Padion*. Together with *U. minor*, *Alnus glutinosa* and *Fraxinus excelsior* it forms the tree zone in communities designated as association *Fraxino-Ulmetum* (Medwecka-Kornaś, 1972, in Szata roślinna Polski 1).

The distribution of *U. laevis* in Poland has not been described before.




Европейский вид. С меньшими или большими разрывами растёт на пространстве от средней Франции до Урала, не заходя как в самые северные так и в самые южные районы континента. Он отсутствует также на высоких ярусах гор. За границы Европы переходит лишь в долине реки Урала и, кроме того, на двух

близко расположенных друг от друга местонахождениях в северо-западной Турции (Browicz, Zieliński, in Davis, Flora of Turkey 7, рукопись).

Ареал вяза гладкого обрабатывался несколько раз (Schmucker, 1942, Silvae Orbis, 4; Schreiber, 1958, in Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 3, 1; Meusel, Jäger, Weinert, 1965, Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora; Jalas, Suominen 1976, Atlas Florae Europaeae, 3).


В Польше *U. laevis* довольно обычен только в низинных районах страны. Он не встречается ни на Карпатах, ни в Судетах, редок он также в предгорьях. Несколько известно, вид этот не заходит выше 600 - 700 м над ур.м. Растет обычно единичными экземплярами или небольшими группами, причем чаще всего на плодородных влажных местообитаниях, часто на заливаемых. Является одним из видов характерных для заливных лугов из союза *Alno-Padion*. Вместе с *U. minor*, *Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior* образует древесный ярус в сообществах, выделяемых как ассоциация *Fraxino-Ulmetum* (Medwecka-Kornaś, 1972, in: Szata roślinna Polski, 1).

Размещение вида в Польше до сих пор не было обработано.



Ulmus laevis Pall.

62



Ujście Ławy Półn.

62

