

Nr 71/65

Nazwisko

Wiek 66 lat

Dzień śmierci

23.IV.65

Sekcjonowany

w 24 godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

publ. 78

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. Ognisko krwiotoczne brzeg

Użyte metody barwienia

Parafina

H-E, V-G.

P-406

Mikrofotografie, rysunki

G. Korybska

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis univ. et cerebri. Hypertensio art. Encephalomalacia hemisp. sin. Hemiplegia dex. cum aphasia. Myocardio-pathia arterioscler. in stadio insuff. circ. Susp. infarc. myocardi sub finem vitae.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus haemorrhagicus lobi parietalis sinistri. Oedema cerebri. Status lacunaris. Arteriosclerosis gradus minoris

Rozpoznanie histologiczne

Encephalomalacia cum haemorrhagia lobi parietalis sinistri. Arteriosclerosis.

W płacie ciemieniowym lewym w istocie białej w osi zawoju, ognisko rozmiękania w fazie rozbiórki makrofagowej, przechodzące w brzeg świeżego ogniska krwotocznego. Świeże krwinki nasiakają otaczającą tkankę, zawierającą liczne makrofagi w skupieniach i proliferujące naczynia. Wokół tego ogniska duży obrzęk istoty białej, rozpułchnienie śródbłonek, obrzęk komórek glejowych, pobudzenie astragleju, miejscami zblednięcia i rozluźnienia struktury tkanki,

odpowiadające wstępnej fazie martwicy obrzękowej. Obok tego kilka mniejszych ognisk martwicy rozsianych w istocie białej, pokorowo i trójkątne w korze, o obrazie morfologicznym jak w ognisku głównym, bez komponenty krwotocznej. Gdzieś przy naczyniach skupienia leukocytów, makrofagów z hemosyderyną, lub drobnokomórkowe nacieki symptomatyczne. Na terenie kory zaniki neurocytów, miejscami zupełne zatarcie warstwowości, schorzenia komórkowe ischemiczne i zwyrodnienia tłuszczowe. Warstwa graniczna glejowa pogrubiała z pomnożoną ilością gleju włóknistego. W oponach niewielkie nacieki symptomatyczne. Duże zmiany szkliste - włókniste naczyń śródmózgowych.

A. Taraszewska