

Nr 5/64.

Nazwisko

Wiek

39 l.

Dzień śmierci

30.XII.63.

Sekcjonowany 2.I.64.

w..... godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

pułko 75

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. Tętniak
tętnicy
łącznej
przed-
niej.

el. φ

Użyte metody barwienia

Parafina: H-E. v.G.

/B. Augustynowicz/.

Mikrofotografie, rysunki

P-327

Rozpoznanie kliniczne

Syp. Grack.

Morbus hypertonicus. Haemorrhagia
subarachnoidealis ad ventriculos
penetrans.

Rozpoznanie anatomiczne

Haemorrhagia subarachnoidealis.
Haemocephalus internus.
Aneurysma arteriae cerebri
anterioris sin.

Ta

Rozpoznanie histologiczne

Aneurysma arteriae communicantis
anterioris.

Pobrany twór tętniakowy ma układ
kilkokomorowy, o ścianach z budową
zatartą mięśniowo-kolagenową. W
kilku miejscach w głąb ściany dra-
żą ogniska rozmiękania rozwarstwia-
jące włókna kolagenowe. Naogół ścia-
ny są nierówne bądź to bardzo grube,
bądź utworzone tylko przez cienką
warstwę włókien kolagenowych.

Prof. dr med. E. Osetowska.