

Nr 139/64

Nazwisko

Wiek 77 lat.

Dzień śmierci

15.VIII.64

Sekcjonowany

w 48 godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

publio 85

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. Opuszka

2. Rdzeń szyszynny

3. Rdzeń piersiowy

4. Kora ruchowa 1.

5. Zwój międzykręgowy z korzonkiem.

Szpital Grenadierów

Rozpoznanie kliniczne

Polyneuritis symptomat. Periarteriitis nodosa suspekta. Arteriosclerosis universalis. Myocardopathia in statu insufficientiae circulatoriae. Inanitio.

Rozpoznanie anatomiczne

Bez zmian makroskopowych.

del φ

Użyte metody barwienia

Parafina H-E

Kresil-Violet

P-70

Mikrofotografie, rysunki

K. Kulon.

T6

Rozpoznanie histologiczne

Myelomalacja peripherica vasogenes?

W mózgu nie stwierdza się zmian typowych poza przerzedzeniami w warstwie V i III i okołonaczyniowymi.

Nie trafiono zresztą na okolicę ruchową. Także zamiast opuszki pobrano rdzeń podopaszkowy /być może źle odwrócono skrawki do krajania/.

Rdzeń na wszystkich skrawkach rozpada się bezodczynowo na obwodzie. Typ tego rozpadu nasuwa podejrzenie artefaktu utrwalania, ale wśród rozpadających się mas można zauważyć b. liczne naczynia o grubych szklistych ścianach.

nach, z prawie zupełnie zamkniętym światłem. Podobne zmiany w naczyniach korzków, które są obrzękłe i mają zatartą strukturę.

Prof.dr med.E.Osetowska.