

Nr 120/63.

Nazwisko

Wiek

66 lat.

Dzień śmierci

20.V.63 r.

Sekcjonowany

w 72 godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

Do pracy  
dr K. Wiśniewskiej.

pułko 79

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. stare og.  
w płacie  
ciem. L.
2. świeże  
og. zwoje  
L.
3. rdzeń.

Użyte metody barwienia

H-E. i Van Gieson  
Parafina.

/.M.Rezner/.

Mikrofotografie, rysunki

P-312

Rozpoznanie kliniczne

Grenadierów.

Neoplasma malignum glandularum lym-  
phaticorum colli. Metaplasas neopla-  
-smatica multiples ad cerebrum.  
Hemiplegia dextra cum aphasia.  
Neuromyelopathia toxica in decursum  
morbi. Myocarditis arterioscleroti-  
ca in stadi insuff. circulatoriae.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus encephalomalacia recens in  
reg. nucleorum basalia sin. et  
altus in reg. parieto occipitalae  
sinistrae.  
Arteriosclerosis gradu mediocri.

Rozpoznanie histologiczne

Encephalomalacia.

W płacie ciemieniowym ognisko roz-  
miękania z rozbiórką makrofagową i  
organizacją fibroblastyczną. W zwo-  
jach podstawy /wzgórzu/ - ognisko  
bezodczynowego rozplywania się tkan-  
ki. Dookoła ogniska naczynia z dość  
zaawansowaną miażdżycą. W rdzeniu  
stwierdza się ubytki tkanki w obu  
polach szarych obejmujące środkową  
część obu rogów tylnego i przedniego  
obustronnie. W tkance otaczającej  
brak odczynu komórkowego, obok ubytku  
grupy dość dobrze zachowanych



neuronów rogów przednich. Być może miała tu miejsce ostra martwica  
obrzękowa z rozplywaniem się tkanki - trudno jednak wykluczyć jakiś  
błąd techniczny - w sumie obraz rdzenia nie daje się wyraźnie zakla-  
syfikować.

/Prof.Dr med. E.Osetowska/.