

Nr 194/63.

Nazwisko

Wiek

62 1.

Dzień śmierci

12.XI.1963 r.

Sekcjonowany

w 24 godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

pułto 69

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. okolica potyliczna.
2. okolica skroniowa.
3. wzgórze.
4. okolica czołowa.

bl. 9

Użyte metody barwienia

Parafina. H-E,  
Krezyl. v. Gieson.

/G. Korybska/.

Mikrofotografie, rysunki

P-354

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis cerebri. Apoplexia cerebri recidivans. Encephalomalacia inveterata regionis parietalis hemisphaerii sinistri subsequente aphasia amnestica et sensorica et hepipharensis dextra. Epilepsia Jacksoni postapoplectica lateris dextri. Encephalomalacia recens trunci cerebri.

Rozpoznanie anatomiczne

Lacuna postapoplectica in regione gyri frontalis inferioris, temporalis superioris et lobuli parietalis inferioris. Atheromathosis gradus medioeri.

Rozpoznanie histologiczne

I b

Encephalomalacia multilocularis.  
Status lacunaris.

W okolicy oczodołowej, okolicy skroniowej i w korze oraz istocie białej okolicy potylicznej ogniska starego rozmiękania w stadium rozbiórki i proliferacji włókien mezodermalnych-kolagenowych. Przypadek jest opracowany b. pięknie technicznie. Zawiera ślicznie wybarwione w 3 metodach makrofagi: szczególnie w krezylu fioleto widać wyraźnie ziarnistą zawartość protoplazmy oraz 2 typy jąder:

drobne, okrągłe, typowe dla histiocytów łącznotkankowych oraz duże, czasem płatkowate, sugerujące pochodzenie od gleju podporowego. Na skrawku z okolicy skroniowej b.piękna proliferacja włókien kolagenowych. Duże zapalne odczyny symptomatyczne. W zwojach podstawy /wzgórzu/ okołonaczyniowy rozpad o typie status lacunaris.

Prof.dr med. E. Osetowska.