

Nr 128/62.

Nazwisko

Wiek

56 l.

Dzień śmierci

28.6.62.

Sekcjonowany

w godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. wzgórze
obustron-
ne z pod-
wzgórzem.

2. opuszka.

3. most z
ogniskiem.

bl. p

Użyte metody barwienia

Parafina.
H-E. v. Gieson.

/K. Kulon/.

Mikrofotografie, rysunki

P-27

Rozpoznanie kliniczne

Gronadierów.

Hypertensio arterialis. Haemor-
rhagia subarachnoidealis.
Haematuria et Haematemesis.

Rozpoznanie anatomiczne

Haemorrhagia trunci cerebri.

Rozpoznanie histologiczne

Angioma racemosum ? Haemorrhagia
trunci et subarachnoidealis.

W oponach poniżej dna komory III-jej
znajduje się groniasty pakiet na-
czyń krwionośnych, zawierający na-
czynia śluzne, tętnicze oraz konwo-
luty o ścianach niezupełnie zróżni-
cowanych. W medzie olbrzymi krwotok
niszczący i rozrywający całą nakry-
wkę, przenosi się także na część
grzbietową opuszki. Nie widać cech
poprzedzającego rozmiękania. W

./.

części podstawnej mostu mniejsze, wtórne krwotoczki z wyciśnięcia. W obrębie podpajęczynówki wśród naczyń naczyniaka duże skupisk wolno leżących krwinek.

/Doc.dr med. E.Osetowska/.