

Nr 230/62.

Nazwisko

Wiek

79 1.

Dzień śmierci

31.X.1962 r.

Sekcjonowany

w godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

dr Markiewicz.

pułt. 69

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. skroń na
wys. wzgó-
rza L.

2. zwoje pod-
stawy
wczesne.

3. w pełni
rozwoju.

4. wzgórze.

bl o

Użyte metody barwienia

Parafina. H-E.v.G.

/H. Dunin- /

dr Markiewicz.
standart

/M. Raubo/.

Mikrofotografie, rysunki

Rozpoznanie kliniczne

Grenadierów.

Arteriosclerosis diffusa praecipue
cerebri. Encephalomalaciae multi-
plices. Hemiparesis dextra cum
aphasia sensorica.
Dementia arteriosclerotica.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus encephalomalaciae recens in
regione fronto-temporo-occipitalis.
Atherosclerosis gradu mediocri.

Rozpoznanie histologiczne

Encephalomalacia cerebri.

W skrawku pobranym z płata skroniowe-
go rozległa martwica biała obejmują-
ca zarówno korę jak i substancję
białą. W rozpływającej się tkance
liczne makrofagi, młode naczynia i
fibroblasty. W tkance wokół ogniska
martwicy pobudzone formy gleju astro-
cytarnego i mikrogleju. Mikroglej w
postaci przerosłych form pałeczko-
watyh zwłaszcza w zachowanej części
kory skroniowej.

W torebce wewnętrznej pasmowate ognisko martwicy z pojedynczymi makrofagami, glejem i fibroblastami z zachowanymi pasmami tkanki stanowiącymi jakgdyby rusztowanie ogniska martwiczego. Wokół ogniska pobudzone formy astrogleju.

Pod **wysciółką** kom.bocznej tkanka rozluźniona, rozpływająca się z pojedynczymi skupieniami z leukocytów, bez reakcji tkanki otaczającej.

Naczynia opon i mózgu o cechach szkliwienia i włóknienia.

Przestrzenie okołonaczyniowe poszerzone, tkanka wokół naczyń o strukturze rozrzedzonej, nieraz rozpływającej się.

W korze mózgowej niektóre komórki obkurczone, z ciemnymi jądrami przypominające schorzenie ischemiczne.

/Dr K. Renkawek/.