

DR. ANTONI WAGNER.

Wykaz systematyczny znanych dotychczas gatunków i form Clausiliidów. II ¹⁾.

Systematisches Verzeichnis der mir heute bekannten Arten und Formen der Clausiliiden. II ²⁾.

Genus *Albinaria* ex rect. mea — Rodzaj.

Subgenus *Protalbinaria* A. J. Wagner — Podrodzaj.

Formenkreis der *Alb. sericata* — Zespół form.

133. *Albinaria (Protalbinaria) sericata* Pfr.

F.: Insel Euboea.

mz.: wyspa Eubea.

¹⁾ W pierwszej części niniejszego wykazu systematycznego Clausiliidów (Prace zool. Polsk. Państw. Muz. Przyrod. I, 1922, 2—3), pominięty został na str. 87, wskutek niedopatrzeń przy korekcie, ponad tytułem „Subgen. *Medora* Vest- Podrodzaj“ tytuł: „Genus *Albinaria* ex rect. mea- Rodzaj“. Wskutek tego wszystkie *Alopiinae* od № 81 do № 132, tworzące Subgen. *Medora* Vest i Subgen. *Agathylla* Vest sprawiają wrażenie, jakoby należały do rodzaju *Alopiia* ex rect. mea. Zaznaczam więc wyraźnie, że podrodzaje *Medora* Vest i *Agathylla* Vest zaliczam do rodzaju *Albinaria* ex rect. mea.

²⁾ Infolge eines Uebersehens bei der Korrektur im ersten Teile dieses „Systematischen Verzeichnisses der Clausiliiden (Annal. Zoolog. Mus. Polon. Hist. Nat. I, 1922, 2—3), wurde auf pag. 87 vor der Bezeichnung „Subgen. *Medora* Vest- Podrodzaj“ die Bezeichnung „Genus *Albinaria* ex rect. mea“ ausgelassen, so dass es den Eindruck macht, als ob alle Formen und Arten von № 81 bis № 132 der Subgen. *Medora* Vest und *Agathylla* Vest bei dem Genus *Alopiia* ex rect. mea eingeteilt worden wären. Es wird hiemit ausdrücklich festgestellt, dass das Subgen. *Medora* Vest und Subgen. *Agathylla* Vest zum Genus *Albinaria* ex rect. mea gehören.

134. *Albinaria (Protalbinaria) sericata bifilosa* Bttg.
F.: B. Delphi, Euboea.
mz.: g. Delfy, Eubea.
135. — *sericata senex* Bttg.
F.: die L. Kirinthos und Helenika in N. Euboea.
mz.: m. Kirinthos i Helenika, pn. Eubea.
136. — *profuga* A. S.
F.: die U. von Argos und Korinth im N. O. des Pelopones.
mz.: okolica m. Argos i Korynt, w pn.-ws. Peloponezie.
137. — *profuga collaris* Wstld.
F.: die U. von Myli bei Nauplia im O. des Pelopones.
mz.: okolica m. Myli k. Nauplia we ws. Peloponezie.
138. — *profuga thiesseae* Bttg.
F.: B. Actolikon in Akarnanien, Mittelgriechenland.
mz.: g. Actolikon w Akarnanji, Grecja środkowa.

Formenkreis der *Alb. candida* — Zespół form.

139. *Albinaria (Protalbinaria) candida* Pfr.
F.: die Halbinsel Akrotiri im N. W. Kretas; besonders die U. von Perivolica bei Kanea.
mz.: półwysp Akrotiri w pn.-za. części wyspy Krety, mianowicie m. Perivolica k. Kanei.
140. — *candida striata* Pfr.
F.: die U. von Kanea auf Kreta, besonders die L. Nerokuri Sü. von Kanea.
mz.: okolice m. Kanea, mianowicie m. Nerokuri na pd. od Kanei w za. części wyspy Krety.
141. — *candida bivalatalis* Marts.
Sy.: *Cl. bivalatalis* Marts.
F.: die L. Nerokuri bei Kanea in W. Kreta.
mz.: okolice m. Nerokuri na pd. od m. Kanea w za. części wyspy Krety.
142. — *arthuriana* Bttg.
F.: die Insel Spinalunga und das Küstengebiet der Mirabellabucht in Ostkreta; im Besonderen die L. Neapolis, Vigli, Lasitha, Kolariti Mezambolo.
mz.: wyspa Spinalunga i pobrzeże zatoki Mirabelskiej

w za. części wyspy Kreta; mianowicie m. Neapolis, Vigli, Lasitha, Kolariti Mezambolo.

143. *Albinaria (Protalbinaria) amalthea* Wstld.

F.: die L. Perivolica bei Kanea und Platania in N. W. Kreta.

mz.: m. Perivolica k. Kanei i Platania w pn.-za. części wyspy Kreta.

Formenkreis der *Alb. maculosa* — Zespół form.

144. *Albinaria (Protalbinaria) maculosa* Dh.

Sy.: *Cl. maculosa* var. *thiesseana* Bttg.

F.: Mittelgriechenland, der N. des Pelopones, die Inseln Euboea (Chalkis), Poros und Aegina; im Besonderen die L. Patras, Korinth, Hymettus, Eleusis, Makropulo, Palaeokondura, Pentelikon, Parnass.

mz.: środkowa Grecja, pn. część Peloponezu i wyspy Eubea (Chalkis), Poros i Egina; mianowicie: m. Patras, Korynt, Hymettus, Eleusis, Makropulo, Palaeokondura, Pentelikon, Parnas.

145. — *maculosa arcadica* Bttg.

F.: die Landschaft Arkadien am Pelopones und im Besonderen an nachstehenden L.: Diakophto, Akrata, Kloster Megaspilion bei Kalawryta.

mz.: powiat Arkadja w Peloponezie; mianowicie m. Diakophto, Akrata, klasztor Megaspilion k. Kalawryta.

146. — *krueperi* Pfr.

F.: B. Klissa im Pelopones.

mz.: g. Klissa w Peloponezie.

147. — *krueperi holostoma* Bttg.

F.: L. Katakolon im Pelopones.

mz.: m. Katakolon w Peloponezie.

148. — *krueperi dissipata* Bttg.

F.: die L. Lepanto in Aetolien, Patras im Pelopones.

mz.: m. Lepanto w Etolji, Patras w Peloponezie.

149. — *grisea* Dh.

F.: die L. Nauplia im Pelopones.

mz.: m. Nauplia w Peloponezie.

150. *Albinaria (Protalbinaria) schuchi* Rssm.
 Sy.: *Cl. massenae* Pot. et Michaud, *Cl. grisea* Küst.
 F.: die L. Navarin, Kambos und Vytina im Pelopones.
 mz.: m. Navarin, Kambos i Vytina w Peloponezie.
151. — *schuchi oertzeni* Bttg.
 F.: die L. Olympia im Pelopones.
 mz.: m. Olimpja w Peloponezie.
152. — *schuchi heterochroa* Wstld.
 F.: die L. Tripoliza im Pelopones.
 mz.: m. Tripoliza w Peloponezie.
153. — *schuchi incommoda* Bttg.
 F.: die Insel Zante.
 mz.: wyspa Zante.
154. — *schuchi contaminata* Rssm.
 Sy.: *Cl. lactea* Rssm., *Cl. obliqua* Chrp. var.
odyseus Bttg. var. *soluta* Mss.
 F.: die Inseln Kephalaria (an den L. Argostoli, Mt.
 Nero und Ainos), Korfu und Ithaka.
 mz.: wyspy Kefalonia, Korfu i Itaka.
155. — *schuchi muraria* A. S.
 F.: die L. Stamna in Akarnanien.
 mz.: m. Stamna w Akarnanji.

Formenkreis der *Alb. bigibbosa* — Zespól form.

156. *Albinaria (Protalbinaria) bigibbosa* Chrp.
 F.: die L. Adalia in Pamphylien; Felsengräber bei
 Makri und Karaman in Lycien, Klein Asien.
 mz.: m. Adalia w Pamfilji, skalne grobowce k. Makri
 w Licji, m. Karaman w Licji, Mała Azja.
157. — *anatolica* Roth.
 F.: Kakamo und Makri in Lycien, sowie die benach-
 barte Insel Skinosa, Klein Asien.
 mz.: m. Kakamo i Makri w Licji, oraz pobliska wyspa
 Skinosa, Mała Azja.
158. — *anatolica forbesiana* Pfr.
 F.: die L. Djemel in Lycien, Klein Asien.
 mz.: m. Djemel w Licji, Mała Azja.
159. — *dunkeri* Pfr.

F.: die L. Kaunas in Klein Asien.

mz.: m. Kaunas w Małej Azji.

160. *Albinaria (Protalbinaria) alajana* Bttg.

F.: Alaja O. von Adalia in Cilicien, Klein Asien.

mz.: m. Alaja na ws. od Adalji w Cylicji, Mała Azja.

Subgenus *Albinaria* s. str. — Podrodzaj.

Formenkreis der *Alb. byzanthina* — Zespół form.

161. *Albinaria (Albinaria) byzanthina* Chr p.

F.: die Umgebung von Kanea, besonders an den

L.: Chalepa, Tuzla, Suda, Platania, ferner die Halbinsel Akrotiri und der Kretische Olymp in W. Kreta.

mz.: okolice Kanei, mianowicie: m. Chalepa, Tuzla, Suda, Platanja, oraz półwysep Akrotiri i g. Olympos w za. części wyspy Krety.

162. — *byzanthina solidula* Pfr.

F.: Westkreta zwischen Kanea und Rethymno, im besonderen die L. Palaeokastron, Apokorona, Platania, Hagioi Deka, Rethymno.

mz.: za. część wyspy Krety między m. Kanea i Rethymno, mianowicie: m. Palaeokastron, Apokorona, Platania, Hagioi Deka, Rethymno.

163. — *byzanthina adpersa* Bttg.

F.: das Küstengebiet im W. Kretas zwischen der Sudabai und Rethymno, im besonderen an den L.: Ampelusa, Suda.

mz.: pobrzeże pn.-za. części wyspy Krety między zatoką Suda i m. Rethymno, mianowicie m.: Ampelusa i Suda.

164. — *byzanthina strigata* Pfr.

Sy.: *Cl. strigata* var. *centralis* Wstld., *Cl. strigata* var. *acuticosta* Wstld., *Cl. troglodytes* var. *vexans* Bttg.

F.: die Umgebung von Kanea und Rethymno in W. Kreta, besonders an den L.: Galos, Gortina, Tsikalaria; die Umgebung der L. Sphakia u. zw. in Xyloskala und Anapolis.

mz.: okolica Kanei i Rethymno w za. części wyspy

Krety; mianowicie m.: Galos, Gortina, Tsikalaria, oraz okolica m. Sphakia, mianowicie m. Xyloskala i Anapolis.

165. *Albinaria (Albinaria) byzanthina troglodytes* A. S.
 Sy.: *Cl. troglodytes* var. *interpres* Wstld.
 F.: die Umgebung von Rethymno, an den L. Asomato und Sphakia in West-Kreta.
 mz.: okolice Rethymno, w m. Asomato i Sphakia w za. części wyspy Krety.
166. — *aphrodite* Bttg.
 Sy.: *Cl. (Albinaria) hippolyti* Bttg.
 F.: der Pass Tyliisso im W. von Kandia, der B. Ega (nach Boettger Fundort der *Cl. hippolyti* Bttg.) in Zentral-Kreta.
 mz.: przełęcz Tyliisso na ws. od m. Kandia, g. Ega (według Boettgera m. z. *Cl. hippolyti* Bttg.) w środkowej części Krety.
167. — *aphrodite xanthostoma* Bttg.
 F.: Cap Spada im N. W. der Insel Kreta.
 mz.: przylądek Spada w pn.-za. części wyspy Krety.
168. — *virginea* Pfr.
 F.: die L. Spili am Osthang des Leuka-Ore Gebirges in Zentral-Kreta.
 mz.: m. Spili na ws. zb. wg. Leuka-Ore w środkowej części wyspy Krety.
169. — *virginea vianensis* A. J. Wagner.
 F.: die Umgebung von Viano im Küstengebiet Sü. des Lasithigebirges, Ost-Kreta.
 mz.: okolica m. Viano na pobrzeżu na pd. od pg. Lasithi we ws. części wyspy Krety.
170. — *virginea subvirginea* Bttg.
 Sy.: *Cl. subvirginea* var. *farcimen* Wstld.
 F.: die Insel Kreta.
 mz.: wyspa Kreta.
171. — *tenuicostata* Pfr.
 F.: die Umgebung von „Selino Castelli“ an der S. W. Ecke der Insel Kreta.
 mz.: okolice m. „Selino Castelli“ w pd.-za. części wyspy Krety.

172. *Albinaria (Albinaria) tenuicostata strictecostata* Bttg.
 F.: die Limbrosschlucht zwischen Nibros und Sphakia am Südosthang des Leuka-Ore Gebirges; die Schlucht Askiphu am Osthang und die L. Khordaliotikon-Pharangi in der Megalopotamosschlucht bei Spili, ebenfalls am Osthang des Leuka-Ore Gebirges, West-Kreta.
 mz.: ww. Limbros pomiędzy Nibros i Sphakia na pd.-ws. zb. wg. Leuka-Ore; ww. Askiphu na ws. zb. i m. Khordaliotikon — Pharangi w ww. r. Megalopotamos również na ws. zb. wg. Leuka-Ore, za. cz. wyspy Kreta.
173. — *glabella* Pfr.
 Sy.: *Albinaria pura* Bttg.
 F.: das Leuka-Ore Gebirge in W. Kreta.
 mz.: wg. Leuka-Ore w za. części wyspy Kreta.
174. — *glabella grabusana* Bttg.
 F.: die Insel Grabusa an der N. W. Ecke der Insel Kreta.
 mz.: wyspa Grabusa k. pn.-za. rogu wyspy Kreta.

Formenkreis der *Alb. cretensis* — Zespół form.

175. *Albinaria cretensis* R s s m.
 Sy.: *Alb. cretensis* var. *sphakiota* Maltz.
 F.: die Limbrosschlucht zwischen Nibros und Sphakia am Sü.-O. Hang des Leuka-Ore Gebirges in W. Kreta.
 mz.: ww. Limbros pomiędzy Nibros i Sphakia na pd.-ws. zb. wg. Leuka-Ore w za. części wyspy Kreta.
176. — *cretensis porphyrostoma* A. J. Wagner.
 F.: die Schlucht Askiphu am Osthang des Leuka-Ore Gebirges, West-Kreta.
 mz.: ww. Askiphu na ws. zb. wg. Leuka-Ore w za. części wyspy Kreta.
177. — *cretensis microtypica* A. J. Wagner.
 F.: die Schlucht Katholikos auf der Halbinsel Akrotiri, W. Kreta.
 mz.: ww. Katholikos na półwyspie Akrotiri, za. Kreta.

Formenkreis der *Alb. coerulea* — Zespół form.178. *Albinaria coerulea* Fér.

Sy.: *Cl. bifurcata* Desh., *Cl. tinorensis* Mss., *Cl. coerulea* var. *antiparia* Wstld.,—var. *syrensis* Wstld.,—var. *euboica* Wstld.,—var. *myconia* Wstld., *Cl. cretensis* Küst. et Pfr., var. *naxia* Bttg., var. *amorgia* Bttg.

F.: die Inseln Syra, Naxos, Amorgos, Jos, Antiparos, Tinos und nach Bttg. Euboea.

mz.: wyspy Syra, Naxos, Amorgos, Jos, Antiparos, Tinos i według Bttg. Eubea.

179. — *coerulea birugosa* Bttg.

Sy.: *Cl. therana* Let., *Cl. coerulea* var. *santorina* Let.

F.: die Insel Santorin der Kykladen.

mz.: wyspa Santorin w grupie Kykladów.

180. — *coerulea milleri* Pfr.

F.: die Insel Paros der Kykladen.

mz.: wyspa Paros w grupie Kykladów.

181. — *coerulea altecostata* Pfr.

F.: die Insel Strongylo bei Naxos der Kykladen.

mz.: wyspa Strongylo obok Naxos w grupie Kykladów.

182. — *coerulea anaphiensis* Bttg.

F.: das Kloster Panagia auf Anaphi der Kykladen.

mz.: Klasztor Panagia na wyspie Anaphi w grupie Kykladów.

183. — *coerulea kreglingerii* Pfr.

F.: die Insel Makariaes bei Naxos der Kykladen.

mz.: wyspa Makariaes obok Naxos w grupie Kykladów

184. — *coerulea astropalia* Bttg.

F.: die Insel Astropalia der Kykladen.

mz.: wyspa Astropalia w grupie Kykladów.

185. — *coerulea freytagi* Bttg.

F.: B. Kerki auf der Insel Samos.

mz.: g. Kerki na wyspie Samos.

186. — *brevicollis* Pfr.

Sy.: *Cl. eremita* Chrp., *Cl. löbbeckei* Pfr.

- F.: die Inseln Rhodus und Kasos der Sü. Sporaden;
ferner nach Bttg. in Cilicien.
mz.: wyspa Rodos i Kasos w grupie pd. Sporadów;
oraz według Bttg. w Cylicji, Mała Azya.
187. *Albinaria (Albinaria) maculata* R s s m.
F.: Smyrna und Ephesus an der kleinasiatischen Küste,
Landschaft Lydien.
mz.: m. Smyrna i Efez na pobrzeżu Małej Azji, pro-
wincja Lidja.
188. — *rebeli* A. J. Wagner.
F.: die Schlucht Kawusi am Mirabellbusen, der N. O.
Küste Kretas.
mz.: ww. Kawusi nad zatoką Mirabelską w pn.-ws.
części wyspy Krety.
189. — *sturanyi* A. J. Wagner.
F.: B. Kophina (1250 m.) des Messara Gebirges im
zentralen Süden Kretas.
mz.: g. Kophina (1250 m.) w pg. Messara w pd.-środ-
kowej części wyspy Krety.
190. — *cytherae* Bttg.
F.: die Insel Cerigo = Kythera.
mz.: wyspa Cerigo.
191. — *cytherae cerigottana* Bttg.
F.: die Insel Cerigotto.
mz.: wyspa Cerigotto.

Formenkreis der *Alb. filumna* — Zespól form.

192. *Albinaria (Albinaria) filumna* Pir.
F.: die L. Anubin und Dorf Bescheri, unweit des histo-
rischen Zedernwaldes im Libanon von dem Bota-
niker Th. Kotschy gesammelt.
mz.: m. Anubin i Bescheri niedaleko od lasu cedro-
wego w pg. Liban.
193. — *ungeri* Zelebor.
Sy.: *Cl. rufospira* Pir., *Cl. rollei* Bttg.
F.: die L. St. Chrysostomo und Pentadaktylon, ebenso
die U. von Larnaka auf der Insel Cypern.
mz.: m. St. Chrysostomo, Pentadaktylon, oraz okolica
m. Larnaka na wyspie Cyprze.

194. *Albinaria (Albinaria) ungeri virgo* Mss.

F.: die L. „Kalkfelsen zwischen Kerina und Nikosia“ auf Cypern.

mz.: m. „skały wapienne pomiędzy m. Kerina i Nikosia“ na wyspie Cyprze.

Formenkreis der *Alb. munda* — Zespól form.

195. *Albinaria (Albinaria) munda* Rssm.

F.: die Umgebung von Smyrna im Küstengebiet Kleinasiens.

mz.: okolica m. Smyrny na pobrzeżu Małej Azji.

196. — *chia* Bttg.

F.: die Insel Chios.

mz.: wyspa Chios.

197. — *chia samia* Bttg.

F.: die Insel Samos.

mz.: wyspa Samos.

Formenkreis der *Alb. discolor* — Zespól form.

198. *Albinaria (Albinaria) discolor* Pfr.

Sy.: *Cl. discolor* var. *inaequata* Blanc.

F.: die Inseln Cerigo und Elaphonisi, sowie die O. Küstengebiete des Pelopones und Mittelgriechenlands.

mz.: wyspy Cerigo i Elaphonisi, oraz ws. pobrzeże Peloponezu i Grecji środkowej.

199. — *discolor flammulata* Pfr.

Sy.: *Cl. discolor* var. *flammulata* forma *costulata* Bttg.

F.: die Insel Aegina.

mz.: wyspa Egina.

200. — *conemenosi* Bttg.

F.: U. von Patras im N. des Pelopones.

mz.: okolica Patrasu w pn. części Peloponezu.

201. — *compressa* Pfr.

Sy.: *Cl. grayana* Pfr.

F.: die Insel Cerigo.

mz.: wyspa Cerigo.

202. — *crstatella* Küst.

F.: die Insel Skyros der N. Sporaden.

- mz.: wyspa Skyros, w grupie pn. Sporadów.
203. *Albinaria (Albinaria) cristatella cristulifera* Bttg.
F.: die Insel Giura der N. Sporaden.
mz.: wyspa Giura w grupie pn. Sporadów.
204. — *senilis* Rssm.
Sy.: *Cl. modesta* Rssm, *Cl. cretacea* Küst.
F.: die Insel Kefalonia.
mz.: wyspa Kefalonia.
205. — *senilis naevosa* Fé r.
F.: die Insel Zante.
mz.: wyspa Zante.
206. — *senilis corcyrensis* Mss.
Sy.: *Cl. senilis* var. *castrensis* Mss.
F.: die Insel Korfu.
mz.: wyspa Korfu.
207. — *senilis epirotica* Mss.
F.: Epirus.
mz.: Epir.
208. — *senilis leucadia* Bttg.
F.: die Insel Levkas = Santa Maura.
mz.: wyspa Levkas = Santa Maura.

Formenkreis der *Alb. voithi* — Zespół form.

209. *Albinaria (Albinaria) voithi* Rssm.
F.: Gs. Taygetos im Sü. des Pelopones, an den L. Mizdra, Xerokampi, Kamusta, unweit Sparta.
mz.: Tajget na pd. części Peloponezu, mianowicie m. Mizdra, Xerokampi i Kamusta niedaleko miasta Sparty.
210. — *voithi agesilaus* Martens.
F.: der Gebirgsstock des Taygetos im Pelopones, nach Martens: Kloster Gola, Höhe Kamusta (1500 m.), U. von Mizdra, Placka und an den Wällen von Sparta.
mz.: wg. Tajget w Peloponezie; według E. Martensa m. klasztor Gola, wyżyna Kamusta (1500 m.), okolica m. Mizdra, Placka i wały Sparty.
211. — *voithi agamemnon* Bttg.
F.: Osthang des Gebirgsstockes Taygetos am Pelopones.
mz.: ws. zbocze wg. Tajget na Peloponezie.

212. *Albinaria (Albinaria) voithi menelaus* Martens.
 Sy.: *Alb. menelaus* subspec. *semicostulata* Bttg.
 F.: der Gebirgsstock des Taygetos am Pelopones, besonders an den L. Berg St. Elias (2000 m.), Albanos ober Kamusta (1500 m.), und Pygadia.
 mz.: wg. Tajget na Peloponezie, mianowicie g. Św. Eliasza (2000 m. nad p. m.), Albanos nad Kamustą (1500 m. nad p. m.), i Pygadia.
213. — *voithi juncea* Wstld.
 F.: die L. Kambos am Taygetos.
 mz.: m. Kambos w wg. Tajget.

Formenkreis der *Alb. corrugata* — Zespół form.

214. *Albinaria (Albinaria) corrugata* (Drap.) Rssm. et Bttg.
 Sy.: *Alb. corrugata* var. *almyrosana* Bttg. und — var. *homaloraphe* Bttg.
 F.: der O. Kretas von Kandia bis zur Mirabellbucht, im Bereiche des Lasithigebirges.
 mz.: ws. cz. wyspy Krety od m. Kandia do zatoki Mirabelskiej w obrębie pg. Lasithi.
215. — *corrugata draparnaldi* Beck.
 F.: Im Bereiche des Verbreitungsgebietes der typischen Form, jedoch in den unteren Höhenlagen.
 mz.: w obszarze rosziedlenia formy typowej, ale na niższych poziomach.
216. — *corrugata epimenides* Bttg.
 F.: die Insel Spinalunga im Mirabellbusen des N. O. Kretas, sowie im benachbarten Küstengebiet der Insel Kreta.
 mz.: wyspa Spinalunga w zatoce Mirabelskiej i pobliskie wybrzeże tejże zatoki, w pn.-ws. części wyspy Krety.
217. — *corrugata lasitiotica* A. J. Wagner.
 F.: oberste Höhenlage des Lasithigebirges (1600 m.), O. Kreta.
 mz.: najwyższe poziomy pg. Lasithi (1600 m.) we ws. części wyspy Krety.
218. — *corrugata inflata* Oliv.
 F.: U. der Stadt Kandia, ausserdem zerstreut im Gebiete der typischen Form.

- mz.: okolica m. Kandia, oprócz tego rozproszona w obszarze rozszedlenia formy typowej.
219. *Albinaria (Albinaria) corrugata distans* Pfr.
F.: Pyrgos an der zentralen Südküste Kretas in der Messara Ebene, nach Boettger in Sudsuro ebendasselbst.
mz.: m. Pyrgos na pd.-środkowym pobrzeżu wyspy Krety, według O. Boettgera w m. Sudsuro.
220. — *corrugata turgida* A. J. Wagner.
F.: U. von Neapolis, W. der Mirabellbucht in Ost-Kreta.
mz.: okolica m. Neapolis na za. od zatoki Mirabelskiej w ws. części Krety.
221. — *dörfleri* A. J. Wagner.
F.: der B. Kophina (1250 m.) des Messara Gebirges im zentralen Süden Kretas.
mz.: g. Kophina (1250 m.), pg. Messara w pd.-środk. części wyspy Krety.
222. — *sculpticollis* Bttg.
F.: die Insel Sophrana N. W. Karpathos in der südlichen Gruppe der Sporaden.
mz.: wyspa Sophrana na pn.-za. od wyspy Karpathos w południowej grupie Sporadów.
223. — *sculpticollis unia* Bttg.
F.: die Insel Unia N. W. Karpathos, der südlichen Sporaden.
mz.: wyspa Unia na pn.-za. od wyspy Karpathos, w południowej grupie Sporadów.

Formenkreis der *Alb. teres* — Zespól form.

224. *Albinaria (Albinaria) teres* Oliv.
F.: die Insel Standia, nördlich Kreta.
mz.: wyspa Standia na pn. od wyspy Krety.
225. — *teres extensa* Pfr.
Sy.: *Alb. vesti* Bttg.; *Alb. teres* var. *phalanga* Bttg.
F.: Ost-Kreta an nachstehenden L.: Toplu Monastiri, Sitia, Mallaes; Kallochorio im Golf von Mirabella; Schlucht bei Kawusi; Hierapetra; Pass Katharos im Lasithigebirge O. Kretas.
mz.: ws. część wyspy Krety w m.: Toplu Monastiri,

Mallaes, Sitia; Kallochorio w zatoce Mirabelskiej; ww Kawusi; Hierapetra; przełęcz Katharos w pg. Lasithi, we ws. części wyspy Krety.

226. *Albinaria (Albinaria) teres vermiculata* Bttg.

Sy.: *Cl. vermiculata megalostoma* Bttg.

F.: O. Kreta an den L.: Kawusi, Passhöhe Bebona, Afendi Kawusi, Russo Xylo bei Mallaes, Kloster Mallaes am Südhang des Lasithigebirges, Mangasa und Khadra im Distrikt Sitia.

mz.: ws. część wyspy Krety, mianowicie m. Kawusi, Afendi Kawusi, Bebona, Russo Xylo k. Mallaes, klasztor Mallaes, Mangasa i Khadra.

227. — *turrita* Pfr.

Sy.: *Cl. rotundata* A. S.

F.: die Inseln Milos und Amorgos der Kykladen.

mz.: wyspy Milos i Amorgos w grupie Kykladów.

228. — *turrita syphnia* Bttg.

F.: die Insel Syphnos der Kykladen.

mz.: wyspa Syphnos w grupie Kykladów.

229. — *eumeces* Bttg.

F.: die Inseln Makronision und Keos der Kykladen.

mz.: wyspy Makronision i Keos w grupie Kykladów.

Formenkreis der *Alb. olivieri* — Zespół form.

230. — *olivieri* Roth.

F.: die Insel Rhodus und die Sü.-W. Küstengebiete Kleinasiens.

mz.: wyspa Rodos i pd.-za. pbrzeże Małej Azji.

231. — *privigna* Bttg.

F.: die Safrania Inseln der Sü. Sporaden, Sü.-O. von Astropalia.

mz.: wyspy Safrania w grupie pd. Sporadów na pd.-ws. od Astropalji.

232. — *lerosiensis* Fér.

F.: die Inseln Leros und Kos der Sü. Sporaden.

mz.: wyspy Leros i Kos w grupie pd. Sporadów.

233. — *lerosiensis latecostata* Bttg.

Sy.: *Cl. hedenborgi* Shuttlew.

F.: die L. Makri in Lycien, Kleinasien.

- mz.: m. Makri w Licji, Mała Azja.
234. *Albinaria (Albinaria) lerosiensis carpathia* Bttg.
F.: die Insel Karpathos der Sü. Sporaden.
mz.: wyspa Karpathos w grupie pd. Sporadów.
235. — *lerosiensis armathia* Bttg.
F.: die Insel Armathia der Sü. Sporaden.
mz.: wyspa Armathia w grupie pd. Sporadów.
236. — *lerosiensis oertzeni* Bttg.
F.: die Insel Kasos der Sü. Sporaden.
mz.: wyspa Kasos w grupie pd. Sporadów.
237. — *retusa* Oliv.
F.: die Insel Kreta.
mz.: wyspa Kreta.
238. — *saxatilis* Pfr.
Sy.: *Cl. lerosiensis* A. Schm.
F.: die Insel Cypern.
mz.: wyspa Cypr.
239. — *saxatilis avia* Rssm.
F.: die Insel Cypern.
mz.: wyspa Cypr.

Formenkreis der *Alb. terebra* — Zespół form.

240. *Albinaria (Albinaria) terebra* Pfr.
Sy.: *Alb. venosa* Bttg.
F.: die L. Asomato und die Inseln Paximadhia in der Messara Bucht, Sü. Kreta.
mz.: m. Asomato i wyspy Paximadhia, zatoka Messara, pd. Kreta.
241. — *idaea* Pfr.
F.: B. Nidha am Idagebirge (Psiloritis), im zentralen Teile der Insel Kreta.
mz.: g. Nidha w pg. Ida (Psiloritis) w środkowej części wyspy Kreta.
242. — *spratti* Pfr.
F.: das Ida Gebirge, die L. Melidoni; nach Küster die L. Melopotamos auf Kreta.
mz.: pg. Ida, mianowicie m. Melidoni; według Küstera m. Melopotamos, wyspa Kreta.

Formenkreis der *Alb. praeclara* — Zespót form.243. *Albinaria (Albinaria) praeclara* Pfr.

F.: das Küstengebiet des Mirabellbusens auf O. Kreta, namentlich an den L.: Hagion Nikolao, und Panagia Kristallenia.

mz.: pobraże zatoki Mirabelskiej w ws. części wyspy Krety; mianowicie: Hagion Nikolao, Panagia Kristallenia.

244. *Albinaria (Albinaria) praeclara clara* Bttg.

F.: das Küstengebiet des Mirabellbusens auf Kreta, besonders in der Umgebung der L. Hagion Nikolao.

mz.: pobraże zatoki Mirabelskiej, zwłaszcza okolica m. Hagion Nikolao w za. części wyspy Krety.

245. — *praeclara paucicostata* Bttg.

F.: in der Umgebung der L. Hagion Nikolao am Mirabellbusen O. Kretas.

mz.: okolica m. Hagion Nikolao, na pobrażu zatoki Mirabelskiej, w za. części wyspy Krety.

246. — *praeclara rudis* Pfr.

Sy.: *Alb. clara* Bttg. (part.)

F.: Höhen über Hagion Nikolao, am Wege nach Neapolis, Kalokhorio und die Insel Megalonisi im Mirabellbusen O. Kretas.

mz.: wyniosłości nad m. Hagion Nikolao na drodze do m. Neapolis i Kalokhorio, oraz wyspa Megalonisi w zatoce Mirabelskiej.

247. — *praeclara drakakisi* Maltz.

Sy.: *Cl. teres extensa* Bttg. und Pfr.

F.: Felsschlucht Kawusi und die L. Bebona im O. des Mirabellbusens.

mz.: ww. Kawusi i g. Bebona we ws. części zatoki Mirabelskiej.

248. — *maltzani* Bttg.

F.: die U. von Neapolis in O. Kreta.

mz.: okolica m. Neapolis we ws. części wyspy Krety.

Formenkreis der *Alb. goldfussi* — Zespót form.249. *Albinaria (Albinaria) goldfussi* Bttg.

F.: der Gebirgsstock des Taygetos am Pelopones, namentlich die L. Langadi.

- mz.: wg. Tajget w Peloponezie, mianowicie m. Langadi.
250. *Albinaria (Albinaria) goldfussi chaperi* Wstld.
F.: Tajgetos, Osthang.
mz.: ws. zb. wg. Tajget.
251. — *brömei* Bttg.
F.: Gipfel des Chelmos am Polopones.
mz.: szczyty g. Chelmos w pn. Poloponesie.
252. — *winneguthi* A. J. Wagner.
F.: Dukati bei Valona in Albanien.
mz.: Dukati obok Walony w Albanji.
253. — *cyclothyra* Bttg.
F.: die L. Klissura in Akarnania, Mittelgriechenland.
mz.: m. Klissura w Akarnanji, Grecja środkowa.
254. — *violascens* Wstld.
F.: B. Veluchi N. Karpenision in Aetolien, Mittelgriechenland.
mz.: g. Veluchi na pn. od m. Karpenision w Etolji, Grecja środkowa.
255. — *subbigibbosa* Wstld.
Sy.: *Alb. cristatella* var. *subbigibbosa* Wstld.
F.: die L. Klissura in Akarnanien.
mz.: m. Klissura w Akarnanji, Grecja środkowa.
256. — *sublactea* Bttg.
Sy.: *Alb. hians* var. *sublactea* Bttg.
F.: die L. Kryoneri in Akarnanien.
mz.: m. Kryoneri w Akarnanji, Grecja środkowa.
257. — *messenica* Mart.
F.: die L. Kalamata in Messenien am Polopones.
mz.: m. Kalamata w Messenji na Poloponezie.

Formenkreis der *Alb. leonisorum* — Zespół form.

258. *Albinaria (Albinaria) leonisorum* Bttg.
F.: die L. Russo Xylo bei Mallaes, O. Kreta.
mz.: m. Russo Xylo obok Mallaes we ws. części wyspy Kreta.