

## R É S U M É.

Mr. Stanislas Grabiński, propriétaire de Walewice aux environs de Łowicz a tué le 20 août 1914 un phoenicoptère adulte aux bords d'un étang. Il est à remarquer, que c'est la première fois, qu'on tue sur le territoire de la Pologne cet habitant des bassins de la Méditerranée, de la Mer Noire et de la Mer Caspienne. Le phoenicoptère était tué déjà en Poméranie (1869 et 1890), en Silésie (1895 et 1905) et près de Riga. Mr. Grabiński a fait don de ce phoenicoptère au Musée d'Histoire Naturelle de l'État Polonais à Varsovie.

JERZY KREMKY.

Drobne notatki lepidopterologiczne — Notices  
lépidopterologiques.

*Plusia ain* Hochenw. 17VI1923 r. Mała Wieś (pow. grójecki, woj. warszawskie). ♂ świeżo wylęgły na pniu modrzewia.

Gatunek ten spotykany był dotychczas jedynie w górach. Seitz i Spuler podają go z Alp, gór niemieckich i północnych Węgier, w Azji od Altaju do Amuru. Ludwik Biró spotkał go we wschodnich Karpatach, a dr. Prüffer podaje go z Tatr (Dolina Strążyska).

Mój okaz z pod Warszawy, znaleziony w Małej Wsi w lesie modrzewiowym, jedynym na terytorjum Polski nizinnej, pozwala mi przypuszczać, że *Plusia ain* Hochenw. nie jest gatunkiem wyłącznie górskim, jak sądzono dotychczas, a występowanie związane jest raczej z obecnością modrzewia na danym obszarze.

*Eriogaster rimicola* Hb. W czerwcu 1918 r. gąsienice tej prządki wystąpiły licznie w Piasecznie (pow. warsz.) na starych dębach. Jest to pierwsze stanowisko występowania tego motyla w Polsce. Dotychczas znany z Niemiec, z północnej i środkowej Francji, na południo-wschód dochodzi do Rumunji i Dalmacji.

*Pterogonia proserpina* Pall. W czerwcu 1921 r. w Wawrze (pow. warszawski) znaleźliśmy z kol. M. Maślowskim kilkadziesiąt gąsienic tego motyla na wierzbowce kłosowej (*Epilobium angustifolium* L.), rosnącej w młodym zagajniku sosnowo-brzozowym. Młode gąsienice (zielone) w dzień spoczywają na liściach rośliny, starsze, ciemno-zabarwione, ukryte pod rośliną, częściowo zagrzebane w piasku.

*P. proserpina* Pall. występuje w środkowych Niemczech, na wschód dochodzi do Buchary, na południe do morza Śródziemnego. Z Polski znany z okolic Lwowa (Hirszler i Romaniszyn) i Ojcowa (Słaszczewskij). Prócz tego Słaszczewskij, jakoby, znalazł jedną gąsienicę pod Warszawą, która jednakże motyla nie wydała.

*Orthosia nitida* F. ab. *obscurata* Sp ul. Uścimów (Ostrów Siedlecki) ♀ 11X1913 r. na przynętę jabłkową. (Z Polski podawany tylko z Poznańskiego, pomimo, że za ojczyznę jego uważana jest prawie cała Europa za wyjątkiem Belgji i Anglji).

*Tephroclystia extremata* F. Zbuczyn (Siedlce) 16V1921 r. ♂ na parkanie. Nowy dla Polski. Dotychczas znany z Niemiec (Wiesbaden), Austrii, Czechosłowacji (b. rzadki), południowo-wschodniej Europy, Korsyki i wschodniej Azji.

*Agrotis janthina* Esp. Uścimów (Ostrów Siedlecki) 2 ♂ 19 i 20VIII1913 r. na przynętę jabłkową. Prócz tego p. A. Kreczmer złowił 2 okazy w lipcu 1922 i 1923 r. w Żwirze (pow. warszawski), a inż. Makólski 1 okaz w Zambrowie koło Łomży. Pomimo, że znany z Danji, środkowej i południowej Europy i Marokka, z Polski dotychczas nie podawany.

#### R É S U M É.

L'auteur a capturé une *Plusia ain* Hochenw. dans une forêt de mélèzes à Mała Wieś au sud de Varsovie; il émet l'opinion, que ce n'est pas une espèce exclusivement monticole, comme on croyait généralement jusqu'à présent. L'auteur constate aussi la présence de la *Pterogonia proserpina* Pall. aux environs de Varsovie. Comme espèces trouvées pour la première fois sur le territoire de la Pologne il cite: *Eriogaster rimicola* Hbn., *Agrotis janthina* Esp. et *Tephroclystia extremata* F.

Dr. STANISŁAW M. SUMIŃSKI.

O występowaniu w Polsce *Anax parthenope* de Selys (*Odonata, Aeschninae*). — Sur l'apparition de l'*Anax parthenope* de Selys en Pologne.

W pracach dawniejszych i nowszych faunistów, aż do r. 1921, nigdzie nie spotykamy danych o znajdowaniu w Polsce *Anax parthenope* de Selys, obecność zaś tego gatunku na naszych