

Regina BAŃKOWSKA

Stratiomyidae (Diptera) Pienin

Z uwagi na dość słabo poznaną dipterofaunę Pienin, wydaje się celowe opublikowanie niewielkiego wykazu gatunków *Stratiomyidae*, złowionych w trakcie badań faunistycznych tego regionu. Kilka gatunków należy do rzadko polawianych i znanych jest dotychczas tylko z kilku stanowisk w Polsce. Są to: *Actina nitens*, *Acanthomyia dubia*, *Allognosta vagans* i *Clitellaria ephippium*.

Nieliczne dane dotyczące występowania *Stratiomyidae* w Pieninach można znaleźć w spisie muchówek Galicji (NOWICKI 1873) oraz w zestawieniu zbiorczym *Stratiomyidae*, obejmującym obszar całej Polski, opracowanym przez TROJANA (1974).

Należy zaznaczyć, że materiały pienińskie były zbierane dość przypadkowo, nie dają obrazu całości fauny tego regionu i nie mogą stanowić podstawy do rozważań syntetycznych.

Wykaz zebranych gatunków

Podrodzina *Beridinae*

Rodzaj *Allognosta* OSTEN-SACKEN, 1883

1. *Allognosta vagans* (LOEW, 1873)

Gatunek europejski, bardzo rzadki, z Polski dotychczas podawany z Kotliny Sądeckiej (GRZEGORZEK 1873, NOWICKI 1873).

Jeden okaz samca złowiono 20 lipca w olszynie karpackiej.

Rodzaj *Beris* LATREILLE, 1803

2. *Beris chalybeata* (FÖRSTER, 1771)

Zamieszkuje całą Europę. Z Polski wymieniany z wielu miejscowości (TROJAN 1974).

W Pieninach poławiany w ciągu maja i czerwca na łące pienińskiej, młace i łące ziołoroślowej.

3. *Beris clavipes* (LINNAEUS, 1767)

Występuje w Europie. W Polsce wymieniany z licznych stanowisk (TROJAN 1974). Z Pienin wymienia go NOWICKI (1873).

Dwa samce tego gatunku złowiono 3 czerwca w Krościenku „na światło”.

4. *Beris morrissi* DALE, 1842

Zamieszkuje całą Europę i Amerykę Północną. Z Polski wymieniany z kilku miejscowości (TROJAN 1974).

W Pieninach złowiono dwie samice: jeden okaz w czerwcu „na światło”, drugi w lipcu na łące pod Trzema Koronami.

Rodzaj *Acanthomyia* SCHINER, 1860

5. *Acanthomyia dubia* (ZETTERSTEDT, 1840)

Gatunek borealno-górski, występuje w Europie oraz w Ałtaju. W Polsce znany dotychczas z południowej części kraju: Sudetów, Dolnego Śląska, Ojcowa i Tatr (TROJAN 1974).

W Pieninach złowiono na początku lipca dwie samice: jedną na murawie naskalnej w Wąwozie Sobczańskim, drugą na młace.

Rodzaj *Actina* MEIGEN, 1804

6. *Actina nitens* (LATREILLE, 1809)

Występuje w środkowej i południowej Europie. Z Polski znany dotychczas z trzech stanowisk: Dolnego Śląska i Doliny Nidy (TROJAN 1974) oraz Bieszczadów (BAŃKOWSKA 1971), gdzie występuje masowo w maju na wilgotnych łąkach w piętrze pogórza.

W Pieninach poławiany dość licznie na początku czerwca na łące pienińskiej.

Podrodzina *Stratiomyinae*

Rodzaj *Stratiomys* GEOFFROY, 1764

7. *Stratiomys potamida* MEIGEN, 1822

Zamieszkuje całą Europę. W Polsce znany dotychczas z Pomorza, Pojezierza Mazurskiego i Dolnego Śląska (TROJAN 1974).

Jednego samca złowiono 26 czerwca w buczynie ciepłolubnej.

8. *Stratiomys chameleon* (LINNAEUS, 1758)

Występuje w Europie, Azji Środkowej i zachodniej części Syberii. W całej Polsce pospolity. Z Pienin wykazał go TROJAN (1974).

Poławiany dość licznie od czerwca do września na łąkach pienińskich i łące ziołoroślowej.

Rodzaj *Odontomyia* MEIGEN, 1803

9. *Odontomyia hydroleon* (LINNAEUS, 1761)

Zamieszkuje całą Europę, południową część Syberii i Chiny. W całej Polsce pospolity. Z Pienin wymienia go TROJAN (1974).

Dość licznie poławiany od czerwca do końca sierpnia na łąkach pienińskich, łące zióloroślowej i w buczynie ciepłolubnej.

Podrodzina *Clitellariinae*

Rodzaj *Clitellaria* MEIGEN, 1803

10. *Clitellaria ephippium* (FABRICIUS, 1775)

Gatunek europejski, rzadko poławiany. Z Polski wymieniany z kilku stanowisk na Pomorzu, Pojezierzu Mazurskim oraz w południowej części kraju (TROJAN 1974).

W Pieninach złowiono 14 czerwca jedną samicę w Krościenku.

Rodzaj *Oxycera* MEIGEN, 1803

11. *Oxycera trilineata* (FABRICIUS, 1781)

Zamieszkuje całą Europę, Azję Mniejszą i Afrykę Północną. Z Polski wymieniany z wielu miejscowości (TROJAN 1974).

W Pieninach złowiono jeden okaz samicy 7 lipca na murawie kserotermicznej na Flakach koło Czorsztyna.

Podrodzina *Geosarginae*

Rodzaj *Microchrysa* LOEW, 1855

12. *Microchrysa polita* (LINNAEUS, 1758)

Zamieszkuje Holarktykę. W całej Polsce pospolity.

W Pieninach poławiany w ciągu czerwca i lipca na młacie, murawie kserotermicznej w Wąwozie Sobczańskim i w Krościenku „na światło”.

Rodzaj *Geosargus* BEZZI, 1907

13. *Geosargus cuprarius* (LINNAEUS, 1758)

Gatunek holarktyczny. W całej Polsce pospolity. Z Pienin wymienia go NOWICKI (1873).

Poławiany w czerwcu i lipcu w buczynie ciepłolubnej, na łące zióloroślowej i w Krościenku „na światło”.

Rodzaj *Chloromyia* DUNCAN, 1837

14. *Chloromyia formosa* (SCOPOLI, 1863)

Występuje w całej Europie, na Kaukazie, w Azji Środkowej i w Azji Wschodniej. W Polsce wszędzie pospolity. Z Pienin wykazał go TROJAN (1974).

W Pieninach masowo poławiany od czerwca do września na wszystkich badanych stanowiskach.

Instytut Zoologii PAN
00-950 Warszawa, Wilcza 64

PIŚMIENNICTWO

- BAŃKOWSKA R. 1971. *Stratiomyidae (Diptera)* Bieszczadów. Fragm. faun., Warszawa, 17: 395-400.
- GRZEGORZEK A. 1873. Uebersicht der bis jetzt in der Sandezer Gegend West-Galiziens gesammelten Dipteren. Verh. zool.-bot. Ges., Wien, 23: 1-12.
- NOWICKI M. 1873. Beiträge zur Kenntniss der Dipterenfauna Galiziens. Krakau, 35 pp.
- TROJAN P. 1963. *Stratiomyidae*. Klucze do oznaczania owadów Polski, XXVIII, 22. Warszawa, 72 pp., 144 ff.
- TROJAN P. 1974. Przegląd faunistyczny *Stratiomyidae (Diptera)* Polski. Fragm. faun., Warszawa, 20: 15-28.

РЕЗЮМЕ

[Заглавие: *Stratiomyidae (Diptera)* Пенинов]

В работе представлен список 14 видов, из которых 9 являются новыми для фауны Пенинов.

ZUSAMMENFASSUNG

[Titel: *Stratiomyidae (Diptera)* der Pieninen]

Die vorliegende Arbeit enthält ein Verzeichnis der 14 in den Pieninen gefundenen Arten, unter denen 9 neu für das untersuchte Gebiet erscheinen.

Redaktor pracy — prof. dr A. Riedel