







4998

4.1.

~~БИБЛИОТЕКА ЗООЛОГ. КАБ.  
Варшавского Университета.  
Инвент. кат. № 4998  
Сост. кат. № 860~~

~~INVENTARZ  
1895 12-11~~

K.4.125

<http://rcin.org.pl>



БИБЛИОТЕКА ЗООЛОГ. КАБ.

Варшавского Университета.

Инвент. карт. № 4998

Сот. карт. № 860

CAROLI A LINNÉ  
SYSTEMA  
NATURAE.

---

TOM. I. PARS IV.

*Dr. de Sarsch*



PAŃSTWOWE  
MUZEUM ZOOLOGICZNE  
BIBLIOTEKA  
Nr. K. 4125

CAROLI LINNÆ  
SYSTEMA  
NATURÆ

---

TOM I. PART IV.



CLASSIS V.  
I N S E C T A.

*In his tam parvis, atque tam nullis*

*Quae ratio? quanta vis!*

*Quam inextricabilis perfectio!*

PLIN. XI. 2.

ANIMALCULA polyпода, *spiraculis* lateralibus respirantia, *cute* cataphracta aut pilis hirta; *antennis* mobilibus sentientibus instruuntur.

CORPUS horum dividitur in *caput*, *truncum*, *abdomen*, *artus*.

CAPUT plerisque distinguendum *instruitur* cerebro minuto, oculis, antennis, saepius ore; *destituitur* naribus, auribus, etsi, nonnullis certe, evidenter competat olfactus et auditus.

*Oculi* plerisque bini. absque palpebris, simplices parvi, aut compositi magni hemisphaerici vel polyedri, rarius mobiles aut stipitati; his vident colores.

*Antennae* binae, articulae, sensu tactus, ut videtur, instructae, sunt *setaceae*, *filiformes*, *moniliformes*, *clavatae*, *capitatae*, *fissiles*, *pectinatae*, *barbatae*, corpore breviores, longiores, mediocres.

*Palpi* articulati, ori affixi, plerisque quatuor s. sex: articulis 2, 4, 3.

*Os* paucioribus nullum, plurimis sub capite, quibusdam in pectore; *rostris*, *labio*, *maxillis* transversis ad latera mobilibus, *dentibus*, *lingua*, *palato*.

*Stemmata* verticis puncta tria elevata nitida.

TRUNCUS, inter caput et abdomen, pedatus, *thorace* supra dorso, posteriorius *scutello*, subtus *pectore sternoque*.

ABDOMEN ventriculo, intestinis, visceribusque foetum, incisuris 5, annulatum, *spiraculis* porosis lateribus pertusum, supra *tergo*, subtus *ventre*, posteriorius *ano* terminatum.

ARTUS sunt *cauda*, *pedes*, plurimisque *alae*.

*Cauda* abdomen terminans, est vel *solitaria*, vel *bicornis*; simplex vel armata *forcipe*, *furca*, *seta* vel *aculeo* simplici vel composito, laevi vel serrato.

Fffff

*Pedes*

*Pedes* trunci *femoribus*, *tibiis*, *plantae tarsis*, *digitorum unguibus*; manus (*chela*) nonnullis, simplex pollice mobili; posteriores pro usu *saltatorii*, *cursorii*, *natorii*.

*Alae* duae vel quatuor sunt vel *planae*, *plicatiles*, *erectae*, *patentes*, *incumbentes*, *deflexae* vel *reversae*, *dentatae*, *caudatae*, *reticulatae*, *maculis*, *fasciis*, *strigis*, *lineis*, *punctis* pictae, vel *stigmatibus* notatae, *ocellis* ornatae, idque vel in *primoribus* vel in *secundariis*, tam in *pagina superiore*, quam *inferiore*.

*Elytra* (alae superiores) crustacea bina, saepius mobilia, *truncata*, *spinosa*, *ferrata*, *scabra*, *friata*, *porcata*, *fulcata*, *punctata*, tegentia alas inferiores. *Hemelytra* media quasi alas inter et *elytra*.

*Halteres* sub alis dipterorum ex petiolo capitati.

SEXUS *Mas* et *Femina* generant perfecta.

*Neutra* nonnullis (formicae, vespa, api) societate foederatis.

METAMORPHOSIS plurimis triplex, mutanda structura, exutis ovi tunicis, una post alteram.

OVUM sub minima mole vesicaria excluditur.

LARVA (Eruca) succosa, mollior, major, aptera, sterilis, tardior, interdum apus, saepeque polypus, vorax alimento proprio.

PUPA (Nympha, Chrysalis) ficcior, coarctata, durior, *nuda* vel *folliculata*, saepe sine ore, vel *pedata* 1. 2. 3. vel *apus* 4. 5.

1. *completa*, omnibus partibus agilis (aranae, acarus, oniscus.)
2. *semicompleta* solis alarum rudimentis (gryllus, cicada, cimex, libellula, ephemera.)
3. *incompleta*, alis pedibusque immobilis (apis, formica, tipula.)
4. *obtecta*, thorace abdomineque distincto corticata (lepidoptera, caque vel *nuda*, vel folliculata.)
5. *coarctata* intra globum (musca, oestrus).

IMAGO revelata, declarata, perfecta generans, agilis, antennis instructa.

triplex itaque structura et cognitio ejusdem animalis.

HAEC

---

*Verbositas, praesente seculo calamitas artis insectorum, ut pauciloquium vermium.*

**HAEC** *muta*, nisi alio proprio instrumento, tympano thoracico, alisve sonora; *surda*, (pleraque,) stridorem aetheris licet percipiant; *plura* ubique plantarum speciebus, sed ob regionem sibi magis patentem in orbe pauciora, *tropica*, *arctica* et *antarctica*; singula demum *minima*, annua, exceptis aquaticis aliisque paucioribus, sed universa maximae molis animantia, effectuque pariter maxima, et magis occulto magisque disperso, ideoque minus coercendo; totidem enim sunt naturae annui ministri, propriis negotiis peragendis praefixi, quot muniis sufficiant, proportionem inter plantas servando, erronea, superflua, mortua, putrida, consumendo, aliis demum, inprimis avibus in alimentum cedendo.

**HABITANT** insecta in iis tantum plantis, e quibus (non in quibus,) visitant, unde saepius nomina *trivialia* optima, ut ars cum *politia naturae* combinatur; aliis alia muneribus praefixa praeparant, purgant, destruunt necessaria.

**ENTOMOLOGI** praestantiores delineando figuras, designando attributa et characteres, disponendo ordines inclaruere.

Veteres *Mouffet*, *Aldrovandi*, *Jonston*, *Rai*.

Metamorphosii *Goedart*, *Meriana*, *Albin*, *Frisch*, *Roefel*, *Wilkes*, *Kleemann*, *Ammiral*, *Harris*.

Philosophi *Swammerdam*, *Lesser*, *Reaumur*, *de Geer*, *Bonnet*, *Lyonnet*, *Goeze*, *Koch*.

Iconographi *Clerck*, \*) *Sepp*, *Roefel*, *Hoeffnagel*, *Bradley*, *Robert*, *Petiver*, *Schaeffer*, *Voet*, *Fuessli*, *Hollar*, *Amiral*, *Drury*, *Cramer*, *Esper*, *Knoch*, *Jablonsky*, *Bergstraeffer*, *Herbst*, *Capieux*.

Descriptores *Rai*, *Fauna suecica* (edit. 2. *Holm*. 1761. 8.) *Museum Reginae Holm*. 1764. *Koelreuter*, *Pallas*, *Thunberg*, *Schranck*, *a Laicharting*, *Schreber*, *J. R. Forster*, *Pollich*, *Lang*, *Harrer*, *Bjercander*, *Knoch*, *Schaller*, *Scriba*, *Schroeter*, *Mayer*.

Monographi *Lister*, *Schaeffer*, *Clerck*, *v. Gleichen*, *O. Fr. Müller*, *Herbst*, *Kob*, *Loschge*, *Panzer*.

Systematici *Systema naturae*, *Poda*, *Sulzer*, *Geoffroi*, *Scopoli*, *Gronovius*, *T. Bergmann*, *de Geer*, *Schluga*, *Brünnich*, *Schiefermüller*, *Fabricius*.

\*) Clerckii icones insectorum pulcherrimum opus, quod Academia Regia Scientiarum Holmiensis ab interitu vindicavit.

ORDINES insectorum ab alis defuncti.

Alae 4	{	Superiores	crustaceae futura recta	-	<i>Coleoptera</i>	1.	
			semicrustaceae incumbentes	-	<i>Hemiptera</i>	2.	
	{	Omnes	imbricatae squamis	-	<i>Lepidoptera</i>	3.	
			membranaceae				
				ano	{		
					inermi	<i>Neuroptera</i>	4.
					aculeato	<i>Hymenoptera</i>	5.
Alae 2, halteres loco posteriorum						<i>Diptera</i>	6.
Alae 0 f. absque alis et elytris						<i>Aptera</i>	7.

CHA-

*Quaeso ne haec legentes,  
 quoniam in his spernunt multa,  
 etiam relata fastidio damnent,  
 cum in contemplatione naturae  
 nil possit videri supervacaneum.*

PLIN.

CHARACTERES INSECTORUM.

I. COLEOPTERA.

\* *Antennis clavatis extrorsum incrassatis.*

a) *clava lamellata.*

189. SCARABAEUS. *Tibiae anteriores dentatae.* . . . . . 1526.  
 190. LUCANUS. *Penicilli duo sub labio palpigeri.* . . . . . 1538.

b) *clava perfoliata.*

191. DERMESTES. *Caput inflexum sub thorace vix marginato.* 1592  
 MELYRIS. *Labium clavatum, emarginatum.* . . . . . 1604.  
 195. BYRRHUS. *Labium porrectum, bifidum.* . . . . . 1612.  
 196. SILPHA. *Thorax et elytra marginata.* . . . . . 1615.  
 TRITOMA. *Palpi anteriores securiformes.* . . . . . 1634.  
 HYDROPHILUS. *Maxilla bifida.* . . . . . 1941.

c) *clava solida.*

193. HISTER. *Caput retractile intra thoracem.* . . . . . 1608.  
 PAUSUS. *Antennae biarticulatae: clava uncinata.* . . . . . 1737.  
 BOSTRICHUS. *Caput inflexum sub thorace vix marginato.* . . . . . 1600.  
 ANTHRENUS. *Maxilla bifida.* . . . . . 1614.  
 NITIDULA. *Thorax et elytra marginata.* . . . . . 1628.  
 198. COCCINELLA. *Palpi anteriores securiformes, posteriores fili-*  
*formes.* . . . . . 1644.  
 202. CURCULIO. *Rostrum elongatum corneum.* . . . . . 1740.

\*\* *Antennis moniliformibus.*

- BRENTUS. *Rostrum elongatum, corneum, rectum.* . . . . . 1739.  
 203. ATTELABUS. *Rostrum elongatum, incurvum.* . . . . . 1809.  
 ERODIUS. *Labium corneum, emarginatum.* . . . . . 2012.  
 217. STAPHYLINUS. *Elytra dimidiata, alas tegentia. Vesiculae 2*  
*supra caudam exferendae.* . . . . . 2025.  
 SCAURUS. *Labium truncatum, integrum.*  
 ZYGIA. *Labium elongatum, membranaceum.* . . . . . 1738.  
 215. MELOE. *Thorax subrotundus. Caput gibbum, inflexum.* 2017.  
 214. TENEBRIO. *Thorax marginatus. Caput exsertum. Corpus* 1993.  
*oblongum.*  
 197. CASSIDA. *Corpus ovatum. Elytra marginata. Caput te-*  
*ctum clypeo.* . . . . . 1635.  
 OPATRUM. *Thorax et elytra marginata.* . . . . . 1631.

Fffff 3

216.

216. MORDELLA. *Laminae ad basin abdominis. Caput inflexum.* 2022  
 199. CHRYSOMELA. *Corpus ovatum, immarginatum.* . . . 1667.  
 HORIA. *Palpi inaequales. Maxilla bifida. Labium rotundatum.* . . . . . 1888.
- \*\*\* *Antennis filiformibus.*
- APALUS. *Thorax subrotundus. Caput gibbum, inflexum.* 1738  
 MANTICORA. *Maxillae exsertae, dentatae. Oculi prominuli.* 292  
 PIMELIA. *Thorax marginatus. Caput exsertum. Corpus oblongum.* . . . . . 2000.
194. GYRINUS. *Antennae rigidulae. Oculi 4.* . . . 1611.  
 CUCUJUS. *Labium breve, bifidum: laciniis distantibus.* 1889.  
 CRYPTOCEPHALUS. *Corpus ovatum, immarginatum.* 1700.
201. BRUCHUS. *Antennae extrorsum crassiores.* . . . 1734.  
 192. PTINUS. *Thorax caput recipiens. Antennae articulis ultimis longioribus.* . . . . . 1604.
200. HISPA. *Antennae porrectae, approximatae, fusiformes.* 1732.  
 211. BUPRESTIS. *Caput dimidium intra thoracem retractum.* 1926.  
 206. NECYDALIS. *Elytra dimidiata: alis nudis.* . . . . 1878.  
 207. LAMPYRIS. *Elytra flexilia. Thoracis clypeus caput obumbrans recipiensque.* . . . . . 1882.
208. CANTHARIS. *Elytra flexilia. Abdomen lateribus plicato-pappiliformi.* . . . . . 1890.
- NOTOXUS. *Labium bifidum: laciniis conniventibus obtusis.* 1813.  
 209. ELATER. *Pectoris mucro e poro abdominis resiliens.* 1901.  
 CALOPUS. *Thorax ad latera mucronato-callosus.* 1865.  
 ALURNUS. *Maxilla fornicata.* . . . . . 1666.
213. CARABUS. *Thorax obcordatus, posterius truncatus.* 1959.  
 LYTTA. *Thorax subrotundus. Caput gibbum, inflexum.* 2013.

\*\*\*\* *Antennis setaceis.*

- SERROPALPUS. *Palpi anteriores profunde ferrati.* . . . 1901.  
 204. CERAMBYX. *Thorax ad latera mucronato-callosus.* 1814.  
 205. LEPTURA. *Elytra apice attenuata. Thorax teretiussculus.* 1866.  
 RHINOMACER. *Antennae rostro insidentes.* . . . . . 1809.  
 ZONITIS. *Labium emarginatum.* . . . . . 1738.
210. CICINDELA. *Maxillae exsertae dentatae. Oculi prominuli.* 1919.  
 212.

Genera naturalia auctorum, metamorphosi demonstranda, vitam scientiae largiuntur.

Genera falsa vitonum, ex ludicro principio deducta totidem foetidissimis ulceribus artem pulcherrimam commaculant.

212. DYTICUS. *Pedes posteriores ciliati, natatorii.* . . . . 1944.  
 218. FORFICULA. *Elytra dimidiata: alis testis, Cauda forcipata,* 2039

## II. HEMIPTERA.

219. BLATTA. *Os maxillosum. Alae coriaceae, planae. Pedes cursorii.* . . . . 2041  
 PNEUMORA. *Os maxillosum. Alae membranaceae, deflexae. Pedes cursorii. Corpus cavum, inflatum, diaphanum.* . . . . 2047.  
 220. MANTIS. *Os maxillosum. Pedes anteriores ferrati: ungue unico.* . . . . 2048  
 221. GRILLUS. *Os maxillosum. Pedes posteriores saltatorii.* 2056  
 222. FULGORA. *Rostrum inflexum. Frons producta, inermis. Antennae capitatae.* . . . . 2089.  
 223. CICADA. *Rostrum inflexum. Pedes posteriores saltatorii.* 2092  
 224. NOTONECTA. *Rostrum inflexum. Pedes posteriores natatorii (ciliati.)* 2118  
 225. NEPA. *Rostrum inflexum. Pedes anteriores cheliferi.* 2120.  
 226. CIMEX. *Rostrum inflexum. Pedes cursorii. Antennae thorace longiores.* 2123  
 MACROCEPHALUS. *Rostrum inflexum. Antennae brevissimae.* 2201  
 227. APHIS. *Rostrum inflexum. Abdomen bicornae.* . . . . 2201  
 228. CHERMES. *Rostrum pectorale. Pedes posteriores saltatorii.* 2211  
 229. COCCUS. *Rostrum pectorale. Abdomen (maribus) posteriorius fetosum.* . . . . 2215.  
 230. THRIPS. *Rostrum obsoletum. Alae incumbentes abdomini reflexili.* . . . . 2222.

## III. LEPIDOPTERA.

231. PAPILIO. *Antennae extrorsum crassiores. Alae erectae.* 2225  
 232. SPHINX. *Antennae medio crassiores.* 2271  
 233. PHALAENA. *Antennae introrsum crassiores.* 2290.

## IV. NEUROPTERA.

234. LIBELLULA. *Cauda forcipata. Os multi-maxillosum. Alae extensae.* 2619.  
 235. EPHEMERA. *Cauda fetis 2-3. Os edentulum. Alae erectae.* 2626.  
 238. MYRMELEON. *Cauda forcipata. Os bidentatum. Alae deflexae.* 2692.  
 236. PHRYGANEA. *Cauda simplex. Os edentulum. Alae deflexae.* 2631.  
 237. HEMEROBIUS. *Cauda simplex. Os bidentatum. Alae deflexae.* 2638.  
 239. PANORPA. *Cauda chelata. Os rostratum. Alae incumbentes.* 2645.  
 240. RAPHIDIA. *Cauda filo 1. Os bidentatum. Alae deflexae.* 2647.

## V. HYMENOPTERA.

241. CYNIPS. *Aculeus spiralis!* 2699  
 242. TENTREDO. *Aculeus ferratus! bivalvis.* 2658  
 243. SIREX. *Aculeus ferratus sub abdominis spina terminali.*  
 244. ICHNEUMON. *Aculeus exsertus! triplex.* 2074 (2071)  
 245. SPHEX. *Aculeus punctorius. Alae planae. Lingua inflexa trifida.* 2723  
 SCOLIA. *Lingua inflexa, trifida. Labium apice membranaceum.* 2735 (2739)  
 THYNNUS. *Lingua brevissima, involuta. Labium trifidum.*  
 LEUCOSPIS. *Labium maxilla longius emarginatum. Antennae clavatae.* 2739  
 TIPHIA. *Labium breve, corneum, tridentatum.* 2740  
 CHALCIS. *Antennae breves, cylindricae, fusiformes.* 2742  
 246. CHRYSIS. *Aculeus punctorius. Abdomen subtus fornicatum.* 2744 (2748)  
 247. VESPA. *Aculeus punctorius. Alae superiores plicatae!*  
 248. APIS. *Aculeus punctorius. Lingua inflexa!* 2776  
 249. FORMICA. *Aculeus obsoletus. Alae neutris nullae!* 2797  
 250. MUTILLA. *Aculeus punctorius. Alae neutris nullae.* 2805

## VI. DIPTERA.

\* *proboscide et haustello.*

- DIOPSIS. *Caput bicorne: oculis terminalibus.* 2829  
 252. TIPULA. *Haustrillum sine vagina. Palpi 2 porrecti, filiformes.* 2812  
 253. MUSCA. *Haustrillum sine vagina, fetis instructum.* 2829  
 254. TABANUS. *Haustrillum vagina univalvi fetisque instructum.*  
 256. EMPIS. *Proboscis inflexa.* 2889 (2881)  
 257. CONOPS. *Proboscis porrecta, geniculata.* 2893

\*\* *haustello sine proboscide.*

251. OESTRUS. *Haustrillum retractum intra labia connata, poro pertusa.* 2809  
 258. ASILUS. *Haustrillum rectum, bivalve, basi gibbum.* 2845  
 STOMOXY. *Haustrillum vagina univalvi convoluta, basi geniculata.* 2891  
 255. CULEX. *Vagina exserta, univalvis, flexilis: fetis 5.* 2886  
 259. BOMBYLIUS. *Haustrillum longissimum, rectum, fetaceum, bivalve.* 2902  
 260. HIPPOBOSCA. *Haustrillum breve, cylindricum, rectum, bivalve.* 2909



## VII. APTERA.

\* *Pedibus sex, capite a thorace discreto.*

261. LEPISMA. Cauda fetis exsertis. 2906.  
 262. PODURA. Cauda bifurca, inflexa, faltatrix. 2907  
 263. TERMES. Os maxillis duabus. Labium corneum, quadri-  
 fidum. 2917.  
 264. PEDICULUS. Os aculeo exserendo. 2914.  
 265. PULEX. Os rostro inflexo cum aculeo. Pedes faltatorii. 2925.

\*\* *Pedibus 8-14, capite thoraceque unitis.*

266. ACARUS. Oculi 2. Pedes 8. Palpi compressi. 2924.  
 HYDRACHNA. Oculi 2-8. Pedes 8 in anteriore corporis parte.  
 Papillae textoriae. 2935.  
 268. ARANEA. Oculi 8. Pedes 8. Papillae textoriae. Palpi  
 clavati. 2946.  
 267. PHALANGIUM. Oculi 4. Pedes 8. Palpi chelati. 2942.  
 269. SCORPIO. Oculi 8. Pedes 8. Palpi chelati. 2961.  
 270. CANCER. Oculi 2. Pedes 10: primo chelato. 2963.  
 271. MONOCULUS. Oculi 2. Pedes 12: decem chelatis. 2996.  
 272. ONISCUS. Oculi 2. Pedes 14. 3009.

\*\*\* *Pedibus pluribus, capite a thorace discreto.*

273. SCOLOPENDRA. Corpus lineare. 3015.  
 274. JULUS. Corpus subcylindricum. 3016.

## I. CO.

---

*In nova fert animus mutatas dicere formas  
 corpora.*

---

## I. COLEOPTERA.

*Elytra alas tegentia.*

189. SCARABAEUS. *Antennae clavatae : clava lamellata.*

*Palpi 4.*

*Mandibula cornea subedentula.*

*Tibiae anteriores saepius dentatae.*

♂ *palpis filiformibus.*

† *mandibula arcuata.*

a) *plane edentula*, Scarabaei Fabricii.

β) *thorace cornuto.*

α) *scutellati.*

Hercules. I. Sc. thoracis cornu incurvo maximo : subtus barbato unidentato, capitis recurvato : supra multidentato. *Mus. Lud. Ulr. 3. Gronov. zooph. 412. Jablonsk. Kaef. I. t. 1. f. 1. 2. Voet coleopt. t. 12. f. 98. Drury inf. I. t. 30. f. 1. 2. Aubent. misc. t. 41. f. 2. Fabric. spec. inf. I. p. 4. n. 1. mant. inf. I. p. 3. n. 1.*

*Marcgr. bras. 247. f. 3. Taurus volans f. Eruma.*

*Fonst. inf. t. 16. f. 1.*

*Olear. mus. t. 16. f. 1.*

*Petiv. gazoph. t. 70. f. 1. Rhinoceros americanus cinereus, rostro nigro nitente.*

*Edw. glean. t. 334.*

*Grew mus. 162.*

*Roef. inf. 11. Kaef. I. t. A. f. 1. inf. IV. p. 45. t. 5. f. 3.*

*Degeer inf. 4. p. 304. n. 2. t. 18. f. 9. Scarabaeus scutellatus niger &c.*

*Habitat in America, varians elytris piceis et glaucis nigropunctatis.*

*Femina mutica.*

Alcides. 91. Sc. thoracis cornu incurvo subtus barbato unidentato, capitis recurvato mutico. *Fabr. spec. inf. I. p. 4. n. 2. mant. inf. I. p. 3. n. 2.*

*Habitat in India, Hercule duplo minor, an ejus varietas?*

2. Sc.

- Gideon. 2. Sc. thoracis cornu incurvo maximo subtus laevi apice bifido, capitis recurvato supra unidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 4. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 3. n. 3. *Gron. zooph.* 413. *Voet coleopt. t.* 12. f. 100. *Jablonsk. Kaef.* 1. t. 1. f. 3.  
*Edw. av. t.* 40.  
*Roef. inf.* 2. *Kaef.* 1. t. A. f. 5.  
*Swammerdam bibl. nat. t.* 30. f. 2.  
*Aubent. misc. t.* 40. f. 3.  
*Habitat in America australi et India, an vere a praecedentibus diversus?*
- Centaurus. 92. Sc. thoracis cornu incurvo basi bidentato apice bifido, capitis recurvato unidentato. *Fabric. sp. inf.* 1. p. 5. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 3. n. 4. *Jablonsk. Kaef.* 1. t. 2. f. 1.  
*Drury inf.* 1. t. 36. f. 1. Scarabaeus Gideon.  
*Habitat in India et Africa.*
- Oromedon. 93. Sc. thoracis cornu brevi emarginato, capitis recurvato bifido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 5. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 5.  
*Drury inf.* 1. t. 36. f. 5. *Aubent. misc.* 1. t. 40. f. 4.  
*Voet coleopt. t.* 13. f. 102. *Jablonsk. Kaef.* 1. t. 2. f. 2.  
*Habitat in America australi et India.*
- Aegeon. 94. Sc. rufus, thoracis cornu brevi incurvo subtus barbato, capitis recurvo subulato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 5. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 6. *Drury inf.* 2. t. 30. f. 5. *Jablonsk. Kaef.* 1. t. 1. f. 4.  
*Habitat in America australi et India.*
- dispar. 95. Sc. cornu (in mare) thoracis subulato protenso, capitis subulato subrecurvo, scutello cordato. *Fabric. sp. inf.* 1. p. 5. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 7. *Jablonsk. Kaef.* 1. t. 2. f. 3. 4.  
*Pall. it.* 1. p. 461. Scarabaeus polyceros.  
*Pall. it.* 3. p. 707. *ic. inf. Russ. indig.* 1. t. A. f. 8. A. B.  
*Habitat in regionibus Russici imperii magis australibus, ater, stercorarii magnitudine.*  
*Feminae nec thorax, nec caput cornutum, sed utrumque antrosum bidentatum.*
- Chorinae us. 96. Sc. thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido, capitis longiori recurvo bifido. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 6. n. 8. *mant.* 1. p. 4. n. 8. *Voet coleopt. t.* 13. f. 104. *Jablonsk. Kaef.* 1. t. 2. f. 5.  
*Habitat in Brasilia, pani affinis.*

- dichotomus. 89. *Sc. thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis.* *Mant.* 1. 529. *Fabr. spec. inf.* 1. p. 6. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 9. *Fablonsk. Kaef.* 1. t. 2. f. 6. *Aubent. misc. t.* 40. f. 5. *Voet coleopt. t.* 14. f. 107. *Sulz. hist. inf. t.* 1. f. 1. *Habitat in America australi et India.*
- claviger. 90. *Sc. rufus, thoracis cornu elevato, capitis fubulato recurvo.* *Mant.* 1. 529. *Fabr. spec. inf.* 1. p. 6. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 10. *Aubent. misc.* 1. t. 40. f. 1. *Drury inf.* 3. t. 48. f. 3. *Voet coleopt. t.* 14. f. 108. *Habitat in America australi et India.*
- hastatus. 97. *Sc. thoracis cornu brevi fornicato hastato subtus hirto, capitis recurvo.* *Fabr. spec. inf.* 1. p. 6. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 11. *Habitat in America meridionali.*
- Enema. 98. *Sc. thoracis cornu incurvo simplici basi crassissimo, capitis recurvo bifido.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 6. n. 12. *Habitat in India, pani affinis.*
- Pan. 99. *Sc. thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido, capitis recurvo unidentato.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 6. n. 12. *mant.* 1. p. 4. n. 13. *Habitat in America australi et India.*
- Jafon. 100. *Sc. thoracis cornu crassissimo apice emarginato, capitis unidentato trifido.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 15. *Fablonsk. Kaef.* 1. t. 3. f. 3. *Swammerd. bibl. nat. t.* 30. f. 5. *Voet coleopt. t.* 13. f. 103. *Aubent. misc. t.* 15. f. 4. *Habitat in Sina, Chorinaeo affinis.*
- validus. 101. *Sc. thorace antierius retuso: cornu conico brevissimo, capite bituberculato.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 16. *Habitat in Brasilia, rhinocerotis magnitudine.*
- truncatus. 102. *Sc. thorace retuso, cornu brevi truncato, capite mutico.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 7. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 4. n. 17. *Habitat in nova Seelandia, nascicornis magnitudine.*

- Eurytus. 103.** Sc. thorace anterieus retuso: cornu brevi incumbente emarginato, capite mutico. *Fabr. sp. inf. 1. p. 7. n. 17. mant. inf. 1. p. 5. n. 18.*  
*Habitat in America, niger.*
- Aetacon. 3.** Sc. glaber, thorace bicorni, capitis cornu unidentato apice bifido, elytris laevibus. *Mus. Lud. Ulr. 4.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 7. n. 18. mant. inf. p. 5. n. 19. Jablonsk. Kaef. 1. t. 3. f. 4.*  
*Marcgr. bras. 246. Enema.*  
*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. A. f. 2.*  
*Swammerd. bibl. nat. t. A. f. 2.*  
*Petiv. gazoph. t. 15. f. 12.*  
*Seb. mus. 4. t. 90. f. 3. 4.*  
                                   91. f. 3.  
*Aubent. misc. t. 5. f. inf.*  
*Voet coleoptr. t. 16. f. III. 112.*  
*Meriau. sur. t. 72.*  
*Huffn. pict. 1. t. 1.*  
*Habitat in America, omnium haecenus cognitorum insectorum, cancris monoculisque exceptis, maximum.*  
*Thoracis cornua antrorsum versa, conica.*
- Simfon. 4.** Sc. thorace bicorni, capitis cornu apice bifido, clypeo denticulato. *Mus. Lud. Ulr. 5.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 8. n. 19. mant. inf. 1. p. 5. n. 20.*  
*Habitat in America australi et India, aetaconi affinis, at quadruplo minor, supra laevis, piceus.*  
*Caput anterieus bidentatum; thoracis cornua lanceolata, porrecta, non capite, sed cornu capitis longiora.*
- Elephas. 104.** Sc. villosus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido. *Fabr. sp. inf. 1. p. 8. n. 20. mant. inf. p. 5. n. 21.*  
*Olear. mus. t. 16. f. 2.*  
*Habitat in Guinea, aetaconi affinis, at villosus.*
- Boas. 105.** Sc. thorace retuso excavato bidentato, capitis cornu recurvo simplici. *Fabr. sp. inf. 1. p. 8. n. 21. mant. inf. 1. p. 5. n. 22.*  
*Habitat ad Sierra Leona.*
- Coryphaeus. 106.** Sc. thorace bicorni, corpore ferrugineo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 8. n. 22. mant. inf. 1. p. 5. n. 23.*  
*Habitat ad caput bonae spei, vernalis magnitudine et statura.*

**bicornis.** 107. Sc. thorace bicorni, capitis cornu recurvo unidentato, elytris rufis. *Lesk. Anf. der Naturg.* 1. t. 9. f. 1. *Fablonk. Kaef.* 1. t. 4. f. 1. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 5. n. 24. *Aubent. misc. t.* 15. f. 2.  
*Habitat in America meridionali, nasicornis magnitudine.*

**Tityus.** 5. Sc. thoracis cornu intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo. *Amoen. ac.* 6. p. 39. n. 1. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 8. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 26. *Fablonk. Kaef.* 1. t. 4. f. 2. Scarabaeus scutellatus glaucus, thorace tricorni: lateralibus brevissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis cornu recurvato simplicissimo. *Gron. zooph. t.* 14. f. 8. Scarabaeus thorace tricorni laevi: intermedio maximo incurvo subtus barbato, capitis cornu maximo recurvo.

*Aubent. misc.* 1. t. 14. f. 8.

*Voet Kaef. t.* 12. f. 99.

*Degeer inf.* 4. t. 18. f. 10.

*Habitat in America, herculi similis, at parvus.*

*Elytra nunc nigra glauco-maculata, nunc glauca, nigro-maculata.*

**Atlas.** 6. Sc. thorace tricorni: anteriore brevissimo, capitis cornu ascendente. *Mus. Lud. Ulr.* 6.\*

*Fabr. spec. inf.* 1. p. 9. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 27. *Fablonk. Kaef.* 1. t. 4. f. 5.

*Marcgr. bras.* 247. f. 1.

*Edw. av. t.* 105. f. 1.

*Olear. mus. t.* 16. f. 3.

*Merian. surin. in tit.* F. G.

*Swammerd. bibl. t.* 30. f. 3.

*Voet coleopt. t.* 15. f. 109. 110.

*Sulz. inf. t.* 1. f. 1.

*Habitat in America magis australi.*

**Geryon.** 108. Sc. thorace excavato tricorni, lateralibus compressis unidentatis, capitis recurvo simplici. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 9. n. 25. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 28. *Fablonk. Kaef.* 1. t. 4. f. 5. *Drury inf.* 2. t. 30. f. 6.

*Habitat in America australi et India.*

7. Sc.

---

Scarabaeorum larvae hexapodes annulatae, pilosae, abdominis apice vesiculoso, capite corneo instructae, vivunt tranquillae sub terra, plurimae fimo delectantur et pascuntur, cetoniarum ligno putrescente, melolontharum radicibus plantarum; pupae intra glebam quiescentes.

- Aloëus. 7.** Sc. thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite submutico, elytris unistriatis. *Mus. Lud. Ulr. 7.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 9. n. 26. mant. inf. 1. p. 5. n. 29. Jablonsk. Kaef. 1. t. 4. f. 3.*  
*Degeer inf. 4. p. 302. n. 1.* Scarabaeus scutellatus niger, thorace tricorni: intermedio longiori truncato.  
*Roes. inf. 2. Scarab. 1. t. A. f. 6.*  
*Petiv. gazoph. t. 24. f. 10.*  
*Aubent. misc. t. 5. f. 1.*  
*Voet Kaef. t. 18. f. 122. (mas) et t. 19. f. 122. (femina.)*  
*Habitat in America, nasicorni simillimus, at triplo major, tibiis anterioribus quinquedentatis.*
- Antacus. 109.** Sc. thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris laevissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 9. n. 27. mant. inf. 1. p. 6. n. 30. Jablonsk. Kaef. 1. t. 4. f. 4.*  
*Drury inf. 1. t. 34. f. 3.*  
*Habitat in insulis Americae oppositis.*  
*Femina mutica.*
- Syphax. 110.** Sc. thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 10. n. 28. mant. inf. 1. p. 6. n. 31.*  
*Habitat in America, antaeo perquam affinis.*
- Maimon. 111.** Sc. thorace tricorni: cornubus aequalibus brevissimis, elytris laevibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 10. n. 29. mant. inf. 1. p. 6. n. 32.*  
*Habitat in America.*
- Typhoeus. 9.** Sc. thorace tricorni: intermedio minore; lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Mus. Lud. Ulr. 8.\* Gro-nov. zooph. 123.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 10. n. 30. mant. inf. 1. p. 6. n. 33.*  
*Bergstr. Nomencl. 1. p. 26. n. 6. t. 4. f. 6. Jablonsk. Kaef. 1. t. 5. f. 1. 2.*  
*Geoffr. inf. parif. 1. p. 72. t. 1. f. 3.*  
*Raj. inf. 103.* Scarabaeus ovinus 2.  
*Frisch inf. 4. t. 8.* Scarabaeus thorace cornuto.  
*Mouff. inf. 152. f. 2.* Taurocerus.  
*Petiv. gaz. t. 23. f. 3.*  
*Schaeff. icon. t. 5. f. 1. ♀. t. 26. f. 4. ♂.*  
*Degeer inf. 4. t. 10. f. 5.*  
*Voet coleoptr. t. 19. f. 124. 125.*

Ggggg

*Habitat*

*Habitat in Europa, sub stercore bovino sub terra cuniculos profundos fodiens, nidulans, stercorarii magnitudine, ater.*

*Caput depressum, ad latera villosum, angustum; antennarum capitulum subgriseum; thorax glaber, cornubus nunc capiti aequalibus, nunc duplo longioribus, in femina exfolietis; elytra striata; tibiae admodum pilosae.*

**Titanus. II2.** Sc. thorace tricorni: intermedio longiori apice bifido; lateralibus subarcuatis acutis, capite inutico. *Fabr. sp. inf. I. p. 10. n. 31. mant. inf. I. p. 6. n. 34.*

*Sloane jam. 2. p. 205. t. 237. f. 4. 5. Scarabaeus major niger tricornis.*

*Drury inf. I. t. 36. f. 3. 4. Scarabaeus Simfon.*

*Habitat in insulis Americae meridionali oppositis.*

**Oenobarbus. II3.** Sc. thorace tricorni: medio longiori emarginato; lateralibus obtusis, capite bituberculato. *Fabr. sp. inf. I. p. 10. n. 32. mant. inf. I. p. 6. n. 35.*

*Habitat in America, titani statura, sed minor.*

**quadrispinosus. II4.** Sc. thorace retuso: prominentia quadridentata, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf. I. p. 11. n. 36. mant. inf. I. p. 6. n. 38.*

*Habitat in Cayenna, magnus.*

**quadridens. II5.** Sc. thorace quadridentato, capitis clypeo bidentato, corpore ferrugineo. *Fabr. sp. inf. I. p. 11. n. 37. mant. inf. I. p. 6. n. 39.*

*Habitat in India, parvus, gibbus.*

**mobili-cornis. II6.** Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recurvo mobili. *Fabr. spec. inf. I. p. 12. n. 38. mant. inf. I. p. 6. n. 40.*

*Laichart. inf. t. I. f. 11. Fablonsk. Kaef. I. t. 8. f. 6. 7.*

*Habitat in Anglia et Germania, niger.*

*Femina plane mutica; elytra striata.*

**cylindricus. II.** Sc. thorace anterius truncato quinquedentato, capite anterius cornu erecto, corpore cylindrico. *Fn. succ. 380.*

*Laichart. inf. tyr. p. 4. n. 4. Lucanus cylindricus.*

*Scopol. introd. hist. nat. 5. 75. Lucanus tenebrioides.*

*Degeer inf. 4. t. 10. f. 2.*

*Voet coleopr. t. 20. f. 131.*

*Habitat in Europae magis borealis pruno ceraso.*



- Candidae. 409. Sc. thorace excavato antrorsum cornuto tibiis anterioribus tridentatis. *Petagn. spec. inf. Calabr. p. 3. n. 9. f. VI. a. 6.*  
*Habitat in Calabriae ulterioris promontorio Lacinio.*
- β) *exscutellati.*
- violaceus. 117. Sc. totus violaceus, maxillis prominentibus, fronte declivi, thorace sexspinosa. *Lepech. it. 2. p. 208. t. 10. f. 13.*  
*Habitat in Sibiria, sub lapidibus, parvus.*  
*Elytra punctis excavatis insignita.*
- nemestri- 118. Sc. thoracis cornubus duobus porrectis acutis, capitis erecto subulato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 96. mant. inf. 1. p. 11. n. 106.*  
*Degeer inf. 7. p. 637. t. 47. f. 16.* Scarabaeus tricornutus.  
*Habitat ad caput bonae spei, jaccho affinis, subtus hirtus.*
- Oedipus. 119. Sc. thoracis cornu plano subtus dentato, capitis truncato tridentato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 98. mant. inf. 1. p. 11. n. 108.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- splendi- 120. Sc. thoracis aenei cornubus duobus compressis nigris, capitis erecto apice compresso. *Fabr. sp. inf. 1. p. 23. n. 100. mant. inf. 1. p. 12. n. 110.*  
*Habitat in America australi, carnificis magnitudine.*
- festivus. 52. Sc. thorace gibbo bicorni, capitis cornu erecto, elytris rubro-aeneis. *Linm. sp. inf. 1. p. 23. n. 101. mant. inf. 1. p. 12. n. 111.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 552. n. 52. Gron. zooph. 452.* Scarabaeus exscutellatus muticus, thorace nigro-maculato, elytris rubro-aeneis, lterno porrecto.  
*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. B. f. 8. (mas).*  
*Voet coleoptr. t. 23. f. 5. 7.*  
*Degeer inf. 4. t. 8. f. 15.*  
*Drury inf. 3. t. 48. f. 5. (fem.)*  
*Habitat in America, melolonthae magnitudine, at brevior, niger.*
- Pactolus. 121. Sc. thorace bidente, capitis cornu elongato recurvo medio bidentato. *Fabr. mant. 1. p. 12. n. 112.*  
*Habitat in Brasilia, mediae magnitudinis, viridi-aeneus.*

- Pithecius. 122. Sc. thorace bicorni: cornubus brevissimis, capitis cornu erecto subulato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 23. n. 102. mant. inf. 1. p. 12. n. 113.*  
*Habitat in America australi et India.*
- feniculus. 123. Sc. thorace antierius, clypeo posterius bicorni. *Fabr. sp. inf. 1. p. 23. n. 103. mant. inf. 1. p. 12. n. 114.*  
 β) Scarabaeus brevipes. *Herbst apud Fueßl. Arch. Inf. 4. p. 10. n. 35. t. 19. f. 16.*  
*Habitat in Coromandel, bonasi statura.*
- Catla. 124. Sc. thorace antierius bidentato, capitis clypeo lineis duabus elevatis transversis carinatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 12. n. 115.*  
*Habitat in Coromandel, nuchicornis magnitudine et statura, an femina alius speciei?*
- Molossus. 8. Sc. thorace retuso bidentato utrinque impresso, clypeo unicorni lunato integro, elytris laevibus. *Mus. Lud. Ulr. 11.\* Amoen. ac. 6. p. 391.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 26. n. 118. mant. inf. 1. p. 14. n. 134.*  
*Drury inf. 1. t. 32. f. 2.*  
*Schroet. Abb. 1. t. 3. f. 3.*  
*Degeer inf. 4. t. 18. f. 11.*  
*Habitat in Sina, ibi officinalis, cornu dentibusque nunc longioribus nunc brevioribus, feminae nullis.*  
*Femora ovata.*
- Rosalius. 125. Sc. thorace antierius bicorni, posterius elevato tricorni, capitis cornu compresso ferrato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 24. n. 104. mant. inf. 1. p. 12. n. 116.*  
*Habitat in America meridionali.*
- Ammon. 126. Sc. thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris striatis. *Linn. sp. inf. 1. p. 24. n. 105. mant. inf. 1. p. 12. n. 117.*  
*Fabr. syst. entom. p. 21. n. 83. Scarabaeus Silenus.*  
*Habitat in America.*
- Midas. 127. Sc. thorace tricorni, clypeo sinuato bicorni. *Fabr. sp. inf. 1. p. 24. n. 106. mant. inf. 1. p. 12. n. 118.*  
*Habitat in America.*
- Hama-dryas. 128. Sc. thorace tricorni: intermedio plano acuto tridentato, clypeo reflexo bicorni. *Fabr. sp. inf. 1. p. 24. n. 107. mant. inf. 1. p. 12. n. 119.*  
*Voet coleoptr. t. 27. f. 38?*  
*Habitat ad caput bonae spei, niger.*

- lunaris. 10. Sc. thorace bicorni: intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Fn. suec.* 379.\* *Scop. ent. carn.* 22. *Gron. zooph.* 453.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 24. n. 108. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 120.  
*Fn. suec.* 1. p. 341. Scarabaeus thorace submutico, capite lunato, clypeo emarginato.  
*Raj. inf.* 103. Scarabaeus ovinus tertius.  
*Geoffr. inf. parif.* 1. p. 88. n. 1. *Copris capitis clypeo lunulato &c.*  
*Frisch inf.* 4. p. 25. t. 7.  
*Roef. inf.* 2. *scar.* 1. t. B. f. 2.  
*Pet. gaz.* t. 138. f. 4.  
*Schaeff. ic.* t. 63. f. 2. 3. ♂. ♀.  
*Bergstr. nomencl.* t. 1. f. 9. et t. 4. f. 7.  
*Poda mis.* t. 1. f. 1.  
*Voet coleopt.* t. 25. f. 24. 25. et t. 26. f. 26.  
*Habitat in Europae stercoratis, aliquando minor, cornibus minoribus, feminae in thorace constanter nullis.*
- Rhadamistus. 129. Sc. thorace late foveolato; anterius cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis: futura punctisque duobus nigris.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 25. n. 109. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 121.  
*Habitat Tranquebariae.*
- Lar. 130. Sc. thorace tridentato, capitis cornu erecto, clypeo fisso.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 13. n. 124.  
*Habitat in India parvus niger.*
- Faunus. 131. Sc. thorace quadricorni; intermediis brevissimis, capitis cornu recurvo ferrato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 25. n. 112. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 125.  
*Voet coleopt.* t. 24. f. 15.  
*Drury inf.* 3. t. 48. f. 6.  
*Habitat in Cayenna.*  
*Feminae cornua minora: lateralia acuta.*
- capucinus. 132. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recumbente utrinque unidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 25. n. 113. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 126.  
*Habitat in India, carolini magnitudine et statura.*
- Lemur. 133. Sc. thorace quadridentato cupreo, clypeo posterius transverso carinato, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 495. *mant. inf.* 1. p. 13. n. 127.

Ggggg 3

Schaller

*Schaller act. soc. Hal. nat. cur. I. p. 237.* Scarabaeus 10 punctatus.

*Habitat in Germaniae inferioris stercore animali, niger, statura nuchicornis.*

Camelus. 134. Sc. thorace quadridentato, clypeo posterius subbicorni, corpore atro. *Fabr. mant. inf. I. p. 13. n. 128.*

*Habitat in Germania.*

*Femina non mutica.*

Daldorfii. 135. Sc. thorace sexdentato, clypeo rhombeo: centro prominulo, elytris laevibus. *Fabr. mant. inf. I. p. 14. n. 129.*

*Habitat in India, vernalis magnitudine.*

Bison. 27. Sc. thorace anteriorius mucronato, capite cornibus duobus lunaribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 26. n. 115. mant. inf. I. p. 14. n. 131.*

*Habitat in Hispania, et australi Gallia, ater, stercoreario minor.*

*Femina thoracis margine anteriore carinato elevato, mucroneque capitis parvo distincta.*

lagittarius. 136. Sc. thorace anteriorius mucronato, capitis cornu solitario erecto. *Fabr. sp. inf. I. p. 26. n. 116. mant. inf. I. p. 14. n. 132.*

*Habitat ad caput bonae spei.*

bucephalus. 137. Sc. thorace retuso quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni. *Fabr. sp. inf. I. p. 26. n. 117. mant. inf. I. p. 14. n. 133.*

*Habitat in America australi et India.*

lancifer. 13. Sc. violaceus, thorace dentato, capitis cornu angulato, elytris fulcatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 26. n. 119. mant. inf. I. p. 14. n. 135.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 544. n. 13.* Scarabaeus exscutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace inaequali, elytris fulcatis.

*Voet coleoptr. t. 23. f. I. 2.* Scarabaeus violaceus.

*Marcgr. bras. 247.* Taurus.

*Schroet. Abb. I. t. 3. f. 4.*

*Habitat in America australi, et India, mimia minor.*

**Vitulus.** 138. Sc. thorace quadridentato, occipite cornubus duobus erectis brevibus, corpore atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 29. n. 127. mant. inf. 1. p. 15. n. 145.*  
*Habitat in Austria.*  
 Femina mutica.

**Gazella.** 407. Sc. thorace subinermi aeneo, occipite cornubus duobus arcuatis, elytris testaceis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 377.*  
*Habitat - - - statura et magnitudine Sc. Tauri.*

b) thorace inermi, capite cornuto.

α) scutellari.

**bilobus.** 12. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 6. n. 13. mant. inf. 1. p. 4. n. 14. Jablonsk. Kaef. 1. t. 3. f. 2.*  
*Edw. av. t. 105. f. 2.*  
*Gron. zooph. p. 414. t. 14. f. 1. 2.*  
*Aubent. misc. t. 15. f. 3.*  
*Schaeff. ic. t. 63. f. 2. 3.*  
*Voet coleoptr. t. 14. f. 106.*  
*Habitat in Europa australi, nasicorni similis, piceus.*

**Rhinoceros.** 14. Sc. thorace retuso subtuberculato, capitis cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 12. n. 40. mant. inf. 1. p. 7. n. 42.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 544. n. 14. Mus. Lud. Ulr. 10.\* Scarabaeus scutellatus thorace inermi, capite cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis.*  
*Petiv. gaz. t. 44. f. 9. et t. 100. f. 3. Rhinoceros Lacoenensis &c.*  
*Roes. inf. 2. Scar. 1. t. A. f. 7.*  
*Barrel. ic. t. 163.*  
*Voet coleoptr. t. 18. f. 117. 118.*  
*Habitat in Asia, piceus, subtrus hirsutus, nasicorni similis, sed duplo major.*  
 Feminae thorax excavatus.

**nasicornis.** 15. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laevibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 11. n. 33. mant. inf. 1. p. 6. n. 36. Jablonsk. Kaef. 1. t. 6. f. 4. 5.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 544. n. 15. Fn. succ. 378. Scop. ent. carn. 14. Scarabaeus scutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis.*  
*Mouff. inf. 53.*

*Imperat. nat.* 924. f. 1. 2. et 925. f. 3. 4.

*Hoeffn. pict. t.* 13. f. antepenult.

*Olear. mus.* 27. t. 16. f. 4.

*Jacob. mus.* 1. S. 5.

*Fonst. inf. t.* 15. f. 2.

*Swammerd. bibl. nat. t.* 27. f. 1. 2.

*Frisch inf.* 3. t. 3. f. 4.

*Roef. inf.* 2. Scar. 1. t. 7. f. 8. 10.

*Geoffr. inf. parif.* 1. p. 68. n. 1.

*Drury inf.* 1. t. 34. f. 7. 8.

*Voet coleopt. t.* 18. f. 120. 121.

*Habitat in Europae fimetis et vaporariis.*

Larva grisea, capite, pedibus spiraculisque rufis, a Swammerdamio pro cosso veterum habita. Feminae thorax rotundatus vix retusus.

Sylvanus. 139. Sc. thorace retuso: prominentia triplici, intermedia obsoleta, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 11. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 6. n. 37. *Habitat in Brasilia.*

Lazarus. 140. Sc. thorace bituberculato, capitis cornu brevi emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 11. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 5. n. 25. *Habitat in Noveboraco.*

Barbarossa. 141. Sc. thorace anterieus scabro, capitis cornu recurvo brevi. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 12. n. 41. *mant. inf.* 1. p. 7. n. 43. *Habitat in nova Hollandia.*

Satyryus. 142. Sc. thorace anterieus truncato, capitis cornu recurvo, capite longiore. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 12. n. 42. *mant. inf.* 1. p. 7. n. 44. *Habitat in America septentrionali.* *Feminae clypeus tuberculatus, thorax planus.*

jamaicensis. 143. Sc. thorace anterieus retuso, capitis cornu recurvo, clytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 13. n. 43. *mant. inf.* 1. p. 7. n. 45. *Drury inf.* 1. t. 34. f. 1. 2. *Habitat in America meridionali.* *Femina mutica.*

Silenus. 144. Sc. thorace anterieus excavato, capitis cornu recurvo, clytris laevissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 13. n. 44. *mant. inf.* 1. p. 7. n. 46.

*Forster*

*Forster cent. inf. I. I. I. Scarabaeus excavatus.*  
*Voet coleopt. t. 18. f. 119.*  
*Barrel. plant. Hiss. t. 163.*  
*Scopol. delic. infubr. I. p. 50. t. 21. f. c.*  
*Habitat in Galloprovincia.*

- Syrichtus. 145. Sc. thorace rotundato, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf. I. p. 13. n. 45. mant. inf. I. p. 7. n. 47.*  
*Habitat in America.*
- Apelles. 146. Sc. capitis cornu brevissimo, clytris cinereis: punctis elevatis atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 13. n. 46. mant. inf. I. p. 7. n. 48.*  
*Habitat ad caput bonae spei, parvus, pedibus flavis nigromaculatis.*
- Aries. 147. Sc. thorace rotundato, capitis cornu brevissimo subulato. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 495. mant. inf. I. p. 7. n. 49.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- coronatus. 148. Sc. capitis clypeo elevato posteriorius emarginato. *Fabr. sp. inf. I. p. 13. n. 47. mant. inf. I. p. 7. n. 50.*  
*Habitat in Java, piceus.*
- Hylax. 149. Sc. capitis cornu emarginato, tibiis posterioribus brevissimis apice spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 13. n. 48. mant. inf. I. p. 7. n. 51.*  
*Habitat in Africa.*
- didymus, 19. Sc. thorace fossula exarato, capite tricuspidi, clytris striatis. *Mus. Lud. Ulr. 14. Fabr. sp. inf. I. p. 13. n. 49. mant. inf. I. p. 7. n. 52.*  
*Gron. zooph. 420.*  
*Petiv. gaz. t. 27. f. 7.*  
*Drury inf. I. t. 32. f. 3.*  
*Voet coleopt. t. 19. f. 126.*  
*Habitat in America.*  
*Feminae thorax antrorsum mucrone parvo elevato armatus.*
- Polyphemus. 150. Sc. capite tricorni: anteriore porrecto bifido. *Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 50. mant. inf. I. p. 7. n. 53.*  
*Habitat in Africa, goliatho affinis, sed minor, clytris viridibus macularum albarum serie triplici ornatis.*

- Goliathus.** 151. Sc. clypeo bifurco. *Mant. p. 530. Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 51. mant. inf. I. p. 7. n. 54.*  
*Sulz. inf. t. I. f. 2.*  
*Voet coleopr. t. 22. f. 51.*  
*Drury inf. I. t. 31. et 3. t. 40. f. 1.*  
*Habitat in Africa, praesertim Guinea.*
- Hircus.** 152. Sc. thorace scabro, capite linea transversa carinata: clypeo bidentato. *Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 52. mant. inf. I. p. 7. n. 55.*  
*Habitat Tranquebariac.*
- farctus.** 153. Sc. brunneus, capite subbicorni, elytris punctato-striatis apice nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 53. mant. inf. I. p. 7. n. 56.*  
*Habitat in Pensilvania.*
- retusus.** 154. Sc. thorace retuso, capitis cornu brevi plano, femoribus posterioribus incrassatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 14. n. 54. mant. inf. I. p. 7. n. 57.*  
*Habitat ad caput bonae spei, nasicorni minor, niger, sub-  
 tus ferrugineus hirtus, pedibus rufis.*
- piceus.** 155. Sc. piceus, thorace glabro, capite bicorni, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 15. n. 55. mant. inf. I. p. 7. n. 58. Herbst apud Fueßl. Arch. Inf. 4. p. 4. n. 6. t. 19. f. 1.*  
*Habitat in America australi et India, fossoris magnitudine.*
- maurus.** 30. Sc. capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo. *Fabr. sp. inf. I. p. 16. n. 62. mant. inf. I. p. 9. n. 68.*  
*Habitat in Mauritania, oblongus, thorace convexo.*
- β) exscutellati.
- Jacchus.** 156. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu recurvo simplicis. *Fabr. sp. inf. I. p. 22. n. 97. mant. inf. I. p. 11. n. 107.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*  
*Feminae cornu capitis brevissimum truncatum.*
- Sabaesus.** 157. Sc. thorace prominentia duplici, capitis cornu erecto simplicis. *Fabr. sp. inf. I. p. 23. n. 99. mant. inf. I. p. 12. n. 109.*  
*Habitat in Coromandel, Jacchi statura et magnitudine.*  
*Feminae cornu capitis, et thoracis tubercula minora.*



- Belzebul. 158. Sc. thorace prominentia triplici, capite tricorni: intermedio majore. *Fabr. sp. inf. 1. p. 25. n. 110. mant. inf. 1. p. 13. n. 122.*  
*Habitat in America.*
- bifasciatus. 159. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu erecto, elytris nigris: fasciis duabus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 25. n. 111. mant. inf. 1. p. 13. n. 123.*  
*Habitat in Coromandel, niger, nuchicornis magnitudine.*
- Bonafus. 160. Sc. thorace prominentia duplici, capite tricorni: laterali-  
libus majoribus arcuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 26. n. 114. mant. inf. 1. p. 14. n. 130.*  
*Pallas ic. inf. Russ. p. 5. t. A. f. 5.*  
*Schroeter Abb. 1. t. 3. f. 5. Scarabaeus Vacca.*  
*Habitat in India.*
- valgus. 20. Sc. femoribus secundi paris remotis. *Mus. Lud. Ulr. 15. Fabr. sp. inf. 1. p. 27. n. 120. mant. inf. p. 14. n. 136.*  
Scarabaeus (Paniscus) thorace retuso elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fisso.  
*Petiv. gaz. t. 27. f. 8.*  
*Roef. inf. 2. Scarab. 1. t. B. f. 2.*  
*Habitat in America.*  
*Elytra brevia; digiti magis hirsuti, quam congeneribus.*
- carolinus. 16. Sc. thorace retuso, capite ovali integro unicorni, elytris striatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 27. n. 121. mant. inf. 1. p. 14. n. 137.*  
Scarabaeus capitis cornu erecto brevissimo, clypeo integro, elytris sulcatis.  
*Drury inf. 1. t. 35. f. 2.*  
*Voet coleoptr. t. 24. f. 14.*  
*Habitat in America boreali, ater, obtusus, gibbus, pollicem crassus, statura molossi.*
- Sphinx. 161. Sc. thorace punctis quatuor impressis, capite subcornuto, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 27. n. 122. mant. inf. p. 24. n. 138.*  
*Pall. it. 1. p. 462. n. 25. Scarabaeus humerosus.*  
*Pall. ic. inf. Russ. 1. p. 4. t. A. f. 4. Scarabaeus Menalcas.*  
*Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 10. et apud Fuessl. Arch. Inf. 4. p. 11. n. 37. t. 19. f. 17.*  
*Drury inf. 1. t. 35. f. 8. Scarabaeus spinipes.*  
β) Scarabaeus fronte ruga, elytris striis laevissimis. *Mus. Lesk. p. 1. n. 12.*

*Habitat*

*Habitat in America meridionali, et deserto acidissimo mari caspio boream versus finitimo, sericeus ex viridi caeruleus.*

**Nicanor. 162.** Sc. thorace punctis quatuor impressis, capitis cornu recurvo bidentato, clytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 27. n. 123. mant. inf. 1. p. 14. n. 139.*

*Drury inf. 1. t. 35. f. 1. Scarabaeus fulcatus.*

*Habitat in America.*

**Fricator. 163.** Sc. thorace antierius elevato acuto, capitis cornu truncato submarginato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 15. n. 140.*

*Habitat in India, totus ater, nitidus, nicanoris magnitudine.*

**Mimas. 17.** Sc. thorace retuso angulato, capite obsolete bicorni, clytris inauratis striatis. *Mus. Lud. Ulr. 9.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 28. n. 124. mant. inf. 1. p. 15. n. 141.*

*Sulz. inf. t. 1. f. 4. Voet coleoptr. t. 23. f. 4. Copris viridis splendens.*

*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. B. f. 1.*

*Habitat in America meridionali, clypeo integro.*

**hispanus. 21.** Sc. clypeo cornuto emarginato, clytris striatis, femoribus secundis remotissimis. *Mus. Lud. Ulr. 12. Fabr. sp. inf. 1. p. 29. n. 130. mant. inf. 1. p. 15. n. 148.*

*Pet. gazoph. t. 8. f. 4.*

*Voet coleoptr. t. 24. f. 13.*

*Habitat in Barbaria et australiore Europa, lunari similis, sed major, clypei incisura a molosso distinctus.*

**tridens. 164.** Sc. thorace cupreo, capite basi tridentato, clytris nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 29. n. 129. mant. inf. 1. p. 15. n. 147.*

*Habitat in Africa aequinoctiali, niger, carnificis magnitudine.*

**carnifex. 22.** Sc. thorace plano angulato scabro, capitis cornu inflexo, corpore aeneo. *Gron. zooph. 450.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 129. n. 28. mant. inf. 1. p. 15. n. 146.*

Scarabaeus exscutellatus, thorace incermi angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo.

*Catesb. Car. 3. t. 11. f. ult.*

*Drury inf. 1. t. 35. f. 3-5.*

*Voet coleopt. t. 26. f. 31. 32.*

*Habitat in America, stercorario brevior, latus, depressus; formatam e stercore pilulam conjunctis gregatim viribus*  
per

*per totam aestatem volvens volutansque, etiam non suam, usque in foveam determinatam, uti pilularis.*  
Cornu retrorsum positum nigrum, lacve, feminae obsoletum.

**Spinifex.** 165. Sc. thorace rotundato, occipite spina recurva. *Fabr. sp. inf. 1. p. 29. n. 131. mant. inf. 1. p. 15. n. 145.*  
*Habitat in Coromandel, niger viridi-nitens, nuchicornis statura et magnitudine.*

**nuchicornis.** 24. Sc. thorace rotundato, occipite spina erecta armato. *Fr. suec. 381.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 132. mant. inf. 1. p. 15. n. 150.*

*It. gotl. 41.* Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro-nebulosis.

*Raj. inf. p. 103. n. 2.* Scarabaeus ovinus tertius.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 89. n. 3. (mas) et (fem.) 4.*

*Voet colept. t. 25. f. 18.*

*Gronov. zooph. 454.*

*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. A. f. 4.*

β) Scarabaeus coenobita. *Herbst apud Fueßl. Arch. Inf. 4. p. 11. n. 40. Voet colept. t. 25. f. 18.*

*Habitat in Europae stercore.*

*Femina mutica.*

**Capra.** 166. Sc. occipite spina erecta gemina, corpore nigro obscuro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 15. n. 144.*

*Habitat Halae Saxonum, vaccae statura et magnitudine.*

**Vacca.** 25. Sc. thorace acuminato, occipite spina erecta gemina. *Fabr. sp. inf. 1. p. 28. n. 126. mant. inf. 1. p. 15. n. 143.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 90. n. 5.*

*Schaeff. inf. t. 73. f. 4. 5. ♂. ♀.*

*Schroet. Abh. 1. t. 3. f. 5.*

*Habitat in Europa temperata, nuchicorni thorace aeneo, elytrisque fuscis, caprae spina occipitis gemina similis.*

**Taurus.** 26. Sc. occipite cornibus binis reclinatis arcuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 28. n. 126. mant. inf. 1. p. 15. n. 142. Schreiber inf. t. 1. f. 6. 7.*

*Scop. ent. carn. 25.* Scarabaeus illyricus.

*Raj. inf. p. 103. n. 2.* Scarabaeus ovinus alter.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 92.* Copris niger, capite pone bicorni &c.

*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 5.*

*Schaeff.*

*Schaeff. inf. t. 73. f. 2. 3. ♂. ♀.*

*Voet coleopt. t. 24. f. 16.*

*Habitat in Germania et Europa magis australi, nuchicorni similis, at cornubus distantibus arcuatis diversus.*

- nutans. 167. Sc. thorace anterieus impresso, occipite spina erecta apice nutante, corpore nigro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 15. n. 151.*  
*Habitat Halae Saxonum, nuchicornis statura et magnitudine.*
- scabrosus. 168. Sc. thorace rugoso, capitis cornu erecto brevissimo, elytris testaceis nigro-scabris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 133.*  
*mant. inf. 1. p. 16. n. 152.*  
*Voet coleopt. t. 25. f. 23.*  
*Habitat in America meridionali, nuchicorni paulo major.*
- furcatus. 169. Sc. thorace rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis: intermedio breviori. *Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 134. mant. inf. 1. p. 16. n. 153.*  
*Laichart. inf. tyr. p. 26. n. 20. t. 1. f. 20. Scarabaeus Vitulus.*  
*Habitat in Gallia meridionali.*  
*Feminae cornuum loco linea transversa elevata.*
- verticicornis. 170. Sc. thorace griseo nigro-punctato, capitis cornu erecto brevissimo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 30. n. 135. mant. inf. 1. p. 16. n. 154.*  
*Habitat in Anglia, nuchicorni valde affinis, an varietas?*
- truncaticornis. 171. Sc. aeneo-niger, thorace rotundato, occipite spina apice truncata. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 238.*  
*Habitat in - - - statura nuchicornis, at minor.*  
*Femina mutica.*
- spiniger. 415. Sc. occipite spina erecta brevi, elytris lividis: maculis confluentibus nigris. *Mus. Lesk. p. 3. n. 47.*  
*Habitat in Europa.*
- novem maculatus. 416. Sc. testaceo fuscus, clypeo rugis duabus, elytris fuscis: maculis novem rufo testaceis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 48.*  
*Habitat extra Europam, antennis, thoracis margine exteriori pedibusque lividis.*
- recticornis. 427. Sc. ater, thorace subinermi, capite cornubus duobus erectis, clypeo rotundato. *Lesk. it. p. 45. t. A. f. 8. 9.*  
*Habitat in Lusitaniae valle, a fluvio Puloniz irrigata, 5 lineas longus.*

c) tho-

c) *thorace et capite inermi*: Mutici:α) *scutellati*.

- Aygulus**, 172. Sc. thorace quadripunctato, capite tuberculato, elytris testaceis, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 15. n. 57. *mant. inf.* 1. p. 8. n. 60.  
*Habitat in India, Jnuo affinis, at duplo major, et tibiis anterieus quoque dentatis distinctus.*
- fimeta-rius**. 32. Sc. ater, capite tuberculato, elytris rubris. *Fn. suec.* 385. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 16. n. 64. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 70. *Scop. ent. carn.* p. 20. 21. *Geoffr. inf. parif.* 1. p. 81. n. 18. *Fn. suec.* 1. p. 355. Scarabaeus capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris.  
*Raj. inf.* p. 106. n. 9. Scarabaeus pilularius nonus.  
*Frisch inf.* 4. t. 19. f. 3.  
*Roef. inf.* 2. scar. 1. t. A. f. 3.  
*Schaeff. ic. t.* 144. f. 6.  
*Degeer inf.* 4. t. 10. f. 8.
- β) Scarabaeus capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis. *It. oel.* 41.  
*Uddm. diff. nr.* 2.
- γ) Scarabaeus (rufus) rufus totus, folis oculis nigris, capite tuberculis tribus, elytris striatis. v. *Moll apud Fueßl. naturh. Mag.* 1. 372.  
*Habitat frequens in Europae stercore.*  
*Capitis tubercula ut plurimum tria.*
- haemor-rhoidalis**. 33. Sc. capite tuberculato, elytris apice rubris. *Fn. suec.* 386. *Fn. suec.* 1. p. 358. Scarabaeus ater, elytris postice ferrugineis, pedibus rufis.  
*Habitat in Europae fungis et putridis; an mera granarii varietas?*
- conspur-catus**. 34. Sc. thoracis marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris lividis nigro-maculatis. *Fn. suec.* 387.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 17. n. 67. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 73.  
*Raj. inf.* p. 108. Scarabaeus pilularius decimus.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 82. n. 19.  
*Schaeff. ic. t.* 26. f. 8.  
*Pontopp. Atl. dan. t.* 1. f. 82.  
*Voet coleoptr. t.* 21. f. 144.
- β) Scarabaeus tessulatus. v. *Moll naturh. Br.* 1. p. 162. n. 9.  
*Habitat in Europae stercore, vere praesertim frequens, sordido affinis, sed minor; β) dimidio minor.*

173. Sc.

- fordidus.** 173. Sc. capite tuberculato, thorace nigro: margine pallido; puncto nigro, elytris griseis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 17. n. 68. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 75. *Herbst apud Fueßl. Arch. Inf.* 4. p. 6. n. 13. t. 19. f. 3.  
*Habitat in Angliae stercore.*
- luridus.** 174. Sc. ater, capite tuberculato, elytris griseis nigro-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 17. n. 69. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 76.  
*Müll. prodr. zool. dan.* Scarabaeus tessellatus.
- marianus.** 35. Sc. capite tuberculato, elytris laevibus glaucis fusco-punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 18. n. 71. *mant. inf.* 1. p. 9. n. 78.  
*Habitat in America, magnitudine aloei; an forsitan femina mutica Herculis?*
- fordens.** 413. Sc. niger, capite tuberculato: intermedio prominulo, elytris fordide testaceis: futura marginibusque fordide brunneis. *Mus. Lesk.* p. 2. n. 21.  
*Habitat in Europa.*
- nebulosus.** 414. Sc. fuscus, thorace laevi: marginibus externis lividis, capite obsolete tuberculato, elytris striatis, fusco-nebulosis, pedibus testaceis. *Mus. Lesk.* p. 2. n. 22.  
*Habitat in Europa.*
- Inuus.** 175. Sc. thorace quadripunctato, capite quadrituberculato, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 15. n. 56. *mant. inf.* 1. p. 8. n. 59.  
*Fabr. syst. entom.* p. 14. n. 45. Scarabaeus Sphinx.  
*Habitat in Sierra Leon Africae, supra ex viridi aeneus obscurus.*
- subterraneus.** 28. Sc. thorace glabro, capite tuberculis tribus, elytris striis crenatis. *Fn. suec.* 382.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 15. n. 58. *mant. inf.* 1. p. 8. n. 61.  
*Gadol satag.* 76. Scarabaeus niger, capitis clypeo lunato tribus tuberculis notato.  
*Sulz. inf.* t. 1. f. 2.  
*Habitat in Europae stercore, fossori affinis, at multo minor.*
- Foffor.** 31. Sc. thorace retuso, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Fn. suec.* 384.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 15. n. 59. *mant. inf.* 1. p. 8. n. 62.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 82. n. 20.

Gunner.

- Gunner. act. Nidr. 4. p. 266. n. 2. t. 16. f. 1.*  
*Fn. suec. 352. Scarabaeus ovatus ater glaber.*  
*Schaeff. ic. t. 144. f. 78.*  
*Degeer inf. 4. t. 10. f. 7.*  
*Voet coleopt. t. 21. f. 141.*  
*Habitat in Europae subulosi stercoratis.*
- foetens. 176. Sc. capite tuberculis tribus: medio acuto, elytrorum limbo ferrugineo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 8. n. 63.*  
*Habitat Halae Saxonum ater, ano rufo, thoracis macula marginali ferruginea.*
- analis. 177. Sc. niger, capite tuberculis tribus aequalibus, elytris apice ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 8. n. 64.*  
*Habitat in India, fossoris statura et magnitudine.*
- scybalarius. 178. Sc. capite tuberculis tribus: intermedio acuto, elytris striatis testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 16. n. 60. mant. inf. 1. p. 8. n. 65.*  
*Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 7. n. 17. t. 19. f. 6.*  
*Scarabaeus foetidus.*  
*Habitat in Germania, fossore minor.*
- terrestris. 179. Sc. capite tuberculis tribus aequalibus, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 16. n. 61. mant. inf. 1. p. 8. n. 66.*  
*Habitat in Anglia, fossore triplo minor.*
- conflagratus. 180. Sc. capite tuberculis tribus, clypeo scutelloque nitide nigris. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 5. n. 11.*  
*Habitat in Germaniae stercore vaccino, erratico affinis.*  
*Elytra punctis excavatis sulcata.*
- inquinaris. 181. Sc. capite tuberculis tribus, elytris luteis nigro striatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 6. t. 19. f. 5. Fabr. mant. inf. 1. p. 9. n. 74.*  
*Habitat in Germania, fimetario tertia parte, ad conspurcaturum accedens.*  
*Scutellum nitide nigrum.*
- unifasciatus. 182. Sc. thorace piceo: prominentia triplici; intermedia tributerculata, elytris testaceis: fascia sinuata fusca. *Schaller Abb. der hall. Naturf. 1. p. 240.*  
*Habitat in Malabar.*
- sanguinolentus. 183. Sc. niger, capite tuberculis tribus obsoletis, elytris punctatim striatis apice rubris. *Herbst apud Fuessli Arch. 4. p. 6. n. 15. t. 19. f. 4.*  
Hhhhh  
*Habitat*

*Habitat in Germania, fmetarium simulans, at tertia parte minor.*

**bimaculatus.** 184. Sc. capite subtrituberculato, elytris striatis: macula basos rubra. *Fabr. mant. inf. 1. 8. n. 67.*

*Habitat in Germania, ater, terrestris statura et magnitudine.*

**testaceus.** 185. Sc. testaceus, capite bituberculato, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 16. n. 63. mant. inf. 1. p. 9. n. 69.*

*Habitat in Angliae stercoratis.*

**pygmaeus.** 186. Sc. clypeo marginato, thorace viridi: prominenti bifida, elytris testaceis nigro-maculatis. *Schaller Abb. der ball. Naturf. 1. p. 239.*

*Habitat in Malabar, ovati magnitudine, nuchicornis statura.*

**erraticus.** 29. Sc. thorace laevi, capite tuberculo unico, elytris fuscis. *Fn. succ. 385. Fabr. sp. inf. 1. p. 17. n. 66. mant. inf. 1. p. 9. n. 72. Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 5. n. 10. t. 19. f. 2.*

*Schaeff. ic. t. 26. f. 9.*

*Voet coleopt. f. 146?*

*Habitat in Europae stercore, viis.*

**bicolor.** 187. Sc. thorace subinermi, capite tuberculo unico, elytris nigris, abdomine rufo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 17. n. 65. mant. inf. 1. p. 9. n. 71.*

*Habitat in Germania.*

**granarius.** 23. Sc. niger, clypeo tuberculo solitario, elytris posterius testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 17. n. 70. mant. inf. 1. p. 9. n. 77. Lesk. it. p. 45. t. A. f. 10.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 547. n. 23.* Scarabaeus scutellatus niger, thorace inermi: clypeo tuberculato, elytris substriatis margine postico testaceis.

*Habitat in Europae locis suffocatis, seminis tritici magnitudine.*

*Elytra interdum ultra dimidium testacea.*

**futuralis.** 188. Sc. niger nitidus, capitis tuberculo solitario minuto, elytris sordide flavis striatis minuto punctatis, scutello margine exteriori ad basin futuraeque nigris. *v. Moll naturh. Br. 1. p. 162. n. 10.*

*Habitat in vallis Salzburgensis Zillertal stercore equino, sordido affinis.*



- Veter. 408. Sc. rufus, capite thoraceque linea carinata elevata. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 377.*  
*Habitat in India, cephi magnitudine.*
- Gigas. 36. Sc. thorace retuso, capite supra margineque angulato. *Mus. Lud. Ulr. 16.\**  
*Habitat in Aegypto, ater, primae magnitudinis.*
- scaber. 37. Sc. thorace elytrisque anterieus scabris. *Mus. Lud. Ulr. 17.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 18. n. 72. mant. inf. 1. p. 9. n. 79.* Scarabaetus scutellatus, clypei centro prominulo, elytris antice scabris.  
*Habitat in America, nascicorni duplo major, Herculis feminae affinis.*
- longimanus. 39. Sc. pedibus anterioribus arcuatis longissimis. *Mus. Lud. Ulr. 18.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 18. n. 73. mant. inf. 1. p. 9. n. 80.*  
*Aubent. misc. t. 41. f. 1.*  
*Voet coleopt. t. 11. f. 97.*  
*Habitat in India.*  
*Femora anteriora dente valido armata.*
- stercorarius. 42. Sc. ater glaber, elytris sulcatis, capite rhombeo: vertice prominulo. *Fn. suec. 388.\** *Geoffr. inf. par. 1. p. 75. n. 9. Scop. ent. carn. 26. Fabr. sp. inf. 1. p. 18. n. 74. mant. inf. 1. p. 10. n. 81.*  
*Mouff. inf. 151.*  
*Raj. inf. p. 74. n. 1.*  
*Bauh. halluc. 212. f. ult.*  
*List. mut. 17. f. 4.*  
*scar. angl. p. 380. n. 4.*  
*Frisch inf. 4. p. 13. t. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 23. f. 9.*  
*Degeer inf. 4. t. 9. f. 10. 11.*  
*Voet coleopt. t. 20. f. 134.*  
*Habitat in Europa sub stercore, acaris et ichneumone infestatus, vespere ingenti cum susurro circumvolitando serenum diem praeannuncians, ab Aegyptiis soli consecratus, colore interdum in caeruleum aut virescentem vergente, aut subtus aeneo, elytris obscuris rufis varians.*
- vernalis. 43. Sc. elytris glabris laevissimis, clypeo rhombeo: vertice prominulo. *Fn. suec. 389. Geoffr. inf. par. 1. p. 77. n. 10. Scop. ent. carn. p. 27. Fabr. sp. inf. 1. p. 19. n. 75. mant. inf. 1. p. 10. n. 82.*

*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 6.*

*Voet coleopt. t. 20. f. 135.*

*Degeer inf. 4. t. 10. f. 4.*

*Habitat sub Europae stercore, stercoreario similimus, at minor, glaber, nitidus, antennis rubris, colore caerulefcente, virescente et obscuro varius.*

juvencus. 189. Sc. thorace anterieus impresso mucronato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 19. n. 76. mant. inf. 1. p. 10. n. 83.*  
*Habitat in America.*

splendidus. 190. Sc. viridi-nitens, clytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 19. n. 77. mant. inf. 1. p. 10. n. 84.*  
*Habitat in insulis Americae australi oppositis.*

Cephus. 191. Sc. rufus, clytrorum sutura apicibusque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 19. n. 78. mant. inf. 1. p. 10. n. 85.*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks.*

laborator. 192. Sc. ater, thorace punctato, clytris striatis, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 20. n. 79. mant. inf. 1. p. 10. n. 86.*  
*Habitat in Brasiliae stercore.*

globator. 193. Sc. thorace clytrisque obscure nigris punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 20. n. 80. mant. inf. 1. p. 10. n. 87.*  
*Habitat ad caput bonae spei, fossoris magnitudine, subtus hirtus piceus.*

septemmaculatus. 194. Sc. clytris striatis pallidis nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 20. n. 81. mant. inf. 1. p. 10. n. 88.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, piceus, conspurcati statura, at paulo major.*

bipunctatus. 195. Sc. thorace nigro rubro-marginato, clytris rubris puncto nigro. *Lepch. it. 2. p. 324. t. 10. f. 7. Fabr. mant. inf. 1. p. 10. n. 89.*  
*Laxmann nov. comm. Petr. 14. p. 593. t. 24. f. 1. Scarabaeus bimaculatus.*  
*Pallas ic. inf. Russ. 1. p. 12. t. A. f. 12. Scarabaeus coccionelloides.*  
*Habitat sub fimo equino Russiae australis et ad Volgam.*  
*Thoracis margo rufus, puncto nigro.*

arator. 196. Sc. niger, thorace laevi, clytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 20. n. 102. mant. inf. 1. p. 10. n. 90.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

- barbatus. 197. *Sc. muticus laevis niger, ano barbato.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 20. n. 83. mant. inf. 1. p. 10. n. 91.*  
*Habitat in India.*
- quisquilius. 83. *Sc. ater glaber, elytris livido-testaceis.* *Fn. succ. 297.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 21. n. 91. mant. inf. 1. p. 11. n. 100.*  
*Scop. ent. carn. 29.*  
*Herbst apud Fueslli Arch. Inf. 4. p. 7. n. 23. t. 19. f. 8.*  
β) *Scarabaeus merdarius.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 21. n. 90. Herbst apud Fueslli Arch. Inf. 4. p. 7. n. 22.*  
γ) *Scarabaeus cotericus.* *v. Moll. naturh. Br. 1. p. 168. n. 13.*  
*Scarabaeus Copris.* *Schranck enum. inf. Austr. p. 5. n. 6.*  
*Habitat in Europae stercore et quisquiliis, seminis milii magnitudine, β) dimidio major.*
- arcuatus. 198. *Sc. niger nitidus, capitis clypeo anterieus rufo, elytris striato-punctatis, futura, puncto marginali bascos vittaque abbreviata futuram versus inflexa rubescentibus, pectore obscuro, abdomine flavescente, palpis, antennis pedibusque ferrugineis.* *v. Moll. naturh. Br. 1. p. 160. n. 7.*  
*Habitat in alpibus Salzburgicis.*
- Scrofa. 199. *Sc. oblongus niger, elytris fuscis substriatis.* *Fabr. mant. 1. p. 11. n. 99.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura testudinarii, at minor.*
- testudinarius. 200. *Sc. niger, elytris fulcatis piceis ferrugineo-punctatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 21. n. 89. mant. inf. 1. p. 11. n. 98.*  
*Herbst apud Fueslli Arch. Inf. 4. p. 7. n. 21. t. 19. f. 7. a. b.*  
*Habitat in Anglia et Germania, vere in agris stercoreatis frequens.*
- marginellus. 201. *Sc. niger, thoracis elytrorumque margine testaceo.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 21. n. 88. mant. inf. 1. p. 11. n. 97.*  
β) *Melolontha nigro-marginata.* *Herbst apud Fueslli Arch. Inf. 7. p. 155. n. 20. t. 43. f. 7.*  
*Habitat in Coromandel, parvus, pedibus piceis.*
- quadrimaculatus. 84. *Sc. niger oblongus, elytris maculis duabus nigris.* *Fn. succ. 398.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 21. n. 86. mant. inf. 1. p. 10. n. 94.*  
*Herbst apud Fueslli Arch. Inf. 4. p. 10. n. 31. t. 19. f. 15.*  
*Scarabaeus quadriguttatus.*  
*Habitat in Europae stercore.*

- Sus. 202. *Sc. oblongus* obscure rufus, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. mant. I. p. II. n. 95. Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 9. n. 29. t. 19. f. 10.*  
*Habitat in Germaniae stercore humano, fimetario dimidio minor, statura quadrimaculati.*
- plagiatus. 85. *Sc. niger*, elytris plaga rufescente. *Fabr. sp. inf. I. p. 21. n. 87. mant. inf. I. p. II. n. 96.*  
*Habitat in Europa, an varietas subterranei?*
- Blackbur- 203. *Sc. thorace nigro aeneo*, elytris striatis atris. *Fabr. sp. ni. inf. I. p. 20. n. 85. mant. inf. I. p. 10. n. 93.*  
*Habitat in America boreali, rufipede paulo major.*
- rufipes. 86. *Sc. antennis pallidis*, elytris laevibus. *Fn. suec. 403.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 20. n. 84. mant. inf. I. p. 10. n. 92.*  
*Scarabaeus thorace glabro nitido, elytris striatis.*  
*Degeer inf. 4. t. 10. f. 6.*  
 β) *Scarabaeus arator.* *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 9. n. 30.*  
*Scarabaeus gagates. v. Moll naturh. Br. I. p. 172. n. 17.*  
*Habitat in Europae, potissimum borealis stercoreatis, β) fime-*  
*tarium magnitudine vix superans.*
- Cerato- 87. *Sc. thorace scabro lateribus tridentato*, elytris griseis,  
 niae. *Mus. Lud. Ulr. 31.\**  
*Hasselq. it. 409. n. 99: Scarabaeus ceratoniae.*  
*Habitat in Caira ceratoniae.*
- porcatus. 204. *Sc. fuscus*, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 21. n. 92. mant. inf. I. p. II. n. 101. Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 8. n. 24. t. 19. f. 9. a. b. c.*  
 β) *Scarabaeus foveolatus. v. Moll. naturh. Br. I. p. 173. n. 19.*  
*Habitat in Germaniae stercore.*
- stercora- 205. *Sc. ater laevis*, elytris striato-crenatis, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. I. p. 22. n. 93. mant. inf. I. p. II. n. 102.*  
 tor. *Habitat in Brasilia.*
- asper. 206. *Sc. capite thoraceque transversim fulcatis*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 22. n. 94. mant. inf. I. p. II. n. 103.*  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 8. n. 25. t. 19. f. 10. a. b.*  
*Habitat in Europae plantis putridis.*

- unipunctatus. 207. Sc. ater, coleoptris flavescens: puncto communi nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 22. n. 95. mant. inf. I. p. 11. n. 104.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 579. n. 6. Fn. suec. 470.\* Coccinella coleoptris flavescens: puncto communi nigro.*
- interpunctatus. 208. Sc. niger, elytris fordide flavis fulcis nigris: area intermedia maculis oblongis alternis nigris varia. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 8. n. 26. t. 19. f. 11.*  
*Habitat in stercore vaccino Berolini.*
- variatus. 209. Sc. niger, elytris dimiato flavis. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 9. A. 27. t. 19. f. 12.*  
*v. Moll naturh. Br. I. p. 172. n. 18. Scarabaeus variegatus? Habitat in stercore vaccino pratorum Berolinensium, ad interpunctatum proxime accedens, an varietas?*
- contaminatus. 210. Sc. niger, clypei sutellique margine luteo, elytris punctato-striatis hirtis pedibusque fordide flavis. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 9. n. 28. t. 19. f. 13.*  
*Habitat in Pomerania, interpunctato similis, sed minor.*
- minutus. 211. Sc. niger, elytris striatis pedibusque spadiceis. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. I. p. 10. n. 32.*  
*Habitat Berolini, quisquilio aequalis, at magis oblongus.*
- oblongus. 212. Sc. clypeo foveolato, elytris fulcatis, corpore oblongo. *v. Moll naturh. Br. I. p. 171. n. 16. et apud Fueßli n. Mag. Entom. I. p. 371.*  
*Habitat in Germaniae stercore, fossori affinis.*
- arenarius. 213. Sc. ater, elytris striatis, tibiis piceis. *Fabr. mant. I. p. 11. n. 105.*  
*Habitat in Sueciae arena mobili, parvus.*
- laevis. 417. Sc. ater, thorace laevi, elytris striatis. *Mus. Lesc. p. 2. n. 34.*  
*Habitat in Europa.*
- dichrous. 418. Sc. ater glaber, thoracis margine externo elytris pedibusque fordide testaceis. *Mus. Lesc. p. 2. n. 35.*  
*Habitat in Europa.*
- β) *exscutellati.*
- decempunctatus. 214. Sc. thorace anterioribus tuberculis tribus, elytris testaceis fasciis transversa oblongo-punctatis. *Schaller Abb. der holl. Naturf. I. p. 237.*

- v. *Moll naturh. Br. I. p. 175. n. 21.* Scarabaeus quadrituberculatus.  
*Habitat in Germaniae stercore humano et vaccino.*
- reflexus. 215. Sc. niger, capite trituberculato, clypeo reflexo emarginato. *Fabr. mant. inf. I. p. 16. n. 157.*  
*Habitat in Sina, oblongus, fossoris magnitudine.*
- quadripulatus. 216. Sc. ater, capite bituberculato, elytris maculis duabus rubris. *Fabr. sp. inf. I. p. 31. n. 137. mant. inf. I. p. 16. n. 156.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- fulcator. 217. Sc. ater, capitis tuberculo unico, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 31. n. 136. mant. inf. I. p. 16. n. 155.*  
*Habitat in Cayenna.*
- eristatus. 218. Sc. niger, thorace cristato, clypeo tuberculato quadridentato. *Fabr. sp. inf. I. p. 31. n. 138. mant. inf. I. p. 16. n. 158.*  
*Habitat in Aegypto.*
- facer. 18. Sc. clypeo sexdentato, thorace crenulato, tibiis posterioribus ciliatis, vertice subdentato. *Mus. Lud. Utr. 13.\* Aoen. acad. 6. t. 3. f. 170. Fabr. sp. inf. I. p. 31. n. 139. mant. inf. I. p. 16. n. 159.*  
*Degeer inf. 7. p. 638. n. 36. t. 47. f. 18.* Scarabaeus cornutus.  
*Osb. it. 51.* Scarabaeus laevis thorace inermi, capite antice sexdentato.  
*Loefl. it. 20.* Scarabaeus pilularius niger, clypeo anticeferato, elytris nebulose maculatis submollibus planiusculis.  
*Petiv. gazoph. t. 42. f. 2.*  
*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 3.*  
*Voet coleopt. t. 27. f. 39. 40.*  
*Habitat in partibus Orbis antiqui australioribus, in Rossiae australis aridis frequens cylindrum e stercore bovino volvens in columnis antiquis Romae exsculptus ab Aegyptiis.*
- laticollis. 38. Sc. niger, clypeo sexdentato, elytris fulcatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 31. n. 140. mant. inf. I. p. 16. n. 160.*  
*Geoffr. inf. I. p. 89. n. 2.* Copris niger, capite clypeato: margine ferrato, thorace lato laevi, elytris striatis.  
*Raj. inf. p. 105. n. 4.*  
*Voet coleopt. t. 27. f. 41.*  
*Habitat in Sina, et australi Europa, sacro valde affinis.*

- variolo- 219. Sc. clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris: punctis  
fus. impressis variolosis. *Fabr. mant. I. p. 16. n. 161.*  
*Habitat in Itria, laticollis statura, sed paulo minor.*
- miliaris. 220. Sc. clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris: maculis  
elongatis atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 32. n. 141. mant. inf.*  
*I. p. 17. n. 162.*  
*Habitat in India.*
- Bacchus. 221. Sc. clypeo quadridentato, thorace gibbo elytrisque gla-  
bris. *Fabr. sp. inf. I. p. 32. n. 142. mant. I. p. 17. n. 163.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus, gibbus.*
- gibbofus. 222. Sc. clypeo quadridentato, elytris basi gibbo notatis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 32. n. 143. mant. p. 17. n. 164.*  
*Habitat in America.*
- Hollan- 223. Sc. clypeo quadridentato, elytris fulcatis. *Fabr. sp. inf.*  
diac. *I. p. 32. n. 144. mant. inf. I. p. 17. n. 165.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- Koenigii. 224. Sc. clypeo bidentato, thorace scabro, elytris variolosis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 32. n. 145. mant. inf. I. p. 17. n. 166.*  
*Pall. icon. inf. Ross. I. p. 7. t. A. f. 7. Scarabaeus scriptus.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- eupreus. 225. Sc. ex nigro cupreus, clypeo emarginato, thorace gibbo.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 32. n. 146. mant. inf. I. p. 17. n. 167.*  
*Habitat in Africa.*
- flagella- 226. Sc. niger opacus, clypeo emarginato, elytris scabris.  
tus. *Fabr. sp. inf. I. p. 32. n. 147. mant. inf. I. p. 17. n. 168.*  
*Habitat ad caput bonae spei, et in australi Europa.*
- pilularius. 40. Sc. niger opacus laevis subtus aeneus, thorace posterius  
rotundato. *Mus. Lud. Ulr. 19.\* Fabr. sp. inf. I. p. 33.*  
*n. 151. mant. inf. I. p. 17. n. 170.*  
*Geoffr. inf. I. p. 91. n. 7. Copris niger nitidus &c.*  
*Arist. Anim. l. 5. c. 18.*  
*Plin hist. mund. II. 34. Pilularius.*  
*Raj. inf. p. 105. n. 1.*  
*Catesb. Car. 3. t. 11. fig. sinistr.*  
*Schaeff. ic. t. 73. f. 6.*  
*Voet colcopt. t. 28. f. 49.*
- β) Scarabaeus Moplus. *Pall. ic. inf. Ross. I. t. A. f. 3.*  
Scarabaeus Geoffroae. *Sulz. ic. inf. t. I. f. 7.*  
*Habitat in Europa magis australi, stercorarii magnitudine*  
*et statura; vini quotidie sisyphi instar volvunt globum e*  
*H h h h h 5 ster-*

- stercore inprimis humano confectum se saepe septies majorem* Loefl. *it.* 20.
- Schaefferi 41. Sc. thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangularibus, femoribus posterioribus elongatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 32. n. 148. *mant. inf.* 1. p. 17. n. 169. *Scop. ent. carn.* p. 84. Scarabaeus longipes. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 92. n. 9. Copris niger, pedibus longis &c. *Schaeff. ic. t.* 3. f. 8. *Voet coleoptr. t.* 25. f. 17. *Habitat in Calabriae, Germaniae et Sibiriae collibus apricis, globulos e stercore bovino factos volvens et sepeliens, niger, horticolae magnitudine.*
- brasilianus 227. Sc. ater, clypeo emarginato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 33. n. 150. *mant. inf.* 1. p. 17. n. 171. *Habitat in Brasiliae stercore bovino.*
- calcaratus 44. Sc. capite clypeato emarginato, femoribus posterioribus dentatis. *Habitat in Aegypto.*
- Schreberii 45. Sc. ater glaber, elytrorum maculis duabus femoribusque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 33. n. 151. *mant. inf.* 1. p. 17. n. 172. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 91. n. 7. Copris niger nitidus &c. *Schaeff. ic. t.* 73. f. 6. *Voet coleoptr. t.* 28. f. 49. *Habitat in Europa temperata, nuchicornis fere statura.*
- bipustulatus 228. Sc. ater, elytris basi macula rufa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 33. n. 152. *mant. inf.* 1. p. 17. n. 173. *Habitat in nova Hollandia.*
- pallipes 229. Sc. capite thoraceque pallido viridique variegatis, pedibus antennisque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 33. n. 153. *mant. inf.* 1. p. 17. n. 174. *Habitat in Coromandel, parvus.*
- triangularis 230. Sc. niger, thoracis margine femoribusque pallidis, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 33. n. 154. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 175. *Drury inf.* 1. t. 36. f. 7. *Habitat in America australi, nuchicornis statura.*



- cinctus. 231. Sc. niger, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 34. n. 155. mant. inf. 1. p. 18. n. 176.*  
*Habitat in Sina.*
- flavipes. 232. Sc. nigricans, thoracis marginibus, elytris pedibusque flavescens. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 495. mant. inf. 1. p. 18. n. 177.*  
*Laichart. inf. tir. 1. p. 24. n. 17. Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 12. n. 46. t. 19. f. 19. Scarabaeus thoracocircularis.*  
*Schaeff. ic. t. 74. f. 6.*  
*Habitat in Germania, cincti statura.*
- aeneus. 233. Sc. viridi-aeneus, thorace bituberculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 34. n. 156. mant. inf. 1. p. 18. n. 178.*  
*Habitat in Coromandel, parvus, subtus niger.*
- smaragdulus. 234. Sc. aeneus nitidus, clypeo bidentato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 34. n. 157. mant. inf. 1. p. 18. n. 179.*  
*Habitat in America australi, parvus, glaberrimus.*
- ovatus. 46. Sc. niger, clypeo emarginato, thorace subaeneo, elytris abbreviatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 34. n. 158. mant. inf. 1. p. 18. n. 180.*  
*Habitat in Calabriae, Germaniae, Angliae stercore bovino, nuchicorni similis, at quadruplo minor.*
- amazonus. 47. Sc. testaceus thorace lituris duabus nigris, elytrisque margine exteriori callo fusco.  
*Habitat Surinami, laevis, stercoreario dimidio minor.*
- crucifer. 319. Sc. thorace subvillosa viridescente, elytris luteis corpore brevioribus: cruce nigra, trabe duplici. *Lepech. it. 1. p. 240. t. 16. f. 14.*  
*Habitat in Sibiriae quereetis, pulpa foliorum victitans, subtus niger villosus, an hujus generis?*
- caeruleus. 320. Sc. totus cyaneus oblongus. *Lepech. it. 1. p. 313. t. 19. f. 2.*  
*Habitat in Sibiriae deserto uralensi, 5 lineas longus, subtus in atrum colorem vergens.*
- uralensis. 321. Sc. viridis, elytris flavis corpore brevioribus, apice acuminatis. *Lepech. it. 1. p. 313.*  
*Habitat in deserti Sibiriae uralensis arenosis, subtus villo albo tectus.*  
*Elytra lineis villo albicante signatis a medio ad apicem distincta.*  
 419. Sc.

fluctuosus. 419. Sc. niger elytris strictis punctatis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 32.*  
*Habitat in Europa.*

guttatus. 420. Sc. niger, thorace rotundato: guttis eminentibus glabris, capitis clypeo impresso apice bifido, elytris profunde striatis crenatis: maculis oblongis e pilis luteis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 53.*

b) *mandibula arcuata subdentata, abdomine apice nudo, oblique truncato.* *Melolonthae.*

Fullo. 57. Sc. testaceus albo-maculatus, scutello macula duplici antennis heptaphyllis. *Fabr. sp. inf. I. p. 35. n. I. mant. inf. I. p. 19. n. I.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 553. n. 57. Fn. suec. p. 394.\* Scop. ent. carn. p. 123.* Scarabaeus scutellatus muticus, antennis heptaphyllis, corpore nigro, pilis albis, scutello macula duplici alba.

*Geoffr. inf. par. I. p. 69. n. 2.* Scarabaeus antennarum lamellis maximis.

*Raj. inf. p. 93. n. 9.* Scarabaeus Fullo.

*Frisch inf. 11. t. 1. f. 1.*

*Mouff. inf. 160. f. 4.*

*Hoeffn. inf. 2. t. 7.*

*Eph. Nat. Cur. Dec. 2. ann. 6. obs. 239.*

*Aubent. misc. t. 16. f. med.*

*Schaeff. ic. t. 23. f. 2.*

*Petiv. gaz. t. 138. f. 1.*

*Sulz. hist. inf. I. 1.*

*Voet coleopt. t. 6. f. 48. 49.*

β) Scarabaeus albus. *Pall. it. 2. p. 718. n. 4.*

*Pall. ic. inf. Ross. I. p. 19. t. B. f. 21.* Scarabaeus hololeucos.

*Habitat in Europae et Barbariae arenosis, quercu, elymo et arundine arenariis victitans, subtus hirsutus, unguiculis basi ramo uncinato.*

ruricola. 235. Sc. ater sericeus, elytris rufis: margine nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 73. n. 45. mant. inf. I. p. 23. n. 58.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 80. n. 15.* Scarabaeus niger elytris croceis &c.

*Habitat in Angliae graminosis.*

fruticola. 236. Sc. capite thoraceque caeruleo-pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant. inf. I. p. 23. n. 56.*

*Scop. ent. carn. 6.* Scarabaeus cyathiger.

*Poda*

- Poda inf.* 21. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 43. n. 44. Scarabaeus agricola.  
*Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. p. 15. n. 6. t. 19. f. 24.  
*Schaeff. ic.* t. 65. f. 1.  
*Voet coleoptr.* t. 8. f. 67.
- β) Scarabaeus campeltris. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. p. 15. n. c. t. 19. f. 25.  
*Habitat in Germaniae spicis secalinis, in Calabria etiam inquitinus, horticolae statura, sed minor.*
- praticola. 237. Sc. thorace nigro flavoque vario subpiloso, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 42. n. 43. *mant. inf.* 1. p. 23. n. 55.  
*Habitat in Sibiria, agricolae affinis, at clypeo non reflexo.*
- arvicola. 238. Sc. capitis clypeo reflexo, corpore nigro immaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 42. n. 42. *mant. inf.* 1. p. 23. n. 54.  
*Habitat in Russia magis australi, horticolae affinis.*
- agricola. 58. Sc. thorace villoso, elytris lividis: limbo fasciaque nigris, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant.* 1. p. 23. n. 57.  
*Habitat in Germaniae graminibus.*
- floricola. 239. Sc. cyaneo-nigra glabra, elytris rufis: sutura nigra, abdomine punctis falciculatis albis, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. p. 22. n. 53.  
*Habitat in Africa, horticolae proxime affinis.*
- abdominalis. 240. Sc. capite thoraceque caeruleo-pilosis, elytris testaceis, abdomine albo villoso. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 496. *mant. inf.* 1. p. 22. n. 52.  
*Habitat in Italia, horticolae nimum affinis.*
- horticola. 59. Sc. capite thoraceque caeruleo-pilosis, elytris testaceis, pedibus nigris. *Fn. succ.* 391.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 42. n. 41. *mant. inf.* 1. p. 22. n. 50.  
*Geoffr. inf. paris.* 1. p. 75. n. 8.  
*It. scan.* 116. 321. Scarabaeus frifius.  
*Lif. scar.* 380. n. 3. Scarabaeus ex nigro virescens, pennarum thecis rufis.  
*Degeer inf.* 4. p. 278. n. 24. t. 10. f. 18. Scarabaeus viridicollis.  
*Raj. inf.* p. 380. n. 3.  
*Frisch inf.* 4. t. 14.  
*Pet. gaz.* t. 22. f. 9.  
*Schaeff. ic.* t. 23. f. 4.

*Habitat*

- Habitat in Europae hortis; larva radices brassicae lotrydis, et capitatae destruit, intacta viridi et sabauda; imago pomonam devastat, intacta pyro communi.*
- regius. 241. *Sc. cupreo-nitidus*, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 42. n. 40. mant. inf. 1. p. 22. n. 49.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, splendentis statura.*
- splendens. 242. *Sc. ater*, elytris vitta abbreviata aurea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 41. n. 39. mant. inf. 1. p. 22. n. 48.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- ferrugineus. 243. *Sc. rufus* thorace elytrisque vage punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 22. n. 47. mant. inf. 1. p. 41. n. 38.*  
*Habitat in Coromandel, rauco affinis, at duplo minor.*
- raucus. 244. *Sc. clypeo reflexo*, thorace elytrisque punctatis nigro-aeneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 41. n. 37. mant. inf. 1. p. 22. n. 46.*  
*Habitat in Coromandel, subtus niger.*
- rupicola. 245. *Sc. villosus* virefcens, capite nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 41. n. 36. mant. inf. 1. p. 22. n. 44.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- innubus. 246. *Sc. glaber niger*, thoracis margine, abdomine femoribusque testaceis. *Fabr. mant. 1. p. 22. n. 45.*  
*Habitat in - - - parvus, nitidus, thorace punctato, elytris substriatis.*
- errans. 247. *Sc. testaceus*, thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 41. n. 35. mant. inf. 1. p. 22. n. 43.*  
*Habitat in - - -*
- Cardui. 248. *Sc. glaber viridi-aeneus*, abdomine rufo-cinereo villosa. *Fabr. mant. inf. 1. p. 21. n. 42.*  
*Habitat in Africae carduo pycnocephalo, Sc. Frischii statura, at paulo minor.*
- Vitis. 249. *Sc. viridis*, thoracis lateribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 41. n. 34. mant. inf. 1. p. 21. n. 41.*  
*Scop. ent. carn. Scarabaeus dubius.*  
*Voet coleoptr. t. 6. f. 56. 57.*  
*Sulz. hist. inf. t. 1. f. 11.*  
*Habitat in Europae et Americae vite, Sc. Frischii valde affinis, varians elytris testaceis.*

- Frifchii. 250. Sc. nigro-aeneus, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 41. n. 33. *mant. inf.* I. p. 21. n. 40.  
*Frifch inf.* 4. p. 29. t. 14.  
*Voet coleoptr.* t. 6. f. 55. et t. 7. f. 58.  
*Habitat in Germaniae vite et rofa, in Brasilia, rarius elytris thoraci concoloribus.*
- janthinus. 421. Sc. obsolete violaceus, thoracis margine externo, elytris, abdomine pedibusque testaceis, ano fusco violaceo femoribus anterieus violaceis. *Muf. Lesk.* p. 3. n. 62.  
*Habitat in Europa, ftatura et magnitudine Sc. Frifchii.*
- coriarius. 422. Sc. fusco-violaceus, thorace fusco-luteo piloso, capitis clypeo apice reflexo, elytris testaceis. *Muf. Lesk.* p. 4. n. 72.  
*Habitat in Europa.*
- holofericeus. 251. Sc. fupra viridis holofericeus fubtus cupreus, elytris lineis elevatis quatuor. *Fabr. mant.* I. p. 21. n. 39.  
*Habitat in Ruffia magis australi, Sc. Frifchii ftatura et magnitudine.*
- auftriacus. 252. Sc. glaber, elytris fufcis: marginis exterioris plica elevata, feutelli macula quadrata. *Schranck enum. inf. Auftr.* p. 11. *Herbst apud Fueffli Arch. Inf.* 4. p. 16. n. 12. t. 19. f. 26.  
*Habitat in Auftria, an varietas agricolae?*
- laetus. 253. Sc. fupra glaber aureus, thoracis linea dorfali feutelloque fanguineis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 40. n. 32. *mant. inf.* I. p. 21. n. 58.  
*Habitat in nova Seelandia.*
- feftus. 254. Sc. fupra glaber viridis, thorace linea dorfali, elytris ftatura nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 40. n. 31. *mant. inf.* I. p. 21. n. 37.  
*Habitat in nova Seelandia.*
- rufescens. 255. Sc. glaber rufescens, elytris testaceis, clypeo quinque-dentato. *Fabr. sp. inf.* I. p. 40. n. 30. *mant. inf.* I. p. 21. n. 36.  
*Voet coleoptr.* t. 19. f. 76.  
*Habitat ad caput bonae fpei.*

obscurus. 256. Sc. obscure piceus immaculatus, pilis brevissimis erectis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 40. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 21. n. 35.

*Habitat in Africa aequinoctiali, rufescentis magnitudine.*

erythrocephalus. 257. Sc. glaber pallidus, capite rubro basi nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 40. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 21. n. 34.

*Petagn. sp. inf. Calabr.* p. 5. n. 18. f. XXXV.

*Habitat in Calabria et Coromandel, melanocephalo affinis, at duplo minor.*

melanocephalus. 258. Sc. glaber rufescens, capite nigro, clytris pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 40. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 21. n. 33.

*Voet coleopt. t.* 9. f. 80.

*Habitat in Brasilia.*

ferratus. 259. Sc. obscure testaceus, clypeo emarginato, thoracis margine ferrato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 35. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 19. n. 2.

β) *Melolontha sibirica.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 35.

*Habitat in Coromandel, melolonthae magnitudine, β) triplo minor in Sibiria.*

Melolontha. 60. Sc. scutellatus muticus testaceus, thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis albis. *Fn. succ.* 392.\* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 70. n. 1. *Scop. ent. carn.* 16.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 35. n. 3. *mant. inf.* p. 19. n. 3. *Melolontha (vulgaris) testacea,* thorace villoso, incisuris abdominis albis.

*Mouff. inf.* 160. f. 2.

*Lister scar. Angl.* 379.

*Aldrov. inf.* 454. t. sup. f. 2.

*Hoefn. inf. t.* 1. f. 11.

*Goed. inf.* 1. t. 78.

*Merian. europ.* 1. p. 2. f. 4.

*Frisch inf.* 4. t. 14.

*Raj. inf.* p. 104. n. 1.

*Pet. gaz. t.* 9. f. 2.

*Alb. inf.* 60.

*Roes. inf.* 2. scar. 1. t. 1.

*Leeuwenh. epist.* 1. p. 18.

*Sulz. inf. t.* 1. f. 3.

*Schaeff. elem. t.* 8. f. 3. et. t. 109. f. 5.

*icon. t.* 93. f. 1. 2.

*Voet coleopt. t.* 6. f. 45. 46.

*Degeer inf.* 4. t. 10. f. 14.

*Habitat*

*Habitat in Europae parte magis boreali vulgatissimus, in Calabria quoque frequens, unguibus prope basin bidentatis, dente inferiori brevior, vespere circumvolitans, arborum foliis, tilia tamen intacta, visitans, autumno copiosior morbos praenuncians, oleum infusum cimicifugum reddens, meleagridum gallinarum, vespertilionum gratus cibis, varians annuatim thorace rufo et nigro.*

*Mas cauda acuta inflexa distinctus; larva grisea, capite pedibusque testaceis, plantarum, segetis praesertim radices exedit, sexto demum anno exeunte scarabaeo.*

**solstitialis.** 61. Sc. scutellatus muticus testaceus thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus albis parallelis. *Fr. suec. 393.\**

*Geoffr. inf. par. 1. p. 74. n. 7. Scop. ent. carn. 3.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 7. mant. inf. 1. p. 19. n. 9. Melolontha testacea, thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus pallidioribus.*

*Mouff. inf. 160. f. 3.*

*Lister scar. angl. 301. n. 2.*

*Raj. inf. p. 105. n. 2.*

*Petiv. gaz. p. 36. t. 22. f. 9.*

*Frisch inf. 9. t. 15. f. 3.*

*Schaeff. ic. t. 93. f. 3.*

*Voet coleoptr. t. 6. f. 51. 52.*

*Degeer inf. 4. t. 10. f. 15.*

*Habitat in Europae arboretis, unguibus, ad basin unidentatis, melolontha senior, solstitio aestivo frequentissimus, arborum germinibus frumentaceorum, quorum radices larva rodit, inhaerendo, morbi epidemici Kriebelkrankheit causa?*

**Tau nigrum.** 411. Sc. nigricans subtus lunatus canescens, elytris pilis albis brevissimis, scutello villoso albido T nigro inscripto.

*Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien II. 2. p. 6.*

*Habitat in Hungaria, unguibus medio unidentatis.*

**Ianugithorax.** 412. Sc. unguibus bifidis, posterioribus minoribus posteriorum unico. *Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien II. 2. p. 7. n. 9.*

*Voet coleoptr. t. 4. f. 31.*

*Habitat in Bavariae montibus, ab hirtello distinctus.*

**reflexus.** 260. Sc. glaber testaceus, clypeo reflexo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 6. mant. inf. 1. p. 19. n. 7.*

*Habitat in Africa aequinoctiali, fervido affinis, at paulo minor.*

- Alopex*. 261. Sc. fulvo-hirtus, clypeo reflexo emarginato, clytris glabris nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 19. n. 8.*  
*Habitat ad caput bonae spei, reflexi statura.*
- fervidus*. 262. Sc. testaceus glaber, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. I. p. 36. n. 5. mant. inf. I. p. 19. n. 6.*  
*Habitat in America septentrionali, quasi rore caerulecente tectus.*
- villosus*. 263. Sc. testaceus, clypeo marginato reflexo, corpore fubtus lanato, scutello albo. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 496. mant. inf. I. p. 19. n. 4.*  
*Habitat in Italia, melolonthae statura et magnitudine.*
- atomarius*. 264. Sc. albo-farinofus, thorace canaliculato atro, clytris fuscis, abdomine albo: punctis lateralibus atris. *Fabric. sp. inf. I. p. 43. n. 46. mant. inf. I. p. 23. n. 59.*  
*Habitat ad caput bonae spei, farinofi statura et magnitudine.*
- farinofus*. 64. Sc. scutellatus muticus niger, polline virefcente, clytris abbreviatis. *Fn. Suec. 399.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 43. n. 47. mant. inf. I. p. 23. n. 60.*  
*Melolontha fupra caeruleo-fubtus argenteo-fquamofa nitens, clypeo integro.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 79. n. 13.* Scarabaeus violaceus.  
*Degeer inf. 4. p. 302. n. 30. t. 10. f. 23.* Scarabaeus scutellatus niger, squamulis grifeo-viridibus &c.  
*Drury inf. 2. t. 32. f. 4.* Scarabaeus caeruleus.  
*Voet coleoptr. t. 9. f. 71.*  
*Habitat in Europa magis australi, unguibus posterioribus breviffimis.*
- argenteus*. 265. Sc. niger, fubtus argenteo-nitens, clypeo marginato, clytris testaceis. *Fabr. spec. inf. I. p. 44. n. 48. mant. inf. I. p. 23. n. 61.*  
*Scop. ent. carn. 9. Poda inf. 20.* Scarabaeus argenteus.  
*Voet coleoptr. t. 8. f. 68.*  
*Habitat in Aultria interiori, Calabria et frequens in Angliae floribus.*

266. Sc.

*Melolonthae arborum foliis, cetoniae etiam floribus vifitant; trichii delectantur floribus praefertim umbellatarum; melolontharum larva radicibus, cetoniarum ligno putrefcente fubacidulo vifitat.*



- proboscideus. 266. Sc. niger hirtus, clypeo porrecto subreflexo, elytris testaceis: margine nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 44. n. 49. mant. inf. I. p. 23. n. 62.*  
*Habitat in India, et Africae floribus.*
- spinipes. 267. Sc. niger immaculatus, pedibus posterioribus elongatis: femoribus basi unispinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 44. n. 50. mant. inf. I. p. 23. n. 63.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura crassipedis.*
- dentipes. 268. Sc. niger, elytris testaceis, clypeo quadridentato, femoribus tibiisque posterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 44. n. 51. mant. inf. I. p. 23. n. 64.*  
*Habitat ad caput bonae spei, spinipedi affinis.*
- podagricus. 269. Sc. niger, clypeo tridentato, femoribus tibiisque posterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 44. n. 52. mant. inf. I. p. 23. n. 65.*  
*Habitat in Coromandel, dentipedis statura.*
- arthriticus. 270. Sc. niger, elytris griseis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque posterioribus incrassatis subinermibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 44. n. 53. mant. inf. I. p. 22. 23. n. 66.*  
*Habitat ad caput bonae spei, podagrici minor.*
- gonagricus. 271. Sc. griseus, pedibus rufis, femoribus posterioribus incrassatis muticis. *Fabr. sp. inf. I. p. 45. n. 54. mant. inf. I. p. 24. n. 67.*  
*Habitat ad caput bonae spei, arthritico minor.*
- crassipes. 272. Sc. ater albo-maculatus, pedibus posterioribus elongatis crassissimis. *Fabr. sp. inf. I. p. 45. n. 55. mant. inf. I. p. 24. n. 68.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- pulverulentus. 273. Sc. corpore polline virescenti argenteo, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 45. n. 56. mant. inf. I. p. 24. n. 69.*  
*Sulz. hist. inf. t. I. f. 8.*  
*Habitat in Alsatia et Russia, argenteo duplo minor.*
- sylvicola. 274. Sc. clypeo inflexo integro, corpore nigro glabro. *Fabr. sp. inf. I. p. 45. n. 57. mant. inf. I. p. 24. n. 70.*  
*Habitat in nova Hollandia, elytris fuscis varians.*

- subspino- 275. Sc. flavescens, pedibus rufis, thorace subspinoso. *Fabr.*  
fus. *sp. inf. I. p. 45. n. 58. mant. inf. I. p. 24. n. 71.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*
- Bankfii. 276. Sc. capite thoraceque atris, elytris villosis pedibusque  
testaceis, abdomine brevi retuso. *Fabr. mant. I. p. 24.*  
*n. 72.*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks, pulverulenti statura.*
- aulicus. 65. Sc. scutellatus muticus pilosus luteus, capite nigro, pedi-  
bus posterioribus elongatis uniunguiculatis.  
*Fabr. mant. I. p. 22. n. 51.* *Melolontha (regia) villosa su-  
pra lutea, capite nigro, subtus cinerea.*  
*Habitat in Africa, horticolae magnitudine et statura.*
- abbrevia- 277. Sc. villosus niger, clypeo tridentato, elytris abbreviatis  
tus. testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 45. n. 59. mant. inf. I.*  
*p. 24. n. 73.*  
*Habitat ad caput bonae spei, pilis aliquot albis hirtus.*
- mutabilis. 278. Sc. ater, tomento cinereo villosus. *Fabr. sp. inf. I. p. 45.*  
*n. 60. mant. inf. I. p. 24. n. 74.*  
*Voet coleoptr. t. 9. f. 75.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- chryfo- 279. Sc. ater, elytris auro nitentibus, antennis pedibusque te-  
melinus. staceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 46. n. 61. mant. inf. I. p. 24.*  
*n. 75. Schranck inf. austr. 16. n. 25.*  
*Habitat in Americae borealis, Germaniae ligno putrescente.*
- verficolor. 280. Sc. obscure aeneus, elytris tomento cinereo nitidulis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 46. n. 62. mant. inf. I. p. 24. n. 76.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- capicola. 281. Sc. niger hirtus, scutello abdomineque albidis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 46. n. 63. mant. inf. I. p. 24. n. 77.*  
*Voet coleoptr. t. 9. f. 75.*  
*Habitat ad caput bonae spei, parvus.*
- picatus. 282. Sc. glaber ferrugineus, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 46. n. 64. mant. inf. I. p. 24. n. 78.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura capicolae.*
- lineatus. 283. Sc. obscure virescens, elytris lineis duabus rufis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 46. n. 65. mant. inf. I. p. 24. n. 79.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, parvus, gibbus.*

- gibbus.** 284. *Sc. gibbus testaceus, tomento cinerascente nitidulus. Fabr. sp. inf. I. p. 46. n. 66. mant. inf. I. p. 24. n. 80.*  
*Habitat ad caput bonae spei, lineato magis gibbus.*
- monticola.** 285. *Sc. testaceus glaber, capite atro, clypeo integro reflexo. Fabr. sp. inf. I. p. 46. n. 67. mant. inf. I. p. 24. n. 81.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- humeralis.** 286. *Sc. ater, elytris basi puncto-que medio pallidis. Fabr. sp. inf. I. p. 46. n. 68. mant. inf. I. p. 24. n. 82.*  
*Habitat in Europae graminosis.*
- Urfus.** 287. *Sc. ater hirsutissimus, pedibus quatuor anterioribus testaceis. Fabr. sp. inf. I. p. 47. n. 69. mant. inf. I. p. 24. n. 83.*  
*Habitat ad caput bonae spei, pedibus aliquando omnibus nigris.*
- Lynx.** 288. *Sc. niger hirtus, clytrorum margine aureo. Fabr. sp. inf. I. p. 47. n. 70. mant. inf. I. p. 24. n. 84.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- longipes.** 66. *Sc. scutellatus muticus atro-cyaneus, pedibus nigris, posterioribus elongatis uniunguiculatis. Fabr. sp. inf. I. p. 47. n. 71. mant. inf. I. p. 24. n. 85.*  
*Melolontha (crinita) hirta, supra viridis, subtus nigra. Pall. ic. inf. Ross. t. A. f. 17. Scarabaeus bombyliiformis. Habitat ad caput bonae spei.*
- hirtus.** 289. *Sc. hirtus, capite thoraceque viridibus, elytris fuscis. Fabr. sp. inf. I. p. 47. n. 72. mant. inf. I. p. 25. n. 86.*  
*Pall. ic. inf. Ross. t. A. f. 15. Scarabaeus Alopecias. Habitat in Sibiria.*
- Vulpes.** 290. *Sc. aureus fulvo hirtus, abdomine ferrugineo. Fabr. sp. inf. I. p. 47. n. 73. mant. inf. I. p. 25. n. 87.*  
*Habitat in Sibiria.*
- bombylius.** 291. *Sc. niger cinereo hirtus, clytris testaceis: lineis tribus apicis albidis. Fabr. mant. inf. I. p. 25. n. 88.*  
*Habitat in Africae plantis, vulpis magnitudine et statura.*
- vittatus.** 292. *Sc. cyaneus pilosus, clytris testaceis: lineis tribus albicantibus. Fabr. sp. inf. I. p. 47. n. 74. mant. inf. I. p. 25. n. 89.*  
*Lepechin it. I. p. 508. t. 16. f. 9. Scarabaeus acuminatus. Pall.*

- Pall. it. 1. p. 462. n. 26. icon. inf. Ross. 1. p. 14. t. A. f. 14.*  
*Scarabaeus oxypterus.*  
*Petiv. gazoph. t. 11. f. 12.*  
*Voet coleoptr. t. 5. f. 35.*  
*Habitat in America australi et India.*
- bimaculatus. 293. *Sc. oblongus glaber testaceus, thorace utrinque macula abdomineque flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 19. n. 10.*  
*Habitat in Sina, solstitiali maxime affinis.*
- atriplicis. 294. *Sc. oblongus villosus pallidus, elytris futura apiceque nigris, clypeo reflexo. Fabr. mant. 1. p. 19. n. 11.*  
*Habitat in Barbariae atriplice halimifolia, ruficornis statura et magnitudine.*
- ruficornis. 295. *Sc. villosus testaceus, abdomine albicante. Fabr. sp. inf. 1. p. 87. n. 8. mant. pl. 1. p. 20. n. 12.*  
*Habitat in Germania, an varietas solstitialis?*
- teres. 296. *Sc. oblongus glaber niger, elytris obsolete striatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 37. n. 9. mant. inf. 1. p. 20. n. 13.*  
*Scop. ent. carn. 19. Scarabaeus oblongus.*  
*Habitat in Germania superiore, an ab oblongo diversus?*
- lanigerus. 67. *Sc. scutellatus muticus, subtus lanatus, capite thoraceque lanatis, elytris luteis. Mus. Lud. Utr. 20.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 37. n. 10. mant. inf. 1. p. 20. n. 14.*  
*Melolontha (lanigera) subtus lanata, capite thoraceque aurcis, elytris luteis.*
- brunus. 72. *Sc. scutellatus muticus testaceus, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 26. mant. inf. 1. p. 21. n. 32.*  
*Melolontha (brunnea) glabra testacea, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 83. n. 22. Degeer inf. 4. p. 277. n. 23. t. 10. f. 17. Scarabaeus fulvus.*  
*Voet coleoptr. t. 7. f. 53. 54.*  
*Habitat in Europae arboretis.*
- signatus. 297. *Sc. glaber pallidus thorace lineis duabus, elytris maculis tribus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 25. mant. inf. 1. p. 21. n. 31.*  
*Habitat in Jamaica, ruficollis magnitudine.*

ruficollis. 298. Sc. glaber punctatus ferrugineus, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 24. mant. inf. 1. p. 21. n. 30.*  
*Habitat in Coromandel, brunneo major.*

pallens. 299. Sc. glaber testaceus capite elytrorumque futura nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 23. mant. inf. 1. p. 21. n. 29.*  
*Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 13. n. 4. t. 19. f. 21. a. b.*  
*Melolontha spinipes.*  
*Habitat ad caput bonae spei, et in India, solstitiali similis.*

hirticollis. 300. Sc. hirtus niger, elytris punctatis glabris rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 21. n. 28.*  
*Habitat in Africa, fusci magnitudine.*

fuscus. 301. Sc. glaber testaceus, capite obscuriore, elytris striatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 22. mant. inf. 1. p. 20. n. 27.*  
*Habitat in terra del fuego.*

triflis. 302. Sc. thorace villoso obscuro, elytris laevibus testaceis, scutello albo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 21. mant. inf. 1. p. 20. n. 26.*  
*Habitat in America boreali, fusco affinis.*

striatus. 303. Sc. glaber aeneus, elytris striatis: futura lineisque quatuor cupreis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 39. n. 20. mant. inf. 1. p. 20. n. 26.*  
*Habitat in terra del fuego.*

luridus. 304. Sc. thorace nigro: margine pallido, elytris griseis nigropunctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 19. mant. inf. 1. p. 20. n. 24.*  
*Habitat - - -*

glacialis. 305. Sc. glaber piceus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 18. mant. inf. 1. p. 20. n. 23.*  
*Habitat in terra del fuego.*

dorsalis. 306. Sc. glaber testaceus, capite, thoracis elytrorumque dorso nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 17. mant. inf. 1. p. 20. n. 22.*  
*Habitat Tranquebariae.*

bicoloratus. 307. Sc. glaber viridis, subtus testaceus, pedibus apice aureis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 38. n. 16. mant. inf. 1. p. 20. n. 21.*  
*Voet coleoptr. t. 8. f. 66.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

*futuratus*. 308. Sc. viridis, elytrorum futura flavescente. *Fabr. sp. inf. I. p. 38. n. 15. mant. inf. I. p. 20. n. 20.*  
*Habitat in nova Seelandia.*

*aeratus*. 309. Sc. glaber aeneus, abdominis lateribus albis, elytris acuminatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 38. n. 14. mant. inf. I. p. 20. n. 19.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

*viridis*. 310. Sc. glaber, supra viridis, subtus aureus. *Fabr. sp. inf. I. p. 38. n. 13. mant. inf. I. p. 20. n. 18.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

*glabratus*. 311. Sc. testaceus nitidus, sterno anteriori porrecto obtuso. *Fabr. sp. inf. I. p. 30. n. 12. mant. inf. I. p. 20. n. 17.*  
*Habitat in America australi et India.*

*punctatus*. 76. Sc. scutellatus muticus testaceus, elytris punctis tribus subfuscis obsoletis distantibus. *Mus. Lud. Ulr. 23.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 38. n. 11. mant. inf. I. p. 20. n. 16.*  
*Melolontha testacea, elytris punctis tribus fuscis distantibus.*  
*Gron. zooph. 438.*  
*Drury inf. I. t. 34. f. 5.*  
*Voet coleoptr. t. 8. f. 65.*  
*Habitat in America, laevis, aurati magnitudine, unguibus arcuatis acutissimis.*

*longicornis*. 312. Sc. supra glaber niger, elytris ferrugineis, antennarum clava elongata. *Fabr. mant. inf. I. p. 20. n. 15.*  
*Habitat ad caput bonae spei, lanigeri statura et magnitudine.*

*unicolor*. 313. Sc. totus spadiceus laevis, elytris punctis impressis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 154. n. 18. t. 43. f. 5.*  
*Habitat in India, brunno similis, at quadruplo major.*

*ciliatus*. 314. Sc. niger subtus pilosus, elytris villosis et thorace posteriori pilis longis albis ciliato punctatis. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 155. n. 19. t. 43. f. 6.*  
*Habitat in India, antennis ad fullonem accedens, his pedibusque fuscis.*

*pestiferus*. 315. Sc. holosericeus obscurus albo-obumbratus, elytris costatis. *Sut. hist. inf. t. 1. f. 9.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 155. n. 21. Melolontha Berolinensis.*  
*Voet coleoptr. t. 21. f. 150.*

*Habitat*

*Habitat in Germania et Helvetia, brunneo similis, at brevior, magisque rotundatus et convexus.*

- cerealis. 316. Sc. scutellatus, subtus hirsutus, abdominis latere utroque albo-maculato. *Scop. delic. insubr. I. p. 49. t. 21. f. B. a. b. c.*  
*Habitat in Insubria, sub initium aestatis vespere frequens in celti australi aliisque arboribus, melolonthae valde affinis.*
- lunatus. 317. Sc. exscutellatus niger, tibiis toto margine exteriori denticulatis. *Scop. delic. insubr. I. p. 52. t. 21. f. E.*  
*Habitat in agro Ticinensi, glaber, totus niger, supra punctulatus.*
- fuscescens. 318. Sc. scutellatus fuscescens, scutello lineola transversa duplicata, tibiis posterioribus quadridentatis. *Scop. delic. insubr. I. p. 53. t. 21. f. F.*  
*Habitat in Insubria, frequens inter segetes, aestate in arboribus, statura solstitialis, supra badius, subtus villis longioribus et rufescentibus hirsutus.*
- deserti. 322. Sc. supra nigricans, subtus lanugine alba obsitus, elytris corpore brevioribus, scutello triangulari villosulo albo. *Lepech. it. I. p. 313. t. 19. f. 7.*  
*Habitat in deserto Sibiriae uralensi, 9 lineas longus, an hujus tribus?*
- sepicola. 55. Sc. scutellatus muticus ferrugineus, thorace elytrisque pilosis. *Mus. Lud. Utr. 24.\**  
*Habitat in India, habitu horticolae, at triplo major.*
- fyriacus. 56. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque piloso viridibus, elytris pilosis ciliatis. *Mus. Lud. Utr. 25.\**  
*Habitat in India, horticolae statura.*
- Leei. 427. Sc. scutellatus muticus caeruleus nitidissimus, capitis disco, thoracis fascia interrupta, elytrorumque vittis quatuor aureis. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 4.*  
*Habitat in India, facie sc. vitis, at duplo fere major.*
- bivittatus. 428. Sc. flavus nitidissimus, capite thoraceque vittis duabus communibus, elytris striis plurimis abbreviatis viridibus. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 5.*  
*Habitat in Brasilia, fervidae facie, at paulo minor.*

†† *mandibula recta.*

a) *acuta*, *Cetoniae*.

- Chrysis.** 49. *Sc. scutellatus muticus*, sterno porrecto, scutello clytris dimidio brevior. *Mus. Lud. Ulr.* 21.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 52. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 15.  
*Cetonia* scutello clytris dimidio brevior, sterno porrecto, corpore viridi.  
*Degeer inf.* 4. p. 319. n. 12. t. 19. f. 4. *Scarabaeus*, scutello longissimo &c.  
*Gron. zooph.* p. 428. t. 15. f. 8.  
*Sulz. hist. inf.* t. 1. f. 10.  
*Voet coleoptr.* t. 8. f. 63.  
*Habitat in America magis australi, aurati colore et magnitudine.*
- furina-** 50. *Sc. scutellatus muticus niger*, thoracis incisurarumque marginibus flavis, sterno porrecto. *Amoen. ac.* 6. p. 391.\* †  
**mus.** *Habitat Surinami.*  
 Caput *linea flava*, abdominis *segmentum ultimum maculis 3-4 flavis pictum.*
- nitidus.** 51. *Sc. scutellatus muticus* thorace postice lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto. *Mus. Lud. Ulr.* 26.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 52. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 13. *Cetonia* thorace postice lobato, capite spina recumbente, sterno cornuto.  
*Degeer inf.* 4. p. 321. n. 16. t. 19. f. 8. 9. *Scarabaeus* scutello minimo &c.  
*Gron. zooph.* 455.  
*Drury inf.* 1. t. 33. f. 5. 6.  
*Roef. inf.* 2. *Scar.* 1. t. B. f. 4.  
*Voet coleoptr.* t. 3. f. 23.  
*Habitat in America, praesertim Carolina.*
- Carmeli-** 323. *Sc. nigro-viridis*, thorace clytrisque testaceis, ano albo  
**ta.** bipunctato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 28. n. 14.  
*Habitat in Africa, statura nitidi, capite nigro.*
- quadri-** 324. *Sc. niger*, ano bipunctato, pedibus rufis; tibiis posterioribus spinis annulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 27. n. 12.  
**punctatus.** *Habitat in India, antennis pedibusque ferrugineis.*
- areatus.** 325. *Sc. niger pubescens*, clytris disco rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 59. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 31. n. 59.  
*Habitat in Virginia.*

326. *Sc.*



- cruentatus. 326. Sc. niger, elytris viridibus nitidis, thoracis margine anoque rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 59. n. 48. mant. inf. I. p. 31. n. 58.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- acuminatus. 327. Sc. obscure aeneus pallido-maculatus, elytris acuminatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 47. mant. inf. I. p. 31. n. 57.*  
*Voet coleopt. t. 4. f. 37.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- maculatus. 328. Sc. aeneus nitidus, thorace utrinque macula, elytris plurimum albis, sterno obtuso. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 46. mant. inf. I. p. 31. n. 36.*  
*Voet coleopt. t. I. f. 8. Antheus.*  
*Habitat in Coromandel, acuminati statura.*
- stolatus. 329. Sc. viridi-fuscus, thorace margine punctisque, elytris fascia media maculisque niveis posterioribus acuminatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 45. mant. inf. I. p. 31. n. 55.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- philippensis. 330. Sc. aeneus nitidus, thorace margine punctisque duobus albis, elytris maculatis acuminatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 44. mant. inf. I. p. 30. n. 54.*  
*Habitat in insulis Philippinis.*
- aurichalceus. 331. Sc. aeneus opacus, elytris acuminatis albo-maculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 43. mant. inf. I. p. 30. n. 53.*  
*Habitat prope Surate Indiae.*
- fordens. 332. Sc. nigro-aeneus, elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 42. mant. inf. I. p. 30. n. 52.*  
*Habitat in Brasilia.*
- tetradactylus. 333. Sc. scutellatus muticus niger, pedibus triunguiculatis, pollice fixo. *Mont. pl. p. 530.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 58. n. 41. mant. inf. I. p. 30. n. 51. Cetonia atra, scutello elytris dimidio brevior, pedibus triunguiculatis: pollice fixo.*  
*Drury inf. I. t. 33. f. 7.*  
*Sloan. jam. 2. 237. f. 2.*  
*Habitat in America meridionali, insulisque oppositis.*

- orichal- 88. *Sc. scutellatus muticus aeneus glaber, subtus ferrugineo*  
cus.           varius. *Syst. nat. T. III. app. p. 224.*  
*Habitat in India.*
- gagates. 334. *Sc. ater nitidus, clypeo truncato reflexo, sterno obtuso.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 57. n. 40. mant. inf. I. p. 30. n. 50.*  
*Forster cent. inf. 6. 6.*  
*Habitat in Sierra Leona Africae.*
- Iris. 335. *Sc. viridis nitidissimus fulco-micans immaculatus. Fabr.*  
*spec. inf. I. p. 57. n. 39. mant. inf. I. p. 30. n. 49.*  
*Habitat Surinami, fulgidi magnitudine, sterno porrecto.*
- fulgidus. 336. *Sc. aeneus nitidissimus, abdominis ultimo segmento pro-*  
minente quadripunctato. *Fabr. sp. inf. I. p. 57. n. 38.*  
*mant. inf. I. p. 30. n. 48.*  
*Voet coleoptr. t. 3. f. 24?*  
*Hospitatur in museo Jll. Banks.*
- tricolor. 337. *Sc. viridi-aeneus hirtus, elytris testaceis: vitta media*  
nigra suturaque aenea. *Fabr. sp. inf. I. p. 57. n. 37.*  
*mant. inf. I. p. 30. n. 47.*  
*Voet coleoptr. t. 7. f. 60.*  
*Habitat in America.*
- quadrico- 338. *Sc. thorace nigro: margine rufo, elytris aeneo-nitidis:*  
lor.           sutura nigra. *Fabr. sp. inf. I. p. 57. n. 36. mant. inf. I.*  
*p. 30. n. 46.*  
*Habitat in Africa.*
- africanus. 339. *Sc. aeneus nitens, capitis spina incumbente, sterno por-*  
recto, elytris punctis nigris striatis. *Fabr. sp. inf. I. p.*  
*57. n. 35. mant. inf. I. p. 30. n. 45.*  
*Drury inf. 2. t. 30. f. 4.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- venereus. 340. *Sc. cupreus nitidus, thorace scutello elytrisque viridibus.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 57. n. 34. mant. inf. I. p. 30. n. 44.*  
*Herbst Arch. Inf. 7. p. 156. n. 10. Cetonia aeruginea.*  
*Voet coleoptr. t. 4. f. 26.*  
*Habitat in Jamaica.*
- aethiopi- 341. *Sc. viridis fulvo micans, elytris maculis duabus nigris,*  
cus.           sterno obtuso. *Fabr. sp. inf. I. p. 56. n. 33. mant. inf.*  
*I. p. 30. n. 43.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali.*

342. *Sc.*

- elegans. 342. *Sc. viridis nitidissimus*, elytrorum sutura punctoque apicis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 42.  
*Habitat in Coromandel, aurati magnitudine.*
- speciosissimus. 343. *Sc. scutellatus aurato-viridis*, punctulatus laevis, tibiis interno latere rufo-ciliatis: posterioribus edentatis bispinosis. *Scop. delic. insubr.* p. 48. t. 21. f. A. a. b.  
*Habitat - - - Eremita major, aurato affinis, at corpore utrinque splendidissimo, thoracis foveis nullis, abdomine posterius non punctato, ejusque segmento primo absque lateribus unidentatis distinctus.*
- coruscans. 344. *Sc. cyaneus*, thoracis margine elytrisque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 41.  
*Voet coleopr.* t. 8. f. 62.  
*Habitat in India.*
- limbatus. 345. *Sc. niger*, thoracis margine ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 40.  
*Habitat in Aegypto.*
- fuliginosus. 346. *Sc. scutellatus niger*, supra opacus, subtus nitens, segmento femorali in dentem exeunte. *Scop. delic. insubr.* 1. p. 51. t. 21. f. D. b.  
*Habitat Paviae in hortis, campis, frequens in floribus onopordi acanthii, statura nobilem simulans.*
- quinquelineatus. 347. *Sc. niger*, thorace quinquelineato, elytris albo maculatis, clypeo reflexo spinaeque incumbente. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 30. n. 39.  
*Hospitatur in museo Ill. Banks.*
- semipunctatus. 348. *Sc. viridis nitidus*, thorace quadrilineato, elytris basi lineatis, apice punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 29. n. 38.  
*Habitat - - - mediae magnitudinis, subtus albo villosus.*
- trilineatus. 349. *Sc. niger*, thorace lineis tribus, elytris fascia flexuosa scutelloque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 37.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- pictus. 350. *Sc. niger*, thorace quinquelineato, elytris acuminatis albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 56. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 36.  
*Habitat in Oriente.*

- olivaceus.** 351. Sc. testaceus, thorace lineis punctisque duobus, elytris maculis quatuor transversis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 55. n. 26. mant. inf. 1. p. 29. n. 35.*  
*Habitat in Sierra Leona Africae.*
- thoracicus.** 352. Sc. niger, thorace ferrugineo, elytris nigris subpurpurascens. *Fabr. sp. inf. 1. p. 55. n. 25. mant. inf. 1. p. 29. n. 34.*  
*Habitat Alexandriae in Aegypto.*
- alexandrinus.** 353. Sc. niger, thoracis margine elytrisque testaceis, elytris futura fasciisque dentata nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 55. n. 24. mant. inf. 1. p. 29. n. 33.*  
*Habitat Alexandriae in Aegypto.*
- sinuosus.** 354. Sc. fusco-viridis, thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 55. n. 23. mant. inf. 1. p. 29. n. 32.*  
*Degeer inf. 7. p. 639. n. 38. t. 47. f. 20.* Scarabaeus punctato-marginatus.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Ephippium.** 355. Sc. niger, thoracis margine lineaque dorsali, elytris macula difformi ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 29. n. 31.*  
*Voet coleoptr. t. 9. f. 81.*  
*Habitat in India, lineolae statura et magnitudine.*
- lineola.** 53. Sc. muticus niger, lineola flava a capite ad scutellum ducta. *Fabr. sp. inf. 1. p. 55. n. 22. mant. inf. 1. p. 29. n. 30.*  
*Degeer inf. 4. p. 320. n. 13. t. 13. f. 5.* Scarabaeus scutellatus niger nitidus flavo-maculatus &c.  
*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. B. f. 7.*  
*Voet coleoptr. t. 9. f. 81.*  
*Habitat in America, stercorario minor.*
- sticticus.** 54. Sc. scutellatus muticus niger glaber, punctis albis sparsis, abdomine subtus punctis quatuor albis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 18. n. 5. t. 19. f. 27.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 59. n. 51. mant. inf. 1. p. 31. n. 61.*  
Cetonia clypeo emarginato nigra albo-maculata, abdomine subtus punctis quatuor albis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 79. n. 14.* Scarabaeus nigro-caeruleicens &c.  
*Raj. inf. p. 104. n. 8.*  
*Habitat in Galliae et Calabriae carduis.*

- funestus. 356. Sc. glaber niger, thorace elytrisque albo-punctatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 31. n. 62. Scop. ent. carn. 7.*  
*Habitat in Carniola et Italia, mediae magnitudinis.*
- thebanus. 357. Sc. niger, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris albo punctatis, dorso rufo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 59. n. 52. mant. inf. 1. p. 31. n. 64. Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 1. f. 8. et apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 18. n. 6. t. 19. f. 28.*  
*Habitat in Aegypto.*
- floralis. 358. Sc. glaber niger, thoracis, elytrorum abdominisque margine albo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 31. n. 63.*  
*Habitat in Africae floribus compositis, satis magnus.*
- lugubris. 359. Sc. glaber ater, elytris macula laterali anoque albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 53. mant. inf. 1. p. 31. n. 65.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Histrion. 360. Sc. testaceus, capite, thoracis lineis duabus, elytrorum futura maculisque tribus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 54. mant. inf. 1. p. 31. n. 66.*  
*Habitat in Aegypto.*
- albellus. 361. Sc. ater, thorace, margine elytrisque maculis sparsis albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 55. mant. inf. 1. p. 31. n. 67. Pall. it. 1. p. 462. n. 17. ic. inf. Ross. 1. p. 17. t. A. f. 18.*  
*Herbst apud Fueßli Arch. inf. 4. p. 18. n. 7. t. 19. f. 29.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- hottentottus. 362. Sc. ater glaber, elytris posterius punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 56. mant. inf. 1. p. 31. n. 68.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- cruentus. 363. Sc. ater glaber, thorace posterius maculis duabus elytris-que vitta sanguineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 32. n. 69.*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks, statura hottentotti.*
- fqualidus. 68. Sc. scutellatus muticus niger hirtus, thorace subcarinato. *Scop. ent. carn. 13.*  
*Voet coleoptr. t. 4. f. 33.*  
*Habitat in Germania, hirtello similimus, an varietas?*
- hirtellus. 69. Sc. scutellatus muticus hirtus testaceo-nigricans, elytris pallido-maculatis.

Fabr.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 59. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 31. n. 60.  
*Cetonia* (*hirta*) *nigricans hirta* elytris pallido maculatis,  
 thorace carinato.

*Scop. ent. carn.* 8. *Poda inf.* 21. *Scarabaeus hirtus*.

*Voet coleoptr. t.* 14. f. 34.

*Habitat in Europa magis australi, vere etiam frequens in omnibus desertis Volgae finitimis ad Terek usque, vitis ibi gemmas foliiferas et floriferas exedens, fasciato dimidio minor.*

cafer. 364. *Sc. viridis*, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 29.  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*

marginatus. 365. *Sc. glaber ater*, thoracis elytrorumque marginibus rufis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 55. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 28.  
*Drury inf.* 2. t. 32. f. 1.  
*Voet coleoptr. t.* 1. f. 4.

insignitus. 366. *Sc. thorace nigro: margine albo, elytris testaceis: futura margineque nigris.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 54. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 29. n. 27.  
*Voet coleoptr. t.* 2. f. 13.  
*Habitat ad caput bonae spei.*

capensis. 73. *Sc. scutellatus muticus rufus hirtus, adspersus punctis albis.* *Mus. Lud. Utr.* 30.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 54. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 26. *Cetonia hirta rufa albo-punctata.*  
*Degeer inf.* 7. p. 640. n. 40. t. 48. f. 2. *Scarabaeus albo-punctatus.*  
*Petiv. gaz. t.* 8. f. 6.  
*Roef. inf.* 2. *scar.* 1. t. B. f. 6.  
*Drury inf.* 1. t. 33. f. 3.  
*Voet coleoptr. t.* 2. f. 11.  
*Habitat in Africa.*

cafer. 367. *Sc. viridis nitidus*, thoracis margine elytrorumque maculis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 54. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 25.  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus, punctis inter oculos 2 albis.*

Eremita. 74. *Sc. scutellatus aeneo-ater*, thorace inaequali, thorace sulco longitudinali. *Scop. ent. carn.* 15. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 53. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 28. n. 23.

*Degeer*

*Degeer inf. 4. p. 300. n. 28. t. 10. f. 22.* Scarabaeus coriarius &c.

*Voet coleoptr. t. 3. f. 21.* Scarabaeus lugubris.

*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. 3. f. 8.*

*Bergstr. nomencl. 1. t. 10. f. 1.*

*Schaeff. ic. t. 26. f. 1.*

*Habitat in pyri, falicis truncis putridis, recens corium ruficum olens.*

fascicula- 75. Sc. scutellatus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. *Mus. Lud. Ulr. 26.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 53. n. 16. mant. inf. 1. p. 28. n. 24.*  
*Drury inf. 1. t. 33. f. 2.*  
*Voet coleoptr. t. 3. f. 17.*  
*Habitat ad caput bonae spei, subtus lana helvola in fasciculos digesta vestitus.*

amarag- 368. Sc. ferrugineo-flavescens, elytris virescentibus, sterno dinus. cornuto. *Fabr. sp. inf. 1. p. 53. n. 14. mant. inf. 1. p. 28. n. 22.*  
*Habitat in America.*

moestus. 369. Sc. piceus, abdominis segmentis margine albis, clypeo emarginato, sterno cornuto. *Fabr. sp. inf. 1. p. 53. n. 13. mant. inf. 1. p. 28. n. 21.*  
*Habitat in America boreali.*

aterri- 370. Sc. niger obscurus, elytris obsolete rufo-maculatis. *Fabr. mus. sp. inf. 2. app. p. 496. mant. inf. 1. p. 28. n. 19.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura lanii.*

corniger. 371. Sc. niger obscure immaculatus, thoracis margine anteriori subcornuto. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 496. mant. inf. 1. p. 28. n. 20.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura aurati.*

ruber. 372. Sc. scutellatus ruber, elytris nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 53. n. 12. mant. inf. 1. p. 28. n. 18.*  
*Roef. inf. 2. Scar. 1. t. B. f. 3.*  
*Voet coleoptr. t. 2. f. 16.*  
*Hospitatur in museo Ill. Banks.*

Lanius. 77. Sc. exscutellatus muticus ruber, adpersus punctis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 52. n. 11. mant. inf. 1. p. 28. n. 17.*  
*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 7. 8.*

Kkkkk

Drury

- Drury inf. 1. t. 33. f. 8.*  
*Voet coleoptr. t. 5. f. 44.*  
*Habitat in America meridionali.*
- S. Fran- 373. *Sc. piccus*, thoracis margine flavescente, sterno porrecto.  
 cifci. *Fabr. mant. inf. 1. p. 28. n. 16.*  
*Habitat in India, statura chrysis.*
- micans. 374. *Sc. viridis nitens*, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis  
 anterioribus ferratis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 50. n. 1. mant.*  
*inf. 1. p. 26. n. 1.*  
*Drury inf. 1. t. 32. f. 3.*  
*Habitat in Sierra Leona Africae.*
- sinensis. 375. *Sc. aeneus*, clypeo emarginato subspinoso, thorace po-  
 sterius lobato, elytris acuminatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 90.*  
*n. 2. mant. inf. 1. p. 26. n. 2.*  
*Forster cent. inf. 2. 2.*  
*Voet coleoptr. t. 5. f. 40.*  
*Habitat in Sina.*
- nigrita. 376. *Sc. glaber ater*, clypeo emarginato subspinoso, thorace  
 potterius lobato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 50. n. 3. mant. inf.*  
*1. p. 26. n. 3.*  
*Hermann mus. p. 17. n. 257.*  
*Petiv. gazoph. t. 28. f. 3.*  
*Habitat in Zeylon.*
- auratus. 28. *Sc. scutellatus auratus*, segmento abdominis primo lateri-  
 bus unidentato, clypeo planiusculo. *Fn. succ. 400. Scop.*  
*ent. carn. 17.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 50. n. 4. mant. inf. 1. p. 26. n. 4. Ceto-*  
*nia aurata*, segmento abdominis primo lateribus uniden-  
 tato, elytris albo maculatis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 73. n. 5.*  
*Hoeffn. pict. t. 6. f. prior.*  
*Frisch inf. 12. 25. t. 3. f. 1.*  
*Raj. inf. p. 76. n. 7.*  
*Roef. inf. 2. scar. 1. t. 2. f. 8. 9.*  
*Degeer inf. 4. p. 279. n. 25. t. 11. f. 1. Scarabaeus Sin-*  
*ragdus.*  
*Bergstr. nomencl. 1. 14. n. 5. 6. 7. t. 2. f. 5. 6. 7.*  
*Schaeff. icon. t. 26. f. 2. 3. 7. et t. 50. f. 8. 9.*  
*Voet coleoptr. t. 1. f. 1. 2. 3.*  
*Drury inf. 1. t. 33. f. 1.*



*Pet. gaz. t. 23. f. 12.*

*Worm mus. 342.*

*Ammir. inf. t. 12.*

*Habitat, magnitudine et colore varius, in Europa, larva in lignis putrescentibus, et formicarum acervis, imago in floribus, praesertim paeoniae, sorbi aucupariae, tacta per anum ejicit liquorem foetidissimum.*

*Sternum porrectum; pectoris latera posterius in dentem terminata.*

**Morio.** 377. *Sc. niger obscurus, corpore subtus nitidiore. Fabr. sp. inf. 1. p. 51. n. 5. mant. inf. 1. p. 27. n. 6. Voet coleoptr. t. 2. f. 14. Habitat in Europa australi, aurato proxime affinis.*

**opacus.** 378. *Sc. obscure viridis opacus, capitis clypeo reflexo. Fabr. mant. inf. 1. p. 27. n. 5. Habitat in Africae floribus compositis, aurati magnitudine et statura.*

**erythro-**  
**pus.** 379. *Sc. niger, capitis clypeo porrecto basi utrinque sinuato, thoracis limbo elytrorumque margine cinereis. Fabr. mant. 1. p. 27. n. 7. Habitat ad caput bonae spei, morionis statura et magnitudine.*

**variabi-**  
**lis.** 79. *Sc. scutellatus laevis opacus ater, elytris albo-punctatis. Fu. succ. 402.\* Fabr. mant. 1. p. 27. n. 11. Cetonia (octopunctata) nigra, thorace punctis quatuor albis. Degeer inf. 4. p. 301. n. 29. t. 10. f. 22. Scarabaeus albo-punctatus. Schaeff. ic. t. 198. f. 8. Voet coleoptr. t. 5. f. 42. Habitat in Germaniae et Sibiriae quercubus, colore rubro et aureo varians; mas quintuplo minor.*

**aerugino-**  
**fus.** 80. *Sc. scutellatus auratus supra viridis. Gron. mus. 424. t. 15. f. 7. Habitat in regno Tunetano et Calabriae lentisco, statura aurati.*

**cordatus.** 380. *Sc. niger, thorace utrinque puncto baseos elytrisque duobus flavis. Fabr. mant. 1. p. 27. n. 10. Fabr. sp. inf. 1. p. 51. n. 7. Cetonia octopunctata. Habitat*

- Lundii. 381. Sc. ater nitidus, capitis clypeo cordato. *Fabr. mant. 1.*  
p. 27. n. 9.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- nobilis. 81. Sc. scutellatus laevis auratus, abdomine posterius albo-punctato. *Fn. suec. 401.\* Scop. ent. carn. 18.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 51. n. 6.* *Cetonia aurata*, abdomine postice albo-punctato, elytris rugosis.  
*Fabr. mant. 1. p. 27. n. 8.* *Cetonia cuspidata.*  
*Udm. diff. 1.* *Scarabaeus viridi aeneus*, thorace fulcato, elytris rugosis.  
*Degeer inf. 4. p. 297. n. 26.* *Scarabaeus viridulus &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 73. n. 6.*  
*Roef. inf. 2. scar. 1. t. 3. f. 1-5.*  
*Schaeff. icon. t. 66. f. 5.*  
*Voet coleoptr. t. 4. f. 28.*  
*Habitat in Europa, larva (grisea, capite sanguineo, pedibus flavescens) in ligno putrescente, imago in floribus praesertim umbellatarum.*
- aeneus. 82. Sc. scutellatus oblongus cyaneus glaber, abdomine testaceo, capitis apice tridentato. *Mus. Lud. Ulr. 29.\**  
*Habitat - - - brunni magnitudine, subtus pubescens.*
- caeruleus. 382. Sc. glaberrimus glaucus, elytris chalybeis punctato-striatis, maculis quinque albis. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 19. n. 8. t. 19. f. 30.*  
*Habitat in India.*
- metallicus. 383. Sc. viridis auratus, subtus violaceus, annulis abdominis quatuor macula alba notatis. *Herbst apud Fueßli n. ent. Mag. 1. p. 314.*  
*Habitat in Europa.*
- bimucronatus. 384. Sc. testaceus, tibiis anterioribus majoribus barbatis, clypeo utrinque mucronato, villis fimbriato. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 13. n. 13. t. A. f. 13.*  
*Habitat in Amboina, habitu longimani, eremita duplo major.*
- aureolus. 385. Sc. depresso-subangulatus, polline aureolus, thorace elytrisque nigro-punctatis. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 18. t. A. f. 20.*  
*Habitat in Dauria, Junio in rheo compacto florente frequens, farinoso affinis, an hujus tribus?*

- glaucus.** 386. Sc. cylindraceus, totus testaceus glaber, commissura thoracis pallido-villosa, abdomine glauco. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 19. t. B. f. A. 22.*  
*Habitat in sabuletis Anketeri inter Cumam et Caucasum, vere frequens fullonis magnitudine.*
- sanguinolentus.** 387. Sc. depresso-angulatus niger, thorace supra elytrisque disco rubris, punctis elytrorum abdominisque crebris albis. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 21. t. B. f. A. 24.*  
*Habitat in America boreali, silitici forma et magnitudine.*
- pulcher.** 429. Sc. thorace elytrisque pulchre variegatis laevibus, capite nigro: spina incumbente. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 6.*  
*Habitat in insula Tobago, marginati facie et magnitudine, subtus totus, antennis pedibusque ater.*
- trivittatus.** 430. Sc. thorace vittis tribus albidis, elytris flavo-testaceis: futura limboque nigro, hoc albo maculato. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 7.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, curato paulo minor, et magis depressus.*
- subfasciatus.** 431. Sc. scutellatus muticus niger opacus, elytris fasciis quatuor lateralibus abbreviatis fulvis: posteriori maxima. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 8.*  
*Habitat ad caput bonae spei, aurato paulo minor et magis depressus.*
- scabriusculus.** 432. Sc. aureo-niger, elytris anterioribus glabris posterioribus scabriusculis: linea elevata glabra abdomine utrinque albo-maculato. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 9.*  
*Habitat - - - aurati facie, at paulo major.*

b) *mandibula obtusa*, Trichii.

- fasciatus.** 70. Sc. scutellatus niger tomentoso-flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. *Fn. suec. 395.\* Scop. ent. carn. 5. Fabr. sp. inf. 1. p. 48. n. 1. mant. inf. 1. p. 25. n. 1. Trichius niger tomentoso flavus, elytris fasciis tribus nigris abbreviatis.*  
*Mouff. inf. 161. f. 6.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 80. n. 16.*  
*Gunner act. Nidros. 4. t. 16. f. 2.*  
*Schaeff. ic. t. 1. f. 4.*

Kkkkk 3

Degeer

*Degeer inf.* 4. t. 10. f. 19.

*Drury inf.* 1. t. 36. f. 2.

*Voet coleoptr.* t. 5. f. 43.

*Habitat in Europae borealis, etiam Calabriae ulterioris floribus syringae, filipendulae, umbellatarum.*

fuccin- 388. Sc. niger tomentoso cinereus; elytris nigris: fasciis dua-  
ctus. bus flavis. *Fabr. mant.* 1. p. 25. n. 2. *Pall. ic. inf. Ross.*  
1. t. A. f. 19.

*Habitat in Germania, statura fasciati, at duplo minor.*

indus. 71. Sc. scutellatus thorace hirsuto, elytris lividis fusco-pun-  
ctatis. *Mus. Lud. Ulr.* 27.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 48. n. 2.  
*mant. inf.* 1. p. 25. n. 3.

*Habitat in India, statura fasciati, cetonius affinis.*

punctula- 389. Sc. capite thoraceque viridi-aeneis glabris, elytris testa-  
tus. ceis, abdominis ultimo segmento prominente bipunctato.  
*Fabr. mant.* 1. p. 25. n. 4.

*Hospitatur in museo Ill. Banks.*

bibens. 390. Sc. capite et thorace viridi-aeneis pilosis, elytris testaceis  
viridi nitentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 48. n. 3. *mant. inf.*  
1. p. 26. n. 5.

*Habitat in America.*

hemipte- 63. Sc. scutellatus thorace tomentoso rugis duabus longitudina-  
rus. libus marginato, elytris abbreviatis. *Fabr. sp. inf.* 1.  
p. 48. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 26. n. 6.

*Scop. ent. carn.* 28. Scarabaeus variegatus.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 78. n. 17.

*Bergstr. nomencl.* 1. t. 11. f. 7.

*Voet coleoptr.* t. 10. f. 88-90.

*Habitat in Europa, larva in ligno, imago in floribus, femina aculeo ani rigido brevi munita.*

lunula- 391. Sc. glaber cyaneus, elytris lunulis duabus albis. *Fabr.*  
rus. *sp. inf.* 1. p. 49. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 26. n. 7.

*Habitat in Carolina.*

virens. 392. Sc. viridis pubescens, ano albo bimaculato. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 49. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 26. n. 8.

*Habitat in India.*

393. Sc.

- piger. 393. Sc. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis albo maculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 49. n. 7. mant. inf. I. p. 26. n. 9.*  
*Habitat in America boreali.*
- Delta. 394. Sc. thorace nigro: triangulo albo, elytris testaceis: puncto fusco. *Fabr. sp. inf. I. p. 49. n. 8. mant. inf. I. p. 26. n. 10.*  
*Forster cent. inf. I. p. 7. n. 7. Scarabaeus scutellatus muticus flavus thorace atro: triangulo flavo, elytris testaceo-flavis nigro-maculatis.*  
*Drury inf. 2. t. 30. f. 1. 2.*  
*Habitat in Americae floribus.*
- fulvus. 395. Sc. pubescens, thorace fulvo nigro-lineato, elytris testaceis: sutura fulva. *Fabr. sp. inf. I. p. 49. n. 9. mant. inf. I. p. 26. n. 11.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- nigripes. 396. Sc. hirtus fuscus, elytris subtestaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 49. n. 10. mant. inf. I. p. 26. n. 12.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura fulvi.*
- naevius. 397. Sc. supra glaber cinereo-maculatus, capite thoraceque nigris, elytris piccis. *Fabr. sp. inf. I. p. 49. n. 11. mant. inf. I. p. 26. n. 13.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura nigripedis.*
- carbonarius. 423. Sc. hirsutus totus niger, clypeo angusto apice bifido. *Mus. Lesk. p. 4. n. 75.*  
*Habitat extra Europam.*
- unguiculatus. 424. Sc. griseus tomentosus, thorace fusco, clypeo apice angusto fulcato bifido, elytris rufis margine nigris pilosis, pedibus posterioribus elongatis unguiculatis. *Mus. Lesk. p. 4. n. 76.*  
*Habitat extra Europam.*

\*\* *palpis capitatis*, Trox.

- fabulosus. 48. Sc. scutellatus niger opacus, tuberculis rugosis, antennis basi pilosis. *Fn. succ. 390.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 34. n. 1. mant. inf. I. p. 18. n. 1. Trox thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo.*

Kkkkk 4

Scop.

*Scop. ent. carn.* 23. Scarabaeus rugosus.

*Degeer inf.* 4. t. 10. f. 12.

*Habitat in Europae collibus sabulosis apricis.*

arenosus. 398. Sc. thorace subcanaliculato, elytris striatis, corpore obscuro. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 18. n. 2.

*Habitat Halae Saxonum, statura sabulosi, at duplo minor, fuscus.*

suberosus. 399. Sc. griseus, thorace marginato: margine posteriori dentato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 3.

*Habitat in Brasilia.*

horridus. 400. Sc. ater, thorace elytrisque spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 34. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 4.

*Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 10. t. A. f. 10. Scarabaeus pectinatus.

*Habitat in India.*

filphoides. 401. Sc. niger, thorace marginato inaequali, elytris striatis spinosis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 496. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 5.

*Habitat ad caput bonae spei, statura horridi.*

spinicosus. 402. Sc. nigricans, thorace posteriori utrinque emarginato, antennis spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 35. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 18. n. 6.

*Habitat - - -*

tenebrioides. 403. Sc. ovatus piceus glaber, punctato-scaber, clypeo margine ciliato. *Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 9. A. 8. t. A. f. 9.

*Habitat in Dauriae campis glareosis aridis, inter Ononem et Argunum positis, Majo primo veris calore obvius, interdiu humi immobilis.*

morticini. 404. Sc. filphoides, clypeo inaequali ciliato, elytris striatis convexae punctatis hispidulis. *Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 11. t. A. f. 11.

*Habitat in Tatariae desertis aridissimis, ad fluviis Ural et Irty, sub cadaveribus aestivo calore exsiccatis frequens, ani ad elytra attritu stridens, ut sabulosus, niger, opacus, fossoris magnitudine.*

quadriguttatus. 410. Sc. testaceus, capite thoraceque aeneo nitidulis, abdominis ultimo segmento prominulo bipunctato. *Fabr. mant. inf.* 2. app. p. 377.

*Habitat in Sina, statura melolonthae.*

*miliarius*. 425. Sc. elevato punctatus niger, thoracis dorso fulcato, elytris abdomen superantibus decussato striatis. *Mus. Lesk.* p. 3. n. 54.

*Habitat extra Europam, elytris striarum punctatarum ordinibus novem capitis punctis elevatis sex.*

*coracinus*. 426. Sc. niger, frontis tuberculis duobus, thorace tuberculato, elytris abdomen superantibus punctorum elevatorum ordinibus novem. *Mus. Lesk.* p. 3. n. 55.

*Habitat extra Europam.*

*longipes*. 433. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque nigro, elytris pallide testaceis: lunula communi nigra, pedibus posterioribus longissimis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. n. 3. 10.

*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine horticolae, at supra magis depressus.*

\*\*\* *palpis cylindricis, antennarum clava tunicata, Lathrus.*

*cephalotes*. 405. Sc. clypeo emarginato-bilobo. *Pall. it.* 1. app. p. 461. n. 23.

*Laxmann nov. comm. Petrop.* 14. p. 59. n. 4. t. 24. f. 1.

*Pall. ic. inf. Ross.* 1. t. A. f. 1. *Lucanus apterus.*

*Acharius nov. act. Stockh.* 1781. p. 246. t. 5. f. 3-12. *Bulbocerus cephalotes.*

*Scop. introd. in hist. nat.* p. 439. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 2. *Lathrus.*

*Habitat in Tatariae, Rossiae, Hungariae desertis aridis sub terra, monogamus, laevis, niger, subopacus, subrotundus thorace convexo marginato, elytris coalitis, vix thoracis longitudinem superantibus, pedibus fossoriis, mandibula adunco-falcata intus denticula, medius inter scarabaeos et lucanos.*

*hemisphaericus*. 406. Sc. hemisphaericus, clypeo anteriori obtuse bidentato. *Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 20. A. 23. t. B. f. A. 23.

*Habitat - - - sacro major, cephalotae perquam affinis, an specie distinctus?*

190. LUCANUS. *Antennae* clavatae : clava compressa, latere latiore, pectinatofiffili.

*Maxillae* porrectae, exsertae, dentatae.

*Penicilli* duo sub labio palpigeri.

Alces. 8. L. mandibulis exsertis apice quadridentatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. I. n. I. *mant. inf.* I. p. I. n. I. *Petiv. gazoph. t.* 47. f. 15. *Habitat in Asia.*

Cervus. I. L. scutellatus : maxillis exsertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Fn. suec.* 405. *Scop. ent. carn.* I.

*Fn. suec.* I. n. 377. Scarabaeus cornibus duobus mobilibus aequalibus apice bifurcatis : introrsum ramis denticulisque instructis.

*Fabr. sp. inf.* I. p. I. n. 2. *mant. inf.* I. p. I. n. 2. Lucanus mandibulis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo : ruga transversali elevata.

*Geoffr. inf.* I. p. 61. n. I. t. I. f. I. *Platycerus fuscus* &c. *Mouff. inf.* 148. *Cervus volans.*

*Raj. inf.* p. 74. n. 2. *Scarabaeus maximus platyceros* &c. *Olear. mus. t.* 16. f. 5. *Taurus volans.*

*Aldrov. inf.* 151. f. I.

*Hoeffn. pict. t.* 6.

*Worm. mus.* 242.

*Fonst. inf. t.* 14. f. I. 2.

*Merian. cur. t.* 168.

*Imperat. nat.* 924. f. 3.

*Roef. inf.* 2. *Scar.* I. t. 4. 5.

*Bergstr. nomencl.* I. p. 18. n. I-3, t. 3. f. I-3. et t. 4. f. I.

*Sulz. inf. t.* I. f. 4.

*Degeer inf.* 4. t. 12. f. I.

*Schaeff. ic. t.* 133. f. I.

*Voet coleoptr. t.* 29. f. I. 3.

*Schluga t.* I. f. I.

b) Scarabaeus maxillis lunatis prominentibus dentatis, thorace inermi. *Fn. suec.* 338. (femina).

*Geoffr. inf. par.* I. p. 60. n. 2. *Platycerus fuscus*, elytris laevibus, capite laevi.

O. F. Müller *prodr. zool. dan.* p. 444. *Lucanus Dorcas.*

*Imper.*



*Imper. nat.* 925. f. 1. 2.

*Gron. zooph.* 446.

*Roef. inf.* 2. *Scar.* 1. t. 5. f. 8.

*Schaeff. elem.* t. 9. f. 1.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 25. n. 2. 3. t. 4. f. 2. 3.

*Voet coleoptr.* t. 29. f. 2. 4.

*Habitat in Europae et Sibiriae ligno quercino putrescente, femina minor, larva obesa albida, capite pedibusque ferrugineis, a Roefelio pro crasso veterum habita.*

**Elaphus.** 9. L. mandibulis exsertis nidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 1. n. 3.

*Voet coleoptr.* t. 30. f. 5.

*Habitat in Virginia, femina minor, mandibulis haud exsertis.*

**Capreolus.** 2. L. scutellatus, maxillis exsertis, apice tantum furcatis. *Amoen. acad.* 6. p. 391. n. 4.\* *Mus. Lud. Ulr.* 30.\*

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 1. n. 4. Lucanus mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transversa elevata interrupta.

*Degeer inf.* 4. t. 19. f. 11, 12.

*Merian. Europ.* 168.

β) Lucanus platyceros. *Scriba Schr. der berl. Naturf.* 7. p. 728.

*Geoffr. inf. paris.* 1. p. 63. n. 5.

*Habitat in America boreali, Afsatia, Calabria, cervo dimidio minor.*

**Dania.** 10. L. mandibulis exsertis intus bidentatis longitudine capitis.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 1. n. 5.

*Mus. Lud. Ulr.* 30. Lucanus Capreolus β.

*Habitat in Virginia.*

**Gazella.** 11. L. mandibulis intus bidentatis, ater, elytrorum margine exteriori testacco. *Fabr. mant.* 1. p. 1. n. 6.

*Habitat in Siam, damae magnitudine.*

**tridentatus.** 3. L. maxillofus depressus niger, thorace utrinque tridentato.

*Fn. suec.* 406. *It. cel.* 152.\* *Bonsdorf nov. act. Stockb.* 1785. 3. n. 10. p. 216.

*Habitat in Oelandia, thorace trilobato; an cervi potius mera varietas minor?*

- interrup- 4. *L. excutellatus*, antennis arcuatis, corpore oblongo de-  
tus. presso, vertice spina recumbente, thorace abdomineque  
remotis. *Mus. Lud. Ulr.* 33.\* *Mus. Ad. Fr.* 82. *Gron.*  
*zooph.* 447. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 3. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 2.  
n. 8.  
*Brown jam.* 429. t. 44. f. 7. *Dermeistes.*  
*Merian. furin.* t. 50.  
*Petiv. gaz.* t. 27. f. 7.  
*Sulz. hist. inf.* t. 2. f. 2.  
*Degeer inf.* 4. t. 19. f. 13.  
*Voet coleoptr.* t. 29. f. 1.  
*Habitat in America, sub saccharo putrescente, scarabaeo vul-*  
*go proxime affinis; mas major spina capitis incumbente*  
*mandibulis truncato-tridentatis, elytrorumque sulcis la-*  
*teralibus punctatis, femina spina capitis elevata, arcuata,*  
*mandibulis acuto-tridentatis, elytrorumque sulcis omni-*  
*bis laevibus distincta.*
- carinatus. 5. *L. depressus*, thorace mutico capite brevior: angulis po-  
sterioribus excavatis. *Mus. Lud. Ulr.* 34.\*  
*Habitat in India, abdomine brevissimo, pectore posterius in*  
*angulum acutum terminato.*
- parallele- 6. *L. scutellatus depressus niger*, maxillis dente laterali elevato.  
pipedus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 2. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 1. n. 7. *Pon-*  
*topp. atl. dan.* 1. p. 666. t. 29. f. 1.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 62. n. 3. *Platyceros niger &c.*  
*Voet coleoptr.* t. 29. f. 7.  
*Berg str. nomencl.* 1. t. 1. f. 3. 4.  
*Degeer inf.* 4. t. 12. f. 9.  
*Schaeff. elem.* t. 101. f. 1.  
icon. t. 63. f. 7.  
*Habitat in Calabriae, Galliae, Angliae, Germaniae, Da-*  
*niae, Sueciae, Sibiriae silvis, cervo feminae similis, at*  
*gies minor, niger, magis depressus; femina mave minor,*  
*mandibulis minoribus, punctoque capitis duplici promi-*  
*nente distincta.*
- cancroi- 12. *L. mandibulis incurvis*: intus dente incrassato difformi,  
des. elytris punctato-subpubescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1.  
p. 2. n. 9.  
*Habitat in terra van Diemen, virescente paulo major.*
- virescens. 13. *L. mandibulis tridentatis*, corpore viridi-aeneo. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 3. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 2. n. 10.  
*Habitat in America.*

- tenebroides. 14. *L. mandibulis lunatis unidentatis ater, thorace marginato, elytris substriatis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 2. n. 11.*  
*Habitat in Novogorod inferiori Rossiae, statura caraboidis, at paulo major, ater.*
- caraboides. 7. *L. scutellatus caerulefcens, mandibulis lunatis, thorace marginato.* *Fn. suec. 407.<sup>m</sup> Scop. ent. carn. 2. Fabr. sp. inf. 1. p. 3. n. 9. mant. inf. 1. p. 2. n. 12.*  
*Udm. diss. n. 40. Carabaeus caerulefcens.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 63. n. 4. Platyceros violaceo-caeruleus &c.*  
*Schaeff. ic. t. 6. f. 8. et t. 75. f. 7. Platycerus.*  
*Degeer inf. 4. t. 12. f. 11.*  
*Voct coleoptr. t. 29. f. 8.*  
*Habitat in Europae locis suffocatis, varians colore viridi et caeruleo.*
- piceus. 15. *L. ater glaber striatus, antennis, abdomine et pedibus piceis.* *Bonsdorf nov. act. Stockb. 1785. 3. n. 10. p. 217. t. 8. f. a.*  
*Habitat in Ostrogothiae et Westrogothiae lapidosis, Junio frequens.*
- capensis. 16. *L. exscutellatus niger, elytrorum fulcis punctatis.* *Thunberg nov. inf. spec. 1. p. 5. f. 1.*  
*Habitat ad caput bonae spei, cylindricus, glaber, tenebrione fossore paulo major.*
- Pilmus. 17. *L. exscutellatus ater, corpore depresso, thorace striato.* *Molin. hist. nat. Chil. p. 184.*  
*Habitat in provincia Chilensi Makle, arvis legumine confitis infestus, 8 lineas longus; an hujus generis?*
- Tarandus. 18. *L. scutellatus ater glaberrimus, mandibulis exfertis apice tridentatis a latere interiori bidentatis.* *Swederus nov. act. Stockb. 8. 1787. 3. n. 3. 1. t. 8. f. 2.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, L. Cervo major.*
- Antilope. 19. *L. mandibulis exfertis a latere interiori bimarginatis: margine superiori bidentato, inferiori quinqueidentato.* *Swederus nov. act. Stockb. 8. 1787. 3. n. 3. 2. t. 8. f. 3.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, brunneus, subglaber, magnitudine capreoli.*

Bubalus. 20. *L. niger*, mandibulis bifidis: altera parte porrecta, sublunata interius tridentata; altera majore deflexa arcuata integra. *Swederus nov. act. Stockb.* 8. 1787. 3. n. 3. 3. t. 8. f. 4.

*Habitat in Georgia Americae, caraboide duplo major.*

191. **DERMESTES.** *Antennae clavatae: clava perfoliata: articulis tribus crafioribus.*

*Thorax convexus, vix marginatus.*

*Caput sub thorace inflexum condens.*

\* *maxilla bifida.*

Lardarius. 1. *D. niger*, elytris anterieus cinereis. *Fn. suec.* 408. *Geoffr. inf. parif.* 1. p. 100. n. 5. *Scop. ent. carn.* 34. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 1.

*Goed. inf.* 2. t. 41.

*Blank. inf.* t. 11. f. K. L. M.

*Raj. inf.* p. 107. n. 4.

*Mer. inf.* 2. t. 33.

*Frisch inf.* 6. t. 9.

*Degeer inf.* 4. p. 192. n. 1. t. 7. f. 15.

*Schaeff. elem.* t. 7. f. 1. 2.

*icon.* t. 42. f. 3.

*Habitat in Europa, larva ovata cinerea hirsuta in animalibus diu asservatis, lardo, carnibus, repositoriis culinariis et museis libris potissimum corio suillo aut asinino a pilis non satis repurgato tectis infesta, imago, olea et pinguedines aliis insectis lethalia appetens, scybala inter vorandum ex ano protrudit concatenata pendula; rarius elytris anterieus ferrugineis conspicua.*

elongatus. 2. *D. niger*, elytris basi fasciaque posteriore lividis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 409.\*

*Habitat in Europa, fere filiformis.*

undatus. 3. *D. oblongus niger*, elytris fascia alba lineari duplici. *Fn. suec.* 410.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 64. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 6.

*Degeer*

- Degeer inf.* 4. p. 199. n. 5. *Dermestes oblongus niger* &c.  
*Schaeff. ic. t.* 157. f. 7. a. b.  
*Habitat in Europae putridis, suffocatis.*
- pellio.** 4. *D. niger, coleopteris punctis albis binis.* *Fn. suec.* 411.\*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 100. n. 4. *Scop. ent. carn.* 37.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 5. *Dermestes niger, elytris puncto albo.*  
*Degeer inf.* 4. p. 197. n. 3. *Dermestes bipunctatus.*  
*Raj. inf.* p. 85. n. 35.  
*Frisch inf.* 5. p. 22. t. 8.  
*Schaeff. ic. t.* 42. f. 4.  
 β) *Dermestes minor non punctatus.* *Mus. Lesk.* p. 5. n. 101.  
*Habitat in Europae pellibus, lardo, aliis cibariis, libris vetustis.*  
*Larva oblonga, pilosa, cauda setosa.*
- macellarius.** 5. *D. niger glaber, pedibus piceis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n. 4.  
*mant. inf.* 1. p. 34. n. 4.  
*Habitat in Germania, lardario affinis.*
- cadaverinus.** 7. *D. niger, ore ferrugineo.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n. 3.  
*mant. inf.* 1. p. 34. n. 3.  
*Habitat in insula S. Helenae.*
- carnivorus.** 8. *D. niger, elytris anterieus testaceis, abdomine albo.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 63. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 2.  
*Habitat in nova Hollandia et Seelandia.*
- trifasciatus.** 9. *D. ovatus niger, elytris fasciis tribus undatis cinereis.* *Fabr. mant.* 1. p. 34. n. 7.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 112. n. 5. *Byrrhus fuscus* &c.  
*Habitat in Europa magis australi, undati magnitudine et statura.*
- zoguttatus.** 10. *D. oblongus ater, punctis viginti albis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 64. n. 7. *mant.* 1. p. 34. n. 8.  
*Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 3.
- bicolor.** 11. *D. oblongus niger subtus testaceus, elytris striatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 64. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 34. n. 9.  
*Habitat in Germania, statura murini.*

12. D.

---

*Dermestes larvae exedunt et destruunt animalium cadavera, res culinarias, pelles, libros; apodes lignum putrescens.*

- domestici. 12. *D. niger*, elytris griseis margine nigris, thorace villosus.  
*Fn. suec. 424.\**  
*Geoffr. inf. par. 1. p. III. t. 1. f. 6.* Byrrhus.  
*Habitat in Europa, thorace fere hemisphaerico.*
- violaceus. 13. *D. nigro-caerulescens*, thorace villosus. *Fn. suec. 422.\**  
*Scop. carn. 51. Fabr. sp. inf. 1. p. 65. n. 13. mant. inf. 1. p. 35. n. 15.*  
*Fn. suec. 373.* Dermestes nigro-caeruleus.  
*Degeer inf. 5. p. 163. n. 4. t. 5. f. 13.* Clerus caeruleus &c.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 304. n. 2.* Clerus nigro-caeruleus.  
*Raj. inf. 100.* Scarabaeus antennis clavatis 12.  
*Habitat in Europae cadaveribus frequens, etiam in floribus.*
- rufipes. 16. *D. nigro-caerulescens*, thorace villosus, pedibus rufis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 65. n. 14. mant. inf. 1. p. 35. n. 16.*  
*Thunb. nov. inf. spec. 1. p. 10.* Anobium rufipes.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, an varietas violacei?*
- ruficollis. 17. *D. violaceus*, thorace elytrorumque basi rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 65. n. 15. mant. inf. 1. p. 35. n. 17.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 8. f. 7.*  
*Habitat in Africa et India, violacei magnitudine, totus hirtus.*
- caeruleus. 24. *D. caeruleus hirtus linearis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 10.* Anobium caeruleum.  
*Habitat ad caput bonae spei, violaceo similis, at linearis.*
- hirtus. 14. *D. ater hirtus.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 6.* Hispa (hirta) antennis ferratis atra hirta.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 94. n. 18.* Lagria atra.  
*Habitat in Europa, undati magnitudine, pilis nigris hirtus.*
- fenestralis. 15. *D. castaneus*, capite nigricante, thorace fusco. *Fn. suec. 423.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 67. n. 24. mant. inf. 1. p. 36. n. 29.*  
*Degeer inf. 5. p. 197. n. 7.* Ips spinosus &c.  
*Müll. prodr. zool. dan. p. 57. n. 505.* Byrrhus fenestralis &c.  
*Habitat in Europa boreali, frequens in fenestris.*
- vulpinus. 25. *D. oblongus laevis niger*, thoracis lateribus cinereo-villosis subtus albidus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 64. n. 9. mant. inf. 1. p. 34. n. 10.*  
*Habitat ad caput bonae spei, carnivoro affinis et aequalis.*

- felinus. 28. *D. oblongus villosus cinereus immaculatus.* *Fabr. mant. inf. I. p. 34. n. II.*  
*Habitat in terra van Diemen, an satis a vulpino distinctus?*
- murinus. 18. *D. oblongus tomentosus nigro alboque nebulosus, abdomine niveo.* *Fabr. sp. inf. I. p. 64. n. 10. mant. inf. I. p. 35. n. 12.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 563. n. 18. Fn. suec. 426.\* Scop. ent. carn. 35. Geoffr. inf. par. I. p. 102. n. 7. Dermestes tomentosus oblongus fusco cinereoque nebulosus, scutello luteo.*  
*Degeer inf. 4. p. 197. n. 2. Dermestes nebulosus &c.*  
*Frisch inf. 4. p. 34. t. 18.*  
*Schaeff. ic. t. 42. f. 1. 2.*  
*Voet coleoptr. t. 31. f. II.*  
*Habitat in Europae cadaveribus frequens.*  
*Larva oblonga brunnea, ore atra.*
- tessellatus. 31. *D. oblongus tomentosus fusco cinereoque nebulosus, abdomine fusco.* *Fabr. sp. inf. I. p. 65. n. 11. mant. inf. I. p. 35. n. 13.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 100. n. 8. Dermestes flavescens pilosus.*
- navalis. 32. *D. elongatus ferrugineo-fuscus, oculis atris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 65. n. 12. mant. inf. I. p. 35. n. 14.*  
*Habitat in nova Seelandia, murino quadruplo minor.*
- scaber. 33. *D. griseus, thorace elytrisque scabris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 66. n. 20. mant. inf. I. p. 35. n. 25.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- testaceus. 34. *D. oblongus testaceus, oculis abdominisque basi nigris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 66. n. 19. mant. inf. I. p. 35. n. 24.*  
*Habitat in Belgio.*
- fumatus. 22. *D. oblongus testaceus, oculis nigris.* *Fn. suec. 432.\**  
*Geoffr. inf. par. I. p. 104. n. 12. Fabr. sp. inf. I. p. 66. n. 16. mant. inf. I. p. 35. n. 19.*  
*Scop. ent. carn. 59. Dermestes rosae.*  
*Degeer inf. 4. p. 195. n. 3. Ips testaceo-flavus &c.*  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 20. n. 7. t. 20. f. I?*  
*Habitat in Europae floribus, in viis, fimo equino.*
- picipes. 35. *D. oblongus nigricans, pedibus piceis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 35. n. 23.*  
*Habitat Halae Saxonum, tomentosi statura et magnitudine.*

- chinenfis. 36. *D. oblongus ferrugineus, elytris striatis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 66. n. 21. mant. inf. I. p. 36. n. 27.*  
*Habitat in seminibus e Sina allatis.*
- paniceus. 19. *D. oblongus ferrugineus, oculis rufis.* *Fn. suec. 431.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 66. n. 18. mant. inf. I. p. 35. n. 22.*  
*Frisch inf. 2. p. 36. t. 8.*  
*Habitat in Europae pane diutius affervato, glutine bibliopogorum, et libris aliisque, quibus hoc adhaeret, seminis milii magnitudine.*  
*Larva ovata alba nitida.*
- ferrugineus. 21. *D. oblongus ferrugineus femicylindricus, elytris abbreviatis.* *Fn. suec. 433.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 91. n. 6. mant. inf. I. p. 51. n. 6. Nitidula ferruginea?*  
*Schranck apud Fueßli n. entom. Mag. I. p. 140. Dermestes testaceus.*  
*Laicharing inf. tyr. I. p. 104. n. 2. Ostoma ferruginea?*  
*Lesk. it. p. 46. t. A. f. 11?*  
*Habitat in Europa.*
- Eustatius. 20. *D. ater glaber obtusissimus, pedibus ferrugineis.*  
*Habitat in insulae Eustatii fungis, pediculi magnitudine.*
- pedicularius. 23. *D. oblongus testaceus, elytris abbreviatis.* *Fn. suec. 434.\**  
*Schranck inf. austr. n. 56. Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 22. n. 13. t. 20. f. 6.*  
*Fn. suec. I. n. 441. Chrysomela dilute testacea hemiptera.*  
*Habitat in Europae floribus frequens.*
- fuscus. 37. *D. oblongus villosus fuscus immaculatus.* *Fabr. mant. inf. I. p. 35. n. 21.*  
*Habitat Halae Saxonum et Kilonii, tomentosi statura et magnitudine.*
- tomentosus. 38. *D. oblongus villosus griseus, capite punctis duobus fuscis.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 66. n. 17. mant. inf. I. p. 35. n. 20.*  
*Degeer inf. 4. p. 199. n. 4. t. 7. f. 18.*  
*Habitat in Angliae, Sueciae floribus.*
- sanguinicolis. 39. *D. elongatus hirtus violaceus, thorace abdomineque rufis.*  
*Fabr. mant. I. p. 35. n. 18.*  
*Habitat Halae Saxonum, chrysomelae statura, antennis dermestis.*



- limbatus. 40. D. fuscus, elytris punctatis: limbo cinereo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 66. n. 23. *mant. inf.* I. p. 36. n. 28.  
*Habitat in nova Seelandia, parvus.*
- iscanicus. 26. D. ater thorace punctoque elytrorum testaceis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 66. n. 22. *mant. inf.* I. n. 27.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 564. n. 26. *Fn. suec.* 437.\* Dermestes fuscus, thorace testaceo.  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf.* 4. p. 21. n. 8. t. 20. f. 2.  
*Habitat in Suecia et Germania.*
- Colon. 27. D. thorace lateribus flavis, elytris griseis: puncto nigro.  
*Fn. suec.* 430.\*  
*Habitat in Europa.*
- furina- 29. D. testaceus, elytris striatis, thorace striis tribus elevatis  
mentis. marginibusque denticulato.  
*Habitat in Surinamo et Sibiria, oblongus, pediculi magni-  
tudine.* Rolander.
- hemipte- 30. D. elytris abbreviatis basi exteriore apiceque testaceis.  
rus. *Habitat Surinami, pediculi magnitudine.* Rolander.  
*Antennae capitatae; pedes ferruginei; elytra abdomine di-  
midio breviora; singulis macula cuneiformis in apice, et  
punctum glaucum ad basin exteriorem elytri.*
- bifascia- 41. D. niger, elytris fasciis binis undulatis luteis, thorace ci-  
rus. nereo-tessellato. *Thunb. nov. inf. sp.* I. p. 6. f. 2.  
*Habitat ad caput bonae spei, undati magnitudine, at latior.*
- interrup- 42. D. niger, fascia baseos elytrorum rubra interrupta. *Thunb.*  
tus. *nov. inf. sp.* I. p. 6. f. 3.  
*Habitat - - - undati magnitudine.*
- bipustula- 43. D. ater glaber, capite, thorace punctoque baseos elytro-  
rus. rum rubris. *Thunb. nov. sp. inf.* I. p. 6. f. 4.  
*Fabr. mant. inf.* I. p. 45. n. 7. *Ips humeralis.*  
*Habitat - - - magnitudine pulicis.*
- marginata- 44. D. niger, thoracis lateribus, pectore incisurisque abdomi-  
tus. nis albis. *Thunb. nov. sp. inf.* I. p. 7. f. 6.  
*Habitat in India et ad caput bonae spei, magnitudine et fa-  
cie lardarii, sed paulo major, et rotus virtus.*

- piceus.** 45. *D. totus ferrugineus, elytris striatis.* *Thunb. nov. sp. inf.* 1. p. 8.  
*Habitat in India et ad caput bonae spei, marginati magnitudine et statura.*
- capensis.** 46. *D. ater hirtus, elytris flexilibus violaceis: fasciis duabus albis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 9. f. 8. Anobium capense.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine majoris pediculi.*
- cafer.** 47. *D. niger glaber, elytris fasciis duabus luteis.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. t. 9. f. 9. Anobium bifasciatum.*  
*Habitat ad caput bonae spei, sublineari oblongus.*
- viridis.** 48. *D. viridis hirtus, pedibus rubris.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 9. Anobium viride.*  
*Habitat in Africa et India.*
- simetarius.** 49. *D. flavescens fuscus, thorace marginato, antennis pedibusque spadiceis.* *Herbst apud Fuesli Arch. inf. 4. p. 21. n. 10. t. 20. f. 3.*  
*Habitat Berolini in fimo et floribus, convexus, 1½ lineas longus.*
- cellaris.** 50. *D. fuscescens, antennis longis, elytris striatis.* *Scop. ent. carn. n. 42.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 22. n. 12. t. 20. f. 5.*  
*Habitat in Germaniae parietibus, vere frequens, 2/3 lineae longus.*
- longicornis.** 51. *D. fuscus, antennis longis, thorace medio excavato, elytris punctatis.* *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 23. n. 15. t. 20. f. 8.*  
*Habitat Berolini, lineam longus, cellari affinis.*
- flavescens.** 52. *D. ferrugineus subtus flavescens, capite obscuriore, oculis nigris, thorace tereti.* *Schranck apud Fuesli n. ent. Mag. 1. p. 140.*  
*Habitat in Bavaria, ferrugineo affinis.*
- fulvipes.** 53. *D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.* *Schranck apud Fuesli n. ent. Mag. 1. p. 141. Dermestes leucophilus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 108, n. 21.*  
*Habitat - - -*

61. D.

---

*Plura hujus nominis insecta habent Scopoli et Geoffroi, Schranck, Laicharting, Moß,*

- fulcatus. 61. *D. fusco ruber*, oculis nigris, elytris fulcatis punctatis.  
*Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 2. n. 1.*  
*Habitat in Suecia, pediculo duplo major.*
- fenestra- 62. *D. fuscus*, elytris maculis sedecim pallidis, tibiis omni-  
tus. bus spinosis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 3. n. 2.*  
*Habitat Upsaliae, prini mollis magnitudine.*
- ruber. 63. *D. ruber*, thorace glaberrime ferrugineo-nigro, lateribus  
rufis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 3. n. 3.*  
*Habitat Upsaliae, pediculo vix major, silphae melanocephalae affinis.*
- linearis. 64. *D. corpore elytrisque linearibus ferrugineis*, capite thora-  
ceque fuscis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 4. n. 4.*  
*Habitat in Suecia, fenestrali similis, at multoties major.*
- ater. 658. *D. ater nitidus*, elytris tenuissime punctatis. *Thunb.*  
*nov. act. Upsf. 4. p. 4. n. 5.*  
*Habitat Upsaliae, magnitudine coccinellae bipunctatae.*
- bipustula- 66. *D. niger*, capite thoraceque rubris, elytris nigris: basi  
tus. macula rubra. *Thunb. nov. act. Upsf. 1. p. 4. n. 6.*  
*Habitat Upsaliae, pediculo vix major.*
- fasciatus. 67. *D. niger*, elytris fasciis duabus undulatis lutescentibus.  
*Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 5. n. 7.*  
*Habitat Upsaliae, pediculi magnitudine.*
- \*\* *maxilla unidentata*: *Apate*.
- murica- 6. *D. elytris reticulatis posterius retusis dentatis*, thorace mu-  
tus. ricato gibbo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 1. mant. inf. 1. p. 33. n. 1.*  
*Pall. spic. zool. 9. p. 7. t. 1. f. 3. Ligniperda terebrans.*  
*Habitat in Americae meridionalis lignis.*
- hamatus. 54. *D. elytris ante apicem unispinosis thoracis margine ante-*  
riori bihamato denticulato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 33. n. 2.*  
*Habitat in Saxoniae lignis, statura muricati, at minor.*
- Mona- 55. *D. elytris obtusis*, thorace gibbo truncato. *Fabr. sp. inf.*  
chus. *1. p. 62. n. 2. mant. inf. 1. p. 33. n. 3.*  
*Pall. spic. zool. 9. p. 8. t. 1. f. 4. Ligniperda cornuta.*  
*Habitat in Americae meridionalis lignis.*

- Jesuita. 56. *D. elytris integris variolosis*, thorace anterieus truncato.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 3. mant. inf. 1. p. 33. n. 4.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- indicus. 57. *D. elytris integris nigris*, thorace anterieus scabro. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 62. n. 4. mant. inf. 1. p. 33. n. 5.*  
*Habitat in Coromandel, minuto affinis, at paulo major.*
- minutus. 58. *D. niger*, elytris integris piceis, thorace anterieus scabro.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 5. mant. inf. 1. p. 33. n. 6.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- exilis. 59. *D. ater*, elytris integris pallidis: margine omni nigro.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 33. n. 7.*  
*Habitat Kilonii sub fagi cortice, parvus.*
- villosus. 60. *D. thorace villoso*, elytris integris fuscis: margine punctis-  
 que ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 33. n. 8.*  
*Habitat Halae Saxonum.*
- pallipes. 68. *D. oblongus planus ater nitidus*, antennis pedibusque te-  
 staceis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Sueciae floribus, minutus.*
- lunatus. 69. *D. oblongus niger*, elytris lunula dorsali cinerea. *Fabr.*  
*mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Suecia, sub arborum corticibus, parvus.*
- ruficornis. 70. *D. fuscus capite retracto*, antennis pedibusque rufis. *Musf.*  
*Lesk. p. 5. n. 108. b.*  
*Habitat in Europa, minimus.*

**BOSTRICHUS.** *Antennae clavatae: clava solida.*  
*Thorax convexus vix marginatus.*  
*Caput sub thorace inflexo conditum.*

- Capucinus. 1. *B. niger*, elytris abdomineque rubris, thorace retuso. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 67. n. 1. mant. inf. 1. p. 36. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 5. Fn. Suec. 416. Dermestes*  
*capucinus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 302. n. 1. t. 5. f. 1. Bostrichus ni-*  
*ger &c.*  
*Schaeff. elem. t. 28.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 5. 6. c.*  
 β) *Dermestes capucinus abdomine nigro. Lepechin it. 2. t. 11. f. 3.*  
*Habitat in Europae, β) Sibiriae truncis, praesertim emor-*  
*tuis, parietibus.*

- flavicornis. 2. *B. piccus*, elytris apice spinoso-dentatis, antennis flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 67. n. 2. mant. inf. 1. p. 36. n. 2. Habitat in America boreali.*
- elongatus. 3. *B. elongatus ater*, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 36. n. 3. Habitat in Upsaliae ligno antiquo.*
- typographus. 4. *B. testaceus pilosus*, elytris striatis retusis praemorfo-dentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 67. n. 3. mant. inf. 1. p. 36. n. 4. Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 7. Fn. suec. 418. It. ocl. 26. 195. Lepech. it. 2. p. 202. t. 81. f. 21. Dermestes typographus. Degeer inf. 5. p. 193. n. 1. t. 6. f. 1, 2. Ips pilosus fuscus &c. Raj. inf. p. 100. n. 10. Sulz. hist. inf. t. 2. f. 4. Habitat intra Europae, Americae, Sibiriae cortices arborum, praesertim piceae infestissimus, fertilissimus, voracissimus, intra corticem canalem effodiens, ex quo ad latus plures utrinque subparalleli exeunt, pro aetate magnitudine, magis adhuc colore flavescente, fuscescente, fusco, subatro varians, vitae tenacissimus.*
- chalcographus. 5. *B. ater*, elytris praemorfo-dentatis rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 68. n. 4. mant. inf. 1. p. 36. n. 5. Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 8. Fn. suec. 417. Dermestes chalcographus. Habitat intra arborum Europae cortices, colore nigro et testaceo varians.*
- polygraphus. 6. *B. nigricans*, elytris glaucis obtusiusculis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 68. n. 5. mant. inf. 1. p. 37. n. 6. Syst. nat. XII. 2. p. 562. n. 10. Fn. suec. 420. Dermestes polygraphus. Degeer inf. 5. p. 196. n. 5. Ips rufo-fuscus &c. Habitat in Europa boreali sub arborum corticibus, labyrinthos formans, inter nocentiores sui generis.*
- micrographus. 7. *B. ferrugineus*, elytris integris testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 37. n. 7.*

LIII 4

Syst.

Bostrichi fertilissimi larva et imago cortices arborum et ligna exedit, sitvarum aliquando pestis perniciosissima. *J. P. Gmelin Abb. von der Wurmtrocknis. Lips. 1787.*

*Syst. nat.* XII. 2. p. 562. n. 9. *Fn. suec.* 419. Dermestes (micrographus) testaceus glaber, thorace nigro, elytris apice retulo-dentatis.

*Habitat in Europae ligno, etiam intra cortices arborum, parvus, niger, elytris, antennis pedibusque testaceis.*

**bidentatus.** 8. B. niger, coleopteris testaceis apice retufis bihamatis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 37. n. 8.

*Herbst apud Fueßli Arch. Inf.* 4. p. 24. n. 6. t. 20. f. 10. Bostrichus bidentatus.

*Lepech. it.* 2. p. 202. t. II. f. 22. Scarabaeus thorace mutico, elytris apice excavatis mucronibus 4 instructis?

*Habitat in Saxonia et Sibiria, polygraphi magnitudine.*

**Scolytus.** 9. B. glaber nigricans, elytris truncatis integris, abdomine retuso, fronte villosa cinerascete. *Fabr. sp. inf.* I. p. 68. n. 6. *mant. inf.* I. p. 37. n. 9.

*Geoffr. inf. paris.* I. p. 310. n. 1. t. 5. f. 5. Scolytus.

*Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 13.

*Schaeff. ic. t.* 112.

*Habitat sub Angliae ulmorum cortice, quas misere devastat.*

**crenatus.** 10. B. glaber ater, elytris integris piceis crenato-striatis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 37. n. 10.

*Habitat in Germania, scolyti statura et magnitudine.*

**pygmaeus.** 11. B. ater nitidus, elytris integris rufis, abdomine retuso. *Fabr. mant. inf.* I. p. 37. n. 11.

*Habitat Halae Saxonum, scolyto proxime affinis, at triplo minor.*

**piniperda.** 12. B. villosus testaceus, corpore nigricante, tibiis quatuor posterioribus ferratis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 37. n. 12.

*Habitat in Germaniae ligno, piniperda paulo major.*

**piniperda.** 13. B. niger subvillosus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 68. n. 7. *mant. inf.* I. p. 37. n. 13.

*Lesk. it. p.* 11. t. A. f. 2.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 563. n. 11. *Fn. suec.* 421. Dermestes piniperda.

*Degeer inf.* 5. p. 194. n. 2. t. 6. f. 8. 9. Ips subvillosus niger nitidus &c.

*Habitat in Europae pini ramulis inferioribus, quos perforat, exsiccat, destruit, hortulanus naturae, curculionis fere statura, colore elytrorum varians.*

14. B.

- testaceus. 14. *B. glaber testaceus*, elytris laevibus, longitudine abdominis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 37. n. 14.*  
*Habitat in pini truncis, piniperdae statura oblonga.*
- varius. 15. *B. subvillosus*, corpore nigro cinereoque vario. *Fabr. sp. inf. 1. p. 69. n. 8. mant. inf. 1. p. 38. n. 15.*  
*Habitat in Hafniae arboretis antennarum clava acuminata.*
- vittatus. 16. *B. subvillosus fuscus*, elytris vitta abbreviata cinerea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 38. n. 16.*  
*Habitat in Europae truncis arborum, statura varii, at duplo minor.*
- minutus. 17. *B. glaber ater immaculatus*, elytris integris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 69. n. 9. mant. inf. 1. p. 38. n. 17.*  
*Habitat Kilonii in boletis versicolore.*
- maculatus. 18. *B. niger*, elytris fascia undata punctisque rubris. *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 7. f. 5.*  
*Habitat in Suecia, statura dermestis undati, antennis moniliformibus, au hujus generis?*
- bifasciatus. 19. *B. ater*, elytris flavis: fasciis duabus nigro-caerulescentibus denticulatis.  
*Lepech. it. 2. p. 206. t. 10. f. 3. Dermestes bifasciatus.*  
*Habitat in Sibiria.*
- limbatus. 20. *B. niger*, elytris flavescens marginatis fusco-limbatis.  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 1. p. 24. n. 7. t. 20. f. 11.*  
*Habitat in Pomerania, 1½ lineas longus thorace capucino similis.*
- fuscus. 21. *B. fuscus*, elytris striatis: striis apice cohaerentibus, tibiis extus dentatis, plantis rufis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 112.*  
*Habitat in Europa.*
- pilosus. 22. *B. testaceus pilosus*, elytris punctato-striatis, apice retusis dentatis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 113.*  
*Habitat in Europa.*

**MELYRIS.** *Labium clavatum emarginatum.**Antennae totae perfoliatae.**Maxilla unidentata acuta.*

viridis. 1. *M. viridis*, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 67. n. 1. mant. inf. I. p. 36. n. 1.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

nigra. 2. *M. nigra*, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 67. n. 2. mant. inf. I. p. 36. n. 2.*  
*Habitat - - - statura viridis, at triplo minor.*

**192. PTINUS.** *Antennae filiformes: articulis ultimis majoribus.**Thorax subrotundus, non marginatus, caput excipiens.*\* *palpis clavatis: Anobia.*

rugosus. 1. *Pt. fuscus* thorace inaequali, elytris striatis. *Fabr. mant. I. p. 39. n. 1.*  
*Habitat Kilonii, pertinace duplo major, immaculatus.*

pertinax. 2. *Pt. fuscus unicolor.* *Fn. suec. 414.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 71. n. 1. mant. inf. I. p. 39. n. 2. Anobium fuscum immaculatum.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 112. n. 4. Byrrhus totus nigro-fuscus.*  
*Degeer inf. 4. p. 227. n. 1. t. 8. f. 24. 25. Byrrhus nigro-fuscus &c.*

*Habitat in Europa captus mortui instar se contrahens immobilis, e ligno, potissimum querno confecta destruens, libris etiam infestus, ab attelabo formicario eradicatur.*

mollis. 3. *Pt. testaceus oculis fuscis.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 71. n. 2. mant. inf. I. p. 39. n. 3. Anobium testaceum, oculis nigris.*  
*Fn. suec. 415. Bergius nov. act. Stockh. 1786. 4. p. 268. Dermestes mollis.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 112. n. 2. Byrrhus testaceus glaber.*  
*Degeer inf. 4. p. 230. n. 4. t. 8. f. 29. Byrrhus rufo-fuscus, oculis nigris &c.*

*Habitat*



*Habitat in Europae quisquiliis, herbariis etiam invisus, calore furni pellendus.*

*Larva alba frigoris patientissima.*

- frumenta- 7. Pt. testaceus, thorace ciliato: dorso plano carinato. *Fabr.*  
rius. *sp. inf. 1. p. 71. n. 3. mant. inf. 1. p. 39. n. 5.*  
*Habitat in pane diutius asservato, capitur in navi prope Brasiliam.*
- planus. 8. Pt. fuscus, thorace plano, elytris crenato-striatis. *Fabr.*  
*mant. 1. p. 39. n. 4.*  
*Habitat Kilonii.*
- flavipes. 9. Pt. villosus niger, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 71. n. 4.*  
*Habitat Hamburgi.*
- lineatus. 10. Pt. pilosus niger, elytris lineis sesquitertiis rufis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 72. n. 6.*  
*Habitat in Brasilia, statura cantharidis nigrae; an hujus generis?*
- cyaneus. 11. Pt. subvillosus cyaneus, antennis nigris. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 72. n. 7.*  
*Habitat in America magis australi, cantharidis nigrae statura et magnitudine.*
- minutus. 12. Pt. subvillosus niger thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 72. n. 8.*  
*Habitat in nova Seelandia, statura cyanei, at duplo minor, elytris interdum virescentibus.*
- pulsator. 13. Pt. cylindricus opacus rugosus maculis griseis adpersus.  
*Schaller Abb. hall. Naturf. Ges. 1. p. 249.*  
*Habitat Halae Saxonum in truncis vetustis salicis et domibus, noctu praesertim termitis instar pulsans, statura pertinacis, magnitudine dermestis lardarii.*
- fagi. 14. Pt. niger, antennis spadiceis, elytris punctato-sulcatis.  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 26. n. 2. t. 20. f. 12.*  
*Habitat Berolini, 3. lineas longus.*
- ferrugi- 15. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris obsolete striatis.  
neus. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 37. n. 3. t. 20. f. 13.*  
*Habitat in Marchia.*

- testaceus. 16. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris glaberrimis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 7. p. 158. n. 4.*  
*Habitat Berolini, an satis a ferrugineo distinctus?*
- capensis. 26. Pt. ferrugineus, elytris striatis pallidioribus. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura pertinacis, at duplo minor.*
- fuscus. 27. Pt. fuscus, corpore griseo irrorato, scutello griseo, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 121.*  
*Habitat in Europa.*
- rufus. 28. Pt. rufus luteo nitens, thorace utrinque posterius macula lutea, elytris punctato striatis. *Mus. Lesk. p. 6. n. 122.*  
*Habitat in Europa.*
- ferrugineus. 29. Pt. ferrugineus, thorace inaequali, elytris punctato striatis, antennis rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 6. n. 123.*  
*Habitat in Europa, antennarum articulis 3 ultimis majoribus, compressis obconicis.*
- friatulus. 30. Pt. testaceus, elytris levissime striatis, antennorum articulis tribus ultimis majoribus. *Mus. Lesk. p. 6. n. 127.*  
*Habitat in Europa.*
- brunneus. 31. Pt. brunneus, elytris levissime striatis pubescentibus. *Mus. Lesk. p. 6. n. 128.*  
*Habitat in Europa.*
- \*\* palpis filiformibus: Ptini.
- Gigas. 17. Pt. griseus, elytris posterius cinereis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 72. n. 1. mant. inf. 1. p. 40. n. 1.*
- imperialis. 4. Pt. fuscus, thorace subcarinato, coleoptris macula lobata alba. *Fabr. sp. inf. 1. p. 73. n. 5. mant. inf. 1. p. 40. n. 5.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 57. n. 507. Bruchus imperialis. Sulz. hist. inf. t. 2. f. 7.*  
*Habitat in Europae borealis et Calabriae arboribus, seminis tritici magnitudine.*  
*Antennae longitudine corporis pedesque ferruginei; scutellum niveum; elytra nigra, macula alba aquilam insignium quodammodo referente notata.*

- Fur.** 5. *Pt. testaceus* subapterus, thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 73. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 40. n. 4.  
*Fn. Juec.* 651. *Cerambyx* Fur.  
*Geoffr. inf. paris.* 1. p. 164. n. 4. t. 2. f. 6. *Bruchus testaceus*.  
*Degeer inf.* 4. p. 231. n. 5. t. 9. f. 5. 6. *Byrrhus rapax*.  
*Scop. ent. carn.* 210. *Buprestis* Fur.  
*Sulz. hist. inf.* t. 2. f. 8.  
*Schaeff. elem.* t. 30.  
*Frisch inf.* 13. t. 15.  
*Habitat in Europae seminibus, in museis pessimus, destruens herbaria, insecta, aves, pelles, utensilia, libros, culina-ria, iuvo pulverem tabaci, ambrosiacis non pellendus, frigoris et humiditatis amans, calore et siccitate arcendus, arsenico et alumine, certius mercurio corrosivo sublimato albo occidendus, habitu, facie, moribus, metamorphosi ad dermestes, dentibus thoracis lateralibus ad cerambyces accedens; femina aptera; larva hexapus obesa, mollis, pilosa, segmentis dorsulibus prominulis; puppa intra glutinosum.*
- longicor-nis.** 18. *Pt. ater* nitidus, pedibus flavescens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 72. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 40. n. 3.  
*Habitat in Germania, furis magnitudine.*
- germanus.** 6. *Pt. fuscus*, thorace transversim rugoso, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 72. n. 2. *mant. inf.* p. 40. n. 2. *Ptinus fuscus*, thorace quadridentato, elytris villosis cinereo-variis.  
*Habitat in Europae quercu, furi affinis, sed major.*  
*Antennae ferrugineae, longitudine corporis.*
- latro.** 19. *Pt. testaceus* immaculatus, thorace bidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 73. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 40. n. 6.  
*Habitat Argentorati. Hermann.*
- spinicornis.** 20. *Pt. oblongus*, antennarum articulis duobus prioribus longioribus spinosis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 40. n. 7.  
*Habitat in Sandwichii insulis.*
- sulcatus.** 21. *Pt. albidus*, thorace quadrifurcato villosus, elytris connatis fusco-testaceis nitidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 73. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 40. n. 6.  
*Habitat in plantis siccis ex insulis Canariis missis, fure minor.*

- Scotias.** 22. Pt. thorace laevi piceo, elytris connatis fusco testaceis nitidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 74. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 40. n. 8. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf.* 4. p. 27. n. 5. t. 20. f. 14. *Czempinsk. diff.* 51. 155. *Jacquin miscell. austr. t.* 23. f. 1. *Scotias phylloides.*  
*Schranck inf. austr.* Scotias Seminulum.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 164. n. 2. *Bruchus totus testaceus &c.*  
*Scop. introd. hist. nat.* 505. Gibbium?  
*Habitat in Europae magis australis betula.*
- friatus.** 23. Pt. thorace gibbo bituberculato, coleoptris globosis striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 40. n. 10.  
*Habitat Halae Saxonum, statura scotiae.*
- upsalien-** 24. Pt. testaceus, oculis nigris, elytris striatis, thorace confis.  
vexo-plano. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 6. n. 9.  
*Habitat Upsaliae, pediculi magnitudine, molli duplo minor; an hujus tribus.*
- Faber.** 25. Pt. testaceo-obscurus, elytris laevibus cinereo-undulatis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 6. n. 10.  
*Habitat in Hollandia, pertinace major.*
- apterus.** 32. Pt. capite fusco: fronte canaliculata, elytris annatis pedibus antennisque rufis, femoribus clavatis, tibiis ciliatis. *Musl. Lesk. p.* 7. n. 130.  
*Habitat -*

193. **HISTER.** *Antennae clavatae: clava solida, infimo articulo compresso, decurvato.*

*Caput intra corpus retractile.*

*Os forcipatum.*

*Elytra corpore breviora.*

*Tibiae anteriores dentatae.*

**maximus.** 1. *H. maximus.*  
*Musl. Lud. Utr.* 36.\* *Hister unicolor.*  
*Habitat in India, unicolori similis, sed decuplo major, thoracis angulis rotundatis, pectoris apice non ad os usque extenso.*

2. *H.*

- major.** 2. *H. ater*, elytris substriatis, thoracis marginibus ciliatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 1. mant. inf. 1. p. 32. n. 1. Voet coleoptr. t. 31. f. 6. Habitat in Africa, unicolori similimus, at duplo major.*
- niger.** 7. *H. niger*, punctis elevatis scaber. *Fabr. mant. inf. 1. p. 32. n. 4. Habitat in Hispania, unicoloris magnitudine.*
- unicolor.** 3. *H. ater*, elytris oblique striatis. *Fn. suec. 440.\* Scop. ent. carn. 30. Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 2. mant. inf. 1. p. 32. n. 2. Degeer inf. 4. p. 342. n. 1. t. 12. f. 12. Hister niger nitidus, elytris striatis. Geoffr. inf. par. 1. p. 94. t. 1. f. 4. Attelabus totus niger &c. Raj. inf. p. 91. n. 7. Scarabaeus antennis globulosis &c. Gwerner act. nidros. 4. t. 16. f. 4. Schaeff. ic. t. 42. f. 10. et t. 208. f. 5. Sulz. hist. inf. t. 2. f. 8. 9.*
- β) *Hister* elytris striis quinque punctatis dimidiatis. *Mus. Lesk. p. 5. n. 89.*
- γ) *Hister* elytris striis tribus integris duabusque parvulis. *Mus. Lesk. p. 5. n. 90. Habitat in Europae et Americae arena, terra, stercore, β) triplo, γ) quadruplo minor.*
- cyaneus.** 8. *H. thorace aeneo, elytris caeruleiscentibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 60. n. 3. mant. inf. 1. p. 32. n. 4. Habitat in nova Hollandia.*
- planus.** 9. *H. planus ater opacus, elytris laevissimis. Fabr. mant. inf. 1. p. 32. n. 5. Sulz. hist. inf. t. 2. f. 9. Habitat in Helvetia.*
- brun-  
neus.** 10. *H. ferrugineus, elytris substriatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 61. n. 4. mant. inf. 1. p. 32. n. 6. Habitat in Sueciae stercore.*
- pygmae-  
us.** 4. *H. ater, elytris laevissimis. Fn. suec. 441. Fabr. sp. inf. 1. p. 61. n. 5. mant. inf. 1. p. 32. n. 7. Degeer inf. 4. p. 344. n. 4. Hister nigro-fuscus &c. Schaeff. ic. t. 42. f. 10. Habitat in Europa boreali, unicolori similimus, at quadruplo minor.*

- depressus. **11.** H. depressus ater nitidissimus, elytris substriatis. *Fabr. mant. inf. p. 32. n. 8.*  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 20. n. 7.* Hister compressus.  
*Habitat sub betulae cortice.*
- abbreviatus. **12.** H. ater, elytris crenato-striatis: striis interioribus abbreviatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 61. n. 6. mant. inf. 1. p. 32. n. 9.*  
*Habitat in America boreali, statura pygmaei.*
- bimaculatus. **5.** H. ater, elytris posterius rubris. *Fn. suec. 442.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 6. n. 7. mant. inf. 1. p. 33. n. 10.*  
*Scop. ent. carn. 51.* Hister fimetarius.  
*Degeer inf. 4. p. 343. n. 2.* Hister niger nitidus &c.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 95. n. 2.* Attelabus niger &c.  
*Udm. diss. 80.* Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris.  
*Schaeff. ic. t. 3. f. 9.*  
*elem. t. 24. f. 1.*  
*Voet coleoptr. t. 31. f. 1.*  
*Habitat in Europae stercore bovino.*
- quadrimaculatus. **6.** H. ater, elytris bimaculatis. *Fn. suec. 443.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 61. mant. inf. 1. p. 33. n. 11.*  
*Degeer inf. 4. p. 344. n. 3.* Hister niger nitidus &c.  
*Gadd satag. 76.* Scarabaeus ovatus niger glaber, maculis duabus rubris in singulo elytro.  
*Schaeff. elem. t. 24. f. 2.*  
*icon. t. 3. f. 9. et t. 14.*  
*Voet coleoptr. t. 31. f. 3.*  
*Habitat in Europa boreali, maculis elytrorum interdum cohaerentibus.*
- aeneus. **13.** H. aeneus, elytris basi striatis apice punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 9. mant. inf. 1. p. 33. n. 12.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 95. n. 3.* Attelabus nigro cupreus.  
*Habitat in Anglia, Gallia.*
- detritus. **14.** H. ater nitens, elytris piceis apice obscuris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 62. n. 10. mant. inf. 1. p. 33. n. 13.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- striatus. **152.** H. ater, thorace elytrisque striatis. *Forster nov. sp. inf. cent. 1. p. 11. n. 11.*  
*Habitat in Anglia,*

- pulca- 16. H. niger, elytris striatis apice pallidis. *Thunb. nov. act.*  
rius. *Ups. 4. p. 7. n. 11.*  
*Habitat in Suecia, pygmaei magnitudine.*
- apterus. 17. H. fulvus, alis nullis, *Scop. ent. carn. n. 32.*  
*Habitat in Carniola.*

194. GYRINUS. *Antennae cylindricae.*  
*Maxilla cornea, acutissima.*  
*Oculi 4: duo supra, duo infra.*

- Natator. 1. G. substriatus. *Geoffr. inf. par. 1. p. 194. t. 3. f. 3. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 297. n. 1. mant. inf. 1. p. 194. n. 1.*  
*Fn. suec. 779. Scop. ent. carn. 299. Dytiscus ovatus gla-*  
*ber, antennis capite brevioribus obtusis.*  
*Merret pin. 203. Pulex aquaticus.*  
*Pet. gaz. 21. t. 13. f. 9. Scarabaeus niger nostras, supra*  
*aquam velociter circumnatans.*  
*Raj. inf. p. 89. n. 9. Scarabaeus aquae subrotundus e cae-*  
*ruleo viridi splendente undique tinctus.*  
*Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3. p. 158. Gyrimus py-*  
*golampis.*  
*Roef. inf. 3. p. 195. t. 31.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 43.*  
*Poda inf. 44. n. 4.*  
*Schaeff. elem. t. 67.*  
*Habitat in Europae lacubus, frequens, nitidissimus, foetens,*  
*velocissime supra aquam per orbis cursitans, dum vero*  
*urinatur, bullam aëream hydrargyri coloris secum trahens.*
- bicolor. 3. G. niger subtus ferrugineus, pedibus posterioribus com-  
pressis. *Fabr. mant. 1. p. 194. n. 2.*  
*Habitat in Sueciae aquis, natatore major.*
- australis. 4. G. substriatus virefcens elytris abbreviatis unidentatis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 298. n. 2. mant. inf. 1. p. 194. n. 3.*  
*Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3. p. 159. n. 5.*  
*Habitat in novae Hollandiae aquis.*
- america- 2. G. laevis ater opacus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 298. n. 3. mant.*  
nus. *inf. 1. p. 194. n. 4. Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3.*  
*p. 157. n. 2.*  
*Habitat in Americae meridionalis aquis, natatori similis,*  
*sed duplo major.*

M m m m m

5. G.

- spinosus. 5. *G. niger nitidus*, thoracis elytrorumque margine flavo, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 298. n. 4. mant. inf. 1. p. 194. n. 5.*  
*Habitat in Coromandel, congeneribus similis, at spinis elytrorum duabus elongatis acutissimis distinctus.*
- grossus. 6. *G. subtus ater*, supra niger, laevis, glaberrimus, elytris apicibus rotundatis. *Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3. p. 156. n. 1.*  
*Habitat in aquis claris ad caput bonae spei.*
- formosus. 7. *G. subtus ater*, pectore, sterno pedibusque ferrugineis, supra obscure aeneo-virefcens, linea labii transversa, maculis binis frontis, thoracis linea transversa interrupta, striisque elytrorum rubro-subauratis. *Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3. p. 157. n. 3.*  
 β) *Gyrinus minor non auratus*. *Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3. p. 157.*  
*Habitat in aquis claris ad caput bonae spei, β) duplo minor.*
- orientalis. 8. *G. subtus pallide ferrugineus*, supra aeneo-niger, elytris utrinque compressis striatis subauratis, posterius quadridentatis. *Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3. p. 160. n. 6.*  
*Habitat - - - teretiunculus, elytris abdominis longitudine.*
- Viola aquatica. 9. *G. subtus pallide ferrugineus*, supra ater glaberrimus, subtomentoso murinus. *Modeer act. soc. physigr. Lond. 1. 3. p. 160. n. 7.*  
*Aldr. inf. l. 7. c. 1. Fossl. inf. l. 4. c. 1. Viola aquatica.*  
*Habitat in aquis salis.*

195. BYRRHUS. *Antennae clavatae*: clava perforata.

*Palpi aequales*, subclayati.

*Maxilla bifida.*

*Labium bifidum.*

- Gigas. 1. *B. niger*, elytris punctatis ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 38. n. 1.*  
*Habitat in Aultria, pilula major.*  
*Feminae anus aculeo armatus.*

4. B.



- Pilula. 4. *B. fuscus*, elytris striis atris interruptis. *Fabr. sp. inf. I. p. 69. n. 1. mant. inf. I. p. 38. n. 2.*  
*Fn. suec. 427.* *Dermeftes tomentosus ovatus fusco-nebulosus.*  
*Deeger inf. 4. p. 213. n. 9. t. 7. f. 23.* *Dermeftes ovatus &c.*  
*Geoffr. inf. par. 4. p. 116. n. 1. t. 1. f. 8.* *Cistela subvillosa viridescens &c.*  
 β) *Byrrhus maculatus.* *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 25. n. 2.*  
*Habitat in Europae fabulosis, colore nigro interdum conspicuus.*
- ater. 2. *B. niger immaculatus.* *Fabr. sp. inf. I. p. 69. n. 2. mant. inf. I. p. 38. n. 3.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 117. n. 3.* *Cistela nigra nitens glabra.*  
*Habitat in Germania, pilulae statura et magnitudine.*
- dorsalis. 3. *B. nigricans*, coleoptris macula transversa ferruginea. *Fabr. mant. inf. I. p. 38. n. 4.*  
*Habitat Kilonii, atro proxime affinis, at paulo minor.*
- varius. 5. *B. niger*, thorace aeneo, elytris fuscis: striis tribus abbreviatis viridibus nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 69. n. 3. mant. inf. I. p. 38. n. 5.*  
*Habitat in Anglia.*
- aeneus. 6. *B. totus aeneus.* *Fabr. sp. inf. I. p. 70. n. 4. mant. inf. I. p. 38. n. 6.*  
*Habitat Upsaliae, scutello albido.*
- nitidus. 7. *B. totus nitidus*, supra aeneo-viridis, subtus niger. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 252.*  
*Habitat Halae Saxonum in saxosis, vere infra saxa frequens.*
- fasciatus. 8. *B. nigricans*, elytris fascia lata fusca. *Herbst. apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 26. n. 4.*  
*Voet coleoptr. t. 32. f. 2?*  
*Habitat Berolini.*
- virescens. 9. *B. virescens*, scutello luteo. *Mus. Lesk. p. 6. n. 116.*  
*Habitat in Europa.*

**ANTHRENUS.** *Antennae clavatae: clava solida.*  
*Palpi inaequales, filiformes.*  
*Maxilla membranacea, linearis,*  
*bifida.*  
*Labium integrum.*

**Pimpinellae.** 4. *A. niger, elytris fascia alba apice ferrugineus, litura alba.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 70. n. 1. mant. inf. 1. p. 39. n. 1.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 114. n. 1. Anthrenus squamosus ni-*  
*ger &c.*  
*Habitat in pimpinellae floribus Galliae.*

**Scrophulariae.** 1. *A. niger, elytris albo-maculatis: futura sanguinea.* *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 70. n. 2. mant. inf. 1. p. 39. n. 2.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 569. Byrrhus Scrophulariae.*  
*Fn. suec. 429. Dermestes tomentosus maculatus, futura ely-*  
*trorum rubra.*  
*Degeer inf. 4. p. 200. n. 6. t. 7. f. 20. Dermestes ovatus*  
*niger &c.*  
*Raj. inf. p. 85. n. 35.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 11. h.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 11. f. 9. 10.*  
*Schaeff. elem. t. 17.*  
*icon. t. 176. f. 4.*  
*Habitat in Europae scrophulariis.*

**Museorum.** 2. *A. nebulosus, elytris subnebulosis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 70.*  
*n. 3. mant. inf. 1. p. 39. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 568. n. 2. Byrrhus museorum.*  
*Fn. suec. 430. Dermestes tomentosus maculatus, elytris*  
*puncto albo.*  
*Degeer inf. par. 4. p. 203. n. 7. t. 8. f. 11. 12. Dermestes*  
*ovatus fulcus &c.*  
*Habitat in muscis, animalia asservata destruens, libris quo-*  
*que infestus, praecedenti similis, at minor.*

**Verbasci.** 3. *A. niger, elytris fasciis tribus undatis albis.* *Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 70. n. 4. mant. inf. 1. p. 39. n. 4.*  
*Syst.*

*An ad hoc genus spectat dubius Herbst apud Fuesli Arch. inf. 1. p. 41. n. 10. t. 21.*  
*f. k. k.*

*Syst. nat.* XII. 2. p. 568. n. 3. *Byrrhus fuscus*, elytris fasciis tribus undulatis pallidis.

*Geoffroi inf. par.* I. p. 115. n. 2. *Anthrenus squamosus niger*, elytris fuscis &c.

*Bergstr. nomencl.* I. t. II. f. 11. 12.

vagus. 5. *A. cinereus*, elytris fasciis nigris tribus obsoletis.  
*Habitat in Europa, Suecia; an hujus generis?*

glaber. 6. *A. glaber niger*, elytris, pedibus antennisque fuscis. *Herbst*  
*apud Fuessli Arch. inf.* 4. p. 26. n. 4.  
*Habitat Berolini, magnitudine derm. pellionis.*

fuscus. 7. *A. fuscus* pilis luteis levissime tomentosus apice pallida.  
*Mus. Lesk.* p. 20. n. 119. b.  
*Habitat in Europa.*

196. SILPHA. *Antennae clavatae: clava perfoliata.*

*Elytra marginata.*

*Caput prominens.*

*Thorax planiusculus, marginatus.*

germani- I. *S. oblonga atra*, clypeo obrotundo inaequali marginato,  
ca. elytris obtusissimis margine laterali ferrugineis.

*Degeer inf.* 4. p. 173. n. 2. t. 6. f. 4. *Silpha tota atra*, elytris truncatis abdomine brevioribus.

*Fabr. sp. inf.* I. p. 83. n. I. *mant. inf.* I. p. 569. n. I. *Nicrophorus ater*, thorace obrotundo inaequali.

*Geoffr. inf. par.* I. p. 99. n. 2. *Dermestes thorace marginato*, elytris abscissis, totus niger.

*Raj. inf.* p. 107. n. I.

*List. scar. angl.* p. 381.

*Voet coleopt. t.* 30. f. 4. 5.

*Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 10.

β) *Silpha speciosa*, elytris maculis duabus aurantiacis. *Schulze*  
*Naturf.* 6. p. 95. t. 4.

γ) *Silpha humator.* *Bergstr. nomencl.* I. t. 10. f. 9.

*Habitat multiplici varietate in Germania, cadavera ovo im-*  
*praegnata sepeliens.*

M m m m m 3

2. S.

*Silpharum larva et imago animalium, imprimis cadaveribus pascitur.*

Vespillo. 2. *S. oblonga atra*, clypeo orbiculato inaequali, elytris fascia duplici ferruginea. *Fn. succ. 444.\* Mus. Lud. Ulr. 37.\**

*Degeer inf. par. 4. p. 168. n. 1. t. 6. f. 1.* Silpha nigra, elytris truncatis &c.

*Fabr. sp. inf. 1. p. 84. n. 2. mant. inf. 1. p. 48. n. 2.* Nicrophorus ater, elytris fascia duplici ferruginea.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 98. n. 1. t. 1. f. 5.* Dermestes thorace marginato &c.

*Scop. ent. carn. 33.* Dermestes vespillo.

*Raj. inf. 106.*

*Lister scar. p. 381. n. 2.*

*Mouff. inf. 149. f. 1.*

*Imp. alt. 692. t. 2. f. 2.*

*Blanck. inf. 160. t. 14. f. 1.*

*Gleditsch act. Berol. 1752. p. 53.*

*Petiv. gazoph. t. 13. f. 6.*

*Poda inf. t. 1. f. 2.*

*Voet coleoptr. t. 30. f. 1-3.*

*Roef. inf. 4. t. 1. f. 1. 2.*

*Frisch inf. 12. p. 28. t. 3. f. 2.*

*Bergstr. nomencl. 1. 10. 14. t. 1. f. 14.*

*Schaeff. ic. t. 9. f. 4.*

β) *Silpha vespilloides.* Herbst apud Fuessli *Arch. Inf. 4. p. 32. n. 3.*

*Habitat multiplici varietate, in Europa, America, cada- vera ovo impraegnata sepeliens, moschum non raro spi- rans, elytris erectis approximatis ocyssime volitans, aca- ris infestata; in America interdum decuplo major.*

bimacula-3. *S. ovata nigra*, antennarum capitulis globosis, pedibus fer- rugineis.

*Habitat in Barbaria, oryzae magnitudine, thoracis margine subferrugineo, elytris in medio macula rubra notatis.*

quadripu-5. *S. oblonga nigra*, elytris punctis duobus ferrugineis. *Fn. succ. 446.\**

*Degeer inf. 4. p. 185. n. 12. t. 6. f. 20. 21.* Silpha nigra oblonga depressa &c.

*Fabr. syst. ent. p. 69. n. 3.* Tritoma quadripustulata.

*Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 2. mant. inf. 1. p. 445. n. 5.* Ips quadripustulata.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 106. n. 16?*

*Frisch inf. 9. 36. t. 19.*

β) *Silpha americana* quadruplo major.

*Habitat*

*Habitat in Europae et Americae ligno putrescente, glaberri-  
mus, statura scarabaei, larva oblonga hirsuta grisea.*

- dorsalis. 4. *S. oblonga supra pallida coleoptris macula media nigra. Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 4.*  
*Habitat in Europa australi, quadripustulata paulo major.*
- notata. 17. *S. atra elytris inacula baseos rufa. Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 3.*  
*Habitat Halae Saxonum, dorsalis statura.*
- bipuncta- 53. *S. ater, elytris rufis: macula magna atra. Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 2.*  
ta. *Habitat in Europa magis australi.*
- fasciata. 24. *S. atra, elytris fasciis duabus rufis: anteriori nigro-maculata. Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 1. mant. inf. 1. p. 45. n. 1.*  
*Habitat in America boreali.*
- rufipes. 25. *S. atra, capite, thorace pedibusque ferrugineis. Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 6.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 2. Tritoma rufipes.*  
*Habitat in Norwegiae fungis arboreis, in Germania duplo major.*
- quadri- 27. *S. rufa, thorace elytrisque nigris: his maculis duabus ru-  
maculata. fis. Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 8.*  
*Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 256. Silpha qua-  
drimaculata oblonga ferruginea, superne nigra, elytris  
striatis: maculis duabus ferrugineis.*  
*Habitat Halae Saxonum, ad russicam accedens.*
- punctula- 32. *S. oblonga nigra, elytris punctis fasciaque posteriore ful-  
ta. vis. Fabr. mant. inf. 1. p. 46. n. 9.*  
*Habitat Halae Saxonum, parva.*
- glabra. 34. *S. oblonga nigra, thorace rufo, elytris nigris: maculis  
duabus obsolete rufis, pedibus rufis. Schaller Abb. der  
hall. Naturf. Ges. 1. p. 255.*  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 46. n. 10. Ips sanguinicollis.*  
*Habitat Halae Saxonum, mediae magnitudinis, ad russi-  
cam accedens.*
- picea. 36. *S. picea, elytris nigris, basi fasciaque posteriore ferrugi-  
neis. Fabr. sp. inf. 1. p. 81. n. 3. mant. inf. 1. p. 46. n. 11.*  
*Habitat in Germania, quadripustulata minor.*

- quadri- 37. *S. oblonga nitida atra*, elytris maculis duabus albis, an-  
guttata. teriore sinuata. *Fabr. sp. inf. I. p. 81. n. 4. mant. inf.*  
*I. p. 46. n. 14. Herbst. apud Fuesli Arch. Inf. 7. p. 158.*  
*n. 4. t. 43. f. 17.*  
*Habitat Kilonii.*
- nigricor- 38. *S. flava*, antennis nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 46. n. 12.*  
nis. *Habitat Halae Saxonum, aenea paulo major; an hujus ge-*  
*neris?*
- aenea. 39. *S. oblonga rufa*, elytris caeruleo-viridibus, antennis ni-  
gris. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 254.*  
*Fabr. mant. inf. I. p. 46. n. 13. Ips aenea.*  
*Habitat in silvis Magdeburgicis, mediae magnitudinis.*
- crenata. 40. *S. oblonga nigra*, thorace rugoso, elytris striato-crena-  
tis: maculis duabus rubris. *Fabr. sp. inf. I. p. 81. n. 5.*  
*mant. inf. I. p. 46. n. 15. Herbst apud Fuesli Arch. inf. 4.*  
*p. 31. n. 2. t. 20. f. 2.*  
*Fabr. Syst. ent. p. 69. n. 4. Tritoma crenata.*  
*Habitat in Suecia, quadripustulata quadruplo minor.*
- rufifrons. 41. *S. oblonga glabra atra*, fronte pedibus maculisque duabus  
elytrorum ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 81. n. 6. mant.*  
*inf. I. p. 46. n. 16.*  
*Fabr. syst. ent. p. 69. n. 5. Tritoma rufifrons.*  
*Habitat in Anglia.*
- bifascia- 42. *S. nigra*, elytris fasciis duabus punctoque apicis ferrugi-  
ta. neis. *Fabr. mant. inf. I. p. 47. n. 17.*  
*Habitat Halae Saxonum, minuta.*
- nigra. 43. *S. oblonga nigra immaculata.* *Fabr. mant. inf. I. p. 47.*  
*n. 18.*  
*Habitat in Uplandiae boletis, parva.*
- haemor- 79. *S. rufa*, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inf. 2. app.*  
rhoidalis. *p. 378.*  
*Habitat in Suecia, rufipedi proxime affinis.*
- binotata. 80. *S. testacea*, elytris striatis: maculis duabus nigris. *Petagn.*  
*inf. Calabr. p. 7. n. 31. f. XXXIII.*  
*Habitat in sepibus circa Bellimontum Calabriae, 'statura*  
*rufficae.*

- spadicea. 81. *S. oblonga glabra, oculis apiceque elytrorum nigris.*  
*Lesk. it. p. 14. t. A. f. 3.*  
*Habitat in Lusatiae monte Keulenberg, 2½ lineas longa.*
- sexdenta- 44. *S. nigra, thorace sexdentato, elytris angustis punctato-*  
 ta. *fulcatis. Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 31. n. 3.*  
*t. 20. f. 21.*  
*Habitat in oryza, 1½ lineas longa.*
- collaris. 45. *S. ovata nigra, thorace, pedibus antennisque luteis. Schal-*  
*ler Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 256.*  
*Habitat in ligno ducatus Magdeburgici, ruffica dimidio*  
*minor.*
- carnaria. 46. *S. fusca, elytris obtusis pubescentibus: maculis duabus*  
*testaceis. Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 257.*  
*Habitat in cadaveribus, nitidulae rufipedi similis, at minor.*
- indica. 6. *S. nigra, elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace antierius*  
*bidentato. Mus. Lud. Utr. 38.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 85.*  
*n. 3. mant. inf. 1. p. 48. n. 4.*  
*Habitat in India.*
- america- 7. *S. ovata fusca, clypeo flavo, centro nigro intra anulum*  
 na. *fulvum.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 85. n. 4. mant. inf. 1. p. 48. n. 5.* Sil-  
 pha depressa nigra, thorace flavo: centro nigro.  
*Catesb. Car. 3. t. 10. f. 5. Blatta americana.*  
*Habitat in America, vespillonis magnitudine.*
- Seminu- 8. *S. ovata atra nitida immaculata, abdomine rubro. Fn.*  
 lum. *succ. 447.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 79. n. 16. mant. inf. 1. p. 44. n. 13.*  
*Sphaeridium atrum, abdomine pedibusque rufis.*  
*Habitat in Europae hortis et floribus, parva; testam dyspo-*  
*dis instar componens, terrefacta similis semini caput et*  
*pectus abdomini applicans, ut exacte granum glabrum lu-*  
*cidum referat, quiete jaciendo facile seducens inventarent.*
- agaricina. 9. *S. ovata atra glaberrima hemiptera. Fn. succ. 448.*  
*Scop. ent. carn. 43. Dermelles agaricinus.*  
*Habitat in agaricis.*
- ruffica. 10. *S. oblonga rufa, antennis, elytris, pectoreque nigris. Fn.*  
*succ. 449.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 85. n. 5. mant. inf. 1.*  
*p. 48. n. 6.*

- Uddm. diss.* 7. Dermestes elytris nigris, capite, clypeo et abdomine rubro.  
*Degeer inf.* 5. p. 283. n. 1. t. 8. f. 12. Anthribus ruber &c.  
*Herbst. apud Fuessli Arch. Inf.* 7. p. 159. n. 14. t. 43. f. 9.  
*Habitat in Europa boreali, et Calabria.*
- livida.** 47. *S. fusca* thorace elytris pedibusque lividis. *Fabr. mant.* 1. p. 48. n. 3. *Herbst. apud Fuessli Arch. Inf.* 4. p. 34. n. 10.  
*Habitat in Germania, littoralis statura, sed duplo minor.*
- littoralis.** 11. *S. atra*, elytris laevibus: lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido. *Fn. succ.* 450.\* *Scop. ent. carn.* 55. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 85. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 48. n. 2.  
*Fn. succ.* 380. Cassida atra, elytris lineis tribus elevatis, antennis antice testaceis.  
*Degeer inf.* 4. p. 176. n. 4. *Silpha rufo-clavata* &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 120. n. 3. *Peltis nigra* &c.  
*Schaeff. ic.* t. 218. f. 1.  
*Frisch inf.* 6. p. 12. t. 5.  
*Bergstr. nomencl.* 1. 24. 6. t. 3. f. 6.  
 β) *Silpha clavipes?* *Sulz. hist. inf.* t. 2. f. 14?  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 11. f. 3.  
*Habitat in Europae cadaveribus.*  
*Larva ovata, depressa, fusca, voracissima.*
- furina-** 48. *S. atra*, elytris fascia posteriore flava, femoribus posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 85. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 48. n. 1.  
*Habitat in America meridionali.*
- inaequa-** 49. *S. atra*, elytris laevibus: lineis elevatis tribus, thorace lis. inaequali emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 87. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 49. n. 13.  
*Habitat in America septentrionali, atratae affinis.*
- granulata.** 50. *S. atra*, elytris lineis elevatis tribus punctisque granulatis, thorace emarginato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 49. n. 12.  
*Habitat in Africa, atrata paulo major.*
- atrata.** 12. *S. atra*, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, thorace integro. *Fn. succ.* 451.\* *Scop. ent. carn.* 56. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 87. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 49. n. 11.  
*Laichart. inf. tyr.* 1. p. 98. n. 10. *Silpha tyrolensis.*  
*Degeer inf.* 4. p. 177. n. 5. t. 6. f. 15. *Silpha punctata* &c.  
*Geoffr.*



*Geoffr. inf. par. 1. p. 118. n. 1. Peltis nigra &c.*

*Schaeff. elem. t. 96. f. 1.*

*icon. t. 93. f. 5.*

*Habitat in Europae agris et viis frequens.*

thoracica. 13. *S. nigra*, elytris obscuris: lineae elevata unica, thorace testaceo. *Fn. suec. 452.\* Scop. ent. carn. 54. Stroem uel. nidr. 3. p. 384. t. 6. f. 1. Fabr. sp. inf. 1. p. 86. n. 6. mant. inf. 1. p. 48. n. 7.*

*Degeer inf. 4. p. 174. n. 3. t. 6. f. 7. Silpha nigra &c.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 121. n. 6. Peltis nigra &c.*

*Gadol diss. 25. Cassida nigra*, clypeo latissimo pallide, rufo, macula lata nigra nitida.

*Raj. inf. p. 90. n. 10. Scarabaeus primo similis parum canaliculatus, scapulis croceis.*

*Bergst. nomencl. 1. 23. 5. t. 3. f. 5.*

*Schaeff. ic. t. 75. f. 4.*

*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 12.*

*Habitat in Europae cadaveribus.*

laevicol- 51. *S. gibba nigra*, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace  
lis, laevi emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 86. n. 7. mant. inf. 1. p. 48. n. 8.*

*Habitat in nova Hollandia.*

margin- 52. *S. atra*, thoracis margine pallido, elytris fuscis. *Fabr.*  
lis, *sp. inf. 1. p. 86. n. 8. mant. inf. 1. p. 48. n. 9.*

*Forster cent. inf. 1. p. 17. n. 17. Silpha noveboracensis.*

*Habitat in America boreali, atratae magnitudine.*

quadri- 14. *S. nigra*, elytris pallidis: puncto bascos medioque nigro,  
punctata. thorace emarginato. *Fn. suec. 453.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 88. n. 17. mant. inf. 1. p. 49. n. 20.*

*Pet. gaz. t. 12. f. 2.*

*Schreb. inf. 2. f. 5. Silpha quadripunctata nigra*, elytris exalbidis: maculis 4 nigris.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 122. n. 7. Peltis nigra*, thorace elytrisque testaceis, thoracis macula coleoptorumque 5 nigris.

*Degeer inf. 4. p. 181. n. 6. t. 4. Silpha corpore nigro &c.*

*Lepechin it. 1. p. 202. t. 16. f. 4. Silpha flavicans.*

*Habitat in Europae, frequens in Angliae quercu.*

pedemon- 54. *S. testacea*, antennis apice nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 88.*  
tana. *n. 18. mant. inf. 1. p. 49. n. 21.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 123. n. 9.*

*Habitat in agris Pedemontanis.*

- hirta. 55. *S. nigricans* villis flavis splendidis hirta, elytris lineis duabus et dimidia elevatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 34. n. 11.*  
*Habitat* Berolini, *sinuatae affinis.*
- sinuata. 56. *S. thorace emarginato scabro*, elytris lineis elevatis tribus apice sinuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 88. n. 16. mant. inf. 1. p. 49. n. 19.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 15.* *Silpha appendiculata.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 119. n. 2.* *Peltis nigra &c.*  
*Habitat in Anglia et Germania.*
- carinata. 57. *S. spadicea*, clypeo glaberrimo, latissimo, marginato, anterieus exciso, elytris margine carinatis glabris: lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 34. n. 12.*  
*Habitat in Pomerania, opacae affinis.*
- opaca. 15. *S. fusca*, elytris concoloribus: lineis elevatis subternis, thorace anterieus truncato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 88. n. 15. mant. inf. 1. p. 49. n. 18.*  
*Müller prodr. zool. dan. p. 63. n. 585.* *Peltis opaca &c.*  
*Schaeff. ic. t. 93. f. 6.*
- rugosa. 16. *S. nigricans*, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace rugoso posterieus sinuato. *Fn. suec. 445.\* Scop. ent. carn. 53. Fabr. sp. inf. 1. p. 86. n. 9. mant. inf. 1. p. 49. n. 10.*  
*Fn. suec. 1. n. 379.* *Cassida atra*, elytris striis quinque punctisque elevatis.  
*Degeer inf. 4. p. 182. n. 7. et inf. 5. p. 43. n. 5. t. 2. f. 21.*  
*Silpha nigra opaca &c. et Tenebrio rugosus &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 120. n. 4.* *Peltis nigra &c.*  
*Raj. inf. 90. p. 9.* *Scarabaeus inter cadavera frequens &c.*  
*Bergstr. nomencl. 1. 23. 4. t. 3. f. 4.*  
 β) *Silpha pellae ocephalos.* *Bergstr. nomencl. t. 9. f. 8.*  
*Habitat frequentissima in Europa et Sibiria, cadavera, pisces, carnes consumens, capta humorem foetidissimum evomens.*
- cancellata. 58. *S. nigra*, thorace laevi, elytris rugosis: lineis elevatis tribus. *Fabr. mant. 1. p. 49. n. 17.*  
*Habitat Halae Saxonum, obscurae proxime affinis.*

- obscura. 18. *S. nigra*, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, thorace anteriori truncato. *Fn. suec.* 457. *Scop. ent. carn.* 57. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 88. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 49. n. 16. *Udm. diff.* 8. *Callida ovata nigra*, lineis elevatis tribus: media longissima.
- β) *Silpha punctata*. *Bergstr. nomencl. t.* 9. f. 9? *Habitat in Europa boreali, rarior.*
- ferruginea. 19. *S. ferruginea*, elytris lineis elevatissimis, thorace emarginato capite latiore. *Fn. suec.* 458. *Scop. ent. carn.* 60. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 89. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 49. n. 22. *Degeer inf.* 4. p. 183. n. 9. *Silpha cimicoides* &c. *Laichart. inf. tyr.* 1. p. 102. n. 1. *Ostoma rubicunda*. *Raj. inf.* p. 84. n. 33. *Schaeff. ic. t.* 40. f. 7. *Habitat in Europa boreali, etiam Calabria.*
- reticulata. 20. *S. ferruginea*, elytris lineis elevatis senis, thorace emarginato ferrato. *Habitat in Europa, ferruginea duplo angustior.* *Clypeus lunatus, latitudine thoracis, et ultra thoracem exsertus; hic elytris angustior, marginibus lateralibus crenulatis; elytra profunde sulcata; inter singulos sulcos ordine punctorum excavato.*
- grossa. 21. *S. atra*, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, thorace transverso emarginato. *Fn. suec.* 459. *Udm. diff.* 9. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 87. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 49. n. 14. *Silpha truncata.* *Habitat in Europa, ovata, punctis elytrorum confertis.*
- laevigata. 59. *S. atra*, elytris laevibus subpunctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 87. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 49. n. 15. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 122. n. 8. *Peltis nigra tota* &c. *Sulz. hist. inf. t.* 2. f. 16. *Habitat in Europae silvis.*
- oblonga. 22. *S. nigra*, elytris striato-punctatis, lineis elevatis senis, thorace emarginato. *Fn. suec.* 460. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 89. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 50. n. 23. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. t. 20. f. 22. *Degeer inf.* 4. p. 185. n. 71. *Silpha oblonga* &c. *Fn. suec.* 381. *Callida atra*, elytris striis 10 elevatis, punctis excavatis striatis.
- β) *Silpha flavifrons*. *Schaeff. elem. t.* 18?

- scabra. 23. *S. oblonga nigra*, thorace anterieus elytrisq̄ue ante apicem bidentatis.  
*Fabr. mant. inf. I. p. 50. n. 24.* *Silpha dentata?*  
*Habitat in Europa, statura et magnitudine oblongae.*
- limbata. 60. *S. nigra*, thoracis elytrorumq̄ue margine; subferrugineo, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis. *Fabr. sp. inf. I. p. 89. n. 21. mant. inf. I. p. 50. n. 25.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura ferrugineae, at paulo minor.*
- undata. 61. *S. nigra nitida*, elytris fasciis duabus undatis, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inf. I. p. 50. n. 26.*  
*Habitat in Saxonia, sub arborum cortice, dermestis undati statura et magnitudine.*
- succincta. 26. *S. ferruginea nitida*, elytris medio nigris.  
*Habitat in Suecia, pediculo major.*
- fulca. 28. *S. fulca elongata*, subtus picea.  
*Habitat in Suecia, pediculo major, statura cicindelae.*
- depressa. 29. *S. ferruginea*, elytris laevibus, thorace emarginato. *Fn. suec. 463.\**  
*Habitat in Europa.*
- uralensis. 62. *S. supra atra*, subtus ferruginea, thoracis atque elytrorum marginibus rubicundis. *Lepech. it. I. p. 312. t. 16. f. 3.*  
*Habitat in deserto Uralensi, aliorum insectorum cadavera sepehens; an hujus generis?*
- grisea. 30. *S. grisea*, elytris laevibus, thorace emarginato. *Fn. suec. 464.\**  
*Habitat in Europa.*
- testacea. 31. *S. testacea*, thorace integro.  
*Habitat in Germania, nitidula aestiva triplo major, an hujus generis?*
- pulicaria. 33. *S. nigra oblonga*, elytris abbreviatis, abdomine acuto.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 79. n. 12. mant. inf. I. p. 44. n. 15.*  
*Sphaeridium pulicarium.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 564. n. 24. Fn. suec. 370. Dermestes pulicarius.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 308. n. 4. Anthribus niger.*  
*Raj. inf. 108. n. 29.*  
*Habitat frequens in Europa, in floribus cursitans.*

- minuta.* 63. *S. atra*, elytris striatis, pedibus concoloribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 79. n. 11. mant. inf. 1. p. 44. n. 14.*  
*Habitat in Anglia.*
- fimetaria.* 64. *S. atra*, immaculata, elytris laevissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 79. n. 9. mant. inf. 1. p. 43. n. 12. Herbsi apud Fueßli Arch. inf. 4. p. 30. n. 4. t. 20. f. 17.*  
*Habitat in Angliae stercore.*
- cruentata.* 65. *S. atra nitida*, thoracis margine elytrorumque macula sanguineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 79. n. 8. mant. inf. 1. p. 43. n. 11.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- rufa.* 66. *S. atra nitida*, thorace pedibusque anterioribus rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 43. n. 10.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura parva et gibba haemorrhoidalis.*
- haemorrhoidalis.* 67. *S. atra*, elytris apice rufis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 79. n. 7. mant. inf. 1. p. 43. n. 9.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 308. n. 5. Anthribus niger ovatus &c.*  
*Habitat in Europae stercore bovino.*
- melanocephala.* 68. *S. atra glabra*, elytris griseis: macula communi basae nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 78. n. 6. mant. inf. 1. p. 43. n. 8.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 563. n. 16. Fn. succ. 425. Dermelles melanocephalus &c.*  
*Habitat in Europae stercore frequens.*
- atomaria.* 35. *S. nigra subovata*, elytris immarginatis, pedibus pallidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 78. n. 5. mant. inf. 1. p. 43. n. 7. Sphaeridium laeve atrum, elytris crenato-striatis, pedibus pallidis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 117. n. 19. Dermelles niger subrotundus &c.*  
*Habitat in Europae stercore.*
- striata.* 69. *S. ferruginea*, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 43. n. 6.*  
*Habitat Kilonii, statura marginatae.*
- marginata.* 70. *S. laevis atra*, elytrorum margine pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 43. n. 5.*  
*Habitat Halae Saxonum, glabratae statura et magnitudine.*

- glabrata. 71. *S. atra*, antennis pedibusque rufis, elytris laevibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 78. n. 4. mant. inf. I. p. 43. n. 4.*  
*Habitat in insula Madera, statura dyticeoidis, at minor.*
- dyticeoides. 72. *S. ferruginea*, elytris atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 78. n. 3.*  
*mant. inf. I. p. 43. n. 3.*  
*Habitat in insula S. Helenae.*
- stercorea. 73. *S. atra nitida*, elytrorum macula apicis rubra, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 78. n. 2. mant. inf. I. p. 43. n. 2.*  
*Habitat Kilonii in stercore.*
- scarabaeoides. 74. *S. ovata atra*, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 78. n. 1. mant. inf. I. p. 43. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 563. n. 17. Fn. suec. 428.\* Scop. ent. carn. 36. Dermestes scarabaeoides.*  
*Gadd sutag. 76. Scarabaeus ovatus niger glaber, maculis 2 rubris in singulo elytro.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 106. n. 17. Dermestes niger &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 345. t. 12. f. 17. Hister testudinarius &c.*
- insignita. 75. *S. nigra*, elytris obsolete striatis: maculis duabus magnis coccineis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 30. n. 5. t. 20. f. 18.*  
*Habitat rarior Berolini in stercore vaccino.*
- nigricans. 76. *S. nigricans*, elytris laevissimis: maculis quatuor flavis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 30. n. 6. t. 20. f. 19.*  
*Habitat rarior Berolini in stercore vaccino, statura et magnitudine melanocephalae.*
- histeroides. 77. *S. nigra*, antennis pedibusque rubris, elytris abbreviatis: macula rubra. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 8. n. 12.*  
*Habitat Upsaliae, oblonga, angusta, pediculo vix major.*
- biguttata. 78. *S. tota ferruginea*, elytris linea punctoque pallido. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 9. n. 13.*  
*Habitat Upsaliae, depressae magnitudine et facie.*
- lutea. 81. *S. lutea*, elytris pubescentibus laevibus. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Suecia.*
- ruficornis. 82. *S. atra glabra*, antennis abdomine pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 7. n. 142.*  
*Habitat in Europa.*

- exilis. 83. *S. atra glabra minima, capite thoraceque incurvis.* *Mus. Lesk. p. 7. n. 144. c.*  
*Habitat in Europa.*
- spadicea. 84. *S. ferrugineo fusca glabra, capite thoraceque incurvis.* *Mus. Lesk. p. 8. n. 144. A.*  
*Habitat in Europa.*
- trilineata. 85. *S. elytris punctatis: lineis elevatis tribus; intermedia longissima.* *Mus. Lesk. p. 8. n. 154. b.*  
*Habitat in Europa.*
- melan- 86. *S. testacea, oculis nigris, elytris guttis quinque nigris: ophthalmia. una communi ad scutellam.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 160.*  
*Habitat in Europa.*
- multico- 87. *S. nigra, antennis pedibusque rufis, thoracis testacei dorso lor. fusco; punctis duobus impressis, elytris testaceis: punctis duobus, taenia media, fascia inaequali versus apicem apiceque ipso nigris.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 171.*  
*Habitat in Europa, antennarum apice fusco.*
- bicolor. 88. *S. fusca, pedibus rufis.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 172. 174.*  
*Habitat in Europa.*
- nebulosa. 89. *S. testacea, capite, thorace elytrisque fusco nebulosis.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 173.*  
*Habitat in Europa.*
- rubigino- 90. *S. thorace angusto: dorso fulcato, corpore fusco, elytris fa. rugosis, capite, thorace, abdomine pedibusque ferrugineis.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. b.*  
*Habitat - - -*
- pallipes. 91. *S. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque pallidis, oculis nigris.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. d.*  
*Habitat in Europa.*
- squalida. 92. *S. fusco testacea, capite, thorace antennarumque testacearum apice testaceis, elytris sordide testaceis, pedibus lividis.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. c.*  
*Habitat - - -*
- friatula. 93. *S. ferruginea, elytris levissime striatis.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. f.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 94. *S. nigra, antennis pedibusque rufis, elytris fusco-brunneis.* *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. g.*  
*Habitat in Europa.*

**NITIDULA.** *Antennae* clavatae: clava solida.  
*Elytra* marginata.  
*Caput* prominens.  
*Thorax* planiusculus, marginatus.

\* *labio quadrato*: Elophori.

- aquatica. 1. *N. fusca*, thorace rugoso elytrisque fusco-aeneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 1.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 573. n. 25. *Fn. suec.* 461.\* *Silpha cinerea*, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virefcente.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 105. n. 15. *Dermestes viridi-aeneus*, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.  
*Degeer inf.* 4. p. 379. n. 5. t. 15. f. 5. 6. *Hydrophilus aeneus* &c.  
*Habitat in Europae aquis stagnantibus, parva, frequens inter cervas.*
- elongata. 2. *N. fusca*, thorace rugoso, elytris sulcatis crenatis. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 257.  
*Habitat Halae Saxonum in aquis stagnantibus sub lemna, magnitudine media ptini pertinacis, angusta et elongata, pedibus piceis.*
- nubila. 3. *N. grisea*, thorace elytrisque sulcato-rugosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 2.  
*Habitat Hamburgi.*
- minuta. 4. *N. fusca*, thorace rugoso aeneo, elytris pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 77. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 42. n. 3.  
*Habitat in Angliae aquis stagnantibus, aquaticae affinis, at triplo minor.*
- coccinelloides. 28. *N. nigra*, capite, thorace elytrisque fumatis. *Mus. Lesk.* p. 7. n. 137. b.  
*Habitat in Europa, statura coccinellae.*
- fusca. 29. *N. fusco-tellacea*, elytris punctato-striatis, antennis pedibusque tellaceis. *Mus. Lesk.* p. 7. n. 137. c.  
*Habitat in Europa.*

30. *N.*



- nebulosa. 30. N. testaceo grisea, capite fusco: tuberculis inter oculos quatuor, thorace aspero, elytris lineis elevatis sex: interstitiis punctatis. *Mus. Lesk. p. 7. n. 138. b.*  
*Habitat - - - an forte eadem cum nubila?*
- \*\* labio cylindrico.
- bipustulata. 5. N. ovata nigra, elytris puncto rubro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 1. mant. inf. 1. p. 51. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 570. n. 4. Fn. succ. 445.* Silpha oblonga nigra, elytris singulis puncto unico rubro.  
*Laichart. inf. tyr. 1. p. 106. n. 3.* Ostoma bipustulata.  
*Degeer inf. 4. p. 186. n. 13. t. 6. f. 22. 23.* Silpha nigra &c.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 100. n. 3.* Dermestes niger &c.  
*Habitat in Europae cadaveribus, carnibus, lardo.*
- obscura. 6. N. ovata nigra obscura, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 2. mant. inf. 1. p. 51. n. 2.* *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 2. t. 20. f. 23.*  
*Habitat in Germania.*
- abbreviata. 7. N. ovata nigra obscura, elytris laevibus obtusis abbreviatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 3. mant. inf. 1. p. 51. n. 3.*  
*Habitat in nova Seelandia, obscurae statura et magnitudine, pedibus nunc flavis, nunc nigris.*
- marginata. 8. N. ovata, elytris fulcatis: margine punctisque disci ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 4. mant. inf. 1. p. 51. n. 4.*  
*Habitat in Italia, statura bipustulatae.*
- aestiva. 9. N. testacea subtomentosa, thorace emarginato, oculis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 91. n. 5. mant. inf. 1. p. 51. n. 5.* *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 3. t. 20. f. 24.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 574. n. 32. Fn. succ. 465.* Silpha aestiva.  
*Habitat in Europae floribus.*
- strigata. 10. N. ovata fusca, thoracis margine, elytris margine, lineola baseos strigaeque apicis fulvis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 51. n. 7.*  
*Habitat Halae Saxonum, mediae magnitudinis, subtus fusca.*
- varia. 11. N. ovata, thorace elytrisque nigro ferrugineoque variis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 92. n. 7. mant. inf. 1. p. 52. n. 8.* *Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 76. n. 4. t. 20. f. 25.*  
*Habitat Kilonii in hortis, statura dermestis ferruginei.*

- bicolor. 12. *N. ferruginea*, elytris nigris, fascia baseos punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 9.  
*Habitat in arvis Kiloniensibus.*
- Colon. 13. *N. nigra*, elytris ferrugineo-variis, thorace emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 10.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 573. n. 27. *Fn. suec.* 462. *Degeer inf.* 4. p. 117. n. 14. t. 6. f. 24. *Silpha Colon.*  
*Habitat in Europae borealis graminosis.*
- limbata. 14. *N. nigra*, thoracis margine, elytrorumque limbo ferrugineis. *Fabr. mant.* 1. p. 52. n. 11.  
*Habitat Halae Saxonum parva.*
- haemorrhoidalis. 15. *N. nigra*, elytris apice ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 12.  
*Habitat Hamburgi.*
- discoidea. 16. *N. nigra*, thorace marginato, elytrorum disco ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 13.  
*Habitat in Anglia.*
- pedicularia. 17. *N. nigra*, elytris laevibus, thorace marginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 92. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 14.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 574. n. 34. *Fn. suec.* 466. *Silpha pedicularia.*  
β) *Dermeestes (psyllius) ovatus niger*, abdomine obtuso, thorace elytrisque marginatis.  
*Habitat in Europae borealis hortis, floribus, pediculi magnitudine, ovato-oblonga.*
- litura. 18. *N. testacea*, elytris litura arcuata nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 52. n. 15.  
*Habitat Halae Saxonum, parva.*
- bipunctata. 19. *N. testacea*, coleoptris maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 52. n. 16.  
*Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. p. 58. n. 32. t. 23. f. 20. c. *Chrytomela scutellata.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura liturae.*
- aenea. 20. *N. viridi-aenea*, thorace marginato, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 93. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 52. n. 17.  
*Habitat in Anglia.*

- viridescens. 21. *N. viridi-aenea*, thorace marginato, pedibus rufis. *Fabr. mant. inf. I. p. 52. n. 18.*  
*Habitat* Kilonii, *statura aeneae.*
- pubescens. 22. *N. thorace elytrisque griseis pubescentibus.* *Fabr. sp. inf. I. p. 93. n. 14. mant. inf. I. p. 52. n. 19.*  
*Habitat in Germania.*
- hirta. 23. *N. atra*, thorace elytrisque pubescentibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 93. n. 15. mant. inf. I. p. 52. n. 20.*  
*Habitat in Germania, pubescenti affinis.*
- rufipes. 24. *N. nigra nitida*, pedibus pallidis. *Fabr. sp. inf. I. p. 93. n. 16. mant. inf. I. p. 52. n. 21.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 573. n. 24.* *Silpha nigralaevis*, thorace submarginato, pedibus pallidis.  
*Habitat in Europae hortis.*
- setacea. 25. *N. ochracea immaculata*, oculis nigris, elytris laevissimis.  
*Herbst. apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 6.*  
*Habitat - - - statura et magnitudine coli, dermesti ferrugineo affinis.*
- pectoralis. 26. *N. fusca*, capite pedibusque ferruginea, antennarum clava flava. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 41. n. 12. t. 21. f. M. m.*
- pilosa. 27. *N. nigra*, elytris villosis, antennis pedibusque ferrugineis.  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 39. n. 7. t. 21. f. G. g.*  
*Habitat in Marchia, lineam longa.*

OPATRUM. *Antennae moniliformes, extrorsum crassiores.*

*Elytra marginata.*

*Caput prominens.*

*Thorax planiusculus, marginatus.*

- griseum. 1. *O. cinereum*, thorace plano marginato, elytris ltriiis tribus elevatis posterius dentatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 89. n. 1. mant. inf. I. p. 50. n. 1.*  
*Habitat in Italia, sabuloso major.*

- fabulo- 2. *O. fuscum*, elytris lineis elevatis tribus dentatis, thorace  
sum. emarginato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 89. n. 2. mant. inf. 1. p. 50. n. 2.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 572. n. 17. Fn. suec. 456.* *Silpha fabulosa*  
*Udm. diss. 5.* *Dermeestes niger*, inter elytrorum lineas quatuor elevatas scrobiculis exaratus.  
*Fn. suec. 382.* *Callida nigra*, elytris striis quinque utrinque dentatis, clypeo emarginato.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 350. n. 7.* *Tenebrio atra* &c.  
*Habitat in Europae et borealis Americae campis apricis sabulosis.*
- gibbum. 3. *O. nigrum*, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 90. n. 3. mant. inf. 1. p. 50. n. 3.*  
*Habitat in Sueciae collibus arenosis.*
- laevigatum. 4. *O. nigrum*, clypeo anterieus picco, elytris substriatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 90. n. 4. mant. inf. 1. p. 50. n. 4.*  
*Habitat in nova Seelandia, statara gibbi.*
- arenarium. 5. *O. griseum*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 90. n. 5. mant. inf. 1. p. 51. n. 5.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- orientale. 6. *O. cinereum*, thorace elytrisque rugosis, tibiis anterioribus dilatatis triangularibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 90. n. 6. mant. inf. 1. p. 51. n. 6.*  
*Forsk. Fn. ar. p. 77. n. 1.* *Silpha multifriata.*  
*Habitat in Orientis arenosis.*
- tibiale. 7. *O. nigrum*, elytris punctato subrugosis, tibiis anterioribus compresso-triangularibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 90. n. 7. mant. inf. 1. p. 51. n. 7.*  
*Habitat sub Scaniae lapidibus, parva.*
- Agricola. 8. *O. nigrum*, thorace laevi, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 57. n. 8. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 35. n. 2.*  
*Habitat Berolini et Halae Saxonum, parva.*
- minutum. 9. *O. cinereum*, thorace rugoso, elytris lineis elevatis quatuor laevibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 90. n. 8. mant. inf. 1. p. 51. n. 9.*  
*Habitat in Sueciae arenosis, primis speciebus quadruplo minor.*

- quisquiliarum. 10. *O. nigrum*, thorace granulato medio glabro, elytris glaberrimis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 35. n. 3.*
- cinereum. 11. *O. nigrum* cinereo obumbratum, elytris punctato-fulcatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 159. n. 4. t. 43. f. 10.*  
*Habitat in India.*
- Lithophilus. 12. *O. nigrum*, thorace et subtus coccineum, thorace emarginato posterius utrinque acuminato, elytris glaberrimis, tarsis triarticulatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 37. n. 1. t. 21. f. A. a.*  
*Habitat in Marchia sub saxis, 2 lineas longum, dubii generis.*
- melinum. 13. *O. ochraceum* glabrum, thorace elytrisque tenerrime punctatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 37. n. 2. t. 21. f. B. b.*  
*Habitat rarior in Marchiae floribus, 1½ lineas longum, dubii generis.*
- cineterium. 14. *O. badium* elongatum, elytris planis glaberrimis. *Herbst apud Fuessli Arch. inf. 4. p. 38. n. 3. t. 21. f. C. c.*  
*Habitat in Pomerania.*
- bipustulatum. 15. *O. ferrugineum*, elytris tenerrime fulcatis thoraceque posterius ferrugineis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 38. n. 4. t. 21. f. D. d.*  
*Habitat in Pomerania, 2 lineas longum, angustum, elongatum.*
- monilicorne. 16. *O. fuscum*, thorace elytrisque villosis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 39. n. 5. t. 21. f. E. e.*  
*Habitat in Germania, 4 lineas longum.*
- filphoides. 17. *O. nigrum* glabrum, thorace retrorsum dilatato, elytris punctato striatis: maculis duabus fulvis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 41. n. 11. t. 21. f. L. l.*  
*Habitat in fungis quernis, generis dubii.*
- unipunctatum. 18. *O. fuscum* hirtum, thorace subcylindrico immarginato media fovea excavato, antennarum articulis duobus ultimis distantibus majoribus.  
*Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 40. n. 8. t. 21. f. H. h.*  
*Dermestoides unipunctatus.*  
*Habitat - - - ultra duas lineas longum, utrum hujus, an cum sequente proprii generis?*

- bipunctatum. 19. *O. fuscum*, thorace subcylindrico immarginato: foveis binis, antennarum articulis duobus ultimis distantibus majoribus.  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 40. n. 9. t. 21. f. I. i.*  
*Habitat - - - unipunctato affine, at minus et magis depressum.*
- clathratum. 20. *O. nigrum*, elytris striatis: striis punctatis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*  
*Habitat in Cayenna.*
- testaceum. 21. *O. testaceus*, oculis, thorace, elytris antennisque fuscis, his basi apiceque rufis, elytrorum basi lunula magna testacea, thorace punctis duobus impressis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 178.*  
*Habitat in Europa, statura quadripustulati, elytris punctato striatis.*
- brunneum. 22. *O. brunneum* luteo sericeum, elytris levissime punctato striatis: maculis sex luteis, antennis pedibusque lutescentibus. *Mus. Lesk. p. 10. n. 179.*  
*Habitat - - -*

**TRITOMA.** *Antennae clavatae: clava perfoliata.*  
*Palpi anteriores securiformes.*

- bipustulatum. 1. *Tr. atrum* elytris macula laterali coccinea. *Fabr. sp. inf. I. p. 80. n. 1. mant. inf. I. p. 44. n. 1.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 335. n. 1. t. 6. f. 2. Tritoma?*  
*Habitat in Angliae boletis arboreis.*
- glabrum. 2. *Tr. glabrum atrum*, antennis pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 45. n. 2.*  
*Habitat sub Sueciae arborum corticibus, statura bipustulati.*
- dubium. 3. *Tr. nigrum*, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 80. n. 3. mant. inf. I. p. 44. n. 3.*  
*Habitat Kilonii.*
- vittatum. 4. *Tr. rufum*, elytris nigris: vitta rufa. *Fabr. mant. inf. I. p. 44. n. 4.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*

5. *Tr.*

- Morio. 5. Tr. atrum holosericeum, antennis pedibusque contoloribus.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 44. n. 5.*  
*Habitat Kilonii, statura dubii, at duplo major.*
- sericeum. 6. Tr. nigricans holosericeum, pedibus testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 44. n. 6.*  
*Habitat in Germania, statura dubii, sed major.*
- collare. 7. Tr. nigrum, thoracis lateribus abdomineque rubris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 4. mant. inf. 1. p. 44. n. 7.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

197. CASSIDA. *Antennae moniliformes.**Styctolus**Elytra marginata.**Caput sub thoracis clypeo plano  
reconditum.*

- viridis. 1. *C. viridis.* *Fn. succ. 467. It. oel. 153. Scop. ent. carn. 117. Geoffr. inf. par. 1. p. 313. n. 1. Fabr. sp. inf. p. 107. n. 1. mant. inf. 1. p. 62. n. 1.*  
*Degeer inf. 5. p. 174. n. 2. Cassida cardui &c.*  
*Goed. inf. 1. p. 94. t. 43.*  
*Blank. inf. 89. t. 11. f. F.*  
*Merian. europ. t. 115.*  
*Volk. hesper. 1. p. 166. f. 4.*  
*Raj. inf. 107. n. 5.*  
*Reaum. inf. 3. t. 18.*  
*Roes. inf. 2. scar. 3. p. 13. t. 6.*  
*Schaeff. el. t. 35.*  
*icon. t. 27. f. 5.*

*Habitat in Europae carduis et verticillatis frequens.**Larva hexapus depressa, spinis lateralibus acutis et cauda bifeta armata proprio stercore obvoluta obambulat.*

- Murraea. 2. *C. nigra,* clypeo rubro, elytris sanguineis: punctis nigris sparsis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 108. n. 6. mant. 1. p. 62. n. 8.*  
*Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 50. n. 5. t. 22. f. 29.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 314. n. 5. β. Cassida rubra maculis rubris variegata.*  
*Habitat in Europae plantis, statura viridis. J. A. Murray.*

- atrata. 32. *C. atra*, clypeo anterieus fanguineo. *Fabr. mant. inf. I. p. 62. n. 7.*  
*Habitat in Aultria, flatura nebulofae, at minor.*
- nebulofa. 3. *C. pallido-nebulofa*, fulco punctata. *Fn. fuc. 468.\* Fabr. fp. inf. I. p. 108. n. 5. mant. inf. I. p. 62. n. 6.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 313. n. 2.*  
*Raj. inf. p. 88. n. 13.*  
*Frifch inf. 4. p. 30. t. 15.*  
*Goed. inf. I. p. 96. t. 44.*  
*List. goed. 287. t. 117.*  
*Roes. inf. 2. Scar. 3. p. 13. t. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 27. f. 4.*  
*Habitat in Europae carduis.*
- oxdobny* nobilis. 4. *C. grifea*, elytris linea caerulea nitidiffima. *Fn. fuc. 469.*  
*Fabr. fp. inf. I. p. 110. n. 17. mant. inf. I. p. 63. n. 21.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 313. n. 3.*  
*Raj. inf. p. 107. n. 7.*  
*Schaeff. ic. t. 96. f. 6.*  
*Habitat in Europae carduis, et plantis ftellatis.*  
*Linea elytrorum cum vita perit, in aqua calida revivifcens.*
- cribraria. 33. *C. rufefcens*, thorace punctis quatuor, elytris munerofis nigris, clypeo emarginato. *Fabr. fp. inf. I. p. 110. n. 16.*  
*mant. inf. I. p. 63. n. 20.*  
*Habitat in America.*
- deufta. 34. *C. rufefcens*, thorace punctis duobus elytris numerofis cyaneo nigris, clypeo integro. *Fabr. fp. inf. I. p. 109. n. 15. mant. inf. I. p. 63. n. 19.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- octopunctata. 35. *C. rufefcens*, thorace punctis duobus, elytris quatuor cyaneo nigris. *Fabr. mant. I. p. 63. n. 18.*  
*Habitat in Siam, flatura et magnitudine deuftae.*
- interrupta. 36. *C. flavefcens*, thorace immaculato elytris ante marginem punctisque nigris. *Fabr. fp. inf. I. p. 109. n. 14. mant. inf. I. p. 63. n. 17.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- fexpunctata. 37. *C. flavefcens*, coleoptrorum difco ferrugineo: punctis fex nigris. *Fabr. fp. inf. I. p. 109. n. 13. mant. inf. I. p. 63. n. 16.*  
*Habitat in-Cayenna.*



- annulus. 38. *C. flavescens*, coleoptrorum disco atro: annulo fasciaeque posteriore flavescens. *Fabr. sp. inf.* I. p. 109. n. 12. *mant. inf.* I. p. 63. n. 15.  
*Habitat in Cayenna, statura judaicae.*
- judaica. 39. *C. ferruginea*, coleoptrorum disco punctis impressis maculisque nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 109. n. 11. *mant. inf.* I. p. 63. n. 14.  
*Habitat in Cayenna, hebraea minor.*
- hebraea. 40. *C. pallida*, coleoptris lineolis numerosissimis difformibus nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 109. n. 10. *mant. inf.* I. p. 63. n. 13.  
*Habitat in Cayenna, parva, flavescens.*
- cineta. 41. *C. thorace elytrisque obscuris: margine flavescente, elytris ante marginem macula albo-hyalina.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 109. n. 9. *mant. inf.* I. p. 63. n. 12.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura interruptae.*
- marginella. 42. *C. viridis*, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 108. n. 8. *mant. inf.* I. p. 63. n. 11.  
*Habitat in Brasilia.*
- limbata. 43. *C. capite thoraceque pubescentibus obscure aeneis: margine pubescente.* *Fabr. mant. inf.* I. p. 63. n. 10.  
*Habitat Halae Saxonum in diantho carthusianorum, statura et magnitudine ferrugineae.*
- ferruginea. 44. *C. nigra*, thorace elytrisque ferrugineis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 108. n. 7. *mant. inf.* I. p. 62. n. 9. *Herbst apud Fuesli Arch. Inf.* 4. p. 50. n. 6. t. 22. f. 28. *Schranck Beytr.* 62. 3. *Cassida subferruginea.*  
*Habitat in Germania, in Calabria viridi paulo minor.*
- Vibex. 5. *C. virens*, futura dorsali sanguinolenta. *Fabr. sp. inf.* I. p. 108. n. 4. *mant. inf.* I. p. 62. n. 5.  
*Habitat in Germaniae plantis, viridi similis, elytrorum tamen dorso virescente.*
- affinis. 45. *C. elytris griseis nigro-punctatis, thorace flavescente immaculato.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 108. n. 3. *mant. inf.* I. p. 62. n. 4.  
*Habitat in Germania, viridi valde affinis.*

- maculata. 6. *C. viridis*, elytris rarius, sutura dorsali confertius nigro maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 107. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 62. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 314. t. 5. f. 6. *Cassida viridis maculis nigris variegata.*  
*Degeer inf.* 5. p. 175. n. 3. *Cassida supra viridis, subtus nigra &c.*  
*Habitat in Germaniae plantis, an varietas viridis?*
- equestris. 46. *C. viridis*, elytrorum basi argentea, abdomine atro: margine pallido. *Fabr. mant.* 1. p. 62. n. 2.  
*Habitat Halae Saxonum in mentha aquatica, viridi major, pedibus flavescens.*
- truncata. 47. *C. rufa*, elytris subreticulatis nigro-maculatis dorso gibbis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 41.  
*Habitat - - - magna.*
- gibbosa. 48. *C. atra*, thorace maculis duabus villosa-aureis, elytris virescenti-reticulatis: spina futurali obtusa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 40.  
*Habitat in Brasilia, magna.*
- bidens. 49. *C. atra*, elytris anterieus porrectis: spina futurali erecta. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 39.  
*Habitat in Brasilia, magna.*
- spinifex. 7. *C. ferruginea*, elytris angulo anteriore spina porrecta, thorace utrinque spina transversali. *Amoen. acad.* 6. p. 92. n. 7.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 38.  
*Habitat in India, ad basin elytrorum linea nigra notata.*
- bicornis. 8. *C. cyanea*, elytris angulo anteriore spina truncata. *Amoen. acad.* 6. p. 393. n. 9.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 112. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 36.  
*Habitat in America australi et India.*
- perforata. 50. *C. testacea*, elytris angulo anteriore spinoso basique perforatis. *Pall. spicil. zool.* 9. p. 3. t. 1. f. 1. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 35.  
*Habitat in America meridionali.*

- margari- 51. *C. virens*, elytris viridi-argenteis lucidis, capite pectoreque  
tacea, nigris. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 259.*  
*Fabr. mant. I. p. 63. n. 22.*  
*Habitat Halae Saxonum vere sub lapidibus, nebulosae pro-*  
*xime affinis, colore cum vita pereunte.*
- fastuosa. 52. *C. atra*, elytris rubro-aeneis nigro maculatis. *Schaller*  
*Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 259.*  
*Habitat rarior Halae Saxonum in populo alba, nobili vix*  
*major, colore cum vita pereunte.*
- fusca. 53. *C. spadicea*, elytris striis duabus elevatis. *Laichart. inf.*  
*tyr. I. n. 4. Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 51. n. 9.*  
*Habitat in Germania, viridi minor.*
- cruciata. 9. *C. pallida*, elytris disco fusco-cruciato.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 110. n. 18. mant. inf. I. p. 64. n. 23.*  
*Cassida flavescens, coleoptris disco nigro: maculis qua-*  
*tuor flavescentibus.*  
*Degeer inf. 5. p. 187. n. 12. t. 15. f. 15. Cassida hyalina*  
*pallide flava &c.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- Crux. 54. *C. flava*, thoracis linea dorsali ferruginea, coleoptrorum  
disco ferrugineo: maculis quatuor flavis. *Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 110. n. 119. mant. inf. I. p. 64. n. 24.*  
*Habitat in Cayenna, an vere a cruciata diversa?*
- II puncta- 55. *C. flavescens*, thoracis puncto medio, coleoptris undecim  
ta. nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 110. n. 20. mant. inf. I. p.*  
*64. n. 25.*  
*Habitat in America meridionali, subtus dilute ferruginea.*
- bifasciata. 10. *C. pallida*, corpore fasciis duabus fuscis.  
*Habitat in America meridionali.*
- flava. 11. *C. flava immaculata*, corpore testaceo, puncto scutellari  
nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 113. n. 35. mant. inf. I. p.*  
*65. n. 42.*  
*Degeer inf. 5. p. 184. t. 15. f. 13. Cassida pallide flava im-*  
*maculata &c.*  
*Habitat in Europa australi.*
- purpurea. 12. *C. flava*, supra corpus purpurea.  
*Habitat in America, parva.*

- leuco-phaea. 13. *C. testacea*, margine punctis flavis. *Amoen. acad.* 6. p. 392. n. 8. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 43.  
*Habitat in America.*
- tuberculata. 14. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flavo, coleoptris basi trituberculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 110. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 26.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 576. n. 14. *Cassida marginata.*  
*Degeer inf.* 5. p. 186. n. 11. t. 15. f. 14. *Cassida cincta.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- futuralis. 56. *C. brunnea*, elytris flavis: futuris brunneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 27.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- biguttata. 57. *C. thorace flavo*, elytris rufescentibus: margine nigro; maculis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 28.  
*Habitat in Cayenna.*
- miliaris. 58. *C. flava*, thorace immaculato, elytris nigro-punctatis: margine bifasciato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 111. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 64. n. 29.  
*Habitat in insula S. Helenae.*
- punctata. 59. *C. nigra*, clypeo brunneo, elytris flavis nigro-punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 64. n. 30.  
*Habitat ad caput bonae spei, miliaris magnitudine.*
- reticularis. 15. *C. flava*, elytris caeruleo-variegatis: lateribus unifasciatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 44. *Degeer inf.* 5. p. 188. n. 14. t. 15. f. 17. *Cassida pellucida albo-flavescens &c.*  
*Habitat in America meridionali, magna.*
- variegata. 16. *C. rufa*, elytris caeruleo-variegatis: lateribus unifasciatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 113. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 65. n. 45. *Degeer inf.* 5. p. 178. n. 2. t. 15. f. 6. *Cassida fusco-rubra &c.*  
*Habitat in America, magna.*
- trifasciata. 60. *C. rufa*, elytrorum lateribus trifasciatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 65. n. 46.  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*

- annulata. 61. *C. caerulea*, thorace maculis duabus, elytris annulis rufis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 113. n. 39. mant. inf. 1. p. 65. n. 47.*  
 β) *Cassida ornata*. *Herbst apud Fucssli Arch. Inf. 4. p. 50.*  
*n. 8. t. 22. f. 30.*  
*Habitat in America australi et India magna.*
- grossa. 17. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris sparsis: margine  
 lineis ramosis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 113. n. 40. mant.*  
*inf. 1. p. 65. n. 48.*  
*Schulze Naturf. 6. p. 89. t. 4. f. 1.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 1.*  
*Degeer inf. 5. t. 15. f. 5.*  
*Habitat in America meridionali, congenerum maxima.*
- elathrata. 18. *C. ferruginea*, elytris margine omni, linea longitudinali  
 et dimidiata transversali nigris.  
*Habitat in India. De Geer.*  
*Thorax immaculatus; elytra latissima; femina lineis trans-*  
*versis dimidiatis tribus distincta.*
- 7guttata. 19. *C. nigra*, coleoptris maculis septem albis.  
*Habitat in India, an varietas blattae Petiverianae? Brünnich.*
- exclama- 20. *C. flava*, elytris lineis ternis nigris, intermedia signum!  
 tionis, referente. *Fabr. sp. inf. 1. p. 114. v. 41. mant. inf. 1.*  
*p. 65. n. 49.*  
*Habitat in America meridionali, viridi paulo major, sub-*  
*tus livida.*
- lineata. 62. *C. cinerascens*, lineis elytrorum quatuor albidis. *Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 65. n. 50.*  
*Habitat ad caput bonae spei, cassidae exclamationis magni-*  
*tudine et statura.*
- jamaicenis. 21. *C. luteo-aenea*, elytris immaculatis excavato-punctatis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 111. n. 27. mant. inf. 1. p. 64. n. 34.*  
*Sloan. jam. 2. p. 208. t. 233. f. 27. 28.*  
*Habitat in America, ad futuram antierius gibba, colorem in*  
*spiritu vini perditum in aqua calida recuperans.*
- dorsifata. 63. *C. thorace elytrisque obscuris, elytris spina suturali mar-*  
 gineque albicante: basi obscuro. *Fabr. mant. inf. 1.*  
*p. 64. n. 33.*  
*Habitat in Siam, statura jamaicensis, at duplo minor.*

- quadripu- 64. *C. thorace obscuro, elytris sanguineis: margine cyaneo; stulata. maculis duabus rubris. Fabr. sp. inf. I. p. 111. n. 26. mant. inf. I. p. 64. n. 32. Habitat in America, mediae magnitudinis, atra.*
- cyanea. 22. *C. cyaneo-aenea, elytris immaculatis excavato-punctatis. Mus. Lud. Ulr. 39.\* Fabr. sp. inf. I. p. 112. n. 30. mant. inf. I. p. 65. n. 37. Petiv. gazoph. t. 57. f. 6. Degeer inf. 5. p. 181. n. 5. t. 15. f. 9. Habitat in America.*
- margina- 23. *C. elytris testaceis, corpore elytrorumque margine nigro, ta. thorace aeneo. Fabr. sp. inf. I. p. 111. n. 25. mant. inf. I. p. 64. n. 31. Schulze Naturf. 9. p. 103. t. 2. f. 3. Degeer inf. 5. p. 185. n. 10. Cassida thorace violaceo nigro &c. Habitat in America australi et India.*
- inaequa- 24. *C. ferrugineo-aenea, elytris macula flava subovata disci- lis. Fabr. sp. inf. I. p. 114. n. 42. mant. inf. I. p. 65. n. 51. Schulze Naturf. 9. t. 2. f. 6. Mus. petrop. 650. n. 130. Degeer inf. 5. p. 182. n. 6. t. 16. f. 2. Cassida bimaculata &c. Habitat in America meridionali.*
- imposita. 25. *C. elytris nigris antierius annulatis: puncto centrali fulvo. Lederm. microsc. t. 28. f. F. g. et t. 44. f. b. c. d. Habitat in America calidiore.*
- lateralis. 26. *C. fusco-aenea, elytris macula flava laterali. Fabr. sp. inf. I. p. 114. n. 43. mant. inf. I. p. 66. n. 52. Degeer inf. 5. p. 184. n. 8. t. 15. f. 12. Cassida fusco-aenea &c. Sulz. hist. inf. I. t. 3. f. 2. Habitat in America meridionali, inaequali duplo minor.*
- discoides. 27. *C. viridi-aenea, elytris macula didyma flava disci. Fabr. sp. inf. I. p. 114. n. 44. mant. inf. I. p. 66. n. 53. Degeer inf. 5. p. 183. n. 7. t. 15. f. 11. Cassida quadrimaculata &c. Habitat in America meridionali.*
- decussata, 28. *C. nigro-caerulefcens, elytris flavo-maculatis, maculis dorfalibus reticulatis, lateralibus distinctis. Fabr. sp. inf. I. p. 115. n. 48. mant. inf. I. p. 66. n. 57. Habitat in Jamaica.*

- bipuncta-29. *C. flavescens*, elytris punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf.*  
ta. I. p. 115. n. 49. *man. inf.* I. p. 66. n. 58.  
*Habitat in India, nebulosae magnitudine et facie, elytrorum*  
*punctis interdum tribus.*
- bipustu-30. *C. viridis*, elytris maculis duabus lateralibus sanguineis.  
lata. *Amoen. acad.* 6. p. 392. n. 8. *Schulze Naturf.* 6. p. 91.  
t. 4. f. 2. *Fabr. sp. inf.* I. p. 114. n. 45. *man. inf.* I.  
p. 66. n. 54.  
*Habitat in Cayenna.*
- sempustu-65. *C. cayanea*, elytris maculis tribus rubris. *Fabr. sp. inf.*  
lata. I. p. 114. n. 46. *man. inf.* I. p. 66. n. 55.  
*Habitat in Brasilia, mediae magnitudinis.*
- 16pustu-66. *C. nigra*, thorace punctis duobus, elytris septem rubris.  
lata. *Fabr. sp. inf.* I. p. 115. n. 47. *man. inf.* I. p. 66. n. 56.  
*Habitat in America meridionali, mediae magnitudinis.*
- angustata.31. *C. flavescens*, elytris posterius angustatis.  
*Habitat in India.*
- bituber-32. *C. brunnea albo marginata*, elytris nigro maculatis basi  
culata. unituberculatis. *Fabr. man. inf.* 2. app. p. 378.  
*Habitat in Cayenna, tuberculatae affinis, at duplo minor.*
- Taurus.33. *C. atra*, elytris angulo anteriore spina truncata. *Fabr.*  
*man. inf.* 2. app. p. 380.  
*Habitat in Cayenna, statura bicornis, at paulo minor.*
- retifor-34. *C. nigra* thorace bimaculato, elytris flavis nigro-reticula-  
mis. tis. *Fabr. man. inf.* 2. app. p. 379.  
*Habitat in Cayenna, statura tauri.*
- palliata.35. *C. nigra*, thorace villoso virescente, elytris viridibus  
margine lineaque media ferrugineis. *Fabr. man. inf.* 2.  
app. p. 370.  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- cuprea.36. *C. supra cuprea*, thoracis margine, elytrisque maculis dua-  
bus marginalibus rufis. *Fabr. man. inf.* 2. app. p. 379.  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- rubigino-37. *C. ferruginea*, thorace elytrisque fuscis, punctatis: mar-  
fa. ginibus externis ciliatis. *Mus. Lesh.* p. 12. n. 236.  
*Habitat in Europa.*

nitens. 38. *C. nigra*, thorace elytrisque griseis aureo nitentibus, pedibus lividis. *Mus. Lesk. p. 13. n. 237.*

*Habitat* - - -

superba. 39. *C. nigro*, elytris punctatis clypeoque viridi-aureis, antennis abdomine pedibusque viridibus. *Mus. Lesk. p. 13. n. 238.*

*Habitat in Europa, aureo nitore cum vita pereunte.*

sanguinolenta. 40. *C. aureo-flava*, elytrorum annulo ovali tuberculoque suturali sanguineis. *Swederus nov. act. Stockb. 8. 1787. 3. n. 3. 11.*

*Habitat in Rio Janeiro, subtus pallida, magnitudinis mediae.*

arcuata. 41. *C. albida*, disco communi nigro: limbo, annulo ovali arcuque posterius flavissimis. *Swederus nov. act. Stockb. 8. 1787. 3. n. 3. 12.*

*Habitat in Rio Janeiro, mediae magnitudinis, pectore et abdomine nigris.*

198. COCCINELLA. *Antennae clavatae: clava solida.*

*Palpi anteriores securiformes, posteriores filiformes.*

*Corpus hemisphaericum, thorace elytrisque marginatis, abdomine plano.*

\* *coleoptris rubris flavisve: punctis nigris maculatis.*

marginata. I. *C. coleoptris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.*

*Coccinella coleoptris rubris: margine nigro, thorace utrinque puncto marginali albo. Fabr. sp. inf. 1. p. 93. n. 1. mant. inf. 1. p. 53. n. 1.*

*Habitat in America, mediae magnitudinis, nigra.*

immaculata. 155. *C. coleoptris flavescentibus immaculatis, thoracis macula nigra: punctis duobus albis. Mus. Lesk. p. 11. n. 211.*

*Habitat in Suecia.*



- marginella. 6. *C. coleoptris* obscure testaceis: margine flavo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 53. n. 3.*  
*Habitat in America, magna.*
- limbata. 50. *C. atra*, coleoptrorum disco rubro: punctis duobus atris. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 497. mant. inf. 1. p. 53. n. 2.*  
*Habitat Hamburgi, mediae magnitudinis.*
- furina- 2. *C. coleoptris* rubris immaculatis, thorace, capiteque nigris. *Amoen. acad. 6. p. 393. n. 12.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 93- n. 2. mant. inf. 1. p. 53. n. 4.*  
*Habitat in America meridionali.*
- menfis.
- fanguinea. 3. *C. coleoptris* fanguineis immaculatis, thorace maculis nigris. *Amoen. acad. 6. p. 393. n. 11.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 93- n. 3. mant. inf. 1. p. 53. n. 5.*  
*Habitat in America meridionali, parva, subtus atra.*
- impunctata. 4. *C. coleoptris* rubris: puncto nullo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 93- n. 4. mant. inf. 1. p. 53. n. 6.*  
*Habitat in Sueciae hortis, minor.*
- livida. 51. *C. coleoptris* rubris impunctatis, scutello nigro, thorace maculis quinque nigris. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 42. n. 1. t. 22. f. 1. a.*  
*Habitat Berolini, supra ex luteo pallide fuscescens, subtus fusca.*
- Colon. 52. *C. coleoptris* rubris: puncto nigro, scutello maculaque thoracis obsolete nigris. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 42. n. 2. t. 22. f. 1. b.*  
*Habitat Berolini, magnitudine et colore ad lividum accedens.*
- fimbriata. 53. *C. elytris* flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine posteriori punctis quatuor nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 11. f. 10.*  
*Habitat - - - magnitudine quinquepunctatae.*
- minuta. 54. *C. elytris* rubris thoraceque immaculatis. *Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 11.*  
*Habitat in India, minima.*
- dimidiata. 55. *C. coleoptris* fanguineis apice atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 94- n. 5. mant. inf. 1. p. 53. n. 7.*  
*Habitat in Coromandel, magna.*

- albida. 56. *C. coleoptris flavis*: margine albedo; punctis utrinque duobus nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 53. n. 8.*  
*Schaller Abb. der hall. Naturf. Gef. I. p. 260. Coccinella*  
*margine punctata.*  
*Habitat Halae Saxonum, magna.*
- Lineola. 57. *C. elytris rubris*: lineola baseos apicisque nigra. *Fabr. sp. inf. I. p. 94. n. 6. mant. inf. I. p. 53. n. 9.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- unifasciata. 58. *C. coleoptris rubris*: fascia media atra. *Fabr. sp. inf. I. p. 94. n. 7. mant. inf. I. p. 53. n. 10.*  
*Habitat Hamburgi, punctis duobus capitis thoracisque margine albis varians.*
- annulata. 5. *C. coleoptris rubris*: macula sublunari nigra. *Fabr. sp. inf. I. p. 94. n. 8. mant. inf. I. p. 53. n. 11.*  
*Habitat in Germania, nigra, mediae magnitudinis. D. Schreber.*  
*Thorax marginibus lateralibus pallidus; elytra sanguinea; fascia media nigra, alteraque posteriore, exterius cum priore connexa.*
- trinotata. 59. *C. elytris rubris hirtis*: punctis tribus nigris, capite rubro. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 11. f. 11.*  
*Habitat ad caput bonae spei, congenerum minima.*
- trilineata. 60. *C. coleoptris flavis*: lineis tribus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 53. n. 12.*  
*Habitat in America, parva, atra.*
- sexlineata. 61. *C. coleoptris flavis*: lineis sex punctisque tribus nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 94. n. 9. mant. inf. I. p. 54. n. 15.*  
*Habitat in Sibiria, magna, nigra.*
- moscovi. 62. *C. coleoptris flavis*: lineis quatuor abbreviatis punctis sex atris. *Fabr. mant. I. p. 54. n. 13.*  
*Habitat in Russia magis australi, magna.*
- abbreviata. 63. *C. coleoptris rubris*: fascia posteriore abbreviata punctisque duobus nigris, thorace atro: lineis duabus albis. *Fabr. mant. inf. I. p. 54. n. 14.*  
*Habitat in America boreali, oblonga, atra. Blagden.*

- bipuncta- 7. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris duobus. *Fn. suec.* 471.\*  
 ra. *Scop. ent. carn.* 234. *Fabr. sp. inf.* I. p. 94. n. 10. *mant.*  
*inf.* I. p. 54. n. 16.  
*Petiv. gazoph.* 34. t. 21. f. 4.  
*Merian. inf.* 69. t. 136.  
*Raj. inf.* 86. n. 2.  
*List. loq.* 383. n. 8.  
*Bradl. natur.* t. 27. f. 4.  
*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 16.  
*Frisch inf.* 9. p. 33. t. 16. f. 4.  
*Sulz. inf. hist.* t. 3. f. 3.  
*Schaeff. ic.* t. 9. f. 9.  
*Stroem act. Nidros.* 3. t. 6. f. 2.  
*Degeer inf.* 5. p. 389. n. 2.  
*Habitat in Europae hortis et silvis frequens, vittans aphidibus.*
- tripuncta- 8. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris tribus. *Fn. suec.* 472.\*  
 ctata. *Fabr. mant.* I. p. 54. n. 17.  
*Habitat in Germania, statura septempunctatae.*
- quadri- 9. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris quatuor. *Fabr. sp. inf.* I.  
 punctata. p. 95. n. 16. *mant. inf.* I. p. 56. n. 28.  
*Habitat in Europa, mediae magnitudinis, subtus nigra.*  
*Thorax flavus: punctis quatuor nigris; pedes flavi.*
- hebraea. 10. *C. coleoptris luteis*: maculis luteis sex longitudinalibus dif-  
 formibus. *Fn. suec.* 473.\*  
*Habitat in Europa.*
- quadrino- 64. *C. coleoptris rubris*: punctis quatuor bascos nigris, tho-  
 tata. racis marginibus albidis. *Fabr. mant.* I. p. 56. n. 29.  
*Habitat Kilonii.*
- quadri- 65. *C. coleoptris rubris*: punctis quatuor nigris, thorace atro:  
 maculata. macula marginali alba. *Fabr. mant.* I. p. 56. n. 30.  
*Habitat Halae Saxonum, nigra.*
- quinque- 11. *C. coleoptris fanguineis*: punctis nigris quinque. *Fn.*  
 punctata. *suec.* 474.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 96. n. 17. *mant. inf.* I.  
 p. 56. n. 31.  
*Degeer inf.* 5. p. 370. n. 7.  
*Schaeff. ic.* t. 9. f. 8.  
*Merian. europ.* t. 69.  
*Habitat in Europae arboribus.*

- quinque- 66. *C. oblonga*, coleoptris flavescentibus: punctis nigris quinque, thorace atro: margine anteriore triradiato albo.  
*Fabr. mant. I. p. 56. n. 32.*  
*Habitat Halae Saxonum.*
- sexpunctata. 12. *C. coleoptris fulvis*: punctis nigris sex. *Fabr. sp. inf. I. p. 96. n. 18. mant. inf. I. p. 56. n. 33.*  
*Habitat in Europae hortis, parva, atra, thoracis margine punctisque duobus albis.*
- glacialis. 67. *C. coleoptris rubris*: punctis sex nigris; intermediis majoribus sinuatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 96. n. 19. mant. inf. I. p. 56. n. 34.*  
*Habitat in America boreali.*
- sexmaculata. 68. *C. coleoptris rubris*: punctis sex nigris: anterioribus quatuor transversis sinuatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 96. n. 20. mant. inf. I. p. 56. n. 35.*  
*Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 262. Coccinella (undulata) coleoptris rufis: fasciis binis interruptis undulatis nigris, postice puncto unico.*  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 7. p. 160. t. 43. f. 12.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis, pallide flavescens.*
- sexnotata. 69. *C. elytris flavis*: arcibus quatuor punctisque duobus nigris. *Thunb. nov. act. Uj. 4. p. 9. n. 15. t. 1. f. 2.*  
*Habitat in Succia, thorace flavo punctis 5 nigris contiguis variis, bipunctatae magnitudine.*
- trifasciata. 13. *C. coleoptris rubris*, fasciis nigris tribus. *Fn. suec. 475.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 95. n. 14. mant. inf. I. p. 55. n. 26.*  
*Raj. inf. p. 87. n. 9. Scarabaeus hemisphaericus minor &c.*  
*Habitat in Europae hortis.*
- bifasciata. 70. *C. coleoptris ferrugineis*: fasciis duabus punctisque quatuor nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 95. n. 15. mant. inf. I. p. 56. n. 27.*  
*Thunb. nov. inf. spec. I. f. 24. Coccinella flexuosa.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magna nigra, capite, thorace pedibusque ferrugineis.*

71. *C.*


---

*Species diversas conjunctas vidi, ut bipunctatam cum sexpunctata; species maculis interdum variant, unde incautus plures numerantur, nisi rationem thoracis habeas,*

- inaequa- 71. *C. coleoptris flavis*: punctis anterioribus tribus futura fasci-  
lis. ciaeque apicis nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 95. n. 13. mant. inf. I. p. 55. n. 25.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- eingulata. 72. *C. coleoptris luteis*: punctis quatuor baseos fascia posteriore  
punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 55. n. 24.*  
*Habitat Tranquebariae, magna, nigra, capite, thorace pedibusque flavis.*
- flexuosa. 73. *C. ovata, coleoptris luteis*: fascia flexuosa punctisque duobus  
nigris, thoracis margine albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 95. n. 12. mant. inf. I. p. 55. n. 23.*  
*Habitat Hamburgi.*
- undata. 74. *C. oblonga, coleoptris luteis*: fascia flexuosa punctisque  
duobus nigris, thorace flavo punctato. *Fabr. mant. inf. I. p. 55. n. 22.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magna, atra.*
- arcuata. 75. *C. ovata, coleoptris rubris*: punctis quatuor, fasciis duobus  
punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 55. n. 21.*  
*Habitat in Sina, mediae magnitudinis, nigra, capite albido.*
- tricincta. 76. *C. ovata, coleoptris rubris*: fasciis tribus atris; anteriore  
abbreviata tricuspudata. *Fabr. mant. inf. I. p. 55. n. 20.*  
*Habitat in Sina, mediae magnitudinis, nigra.*
- rivularis. 77. *C. coleoptris luteis*: fasciis duabus dorsalibus sinuatis punctisque  
sex nigris, thorace atro flavo-bipunctato. *Fabr. mant. inf. I. p. 54. n. 19.*  
*Habitat in Suecia, mediae magnitudinis.*
- hieroglyphica. 14. *C. coleoptris luteis*: maculis duabus nigris longitudinalibus  
sinuatis. *Fn. suec. 476.\* Fabr. sp. inf. I. p. 95. n. 11. mant. inf. I. p. 54. n. 18.*  
*Degeer inf. 4. p. 382. n. 15. Coccinella coleoptris flavo-rubris &c.*  
*Sulzer hist. inf. t. 3. f. 4.*  
*Habitat in Europae hortis, affinis decempustulatae.*
- septempunctata. 15. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris septem. *Fn. suec. 477.\* Scop. ent. carn. 235. Geoffr. inf. par. I. p. 321. t. 6. f. 1. Fabr. sp. inf. I. p. 96. n. 21. mant. inf. I. p. 57. n. 36.*  
*Ooooo 4* *Frisch*

- Frisch inf. 4. p. 1. t. 1. f. 4.*  
*Petiv. gaz. 33. t. 21. f. 3.*  
*Goed. inf. 2. p. 58. t. 18.*  
*Rij. inf. 86. n. 1.*  
*Merian. europ. 24. f. 11.*  
*Albin. inf. 61. f. C.*  
*Roef. inf. 2. scar. 3. p. 7. t. 2.*  
*Reaum. inf. 3. t. 31. f. 18.*  
*Bradl. nat. t. 27. f. 4.*  
*List. sc. angl. 382. n. 7.*  
*Ammir. inf. t. 14.*  
*Sulz. inf. t. 3. f. 13.*  
*Hollar t. 4. f. 8.*  
*Degeer inf. 5. p. 370. n. 4. t. 10. f. 14.*  
*Schaeff. ic. t. 9. f. 7.*  
*Habitat in Europae plantis frequens.*  
*Elytrorum puncta in triangulum posita.*

- septem- 78. *C. oblonga*, coleoptris rubris: punctis nigris septem;  
 maculata. communi trilobo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 97. n. 22. mant.*  
*inf. 1. p. 57. n. 37.*  
*Habitat in Germania.*  
*Thorax ater, margine albus.*
- octopun- 79. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris octo. *Fabr. sp. inf. 1.*  
 ctata. *p. 97. n. 23. mant. inf. 1. p. 57. n. 38.*  
*Habitat in Germania, an varietas sexpunctatae?*
- transver- 80. *C. coleoptris luteis*: maculis octo nigris; anterioribus qua-  
 falis. tuor transversis sinuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 97. n. 24.*  
*mant. inf. 1. p. 57. n. 39.*  
*Habitat in Coromandel, mediae magnitudinis, nigra.*
- octoma- 81. *C. coleoptris luteis*: punctis nigris octo; anterioribus sex  
 culata. transversis sinuatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 97. n. 25. mant.*  
*inf. 1. p. 57. n. 40.*  
*Habitat - - magna, nigra, capite et thorace luteis.*
- novem- 82. *C. coleoptris rubeis*: punctis novem nigris; posteriori com-  
 maculata. muni, thorace bipunctato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 97. n. 26.*  
*mant. inf. 1. p. 57. n. 41.*  
*Fabr. syst. ent. p. 81. n. 15. Coccinella novempunctata.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

16. C.

Coccinellarum larvae aphides consumunt, eoque plantas a phthiriasi hae purgant.

- novem- 16. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris novem. *Fn. succ.* 478.\*  
 punctata. *Scop. ent. carn.* 236. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 97. n. 27. *mant.*  
*inf.* 1. p. 57. n. 42.  
*Uddm. diff.* 14. *Coccinella nigra*, elytris rubris, punctis  
 novem nigris.  
*Fabr. syst. ent.* p. 81. n. 16. *Coccinella decempunctata.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 322. n. 4.  
*Degeer inf.* 5. p. 373. n. 6.
- β) *Coccinella coleoptris rufescentibus*: punctis 1. 2. 1. cum  
 puncto communi ad scutellum, thorace albido: macula  
 scutiformi nigra: punctis duobus albis, capite posterius  
 fascia nigra. *Mus. Lesk.* p. 10. n. 193.  
*Habitat in Europae hortis et juniperetis.*
- decem- 17. *C. coleoptris fulvis*: punctis nigris decem. *Fn. succ.* 479.\*  
 punctata. *Scop. ent. carn.* 237. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 98. n. 28. *mant.*  
*inf.* 1. p. 57. n. 43.  
*Degeer inf.* 5. p. 374. n. 7.
- β) *Coccinella coleoptris flavo rufescentibus*: punctis 1. 3. 1.  
 thorace maculis 4 punctisque interpositis 3 nigris. *Mus.*  
*Lesk.* p. 11. n. 195.  
*Habitat in Europae plantis. Thorax maculis quatuor.*
- decem- 83. *C. oblonga*, elytris fulvis: punctis nigris decem; duobus  
 maculata. communibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 98. n. 29. *mant. inf.* 1.  
 p. 57. n. 44.  
*Habitat in America boreali, atra, statura tredecimpun-*  
*ctatae.*
- dilatata. 84. *C. subrotunda*, coleoptris marginatis fulvis: punctis ni-  
 gris decem, thorace bipunctato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 98.  
 n. 30. *mant. inf.* 1. p. 57. n. 45.  
*Habitat in America.*
- 11 puncta- 18. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris undecim. *Fn. succ.*  
 480.\* *Ström act. nidr.* 3. p. 388. t. 6. f. 2. *Geoffr. inf.*  
*par.* 1. p. 325. n. 9. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 98. n. 31. *mant.*  
*inf.* 1. p. 57. n. 46.  
*Merian. europ.* 168.  
*Degeer inf.* 5. p. 375. n. 8.
- β) *C. thorace albo*: punctis quinque septemve nigris, coleop-  
 tris rubicundis; punctis 11, aliis 6, aliis 4 nigris. *Mus.*  
*Lesk.* p. 10. n. 181.

- 7) *C. coleoptris rubris*: punctis nigris undecim I. 3. I. una cum communi ad scutellum, thorace flavescente: guttis 5 nigris et utrinque punctulo nigro. *Mus. Lesk. p. II. n. 194.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- II maculata. 85. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris undecim, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inf. I. p. 57. n. 47. Schaeff. ic. t. 254. f. 3. a. 3. b?*  
*Habitat in Hispania, II punctata duplo major.*
- II punctata. 19. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris sex; extimo lineari repando. *Fabr. sp. inf. I. p. 98. n. 32. mant. inf. I. p. 57. n. 48.*  
*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 45. n. 13. t. 22. f. 8. h?*  
*Habitat in Europa, minuta, flava, subtus nigra.*
- variegata. 86. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris duodecim fasciaque media nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 99. n. 33. mant. inf. I. p. 57. n. 49.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis, flava.*
- chryso-melina. 87. *C. coleoptris rufis*: punctis nigris duodecim, thorace immaculato. *Fabr. sp. inf. I. p. 99. n. 34. mant. inf. I. p. 57. n. 50.*  
*Thunb. nov. sp. inf. I. p. 16. f. 21.*  
*Habitat in cacto opuntia Africae, et in Calabria, ovata, gibba, oculatae magnitudine.*
- borealis. 88. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris duodecim; duobus communibus, ultimis orbiculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 99. n. 35. mant. inf. I. p. 58. n. 51.*  
*Thunb. nov. inf. spec. I. p. 15. f. 20.* Coccinella elytris rufis: punctis duodecim nigris, thorace quadripunctato.  
*Habitat ad caput bonae spei, gibba, subtus lutea, ocellatae magnitudine.*
- cassidea. 89. *C. oblonga rubra, coleoptris punctis duodecim, thorace quatuor nigris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 99. n. 36. mant. inf. I. p. 58. n. 52.*  
*Habitat in America boreali.*
- III maculata. 90. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris tredecim, corpore orbiculato. *Fabr. sp. inf. I. p. 99. n. 37. mant. inf. I. p. 58. n. 53.*

Forster



*Forster nov. inf. sp. cent. 1. p. 18. n. 18.* Coccinella coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, thorace albo nigro-punctato.

*Habitat in Europa boreali.*

13notata. 91. C. elytris flavis; punctis nigris tredecim thorace luteo: punctis septem nigris. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 10. n. 16. t. 1. f. 4.*

*Habitat in Europa, bipunctatae magnitudine, flava, antennis rubris.*

13puncta. 20. C. coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, corpore oblongo. *Fn. suec. 481. Scop. ent. carn. 238. Geoffr. inf. par. 1. p. 323. n. 6. Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 38. mant. inf. 1. p. 58. n. 54.*

*Degeer inf. 5. p. 375. n. 9.*

*Reaumur inf. 3. t. 31. f. 79.*

*Schaeff. ic. t. 48. f. 6.*

β) Coccinella oblonga. *Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 43. n. 7. t. 22. f. 4. d.*

*Habitat in Europa frequens.*

urficolor. 92. C. coleoptris flavis: punctis quatuordecim nigris; duobus communibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 58. n. 55.*

*Habitat in Sina, orbiculata, gigantea, flava, olivacea aut nigra.*

14puncta. 21. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim; quibusdam contiguis. *Fn. suec. 482. Fabr. sp. inf. 1. p. 99. n. 39. mant. inf. 1. p. 58. n. 56.*

*Scop. ent. carn. 243. Coccinella tessulata.*

*Schaeff. ic. t. 62. f. 6.*

*Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. t. 22. f. 5. c.*

*Habitat in Europae hortis, frequens.*

14maculata. 93. C. coleoptris luteis: futura punctisque quatuordecim nigris distinctis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 58. n. 57.*

*Habitat Halae Saxonum, 14punctata major, thorace nigropunctato et capite albis.*

16puncta. 22. C. coleoptris flavis: punctis nigris sedecim. *Fn. suec. 483.\* Scop. ent. carn. 240. Fabr. sp. inf. 1. p. 100. n. 41. mant. inf. 1. p. 58. n. 59. Herbst apud Fueßli Arch. Inf. 4. p. 44. n. 11. t. 22. f. 6. f.*

*Habitat*

- Habitat in Italia, et Germania major, oblonga, albida, capite quadripunctato.*
- 16maculata. 94. *C. coleoptris rubris: punctis nigris sedecim, capite immaculato.* *Fabr. mant. inf. I. p. 58. n. 60.*  
*Habitat Halae Saxonum, majuscula, oblonga.*
- oculata. 95. *C. elytris rubris: punctis novem nigris, circulo flavo circum oculos.* *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 14. f. 18.*  
*Habitat ad caput bonae spei, atra, magnitudine septempunctatae.*
- ocellata. 23. *C. coleoptris luteis: punctis nigris quindecim subocellatis.* *Fn. suec. 484.\* Fabr. sp. inf. I. p. 100. n. 40. mant. inf. I. p. 58. n. 58.*  
*Gadd sat. 26. Coccinella elytris flavo-luteis, punctis quindecim nigris oculo flavo cinctis.*  
*Degeer inf. 5. p. 376. n. 10. t. II. f. I.*  
*Merian. inf. eur. 48. f. 5.*  
*Sulz. inf. t. 13. f. 14.*  
*Schaeff. ic. t. 1. f. 2.*  
*elem. t. 47. f. I.*  
*Habitat in Europae hortis, congeneribus plurimis major.*
- 18punctata. 24. *C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim, ultimo arcuato.* *Fabr. sp. inf. I. p. 100. n. 42. mant. inf. I. p. 59. n. 61. Mus. Lesk. p. 10. n. 184.*  
*Coccinella gemella. Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 44. n. 12. t. 22. f. 7. g.*  
*Habitat in Europa boreali, thoracis lateribus flavis.*
- 19punctata. 25. *C. coleoptris flavis: punctis nigris novendecim.* *Fn. suec. 485. Geoffr. inf. par. I. p. 325. n. 10. Fabr. sp. inf. I. p. 100. n. 43. mant. inf. I. p. 59. n. 62.*  
*Müll. prodr. zool. dan. p. 67. n. 632. Coccinella lutea &c.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. p. 45. n. 14. t. 22. f. 9. I.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- 20punctata. 96. *C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti.* *Geoffr. inf. par. I. p. 329. n. 17. Scop. ent. carn. 242. Fabr. sp. inf. I. p. 100. n. 44. mant. inf. I. p. 59. n. 63.*  
*Herbst apud Fuesli Arch. Inf. 4. par. t. 22. f. 10. k.*  
*Habitat rarior in Europa.*

- 22puncta-26. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris viginti duobus. *Fn.*  
*ta. succ. 486. Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 45. mant. inf. 1. p. 59. n. 64.*  
*Degeer inf. 5. p. 379. n. 12.*  
*Raj. inf. p. 87. n. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 30. f. 10.*  
*Habitat in Europae hortis, parva.*
- 23puncta-27. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris viginti tribus distinctis.  
*ta. Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 46. mant. inf. 1. p. 59. n. 65.*  
*Habitat in Europae plantis, parva, rubra, subtus rufa.*
- 24puncta-28. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris viginti quatuor. *Fn.*  
*ta. succ. 487. Geoffr. inf. par. 1. p. 326. n. 11. Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 47. mant. inf. 1. p. 59. n. 66. Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 45. n. 16. t. 22. f. 11. 1.*  
*Degeer inf. 5. p. 381. n. 14. Coccinella coleoptris rufifuscis &c.*  
*Habitat in Europae hortis.*
- 25puncta-29. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris viginti quinque. *Fn.*  
*ta. succ. 488.*  
*Habitat in Europa.*  
*Puncta quadrata, passim ovalita.*
- 28puncta-97. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris viginti octo. *Fabr.*  
*ta. sp. inf. 1. p. 101. n. 48. mant. inf. 1. p. 59. n. 67.*  
*Habitat Tranquebariac.*
- congl- 30. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris plurimis subcontiguis.  
 bata. *Fn. succ. 489.\**  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 326. n. 12.*  
*Degeer inf. 5. p. 378. n. 11. Coccinella rosea.*  
*Frisch inf. 9. p. 34. t. 17. f. 6.*  
*Habitat in Europa, an mera conglomeratae varietas?*
- congl- 31. *C. coleoptris flavescens*: punctis nigris plurimis con-  
 merata. *tiguis. Fn. succ. 490.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 101. n. 49.*  
*mant. inf. 1. p. 59. n. 68.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 316. n. 12.*  
*Degeer inf. 5. p. 383. n. 17.*  
*Raj. inf. p. 87. t. 5.*  
*List. loq. p. 383. n. 9.*  
*Frisch inf. 9. 34. t. 17. f. 4. 5.*  
*Schaeff. ic. t. 171. f. 1. a. b.*

Herbst

*Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. t. 22. f. 14. 15?*

*Habitat in Europae hortis frequens.*

- tricolor. 98. *C. coleoptris flavis: punctis decem rubris, maculisque decem atris marginalibus. Fabr. mant. inf. 1. p. 59. n. 69. Habitat in insula Amsterdam maris australis.*
- detrita. 99. *C. flava, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. Fabr. sp. inf. 1. p. 102. n. 50. mant. inf. 1. p. 59. n. 70. Habitat in nova Hollandia.*
- japonica. 100. *C. elytris flavis, cruce futurae duplici maculisque quatuor nigris. Thunb. nov. inf. spec. 1. p. 12. f. 12. Habitat in Japonia, magnitudine hieroglyphicae.*
- grandis. 101. *C. elytris flavis: punctis nigris tredecim thorace nigro: marginibus flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 12. f. 13. Habitat in Sina, coccinellarum maxima.*
- gibba. 102. *C. elytris rubris, fascia punctisque sex nigris. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 13. f. 14. Habitat ad caput bonae spei, tenuissime hirta, rubra, pectore nigro, magnitudine septempunctatae.*
- capensis. 103. *C. elytris rubris: punctis octo nigris, thorace immaculato. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 13. f. 15. Habitat ad caput bonae spei, rubra, magnitudine septempunctatae.*
- Pfl. 104. *C. elytris flavis: margine exteriori maculis quatuor nigris. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 13. f. 16. Habitat ad caput bonae spei, magnitudine fere septempunctatae, flavicans, pectore nigro.*
- iridea. 105. *C. elytris rubris: punctis novem nigris ocellaribus. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 14. f. 17. Habitat ad caput bonae spei, glabra, rubra, magnitudine fere septempunctatae.*
- similis. 106. *C. elytris rubris: fasciis duabus punctisque quatuor nigris. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 15. f. 19. Habitat - - magnitudine septempunctatae, supra pilis brevissimis cinereis hirta, subtus nigra.*
- pufilla. 107. *C. elytris flavis: punctis octo nigris quadrifariis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 16. f. 22. Habitat - - - flavescens, glabra, pulice vix major.*

108. *C.*

- distincta. 108. *C. elytris rubris*: punctis sedecim nigris distinctis. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 17. f. 23.*  
*Habitat ad caput bonae spei, nigra, supra pilis minimis cinereis adpersa, quinquepunctatae magnitudine.*
- repanda. 109. *C. elytris flavis*: fasciis tribus undatis nigris. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 18. f. 25.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glabra, nigra, septempunctatae magnitudine.*
- flavicol- 110. *C. elytris fanguineis*: punctis decem nigris, thorace flavo.  
 lis. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 18. f. 26.*  
*Habitat ad caput bonae spei, flavicans, pilis tenuissimis hirta, septempunctatae magnitudine.*
- undulata. 111. *C. elytris rubris*: fasciis undatis dentatisque variis nigris.  
*Thunb. nov. inf. sp. I. p. 18. f. 27.*  
*Habitat ad caput bonae spei, septempunctatae magnitudine, supra pilis brevissimis cinereis hirsuta flavescens, subtus nigra.*
- lunaris. 112. *C. elytris flavis*: fasciis duabus, arcu punctisque quinque nigris. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 19. f. 28.*  
*Habitat ad caput bonae spei, septempunctatae fere magnitudine, glabra, nigra.*
- Crux. 113. *C. elytris flavis*: lineis duabus cruceque nigris. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 20. f. 29.*  
*Habitat ad caput bonae spei, subtus nigra.*
- Comma. 114. *C. elytris flavis*: futura, margine lineaque nigris. *Thunb. nov. sp. inf. I. p. 20. f. 30.*  
*Habitat ad caput bonae spei, quinquepunctatae magnitudine, supra flava.*
- lineata. 115. *C. elytris rubris*: margine omni maculisque duabus oblongis nigris. *Thunb. nov. sp. inf. I. p. 21. f. 31.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glabra, quinquepunctatae magnitudine, flava, abdomine femoribusque nigris.*
- oclogut- 116. *C. elytris rubris*: maculis octo flavis. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 24. f. 37.*  
 tata. *Habitat in Japonia, ocellata paulo major, glabra, rubra.*

- variabilis. 117. *C. elytris rubris*: maculis undecim nigris, thoracis quatuor cordatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 42. n. 6. t. 22. f. 3. c.*  
*Habitat* Berolini, *bipunctata paulo major, magis oblonga, macularum punctorumque numero varians.*
- centum-punctata. 118. *C. elytris fulvis*: punctis nigris plurimis; multis confluentibus. *Herbst apud Fuessli Arch. inf. 4. p. 45. n. 17. t. 22. f. 13.*  
*Habitat in India, septem lineas longa.*
- quadri-lineata. 119. *C. elytris flavis*: lineis tribus longitudinalibus transverseque maculisque duabus confluentibus nigris. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 46. n. 18. t. 22. f. 12. m.*  
*Habitat - - - oblonga, nigra.*
- sparsa. 120. *C. elytris spadiceis*: punctis viginti quatuor nigris. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 7. p. 160. n. 37. t. 43. f. 11.*  
*Habitat in India, septempunctatae magnitudine, pilis albicantibus hirsuta, spadicea.*
- Punctur. 121. *C. elytris fulvis immaculatis*, thoracis macula media angulosa nigra. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 7. p. 161. n. 40. t. 43. f. 14. g. h.*  
*Habitat - - - 1½ lineas longa, capite nigro, thorace fulvo.*  
 \*\* *coleoptris rubris flavisve, albo-maculatis.*
- bimaculosa. 122. *C. elytris fulvis*: lituris duabus obsoletis albis semilunariibus. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 7. p. 160. n. 39. t. 43. f. 13. c. f.*
- punctato-guttata. 32. *C. coleoptris rubris*: punctis albis quatuordecim, nigris tribus. *Fn. suec. 491.\**  
*Habitat in Europa, an solo sexu a decempustulata distincta?*
- biguttata. 123. *C. coleoptris rufis*: punctis duobus flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 59. n. 72.*  
*Habitat - - - parva, thorace glabro atro, margine laterali flavo.*
- camtschatcensis. 124. *C. coleoptris obscure rufis*: punctis octo albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 59. n. 71.*  
*Habitat in Camtschatca, mediae magnitudinis, atra.*

- 10gutta- 33. *C. coleoptris luteis*: punctis albis decem. *Fabr. sp. inf. 1.*  
 ra. p. 102. n. 51. *mant. inf. 1. p. 60. n. 73.* *Herbst apud Fue-*  
*ssli Arch. Inf. 4. p. 47. n. 20. t. 22. f. 16. p. 8.*  
 β) *Coccinella 10guttata minor*, *coleoptris rubris*, puncto an-  
 teriori marginali lunato. *Schaller Abb. der hall. Naturf.*  
*Gef. 1. p. 263.*  
*Habitat in Sueciae hortis, minor.* Fabricius.
- 12gutta- 125. *C. coleoptris ex luteo fuscis*: punctis albis 12. *Herbst*  
 ra. *apud Fueßli Arch. inf. 4. p. 47. n. 26. t. 22. f. 10. v.*  
 β) *Schranck enum. inf. Austr. p. 61. n. 111.*  
 γ) *C. coleoptris flavo rufescentibus*: guttis sex albis 1. 2. 2. 1.  
*Mus. Lesk. p. 11. n. 210.*  
*Habitat - - -*
- bisep- 126. *C. coleoptris luteis*: punctis quatuordecim albis. *Schal-*  
 temgutta- *ler Abb. der hall. Naturf. Gef. 1. p. 265.*  
 ra. *Habitat - - - citrea, 16guttatae statura et magnitudine.*
- 14gutta- 34. *C. coleoptris rufis*: punctis quatuordecim albis. *Fn. suec.*  
 ra. 492.\* *Geoffr. inf. par. 1. p. 327. n. 13. Scop. ent. carn.*  
 248. *Fabr. sp. inf. 1. p. 102. n. 52. mant. inf. 1. p. 60.*  
 n. 74.  
*Raj. inf. p. 86. n. 3.*  
*List. loq. 383. n. 10.*  
*Degeer inf. 5. p. 385. n. 20.*  
*Schaeff. ic. t. 9. f. 11.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 47. n. 21. t. 22. f. 17. r.*  
*Habitat in Europae salicibus, ex testaceo lutea, capite nigro.*
- cayen- 156. *C. coleoptris fulvis*: punctis duodecim lunulisque utrin-  
 nenfis. que duabus connatis albis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*  
*Habitat in Cayenna, rufa, mediae magnitudinis.*
- 15gutta- 127. *C. coleoptris luteis*: punctis quindecim albis; communi  
 ra. medio obsoleto. *Fabr. sp. inf. 1. p. 102. n. 53. mant.*  
*inf. 1. p. 60. n. 75.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 327. n. 14.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 47. n. 22. t. 22. f. 18. f.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- 16gutta- 35. *C. coleoptris luteis*: punctis albis sedecim. *Fn. suec. 493.*  
 ra. *Scop. ent. carn. 249. Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 54. mant.*  
*inf. 1. p. 60. n. 76.*  
*Degeer inf. 5. p. 385. n. 21.*

P P P P P

Sulz.

- Sulz. hist. inf. t. 3. f. 5.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. p. 161. n. 42. t. 43. f. 16. l. m.*  
*Habitat in Europa.*
- 18gutta- 36. *C. coleoptris rubris: punctis albis octodecim. Fn. suec.*  
 ta. 494. *Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 55. mant. inf. 1. p. 60.*  
*n. 77. Scop. ent. carn. 241.*  
*Schaeff. ic. t. 9. f. 12.*
- β) *Coccinella ornata. Herbst apud Fueßli arch. inf. 4 p. 47.*  
*n. 23. t. 22. f. 19. t.*
- 20gutta- 37. *C. coleoptris rubris: punctis albis viginti. Fn. suec. 495.*  
 ta. *Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 56. mant. inf. 1. p. 60. n. 78.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 47. n. 24. t. 22. f. 20. u.*
- oblongo- 38. *C. coleoptris rubris: lineis punctisque albis. Fn. suec. 496.*  
 guttata. *Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 56. mant. inf. 1. p. 60. u. 79.*  
*Scop. ent. carn. 242.*  
*Degeer inf. 5. p. 384. n. 19.*  
*Schaeff. ic. t. 9. f. 10.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 9. f. 6.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 14.*  
*Habitat ravior in Europae hortis.*
- oblitera- 39. *C. coleoptris flavis: punctis quatuor rufis; anterioribus*  
 ta. *obfoletis. Fn. suec. 497.\**  
*Habitat in Europa.*
- pallida. 128. *C. elytris flavis: lineis quatuor fuscis. Thunb. nov. act.*  
*Upsf. 4. p. 9. n. 14. t. 1. f. 1.*  
*Habitat Upsaliae, flava, bipunctatae magnitudine.*
- \*\*\* *Coleoptris nigris: rubro maculatis.*
- impustu- 40. *C. coleoptris nigris: puncto nullo. Fabr. sp. inf. 1. p. 103.*  
 lata. *n. 58. mant. inf. 1. p. 60. n. 80.*  
*Habitat in Germaniae nemoribus, statura quadripustulatae,*  
*tota atra, thoracis lateribus flavis: puncto nigro.*
- analis. 129. *C. coleoptris atris apice rubris immaculatis. Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 60. n. 81.*  
*Habitat Halae Saxonum, haemorrhoidali affinis, at duplo*  
*minor.*
- haemor- 130. *C. coleoptris atris apice rubris: fascia nigra. Fabr. sp.*  
 rhoidalis. *inf. 1. p. 104. n. 59. mant. inf. 1. p. 60. n. 82.*  
*Habitat*



*Habitat Hamburgi, frequenter puncto sanguineo communi in dorso notata.*

flavipes. 131. *C. elytris nigris, thorace nigro: maculis duabus flavis.*

*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 21.*

*Habitat ad caput bonae spei, bipustulatae magnitudine, impustulatae affinis, at punctum nigrum nullum ad latera thoracis.*

Cacti. 41. *C. coleoptris atris: maculis duabus rubris.† Fabr. sp. inf.*

*1. p. 104. n. 60. mant. inf. 1. p. 60. n. 83.*

*Gron. zooph. 609. Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula solitaria subrotunda utrinque.*

*Merian. surin. p. 2. t. 2. f. summa.*

*Pet. gaz. t. 1. f. 5.*

*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 31-33. et t. 9. f. 13.*

*Habitat in Americae cactis, saepius inter coccus cacti lecta, bipustulatae similis.*

bipustulata. 42. *C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus, abdomine sanguineo. Fn. suec. 498.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 104. n. 61.*

*mant. 1. p. 60. n. 84. Laichart. inf. tir. 1. p. 134.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 334. n. 26.*

*Degeer inf. 5. p. 387. n. 27. t. 10. f. 25.*

*Frijch inf. 9. p. 34. t. 16. f. 6.*

*Roef. inf. 2. scar. 3. p. 10. t. 3.*

β) *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 48. n. 27. t. 22. f. 22. w.*

*Habitat in Europae hortis frequens, etiam in America septentrionali.*

*Elytrorum singula puncta e tribus conflata.*

mutabilis. 132. *C. coleoptris nigris, punctis duobus rubris orbiculatis submarginalibus, corpore oblongo. Fabr. sp. inf. 1. p. 104. n. 62. mant. inf. 1. p. 60. n. 85.*

*Habitat Hamburgi.*

*Elytra junioribus lutescentia; puncto flavescente.*

frontalis. 133. *C. coleoptris nigris: punctis duobus rubris, fronte pedibusque anterioribus rubris. Fabr. mant. inf. 1. p. 60. n. 86.*

*Habitat Halae Saxonum, capite interdum nigro, punctisque elytrorum quatuor.*

- tripustulata. 157. *C. coleoptris* nigris: basi macula magna lutea, medio pustulis duabus apiceque unica rubra. *Lesk. mus. p. 12. n. 215.*  
*Habitat in Europa.*
- lunulata. 158. *C. coleoptris* nigris margine reflexis: puncto medio bascosque lunula media rubris. *Mus. Lesk. p. 12. n. 317.*  
*Habitat - - -*
- limbata. 159. *C. coleoptris* nigris: lunula ad marginem bascos exteriorum rubra thorace nigro: margine albo. *Mus. Lesk. p. 12. n. 219.*
- leucocephala. 160. *C. nigra*, thorace antierius, capite, punctisque elytrorum septem albis. *Mus. Lesk. p. 12. n. 223.*  
*Habitat - - - macula capitis trigona nigra, punctis elytrorum tribus ad marginem externum positis margine connexis.*
- nigra. 161. *C. nigra*, elytris singulis posterius gutta rubra notatis. *Mus. Lesk. p. 12. n. 224.*
- ruficauda. 162. *C. rubra*, elytris nigris apice rubris. *Mus. Lesk. p. 12. n. 225.*  
*Habitat in Europa.*
- bifasciata. 163. *C. nigra*, thoracis margine externo elytrisque flavis: fascia media longitudinali et communi suturae nigrae. *Mus. Lesk. p. 12. n. 226.*  
*Habitat in America.*
- quadripustulata. 43. *C. coleoptris* nigris: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. *Fn. suec. 449.\* Scop. ent. carn. 244. Fabr. sp. inf. 1. p. 104. n. 63. mant. inf. 1. p. 61. n. 87. Geoffr. inf. par. 1. p. 333. n. 25. Degeer inf. 5. p. 389. n. 24. Bergstr. nomencl. 1. t. 9. f. 5. Schaeff. ic. t. 30. f. 16. 17.*  
*Habitat in Europae hortis, aliquando cum bipunctata copula conjuncta.*
- erythrocephala. 134. *C. coleoptris* atris: punctis rubris sex, capite thoracisque margine pallide rufescentibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 61. n. 88. Mus. Lesk. p. 12. n. 220.*  
*Habitat Kilonii, sexpustulata minor, capite et abdomine rubris.*

- sempustulata. 44. *C. coleoptris nigris*: punctis rubris sex. *Fn. suec.* 500.\*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 331. n. 20. *Scop. ent. carn.* 245.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 105. n. 64. *mant. inf.* 1. p. 61. n. 89.  
*Degeer inf.* 5. p. 390. n. 25.  
*Roj. inf.* p. 87. n. 4.  
*Schaeff. ic. t.* 30. f. 12.  
 β) *Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 6.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 9. f. 4.  
*Habitat in Europae hortis, rarius varians puncto adhuc minutissimo ad futuram rubro.*
- lunata. 135. *C. coleoptris nigris*: maculis decem rubris, sex lunatis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 105. n. 65. *mant. inf.* 1. p. 61. n. 90.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 22. f. 33. *Coccinella rivoia.*  
*Habitat in insula S. Helenae et ad caput bonae spei, gibba, glabra, ocellatae magnitudine.*
- hirta. 136. *C. elytris nigris*: maculis duodecim rubris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. p. 23. f. 35.  
*Habitat ad caput bonae spei, ocellatae magnitudine, atra, pilis cinereis hirta.*
- Reppen-  
 fis. 137. *C. oblonga elytris nigris*: maculis fulvis orbicularibus duabus. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 48. n. 28. t. 22. f. 23. x.  
*Habitat in Marchia, nigra.*
- campe-  
 tris. 138. *C. subrotunda, elytris nigris*: maculis duabus orbicularibus fulvis, pedibus anterioribus fulvis. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 48. n. 29. t. 22. f. 24. y.  
*Habitat in Marchia.*
- fasciata. 139. *C. elytris nigris*: fascia transversa maculis quatuor fulvis conflata. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 49. n. 30. t. 22. f. 25. z.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 334. n. 26.  
*Habitat in Gallia et Germania.*
- decem-  
 pustulata 45. *C. coleoptris nigris*: punctis fulvis decem. *Fn. suec.* 501.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 105. n. 66. *mant. inf.* 1. p. 61. n. 91.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 330. n. 19.  
*Degeer inf.* 5. p. 391. n. 26.  
*Schaeff. ic. t.* 30. f. 10. et t. 171. f. 2.  
*List. loq.* 383. n. 9.

*Frisch inf. 9. t. 17. f. 4. 5.*

*Raj. inf. 87. n. 15.*

*Habitat in Europae hortis, varians elytrorum punctis flavis et rubris.*

russica. 140. *C. elytris nigris: punctis duodecim fulvis. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 49. t. 22. f. 26.*  
*Habitat in Russia, septempunctatae magnitudine.*

16pustulata. 47. *C. coleoptris nigris: punctis fulvis sedecim. Fn. suec. 503.*  
*Habitat in Europa.*

20pustulata. 141. *C. elytris nigris: punctis fulvis viginti. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 24. f. 36.*  
*Habitat ad caput bonae spei, septempunctatae magnitudine, gibba, nigra, tenuissime hirta.*

guttato-pustulata. 142. *C. coleoptris nigris: punctis duobus flavis quatuorque rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 106. n. 69. mant. inf. 1. p. 61. n. 94.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

\*\*\*\* *Coleoptris nigris, albo flavoque maculatis.*

atra. 143. *C. elytris nigris: maculis duabus flavis, thoracis marginibus anoque flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 21.*  
*Habitat - - - bipustulata minor, valde gibba, glaberrima.*

laevis. 144. *C. elytris nigris: punctis sex flavis, thoracis angulis anterioribus flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 22. f. 32.*  
*Habitat - - - glabra, nigra, capite pedibusque flavis, bipustulatae magnitudine.*

dentata. 145. *C. elytris nigris: margine exteriori linea tridentata punctisque sex flavis. Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 23. f. 34.*  
*Habitat ad caput bonae spei, 14punctatae magnitudine, nigra, capite, thoracis et abdominis margine pedibusque flavis.*

pantherina. 48. *C. coleoptris nigris: punctis flavis octo. Fn. suec. 504.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 106. n. 71. mant. inf. 1. p. 61. n. 96.*  
*Degeer inf. 5. p. 392. n. 28.*  
*Habitat in Europa boreali.*

- humeralis. 146. *C. coleoptris nigris*: punctis flavis octo: anterioribus duobus uncinatis. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 266.*  
*Habitat Halæ Saxonum, flavicans, ad 14pustulatam accedens.*
- 14pustulata. 46. *C. coleoptris nigris*: punctis flavis quatuordecim. *Fn. suec. 502.\* Geoffr. inf. par. I. p. 330. n. 18. Scop. ent. carn. 246. Fabr. sp. inf. I. p. 106. n. 68. mant. inf. I. p. 61. n. 93.*  
*Uddm. diss. 15. Coccinella coleoptris nigris: maculis decem pallide flavis.*  
*Pod. inf. 26. Coccinella 14maculata.*  
*Degeer inf. 5. p. 391. n. 27.*  
*Schæff. ic. t. 30. f. 10.*  
*Habitat in Europæ floribus.*
- tigrina. 49. *C. coleoptris nigris*: punctis albidis viginti. *Fn. suec. 505.\* Uddm. diss. II. Fabr. sp. inf. I. p. 107. n. 74. mant. inf. I. p. 61. n. 100.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 49. n. 36. t. 22. f. 27.*  
*Schæff. ic. t. 30. f. 9.*  
*Habitat in Europa boreali, an varietas 20guttatæ?*
- felina. 147. *C. coleoptris atris*: punctis sex albis, corpore globoso. *Fabr. sp. inf. I. p. 106. n. 70. mant. inf. I. p. 61. n. 95.*  
*Habitat in America boreali.*
- pardelina. 148. *C. coleoptris nigris*: punctis decem margineque sinuato albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 106. n. 72. mant. inf. I. p. 61. n. 97.*  
*Habitat - - - magna, atra.*
- urquina. 149. *C. coleoptris atris*: punctis decem albis, capite thoracisque margine anteriore albis. *Fabr. mant. inf. I. p. 61. n. 98.*  
*Habitat in America boreali, parva, nitida, atra, capite pedibusque albis.*
- 12pustulata. 150. *C. coleoptris nigris*: punctis duodecim albis; exterioribus margine connexis. *Fabr. sp. inf. I. p. 106. n. 67. mant. inf. I. p. 61. n. 92.*  
*Habitat Hamburgi.*
- leonina. 151. *C. coleoptris nigris*: punctis albis sedecim. *Fabr. sp. inf. I. p. 106. n. 73. mant. inf. I. p. 61. n. 99.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

- canina. 152. *C. coleoptris* nigris: punctis albis viginti, capite thoraceque villosis immaculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 107. n. 75. mant. inf. 1. p. 62. n. 101.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magna, nigra.*
- Thunbergii. 153. *C. elytris* nigris: margine punctisque duobus albis, capite nigro: punctis albis. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 10. n. 17.*  
*Habitat Upsaliae, bipustulatae magnitudine, nigra.*
- villosa. 154. *C. villosa* nigra, elytrorum marginibus flavis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*  
*Habitat in Cayenna, magna.*

ALURNUS. *Antennae* filiformes.*Palpi* sex brevissimi.*Maxilla* cornea, fornicata.

- grossus. 1. *A. ater*, thorace coccineo, elytris flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 115. n. 1. mant. inf. 1. p. 66. n. 1.*  
*Habitat in America australi et India.*
- femoratus. 2. *A. viridi-aeneus*, femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 115. n. 2. mant. inf. 1. p. 66. n. 2. Drury inf. 2. t. 34. f. 5. Tenebrio femoratus. Sulz. hist. inf. t. 7. f. 8. Tenebrio viridis.*  
*Habitat in India, magnus, laevis, nitidus, antennis corpore dimidio brevioribus: articulis ultimis nigris.*
- dentipes. 3. *A. niger*, femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 66. n. 3.*  
*Habitat ad caput bonae spei, laevis, immaculatus, femorato affinis.*

199. CHRYSOMELA. *Antennae moniliformes.*  
*Palpi sex extrorsum cras-*  
*fiores.*  
*Thorax, nec elytra, margi-*  
*natus.*  
*Corpus (plerisque) ovatum.*

\* *femoribus posterioribus aequalibus.*

- tenebrioi-  
des. 1. Chr. aptera atra, antennis pedibusque violaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 1. mant. inf. 1. p. 66. n. 1. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. t. 23. f. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 29. Tenebrio (laevigatus) apterus niger laevis, elytris laevibus, thorace lunato, subtus caeruleus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 295. n. 19. Chrysomela atro-purpurea &c.*  
*Habitat in Europa magis australi.*  
*Larva gibba, violacea, ano rufo, polyphaga, plantis vittata.*
- Morio. 2. Chr. atra, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 66. n. 2.*  
*Habitat in terra van Diemen, tenebrioide paulo minor.*
- goettin-  
genlis. 4. Chr. atra, pedibus violaceis. *Fn. Juec. 506.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 2. mant. inf. 1. p. 67. n. 3.*  
*Degeer inf. 5. p. 298. n. 8. Chrysomela violaceo-nigra &c.*  
*Laichart. inf. tyr. 1. p. 143. n. 2. Chrysomela coriaria.*  
*Habitat in Europa.*
- vittata. 3. Chr. cyanea, elytris margine vittaque media flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 3. mant. inf. 1. p. 67. n. 4.*  
*Habitat in America, magna, crassa.*
- bicolor. 72. Chr. viridi-aenea, subtus violacea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 4. mant. inf. 1. p. 63. n. 5.*  
*Foršk. Fn. ar. p. 77. n. 2. Chrysomela viridi-aenea.*  
*Habitat Alexandriae.*  
*Elytra punctato-siriata.*

- affinis. 73. Chr. obscure aenea, subtus violacea, elytris laevibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 67. n. 6.*  
*Habitat sub lapidibus Barbariae, bicolori affinis, at duplo minor.*
- Lusitanica. 74. Chr. thorace cupreo, elytris aeneis: punctis impressis caeruleis, subtus violacea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 116. n. 5. mant. inf. 1. p. 67. n. 7.*  
*Habitat in Lusitania, major Chr. Banksii.*
- ferruginea. 75. Chr. ferruginea, subtus nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 117. n. 6. mant. inf. 1. p. 67. n. 8.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magna.*
- Banksii. 76. Chr. supra aenea, subtus testacea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 117. n. 7. mant. inf. p. 67. n. 9.*  
*Habitat in Lusitania et Calabria.*
- Sophiae. 77. Chr. caerulea, tibiis plantisque flavis. *Fabr. mant. 1. p. 73. n. 86.*  
*Schaller Abb. der ball. Naturf. Gef. 1. p. 272. Chrysomela ovata viridis, elytris postice acuminatis, tibiis plantisque ferrugineis.*  
*Habitat Halae Saxonum in Sisymbrio Sophia, laevis, glabra, statura et magnitudine chr. ermoraciae.*
- pallipes. 78. Chr. nigra, elytris pedibusque pallidibus. *Fabr. mant. 1. p. 73. n. 215.*  
*Habitat Kilonii, parva.*
- bimaculata. 79. Chr. oblonga atra, elytris testaceis: macula atra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 127. n. 67. mant. inf. 1. p. 73. n. 87.*  
*Habitat in America.*
- fasciata. 80. Chr. oblonga atra, elytris fasciis tribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 68. mant. inf. 1. p. 73. n. 88.*  
*Habitat in America.*
- ruficollis. 81. Chr. oblonga viridi-aenea, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 69. mant. inf. 1. p. 72. n. 89.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. p. 162. n. 61. t. 45. f. 3. Geoffr. inf. par. 1. p. 263. n. 16. Chrysomela nigra &c.*  
*Habitat in Europa magis australi, etiam Germania.*
82. Chr.

---

Chrysomelarum et cryptocephalorum larvae consumunt folia, reliquis eorum raris, pulpa contentae.



- flavicornis. 82. Chr. oblonga punctata viridi-aenea, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 73. n. 90.*  
*Habitat in Cayenna, minor.*
- crenata. 83. Chr. oblonga subtus aenea, supra cuprea, antennis flavis: articulo quinto et ultimo fulcis. *Fabr. mant. 1. p. 73. n. 91.*  
*Habitat in Cayenna, flavicorni major.*
- littoralis. 84. Chr. oblonga atra, elytris porcatis. *Fabr. mant. 1. p. 74. n. 92.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 252. n. 1. t. 4. f. 6.* Galleraca atrofusca, lineis tribus elevatis punctis numerosis.  
*Habitat ad Europae australis littora, statura chr. tanaceti, at major.*
- cayennensis. 85. Chr. oblonga atra, capite, thorace, femoribusque quatuor anterioribus obscure rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 74. n. 93.*  
*Habitat in Cayenna, statura chr. tanaceti, at paulo major.*
- tanaceti. 5. Chr. atra punctata, antennis pedibusque nigris. *Fn. suec. 507. It. gottl. 270.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 70. mant. inf. 1. p. 74. n. 94.*  
*Degeer inf. 5. p. 299. n. 4. t. 8. f. 27.* Chryfomela oblonga nigra punctata, elytris coriaceis.  
*Merian. inf. eur. t. 68.*  
*Schaeff. ic. t. 21. f. 14.*  
*Habitat in Europae tanaceto, rarius tota obscure grisea.*
- ruffica. 86. Chr. oblonga nigra, thorace elytrisque griseis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 74. n. 95.*  
*Schaller Abb. hall. Naturf. Gef. 1. p. 274.* Chryfomela ovata nigra, elytris griseis: striis quinque eminentibus.  
*Habitat in Europae fruticibus, affinis chr. tanaceti.*
- 12punctata. 87. Chr. oblonga, thorace flavescente, elytris viridibus: punctis sex nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 71. mant. inf. 1. p. 74. n. 96.*  
*Habitat - - -*
- haemorrhoidalis. 6. Chr. nigra nitida, antennis basi flavescens, ano supra rubro. *Fn. suec. 508.\* Scop. ent. carn. 225. Fabr. sp. inf. 1. p. 126. n. 60. mant. inf. 1. p. 72. n. 78.*  
*Degeer inf. 5. p. 287. n. 6.*  
*Habitat in betula et alno, elytris striato-punctatis.*

88. Chr.

- fucata. 88. Chr. atra, thorace elytrisque viridi-aeneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 126. n. 61. mant. inf. 1. p. 72. n. 79.*  
*Habitat in Italia, statura et magnitudine haemorrhoidalis.*
- fuscicornis. 89. Chr. viridi-aenea, antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 126. n. 62. mant. inf. p. 73. n. 80.*  
*Habitat in Russia, magnitudine et statura haemorrhoidalis.*
- graminis. 7. Chr. viridi-caerulea nitida, antennis pedibusque concoloribus. *Fn. succ. 509. Scop. ent. carn. 220. Fabr. sp. inf. 1. p. 118. n. 16. mant. inf. 1. p. 68. n. 21.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 260. n. 10.*  
*Degeer inf. 5. p. 304. n. 16.*  
*Schaeff. ic. t. 21. f. 10.*  
*Habitat in Europae plantis, praesertim gramine.*
- cuprea. 90. Chr. capite thoraceque aeneis, elytris cupreis, corpore atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 118. n. 17. mant. inf. 1. p. 68. n. 22.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 263. n. 15.*  
*Laichart. inf. vir. 1. p. 144. n. 3. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 55. n. 26. t. 23. f. 14. Chryfomela metallica?*  
*Habitat in Germania.*
- asiatica. 91. Chr. viridi-aenea nitidissima elytris cyaneis. *Pall. it. 1. p. 463. n. 10. Fabr. sp. inf. 1. p. 118. n. 15. mant. inf. 1. p. 68. n. 20.*  
*Habitat in Sibiria, surinamensi major.*
- glaberrima. 92. Chr. cyanea glaberrima, antennis plantisque fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 118. n. 14. mant. inf. 1. p. 68. n. 19.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 16. Chryfomela americana.*  
*Habitat Surinami, rarior in Europa boreali, aliquando tota aenea.*
- ignita. 93. Chr. cyanea nitida, elytris aeneis, antennis plantisque fulcis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 68. n. 18.*  
*Habitat in Cayenna, maxima.*
- aenea. 8. Chr. viridis nitida, abdomine posterius ferrugineo. *Fn. succ. 510.\**  
*Fn. succ. 1. n. 420. Chryfomela viridis nitida, thorace antice excavato.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 130. n. 80. mant. inf. 1. p. 75. n. 106.*  
*Geoffr.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 261. n. 12.*

*Degeer inf. 5. p. 305. n. 18. t. 9. f. 4.*

*Habitat in betula alno, etiam in Calabria.*

dresden- 95. Chr. oblonga, capite thoraceque obscure ferrugineis, ely-  
fis. tris nigro-aeneis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 75. n. 105.*  
*Habitat Dresdae, statura et magnitudine vitellinae.*

alni. 9. Chr. violacea, elytris vage punctatis, pedibus antennisque  
nigris. *Fn. suec. 511.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 128. n. 72.*  
*mant. inf. 1. p. 74. n. 97.*

*Degeer inf. 5. p. 314. n. 21. t. 9. f. 18.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 332. n. 1.*

*Frisch inf. 7. 13. t. 8.*

*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 13.*

*Schaeff. elem. t. 53. f. 1. 2.*

*Habitat in betula alno.*

absinthii. 97. Chr. oblonga pallida, thorace macula, elytris lineis tribus  
nigris. *Pall. it. 2. p. 725. n. 70. Fabr. sp. inf. 1. p. 129.*  
*n. 73. mant. inf. 1. p. 74. n. 98.*  
*Habitat in Sibiria, magnitudine Chr. tanacetii.*

concolor. 98. Chr. oblonga flavescens nitida, oculis fuscis. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 129. n. 74. mant. inf. 1. p. 74. n. 99.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, Chr. tanacetii paulo major:*

picea. 99. Chr. oblonga picea, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 129. n. 75. mant. inf. 1. p. 74. n. 100.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magna, glabra, nitida.*

betulae. 10. Chr. violacea, elytris punctato striatis. *Fn. suec. 514.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 129. n. 76. mant. inf. 1. p. 74. n. 101.*  
*Scop. ent. carn. 221.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 264. n. 17. Chrysomela nigro-pur-*  
*purea &c.*

*Degeer inf. 5. p. 318. n. 24. t. 9. f. 24. a. b. Chrysomela*  
*caerulea salicis &c.*

*Roef. inf. 2. scar. 3. t. 1.*

*Raj. inf. 90. f. 5.*

*Mus. Lesk. p. 14. n. 267?*

*Habitat in betulae albae foliis, paginam inferiorem exedens.*

tricolor. 100. Chr. oblonga, thorace fulvo viridi punctato, elytris vi-  
ridibus nitidis, abdomine nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 129.*  
*n. 77. mant. inf. 1. p. 74. n. 102.*

*Habitat*

*Habitat* - - - *major Chr. betulae, capite viridi, ore, pectore pedibusque fulvis, antennis fuscis.*

- haemo- 11. Chr. violacea, plantis alisque rubris. *Fn. suec. 512.\**  
 ptera. *Fabr. sp. inf. 1. p. 118. n. 18. mant. inf. 1. p. 68. n. 23.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 258. n. 5.* Chrysomela tota violacea.  
*Degeer inf. 5. p. 312. n. 20. t. 9. f. 13.* Chrysomela hyperici?  
*Pod. inf. 26.* Chrysomela graminis.  
*Habitat in Europa.*
- fuscipes. 250. Chr. violacea, antennis tibiis plantisque fusco-ferrugineis.  
*Muf. Lesk. p. 13. n. 243.*  
*Habitat in Europa.*
- nitens. 251. Chr. oblonga violacea nitida, elytris laevissime punctatis.  
*Muf. Lesk. p. 13. n. 261.*  
*Habitat* - - -
- femistriata. 101. Chr. nigra, elytris flavis: fascia media nigra, anterieus et posterius nigro-striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 119. n. 19.*  
*mant. inf. 1. p. 69. n. 26.*  
*Habitat in Brasilia.*
- centaurei. 102. Chr. cuprea nitens, subtus viridi-aenea, pedibus cupreis.  
*Fabr. mant. 1. p. 68. n. 25.*  
*Habitat in Germaniae centaureo, variantis statura et magnitudine.*
- varians. 103. Chr. caerulea s. viridis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. 1. p. 68. n. 24.*  
*Schaller Abb. der ball. Naturf. Ges. 1. p. 271.* Chrysomela subglobosa nitida, colore varians, antennis nigris.  
*Habitat in Saxonia, statura et magnitudine fastuosae.*
- occidentalis. 12. Chr. viridi-aenea, pedibus antennisque flavis.  
*Habitat in America, chr. vitellinae similis.* Rolander.
- cerasi. 13. Chr. livida, antennarum apicibus, oculisque nigris. *Fn. suec. 570.\**  
*Habitat in pruni padi foliis, quae cribri instar perforat subtus haerens larva, depressa, viridis, setosa.* T. Bergman.  
 Magnitudo cimicis lectularii; thoracis margo anterior nigricans.

- padi. 14. Chr. nigra, elytris apice lividis. *Fn. suec. 813.\**  
*Habitat in pruno pado, pulice major.*
- minutissi- 15. Chr. nigra opaca.  
 ma. *Habitat in Suecia, pulice quadruplo minor, elytris abdomi-  
 ne brevioribus.*
- armora- 16. Chr. nigra nitidissima subcaeruleascens, subtus nigra. *Fn.*  
 ciae. *suec. 515.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 127. n. 66. mant. inf. 1.  
 p. 73. n. 84. Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. t. 44 f. 7. c. d.  
 Degeer inf. 5. p. 322. n. 25. Chrysomela plantaginis.*  
*Habitat in plantagine, cochlearia armoracia, ranunculo  
 aquatili, flammula.*
- melano- 254. Chr. oblonga nigra, capite, thorace elytrisque rubris:  
 itoma. illo posterius puncto oreque, isto utrinque puncto, dorso  
 scutelloque, his futura nigris. *Mus. Lesk. p. 14.*
- carbona- 255. Chr. nigra, elytris laevissime punctatis: punctorum serie-  
 ria. bus novem. *Mus. Lesk. p. 14. n. 285.*  
*Habitat in Europa.*
- décem- 256. Chr. nigra, elytris ordinibus punctorum quinque parium.  
 punctata. *Mus. Lesk. p. 14. n. 266.*  
*Habitat in Europa.*
- luteicor- 257. Chr. nigra, antennis luteo-rufescentibus, elytris laevissi-  
 nis. me punctatis: punctorum seriebus novem; margine in-  
 flexo testaceo. *Mus. Lesk. p. 14. n. 275.*  
*Habitat in Europa.*
- subpun- 258. Chr. nigra aeneo nitens, elytris laevissime punctatis.  
 ctata. *Mus. Lesk. p. 14. n. 276.*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 259. Chr. atra, elytris laevibus punctatis margine sanguineis.  
 melas. *Mus. Lesk. p. 14. n. 270.*  
*Habitat in Europa, an distincta satis a limbata?*
- cyano- 260. Chr. violacea, capite thorace elytrisque nigris: his pro-  
 melas. funde punctatis, antennarum basi rubra. *Mus. Lesk. p.  
 14. n. 265.*  
*Habitat in Europa.*
- dichroa. 261. Chr. oblonga violacea, thorace, elytris tibiisque viridi-  
 bus. *Mus. Lesk. p. 14. n. 280.*  
*Habitat in Europa.*

262. Chr.

- elegans. 262. Chr. oblonga violaceo-aenea, capite, thorace, elytris profunde punctatis pedibusque viridi-aeneis. *Mus. Lesk.* p. 14. n. 281.  
*Habitat in Europa.*
- ruffica. 104. Chr. cyanea antennarum basi, thorace pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 71. n. 55.*  
*Habitat in Russia meridionali, statura chr. polygoni, at paulo minor.*
- brunnea. 105. Chr. testacea, elytris sutura lineolaque media fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 123. n. 44. mant. inf. 1. p. 71. n. 56.*  
*Habitat in nova Hollandia, parva.*
- quinque- 252. Chr. oblonga testacea, elytris punctis profundis striatis: maculata. singulis maculis quinque nigris notatis. *Mus. Lesk. p. 13. n. 260.*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 253. Chr. aenea, capite thoraceque fusco aeneis, elytris rubris ptera. basi gibbis. *Mus. Lesk. p. 13. n. 257.*
- cerealis. 17. Chr. aurata, thorace lineis tribus, coleoptrisque quinque caeruleis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 124. n. 45. mant. inf. 1. p. 71. n. 57.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 262. n. 14. Chrysomela aurea.*  
*Schaeff. ic. r. 1. f. 3.*  
*Habitat in Europae magis australis segete, montis vogelsi spartio scopario, mediae magnitudinis, subtus obscure violacea, rarius tota purpurea.*
- america- 106. Chr. viridi-aenea, elytris striis quinque sanguineis. *Fabr. na. sp. inf. 1. p. 124. n. 46. mant. inf. 1. p. 71. n. 58.*  
*Habitat in America et Galliae australis lavandula, verticis macula coccinea.*
- festiva. 107. Chr. nigro-aenea, elytris lineis tribus suturaque anteriore flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 124. n. 47. mant. inf. 1. p. 71. n. 59.*  
*Habitat in America.*
- fastuosa. 18. Chr. aurea, coleoptris lineis tribus caeruleis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 125. n. 48. mant. inf. 1. p. 71. n. 60. Scop. ent. carn. 232. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 53. n. 15. f. 23. f. 6.*

Geoffr.

- Geoffr. inf. par. I. p. 261. n. 11. Chrysomela viridis nitida &c.*  
*Gron. zooph. 561.*  
*Habitat in Europae lamio albo, urticis, rubis.*
- gloriosa. 108. Chr. viridis nitida, elytris linea caerulea. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 497. mant. inf. I. p. 71. n. 61.*  
*Habitat in Italia, fastuosae affinis, at duplo major.*
- speciosa. 19. Chr. viridi-sericea, elytris lineis duabus aureis. *Fabr. sp. inf. I. p. 124. n. 49. mant. inf. I. p. 71. n. 62. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 54. n. 16. t. 23. f. 7?*  
*Scop. ent. carn. 231. Chrysomela speciosissima.*  
*Hollar inf. t. 6. f. 2.*  
*Habitat in Germaniae silvis.*  
*Elytrorum lineae antierius et posterius coeunt.*
- cyanea. 109. Chr. thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 124. n. 50. mant. inf. I. p. 71. n. 63.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*
- nitida. 110. Chr. thorace rotundato viridi-aeneo, antennis cyaneis. *Fabr. mant. inf. I. p. 71. n. 64.*  
*Habitat in Siam, auratae affinis, at paulo major.*
- aurata. 111. Chr. thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: margine cyaneo. *Fabr. sp. inf. I. p. 124. n. 51. mant. inf. I. p. 71. n. 65.*  
*Habitat in America boreali.*
- limbata. 112. Chr. atra, coleopterorum limbo sanguineo. *Fabr. sp. inf. I. p. 125. n. 52. mant. inf. I. p. 71. n. 66.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 260. n. 9. Chrysomela nigro-caerulea &c.*  
*Schaeff. ic. t. 21. f. 20.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- hypo-chaeridis. 21. Chr. aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. *It. scan. 210. Fn. suec. 516.*  
*Scop. ent. carn. 193. Buprestis syngenesiae.*  
*Habitat in hypochaeridis maculatae floribus.*
- vulgatissima. 22. Chr. oblonga caerulea, antennis basi ferrugineis. *Fn. suec. 517.\* Scop. ent. carn. 223. Fabr. sp. inf. I. p. 130. n. 79. mant. inf. I. p. 75. n. 104.*

- Degeer inf. 5. p. 317. n. 23.* Chrysomela caerulea betulae.  
*Habitat in Europa, potissimum in salice.*
- vitellinae. 23. Chr. viridi-caerulea. *Fn. suec. 519.\* Scop. ent. carn. 224.*  
*Fn. suec. 426.* Chrysomela aenei coloris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 130. n. 78. mant. inf. 1. p. 74. n. 103.*  
 Chrysomela oblonga viridi-aenea.  
*Degeer inf. 5. p. 323. n. 27.*  
*Roef. inf. 2. scar. 3. p. 5. t. 1.*  
*Habitat in Europae salicibus glabris populoque, vulgarissima paulo minor, folia subtrus consumens.*  
*Larvae, dum pascentur, per lineas parallelas dispositae.*
- polygoni. 24. Chr. caerulea, thorace, femoribus anoque rufis. *Fn. suec. 520.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 123. n. 43. mant. inf. 1. p. 70. n. 54.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 283. n. 4.*  
*Degeer inf. 5. p. 322. n. 26.*  
*Raj. inf. 100. n. 4.*  
*Reaumur inf. 3. t. 17. f. 14. 15.*  
*Schaeff. ic. t. 51. f. 5. et t. 161. f. 4. et t. 173. f. 4.*  
*Habitat in polygono aviculari, rumice acetosa, pedibus interdum rufis, ut tamen plantae nigrae sint.*  
*Femina ovis gravida ultra coleoptra ventricosa.*
- 18gutta- 113. Chr. elytris fuscis: punctis octo pallidis; quibusdam con-  
 ta. nexis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 123. n. 42. mant. inf. 1. p. 70. n. 53.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- pallida. 25. Chr. flavescens, oculis nigris. *Fn. suec. 521.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 122. n. 34. mant. inf. 1. p. 70. n. 44.*  
*Fn. suec. 1. n. 423.* Chrysomela pallido-grisea.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 243.* Chrysomela pallida, oculis nigris.  
*Habitat in Europae salicibus.*
- striata. 114. Chr. atra nitida, elytris striatis testaceis, futura atra.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 122. n. 35. mant. inf. 1. p. 70. n. 45.*  
*Habitat ad caput bonae spei, gibba, mediae magnitudinis.*
- notata. 115. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris pallidis nigro-variis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 122. n. 36. mant. inf. 1. p. 70. n. 46.*  
*Habitat ad caput bonae spei, pallida, capite fulva, statura pallidae.*
116. Chr.



- rumicis 116. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris fulvis: futura vittaque media nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 70. n. 47.*  
*Habitat in Hispaniae rumice spinoso, statura et magnitudine pallidae.*
- vulpina. 117. Chr. atra, elytris margine, punctis quatuor apiceque nigro-maculato albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 122. n. 37. mant. inf. I. p. 70. n. 48.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura notatae.*
- crassicornis 118. Chr. flavescens, elytris maculis duabus nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 122. n. 38. mant. inf. I. p. 70. n. 49.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- staphylaea. 26. Chr. obscure testacea tota. *Fn. suec. 518.\* Fabr. sp. inf. I. p. 119. n. 21. mant. inf. I. p. 69. n. 29.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 263. n. 15. Chrysomela supra rubropcuprea &c.*  
*Degeer inf. 5. p. 294. n. 3. t. 8. f. 24. Chrysomela cuprea.*  
*Habitat in Europae pratis.*
- fervida. 119. Chr. testacea, elytris aeneis: margine testaceo. *Fabr. sp. inf. I. p. 119. n. 22. mant. inf. I. p. 69. n. 30.*  
*Habitat in insula Java.*
- polita. 27. Chr. thorace aurato, elytris rufis. *Fn. suec. 522.\* Scop. ent. carn. 229.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 119. n. 23. mant. inf. I. p. 69. n. 31.*  
*Chrysomela ovata, thorace aurato, elytris testaccis.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 257. n. 2.*  
*Degeer inf. 5. p. 294. n. 2. t. 8. f. 2. 3.*  
*Schaeff. ic. t. 65. f. 9.*  
*Habitat in falice, populo.*
- lurida. 28. Chr. nigra, elytris castaneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 120. n. 24. mant. inf. I. p. 69. n. 33.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 258. n. 3.*  
*Habitat in Galliae vite, Germania, statura politae, at dimidio minor.*
- lunata. 120. Chr. ferruginea, elytris margine, vitta lunulaque media flavicantibus. *Fabr. mant. inf. I. p. 69. n. 32.*  
*Habitat - - - statura et magnitudine politae.*

- clavicor- 29. Chr. nigra, elytris abdomineque nigris, antennis clavatis.  
nis. *Habitat in America, chr. populi facie.* Rolander.
- tremula. 121. Chr. caerulefscens, elytris testaceis. *Fabr. mant. 1. p. 69. n. 28.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 256. n. 2.*  
*Habitat in Europae populo, chr. populi duplo minor.*
- populi. 30. Chr. thorace caerulefscente, elytris rubris apice nigris. *Fn. suec. 523.\**  
*Scop. ent. carn. 228. Fabr. sp. inf. 1. p. 119. n. 20. mant. inf. 1. p. 69. n. 27. Pod. inf. 27. Chrysomela 7 punctata.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 256. n. 1.*  
*Degeer inf. 5. p. 290. n. 1. t. 8. f. 16.*  
*List. scar. angl. 381. n. 6.*  
*Merian. inf. eur. 14. t. 27.*  
*Albin. inf. 63. f. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 21. f. 9. et. t. 9. et t. 47. f. 4. 5.*  
*Habitat in populo tremula, folia saepe devastans, quae ex-corticata rudis vasis relinquit.*  
*Larva foetens, hexapus, albo nigroque varia ex tuberculorum duplici serie humorem lacteum fundit.*
- vimina- 31. Chr. nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 121. n. 30. mant. inf. 1. p. 69. n. 39.*  
lis. *Syst. nat. XII. 2. p. 590. n. 31. Fn. suec. 524.\** Chry-  
somela ovata nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 265. n. 18. Chrysomela rubra &c.*  
*Scop. ent. carn. 233. Chrysomela signata.*  
*Degeer inf. p. 297. n. 6.*  
*Habitat in Europae salicibus, aliquando cum haemorrhoida-  
li copia conjuncta.*
- cyani- 122. Chr. rufa, elytris punctis posteriusque cyaneis. *Fabr.*  
pes. *sp. inf. 1. p. 121. n. 31. mant. inf. 1. p. 69. n. 40.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- cyani- 123. Chr. rufa, thorace macula dorsali punctisque duobus,  
cornis. coleopttris maculis octo cyaneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 121.*  
*n. 32. mant. inf. 1. p. 69. n. 41.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- 10puna- 32. Chr. thorace rubro posterius nigro, elytris rufis: pun-  
ctata. ctis subquinis nigris. *Fn. suec. 525. Fabr. sp. inf. 1. p. 121.*  
*n. 33. mant. inf. 1. p. 69. n. 42.*

- Fn. suec.* 1. n. 436. Chrysomela supra rufa, thoracis punctis nigris duobus, elytrorum pluribus.
- Geoffr. inf. par.* 1. p. 258. n. 4. Chrysomela rubra &c.
- Degeer inf.* 5. p. 294. n. 4. t. 8. f. 25. Chrysomela rufipes.
- Schaeff. ic. t.* 21. f. 13.
- β) Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris.  
*Fn. suec.* 1. n. 1354.  
*Habitat in Europae populo, punctorum in elytris numero varians.*
- sempun- 124. Chr. nigra, thorace rufo: punctis duobus, elytris rufis:  
ctata. punctis tribus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 70. n. 43.  
*Habitat in Europae plantis, decempunctatae affinis.*
- variolosa. 33. Chr. nigra, elytris rubris: punctis sparsis impressis caeruleis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 122. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 70. n. 50.  
*Habitat in Africa.*
- lapponi- 34. Chr. thorace viridi, elytris rubris, fascia inter punctum  
ca. maculamque lunatam caerulea. *Fn. suec.* 526.\* *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 123. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 70. n. 51.  
*Degeer inf.* 5. p. 302. n. 12. t. 9. f. 3. Chrysomela cur-  
vilinea.  
*Schaeff. ic. t.* 44. f. 2.  
*Habitat in Europa boreali, Saxoniae fraxino, elytrorum su-  
tura caerulea.*
- undulata. 35. Chr. rufa, elytris fasciis tribus atro-caeruleis undulatis.  
*Amoen. ac.* 6. p. 393. n. 14. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 173. n.  
11. *mant. inf.* 1. p. 70. n. 52.  
*Habitat in India.*
- boleti. 36. Chr. nigra, elytris fasciis tribus flavis repandis. *Fn. suec.*  
527.\* *Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 9. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 120.  
n. 25. *mant. inf.* 1. p. 69. n. 34.  
*Uddm. diss.* 4. f. 3. *Dermettes ater nitens*, elytris nigris:  
fasciis duabus flavis undulatis.  
*Scop. ent. carn.* 247. *Coccinella fasciata.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 337. t. 6. f. 3. *Schaeff. elem. t.* 58.  
ic. t. 77. f. 6. *Diaperis.*  
*Degeer inf.* 5. p. 49. n. 9. t. 3. f. 3. *Tenebrio boleti.*  
*Habitat in boletis arboreis.*

- novem-  
vittata. 125. Chr. thorace nigro aeneo, coleoptris flavis: vittis novem  
fuscis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 120. n. 26. *mant. inf.* I. p.  
69. n. 35.  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine chr. boleti.*
- stolida. 126. Chr. ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris varie-  
gatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 120. n. 27. *mant. inf.* I. p. 69.  
n. 36.  
*Habitat in America.*
- nigrico-  
nis. 127. Chr. nigro-aenea, capite, thoracis lateribus, elytro-  
rumque macula duplici baseos ferrugineis. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 121. n. 28. *mant. inf.* I. p. 69. n. 37.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- collaris. 37. Chr. violacea, thoracis marginibus albis: puncto nigro.  
*Fn. suec.* 528.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 121. n. 29. *mant. inf.*  
I. p. 69. n. 38.  
*Degeer inf.* 5. p. 302. n. 13.  
*Schaeff. ic. t.* 52. f. 11. 12.  
*Habitat in Europae et borealis Americae salicibus.*
- sanguino-  
lenta. 38. Chr. atra, elytris margine exteriori sanguineis. *Fn. suec.*  
529.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 125. n. 53. *mant. inf.* I. p. 71.  
n. 67.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 259. n. 8. t. 4. f. 8. Chrysomela ni-  
gro-caerulea &c.  
*Degeer inf.* 5. p. 298. n. 7. t. 8. f. 26. Chrysomela rubro-  
marginata.  
*Scop. ent. carn.* 203. Buprestis sanguinolenta.  
*Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 10.  
*Schaeff. ic. t.* 21. f. 15.  
*Habitat in Europae salicetis.*
- marginata. 39. Chr. nigro-aenea, elytris margine luteis. *Fn. suec.* 529.\*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 125. n. 54. *mant. inf.* I. p. 71. n. 68.  
*Degeer inf.* 5. p. 303. n. 14.  
*Schaeff. ic. t.* 21. f. 19.  
*Habitat in Europae pratis apricis.*  
*Elytra striato-punctata.*
- aucta. 128. Chr. thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis:  
margine rubro. *Fabr. mant. inf.* I. p. 72. n. 69.  
*Habitat Dresdae, magnitudine et statura marginatae.*

- marginel- 40. Chr. nigro-caerulea, thorace elytrisque margine luteis.  
la. *Fn. suec.* 530.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 125. n. 55. *mant. inf.*  
1. p. 42. n. 70. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. t. 23.  
f. 9.  
*Degeer inf.* 5. p. 304. n. 15. Chrysomela ranunculi.  
*Raj. inf.* 99.  
*Habitat in Europae ranunculis.*
- hannove- 129. Chr. cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque  
riana. ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 126. n. 56. *mant. inf.* 1.  
p. 72. n. 71. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 54. n. 22.  
t. 23. f. 10.  
β) Chrysomela potentillae. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4.  
p. 55. n. 23. t. 23. f. 11.  
γ) Chrysomela ranunculi. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4.  
p. 55. n. 24. t. 23. f. 11.  
*Habitat in Germania.*
- 5puncta- 130. Chr. nigra, thorace rufo, coleoptris testaceis: punctis  
ta. quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 72. n. 72.  
*Habitat Hamburgi, mediae magnitudinis.*
- scutellata. 131. Chr. rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Herbst*  
*apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 58. n. 32. t. 23. f. 20. c.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 72. n. 73.  
*Habitat in Germania, parva.*
- litura. 132. Chr. rufescens, elytris futura lineaque longitudinali ni-  
gris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 126. n. 57. *mant. inf.* 1. p. 72.  
n. 74. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 57. n. 30. t. 23.  
f. 18. a.  
*Habitat in Anglia et Germania.*
- flavicans. 133. Chr. flavescens, elytris viridi-cinereis. *Fabr. mant.*  
*inf.* 1. p. 72. n. 75.  
*Habitat Halae Saxonum, statura et magnitudine liturae.*
- castanea. 41. Chr. fusca, elytris margine exteriore castaneo. *Amoen.*  
*ac.* 6. p. 394. n. 15.  
*Habitat Surinami.*
- analis. 42. Chr. atra, elytris fuscis: margine exteriore testaceo. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 130. n. 81. *mant. inf.* 1. p. 75. n. 107.  
*Habitat in Europa, capta primum ad praedium Hammarby.*  
*Fabricius.*

- cruenta. 134. Chr. oblonga fanguinea, thorace immaculato, elytris punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 130. n. 82. mant. inf. 1. p. 75. n. 108.*  
*Habitat in India, coccineae statura.*
- coccinea. 43. Chr. thorace marginato fanguineo: macula nigra, elytris fanguineis: maculis duabus nigris. *Fn. succ. 532.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 131. n. 83. mant. inf. 1. p. 75. n. 109.*  
*Uddm. diff. 13. Coccinella coleoptris rubris, maculis quatuor nigris.*  
*Degeer inf. 5. p. 301. n. 10. t. 9. f. 1. Chrysomela quadrimaculata.*  
*Habitat in Europae borealis corylo.*
- cruciata. 135. Chr. oblonga rubra, coleoptris cruce nigra. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 273. Fabr. mant. inf. 1. p. 75. n. 110.*  
*Habitat Halae Saxonum, coccinea minor, elytris &c. marginatis a plurimis congeneribus distans, an forte cum chr. rustica, et cryptocephalis capreae, nymphaeae &c. proprii generis?*
- quadrimaculata. 136. Chr. oblonga, thorace testaceo immaculato, elytris testaceis: maculis duabus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 131. n. 84. mant. inf. 1. p. 75. n. 111.*  
*Habitat in nemoribus Kiloniensibus.*
- decemmaculata. 137. Chr. oblonga nigra, coleoptris rubris: punctis decem nigris; duobus communibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 131. n. 85. mant. inf. 1. p. 75. n. 112.*  
*Habitat in America.*
- 20punctata. 138. Chr. oblonga viridi-aenea thoracis marginibus albis, elytris albis: maculis decem aeneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 131. n. 86. mant. inf. 1. p. 75. n. 112.*  
*Bergstr. nomencl. 1. p. 87. t. 13. f. 10. Chrysomela vicies maculata.*  
*Petiv. gazoph. 2. 29. f. 5.*  
*Habitat in Anglia.*
- bipunctata. 139. Chr. testacea, elytris macula fusca. *Fabr. sp. inf. 1. p. 127. n. 64. mant. inf. 1. p. 73. n. 82.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura philadelphicae, at major.*

- philadel- 44. Chr. viridis, elytris flavis: punctis virescentibus oblon-  
phica. giusculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 127. n. 65. mant. inf. I. p. 73. n. 83.*  
*Degeer inf. 5. p. 353. n. 6. t. 16. f. 13.*  
*Petiv. gaz. t. 26. f. 11.*  
*Habitat in Pennsylvania, elytrorum futura nunc viridi, nunc flava.*
- trimacu- 45. Chr. cyanea, coleoptris flavis: fascia maculisque duabus  
lata. nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 117. n. 9. mant. inf. I. p. 67. n. 11.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 592. n. 45.* Chryfomela ovata nigra,  
elytris flavis, maculis tribus oblongis nigris, intermedia  
futuræ communi.  
*Habitat in America, minuta, forma coccinellæ.*
- Adonidis. 140. Chr. atra, thoracis margine flavo: puncto nigro, elytris  
flavis: futura vittaque nigris. *Pall. it. I. p. 463. n. 29.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 117. n. 10. mant. inf. I. p. 67. n. 12.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 56. n. 39. t. 23. f. 17.*  
*Habitat in Tibiriæ adonide et Aultria.*
- dorsalis. 141. Chr. atra, thoracis margine testaceo: puncto nigro, ely-  
tris testaceis: futura abbreviata atra. *Fabr. sp. inf. I. p. 117. n. 11. mant. inf. I. p. 67. n. 13.*  
*Habitat in Aultria.*
- clavata. 142. Chr. capite thoraceque ferrugineis, elytris nigris: vitta  
flavescente. *Fabr. mant. inf. I. p. 67. n. 14.*  
*Habitat - - - nigra, mediæ magnitudinis.*
- bifasciata. 143. Chr. testacea, elytris aeneis nitidis: punctis duobus fas-  
ciisque duabus flavis. *Fabr. mant. inf. I. p. 68. n. 15.*  
*Habitat in Cayenna, magna.*
- futuralis. 144. Chr. aenea, elytris flavis: futura vittaque aeneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 117. n. 1. 2. mant. inf. I. p. 68. n. 16.*  
*Habitat in America boreali.*
- barbarica. 46. Chr. viridi-aenea, elytris lineis quinque rubris, alis fan-  
guineis.  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 16.*  
*Habitat in Barbaria, inter coccos officinarum lecta, ex caeruleo virescens, subtus ex piceo aenea.*

- Lineola. 47. Chr. flava, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 126. n. 58. *mant. inf.* p. 72. n. 76.  
*Habitat in America, pulicis magnitudine, capite et thorace pallidis, oculis nigris.* Brünniche.
- aestuans. 48. Chr. ferruginea, clytris maculis quatuor flavicantibus difformibus. *Gron. zooph.* 565.  
*Habitat in America, coccinellae maximae magnitudine, elytris glabris obsolete punctato-friatis.*
- facra. 49. Chr. supra rufa, thoracis linea, punctis duobus, elytrorumque futura nigris. *Mus. Lud. Utr.* 40.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 126. n. 59. *mant. inf.* 1. p. 72. n. 77.  
*Habitat in Palaestina, alis sanguineis.*
- 14puncta-94. Chr. testacea, coleoptris flavis: punctis sedecim nigris; ta. duobus communibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 117. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 68. n. 17.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 599. *Chrysomela cylindrica*, femoribus posticis incrassatis dentatis, thorace rufo, coleoptris flavis punctis XIV nigris.  
*Habitat in India, bipunctatae similis, at major.*
- obscura. 96. Chr. nigra, thorace rotundato angustiori, pedibus posterioribus elongatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 127. n. 63. *mant. inf.* 1. p. 73. n. 81.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 599. *Fn. faec.* 561.\* *Chrysomela subcylindrica*, thorace pedibusque nigris.  
*Degeer inf.* 5. p. 336. n. 40. *Chrysomela nigro-quadrata.*  
*Habitat in Europae plantis, thorace gibbo, elytris angustiore.*
- violacea. 145. Chr. violacea, elytris lineis quatuor viridescentibus. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 270.  
*Schaeff. ic. t.* 21. f. 10.  
*Habitat aestate gregaria in Europae salicibus, chr. alni major, ceterum cereali similis.*
- olivacea. 146. Chr. aeneo-olivacea, thoracis marginibus lateralibus crassis, elytris punctato-friatis. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 272.  
*Habitat in Germaniae plantis, staphyleae statura et magnitudine, nitida, punctorum excavatorum in elytris seriebus 9.*



- hemicor-nis.** 147. Chr. violacea, sterno porrecto. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges.* I. p. 274. t. I. f. I.  
*Habitat in India, scarabaei vernalis magnitudine, punctis plurimis in thorace et elytris excavatis.*
- globosa.** 148. Chr. elytris nigris, thorace sanguineo, pedibus rufis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 11. n. 18.  
*Habitat in Suecia, pediculo duplo major, globosa, nigra.*
- hollandi-ca.** 149. Chr. supra aenea, elytris punctatis, subtus nigra, cinereo-tomentosa. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 11. n. 19.  
*Habitat in Hollandia Sueciae, statura et magnitudine Chr. vitellinae.*
- undata.** 150. Chr. elytris testaceis: punctis fasciisque duabus nigris, capite thoraceque testaceis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 12. n. 20.  
*Habitat Upsaliae, pallidae statura et magnitudine, subtus testacea.*
- bipustulata.** 151. Chr. elytris nigris: apicis macula flava, capite thoracisque lateribus flavis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 13. n. 21.  
*Habitat in Suecia, pediculo duplo major, nigra, glabra, subdepressa.*
- gibba.** 152. Chr. oblonga, elytris brunneis, capite thoraceque fuscis. *Thunb. nov. act. Ups.* 4. p. 14. n. 24.  
*Habitat Upsaliae, magnitudine vulgatissimae, subdepressa.*
- gigas.** 153. Chr. tota cyanea, oculis ex luteo-fuscis, elytris glaberrimis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. p. 51. n. 2. t. 23. f. 2.  
*Habitat in India.*
- Gronovii.** 154. Chr. nigra nitida, thoracis fascia duplici et margine nigris, elytris luteis: macula, vitta interrupta, punctisque duobus nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. p. 52. n. 4. t. 23. f. 4.  
*Habitat - - - ultra dimidium pollicem longa, fascia thoracis priore dentata.*
- indica.** 155. Chr. nigra, abdomine luteo, elytris subdiaphanis fuscis: fasciis tribus luteis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. p. 52. n. 5. t. 23. f. 5.  
*Habitat in India.*

- lomata. 156. Chr. nigra, capite, thorace, elytrisque cyaneis, his obsolete punctatis margine sanguineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 1. p. 54. n. 20. t. 23. f. 8.*  
*Habitat in Germania, marginatae affinis.*
- centaura. 157. Chr. viridi-aurea, thorace elytrisque rubris punctatis, antennis nigris, tarsi fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 56. n. 27. t. 23. f. 15.*  
*Habitat Berolini, ultra 2 lineas longa.*
- taraxa- 158. Chr. rubro aurea, subtus viridi-aurea, elytris punctato-  
conis. friatis, antennis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 56. n. 28. t. 23. f. 16.*  
*Habitat Berolini in taraxacone.*
- exilis. 159. Chr. nigra, capite et thorace glaberrimis pedibusque fulvis, elytris punctis fuscis seriatis maculisque duabus nigris confluentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 57. n. 31. t. 23. f. 19. b.*
- unicolor. 160. Chr. livida, elytris glabris: punctis sparsis excavatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 161. n. 56. t. 44. f. 1.*  
*Habitat in America, maxima.*
- grisea. 161. Chr. ex virescente grisea subvillosa, pedibus antennisque flavescens. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 161. t. 44. f. 2. a. b.*  
*Habitat Berolini, vix lineam superans.*
- rubi. 162. Chr. angusta chalybea, elytris glabris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 562. n. 59. t. 44. f. 4. c. f.*  
*Habitat Berolini.*
- caecaliae. 163. Chr. virens, elytris stria longitudinali futuraque caeruleis, alis rubris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 162. n. 62. t. 45. f. 2.*  
*Habitat in Austria.*
- bulgaren- 164. Chr. atra, elytris nigro-aeneis punctatis, unguiculis rubris. *Schranck inf. austr. p. 70. n. 127. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 55. n. 25. t. 23. f. 13.*  
*Habitat in Austria.*

165. Chr.

Huc referas quoque Chrysomelam bimaculatam. *Schueff. ic. inf. t. 51. f. 7. et lit. M. t. 21. f. 1. 2.*

- binotata. 165. Chr. testacea, elytris basi ferrugineis. Müll. *fn. fridrichsd.*  
p. 8. n. 73.  
*Habitat in Dania.*
- Fridrichs-  
dalenfis. 166. Chr. thorace macula nigra, elytris sanguineis immacula-  
tis, abdomine nigro. Müll. *fn. fridr.* p. 8. n. 74. *prodr.*  
*zool. dan.* p. 81. n. 885.  
*Schaeff. ic. t. 194. f. 4.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- similis. 167. Chr. nigro-violacea, thorace lateribus, antennisque basi  
rubris. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 81. n. 880.  
*Habitat in Dania.*
- orichal-  
cea. 168. Chr. nigra, supra aenea, elytris punctis striatis. Müll.  
*zool. dan. prodr.* p. 82. n. 889.  
*Habitat in Dania.*
- grossa. 169. Chr. atra, subtus violacea, tarsis spongiosis subtus fuscis.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 81. n. 875.  
*Schaeff. ic. t. 126. f. 1.*  
*Habitat in Dania.*
- punctata. 170. Chr. violacea, elytris punctato-striatis, ano rubro. Müll.  
*zool. dan. prodr.* p. 82. n. 890.  
*Habitat in Dania.*
- obtusa. 171. Chr. violacea, thorace pedibusque rufis. Müll. *zool. dan.*  
*prodr.* p. 82. n. 895.  
*Habitat in Dania.*
- thoracica. 172. Chr. violacea, thoracis margine laterali dilatato, elytris  
punctato-striatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 82. n. 898.  
*Habitat in Dania.*
- bilineata. 173. Chr. viridi-aurea, thorace anterieus excavato, elytrorum  
linea duplici caerulea. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 83.  
n. 904.  
*Act. nidr.* 4. p. 8. t. 16. f. 5.  
*Habitat in Scandinavia.*
- ferotina. 174. Chr. nitida rufa, oculis nigris, tibiis posterioribus arcua-  
tis. Müll. *prodr. zool. dan.* p. 83. n. 905.  
*Habitat in Dania.*
- caerulea. 175. Chr. caerulea, thorace violaceo. *Geoffr. inf. par.* 1.  
p. 259. n. 6.  
*Habitat in Gallia.*

176. Chr.

- atrata.* 176. Chr. atra, alis sanguineis. *Geoffr. inf. par. I. p. 259. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- decemstriata.* 177. Chr. viridis nitida, striis decem cupreis, punctorum serie duplici divisis. *Geoffr. inf. par. I. p. 261. n. 13.*  
*Habitat in Gallia.*
- ruficauda.* 178. Chr. viridi-aenea obscura nitida, abdominis lateribus, ano alarumque margine rubris. *Degeer inf. 5. p. 305. n. 17.*  
*Habitat in Gallia.*
- viridula.* 179. Chr. viridis aurata nitida, thorace anterieus aequali, abdomine supra toto nigro. *Fn. Suec. I. n. 421. 2. n. 520. B.*  
*Goed. inf. I. t. 45.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 261. n. 11.*  
*Degeer inf. 5. p. 311. n. 19.*  
*Habitat in Europa.*
- amethystina.* 180. Chr. supra ex caeruleo violacea, subtus ex violaceo viridis, punctis excavatis sparsis.  
*Degeer inf. 5. p. 316. n. 22.*  
*Habitat - - - thorace amplo, antennis brevioribus nigris.*
- longicornis.* 181. Chr. oblonga, thorace teretiufculo, supra ex griseo fusca nitida, subtus nigra capite nigro.  
*Degeer inf. 5. p. 325. n. 29. t. 9. f. 35.*  
*Habitat in Europa, antennis longis.*
- cruentata.* 182. Chr. nigra, elytris glabris: fasciis transversis undulatis maculisque rubris.  
*Degeer inf. 5. p. 350. n. 2. t. 16. f. 9.*  
*Habitat in America australi.*
- haemostata.* 183. Chr. capite thoraceque viridi-aeneis obscuris, elytris nigris: maculis plurimis rubris punctisque excavatis.  
*Degeer inf. 5. p. 350. n. 3. t. 16. f. 10.*  
*Habitat in America australi.*
- fuliginosa.* 184. Chr. fusca depressa, thorace elytrisque griseo-fuscis, antennis nigris.  
*Degeer inf. 5. p. 354. n. 8. t. 16. f. 15.*  
*Habitat Surinami.*
- asclepiada.* 185. Chr. obscure caerulea nitida, antennis nigris, thoracis punctis sparsis, elytrorum lineatis. *Pall. it. 2. app. n. 69.*  
*Habitat ad Volgam et Irin Sibiriae in Asclepiada.*

186. Chr.

- sapphiri- 186. Chr. cyanca nitida, ore oculisque rubris, antennis nigris.  
na. Forst. nov. inf. gen. p. 19. n. 19.  
Habitat - - - sanguinolenta triplo major, thorace ely-  
trisque punctis minutissimis conspersis.
- anglica. 187. Chr. atro-caerulea, elytris nigro-aeneis striato-puncta-  
tis, alis rubris. Forst. nov. inf. gen. p. 20. n. 20.  
Habitat in Angliae hypericone perforato, fastuosae magni-  
tudine.
- rhois. 188. Chr. ferruginea, capite, thorace et striis aliquot elytro-  
rum pallidis. Forst. nov. inf. gen. p. 21. n. 21.  
Habitat in Americae septentrionalis rhoe glabro, politae ma-  
gnitudine.
- novebora- 189. Chr. thorace rufo: disco punctis nigris, elytris rubis:  
censis. futura, punctis lineolisque nigris. Forst. nov. inf. gen.  
p. 22. n. 22.  
Habitat in Noveboraco, habitu chr. populi, magnitudine  
fere politae.
- vernalis. 190. Chr. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque oliva-  
ceis, elytris stria longitudinali et futura nigra. Forst. nov.  
inf. gen. p. 23. n. 23.  
Habitat in Anglia, primo vere in arena conspicua, magni-  
tudine et habitu chr. vitellinae.
- frontalis. 191. Chr. nigra, capite antennarum basi, elytrorum margine  
et pedibus ferrugineis. Forst. nov. inf. gen. p. 24. n. 24.  
Habitat in America septentrionali, mediae magnitudinis.
- sifymbrii. 192. Chr. capite atro, thoracis elytrorumque marginibus un-  
dique sanguineis. Lepechin it. 1. p. 10. t. 4. f. 16.  
Habitat in Russiae Sifymbrio Sophia.
- Lepechi- 193. Chr. capite caeruleo, thorace elytrisque rubris: fasciis  
ni. duabus caeruleis. Lepech. it. 1. p. 29. t. 4. f. 7.  
Habitat in Russia australi.
- rubicun- 194. Chr. atra, thorace elytrisque rubicundis, incisuris ab-  
da. dominis albis. Lepech. it. 1. p. 311. t. 20. f. 3.  
Habitat in Russiae australis polygono frutescente.
- distincta. 195. Chr. obscure viridis, thoracis elytrorumque limbo inter-  
rupto flavescente. Lepech. it. 1. p. 312. t. 20. f. 6.  
Habitat in Russia australi.

196. Chr.

- quadri- 196. Chr. capite nigro, thorace nigro, margine rubro, elytris  
punctata. miniatis: punctis quatuor nigris. *Lepech. it. 2. p. 208.*  
*t. 11. f. 20.*  
*Habitat in Sibiria.*
- menthae. 197. Chr. nigro-aenea nitida. *Schranck Beytr. z. Naturg.*  
*p. 63. §. 5.*  
*Habitat in mentha aquatica; an propria species?*
- pruni. 198. Chr. nigra, capite, thorace, elytrorumque apicibus rufis.  
*Schranck Beytr. z. Naturg. p. 63. §. 6.*  
*Habitat in pruno.*
- cognata. 199. Chr. caerulea, pedibus nigris, ano supra, primisque an-  
tennarum articulis fulvis. *Herbst apud Fueßli arch. inf.*  
*4. p. 58. n. 37.*  
*Habitat Berolini, statura et magnitudine chr. vitellinae, ce-*  
*terum haemorrhoidali affinis.*
- erythro- 200. Chr. viridis nitens granulata elytris obtuse mucronatis,  
pus. antennis fulvis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 59.*  
*n. 38.*  
*Habitat Berolini in salicibus, statura et magnitudine chr.*  
*vitellinae.*
- raphani. 201. Chr. viridis nitens, elytris granulatis, antennarum ulti-  
mis articulis tarsisque nigris. *Herbst apud Fueßli arch.*  
*inf. 4. p. 59. n. 42. t. 23. f. 21.*  
*Habitat Berolini in armoracia.*
- aerofa. 202. Chr. nigra caerulefcenti irrorata, subtus fusca, antennis  
pedibusque nigris, punctorum in elytris seriebus septem.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 60. n. 43. t. 23. f. 22.*  
*Habitat in Pomerania.*
- melano- 203. Chr. caerulea subtus fusca, antennis pedibusque nigris,  
pus. elytrorum punctis sparsis. *Herbst apud Fueßli arch. inf.*  
*4. p. 60. n. 44.*  
*Habitat Berolini, aerofae affinis.*
- japonica. 248. Chr. testacea, thorace livido: margine posteriori pun-  
ctisque 5 nigris, elytris nigro caeruleis. *Hornstedt Schrift.*  
*der berl. Naturf. 8. I. t. 1. f. 1.*  
*Habitat in Japonia, chr. alni magnitudine.*

- malaccen-249. Chr. capite, thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigro-aeneis: margine interiori ferrugineo. *Hornft. Schrift. berl. Naturf. 8. 1. p. 2. t. 1. f. 9.*  
*Habitat in Malacca, Sumatra et Java, marginatae magnitudine.*
- crassipes. 263. Chr. testacea, oculis nigris, elytris vix punctatis, femoribus crassis. *Muf. Lesk. p. 14. n. 277.*  
*Habitat in Europa.*
- janthina. 264. Chr. oblonga, fusco aenea, elytris violaceis: punctorum ordinibus novem, tibiis compressis rufis. *Muf. Lesk. p. 14. n. 286.*  
*Habitat in Europa.*
- bimaculata. 265. Chr. oblonga rufa, elytris testaceis, punctato striatis: maculis duabus oblongis obsolete fulcis. *Muf. Lesk. p. 15. n. 287.*  
 \*\* *saltatoriae, femoribus posterioribus incrassatis:*  
*Alticae.*
- flava. 204. Chr. flava, thorace nigro punctato, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 131. n. 87. mant. inf. 1. p. 75. n. 113.*  
*Fabr. syst. ent. app. p. 821. Altica thoracica.*
- caroliniana. 205. Chr. flavescens, thorace punctis duobus, coleoptris vittis quinque flavis. *Fabr. mant. 1. p. 75. n. 114.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 156. n. 38. Crioceris caroliniana.*  
*Habitat in America boreali.*
- oleracea. 51. Chr. virescenti-caerulea. *Fn. suec. 534. Fabr. sp. inf. 1. p. 133. n. 94. mant. inf. 1. p. 77. n. 126.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 245. a. 1. Scop. ent. carn. 212.*  
*Altica oleracea.*  
*Degeer inf. 5. p. 344. n. 49.*  
*Habitat in Europae plantarum, praesertim tetradynamarum, cotylidionibus, quas misere destruit, nisi forte ante seminationem immorsis seminibus, cineribus herbarum, potissimum tabaci, pollenda.*
- albicolis. 206. Chr. thorace pallido elytris aeneis: maculis duabus fasciisque aureis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 133. n. 95. mant. inf. 1. p. 77. n. 127.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

- fulvicollis. 207. Chr. thorace rufescente, elytris pallidis: futura maculisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 133. n. 96. mant. inf. 1. p. 77. n. 128.*  
*Habitat - - mediae magnitudinis, pallida, capite pedumque geniculis nigris.*
- bicolor. 52. Chr. rufa, elytris femoribusque posterioribus caeruleis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 192. mant. inf. 1. p. 77. n. 124.*  
*Degeer inf. 5. p. 357. n. 12. t. 16. f. 20.*  
*Habitat in America.*  
*Corpus colore et magnitudine chr. polygoni.*
- famelica. 208. Chr. flavescens, elytris viridibus: margine pallida. *Fabr. mant. inf. 1. p. 76. n. 123.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 91. Chrysomela marginata.*
- leucopicta. 209. Chr. nigra, thorace albo, elytris obscure violaceis: punctis quatuor albis; interiori lineari. *Fabr. mant. 1. p. 76. n. 122.*  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- quadri-fasciata. 210. Chr. ferruginea, elytris strigis quatuor albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 76. n. 121.*  
*Habitat in Cayenna, magna.*
- cineta. 211. Chr. nigra, elytris viridi-aeneis: margine punctisque duobus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 90. mant. inf. 1. p. 76. n. 119.*  
*Habitat in Lusitania, magna.*
- equestris. 212. Chr. thorace elytrisque albis: margine baseos fasciaque media ferrugineis. *Fabr. mant. 1. p. 76. n. 118.*  
*Habitat in America, magna.*
- quadri-guttata. 213. Chr. ferruginea, thorace albo, elytris atris: punctis quatuor albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 89. mant. inf. 1. p. 76. n. 117.*  
*Habitat in Cayenna, biguttatae affinis.*
- biguttata. 214. Chr. ferruginea, thorace elytrorumque maculis duabus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 88. mant. inf. 1. p. 76. n. 116.*  
*Habitat in America.*



- glabra- 215. Chr. thorace pallido: punctis tribus nigris, elytris ni-  
ta. gris: vittis duabus albis. *Fabr. mant. I. p. 76. n. 115.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 156. n. 39.* *Crioceris glabrata.*
- nobili- 216. Chr. ferruginea, elytrorum margine fasciaque albis.  
tata. *Fabr. mant. I. p. 76. n. 120.*  
*Habitat in Cayenna, magna.*
- chryso- 53. Chr. atro-caerulea, capite pedibusque quatuor anterioribus  
cephala. luteis. *Fn. suec. 535. Scop. ent. carn. 213.*  
*Habitat in Suecia.*
- hyoscy- 54. Chr. virescenti-caerulea, pedibus testaceis, femoribus po-  
ami. sterioribus violaceis. *Fn. suec. 536.\* Fabr. sp. inf. I. p.*  
*133. n. 97. mant. inf. I. p. 77. n. 129.*  
*Fn. suec. 540. Mordella ovata caerulea nitida, tibiis ferrugineis.*  
*Degeer inf. 5. p. 345. n. 51. Chrysomela ovata saltatoria. &c.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 248. II. Altica caerulea &c.*  
*Raj. inf. 98. 9. Capricornus exiguus saltatorius.*  
*Habitat in Europae hyoscyamo, brassica.*
- quadri- 217. Chr. nigra, coleoptris punctis quatuor rufis. *Fabr. sp.*  
pustulata. *inf. I. p. 135. n. 107. mant. inf. I. p. 77. n. 139.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 250. n. 15.*  
*Habitat in Angliae, Galliae hortis.*
- anglica- 218. Chr. atra, elytris tibiisque pallidis. *Fabr. sp. inf. I.*  
na. *p. 135. n. 106. mant. inf. I. p. 77. n. 138.*  
*Habitat in Angliae plantis.*
- dorsalis. 219. Chr. nigra, thorace elytrorumque margine pallidis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 135. n. 105. mant. inf. I. p. 77. n. 137.*  
*Habitat in Anglia, statura atricillae, an varietas?*
- atricillae. 55. Chr. nigra, thorace, elytris tibiisque testaceis. *Fn.*  
*suec. 537.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 135. n. 104. mant. inf. I. p. 77. n. 136.*  
*Chrysomela saltatoria nigra, thorace elytris cinereis.*  
β) *Chrysomela melanocephala. Degeer inf. 5. p. 348. n. 57.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 251. n. 19.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- erythro- 56. Chr. atro-caerulea, capite geniculisque pedum rufis. *Fn.*  
cephala. *suec. 538.\* Fabr. sp. inf. I. p. 134. n. 103. mant. inf.*  
*I. p. 77. n. 135.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 246. n. 4. Altica nigro-aenea &c.  
Habitat in Europae plantis.*

- Modceri. 57. Chr. aenea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque posterioribus luteis. *Fn. succ. 539.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 134. n. 102. mant. inf. I. p. 77. n. 134.*  
Chryfomela faltatoria viridi-aenea, elytris macula postica pedibusque anticis flavis.  
*Habitat in Europae plantis.*
- helxines. 58. Chr. viridi-aenea, antennis fuscis, pedibus testaceis. *Fn. succ. 543. Fabr. sp. inf. I. p. 134. n. 100. mant. inf. I. p. 77. n. 132.*  
*Fn. succ. 539. Mordella atro-aenea subrotunda.*  
*Degeer inf. 5. p. 345. n. 52. Chryfomela viridi-aurata.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 209. n. 14. Altica aurea, pedibus flavis.*  
*Sulz. hist. inf. 2. 3. f. 12.*  
*Habitat in polygono fagopyro aliisque.*
- exoleta. 59. Chr. ferruginea, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 136. n. 18. mant. inf. I. p. 18. n. 143.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 594. Fn. succ. 541.\* Chryfomela faltatoria livida, elytris testaceis, abdomine capiteque fusco.*  
*Fn. succ. 533. Mordella flava.*  
*Degeer inf. 5. p. 338. n. 42.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 250. n. 16.*  
*Herbst apud Fueslii arch. inf. 7. p. 163. n. 63. t. 44. f. 7. l. m.*  
*Habitat in Europae eebii floribus, quos consumit.*
- nitidula. 60. Chr. viridis nitens, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 134. n. 99. mant. inf. I. p. 77. n. 131.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 594. Fn. succ. 542.\* Chryfomela faltatoria, elytris caeruleis, capite thoraceque aureo, pedibus ferrugineis.*  
*Degeer inf. 5. p. 346. n. 54.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 249. n. 13.*  
*Schaeff. ic. t. 87. f. 5.*  
*Habitat in Europae falice.*
- trifascia. 61. Chr. supra albida, fasciis tribus fuscis. *Fabr. sp. inf. I. p. 134. n. 101. mant. inf. I. p. 77. n. 132.*  
*Habitat in Europae plantis, mediae magnitudinis.*  
*Capitis fascia una, elytrorum duae.*

- nigripes.* 220. Chr. viridi - aenea, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 133. n. 98. *mant. inf.* I. p. 77. n. 130.  
*Habitat in Anglia.*
- tabida.* 221. Chr. pallida oculis nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 136. n. 113. *mant. inf.* I. p. 78. n. 145.  
*Habitat in Angliae plantis.*
- brassicae.* 222. Chr. atra, elytris pallide testaceis: margine omni fasciaque media atris. *Fabr. mant.* I. p. 78. n. 146.  
*Habitat in Germaniae oleribus, parva.*
- nemorum.* 62. Chr. elytris flavis: margine omni nigro. *Fabr. sp. inf.* I. p. 136. n. 114. *mant. inf.* I. p. 78. n. 147.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 595. *Fn. succ.* 543.\* *Scop. ent. carn.* 215.  
Chrysomela faltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis.  
*Fn. succ.* 542. Mordella oblonga atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.  
*Degeer inf.* 5. p. 347. n. 55. Chrysomela fasciata,  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 247. n. 9.  
*Sulz. hist. inf.* t. 3. f. 11.  
*Habitat in pulmonaria, dentaria, cardamine, polyphaga.*
- atra.* 223. Chr. atra nitida, antennarum basi plantisque piceis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 137. n. 15. *mant. inf.* I. p. 78. n. 148.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 247. n. 8.  
*Habitat Hafniae.*
- rustica.* 63. Chr. atra, antennis, pedibus elytrorumque apicibus testaceis,  
*Habitat in Europa, elytris subtilissime punctatis.*
- pulicaria.* 64. Chr. nigra, elytris posterius macula ferruginea.  
*Habitat in Europa, pulicis magnitudine.*
- rufipes.* 65. Chr. caerulea obovata, capite, thorace, pedibus antennisque rufis. *Fn. succ.* 545.\* *Scop. ent. carn.* 212. *Fabr. sp. inf.* I. p. 135. n. 108. *mant. inf.* I. p. 77. n. 140.  
*Degeer inf.* 5. p. 343. n. 47. t. 10. f. 11.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 245. n. 2.  
*Schaeff. ic.* t. 166. f. 5.  
β) Chrysomela africana. *Fabr. sp. inf.* I. p. 135.  
*Habitat in Europae plantis, praesertim malva parviflora,*  
β) major in Africa aequinoctiali.

- fuscipes. 224. Chr. violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 135. n. 109. mant. inf. 1. p. 77. n. 141.*  
*Habitat in Angliae plantis, an varietas rufipedis?*
- testacea. 225. Chr. testacea gibba, elytris laevissimis. *Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 136. n. 110. mant. inf. 1. p. 77. n. 142.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 250. n. 17.*  
*Habitat in Angliae plantis.*
- fascicor- 66. Chr. caerulea obovata, capite, thorace pedibusque rufis, an-  
 nis. tennis fuscis. *Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. 1. p. 8.*  
*n. 9. t. 1. f. 10.*  
*Habitat in Germania, et Java, ad rufipedem proxime acce-*  
*dens, ut paulo major.*
- holfatica. 67. Chr. nigra nitida, elytris apice puncto rubro. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 136. n. 112. mant. inf. 1. p. 78. n. 144.*  
*Habitat in Hollatia frequens, olera devastans.*
- hemi- 68. Chr. suborbiculata depressa nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 137.*  
 sphaerica. *n. 116. mant. inf. 1. p. 78. n. 149.*  
*Degeer inf. 5. p. 348. n. 8.*  
*Habitat in Saxoniae corylo.*
- furina- 69. Chr. flavescens, elytris margine fasciaque sanguineis. *Fabr.*  
 mentis. *sp. inf. 1. p. 137. n. 117. mant. inf. 1. p. 78. n. 150.*  
*Degeer inf. 5. p. 355. n. 10. t. 16. f. 17.*  
*Habitat Surinami.*
- S. litte- 70. Chr. pallida, elytris nigris: linea longitudinali flexuosa  
 ra. alba. *Fabr. sp. inf. 1. p. 137. n. 118. mant. inf. 1. p. 78.*  
*n. 151.*  
*Degeer inf. 5. p. 357. n. 13. t. 16. f. 21.*  
*Habitat Surinami.*
- acquino- 71. Chr. thorace rubro, elytris violaceis: maculis quatuor al-  
 ctialis. bis alternis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 132. n. 93. mant. inf. 1.*  
*p. 77. n. 115.*  
*Degeer inf. 5. p. 356. n. 11. t. 16. f. 19.*  
*Habitat in America meridionali.*

226. Chr.

Chrysomelae saltatoriae plantarum cotyledonibus et tenellis foliis infestae; an huc spe-  
 ctat chrysomela maulica. *Molin. hist. nat. Chil. p. 183. aurata, antennis cae-*  
*ruleis, in umbellis visnagae in provincia Chilensi Maule habitans, muscae ma-*  
*gnitudine?*

- Lens. 226. Chr. tota caeruleo-nigra, elytris punctatis. *Thunberg nov. act. Upf. 4. p. 13. n. 22.*  
*Habitat* Upſaliae glabra, lentis magnitudine.
- exclamationis. 227. Chr. thorace nigro, elytris nigris: maculis quatuor flavis. *Thunb. nov. act. Upf. 4. p. 14. n. 23.*  
*Habitat* Upſaliae, pulice fere minor.
- flavipes. 228. Chr. chalybea, elytris obſolete granulatis, pedibus antennarumque articulis primis luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inf. 4. p. 61. n. 53.*  
*Habitat* Berolini.
- pedicularia. 229. Chr. viridi-aurea, granulata ſubtus nigra, pedibus antennisque fulceſcentibus: articulis extremis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inf. 4. p. 61. n. 54.*  
*Habitat* Berolini, vix pediculi magnitudine.
- minima. 230. Chr. ex atro virens, elytris tenerrime punctatis, antennis exortum fuscis, verſus finem nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inf. 4. p. 61. n. 55.*  
*Habitat* Berolini, pulice dimidio minor.
- tamaricis. 231. Chr. capite nigro, thorace flavo: diſcis macula nigra, elytris glaberrimis ex fulceſcente nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inf. 7. p. 163. n. 64. t. 45. f. 6. g. h.*  
*Habitat* in Aultria.
- fimbriata. 232. Chr. oblonga, capite, thorace quadripunctato, elytrisque pallide teſtaceis linea nigra cinctis, femoribus rufis. *Forſt. nov. inf. gen. p. 25. n. 25.*  
*Habitat* in America ſeptentrionali, magnitudine et ſtatura *cryptocephali capreae*.
- hudsonias. 233. Chr. atra oblongiuſcula, antennarum baſi, ferruginea. *Forſt. nov. inf. ſp. p. 26. n. 26.*  
*Habitat* in America ſeptentrionali, nitens, magnitudine *cryptocephali cyanotae*.
- quadri-notata. 234. Chr. nigra, antennarum baſi flaveſcente, elytrorum maculis quatuor teſtaceis. *Pontoppid. Naturg. Daennem. p. 204. t. 16.*  
*Habitat* in Dania.

1698 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. *Altica*.

- pufilla. 235. Chr. nigra, antennis pedibusque pallidis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 923.*  
*Habitat in Dania.*
- luteola. 236. Chr. lutea, oculis, peñore antennarumque apice nigris.  
*Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 924.*  
*Habitat in Dania.*
- flavcola. 237. Chr. nigra, thorace capiteque rufo, elytris, antennis pedibusque luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 925.*  
*Habitat in Dania.*
- latiuscula. 238. Chr. ex nigro fusca, tibiis tarsisque subluteis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 84. n. 926.*  
*Habitat in Dania.*
- caerulefcens. 239. Chr. viridi-caerulea nitidiffima, thorace laevi, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus nigris. *Degeer inf. 5. p. 346. n. 53.*  
*Habitat in Europa.*
- cyano-picta. 240. Chr. thorace punctato virefcenti-caeruleo, elytris violaceis punctato-friatis, pedibus rufis. *Degeer inf. 5. p. 344. n. 50.*  
*Habitat in Europa.*
- friata. 241. Chr. caerulea, capite, thorace, antennis pedibusque rufis, elytris afriatis. *Degeer inf. 5. p. 343. n. 48.*  
*Habitat in Europa.*
- ferruginea. 242. Chr. ferruginea, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n. 216.*  
β) Chryfomela (lurida) fusco-rufa, abdomine oculisque nigris. *Scop. ent. carn. n. 219.*
- truncata. 243. Chr. nigra, elytris truncatis apice ferrugineis, pedibus antennisque rufis. *Scop. ent. carn. n. 218.*  
*Habitat in Carniola.*
- verficolor. 244. Chr. nigra, elytris nigro-aeneis friatis, thorace rubro. *Geoffr. inf. par. 1. p. 245. n. 3. t. 4. f. 4.* *Altica bicolor.*  
*Habitat in Gallia.*
- ovalis. 245. Chr. nigro-aenea, pedibus nigris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 246. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*

246. Chr.

- crucifera-  
rarum. 246. Chr. nigro-aenea oblonga, pedibus nigris. *Geoffr.*  
*inf. par. 1. p. 246. n. 6.*  
*Habitat in Galliae tetradyamis.*
- ochro-  
pus. 201. Chr. nigra, pedibus rufis, elytris non striatis. *Geoffr.*  
*inf. par. 1. p. 246. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- denigra-  
ta. 248. Chr. nigra, thorace elytrisque flavis: oris nigris. *Geoffr.*  
*inf. par. 1. p. 248. n. 10.*  
*Habitat in Gallia.*
- laevigata. 247. Chr. caerulea, elytris punctis sparsis, tibiis ferrugineis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 249. n. 12.*
- picipes. 266. Chr. viridi-aenea punctata pedibus piccis, elytris spadi-  
ceis futuram versus nigris. *Mus. Lesk. p. 16. n. 324.*  
*Habitat in Europa.*
- concolor. 267. Chr. fusco aenea, elytris striatis, antennis pedibusque  
rufis, femoribus posterioribus fusco-aeneis. *Mus. Lesk.*  
*p. 16. n. 325.*  
*Habitat in Europa.*
- crenata. 268. Chr. nigra, elytris aeneis: striis crenatis antennarum  
basi tibiisque piccis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 331.*  
*Habitat in Europa.*
- discolor. 269. Chr. capite thoraceque nigro, elytris testaceo-fuscis gla-  
bris, pedibus quatuor anterioribus tibiisque posterioribus  
subtestaceis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 332.*  
*Habitat in Europa.*
- annulata. 270. Chr. fusco-aenea, elytris striis crenatis, antennarum  
basi tibiisque quatuor anterioribus rufis: annulo fusco-  
aeneo. *Mus. Lesk. p. 16. n. 333.*  
*Habitat in Europa.*

**CRYPTOCEPHALUS.** *Antennae filiformes.*  
*Palpi quatuor.*  
*Thorax, nec elytra, marginatus.*  
*Corpus subcylindricum.*

\* *palpis aequalibus filiformibus.*

† *maxilla unidentata.*

† *labio integro, cylindrici.*

**longipes.** 1. *Cr. niger; obscurus, elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 137. n. 1. mant. inf. 1. p. 78. n. 1.*

*Laichart. inf. tir. 1. p. 166. n. 1. Clytra longipes. Schaeff. ic. t. 6. f. 3.*

*Habitat in Germaniae, Calabriae corylo, salice.*

**fexmaculatus.** 2. *Cr. niger, thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 138. n. 2. mant. inf. 1. p. 78. n. 2.*

*Habitat in Italia, quadripunctato paulo major.*

**quadripunctatus.** 3. *Cr. niger, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus ferratis. Fabr. sp. inf. 1. p. 138. n. 3. mant. inf. 1. p. 78. n. 3.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 596. n. 76. Fn. suec. 432. Degeer inf. 5. p. 32. t. 10. f. 7. Chrysomela quadripunctata.*

*Scop. ent. carn. 206. Buprestis quadripunctata.*

*Laichart. inf. tir. 1. p. 167. n. 2. Clytra quadripunctata.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 195. t. 3. f. 4. Melolontha coleoptris rubris &c.*

*Schaeff. elem. t. 83. f. 1.*

*ic. t. 6. f. 1. 2. 3.*

*Habitat in Europae corylo frequens.*

*Larva saccata: sacco ovato scabro anterius oblique truncato.*

**quadrinotatus.** 4. *Cr. cyaneo-niger, elytris rubris: maculis duabus cyaneis, antennis brevibus. Fabr. mant. inf. 1. p. 79. n. 4.*

*Habitat in Barbaria, statura quadripunctati, at quadruplo minor.*

5. *Cr.*



- atraxidis. 5. *Cr. niger*, thorace rubro trimaculato, elytris testaceis: maculis tribus nigris, tibiis rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 138. n. 4. mant. inf. I. p. 79. n. 5.*  
*Pall. it. 2. p. 725. n. 68.* *Chrysomela atraxidis.*  
*Habitat in Sibiriae atraxide, magnitudine quadripunctati.*
- lunulatus. 6. *Cr. ater nitidus*, elytris flavis: lunula, fascia punctoque apicis nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 138. n. 5. mant. inf. I. p. 79. n. 6.*  
*Habitat - - - quadripunctato paulo minor.*
- 12maculatus. 7. *Cr. niger*, thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 139. n. 6. mant. inf. I. p. 79. n. 7.*  
*Habitat ad caput bonae spei, lunulati statura et magnitudine.*
- obsitus. 8. *Cr. testaceus*, antennis elytrorumque margine nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 139. n. 7. mant. inf. I. p. 79. n. 8.*  
*Habitat in America meridionali.*
- tridentatus. 9. *Cr. caerulefcens*, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 139. n. 8. mant. inf. I. p. 79. n. 9.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 596. n. 73. Fn. suec. 546.* *Chrysomela tridentata.*  
*Degeer inf. 5. p. 333. n. 36. t. 10. f. 10.* *Chrysomela caerulea nitida &c.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 196. n. 3.* *Melolontha nigro-viridis &c.*  
*Schaeff. ic. t. 77. f. 5.*  
*Habitat in corylo, Lonicera xylosteo, etiam in Calabria. Feminae pedes anteriores elongati.*
- lineatus. 10. *Cr. rufescens*, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 139. n. 9. mant. inf. I. p. 79. n. 10.*  
*Habitat in Brasilia.*
- venustus. 11. *Cr. griseo-fuscus*, thorace margine maculisque duabus flavis, elytris flavis: vittis duabus nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 79. n. 11.*  
*Habitat in America, mediae magnitudinis.*
- Gorte-  
 riae. 12. *Cr. ater glaber*, thorace elytrisque punctis quatuor flavescens. *Fabr. sp. inf. I. p. 139. n. 10. mant. inf. I. p. 79. n. 12.*

Syst.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 74. *Amoen. acad.* 6. p. 394. n. 16.  
*Chrysomela Gorteriae.*

*Habitat in capitibus bonae spei Gorteriis.*

oclo-pun- 13. *Cr. niger*, thorace rufo, elytris testaceis: punctis quatuor  
 ctatus. nigris. *Fabr. mant. inf.* I. p. 79. n. 13.

*Habitat in Barbariae plantis, statura et magnitudine Cr. Gorteriae.*

maxillo- 14. *Cr. capite thoraceque fulvis*, elytris flavis: puncto bascos  
 fus. scutelloque nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 139. n. 11. *mant. inf.* I. p. 80. n. 14.

*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis, antennis ferratis.*

auritus. 15. *Cr. ater*, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 139. n. 12. *mant. inf.* I. p. 80. n. 15.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 75. *Chrysomela aurita.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 7. p. 163. n. 19. t. 44. f. 5. g. h.

*Habitat in Saxoniae corylo, in Calabria.*

didymus. 16. *Cr. rufus*, elytris maculis tribus nigris, anteriore posteriorius didyma. *Fabr. sp. inf.* I. p. 140. n. 13. *mant. inf.* I. p. 80. n. 16.

*Habitat in nova Hollandia.*

quadri- 17. *Cr. rufus*, capitibus basi elytrorumque maculis duabus cyan-  
 maculatus. neis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 140. n. 14. *mant. inf.* I. p. 80. n. 17.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 77. *Fn. suec.* 547.\* *Chrysomela quadrimaculata.*

*Fn. suec.* 432. *Chrysomela oblonga nigra*, colcoptis rubris: maculis quatuor nigris.

*Scop. ent. carn.* 206. *Buprestis quadripunctata.*

*Geoffr. inf. par.* I. p. 195. t. 3. f. 4.

*Pontopp. atl. dan.* I. t. 29.

*Schaeff. ic.* t. 6. f. 6. 7.

*Habitat in Germania, Calabria, abdomine cinereo.*

flavicol- 18. *Cr. niger*, thorace fulvo: punctis sex nigris, elytris pal-  
 lis. lidis: punctis duobus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 140. n. 15. *mant. inf.* I. p. 80. n. 18.

*Habitat in Sibiria, quadrimaculato proxime affinis.*

19. *Cr.*

- longimanus.** 19. *Cr. obscure aeneus, elytris testaceis: puncto baseos nigro.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 140. n. 16. mant. inf. 1. p. 80. n. 19. Syst. nat. XII. 2. p. 599. n. 95. Fu. suec. 562. Pall. it. 2. app. n. 67?* *Chrysomela longimana.*  
*Habitat in Europae borealis trifolio montano, euphorbia cyparissia, tridentato affinis, sed minor, pedibus anterioribus in altero sexu longissimis.*  
*Larva saccata.*
- Lar.** 20 *Cr. rufus, elytris fuscis cyaneis nitidis, pedibus anterioribus elongatis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 80. n. 20.*  
*Habitat in America meridionali, mediae magnitudinis.*
- marginatus.** 21. *Cr. nigro-aeneus, elytris flavis: margine nigro.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 140. n. 17. mant. inf. 1. p. 80. n. 21. Schaller Abb. der hall. Nat. Gef. 1. p. 276.* *Chrysomela phalerata.*  
*Habitat in Germania, longimano affinis.*
- hirsutus.** 22. *Cr. thorace elytrisq. obscure aeneis pubescentibus.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 141. n. 18. mant. inf. 1. p. 80. n. 22.*  
*Habitat in America boreali.*
- bipunctatus.** 23. *Cr. niger nitidus, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 141. n. 19. mant. inf. 1. p. 80. n. 23.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 234. n. 1. t. 4. f. 3.* *Cryptocephalus niger &c.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 597. n. 78. Fu. suec. 548.* *Chrysomela bipunctata.*  
*Uddm. diss. 22.* *Chrysomela atra, elytris rubris, punctis 4 nigris.*  
*Petiv. gaz. t. 31. f. 4.*  
*Degeer inf. 5. p. 332. n. 35.*  
( $\beta$ ) *Uddm. diss. 21.* *Chrysomela nigra, elytris rubris, macula nigra longitudinali.*  
*Gadd diss. 25.* *Callida nigra, elytris flavis nitidis, maculis quatuor nigris &c.*  
*Habitat in Europae borealis corylo.*
- bimaculatus.** 24. *Cr. niger obscurus, thorace fulvo, elytris testaceis: punctis duobus nigris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 141. n. 120. mant. inf. 1. p. 80, n. 24.*

Schaller

*Schaller Abb. der hall. Nat. Gef. I. p. 274.* *Chryfomela melanocephala.*

*Habitat in Italia et Saxonia.*

cordiger. 25. *Cr. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 141. n. 21. mant. inf. I. p. 80. n. 25.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 235. n. 7. Cryptocephalus niger.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 91. Fn. suec. 558. Chryfomela cordigera.*

*Uddm. diff. 23. Chryfomela nigra, elytris subflavis, punctis quatuor nigris.*

*Degeer inf. 5. p. 330. n. 33.*

*Schaeff. ic. t. 30. f. I.*

*Habitat in Europae corylo, salice, thoracis macula media interdum cordata.*

bothnicus. 26. *Cr. ater, thorace linea longitudinali rubra. Fabr. sp. inf. I. p. 142. n. 22. mant. inf. I. p. 80. n. 26.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 90. Fn. suec. 557. Chryfomela bothnica.*

*Degeer inf. 5. p. 335. n. 39. Chryfomela cylindrica nigra &c.*

*Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 164. n. 21. t. 44. f. 8. n. o.*

*Habitat in Suecia, cum decempunctato copula interdum connexus.*

vitis. 27. *Cr. niger glaber, elytris rufis. Geoffr. inf. par. I. p. 233. n. 2. Fabr. sp. inf. I. p. 142. n. 23. mant. inf. I. p. 81. n. 27.*

*Habitat in Europae magis australis vite vinifera, quam misere aliquando devastat.*

coryli. 28. *Cr. niger, thorace elytrisque testaceis immaculatis. Fabr. sp. inf. I. p. 142. n. 24. mant. inf. I. p. 81. n. 28.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 88. Fn. suec. 555.\* Chryfomela coryli.*

*Habitat in Europae corylo.*

pallens. 29. *Cr. niger, thorace, elytris tibiisque pallidis. Fabr. mant. I. p. 81. n. 29.*

*Habitat in Sina, Cr. coryli proxime affinis.*

variegatus. 30. *Cr. niger, thorace linea dorsali abbreviata marginibusque rubris, elytris testaceis. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 497. mant. inf. I. p. 81. n. 31.*

*Habitat in Italia, statura cr. coryli.*

31. *Cr.*

- trifascia- 31. Cr. supra testaceus, thorace fascia, elytris tribus atris.  
tus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 81. n. 31.*  
*Habitat in Sina, statura et magnitudine cr. coryli.*
- ruficollis. 32. Cr. niger, thorace rufo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.*  
*1. p. 142. n. 25. mant. inf. 1. p. 81. n. 32.*  
*Habitat in insula S. Helenae.*
- nigripes. 33. Cr. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice  
nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 142. n. 26. mant. inf. 1. p. 81.*  
*n. 33.*  
*Habitat in America boreali.*
- sexpun- 34. Cr. niger, thorace variegato, elytris rubris: maculis tri-  
ctatus. bus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 142. n. 27. mant. inf. 1.*  
*p. 81. n. 34.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 599. n. 92. Fn. suec. 559.\* Chryso-*  
*mela sexpunctata.*  
*Degeer inf. 5. p. 331. n. 34. t. 10. f. 9. Chrysomela ru-*  
*bra &c.*  
*Scop. ent. carn. 208. Buprestis sexpunctata.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 18.*  
*Schaeff. ic. t. 90. f. 1-3.*  
*Habitat in Europae borealis corylo, etiam in Calabria.*
- caeruleus. 35. Cr. cyaneus nitidus, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 143.*  
*n. 28. mant. inf. 1. p. 81. n. 35.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, oblongus.*
- eupreus. 36. Cr. rubro-cupreus nitidus subtus cyaneus. *Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 81. n. 36.*  
*Habitat in Cayenna, calcarati statura et magnitudine.*
- rubri- 37. Cr. cyaneus nitidus, fronte, thoracis fascia, femoribus-  
frons. que rubris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 81. n. 37.*  
*Habitat - - - statura calcarati. Leske.*
- calcara- 38. Cr. violaceus, capite, thorace femoribusque dentatis rufis.  
tus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 143. n. 29. mant. inf. 1. p. 82. n. 38.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- sapphiri- 39. Cr. cyaneus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1.*  
nus. *p. 143. n. 30. mant. inf. 1. p. 82. n. 39.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 197. n. 4. Melolontha caerulea, tho-*  
*race pedibusque ferrugineis.*  
*Habitat in Gallia.*

- cinctus.** 40. *Cr. capite thoraceque rufis, elytris nigris: margine rufis.*  
*Fabr. mant. inf. I. p. 82. n. 40.*  
*Habitat in America meridionali, sapphirini statura, sed triplo minor.*
- bucephalus.** 41. *Cr. cyaneus, ore, thoracis marginibus pedibusque rubris.*  
*Fabr. mant. inf. I. p. 82. n. 41.*  
*Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 276. Chryfomela bucephala.*  
*Habitat in Saxoniae anthyllide vulneraria.*
- collaris.** 42. *Cr. cyaneus nitidus, thoracis lateribus, elytrorum apicibus femoribusque rubris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 143. n. 31.*  
*mant. inf. I. p. 82. n. 42.*  
*Habitat in Sibiria, sericeo major.*
- sericeus.** 43. *Cr. viridi-caeruleus antennis nigris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 143. n. 32.*  
*mant. inf. I. p. 82. n. 43.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 233. n. 3. Cryptocephalus viridicaeruleus sericeus.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 86. Fn. suec. 554. Chryfomela sericea.*  
*Degeer inf. 5. p. 334. n. 37.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 13.*  
*Habitat in Europae salicibus, rarius tota aenea.*
- nitens.** 44. *Cr. viridis nitens, ore pedibusque testaceis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 144. n. 33.*  
*mant. inf. I. p. 82. n. 44.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 598. n. 84. Fn. suec. 551. Chryfomela nitens.*  
*Degeer inf. 5. p. 334. n. 38.*  
*Habitat in Europae salice.*
- glabratus.** 45. *Cr. violaceus, thorace elytrisque aeneis, antennis fulcis.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 144. n. 34.*  
*mant. inf. I. p. 82. n. 45.*  
*Habitat in Brasilia.*
- leuadrum.** 46. *Cr. ater, elytris flavis: vitta media abbreviata atra.* *Fabr. sp. inf. I. p. 144. n. 35.*  
*mant. inf. I. p. 82. n. 46.*  
*Habitat in Germania.*
- vittatus.** 47. *Cr. niger, elytris margine striaque abbreviata flava.* *Fabr. sp. inf. I. p. 144. n. 36.*  
*mant. inf. I. p. 82. n. 47.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 233. n. 4.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 62. n. 10. t. 23. f. 23.*  
*Habitat in Europae magis australis graminosis.*

48. *Cr.*

- limbatus*. 48. *Cr. ferrugineus*, thorace rufo, elytrorum futuris cyaneo-nitidis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 498. *mant. inf.* 1. p. 82. n. 48.  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- Moraei*. 49. *Cr. ater*, elytris maculis duabus flavis marginalibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 144. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 82. n. 49.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 234. n. 5. *Cryptocephalus niger* &c. *Syst. nat.* XII. 2. p. 597. n. 82. *Fu. suec.* 550. *Chrytomela Moraei*.  
*Scop. ent. carn.* 202. *Buprestis Moraei*.  
*Uddm. diff.* 28. *Cassida nigra nitida*, clypeo caput fere integrum tegente, macula ad apicem et basin elytrorum lutea, *Schaeff. ic. t.* 30. f. 5.  
*Habitat in Europae hypericonibus.*
- octoguttatus*. 50. *Cr. ater*, elytris maculis quatuor flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 82. n. 50.  
*Habitat in Saxoniae fraxino, magnitudine cr. Moraei.*
- 15guttatus*. 51. *Cr. rufus*, thorace maculis tribus, elytris sex flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 144. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 51.  
*Habitat in Brasilia.*
- decempunctatus*. 52. *Cr. capite thoraceque variegatis, coleoptris flavis: punctis decem nigris.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 145. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 52. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 7. t. 45. f. 4. a. b.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 599. n. 93. *Fu. suec.* 561. *Chrytomela decemmaculata*.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 7. p. 64. n. 18. t. 43. f. 26. c. *Cryptocephalus hieroglyphicus?*  
*Habitat in Europa.*
- bipustulatus*. 53. *Cr. ater*, elytris macula apicis rufa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 145. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 53.  
*Laichart. inf. tir.* 1. p. 197. n. 7. *Cryptocephalus Podae*.  
*Schaeff. ic. t.* 77. f. 7.  
*Habitat in Europae chrysanthemo coronario.*
- bifasciatus*. 54. *Cr. rufus*, thorace maculis duabus, elytris fasciis duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 145. n. 41. *mant. inf.* 1. p. 83. n. 54.  
*Habitat in Africa aequinoctiali.*

- quadripu- 55. *Cr. niger*, elytris laevibus rufo bimaculatis. *Fabr. sp. inf.*  
flulatus. I. p. 145. n. 43. *mant. inf.* I. p. 83. n. 55.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 597. n. 80. *Fn. suec.* 549.\* *Chrysome-*  
*la quadripustulata.*  
*Habitat in Sueciae nemoribus.*
- notatus. 56. *Cr. niger*, elytris punctato-friatis: fascia puncto-que api-  
cis testaceis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 83. n. 56.  
*Habitat in America, parva, immaculata.*
- Histrio. 57. *Cr. niger*, thorace elytris-que ferrugineo-variegatis, pe-  
dibus ferrugineis: geniculis nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p.  
145. n. 43. *mant. inf.* I. p. 83. n. 57.  
*Habitat in Italia, magnitudine Cr. Scopolii.*
- Scopoli. 58. *Cr. niger*, thorace rufo, elytris rufis: fasciis duabus cya-  
neis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 145. n. 44.  
*mant. inf.* I. p. 83. n. 58.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 597. n. 81. *Chrysome-*  
*la Scopolina.*  
*Habitat in Europa australi et America, mediae magnitudinis.*
- Koenigii. 59. *Cr. rufus*, elytris punctis duobus caeruleis. *Fabr.*  
*sp. inf.* I. p. 146. n. 45. *mant. inf.* I. p. 83. n. 59.  
*Habitat in Tranquebariae, ad Cr. Scopoli proxime accedens.*
- Paracen- 60. *Cr. elytris flavis: lineola punctisque tribus nigris.* *Fabr.*  
thesis. *sp. inf.* I. p. 146. n. 46. *mant. inf.* I. p. 83. n. 60.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 1066. n. 1. *Chrysome-*  
*la Paracenthesis.*  
*Habitat in Europae salice, betula, supra flavus, thorace*  
*nigro variegato.*
- hordei. 61. *Cr. aeneus nitidus*, fronte cuprea. *Fabr. mant. inf.* I.  
p. 83. n. 61.  
*Habitat in Barbariae hordeo marino, parvus, antennis ser-*  
*ratis.*
- pini. 62. *Cr. testaceus*, elytris pallidis, antennis fulcis. *Fabr. sp.*  
*inf.* I. p. 146. n. 47. *mant. inf.* I. p. 84. n. 62.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 89. *Fn. suec.* 556.\* *Chrysome-*  
*la pini.*  
*Habitat in Sueciae pino.*
- reticula- 63. *Cr. thorace elytris-que albis, testaceo reticulatis.* *Fabr.*  
tus. *mant. inf.* I. p. 84. n. 63.  
*Habitat in Cayenna, parvus.*



- pufillus*. 64. Cr. thorace fulvo, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 146. n. 48. *mant. inf.* 1. p. 84. n. 64.  
*Habitat* Hamburgi.
- nitidulus*. 65. Cr. thorace aeneo nitido, elytris cyaneis, capite, antennarum basi pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 84. n. 65.  
*Habitat in* Russia meridionali, *labiato major*.
- labiatus*. 66. Cr. ater nitidus, ore, pedibus basique antennarum lutescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 146. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 84. n. 65.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 87. *Fn. suec.* 553.\* *Chrysomela labiata*.  
*Habitat in* Europae *rossis*.
- flavilabris*. 67. Cr. obscure aeneus nitidus, ore lutescente, antennibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 84. n. 67.  
*Müll. prodr. zool. dan.* n. 519.  
*Geoffr. inf. par.* 1. n. 8.  
*Habitat in* Saxoniae *betula*, *labiato affinis*, at *elytra striatopunctata*.  
*Larva succata*.
- flavipes*. 68. Cr. ater nitidus, capite pedibusque luteis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 146. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 84. n. 68.  
*Habitat in* Italia, *labiato affinis*, at *quadruplo major*.
- cyaneus*. 69. Cr. ex fulco cyaneus, thorace laevi marginato, antennis nigris.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 596. n. 72. *Chrysomela cyanea*.  
*Habitat in* America, *magnitudine chrysomelae graminis*.
- bilineatus*. 70. Cr. niger, elytris lineis duabus flavescens, pedibus ferrugineis.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 597. n. 83. *Chrysomela bilineata*.  
*Habitat in* Europa, *minutus*.
- Barbareae*. 71. Cr. antennis basi oreque ferrugineis.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 598. n. 85. *Fn. suec.* 552.\* *Chrysomela barbareae*.  
*Habitat in* Erysimi *barbareae floribus*; *an varietas labiati?*
- glaucocephalus*. 72. Cr. niger nitidus, capite pedibusque flavis, thorace elytrisque anterieus albo-marginatis.  
*Schaller Abb. der holl. Naturf. Gef.* 1. p. 277. *Chrysomela glaucocephala*.

*Habitat* Halae, *ravior in betula, statura et magnitudine cr. Moraei.*

- biguttatus. 73. *Cr. niger, capite, apicibus clytrorum pedibusque flavis. Schranck enum. inf. austr. n. 169? Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 278. Chrysomela biguttata. Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 163. n. 20. t. 44. f. 6. i. k? Habitat ravior Halae Saxonum, magnitudine chrysomelae nemorum.*
- Martinius. 74. *Cr. caeruleus nitidus, elytris rubris. Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 278. Chrysomela Martinia. Habitat in Malabar, statura et magnitudine ad quadripunctatum accedens.*
- cassimilis. 75. *Cr. ex caeruleo niger, capitis maculis duabus, pedibus anterioribus antennisque flavis. Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 63. n. 13. Habitat Berolini, labiato similis, sed major.*
- ornatus. 76. *Cr. niger, capitis macula biloba fulva, thoracis linea et margine flavis. Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 63. n. 15. t. 23. f. 24. Habitat - - - labiato similis, at major.*
- peregrinus. 77. *Cr. niger glaberrimus, capite, thorace elytrisque caeruleis. Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 63. n. 16. t. 23. f. 25. Habitat in India, 5 lineas longus.*
- laticlavus. 78. *Cr. niger, capite, thorace elytrisque rufis, sutura et margine clytrorum nigris, antennis ferratis. Forst. nov. inf. spec. 27. n. 27. Chrysomela laticlavia. Habitat in America septentrionali, sericci magnitudine.*
- viridans. 79. *Cr. viridis, elytris marginatis. Lepech. it. I. p. 312. t. 20. f. 6. Chrysomela obscure viridis. Habitat in Russia australi.*
- octonotatus. 80. *Cr. thorace elytrisque flavis: singulis punctis quatuor nigris. Lepech. it. 2. p. 207. t. 11. f. 19. Chrysomela octopunctata. Habitat in Russia australi.*

- sext-notatus*. 81. *Cr. niger*, thoracis margine rufo, elytrorum punctis duobus maculisque quatuor nigris.  
*Lepech. it. 2. p. 207. t. 10. f. 14.* *Chryfomela sexpunctata*.  
*Habitat in Russia australi.*
- Mülleri*. 82. *Cr. niger villosus*, elytris punctis duobus rubris.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 58. n. 511.* *Chryfomela bimaculata*.  
*Habitat in Dania.*
- muscifor-mis*. 83. *Cr. viridi-caeruleus*, thorace rubro: macula caerulea, tibiis ferrugineis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 197. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*
- Vibex*. 84. *Cr. niger*, elytris rubris striatis: maculis quatuor limboque nigris.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 234. n. 6. t. 4. f. 3.*  
*Habitat in Gallia.*
- livens*. 85. *Cr. ex caeruleo violaceo punctato-striatus*, antennarum basi maculaque oris pallida.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 58. n. 519.* *Cryptocephalus parvulus*.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 235. n. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- punctatus*. 86. *Cr. caeruleus sparsim punctatus*, tibiis anterioribus ferrugineis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 236. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- parisinus*. 87. *Cr. niger striatus*, pedibus rufis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 236. n. 10.*  
*Habitat in Gallia.*
- rufipes*. 88. *Cr. niger striatus*, thorace pedibusque rufis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 236. n. 11.*  
*Habitat in Gallia.*
- fulvus*. 89. *Cr. capite thoraceque fulvo*, elytris pallidis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 237. n. 12.*  
*Habitat in Gallia.*
- ferruginosus*. 90. *Cr. niger nitidus* antennis corpore duplo longioribus, elytris apice macula lutea.

*Schranck Beytr. z. Naturg. p. 64. §. 7. Chrysomela ferrugata.*  
*Poda mus. Graec. p. 38. sp. 9.*  
*Habitat in Germania superiore.*

- multicolor. 246. *Cr. elytris flavis: fasciis duabus coccineis.*  
*Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. I. p. 3. n. 3. t. I. f. 6. Chry-*  
*somela bifasciata.*  
*Habitat in Java, magnitudine chrysomelae vulgatissimae,*  
*thorace rubro, abdominis apice nigro.*
- sumatranus. 247. *Cr. elytris luteis: macula in medio castanea.*  
*Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. I. p. 4. n. 4. t. I. f. 4. Chry-*  
*somela bimaculata.*  
*Habitat in Sumatra, rarior in Java, magnitudine chryso-*  
*melae vulgatissimae.*
- coffeaec. 248. *Cr. thoracis sulco transverso, abdomine viridi, elytris*  
*flavescentibus. Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. I. p. 5.*  
*n. 5. t. I. f. 7.*  
*Habitat in Bantam in hortis, in quibus coffea colitur, hujus*  
*orillos magnitudine, facie, colore referens.*
- orientalis. 249. *Cr. flavus, thorace rufo: sulco transverso, elytris nigro*  
*caeruleis. Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. I. p. 5. n. 6.*  
*t. I. f. 3.*  
*Habitat in Malacca, Java, aliisque oceani indici insulis,*  
*cr. phallandrii magnitudine.*
- batavien- 250. *Cr. capite, thorace, elytris pedibusque lividis. Hornst.*  
*sis. Schr. berl. Naturf. 8. I. p. 6. n. 7. t. I. f. 12.*  
*Habitat in Java, magnitudine chr. nymphaeae; an hujus ge-*  
*neris et tribus?*
- javanus. 251. *Cr. ater, thorace elytrisque rubris nigro-maculatis, an-*  
*tennis nigris basi rufescentibus.*  
*Hornst. Schr. berl. Naturf. 8. I. p. 7. n. 8. t. I. f. 2. 5. 8. II.*  
*Chrysomela cryptocephala.*  
*Habitat in Java, punctati magnitudine et facie; an idem*  
*cum 10maculato?*
- cyanoc- 252. *Cr. capite, thoracis margine, elytris femorum basi et*  
*phalus. apice violaceis, vertice et thorace coccineis. Mus. Lesk.*  
*p. 15. n. 298. b.*  
*Habitat extra Europam.*

- flavifrons*. 253. *Cr. ater nitidus*, fronte, ore, pedibus, antennarum basi elytrorumque margine lutescentibus. *Mus. Lesk. p. 15. n. 306.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscatus*. 254. *Cr. fuscus*, capite thorace elytrisque violaceis: his profunde punctatis. *Mus. Lesk. p. 15. n. 310.*  
*Habitat in Europa.*
- ochrocephalus*. 255. *Cr. niger*, capite anteriori, elytrisque flavis: his guttis quatuor punctoque apicis nigris. *Mus. Lesk. p. 15. n. 312.*  
*Habitat in Europa, thorace flavo, maculis utrinque 2 connatis.*
- futuralis*. 256. *Cr. ater glaber*, elytris flavis: futura vittaque atra apice connata. *Mus. Lesk. p. 16. n. 314.*  
*Habitat in Europa.*
- chryso-* 257. *Cr. ater glaber*, elytris punctato-striatis, capite, elytrorum apicibus pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 315.*  
*pus.*  
*Habitat in Europa.*
- †† *labio bifido, oblongi, Cistelae.*
- Gigas*. 91. *Cr. villosus fuscus*, elytris, abdomine femoribusque testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 84. n. 1.*  
*Habitat in Gallia magis australi, praegrandis.*
- cervinus*. 92. *Cr. lividus*, pedibus fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 146. n. 1. mant. inf. 1. p. 85. n. 2.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 115. Fn. suec. 575. Chryso-*  
*mela cervina.*  
*Habitat in Europa boreali, etiam in Calabria.*
- cinereus*. 93. *Cr. lividus*, elytris pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 146. n. 2. mant. inf. 1. p. 85. n. 3.*  
*Habitat in Italia, cervino proxime affinis, an varietas?*
- lividus*. 94. *Cr. lividus*, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 146. n. 3. mant. inf. 1. p. 85. n. 4.*  
*Habitat in terra del fuego, cinereo affinis, at duplo minor.*
- ceram-* 95. *Cr. ater*, thorace anteriori angustato, elytris striatis testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 4. mant. inf. 1. p. 85. n. 5.*  
*boides.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 17. Fn. suec. 576. Chrylomela*  
*ceramboides.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 354. n. 3.* *Mordella nigra* &c.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 64. n. 1. t. 23. f. 27.*  
*Habitat in Europa boreali, et Calabria, thorace rarius testaceo.*

rusticaris. 96. *Cr. ater*, thorace quadrato, elytris striatis testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 85. n. 6. Lesk. ir. 1. p. 15. n. 5. t. A. f. 4.*  
*Habitat in Europae magis australis spicis secalinis, ceram- boidi affinis.*

testaceus. 97. *Cr. niger*, thorace, elytris et abdomine testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 5. mant. inf. 1. p. 85. n. 7.*  
*Habitat in chrysanthemo, sambuco, aliisque Barbariae plantis, polyphaga.*

fulphureus. 98. *Cr. flavus*, elytris sulphureis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 6. mant. inf. 1. p. 85. n. 8.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 114.* *Chrysomela sulphurea.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 351. n. 11.* *Tenebrio luteus.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 64. n. 2. t. 23. f. 28.*  
*Habitat in Europae umbellatarum floribus.*

rubricollis. 99. *Cr. ater*, thorace ferrugineo, elytris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 7. mant. inf. 1. p. 85. n. 9.*  
*Habitat in Europae santolina, statura et magnitudine sulphureae.*

caerulef-cens. 100. *Cr. ater*, elytris striatis caerulefcentibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 85. n. 10.*  
*Habitat in Barbariae plantis, rubricollis statura et magnitudine.*

nalis. 101. *Cr. rufescens*, antennis, macula elytrorum anoque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 8. mant. inf. 1. p. 85. n. 11.*  
*Habitat Tranquebariae, macula elytrorum interdum duplici.*

varians. 102. *Cr. testaceus*, oculis nigris, elytris substriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 85. n. 12.*  
*Habitat Halae Saxonum, murinae proxime affinis, at paulo major, antennis pedibusque interdum testaceis.*

murinus. 103. *Cr. niger*, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 9. mant. inf. 1. p. 85. n. 13.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 118. En. succ. 577.* *Chrysomela murina.*

*Geoffr.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 355. n. 4. Mordella nigra &c.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 64. n. 3. t. 23. f. 29.*  
*Habitat in Europa boreali.*

- humeralis. 104. *Cr. niger, elytris puncto baseos ferrugineo. Fabr. mant. inf. 1. p. 85. n. 141.*  
*Habitat Halae Saxonum, parvus.*
- Morio. 105. *Cr. niger obscurus, pedibus testaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 86. n. 15.*  
*Habitat in Suecia, parvus, oblongus, angustus, villosus.*
- angustatus. 106. *Cr. thorace elytrisque obscure rufis medio nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 10. mant. inf. 1. p. 86. n. 16.*  
*Habitat in Anglia, murini statura, sed angustior.*
- pallidus. 107. *Cr. pallidus, capite elytrorumque apicibus fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 11. mant. inf. 1. p. 86. n. 17.*  
*Habitat in Anglia.*
- aeruginosus. 108. *Cr. flavus, capite pectoreque nigris, elytris viridibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 12. mant. inf. 1. p. 86. n. 18.*  
*Habitat in Africae plantis.*
- festivus. 109. *Cr. ferrugineus, elytris cyaneo-viridibus: margine ferrugineo. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 13. mant. inf. 1. p. 86. n. 19.*  
*Habitat ad caput bonae spei, parvus.*
- aulicus. 110. *Cr. ater, thorace rufo, elytris cyaneis. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 14. mant. inf. 1. p. 86. n. 20.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- innubus. 111. *Cr. niger, thorace rufo, elytris nigris: margine vittaeque luteis. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 15. mant. inf. 1. p. 86. n. 21.*  
*Habitat in America.*
- americanus. 112. *Cr. thorace flavo, elytris pallidis: vitta media nigra. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 16. mant. inf. 1. p. 86. n. 22.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- quinquevittatus. 113. *Cr. testaceus, elytrorumque marginibus vittaeque media nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 148. n. 17. mant. inf. 1. p. 86. n. 23.*  
*Habitat in America boreali.*

- hirtus.** 114. *Cr. hirtus*, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 149. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 86. n. 24.  
*Habitat ad caput bonae spei, ad lagrias accedens.*
- sexlineatus.** 115. *Cr. ferrugineus*, elytris flavis: lineolis tribus nigris.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 149. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 86. n. 25.  
*Habitat - - -*
- minutus.** 116. *Cr. niger*, elytris pubescentibus pedibusque griseis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 149. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 86. n. 26.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 593. n. 50. *Fn. suec.* 533.\* *Chrysomela minuta.*  
*Habitat in Europae plantis aquaticis, dytici facie.*
- lepturoides.** 117. *Cr. obscure aeneus*, antennis plantisque ferrugineis. *Forst. nov. inf. sp.* 1. p. 30. n. 30.  
*Habitat in Noveboraco, leptura melanura major.*
- alpinus.** 118. *Cr. niger nitens*, elytris castaneis rugosis: sutura nigra.  
*v. Moll naturh. Br. üb. Oestr. &c. vol.* 1. p. 49.  
*Habitat in alpinis Salzburgicis.*
- Luperus.** 119. *Cr. niger*, elytris virenti nitentibus, pedibus antennarumque longarum articulo primo fulvis, ultimo palporum praegrandi cordato. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 65. n. 4. t. 23. f. 30.  
*Sulz. hist. inf.* t. 3. f. 15.  
*Schaeff. elem.* t. 80.  
*Habitat in Germania, an hujus tribus?*
- betulae.** 120. *Cr. niger*, thorace suborbiculato piloso, elytris fuscescentibus obsolete striatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 65. n. 5. t. 23. f. 31.  
*Habitat Berolini, 5 fere lineas longus.*
- reppensis.** 121. *Cr. niger*, thorace anterieus angustato, posterius dilatato, elytris laevibus pedibusque fulcis. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 65. n. 6. t. 23. f. 32.  
*Habitat rarior in Marchia, 2 circiter lineas longus.*
- strigofus.** 122. *Cr. rubescens*, abdomine nigro, fronte duabus, thorace tribus, elytrisque quatuor fasciis nigris.  
*Sulz. hist. inf.* t. 3. f. 16.  
*Habitat - - - an hujus tribus?*



- Forsteri. 240. Cr. subvillosus fuscus, fasciis longitudinalibus nigricantibus interruptis.  
*Forst. nov. inf. sp. I. p. 12. n. 12.* *Cistela fasciata.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 116. t. 1. f. 8.*  
*Schaeff. ic. t. 95. f. 3.*  
*Habitat in Europae arena, obovatus, chrysomelae politae magnitudine.*
- pustulatus. 241. Cr. niger ovatus, macula elytrorum rufa undata. *Geoffr. inf. par. I. p. 116. n. 2.*  
*Forst. nov. inf. sp. I. p. 13. n. 13.*  
*Habitat in Europae arena, magnitudine chrysomelae fastuosae.*
- denigratus. 242. Cr. totus niger nitens glaber.  
*Forst. nov. inf. sp. I. p. 14. n. 14.* *Cistela nigra.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 117. n. 3.*  
*Habitat in Europae arena, pustulato minor.*
- quadrifasciatus. 243. Cr. obovatus niger, elytris striatis.  
*Forst. nov. inf. sp. I. p. 15. n. 15.* *Cistela striata.*  
*Habitat in Angliae arena, statura et magnitudine cr. Forsteri.*
- holosericeus. 244. Cr. ovatus, fusco-viridis, elytrorum fasciis longitudinalibus interruptis. *Forst. nov. inf. sp. I. p. 16. n. 16.*  
*Habitat in Europae arena, magnitudine denigrati.*
- capucinus. 258. Cr. ferrugineus, capite, thorace elytrisque fuscis: his crenato-striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 335.*  
*Habitat in Europa.*
- conspersus. 259. Cr. supra polline luteo, subtus argenteo conspersus, antennis fuscis, pedibus fusco ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 16. n. 337.*  
*Habitat in Europa, curculionis facie.*
- fulphureatus. 260. Cr. fuscus, antennis elytris pedibusque sulphureis, plantis fuscis. *Mus. Lesk. p. 17. n. 338.*  
*Habitat in Europa, statura sulphurei, an varietas?*
- truncatus. 261. Cr. fuscus, elytris laevibus, antennis pedibusque flavo-rufescentibus, thorace posterius truncato. *Mus. Lesk. p. 17. n. 339.*  
*Habitat in Europa.*

brunneus. 262. Cr. brunneus, abdomine fusco, elytris laevibus. *Musl. Lesk. p. 17. n. 340.*  
*Habitat in Europa.*

rufitarsis. 268. Cr. oblongus, corpore capite antennis pedibusque nigro-aeneis pilosis, elytris testaceis punctatis, tarsis rufis. *Lesk. it. p. 15. t. A. f. 4.*  
*Habitat in Lusatiae monte Keulenberg.*

†† *maxilla bifida, oblongi, Criocerides.*

trilobus. 123. Cr. capite thoraceque flavescens nigro-maculatis, elytris griseis, corpore nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 149. n. 1. mant. inf. 1. p. 86. n. 1.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus niger.*

Lincola. 124. Cr. griseus, thorace linea dorsali, elytris puncto baseos nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 149. n. 2. mant. inf. 1. p. 86. n. 2.*  
*Habitat in Italia, statura Cr. nymphaeae.*

nymphaeae. 125. Cr. fuscus, elytrorum margine prominulo flavescente. *Fabr. sp. inf. 1. p. 150. n. 3. mant. inf. 1. p. 86. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 99. Fn. suec. 565. Chrysomela nymphaeae.*  
*Degeer inf. 5. p. 326. n. 31. t. 20. f. 1. 2. Chrysomela ovata nigro-fulca.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 254. n. 4. Galleruca pallida &c.*  
*Habitat in Europae nymphaeis, tardus.*

capreae. 126. Cr. thorace nigro-maculato elytris griseis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 150. n. 4. mant. inf. 1. p. 86. n. 4.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 100. Fn. suec. 516. Chrysomela capreae.*  
*Degeer inf. 5. p. 325. n. 30. Chrysomela grisea alni.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 254. n. 5. Galleruca nigra &c.*  
*Fn. suec. 1. n. 424. Chrysomela nigra, thorace elytris griseis.*  
*Habitat in Europae salicibus.*

atratus. 127. Cr. pallidus, elytrorum omni margine atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 150. n. 5. mant. inf. 1. p. 86. n. 5.*  
*Habitat Tranquebariae.*

palliatus. 128. Cr. luteus, elytris nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 87. n. 6.*  
*Schall. Abb. hall. Nat. Gef. 1. p. 279. Chrysomela oblonga lutea, oculis elytris nigris.*  
*Habitat Tranquebariae.*

129. Cr.

- calmari- 129. *Cr. ovatus cinereus*, elytris vitta lineolaque bascos nigris.  
 ensis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 150. n. 6. mant. inf. 1. p. 87. n. 7.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 101. Chrysomela calmariensis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 253. n. 3. Galleruca pallida &c.*  
*Habitat in Europae salice, alno.*
- abdomi- 130. *Cr. flavus*, antennis abdomineque fuscis, ano flavo. *Fabr.*  
 nalis. *sp. inf. 1. p. 151. n. 7. mant. inf. 1. p. 87. n. 8.*  
*Habitat in India, et ad caput bonae spei.*
- sapensis. 131. *Cr. niger*, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 151.*  
*n. 8. mant. inf. 1. p. 87. n. 9.*  
*Habitat ad caput bonae spei, minor, opacus.*
- sangui- 132. *Cr. ovatus rufus*, antennis oculisque nigris. *Fabr. sp.*  
 neus. *inf. 1. p. 151. n. 9. mant. inf. 1. p. 87. n. 10.*  
*Habitat Halae Saxonum, pedibus ut plurimum cinereis.*
- tenellus. 133. *Cr. ferrugineus*, thorace elytrorumque margine flavis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 151. n. 10. mant. inf. 1. p. 87. n. 11.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 102. Fn. suec. 564. Chrysomela*  
*tenella.*  
*Habitat in Europae salice.*
- pictus. 134. *Cr. fuscus*, capite thoraceque flavis nigro-maculatis,  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 87. n. 12.*  
*Habitat in India, tenelli statura.*
- halensis. 135. *Cr. flavescens*, capitis basi elytrisque aeneis, antennis ni-  
 gris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 151. n. 11. mant. inf. 1. p. 87. n. 13.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 589. n. 20. Chrysomela halensis.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 164. n. 15. t. 45. f. 5.*  
*Habitat in Germania chrysomela polygona major.*
- bituber- 136. *Cr. fulvus*, elytris pallidis: margine omni fulvo. *Fabr.*  
 culatus. *sp. inf. 1. p. 151. n. 12. mant. inf. 1. p. 87. n. 14.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura melanocephali.*
- bidenta- 137. *Cr. flavus*, elytris nigris apice flavescens. *Fabr. sp.*  
 tus. *inf. 1. p. 151. n. 13. mant. inf. 1. p. 87. n. 15.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura bituberculati.*
- melano- 138. *Cr. rufus*, capite nigro, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf.*  
 cephalus. *1. p. 152. n. 14. mant. inf. 1. p. 87. n. 16.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

1720 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus*. *Crioceris*.

- cantharoides. 139. *Cr. violaceus*, capite, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 15. mant. inf. 1. p. 87. n. 17.*  
*Habitat in Anglia, statura cr. nymphaeae.*
- melanogaster. 140. *Cr. pallidus*, elytrorum maculis duabus abdomineque atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 16. mant. inf. 1. p. 87. n. 18.*  
*Herbst apud Fueslli arch. inf. 4. p. 66. n. 6. t. 23. f. 33.*  
*Crioceris quadrimaculata.*  
*Habitat ad caput bonae spei, et in Germania.*
- pygmaeus. 141. *Cr. rufus*, capite abdomineque atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 87. n. 19.*  
*Habitat in Cayenna, minutus.*
- indicus. 142. *Cr. niger*, capite, thorace, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 87. n. 20.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*
- exilis. 143. *Cr. niger*, thorace elytrisque pallidis immaculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 17. mant. inf. 1. p. 88. n. 20.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- erythrocephalus. 144. *Cr. niger*, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 17. mant. inf. 1. p. 88. n. 22.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura exilis.*
- fiamensis. 145. *Cr. niger*, elytris maculis duabus testaceis, thorace cylindrico. *Fabr. mant. inf. 1. p. 88. n. 23.*  
*Habitat in Siam, statura merdigeri, at duplo major.*
- imprefus. 146. *Cr. ater* elytris rubris, thorace cylindrico utrinque subimpresso. *Fabr. mant. inf. 1. p. 88. n. 24.*  
*Habitat in Siam, statura merdigeri, at paulo major.*
- merdiger. 147. *Cr. supra ruber*, thorace cylindrico utrinque impresso. *Fabr. sp. inf. 1. p. 152. n. 19. mant. inf. 1. p. 88. n. 25.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 599. n. 97. Fn. suec. 563. Chrysomela merdigera.*  
*Degeer inf. 5. p. 338. n. 43. Chrysomela rubra liliorum.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 239. n. 1. Crioceris rubra.*  
*Scop. ent. carn. 112. Attelabus lili.*  
*Blank. inf. 91. t. 11. f. 1.*  
*Valisn. nat. 1. p. 265. t. 32.*  
*Merian. inf. eur. 3. t. 21.*  
*Reaum. inf. 3. t. 17. f. 12.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 14.*

Schaeff.

*Schaeff. elem. t. 52. f. 1.*

*icon. t. 4. f. 4.*

*Habitat in convallaria majali, liliis, etiam Calabriae.*

- 12pun- 148. *Cr. ruber* thorace cylindrico, elytris punctis sex nigris.  
 ctatus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 153. n. 20. mant. inf. 1. p. 88. n. 26.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 601, n. 110. Fn. suec. 568. Chryfome-*  
*la 12punctata.*  
*Scop. ent. carn. 114. Attelabus 12punctatus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 241. n. 2. t. 4. f. 5. Crioceris rubra,*  
*punctis 13 nigris.*  
*Frisch inf. 13. t. 28.*  
*Schaeff. ic. t. 4. f. 5.*  
*Habitat in asperago, frequens.*
- 14pun- 149. *Cr. thorace cylindrico fusco: punctis quinque nigris, ely-*  
 ctatus. *tris flavis: punctis septem. Fabr. sp. inf. 1. p. 153. n. 21.*  
*mant. inf. 1. p. 88. n. 27.*  
*Scop. ent. carn. 116. Attelabus 14punctatus.*  
*Habitat in Germania magis australi.*
- cayen- 150. *Cr. thorace cylindrico rufo, elytris flavis: fasciis duabus*  
 nensis. *nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 88. n. 28.*  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- fucatus. 245. *Cr. cyaneus, elytris flavis: maculis duabus cyaneis. Fabr.*  
*mant. inf. 2. app. p. 381.*  
*Habitat in insula S. Barthomaci.*
- quinque- 151. *Cr. niger, thorace rufo, coleoptris flavescens: macu-*  
 notatus. *lis quinque nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 88. n. 29.*  
*Habitat in Germania superiori, statura cayennensis.*
- ebraeus. 152. *Cr. flavescens, thorace rufo, elytris albis: maculis quinque*  
*nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 89. n. 30.*  
*Habitat in Cayenna, pedibus albis.*
- australis. 153. *Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fasciis duabus albis.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 153. n. 22. mant. inf. 1. p. 89. n. 31.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- unifascia- 154. *Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fascia atra. Fabr.*  
 tus. *sp. inf. 1. p. 153. n. 23. mant. inf. 1. p. 89. n. 32.*  
*Habitat in nova Hollandia, an varietas australis?*

- novae  
Hollan-  
diae. 155. Cr. flavus, thorace cylindrico, antennis, pectore pedibus-  
que nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 155. n. 25. mant. inf. 1. p. 89. n. 33.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- griseus. 156. Cr. pallidus, capite femoribusque ferrugineis, antennis ti-  
biisque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 154. n. 24. mant. inf. 1. p. 89. n. 34.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*
- oculatus. 157. Cr. flavus, thorace cylindrico, elytris basi nigris: puncto  
flavo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 154. n. 26. mant. inf. 1. p. 89. n. 35.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- biocula-  
tus. 158. Cr. testaceus, thorace immaculato, elytris maculis dua-  
bus ocellaribus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 154. n. 27. mant. inf. 1. p. 89. n. 36.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura oculati.*
- nigriceor-  
nis. 159. Cr. pallidus, thorace tuberculato cylindrico, antennis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 154. n. 28. mant. inf. 1. p. 89. n. 37.*  
*Habitat - - - oculato paulo minor.*
- nitidus. 160. Cr. viridi-aeneus nitidus, elytris testaceis: maculis dua-  
bus cyaneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 154. n. 29. mant. inf. 1. p. 89. n. 38.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Cyanel-  
la. 161. Cr. caeruleus, thorace cylindrico: lateribus gibbis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 154. n. 30. mant. inf. 1. p. 89. n. 39.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 600. n. 104. Fn. suec. 572. Chrysomela cyanella.*  
*Degeer inf. 5. p. 340. n. 44. Chrysomela caeruleo-violacea.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 243. n. 5. Crioceris tota caeruleo-viridis.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 67. n. 10. t. 23. f. 34.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- melano-  
pus. 162. Cr. caeruleus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 155. n. 31. mant. inf. 1. p. 89. n. 40.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 601. n. 105. Fn. suec. 573. Chrysomela melanopa.*  
*Degeer inf. 5. p. 342. n. 46.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 19.*  
*Habitat in Europa, in Calabriae quercu.*

- ochropus. 163. *Cr. niger*, thorace pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 89. n. 41.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 106. *Chrysomela flavipes*.  
*Habitat in Germania, frequens, melanopodi affinis.*
- subspinofus. 164. *Cr. niger*, capite, thorace subspinoso, pedibusque rufis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 89. n. 42.  
*Habitat in Anglia, statura ochropodis.*
- saxonicus. 165. *Cr. ater nitidus*, antennarum basi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 89. n. 43.  
*Habitat in Saxoniae fruticibus, melanopode paulo major.*
- cyanocephalus. 166. *Cr. cyaneus*, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 90. n. 44.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- asparagi. 167. *Cr. thorace rubro*: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 155. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 90. n. 45.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 112. *Fn. succ.* 567. *Chrysomela asparagi*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 241. n. 3. *Crioceris thorace rubro &c.*  
*Scop. ent. carn.* 113. *Attelabus asparagi*.  
*Frisch inf.* 1. p. 27. t. 6.  
*Roef. inf.* 2. scar. 3. t. 4.  
*Schaff. ic.* t. 52. f. 9. 10.  
 β) *Cr. elytrorum maculis duabus basi connatis.*  
 γ) *Cr. elytrorum fasciis duabus angustis rubris.*  
*Habitat in Europa, asparagos depascens, β) in Italia, γ) in Gallia.*
- phellandrii. 168. *Cr. niger*, thoracis margine, elytrorumque lineis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 156. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 90. n. 46.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 14. *Fn. succ.* 569. *Chrysomela phellandrii*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 266. n. 20. *Chrysomela oblonga nigra.*  
*Degeer inf.* 5. p. 324. n. 28. t. 9. f. 34. *Chrysomela oblonga nigro-aenea.*  
*Habitat ad phellandrii aquatici radices.*
- campestris. 169. *Cr. nigro-caerulea*, thoracis limbo nigro, elytris punctis tribus posterius margine flavo connexis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 90. n. 47.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 602. n. 113. *Chrysomela campestris.*  
*Valisn. op.* I. t. 7. *Cancarella asparagi.*  
*Habitat in Europa magis australi, statura et magnitudine*  
*cr. asparagi.*

longus. 170. *Cr. elongatus niger, elytris vitta flava. Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 156. n. 37. mant. inf. I. p. 90. n. 48.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magis elongatus, quam reli-*  
*qui hujus tribus.*

trilineatus. 171. *Cr. pallidus, thorace maculis tribus, elytris striis abbre-*  
*viatis tribus nigris. Fabr. mant. inf. I. p. 90. n. 49.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

equestris. 172. *Cr. capite thoraceque testaceis, elytris brunneis: margi-*  
*ne, lineola bascos fasciisque media flavis. Fabr. mant.*  
*inf. I. p. 90. n. 50.*  
*Habitat in Cayenna, parvus.*

stolatus. 173. *Cr. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra. Fabr. sp.*  
*inf. I. p. 156. n. 38. mant. inf. I. p. 90. n. 51.*  
*Habitat in Carolina, pedibus flavescens: geniculis nigris.*

crataegi. 174. *Cr. ruber, elytrorum linea longitudinali punctoque ni-*  
*gris. Forst. nov. inf. sp. cent. I. p. 28. n. 28.*  
*Habitat in Angliae crataego oxyacantha, subrus niger, sta-*  
*tura et magnitudine cr. nymphaeae.*

trifuscatus. 175. *Cr. niger, thorace elytrisque pallidis, elytris margine*  
*et futura, furca tridente, punctisque octo nigris. Forst.*  
*nov. inf. sp. cent. I. p. 29. n. 29.*  
*Habitat in America septentrionali, magnitudine et habitu*  
*ochropodis.*

parvus. 176. *Cr. fuscus, capite bimaculato, antennarum basi fulva.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 66. n. 4.*  
*Habitat Berolini, cupreo dimidio minor.*

pallefcens. 177. *Cr. pallidus, capite nigro, antennis flavescens. Herbst*  
*apud Fuessli arch. inf. 4. p. 66. n. 5.*  
*Habitat Berolini, cr. nymphaeae paulo major.*

erythropus. 178. *Cr. totus ruber, femoribus solis ad finem nigris. Herbst*  
*apud Fuessli arch. inf. 4. p. 67. n. 8.*  
*Habitat Berolini, merdigero proxime affinis.*



- beroli- 179. *Cr. capite et thorace coccineis glaberrimis, elytris gran-*  
 nensis. *ulatis oculisque nigris, pedibus fulvis. Herbst apud*  
*Fuessli arch. inf. 4. p. 67. n. 12.*  
*Habitat Berolini, melanopode duplo minor.*
- ochra- 180. *Cr. ochraceus, thoracis puncto et abdomine nigris, ano*  
 ceus. *fulvo. Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 165. n. 16. t.*  
*44. f. 9. p. 9.*  
*Habitat in India, 3 lineas longus.*
- fulvipes. 181. *Cr. ater nitens, antennarum basi pedibusque supra fulvis.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 165. n. 17.*  
*Habitat in Austria, 2 lineas longus.*
- tristis. 182. *Cr. niger, elytris caeruleis punctato-friatis, pedibus fulvis.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 165. n. 18.*  
*Habitat in Austria, cyanellae similis, sed minor, sesquilinearis*  
*longus.*
- nigri- 183. *Cr. niger, thorace pedibusque rubris.*  
 cans. *Geoffr. inf. par. 1. p. 231. n. 1. t. 4. f. 2. Luperus niger.*  
*Habitat in Gallia.*
- erythro- 184. *Cr. niger, pedibus rufis. Geoffr. inf. par. 1. p. 231. n. 2.*  
 melas. *Luperus rufipes.*  
*Habitat in Gallia.*
- aerugi- 185. *Cr. pallidus, capite et pectore nigris, elytris viridibus po-*  
 nosus. *litis.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 84. n. 913. Luperus aeruginosus.*  
*Habitat in Dania.*
- aquati- 186. *Cr. niger, thorace maculato, elytrorum margine sutura-*  
 cus. *que lata, pedibusque flavis.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 83. n. 908.*  
*Habitat in Daniae aquis; an hujus tribus?*
- veris. 187. *Cr. niger, thorace cupreo, elytris viridibus, pedibus rufis.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 83. n. 910. Galleruca veris.*  
*Habitat in Dania, vere conspicuus.*
- friatus. 188. *Cr. ater, capite supra, elytris et abdomine apice albidis.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 85. n. 940. Crioceris ftriata.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 307. n. 3. t. 5. f. 2. Anthribus &c.*  
*Schaeff. ic. t. 89. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*

1726 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus. Crioceris.*

russicus. 189. *Cr. viridis*, elytris flavis, pedibus anterioribus longioribus.

*Lepech. it. 1. p. 312. t. 16. f. 10. Chrysomela longipes.*  
*Habitat in Russia australi.*

lusitanicus. 190. *Cr. testaceus*, capite, pectore pedibusque nigris.  
*Syst. nat. XII. 2. p. 1066. n. 2. Chrysomela lusitanica.*  
*Habitat in Lusitania, habitu tridentati.*

tricolor. 263. *Cr. nigra*, thorace cylindrico ad latera gibbo capite elytrorum futura marginibusque ferrugineis, elytris testaceis, pedibus antennis palpisque flavo-rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 17. n. 354.*  
*Habitat in Europa.*

melanophthalmus. 264. *Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo luteo-rufescente, capite rufo posteriori nigro, elytris polline rufo, abdomine argenteo conspersis. Mus. Lesk. p. 17. n. 355.*  
*Habitat in Europa.*

gibbus. 265. *Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo, capite, thorace pedibusque flavo-rufescentibus, elytris nigris profunde punctatis. Mus. Lesk. p. 17. n. 356.*  
*Habitat in Europa.*

fuliginosus. 266. *Cr. niger*, thorace pedibusque rufis, elytris laevissime punctatis. *Mus. Lesk. p. 17. n. 357.*  
*Habitat in Europa.*

ochropus. 267. *Cr. niger*, elytris fuscis, thorace antennarum basi pedibusque flavis, femoribus basi fuscis. *Mus. Lesk. p. 17. n. 358.*  
*Habitat in Europa.*

\*\* *palpis inaequalibus, anterioribus securiformibus.*

† *labio corneo, Erotyli.*

giganteus. 191. *Cr. ovatus niger*, coleoptris punctis fulvis numerosissimis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 157. n. 1. mant. inf. 1. p. 91. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 586. n. 1. Chrysomela gigantea.*  
*Degeer inf. 5. p. 349. t. 16. f. 8. Chrysomela oblonga nigra &c.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 8. et f. 15. Coccinella gigantea.*  
*Habitat in India.*

192. *Cr.*

- cancel- 192. Cr. ater, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant.*  
 latus. *inf. I. p. 91. n. 2.*  
*Habitat in Brasila, magnus, fere globosus.*
- Hiltrio. 193. Cr. ater, elytris nigro flavoque fasciatis: macula bascos  
 apicisque coccinea. *Fabr. mant. inf. I. p. 91. n. 3.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- lugubris. 194. Cr. testaceus, antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 157. n. 2. mant. inf. I. p. 91. n. 4.*  
*Habitat in America.*
- gibbo- 195. Cr. niger, elytris flavescens nigro-punctatis: fascia  
 sus. media et posteriore nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 157. n.*  
*3. mant. inf. I. p. 91. n. 5.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 586. n. 2. Amoen. ac. 6. p. 393. n. 13.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 117. n. 8? mant. inf. I. p. 67. n. 10?*  
*Chrysomela gibbosa.*  
*Gron. zooph. 606. t. 14. f. 5. Coccinella.*  
*Habitat in America meridionali.*
- pustula- 196. Cr. ater elytris fasciis quinque punctorum fulvorum.  
 tus. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 498. mant. inf. I. p. 91. n. 6.*  
*Habitat - - - giganteo affinis, sed non gibbosus.*
- concate- 197. ater, elytris flavo nigroque reticulatis: fasciis duabus  
 natus. atris. *Fabr. mant. inf. I. p. 91. n. 7.*  
*Habitat - - - magnus.*
- quinque- 198. Cr. ovatus, elytris nigris: punctis quinque rubris. *Fabr.*  
 punctatus. *sp. inf. I. p. 157. n. 4. mant. inf. I. p. 91. n. 8.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 586. n. 3. Chrysomela quinquepunctata.*  
*Gron. zooph. 613. t. 16. f. 7. Coccinella coleoptris nigris*  
*punctato-impressis: maculis decem rubris.*  
*Habitat in America.*
- puncta- 199. Cr. niger, elytris flavis: punctis numerosissimis nigris.  
 tissimus. *Fabr. sp. inf. I. p. 157. n. 5. mant. inf. I. p. 91. n. 9.*  
*Habitat in America.*
- varius. 200. Cr. ater, elytris punctatis medio fulvo maculatis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 157. n. 6. mant. inf. I. p. 92. n. 10.*  
*Habitat Surinami, statura punctatissimi, at minor, thorace*  
*atro, punctis quasi cicatricibus notata.*

- macrocheiros. 201. Cr. ater, elytris fasciis atris flavisque undatis alternis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 92. n. 11.*  
*Habitat in India, variegato affinis, at paulo major.*
- fasciatus. 202. Cr. ater, elytris fasciis tribus flavescens. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 7. mant. inf. I. p. 92. n. 12.*  
*Habitat - - - mediae magnitudinis.*
- Zebra. 203. Cr. flavescens, capite, thoracis basi, fasciis tribus elytrorum pedibusque atris. *Fabr. mant. inf. I. p. 92. n. 13.*  
*Habitat in Cayenna, reliquis hujus tribus minor, capite atro.*
- immaculatus. 204. Cr. ater immaculatus. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 8. mant. inf. I. p. 92. n. 14.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- venereus. 205. Cr. ater, thorace elytrisque cupreis. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 9. mant. inf. I. p. 92. n. 15.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- nebulosus. 206. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineo variis. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 10. mant. inf. I. p. 92. n. 16.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, mediae magnitudinis.*
- dilatatus. 207. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 11. mant. inf. I. p. 92. n. 17.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- smaragdulus. 208. Cr. ater, elytris striatis viridibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 12. mant. inf. I. p. 92. n. 18.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- amethystinus. 209. Cr. ater, thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 13. mant. inf. I. p. 92. n. 19.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- bicolor. 210. Cr. ater, supra aeneus. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 14. mant. inf. I. p. 92. n. 20.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- kiloniensis. 211. Cr. niger, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 158. n. 15. mant. inf. I. p. 92. n. 21.*  
*Habitat Kilonii.*

- jamai- 212. Cr. viridis nitidus punctatus, antennis pedibusque flavescens.  
centis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 16. mant. inf. 1. p. 92. n. 22.*  
*Habitat in Jamaica, antennis elongatis, ore piceo.*
- eichorei. 213. Cr. ore porrecto, rostro depresso elongato oblongo. *Hasselq. it. p. 449. n. 101.*  
*Habitat in Orientis eichoreo, medius quasi inter cryptocephalos, dermestes, curculiones, cantharides; an ex hac tribu?*
- †† labio membranaceo, Lagriae.
- aeneus. 214. Cr. obscure aeneus immaculatus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 1. mant. inf. 1. p. 93. n. 1.*  
*Habitat in Americae meridionali oppositis insulis.*
- tahitiensis. 215. Cr. lividus, oculis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 2. mant. inf. 1. p. 93. n. 2.*  
*Habitat in insula Tahiti.*
- pacificus. 216. Cr. lividus, thorace lineis, elytris vitta fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 3. mant. inf. 1. p. 93. n. 3.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- fuscicornis. 217. Cr. cyaneus, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 4. mant. inf. 1. p. 93. n. 4.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- meridionalis. 218. Cr. rufus, elytris fuscis: marginibus lineaque media rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 5. mant. inf. 1. p. 93. n. 5.*  
*Habitat in America meridionali, eleganti affinis, at duplo major.*
- elegans. 219. Cr. rufus, elytris vitta abdomineque apice fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 6. mant. inf. 1. p. 93. n. 6.*  
*Habitat in America meridionali.*
- rufifrons. 220. Cr. cyaneus, capite thoraceque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 159. n. 7. mant. inf. 1. p. 93. n. 7.*  
*Habitat in America boreali.*
- elongatus. 221. Cr. ater, thorace rufo villosa. *Fabr. sp. inf. 1. p. 160. n. 8. mant. inf. 1. p. 93. n. 8.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 603. n. 122. Chrysomela elongata.*  
*Habitat in Europa, praesertim Anglia.*

1730 INSECTA COLEOPTERA. *Cryptocephalus*. *Lagria*.

- ambu- 222. *Cr. glaber ater*, elytris punctatis. *Fabr. mant. inf. 1. p.*  
lans. 93. n. 9.  
*Habitat in Germania, elongato proxime affinis, at thorax ater.*
- tuber- 223. *Cr. ovatus glaber ater*, elytris tuberculatis. *Fabr. mant.*  
culatus. 1. p. 93. n. 10.  
*Habitat in Cayenna, villoso major.*
- villosus. 224. *Cr. villosus ater*, thorace elytrisque viridibus. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 160. n. 9. mant. inf. 1. p. 93. n. 11.*  
*Habitat ad caput bonae spei, hirtio proxime affinis.*
- pubes- 225. *Cr. niger*, thorace marginato villoso, elytris glabris tes-  
cens. taceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 160. n. 10. mant. inf. 1. p.*  
93. n. 12.  
*Syst. nat. XII. 2. p. 603. n. 120. Chrysomela pubescens.*  
*Habitat in Germania, hirtio affinis.*
- hirtus. 226. *Cr. villosus niger*, thorace tereti, elytristestaceis. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 160. n. 11. mant. inf. 1. p. 93. n. 13.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 602. n. 119. Fn. succ. 578.\* Chryso-*  
*mela hirta.*  
*Degeer inf. 5. p. 446. t. 2. f. 23. 24. Tenebrio alatus vil-*  
*losus niger &c.*  
*Habitat in Europae saponariis.*
- indus. 227. *Cr. cyaneus*, pedibus longitudine corporis.  
*Syst. nat. XII. 2. p. 603. n. 121. Chrysomela inda.*  
*Habitat in India, magnitudine scarabaei stercorarii.*
- ventra- 228. *Cr. villosus cyaneus*, elytris lincis elevatis tribus, abdo-  
lis. mine rufo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 93. n. 14.*  
*Habitat in India, tomentoso affinis.*
- tomento- 229. *Cr. villosus cyaneus*, abdomine femoribusque rufis.  
fus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 160. n. 12. mant. inf. 1. p. 94. n. 15.*  
*Habitat in nova Hollandia, elytris variis fuscis.*
- glabratus. 230. *Cr. glaber*, thorace rufescente, elytris flavis. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 160. n. 13. mant. inf. 1. p. 94. n. 16.*  
*Habitat in Anglia.*
- scutella- 231. *Cr. niger*, cinereo-hirtus, scutello albo. *Fabr. mant.*  
ris. *inf. 1. p. 94. n. 17.*  
*Habitat in Hispania, statura et magnitudine triticei.*
- niger. 232. *Cr. pilosus niger*, elytris laeviusculis ferratis. *Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 94. n. 19.*

*Syst.*

- Syst. nat.* XII. 2. p. 564. n. 28. *Fn. succ.* 439. *Dermeistes niger.*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 71. n. 5. *Anobium nigrum.*  
*Scop. ent. carn.* 131. *Cantharis bilosa.*
- barbarus. 233. *Cr. antennis ferratis, hirtus, obscure aeneus.* *Fabr. mant. inf.* I. p. 94. n. 23.  
*Habitat in Barbariae floribus compositis, dermesti hirto affinis.*
- antherinus. 234. *Cr. niger, elytris fasciis duabus ferrugineis.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 160. n. 14. *mant. inf.* I. p. 94. n. 24.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 681. n. 16. *Fn. succ.* 829. *Meloë antherinus.*  
*Syst. nat.* X. p. 418. n. 7. *Tenebrio pedicularius.*  
*Habitat frequens in floribus, agilis, cursitans, vix pediculo major.*
- floralis. 235. *Cr. niger thorace ferrugineo.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 161. n. 15. *mant. inf.* I. p. 94. n. 25.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 681. n. 15. *Fn. succ.* 829? *Meloë floralis.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- Marchiae. 236. *Cr. niger villosus, thorace cylindrico capitisque margine posteriore rubris, elytris striato punctatis.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 4. p. 68. n. 2. t. 23. f. 35.  
*Habitat Berolini, 4 lineas longus.*
- + + *dubiae species.*
- caraboides. 237. *Cr. niger, elytris subcaeruleis, plantis ferrugineis.*  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 602. n. 115. *Fn. succ.* 574. *Chrysomela caraboides.*  
*Habitat in Europa.*
- punctulatus. 238. *Cr. vicidi-aeneus punctatissimus, pedibus ferrugineis.*  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 108. *Antoen. ac.* 6. p. 394. n. 18.  
*Chrysomela punctatissima.*  
*Habitat Surinami.*
- lampyroides. 239. *Cr. elytris subtomentosis nigris: linea longitudinali margineque pallidis.*  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 601. n. 107. *Chrysomela tomentosa.*  
*Habitat in Carolina, cr. capreae affinis, facie lampyridis, lividus.*

200. HISPA. *Antennae cylindricae, basi approxi-  
matae, inter oculos sitae.*

*Palpi fuliformes.*

*Thorax et elytra saepius aculeata.*

- atra. 1. H. corpore toto atro. *Schr. der berl. Naturf. Ges. 4. t. 7. f. 6.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 10. mant. inf. 1. p. 47. n. 9.* Hispa  
antennis fuliformibus, thorace elytrisque ipinosis, cor-  
pore atro.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 243. n. 7.* Crioceris atra spinis horrida.  
*Habitat in Europa australi et Africa boreali ad radices gra-  
minum.*
- testacea. 2. H. corpore testaceo, antennis aculeisque nigris. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 83. n. 11. mant. inf. 1. p. 47. n. 10.*  
*Habitat in Barbaria, atrae magnitudine; thorace spina sex-  
tuplici armato.*
- bihamata. 3. H. inermis nigra, rubro-maculata, elytris truncatis hamatis.  
*Habitat in India, oblonga, depressa, cr. capreae magnitudine.*
- mutica. 4. H. inermis, antennis pilosis.  
*Fn. suec. 413.* Dermestes (clavicornis) niger, antennis cla-  
vatis pilosis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 9. mant. inf. 1. p. 47. n. 7.* Hispa  
antennis pilosis, nigra, elytris striatis.  
*Degeer inf. 5. p. 47. t. 3. f. 1.* Tenebrio hirticornis.  
*Habitat in Europae quisquiliis, museis.*
- sanguini- 5. H. inermis atra, thorace sanguineo. *Mant. 530.*  
collis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 83. n. 12. mant. inf. 1. p. 48. n. 11.* Hispa  
antennis fuliformibus, thorace elytrorumque basi sangui-  
neis, elytris ferratis.  
*Habitat in America meridionali.*
- ferrata. 6. H. antennis fuliformibus, nigra, elytris rufescentibus apice  
ferratis nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 48. n. 12.*  
*Habitat Surinami, statura sanguinicollis.*
- picipes. 7. H. antennis fuliformibus, atra, elytris pedibusque piceis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 47. n. 8.*  
*Habitat Halae Saxonum, congeneribus longior.*



- cornuta.** 8. H. tota atra, thorace antierius posteriusque spinoso, elytris porcatis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 15. n. 25. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in Suecia, opatri fabulosi magnitudine, sed angustior.*
- scabra.** 9. H. tota nigra, thorace alato elytrisque margine ferrato-ciliatis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 15. n. 26. t. 1. f. 6.*  
*Habitat in Suecia, silphae ferrugineae magnitudine,*  
*Huic et cornutae, et scabrae antennae fusiformes.*
- capensis.** 10. H. picea hispida, thoracis spina palmata. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 66. f. 76.*  
*Habitat ad caput bonae spei, pediculi majoris magnitudine, colore nigro et piceo varians.*
- angulata.** 11. H. antennis fusiformibus, flava, capite, thoracis linea dorsali elytrorumque margine sinuato nigris. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*  
*Habitat in Cayenna.*
- dentata.** 12. H. antennis filiformibus, nigra, thoracis margine, elytrorum ferratorum macula baseos fasciaque media flavis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 378.*  
*Habitat in Cayenna.*
- caerulea.** 13. H. antennis subferratis caerulea hirta. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 7.*  
*Habitat in Germania.*
- bipustulata.** 14. H. antennis ferratis, atra hirta, elytris macula baseos rufa. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 8. mant. inf. 1. p. 47. n. 6.*  
*Habitat in Italia, dermeste hirta minor.*
- cornigera.** 15. H. antennis ferratis, thorace rufo, elytris caeruleis, capite bicorni. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 5. mant. inf. 1. p. 47. n. 5.*  
*Habitat in Anglia, an proprii generis.*
- ferraticornis.** 16. H. fusca, antennis ferratis, elytris striatis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 5. n. 8.* Ptinus ferraticornis.  
*Habitat Upsaliae, ptini mollis magnitudine.*
- pectinicornis.** 17. H. fusca, antennis pectinatis, pedibus luteis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 3. mant. inf. 1. p. 47. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 565. n. 1.* Ptinus pectinicornis.  
*Fn. suec. 412.* Dermestes pectinicornis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 65. n. 2.* Ptinus atro-fuscus &c.  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 6.*  
*Habitat in Europae quisquiliis, coryli foliis.*

bicornis. 18. H. antennis pectinatis, thorace elytrisque viridi-aeneis, capite bicorni. *Fabr. sp. inf. 1. p. 82. n. 4. mant. inf. 1. p. 47. n. 4.*

*Habitat in America boreali, an hujus generis?*

flabelli- 19. H. nigra, antennis pectinatis, elytris striatis. *Fabr. sp. cornis. inf. 1. p. 81. n. 2. mant. inf. 1. p. 47. n. 2.*

*Schaeff. ic. t. 215. f. 3?*

*Habitat in Anglia.*

mystaci- 20. H. antennis pectinatis, elytris striatis albo punctatis. *Fabr. na. sp. inf. 1. p. 81. n. 1. mant. inf. 1. p. 47. n. 1.*

*Drury inf. 3. t. 48. f. 7.*

*Habitat in nova Hollandia, praegrandis.*

201. BRUCHUS. *Antennae filiformes.*

*Palpi aequales, filiformes.*

*Labium acuminatum.*

pisi. 1. Br. elytris nigris albo-maculatis, podice albo: punctis binis nigris. *Mus. Lud. Ulr. 35. Fabr. sp. inf. 1. p. 74. n. 2. mant. inf. 1. p. 41. n. 4.*

*Syst. nat. X. p. 356. Dermestes pisorum.*

*Amoen. ac. 3. p. 347. Curculio pisorum.*

*Kalm it. 2. p. 294. Bruchus Americae septentrionalis.*

*Degeer inf. 5. p. 278. n. 1. t. 16. f. 3. 4. Bruchus nigro-fuscus &c.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 267. n. 1. t. 4. f. 9. Mylabris fusca cinereo-nebulosa &c.*

*Scop. ent. carn. 63. Laria falicis.*

*Ledermüll. micr. 195. t. 100.*

*Gron. zooph. 569.\**

*Habitat in America septentrionali, nuperius quoque in Europa australi, pisorum agros devastans, pomonae etiam floribus infestus, devoratur a gracula quiscula.*

umbellat- 8. Br. squamosus supra griseus subtus cinereus. *Fabr. mant. tarum. inf. 1. p. 41. n. 3.*

*Habitat in Barbariae ambulatis, magnus.*

Robinae. 9. Br. griseo-nitidulus, elytris vix abdomine brevioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 3. mant. inf. 1. p. 41. n. 5.*

*Habitat*

*Habitat in Robiniae Pseudacaciae ex America allatis seminibus, magnus.*

**gibbosus. 10.** Br. thorace gibbofo cupreo, elytris nigris tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 4. mant. inf. 1. p. 41. n. 6.*

*Habitat in America boreali.*

**scabrosus. 11.** Br. niger, elytris rufis elevato-striatis: punctis nigris sparsis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 5. mant. inf. 1. p. 41. n. 7.*

*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 28. n. 1. t. 20. f. 15.*

*Habitat in Europae potissimum aesculo.*

**clathratus. 12.** Br. totus niger, thorace albido-cancellato, elytrorum striis ex nigro et griseo variis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 158. n. 5.*

*Habitat Berolini, scabrosi statura et magnitudine.*

**Cacao. 13.** Br. corpore fusco griseo-maculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 6. mant. inf. 1. p. 41. n. 8.*

*Habitat in Theobromatis seminibus.*

**undatus. 14.** Br. niger, elytris fuscis: strigis undatis albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 41. n. 9.*

*Habitat in Africae floribus, mediae magnitudinis.*

**Theobromatis. 2.** Br. elytris griseis nigro-maculatis, pedibus rufis, scutello albo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 75. n. 7. mant. inf. 1. p. 41. n. 10.*

*Habitat in Theobromatis seminibus, indicus, ex nigro canescens, br. pisi dimidio minor.*

**marginalis. 15.** Br. niger, elytris cinereis: maculis tribus nigris margine connexis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 8. mant. inf. 1. p. 42. n. 11.*

*Habitat in Germania.*

**canalis. 16.** Br. subferrugineus, elytris apice atris, ano atro: linea media alba. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 9. mant. inf. 1. p. 42. n. 12.*

*Habitat in India, parvus.*

**bipunctatus. 17.** Br. cinereus, elytris fuscis: puncto baseos ocellari atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 75. n. 10. mant. inf. 1. p. 42. n. 13.*

*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 2.*

*Habitat in Helvetiae plantis.*

- Alat.*  
*Anthriscus*
- varius. 18. Br. elytris nigris: punctis albis nigrisque alternis striatis, femoribus muticis. *Fabr. mant. inf. I. p. 42. n. 14.*  
*Habitat in Sueciae pinetis, statura bipunctati.*
- Gledit-  
schieae. 3. Br. elytris striatis longitudine abdominis, corpore picco, antennis nigris.  
*Amoen. ac. 6. p. 392. n. 5. Dermestes Gleditsiae.*  
*Habitat in Americae septentrionalis Gleditsiae seminibus.*  
*Femora mutica.*
- spinosus. 19. Br. griseus, thorace elytrisque spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 74. n. 1. mant. inf. I. p. 41. n. 1.*  
*Habitat in Jamaica.*
- Bactris. 4. Br. cinereus, elytris sublaevibus, femoribus posterioribus ovatis, tibiis incurvis. *Amoen. ac. 6. p. 392. n. 6. Fabr. mant. inf. I. p. 41. n. 2.*  
*Jacq. hist. stirp. amer. t. 170.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 28. n. 3. t. 20. f. 16.*  
*Habitat in Bactris, palmae americanae, nucleis.*
- rufipes. 20. Br. niger, elytris albo-punctatis, pedibus anterioribus rufis, posterioribus nigris unidentatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 29. n. 4.*  
*Habitat in Pomerania, granario proxime affinis, at minor, an varietas?*
- granarius. 5. Br. elytris nigris: atomis albis, femoribus posterioribus unidentatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 76. n. 11. mant. inf. I. p. 42. n. 15.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 605. n. 5. Bruchus elytris nigris: atomis albis, pedibus anticis rufis, posticis dentatis.*  
*Fn. succ. 628. Curculio atomarius.\**  
*Habitat in Europae plantarum seminibus.*
- cisti. 21. Br. ater immaculatus, femoribus muticis. *Fabr. sp. inf. I. p. 76. n. 12. mant. inf. I. p. 42. n. 16.*  
*Habitat in cisti helianthemii floribus frequens.*
- abdomi-  
nalis. 22. Br. niger, abdomine cinereo immaculato, pedibus anterioribus testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 76. n. 13. mant. inf. I. p. 42. n. 17.*  
*Habitat in India, parvus.*

- feminari- 6. Br. ater, antennarum basi pedibusque anterioribus testaceis,  
us. femoribus muticis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 76. n. 14. mant. inf. 1. p. 42. n. 18.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 268. n. 3.* Mylabris nigra, abdomine albo sericeo.  
*Habitat in Europae floribus, pediculi magnitudine.*
- macula- 23. Br. elytris punctatis testaceis nigro-maculatis, podice gri-  
tus. seo: punctis binis nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 76. n. 14. 15. mant. inf. 1. p. 42. n. 19.*  
*Habitat in Americae feminibus.*
- mimosae 24. Br. testaceus immaculatus, elytris substriatis femoribus po-  
terioribus acute dentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 76. n. 16. mant. inf. 1. p. 42. n. 20.*  
*Habitat in mimosae Americae meridionalis feminibus, seminario paulo major.*
- ferrati- 25. Br. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore gri-  
cornis. seo fusco maculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 77. n. 17. mant. inf. 1. p. 42. n. 21.*  
*Habitat in Oriente.*
- pectini- 7. Br. antennis pectinatis corpore ferrugineo, longioribus.  
cornis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 77. n. 18. mant. inf. 1. p. 42. n. 22.*  
*Syst. nat. X. p. 386. n. 79.* Curculio chinensis.  
*Degeer inf. 5. p. 201. n. 2.* Bruchus rufus.  
*Schaeff. elem. t. 86. f. 1.*  
*Habitat in feminibus e Sina allatis.*

PAUSUS. *Antennae biarticulatae, clavatae; clava solida, uncinata.*

- microce- 1. P. *Dall. diss. big. insect. sist. Ups. 1725. Fuesli arch. inf. 3.*  
phalus. *p. 1. t. 13.*  
*Habitat in America septentrionali, totus niger, magnitudine dermestidis lardarii, capite minutissimo, thorace angusto: anterius margine transverso elevato, elytris abdomine posteriorius fere truncato paulo longioribus truncatis.*

**ZYGIA.** *Antennae* moniliformes.  
*Palpi* inaequales, filiformes.  
*Labium* elongatum, membranaceum.  
*Maxilla* unidentata.

oblonga. 1. Z. *Fabr. sp. inf. I. p. 161. n. 1. mant. inf. I. p. 94. n. 1.*  
*Habitat in Oriente, oblonga, rufa, capite elytrisque obscure cyaneis.*

**ZONITIS.** *Antennae* fetaceae.  
*Palpi* quatuor filiformes, maxilla integra breviores.  
*Labium* emarginatum.

chryso- 1. Z. *flava, elytris puncto medio apiceque nigris. Fabr. sp.*  
melina. *inf. I. p. 161. n. 1. mant. inf. I. p. 95. n. 1.*  
*Habitat in Oriente, Aegypto, subtus atra, ano rufescente.*

flava. 2. Z. *rufescens, elytris flavis apice nigris. Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 161. n. 2. mant. inf. I. p. 95. n. 2.*  
*Habitat in Oriente.*

**APALUS.** *Antennae* filiformes.  
*Palpi* aequales, filiformes.  
*Maxilla* cornea, unidentata.  
*Labium* membranaceum, truncatum, integrum.

bimacu- 1. Ap. *Fabr. sp. inf. I. p. 161. n. 1. mant. inf. I. p. 95. n. 1.*  
latus, *Syst. nat. 2. p. 680. n. 9. Fn. suec. 828. Uddm. diff. 82.*  
*Meloc (bimaculatus) alatus niger, elytris luteis macula nigra postica.*  
*Deger inf. 5. t. 1. f. 18. Pyrochroa bimaculata.*  
*Habitat primo vere in Sueciae arenosis.*

**BRENTUS.** *Antennae moniliformes, ultra medium rostri exsertae.*

*Os rostro porrecto, recto, cylindrico.*

*\* femoribus simplicibus.*

barbicornis. 1. Br. cylindricus, rostro longissimo subtus barbato, elytris elongato-elevatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 1.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 59.* Curculio barbicornis.  
*Habitat in nova Seelandia.*

assimilis. 2. Br. cylindricus, rostro apice glabro atro, elytris ferrugineo-subfasciatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 2.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 60.* Curculio assimilis.  
*Habitat in nova Seelandia.*

monilis. 3. Br. cylindricus ater, elytris acuminatis unistriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 3.*  
*Habitat in nova Hollandia, statura barbicornis, at minor.*

semipunctatus. 4. Br. cylindricus, thorace lineis, elytris punctis albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 4.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 61.* Curculio semipunctatus.  
*Habitat in nova Hollandia.*

*\*\* femoribus dentatis.*

Druryanus. 5. Br. aeneus, thorace tereti, antennis rostro longioribus, elytris apice spinula mucronatis flavo-maculatis. *Pall. inf. ross. 1. p. 16. n. 3.*  
*Drury inf. t. 42. f. 37.*  
*Habitat - - -*

Anchorago. 6. Br. linearis, elytris flavo-striatis, thorace elongato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 5.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 118.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 56. Mus. Lud. Ulr. 52. Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 118.* Curculio anchorago.  
*Degeer inf. 5. p. 273. n. 8. t. 15. f. 28.* Curculio longicollis.  
*Gron. zooph. 583. t. 15. f. 4.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 6.*  
*Habitat in America australi et India.*

- hastile. 7. Br. aterrimus rostro tenuissimo longo ad apicem subarcuato, thorace medio coarctato, elytris subfulcatis, apice subacuminatis. *Pall. inf. russ. I. p. 25. n. 2.*  
*Habitat - - - sesquipollicem longus, crassitie vix libellae puellae.*
- nautilus. 8. Br. femoribus omnibus tibiisque anterioribus dentatis, thorace elongato aeneo, elytris acuminatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 96. n. 6.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 182. n. 119. Curculio nautilus.*  
*Habitat in Jamaica, anchoragini affinis, at paulo major.*
- dispar. 9. Br. linearis niger, elytris rubro-striatis. *Fabr. mant. I. p. 96. n. 7.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 55. Mus. Lud. Utr. 50. Fabr. sp. inf. I. p. 182. n. 120. Curculio dispar.*  
*Pall. inf. russ. I. p. 24. t. B. f. 4. Curculio anomaliceps.*  
*Habitat in America.*
- cylindri-cornis. 10. Br. thorace rotundato nigro-aeneo, elytris ferrugineis flavo substriatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 96. n. 8.*  
*Habitat in nova Seelandia, statura et magnitudine disparis.*
- bifrons. 11. Br. niger, elytris striatis: maculis glabris flavis. *Fabr. mant. inf. I. p. 96. n. 9.*  
*Habitat in Cayenna, statura anchoraginis.*

202. CURCULIO. *Antennae clavatae, infidentes*  
*rostro corneo, prominenti.*  
*Palpi quatuor filiformes.*

\* *Longirostres.*

† *femoribus simplicibus.*

- Gigas 55. C. thorace elytrisque scabris, antennis apice albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 161. n. I. mant. inf. I. p. 97. n. I.*  
*Habitat in Japonia.*
- palmarum. I. C. ater, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis. *Mus. Lud. Utr. 42.\* Fabr. sp. inf. I. p. 162. n. 2. mant. inf. I. p. 97. n. 2.*  
*Degeer inf. 5. p. 269. n. 4. t. 15. f. 26. Curculio longirostis, antennis fractis &c.*

*Rumpf*



*Rumpf amb. 1. p. 79. t. 17. f. g. Cossus faguarius.*

*Petiv. gazoph. t. 35. f. 5.*

*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 89. n. 40.*

*Gron. zooph. 578. t. 16. f. 4.*

*Merian. furin. t. 48. f. 3.*

*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 20.*

*Habitat in Indiae palmis.*

*Larva affata in deliciis. Jacq. stirp. am. 278.*

- cruentatus. 56. *C. ater*, thorace lineis, elytris punctis duobus sanguineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 3. mant. inf. 1. p. 97. n. 3.*  
*Habitat in Carolina, c. palmarum minor.*
- longipes. 96. *C. nigricans*, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 4. mant. inf. 1. p. 97. n. 4.*  
*Drury inf. 2. t. 33. f. 3.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- zaniae. 550. *C. ruber*, thoracis linea nigra, rostro setaceo longissimo. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 29. t. 1. f. 7.*  
*Habitat ad caput bonae spei, in cycade caffra, larva hexapus, setis albidis obsessa intra squamas strobili feminei, nucibus rubraque carne hanc obvelanti victitans.*
- exoticus. 554. *C. griseus*, thorace basi impresso, dorfi ruga brevi, elytris posterius gibbis: punctorum alborum ordinibus decem; interstitiis, profunde nigro punctatis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 368.*  
*Habitat extra Europam.*
- brachypteros. 555. *C. ater*, thorace plano punctato: linea media parum elevata, elytris abbreviatis substriatis: interstitiis punctatis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 374.*  
*Habitat in Europa.*
- undatus. 556. *C. niger*, elytris ordine punctatis: fasciis undulatis interruptis albis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 379.*  
*Habitat in Europa.*
- atomarius. 557. *C. fuscus*, elytris striatis: interstitiis laevissime punctatis atomis griseis pilosis adpersis, tibiis rufis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 380.*  
*Habitat in Europa.*

- coccineus. 558. *C. coccineus*, elytris punctatis: punctorum ordinibus decem. *Mus. Lesk. p. 18. n. 381.*  
*Habitat in Europa.*
- futuralis. 559. *C. griseus*, elytris striatis: futura albida nigro punctata, macula communi oblonga versus apicem marginumque exteriorum posteriorum punctis nigris. *Mus. Lesk. p. 18. n. 384.*  
*Habitat in Europa.*
- indus. 2. *C. ater*, thorace subovato excavato punctato, elytris rugosofulcatis, tibiis spinosis. *Mus. Lud. Utr. 43.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 5. mant. inf. 1. p. 97. n. 5.*  
*Degeer inf. 5. p. 265. n. 1. t. 15. f. 22.*  
*Habitat in India.*
- paganus. 97. *C. griseus*, thoracis dorso fusco: arcubus cinereis, rostro bifurcato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 6. mant. inf. 1. p. 197. n. 6.*  
*Habitat in America australi et India.*
- Elephas. 98. *C. fuscus*, thorace elytrisque variolosis, elytris posterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 7. mant. inf. 1. p. 97. n. 7.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magnus.*
- hemipterus. 3. *C. obscure purpurascens*, elytris abbreviatis, femoribus mediis ciliatis. *Mus. Lud. Utr. 44.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 163. n. 8. mant. inf. 1. p. 97. n. 8.*  
*Degeer inf. 5. p. 271. n. 5. t. 15. f. 25.* Curculio rufofasciatus.  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 5.*  
*Habitat in India.*
- variegatus. 99. *C. rufus nigroque varius*, rostro apice nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 163. n. 9. mant. inf. 1. p. 97. n. 9.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- alliariae. 4. *C. violaceus totus.* *Fn. suec. 580.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 40. mant. inf. 1. p. 101. n. 53.*  
*Fn. suec. 468.* Curculio nigro-caeruleascens.

Degeer

---

Curculionum longirostrium larvae plurimae fructus et semina, brevisrostrum vero folia consumunt; aliae etiam caules consumunt.

*Degeer inf. 5. p. 251. n. 39. Curculio caeruleus.*  
*Frisch inf. 9. 35. t. 18.*  
*Habitat in eryfimi alliariae caulibus, quos perforat.*

eryfimi. 100. *C. niger, thorace bituberculato virescente, elytris cyaneis. Fabr. mant. inf. 1. p. 101. n. 54.*  
*Habitat Kilonii, cyaneo proxime affinis, at magis gibbus.*

cyaneus. 5. *C. ater, elytris violaceis, scutello albo. Fn. succ. 581.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 41. mant. inf. 1. p. 101. n. 55.*  
*Degeer inf. 5. p. 252. n. 41. Curculio longirostris, antennis rectis &c.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 70. n. 11. t. 24. f. 5. c.*  
*Habitat in Europae borealis potissimum salicibus.*

craccae. 6. *C. gibbus supra ater, subtus cinereus. Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 42. mant. inf. 1. p. 101. n. 56.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 606. n. 6. Curculio longirostris niger ovatus, rostro subulato, abdomine pallido.*  
*Degeer inf. 5. t. 6. f. 31. 32? Curculio viciae.*  
*Habitat in Europae viciarum seminibus, pediculi magnitudine.*

malvae. 101. *C. griseus, elytris pedibusque testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 43. mant. inf. 1. p. 101. n. 57.*  
*Habitat in Angliae malvois.*  
*Rostrum et abdomen atra.*

campanulae. 7. *C. niger ovatus elytris striatis obtusis. Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 31. mant. inf. 1. p. 100. n. 40. Lesk. it. p. 16. t. A. f. 5.*  
*Degeer inf. 5. p. 226. n. 23. Curculio longirostris, antennis fractis fulcis &c.*  
*Habitat in campanulae rotundifoliae pericarpis incrassatis.*

fuscirostris. 102. *C. griseus, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 32. mant. inf. 1. p. 100. n. 41.*  
*Habitat in Germaniae plantis.*

roboris. 103. *C. rostro thoraceque rufis, elytris violaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 42.*  
*Habitat in Saxoniae quercu, statura et magnitudine fuscirostris.*

cuprirostris. 104. *C. oblongus viridi aeneus, elytris striatis, rostro cupreo. Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 43.*  
*Habitat Dresdae in betula, parvus.*

- nigriro- 105. *C. viridis* rostro atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 33.*  
 itris. *mant. inf. 1. p. 100. n. 44.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 69. n. 8. t. 24. f. 3.*  
*Habitat in Angliae arvis.*
- variabi- 106. *C. subtestaceus*, thorace viridi lineato, rostro apice fusco.  
 lis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 34. mant. inf. 1. p. 100. n. 45.*  
*Habitat Hamburgi.*
- rufiro- 107. *C. niger*, rostro dimidiato pedibusque rufis. *Fabr. sp.*  
 itris. *inf. 1. p. 167. n. 35. mant. inf. 1. p. 100. n. 46.*  
*Habitat in Anglia.*
- picro- 108. *C. oblongus niger argenteo-holosericus*, rostro dimidiato  
 itris. pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 101. n. 47.*  
*Habitat Hafniae, rufirostri affinis, at major.*
- falicariae. 109. *C. niger*, antennarum basi, coleoptorum disco tibiisque  
 tellaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 36. mant. inf. 1. p.*  
*101. n. 48.*  
*Habitat in Angliae luthro salicaria, parvus.*
- baden- 8. *C. niger*, pedibus piceis.  
 sis. *Habitat in Germania, magnitudine c. cerasi, thorace laevi-*  
*nsculo ovato, elytris obsolete striatis, femoribus clavatis.*  
 Dr. Blom.
- aequatus. 9. *C. aeneus* elytris rubris, rostro nigro elongato.  
*Habitat in Germania, statura c. nucum, sed dimidio minor.*
- cerasi. 12. *C. ater*, antennis ferrugineis, thorace bituberculato.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 30. mant. inf. 1. p. 100. n. 138.*  
*Habitat in foliis pruni cerasi.*
- quadri- 110. *C. thorace* quadrituberculato nigro, elytris striatis cincto  
 tuberculato. reo variegatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 39.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- acridu- 13. *C. piceus*, abdomine ovato. *Fn. suec. 584. Fabr. sp. inf.*  
 lus. *1. p. 169. n. 46. mant. inf. 1. p. 102. n. 62.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 291. Curculio pyriformis nigro-caerule-*  
*lescens.*  
*Degeer inf. 5. p. 235. n. 22. Curculio longirostris antennis*  
*fractis fulcis &c.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. t. 24. f. 12.*

*Habitat*

*Habitat frequens in Europae borealis et Calabriae floribus  
tetradynumis.*

flavipes. III. *C. ater*, femoribus luteis. *Fabr. sp. inf. I. p. 169. n. 47.*  
*mant. inf. I. p. 102. n. 63.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 272. n. 8.* Rhinomacer subglobosus &c.  
*Habitat frequens primo vere in Europae locis apricis calidis.*

purpu- 14. *C. purpureus nitens*, rostro longissimo. *Fn. suec. 585.*  
reus. *Fabr. sp. inf. I. p. 169. n. 48. mant. inf. I. p. 102. n. 64.*  
*Degeer inf. 5. p. 250. n. 38.* Curculio rostro longissimo &c.  
*Petiv. gaz. t. 22. f. 5.*  
*List. loq. 394.*  
*Berg str. nomencl. I. 16. 12. t. 2. f. 12.*  
*Habitat in Europae plantis, frumentario proxime affinis.*

frumen- 15. *C. sanguineus*. *Fn. suec. 586. Fabr. sp. inf. I. p. 169. n.*  
tarius. *49. mant. inf. I. p. 102. n. 65. Degeer inf. 5. p. 251.*  
*n. 40.*

*Act. Stockh. 1750. p. 186. n. 1.*

*Act. nidros. 3. p. 391.*

*Leeuwenb. arc. nat. 168. augm. 6. p. 83. f. 3.*

*Habitat in Europae frumento diutius asservato, pessimus.*

bituber- 112. *C. ferrugineus*, thorace longitudine elytrorum punctisque  
cularatus. duobus dorsalibus elevatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 171. n. 58.*  
*mant. inf. I. p. 103. n. 76.*

*Habitat in nova Seelandia, granario proxime affinis.*

oryzae. 113. *C. piceus*, thorace punctato longitudine elytrorum, ely-  
tris punctis duobus rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 171. n. 57.*  
*mant. inf. I. p. 103. n. 75.*

*Amoen. acad. 6. p. 395. n. 19.* Curculio (oryzae) longiro-  
stris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis,  
femoribus muticis.

*Habitat in oryza, diutius asservata.*

grana- 16. *C. piceus*, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn.*  
rius. *suec. 587. Fabr. sp. inf. I. p. 171. n. 56. mant. inf. I. p.*  
*103. n. 74. Scop. ent. carn. 89.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 285. n. 18.* Curculio rufo-testaceus &c.  
*Degeer inf. 5. p. 239. n. 25.* Curculio longirostris, anten-  
nis fractis &c.

*Raj. inf. 88.* Scarabaeus parvus fordide fulvus &c.

Uuuuu 4

Joblot

*Fohlot obs. microscop.* 1754. t. 7. f. 1.

*Wilcke act. Stockh.* 37. tr. 4. nr. 2.

*Habitat in frumento diutius in granariis asseruato, pessimus; isutide, hyoscyamo, sambuco, thlaspide pelli dicitur.*

- dorsalis. 17. *C. elytris rubris: sutura nigra. Fn. suec.* 588. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 170. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 66.  
*Fn. suec.* 1. n. 475. *Curculio niger elytris in medio rufescentibus.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 7. t. 44. f. 10. r. f.  
*Habitat in Europae borealis ranunculo ficaria.*
- melano- 18. *C. cinereus, coleoptris macula communi cordata fusca.*  
cardius. *Mus. Lud. Ulr.* 18. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 10.  
*Sulz. hist. inf.* 40. t. 4. f. II.  
*Habitat in India.*
- crucia- 114. *C. niger, thorace subspinoso: lineis, elytris posterius*  
tus. *cruce albis. Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 11.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- friatu- 115. *C. niger, elytris holosericeo-striatis. Fabr. sp. inf.* 1. p.  
lus. 163. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 12.  
*Habitat in insula terrae novae.*
- Rubetra, 116. *C. ater laevis immaculatus, femoribus fulcatis. Fabr. mant.*  
inf. 1. p. 97. n. 13.  
*Habitat in Cayenna, magnitudine c. pini.*
- pini. 19. *C. elytris testaceis: fasciis nebulosis. Fn. suec.* 589.\* *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 163. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 14.  
*Degeer inf.* 5. p. 222. n. 15. *Curculio longirostris, antennis fractis &c.*  
*Frisch inf.* 11. t. 23. f. 5.  
*Habitat in pinus sylvestris cortice, cum c. abietis aliquando copula junctus.*
- onopor- 117. *C. niger cinereo-villosus, rostro atro: utrinque sulco ab-*  
di. *breuiato baseos. Fabr. mant. inf.* 1. p. 98. n. 15.  
*Habitat in Africae onopordis, vitrato affinis, at major.*
- stolatus, 118. *C. ferrugineo-fuscus albo-lineatus, rostro nigro: utrin-*  
que sulco abbreviato baseos. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 164. n. 14.  
*mant. inf.* 1. p. 98. n. 16.  
*Habitat in Italia, majusculus.*

- jaceae. 119. *C. niger cinereo irroratus*, elytris puncto bascos distincto. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 15. mant. inf. 1. p. 98. n. 17.*  
*Habitat in Centaurea Jacea, adultior magis glaber.*
- punctulatus. 120. *C. flavo fuscoque varius*, abdomine cinereo nigro punctato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 98. n. 18.*  
*Habitat in America, statura c. jaceae, at paulo minor.*
- cynarae. 121. *C. niger virescenti irroratus*, rostro nigro subcarinato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 98. n. 19.*  
*Habitat in Africae floribus cynarae, c. jaceae affinis, at duplo sepe major.*
- Colon. 122. *C. griseus*, elytris puncto albo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 16. mant. inf. 1. p. 98. n. 20.*  
*Mant. p. 531. Curculio longirostris canescens, femoribus anticis lubdentatis, thorace utrinque linea, elytris puncto albo.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 280. n. 6. Curculio oblongus fuscus. Scop. ent. carn. 104. Curculio palustris. Schaeff. ic. t. 155. f. 2.*  
*Herbst apud Fueslii arch. inf. 4. p. 68. n. 3. t. 24. f. 1.*  
β) *Curculio (semicolon) nigricans. Herbst apud Fueslii arch. inf. 4. p. 69. n. 4.*  
*Habitat in Germania.*
- bimaculatus. 123. *C. fuscus*, elytris puncto cinereo, rostro pedibusque atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 98. n. 21.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura C. Colon, at paulo minor.*
- biguttatus. 124. *C. niger*, elytris puncto elevato, abdomine pedibusque posterioribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 17. mant. inf. 1. p. 99. n. 22.*  
*Habitat in Germania.*
- bilineatus. 125. *C. fuscus*, elytris lineis duabus punctorum alborum. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 18. mant. inf. 1. p. 99. n. 23.*  
*Habitat in Germania, mediae magnitudinis.*
- tessellatus. 126. *C. cinereus*, elytris apice striis albis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 19. mant. inf. 1. p. 99. n. 24.*  
*Habitat in Germania, mediae magnitudinis.*
- decurtatus. 127. *C. ater*, thorace plano punctato, elytris abbreviatis substriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 99. n. 25.*

*Habitat* Halæ Saxonum, *statura fere c. palmarum, at quadruplo minor.*

- equiseti. 128. *C. thorace laevi, elytris muricatis nigris: punctis duobus apiceque albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 20. mant. inf. 1. p. 99. n. 26.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 69. n. 5. t. 24. f. 2.*  
*Habitat in Angliæ equiseti arvensi.*
- Bufo. 129. *C. fuscus, elytris subreticulatis: fascia media alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 21. mant. inf. 1. p. 99. n. 27.*  
*Habitat in Sibiria.*
- atrifris. 130. *C. cinereus, rostro arcuato atro. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 499. mant. inf. 1. p. 99. n. 28.*  
*Habitat Lipsiæ, magnitudine et statura c. equiseti.*
- cupreus. 21. *C. obscure aeneus fubtus obscurior. Fn. suec. 593. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 26. mant. inf. 1. p. 608. n. 21.*  
*Habitat in Europa.*
- Tragiae. 131. *C. aeneus, rostro pedibusque nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 27. mant. inf. 1. p. 100. n. 35.*  
*Habitat in Tragiae volubilis feminibus e Brasilia allatis.*
- aeneus. 132. *C. niger, elytris aeneis. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 22. mant. inf. 1. p. 100. n. 36.*  
*Habitat in Angliæ nemoribus.*
- curvifris. 133. *C. ater nitidus, rostro arcuato. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 29. mant. inf. 1. p. 100. n. 37.*  
*Habitat in nova Hollandia, parvus.*
- scaber. 22. *C. cinereus, pedibus rufis, elytris scabris. Fn. suec. 592.\**  
*Habitat in Europæ urticis.*
- T. album. 23. *C. ater, abdomine ad latera et posterius lacteo. Fn. suec. 594.\**  
*Habitat in Westerbothnia.*
- ruficollis. 24. *C. ferrugineus, elytris capitisque basi atro-caeruleis. Fn. suec. 595.\**  
*Habitat in Europa.*
- Dryados. 134. *C. cinereus, thoracis dorso fusco, elytris testaceis cinereo-undatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 102. n. 67.*  
*Habitat in Sueciæ quercu, parvus.*



- futu- 135. *C. ovatus fuscus*, linea longitudinali alba. *Fabr. sp. inf.*  
 ralis. I. p. 170. n. 51. *mant. inf.* I. p. 102. n. 68.  
*Habitat in Germaniae salice.*
- crux. 136. *C. ater*, thorace punctis duobus baseos, elytris futura pun-  
 ctisque sparvis albis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 170. n. 52. *mant.*  
*inf.* I. p. 102. n. 69.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. p. 70. n. 14. t. 24. f. b. d.  
*Habitat Hamburgi.*
- exclama- 137. *C. ater*, elytris puncto lineolaque apicis albis. *Fabr. sp.*  
 tionis. *inf.* I. p. 170. n. 53. *mant. inf.* I. p. 102. n. 70.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- venustus. 138. *C. fuscus*, thorace elytrisque albo lineatis, pedibus testa-  
 ceis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 170. n. 54. *mant. inf.* I. p. 102.  
 n. 71.  
*Habitat in Anglia, parvus.*
- plantagi- 139. *C. elytris cinereis*: macula media fusca. *Fabr. mant. inf.*  
 nis. I. p. 103. n. 72.  
*Habitat Halae Saxonum, statura c. rumicis.*
- viscaria. 27. *C. subrotundus cinereus*, thorace elytrisque cinereo-vi-  
 rentibus. *Fn. suec.* 598.\*  
*Habitat in lychnidis viscariae fructificationibus.*
- bipun- 28. *C. cinereus*, elytris macula nigra, tibiis flavescens. *Fn.*  
 ctatus. *suec.* 599.\*  
*Habitat in Europa.*
- quadri- 29. *C. nigricans*, coleoptris maculis quatuor albidis. *Fn. suec.*  
 maculatus. 600.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 169. n. 44. *mant. inf.* I. p. 101.  
 n. 58.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 287. n. 22. *Curculio cinereus &c.*  
*Habitat in Europa.*
- unifascia- 140. *C. supra fuscus*, fascia media cinerea. *Fabr. mant. inf.* I.  
 tus. p. 101. n. 59.  
*Habitat Halae Saxonum, mediae magnitudinis.*
- bifascia- 141. *C. niger*, elytris fasciis duabus cinereis: baseos majore  
 tus. undata. *Fabr. sp. inf.* I. p. 169. n. 45. *mant. inf.* I.  
 p. 102. n. 60.  
*Habitat in Kilonii plantis.*

- lythri. 142. *C. ater*, elytris fascia media abbreviata punctoque posteriore albis, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 102. n. 61.*  
*Habitat in Uplandiae floribus lythri, parvus.*
- quinque- 30. *C. griseus*, coleoptris maculis quinque albis. *Fn. suec. maculatus. 601.\**  
*Habitat in Europa.*
- pericar- 31. *C. subglobosus nebulosus*, elytrorum futura basi alba. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 37. mant. inf. 1. p. 101. n. 49.*  
 pius. *Syst. nat. XII. 2. p. 609. n. 31. Fn. suec. 602.\** Curculio longirostris subglobosus nebulosus, coleoptris macula cordata alba.  
*Habitat in Scrophulariae pericarpis.*
- filymbrii. 143. *C. albo-fuscoque varius*, elytris puncto bascos elevato atro, rostro nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 38. mant. inf. 1. p. 101. n. 50.*  
*Habitat Kilonii, in filymbrio amphibio.*
- capreae. 144. *C. coleoptris fasciis duabus abbreviatis undatis albis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 39. mant. inf. 1. p. 101. n. 51.*  
*Habitat in Angliae sulice caprea, parvus.*
- Rana. 145. *C. thorace fusco: limbo testaceo, elytris testaceis: fasciis tribus undatis cinereis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 101. n. 52.*  
*Habitat Kilonii, parvus, gibbus.*
- paraple- 34. *C. cylindricus subcinereus, elytris mucronatis.* *Fn. suec. Eticus. 604.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 62. mant. inf. 1. p. 103. n. 77.*  
*Fn. suec. 445. It. scan. 184.* Curculio fuscus oblongus, elytris rectis acuminatis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 279.* Curculio oblongus &c.  
*Degeer inf. 5. p. 224. n. 18. t. 7. f. 8.* Curculio phellandrii,  
*Schreber samml. 11. p. 336. t. 4.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 7.*  
*Schaeff. ic. t. 44. f. 1.*  
*Habitat in Europae et Sibiriae umbellatis aquaticis, praesertim phellandrio, larva intra caulem, saepe sub aqua latente, et paraplegiae, ut fertur, apud equos caussa, suis stercore antidoto.*

- umbellatarum. 146. *C. thorace nigro cinereo lineato, elytris mucronatis griseis. Fabr. mant. inf. 1. p. 103. n. 78.*  
*Habitat in Barbariae umbellatis, statura fere paraplectici, at duplo fere minor.*
- filiformis. 147. *C. cylindricus subcinereus, thorace lineis tribus fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 63. mant. inf. 1. p. 103. n. 79.*  
*Habitat in Italia, statura paraplectici, at quadruplo minor.*
- cylindricus. 148. *C. cylindricus supra niger, elytris acuminatis: fascia pallida. Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 64. mant. inf. 1. p. 103. n. 80.*  
*Habitat in Sibiria, statura paraplectici, sed minor.*
- notatus. 149. *C. thorace fusco: punctis quatuor albis, elytris fuscis: fascia sesquialtera testacea. Fabr. mant. inf. 1. p. 103. n. 81.*  
*Habitat in Barbariae plantis, cylindricus.*
- barbirostris. 150. *C. niger, rostro barbato, tibiis anterioribus tridentatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 65. mant. inf. 1. p. 104. n. 82.*  
*Seb. mus. 4. t. 95. f. 5.*  
*Habitat in America australi, et India.*
- angustatus. 151. *C. cylindricus ater, elytris obtusis punctatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 172. n. 66. mant. inf. 1. p. 104. n. 83.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 71. n. 18. t. 24. f. 7.*  
*Habitat rarior in Anglia.*
- bardanae. 152. *C. cylindricus griseo tomentosus, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 104. n. 84.*  
*Habitat Dresdae in arctio lappa, statura et magnitudine paraplectici.*
- anguinus. 35. *C. cylindricus canus, fusco lineatus.*  
*Habitat in Germania, statura paraplectici, subtus pedibusque canus nigro punctatus; rostro magis arcuato, elytris longitudinaliter duplici serie punctorum excavatorum minutissimorum ornatis, apice mucronatis.*
- Afcanii. 36. *C. cylindricus ater, lateribus subcaerulefcentibus. Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 67. mant. inf. 1. p. 104. n. 85.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 71. n. 19. t. 24. f. 8.*  
 β) *Curculio cylindricus. Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 71. n. 20.*

*Habitat*

*Habitat in Europa australi, statura paraplectici, subtus con-*  
*nescens, elytris acutis. Alcanius.*

- lineola. 153. *C. cylindricus niger, elytris vitta testacea. Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 173. n. 68. mant. inf. 1. p. 104. n. 86.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- linearis. 154. *C. elongatus niger, antennis pedibusque piceis, rostro*  
*basi attenuato. Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 69. mant. inf.*  
*1. p. 104. n. 87.*  
*Habitat Argentorati, rarior totus ferrugineus. Hermann.*
- crassipes. 155. *C. femoribus anterioribus subclavatis, corpore atro.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 70. mant. inf. 1. p. 104. n. 88.*  
*Habitat Argentorati. Hermann.*
- atriplicis. 156. *C. elongatus ater, thorace nitido, elytris striatis obtusis.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 173. n. 71. mant. inf. 1. p. 104. n. 89.*  
*Habitat in littoris Kilonienfis et Norwegici atriplice littorali.*
- Bacchus. 38. *C. cupreus, rostro plantisque nigris. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 165. n. 22. mant. inf. 1. p. 99. n. 29.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 270. n. 4. Rhinomacer niger &c.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 4.*  
*Schaeff. ic. t. 37. f. 13.*  
*Habitat in Europae magis australis vite, corylo, supra sub-*  
*villofus.*
- betulae. 39. *C. corpore viridi-aurato, subtus concolore. Fn. suec. 605.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 25. mant. inf. 1. p. 99. n. 30.*  
*Degeer inf. 5. p. 248. n. 5. t. 7. f. 25. Curculio longiro-*  
*stris, antennis rectis nigris &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 270. n. 2. Rhinomacer totus viridi-*  
*caeruleus.*  
*Frisch inf. 12. 17. t. 8. f. 2.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 5.*  
*Schaeff. ic. t. 6. f. 4.*  
*Habitat in betula alba, et frequentissimus in vite, folia con-*  
*torquens, aliquando totus caeruleus, alterius sexus tho-*  
*race antrorsum spinoso.*
- populi. 40. *C. corpore viridi-ignito, subtus atro-caerulescente. Fn.*  
*suec. 606. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 24. Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 99. n. 31.*

Degeer

- Degeer inf. 5. p. 249. n. 37.* Curculio longirostris, antennis rectis nigris &c.
- Geoffr. inf. par. 1. p. 270. n. 3.* Rhinomacer viridi-aureus, subtus nigro-violaceus.
- Habitat in betula, populo, alterius sexus thorace antrorsum spinoso.*
- bicolor. 157. C. niger, thorace elytrisque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 25. mant. inf. 1. p. 99. n. 32.*  
*Habitat in America.*
- caeruleo- 158. C. violaceus nitens, thorace elytrisque testaceis. *Schall. cephalus. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 282. Fabr. mant. inf. 1. p. 99. n. 33.*  
*Habitat in Saxoniae crataego, statura bicoloris.*
- sturnus. 159. C. ovatus niger flavo-irroratus. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 280.*  
*Habitat Halae Saxonum gregarius in urticis, c. jaceae affinis, c. pini magis ovatus.*
- parifinus. 160. C. elytris thoraceque viridibus, rostro pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 16. n. 27.*  
*Habitat Lutetiae Parisiorum, pediculo duplo major, oblongo-cylindricus.*
- cylindroi- 161. C. elongatus flavo irroratus, elytris punctato-striatis des. apice obtusiusculis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 38. n. 1.*  
*Habitat ad caput bonae spei, paraplectico affinis.*
- porifer. 162. C. thorace subgloboso: spinulis brevioribus trifariis apice pertusis, elytrisque nigricantibus albo-lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 38. n. 2.*  
*Habitat ad caput bonae spei, subtus cinereo-pubescentis.*
- easser. 163. C. ater thorace scabro, antennis utrinque cicatrice notato, elytris punctato-striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 39. n. 3.*  
*Habitat ad caput bonae spei, subtus griseo-pubescentis, antennarum clava sericeo-argentea.*
- armilla- 164. C. thorace utrinque subspinoso, femoribus ad apicem cingulo griseo notatis, tibiis fere omnibus dentatis. *Sparrm. tus. nov. act. Stockh. 1785. p. 40. n. 10.*

α) Cur-

α) *Curculio* totus ex fusco cinereus.

β) *Curculio* elytris cinereo-nebulosis: maculis utrinque obliquis oblongis cinereis.

*Habitat ad caput bonae spei.*

- ulicis. 165. *C. cinereus*, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus et femoribus primi paris rufis. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 31. n. 31.*  
*Habitat in Anglia, in floribus ulicis europaei, primo vere conspicuus, vix pediculi magnitudine.*
- latus. 166. *C. ater* depressus flavo irroratus thorace granulato: linea media elevata transversa, elytris sulcatis. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 4. p. 71. n. 21. t. 24. f. 9.*  
*Habitat in Hungaria, c. Aescanii affinis.*
- rumicis. 60. *C. griseus* nigro-nebulosus, antennis fuscis. *Fn. succ. 590. Fabr. sp. inf. 1. p. 170. n. 55. mant. inf. 1. p. 103. n. 73. Degeer inf. 5. p. 231. n. 20. t. 7. f. 10. 11. Rij. inf. 85. n. 36.*  
*Habitat in Europae rumice.*
- ungaricus. 167. *C. niger*, thorace elytrisque purpureis. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 4. p. 71. n. 22. t. 24. f. 10.*  
*Habitat in Hungaria, statura et magnitudine bacchi.*
- cyanoccephalus. 168. *C. niger* villosus, capite chalybeo, thorace rubro, elytris subspadiceis punctato striatis, femoribus virescentibus. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 4. p. 72. n. 23. t. 24. f. 11.*  
*Habitat frequens in Marchiae betula, 2 lineas longus.*
- striatus. 169. *C. cinereo-pubescens*, thoracis striis tribus albidis, elytrorum totidem nigris. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 4. p. 72. n. 25. t. 24. f. 13.*  
*Habitat Berolini, rarior, 3 circiter lineas longus, c. polygoni proxime affinis.*
- canus. 170. *C. subglobosus* cinereo-pubescens, elytris abbreviatis. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 5. p. 73. n. 26. t. 24. f. 14. c.*  
*Habitat Berolini.*
- cruciger. 171. *C. nigerrimus*, antennarum basi tarsisque fuscis, elytris abbreviatis striatis albo maculatis. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 5. p. 73. n. 27. t. 24. f. 15.*  
*Habitat Berolini, 2 circiter lineas longus.*

- Grus. 172. *C. niger*, subtus cinereus, thorace elytrisque punctato-friatis scabris, femoribus clavatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 73. n. 28.*  
*Habitat in Pomerania, vix sesquilineam longus.*
- alanda. 173. *C. cinereus*, subglobosus thoracis dorso fascia transversa maculisque nigris, pedibus fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 29. t. 24. f. 16. f.*  
*Habitat in Pomerania.*
- urticari- 174. *C. fuscus*: fasciis villosis albidis undulatis, pedibus fulvis.  
us. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 30.*  
*Habitat in Pomerania, vix pulicis magnitudine.*
- Punctum 175. *C. nigerrimus*, subtus et ad latera ochroleuco irroratus,  
album. antennis fulvis, elytrorum sutura puncto medio albo.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 31. t. 24. f. 17.*  
*Habitat in nymphaeae luteae floribus, magnitudine et stru-  
ctura c. scrophulariae.*
- albovitta- 176. *C. flavo-cinereus*, elytris vitta utrinque alba, rostro ni-  
tus. gro. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 32.*  
*Habitat in Marchia.*
- Lineola 177. *C. convexus piceus*, elytris friatis albo villosis: futurae  
alba. linea alba abbreviata. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5.  
p. 74. n. 33.*  
*Habitat in Marchia, pulicis magnitudine.*
- versico- 178. *C. piceus albido-pubescens*, rostro nigro. *Herbst apud  
lor. Fuessli arch. inf. 5. p. 75. n. 34.*  
*Habitat in Marchia, statura et magnitudine granari.*
- melas. 179. *C. angustus nigerrimus*, tenuissime punctatus, *Herbst  
apud Fuessli arch. inf. 7. p. 166. n. 94.*  
*Habitat in Austria, vix sesquilineam longus.*
- rosarum. 180. *C. subglobosus niger albido-pubescens*, elytris friatis.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 167. n. 97.*  
*Habitat Berolini, sesquilineam longus.*
- quadri- 181. *C. griseus*, thorace lineis duabus, elytris punctis qua-  
punctatus. tuor albis. *Lepechin it. 2. p. 204. t. 11. f. 23.*  
*Habitat in Russia australi.*

- varius. 182. *C. albo nigroque varius*, elytris apice acuminatis. *Lepech. it. 2. p. 204. t. 11. f. 33.*  
*Habitat in Russia australi.*
- piceus. 183. *C. piceus*, elytris abdomen aequantibus. *Pall. it. 1. app. n. 34. inf. mus. 1. p. 23. t. 13. f. 3.*  
*Habitat in muria lacus Indericensis, c. palmarum affinis, at quadruplo minor.*
- nomas. 184. *C. oblongus*, subtus albo-tomentosus, elytris canescens: striis punctato-fulcatis. *Pall. it. 1. app. n. 31.*  
*Habitat in Sibiria.*
- picatus. 185. *C. oblongus ex nigro piceus*, antennis fuscis. *Degeer inf. 5. p. 221. n. 14.*  
*Habitat - - - 4½ lineam longus.*
- gibbosus. 186. *C. ovatus niger*, elytris tuberculatis, posterius cinereis. *Degeer inf. 5. p. 224. n. 17.*  
*Habitat - - - 2½ lineas longus.*
- castaneus. 187. *C. oblongus castaneus*, subtus niger, elytris striato-punctatis gibbosis. *Degeer inf. 5. p. 231. n. 19.*  
*Habitat - - - 3½ lineas longus.*
- fasciatus. 188. *C. cinereus oblongus*, fasciis longitudinalibus dilutioribus. *Fn. succ. ed. 2. n. 2274. Degeer inf. 5. p. 234. n. 21.*  
*Habitat - - -*
- naevius. 189. *C. ovatus griseus*, thorace fasciis, elytris macula magna punctisque fuscis. *Degeer inf. 5. p. 237. n. 24. t. 7. f. 17. 18.*  
*Habitat in plantagine, Julii sine frequens.*
- rostratus. 190. *C. oblongus rufus*, capite elytrisque viridi-caeruleis nitidis. *Degeer inf. 5. p. 252. n. 42. t. 7. f. 27. 28.*  
*Habitat in Succiae hortis.*
- melanocephalus. 191. *C. subglobosus fuscus*, capite rostroque nigris, elytris gibbis. *Degeer inf. 5. p. 272. n. 6. t. 15. f. 27.*  
*Habitat Surinami, 4 lineas longus.*
- frugilegus. 192. *C. oblongus castaneus coleoptris thoracem aequantibus: maculis quatuor rufis.* *Degeer inf. 5. p. 273. n. 7.*  
*Habitat Surinami et in Oriente, parvus, fruges consumens.*  
193. *C.*

*An species a Schaeffero ic. t. 56. f. 4. et t. 95. f. 6. 7. depictae, testaceus et Schaefferi hujus ordinis?*



- pulvertulenti. 193. *C. fuscus*, thorace granulato, elytris transversim rugosis.  
*Scop. ent. carn. n. 75.*  
*Habitat in Carniola.*
- centaureae. 194. *C. ovatus fuscus subrufo-villosus*, rostro deflexo marginato: linea ad apicem elevata media. *Scop. ent. carn. n. 76.*  
*Habitat in centaureis.*
- auratus. 195. *C. viridi-auratus*, antennis rostrique apice dilatato nigris. *Scop. ent. carn. n. 77.*  
*Habitat in Carniola.*
- icosandriae. 196. *C. atro-caeruleus*, rostro porrecto, elytris octo-friatis.  
*Scop. ent. carn. n. 87.*  
*Habitat in plantis icosandris.*
- oleraceus. 197. *C. globosus nigricans*, elytris puncto lunulaque apicis albis. *Scop. ent. carn. n. 88.*  
*Habitat in Carniola.*
- pellucens. 198. *C. flavicans*, oculis rostrique apice nigris. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 90. n. 41.*  
*Habitat circa Schemnitz Hungariae, vix 2 lineas longus.*
- gibbus. 199. *C. ovatus niger*, elytris violaceis fulcatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1014.*  
*Habitat in Dania.*
- similis. 200. *C. ater*, elytris ovatis punctato-friatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1015.*  
*Habitat in Dania.*
- nemorialis. 201. *C. niger*, oculis fuscis, elytris punctato-friatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1016.*  
*Habitat in Daniae nemoribus.*
- politus. 202. *C. niger*, elytris cyaneis friatis nitidis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1017.*  
*Habitat in Dania.*
- ochropus. 203. *C. niger ovatus*, femoribus ex flavo rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1018.*  
*Aët. Nidros. 4. 15.*  
*Habitat in Scandinavia.*
- griseus. 204. *C. oblongus cinereus*, antennis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 974.*  
*Habitat in Dania.*

- nitens. 205. *C. oblongus* ex nigro violaceus, thorace elytrisque ex nigro virentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 975.*  
*Habitat in Dania.*
- arvensis. 206. *C. griseus*, thorace trilineato, elytris rufis obscure tessellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 978.*  
*Habitat in Dania.*
- tuberculatus. 207. *C. niger*, thorace rugoso, elytris lineis tuberculisque muricatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 979.*  
*Habitat in Dania.*
- glaucus. 208. *C. niger*, thorace utrinque linea pallida, tibiis rufis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 88. n. 989.*  
*Habitat in Dania.*
- trifolii. 209. *C. niger*, femoribus pallidis, abdomine albo. *Syst. nat. XII. 3. add. p. 224.*  
*Habitat in trifolii montani spicis, intra quas declaratur, pulicis magnitudine.*
- longus. 210. *C. angustus elongatus niger*, thorace fasciis quatuor albicantibus. *Geoffr. inf. par. I. p. 269. n. 1.*  
*Habitat in Gallia.*
- fuliginosus. 211. *C. ex atro fuscus glaber punctato-striatus.* *Geoffr. inf. par. I. p. 271. n. 6.*  
*Habitat in Gallia.*
- teres. 212. *C. ex nigro viridescens oblongus striatus.* *Geoffr. inf. par. I. p. 272. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- Pulex. 213. *C. subglobosus villosus niger*, pedibus elytrisque rufis. *Geoffr. inf. par. I. p. 272. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- rugosus. 214. *C. totus fuscus rugosus.* *Geoffr. inf. par. I. p. 278. n. 2.*  
*Habitat in Gallia.*
- fulcatus. 215. *C. fusco-nebulosus*, thorace fulcato, elytris striatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 278. n. 3.*  
*Habitat in Gallia.*
- carduelis. 216. *C. niger striatus*, maculis villoso-fuscis nebulosis. *Geoffr. inf. par. I. p. 281. n. 8.*  
*Habitat in Galliae carduis.*

- napobrassicae. 217. *C. ex atro cinereus*, capite globoso, rostro elytrisque nigris, antennis fuscis. *Bjerkander nov. act. Stockh. 1780. 3. n. 4. p. 185.*  
*Habitat in napobrassicae caulibus, quos exedit, lineam longus, an hujus ordinis?*
- erythropus. 560. *C. griseus*, elytris striatis, rostro pedibusque nigris, tibiis apice incurvis plantisque rubris. *Mus. Lesk. p. 18. n. 385.*  
*Habitat in Europa.*
- chalybeus. 561. *C. glaber nigro-caeruleus*, rostro arcuato, thorace punctato, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 388.*  
*Habitat in Europa.*
- crenulatus. 562. *C. niger glaber*, rostro longitudine corporis, elytris striatis: striis profunde crenatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 390.*  
*Habitat - - -*
- foveolatus. 563. *C. viridi-aureus*, rostro pedibusque nigris, abdomine violaceo elytris profunde punctatis, antennas inter oculosque fovea oblonga. *Mus. Lesk. p. 19. n. 391.*  
*Habitat in Europa.*
- virens. 564. *C. cylindricus viridis nitens*, rostro pedibusque cupreis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 392.*  
*Habitat in Europa.*
- crassicornis. 565. *C. niger*, rostro compresso, antennis non fractis apice crassioribus, thorace elytrisque levissime punctatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 393.*  
*Habitat in Europa.*
- glabratus. 566. *C. niger glaber*, elytris nigro-aeneis striatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 398.*  
*Habitat in Europa, statura c. alliarii.*
- atomarius. 567. *C. fuscus*, elytris striatis: atomis griseis pilosis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 399.*  
*Habitat in Europa.*
- striatulus. 568. *C. niger*, elytris fulcatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 400.*  
*Habitat in Europa, statura aterrimi.*
- rugosus. 569. *C. fuscus*, elytris rugosis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 405.*  
*Habitat in Europa.*

- crinitus. 570. *C. niger globosus griseo pilosus, rostro glabro incurvo, elytris striatis. Mus. Lesk. p. 19. n. 407.*  
*Habitat in Europa.*
- haeruato- 571. *C. niger, thorace punctato, elytris striis crenatis, anten-*  
pus. *nis tibiisque sanguineis. Mus. Lesk. p. 19. n. 417.*  
*Habitat in Europa.*
- †† *femoribus posterioribus incrassatis, faltatorii.*
- quercus. 25. *C. pallide flavus, oculis nigris. Fn. suec. 596.\* Uddm. diff. 25.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 184. n. 126. mant. inf. I. p. 110. n. 155.*  
*Curculio (viminalis) longirostris, femoribus faltatorii, corpore testaceo.*  
*Degeer inf. 5. p. 260. n. 48. t. 8. f. 5. Curculio ulmi.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 286. n. 19. Curculio rufus.*  
*Reaumur inf. 3. 31. t. 3. f. 17. 18.*  
*Habitat in Europae salicis, ulmi, quercus foliis, inter ve-*  
*nas majores subcutaneus, folia maculans, magnitudine*  
*pediculi.*
- multiden- 572. *C. rufus, oculis nigris, pedibus posterioribus multiden-*  
tatus. *tatis. Mus. Lesk. p. 20. n. 441.*
- meticulo- 218. *C. griseo fuscus, subtus elytrisque posterius albidus vil-*  
lus. *losus, rostro inflexo nigro. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 8.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- pudicus. 219. *C. pallide griseus, rostro inflexo sanguineo, capite*  
*pedibusque rubicundis, elytris striatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 9.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- ilicis. 220. *C. nigricans, elytris striatis cinereo variis. Fabr. mant. inf. I. p. 110. n. 156.*  
*Habitat in Uplandiae quercu, parvus, statura c. quercus.*
- Jota. 221. *C. ater, elytris striatis, futura basi alba. Fabr. mant. inf. I. p. 110. n. 157.*  
*Habitat in Uplandia, parvus.*
- alni. 42. *C. niger, elytris testaceis: maculis duabus obscuris. Fn. suec. 608.\* Fabr. sp. inf. I. p. 183. n. 123. mant. inf. I. p. 110. n. 151.*

- Fn. suec.* I. n. 473. *Curculio lividus*, coleoptris maculis quatuor obscuris.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 286. n. 20. *Curculio rufus*.  
*Degeer inf.* 5. p. 262. n. 49. *Curculio alni saltator*.  
*Habitat in Europae alno.*
- pilosus.** 222. *C. niger*, cinereo variegatus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 183. n. 124. *mant. inf.* I. p. 110. n. 152.  
*Habitat in Anglia, parvus.*
- Galcar.** 223. *C. niger*, femoribus unidentatis, antennis plantisque testaceis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 110. n. 153.  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- falicis.** 43. *C. elytris atris*: fasciis duabus albis. *Fn. suec.* 610.\*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 183. n. 125. *mant. inf.* I. p. 110. n. 154.  
*Degeer inf.* 5. p. 264. n. 51.  
*Habitat in falicis floribus.*
- fagi.** 44. *C. corpore atro*, femoribus pallidis. *Fn. suec.* 609. *It. scan.* III. *Scop. ent. carn.* 73. *Fabr. sp. inf.* I. p. 184. n. 127. *mant. inf.* I. p. 110. n. 158.  
*Habitat in fagi sylvaticae foliis.*
- segetis.** 45. *C. corpore piceo*, elytris oblongis. *Fn. suec.* 611.  
*Habitat in agris super spicas.*
- rhei.** 279. *C. ater opacus*, thorace subpunctato, elytris punctato-striatis, subtus albido-pubescentibus. *Herbst apud Fueslli arch. inf.* 5. p. 78. n. 50.  
*Habitat Berolini, sine rostro 3 lineas longus.*
- rhamni.** 280. *C. ater opacus*, rostro nitido, thorace grundato, elytris subfulcatis. *Herbst apud Fueslli arch. inf.* 5. p. 78. n. 51.  
*Habitat in Marchia, absque rostro 4 lineas longus, c. rhei similis.*
- curvirostris.** 282. *C. nigricans albido-pubescentis*, thorace punctato, elytris striatis, rostro incurvo, antennarum clavis fuscis. *Herbst apud Fueslli arch. inf.* 5. p. 78. n. 53.  
*Habitat in Marchia, 1½ lineam longus.*
- Vanellus.** 283. *C. capite thoraceque subvilloso brevibus elytris striatis, pedibus fusciscentibus.* *Herbst apud Fueslli arch. inf.* 5. p. 79. n. 55. t. 24. f. 23. I.  
*Habitat Berolini, vix lineam superans.*

- arator. 284. *C. subovatus*, thorace fusco: lineis tribus pallidis, elytrorum sutura nigro dentata, pedibus fuscis. *Mant. p. 531.*  
*Habitat - - - cimicis magnitudine.*
- maricatus. 285. *C. ex fusco nigricans*, elytris verrucoso-striatis, femoribus unidentatis. *Drury inf. 2. t. 34. f. 4.*
- varicosus. 454. *C. elytris connatis fulcatis supra sextuberculatis*, posterius bimucronatis. *Pall. inf. Ross. 1. p. 22. t. B. f. 1.*  
*Habitat in America meridionali, inter maximos congenerum, vaginali affinis, ater.*
- rhynchosceros. 455. *C. elytris connatis tuberculatis mucronatis*, rostro basi bicorni. *Pall. inf. Ross. 1. p. 23. t. B. f. 2.*  
*Habitat in America, varicoso paulo brevior et latior.*
- exesus. 456. *C. corpore nigro lutescente irrorato*, thorace elytrisque maculis exesis albis. *Pall. inf. Ross. 1. p. 33. t. H. f. B. 15.*  
*Habitat Surinami, germano affinis, at major.*
- danubialis. 478. *C. elytris cervinis: punctis nigris sparsis.*  
*Habitat in insulis danubialibus Viennensibus in corticibus arborum, 2 lineas longus.*
- ††† femoribus dentatis.
- aterimus. 10. *C. ater*, elytris nitidis. *Fn. suec. 582.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 179. n. 103. mant. inf. 1. p. 108. n. 132.*  
*Habitat in Europae plantis frequentissimus, statura et magnitudine ocellariae.*
- cerasi. 11. *C. ater*, elytris opacis oblongis. *Fn. suec. 583. Scop. ent. carn. 84. Fabr. sp. inf. 1. p. 179. n. 104. mant. inf. 1. p. 108 n. 133.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 299. n. 48. Curculio niger, thorace utrinque dentato.*  
*Frisch inf. 11. 31. t. 23. f. 1. 3.*  
*Habitat in cerasi pyrique foliis, epidermidem exedens, commaculans, 1750 in Suecia frequentissimus.*
- beccabungae. 41. *C. niger*, elytris rufis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 108. n. 130.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 614. n. 41. Fn. suec. 607.\* Curculio fuscus, elytris subfanguineis: margine anoque fuscis?*  
*Habitat in Sueciae beccabunga, magnitudine et statura c. cerasi.*

- Troglo- 224. C. thorace linea dorsali cinerea, elytris pedibusque testa-  
dytes. ceis, pedibus fuscis. *Fabr. mant. inf. I. p. 108. n. 131.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- lapathi. 20. C. albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis. *Fu.*  
*suec. 591.\* Fabr. sp. inf. I. p. 176. n. 86. mant. inf. I. p.*  
*106. n. 109.*  
*Degeer inf. 5. p. 223. n. 16. t. 7. f. I. 2. Curculio albi*  
*caudis.*  
*Habitat in Europae salicibus et rumicibus, pectoris lateribus*  
*elytrisque posterius albidis.*
- irrorat- 225. C. albus supra fuscus albo maculatus, femoribus fusco an-  
tus. nulatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 106. n. 110.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine C. lapathi.*
- sexgutta- 226. C. niger, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf. I.*  
tus. *p. 176. n. 87. mant. inf. I. p. 106. n. 111.*  
*Habitat in America.*
- luridus. 227. C. ovatus obscure niger, elytris punctato-striatis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 176. n. 88. mant. inf. I. p. 106. n. 112.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- stolidus. 228. C. fuscus, tibiis posterioribus incurvis dentatis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 176. n. 89. mant. inf. I. p. 106. n. 113.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*
- medita- 229. C. elytris striatis, posterius acuminatis. *Fabr. sp. inf. I.*  
bundus. *p. 176. n. 90. mant. inf. I. p. 106. n. 114.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- stupidus. 230. C. niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 91. mant. inf. I. p. 107. n. 115.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- mangife- 231. C. griseus thorace linea punctisque duobus dorsalibus al-  
rae. bis. *Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 92. mant. inf. I. p. 107.*  
*n. 116.*  
*Habitat in mangiferae nucleis.*
- stultus. 232. C. griseus, elytris macula communi lunata cinerea, rostro  
atro. *Fabr. mant. inf. I. p. 107. n. 117.*  
*Habitat in Coromandel, c. mangiferae minor.*

- squalidus. 233. *C. villosus-griseus*, rostro testaceo. *Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 93. mant. inf. I. p. 107. n. 118.*  
*Habitat Surinami, mediae magnitudinis.*
- pomorum. 46. *C. femoribus anterioribus dentatis*, corpore griseo nebuloso. *Fn. suec. 612.\* Fabr. sp. inf. I. p. 181. n. 115. mant. inf. I. p. 109. n. 145.*  
*Frisch inf. I. p. 32. t. 8. Curculio in floribus arborum.*  
*Habitat in pomonae floribus.*
- ovalis. 47. *C. corpore ovato nigro albo maculato.* *Fn. suec. 613.*  
*Habitat in Europa.*
- carbonarius. 48. *C. corpore nigro oblongo, clytris striatis.* *Fn. suec. 614. Scop. ent. carn. 29.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 27. n. 47. t. 24. f. 21.*  
*Habitat in Europa. Solander.*
- mucronatus. 49. *C. femoribus quatuor anterioribus dentatis, clytris polline flavescens, supra apicem gibbosis.* *Mus. Lud. Ulr. 53.\* Gron. mus. 589.\* Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 74. mant. inf. I. p. 104. n. 92.*  
*Habitat in America australi et India.*
- jamaicensis. 234. *C. obscurus scaber, thorace utrinque fasciculato tuberculato, clytris striatis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 73. mant. inf. I. p. 104. n. 91.*  
*Habitat in America meridionali, magnus.*
- bidens. 235. *C. niger, femoribus posterioribus dentatis, clytris unispinosis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 72. mant. inf. I. p. 104. n. 90.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- puffio. 50. *C. femoribus quatuor posterioribus dentatis, clytris striatis nigris: linea repanda grisea.* *Mus. Lud. Ulr. 46.\* Fabr. sp. inf. I. p. 174. n. 75. mant. inf. I. p. 104. n. 93.*  
*Habitat in America australi et India, elytrorum linea longitudinali.*
- vaginalis. 51. *C. clytris striatis: tuberculis sparsis, juxta apicem mucronatis.* *Mus. Lud. Ulr. 47.\**  
*Habitat in America et Sibiria.*  
*Pro rostro fossula in thorace; elytrorum striae ex punctis cavis villosis.*



- spinipes. 236. *C. niger*, thorace lineis duabus, elytris striis quatuor albis, tibiis anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 174. n. 76. mant. inf. I. p. 104. n. 94.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, magnus.*
- Bombina. 237. *C. ferrugineo-fuscus*, elytris striatis: tuberculis elevatis atris. *Fabr. mant. inf. I. p. 104. n. 95.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- Scorpio. 238. *C. ater*, thorace plano basi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque, medio cinereis. *Fabr. mant. inf. I. p. 105. n. 96.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- Scaber. 239. *C. thorace carinato*, elytris fulcatis tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 174. n. 77. mant. inf. I. p. 105. n. 97.*  
*Habitat in Cayenna.*
- trifasciatus. 240. *C. thorace linea laterali*, elytris albo punctatis: maculisque duabus brunneis. *Fabr. mant. inf. I. p. 105. n. 98.*  
*Habitat in Cayenna, testaceus c. abietis paulo major.*
- cylindrirostris. 241. *C. thorace scabro*, elytris posterioribus bituberculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 174. n. 78. mant. inf. I. p. 105. n. 99.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- stigma. 52. *C. elytris macula magna ferruginea.* *Mus. Lud. Ulr. 48.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 174. n. 79. mant. inf. I. p. 105. n. 100.*  
*Habitat in America australi et India.*
- hebes. 242. *C. femoribus subdentatis*, thorace scabro, elytris fulcatis tuberculatis, ore barbato. *Fabr. sp. inf. I. p. 174. n. 80. mant. inf. I. p. 105. n. 101.*  
*Habitat ad fluvium Senegal, mediae magnitudinis.*
- depressus. 53. *C. thorace depresso*, lateribus obtuse angulatis. *Mus. Lud. Ulr. 49.\** *Fabr. sp. inf. I. p. 181. n. 114. mant. inf. I. p. 109. n. 144.*  
*Seb. mus. 4. t. 95. f. 4.*  
*Habitat in America meridionali, griseus: punctis nigris glabris prominulis.*
- annulatus. 54. *C. pallidus*, thorace elytrisque strigis nigris. *Mus. Lud. Ulr. 51.\** *Fabr. sp. inf. I. p. 175. n. 81. mant. inf. I. p. 105. n. 102.*

*Habitat*

*Habitat in America australi et India, thoracis striga una, elytrorum duabus.*

- caliginosus. 243. *C. elytrorum striis punctatis approximatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 175. n. 82. mant. inf. 1. p. 105. n. 103.*  
*Habitat in Anglia, varior.*
- dubius. 244. *C. niger, thorace laevi, elytris striatis scabris. Fabr. mant. inf. 1. p. 106. n. 104.*  
*Habitat - - - magnus.*
- adsperfus. 245. *C. fulvo irroratus, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 106. n. 105.*  
*Habitat in Cayenna, magnitudine et statura c. cynarae.*
- brunneus. 246. *C. brunneus, rostro fusco, elytris testaceis punctato striatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 175. n. 83. mant. inf. 1. p. 106. n. 106.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus.*
- abietis. 57. *C. elytris fuscis: fasciis duabus linearibus interruptis albidis. Fr. succ. 615.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 175. n. 84. mant. inf. 1. p. 106. n. 107.*  
*It. oel. 26. Curculio subfuscus.*  
*Pet. gazoph. 14. t. 8. f. 9. Curculio norwegicus.*  
*Degeer inf. 5. p. 205. n. 1. t. 6. f. 11.*  
*Schaeff. ic. t. 25. f. 1.*  
*Habitat in pini sylvestris cortice et resina; an alter sexus c. pini?*
- reticulatus. 247. *C. oblongus piceus, elytris reticulatis: fasciis obliquis pallidis, tibiis anterioribus spinosis. Fabr. sp. inf. 1. p. 76. n. 85. mant. inf. 1. p. 106. n. 108.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- germanus. 58. *C. ater, thorace utrinque punctis duobus testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 177. n. 94. mant. inf. 1. p. 107. n. 119.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 58. Curculio longirostris, femoribus subdentatis, corpore ovato nigro, punctis testaceis adperso.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 91. n. 44.*  
*Sultz. hist. inf. 39. t. 4. f. 8.*  
*Schaeff. ic. t. 25. f. 2.*  
*Frisch inf. 13. p. 28. t. 26.*  
*Habitat in Europa, frequens in Germania, inter maximos europaeos.*

- nucum. 59. *C. corpore griseo longitudine rostri. Fn. succ. 616. Fabr. sp. inf. 1. p. 179. n. 156. mant. inf. 1. p. 108. n. 135. Uddm. diff. 24. Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis. Geoffr. inf. par. 1. p. 295. n. 42. Degeer inf. 5. p. 205. n. 2. t. 6. f. 14-16. Roef. inf. 3. t. 67. f. 5. 6. Scop. ent. carn. 105. Poda inf. t. 1. f. 3. Schaeff. el. t. 55. f. 1. ic. t. 50. f. 4. Sulz. hist. inf. t. 3. f. 22. Habitat in coryli avellanae nucibus frequens.*
- proboscideus. 248. *C. griseus, rostro corpore duplo longiore. Fabr. sp. inf. 1. p. 180. n. 107. mant. inf. 1. p. 108. n. 136. Habitat in America boreali, an varietas c. nucum?*
- varians. 249. *C. griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 180. n. 108. mant. inf. 1. p. 109. n. 137. Habitat in Cayenna.*
- ceraforum. 250. *C. fuscus, scutello elytrorumque fasciis obsoletis cinereis. Fabr. sp. inf. 1. p. 180. n. 109. mant. inf. 1. p. 109. n. 138. Habitat in Anglia, c. nucum triplo minor.*
- amoenus. 251. *C. ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis. Fabr. sp. inf. 1. p. 180. n. 110. mant. inf. 1. p. 109. n. 139. Habitat in nova Hollandia.*
- bicornis. 252. *C. femoribus acute dentatis, capite bidentato. Fabr. sp. inf. 1. p. 180. n. 111. mant. inf. 1. p. 109. n. 140. Habitat in nova Seelandia, ex fusco et cinereo varius.*
- tenuirostris. 253. *C. niger, elytris albo subfasciatis, antennis rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 180. n. 112. mant. inf. 1. p. 109. n. 141. Habitat in Anglia, statura c. ceraforum, at minor.*
- serophulariae. 61. *C. coleoptris maculis duabus dorsalibus atris. Fn. succ. 603. Fabr. sp. inf. 1. p. 177. n. 95. mant. inf. 1. p. 107. n. 120. Geoffr. inf. par. 1. p. 296. n. 44. Degeer inf. 5. p. 208. n. 3. t. 6. f. 17-20.*

*List. scar. angl. p. 395. n. 35.*

*Reaumur. inf. 3. t. 2. f. 12.*

*Habitat in scrophulariis, quarum pericarpia exedit larva, folliculos ovatos, operculatos, fuscis substituens.*

verbasci. 254. *C. niger, thoracis lateribus flavescens, elytris punctis albis nigrisque alternis striatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 107. n. 121.*

*Habitat Kilonii, an varietas C. scrophulariae.*

gravis. 255. *C. niger, elytris ferrugineo variis, femoribus canaliculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 96. mant. inf. 1. p. 107. n. 122.*

*Habitat ad caput bonae spei.*

druparum. 62. *C. elytris testaceis, obsolete fasciatis. Fn. suec. 617. Fabr. sp. inf. 1. p. 181. n. 113. mant. inf. 1. p. 109. n. 142.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 296. n. 43.*

*Degeer inf. 5. p. 214. n. 7.*

*Schaeff. ic. t. 1. f. 11.*

*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 21.*

*Habitat in cerasi padi nucleis.*

fraxini. 256. *C. fuscus, femoribus ferrugineis, capite dorsoque nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 109. n. 143.*

*Habitat in Sueciae fraxino, magnitudine c. druparum.*

violaceus. 63. *C. totus violaceus. Fn. suec. 579. Fabr. sp. inf. 1. p. 179. n. 105. mant. inf. 1. p. 108. n. 134.*

*Degeer inf. 5. p. 213. n. 5.*

*Bergstr. nomencl. 1. 16. 13. t. 2. f. 13.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 271. n. 5.*

*Habitat in Europae pinetis, frequens in turionibus.*

quinquepunctatus. 64. *C. elytris futura maculisque duabus albis. Fn. suec. 618. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 97. mant. inf. 1. p. 107. n. 123.*

*Herbst apud Fueslli arch. inf. 5. p. 75. n. 40. t. 24. f. 18. g.*

*Habitat in Europa boreali.*

guttula. 257. *C. niger, thorace tuberculato, elytris striatis: puncto posteriore albo. Fabr. mant. inf. 1. p. 107. n. 124.*

*Habitat Halae Saxonum, parvus.*

didymus. 258. *C. supra fuscus, elytris striatis: macula laterali transversa alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 98. mant. inf. 1. p. 108. n. 125.*

*Habitat in Germania, parvus.*

- haemor- 259. C. thorace fusco: lateribus cinerascens, elytrorum  
rhoidalis. futura apice ferruginea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 99.*  
*mant. inf. 1. p. 108. n. 126.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- trimacu- 260. C. coleoptris nigris: maculis tribus cinereis; posteriori  
latus. communi lunata. *Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 100. mant.*  
*inf. 1. p. 108. n. 127.*  
*Habitat in Allatia et Suecia. Hermann et Pajkal.*
- Litura. 261. C. albo nigroque varius, rostro vario. *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 178. n. 101. mant. inf. 1. p. 108. n. 128.*  
*Habitat in Europa.*
- villosus. 262. C. villosus griseus, scutello fasciisque elytrorum posteri-  
ore albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 102. mant. inf. 1.*  
*p. 108. n. 129. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 76.*  
*n. 41. t. 24. f. 19.*  
*Habitat in Germania.*
- hispidus. 65. C. corpore fulcato, adsperso squamis erectis. *Fn. suec. 619.\**  
*Habitat in Europa.*
- pedicula- 66. C. corpore rubro, elytris albido subfasciatis. *Fn. suec. 620.\**  
rius. *Habitat in Europa.*
- Tortrix. 67. C. corpore testaceo, pectore fusco. *Fn. suec. 622.\* Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 181. n. 116. mant. inf. 1. p. 109. n. 146.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 300. n. 51.*  
*Degeer inf. 5. p. 214. n. 16.*  
*Habitat in populo tremula, folia contorquens.*
- tremulac. 263. C. nigricans, elytris striatis griseo irroratis. *Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 109. n. 147.*  
*Habitat in Sueciae populo, statura et magnitudine tortricis.*
- taeniatus. 264. C. thorace nigro: margine anteriore et posteriore rufis,  
elytris pallidis nigro maculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 181.*  
*n. 118. mant. inf. 1. p. 109. n. 148.*  
*Habitat in Anglia, tortrice minor.*
- quadripu- 265. C. niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. sp.*  
stulatus. *inf. 1. p. 183. n. 121. mant. inf. 1. p. 109. n. 149.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura brenti disparis.*

- elongatus. 266. *C. thorace elongato, tibiis anterioribus bidentatis. Fabr. sp. inf. I. p. 183. n. 122. mant. inf. I. p. 110. n. 150.*  
*Habitat in Jamaica.*
- byrrhinus. 267. *C. thorace elytrisque nigris margine ferrugineis, pectore utrinque niveo. Sparrm. nov. act. Stock. 1785. I. n. 4. p. 39. n. 4.*  
*Habitat ad caput bonae spei, ater, ovatus.*
- frigidifris. 268. *C. thorace granulato, elytris punctato-friatis, rostro longitudinaliter utrinque sulcato. Sparrm. nov. act. Stock. 1785. I. n. 4. p. 39. n. 5.*  
*Habitat ad caput bonae spei, nunc totus nigricans, nunc, praeter caput et thoracem, spadiceus.*
- laniger. 269. *C. elytris cicatrifato-reticulatis: posterius maculis duabus albidis lunatis, tibiis anterioribus dentatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 6.*  
*Habitat ad caput bonae spei, supra niger, subtus rubicundolanuginosus, thorace granulato: maculis tribus minoribus griseis.*
- tibialis. 270. *C. niger cinereo-nebulosus oblongus, thorace subgloboso, elytris friatis, rostro inflexo canali pectoris immerso, tibiis anterioribus intus barbatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 7.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- glyphicus. 271. *C. corpore ovato nigro, elytris lineis albis reticulatis. Schall. Abb. der. hall. Ges. Naturf. Fr. I. p. 282.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura c. nucum, sed minor.*
- capucinus. 272. *C. elytris griseo-nebulosis, maculis posterius ad futuram oblongis punctisque binis albidis. Schall. Abb. der. hall. Naturf. Ges. I. p. 283.*  
*Habitat Halae Saxonum, magnitudine fere nebulosi, at magis ovatus.*
- Forsteri. 273. *C. manibus longissimis. Forst. nov. inf. spec. I. p. 32. n. 32.*  
*Habitat in Anglia, oblongus, magnitudine c. pomorum, piceus, pilis cinereis tomentosus, antennis tarsisque rufis, elytris cinereis nigro-punctatis.*

- pollinari- 274. *C. elytris depressis planis abbreviatis, ventre, elytrorum*  
cus. *marginibus et pedibus polline aspersis. Forst. nov. inf. sp. 1.*  
*p. 33. n. 33.*  
*Habitat in Angliæ plantis variis, præsertim urtica dioica,*  
*supra planus fuscus.*
- einnamo- 275. *C. cinnamomeus, rostro antèro analiculato ad margi-*  
mi. *nem denticulato: apice erecto mucronato bifurco, poste-*  
*rius gibbo granulato. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5.*  
*p. 76. n. 46. t. 24. f. 20. h. 1.*  
*Habitat in India, 10 lineas longus; elytris punctato-stria-*  
*tis: macula punctisque aurantiis; an brenti species?*
- affinis. 276. *C. niger, elytris caeruleis punctato striatis. Herbst apud*  
*Fuessli arch. inf. 5. p. 77. n. 48.*  
*Habitat Berolini, carbonarii statura et magnitudine.*
- glaber. 277. *C. ater nitidus, subtus punctatus. Herbst apud Fuessli*  
*arch. inf. 5. p. 78. n. 49.*  
*Habitat Berolini, 2 fere lineas longus.*
- denigra- 278. *C. ater, thorace punctato, elytris punctato striatis apice*  
tus. *subtus rubicundis. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 78.*  
*n. 52.*  
*Habitat in Marchia, sine rostro lineam longus, a terrimo*  
*affinis.*
- cardui. 281. *C. gibbus ex flavicante cinereus, thorace tuberculato,*  
*elytris convexis abbreviatis: lineola, puncto scutelloque*  
*flavis. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 79. n. 54. t. 24.*  
*f. 22. k.*  
*Habitat Berolini in carduis.*
- ireos. 286. *C. totus candidus. Pall. it. 2. app. n. 57.*  
*Habitat in Sibiria iride, c. scrophulariae triplo major.*
- crucifer. 287. *C. fuscus, subtus ex flavo cinereus nitenti-tomentosus,*  
*elytris ad futuram cruce notatis. Pall. it. 1. app. n. 35.*  
*Habitat in Sibiria, c. scrophulariae magnitudine.*
- albicans. 288. *C. thorace tuberculis quinque, elytris sex, ano albo.*  
*Lepech. it. 2. p. 206. t. 10. f. 6.*  
*Habitat in Russia.*
- urticae. 289. *C. niger planiusculus, thorace utrinque dentato, ely-*  
*tris striatis posterius bipunctatis. Mull. 200. dan. prodr.*  
*p. 88. n. 983.*  
*Habitat in urticis.*

- rufus. 290. *C. subglobosus rufus*, elytrorum lineis elevatis albo nigroque tessellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 89. n. 998.*  
*Habitat in Dania, c. scrophulariae affinis.*
- tuberculolus. 291. *C. niger*, thorace lateribus albidis, elytris tuberculorum seriebus quatuor. *Scop. ent. carn. n. 80.*  
*Habitat in Carnioliâ.*
- cariosus. 292. *C. oblongus*, rostro nitidulo, elytris striatis, femoribus anterioribus crassioribus majore dente notatis. *Scop. ent. carn. n. 81.*  
*Habitat in Carnioliâ.*
- fyngenesiac. 293. *C. cervinus*, brevissime villosus, rostro nigro apice nitido. *Scop. ent. carn. n. 82.*  
*Habitat in Carnioliâ fyngenesis.*
- fuscus. 294. *C. fuscus*, scutello puncto albo, elytris macula rubefcente notatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 300. n. 50.*  
*Habitat in Gallia.*
- Geerii. 295. *C. subglobosus griseus*, coleoptris macula magna fusca dorsali. *Degeer inf. 5. p. 212. n. 4.*  
*Habitat in fraxino.*
- ulmi. 296. *C. oblongus ex rufo fuscus*, proboscide nigra, elytris macula nigricante. *Degeer inf. 5. p. 215. n. 8. t. 6. f. 26. 27.*  
*Habitat in ulmo.*
- pulverulentus. 297. *C. oblongus niger*, elytris cinereo maculatis. *Degeer inf. 5. p. 268. n. 3. t. 15. f. 24.*  
*Habitat Surinami.*
- frigidus. 548. *C. fuscus*, elytris striatis subtuberculatis ferrugineo variis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 381.*  
*Habitat in Amboina, mediae magnitudinis.*
- bohemus. 552. *C. elytris griseis punctatis*, antennis pedibusque rufis. *Mayer Abb. der boehm. Gef. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiac pomariis, pulicis magnitudine, celerime currens.*
- reticulatus. 573. *C. oblongus niger*, elytris profunde punctatis reticulatisque: rugis transverse levissime striatis. *Mus. Lesk. p. 20. n. 423.*  
*Habitat in Europa.*



- subfasciatus. 574. *C. ferrugineus*, elytris fulvo obsolete fasciatis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 426.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 575. *C. testaceus*, capite, thorace pedibusque rufis, elytris fasciis duabus dentatis ferrugineis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 427.*  
*Habitat in Europa.*
- dentatus. 576. *C. rufus*, femoribus dente valido armatis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 431.*  
*Habitat in Europa.*
- acutus. 577. *C. rufus*, elytris striatis, femoribus acute dentatis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 432.*  
*Habitat in Europa, an satis distincta species?*
- cinerascens. 578. *C. niger* subtus cinerascens, elytris striatis, rostro longitudine corporis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 434.*  
*Habitat in Europa.*
- muricatus. 579. *C. subglobosus niger*, elytris fulcatis pilosis cinereis, posterioribus muricatis, tibiis tarsisque rufis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 435.*  
*Habitat in Europa.*
- cinereus. 580. *C. subglobosus cinereus*, antennis pedibusque rufescentibus. *Musf. Lesk. p. 20. n. 436.*  
*Habitat in Europa.*
- bipuncta. 581. *C. subglobosus cinereus*, thorace griseo: anterioribus tuberculis quatuor, elytris striatis: singulorum disco punctis duobus griseis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 439.*  
*Habitat in Europa.*
- Daviesii. 601. *C. albido griseus*, elytris anterioribus angulatis: macula magna laterali ferruginea. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 13. t. 8. f. 5.*  
*Habitat in Noveboraco, c. nucum duplo fere major.*
- zonatus. 602. *C. niger*, thorace lateribus elytrisque fasciis tribus distinctis albidis. *Swederus nov. act. Stockh. 1787. 8. n. 3. 14.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis, subovatus.*

\*\* *Brevirostres.*

† *femoribus dentatis.*

- spectabilis. 298. *C. corpore viridi nigroque variegato. Fabr. sp. inf. 1. p. 197. n. 208. mant. inf. 1. p. 121. n. 269.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- pinguis. 299. *C. gibbus nigricans, femoribus posterioribus muticis, thorace lineis, elytris strigis duabus lineaque apicis flavescens. Fabr. mant. inf. 1. p. 121. n. 270.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- tridens. 300. *C. cinereis, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 122. n. 271.*  
*Habitat in nova Seelandia, magnus.*
- fusco-maculatus. 301. *C. ater, femoribus subdentatis, thorace elytrisque laevibus fusco maculatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 122. n. 272.*  
*Habitat in Germania, magnus, laevis.*
- ligustici. 68. *C. abdomine subovato murino. Fn. succ. 621.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 197. n. 209. mant. inf. 1. p. 122. n. 273.*  
*Curculio brevirostris femoribus dentatis, corpore obscuro.*  
*Degeer inf. 5. p. 218. n. 10. Curculio apterus antennis fractis &c.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 12.*  
*Bonsd. curc. Suec. 2. f. 33.*  
*Habitat in ligustico levittico.*
- nubilus. 302. *C. griseus, elytris punctis obscurioribus numerosis. Fabr. sp. inf. 1. p. 197. n. 210. mant. inf. 1. p. 122. n. 274.*  
*Habitat Hamburgi.*
- nigrita. 303. *C. niger obscurus, thorace scabro, elytris crenato-friatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 197. n. 211. mant. inf. 1. p. 122. n. 275.*  
*Habitat in Italia, statura et magnitudine sulcati.*
- sulcatus. 304. *C. ater, elytris friatis ferrugineo maculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 197. n. 212. mant. inf. 1. p. 122. n. 276. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 35.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 85. n. 86. t. 24. f. 35?*  
*Habitat in Saxoniae nemoribus.*

305. *C.*

- gemma- 305. *C. ater*, elytris punctis viridibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 197.  
tus. n. 213. *mant. inf.* 1. p. 122. n. 277. *Scop. ent. carn.* n. 90.  
*Schulze Naturf.* 6. t. 4.  
*Habitat in Europa.*
- picipes. 306. *C. griseus*, elytris nebulosis, femoribus posterioribus  
rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 197. n. 214. *mant. inf.* 3. p. 122.  
n. 278.  
*Habitat in Kilonii plantis.*  
*Elytra punctis subocularibus striata.*
- ovatus. 69. *C. abdomine ovato nigro*, pedibus antennisque rufis. *Fn.*  
succ. 626.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 191. n. 221. *mant. inf.* 1.  
p. 123. n. 287. *Bonsd. curc. suec.* 2. f. 26.  
*Degeer inf.* 5. p. 219. n. 11. *Curculio rosae.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. p. 85. n. 90. t. 24. f. 36.  
*Habitat in Europae pomona.*
- attelaboi- 307. *C. rostro elytrisque unituberculatis.* *Fabr. sp. inf.* 1.  
des. p. 191. n. 222. *mant. inf.* 1. p. 123. n. 288.  
*Habitat in Brasilia.*
- oblongus. 71. *C. antennis, elytris pedibusque ferrugineis.* *Fn. suec.* 625.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 199. n. 220. *mant. inf.* 1. p. 123. n. 286.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 294. n. 39. *Curculio oblongus niger,*  
*elytris pedibusque testaceis.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 7. p. 168. n. 102. t. 45. f. 9. e. f.  
*Habitat in Europa.*
- pyri. 72. *C. aeneo-fuscus.* *Fn. suec.* 623.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 198.  
n. 217. *mant. inf.* 1. p. 122. n. 281.  
*It. scan.* 355. *Curculio viridis opacus*, pedibus antennis-  
que magis fuscis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 282. *Curculio squamoso-viridis &c.*  
*Degeer inf.* 5. p. 246. n. 34.  
*Schaeff. ic. t.* 2. f. 11.  
*Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 23.  
*Habitat in pyri foliis larva, in hujus prunique corollis imago.*
- mali. 308. *C. subpubescens fuscus*, femoribus acute dentatis, anten-  
nis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 499.  
*mant. inf.* 1. p. 122. n. 282. *Lesk. it. p.* 47. t. A. f. 13.  
*Habitat Lipsiae, c. pyri proxime affinis.* Leske.

- arboreti. 309. *C. cinereus*, femoribus anterioribus dentatis, elytris punctato striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 122. n. 283.*  
*Habitat in Cayenna, argentati magnitudine et statura.*
- argentatus. 73. *C. corpore viridi-argenteo.* *Fn. suec. 624.\* Scop. ent. carn. 91. Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 218. mant. inf. 1. p. 123. n. 284. Bousd. curc. Suec. 2. f. 12.*  
*Fn. suec. 459.* Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 293. n. 38.* Curculio squamosus viridi-auratus.  
*Degeer inf. 5. p. 219. n. 12.* Curculio urticae.  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 9.*  
*Habitat in Europae urtica, betula, corylo, quercu.*
- viridanus. 310. *C. viridis*, ore antennisque nigris, oculis atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 219. mant. inf. 1. p. 123. n. 285.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- Morio. 311. *C. ater nitens elytris glabris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 215. mant. inf. 1. p. 122. n. 279. Bousd. curc. Suec. 2. f. 29.*  
*Habitat in Germania, et Succia magnus.*
- bifulcatus. 312. *C. niger*, coleopterorum limbo cinereo, rostro bifulcato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 198. n. 216. mant. inf. 1. p. 122. n. 280.*  
*Habitat in Italia, statura fulcati.*
- aeruginosus. 313. *C. oblongus totus viridis*, femoribus ferrugineis, antennis longioribus. *Bousd. hist. curc. 2. p. 23. n. 7. f. 8.*  
*Habitat in Succia, statura magis oblonga et antennis longioribus a c. pyri distinctus.*
- erythropus. 315. *C. oblongo ovatus niger*, antennis longioribus pedibusque rufis. *Bousd. curc. 2. p. 25. n. 10. f. 10.*  
*Stroem act. Hafn. 2. p. 57. n. 28. 29.* Curculio falicis et dubius.  
*Habitat in Scandinaviae herbidis, frequentior; an a rufipede satis distinctus, cum femora non semper dentata.*
- tessulatus. 316. *C. ovatus niger*, elytris striatis: striarum intervallis albo nigroque alternatim maculatis. *Bousd. curc. 2. p. 38. n. 31. f. 32. Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 967.*  
*Habitat in Scandinavia, punctatulo affinis.*

- floricola. 317. *C. niger*, elytris incanis, antennarum articulis mediis spadiceis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 86. n. 93.*  
*Habitat - - - 3 lineas longus, c. pyri affinis.*
- Fallo. 318. *C. elytris nigris albo punctatis.* *Schranck enum. inf. Austr. p. 116. n. 221.* *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 86. n. 91. t. 24. f. 37.*  
*Habitat in Austriae plantis variis, praesertim arboribus, niger, 3½ lineas longus.*
- anthracinus. 319. *C. niger*, elytris punctatim striatis, femoribus unidentatis. *Scop. ent. carn. n. 92.*  
*Habitat in Carniolia.*
- lugubris. 320. *C. fuscus*, elytris punctis scabris substriatis villosulis coadunatis. *Scop. ent. carn. n. 93.*  
*Habitat in Carniolia.*
- infidus. 321. *C. obsoleto cupreus, caerulefcenti-villosus.* *Scop. ent. carn. n. 94.*  
*Habitat in Carniolia.*
- pruni. 322. *C. niger subvillosus, antennis, elytris pedibusque rufis.* *Scop. ent. carn. n. 95.*  
*Habitat in Carniolia.*
- caelestinus. 323. *C. caeruleus, antennis pedibusque sanguineis.* *Scop. ent. carn. n. 96.*  
*Habitat in Germania.*
- carniolicus. 324. *C. fuscus, glaucescenti-villosus, elytris sparsim punctatis.* *Scop. ent. carn. n. 97.*  
*Habitat in Carniolia.*
- Scopolii. 325. *C. fuscus villosulus, antennis pedibusque rufis.* *Scop. ent. carn. n. 98.*  
*Habitat in Carniolia, an distinctus ab ovato?*
- Roefelii. 326. *C. thorace obscure viridi: linea longitudinali alba, elytris fulco-fulvis: lineis elevatis fulcatis.* *Roef. inf. 3. p. 391. t. 67. f. A. B. C. D.*  
*Habitat in Germania, rostro crasso.*
- Mülleri. 327. *C. niger, elytris substriatis, oculis rufis.* *Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 963.*  
*Habitat in Daniae levistico.*

- danicus. 322. *C. ater*, elytris subfulcatis pallide punctatis, oculis rufis.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 964.*  
*Habitat in Dania.*
- squamifer. 323. *C. oblongus*, elytris griseo nigroque striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 968.*  
*Habitat in Dania.*
- austriacus. 324. *C. cinereus apterus*, elytris lineis albidis nigro-punctatis. *Schranck inf. Austr. p. 117. n. 222.*  
*Habitat in Austria.*
- religiosus. 325. *C. ater nitens*, elytris albo maculatis. *Schranck inf. Austr. p. 118. n. 225.*  
*Habitat in monte Austriae Oettscher ad cellas Marianas, 4 lineas longus, habitu germani.*
- coronatus. 326. *C. niger apterus*, thorace utrinque puncto duplici fulvo: basi pilis fulvis coronata. *Geoffr. inf. par. I. p. 291. n. 34.*  
*Habitat in Gallia.*
- Tigris. 327. *C. niger*, maculis flavo-villosis, elytris subrugosis. *Geoffr. inf. par. I. p. 292. n. 35.*  
*Habitat in Gallia.*
- corrugatus. 328. *C. fuscus apterus*, elytris rugoso-striatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 293. n. 37.*  
*Habitat in Gallia.*
- geographicus. 329. *C. subglobosus ex nigro fuscus*; squamosus, lineolis albis variis. *Geoffr. inf. par. I. p. 294. n. 40.*  
*Habitat in Gallia.*
- facialis. 330. *C. fuscus*, elytris striatis: macularum albarum fascia triplici transversa. *Geoffr. inf. par. I. p. 295. n. 41.*  
*Habitat in Gallia.*
- albo-punctatus. 331. *C. subglobosus squamosus ex cinereo fuscus*, elytrorum maculis tribus et apice albis. *Geoffr. inf. par. I. p. 299. n. 47.*  
*Habitat in Gallia.*
- sericeus. 332. *C. obscure rufus cinereo-villosus*, rostro thorace brevior. *Geoffr. inf. par. I. p. 300. n. 52.*  
*Habitat in Gallia.*
- Virgo. 333. *C. oblongus cinereo-villosus*, rostro thoraci aequali. *Geoffr. inf. par. I. p. 301. n. 53.*  
*Habitat in Gallia.*

- stritos. 334. *C. oblongus niger flavescente-punctatus*, antennis longis fractis. *Degeer inf. 5. p. 217. n. 9.*  
*Habitat - - - 2 lineas longus.*
- granulosus. 601. *C. niger*, thorace varioloso, elytris punctis elevatis rugosis: interstitiorum punctis minoribus. *Mus. Lesk. p. 23. n. 490.*  
*Habitat in Europa.*
- leprofus. 602. *C. villosus ferrugineus albido-maculatus*, thorace punctis confluentibus, elytris punctato-ltriatis. *Mus. Lesk. p. 23. n. 491.*  
*Habitat in Europa.*
- fulcatus. 603. *C. fuscus* thorace punctis profundis rugisque longitudinalibus, elytris punctatis: rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 23. n. 492.*  
*Habitat in Europa.*
- chrysofistatos. 604. *C. fuscus glaber*, thorace punctato, elytrorum sulcis crenatis maculisque tribus auro conpersis, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 23. n. 493.*  
*Habitat in Europa.*
- argentatus. 605. *C. viridi-argenteus*, antennis tibiisque rufis, femoribus fuscis clavatis. *Mus. Lesk. p. 23. n. 500.*  
*Habitat in Europa.*
- haemorrhoeus. 606. *C. fuscus*, antennis, pedibus abdominisque apice rufis, elytris fusco virescentibus. *Mus. Lesk. p. 23. n. 501.*  
*Habitat in Europa.*

†† *femoribus muticis.*

- polygoni. 26. *C. thorace lineato*, elytris cinereis: lineolis fuscis futuraeque nigro-punctata. *Fabr. sp. inf. 1. p. 188. n. 151. mant. inf. 1. p. 116. n. 200.*  
*Syß. nat. XII. 2. p. 609. n. 26. Fn. suec. 597. Curculio longirostris testaceus, coleoptorum futura nigra repanda.*  
*Habitat in Europae polygono, mediae magnitudinis.*
- griseus. 335. *C. supra griseo fuscus*, subtus cinereus, rostro canaliculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 188. n. 152. mant. inf. 1. p. 116. n. 201.*  
*Habitat in Anglia.*

- triguttatus. 336. *C. nigricans*, elytris griseis: maculis duabus albis, posteriori majori communi. *Fabr. sp. inf. 1. p. 188. n. 153. mant. inf. 1. p. 116. n. 202.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 11.*  
*Habitat in Anglia.*
- geminatus. 337. *C. cinereus*, thorace trilineato, elytris striis numerosis fuscis per paria approximatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 116. n. 203.*  
*Habitat Kilonii, mediae magnitudinis, fere globosus.*
- diadema. 338. *C. flavescenti-villosus*, rostro apice retulo atro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 116. n. 204.*  
*Habitat in Cayenna, statura c. coryli, at paulo major.*
- coryli. 339. *C. cinereo fuscoque varius*, elytrorum sutura dimidiata atra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 189. n. 154. mant. inf. 1. p. 116. n. 205.*  
*Habitat in Angliae corylo.*
- Spengleri. 32. *C. fuscus*, elytris flavis: lineis atris glaberrimis abbreviatis inaequalibus, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 191. n. 174. mant. inf. 1. p. 118. n. 229. Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 7.*  
*Habitat in America, statura c. pini.*
- vittatus. 33. *C. ater*, elytris striis albis rubrisque abbreviatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 191. n. 173. mant. inf. 1. p. 118. n. 228.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 610. n. 33. Curculio longirostris, elytris lineis albis luteisque.*  
*Sloan. jam. 2. p. 210. Scarabaeus Curculio.*  
*Habitat in America meridionali, infusisque oppositis.*
- bivittatus. 340. *C. niger*, elytris punctato striatis: vitta marginali dorsaliq; interrupta flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 118. n. 230.*  
*Habitat in insula S. Thomae, statura c. Spengleri.*
- lividus. 341. *C. griseus*, thorace elytrisq; cinereo atroque maculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 191. n. 175. mant. inf. 1. p. 118. n. 231.*  
*Brown illustr. 129. t. 49. f. 8.*  
*Habitat in America meridionali, magnus.*
- pulcher. 342. *C. coleoptris atris*: striis sex dorsalibus approximatis abbreviatis albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 192. n. 176. mant. inf. 1. p. 118. n. 232.*  
*Brown illustr. 126. t. 49. f. 6.*  
*Habitat in Jamaica, statura vittati.*



- histrioni- 343. *C. griseus*, thorace lineis lateralibus fulvis, elytris albis:  
cus. maculis atris fulvisque. *Fabr. sp. inf. I. p. 192. n. 177.*  
*mant. inf. I. p. 118. n. 233. Sparrm. nov. act. Stockh.*  
*1785. I. p. 44. n. 17. t. 2.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Rohrii. 344. *C. elytris acuminatis griseis*: baseos margine flavescente.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 192. n. 178. mant. inf. I. p. 118. n. 234.*  
*Habitat in insulis, Americae oppositis. v. Rohr.*
- impressus. 345. *C. niger*, thorace elytrisque punctis impressis albis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 192. n. 179. mant. inf. I. p. 118. n. 235.*  
*Habitat in Jamaica, statura pulchri.*
- cervinus. 70. *C. griseus*, antennis basi rufescentibus. *Fn. suec. 627.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 190. n. 160. mant. inf. I. p. 117. n. 213.*  
*Bonsd. curc. Saec. 2. f. 15.*  
*Degeer inf. 5. p. 220. n. 13. Curculio griseo-aeneus.*  
*Habitat in Europa, femoribus interdum dentatis.*
- friatus. 346. *C. fuscus*, elytris striis cinereis nigro-punctatis. *Fabr.*  
*mant. inf. I. p. 117. n. 214.*  
*Habitat in Africa, parvus.*
- Lacerta. 347. *C. griseus*, elytris striatis, antennis apice nigris. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 117. n. 214. mant. inf. I. p. 117. n. 215.*  
*Habitat in India, statura cervini, at triplo major.*
- velox. 348. *C. pilosus niger*, elytris margine, puncto baseos, fascia  
interrupta, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inf. I.*  
*p. 117. n. 216.*  
*Habitat in Cayenna, parvus.*
- argyreus. 74. *C. femoribus submuticis*, corpore toto viridi argenteo au-  
reoque maculato. *Mus. Lud. Utr. 54.\* Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 184. n. 128. mant. inf. I. p. 110. n. 159.*  
*Habitat in America australi et India, facie argentati, fe-*  
*moribus primoribus spina obsoleta armatis,*
- imperia- 349. *C. elytris striis elevatis atris fulcisque punctatis viridi-*  
lis. aureis alternis, basi gibbis apice acuminatis. *Fabr. sp.*  
*inf. I. p. 184. n. 129. mant. inf. I. p. 110. n. 160.*  
*Drury inf. 2. t. 33. f. 1.*  
*Lindenberg Naturf. X. p. 86. n. 4. t. 2. f. 1.*  
*Habitat in America meridionali, maximus, insectorum fa-*  
*cile pulcherrimum.*

- regalis. 75. C. corpore viridi-sericeo: fasciis aureis repandis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 130. mant. inf. 1. p. 111. n. 161.*  
*Habitat in America meridionali, magnitudine et statura germanici, femoribus fuscis; annulo aureo.*
- margina- 350. C. fuscus, elytrorum sutura abdominisque marginibus  
tus. aureis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 131. mant. inf. 1. p. 111. n. 162.*  
*Habitat in America.*
- 19puncta- 351. C. canescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris  
tus. novendecim. *Fabr. sp. inf. 1. p. 185. n. 132. mant. inf. 1. p. 111. n. 163.*  
*Habitat in Cayenna.*
- viridis. 76. C. viridis, thoracis elytrorumque lateribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 139. mant. inf. 1. p. 112. n. 175.*  
*Bonsd. curc. Succ. 2. f. 7.*  
*Syst. nat XII. 2. p. 616. n. 76. Curculio brevirostris, femoribus muticis, corpore viridi supra obscuro, subtus flavidiore.*  
*Degeer inf. 5. p. 256. n. 45. Curculio flavo-cinctus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 3. f. 24.*  
*Schaeff. elem. t. 108.*  
*icon. t. 53. f. 6.*  
*Habitat in Europae pomona, magnitudine et statura c. pyri, antennis pedibusque nigris.*
- gibber. 352. C. virescenti-albus, elytris basi unidentatis posterius gibbosis. *Pall. ic. inf. Russf. 1. p. 32. t. B. f. 14. Fabr. mant. inf. 1. p. 112. n. 176.*  
*Habitat in Cayenna.*
- fulvus. 353. C. fulvus, capitis basi pedibusque fuscis, rostro emarginato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 177.*  
*Habitat in Saxonia, parvus.*
- palliatu. 354. C. fuscus, thoracis elytrorumque margine cinereo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 178.*  
*Habitat in Germania, statura viridis, at paulo minor.*
- aurifer. 355. C. corpore ferrugineo auro maculato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 140. mant. inf. 1. p. 113. n. 179.*  
*Drury inf. 1. t. 32. f. 1.*  
*Habitat in America, pedibus anterioribus elongatis.*

- cyanipes. 356. *C. albus*, elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyaneis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 180.*  
*Habitat in Cayenna, antennis fuscis cyaneo nitidis.*
- tamarisci. 357. *C. viridi-nitens*, elytris viridi, ferrugineo nigro cinereaque variis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 181.*  
*Habitat in Africae tamarisco, statura splendiduli, at duplo fere major.*
- splendidulus. 358. *C. viridi-nitens*, coleoptorum disco cinereo, cupreo nigroque fasciato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 141. mant. inf. 1. p. 113. n. 182.*  
*Habitat in Sibiria, statura argentati, at minor.*
- curvipes. 359. *C. argenteo squamosus*, tibiis posterioribus arcuatis intus dentatis ciliatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 183.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*
- speciosus. 77. *C. corpore luteo viridi-nitente*, elytris spinis sparsis. *Mus. Lud. Utr. 55.\**  
*Habitat in America australi et India, spinis elytri utriusque 5.*
- ruficornis. 78. *C. corpore atro*, thorace utrinque bituberculato, antennis rubris. *Fn. succ. 636.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 190. n. 162. mant. inf. 1. p. 117. n. 217. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 13.*  
*Habitat in Europa.*
- albinus. 79. *C. niger*, fronte anoque albis, thorace tuberculato. *Fn. succ. 632. Scop. ent. carn. 66. Fabr. sp. inf. 1. p. 192. n. 180. mant. inf. 1. p. 118. n. 236. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 1.*  
*Degeer inf. 5. p. 255. n. 44. t. 8. f. 1. Curculio brevirostris, antennis longis rubris &c.*  
*Uddm. diff. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex.*  
*Habitat in Europa, magis boreali, colore c. lapathi referens.*
- latirostris. 360. *C. rostro latissimo plano*, elytris apice albis: punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 193. n. 181. mant. inf. 1. p. 118. n. 237. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 2. 3.*  
*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 17. Silpha oblonga.*  
*Geoffr. inf. par. 1. t. 5. f. 2.*  
*Schaeff. ic. t. 89. f. 6.*  
*Habitat in Europa, antennarum annulo rubro.*

- albiro- 361. C. rostro latissimo plano elytrisque posterius albis nigro-  
ftris. *Schall. Abb. d. hall. Naturf. Ges. I. p. 287. Fabr. mant. inf. I. p. 119. n. 238.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 80. n. 66. t. 24. f. 26. m.*  
*Habitat in Germaniae inferioris betula, latirostri duplo major.*
- planiro- 362. C. nigro aeneus, rostro latissimo plano pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 119. n. 239.*  
ftris. *Habitat Kilonii, parvus.*
- marginel- 363. C. niger, thoracis elytrorumque margine albo. *Fabr. lus. sp. inf. I. p. 193. n. 182. mant. inf. I. p. 119. n. 240.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali statura verrucosi, at minor.*
- lineatus. 80. C. fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. *Fn. succ. 630.\* Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 155. mant. inf. I. p. 116. n. 206. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 16. 17.*  
*Degeer inf. 5. p. 247. n. 35. Curculio brevirrostris, antennis fractis &c.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 283. Curculio rostro thoracis longitudine &c.*  
*Schaeff. ic. t. 103. f. 8.*  
*Habitat in Europae salice putrida, plantisque variis.*
- lunatus. 364. C. coleoptris elevato-striatis: fascia semicirculari maculaque posteriore albis; lunula nigra. *Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 156. mant. inf. I. p. 116. n. 207.*  
*Habitat in Anglia.*
- fulvipes. 365. C. tomentoso-virescens, pedibus testaceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 116. n. 208.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura parva lineati.*
- ruficollis. 366. C. testaceus, capite elytrisque striatis cinereo-fuscis. *Fabr. mant. inf. I. p. 116. n. 209.*  
*Habitat Halae Saxonum, parvus.*
- undatus. 367. C. fuscus, elytris apice pallidis: striga undata fusca. *Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 157. mant. inf. I. p. 117. n. 210.*  
*Habitat in Germania, parvus, statura lunulati.*
- hispidu- 368. C. fuscus, thorace cinereo lineato, elytris hispidis: punctis obscurioribus striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 158. mant. inf. I. p. 117. n. 211.*  
lus. *Habitat Kilonii in plantis aquaticis.*

- scabricu- 369. C. corpore cinereo hispido. *Fabr. sp. inf. I. p. 189. n.*  
 lus. 158. *mant. inf. I. p. 117. n. 212.*  
*Bonsd. curc. Suec. 2. f. 21.*  
*Mant. p. 531.* Curculio brevirostris femoribus muticis, ci-  
 nereus, elytris hispidis.  
*Habitat in Sueciae arenosis.*
- incanus. 81. C. oblongus fuscus, thoracis dorso plano. *Fabr. sp. inf.*  
 1. p. 187. n. 147. *mant. inf. I. p. 115. n. 193.* *Bonsd.*  
*curc. Suec. 2. f. 37.* *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t.*  
 24. f. 24.  
*Syst. nat. XII. 2. p. 616. n. 81.* *Fn. suec. 631.\** Curculio  
 brevirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 282. n. 10.* Curculio cinereo squa-  
 mosus &c.  
*Degeer inf. 5. p. 242. n. 28.* Curculio griseo apterus.  
*List. scar. angl. p. 394. n. 30.*  
*Habitat in Europae pinetis.*
- costatus. 370. C. cinereus, thorace nigro: lineis quatuor cinereis. *Fabr.*  
*mant. inf. I. p. 115. n. 194.*  
*Habitat in Gallia australi, magnitudine incani.*
- interru- 371. C. obscurus, coleoptorum fascia interrupta alba. *Fabr.*  
 ptus. *sp. inf. I. p. 188. n. 148. mant. inf. I. p. 115. n. 195.*  
*Habitat in nova Hollandia, mediae magnitudinis.*
- scutella- 372. C. ater, elytris crenato-friatis, pedibus anterioribus  
 ris. elongatis. *Fabr. ment. inf. I. p. 115. n. 196.*  
*Habitat in terra van Diemen, magnus.*
- longima- 373. C. fuscus, thoracis margine punctisque duobus ferrugi-  
 nus. neis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. sp. inf. I. p.*  
 188. n. 149. *mant. inf. I. p. 115. n. 197.*  
*Habitat in Brasilia.*
- raucus. 374. C. nigricans, elytris griseis cinereo punctatis. *Fabr. sp.*  
*inf. I. p. 188. n. 150. mant. inf. I. p. 115. n. 198.* *Herbst*  
*apud Fuessli arch. inf. 5. p. 82. n. 64. t. 24. f. 25.*  
*Habitat in Germania.*
- spinifex. 375. C. cinereus fusco irroratus, thorace acute spinoso. *Fabr.*  
*mant. inf. I. p. 115. n. 199.*  
*Habitat - - - gibbus, mediae magnitudinis*

- chloro- 82. *C. niger*, antennis pedibusque rufis. *Fn. succ.* 635.\* *Fabr.*  
pus. *sp. inf.* I. p. 190. n. 163. *mant. inf.* I. p. 117. n. 218.  
*Bonsd. curc. Succ.* 2. f. 19.  
*Habitat in Europae plantis, parvus, valde oblongus.*
- tristis. 376. *C. niger*, elytris striatis cinereis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 190.  
n. 164. *mant. inf.* I. p. 117. n. 219. *Bonsd. curc. Succ.*  
2. f. 28.  
*Habitat in Anglia, Suecia.*
- adspersus. 377. *C. ater*, elytris posterius albo maculatis. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 190. n. 165. *mant. inf.* I. p. 117. n. 220.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- puncta- 378. *C. fuscus*, elytris punctis holosericeis elevatis margine-  
tus. que flavo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 190. n. 166. *mant. inf.* I.  
p. 117. n. 221.  
*Habitat in Europa boreali.*
- obscurus. 379. *C. ovatus ferrugineo-fuscus.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 191.  
n. 167. *mant. inf.* I. p. 118. n. 222.  
*Habitat in Europa boreali.*
- niger. 380. *C. ovatus scaber niger*, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* I.  
p. 191. n. 168. *mant. inf.* I. p. 118. n. 223.  
*Habitat in Germania.*
- variolo- 381. *C. niger*, thorace carinato varioloso, elytris striatis. *Fabr.*  
sus. *sp. inf.* I. p. 191. n. 169. *mant. inf.* I. p. 118. n. 224.  
*Habitat in Saxoniae campis.*
- sticti- 382. *C. thorace elytrisque variolosis nigris albo-punctatis.* *Fabr.*  
cus. *sp. inf.* I. p. 191. n. 170. *mant. inf.* I. p. 118. n. 225.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- vulgus. 383. *C. ater nitens*, elytris punctato-striatis, femoribus annu-  
lo cinereo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 191. n. 171. *mant. inf.* I.  
p. 118. n. 226.  
*Habitat in America meridionali.*
- succin- 384. *C. ater*, elytris margine lineolisque duabus albis. *Fabr.*  
ctus. *sp. inf.* I. p. 191. n. 172. *mant. inf.* I. p. 118. n. 227.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- rufipes. 83. *C. cinereus oblongus*, pedibus rufis, *Fn. succ.* 634.\*  
*Habitat in Europa.*

- nebulosus. 84. *C. canus*, elytris fasciis obliquis nigris. *Fn. Suec.* 635.\*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 186. n. 142. *mant. inf.* p. 118. n. 184.  
*Bonsd. curc. Suec.* 2. f. 4.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 278. n. I. t. 4. f. 8.  
*Fn. Suec.* I. n. 448. Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine.  
*Degeer inf.* 5. p. 241. n. 27. Curculio carinatus.  
*Frisch inf.* 11. p. 32. t. 23. f. 5.  
*Schaeff. ic. t.* 25. f. 3. *Knoch Beytr.* I. t. 6. f. 8.  
 β) *Curculio nebulosus capensis*. *Sparrm. nov. act. Stokh.* 1785, I. n. 4. p. 44. n. 18. t. 2.  
*Habitat in Europae campis frequens, β) duplo major ad caput bonae spei.*
- fulcivestris. 85. *C. oblongus cinereus subnebulosus* rostro trifurcato. *Fabr. sp. inf.* I. p. 187. n. 143. *mant. inf.* I. p. 114. n. 185.  
*Sparrm. nov. act. Stokh.* 1785. I. n. 4. p. 45. n. 19. t. 2.  
*Bonsdorf curc. Suec.* 2. f. 5.  
*Habitat in Europae planis, et ad caput bonae spei statura et magnitudine nebulosi.*
- emarginatus. 385. *C. oblongus fuscus*, coleopterorum dorso cinereo: lineis duabus punctorum impressorum atrorum. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 186.  
*Habitat Halae Saxonum, statura nebulosi, coleoptris apice emarginatis.*
- perlatus. 386. *C. niger*, abdomine albo: punctis elevatis glabris atris, rostro fulcato. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 187.  
*Habitat in Sina, statura et magnitudine fulcivestris.*
- glaucus. 387. *C. rostro carinato thoraceque inaequali obscuris*, elytris glaucis: puncto posteriori elevato. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 188.  
*Habitat Kilonii, magnitudine et statura albini.*
- albidus. 388. *C. oblongus fuscus elytris albidis*: fascia media lituraque baseos apicisque fuscis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 189.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 83. n. 75. t. 24. f. 31.  
*Curculio candidus.*  
*Habitat in Germania, nebuloso minor.*
- lusitanicus. 389. *C. oblongus supra fuscus*, elytris macula baseos alba. *Fabr. sp. inf.* I. p. 187. n. 144. *mant. inf.* I. p. 115. n. 190.  
*Habitat in Lusitania, statura et magnitudine incani.*

- crenulatus. 390. *C. cinereus*, elytris lineis elevatis tribus crenulatis atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 187. n. 145. mant. inf. I. p. 115. n. 191.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- punctatus. 391. *C. niger*, elytris punctis nigris albisque alternis holoferricis ltriatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 187. n. 146. mant. inf. I. p. 115. n. 192.*  
*Habitat in insula terrae novae, magnitudine c. ligustici.*
- ater. 86. *C. oblongus ater*, antennis rufis. *Fn. suec. 637.\* Bonsd. curc. Suec. 2. f. 20.*  
*Habitat in Europa, an mera varietas chloropodis?*
- emeritus. 87. *C. niger*, thorace elytrisque spinosis fronte excavata. *Muf. Lud. Utr. 56.\* Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 190. mant. inf. I. p. 120. n. 249.*  
*Habitat in America australi et India, aranei tristi facie.*  
*Elytra verrucis pilosis adspersa.*
- barbarus. 88. *C. thorace subspinoso*, elytris angulo duplici crispato. *Fabr. sp. inf. p. 194. n. 191. mant. inf. I. p. 120. n. 250.*  
*Habitat in Barbaria et Calabria, minor in Apulia, duplo minor in Gallia, punctis excavatis adspersus.*
- algirus. 392. *C. cinereus*, thorace spinoso fulcato, elytris angulo duplici spinoso. *Fabr. mant. inf. I. p. 120. n. 251.*  
*Habitat in Africa et Calabria, barbaro triplo minor.*
- crispatus. 393. *C. thorace mutico scabro*, elytris lineis tribus elevatis dentatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 192. mant. inf. I. p. 120. n. 252.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- globosus. 394. *C. thorace spinoso quinquefulcato*, elytris laevibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 193. mant. inf. I. p. 120. n. 253.*  
*Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 33.*  
*Drury inf. I. t. 32. f. 4.*  
*Habitat ad caput bonae spei, an vere distinctus ab obeso?*
- obesus. 395. *C. ater*, thorace spinoso inaequali, elytris rubris: punctis nigris confertis. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 194. mant. inf. I. p. 120. n. 254. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 32. t. 2.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*



- fealaris. 396. *C. ater*, thorace spinoso inaequali, elytris striis rufis denticulatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 195. mant. inf. I. p. 120. n. 255.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- eultratus. 397. *C. cinereus*, thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis posterius cinereis. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 196. mant. inf. I. p. 120. n. 256.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- capensis. 89. *C. ater*, thorace elevato-punctato, elytris striato-crenatis. *Mus. Lud. Ulr. 59. Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 184. mant. inf. I. p. 119. n. 242. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 44. n. 16. t. 2.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Vitulus. 398. *C. niger*, fronte bidentata, elytris unispinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 185. mant. inf. I. p. 119. n. 243.*  
*Habitat in Terra del Fuego.*
- inaequalis. 399. *C. griseus*, thorace inaequali anterieus prominulo, elytris fulcatis, posterius bidentatis, rostro trifurcato. *Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 186. mant. inf. I. p. 119. n. 244.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*
- rostratus. 400. *C. fuscus*, capite thoraceque cylindricis angustioribus, elytris posterius spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 187. mant. inf. I. p. 119. n. 245.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*
- Spec-  
trum. 401. *C. thorace coleoptrisque globosis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 188. mant. inf. I. p. 119. n. 246.*  
*Habitat ad caput bonae spei, parvus, singularis staturae.*
- acuminatus. 402. *C. cylindricus fuscus*, elytris apice acuminatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 189. mant. inf. I. p. 119. n. 247.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- epistrotus. 403. *C. fuscus*, elytris acuminatis crenato-striatis, rostro sulcato. *Fabr. mant. inf. I. p. 120. n. 248.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus.*
- verrucosus. 90. *C. acneo-niger*, elevato-punctatus, elytris posterius verrucosis. *Mus. Lud. Ulr. 60.\* Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 183. mant. inf. I. p. 119. n. 241.*  
*Drury inf. I. 32. f. 5.*  
*Habitat in Aethiopia.*

- cornutus. 91. *C. cinereus*, thorace elytrisque subspinosis, capite spinis fasciculato - pilosis. *Mus. Lud. Ulr.* 57. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 197. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 257.  
*Bonsd. nov. act. Stockh.* 1785. 1. n. 4. p. 46. n. 24. t. 2.  
*Habitat in nova Hollandia et ad caput bonae spei.*
- Tribulus. 404. *C. cinereus*, thorace scabro anterieus impresso, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 198. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 258.  
*Habitat in nova Hollandia, rostro thoracem fere aequante, apice incrassato.*
- retusus. 405. *C. griseo-fuscus*, elytris posterius retusis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 199. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 259.  
*Habitat ad caput bonae spei, statura cornuti.*
- quadridens. 406. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinosis: spinis quatuor; posterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 200. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 260.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- quadrispinosus. 407. *C. albidus*, elytris quadrispinosis, rostro fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 201. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 261.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Clavus. 408. *C. albicans*, thorace canaliculato, coleoptris spinosis: lineolis tribus baseos rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 202. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 262.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- nodulosus. 409. *C. thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 203. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 263.  
*Sparvm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. n. 4. p. 42. n. 12? *Curculio nodulosus.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- rubifer. 410. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinis elevatis sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 204. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 264.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- globifer. 411. *C. thorace scabro, elytris spinosis posterius acuminatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 205. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 265.  
*Habitat ad caput bonae spei.*

- pilularius.** 412. *C. thorace utrinque spinoso noduloso, elytris tuberculato-striatis apice acuminatis. Fabr. mant. inf. I. p. 121. n. 266.*  
*Habitat ad caput bonae spei, globifero proxime affinis.*
- frontalis.** 413. *C. ater, fronte retusa, thorace elytrisque tuberculato-striatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 43. n. 14.*  
*Habitat ad caput bonae spei, praecedentibus affinis.*  
*Thorax tuberculorum lineis 4, elytra conicorum utrinque tribus aspera.*
- 16 punctatus.** 92. *C. caerulefcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris sedecim. Mus. Lud. Utr. 58. Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 133. mant. inf. I. p. 111. n. 164.*  
*Habitat in Brasilia, crabronis magnitudine, ad latera thoracis aureus.*
- decorus.** 414. *C. supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis. Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 134. mant. inf. I. p. 111. n. 165.*  
*Habitat in America meridionali.*
- nitidulus.** 415. *C. viridi-squamosus, elytris punctatis. Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 135. mant. inf. I. p. 111. n. 166.*  
*Habitat in Cayenna, squamis cum aetate pereuntibus niger.*
- candidus.** 416. *C. elytris spinosis albis: macula laterali fusca. Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 136. mant. inf. I. p. 111. n. 167.*  
*Habitat in Cayenna.*
- niveus.** 417. *C. niveus, thoracis dorso rostroque fuscis, elytris spinosis acuminatisque. Fabr. mant. inf. I. p. 111. n. 168.*  
*Habitat in Cayenna, statura candidi.*
- lacteus.** 418. *C. albus auro-nitidulus, elytris fulcatis acuminatis. Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 137. mant. inf. I. p. 111. n. 169.*  
*Habitat in Jamaica, mediae magnitudinis, rostri apice bifido.*
- smaragdulus.** 419. *C. virescens, elytris punctatis: spina anteriore posteriore-que erecta valida. Fabr. mant. inf. I. p. 111. n. 170.*  
*Habitat in Cayenna, statura candidi, at paula minor.*
- 8 tuberculatus.** 420. *C. cinereo fuscoque varius, coleoptris punctatis, posterius gibbis: tuberculis octo. Fabr. mant. inf. I. p. 112. n. 171.*  
*Habitat in Cayenna, statura candidi.*

- Servus. 421. *C. capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris fuscis: punctis maculisque albis. Fabr. mant. inf. 1. p. 112. n. 172. Habitat in Cayenna, statura et magnitudine octotuberculati.*
- modestus. 422. *C. cinereus, thorace elytrisque fusco-maculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 138. mant. inf. 1. p. 112. n. 173. Habitat in nova Seelandia, mediae magnitudinis.*
- flavescens. 423. *C. obscurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 112. n. 174. Habitat in America meridionali, viridi affinis, at paulo major.*
- granulatus. 93. *C. viridis striatus punctis nigris elevatis. Mus. Lud. Ulr. 61.\* Habitat in America australi et India, magnitudine scarabaei stercorarii.*
- abbreviatus. 94. *C. subfuscus, elytris griseis: striis atris glabris elevatis abbreviatis. Mus. Lud. Ulr. 62.\* Gron. zooph. 597.\* Habitat in Martinica.*
- apterus. 95. *C. thorace spinoso: cruce impressa, elytris ferrugineo-punctatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 196. n. 206. mant. inf. 1. p. 121. n. 267. Syst. nat. XII. 2. p. 619. n. 95. Curculio brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato. Degeer inf. 5. p. 275. t. 16. f. 1. Curculio cruciatus. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 49. n. 31. t. 2. β) Curculio ornatus. Drury inf. 2. t. 34. f. 3. Habitat in India et ad caput bonae spei, maximus.*
- ocellatus. 424. *C. thorace spinoso anterieus excavato, elytris cinereis: punctis atris subocellatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 196. n. 207. mant. inf. 1. p. 121. n. 268. Habitat in Madagascar.*
- nivofus. 425. *C. thorace elytrisque feriatim tuberculatis niveo lineatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 41. n. 11. Habitat ad caput bonae spei, subtus albido et flavescente pruinofus vel minutim squamosus.*
- nyctemerus. 426. *C. albus, thorace elytrisque in parte summa atris, fasciis longitudinalibus albis nigrisque utrinque alternantibus,*

bus, abdomine atro, ad latera niveo maculato. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 41. p. 42. n. 12.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

- Argus.** 427. *C. tomentosus*, capite thoracisque margine anteriore griseo alboque punctatis, elytris striis elevatis albo cinereoque maculatis punctatisque. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 43. n. 15.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Porculus.** 428. *C. cinereo-fuscus pilosus*, thorace lineis quinque, elytris posteriore maculis duabus albis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. n. 4. p. 45. n. 20.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Tottus.** 429. *C. ex cinereo et fufcescente rufus*, rostro trifstriato, pedibus faepe rufescentibus. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 45. n. 21.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- atratus.** 430. *C. glabriusculus nigro-nitens*, elytris striatis: interstiorum punctis impressis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 46. n. 22.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- cordiger.** 431. *C. thorace subdidymo cordato*, utrinque aculeato, elytris striatis punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 46. n. 23.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Tauriculus.** 432. *C. niger*, fronte rotundata punctata, thorace bicarinato punctato subcrispato scabro, elytris lineis quatuor tuberculosis, infimis abbreviatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 47. n. 25.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Juvenus.** 433. *C. fronte excavato-retusa*, thorace scabro utrinque undentato, elytris utrinque tuberculorum serie abbreviata triplici. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 47. n. 26.*  
*Habitat ad caput bonae spei, tauriculo affinis, at quadruplo minor.*
- ephippatus.** 434. *C. thorace tuberculis rugisque scabro*, elytris utrinque serie sesquitertia spinularum: futura spinulis conniventibus. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 47. n. 27.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

- cuculatus. 435. C. fronte depressa scabra, thorace anteriori porrecto rostroque bifurcato canaliculatis, elytris pone bituberculatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 48. n. 28.*  
*Habitat ad caput bonae spei, griseus, antennis, oculis, pedumque maculis nigris.*
- Uva. 436. C. ater, capite emarginato, thorace anteriori foveolato, elytris nodulis subglobosis confertis glabris: macula bascos thoracis utrinque supra et subtus femorumque ferruginea. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 49. n. 29.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- biglobatus. 437. C. niger rostro canaliculato, thorace globoso punctato scaberrimo, elytris punctato-scabris: tuberculorum utrinque ordinibus duobus. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 49. n. 30.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- calvus. 438. C. ater, thorace utrinque punctis elevatis scabro: disco laeviusculo, elytris striis elevatis glabriusculis: sulcis interjectis impresso punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 34.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- fenilis. 439. C. fuscus griseo-irroratus, thorace teretiusculo, elytris striis elevatis laevibus distantibus ternis aut quinis: interstitiis planis impresso-punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 35.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Platina. 440. C. subtus lateribusque albo argenteo viridique aureo splendido, supra pedibusque griseus, elytrorum fasciis longitudinalibus atris. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 36.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Gallina. 441. C. griseus, subtus canus, thorace utrinque sulcis quinque subarcuatis obliquis, elytris leviter striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 51. n. 37.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- argynellus. 442. C. viridi-argenteus, oculis atris, rostro supra plano: linea longitudinali nigra impressa. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 51. n. 39.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

- nigellus. 443. *C. nigricans*, subtus ex griseo rufescens, antennis rectis, thorace elytrisque spinulosis. *Sparrrn. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 52. n. 40.  
*Habitat ad caput bonae spei, statura albini, sed minor.*
- Bonsdor- 444. *C. oblongus* albidissimus maculis quibusdam fasciisque  
fi. nigris, rostro bifurcato fusco. *Bonsd. curc. Succ. 2. p. 21.*  
*n. 5. f. 6.*  
*Habitat in Sueciae, potissimum salicis, statura sulcirostris,*  
*at duplo minor.*
- tereticol- 445. *C. oblongo-ovatus*, capite et thorace cylindricis angu-  
lis. flis, elytris cinereis nigro lituratis. *Bonsd. curc. Succ. 2.*  
*p. 28. n. 14. f. 14. Degeer inf. 5. p. 246. n. 33.*  
*Habitat in Sueciae alnetis, non infrequens.*
- lineellus. 446. *C. oblongus* cinereo fuscus, thorace striis tribus pallidio-  
ribus, elytris utrinque linea longitudinali albida una.  
*Bonsd. curc. Succ. 2. p. 30. n. 17. f. 18.*  
*Fn. suec. 1. n. 472. Curculio cinereus, fasciis longitudina-*  
*libus dilutioribus.*  
*Habitat in Suecia, pediculi magnitudine, lineato affinis.*
- echinatus. 447. *C. ferrugineus*, abdomine globoso, elytris fetis erectis  
dense echinatis. *Bonsd. curc. Succ. 2. p. 33. n. 21. f. 22.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 86. n. 947. Curculio scaber?*  
*Habitat in Suecia, subtus fuscus, ano rufo.*
- Truncet- 448. *C. ater*, abdomine subgloboso, rostro brevissimo, anten-  
lus. nis pedibusque rufis. *Bonsd. curc. Succ. 2. p. 33. n. 22.*  
*f. 23.*  
*Habitat in Suecia.*
- capitatus. 449. *C. fusco cinereus*, sutura elytrorum basi nigra, rostro  
brevissimo lato, abdomine subgloboso. *Bonsd. curc.*  
*Succ. 2. p. 33. n. 23. f. 24. Degeer inf. 5. p. 245. n. 32.*  
*Habitat in Sueciae pinetis, vulgatiore, c. coryli proxime*  
*affinis.*
- asperatus. 450. *C. cinereus*, abdomine ovato, elytris fetis erectis brevif-  
simis exasperatis. *Bonsd. curc. Succ. 2. p. 34. n. 24. f. 25.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 288. n. 23.*  
*Habitat Upsaliae in arbutis, primo vere sub siccis foliis con-*  
*spicuus.*

- fuscicus. 451. *C. ovatus*, posterius obtusissimus obscurus, thorace carinulato, antennis et pedibus fuscis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 29. f. 30.*  
*Habitat in Suecia.*
- murinus. 452. *C. ovatus* griseo-fuscus, elytris pallide maculatis, posterius fetosis, rostro sulcato. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 30. f. 31. Müll. zool. dan. prodr. p. 86. n. 943. fn. Fridrichsd. n. 116.*  
*Habitat in Scandinaviae plantis.*
- clavipes. 453. *C. oblongo ovatus* gibbus ater, antennis nigris, pedibus longis rufis, femoribus clavatis crassis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 40. n. 35. f. 36.*  
*Habitat in Hallandia Sueciae.*
- inderien- 454. *C. apterus ovatus* opalino-albus, thorace utrinque mucro-  
fis. nato, elytris excavato punctatis. *Pall. inf. ross. 1. p. 26. t. B. f. 5. it. 1. app. p. 464. n. 36.*  
*Lepech. it. 1. p. 508. t. 16. f. 5.*  
*Habitat circa lacum salsum Inderiensem frequens, fabae minoris magnitudine, tenebrionis apteri facie.*
- nomas. 455. *C. albus*, rostro crasso biporcato, thorace scaberrimo, elytris fusco oblique lituratis. *Pet. gaz. t. 23. f. 4? Pall. it. 1. app. p. 463. n. 31. inf. ross. 1. p. 27. t. B. f. 6.*  
*Habitat in aridissimis deserti caspici, frequens circa fontes lacusque salfos, habitu nebulosi, sed major, 10 lineas longus.*
- candida- 456. *C. albo-nebulosus*, rostro crasso: stria bifurca, thora-  
tus. cis dorso cinereo: linea punctisque duobus niveis. *Pall. it. 1. app. p. 463. n. 32. inf. ross. 1. p. 28. t. B. f. 7.*  
*Habitat in aridis deserti caspici, frequentissimus circa lacum Inderiensem, sulcirostri paulo major, subtus candidissimus.*
- roridus. 457. *C. apterus* rufescente albus, supra lituris punctisque subverrucofis nigris, porco rostri crassi longitudinali. *Pall. inf. ross. 1. p. 28. t. B. f. 8.*  
*Habitat in salis torridis deserti australis ad Volgam, circa sal-solarum et atriplicum radices, sulcirostris magnitudine, at crassior.*
- Cenchrus. 458. *C. dealbatus*, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis nigro punctatis, rostro crasso uniporcato. *Pall. inf. ross. 1. p. 29. t. B. f. 9.*  
*Habitat*



*Habitat in torridis et squalidis deserti Volgenfis rarior, sulcirostri minor, magis teres.*

- tetra- 459. *C. apterus cinerascens*, thorace fusco: lineis quatuor la-  
grammus. cteis, elytrorum lituris quatuor nigris, rostro crasso.  
*Pall. inf. ross. 1. p. 29. t. B. f. 10.*  
*Lepech. it. 2. app. p. 329. t. 11. f. 28.*  
*Habitat in squalidis aridissimis deserti Volgenfis maxime au-*  
*stralis rarior, major, elegans.*
- tribuloi- 460. *C. thorace bicristato scabro*, elytris spinis conicis axilla-  
des. ribus posterioribusque rostro crasso. *Pall. inf. ross. 1.*  
*p. 30. t. B. f. 11.*  
*Habitat in Rio Janeiro Americae, habitu inderiensis, euro-*  
*paeis omnibus major.*
- nigriviti- 461. *C. cylindricus dealbatus*, capite thoraceque subcarinatis:  
tis. fascia utrinque longitudinali fusca. *Pall. inf. russ. 1.*  
*p. 31. t. B. f. 12.*  
*Habitat in aridis squalentibus deserti caspici, frequens, octo*  
*lineas longus.*
- Vibex. 462. *C. cylindricus albissimus*, thorace elytrisque striga utrin-  
que nigra longitudinali. *Pall. inf. ross. 1. p. 32. t. B. f. 13.*  
*Habitat in arenosis ad Selengam, frequens.*
- fenebra- 463. *C. apterus albus*, rostro crasso, elytrorum maculis sex  
tus. rhombeis fuscis. *Pall. inf. ross. 1. p. 33. t. H. f. B. 16.*  
*Habitat in sabulosis ad Selengam, nebulofo minor.*
- flaviceps. 464. *C. apterus albatus*, capite flavescente lateribus rufo, ro-  
stro crasso, thorace elytrisque albo lineatis fusco inter-  
ruptis. *Pall. inf. ross. 1. p. 34. t. B. f. 17.*  
*Lepech. it. 2. app. p. 327. t. 11. f. 27.*  
*Habitat in arenosis ad Selengam et Chonem, rarior in Ta-*  
*tariae desertis, magnitudine feminis atri.*
- picus. 465. *C. albus*, rostro crasso, thorace fasciis tribus longitudinali-  
bus, elytrorum arcuata fuscis. *Pall. it. 1. app. p. 463.*  
*n. 33. inf. ross. 1. p. 35. t. H. f. B. 18.*  
*Habitat rarior in aridissimis salis deserti caspici, circa la-*  
*cum quoque Inderieniem.*
- hololeu- 466. *C. subcylindricus totus albus immaculatus*, rostro crasso,  
cos. oculis atris. *Pall. inf. ross. 1. p. 35. t. H. f. B. 19.*  
*Habitat in squalidis deserti caspici, sub atriplicibus et salsois.*  
467. *C.*

- tenebrioides. 467. *C. apterus aterrimus glaber, elytris laevigatis.* *Pall. inf. ross. I. p. 36. t. B. f. 20.*  
*Frisch inf. 13. p. 28. t. 26?*  
*Schaeff. ic. t. 62. f. 11.*  
*Habitat rarior in deserti caspici aridis, hami inter tenebriones apteros.*
- albator. 468. *C. oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, posteriorius compressis pubescentibus: fasciis lateralibus niveis.* *Pall. inf. ross. I. p. 36. t. B. f. 21.*  
*Habitat in Brasilia, major.*
- noveboracensis. 469. *C. canus, elytris subfasciatis: striis quinque albidis nigro punctatis, scutello flavicante.* *Forst. nov. inf. sp. I. p. 35. n. 35.*  
*Habitat in Noveboraco, 7 lineas longus.*
- melanogrammus. 470. *C. corpore cano, sutura elytrorum anterior nigra, nitida, rostro brevissimo.* *Forst. nov. inf. sp. I. p. 36. n. 36.*  
*Habitat in Anglia, incano dimidio minor.*
- plagiatus. 471. *C. subglobosus, elytris punctis longitudinalibus impressis striisque e cinereo et fusco alternis.* *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 284.*  
*Habitat in Marchia, statura C. coryli, at multoties major.*
- cinereus. 472. *C. oblongus cinereus, elytris albido nebulosis: posteriorius fascia albida.* *Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 285.*  
*Habitat, rarus, Halae Saxonum, lineati statura.*
- sericeus. 473. *C. corpore viridi-argenteo, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus subdentatis.* *Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 286.*  
*Habitat Halae Saxonum in salice, aestate frequentissimus, argentato affinis, lineati statura et magnitudine.*
- tenebriocofus. 474. *C. niger nitidus, oculis fuscis, elytris connatis acuminatis excavato-punctatis.* *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 81. n. 67. t. 24. f. 27.*  
*Habitat Berolini, rarissimus, 5 lineas longus, tenebrioidi affinis.*

- Faber. 475. *C. niger*, rostro lato, antennis fuscis, elytris connatis: punctorum excavatorum seriebus octo. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 81. n. 68. t. 24. f. 28.*  
*Habitat in Marchia.*
- major. 476. *C. niger albido villosus*, thorace punctato rugoso rostrum aequante, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 81. n. 69. t. 24. f. 29.*  
*Habitat Berolini, germanorum maximus.*
- linzensis. 477. *C. apterus fuscus*, thoracis elytrorumque lateribus rufis. *Schranck enum. inf. austr. p. 123. n. 234.*  
*Habitat Linzii.*
- splendendus. 479. *C. viridis angustissimus*, oculis fuscis, antennis pedibusque fulcescentibus, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 82. n. 72. t. 24. f. 30.*  
*Habitat Berolini, 3 lineas longus.*
- trivialis. 480. *C. cinereus*, thorace lineis tribus exfoletis albis, elytris maculis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 82. n. 73.*  
*Habitat Berolini, 3 fere lineas longus, statura c. polygoni.*
- arenarius. 481. *C. capite cano*, thorace granulato pedibusque nigris, elytris connatis griseis punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 22. n. 74.*  
*Habitat Berolini, statura c. ligustici, at dimidio minor.*
- berolinensis. 482. *C. albicans*, subtus varius, thorace rugoso nigro ad latera variegato, elytris fasciis duabus undulatis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 75. t. 24. f. 31.*  
*Habitat Berolini, frequens nebuloso affinis, at multo minor.*
- globatus. 483. *C. capite thoraceque fulcescentibus subaeneis*, thoracis margine arcubusque duobus mediis longitudinalibus cinereis, abdomine subglobofo, elytris connatis punctato-striatis: interstitiis fasciis alternis cinereis et fulcescentibus maculisque obsoletis albidis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 76. t. 24. f. 32.*  
*Habitat Berolini frequens, variae magnitudinis.*
- Viverra. 484. *C. fordide cinereus*, rostro lato, thorace scabro, antennis turgido, per mediam longitudinem sulcato, elytris striatis.

striatis: interstitiis scabris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 77.*

*Habitat in Pomerania, vix sesquilineam longus, antennis fuscis.*

Herbstii. 485. *C. cinereus*, thorace subglobofo granulato, elytris rotundatis striatis: ocellis rubro-aureis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 78.*

*Habitat Berolini, rarior.*

pyricola. 486. *C. angustus ater*, subtus antennisque spadiceus, thorace granulato, elytris fulcatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 79.*

*Habitat in Pomerania, vix 2 lineas longus, rostro paulo longiore.*

granulatus. 487. *C. ovatus griseus*, supra granulatus: granulis hinc inde rubris pellucidis, elytris connatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 80. t. 24. f. 33.*

*Habitat in Marchia, 3 lineas longus.*

piniperda. 488. *C. spadiceus*, thorace elongato punctato, elytris punctato-striatis, femoribus subdentatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 81.*

*Habitat in Marchia, 1½ lineam longus, facie bostrichi piniperdae.*

futuralis. 489. *C. elongatus cinereus fusco subvarius*, subtus, lateribus futuraque albus, antennis oculisque nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 82. t. 24. f. 34.*

*Habitat in Marchia, angustus, 3 lineas longus.*

Eremita. 490. *C. supra flavescente-pilosus*, rostro tenui thoraceque subpunctato nigris, antennis elytrisque punctato-striatis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 85. n. 83.*

*Habitat in Marchia, 2 lineas longus.*

bruchoides. 491. *C. thorace elytrisque abbreviatis nigris granulatis et striatis.* *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 85. n. 84.*

*Habitat in Marchia, brucho similis, vix ultra dimidiam lineam longus, teres, crassus rostro pendulo.*

singularis. 492. *C. subbrevisstris cinereus*, elytris striis punctatis: punctis excavatis centro eminentibus. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1066. n. 3.*

*Habitat*

*Habitat in Lusitania, mediae magnitudinis, femoribus clavatis.*

- earinatus. 493. C. subbrevisrostris niger, thorace subcarinato, elytris angulatis tuberculatis. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1066. *n.* 3.  
*Habitat in Lusitania, barbaro similis, at quadruplo minor.*
- oedematus. 494. C. niger glaber politus, elytris rubris. *Sulz. hist. inf.*  
*p.* 40. *t.* 4. *f.* 10.  
*Habitat in Europa.*
- Cypri. 495. C. fulcatus, linea dorfi longitudinali atra. *Hasselq. it.*  
*p.* 449. *n.* 100.  
*Habitat in Cypro.*
- albidus. 496. C. apterus supra albicans, subtus dilute roseus, thorace bicuspido, elytris fulcatis: punctis canis. *Lepech. it.* 1.  
*p.* 313. *t.* 17. *f.* 7.  
*Habitat in Russia.*
- bipunctatus. 497. C. thorace scabro, elytris nebulosis: punctis ad apicem duobus nigris nitidis. *Lepech. it.* 2. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 25.  
*Habitat in Sibiria.*
- guttatus. 498. C. niger, vellere rufescente nigro punctato: punctis in elytris transparentibus. *Lepech. it.* 2. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 30.  
*Habitat in Sibiria.*
- populneus. 499. C. ater, femoribus pallidis. *Scop. ent. carn.* *n.* 74.  
*Habitat in Carniolia, c. fagi proxime affinis, at femoribus aequalibus.*
- piger. 500. C. femoribus anterioribus clavatis, rostro striis elevatis senis; lateralibus apice conjunctis. *Scop. ent. carn.* *n.* 65.  
*Habitat in Carniolia.*
- iners. 501. C. rostro linea elevato unica, elytris striis decem punctatis. *Scop. ent. carn.* *n.* 68.  
*Habitat in Carniolia.*
- refinosus. 502. C. niger scaber, abdomine subtus, elytris apice albidis. *Scop. ent. carn.* *n.* 67.  
*Habitat in Carniolia.*
- picatus. 503. C. piceus, abdomine nigro, subtus albedo, femoribus clavatis. *Scop. ent. carn.* *n.* 69.  
*Habitat in Carniolia.*

504. C.

- erraticus. 504. C. rostro apice concavo, elytris subvillosis striatis: stria tertia tuberculata. *Scop. ent. carn. n. 70.*  
*Habitat in Carniolia.*
- C. al- 505. C. ex euproeo nigroque varius, elytris ad angulum baseos  
bum. externum linea arcuata alba. *Scop. ent. carn. n. 99.*  
*Habitat in Carniolia.*
- fenfitivus. 506. C. niger, femoribus fulvis apice nigris. *Scop. ent. carn.*  
*n. 100.*  
*Habitat in Carniolia.*
- nemoreus. 507. C. apterus niger opacus, capite glabro, rostro bifido,  
thorace elytrisque scabris acuminatis. *Scop. ent. carn.*  
*n. 101.*  
*Habitat in Carniolia.*
- Momus. 508. C. rostro supra-bisulcato, abdomine posterius fulvo vil-  
loso, femoribus anterioribus crassioribus. *Scop. ent. carn.*  
*n. 102.*  
*Habitat in Carniolia.*
- Zoilus. 509. C. rostro deflexo, elytris striatis nigro punctatis. *Scop.*  
*ent. carn. n. 103.*  
*Habitat in Carniolia.*
- querci- 510. C. niger, scutello trilobo: lobo anteriore albo, elytris  
nus. puncto albo. *Scop. ent. carn. n. 106.*  
*Habitat in Carnioliae et Helvetiae quercu.*
- carnioli- 511. C. niger, thorace albido, elytris striis quinque elevatis ni-  
cus. gris albo-punctatis. *Scop. ent. carn. n. 107.*  
*Habitat in Carniolia.*
- villosulus. 512. C. rufus subvillosus, elytris fasciis duabus obscurioribus  
obsoletis. *Scop. ent. carn. n. 108.*  
*Habitat in Carniolia.*
- praecox. 513. C. ferrugineus, elytris striatis subvillosis. *Scop. ent. carn.*  
*n. 109.*  
*Habitat in Carniolia, sub finem Aprilis conspicuus.*
- tricolor. 514. C. niger, thorace punctis binis albis, elytris punctatis:  
marginē interiore albo, lineisque binis longitudinalibus  
flavis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 91. n. 45.*  
*Habitat - - -*

- dentiro- 515. *C. ovatus niger*, rostro apice quadridentato. Müll. zool.  
ftris. dan. prodr. p. 85. n. 941.  
*Habitat in Dania.*
- tardus. 516. *C. nigricans*, thorace elytrisque utrinque rufis: macu-  
la apicis atra. Müll. zool. dan. prodr. p. 86. n. 942.  
*Habitat in Dania.*
- nodosus. 517. *C. canescens*, elytris nodulis minimis striatis. Müll.  
zool. dan. prodr. p. 86. n. 948.  
Olaß. it. isl. 1. p. 319. Silakkepr.  
*Habitat in Islandia.*
- longicor- 518. *C. nigricans*, thorace hirto, elytris cinereis: maculis  
nis. flavicantibus, pedibus antennisque rufis. Müll. zool.  
dan. prodr. p. 86. n. 949.  
*Habitat in Dania.*
- opacus. 519. *C. totus griseus laevissimus*. Müll. zool. dan. prodr. p.  
46. n. 950.  
*Habitat in Dania.*
- bicolor. 520. *C. griseus*, antennis pedibusque rufescentibus. Müll. zool.  
dan. prodr. p. 46. n. 951.  
*Habitat in Dania.*
- maculo- 521. *C. ovatus*, obscure flavicans, elytris luteo maculatis. Müll.  
fus. zool. dan. prodr. p. 46. n. 952.  
*Habitat in Dania.*
- futuratus. 522. *C. cervinus ovatus* elytris lineis tribus elevatis: futura  
posterius carinata. Müll. zool. dan. prodr. p. 46. n. 955.  
*Habitat in Dania.*
- terlinea- 523. *C. elongatus cinereus*, thorace terlineato, antennis ni-  
tus. gris. Müll. zool. dan. prodr. p. 46. n. 956.  
*Habitat in Dania.*
- mollis. 524. *C. griseo-auratus*, elytris mollibus. Müll. zool. dan. prodr.  
p. 87. n. 960.  
Aët. Nidr. 4. p. 12. t. 16. f. 6.  
*Habitat in Scandinavia.*
- undula- 525. *C. griseus nitens*, fasciis elytrorum undulatis ferrugineis.  
tus. Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 961.  
Aët. Nidr. 4. p. 13.  
*Habitat in Scandinavia.*

- bispinus. 526. *C. caeruleus*, thorace utrinque spinoso, antennis nigris.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 91. n. 1023.*  
*Schaeff. ic. t. 6. f. 4.*  
*Habitat in Europa.*
- incermis. 527. *C. violaceus*, thorace puncto utrinque impresso, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 91. n. 1025.*  
*Schaeff. ic. t. 56. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscatus. 528. *C. nigro-fuscus*, thorace utrinque fascia longitudinali, elytris duplici transversa cinerea. *Geoffr. inf. par. I. p. 280. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- fimbriatus. 529. *C. niger*, thorace punctato, elytris alternatim striatis et punctatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 281. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- exaratus. 530. *C. oblongus* totus niger, thorace punctato, elytris sulcatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 282. n. 11.*  
*Habitat in Gallia.*
- squamosus. 531. *C. squamis nitentibus*, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus. *Geoffr. inf. par. I. p. 284. n. 14.*  
*Habitat in Gallia.*
- Geoffroaei. 532. *C. rufus subvillosus*, capite nigricante. *Geoffr. inf. par. I. p. 284. n. 15.*  
*Habitat in Gallia.*
- gramineus. 533. *C. caeruleo-viridis nitens*, thorace punctato, elytris striatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 284. n. 16.*  
*Pet. gazoph. p. 77. n. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- dolorosus. 534. *C. oblongus niger*, abdomine squamoso: lateribus albis. *Geoffr. inf. par. I. p. 285. n. 17.*  
*Habitat in Gallia.*
- denticulatus. 535. *C. ovatus ex nigro cinereus*, thorace utrinque denticulato. *Geoffr. inf. par. I. p. 288. n. 24.*  
*Habitat in Gallia.*
- aculeatus. 536. *C. subrotundus niger squamosus*, elytris striatis, thorace utrinque aculeato: lateribus lineaque media albis. *Geoffr. inf. par. I. p. 288. n. 25.*  
*Habitat in Gallia.*



- subglobo- 537. *C. subglobosus* ex cinereo ater, striatus, rostro thoracis lon-  
 gitudine. *Geoffr. inf. par. I. p. 289. n. 26.*  
*Habitat in Gallia.*
- erythro- 538. *C. globosus rufus*, elytris striatis: fascia rransversa alba.  
 leucos. *Geoffr. inf. par. I. p. 289. n. 27.*  
*Habitat in Gallia.*
- leucozo- 539. *C. globosus niger*, elytris striatis: fascia transversa alba.  
 nius. *Geoffr. inf. par. I. p. 289. n. 28.*  
*Habitat in Gallia.*
- spinosus. 540. *C. totus fuscus spinosus*, elytris striis elevatis villoso-  
 spinosis. *Geoffr. inf. par. I. p. 412. n. 97.*  
*Habitat in Gallia.*
- arnus. 541. *C. niger*, scutello albicante, elytrorum striis utrinque  
 denticulatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 290. n. 31.*  
*Habitat in Gallia.*
- marmora- 542. *C. lividus*, coleoptris fasciis plurimis obscuris. *Geoffr.*  
 tus. *inf. par. I. p. 291. n. 33.*  
*Habitat in Gallia.*
- bohemi- 543. *C. corpore*, capite antennisque nigris, thorace papilloso  
 cus. et elytris quatuor papillarum ordinibus insignitis cinereis  
 incanis. *Richter Abb. Naturg. Boehm. p. 34.*  
*Habitat in districtu Bohemiae Reichenbergensi, subglobosus,*  
*magnitudine dermestis pellionis.*
- rotunda- 544. *C. apterus*, corpore oblongo nitido nigro laevi. *Degeer*  
 tus. *inf. 5. p. 243. n. 29. t. 7. f. 22.*  
*Habitat in Europa, 3½ lineas longus.*
- multico- 545. *C. corpore subgloboso ex rufo fusco: punctis ex flavo gri-*  
 lor. *seis, elytris carinatis. Degeer inf. 5. p. 244. n. 30.*  
*Habitat in alno, mediae magnitudinis.*
- ochropus. 546. *C. corpore oblongo viridi nitido, antennis pedibusque fla-*  
 vis. *Degeer inf. 5. p. 245. n. 31.*  
*Habitat in Europa, ultra 2 lineas longus.*
- fascicula- 547. *C. corpore ovato fusco: fasciculis pilosis griseis, antennis*  
 tus. *longis. Degeer inf. 5. p. 276. n. 10. t. 16. f. 2.*  
*Habitat Sutinami.*

- fulviro- 549. *C. nigro-aeus* rostro plano pedibusque flavescens.  
 tris. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 381.*  
*Habitat in Scania parvus.*
- triangula- 551. *C. obscurus flavicans*, thoracis basi triangulari, elytris  
 ris. striato-punctatis. *Petagn. inf. Calabr. p. 1. n. 71.*  
*Habitat Brancaleoni in Calabria, in carduorum floribus frequens.*
- formosus. 553. *C. corpore virescente*, antennis pedibusque rufis. *Mayer*  
*Abb. boehm. Ges. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiae floribus cardui, magnitudine c. pyri.*
- carinatus. 582. *C. griseus oblongus*, rostro carinato: carina utrinque fuscata, thorace elytrisque punctatis: his polline griseo confersis: punctorum ordinibus decem, pedibus anticis longioribus: femoribus tibiisque fusco annulatis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 445.*  
*Habitat extra Europam.*
- crassiro- 583. *C. griseus*, rostro crasso supra rugoso, thorace nigro punctato, elytris obsolete rugosis: pilis erectis hispidis, abdomine fusco. *Mus. Lesk. p. 21. n. 449.*  
 tris. *Habitat in Europa.*
- dealbatus. 584. *C. oblongus variolosus niger*, polline albo confersus, elytris fasciis obliquis duabus maculisque tribus albis, abdomine nigro punctato. *Mus. Lesk. p. 21. n. 450.*  
*Habitat in Europa.*
- incinera- 585. *C. niger*, thoracis lineis quatuor elytrorumque vittis quatuor punctisque sparsis cinereis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 456.*  
 tus. *Habitat in Europa.*
- planiro- 586. *C. subglobosus griseus*, rostro explanato, elytris striatis  
 tris. erecto-pilosis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 459.*  
*Habitat in Europa.*
- varius. 587. *C. elytris griseo fulvoque variis punctato-striatis: punctis holosericeis fulcis.* *Mus. Lesk. p. 21. n. 461.*  
*Habitat in Europa.*
- naevius. 588. *C. naevius*, rostro crasso supra plano fusco, elytris rugosis: sutura elevata posterius carinata, femoribus fulcis, tibiis rufis griseo-squamosis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 463.*  
*Habitat in Europa.*

- coracinus. 589. *C. niger ovatus glaber, elytris connatis apice acuminatis thoraceque punctatis. Mus. Lesk. p. 22. n. 465.*  
*Habitat in Europa.*
- latirostris. 590. *C. elytris punctato-striatis cinereo-pilosis, rostro brevi lato stria dorsali exarato. Mus. Lesk. p. 22. n. 466.*  
*Habitat in Europa.*
- hirtus. 591. *C. fuscus, thoracis lineis quatuor, elytrisque hispidis punctato-striatis griseis: horum marginibus externis albidis. Mus. Lesk. p. 22. n. 467.*  
*Habitat in Europa.*
- rugatus. 592. *C. griseus, thoracis dorso elytrorumque rugosorum sutura ferrugineo-fusca, thoracis dorso utrinque puncto. Mus. Lesk. p. 22. n. 470.*  
*Habitat in Europa.*
- infuscatus. 593. *C. rostro thoraceque fuscis: hujus lineis tribus griseis, elytris tibiisque rufescentibus. Mus. Lesk. p. 22. n. 471.*  
*Habitat in Europa.*
- obsoletus. 594. *C. fusco-griseus, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 472.*  
*Habitat in Europa.*
- subrufus. 595. *C. fulvo-griseus, antennis tibiisque rufescentibus. Mus. Lesk. p. 22. n. 473.*  
*Habitat in Europa.*
- clavipes. 596. *C. oblongus fuscus cinereo adsperfus, antennis tibiisque rufis, femoribus clavatis. Mus. Lesk. p. 22. n. 475.*  
*Habitat in Europa.*
- exoletus. 597. *C. fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 478.*  
*Habitat in Europa.*
- nubilus. 598. *C. fuscus griseo-nebulosus, rostro lato plano, elytris striatis apice obtusis. Mus. Lesk. p. 22. n. 479.*  
*Habitat in Europa, magnitudine pediculi, statura c. Albini.*
- tenebri-cosus. 599. *C. niger subaeneus ovatus hirtus punctato-striatus, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 481.*  
*Habitat in Europa.*
- lutofus. 600. *C. lutofus ovatus, antennis rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 482.*  
*Habitat in Europa.*

**RHINOMACER.** *Antennae setaceae, rostro infidentes.*  
*Palpi quatuor extrorsum crassiores.*

curculioi-1. Rh. villoso-griseus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. des. inf. 1. p. 123. n. 1.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 199. n. 1.* Rhinomacer curculioides.

*Habitat in Italia, statura curculionis, subtus cinereus, pedibus nigris.*

attelaboi-2. Rh. villoso-piceus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 123. n. 2.*

*Habitat in Sueciae pinetis, curculioides minor.*

caeruleus. 3. Rh. caerulefcens subvillosus antennarum basi pedibusque flavis. *Petagn. inf. Calabr. p. 14. n. 72. f. XXXIV.*

*Habitat ad littora Calabriae, Brancaleoni; an forte Attelabi species?*

**ATTELABUS.** *Caput posterius acuminatum, inclinatum.*

*Antennae moniliformes, apicem versus crassiores.*

\* *maxilla bifida.*

coryli. 1. A. niger, elytris rufis reticulatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 199. n. 1. mant. inf. 1. p. 124. n. 1.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 619. n. 1. Fn. suec. 638. Amoen. acad. 5. t. 3. f. 171.* Attelabus niger, elytris rubris.

*It. oel. 153.* Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato.

*Degeer inf. 5. p. 257. n. 46. t. 8. f. 3.* Curculio excoriatoruber.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 273. n. 11.*

*Pontopp. atl. Dan. p. 205. n. 1. t. 16.*

*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 1.*

*Schaeff. ic. t. 75. f. 8.*

*Habitat in coryli foliis, quae in cylindrum convolvit, et utrinque claudit.*

2. A.

- avellanae. 2. *A. niger*, elytris, thorace pedibusque rubris.  
*Scop. ent. carn.* 71. *Curculio collaris*.  
*Schaeff. ic. t.* 56. f. 5. 6.  
*Habitat in Germaniae corylis, a. coryli similis; an mera va-*  
*rietas?*
- bicolor. 32. *A. niger*, thorace elytrisque rufescentibus, scutello femo-  
 rum tibiaramque basi et apice nigris. *Mus. Lesk. p.* 23.  
*n.* 504.  
*Habitat in Europa.*
- denigra- 33. *A. niger*, thorace elytrisque rubris, dorsi macula tibiis  
 tus. femorumque basi et apice nigris. *Mus. Lesk. p.* 23. *n.* 505.  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 34. *A. niger*, elytris rubris laevissime striato-punctatis. *Mus.*  
 pterus. *Lesk. p.* 23. *n.* 506.  
*Habitat in Europa.*
- bipustula- 11. *A. ater*, elytris macula bascos rufa. *Fabr. sp. inf.* 1.  
 tus. *p.* 200. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 2.  
*Habitat in America septentrionali.*
- gemma- 14. *A. ferrugineus*, tuberculis nigris sparsis. *Thunb. nov.*  
 tus. *inf. spec.* 3. *p.* 68. f. 80. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 4.  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine et figura a. coryli.*
- indicus. 15. *A. ferrugineus*, capite, elytrorum basi fasciaque cyaneis.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 68. f. 81. *Fabr. mant. inf.* 1.  
*p.* 124. *n.* 5.  
*Habitat in India, statura et magnitudine melanuri.*
- curculio- 3. *A. niger*, thorace elytrisque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200.  
 noides. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 6.  
*Scop. ent. carn.* 72. *Curculio nitens*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 273. *n.* 10.  
*Sulz. hist. inf. t.* 4. f. 12.  
*Schaeff. ic. t.* 75. f. 8.  
*Habitat in Europae corylo, salice, a. coryli similis, sed minor.*
- furina- 4. *A. elytris apice bidentatis.*  
 men- *Habitat Surinami, pensylvanico similis, a. coryli minor,*  
 tus. *niger; elytris fuscis, pedibus ferrugineis, antennis albo*  
*nigroque annulatis.* Rolander.

- pen-sylva- 5. *A. niger*, elytris rubris: fascia media apicisque nigra. *Fabr.*  
nicus. *mant. inf. I. p. 124. n. 3.*  
*Habitat in America boreali, statura surinamensis, sed minor, maxillis pedibusque rufis, antennis obtusis basi flavescens, thorace oblongo glabro.*
- melan- 6. *A. niger*, elytris testaceis apice nigris.  
ros. *Habitat Upsaliae, pensylvanico similis, sed major, antennarum abdominisque basi et elytris testaceis.*
- angula- 16. *A. ferrugineus*, coleoptris angulatis: disco nigro. *Fabr.*  
tus. *mant. inf. I. p. 124. n. 7.*  
*Habitat in Cayenna, statura A. coryli, antennis et pectore nigris.*
- ruficollis. 17. *A. rufus*, capitis vertice nigro, elytris caeruleis nitidis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 200. n. 4. mant. inf. I. p. 124. n. 8.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 87. n. 3. t. 25. f. 1. a.*  
*Habitat in Sibiria, statura a. coryli, antennarum apice caeruleo.*
- pubes- 18. *A. violaceus hirtus*, rostro atro. *Fabr. sp. inf. I. p. 200,*  
cens. *n. 5. mant. inf. I. p. 124. n. 9.*  
*Habitat in Germania, rostro longiori.*
- betulae. 7. *A. ater*, pedibus saltatoriis. *Fn. succ. 640.\* Fabr. sp. inf.*  
*I. p. 201. n. 6. mant. inf. I. p. 124. n. 10.*  
*Degeer inf. 5. p. 259. n. 47. Curculio excoriato-niger.*  
*Habitat in betulae foliis, quae rodendo pulcre crispa reddit, ocys sine saliens.*
- \*\* *maxilla unidentata.*  
† *palpis posterioribus securiformibus, Cleri.*
- mutilla- 19. *A. niger*, elytris fascia triplici alba basi rufis. *Fabr. sp.*  
rius. *inf. I. p. 201. n. 1. mant. inf. I. p. 125. n. 1. Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf. 5. p. 87. n. 1. t. 25. f. 2.*  
*Schranck inf. austr. n. 34. Dermestes fornicarioides.*  
*Habitat Halae Saxonum.*
- dubius. 20. *A. rufus*, elytris nigris: fascia duplici alba basique rufis.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 201. n. 2. mant. inf. I. p. 125. n. 2.*  
*Habitat in America boreali.*

- ichneu- 21. *A. capite thoraceque rufis, elytris nigris: fascia media  
monius. rufa strigaque apicis alba. Fabr. sp. inf. I. p. 201. n. 3.  
mant. inf. I. p. 125. n. 3.  
Habitat in America boreali.*
- formica- 8. *A. niger, thorace rufo, elytris fascia duplici alba basique  
rius. rubris. Fn. suec. 641. Scop. ent. carn. III. Fabr. sp.  
inf. I. p. 201. n. 4. mant. inf. I. p. 125. n. 5.  
Degeer inf. 5. p. 160. n. 3. t. 5. f. 8. Clerus formicarius.  
Schranck inf. austr. p. 21. n. 31. Dermestes formicarius.  
Raj. inf. p. 103. n. 29.  
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 8.  
Habitat in Europa et boreali America; primum pertinacem  
devastans, larva inter corticos putridos.*
- sphageus. 22. *A. niger, fronte elytrorumque fascia cinereis. Fabr. mant.  
inf. I. p. 125. n. 4.  
Habitat in America boreali, statura et magnitudine formi-  
carii.*
- sexgutta- 23. *A. niger, fronte cinerascente, elytris maculis tribus albis.  
tus. Fabr. sp. inf. I. p. 201. n. 5. mant. inf. I. p. 125. n. 6.  
Habitat in America meridionali.*
- quadri- 24. *A. niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis.  
maculatus. Schall. Abb. der ball. Naturf. Ges. I. p. 288. Fabr. mant.  
inf. I. p. 125. n. 7.  
Habitat in Halae Saxonum pinetis, parvus.*
- unifascia- 25. *A. niger, elytris fascia alba basi rubris. Fabr. mant. inf.  
tus. I. p. 125. n. 8.  
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 13. Attelabus formicarius minor.  
Habitat in Helvetiae et Africae onopordo.*
- octopun- 26. *A. cyaneus hirtus, elytris rufis: punctis quatuor nigris.  
ctatus. Fabr. mant. inf. I. p. 126. n. 9.  
Habitat in Hispaniae umbellatis, statura formicarii.*
- tricolor. 27. *A. rufus, capite nigro, elytris basi caeruleis, medio rufis  
apice violaceis. Fabr. sp. inf. I. p. 202. n. 6. mant. inf. I.  
p. 126. n. 10.  
Habitat in Africa aequinoctiali, formicario minor.*
- bifascia- 28. *A. viridi-aeneus pubescens, elytris cyaneis: fasciis dua-  
tus. bus coccineis. Fabr. sp. inf. I. p. 202. n. 7. mant. inf. I.  
p. 126. n. 11.  
Habitat in Sibiria, formicarii magnitudine.*

spylus. 9. A. viridis, elytris fascia duplici flava interrupta, thorace hirsuto. *Mus. Lud. Utr.* 63.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 202. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 126. n. 12.  
*Habitat in Africa, statura et magnitudine formicarii.*

Ammios. 29. A. viridis hirtus, elytris cyaneis: maculis tribus flavis; posterioribus lunatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 126. n. 13.  
*Habitat in Africae annui majori, statura et magnitudine apiarii.*

apiarius. 10. A. caerulefscens, elytris rubris: fasciis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 202. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 126. n. 14.  
Clerus elytris rubris: fasciis tribus caerulefscentibus. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 304. n. 1. t. 5. f. 4. Clerus nigro-violaceus hirsutus &c. *Degeer inf.* 5. p. 157. n. 1. t. 5. f. 3. Clerus caeruleo-violaceus.  
*Schranck inf. austr.* p. 21. n. 36. *Dermestes apiarius.*  
*Swammerd. bibl. nat.* t. 26. f. 3.  
*Reaum. inf.* 6. t. 8. f. 10.  
*Sulz. hist. inf.* t. 4. f. 6. et 14.  
*Schaeff. el.* t. 46.

*ic.* t. 48. f. 11.

*Habitat in Europa, America, Sibiria, larva frequens in alveariis, imago in floribus, formicario duplo major.*

cyaneus. 30. A. cyaneus, abdomine pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 126. n. 15.  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*

crabroni- 31. A. niger hirtus, elytris rufis: fasciis tribus nigris; tertia formis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 126. n. 16.  
*Habitat in Oriente, apiario major.*

†† palpis quatuor subfiliformibus, Spondylides.

ceramboi- 12. A. ater, elytris rugosis thorace latioribus. *Fn. suec.* 643.\*  
des. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 203. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 2.  
*Uddm. diff.* 26. t. 1. f. 1. Curculio inaximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.  
*Degeer inf.* 5. p. 32. n. 2. *Tenebrio variolosus.*  
*Habitat in boleto fomentario; nonne potius tenebrio?*

buprestoi- 13. A. ater, elytris nervosis, thorace subglobofo. *Fn. suec.*  
des. 644.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 203. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 1.  
*Fn.*



*Fn. suec.* 1. n. 554. Buprestis ater.

*Degeer inf.* 5. p. 84. n. 21. t. 3. f. 21. *Cerambyx* maxillo-  
lus niger &c.

*Frisch inf.* 13. p. 23. t. 19. *Scarabaeus* arboreus, collo crasso.

*Habitat in Europae silvis.*

NOTOXUS. *Antennae* filiformes.  
*Palpi* quatuor securiformes.  
*Maxilla* unidentata.

- porcatus. 1. *N. niger*, elytris porcatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 127. n. 1.  
*Habitat in terra van Diemen, molli major.*
- violaceus. 2. *N. pubescens niger violaceo-nitidus*, elytris laevibus: pun-  
ctis tribus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 127. n. 2.  
*Habitat in nova Seelandia.*
- mollis. 3. *N. pubescens*, elytris nigris: fasciis tribus pallidis. *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 203. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 3.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 621. n. 11. *Fn. suec.* 642. *Attelabus*  
*griseus pubescens*, elytris fasciis tribus pallidis.  
*Uddm. diff.* 28. t. 1. f. 9. *Curculio* oblongus ruber, ely-  
tris nigris fascia tripliçi albicante.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 305. n. 3. *Clerus* fuscus villosus &c.  
*Degeer inf.* 5. p. 159. n. 2. t. 5. f. 6. *Clerus* fusco-fasciatus.  
*Schranck inf. austr.* p. 22. n. 37. *Dermeestes* mollis.  
*Habitat in Europae floribus.*
- monoceros. 4. *N. thorace in cornu supra caput protenso.* *Fabr. sp. inf.* 1.  
p. 203. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 4. *Herbst apud Fuesli*  
*arch. inf.* 5. p. 88. n. 2. t. 25. f. 4.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 651. n. 14. *Meloe* monoceros.  
*Fn. suec.* 638. *Attelabus* monoceros.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 356. n. 1. t. 6. f. 8. *Notoxus.*  
*Habitat in Europae floribus.*

204. CERAMBYX. *Antennae fetaceae.**Palpi quatuor.**Thorax spinosus aut gibbus.**Elytra linearia.*\* *palpis quatuor aequalibus.*‡ *filiformibus.*† *maxilla cylindrica integra, Prioni.*† *thorace spinis mobilibus.*longima- I. C. elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis  
nus. longis. *Mus. Lud. Ulr. 64.\* Gron. zooph. 522.\* Fabr.**sp. inf. 1. p. 204. n. 1. mant. inf. 1. p. 128. n. 1.**Grew mus. 163. t. 13. Nococonaca.**Degeer inf. 5. p. 102. n. 6.**Sloan. jan. 2. p. 209.**Merian. surin. t. 28.**Vinc. mus. t. 1. f. inf. med.**Rocf. inf. 2. scar. 2. p. 11. t. 1. f. a.**Aubent. miscell. t. 64. f. 1.**Habitat in America meridionali, tibiis anterioribus in altero  
sexu longissimis.*trochlea- 2. C. elytris fusco canoque variis: punctis elevatis.  
ris. *Habitat in India. Degeer.*†† *thorace marginato.*fuligino- 84. C. ater, thorace crenato unidentato, elytris apice crenato-  
ius. dentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 204. n. 2. mant. inf. 1. p. 128. n. 2.**Habitat in America meridionali, antennis pedibusque interdum rufis.*rostratus. 85. C. thorace unidentato rufo, mandibulis inflexis acutis, terno spinoso. *Fabr. mant. inf. 1. p. 128. n. 3.**Habitat in Siam, mediae magnitudinis, capite atro, antennis piceis, elytris nigris, pedibus rufis.*cervicor- 3. C. thorace utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus  
nis. unispinosis, antennis brevibus. *Mus. Lud. Ulr. 65.\* Gron. zooph. 523.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 8. mant. inf. 1. p. 129. n. 12.**Degeer*

*Degeer inf.* 5. p. 94. n. 1.

*Sloan. jam.* 2. t. 237. f. 6.

*Merian. surin.* t. 48.

*Roef. inf.* 2. scar. 2. p. 12. t. I. f. B.

*Brown jam.* 429. t. 44. f. 8.

*Aubert. miscell.* t. 90. f. 3.

*Habitat larva in Americae ligno bombacis, exenta edulis, incolis in deliciis.*

- armilla- 4. *C. thorace utrinque quadridentato, elytris ferrugineis ni-*  
tus. gro marginatis, femoribus posterioribus unidentatis. *Gron. zooph.* 525. t. 15. f. 6. *Fabr. sp. inf.* I. p. 207. n. II. *mant. inf.* I. p. 129. n. 15. *Habitat in India, maximus.*
- damicor- 86. *C. thorace denticulato, mandibulis porrectis bidentatis,*  
nis. *antennis brevibus. Fabr. sp. inf.* I. p. 207. n. 12. *mant. inf.* I. p. 129. n. 16. *Mant.* I. p. 532. *Cerambyx thorace marginato crenulato angulato, maxillis porrectis corniformibus introrsum bidentatis, antennis mediocribus. Degeer inf.* 5. p. 97. n. 2. *Drury inf.* I. t. 37. f. 1. *Habitat in America meridionali, cujus incolis larva in deliciis.*
- imbricor- 5. *C. thorace bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucro-*  
nis. *natis, antennis perfoliato-imbricatis, brevioribus. Gron. mus.* 529. *Roef. inf.* 2. scar. 2. t. I. f. 1. *Habitat in Carolina, statura coriarii, an mera hujus varietas?*
- Faber. 6. *C. thorace utrinque unidentato rugoso, elytris piceis, an-*  
*tennis mediocribus. Fn. succ.* 646.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 204. n. 4. *mant. inf.* I. p. 128. n. 6. *Bergstr. nomencl.* I. t. 13. f. 1. *Frisch inf.* 13. p. 2. t. 17. *Schaeff. ic.* t. 72. f. 3. t. III. f. 1. *Habitat in Europae ligno ravior.*
- coriarius. 7. *C. thorace tridentato, corpore piceo, elytris mucronatis,*  
*antennis brevioribus. Fn. succ.* 647.\* *Scop. ent. carn.* 161. *Gron. zooph.* 528. *Fabr. sp. inf.* I. p. 206. n. 9. *mant. inf.* I. p. 129. n. 7.

*Fn.*

- Fn. succ.* 480. *Cerambyx niger*, thorace planiusculo, margine utrinque tridentato, coleoptris piceis.
- Gadd sat.* 79. *Cerambyx cinereo nigricans*, antennis et pedibus rufis.
- Degeer inf.* 5. p. 59. n. 1. t. 3. f. 5. *Cerambyx Prionus*.
- Geoffr. inf. par.* 1. p. 198. n. 1. t. 3. f. 9. *Prionus*.
- Raj. inf.* p. 95. n. 1.
- Frisch inf.* 13. t. 9.
- Sulz. hist. inf. t.* 4. f. 26.
- Roefel inf.* 2. scar. 2. t. 1. f. 1. 2.
- Schaeff. el. t.* 103.  
ic. t. 67. f. 3.
- Bergstr. nomencl.* 1. t. 13. f. 3. 4. 5. 6
- Voet coleoptr.* 2. t. 3. f. 9.
- Habitat in Europae betulis putridis, ova magna, oblonga, flavescenzia pariens.*
- giganteus. 87. *C. thorace utrinque tridentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis brevibus.* *Mant.* 1. p. 531. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 206. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 129. n. 14.  
*Aubent misc. t.* 64. f. 2.  
*Drury inf.* 3. t. 49. f. 1.  
*Habitat in America meridionali, mandibulis bidentatis.*
- melano- 8. *C. thorace ferrulato, corpore nigro, antennis brevibus, elytris mucronatis.*  
pus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 208. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 130. n. 25.  
*Prionus thorace marginato dentato, maxillis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.*  
*Gron. zooph.* 531.  
*Merian. surin. t.* 24. f. 1.  
*Drury inf.* 1. t. 38. f. 2.  
*Habitat in America meridionali, coriario duplo major.*
- spinofus. 88. *C. thorace multidentato nigro, elytris unidentatis testaceis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 130. n. 26.  
*Habitat Tranquebariae, mediae magnitudinis.*
- barbatus. 89. *C. thorace integro, mandibulis ferrugineo-hirsutissimis, antennis mediocribus.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 208. n. 21.  
*mant. inf.* 1. p. 130. n. 27.  
*Habitat in America meridionali, magnus.*
- Thomae. 9. *C. thorace crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis: margine luteo.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 207. n. 15.  
*mant.*

*mant. inf. 1. p. 129. n. 19. Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 9.*

*Habitat in insulis Americae, meridionali oppositis, 2 pollices longus.*

bilineatus. 90. C. thorace cremato albo bilineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 208. n. 16. mant. inf. 1. p. 129. n. 20.*

*Habitat in insulis, Americae oppositis.*

cinnamomeus. 10. C. thorace denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Mus. Lud. Ulr. 66.\**

*Fabr. sp. inf. 1. p. 208. n. 19. mant. inf. 1. p. 130. n. 24. Prionus thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis.*

*Merian. surin. 24. t. 24.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 2.*

*Drury inf. 1. t. 40. f. 2.*

*Habitat in America meridionali, elytris cinnamomeis.*

depfarius. 12. C. thorace submarginato unidentato pubescente, corpore nigricante, antennis brevibus nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 128. n. 7.*

*Habitat in Suecia, coriario minor, et dimidio angustior.*

mucronatus. 91. C. thorace bidentato, elytris rufis mucronatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 5. mant. inf. 1. p. 129. n. 8.*

*Habitat in America meridionali.*

curvus. 92. C. niger, thorace bidentato: dentibus arcuatis, elytris obtusis testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 129. n. 9.*

*Habitat in terra van Diemen, mediae magnitudinis.*

Luzonum. 93. C. thorace multispinoso, mandibulis porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 6. mant. inf. 1. p. 129. n. 10.*

*Petiv. gazoph. t. 47. f. 1.*

*Habitat in insulis Luzonum,*

ferripes. 94. C. thorace multispinoso, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus spinoso-ferratis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 205. n. 7. mant. inf. 1. p. 129. n. 11.*

*Habitat in Africa aequinoctiali, c. luzonum proxime affinis.*

- atratus. 13. C. thorace utrinque bidentato, corpore atro, antennis medicribus antrorsum aculeato-ferratis. *Gronov. zooph.* 524. t. 14. f. 9.  
*Habitat in Zeylon.*
- lineatus. 14. C. thorace ferrulato dentato, clytris nigris: linea alba, antennis compressis brevioribus.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 204. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 128. n. 4.  
Prionus thorace marginato crenato unidentato niger albo-vitratus, clytris apice crenato-dentatis.  
*Sloan. jam.* 2. p. 209. t. 237. f. 34.  
*Brown jam.* 430. t. 43. f. 7.  
*Habitat in America meridionali, insulisque oppositis.*
- nitidus. 95. C. thorace crenato unidentato, cyaneo-aeneus, elytris cupreis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 128. n. 5.  
*Habitat in Brasilia, coriario paulo minor.*
- spinibarbis. 15. C. thorace subcrenulato, capite sub maxillis spinoso scabro, antennis brevibus. *Mus. Lud. Utr.* 67.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 208. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 130. n. 21.  
Prionus thorace marginato crenato, capite sub mandibulis tridentatis.  
*Merian. surin.* 24. t. 24.  
*Habitat in America meridionali, niger.*
- maxillofus. 96. C. thorace crenato, mandibulis porrectis intus hirsutis quadridentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 208. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 130. n. 22.  
*Drury inf.* 1. t. 38. f. 3.  
*Habitat in America meridionali, spinibarbi affinis.*
- canaliculatus. 97. C. thorace crenato: canali dorsali villosa albo, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 130. n. 23.  
*Habitat in insulis, Americae oppositis, coriario minor.*
- bifasciatus. 16. C. thorace denticulato, corpore nigro, elytris rubris: fasciis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 207. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 129. n. 17.  
*Gron. zooph.* p. 532. t. 14. f. 4.  
*Habitat in America meridionali.*
- cylindroides. 98. C. obscurus, thorace tridentato, pectore abdomineque ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 207. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 129. n. 18.  
*Habitat in America boreali, mediae magnitudinis.*

- planatus. 17. C. thorace scabro anterieus dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis. *Fu. suec.* 645.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 257. n. 4. *mant. inf.* I. p. 156. n. 6. infusus flavipes. *Habitat in Europae truncis decorticatis, pediculo duplo major, antennis mediocribus, vix hujus generis.*
- †† *maxilla obtusa unidentata, Cerambyces.*
- barbicornis. 18. C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore testaceo nigro variegato. *Mus. Lud. Ulr.* 68.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 214. n. 24. *mant. inf.* I. p. 134. n. 34. *Habitat in Asia.*
- Ammiralis. 19. C. thorace subspinoso, antennarum quarto articulo barbato, secundo spinoso. *Habitat Surinami, niger, elytrorum basi, thoracisque lateribus rufis.*
- Batus. 20. C. thorace spinoso rugoso, elytris bidentatis, antennis longis uncinato-aculeatis. *Mus. Lud. Ulr.* 69. *Mus. Petrop.* 652. n. 154. Capricornus niger cornutus. *Habitat in America australi et India.*
- araneiformis. 21. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosis, antennis longis: articulo quinto barbato. *Fabr. sp. inf.* I. p. 209. n. 2. *mant. inf.* I. p. 131. n. 3. *Sloan. jam.* 2. t. 237. f. 24. *Drury inf.* I. t. 35. f. 4. *Habitat in America meridionali, griseus, aedili duplo major.*
- nodosus. 99. C. thorace spinoso, elytris cinereis nigro maculatis, antennis longissimis: articulo tertio apice nodoso. *Fabr. sp. inf.* I. p. 209. n. 3. *mant. inf.* I. p. 131. n. 4. *Habitat in Marilendia.*
- cancriformis. 100. C. thorace multidentato: dorso plano, elytris tibiisque anterioribus unidentatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 209. n. 4. *mant. inf.* I. p. 131. n. 5. *Drury inf.* 2. t. 35. f. 1. *Cerambyx pustulatus. Habitat in America meridionali.*
- tuberculatus. 101. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris punctatis spinosisque, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 131. n. 6. *Habitat in Jamaica, statura cancriformis.*

- hebraeus. 102. C. thorace acute dentato: dorso bicarinato, elytris cinereis fusco striatis maculatisque. *Fabr. sp. inf. 1. p. 210. n. 5. mant. inf. 1. p. 131. n. 7.*  
*Habitat in America meridionali, cinereus.*
- Scorpio. 103. C. thorace quadrispinoso, elytris tuberculato-granulatis, tibiis anterioribus apice dilatatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 210. n. 6. mant. inf. 1. p. 131. n. 8.*  
*Habitat in America meridionali, cinereus.*
- Sentis. 23. C. thorace spinoso laevi, elytris fastigiatis biguttatis, antennis subtus aculeatis longioribus.  
*Habitat in India, griseus, linea alba ab antennis per latera thoracis et abdominis ducta, antennis corpore sesquilon- gioribus.*
- farinosus. 24. C. piceus, thorace spinoso, elytris punctis albis farinosis sparsis, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 214. n. 25. mant. inf. 1. p. 134. n. 35.*  
*Degeer inf. 5. p. 108. n. 9. t. 13. f. 17. Cerambyx niger &c. Forster nov. inf. sp. 1. p. 39. n. 39. Cerambyx chinensis. Merian. surin. t. 24. f. inf. Drury inf. 2. t. 31. f. 4.*  
*Habitat in argemones mexicanæ radice, larva albicans, capite caudaque nigris, imago lineolis duabus elytrorum mediis approximatis glabris.*
- ferrugi- 25. C. thorace spinoso rugoso, elytris fastigiatis subferrugi-  
 neus. neis, antennis longis. *Mus. Lud. Ulr. 70.\**  
*Habitat in India.*
- depressus. 26. C. depressus niger, cinereo variegatus, thorace multispino-  
 so, elytris acuminatis, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 214. n. 22. mant. inf. 1. p. 134. n. 32.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 626. n. 26? Cerambyx thorace quadri- spinoso: dorso depresso, elytris fastigiatis nebulosis: an- terius punctis elevatis sparsis, antennis longis. Schreb. inf. 8. f. 10? Cerambyx lepturoides, thorace mucronato, elytris apice emarginatis, punctis elevatis scabris. Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, succincti magnitudine.*

104. C.

---

Cerambycum larvæ cortices et ligna rodunt, perforant, penetrant, extrahuntur a picis.



- fasciatus. 104. *C. cyaneus*, thorace spinoso, elytris fascia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 214. n. 23. mant. inf. 1. p. 134. n. 33.*  
*Pall. ic. inf. ross. 2. t. F. f. 4.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 25. f. 5.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- glaucus. 28. *C. glaucus*, thorace quinquespinofo, elytris muricatis: latere fasciaque nigris, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 210. n. 7. mant. inf. 1. p. 131. n. 9.*  
*Degeer inf. 5. p. 111. n. 13. t. 14. f. 4. Cerambyx tuberculatus.*  
*Habitat in America meridionali, subtus fuscus. Rolander.*
- bidentatus. 105. *C. thorace subspinoso, elytris bidentatis scabris cinereo fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 210. n. 8. mant. inf. 1. p. 131. n. 10.*  
*Habitat in America meridionali.*
- nebulosus. 29. *C. thorace spinoso, elytris fastigiatis: punctis fasciisque nigris, antennis longioribus. Fn. suec. 650. It. gotl. 173. Fabr. sp. inf. 1. p. 215. n. 26. mant. inf. 1. p. 134. n. 36. Scop. ent. carn. n. 173.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 204. n. 7.*  
*Voet coleopt. 2. t. 4. f. 4.*  
*Degeer inf. 5. p. 71. n. 8.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 7.*  
*Habitat in abietum truncis, quas librum destruendo necat.*
- fasciculatus. 106. *C. thorace spinoso, elytris integris: punctis tribus hispidis, antennis mediocribus hirtis. Fabr. mant. inf. 1. p. 134. n. 37.*  
*Habitat in Germania, medius quasi inter nebulosum et hispidum.*
- hispidus. 30. *C. thorace spinoso, elytris anterieus albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. Fabr. sp. inf. 1. p. 215. n. 27. mant. inf. 1. p. 134. n. 37.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 215. n. 27. Fn. suec. 651. Cerambyx thorace spinoso, elytris subpraemorhis punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus.*  
*Fn. suec. 1. n. 484. t. 1. Cerambyx cinereus, elytris praemorhis nigris fasciaque alba, antennis sesquilongioribus.*  
*Degeer inf. 5. p. 71. n. 9. t. 3. f. 17. Cerambyx fasciculatus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 206. n. 9.*  
*Raj. inf. p. 97. n. 4.*

*Schaeff. ic. t. 14. f. 9.*  
*Frisch inf. 13. p. 22. t. 16.*  
*Habitat in Europa.*

- pilosus. 107. C. thorace bispinose, elytris griseis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 134. n. 39.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura hispida, sed minor, griseus.*
- rugicol- 108. C. niger, thorace inermi rugosissimo, antennis medio-  
lis. cribus pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 135. n. 40.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- longicor- 109. C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco griseoque  
nis. vario, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 235. n. 28. mant. inf. 1. p. 135. n. 41.*  
*Habitat in Coromandel, mediae magnitudinis.*
- margina- 110. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omni-  
lis. nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 215. n. 29. mant. inf. 1. p. 135. n. 42.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- brevicor- 111. C. thorace inermi viridi, elytris obscuris, antennis bre-  
nis. vibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 30. mant. inf. 1. p. 135. n. 43.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- desertus. 31. C. thorace spinoso albo-lineato, elytris bidentatis albo-  
fasciatis, antennis longioribus. *Mus. Lud. Ulr. 71.\**  
*Habitat in America.*
- fuccin- 32. C. thorace bispinose rugoso, elytris fascia flava, antennis  
tus. longioribus compressis. *Mus. Lud. Ulr. 72.\* Gron. zooph. 535. Fabr. sp. inf. 1. p. 213. n. 21. mant. inf. 1. p. 133. n. 27. Degeer inf. 5. p. 113. n. 14. t. 14. f. 5. Cerambyx fusco castaneus.*  
*Marcgr. bras. 254. Quici.*  
*Drury inf. 1. t. 39. f. 2.*  
*Habitat in America, praesertim Brasilia.*
- strigofus. 112. C. ferrugineus, thorace bispinose rugoso, elytris flavo  
striatis, antennis longis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 133. n. 28.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine succinelli, anten-  
narum corpore duplo longiorum femorumque apice nigro.*

- rufipes. 113. *C. thorace bispinoso rufo, elytris laevibus nigris, antennis longis. Fabr. mant. inf. 1. p. 133. n. 29.*  
*Habitat in America meridionali, statura et magnitudine stigmati.*
- dimidiatus. 114. *C. thorace bispinoso rugoso, flavus nigro punctatus, elytris nigris basi flavis, antennis mediocribus. Fabr. mant. inf. 1. p. 133. n. 30.*  
*Habitat in Cayenna, succincto paulo minor.*
- bicolor. 115. *C. ferrugineus, thorace bispinoso tuberculatoque, elytris ultra dimidium abdomineque atris. Fabr. mant. inf. 1. p. 134. n. 31.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine rufipedis.*
- virens. 33. *C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi femoribus rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 211. n. 10. mant. inf. 1. p. 131. n. 12. Syst. nat. XII. 2. p. 627. n. 33. Cerambyx thorace spinoso, elytris obtusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis.*  
*Drury inf. 1. t. 40. f. 1.*  
*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 39. 40.*  
*Brown jam. 430. t. 43. f. 8.*  
*Habitat in insulis, Americae oppositis, antennis nunc longioribus, nunc brevioribus, femoribus nunc muticis, nunc dentatis.*
- nitens. 116. *C. viridi-nitens, thorace rotundato subspinoso, femoribus clavatis: clava anteriorum rufa. Fabr. sp. inf. 1. p. 211. n. 11. mant. inf. 1. p. 131. n. 13.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, virenti affinis.*
- asfer. 117. *C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. Mant. p. 532. Fabr. sp. inf. 1. p. 211. n. 12. mant. inf. 1. p. 132. n. 14.*  
*Drury inf. 1. t. 39. f. 4.*  
*Habitat in Africa.*
- festus. 118. *C. thorace spinoso viridi, elytris violaceis basi viridibus, femoribus ferrugineis unidentatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 212. n. 13. mant. inf. 1. p. 132. n. 15.*  
*Habitat ad fluvium Gaboon Africae.*
- vittatus. 119. *C. viridis nitens, thorace spinoso, elytrisque nigro lineatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 212. n. 14. mant. inf. 1. p. 132. n. 16.*  
*Habitat in Brasilia.*

velutinus. 120. *C. thorace spinoso niger: vitta atra. Fabr. sp. inf. I. p. 212. n. 15. mant. inf. I. p. 132. n. 17.*

*Habitat in America meridionali, virenti proxime affinis.*

futuratus. 121. *C. ater, thorace spinoso, elytris futura vittaque media aureis. Fabr. sp. inf. I. p. 212. n. 16. mant. inf. I. p. 132. n. 18.*

*Habitat in America meridionali, velutino proxime affinis.*

torridus. 122. *C. niger, thorace subspinoso, elytris viridibus apice spinosis. Fabr. sp. inf. I. p. 213. n. 17. mant. inf. I. p. 132. n. 19.*

*Habitat in Sierra Leon Africae.*

Gigas. 123. *C. niger, thorace rugoso acuteque spinoso, elytris ferrugineis, antennis longis. Fabr. mant. inf. I. p. 132. n. 20.*

*Habitat in India, maximus hujus tribus.*

moschat. 34. *C. viridis nitens, thorace spinoso, antennis cyaneis mediocribus. Fabr. sp. inf. I. p. 210. n. 9. mant. inf. I. p. 131. n. 11.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 627. n. 34. Fn. suec. 652.\* Scop. ent. carn. 165. Cerambyx thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.*

*Fn. suec. I. n. 478. Cerambyx viridi caerulefcens, antennis corpus subaequantibus.*

*Degeer inf. 5. p. 64. n. 2. Cerambyx odoratus.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 203. n. 5. Cerambyx viridi-caerulefcens.*

*Mouff. inf. 149. f. ult. Cerambyx tertius.*

*Raj. inf. p. 81. n. 17.*

*Lister scar. p. 384. n. 11.*

*Frisch inf. 13. t. 11.*

*Ammir. inf. t. 33.*

*Sulz. hist. inf. t. 4. f. c.*

*Schaeff. ic. t. 11. f. 7. et t. 55. f. 1.*

*Bergstr. nomencl. I. p. 13. n. 2. t. 2. f. 2.*

*Habitat in Europae salice, antennis pedibusque nunc cyaneis, nunc fuscis, vivus odorem gratum et soporiferum spirans, ova pariens candida, sapida.*

alpinus. 35. *C. thorace spinoso, coleoptris fascia, maculisque quatuor atris, antennis longis. Fn. suec. 654. Scop. ent. carn. 166. Fabr. sp. inf. I. p. 213. n. 19. mant. inf. I. p. 132. n. 23.*

*It.*

*It. scan.* 260. Cerambyx subcaerulefcens, fascia maculis-  
que 4 nigris.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 202. n. 4. t. 3. f. 6.

*Scheuchz. it. alp.* 1. t. 1. f. 5.

*Fonst. inf. t.* 15. f. 3.

*Mouff. inf.* 150. f. 2.

*Rob. ic.* 8.

*Sulz. hist. inf. t.* 4. f. d.

*Schaeff. ic. t.* 123. f. 1.

*Drury inf.* 2. t. 31. f. 5.

*Habitat in Europae montosis.*

scalatus. 124. C. fuscus: linea longitudinali alba, thorace spinoso, an-  
tennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 213. n. 20. *mant.*  
*inf.* 1. p. 132. n. 24.

*Habitat in America meridionali, mediae magnitudinis.*

cafer. 125. C. viridi-aeneus, thorace spinoso, elytris testaceis, an-  
tennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 132. n. 25.

*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*

Morio. 126. C. ater, thorace hispinoso rugoso, antennis longioribus  
ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 133. n. 26.

*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine succincli.*

aedilis. 37. C. thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis  
nebulosis, antennis longissimis. *Fn. succ.* 653.\* *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 209. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 130. n. 1.

*xyrapik*

*It. ocl.* Cerambyx nebulosus, antennis corpore longiori-  
bus, thoracis punctis quatuor luteis.

*Petiv. gaz. t.* 8. f. 8. Capricornus rufficus.

*Degeer inf.* 5. p. 66. n. 5. t. 4. f. 1. 2.

*Mouff. inf.* 151. f. 2.

*Aët. nidr.* 4. t. 16. f. 8.

*Frisch inf.* 13. t. 12.

*Sulz. hist. inf. t.* 4. f. 27.

*Schaeff. ic. t.* 14. f. 7.

*Berg str. nomencl.* 1. 3. 5. t. 1. f. 5. 6. t. 2. f. 1.

*Habitat in Europae borealis arborum truncis, antennis pro  
sexu diversis.*

varius. 127. C. thorace spinoso tuberculatoque, corpore nigro cine-  
reoque variegato, femoribus clavatis, antennis medio-  
cibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 130. n. 2.

*Habitat in Aultria, aedili minor.*

Bbbbbbb 4

39. C.

- Pantax*
- Cerdo.** 39. *C. thorace spinoso rugoso niger, antennis longis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 212. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 132. n. 21. *Syst. nat.* XII. 2. p. 629. n. 39. *Scop. ent. carn.* 162. *Cerambyx thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 201. n. 2. *Mouff. inf.* 149. f. 1. *Frisch inf.* 13. t. 8. *Drury inf.* 1. t. 39. f. 1. *Schaeff. ic. t.* 14. f. 8. *Berg str. nomencl.* 1. 8. 10. t. 1. f. 10. et t. 2. f. 3.
- β) *Cerambyx Heros.* *Scop. ent. carn.* 163. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 200. *Berg str. nomencl.* 1. t. 11. f. 5. 6. *Habitat in Europae ligno, β) major.*
- Heros.** 128. *C. niger, thorace spinoso rugoso, elytris apice subspinosis testaceis, antennis longis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 132. n. 22. *Schaeff. ic. t.* 24. f. 3. *Habitat in Europae quercu, cerdoni affinis.*
- aurico-  
inus.** 40. *C. thorace quadrispinose ater, elytris taeniis geminis aureis, pedibus posterioribus latissimis compressis.* *Gron. zooph.* 534. t. 16. f. 1.\* *Habitat in America meridionali, antennis corpore paulo longioribus.*
- Juvencus.** 53. *C. thorace inermi rugoso, elytris acuminatis nigris, lanuginoso-canefcentibus, antennis longissimis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 216. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 135. n. 44. *Habitat in America meridionali ferrugineus, carchariae magnitudinis.*
- holoferi-  
ceus.** 129. *C. thorace inermi rugoso, griseus, elytris unidentatis holofericeis fusco cinereoque micantibus, antennis mediocribus.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 135. n. 45. *Habitat in India, mediae magnitudinis.*
- longicol-  
lis.** 130. *C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus, antennis longissimis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 135. n. 46. *Habitat in India, mediae magnitudinis, capite fusco.*

Herbstii. 131. *C. niger*, thorace rugoso utrinque unispinose, elytris supra viridi-aureis: margine ad apicem fasciisque duabus rubris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 168. n. 11. t. 45. f. 10.*

*Voet coleoptr. 2. t. 8. f. 26?*

*Habitat in America.*

platypus. 132. *C. caesus*, subtus, antennis pedibusque caeruleus, elytris ex purpureo viridi-aureis: lineis duabus elevatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 169. n. 12. t. 45. f. 11.*

*Degeer inf. 7. t. 49. f. 3.*

*Habitat in India, statura moschati.*

lusitanus. 133. *C. thorace spinoso*, corpore toto testaceo, elytris fascia undulata pallida. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1067. n. 5.*

*Habitat in Lusitania, culicis magnitudine, antennis ferrugineis, an hujus tribus?*

balteus. 134. *C. thorace spinoso*, corpore ferrugineo, abdomine ovato, elytris fascia nigricante. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1067. n. 6.*

*Habitat in Lusitania, culicis magnitudine, antennis corpore vix longioribus, an ad hanc tribum spectat?*

finnensis. 135. *C. thorace teretiusculo subconvexo ad latera utrinque mucronato.* *Hasselt, it. pal. p. 451.*

*Habitat in Syria; an huic tribui adscribendus?*

††† maxilla bifida.

† cornea, Lamiae.

Tribulus. 136. *C. thorace quadrispinose, scutello elytrisque spinosis, antennis longioribus.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 1. mant. inf. 1. p. 136. n. 1.*

*Habitat ad fluvium Gaboon Africae.*

fronticornis. 137. *C. thorace spinose, frontis cornu porrecto apice emarginato recurvo, antennis longis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 2. mant. inf. 1. p. 136. n. 2.*

*Drury inf. 2. t. 31. f. 2. Cerambyx bipunctatus.*

*Habitat ad caput bonae spei, fuscus.*

pedicornis. 138. *C. thorace elytrisque spinosis, femoribus anterioribus cornutis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 216. n. 3. mant. inf. 1. p. 136. n. 3.*

*Habitat in nova Hollandia.*

- Hyltrix.** 139. *C. thorace quinquespinoso*, elytris fasciculato-pilosis, antennis medioeribus ferratis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 216. n. 4. *mant. inf.* I. p. 136. n. 4.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Crista.** 140. *C. griseus*, thorace acute spinoso, elytris basi tuberculo compresso tridentato. *Fabr. sp. inf.* I. p. 216. n. 5. *mant. inf.* I. p. 136. n. 5.  
*Habitat in nova Seelandia.*
- ambulator.** 141. *C. thorace anterius utrinque bispinoso*, corpore nebuloso. *Fabr. sp. inf.* I. p. 216. n. 6. *mant. inf.* I. p. 136. n. 6.  
*Habitat in insulis Luzonum.*
- Rubus.** 21. *C. thorace spinoso bimaculato*, elytris bidentatis basi scabris mucronatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 224. n. 44. *mant. inf.* I. p. 142. n. 59.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 625. n. 21. *Cerambyx thorace spinoso*, antennis subtus hispidis longis, elytris bidentatis basique mucronatis albo bimaculatis.  
*Degeer inf.* 5. p. 106. n. 7. t. 13. f. 16. *Cerambyx albo-fasciatus.*  
*Habitat in India.*
- spinicornis.** 142. *C. thorace spinoso rugoso*, elytris griseis truncatis, antennis compressis, articulis apice spinosis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 224. n. 45. *mant. inf.* I. p. 142. n. 60.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, rubo minor.*
- brunneus.** 143. *C. brunneus*, thorace trispinoso, elytris obtusis: striis duabus elevatis obscuris, antennis compressis brevioribus. *Forst. nov. inf. sp.* I. p. 37. n. 37.  
*Degeer inf.* 5. p. 99. n. 3. t. 13. f. 13. *Cerambyx pennsylvanicus.*  
*Drury inf.* I. t. 37. f. 1.  
*Habitat in America septentrionali, moschato major, an propria species huc spectans?*
- scabrator.** 144. *C. subtestaceus*, thorace spinoso, elytris punctis atris baefeis scabris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 224. n. 46. *mant. inf.* I. p. 142. n. 61.  
*Habitat in India.*
- Spengleri.** 145. *C. cinereus*, thorace spinoso tuberculato, elytris scabris: maculis duabus lateralibus atris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 225. n. 47. *mant. inf.* I. p. 142. n. 62.  
*Habitat in America meridionali.*



- bidens. 146. *C. grifeus*, thorace acute spinoso, elytris apice bidentatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 225. n. 48. mant. inf. 1. p. 142. n. 63.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- Cantor. 147. *C. thorace mutico cinereo nigro-punctato*, elytris pallide testaceis apice bidentatis cinereis nigro maculatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 142. n. 64.*  
*Habitat in Sina, mediae magnitudinis, niger, cinereo-villosus.*
- Solandri. 148. *C. niger*, thorace subspinoso, elytris bidentatis fuscis cinereo irroratis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 225. n. 49. mant. inf. 1. p. 142. n. 65.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- cornutus. 149. *C. thorace obtuse spinoso*, mandibulis basi cornutis, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 225. n. 50. mant. inf. 1. p. 142. n. 66.*  
*Habitat in America.*
- leprofus. 150. *C. thorace spinoso*, elytris basi variolosis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 225. n. 51. mant. inf. 1. p. 142. n. 67.*  
*Habitat in America.*
- capensis. 36. *C. niger*, thorace bispinoso, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 220. n. 21. mant. inf. 1. p. 138. n. 25.*  
*Pod. mus. 32. n. 3.*  
*Petiv. gazoph. t. 3. f. 8.*  
*Drury inf. 1. t. 39. f. 3.*  
*Voet coleoptr. 2. t. 8. f. 26.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- hottentot- 151. *C. thorace spinoso rufo*, elytris nigris: fascia maculis-  
tus. que duabus marginalibus sanguineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 220. n. 22. mant. inf. 1. p. 138. n. 26.*  
*Brown ill. 118. t. 49. f. 1. Cerambyx punctatus.*  
*Voet coleoptr. 2. t. 8. f. 26.*
- ferruga- 152. *C. obscure ferrugineus*, thorace spinoso, elytris obscu-  
tor. re viretcentibus: striga interrupta sanguinea, antennis longis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 138. n. 27.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus.*

- humera- 153. *C. thorace spinoso, elytris flavis nigro fasciatis anterioribus*  
lis. mucronatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 220. n. 23. mant. inf. I.*  
*p. 138. n. 128.*  
*Habitat - - -*
- trifascia- 154. *C. ater, thorace subspinoso, elytris fasciis tribus flavis,*  
tus. antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 220. n. 24.*  
*mant. inf. I. p. 138. n. 29.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- jamaicen- 155. *C. thorace spinoso posteriori sinuato: elytris flavis: fas-*  
tis. ciis duabus maculaeque rhombea cyanea. *Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 220. n. 25. mant. inf. I. p. 138. n. 30.*  
*Habitat in Jamaica.*
- nobilis. 156. *C. thorace spinoso atro: margine flavo, elytris atris: fasciis*  
tribus flavis punctisque duobus albis. *Fabr. mant. inf.*  
*I. p. 138. n. 31.*  
*Habitat in Cayenna, statura bifasciati.*
- aethiops. 157. *C. ater thorace spinoso, elytris fasciis duabus punctoque*  
apicis luteis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. I. p.*  
*220. n. 26. mant. inf. I. p. 139. n. 32.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- variegata- 158. *C. thorace spinoso cinereo elytris fusco variis, anten-*  
tor. nis longis. *Fabr. sp. inf. I. p. 221. n. 27. mant. inf. I.*  
*p. 139. n. 33.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*
- Sutor. 38. *C. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis, scu-*  
tello luteo, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf. I. p. 218.*  
*n. 15. mant. inf. I. p. 137. n. 17.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 628. n. 38. Fn. suec. 655.\* Scop. ent.*  
*carn. 162. Cerambyx thorace spinoso, elytris obtusis*  
*atris subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis.*  
*Fn. suec. I. n. 482. Cerambyx ater, elytris punctatis maculis*  
*pallidis sparsis, antennis corpore longioribus, thorace*  
*spinoso.*  
*Gadd diff. 27. Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido,*  
*elytris fusco aeneis.*  
*Degeer inf. 5. p. 65. n. 4. Cerambyx atomarius.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 4.*  
*Schaeff. ic. t. 65. f. 1.*  
*Habitat in Europae silvis.*

- Sartor. 159. *C. niger*, thorace spinoso, scutello flavo, elytris immaculatis, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 137. n. 18.*  
*Habitat* Dresdae, an major varietas *futoris*?
- reticulator. 160. *C. niger*, thorace spinoso nigro-lineato, elytrisque reticulatis fulvis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 219. n. 16. mant. inf. 1. p. 137. n. 19.*  
*Habitat* in India, *futoris* magnitudine.
- molator. 161. *C. obscure cinereus fusco-maculatus*, thorace spinoso, elytris apice rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 137. n. 20.*  
*Habitat* in Cayenna, *mediae magnitudinis.*
- titillator. 162. *C. thorace spinoso*, elytris cinereo fusco glaucoque nebulosis, antennis longissimis rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 219. n. 17. mant. inf. 1. p. 137. n. 21.*  
*Habitat* in Carolina.
- vittator. 163. *C. thorace spinoso*, elytris cinereo pulverulentis: vittis duabus flavis nigro marginatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 219. n. 18. mant. inf. 1. p. 137. n. 22.*  
*Forst. nov. inf. sp. 1. p. 38. n. 38. Cerambyx incanus.*  
*Petiv. gazooph. t. 24. f. 6.*  
*Habitat* ad Sinus Campechianis littora.
- oculator. 164. *C. niger*, thorace spinoso, elytris maculis quatuor flavis subocellaribus, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 219. n. 19. mant. inf. 1. p. 138. n. 123.*  
*Degeer inf. 7. t. 49. f. 1. Cerambyx ocellatus.*  
*Voet. coleopt. 2. t. 7. f. 21.*  
*Habitat* ad caput bonae spei.
- Textor. 41. *C. thorace spinoso*, elytris convexis atris, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 217. n. 7. mant. inf. 1. p. 136. n. 7. Syst. nat. XII. 2. p. 629. n. 41. Fn. suec. 656.\* Scop. ent. carn. 164. Cerambyx thorace spinoso*, elytris obtusis convexis atris punctatis, antennis mediocribus.  
*Uddm. diss. n. 29. Cerambyx fœdide niger*, punctis elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subaequantibus.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 201. n. 3.*  
*Degeer inf. 5. p. 64. n. 3.*  
*Schaeff. ic. t. 10. f. 1.*  
*Bergstr. nomencl. 1. 5. 8. t. 1. f. 8.*  
*Habitat* in Europae truncis arborum.

- vaginator. 165. *C. niger*, thorace spinoso rugoso, elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 136. n. 8.*  
*Habitat in India, magnus.*
- puleher. 166. *C. niger*, anterior fasciis, posterior punctis viridibus, thorace spinoso, elytris basi mucronatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 217. n. 8. mant. inf. 1. p. 136. n. 9.*  
*Drury inf. 1. t. 32. f. 6.*  
*Habitat in Africa.*
- regalis. 167. *C. thorace spinoso viridi fasciato, elytris viridi irroratis; maculis tribus fulvis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 217. n. 9. mant. inf. 1. p. 136. n. 10.*  
*Brown illustr. t. 50. f. 1.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura pulchri.*
- nigricornis. 168. *C. griseus*, thorace mutico, elytris dorso planis, antennis brevibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 10. mant. inf. 1. p. 136. n. 11.*  
*Habitat in Coromandel.*
- grifator. 169. *C. griseus*, thorace mutico, elytris basi tuberculis duobus apice spinosis, antennis brevibus villosis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 136. n. 12.*  
*Habitat Tranquebariae, mediae magnitudinis.*
- sternutator. 170. *C. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 11. mant. inf. 1. p. 137. n. 13.*  
*Habitat in insula Barbados.*
- gutturator. 171. *C. thorace spinoso, elytris testaceis albo irroratis; basi punctis elevatis glabris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 12. mant. inf. 1. p. 137. n. 14.*  
*Habitat in Africa.*
- nubilus. 172. *C. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fusco ferrugineoque variis; macula marginali cinerea, antennis mediocribus.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 13. mant. inf. 1. p. 137. n. 15.*  
*Habitat in Germania, mediae magnitudinis.*
- ariolator. 173. *C. thorace spinoso lineato, elytris fuscis; linea semicirculari alba.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 218. n. 14. mant. inf. 1. p. 137. n. 16.*  
*Habitat in India.*

- tristis.** 42. *C. fuscus*, thorace spinoso, elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 221. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 139. n. 37. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 95. n. 54. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 90. n. 6. t. 25. f. 7. *Habitat in ligno cupressi Europae australis, antennis interdum corpore duplo longioribus.*
- funestus.** 174. *C. fuscus*, thorace spinoso, elytris laevibus: maculis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 139. n. 38. *Habitat frequens in Galliae sambuco, tristi proxime affinis, at duplo minor.*
- punctator.** 175. *C. ater*, thorace spinoso, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 221. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 39. *Forster nov. inf. sp.* 1. p. 39. n. 39. *Cerambyx chinensis.* *Drury inf.* 2. t. 31. f. 4. *Cerambyx farinosus.* *Habitat in Sina.*
- crispus.** 175. *C. thorace spinoso, elytris lineis tribus elevatis ferrugineis, antennis mediocribus, corpore cinereo.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 221. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 40. *Habitat ad caput bonae spei.*
- rotator.** 176. *C. cinereus*, thorace spinoso, elytris subfasciatis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 41. *Habitat in India.*
- glycyrrhizae.** 177. *C. niger*, thorace spinoso, elytris albo-lineatis bicarinatis, pedibus ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 42. *Pall. it.* 2. p. 723. n. 60. *Sulz. hist. inf. t.* 5. f. 9. *Cerambyx ovatus?* *Habitat in Sibiria, fuliginatore triplo major.*
- cruciatus.** 178. *C. niger*, thorace spinoso, coleoptris cruce media alba. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 140. n. 43. *Pall. ic. inf. Ross.* 2. t. F. f. 5. *Lepechin it.* 2. p. 198. t. 10. f. 8. *Cerambyx crucifer.* *Habitat in Russia magis australi, statura fuliginatoris, at paulo major.*

- fuliginator. 43. *C. niger*, thorace subspinoso, elytris cinerascensibus, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 44.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 205. n. 8.  
*Degeer inf.* 5. p. 70. n. 7.  
*Frisch inf.* 13. t. 19.  
*Voet coleoptr.* 2. t. 8. f. 30.  
*Habitat in Europa australi, aetate totus niger, lanugine densa.*
- cinerarius. 179. *C. cinerascens*, thorace spinoso, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 140. n. 45.  
*Pall. ic. inf. ross.* 2. t. F. f. 11.  
*Habitat in Russia meridionali, statura fuliginatoris, cui proxime affinis.*
- carinatus. 180. *C. niger*, thorace spinoso, elytris piceis: carina laterali elevata albida, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 46.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. p. 91. n. 8. t. 25. f. 8.  
*Habitat in Sibiria, statura et magnitudine fuliginatoris.*
- coquus. 44. *C. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis sulcatis atris anterieus ferrugineis, antennis medioeribus.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 222. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 47.  
*Habitat in America boreali, thoracis spinis minutissimis.*
- ruspator. 181. *C. thorace spinoso fusco: maculis duabus ferrugineis, elytris fulcis cinereo-variegatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 223. n. 37. *mant. inf.* 1. p. 140. n. 48.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*
- tornator. 182. *C. thorace spinoso quadripunctato, elytris rufis: maculis quatuor nigris, antennis brevibus.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 223. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 141. n. 59.  
*Forst. nov. inf. sp.* 1. p. 41. n. 41. *Cerambyx tetrophthalmus.*  
*Habitat in America boreali.*
- Bankii. 183. *C. griseus*, thorace subspinoso, elytris ferrugineo irroratis: fasciis duabus cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 223. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 141. n. 50.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- saltator. 184. *C. griseus*, thorace inermi, elytris fasciis duabus macularibus abbreviatis strigaque posteriore punctata niveis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 141. n. 51.  
*Habitat . . . parvus.*

- testator. 185. *C. thorace spinoso cornuque brevi recumbente, corpore testaceo, antennis brevibus apice nigris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 223. n. 40. mant. inf. I. p. 141. n. 52.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, parvus, brevis, villosus.*
- Kaehlerii. 50. *C. niger, thorace spinoso elytrisque sanguineis: macula nigra.* *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 96. n. 56. Fabr. sp. inf. I. p. 219. n. 20. mant. inf. I. p. 138. n. 24.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 204. n. 6.*  
*Schæff. ic. t. I. f. 1.*  
 β) *Cerambyx ungarica.* *Herbst apud Fuëssli arch. inf. 5. p. 90. n. 4. t. 25. f. 6.*  
*Schæff. ic. t. 153. f. 4.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- pedestris. 51. *C. ater, vitta integra alba, thorace spinoso, antennis medioeribus.* *Fabr. sp. inf. I. p. 223. n. 41. mant. inf. I. p. 141. n. 53.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 631. n. 51. Cerambyx thorace spinoso apterus niger, elytris tomentosus atris: futura alba, antennis medioeribus.*  
*Poda inf. p. 34. n. 9. Cerambyx pedestris.*  
*Scop. ent. carn. n. 168. Cerambyx arenarius.*  
*Herbst apud Fuëssli arch. inf. 5. p. 91. n. 9. t. 25. f. 9.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- Scopoli. 186. *C. niger, thorace spinoso, elytris unicoloribus, antennis brevibus.* *Fabr. mant. inf. I. p. 141. n. 54.*  
*Scop. ent. carn. n. 169. Cerambyx aethiops.*  
*Habitat in Germania australi, pedestri proxime affinis, at paulo minor, elytris nunc nigris, nunc testaceis.*
- germanicus. 187. *C. ater, thorace spinoso, elytris marginibus lineisque duabus utrinque coeuntibus albis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 141. n. 55.*  
*Habitat in Germania, statura et magnitudine pedestris.*
- molitor. 188. *C. fuscus, vittis tribus integris albis, thorace subspinoso, antennis medioeribus.* *Fabr. sp. inf. I. p. 224. n. 42. mant. inf. I. p. 142. n. 56.*  
*Habitat in India, an varietas pedestris?*
- tuberculator. 189. *C. griseus, thorace mutico, colcoptis basi bituberculatis: maculis duabus communibus albis, antennis brevibus.* *Fabr. sp. inf. I. p. 224. n. 43. mant. inf. I. p. 142. n. 57.*  
*Habitat ad caput bonae spei, parvus.*

- nutator. 190. *C. villosus*, thorace mutico lineato cinereo, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 142. n. 58.*  
*Habitat in Tahiti, tuberculatoris magnitudine.*
- curculio- 64. *C. fuscus*, thorace colcoptisque ocellis quatuor atris.  
noides. *Fabr. sp. inf. 1. p. 221. n. 28. mant. inf. 1. p. 139. n. 34.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 634. n. 64.* *Cerambyx* thorace mutico,  
ocellis quatuor nigris, elytris ocello fesqui-altero, antennis longis.  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 101. n. 75.* *Ieptura curculionoides.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 210. n. 5.*  
*Schneff. ic. t. 39. f. 1. et t. 155. f. 5.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- luscus. 191. *C. niger* ferrugineo irroratus, thorace spinoso rugoso, elytris basi macula ocellari atra, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 139. n. 35.*  
*Habitat in Siam, tristi paulo major.*
- notatus. 192. *C. obscurus* thorace spinoso, elytris punctis duobus approximatis atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 139. n. 36.*  
*Habitat in Cayenna, statura curculionoidis.*
- fulvus. 193. *C. apterus niger*, thorace spinoso, elytris rubris, abdomine brevioribus. *Schrank inf. austr. p. 139. n. 263.*  
*Scop. ent. carn. n. 170.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 25. f. 10.*  
*Habitat in Austria.*
- ungaricus. 194. *C. niger*, capite thoraceque spinoso linea longitudinali, elytris futura lineisque tribus albis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 91. n. 12. t. 25. f. 11.*  
*Habitat in Ungaria.*
- trifasciatus. 366. *C. thorace spinoso*, elytris convexis nigris: fasciis tribus coccineis interruptis; apicis angustiore, antennis corpore longioribus. *Mus. Lesk. p. 24. n. 534.*  
*Habitat extra Europam.*
- luteus. 367. *C. oblongus*, thorace quadrispinoso capite antennarum nigrarum basi pedibusque luteis, dorsi lineis tribus fuscis, elytris apice bispinosis flavescens: rugis duabus marginique fuscis. *Mus. Lesk. p. 24. n. 535.*  
*Habitat extra Europam.*



- Daviesii. 377. *C. ater*, thorace spinoso, punctis maculisque plurimis fulvis, elytris subtriangularibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. n. 3. 3. 15. t. 8. f. 6.  
*Habitat in sinu Hinduras Americae, curculioneide paulo major.*
- †† *membranacea*, Saperdae.
- Carcharias. 52. *C. thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus.* *Fz. succ.* 660. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 230. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 147. n. 1.  
*Degeer inf.* 5. p. 73. n. 10. t. 3. f. 19. *Cerambyx punctatus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 208. n. 1.  
*Pet. gaz.* 5. t. 2. f. 1.  
*Goed. inf.* 2. t. 51.  
*List. goed. f.* 106.  
*Schaeff. ic. t.* 38. f. 4. et t. 152. f. 4.  
*Drury inf.* 1. t. 41. f. 5.  
*Bergstr. nomencl.* 1. 5. 7. t. 1. f. 7.  
 β) *Cerambyx villosus.* *Lepech. it.* 2. t. 11. f. 18?  
*Habitat in Europae, β) Sibiriae silvis.*
- confluens. 368. *C. niger*, thorace cylindrico, antennis mediocribus, elytris punctis confluentibus. *Mus. Lesk.* p. 26. n. 557.  
*Habitat in Europa.*
- fuscicornis. 369. *C. testaceus*, thorace longo utrinque tuberculato, femoribus clavatis ferrugineis, antennis fuscis. *Mus. Lesk.* p. 26. n. 558.  
*Habitat in Europa.*
- surinamus. 54. *C. thorace mutico subcylindrico, corpore subferrugineo, elytris litura una alterave fusca, antennis mediocribus.*  
*Habitat Surinami, mediae magnitudinis, elytris spina acutissima terminatis.*
- scalaris. 55. *C. thorace mutico subcylindrico, coleoptris linea futurali dentata, punctisque flavis, antennis mediocribus.* *Fz. succ.* 697.\* *Scop. ent. carn.* n. 175. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 231. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 147. n. 2.  
*Degeer inf.* 5. p. 77. n. 14. *Cerambyx flavoviridis.*  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 102. n. 77. *Leptara scalaris.*  
*Frisch inf.* 12. p. 29. t. 3. f. 3.  
*Schaeff. ic. t.* 38. f. 5.  
*Hufn. inf. t.* 7.  
*Habitat in Europae populo.*

- candidus. 195. *C. albus*, thorace coleoptrisque fuscis: vittis duabus albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 147. n. 3.*  
*Habitat - - - statura et magnitudine scalaris.*
- roridus. 196. *C. ater*, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 147. n. 4.*  
*Habitat in Africae plantis, oculati magnitudine.*
- modestus. 197. *C. niger*, capite, thorace anoque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 231. n. 3. mant. inf. 1. p. 147. n. 5.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura et magnitudine oculati.*
- cardui. 56. *C. fuscus*, thorace lineato, scutello flavo, antennis longis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 16. mant. inf. 1. p. 149. n. 23. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 94. n. 5. t. 26. f. 2. Syst. nat. XII. 2. p. 632. n. 56. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 101. n. 74.* *Cerambyx* thorace mutico cylindrico, corpore fusco linea longitudinali flavicante, antennis longioribus.  
*Habitat in Europae magis australis carduis, quos major devastat, statura populnei.*
- melano-ceras. 198. *C. cinereus*, thorace lineato, elytris fuscis unicoloribus, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 499. mant. inf. 1. p. 149. n. 24.*  
*Habitat Lipsiae, statura c. cardui, at paulo minor.*
- futuralis. 199. *C. virescens*, thorace rotundato lineato, elytris acuminatis: futura alba. *Fabr. mant. inf. 1. p. 149. n. 25.*  
*Habitat in Africae plantis, statura c. cardui.*
- moestus. 200. *C. thorace quadrispinoso, corpore fusco.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 17. mant. inf. 1. p. 149. n. 26.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- populneus. 57. *C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctatis quatuor flavis, antennis mediocribus.* *Fn. succ. 661.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 234. n. 18. mant. inf. 1. p. 149. n. 27.*  
*Gadd sat. 79.* *Cerambyx* fusco-cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis.  
*Degeer inf. 5. p. 78. n. 15.* *Cerambyx* decempunctatus.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 208. n. 3.* *Leptura nigra &c.*  
*Schaeff. ic. t. 48. f. 5.*  
 β) *Bergst. nomencl. 1. t. 2. f. 4?*  
*Habitat in Europae et Americae populetis, β) triplo minor.*

- tremulus. 201. *C. viridis*, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 234. n. 19. mant. inf. 1. p. 149. n. 28.*  
*Schaeff. ic. t. 101. f. 1.*  
*Habitat Halae Saxonum; an varietas punctati?*
- punctatus. 202. *C. thorace mutico subcylindrico totus viridis: punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. Syst. nat. XII. 2. add. p. 1067. n. 7. Fabr. sp. inf. 1. p. 234. n. 20. mant. inf. 1. p. 150. n. 29.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 10.*  
*Habitat in Europa magis australi, antennis pedibusque nigris.*
- virescens. 203. *C. thorace villoso cinereo, elytris subattenuatis viridibus. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 499. mant. inf. 1. p. 150. n. 30.*  
*Habitat in Italia et Galliae sambuco, statura punctati.*
- macroceras. 204. *C. fuscus, thorace cylindrico, pedibus testaceis, antennis longissimis nigris: annulo albo. Fabr. sp. inf. 1. p. 234. n. 21. mant. inf. 1. p. 150. n. 31.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, parvus.*
- Volvulus. 205. *C. supra niger, thorace cylindrico elytrisque margine cinereis. Fabr. mant. inf. 1. p. 150. n. 33.*  
*Habitat in Cayenna, statura cylindrici, at paulo minor.*
- linearis. 58. *C. niger, thorace mutico cylindrico, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus. Fn. suec. 663.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 232. n. 6. mant. inf. 1. p. 148. n. 9.*  
*Scop. ent. carn. n. 153. Leptura parallela.*  
*Schaeff. ic. t. 55. f. 6.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 26. f. 1.*  
*Habitat in Europae silvis.*
- cylindricus. 59. *C. cylindricus niger, pedibus anterioribus luteis. Fabr. sp. inf. 1. p. 232. n. 7. mant. inf. 1. p. 148. n. 10.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 633. n. 59. Fn. suec. 662. Cerambyx thorace cylindrico mutico, linea albidâ, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis.*  
*Degeer inf. 5. p. 75. n. 12. Cerambyx cinereus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 208. n. 2. Leptura tota caeruleo-nigra.*  
*Scopol. ent. carn. n. 157. Leptura cylindrica.*  
*Roef. inf. 2. scar. 2. t. 3.*  
*Habitat in pyri prunisque ramis.*

- melano- 206. *C. thorace cylindrico pedibusque rufis, corpore nigro.*  
cephalus. *Fabr. mant. inf. I. p. 148. n. 11.*  
*Habitat in Africa, statura et magnitudine cylindrici.*
- pilicor- 207. *C. violaceus, thorace rotundato, antennarum articulo*  
nis. *primo secundoque clavato pilosis. Fabr. mant. inf. I.*  
*p. 148. n. 12.*  
*Pall. inf. ross. 2. t. F. f. 14.*  
*Rozier Journ. de phys. I. t. I. f. B?*  
*Habitat in America meridionali, cylindrico paulo major.*
- erythro- 208. *C. rufus, thorace rotundato villosa, antennis, pectore*  
cephalus. *elytrisque nigris. Fabr. mant. inf. I. p. 148. n. 13.*  
*Schranck inf. austr. n. 270.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 26. f. 3.*  
*Habitat in Germania, cylindrici statura et magnitudine.*
- fibricus. 209. *C. cyaneus, thorace subspinoso, elytris fasciis duabus*  
*flavis. Fabr. sp. inf. I. p. 232. n. 8. mant. inf. I. p. 148.*  
*n. 14.*  
*Habitat in Sibiria, statura clavicornis, at paulo minor.*
- clavicor- 210. *C. viridis, thorace rotundato, elytris maculis tribus fla-*  
nis. *vis. Fabr. sp. inf. I. p. 232. n. 9. mant. inf. I. p. 148. n. 15.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- longipes. 211. *C. violaceus, thorace subglobofo, antennis longioribus,*  
*femoribus clavatis. Fabr. sp. inf. I. p. 233. n. 10. mant.*  
*inf. I. p. 148. n. 16.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- latipes. 212. *C. niger, thorace subglobofo, femoribus clavatis apice*  
*violaceis, tibiis posterioribus compressis, antennis lon-*  
*gioribus. Fabr. mant. inf. I. p. 148. n. 17.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis. Leske.*
- trilinea- 213. *C. griseus, vittis tribus dentatis albis, antennis longis.*  
tus. *Fabr. sp. inf. I. p. 233. n. 11. mant. inf. I. p. 149. n. 18.*  
*Mant. p. 532. Cerambyx thorace cylindrico, corpore fer-*  
*rugineo, elytris mucronatis, marginibus dentatis albis,*  
*antennis longissimis.*

*Fabr.*


---

*Antennae breves, quae corpore breviores, mediocres, quae longitudine corporis, longae, quae corpore longiores sunt.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 226. n. 7. Stenocorus trilineatus.*

*Drury inf. 1. t. 41. f. 1.*

*Habitat in insulis, Americae oppositis.*

- lateralis. 214. *C. niger*, thoracis lateribus clytrorumque vitta laterali ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 12. mant. inf. 1. p. 149. n. 19.*  
*Habitat in America boreali.*
- lynceus. 215. *C. thoracae atro*: puncto utrinque ferrugineo, elytris griseis acuminatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 13. mant. inf. 1. p. 149. n. 20.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- griseus. 216. *C. griseus*, scutello margine, elytris lineolis flavescens. *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 14. mant. inf. 1. p. 149. n. 21.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- analis. 217. *C. testaceus*, clytrorum apicibus anoque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 233. n. 15. mant. inf. 1. p. 149. n. 22.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*
- oculatus. 60. *C. thorace mutico cylindrico luteo*: punctis duobus nigris, elytris fastigiatis linearibus nigris. *Fn. succ. 664. Fabr. sp. inf. 1. p. 231. n. 4. mant. inf. 1. p. 147. n. 6.*  
*Uddm. diff. 31. Cerambyx ferrugineo-rutus, elytris nigro-cinereis punctis excavatis nigris.*  
*Degeer inf. 5. p. 74. n. 11. t. 3. f. 20.*  
*Scop. ent. carn. n. 152. Leptura oculata.*  
*Schaeff. ic. t. 128. f. 4.*  
*Huffn. inf. t. 13.*  
*Habitat in Europae silvis.*
- hirtus. 218. *C. ferrugineus griseo-villosus*, scutello orbitaque oculorum fulvis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 232. n. 5. mant. inf. 1. p. 147. n. 7.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- unicolor. 219. *C. testaceus*, thorace rotundato punctato, antennis longis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 147. n. 8.*  
*Habitat in insula Amsterdam oceani australis, hirta minor.*
- cantharinus. 82. *C. ferrugineus*, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 235. n. 22. mant. inf. 1. p. 150. n. 33.*

*Syst. nat.* XII. 2. p. 637. n. 82. *Cerambyx* thorace submutico, corpore rufo, oculis femoribusque nigricantibus, elytris mollibus, antennis longioribus.

*Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 500. *Callidium* thorace rotundato subspinoso rufum, antennis pedibusque nigricantibus.

*Habitat in Germania, mediae magnitudinis.*

teutonicus. 220. *C. niger*, thorace cylindrico, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 23. *mant. inf.* I. p. 150. n. 34. *Habitat in Germania, statura cantharini.*

janthinus. 221. *C. thorace cylindrico*, corpore violaceo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 24. *mant. inf.* I. p. 150. n. 35. *Habitat in terra Pedamontana.*

monspeliensis. 222. *C. niger*, thorace cylindrico subspinoso, antennisque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 150. n. 36. *Habitat Monspelii, praeusto major.*

praeustus. 223. *C. niger*, elytris flavis apice nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 25. *mant. inf.* I. p. 150. n. 37. *Syst. nat.* XII. 2. p. 641. n. 24. *Fn. suec.* 506. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 103. n. 80. *Leptura* (praeusta) thorace subgloboso fusco, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis. *Geoffr. inf. par.* I. p. 209. n. 4. *Schaeff. ic. t.* 52. f. 8. *Habitat in Europae silvis.*

lineola. 224. *C. niger*, thoracis linea dorsali femoribusque apice rufis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 26. *mant. inf.* I. p. 150. n. 38. *Herbst apud Fucssli arch. inf.* 5. t. 26. f. 4. *Habitat in Italia, parvus.*

minutus. 225. *C. fuscus*, thorace cylindrico, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 235. n. 27. *mant. inf.* I. p. 150. n. 39. *Habitat in Anglia, parvus.*

caerulefcens. 226. *C. thorace mutico cylindrico*, albo-caeruleus, thoracis lineis tribus scutelloque pallidioribus. *Schranck inf. austr.* p. 144. n. 271. *Scop. ent. carn.* n. 160. *Leptura caerulefcens.* *Herbst apud Fucssli arch. inf.* 5. t. 26. f. 5. *Habitat in Germania, Calabria, 5 fere lineas longus.*

227. *C.*

- ferreus. 227. *C. plumbeo-niger immaculatus*, thorace cylindrico inermi, scutello albido. *Schranck inf. austr. p. 145. n. 272. Beytr. zur Naturg. p. 66. S. 11.*  
*Habitat in Austria, 4½ lineas longus.*
- pustulatus. 228. *C. niger*, thorace inermi cylindrico: macula media fulva. *Schranck inf. austr. p. 145. n. 273. Beytr. zur Naturg. p. 66. S. 10.*  
*Habitat in Austriae floribus.*
- filphoides. 229. *C. niger*, thorace mutico cylindrico, elytris lineis subtribus elevatis, femoribus tibiisque anterioribus medio fulvis. *Schranck inf. austr. p. 145. n. 274.*  
*Habitat Viennae, ad Maji finem conspicuus.*
- lividus. 230. *C. niger*, thorace dilute ferrugineo: punctis nigris elevatis, elytris flavescens. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 5. p. 95. t. 26. f. 7.*  
*Habitat Berolini, cautharino affinis.*
- cyaneus. 231. *C. caeruleus*: punctis elevatis, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Herbst apud Fueslli arch. inf. 5. p. 95. n. 13. t. 26. f. 6.*  
*Habitat in Pomerania, 3 circiter lineas longus.*
- cincticornis. 232. *C. thorace cylindrico*: lineis sex longitudinalibus albis, elytris dentatis fuscis albo irroratis, antennis longis medio albo-annulatis. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 290. t. 1. f. 3.*  
*Habitat - - - statura populnei, longicorni affinis.*
- M nigrum. 233. *C. thorace mutico cylindrico*, elytris griseo-nebulosis: macula albida M nigro notata. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 291.*  
*Schaeff. ic. t. 55. f. 4?*  
*Habitat, rarior, Halae Saxonum.*
- ictericus. 234. *C. thorace mutico cylindrico*: linea lutea, elytris fuscis, scutello pedibusque luteis. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 292.*  
*Habitat, rarior, Halae Saxonum, in floribus, cylindrico affinis.*
- vulneratus. 235. *C. thorace mutico cylindrico*: tuberculo carinato luteo, elytris nigricantibus, pedibus luteis. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. I. p. 293.*  
*Habitat in lapidicinis Giebichensteinensibus, pustulato affinis.*

tripunctatus. 378. *C. thorace flavo: punctis tribus nigris, elytris nigris medio longitudinaliter albidis. Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 17.*  
*Habitat in Noveboraco, cylindrici facie, at minor.*

II *palpis capitatis*, *Rhagia.*

cursor. 45. *C. thorace spinoso, elytris obtusis rufis: sutura lineaque nigris, antennis mediocribus. Fn. suec. 658.\* Scop. ent. carn. 167. Fabr. sp. inf. 1. p. 229. n. 2. mant. inf. 1. p. 146. n. 4.*

*Fn. suec. 1. n. 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tribus nigris longitudinalibus.*

*Degeer inf. 5. p. 127. n. 3. Leptura cursor.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 7.*

*Habitat in Europa boreali.*

cinctus. 236. *C. niger, thorace spinoso, elytris subferrugineis: fascia flava, femoribus posterioribus unidentatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 146. n. 5.*

*Habitat in Austria, magnitudine et statura cursoris.*

noctis. 48. *C. niger, thorace spinoso, antennarum basi ferruginea. Fabr. sp. inf. 1. p. 230. n. 3. mant. inf. 1. p. 146. n. 6.*

*Habitat in Europa boreali, cursori proxime affinis, an ejus varietas?*

anglicus. 237. *C. thorace spinoso, elytris fasciis duabus obliquis flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 230. n. 4. mant. inf. 1. p. 146. n. 7.*

*Fn. suec. 1. n. 486. Cerambyx cinereus, coleoptris fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.*

*Degeer inf. 5. p. 124. n. 1. t. 4. f. 6. Leptura mordax.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 222. n. 1. Stenocorus glaber &c.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 8.*

*Schaeff. elem. t. 118. f. 1.*

*ic. t. 8. f. 1. 3.*

*Habitat in Anglia, Gallia.*

ornatus. 238. *C. niger, thorace spinoso, elytris fascia lata flava. Fabr. sp. inf. 1. p. 230. n. 5. mant. inf. 1. p. 146. n. 8.*

*Habitat in Pensilvania.*

exilis. 239. *C. thorace spinoso, elytris elevato striatis cinereis nigro-undatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 146. n. 9.*



- indagator. 240. *C. cinereus*, thorace spinoso, elytris striatis: atomis fasciisque duabus nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 145. n. 3.*  
*Habitat in Germania.*
- inquisitor. 49. *C. niger*, thorace spinoso, elytris nebulosis testaceo subfasciatis, antennis brevioribus. *Fn. succ. 659.\* Fabr. sp. inf. I. p. 229. n. I. mant. inf. I. p. 145. n. 2.*  
*Fn. succ. I. n. 485.\** *Cerambyx cinereus nigro-nebulosus*, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.  
*Degeer inf. 5. p. 126. n. 2. t. 4. f. I. Leptura inquisitor. Geoffr. inf. par. I. p. 223. n. 2. Stenocorus niger &c. Frisch inf. 13. t. 14.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 10.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 7.*  
*Habitat in Europae truncis arborum, larva hexapus nuda alba, capite collarique cornicis fuscis, dorso canaliculato.*
- mordax. 241. *C. griseus*, thorace spinoso, elytris nebulosis, testaceo subfasciatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 145. n. I.*  
*Schaeff. ic. t. 8. f. 2.*  
*Habitat in Germania, inquisitori affinis, at paulo major.*
- elegans. 242. *C. ater*, thorace utrinque unispinose, elytris castaneis: basi, futura maculaque communi nigris; fasciis duabus flavis. *Schrank inf. austr. p. 133. n. 253.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 170. n. 6. t. 45. f. 12. Rhagium elegans.*  
*Habitat in Bavaria, et Calabria.*
- fyco-phanta. 243. *C. nigro ferrugineoque varius*, thorace spinoso, elytris fasciis tribus obscurioribus lineisque duabus elevatis, antennis brevibus. *Schrank inf. Austr. p. 137. n. 260.*  
*Habitat Vindobonae.*
- niger. 365. *C. thorace ovato: margine posteriori scutelloque flavo, elytris falgigiatis, antennis brevibus. Petagn. inf. Calab. p. 17. n. 83. f. XXXVI.*  
*Habitat in Calabria, totus niger, an hujus tribus?*
- III *palpis clavatis*, *Callidia.*
- ruficus. 67. *C. thorace nudo, corpore lurido, antennis subulatis brevioribus. Fn. succ. 666.\* Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 10. mant. inf. I. p. 152. n. 15.*  
*Fn. succ. 492. Cerambyx fuscus, punctis thoracinis impressis.*  
*Degeer*

*Degeer inf. 5. p. 83. n. 20. Cerambyx griseo-fuscus &c.*

*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 20.*

*Schaeff. elem. t. 13. f. 1. et t. 76. f. 1.*

*icon. t. 63. f. 6.*

*Habitat in Europae silvis.*

- agrestis.** 244. *C. niger*, thorace nudo, elytris striatis fuscis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 152. n. 16.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura rustici, at duplo minor.*
- dichro-**  
**us.** 370. *C. niger*, thorace rotundato, elytris striatis tibiis plantisque brunneis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 570.*  
*Habitat in Europa.*
- laeviga-**  
**tus.** 371. *C. niger opacus*, thorace elytrisque laevibus, antennis mediocribus, femoribus rubris compressis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 573.*  
*Habitat in Europa.*
- viridans.** 372. *C. thorace rotundato viridi: fovea utrinque impressa, elytris testaceo viridibus rugoso-reticulatis, antennis pedibusque fusco-testaceis.* *Mus. Lesk. p. 26. n. 574.*  
*Habitat in Europa.*
- cyano-**  
**chryfos.** 373. *C. violaceus pubescens*, antennis apice fuscis, femorum picorum basi tibiisque luteis. *Mus. Lesk. p. 26. n. 578.*  
*Habitat in Europa.*
- oetonota-**  
**tus.** 374. *C. capite nigro fulvo piloso furca glabra antrorsum notato, thorace rotundato maculis punctisque quatuor fulvis pilosis, elytris fuscis bifasciatis quadripunctatis, abdomine pedibusque fusco-ferrugineis.* *Mus. Lesk. p. 26. n. 580.*  
*Habitat in Europa.*
- leucozo-**  
**onias.** 375. *C. niger*, abdominis segmentorum trium priorum margine externo et pectore canis, elytris fasciis duabus linearibus deorsum arcuatis albis et apice cinereo. *Mus. Lesk. p. 27. n. 588.*  
*Habitat in Europa.*
- luridus.** 68. *C. thorace subtuberculato nudo, niger, elytris testaceis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 239. n. 18. mant. inf. 1. p. 154. n. 29. Syst. nar. XII. 2. p. 634. n. 68. Cerambyx thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris luridis.*  
*Habitat in Europae borealis pinetis, bajula simillimus, at tripto minor.*

- fuscus. 245. *C. niger*, thorace subtuberculato canaliculato nudo, elytris striatis obscure testaceis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf. I. p. 154. n. 30.*  
*Habitat Halae Saxonum, statura et magnitudine luridi.*
- lugubris. 246. *C. thorace* subtuberculato nudo, elytris substriatis, corpore lurido immaculato. *Fabr. mant. inf. I. p. 154. n. 31.*  
*Habitat Halae Saxonum, rufico proxime affinis, at triplo minor.*
- raucus. 247. *C. thorace* laevi obscure ferrugineo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 239. n. 19. mant. inf. I. p. 154. n. 32.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura luridi.*
- hafnien- 248. *C. thorace* subvillosa nigro: lineis quatuor albis, inter-  
sis. mediis abbreviatis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 239. n. 20. mant. inf. I. p. 154. n. 33.*  
*Habitat Hafniae.*
- aulicus. 249. *C. thorace* laevi nitido, corpore nigro opaco, elytris laevibus, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 239. n. 21. mant. inf. I. p. 154. n. 34.*  
*Habitat Hafniae.*
- erythro- 250. *C. thorace* laevi nitido, elytris violaceis, tibiis rufis, an-  
pus. tennis brevibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 240. n. 22. mant. inf. I. p. 154. n. 35.*  
*Habitat in Germania boreali.*
- femora- 69. *C. thorace* nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris,  
tus. antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 237. n. 6. mant. inf. I. p. 153. n. 9.*  
*Degeer inf. 5. p. 93. n. 31.*  
*Schaeff. ic. t. 55. f. 7.*  
*Habitat in Germania, statura violacei, at dimidio minor, angustior.*
- occidenta- 251. *C. ater*, thorace pubescente, elytris fasciis duabus rufis.  
lis. *Fabr. mant. inf. I. p. 152. n. 10.*  
*Habitat in America occidentali, magnitudine et statura violacei; loco fasciae posterioris macula interdum marginalis.*
- acumina- 252. *C. thorace* verrucoso nigricante, elytris acuminatis viri-  
tus. dibus: sutura cyanea. *Fabr. sp. inf. I. p. 237. n. 7. mant. inf. I. p. 152. n. 11.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

- ruficus. 253. *C. niger*, thorace verrucoso, elytris testaceis: macula media apiceque nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 237. n. 8. mant. inf. I. p. 152. n. 12.*  
*Habitat in Russiae silvis.*
- violaceus. 70. *C. thorace subpubescente*, corpore violaceo, antennis brevibus. *Fn. suec. 667. Fabr. sp. inf. I. p. 237. n. 5. mant. inf. I. p. 152. n. 8.*  
*Degeer inf. 5. p. 88. n. 24. Cerambyx violaceus.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 97. n. 59. Stenocorus violaceus.*  
*Gadd diff. 28. Cantharis nigra*, thorace rotundato, elytris caerulefcentibus.  
*Frisch inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 1.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 26. f. 10.*  
*Habitat in Europa boreali, frequens.*
- auratus. 71. *C. thorace dente laterali depresso*, viridi-inauratus, antennis nigris, femoribus posterioribus caeruleis.  
*Habitat in America, violaceo similis, pedibus purpureis, an hujus tribus?*
- Stigma. 72. *C. thorace punctato*, corpore atro, elytris laevibus: fligmate albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 11, mant. inf. I. p. 152. n. 17.*  
*Degeer inf. 5. p. 119. n. 22. t. 14. f. 13. Cerambyx niger &c.*  
*Habitat in America, totus niger.*
- equestris. 254. *C. ater nitidus*, thorace nudo, coleoptris fascia interrupta nuda. *Fabr. mant. inf. I. p. 153. n. 18.*  
*Habitat in Cayenna, statura stigmatis, at minor.*
- hirtus. 255. *C. thorace hirtus*, elytris acuminatis pallide testaceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 153. n. 19.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus.*
- tranquebaricus. 256. *C. thorace subtus utrinque macula tomentosa ferruginea*, antennis longioribus barbatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 12. mant. inf. I. p. 153. n. 20.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- compressus. 257. *C. obscure niger*, thorace laevi, antennis longis pedibusque testaceis: femoribus compressis. *Fabr. mant. inf. I. p. 153. n. 21.*  
*Habitat in Siam, barbato minor.*

258. *C.*

- variegatus. 258. *C. thoracis* dorso glabro atro: lineis quatuor albis, elytris flavo irroratis. *Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 13. mant. inf. I. p. 153. n. 22.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- australis. 259. *C. thoracis* lineis duabus, elytris quatuor albis; mediis coeuntibus abbreviatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 14. mant. inf. I. p. 153. n. 23.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- fulcatus. 260. *C. thorace* tomentoso cinereo, elytris albo nigroque striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 238. n. 15. mant. inf. I. p. 153. n. 24.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- striatus. 73. *C. thorace* glabro, corpore nigro, elytris striatis, antennis brevibus. *Fz. suec. 668. Fabr. sp. inf. I. p. 240. n. 23. mant. inf. I. p. 154. n. 36.*  
*Degeer inf. 5. p. 90. n. 26. Cerambyx niger nitidus &c. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 26. f. 13.*  
*Habitat in Europae silvis.*
- lynceus. 261. *C. thorace* subspinoso villosa niger, elytris macula subdidyma fulva. *Fabr. sp. inf. I. p. 240. n. 24. mant. inf. I. p. 154. n. 37.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- salicis. 262. *C. rufus*, thorace tuberculato spinosoque, pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 154. n. 38.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 92. n. 3. t. 25. f. 13. Stenocorus ruficollis.*  
*Habitat in Lipsiae salicibus: an hujus tribus?*
- pufillus. 263. *C. niger*, antennis tibiisque testaceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 155. n. 39.*  
*Habitat in Germania, parvus.*
- bimaculatus. 264. *C. fuscus*, thorace villosa, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 240. n. 25. mant. inf. I. p. 155. n. 40.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*
- flavus. 265. *C. corpore* flavo, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 240. n. 26. mant. inf. I. p. 155. n. 41.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*

variabilis. 74. *C. thorace glabro, corpore fusco-aeneo, antennis pedibusque fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 237. n. 9. mant. inf. 1. p. 152. n. 13.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 635. n. 74. Fn. suec. 669. Cerambyx thorace mutico subrotundo inaequali glabro, pectore anoque ferrugineis, antennis ferrugineis.*

*Poda mus. p. 36. Cerambyx scaber.*

*Frisch inf. 12. p. 345. t. 6. f. 3. 4.*

*Schaeff. ic. t. 4. f. 12.*

*Habitat in Europae borealis pinetis.*

fericeus. 266. *C. thorace holosericeo cinereo, elytris testaceis: punctis elevatis rubris. Fabr. mant. inf. 1. p. 152. n. 14.*

*Habitat in Barbaria, rustico major.*

testaceus. 75. *C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus fuscis. Fabr. sp. inf. 1. p. 239. n. 17. mant. inf. 1. p. 153. n. 26.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 635. n. 75. Fn. suec. 670. Cerambyx thorace subrotundo mutico glabro, corpore testaceo antennis mediocribus.*

*Degeer inf. 5. p. 93. n. 30. Cerambyx testaceus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 218. n. 18. Leptura testacea, thorace glabro.*

*Schaeff. ic. t. 64. f. 6.*

*Habitat in Europae silvis.*

deustus. 267. *C. testaceus, thorace subtuberculato, elytris apice violaceis. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 500. mant. inf. 1. p. 153. n. 27.*

*Habitat in Italia, testaceo proxime affinis, an varietas?*

ligneus. 268. *C. niger, thorace tuberculato villosa, elytris rubris: macula apiceque violaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 153. n. 28.*

*Habitat - - - mediae magnitudinis.*

Portitor. 269. *C. niger, thorace transversum oblongo: maculis duabus nitentibus, elytris ex nigro rubescentibus, antennis longis. Schranck Schr. der berl. Ges. nat. Fr. 2. p. 312.*

*Frisch inf. 13. t. 2. f. 17.*

*Habitat in Bavariae pinetis, bajulo affinis, punctis excavatis inaequalis, mordax.*

270. *C.*

---

*An hujus tribus Cerambyx flavo-fasciatus Schaefferi ic. t. 34. f. 12?*

obscurus. 270. *C. thorace subvillosa fusca elytris testaceo cinereoque variis, antennis mediocribus.* *Fabr. mant. inf. I. p. 151. n. 1.*

*Habitat in terra van Diemen, bajula major.*

Bajulus. 76. *C. thorace villosa, tuberculis duobus, corpore fusco.*

*Fabr. sp. inf. I. p. 236. n. 1. mant. inf. I. p. 151. n. 2.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 636. n. 76. Fn. succ. 672. Mus. Lud.*

*Ulr. 76. Cerambyx thorace mutico subrotundo villosa, tuberculis duobus, antennis brevibus.*

*Degeer inf. 5. p. 86. n. 82. Cerambyx caudatus.*

*Scop. ent. carn. n. 156. Leptura Bajula.*

*Fn. succ. I. n. 489. Cerambyx nigricans, thorace villosa cinereo, punctis duobus glabris.*

*Frisch inf. 13. t. 10.*

*Sulz. hist. inf. t. 4. f. 29.*

*Schaeff. el. t. 76. f. 4.*

*icon. t. 64. f. 4. 5.*

β) *Fn. succ. I. n. 490. Cerambyx testaceus, thorace villosa cinereo, lineolis duabus glabris.*

γ) *Cerambyx saxonicus duplo minor.* *Fabr. mant. inf. I. p. 151.*

*Habitat in Europae borealis arborum truncis, ligna, parietes, asseres e pino desumta perforans.* *Larva \* dorso medio pilis natis spicatis impressis.*

fennicus. 77. *C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus.* *Fabr. sp. inf. I. p. 236. n. 2. mant. inf. I. p. 151. n. 3.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 636. n. 77. Fn. succ. 674. Cerambyx thorace mutico subrotundo: tuberculis subferrugineo-obsolete, elytris violaceis, antennis longiusculis.*

*Uddm. diff. 33. Cerambyx elytris nigro-caeruleis, apice abdominis ferrugineo.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 219. n. 19. Leptura atra.*

*Schaeff. ic. t. 4. f. 12.*

*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 26. f. 8.*

*Habitat in Europae pinetis.*

italicus. 271. *C. thorace subcylindrico hirsuto rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus piccis, pedibus nigris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 236. n. 3. mant. inf. I. p. 151. n. 4.*

*Habitat in Italia, fennico minor.*

liciatys. 78. *C. niger cinereo-nebulosus, antennis brevibus.*

*Habitat in Europa, bajuli magnitudine.*

*Elytra strigis duabus undulatis cinerascensibus obsolete.*

D d d d d

79. C.

- undatus. 79. *C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis duabus undatis albis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf. I. p. 240. n. 27. mant. inf. I. p. 155. n. 42. Syst. nat. XII. 2. p. 636. n. 79. Fn. suec. 675.\* Cerambyx thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus. Degeer inf. 5. p. 91. n. 28. Cerambyx nigro-fuscus. Schaeff. ic. t. 68. f. 1. Habitat in Europa boreali.*
- colonus. 272. *C. elytris lividis: fasciis tribus fuscis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf. I. p. 241. n. 28. mant. inf. I. p. 155. n. 43. Habitat in Carolina.*
- versicolor. 273. *C. thorace rufo, elytris nigris basi rufis: fasciis duabus albis. Fabr. sp. inf. I. p. 241. n. 29. mant. inf. I. p. 155. n. 44. Habitat in America boreali.*
- flexuosus. 274. *C. thorace flavo-fasciato, elytris fasciis septem flavis: anterioribus antrorsum, posterioribus retrorsum arcuatis. Fabr. sp. inf. I. p. 241. n. 30. mant. inf. I. p. 155. n. 45. Drury inf. I. t. 41. f. 2. Cerambyx pictus. Forst. nov. inf. cent. I. p. 43. n. 43. Leptura Robiniae. Per. gaz. t. 27. f. 3?*  
 β) *Callidium (angulatum) thorace globoso nigro flavo fasciato, elytris nigris: fasciis sex flavis, secunda tertiaque angulatis. Fabr. sp. inf. I. p. 241. n. 32. Habitat in Americae robinia.*
- exiguus. 275. *C. testaceus, elytris fascia abbreviata alba. Fabr. sp. inf. I. p. 241. n. 31. mant. inf. I. p. 155. n. 46. Habitat in nova Seelandia, femoribus valde clavatis basi albis.*
- lunatus. 276. *C. thorace globoso nigro flavo-fasciato, elytris atris: fasciis quinque flavis: baseos maculari. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 500. mant. inf. I. p. 155. n. 47. Habitat in insulis Americae oppositis, major.*
- floralis. 277. *C. thorace globoso albo-fasciato, elytris nigris: fasciis quinque albis; secunda tertiaque lunatis. Fabr. sp. inf. I. p. 241. n. 33. mant. inf. I. p. 155. n. 48. Pall. it. 2. p. 724. n. 63. Habitat in Italia, statura exigui.*



- fulminans. 278. *C. thorace globoso maculato, elytris nigris: fasciis undato-angulatis albis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 34. mant. inf. 1. p. 155. n. 49.*  
*Habitat - - -*
- arcuatus. 279. *C. elytris fasciis quatuor flavis: prima interrupta; reliquis retrorsum arcuatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 241. n. 35. mant. inf. 1. p. 155. n. 50.*  
*Uddm. diss. 20. Leche nov. sp. 30. Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis arcuatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 21. Fn. suec. 696. Leptura (arcuata) thorace globoso nigro, elytris fasciis linearibus flavis, tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferrugineis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 212. n. 10.*  
*Frisch inf. 12. t. 3. ic. 4. f. 1.*  
*Raj. inf. p. 83. n. 23.*  
*Pet. gazoph. t. 63. f. 7.*  
*Schaeff. ic. t. 38. f. 6. et t. 107. f. 2. 3.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 26. f. 14.*  
*Habitat in Europae hortis.*
- arietis. 280. *C. thorace nigro, elytris nigris: fasciis flavis, secunda antrorum arcuata, pedibus ferrugineis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 242. n. 36. mant. inf. 1. p. 155. n. 51.*  
*Degeer inf. 5. p. 81. n. 18. Cerambyx quadrifasciatus.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 23. Fn. suec. 695. Leptura arietis.*  
*Fn. suec. 1. n. 507. Leptura nigra, elytrorum lineis transversis flavis, pedibus testaceis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 214. n. 11. Leptura nigra &c.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 96. n. 57. Stenocorus arietis.*  
*Raj. inf. p. 82. n. 22.*  
*List. scar. p. 385. n. 14.*  
*Pet. gazoph. t. 63. f. 6.*  
*Frisch inf. 12. p. 32. t. 3. f. 5.*  
*Schaeff. ic. t. 38. f. 7.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 26. f. 15.*  
 β) *Bergstr. nomencl. 1. 9. 12. t. 1. f. 12.*  
*Habitat in Europae hortis.*
- plebejus. 281. *C. thorace globoso immaculato, elytris nigris: fasciis linearibus albis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 243. n. 37. mant. inf. 1. p. 156. n. 52.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 639. n. 17. Fn. suec. 692. Leptura (rustica) thorace globoso tomentoso, elytris cinereis: fasciis linearibus albidis undatis.*  
 D d d d d 2 Geoffr.

- Geoffr. inf. par. 1. p. 215. n. 12. Leptura nigra &c.*  
*Raj. inf. p. 83. n. 25.*  
*Petiv. gazoph. t. 63. f. 5.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 7.*  
*Habitat in Europae hortis.*
- maculo- 282. *C. thorace maculato, elytris mucronatis nigris: strigis*  
 fus. *tribus arcuatis flavis, basi ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 243. n. 38. mant. inf. 1. p. 156. n. 53.*  
*Habitat in America.*
- america- 283. *C. thorace subspinoso, elytris bidentatis fuscis: strigis*  
 nus. *quatuor flavis, femoribus clavatis compressis. Fabr. mant.*  
*inf. 1. p. 156. n. 54.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 243. n. 39. Callidium acuminatum.*  
*Habitat in America boreali.*
- detritus. 284. *C. thorace flavo-fasciato, elytris nigris: fasciis quinque*  
*flavis, pedibus ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 243. n. 40.*  
*mant. inf. 1. p. 156. n. 55.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 20. Fn. suec 694. Leptura*  
*(detrita) thorace globoso nigricante, elytris fuscis: fasciis*  
*quatuor transversis flavis, pedibus rufis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 216. Leptura nigra &c.*  
*Schaeff. elem. t. 76. f. 2.*  
*icon. t. 38. f. 9. et t. 64. f. 3.*  
*Habitat in Europae hortis.*
- indus. 285. *C. niger, elytris glaucis basi nigro-maculatis. Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 243. n. 41. mant. inf. 1. p. 156. n. 56.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis, pube glaucescente*  
*nitidus.*
- portugal- 286. *C. thorace globoso ferrugineo, elytris nigris: fasciis tri-*  
 lus. *bus atris; primo annulari. Fabr. sp. inf. 1. p. 244. n. 42.*  
*mant. inf. 1. p. 156. n. 57.*  
*Habitat in Lusitania, statura c. verbasci.*
- verbasci. 287. *C. thorace nigro-maculato, elytris subvirescentibus*  
*fasciis tribus nigris; prima lunari. Fabr. sp. inf. 1. p. 244*  
*n. 43. mant. inf. 1. p. 156. n. 58.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 640. n. 22. Leptura (verbasci), thorace*  
*subovato nigro, elytris fasciis tribus nigris, prima semi-*  
*annulata.*

Sulz.

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 12.*

*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 26. f. 19.*

*Habitat in Europae magis australis verbasco.*

- annularis. 288. *C. thorace nigro-maculato, elytris bidentatis subvirescentibus: fasciis tribus nigris, prima annulari. Fabr. mant. inf. 1. p. 156. n. 59.*  
*Habitat in Siam, c. verbasci proxime affinis.*
- aegyptiacus. 289. *C. thorace ferrugineo, elytris cinerascensibus: fasciis tribus fuscis; prima annulari. Fabr. sp. inf. 1. p. 244. n. 44. mant. inf. 1. p. 156. n. 60.*  
*Habitat in Oriente.*
- mysticus. 290. *C. elytris fuscis: fasciis apiceque cinereis basi rufis. Fabr. sp. inf. 1. p. 244. n. 45. mant. inf. 1. p. 156. n. 61.*  
*Degeer inf. 5. p. 82. n. 19. Cerambyx albo-fasciatus.*  
*Scop. ent. carn. 177. Cerambyx quadricolor.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 639. n. 18. Fn. suec. 693.\* Leptura (mystica) thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis antice rufis: fasciis linearibus arcuatis lataque canis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 215. n. 17. Leptura nigra &c.*  
*Raj. inf. p. 83. n. 26.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in Europa.*
- gibbosus. 291. *C. niger, elytris cinereo-fasciatis basi bituberculatis apice acuminatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 156. n. 62.*  
*Habitat Kilonii, statura et magnitudine mystici.*
- picipes. 292. *C. ater, thorace globoso, elytris frigida obliqua alba. Fabr. mant. inf. 1. p. 157. n. 63.*  
*Habitat - - - c. alni paulo major.*
- alni. 293. *C. niger, elytris fasciis duabus albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 245. mant. inf. 1. p. 157. n. 64.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 639. n. 19. Leptura alni.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 26. f. 21.*  
*Habitat in Europa, mystico affinis, sed octies minor.*
- sanguineus. 80. *C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. Fabr. sp. inf. 1. p. 238. n. 16. mant. inf. 1. p. 153. n. 25.*  
*Raj. inf. p. 97. n. 3. Cerambyx minor.*

D d d d d 3

Degeer

*Degeer inf. 5. p. 92. n. 29.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 220. n. 22.*

*Schaeff. ic. t. 64. f. 1.*

*Habitat in Europae silvis, Upsaliae in parietibus.*

castaneus. 81. *C. niger*, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. *Fn. succ. 676.*

*Habitat in Europae cortice abiegno.*

*Thoracis latera inferiora linea rubra longitudinali.*

ebulinus. 83. *C. niger*, thorace tuberculato, elytris violaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 151. n. 5.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 637. n. 83.* *Cerambyx* thorace mutico, corpore nigro, elytris viridi-caeruleis, antennis medio-cribus.

*Habitat in Africae plantis, statura italici.*

aeneus. 294. *C. fuscus*, thorace elytrisque viridi-aeneis, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 151. n. 6.*

*Habitat in Africa, statura italici.*

clavipes. 295. *C. niger opacus*, femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 236. n. 4. mant. inf. 1. p. 152. n. 7.*

*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 26. f. 9.*

*Habitat in Germania.*

pannonicus. 296. *C. niger*, thorace margine subaeneo, medio elevato, elytris viridi-caeruleis, femoribus clavatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 96. n. 6. t. 26. f. 11.*

*Habitat in Ungaria, 8 lineas longus.*

aeneus. 297. *C. viridi-aeneus*, subtus, antennis pedibusque fuscus. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 96. n. 7. t. 26. f. 12.*

*Habitat Berolini.*

venustus. 298. *C.* thorace flavo: fascia nigra, elytris nigris: fasciis tribus latis ex viridi flavis, antennis pedibusque nigris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 98. n. 16. t. 26. f. 16.*

*Habitat in India.*

indicus. 299. *C. niger* subtus flavus, frontis maculis, thoracis fasciis duabus, elytrorum quinque flavis, antennis pedibusque rubris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 98. n. 17. t. 26. f. 17.*

*Habitat in India.*

- confusus. 300. *C. niger pubescens*, thoracis punctis obsoletis sex, elytrorum fasciis undatis albidis quatuor, antennis fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 98. n. 18. t. 26. f. 18.*  
*Habitat* Berolini in talicibus.
- litteratus. 301. *C. clytris nigris*: fasciis apiceque cinereis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 99. n. 22. t. 26. f. 20.*  
*Schranck inf. austr. n. 306?* *Leptura figurata.*  
*Habitat* in Germania.
- hispidus. 302. *C. thorace globoso ferrugineo*, corpore testaceo, capite nigro, femoribus clavatis ustulatis, antennis hispidis mediocribus. *Forster nov. inf. 1. p. 42. n. 42.*  
*Habitat* in America septentrionali, mystici magnitudine.
- viridis. 303. *C. thorace tuberculato violaceo*, elytris viridibus punctato-striatis, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 95. n. 1067. Fn. Fridrichsd. p. 14. n. 134.*  
*Habitat* in Dania.
- multicolor. 304. *C. thorace nigro ovato villo ex griseo flavo pubescente*, elytris ex griseo flavoque variis.  
*Drury inf. 1. t. 41. f. 6.*  
*Habitat* in Noveboraco.
- pulverulentus. 306. *C. thorace convexo nigro-fusco*, elytris castaneis griseo-villosis apice bidentatis. *Degeer inf. 5. p. 118. n. 21. t. 14. f. 12.*  
*Habitat* in Pennsylvania, pollicem fere longus.
- nigricans. 307. *C. niger depressus*, femoribus clavatis, antennis mediocribus crassis. *Degeer inf. 5. p. 88. n. 23.*  
*Hufn. inf. t. 16.*  
*Habitat* in conclavibus Sueciae, 7 lineas longus.
- aurichalceus. 308. *C. fusco-aeneus nitidus*, thorace depresso, antennis pedibusque nigris. *Degeer inf. 5. p. 89. n. 25.*  
*Habitat* - - - dimidium pollicem longus.
- lucidus. 309. *C. niger*, elytris fusco-castaneis lucidis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98.*  
*Habitat* in Carnioliā.
- rufus. 310. *C. niger thorace villoso*, antennis rufis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 61.*  
*Habitat* in Carnioliā.

- carniolicus. 311. *C. thorace subbituberculato, abdominisque apice rufis, elytris atro-violaceis. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 62. Stenocorus fenicus. Habitat in Carniolia.*
- fuliginosus. 312. *C. totus ater opacus, antennis mediocribus. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 62. Habitat in Carniolia.*
- calcaratus. 313. *C. nigro-violaceus, femoribus rufis posterioribus dentatis. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 98. n. 64. Habitat in Carniolia.*
- caraboides. 314. *C. rufus, elytris atro-violaceis. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 99. n. 65. Habitat in Ungariae et Carnioliae collibus, statura carabi minoris.*
- ater. 315. *C. niger, elytris truncatis, antennis mediocribus. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 100. n. 69. Habitat in Carniolia.*
- braccatus. 316. *C. niger, antennis pedibusque rufis; femoribus posterioribus crassis spina armatis. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 100. n. 70. Habitat in Carniolia.*
- tenuis. 317. *C. niger nitens, elytris attenuatis, antennis mediocribus. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 100. n. 71. Habitat in Carnioliae floribus umbellatarum.*
- octopunctatus. 318. *C. viridis, thorace tereti, elytris punctis octo nigris. Schranck inf. austr. p. 142. n. 267. Beytr. z. Naturg. p. 65. §. 9. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 101. n. 73. Leptura octopunctata. Habitat rarior in Austriae tiliis.*
- glanceopterus. 319. *C. ferrugineus, thorace quadriverrucoso, oculis pectoreque nigris. Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 294. z. I. f. 4. Habitat rarior Halae Saxonum, variabili affinis, at dimidio major.*
- virescens. 320. *C. corpore lineari viridi-aeneo, antennis longis. Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 295. Habitat - - - magnitudine circiter variabilis, statura moschati.*

\*\* palpis

\*\* *palpis inaequalibus, anterioribus 2 filiformibus, posterioribus clavatis: Stenocori Fabricii.*

- festivus*. II. C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus: linea laterali lutea. *Fabr. sp. inf. I. p. 226. n. 5. mant. inf. I. p. 143. n. 5.*  
*Degeer inf. 5. p. 100. n. 4. t. 13. f. 14. Cerambyx spinosus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 6. Cerambyx fulcatus.*  
*Gron. zooph. 541. t. 16. f. 5.*  
*Drury inf. I. t. 37. f. 5.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 25. f. 12.*  
*Habitat in insulis, Americae oppositis.*
- marilandicus*. 321. C. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatis fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 226. n. 6. mant. inf. I. p. 143. n. 6.*  
*Habitat in Marilandia.*
- insularis*. 321. C. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 8. mant. inf. I. p. 143. n. 7.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, ex testaceo et cinereo varius.*
- bispinosus*. 322. C. thorace inermi subtuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo. *Fabr. mant. inf. I. p. 143. n. 8.*  
*Habitat in America meridionali, statura insularis, at minor.*
- femipunctatus*. 323. C. thorace spinoso inaequali, elytris bidentatis basi punctatis apice glabris. *Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 5. mant. inf. I. p. 143. n. 9.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- quadrimaculatus*. 27. C. rufescens thorace scabro spinoso, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris. *Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 12. mant. inf. I. p. 143. n. 12. Gron. zooph. 542\*.*  
*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 21.*  
*Drury inf. I. t. 37. f. 3.*  
*Habitat in America meridionali, femoribus 4 posterioribus apice spinosis.*
- geminatus*. 324. C. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, elytris nigris: maculis duorum parium glabris, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf. I. p. 144. n. 13.*  
 D d d d d 5 *Habitat*

*Habitat in Sierra Leon Africae, congeneribus hujus tribus minor et brevior.*

- africanus. 325. *C. thorace mutico atro, elytris bidentatis basi testaceis apice atris: fascia pallida. Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. 13. mant. inf. I. p. 144. n. 14.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, antennis longitudine corporis, nigris.*
- circumflexus. 326. *C. ferrugineus, thorace mutico, elytris unidentatis testaceis: striga undata punctisque duobus fuscis. Fabr. mant. inf. I. p. 144. n. 15.*  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- annulatus. 327. *C. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longioribus: annulis tribus albis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 14. mant. inf. I. p. 144. n. 16.*  
*Habitat - - - -*
- decemmaculatus. 328. *C. thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 15. mant. inf. I. p. 144. n. 17.*  
*Habitat in America.*
- brasiliensis. 329. *C. thorace spinoso ferrugineo, elytris acuminatis testaceis: lineolis tribus glabris flavis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 16. mant. inf. I. p. 144. n. 18.*  
*Habitat in Brasilia, annulato minor.*
- cayennensis. 330. *C. thorace subspinoso, elytris bidentatis cinereo, fusco flavoque variis: angulo basae compresso. Fabr. mant. inf. I. p. 144. n. 19.*  
*Habitat in Cayenna, parvus, cinereus.*
- Druryi. 331. *C. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis brevibus. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 17. mant. inf. I. p. 145. n. 20.*  
*Habitat in America meridionali.*
- undulatus. 332. *C. cinereus, thorace spinoso, elytris bidentatis: fasciis duabus undatis nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 18. mant. inf. I. p. 145. n. 21.*  
*Habitat - - - -*
- ruricola. 333. *C. fuscus, thorace spinoso ferrugineo, elytris bidentatis pallidioribus antennis, longis. Fabr. sp. inf. I. p. 228. n. 19. mant. inf. I. p. 145. n. 22.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*

334. *C.*



- garganicus. 334. *C. thorace spinoso, elytris bidentatis testaceis: macula pallida, antennis longis. Fabr. Sp. inf. 1. p. 226 n. 4. mant. inf. 1. p. 143. n. 4. Habitat in Marilandia.*
- Lamed. 46. *C. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis: taenia obscura longitudinali sinuata, antennis brevibus. Fn. suec. 649.\* Fabr. Sp. inf. 1. p. 226. n. 3. mant. inf. 1. p. 143. n. 3. Geoffr. inf. par. 1. p. 226. n. 6. Stenocorus niger &c. Habitat in Europa.*
- cyaneus. 335. *C. cyaneus, thorace spinoso, elytris basi flavis. Fabr. Sp. inf. 1. p. 226. n. 2. mant. inf. 1. p. 143. n. 2. Forster nov. inf. 1. p. 40. n. 40. Cerambyx palliatus. Fabr. syst. entom. p. 182. n. 2. Calopus blandus.*
- meridiana. 47. *C. thorace subspinoso, elytris fastigiatis fulcis anterioribus testaceis, pectore nitente. Fn. suec. 648. Fabr. Sp. inf. 1. p. 225. n. 1. mant. inf. 1. p. 143. n. 1. Syst. nat. X. 1. p. 398. n. 7. Leptura meridiana. Degeer inf. 5. p. 305. Leptura fusca cinerea. Schaeff. ic. t. 3. f. 13. t. 79. f. 7. t. 82. f. 4. t. 279. f. 3. Raj. inf. p. 96. n. 1. Habitat in Europa boreali, etiam in Calabria, mas testaceus, femina nigricans, larva subterranea, pedibus longissimis.*
- quadriculatus. 336. *C. thorace subspinoso: punctis septem nigris, corpore testaceo, elytris apice dentatis: lineis longitudinalibus curvatis fulcis, antennis longis. Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 289. t. 1. f. 2. Habitat - - - magnitudine meridiani; an hujus tribus?*
- ramphigeus. 61. *C. thorace mutico subcylindrico bipunctato, corpore livido, elytris maculis duabus flavis apice bidentatis. Habitat in America, festivi magnitudine; an hujus tribus?*
- zonarius. 63. *C. thorace mutico cylindrico rugoso, antennis longioribus, elytris obtusis fulcis: fascia lineari albida. Mus. Lud. Ulr. 75.\* Marcgr. bras. 254. Quici. Habitat in America, an ad hanc tribum?*
- irroratus. 62. *C. thorace mutico cylindrico inaequali, elytris apice bidentatis albo irroratis, antennis longioribus aculeatis. Drury inf. 1. t. 33. f. 3.*

*Habitat*

*Habitat in Americae meridionali oppositis insulis, inquisitoris magnitudine.*

- glabra- 337. *C. thorace mutico cinereo: linea glabra fusca, elytris bi-*  
tus. dentatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 227. n. II. mant. inf. I. p. 143. n. II.*  
*Habitat in insula S. Crucis, Oceani americani.*

- suaveo- 305. *C. thorace spinoso caerulefcenti aureo, corpore viridi,*  
lens. *elytris cyaneis, antennis mediocribus pedibusque nigris, abdomine tibiisque ferrugineis, posterioribus longioribus compressis. Mant. p. 532.*  
*Habitat in Jamaica et Carolina.*

- scabricor- 338. *C. ferrugineus thorace subcylindrico, antennis nitidis, in-*  
nis. *tus denticulatis scabris. Fueßli Verz. schw. Inf. p. 13. n. 241. f. 3. a. b.*  
*Scop. ent. carn. n. 174.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 210. n. 6.*  
*Habitat in Europa.*

- asper. 339. *C. ater, asper, rigidus, thorace bispinoso, elytris in*  
medio tuberculatis. *Sulz. hist. inf. p. 44. t. 5. f. 3.*  
*Habitat in Italia.*

- brevis. 340. *C. nigricans, thorace spinoso, femoribus rotundatis bre-*  
vibus, tarsis anterioribus lobatis perhirlutis. *Sulz. hist. inf. p. 45. t. 5. f. 5.*  
*Habitat in Surinamo.*

- haloden- 341. *C. ater, punctis excavatis, thorace albido villoso, elytris*  
dri. *marginem inaequaliter maculatoque bascos rubris. Pallas it. 2. app. n. 62.*  
*Habitat in Sibiriae robinia halodendro, C. Kaebleri affinis, an hujus tribus?*

- badius. 342. *C. badius, thorace elytrisque striatis. Lepech. it. I. t. 16. f. 3.*  
*Habitat in Sibiria, an ex hac tribu?*

- ruber. 343. *C. elytris rubris: apicum macula oblonga nigra, thora-*  
ce nigro: maculis duabus rubris. *Lepech. it. I. t. 16. f. 3.*  
*Habitat in Sibiriae glycyrrhiza echinata.*

- fimbria- 344. *C. ater, margine albo, thorace bispinoso. Lepech. it. 2.*  
tus. *p. 198. t. 10. f. 8.*  
*Habitat in montis Ural larice; an huc spectat?*

345. *C.*

taeniatus. 345. C. thorace spinoso, elytris nigricantibus: fasciis duabus albidis, antennis corpore duplo longioribus. *Lepech. it. 2. p. 299. t. II. f. 32.*

*Habitat in Sibiriae petrarum fissuris.*

aculeatus. 346. C. nigricans antennis longissimis: spinis tribus introrsum armatis. *Rozier journ. de phys. I. p. 26. t. I. f. C.*

*Habitat in America.*

arenarius. 347. C. niger apterus, capitis thoracisque linea media longitudinali, elytrorum margine albo, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. n. 168.*

*Pod. n. f. graec. p. 34. Cerambyx pedestris.*

*Habitat in Carniolia.*

timidus. 348. C. niger, elytris flavescens: maculis binis atris. *Scop. ent. carn. n. 171. ann. hist. nat. 5. p. 99. n. 67.*

*Habitat in Carniolia, e longinquo hostem fugiens, et sub umbella se recipiens:*

adsperfus. 349. C. elytris nigro maculatis punctatisque, antennis brevibus. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 95. n. 55.*

*Habitat in Carniolia, tristi affinis, sed minor.*

ovalis. 350. C. ovatus fuscus, elytris integris. *Geoffr. inf. par. I. p. 206. n. 10.*

*Habitat in Gallia.*

eruentatus. 351. C. griseus, thorace spinoso, elytris basi unidentatis: maculis sex ferrugineis, antennis longis aculeatis. *Degeer inf. 5. p. 107. n. 8.*

*Habitat in India, rubo affinis, an hujus tribus?*

sinensis. 352. C. niger, thorace spinoso, elytris ad latera albo-maculatis, antennis longis cinereo-maculatis. *Degeer inf. 5. p. 109. n. 10.*

*Habitat in Sina, tres lineas ultra pollicem longus.*

tigrinus. 353. C. ex fusco griseus, thorace spinoso, elytris maculis punctatisque fuscis sparsis, antennis longioribus. *Degeer inf. 5. p. 114. n. 15. t. 14. f. 6.*

*Habitat in Pennsylvania, II lineas longus.*

pennsylvanicus. 354. C. thorace subspinoso, elytris truncatis ex flavo griseis: fasciis undulatis punctatis fuscis, antennis longioribus maculatis. *Degeer inf. 5. p. 114. n. 16. t. 14. f. 7.*

*Habitat in Pennsylvania, dimidium pollicem longus.*

355. C.

- hirsutus. 355. *C. fuscus*, thorace spinoso, elytris hirsutis striato-punctatis, antennis mediocribus maculatis. *Degeer inf.* 5. p. 115. n. 17. t. 14. f. 8.  
*Habitat in Surinamo, 4 lineas longus.*
- gibbus. 356. *C. fuscus cinereo-maculatus*, thorace rugoso subspinoso, elytris gibbis punctis nigris hispidis, antennis mediocribus. *Degeer inf.* 5. p. 116. n. 18. t. 14. f. 9.  
*Habitat in Surinamo, hirsuto brevior, at latior et crassior.*
- hirtipes. 357. *C. fuscus*, thorace mutico cylindrico, elytris apice truncatis bidentatis, plantis anterioribus hirsutis, antennis longioribus: media macula alba. *Degeer inf.* 5. p. 116. n. 19. t. 14. f. 10.  
*Habitat in India, 8½ lineas longus.*
- viridefcens. 358. *C. ex flavo viridis*, thorace mutico cylindrico: fasciis tribus longitudinalibus flavis, antennis longioribus nigro cinereoque maculatis. *Degeer inf.* 5. p. 76. n. 13.  
*Habitat in Europa, mediae magnitudinis.*
- hieroglyphicus. 359. *C. subtus canus*, capite thoraceque lanuginosis: area nigra, elytris nigris glabris: futura utrinque ramosa punctisque quinque ex caerulefcente albidis. *Pall. it.* 2. app. n. 59.  
*Habitat in Sibiriae borealis silvis.*
- perforatus. 360. *C. supra pulvere albidus*, subtus lanugine flavescens, elytris punctis quinque dorsalibus mediis nigerrimis. *Pall. it.* 2. app. n. 60.  
*Habitat cum hieroglyphico, cui proxime affinis.*  
*Elytrorum puncta quasi perforata.*
- ferrugineus. 361. *C. nigricans*, elytris ferrugineis, antennis introrsum spinosis. *Rozier journ. de phys.* p. 27. t. 1. f. D.  
*Habitat in America.*
- carbonarius. 362. *C. niger opacus*, antennis brevibus. *Scop. ent. carn.* p. 55. n. 178.  
*Habitat in Carniolia; an propria species?*
- lunulatus. 363. *C. ex fusco obscure rufescens*, thorace subcylindrico mutico, elytris rubescentibus: lunulis quatuor fulcis apice dentatis. *Drury inf.* 1. t. 37. f. 4.  
*Habitat in Jamaica.*  
*Elytrorum futura prope thoracem cor fuscum refert.*

- minimus. 364. *C. minutissimus.* *Seeligm. av. 4. t. 108. f. 4.*  
*Habitat - - - - - cutem penetrans.*
- vittatus. 378. *C. thorace spinoso pubescente, elytris subfastigiatis testaceis, sutura vittaque fuscis.* *Mus. Lesk. p. 25. n. 540.*  
*Habitat in Europa.*
- quadriguttatus. 379. *C. pallide testaceus, thorace subspinoso, elytris bispinosis: maculis duabus flavis, femoribus clavatis muticis.* *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. n. 3. 3. 16. t. 8. f. 7.*  
*Habitat in Honduras Americae, quadrimaculato duplo minor, subdepressus.*

**CALOPUS.** *Antennae filiformes.*

*Palpi quatuor; anteriores clavati, posteriores filiformes.*

*Thorax gibbus.*

*Elytra linearia.*

- ferraticornis. 1. *C. fuscus, antennis compressis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 228. n. 1. mant. inf. 1. p. 145. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 634. n. 65. Fn. suec. 665. Cerambyx ferraticornis, thorace mutico subovali, corpore lurido fusco, antennis compressis antice ferratis mediocribus.*  
*Degeer inf. 5. p. 79. n. 6.*  
*Habitat in Europa, boreali, statura oleri, elongatus, cylindricus.*
- hispicornis. 2. *C. subfuscus, antennarum articulis posterius spina minutissima armatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 634. n. 66. Cerambyx thorace mutico subrotundo, corpore subfusco, elytris fastigiatis bidentatis, antennis mediocribus postice dentatis.*  
*Habitat in America, cerambyci rustico similis, at duplo major; an hujus generis?*
- pygmaeus. 3. *C. minutissimus fuscus, antennis ferratis pilosis.*  
*Degeer inf. 5. p. 80. n. 17. t. 4. f. 5. Cerambyx pygmaeus.*  
*Habitat in Succia, pulicis magnitudine.*

205. LEPTURA. *Antennae setaceae.**Palpi* quatuor filiformes.*Elytra* apicem versus attenuata.*Thorax* teretiufculus.\* *labio integro*, *Donaciae* Fabricii.

aquatica. 1. *L. aurata*, femoribus posterioribus clavatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 245. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 157. n. 1. *Syst. nat.* XII. 2. p. 637. n. 1. *Fn. succ.* 677.\* *Scop. ent. carn.* 147. *Leptura* deaurata, antennis nigris, femoribus posticis dentatis.

*Degeer inf.* 5. p. 140. n. 80. t. 4. f. 14. 15. *Leptura* aquatica spinosa.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 229. n. 12.

*Raj. inf.* p. 100. n. 1.

*Frisch inf.* 12. p. 33. t. 6. f. 2.

*Habitat in plantis aquaticis*, nymphaeis, caricibus, phelandrio, *cujus radici intra globum brunneum adhaeret pupa.*

*Femora posteriora rarius mutica.*

simplex. 17. *L. aurata*, femoribus simplicibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 245. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 157. n. 2.

*Degeer inf.* 5. p. 142. n. 19? *Leptura* aquatica mutica.

*Habitat in Anglia et Germania.*

fasciata. 18. *L. deaurata*, elytris fascia longitudinali purpurea. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 100. n. 3.

*Degeer inf.* 5. p. n. 20. *Leptura* aquatica fasciata.

*Habitat in Europae aquis*, femoribus posterioribus nunc muticis nunc dentatis.

holosericea. 19. *L. viridi-nitens*, antennis pedibusque ex atro fuscis, femoribus posterioribus dentatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 100. n. 4.

*Habitat in Marchiae pratis humidis.*

palustris. 20. *L. ex nigricante violacea*, antennis pedibusque spadiceis, femoribus posterioribus dentatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 100. n. 5.

*Habitat in Pomeraniae paludibus.*

- cinerea. 21. *L. cinerea cupreo irrorata*, pedibus posterioribus muticis.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 100. n. 6.*  
*Habitat in Pomerania.*
- violacea. 58. *L. ex atro subaenea*, elytris obscure violaceis, abdomine sanguineo. *Pall. it. 2. n. 64.*  
*Habitat in Sibiria, magnitudine aquaticae.*
- bicolor. 84. *L. aurea*, thorace supra elytrisque viridibus, his striato-punctatis hinc inde impressis, femoribus clavatis: posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 589.*  
*Habitat in Europa.*
- crassipes. 85. *L. viridi-aenea subtus cinereo-aenea*, elytris striato-punctatis transverse lineolis substriatis, ore antennis pedibusque rufis, femoribus crassis: posterioribus muticis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 590.*  
*Habitat in Europa.*
- fulca. 86. *L. fulca*, elytris punctato-striatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus dente valido armatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 591.*  
*Habitat in Europa.*
- aenea. 87. *L. rufo-aenea*, subtus cinereo-aenea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 592.*  
*Habitat in Europa.*
- nitida. 88. *L. nitida viridi-aurea*, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata purpureo-aenea, abdomine antennis pedibusque auratis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 593.*  
*Habitat in Europa.*
- vulgaris. 89. *L. viridi-argentea*, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata communi viridi-purpurea, capite, abdomine pedibusque cinereo-argenteis, femoribus posterioribus muticis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 594.*  
*Habitat in Europa.*
- caerulea. 90. *L. caerulea*, elytris punctato-striatis: rugis crenatis, antennis aeneis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 595.*  
*Habitat in Europa.*

\*\* *labio bifido*, Lepturae Fabricii.

† *thorace antrorsum oblongiusculo angustiore, elytris apice truncatis.*

- unipunctata. 22. *L. nigra*, elytris rufis: puncto medio nigro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 157. n. 1.*  
*Habitat Dresdae, statura bipunctatae.*
- hastata. 23. *L. atra*, elytris rubris: apice futuraeque media nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 157. n. 2. Sulz. hist. inf. t. 5. f. 11. Geoffr. inf. par. 1. p. 226. n. 6. Stenocorus niger &c.*  
*Habitat in Europa magis australi, melanurae affinis; mas minor, abdomine rufescente.*
- carbonaria. 91. *L. nigra*, elytris testaceis apice fuscis. *Mus. Lesk. p. 28. n. 612.*  
*Habitat in Europa, an hujus familiae?*
- nigella. 92. *L. nigra*, elytris testaceis, tibiis anticis rufis. *Mus. Lesk. p. 28. n. 614.*  
*Habitat in Europa, an hujus familiae?*
- erythropus. 93. *L. nigra*, pedibus rubris, femorum basi tibiaram apice plantisque nigris. *Mus. Lesk. p. 28. n. 606.*  
*Habitat in Europa.*
- quinque-maculata. 94. *L. nigra*, antennis nigro annulatis, pedibus elytrisque testaceis: his maculis quinque fuscisque tribus nigris. *Mus. Lesk. p. 28. n. 600.*  
*Habitat in Europa.*
- fusca. 95. *L. fusca* aureo pubescens, antennarum basi testacea, femoribus tibiisque anticis testaceis: illis supra fasciis, quatuor posterioribus basi testaceis. *Mus. Lesk. p. 28. n. 617.*  
*Habitat in Europa.*
- bipunctata. 24. *L. nigra* villosa, elytris lividis: futura puncto medio apiceque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 245. n. 1. mant. inf. 1. p. 158. n. 3.*  
*Habitat in Sibiria, melanurae valde affinis, elytris apice rotundatis.*
- melanura. 2. *L. nigra*, elytris rubescentibus lividisve: futura apiceque nigris. *Fu. succ. 678\* Fabr. sp. inf. 1. p. 245. n. 2. mant. inf. 1. p. 158. n. 4.*  
*Gadd. diss. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris obsolete lordideque flavescens.*

Degeer



*Degeer inf. 5. p. 137. n. 14. Leptura variabilis.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 226. n. 7. t. 4. f. 1.*

*Raj. inf. p. 97. n. 6.*

*Petiv. gaz. t. 30. f. 5.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 4.*

β) *Leptura minor. Fabr. mant. 1. p. 158.*

*Habitat frequens in Europae floribus, mas elytris apice nigris, femina unicoloribus, β) duplo minor.*

livida. 26. *L. nigra, elytris testaceis immaculatis, pedibus nigris.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 3. mant. inf. 1. p. 158. n. 5.*

*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 26. f. 23.*

β) *Leptura major. Fabr. mant. inf. 1. p. 158.*

*Habitat in Germaniae floribus, β) duplo major.*

rubra. 3. *L. nigra, thorace, elytris tibiisque purpureis. Fn. suec.*

*500. Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 6. mant. inf. 1. p. 158. n. 6.*

*Degeer inf. 5. p. 132. n. 7.*

*Frisch inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 30.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 2.*

*Habitat in Europae floribus.*

emarginata. 27. *L. atra, elytris purpureis apice emarginatis nigris. Fabr.*

*mant. inf. 1. p. 158. n. 6.*

*Habitat in Cayenna, rubra major, immaculata.*

villica. 28. *L. ferruginea, antennis, elytris pectoreque fuscis. Fabr.*

*sp. inf. 1. p. 246. n. 5. mant. inf. 1. p. 158. n. 8.*

*Habitat in Anglia.*

sanguinolenta. 4. *L. nigra, elytris sanguineis. Fn. suec. 679.\* Scop. ent.*

*carn. 150. Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 4. mant. inf. 1.*

*p. 158. n. 7.*

*Scop. ent. carn. p. 47. n. 151? Leptura dubia.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 9.*

testacea. 5. *L. nigra, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace posterius ro-*

*tundato. Fn. suec. 680.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 7.*

*mant. inf. 1. p. 158. n. 10.*

*Degeer inf. 5. p. 135. n. 11.*

*Schaeff. ic. t. 39. f. 3.*

*Habitat in Europa boreali; an mas rubras, cui saepe copula juncta?*

- revestita. 6. *L. testacea*, elytris pectore antennisque atris.  
*Habitat in Germania, statura testaceae.* Schreber.
- pubescens. 29. *L. nigra cinereo-villosa*: costa alarum basi testacea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 158. n. 11.*  
*Habitat in Suecia, testaceae affinis.*
- virens. 7. *L. fericeo-virescens*, antennis fusco viridique variis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 8. mant. inf. 1. p. 158. n. 12.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 638. n. 7. Fn. suec. 682.\** Leptura viridi-flava, antennis luteo viridique variis.  
*Degeer inf. 5. p. 131. n. 6.* Leptura flavo-viridis.  
*Habitat in Europa boreali.*
- atra. 30. *L. corpore toto nigro.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 9. mant. inf. 1. p. 158. n. 13.*  
*Poda mus. gr. p. 28.* Leptura aethiops.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 228. n. 10.* Stenocorus totus niger.  
*Habitat in Europa magis australi, pedibus interdum testaceis.*
- humeralis. 31. *L. nigra*, humeris abdomineque ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 158. n. 14.*  
*Habitat in Germania, statura quadriguttatae, at duplo fere major.*
- futuralis. 32. *L. cinerea*, elytris testaceis: futura nigra. *Fabr. mant. inf. 1. p. 159. n. 15.*  
*Habitat Halae Saxonum, atra paulo major.*
- scutellata. 33. *L. nigra*, scutello albo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 10. mant. inf. 1. p. 159. n. 16.*  
*Habitat in Italia, atra major.*
- femorata. 34. *L. nigricans*, femoribus basi rufis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 159. n. 17.*  
*Scop. ent. carn. p. 47. n. 155?* Leptura ruficrus.  
*Habitat Halae Saxonum, statura et magnitudine nigrae.*
- ruficornis. 35. *L. nigra*, antennis pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 11. mant. inf. 1. p. 159. n. 18.*  
*Habitat in Italia, femoribus interdum apice nigris.*
- marginata. 36. *L. nigra*, elytrorum margine tibiisque posterioribus rufis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 147. n. 12. mant. inf. 1. p. 159. n. 19.*  
*Habitat in Norwegia, statura nigrae.*

- fericea. 8. *L. viridi-caerulea*, elytris subfastigiatis. *Fn. suec.* 683.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 32.  
*Schaeff. ic. t.* 84. f. 1.  
*Habitat in Europa boreali.*
- quadri- 9. *L. nigra*, elytris lividis: maculis quatuor nigris. *Fn. suec.*  
maculata. 684. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 25.  
*Schaeff. elem. t.* 118. f. 2.  
*ic. t.* 1. f. 7.  
*Habitat in Europae plantis.*
- interroga- 10. *L. nigra*, elytris lividis: fascia longitudinali arcuata macu-  
tionis. lisque quatuor nigris. *Fn. suec.* 685.  
*Uddm. diss.* 35. t. 1. f. 2. *Leptura nigra*, elytris fusco-fla-  
vis: maculis octo nigris.  
*Habitat in Europa.*
- sexmacu- 11. *L. nigra*, coleoptris testaceis: maculis sex nigris margine  
lata. connexis. *Fn. suec.* 686.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 16.  
*mant. inf.* 1. p. 160. n. 26.  
*Degeer inf.* 5. p. 133. n. 9. *Leptura testaceo maculata.*  
*Raj. inf.* p. 81. n. 18.  
*Habitat in Europae plantis.*
- 12macu- 37. *L. nigra*, elytris flavis: maculis sex nigris. *Fabr. sp. inf.*  
lata. 1. p. 248. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 160. n. 27.  
*Habitat in Sibiria, statura sexmaculatae, at paulo major.*
- quadri- 12. *L. nigra*, elytris testaceis: fasciis quatuor nigris. *Fn.*  
fasciata. *suec.* 687.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 19. *mant. inf.* 1.  
p. 160. n. 29.  
*Degeer inf.* 5. p. 132. n. 8. t. 4. f. 11. *Leptura octoma-  
culata.*  
*Scop. ent. carn.* n. 172. *Cerambyx fasciatus.*  
*Schaeff. ic. t.* 59. f. 6.  
*Habitat in Europa, attenuatae affinis, an femina?*
- attenuata. 13. *L. elytris attenuatis flavis: fasciis quatuor nigris, pedibus  
testaceis.* *Fn. suec.* 688.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 248. n. 18.  
*mant. inf.* 1. p. 160. n. 28.  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 99. n. 66. *Prionus attenuatus.*  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 93. n. 1046? *Leptura fasciata.*  
*Schaeff. ic. t.* 39. f. 6.  
*Habitat in Europa.*  
*Femora posteriora apice nigra.*

- dubia. 38. *L. nigra* subvillosa, elytris testaceis nigro-punctatis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 249. n. 20. mant. inf. 1. p. 160. n. 30.*  
*Habitat in Sibiria, attenuatae nimis affinis.*
- sexguttata. 39. *L. nigra*, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 249. n. 21. mant. inf. 1. p. 160. n. 31.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 102. n. 13. t. 26. f. 25.*  
*Habitat in Germania.*
- nigra. 14. *L. elytris attenuatis*, corpore nigro nitido, abdomine rufo. *Fn. Suec. 689.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 15. mant. inf. 1. p. 159. n. 20. Degeer inf. 5. p. 144. n. 24.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 227. n. 9. Stenocorus niger nitidus, abdomine fusco-rubente.*  
*Schaeff. ic. t. 39. f. 7.*  
*Habitat in Europae floribus.*
- adulta. 40. *L. aureo-pubescens*, capite elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 159. n. 21.*  
*Habitat Halae Saxonum, nigra paulo minor, pedibus rubris.*
- 4guttata. 41. *L. fusca*, elytris nigris, punctis duobus baseos ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 159. n. 22.*  
*Habitat Halae Saxonum, magnitudine et statura nigrae.*
- rostrata. 42. *L. obscure aenea*, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 159. n. 23.*  
*Habitat in Africae ammi majori, nigra minor.*
- similis. 43. *L. nigra*, elytris spadiceis: apice fasciaque futurali nigris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 101. n. 2. t. 26. f. 22.*  
*Habitat rarior Berolini, melanurae perquam similis.*
- armata. 44. *L. thorace nigro spinoso*, antennis pedibusque ferrugineis, elytris flavis: punctis duobus, macula cordata, falcisque tribus nigris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 101. n. 11. t. 26. f. 24.*  
*Habitat Berolini, attenuatae affinis, antennarum articulis apice, capite, tarsis, et posterioribus femoribus tibiisque nigris, pedum posteriorum apice in altero sexu lobato.*
45. *L.*

*Huic tribui adscribendae quoque videntur 4 species a Schaeffero delineatae, affinis ic. t. 101. f. 5. figurata ic. t. 151. f. 7. clavata ic. t. 103. f. 6. et t. 108. f. 1. et aeneo-punctulata. ic. t. 201. f. 6.*

- ceramby- 45. *L. nigra*, elytris flavis: fasciis tribus nigris; prima ex punctiformis. *Scbranck inf. austr. p. 154. n. 290.*  
*Scop. ent. carn. n. 154.* Leptura quadrimaculata.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 102. n. 16. t. 26. f. 26.*  
*Habitat in Ungaria et Austria, 4½ lineas longa.*
- ruflica. 46. *L. nigra* albido-villosa, elytris flavescens: maculis quinque lineaque media nigris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 102. n. 17. t. 26. f. 27.*  
*Habitat in Russia.*
- laevis. 47. *L. nigra*, subtus villosa-fericea, antennis ex luteo fuscis, pedibus anterioribus ferrugineis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 103. n. 18.*  
*Habitat in Pomerania, nigra dimidio minor.*
- solliticia- 48. *L. nigra*, antennis basi ferrugineis, pedibus elytrisque lulis. teis: his margine nigris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 103. n. 19.*  
*Habitat Berolini, vix 3 lineas longa.*
- splendida. 49. *L. nigra* flavo-villosa, elytris apice glabris, pedibus fulvis, antennis fuscis, basi ferrugineis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 103. n. 20.*  
*Habitat in Marchia, 2½ lineas longa, ad mecydalin accedens.*
- quadrino- 50. *L. nigra* flavicanti-subtus albido-villosa, antennis basi fuscis, femoribus basi ferrugineis, elytris punctatis: maculis duabus aurantiis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. p. 171. n. 22. t. 45. f. 13.*  
*Habitat Berolini.*
- plumipes. 51. *L. fusca* punctata, femoribus subelavatis, pedibus postremis longissimis: tibiis apice floccosis. *Pall. spic. zool. 9. p. 4. t. 1. f. 2. 2.\**  
*Habitat - - - melanura minor, gracilima.*  
*Tarsi sparsa lanugine villosi; floccus in apice tibiarum postremarum e villis nigris sericeis in septem versus per longitudinem dispositis constat.*
- rufipes. 52. *L. nigra*, pedibus rufis: femoribus basi nigris. *Schaller Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 298.*  
*Schaeff. ic. t. 55. f. 7.*  
*Habitat in rhamni cathartici, corni fanguineae, crataegi oxyacanthae floribus, Majo frequens.*

- octomaculata. 53. *L. nigra*, elytris testaceis: maculis sex apicibusque nigris. Schaller *Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 299.  
Schaeff. *ic.* t. 6. f. 9.  
*Habitat in Saxonia.*
- Schalleri. 54. *L. fusca*, elytrorum basi maculis quatuor rufis. Schaller *Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 299.  
Schaeff. *ic.* t. 182. f. 4.  
*Habitat, rarior, in rhamni cathartici, pruni spinosae floribus.*
- ustulata. 55. *L. nigra* thorace elytrisque testaceis, apice nigris, pedibus testaceis. Schaller *Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 298.  
*Habitat, rarior, in floribus Halensibus, Junio conspicua, cerambycis praeusti statura et magnitudine.*
- pumila. 56. *L. fusca*, pedibus anterioribus testaceis: femoribus superne nigris. Schaller *Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. p. 299.  
*Habitat Halae Saxonum, in floribus, cerambycis praeusti magnitudine.*
- parifina. 56. *L. tota nigra*, femorum antennarumque basi rufescente. Thunb. *nov. act. Ups.* 4. p. 16. n. 28.  
*Habitat Lutetii, melanura duplo minor, oblonga, angusta.*
- bipustulata. 57. *L. elytris nigris striato-punctatis: maculis duabus testaceis.* Thunb. *nov. act. Ups.* 4. p. 17. n. 29.  
*Habitat Upsaliae, magnitudine melanurae; an prisinae tribus?*
- Scopoli. 58. *L. abdominis thoracisque margine posteriore rubro, elytris testaceis pellucidis attenuatis: apice et margine infra medium nigro.* Scop. *ann. hist. nat.* 5. p. 100. n. 72.  
*Habitat in Carniolia.*
- verna. 59. *L. nigra*, tibiis anterioribus fulvis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 94. n. 1055.  
Schaeff. *ic.* t. 55. f. 9.  
*Habitat in Dania.*
- nigripes. 60. *L. nigra*, elytris obscure flavo-testaceis, pedibus nigris. Degeer *ins.* 5. p. 136. n. 12.  
*Habitat - - - 7 lineas longa.*
- maculosa. 61. *L. nigra*, elytris testaceo-lividis, antennis flavo-maculatis Degeer *ins.* 5. p. 139. n. 16.  
*Habitat - - - 4 lineas longa.*

- lunulata. 96. *L. nigra*, thorace posterius fascia angusta flava, elytris lunulis duabus ferrugineis. *Swederus nov. act. Stockb.* 8. 1787. 3. n. 3. 18.  
*Habitat ad caput bonae spei, melanurae facie, at paulo major.*
- bicolor. 97. *L. pallide ferruginea*, oculis, elytris, alis et ano supra nigris. *Swederus nov. act. Stockb.* 8. 1787. 3. n. 3. 19.  
*Habitat in America septentrionali, attenuatae simillima, at paulo minor.*
- vittata. 98. *L. pallide testacea*, antennis fusco-annulatis, elytris nigris punctatis: vittis quatuor flavis. *Swederus nov. act. Stockb.* 8. 1787. 3. n. 3. 20.  
*Habitat in America septentrionali, facie et magnitudine sex-maculatae.*
- †† thorace subgloboso nec anterieus attenuato, elytris apice obtusis nec truncatis.
- virginica. 15. *L. thorace globoso nigro*, elytris violaceis, abdomine rufo. *Fn. suec.* 690. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 24. *man. inf.* 1. p. 160. n. 34.  
*Degeer inf.* 5. p. 144. n. 23. *Leptura violacea.*  
*Gadd diss.* 26. *Leptura nigra*, elytris caerulefcentibus, toto abdomine rubro.  
*Schaeff. ic. t.* 58. f. 8.  
*Habitat in Europa boreali.*
- collaris. 16. *L. thorace globoso abdomineque rubris*, elytris nigris. *Fn. suec.* 691. *Scop. ent. carn.* 159. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 249. n. 23. *man. inf.* 1. p. 160. n. 33.  
*Degeer inf.* 5. p. 143. n. 22. *Leptura ruficollis.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 228. n. II. *Stenocorus niger*, thorace rubro.  
*Schaeff. ic. t.* 58. f. 9.  
*Habitat in Europa.*
- decempunctata. 62. *L. atra*, thorace subgloboso, elytris decempunctatis. *Lepechin it.* 2. t. 10. f. 2.  
*Habitat in monte Ural.*
- varia. 63. *L. villosa cana*, thorace subgloboso, elytris nigris: punctis octo et fasciis interruptis quatuor albis. *Lepechin it.* 2. t. 10. f. 4.  
*Habitat in monte Ural.*

- viridis. 64. *L. viridiuscula*, thorace subovato: lineolis duabus longitudinalibus obscurioribus, dorso nigro. *Lepech. it. 2. t. 10. f. 11.*  
*Habitat in Sibiria.*
- linearis. 25. *L. thorace ovato*, corpore cyaneo lineari, antennis longioribus. *Mus. Lud. Ulr. 77.\**  
*Habitat in India, femoribus nunc clavatis, nunc linearibus.*
- massiliensis. 65. *L. nigra*, thorace subglobofo, elytris fasciis subtribus albis introrsum fractis. *Syst. nat. XII. add. p. 1067. n. 8.*  
*Habitat in Lusitania, et Massilia, facie cerambycis rustici, sed triplo minor; an cerambyx?*
- pilosa. 66. *L. nigra cinereo-pubescentis*, thorace globofo, elytris fastigiatis. *Forst. nov. inf. 1. p. 44. n. 44.*  
*Habitat in Hispania ad calpen freti Gaditani, magnitudine circiter cerambycis mystici.*
- nitens. 67. *L. thorace globofo et abdomine nigris flavescenti-tomentosis nitentibus*, elytris atris: fasciis quatuor latis transversis flavis, pedibus ferrugineis. *Forst. nov. inf. 1. p. 45. n. 45.*  
*Habitat in America septentrionali, magnitudine melanuræ.*
- bilineata. 68. *L. fusco-nigricans*, thorace lineis binis, elytris punctis sparsis flavescens. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 102. n. 76.*  
*Habitat in Carniolia, habitu cerambycis cardui, nonne cerambyx?*
- caerulea. 69. *L. caerulea*, tibiis anterioribus rufis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 102. n. 78.*  
*Habitat in Carniolia.*
- squlida. 70. *L. nigra*, elytris basi et margine interiori testaceis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 102. n. 79.*  
*Habitat in Carniolia, antennis brevibus.*
- bipartita. 71. *L. nigra*, thorace ferrugineo: linea nigra longitudinali, elytris macula communi ferruginea. *Schranck. Beyr. z. Naturg. p. 68. §. 15.*  
*Habitat in Germania superiori.*
- ferruginea. 72. *L. nigra*, elytris ferrugineis, extrorsum late nigris. *Schranck Beyr. z. Naturg. p. 68. §. 14. t. 3. f. 14.*  
*Habitat in Germania.*



- Lambda. 73. *L. nigro*, elytris fasciis tribus albis. *Schranck Beytr. z. Naturg. p. 67. §. 13. t. 3. f. 13.*  
*Habitat in Germania.*
- aurea. 74. *L. viridi-aurea*, thorace spinoso, elytris fasciis binis longitudinalibus nigris, femoribus rufis. *Deger inf. 5. p. 145. n. 1.*  
*Habitat - - - 8½ lineas longa.*
- Genii. 75. *L. nigra*, elytris fusco-testaceis apice nigris, pedibus flavis. *Deger inf. 5. p. 139. n. 17.*  
*Schaeff. icon. t. 39. f. 5.*  
*Habitat in Europa, tabaci colore, 3½ lineas longa.*
- maculata. 76. *L. nigra*, maculis villoso-flavis, thorace globofo, antennis corpore dimidio brevioribus. *Geoffr. inf. par. 1. p. 211. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- naevia. 77. *L. nigra villoso-flava*, elytris maculis duabus glabris nigris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 211. n. 8.*  
*Habitat in Gallia*
- punctulata. 78. *L. nigricans*, capite thoraceque rubro nigro-punctato. *Geoffr. inf. par. 1. p. 212. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- strigosa. 79. *L. villoso flava*, elytris lineis tribus transversis nigris. *Geoffr. inf. par. 1. p. 216. n. 14.*  
*Habitat in Gallia.*
- gallica. 80. *L. caerulea*, tibiis rufis, thorace subglobofo. *Geoffr. inf. par. 1. p. 217. n. 16.*  
*Habitat in Gallia.*
- crassipes. 81. *L. atra*, femoribus crassis rufis. *Geoffr. inf. par. 5. p. 219. n. 20.*  
*Habitat in Gallia.*
- bimaculata. 82. *L. rufa*, thorace cylindrico, elytris punctatis: macula et striga undulata albis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 95. n. 1073.*  
*Schaeff. ic. t. 158. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- villosa. 83. *L. nigra villosa*, thorace cylindrico: linea longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr. p. 95. n. 1072.*  
*Habitat in Dania.\**

206. NECYDALIS. *Antennae setaceae vel filiformes.*  
*Palpi quatuor filiformes.*  
*Elytra alis minora, breviora*  
*vel angustiora.*  
*Cauda simplex.*

\* *antennis setaceis, elytris ala et abdomine brevioribus,*  
 Lepturae Fabricii.

major. 1. N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis brevioribus.  
*Fn. suec. 838.\**

*Degeer inf. 5. p. 148. n. 1. t. 5. f. 1. Necydalis ichneumonca.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 25. mant. inf. 1. p. 160. n. 35.*  
 Leptura abbreviata.

*Schaeff. monogr. 1753. f. 1. 2. Musca Cerambyx major.*  
*elem. t. 13. f. 2.*  
*ic. t. 10. f. 10. 11.*

*Habitat in Europa.*

variegata. 12. N. abdomine atro: fasciis fulvis.

*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 26. mant. inf. 1. p. 160. n. 36.*  
 Leptura variegata.

*Habitat in nova Hollandia.*

minor. 2. N. elytris testaceis: apice lineola alba, antennis longiori-  
 bus. *Fn. suec. 837.\* Scop. ent. carn. 179.*

*It. oeland. 74. Necydalis elytris flavis lineola alba.*  
*Degeer inf. 5. p. 151. n. 2. Necydalis ceramboides.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 27. mant. inf. 1. p. 160. n. 37. Le-*  
 ptura dimidiata.

*Schaeff. monogr. 1753. f. 6. 7. Musca Cerambyx minor.*  
*icon. t. 95. f. 5.*

*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 51.*

*Habitat in Europa, inprimis boreali.*

umbella- 3. N. elytris testaceis immaculatis, antennis longis.  
 tarum. *Schreb. inf. 4. Necydalis elytris apice nigris.*

*Scop. ent. carn. 180. Necydalis minima.*

*Fabr. sp. inf. 1. p. 250. n. 28. Leptura umbellatarum.*

*Schaeff. ic. t. 95. f. 4.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 1.*

*Habitat in Germaniae umbellatis.*

*\*\* antennis filiformibus, elytris subulatis longitudine abdominis.*

- viridissima. 13. N. thorace teretiufculo, corpore viridi. *Fabr. sp. inf. I. p. 263. n. 1. mant. inf. I. p. 170. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 650. n. 23. Fn. suec. 717.* *Cantharis viridissima.*  
*Degeer inf. 5. p. 15. n. 3. t. I. f. 13.* *Cantharis viridi-aenea nitida.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 177. n. 14.* *Cicindela viridi-caerulea.*  
*Habitat in Europae hortis frequens.*
- caerulef-cens. 14. N. thorace teretiufculo, corpore caeruleo subopaco. *Fabr. sp. inf. I. p. 263. n. 2. mant. inf. I. p. 170. n. 2.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 650. n. 22.* *Cantharis caerulea.*  
*Degeer inf. 4. p. 76. n. 8.* *Telephorus villosus violaceo-caeruleus.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- sanguinicolis. 15. N. thorace teretiufculo rufo, corpore fusco. *Fabr. mant. inf. I. p. 170. n. 3.*  
*Habitat Halae Saxonum, magnitudine et statura caerulef-cens.*
- ruficollis. 16. N. thorace teretiufculo abdomineque rufis, capite elytris-que viridi-aeneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 263. n. 3. mant. inf. I. p. 170. n. 4.*  
*Habitat in Italia, statura et magnitudine caerulef-cens.*
- caerulea. 4. N. caerulea, femoribus posterioribus clavatis arcuatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 264. n. 7. mant. inf. I. p. 171. n. 11.*  
*Forst. nov. inf. I. p. 47. n. 47.* *Necydalis ceramboides.*  
*Scop. ent. carn. 145.* *Cantharis nobilis.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 342. n. 3.* *Cantharis viridi-caerulea.*  
*Sulz. hist. inf. 48. t. 6. f. 2.*  
*Schaeff. ic. t. 94. f. 7.*  
*Habitat in Europa magis australi et Oriente, pedibus interdum simplicibus.*
- triflis. 17. N. nigra, thorace teretiufculo femorumque basi rufis. *Fabr. mant. inf. I. p. 170. n. 5.*  
*Habitat in terra van Diemen, statura atrae.*
- atra. 5. N. nigra, femoribus omnibus clavatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 263. mant. inf. I. p. 170. n. 6.*

*Habitat*

*Habitat in Europa australi, femoribus in altero sexu simplicibus. Alcanius.*

- humeralis. 18. N. elytris nigris basi flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 263. n. 5. mant. inf. 1. p. 170. n. 7.*  
*Forst. nov. inf. sp. 1. p. 48. n. 48.* Necydalis (muralis) elytris subulatis fulca, humeris flavis, pedibus simplicibus.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 342. n. 2.* Cantharis nigra &c.  
*Habitat in Anglia.*
- ustulata. 19. N. nigra, elytris basi suturaque lata testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 170. n. 8. Schranck inf. austr. n. 319. Herbst apud Fueslli arch. inf. 5. p. 109. n. 8.*  
*Habitat in Germaniae plantis, statura humeralis.*  
 Femina major, thorace fivvo.
- melanura. 20. N. nigra, thorace elytrisque testaceis: his apice nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 170. n. 9.*  
*Habitat in Hispaniae plantis, statura et magnitudine ruficollis.*
- rufa. 6. N. nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 263. n. 6. mant. inf. 1. p. 171. n. 10.*  
*Geoffr. inf. par. 2. p. 220. n. 22.* Leptura nigra &c.  
*Schaeff. ic. t. 94. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- glaucescens. 7. N. elytris glaucis, corpore nigro, abdominis incisuris albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 171. n. 13.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 642. n. 7.* Necydalis elytris glauco flavescens, femoribus clavatis.  
*Syst. nat. X. p. 399. n. 17.* Leptura necydalea.  
*Schaeff. ic. t. 94. f. 6.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- flavescens. 8. N. elytris testaceis, corpore nigro, femoribus posterioribus clavatis arcuatis. *Scop. ent. carn. 145.* Cantharis femorata.  
*Schaeff. ic. t. 85. f. 7.*  
*Habitat in Europa; an mera n. podagrariae varietas?*
- podagrariae. 9. N. elytris testaceis, corpore nigro, femoribus posterioribus clavatis basi testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 264. n. 8. mant. inf. 1. p. 171. n. 12.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 343. n. 4.* Cantharis nigra &c.  
*Habitat*

*Habitat in aegopodio podagraria, elytrorum apice nigro, antennarum basi, palpis, et pedibus quatuor anterioribus testaceis.* Schreber.

- simplex. 10. *N. elytris testaceis, pedibus simplicibus.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 264. n. 9. mant. inf. 1. p. 171. n. 14.*  
*Scop. ent. carn. 144. Cantharis phthysica.*  
*Habitat in Europa, an forsun n. podagrariae varietas?*
- brevicornis. 11. *N. elytris minutissimis, capite thoraceque fuscis: linea longitudinali flava, antennis brevissimis crassiusculis.*  
*Habitat in Guinea, majoris magnitudine, elongata, elytris ex rufo fuscis, pedibus testaceis.*
- friata. 21. *N. virefcens, elytris lineis quatuor elevatis.* *Herbst apud Fuessli arch. 5. p. 109. n. 5.*  
*Habitat Berolini.*
- melanocephala. 22. *N. elytris testaceis, capite epigastrio alisque nigris, antennis fuscis.* *Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 300.*  
*Habitat Halae Saxonum in umbellatis.*
- glauca. 23. *N. nigra, thorace elytrisque cyaneis.* *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 109. n. 6.*  
*Habitat rarior Berolini, 5 lineas longa.*
- collaris. 24. *N. atra, thorace bipunctato testaceo, pedibus simplicibus.* *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 46. n. 46.*  
*Habitat in America septentrionali, caeurleae magnitudine.*
- exusta. 25. *N. fusca, elytris subulatis testaceis margine exustis, pedibus simplicibus.* *Mus. Lesk. p. 31. n. 664.*  
*Habitat in Europa.*
- clavipes. 26. *N. nigra, elytris subulatis testaceis margine exteriori fuscis, femoribus posterioribus clavatis arcuatis.* *Mus. Lesk. p. 31. n. 665.*  
*Habitat in Europa.*

207. LAMPYRIS. *Antennae filiformes.**Palpi quatuor.**Elytra flexilia.**Thorax planus, femiorbiculatus,  
caput subius occultans cin-  
gensque.**Abdominis latera plicato-papillosa.**Femina aptera plerisque, larvae  
phytophagae similis.**\* palpis subclavatis.*noctiluca. 1. *L. oblonga fusca, clypeo cinereo. Fn. succ. 699. Fabr.  
sp. inf. 1. p. 251. n. 1. mant. inf. 1. p. 161. n. 1.**Degeer inf. 4. p. 31. n. 1. t. 1. f. 19. 20. Lampyris nocti-  
luca communis.**Leche nov. sp. 23. n. 47. Cantharis mas coleopterus.**Geoffr. inf. par. 1. p. 167. t. 2. f. 7.**Habitat in Europae borealis juniperetis graminosis, etiam  
in Calabria.*corusca. 2. *L. obscure nigra, clypeo utrinque lunula rosea. Fabr. sp.  
inf. 1. p. 251. n. 3. mant. inf. 1. p. 161. n. 3.**Syst. nat. XII. 2. p. 644. n. 2. Uddm. diff. 47. Lampyris  
oblongiuscula fusca, clypeo utrinque intra marginem  
fulvo.**Habitat in America boreali.*splendi- 3. *L. oblonga fusca, clypeo apice hyalino. Fabr. sp. inf. 1.  
dula. p. 251. n. 2. mant. inf. 1. p. 161. n. 2.**Syst. nat. XII. 2. p. 644. n. 3. Lampyris oblongiuscula fus-  
ca, clypeo supra oculos fenestrato.**Geoffr. inf. par. 1. p. 166. n. 1. Lampyris femina aptera.**Scop. ent. carn. n. 118. Cassida noctiluca.**Poda inf. 39. Cantharis noctiluca.**Raj. inf. p. 78. n. 15.**Guen. de Montbeill. nov. act. Divion. 1782. sem. 2.**Column. ephr. 1. 38. t. 36.**Aldr. inf. 492.**Mouff. inf. p. 109. f. 1. et 2.*

Jonsf.

*Fonst. inf. t. 14. f. 2.*

*Bradl. nat. t. 26. f. 3. A. B.*

*Schaeff. elem. t. 74.*

*Habitat in Europae sylvaticis, an a noctiluca satis distincta, tempestate inprimis pluvia lucem spargens, femina majorem, gravida maximam, in aëre vitali adhuc majorem.*

obscura. 19. *L. nigra*, clypeo utrinque macula rufa. *Fabr. sp. inf. I. p. 251. n. 4. mant. inf. I. p. 161. n. 4.*  
*Habitat in terra del Fuego.*

Pyralis. 4. *L. clypeo rufo medio nigro, elytris nigris: marginibus abdomineque albis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 251. n. 5. mant. inf. I. p. 161. n. 5.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 644. n. 4. Mus. Lud. Ulr. 78.\** *Lampyris oblongiuscula fusca, elytris margine rufescentibus, clypeo intra marginem purpurafcente.*  
*Degeer inf. 4. p. 52. n. 7. t. 17. f. 7.* *Lampyris oblonga.*  
*Habitat in America meridionali.*

cincta. 20. *L. fusca*, thorace elytrorum margine omni abdominisque apice fulvis. *Fabr. mant. inf. I. p. 161. n. 6.*  
*Habitat in Pulicander, pyralidi proxime affinis.*

marginata. 5. *L. oblonga nigra*, thoracis elytrorumque margine omni, scutello abdominisque posteriore flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 252. n. 6. mant. inf. I. p. 161. n. 7.*  
*Habitat in America meridionali, magnitudine noctilucae.*

Hespera. 6. *L. ovata*, elytris fuscis: macula marginali triangulari flava. *Fabr. sp. inf. I. p. 252. n. 9. mant. inf. I. p. 161. n. 10.*  
*Degeer inf. 4. p. 48. n. 1. t. 17. f. 1.* *Lampyris furinamensis.*  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*

ignita. 7. *L. ovata*, elytris fuscis: macula marginali ovata lutea. *Fabr. sp. inf. I. p. 252. n. 10. mant. inf. I. p. 161. n. 11.*  
*Degeer inf. 4. p. 49. n. 2. t. 17. f. 2.* *Lampyris ovata.*  
*Habitat in America meridionali, fusca, subtus flava, alis nigris. Rolander.*

lucida. 8. *L. oblonga*, elytris fuscis: margine exteriori luteo, abdomine flavo. *Fabr. sp. inf. I. p. 253. n. 11. mant. inf. I. p. 161. n. 12.*  
*Degeer inf. 4. p. 51. n. 5. t. 17. f. 5.*  
*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 22.*

FFFFF

Habitat

*Habitat in America meridionali, noctilucae similis, sed pallidior, capite antennisque nigris.*

- nitidula. 21. *L. oblonga fusca, thorace flavescente: macula media nigra, abdomine apice maculis duabus flavis. Fabr. sp. inf. I. p. 253. n. 12. mant. inf. I. p. 161. n. 13. Habitat in Africa aequinoctiali.*
- phospho- 9. *L. oblonga subtestacea, abdomine atro: posterius flavissimo. ra. Fabr. sp. inf. I. p. 253. n. 13. mant. inf. I. p. 161. n. 14. Degeer inf. 4. p. 51. n. 6. t. 17. f. 6. Lampyris oblonga &c. Habitat in America meridionali, antennis nigris. Rolander.*
- japonica. 22. *L. flava, segmento abdominis antepenultimo nigro. Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 79. Fabr. mant. inf. I. p. 162. n. 16. Habitat in Japonia, Majo et Junio copiosissima, vesperi lucem egregiam et vesiculis binis caudalibus aere repletis spargens, oculis, antennis alisque nigris.*
- compres- 23. *L. testacea, antennis pedibusque compressis. Thunb. nov. fa. inf. sp. 4. p. 80. Habitat in India, oblonga, linearis, glabra, abdomine caerulefcente, capite, pectore, pedibus antennisque nigris.*
- capensis. 24. *L. livida, thorace flavescente, abdomine posterius flavissimo. Fabr. sp. inf. I. p. 253. n. 14. mant. inf. I. p. 162. n. 16. Habitat ad caput bonae spei.*
- australis. 25. *L. flavicans, capite elytrisque fuscis. Fabr. sp. inf. I. p. 253. n. 15. mant. inf. I. p. 162. n. 17. Habitat in nova Hollandia.*
- maurita- 10. *L. elytris lividis, corpore flavo. Fabr. sp. inf. I. p. 254. nica. n. 17. mant. inf. I. p. 162. n. 18. Habitat in Africae plantis, splendidula duplo, femina triplo major.*
- depressa. 26. *L. fusca, clypei elytrorumque margine dilatato plano. Fabr. sp. inf. I. p. 254. n. 18. mant. inf. I. p. 162. n. 19. Herbst apud Fuesli arch. inf. 7. p. 171. n. 2. t. 46. f. 7. Habitat in Coromandel, magna.*
- italica. 11. *L. elytris fuscis, thorace transverso rufo. Fabr. sp. inf. I. p. 253. n. 16. Syst. nat. XII. 2. p. 645. n. 11. Lampyris elytris fuscis, clypeo antice transverso rufo medio nigro.*

*Degeer*



*Degeer inf. 4. p. 53. n. 9. t. 17. f. 9. 10.* *Lampyris oblonga* &c.

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 3.*

*Habitat in Italiae et Helvetiae arboribus, congeneribus minor, fusca, abdominis segmentis 2 ultimis flavis, pectore pedibusque luteis; femina nigra.*

chinensis. 12. *L. elytris testaceis apice nigris.* *Osborn. it. 224.\**

*Habitat in Asia.*

minuta. 13. *L. testacea, abdomine alisque nigricantibus.*

*Habitat in Europa, vix pediculo major, ex ovali oblonga.*

pectinata. 27. *L. atra, clypei lateribus basi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 252. n. 7. mant. inf. 1. p. 161. n. 8.*

*Degeer inf. 4. p. 57. n. 11. t. 17. f. 13.* *Lampyris atra* &c. *Syst. nat. XII. 2. p. 649. n. 17.* *Cantharis pectinata.*

*Habitat in America meridionali.*

flabellicornis. 28. *L. nigra, clypeo ante marginem, elytris lineola marginali baseos abdomineque apice albis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 252. n. 8. mant. inf. 1. p. 161. n. 9.*

*Habitat in Brasilia, magna.*

pilosa. 29. *L. oblonga nigra, thorace sanguineo: lineis duabus longitudinalibus nigris, antennarum articulis tribus extimis pectinatis.* *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 49. n. 49.*

*Habitat in America septentrionali, noctilucae fere magnitudine; an ex hac tribu?*

**\*\* palpis subfiliformibus, Pyrochroae Fabricii.**

fasciata. 30. *L. atra, thoracis margine flavescente, elytris fascia lata alba.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 163. n. 9.*

*Habitat in Cayenna, satura reticulatae.*

reticulata. 31. *L. atra, thoracis margine flavo, elytris flavis: fascia apiceque nigris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 4. mant. inf. 1. p. 163. n. 8.*

*Habitat in America boreali.*

bicolor. 16. *L. sanguinea, elytris posterius violaceis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 3. mant. inf. 1. p. 163. n. 7.*

*Anoen. acad. 6. p. 395. n. 21.* *Cantharis bicolor.*

*Habitat in Africa, antennis compressis.*

F f f f f f 2

32. L.

- pufilla. 32. *L. atra*, antennarum apicibus elytrisque sanguineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 163. n. 6.  
*Degeer inf.* 4. p. 36. n. 3. *Lampyris nigro-rubra*.  
*Habitat in* Norwegia, *sanguinea duplo major*.
- nigripes. 33. *L. sanguinea*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 163. n. 5.  
*Habitat in* Siam, *statura et magnitudine sanguineae*.
- sanguinea. 17. *L. nigra*, thoracis lateribus elytrisque sanguineis. *Fn. suec.* 704.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 254. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 163. n. 4.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 168. n. 3. *Lampyris*, elytris rubris.  
*Degeer inf.* 4. p. 452. t. 2. f. 1. *Lampyris sanguinea*.  
*Scop. ent. carn.* 119. *Castida sanguinea*.  
*Raj. inf.* p. 101. n. 4.  
*Frisch inf.* 12. p. 40. n. 3. t. 7. f. 2.  
*Schaeff. ic.* t. 7. f. 1.  
*Habitat in* Europae *lapidosis*.
- pectinicornis. 34. *L. atra*, thorace elytrisque testaceis, antennis pectinatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 162. n. 3.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 650. n. 20. *Fn. suec.* 715. *Cantharis pectinicornis*.  
*Habitat in* Germania, *coccinea major*.
- rubens. 35. *L. nigra*, capite, thorace elytrisque rubris, antennis pectinatis.  
*Schaller Abb. der ball. Naturf. Ges.* 1. p. 301. *Schranck inf. austr.* p. 174. n. 324. *Pyrochroa Satrapa*.  
*Habitat* Halae Saxonum, *Mujo et Junio conspicua*, *statura coccineae*, *at dimidio minor*.
- flabellata. 36. *L. coccinea*, antennis elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 162. n. 2.  
*Habitat in* America, *statura et magnitudine coccineae*, *antennis ferratis*.
- coccinea. 18. *L. nigra*, thorace elytrisque sanguineis immaculatis. *Fn. suec.* 705.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 254. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 163. n. 1.  
*Degeer inf.* 4. p. 47. n. 4. *Lampyris villosa*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 338. n. 1. t. 6. f. 4. *Pyrochroa*.  
*Schaeff. ic.* t. 90. f. 4.

*Habitat*

*Habitat in Europae sepibus, capite aliquando rufo, elytris interdum striatis.*

Aurora. 37. L. nigra, thorace rubro cancellato, elytris spadiceis: lineis quatuor elevatis; interstitiis seriatim punctatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 105. n. 4.*  
*Habitat in Pomerania.*

nitens. 38. L. oblonga, elytris fufcescentibus: macula marginali oblonga fusca, abdomine turtus rufo, posterius flavo: segmento unico nigro. *Degeer inf. 4. p. 50. n. 3. t. 17. f. 3.*  
*Habitat in Surinamo, 4½ lineas longa.*

maculata. 39. L. ovata testacea, thorace fascia elytrisque macula nigris. *Degeer inf. 4. p. 50. n. 4. t. 17. f. 4.*  
*Habitat - - - sex lineas longa.*

penfylvanica. 40. L. oblonga, elytris pallide ex griseo testaceis, thorace intra marginem nigro: maculis binis rufis. *Degeer inf. 4. p. 52. n. 8. t. 17. f. 8.*  
*Brown jam. p. 431. t. 44. f. 9. a. b. Pyralis minor subcinerea longa, alis et oculis nigricantibus?*  
*Habitat in Pennsylvania.*

\*\*\* *palpis articulo ultimo crassiori truncato; Lyci Fabricii.*

latissima. 14. L. flava, elytris macula marginali posteriusque nigris, margine laterali maximo dilatato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 5. mant. inf. 1. p. 163. n. 1.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, statura et magnitudine silphae cujusdam minoris, antrorsum angusta, retrorsum latissima, antennis serratis.*

palliat. 41. L. elytris coriaceis latissimis testaceis apice nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 6. mant. inf. 1. p. 163. n. 2.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

rostrata. 16. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque dilatatis flavis anteriorius posteriusque nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 7. mant. inf. 1. p. 163. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 646. n. 15. Mus. Lud. Utr. 78. Lampyris elytris testaceis antice posticeque nigris.*  
*Degeer inf. 7. p. 622. n. 19. t. 46. f. 11.*  
*Habitat in Africae plantis.*

- probosci- 42. *L. nigra*, thoracis lateribus elytrisque flavis, posterius nigris.  
 dea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 255. n. 8. ment. inf. 1. p. 164. n. 4.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, rostratae proxime affinis.*
- ferrati- 43. *L. nigra*, thorace elytrisque rufescentibus, elytris apice ni-  
 cornis. gris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 256. n. 9. mant. inf. 1. p. 164. n. 5.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- atra. 44. *L. atra*, thorace orbiculato elytrisque rubris, dorfi macula  
 impressa nigra. *Mus. Lesk. p. 29. n. 626.*  
*Habitat in Europa.*

**HORIA.** *Antennae moniliformes.*  
*Palpi quatuor extrorsum crassiores.*  
*Labium lineare, apice rotundatum.*

- testacea. 1. *H. rufa*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf. 1.*  
*p. 164. n. 1.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 256. n. 1. Lymexylon testaceum.*  
*Habitat Tranquebariae.*  
*Mari femora posteriora incrassata, subtus canaliculata dentata.*
- derme- 2. *H. testacea*, oculis, alis pectoreque nigris. *Fabr. mant.*  
 stoides. *inf. 1. p. 164. n. 2.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 650. n. 25. Fn. suec. 702.\* Cantharis*  
*testacea, oculis alis pectoreque nigris, antennis longitu-*  
*dine thoracis.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 256. n. 2. Lymexylon dermestoides.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 145. n. 5. t. 30. f. 4.*  
*Lytta francofurtana.*  
*Habitat in Europa media.*

- CUCUJUS.** *Antennae* filiformes.  
*Palpi* quatuor aequales: articulo ultimo truncato, crassiori.  
*Labium* breve, bifidum: laciniis linearibus, distantibus.  
*Corpus* depressum.
- monilis. 1. *C. supra niger*, thorace quadrato mutico margine, elytris macula ferruginea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 166. n. 9.*  
*Habitat in Germania, antennis moniliformibus ad horiam accedens, vix hujus generis.*
- muticus. 2. *C. thorace mutico nigro: puncto utrinque impresso, elytris striatis fulcis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 5. mant. inf. 1. p. 166. n. 8.*  
*Habitat in Germania, niger.*
- testaceus. 3. *C. testaceus*, thorace subquadrato mutico, femoribus compressis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 166. n. 7.*  
*Habitat sub betulae cortice.*
- dubius. 4. *C. thorace denticulato rufo, elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 3. mant. inf. 1. p. 166. n. 5.*  
*Habitat in America boreali.*
- clavipes. 5. *C. ruber*, thorace sulcato, femoribus clavatis rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 2. mant. inf. 1. p. 166. n. 4.*  
*Habitat in America boreali.*
- caeruleus. 6. *C. niger*, thorace sulcato, elytris striatis caeruleis, abdomine rufo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 166. n. 3.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 2. p. 6. n. 2. t. 1. f. 5. 6.*  
*Habitat in Germania, depresso major.*
- fulcatus. 7. *C. niger*, thorace sulcato, elytris crenato-striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 165. n. 2.*  
*Habitat in Croatiae ligno putrescente, elongatus, mediae magnitudinis.*
- depressus. 8. *C. thorace denticulato elytrisque rufis, pedibus simplicibus nigris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 257. n. 1. mant. inf. 1. p. 165. n. 1.*

F F F F F F 4

Syst.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 647. n. 1. Cantharis (fanguinolenta) supra rubra, elytris bimarginatis.

*Frisch inf.* 13. c. 24. 3. t. 7. f. 1.

*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 2. p. 4. n. 1. t. 1. f. 1-4.

*Habitat in Germania et Russia, lampyridi sanguineae affinis.*

quadra- 9. *C. niger*, thorace quadrato posterius dentato, medio tuberculato, margine externo rugoso, anterieus elevato, antennis fuscis, pedibus simplicibus elytrisque testaceis.

*Mus. Lesk. p. 29. n. 629. b.*

*Habitat in Europa.*

rufus. 10. *C. rufescens*, mandibulis validis, antennis, palpis pedibusque nigris, capite gibboso, elytris molliusculis. *Swederus nov. act. Stockb.* 8. 1787. 3. n. 3. 21.

*Habitat in Sumatra.*

macula- 11. *C. fordide flavus*, thorace quadrangulo inaequali, mandibulis validis, pedibus, elytrorumque maculis subquadratis nigris. *Swederus nov. act. Stockb.* 8. 1787. 3. n. 3. 22. t. 8. f. 8.

*Habitat in Noveboraco, congenerum maximus, subdepressus.*

208. CANTHARIS. *Antennae filiformes.*

*Thorax (plerisque) marginatus, capite brevior.*

*Elytra flexilia.*

*Abdominis latera plicato-pappilosa.*

\* *palpis quatuor securiformibus.*

viridescens. 1. *C. thorace testaceo*: macula nigra, elytris viridibus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 167. n. 3.

*Habitat ad caput bonae spei, magna, capite nigro, pectore fusco, abdomine testaceo.*

fusca. 2. *C. thorace rubro*: macula nigra, elytris fuscis. *Fn. suec.* 700.\* *It. oel.* 38. *Scop. ent. carn.* 120. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 257. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 167. n. 1.

*Raj.*

*Cantharides declaratae aliis visitant insectis, sola lymexyli tribus, tum larva, tum imago, ligno recenti.*

*Raj. inf. p. 84. n. 29. et p. 101. n. 2.* Cantharis sepiarius major, elytris nigricantibus.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 170. n. 1. t. 2. f. 8.* Cicindela elytris nigricantibus &c.

*Degeer inf. 4. p. 60. n. 1. t. 2. f. 12.* Telephorus fuscus.

*Podá inf. 40. n. 4.*

*Frisch inf. 12. 3. t. 6. f. 5.*

*Sulz. hist. inf. t. 5. f. 33.*

*Schaeff. elem. t. 123. f. 1. 2.*

*ic. t. 16. f. 10. et t. 26. f. 9-12.*

*Habitat frequens in Europae sepibus, rapacissima, in propriam speciem saeviens.*

marginel- 73. C. testacea, abdomine nigro marginato capite posteriori  
la. pectore oculisque flavis. *Mus. Lesk. p. 29. n. 631.*  
*Habitat in Europa.*

media. 74. C. fusca, thorace, capite, antennarum basi, abdominis  
margine et apice pedibusque rufis. *Mus. Lesk. p. 29. n. 632.*  
*Habitat in Europa.*

haemato- 75. C. nigra, ore abdomineque rufo. *Mus. Lesk. p. 29. n. 633.*  
stoma. *Habitat in Europa.*

punctata. 76. C. livida, oculis truncoque fuscis, abdominis segmentis  
utrinque puncto fusco. *Mus. Lesk. p. 29. n. 638.*  
*Habitat in Europa.*

dichroa. 77. C. nigra, fronte, thorace, abdomine pedibusque rufis.  
*Mus. Lesk. p. 29. n. 639.*  
*Habitat in Europa.*

multico- 78. C. capite nigro, fronte thoraceque luteis, elytris fuscis,  
lor. abdomine pedibusque lividis. *Mus. Lesk. p. 29. n. 640.*  
*Habitat in Europa.*

livens. 79. C. thoracis macula nigra posteriori triloba, utrinque pun-  
ctis duobus impressis fuscis, capite posteriori nigro, elytris  
fuscis. *Mus. Lesk. p. 30. n. 642.*  
*Habitat extra Europam.*

distincta. 80. C. nigra, maxillis thoracis abdominisque marginibus ex-  
ternis lividis. *Mus. Lesk. p. 30. n. 643.*  
*Habitat in Europa.*

exult. 81. C. fusca, capite thoraceque nigris, elytris testaceis apice  
exultis, antennis pedibusque luteis. *Mus. Lesk. p. 30. n. 644.*  
*Habitat in Europa.*

- livida. 3. *C. tota testacea.* *Fn. suec.* 701.\* *Scop. ent. carn.* 122. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 258. n. 2. *mant. inf.* p. 167. n. 2.  
*Raj. inf.* p. 84. n. 28. *Cantharis fepiarius major e rufo flavicans.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 171. n. 2. *Cicindela thorace rubro immaculato &c.*  
*Degeer inf.* 4. p. 70. n. 2. *Thelephorus flavus.*  
*Habitat in Europa et boreali America.*
- rufa. 4. *C. tota rufa, epigastrio alisque nigris.* *Fn. suec.* 703.\*  
*Habitat in Europa.*
- obscura. 5. *C. thoracis marginibus rubris, corpore nigro.* *Fn. suec.* 706. *Act. nidrosf.* 3. p. 396. t. 6. f. 5. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 258 n. 3. *mant. inf.* 1. p. 167. n. 4.  
*Schaeff. ic.* t. 16. f. 8.  
*Habitat in Europa, thoracis margine aliquando fuscescente, pedibus interdum rubris, fuscae similis, at duplo minor.*
- limbata. 20. *C. fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 258. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 167. n. 5.  
*Habitat in Jamaica, mediae magnitudinis.*
- lateralis. 6. *C. thorace rubro, corpore fusco, elytris margine exteriori flavescens.* *Fn. suec.* 707.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 258. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 167. n. 6.  
*Habitat in Europa boreali.*
- smaragdula. 22. *C. thorace flavo: macula viridi, elytris viridibus nitidis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 259. n. 6.  
*Habitat in Brasilia, mediae magnitudinis.*
- biguttata. 11. *C. thorace medio atro, elytris abbreviatis nigris apice flavis.* *Fn. suec.* 712.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 261. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 24.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 176. n. 11. *Cicindela fusca, elytris apice flavis, thorace fusco.*  
*Degeer inf.* 4. p. 77. n. 10. *Thelephorus niger, femoribus flavis, elytris apice luteis.*  
*Habitat in Europae nemoribus, hortis.*
- minima. 12. *C. thorace rufo: macula nigra, corpore fusco, elytris apice flavis.* *Fn. suec.* 713.\* *Scop. ent. carn.* 128. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 260. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 168. n. 22. *Lesk. it. p.* 47. t. A. f. 14.



*Fn. suec.* 598.\* *Necydalis elytris* apice puncto flavo.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 176. n. 10. *et.* p. 372. t. 7. f. 2. *Necydalis elytris* puncto flavo.  
*Habitat in Europae hortis.*

cardiaca. 13. *C. thorace* submarginato, corpore atro, antennis pectinatis, elytris apice puncto sanguineo. *Fn. suec.* 720.\*  
*Habitat in Europae leonuro cardiaca.*

albicans. 14. *C. thorace* orbiculato, margine luteo, corpore nigro, fronte flava.  
*Habitat in Germania, statura c. cardiaca, magnitudine pediculi, tibiis anterioribus anterieus flavis.* Forskähl.

testacea. 15. *C. thorace* flavo: macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis. *Fn. suec.* 714.\* *Scop. ent. carn.* 123.  
*F. br. sp. inf.* I. p. 261. n. 19. *mant. inf.* I. p. 168. n. 23.  
*Fn. suec.* 593. *Cantharis nigra*, elytris lividis.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 173. n. 6. b. *Cicindela nigra*, thoracis margine flavo &c.  
*Degeer inf.* 4. p. 71. n. 4. *Thelephorus niger*, thorace rufescente &c.  
*Schaeff. ic. t.* 52. f. 8.  
*Habitat in Europae hortis.*

atra. 16. *C. corpore* toto atro. *Fabr. sp. inf.* I. p. 259. n. 7. *mant. inf.* I. p. 167. n. 8.  
*Habitat in Europa boreali.*

marginata. 23. *C. nigra*, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 259. n. 8. *mant. inf.* I. p. 167. n. 9.  
*Habitat in America.*

bimaculata. 25. *C. thorace* ferrugineo: macula nigra, elytris testaceis: macula apicis nigra. *Fabr. sp. inf.* I. p. 259. n. 9. *mant. inf.* I. p. 167. n. 10.  
*Habitat in America septentrionali, nigra.*

pallipes. 28. *C. atra*, elytris pallidis apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 259. n. 10. *mant. inf.* I. p. 167. n. 11.  
*Habitat in Germania, statura atrae.*

pallida. 29. *C. atra*, elytris pedibusque pallide testaceis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 167. n. 12.  
*Habitat Kilonii, parva.*

- ruficollis. 30. *C. atra*, thorace abdomineque rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 259. n. 11. mant. inf. I. p. 168. n. 13.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 6.*  
*Habitat in Anglia.*
- flavipes. 31. *C. testacea*, capite thoracis macula media elytrisque dimidiato nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 259. n. 12. mant. inf. I. p. 168. n. 14.*  
*Habitat in Sina, magna.*
- melanocephala. 32. *C. testacea*, capite elytrorum apicibus tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 260. n. 13. mant. inf. I. p. 168. n. 15.*  
*Habitat in Coromandel, magna.*
- bipunctata. 33. *C. thorace punctis duobus nigris, elytris testaceis apice nigris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 260. n. 14. mant. inf. I. p. 168. n. 16.*  
*Habitat Lipsiae.*
- angulata. 34. *C. testacea*, thorace angulato spinoso, elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 168. n. 17.*  
*Habitat in oceani australis insula Amsterdam, statura et magnitudine melanurae.*
- nigra. 35. *C. pubescens*, corpore nigro. *Fabr. mant. inf. I. p. 168. n. 20.*  
*Scop. ent. carn. 131. Cantharis pilosa.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 564. n. 28. Fn. suec. 439. Dermestes (niger) oblongus pilosus niger, elytris molliusculis.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 71. n. 5. Anobium nigrum.*  
*Habitat frequens in Europae floribus.*
- pulicaria. 36. *C. thorace rufo: macula nigra, elytris atris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 260. n. 17. mant. inf. I. p. 168. n. 21.*  
*Habitat in Germania, atra.*
- canescens. 37. *C. thorace luteo, epigastrio elytrisque obscure cinereis.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 302.*  
*Habitat gregaria Halae Saxonum, in betulis, quercubus, Majo et Junio conspicua, fuscae affinis.*
- coccinea. 38. *C. thorace rubro: macula nigra, corpore nigro, elytris sanguineis.* *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 303.*  
*Habitat rarior Halae Saxonum, bipustulatae affinis.*

- bicolor. 39. *C. lutea*, elytris dimidiato-caeruleis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 81.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glaberrima, statura et magnitudine melanurae.*
- bilineata. 40. *C. thorace flavo*: macula punctisque quatuor fuscis, elytris flavis: linea fusca. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 81.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine testaceae.*
- trilineata. 41. *C. thorace flavo*: maculis duabus nigris, elytris flavis: linea futuraque nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 82.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine testaceae.*
- Altica. 42. *C. thorace rufo*, elytris violaceis immaculatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 82.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine et statura pulicariae, glaberrima, violacea, pedibus rufescentibus.*
- oculata. 43. *C. thorace flavo*: punctis duobus nigris, elytris corporeque cyaneis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 83.*  
*Habitat - - - bipustulata paulo minor, capite pedibusque flavis, elytris interdum violaceis.*
- collaris. 44. *C. thorace sanguineo*: macula nigra, elytris cyaneis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 83.*  
*Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nigra.*
- cuprea. 45. *C. subtus cyanea*, supra acnea. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 83.*  
*Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nitida, pilosa.*
- argentea. 46. *C. thorace plano elytrisque viridibus*, abdomine fericeo-argenteo. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 84.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine et facie fuscae, capite nigro, ano pedibusque luteis, tarsis fuscis.*
- janthina. 47. *C. thorace flavo*: macula punctisque quatuor fuscis, elytris viridibus. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 84.*  
 β) *Cantharis antennis flavis*: extremis tribus articulis fuscis.  
 γ) *Cantharis thoracis macula fusca*, posterius bifida, punctum nigrum includente.  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine et facie fuscae, pectore oculisque nigris, capite, antennis, abdomine pedibusque flavis.*
- americana. 48. *C. thorace flavo*: macula nigra, elytris flavis: macula apicis orientali oblonga nigra. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 50. n. 50.*  
*Habitat in Novboraco, fuscae magnitudine, nigra, antennis fuscis.*

- rufipes. 49. *C. capite thoraceque rubris immaculatis, pedibus fulvis: posterioribus apice nigris. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 107. n. 2.*  
*Habitat Berolini, fuscae affinis, sed minor.*
- berolinenfis. 50. *C. nigra, antennis basi elytrisque flavescens: his apice nigris, pedibus ferrugineis. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 108. n. 10.*  
*Habitat Berolini, lividae affinis, sed minor.*
- fulva. 51. *C. fulva, capite, elytris et antennis dimidiato nigris. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 108. n. 11.*  
*Habitat Berolini, fuscae similis, sed quadruplo minor.*
- ferrata. 18. *C. flavescens, elytris striatis: fasciis tribus nigris, antennis ferratis.*  
*Habitat in America, antennis nigris, longitudine corporis; an hujus generis?*
- tropica. 19. *C. thorace lateribus rubro, elytris nigris: fascia alba, antennis pectinatis. Mus. Lud. Ulr, 80.\* Gron. zool. 515. t. 14. f. 7.*  
*Habitat in America australi, an hujus generis?*
- fonchi. 52. *C. atra, elytris fimbria lineaque longitudinali intermedia albis. Lepechin it. 1. p. 264.*  
*Habitat in Sibiriae foncho; an hujus tribus?*
- caspica. 53. *C. viridis, elytris maculis duabus apicis flavis rhombeis. Lepechin it. 1. t. 16. f. 11.*  
*Habitat ad mare caspium, parva; an hoc referenda?*
- flaveola. 54. *C. subtus flava, capite antennisque nigris, thorace ferrugineo: maculis duabus fuscis, elytris ex luteo fuscis apice flavis. Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. p. 171. n. 12.*  
*Habitat Berolini, biguttatae affinis.*
- violacea. 21. *C. violacea, thorace teretiusculo, antennis pectinatis, femoribus anterioribus crassissimis dentatis.*  
*Habitat in Guinea, dermestis magnitudine, ano pedibusque ferrugineis.*
- virescens. 24. *C. thorace teretiusculo, corpore virescenti-fusco, femoribus posterioribus clavatis.*  
*Habitat in Europa, antennis nigris, elytris trilineatis.*

- lepturoi- 55. *C. lutea*, thorae convexo, elytrorum apice corporeque  
des. nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 81.*  
*Habitat ad caput bonae spei, melanurae affinis, magnitudine lividae.*
- nigripes. 56. *C. lutea*, thorace rotundato, abdomine, pedibus elytrorum-  
que apicibus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 260. n. 15. mant.*  
*inf. 1. p. 168. n. 18.*  
*Habitat in Europa boreali, etiam Calabria, melanurae pro-*  
*xime affinis, an satis a lepturoide distincta?*
- melanu- 27. *C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris.*  
ra. *Fn. suec. 719.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 260. n. 16. mant. inf.*  
*1. p. 168. n. 19.*  
*Raj. inf. p. 84. n. 27. Cantharis sepiarius, elytrorum api-*  
*cibus nigris.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 173. n. 5. Cicindela rubra &c.*  
*Schaeff. ic. t. 16. f. 14.*  
*Habitat in Europae borealis.*
- Histrion. 82. *C. nigra*, thorace, antennarum basi, abdominis segmen-  
torum basi posteriori pedibusque luteis, thoracis macula  
fulca. *Mus. Lesk. p. 30. n. 645.*  
*Habitat in Europa.*
- picca. 83. *C. picea*, thorace posteriori utrinque puncto rubro, anten-  
narum basi pedibusque luteis, femoribus basi atris. *Mus.*  
*Lesk. p. 30. n. 646.*  
*Habitat in Europa.*
- chalybea. 84. *C. nigro-violacea pubescens. Mus. Lesk. p. 30. n. 648.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 85. *C. nigra*, elytris dimidio nigris, apicem versus albis, fun-  
mo apice geniculisque luteis. *Mus. Lesk. p. 30. n. 649.*  
*Habitat in Europa.*

\*\* *palpis filiformibus: articulo ultimo setaceo, Malachii.*

- aenea. 7. *C. corpore viridi-aeneo, elytris extrorsum undique rubris.*  
*Fn. suec. 703.\* Scop. ent. carn. n. 126. Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 261. n. 1. mant. inf. 1. p. 169. n. 1.*  
*Degeer inf. 4. p. 73. n. 6. t. 2. f. 16. 17. Thelephorus*  
*aeneus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 174. n. 7. Cicindela viridi-aenea,*  
*elytris extrorsum rubris.*

*Raj.*

*Raj. inf. p. 77. n. 12.*  
*Schaeff. monogr. 1754. t. 2. f. 10. 11.*  
*icon. t. 18. f. 12. 13.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 5.*

*Habitat in Europae plantis, tentaculis duobus obtusis sanguineis basi connatis ad basin abdominis aliisque duobus ad apicem thoracis exserendis instructa, aliquando minor, elytris totis sanguineis.*

bipustula-8. *C. aeneo-viridis, elytris apice rubris. It. ocl. 127. Fn. ta. fuc. 709.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 262. n. 2. mant. inf. 1. p. 169. n. 2. Scop. ent. carn. n. 127.*

*Raj. inf. p. 101. n. 7. Cantharis vix  $\frac{3}{4}$  unciæ longa.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 175. n. 8. Cicindela aeneo-viridis, elytris apice rubris.*

*Degeer inf. 4. p. 75. n. 7. Thelephorus viridi-aeneus nitidus.*

*Schaeff. ic. t. 18. f. 10. 11. t. 19. f. 14.*

*Habitat in Europa frequens.*

haemor-86. *C. nigra, thorace elytrorumque apicibus rubris. Mus. rhoidalis. Lesk. p. 30. n. 660.*

*Habitat in Europa.*

viridis. 57. *C. aeneo-viridis, ore flavescente. Fabr. mant. inf. 1. p. 169. n. 3.*

*Habitat in Scania, statura et magnitudine bipustulatae.*

sanguino-58. *C. nigro-aenea, thoracis margine elytrisque sanguineis. lenta. Fabr. mant. inf. 1. p. 169. n. 4.*

*Habitat Kilonii, statura aeneae, sed duplo minor.*

cyanea. 59. *C. cyanea, thorace abdomineque rubris. Fabr. mant. 1. p. 169. n. 5.*

*Habitat in Hispaniae umbellatis, statura sanguinolentae.*

pedicula-9. *C. atra, elytris apice rubris. Fn. fuc. 710.\* Fabr. sp. inf. ria. 1. p. 262. n. 3. mant. inf. 1. p. 169. n. 6.*

*Habitat in Europae hortis, pediculo paulo major.*

nemora-60. *C. nigra, thorace margine, elytrisque apice rubris. Fabr. lis. sp. inf. 1. p. 262. n. 4. mant. inf. 1. p. 169. n. 7.*

*Habitat Kilonii in nemoribus.*

10. C.

*An ad primam tribum referendi Thelephori Schaefferi bifasciatus ic. t. 105. f. 9. a. 9. b. et bipunctatus ic. t. 41. f. 15. 16.*

- fasciata. 10. *C. thorace subrotundo virescente, elytris nigris: fasciis duabus rubris. En. suec. 711.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 262. n. 5. mant. inf. 1. p. 169. n. 8. Raj. inf. p. 102. n. 22. Cantharis valde exigua, Geoffr. inf. par. 1. p. 177. n. 12. Cicindela clytris nigris: fasciis duabus rubris. Degeer inf. 4. p. 76. n. 9. Schaeff. ic. t. 189. f. 3. Habitat in Europae muscis.*
- equestris. 61. *C. viridi-aenea, clytris rubris: fascia viridi-aenea. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 500. n. 6. mant. inf. 1. p. 169. n. 9. Habitat in Italia, statura et magnitudine fasciatae.*
- ochropus. 62. *C. nigra, antennarum basi tibiisque flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 169. n. 10. Habitat Halae Saxonum, parva nitida.*
- chryso- 63. *C. thorace rubro immarginato, elytris cyaneis laevibus, meloides. antennis pedibusque nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 17. n. 30. Habitat Lutetiis, magnitudine pediculi majoris, tacta sub pectore caput et corpus contrahens et libera celerrime fugiens.*
- caeruleo- 64. *C. thorace rubro, immarginato, elytris fuscis, capite anterius rubro, posterius ex caeruleo nigro. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 18. n. 31. Habitat circa Holmiam, magnitudine testaceae, laterali similis, sed angustior et minor.*
- succica. 65. *C. thorace flavo immarginato: punctis duobus nigris, elytris flavescens apice nigris. Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 18. n. 32. Habitat in Suecia, melanurae affinis, lividae magnitudine, statura lepturae; an cum 63 et 64 hujus tribus?*
- Herbstii. 66. *C. elytris rubris: macula nigricante. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 108. n. 4. Habitat Berolini, fasciatae magnitudine.*
- erythro- 67. *C. nigra, thoracis margine elytrisque rubris, segmentis melas. abdominis tribus margine fulvis. Herbst apud Fuesli arch. 5. p. 108. n. 5. Habitat Berolini, 3 fere lineas longa.*

\*\*\* *palpis anterioribus porrectis : articulo penultimo appendice magna ovata fissa aucto, ultimo arcuato acuto, Lymexyla.*

- abbreviata. 68. *C. nigra*, thoracis linea dorsali, elytris brevissimis fornicatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 164. n. 1.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, speciebus hujus tribus major, elongata.*
- proboscidea. 69. *C. nigra*, elytris testaceis apice nigris, palpis hamato-irregularibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 256. n. 4. mant. inf. I. p. 165. n. 2.*  
*Habitat in Germaniae lignis.*
- barbata. 70. *C. fusca*, antennis tibiisque piceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 165. n. 3.*  
*Schaller Abb. der ball. Naturf. Gef. I. p. 322. t. I. f. 7.*  
*Mordella (barbata) fusca, palpis ensiformibus trilobis: lobis lateralibus latissimis.*  
*Schaeff. ic. t. 279. f. 7. a. b.*  
*Habitat in Germaniae lignis, proboscideae affinis, tomento aureo fugaci nitens.*
- navalis. 26. *C. thorace teretiufculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. Fn. suec. 718.\* It. wgoth. 153. t. 2.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 256. n. 3. mant. inf. I. p. 165. n. 4.*  
*Frisch inf. 13. p. 24. t. 20.*  
*Schaeff. ic. t. 59. f. I.*  
*Habitat in ligno querno, quod destruit.*
- saxonica. 71. *C. nigro*, elytris basi, abdomine apice pedibusque flavis. *Fabr. mant. I. p. 165. n. 5.*  
*Habitat in Saxoniae ligno, statura et magnitudine navalis.*
- morio. 72. *C. nigra*, pedibus anterioribus flavis. *Fabr. mant. inf. I. p. 165. n. 6.*  
*Habitat in Saxoniae lignis, saxonica duplo major.*



SERROPALPUS. *Antennae fetaceae.*

*Palpi* quatuor inaequales; anteriores longiores profunde ferati: articulis quatuor; ultimo maximo, truncato, compresso apice patelliformi; posteriores subclavati.

*Thorax* marginatus, anterius caput excipiens: angulo utrinque prominente.

*Caput* deflexum.

*Pedes* fossorii.

fstriatus. 1. S. corpore fusco, elytris striatis. *Hellenius nov. act. Stockh.* 1786. 4. p. 273. t. 8. f. 3-5.

*Habitat in insulae Runälalae aedificiis ligneis vetustis, autumno vespere ad parietes conspicuus, elatere aterrimo vix major.*

laevigatus. 2. S. corpore atro, elytris laevibus. *Hellenius act. Stockh.* 1786. 4. p. 280.

*Syst. nat.* XII. 2. p. 656. n. 37. *Fn. suec.* 742.\* Elater (buprestoides) thorace caput recipiente, antennis pectinatis, corpore toto nigro.

*Fabr. mant. inf.* 1. p. 175. n. 55. Elater (buprestoides) cylindricus niger immaculatus, capite retracto.

*Habitat in Europa.*

209. ELATER. *Antennae filiformes.*

*Palpi* quatuor securiformes.

*Corpus* dorso impositum exfliens mucrone pectoris e foramine abdominis resiliente.

flabellicornis. 1. El. fuscus, antennarum fasciculo flabelliformi. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 651. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 171. n. 1.

*Drury inf.* 3. t. 47. f. 1.

Gggggg 2

*Habitat*

*Habitat in India, inter maximos hujus generis, antennis brevibus, a tertio inde articulo ingenti ex 8 lamellis conflato flabello ornatis.*

- fascicula- 37. El. thorace murino, elytris pallidis fusco-undatis, antenarum fasciculo flabellicorni. *Fabr. mant. inf. 1. p. 171. n. 2.*  
*Habitat in America, aeneo paulo major, murinus, antennis nigris.*
- speciosus. 2. El. albus, lineis punctis maculisque nigris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 2. mant. inf. 1. p. 171. n. 3.*  
 Elater albus nigro-maculatus.  
*Habitat in India, noctiluco major. Bränniche.*
- luridus. 39. El. cinereo-tomentosus, elytris substriatis, plantis fuscis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 3. mant. inf. 1. p. 171. n. 4.*  
*Habitat in Coromandel, magnus.*
- oculatus. 3. El. thorace ocellis binis atris: iridibus albis, corpore nigricante. *Mus. Lud. Ulr. 81.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 4. mant. inf. 1. p. 171. n. 5.* Elater thorace ocellis duobus atris, corpore nigro albo-maculato.  
*Degeer inf. 4. p. 159. n. 1. t. 17. f. 28.* Elater niger, thorace maculis binis ovatis villosis aterrimis.  
*Petiv. gaz. t. 10. f. 4.* Scarabaeus elasticus major, capite bimaculato.  
*Alt. angl. 246. p. 396. n. 13. et 271. p. 842. n. 32.*  
*Habitat in America meridionali.*
- fuscus. 40. El. thorace ocellis binis atris, corpore nigro immaculato.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 5. mant. inf. 1. p. 171. n. 6.*  
*Habitat in America.*
- caecus. 41. El. ater, thorace maculis duabus ocellaribus, elytris strigis duabus arcuatis punctoque posteriore ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 6. mant. inf. 1. p. 172. n. 7.*  
*Habitat in Africa.*
- noctilucus. 4. El. thoracis lateribus macula flava glabra. *Mus. Lud. Ulr. 82.\* Gron. zooph. 474.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 7. mant. inf. 1. p. 172. n. 8.*  
*Degeer inf. 4. p. 160. n. 2. t. 18. f. 1.* Elater fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra convexa nitida.  
*Brown jam. 432. t. 44. f. 10.* Elater major fuscus phosphoricus.

Sloan.

Sloan. *jam.* 2. p. 206. t. 237. f. 1. Scarabaeus medius fuscus &c.

Mouff. *inf.* 112. Cocujus.

*Habitat in America meridionali, thoracis ocellis lampyridum et fulgorarum more, noctu, ut fertur, pro arbitrio lucem tantam spargens, ut lecturo sufficiat; abdomen diffractum intus lucet.*

- phosphoreus. 5. El. fuscus, thorace posterius maculis duabus flavis glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 266. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 172. n. 9. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 110. n. 1. t. 27. f. 2. *Degeer inf.* 4. p. 161. n. 3. t. 18. f. 2. Elater fusco-caltaneus. *Habitat in America meridionali, noctilucis affinis, at duplo minor, quamvis europaeis speciebus multo major; thoracis maculis noctu pariter lucentibus.*
- ignitus. 42. El. fuscus, thorace nigro: margine flavo. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 172. n. 10. *Habitat in Cayenna, phosphoreo minor.*
- fuscipes. 43. El. ater, antennis pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 266. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 172. n. 11. *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 110. n. 3. t. 27. f. 4.  $\beta$ ) Elater elytris crenato-striatis. *Mus. Lesk.* p. 31. n. 684. *Habitat in India,  $\beta$ ) in Europa.*
- rubiginosus. 44. El. nigricans griseo maculatus, thoracis limbo elytrorumque macula magna pallidis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 172. n. 12. *Habitat in Sierra Leon Africae, magnus.*
- porcatus. 6. El. viridi-aeneus, elytris sulcatis: fulcis villosis-albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 266. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 172. n. 15. *Syst. nat.* XII. 2. p. 652. n. 6. Elater fuscus elytris nigris porcatis: fulcis elevatis glabris. *Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 7. *Drury inf.* 3. t. 47. f. 6. *Habitat in America meridionali, europaeis speciebus major, pectoris sutura atra nitida.*
- ligneus. 7. El. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. *Amoen. acad.* 6. p. 395. n. 24. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 266. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 172. n. 13. *Gron. zooph.* 477? Elater testaceus, thorace antice truncato, elytris pollice acuminatis. *Habitat in America meridionali.*

- fulcatus. 45. El. villoso-albidus, elytris striis tribus elevatis glabris atris.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 266. n. 13. mant. inf. 1. p. 172. n. 16.*  
*Habitat in America meridionali.*
- virens. 46. El. villoso-viridis, antennis ferratis nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 172. n. 17.*  
*Habitat in insulis Americae oppositis, statura porcati.*
- striatus. 8. El. niger opacus, elytris striatis: striis subpubescentibus, ano villoso.  
*Gron. zooph. 475. Elater virefcens, elytris atris sulcis albis striatis, ano barbato.*  
*Habitat Surinami, magnitudine fere oculati.*
- bipustulatus. 9. El. niger nitidus, elytris puncto baseos nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 243. n. 47. mant. inf. 1. p. 175. n. 59.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 136. n. 15. Elater niger, elytrorum basi maculis rubris.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 27. f. 8.*  
*Habitat in Germaniae graminosis, mediae magnitudinis.*
- brunneus. 10. El. thorace rufo medio nigro, elytris corporeque ferrugineis. *Fn. suec. 721. Fabr. sp. inf. 1. p. 271. n. 34. mant. inf. 1. p. 173. n. 38.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 112. n. 17. t. 27. f. 6.*  
*Habitat in Europae hortis.*
- lyriacus. 11. El. thorace rufo, elytris fascia duplici alba, corpore nigro.  
*Mus. Lud. Ulr. 83.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 269. n. 22. mant. inf. 1. p. 173. n. 26.*  
*Habitat in Oriente. Hasselquist.*
- cruciatus. 12. El. thorace nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis: cruce margineque nigris. *Fn. suec. 722.\* Gadd sat. 27. Fabr. sp. inf. 1. p. 268. n. 21. mant. inf. 1. p. 173. n. 25. Geoffr. inf. par. 1. p. 133. n. 6. Degeer inf. 4. p. 149. n. 9. Sultz. hist. inf. t. 6. f. 10.*  
*Habitat in Europae graminosis.*
- linearis. 13. El. thorace rufo medio fusco, elytris testaceis linearibus.  
*Fn. suec. 723.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 269. n. 25. mant. inf. 1. p. 173. n. 29.*  
*Fn. suec. 1. n. 582. Elater thorace rubro, elytris griseis.*  
*Uddm. diff. 46. Elater canthariformis niger, ano rufo, elytris ex rufo pallide fuscis striatis.*

Degeer

*Degeer inf. 4. p. 154. n. 17.*

*Pontopp. atl. dan. t. 16.*

*Habitat in Europa boreali.*

- ruficollis. 14. El. niger, thorace posterius rubro nitido. \**Fn. suec. 724.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 33. mant. inf. 1. p. 173. n. 37.*  
*Fn. suec. 576.* Elater niger, thorace rubro.  
*Scop. ent. carn. 290.* Elater gramineus.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 132. n. 5.*  
*Degeer inf. 4. p. 153. n. 16.*  
*Raj. inf. p. 92. n. 8.*  
*Schaeff. ic. t. 31. f. 3.*  
*Habitat in Europae graminosis.*
- lineatus. 15. El. niger, elytris obscure lividis fusco sublineatis.  
*Habitat in Germania, mediae magnitudinis, antennis sub-*  
*ferrugineis.*
- mefome- 16. El. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore  
 las. elytrisque nigris. *Fn. suec. 725.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 270.*  
*n. 31. mant. inf. 1. p. 173. n. 35.*  
*Habitat in Europa boreali, lineato paulo major, larva hexa-*  
*pus filiformis duriuscula, caudae scuto corneo lateribus*  
*dentato, subtus tuberculo conico pediformi tubuloso, in*  
*ligno putrescente.*
- thoraci- 47. El. niger, thorace toto rufo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 270.*  
 cus. *n. 32. mant. inf. 1. p. 173. n. 36.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 132. n. 5.* Elater niger, thorace rufo.  
*Habitat prope Hemly Anglorum, ruficollis affinis.*
- aterri- 17. El. thorace atro nitido, elytris striatis nigris. *Fabr. sp.*  
 mus. *inf. 1. p. 267. n. 14. mant. inf. 1. p. 172. n. 18.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 653. n. 17. Fn. suec. 726.\* Uddm. diff. 45.*  
 Elater ater, thorace opaco punctato, elytris striatis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 136. n. 13.* Elater totus niger nitidus.  
*Habitat in Europa boreali.*
- casta- 18. El. thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris,  
 neus. corpore atro. *Fn. suec. 727.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 269.*  
*n. 23. mant. inf. 1. p. 173. n. 27.*  
*Degeer inf. 4. p. 153. n. 15.* Elater flavo-peñtinicornis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 132. n. 4.*  
*Raj. inf. p. 192. n. 6.*

*List. loqu.* 387.

*Schaeff. ic. t. II. f. 9. et t. 31. f. 4.*

*Habitat in Europae campis.*

- virescens. 48. El. thorace viridi: fulco medio, elytris flavis mucronatis: apice macula virescenti-nigra oblonga. *Schranck Schr. der berl. Naturf. Fr. 2. p. 317.*  
*Scop. ent. carn. n. 286. Schranck inf. austr. n. 237.* Elater castaneus.  
*Poda mus. p. 41. n. 1.* Elater pectinicornis.  
*Habitat in Austria et Carniolia, viridi-aeneus.*
- livens. 19. El. niger, thorace glaberrimo rubro, elytris testaceis.  
*Fn. suec. 728.\* Fabr. sp. inf. I. p. 269. n. 24. mant. inf. I. p. 173. n. 28.*  
*Schaeff. ic. t. II. f. 8.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- ferrugineus. 20. El. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracisque margine posteriore nigris. *Fn. suec. 729.\* Fabr. sp. inf. I. p. 266. n. 11. mant. inf. I. p. 172. n. 14.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 130. n. 1. t. 2. f. 4.* Elater thorace elytrisque rubris.  
*Schaeff. ic. t. 19. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- haemato- 48. El. niger, thorace pubescente fulvo, elytris fanguineis.  
 des. *Fabr. sp. inf. I. p. 271. n. 35. mant. inf. I. p. 173. n. 39.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 9.* Elater fanguineus.  
 β) Elater thorace nigro. *Schaeff. ic. t. 2. f. 6.*  
*Habitat in Germania et Calabria.*
- fanguineus. 21. El. ater, elytris fanguineis. *Fn. suec. 731. Scop. ent. carn. 287. Fabr. sp. inf. I. p. 271. n. 36. mant. inf. I. p. 173. n. 40.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 131. n. 2. Degeer inf. 4. p. 151. n. 13.*  
 Elater niger, elytris rubris.  
*Schaeff. el. t. 60. f. 2.*  
*ic. t. 31. f. 7.*  
*Berg str. nomencl. t. 10. f. 10.*  
*Habitat in Europae graminosis, elytrorum summo apice nigro.*
- balteatus. 22. El. niger, elytris anterius dimidiato rufis. *Fn. suec. 732.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 271. n. 37. mant. inf. I. p. 174. n. 41.*  
*Degeer inf. 4. p. 152. n. 14.*

*Raj. inf. p. 78. n. 23.*  
*Schaeff. ic. t. 77. f. 2.*  
*Habitat in Europae arvis.*

- elongatus. 49. El. ater, elytris testaceis apice nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 174. n. 42.*  
*Habitat in Austria, balteato proxime affinis.*
- melanocephalus. 50. El. fanguineus, capite, thoracis linea dorsali elytrorum-que apice nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 272. n. 38. mant. inf. I. p. 174. n. 43. Thunberg nov. inf. sp. 3.*  
*Habitat in Coromandel et ad caput bonae spei, balteato paulo minor, ceterum ejusdem staturae.*
- marginatus. 23. El. thorace subfusco, elytris testaceis: margine undique nigro. *Fn. succ. 733.\* Fabr. sp. inf. I. p. 270, n. 30. mant. inf. I. p. 173. n. 34.*  
*Aët. nidros. 3. p. 16. t. 6. f. 6.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- sputator. 24. El. thorace fusco nitido, elytris testaceis, corpore nigro. *Fn. succ. 734.\* Scop. ent. carn. 285. Fabr. sp. inf. I. p. 272. n. 39. mant. inf. I. p. 174. n. 44.*  
*Degeer inf. 4. p. 151. n. 11. Elater fuscus flavipes.*  
*Schaeff. ic. t. 19. f. 11.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- pilosus. 51. El. fuscus cinereo-subvillosus, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 174. n. 45. Lesk. it. I. p. 11. n. 1. t. A. f. 1.*  
*Habitat in Lusatae montibus, parvus.*
- pallipes. 52. El. fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf. I. p. 172. n. 46.*  
*Habitat Tranquebariae parvus.*
- fuscicus. 53. El. niger, elytris lineatis fuscis. *Fabr. sp. inf. I. p. 272. n. 40. mant. inf. I. p. 174. n. 47.*  
*Habitat in Sueciae graminosis.*
- minutus. 34. El. thorace atro nitido, elytris nigris. *Fn. succ. 744.\* Fabr. sp. inf. I. p. 272. n. 41. mant. inf. I. p. 174. n. 48.*  
*Habitat in Europa plantis, parvus, niger, immaculatus.*
- limbatus. 54. El. thorace atro nitido, elytris testaceis limbo nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 272. n. 42. mant. inf. I. p. 174. n. 49. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 64.*  
*Habitat Kilonii et ad caput bonae spei.*

Gggggg 5

55. EL

- advena. 55. El. ater, elytris striatis pedibusque obscure cinereis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 174. n. 50.*  
*Habitat prope Bilertam Hispaniae, parvus.*
- marginellus. 56. El. thorace nigro: margine ferrugineo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 372. n. 43. mant. inf. 1. p. 174. n. 51.*  
*Habitat in Germania, limbato simillimus, at paulo major.*
- obscurus. 25. El. piccus thorace elytrisque obscure nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 269. n. 26. mant. inf. 1. p. 173. n. 30.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 655. n. 25. Fn. suec. 735.* Elater thorace fusco obscuro, elytris obscure testaceis.  
*Habitat frequens in Europae borealis plantis.*
- flavipes. 57. El. thorace obscure nigro, elytris striatis fuscis, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 27. mant. inf. 1. p. 173. n. 31.*  
*Habitat in insulis Americae oppositis.*
- filiformis. 58. El. ex cinereo fuscus immaculatus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 28. mant. inf. 1. p. 173. n. 32.*  
*Habitat in Italia, filiformis, obscuro duplo minor.*
- tristis. 26. El. thorace atro nitido, elytris basi margineque exteriori lividis. *Fn. suec. 736.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 270. n. 29. mant. inf. 1. p. 173. n. 33.*  
*Schaeff. ic. t. 194. f. 1.*  
*Habitat in Europae ligno putrescente.*
- fasciatus. 27. El. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus: fascia alba undulata. *Fn. suec. 737.\* Scop. ent. carn. 281.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 17. mant. inf. 1. p. 173. n. 21.*  
*Habitat in Europae hertis.*
- murinus. 28. El. thorace obscure cinereo, elytris cinereo nebulosis, plantis rufis. *Fn. suec. 738.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 15. mant. inf. 1. p. 172. n. 19.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 135. n. 10.* Elater niger, elytris villoso-murinis.  
*Degeer inf. 4. p. 150. n. 10.* Elater rufipes.  
*Schaeff. ic. t. 4. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- testellatus. 29. El. thorace obscure aeneo, elytris aeneis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris. *Fn. suec. 739.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 16. mant. inf. 1. p. 173. n. 20.*  
*Geoffr.*



- Geoffr. inf. par. 1. p. 135. n. 9.* Elater niger villosus-undatus.
- Degeer inf. 4. p. 148. n. 7.* Elater rufus-unguiculatus.
- Scop. ent. carn. 282.* Elater thoracicus.
- Gadd Sat. 80.* Elater niger, pilis miniatis flavo-aeneis junctim intermixtis.
- Schaeff. ic. t. 4. f. 7.*
- Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. III. n. 7. t. 22. f. 5.*
- Habitat in Europae hortis, scutello pallido.*
- germanus. 30. El. thorace elytrisque atro-caeruleis, corpore toto pedibusque nigris. *Fn. suec. 730.\**
- Scop. ent. carn. 279. Schranck inf. austr. p. 183. n. 340?*
- Elater nitens.
- Sulz. hist. inf. t. 6. f. 8.* Elater latus.
- Habitat in Europa, an mera aenei varietas?*
- aeneus. 31. El. thorace elytrisque aeneis, antennis nigris simplicibus.
- Fn. suec. 740.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 267. n. 18. mant. inf. 1. p. 173. n. 22.*
- Fn. suec. 578.* Elater viridi-aeneus, pedibus fulvis.
- Degeer inf. 4. p. 149. n. 8.* Elater aeneus rufipes.
- Act. Nidros. 3. t. 4. f. 6.*
- β) Elater fulcus latior. *Mus. Lesk. p. 31. n. 681.*
- Habitat in Europae nemoribus.*
- pectinicornis. 32. El. thorace elytrisque aeneis, antennis maris pectinatis.
- Fn. suec. 741. Fabr. sp. inf. 1. p. 268. n. 19. mant. inf. 1. p. 173. n. 23. Scop. ent. carn. 278.*
- Fn. suec. 575. Geoffr. inf. par. 1. p. 133. n. 7.* Elater fulco-aeneus.
- Degeer inf. 4. p. 145. n. 2. t. 5. f. 3.* Elater aeneo-pectinicornis.
- Raj. inf. p. 92. n. 7.*
- List. angl. p. 387. n. 19.*
- Pod. inf. t. 1. f. 4.*
- Sulz. hist. inf. t. 5. f. 36.*
- Schaeff. el. t. 11. f. 1. et t. 60. f. 3. ic. t. 2. f. 4.*
- Bergstr. nomencl. 1. t. 13. f. 11.*
- Habitat in Europae nemoribus.*
- cupreus. 59. El. cupreus, elytris dimidiato flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 268. n. 20. mant. inf. 1. p. 173. n. 24.*
- Schaeff. ic. 1. t. 38. f. 2.*

*Habitat*

*Habitat in Anglia, antennis nigris pectinatis, rarius simplicibus.*

- niger. 33. El. thorace laevi, elytris pedibus corporeque nigris. *Fiz. succ. 743.\**  
*Fiz. succ. 577.* Elater totus nigro-fuscus.  
*List. mut. t. 17. f. 14.*  
*Raj. inf. p. 92. n. 1. 2. 3.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 134. n. 8.*  
*Scha. ff. ic. t. 174. f. 4.*  
 β) Elater nigricans. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 114. n. 33.*  
*Habitat in Europa, β) dimidio minor.*
- nitidulus. 60. El. ater, elytris striatis: maculis duabus, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 174. n. 52.*  
*Habitat in Cayenna, pulchello triplo minor.*
- pulchellus. 35. El. capite thoraceque atris, elytris nigris, maculis flavicantibus, pedibus flavis. *Fiz. succ. 745.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 272. n. 44. mant. inf. 1. p. 175. n. 53.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 112. n. 22. t. 27. f. 7. a.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- sexguttatus. 61. El. laevis ater, elytris punctis tribus albis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 65. f. 75.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 175. n. 54.*  
*Habitat ad caput bonae spei, minimus, nitidus.*
- tetrastrichon. 36. El. niger luteo-maculatus, elytris maculis confluentibus, abdomine quadrifariam punctato.  
*Habitat in Africa, mediae magnitudinis.*
- dermestoides. 38. El. subvillosus cinereus, elytris striatis, capite retracto. *Fabr. mant. inf. 1. p. 175. n. 56.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 656. n. 38. n. 38.* Elater subpubescens subfuscus, antennis subelavatis.  
*Habitat in Suecia, dermestis facie, parvus.*
- notatus. 62. El. thorace rufo nigro bimaculato, elytris basi rufis, apice nigris: maculis duabus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 273. n. 45. mant. inf. 1. p. 175. n. 57.*  
*Habitat in Coromandel, parvus, statura pulchelli.*
- festivus. 63. El. thorace ferrugineo, elytris atris: fasciis duabus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 273. n. 46. mant. inf. 1. p. 175. n. 58.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 64. f. 74.*  
*Habitat in Africa, magnitudine balteati.*

64. El.

- deustus. 64. El. testaceus, linea thoracis elytrorumque posterius ramosa nigra. *Thunb. nov. inf. spec. 3. p. 64.*  
*Habitat in Zeylona, melanocephalo duplo minor, tenuissime pubescens.*
- clavicornis. 65. El. viridis, antennis clavatis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 65.*  
*Habitat in India, pecticorni major, glaberrimus, nitens, an hujus generis?*
- ustulatus. 66. El. niger, elytris testaceis posterius fuscescentibus, antennis pedibusque castaneis. *Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 303.*  
*Schaeff. ic. t. 199. f. 8.*  
*Habitat - - - magnitudine castanei, facie balteati.*
- giganteus. 67. El. depressus, elytris viridi-aeneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 304 t. 1. f. 5.*  
*Habitat in America buprestis facie.*
- indicus. 68. El. niger, thorace convexo punctato: margine fulvo, medio lineato, elytris atris punctato-striatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 110. n. 2. t. 27. f. 3.*  
*Habitat in America, phosphoreo minor, et angustior.*
- carbonarius. 69. El. ater atro-farinosus: punctis minutissimis albis interjectis, antennis ferratis. *Schranck inf. austr. p. 184. n. 343.*  
*Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 1. Elater punctatus.*  
*Habitat in Germania.*
- undulatus. 70. El. niger flavo-undulatus pubescenti-nitens. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 111. n. 8.*  
*Schaeff. ic. t. 4. f. 7.*  
*Habitat in Germania.*
- caeruleus. 71. El. chalybeus, antennis nigris simplicibus, pedibus ex atro fuscis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 111. n. 10.*  
*Habitat Berolini, aeneo proxime affinis.*
- sanguinolentus. 72. El. ater, elytris sanguineis: margine interiori macula magna ovata atra communi. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 69. §. 16. t. 3. f. 15. inf. austr. p. 184. n. 341. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 112. n. 24. t. 27. f. 9.*  
*Habitat in Germania, an mera sanguinei varietas?*

73. El.

- purpureus. 73. *El. niger*, thorace atro: vellere raro purpureo, elytris purpureis: lineis duabus elevatis. *Schranck inf. austr. p. 187. n. 350.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 113. n. 25. t. 27. f. 10.*  
*Habitat in Aultria, sanguineo affinis, at magis depressus.*
- quercinus. 74. *El. fuscus*, capite thoraceque granulatis: villis flavis undulatis, elytris fascia flavo-villosa. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 113. n. 26. t. 27. f. 11.*  
*Habitat in Ungaria et Germania, in quercu.*
- erythropus. 75. *El. niger*, elytris flavicanti-villosis, punctato-striatis, pedibus antennarumque articulis margine spadiceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 113. n. 28. t. 27. f. 12.*  
*Habitat Berolini.*
- hirtus. 76. *El. nirenti-niger pubescens*, thorace punctato, elytris striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 114. n. 30.*  
*Habitat Berolini, magnitudine erythropodis, at paulo latior.*
- vulgaris. 77. *El. niger*, elytris fuscis punctato-striatis: sutura nigra, pedibus pallidis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 114 n. 32.*  
*Habitat Berolini.*
- griseus. 78. *El. obscure griseus*, thorace convexo, elytris punctato-striatis, subtus nigris, antennis pedibusque fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 114. n. 34.*  
*Habitat Berolini.*
- cinereus. 79. *El. niger pubescenti-canus*, thorace convexo, tarsis ferrugineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 114. n. 35.*  
*Habitat Berolini, magnitudine et statura grisei.*
- equiseti. 80. *El. niger*, thorace convexo, elytris striatis, pedibus flavicentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 114. n. 36.*  
*Habitat Berolini, 3 lineas longus, statura cinerei.*
- pulverulentus. 81. *El. niger virescenti-aureo irroratus*, elytris striatis, tibiis intus crispo-pilosis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 172. n. 38. t. 48. f. 1.*  
*Habitat in America, inter maximos hujus generis.*
- socialis. 82. *El. fuscus*, antennis elytrorumque marginibus ferrugineis. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1067. n. 9.*  
*Habitat in Lusitania, magnitudine peñnicornis.*

- ferraticor- 83. *El. fuscus*, abdomine supra pedibusque fulvis. *Scop. ent. carn. n. 280.*  
nis. *Habitat in Carniola.*
- monta- 84. *El. villosulus niger nitens*, antennis basi tibiisque fulvis.  
nus. *Scop. ent. carn. n. 283.*  
*Fuessli Verz. schw. Inf. p. 17. n. 334.*  
*Habitat in Carnioliae et Helvetiae montibus.*
- degener. 85. *El. niger aureo punctatus variegatus*, thorace posterius  
dentato. *Scop. ent. carn. n. 292.*  
*Habitat in Carniola.*
- subfuscus. 86. *El. niger*, elytris fuscis, abdomine rubro. *Müll. zool. d'an.*  
*prodr p. 59. n. 538.*  
*Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. n. 169.*  
*Habitat in Dania.*
- seelandi- 87. *El. ex purpureo aeneus griseo-villosus*, elytris striato-  
cus. punctatis nebulosis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 61. n. 550.*  
*Fn. Fridrichsd. p. 17. n. 170.*  
*Habitat in Seelandia Daniae.*
- sexmacu- 88. *El. niger griseo-villosus*, thoracis margine elytrisque te-  
latus. litaceis: maculis sex subfuscis glabris. *Müll. Fn. Fridrichsd.*  
*p. 17. n. 171. zool. dan. prodr. p. 60. n. 544.*  
*Habitat in Dania.*
- obtusus. 89. *El. corpore obtuso subtus nigro*, thorace nigro, elytris fuscis  
griseo-villosis, antennis rufis. *Degeer inf. 4. p. 147.*  
*n. 5. t. 5. f. 19.*  
*Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. n. 172. zool. dan. prodr. p. 60.*  
*n. 540. Elater badius.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- pullus. 90. *El. niger nitidus pubescens*, elytris punctatis, pedibus  
brunneis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 59. n. 537.*  
*Habitat in Dania.*
- chryso- 91. *El. niger*, thorace rubro fulcato, elytris tarsisque flavis.  
melinus. *Müll. zool. dan. prodr p. 60. n. 539.*  
*Habitat in Dania.*
- lugubris. 92. *El. supra ater*, opacus, subtus niger. *Müll. zool. dan.*  
*prodr. p. 60. n. 545.*  
*Habitat in Dania.*

- Mülleri. 93. *El. rufus pubescens*, pedibus luteis. *Müll. zool. dan. prodr.*  
p. 61. n. 551.  
*Habitat in Dania.*
- tubercula- 94. *El. niger opacus*, thorace bituberculato, clytris laevissime  
tus. striatis, punctis ferrugineis. *Pontopp. hist. nat. Dan. p.*  
208. n. 13. t. 16.  
*Habitat in Dania, magnitudinis pectinicornis.*
- gracilis. 95. *El. testaceus*, capite thoraceque linea longitudinali, macu-  
la laterali atra, clytris laevissimis, margine atro. *Gron. mus.*  
1. p. 153. n. 478.  
*Habitat in America.*
- guineen- 96. *El. viridi-acneus*, thorace subpubescente, antennis nigris,  
sis. clytris striatis. *Gron. mus.* 2. p. 153. n. 476. —  
*Habitat in Guinea.*
- fimbria- 97. *El. niger*, thoracis margine rubro, clytris ad futuram li-  
tus. neis duabus longitudinalibus flavis interruptis. *Lepechin*  
*it.* 1. p. 311. t. 16. f. 12.  
*Habitat in deserto Sibiriae Uralensi.*
- auratus. 98. *El. viridi-aureus*, pedibus nigris. *Drury inf.* 2. p. 65.  
t. 35. f. 3.  
*Habitat in Sina.*
- histrion. 99. *El. niger*, clytris flavis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 131. n. 3. *Elater nigro-flavus.*  
*Habitat in Gallia.*
- vittatus. 100. *El. niger*, clytris fuscis: fascia longitudinali fulva.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 135. n. 11. *Elater bicolor.*  
*Ruf. inf.* p. 78. n. 13.  
*Habitat in Gallia.*
- fuscatus. 101. *El. niger*, clytris fuscis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 136. n. 12. *Elater bicolor.*  
*Habitat in Gallia.*
- discolor. 102. *El. niger* pedibus rufis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 136. n. 14. *Elater rufipes.*  
*Habitat in Gallia.*
- mela- 103. *El. rufus*, oculis nigris. *Degeer inf.* 4. p. 144. n. 1. t.  
nophthal- 5. f. 18.  
mos. *Habitat in Succia, pollicem longus.*

- major. 104. El. nigro-fuscus nitidus, pedibus fusco-castaneis, abdomine supra rubente. *Degeer inf. 4. p. 146. n. 3.*  
*Habitat in Europa, magnus.*
- minor. 105. El. elongatus capite thoraceque nigris, elytris antennis pedibusque fuscis. *Degeer inf. 4. p. 147. n. 4.*  
*Habitat in Europa, inter minores.*
- inaequalis. 106. El. niger: maculis villosis griseis, elytris scabris, thorace cavitatibus impressis. *Degeer inf. 4. p. 148. n. 6.*  
*Habitat in Europae arboribus, magnus.*
- undatus. 107. El. griseo-marinus villosus, elytris fasciis tribus undulatis transversis nigris. *Degeer inf. 4. p. 155. n. 18. t. 5. f. 26.*  
*Habitat in Europa, 7 lineas longus.*
- maculosus. 108. El. capite nigro, thorace rufo: maculis tribus oblongis nigris, elytris fuscescentibus. *Degeer inf. 4. p. 158. n. 19.*  
*Habitat in Europa, minor.*
- nitidus. 109. El. nigro-viridi-aeneus nitidus, pedibus nigris. *Degeer inf. 4. p. 159. n. 21.*  
*Habitat in Europa, pusillus.*
- piceus. 110. El. totus ater nitidus, elytris laevissimis. *Degeer inf. 4. p. 162. n. 4. t. 18. f. 3.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longus.*
- lividus. 111. El. pallide fusco-rufescens antennis rufis, pedibus flavo-testaceis. *Degeer inf. 4. p. 162. n. 5. t. 18. f. 4.*  
*Habitat in Pennsylvania, dimidium pollicem longus.*
- ochropus. 112. El. nigro-fuscus, pedibus antennisque flavo-testaceis. *Degeer inf. 4. p. 163. n. 6. t. 18. f. 5.*  
*Habitat Surinami, 4½ lineas longus.*
- maculatus. 113. El. obscure testaceus, thorace anterieus nigro, elytris maculis binis irregularibus nigris. *Degeer inf. 4. p. 163. n. 7. t. 18. f. 6.*  
*Habitat Surinami, 3 modo lineas longus.*
- segetis. 114. El. niger, antennis tarsisque fuscis, elytris lineis longitudinalibus nigris fuscisque. *Bjerkand act. Holm. 1779. 4. n. 4. p. 254. t. 10. f. 1. - 3.*  
*Habitat in Succiae segetis radicibus, agros larva devastante, praesertim siccos, tardam subeunte metamorphosin.*

Hhhhhh

115. El.

- dubius. 115. *El. viridi-aeneus*, thorace pedibusque nigris. *Mayer Abh. boehm. Gesf. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiae pratis, grani oryzae magnitudine, an propria species?*
- punctatus. 116. *El. elongatus fuscus*, thorace punctato, elytris crenato-striatis, ore pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 671.*  
*Habitat in Europa.*
- dichrous. 117. *El. niger*, thorace linea longitudinali, elytris basi fulcatis apicem versus complanatis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 673.*  
*Habitat in Europa.*
- pubescens. 118. *El. piceus pubescens*, elytris striatis, plantis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 674.*  
*Habitat in Europa.*
- villosus. 119. *El. fuscus cinereo-villosus*, elytris laevissime striatis, antennis pedibusque rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 31. n. 682.*  
*Habitat in Europa.*
- crenatus. 120. *El. niger*, elytris crenato-striatis punctatisque, pedibus testaceis. *Mus. Lesk. p. 31. n. 683.*  
*Habitat in Europa.*
- ambiguus. 121. *El. niger*, elytris rufo-testaceis striatis, plantis testaceis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 688.*  
*Habitat - - - -*
- lineolatus. 122. *El. niger*, thoracis linea longitudinali, elytris crenato-striatis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 689.*  
*Habitat in Europa.*
- longicornis. 123. *El. niger*, elytris obsolete striatis, antennis longis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 690.*  
*Habitat in Europa.*
- concolor. 124. *El. fuscus*, thorace punctato, elytris levissime striatis, antennis pedibusque rufo-fuscis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 691.*  
*Habitat in Europa.*
- variabilis. 125. *El. fuscus flavo-villosus*, pedibus rufis, elytris levissime striatis: maculis fuscis incerta directione lucis inconspicuis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 693.*  
*Habitat in Europa.*



- rubigine- 126. El. ferrugineus, thorace fusco punctato, elytris crenato-  
us. striatis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 694.*  
*Habitat in Europa.*
- villosus. 127. El. fusco-ferrugineus griseo-villosus, thorace pectoreque  
fulcis, elytris levissime striatis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 695.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 128. El. ferrugineus, capite thoraceque fusco, hujus margini-  
bus externis, elytris punctato-striatis, antennis pedibus-  
que testaceis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 696.*  
*Habitat in Europa.*
- haemo- 129. El. niger, elytris sanguineis: futurae macula communi  
pterus. oblonga picea. *Mus. Lesk. p. 32. n. 697.*  
*Habitat in Europa.*
- crassipes. 130. El. niger, elytris levissime striatis, femoribus crassis.  
*Mus. Lesk. p. 32. n. 699.*  
*Habitat in Europa.*
- acupun- 131. El. testaceus, thoracis dorso fuscescente, elytris striatis:  
ctatus. striis punctis distinctis impressis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 701.*
- gibbus. 132. El. fuscus griseo-villosus, elytris levissime striatis thora-  
ceque gibbis, antennis pedibusque fusco-ferrugineis. *Mus.*  
*Lesk. p. 32. n. 698.*  
*Habitat in Europa.*
- pubes. 133. El. ater pubescens, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 32.*  
*n. 702. 703.*  
*Habitat in Europa.*
- cineraf- 134. El. testaceus cinereo-villosus, thorace fuscescente, pe-  
cens. dibus rufis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 704.*  
*Habitat in Europa.*
- bicolor. 135. El. fusco-ferrugineus, capite thoraceque fuscis, elytris stri-  
atis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 705.*  
*Habitat in Europa.*
- quadrisul- 136. El. niger, elytris obsolete striatis, basi sulcis quatuor  
cus. impressis, antennis longis tibiis plantisque antisis fusco-fer-  
rugineis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 706.*  
*Habitat in Europa.*

- strigosus. 137. El. testaceo-fuscus, clytris striatis, pedibus testaceis.  
*Mus. Lesk. p. 32. n. 708.*  
β) Elater clytris fusciscentibus versus apicem, clytris totis testaceis. *Mus. Lesk. p. 32. n. 707.*  
*Habitat in Europa.*
- futuralis. 138. El. fuscus, thoracis margine ferrugineo, clytris testaceis: futura fusca. *Mus. Lesk. p. 33. n. 711.*  
*Habitat in Europa.*
- dentatus. 139. El. thorace atro: macula utrinque dentibusque rubris, clytris testaceis: marginibus externis nigris. *Mus. Lesk. p. 33. n. 713.*  
*Habitat in Europa.*
- capucinus. 140. El. niger, clytris pedibus anticis tibiisque testaceis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 718.*  
β) Elater clytris apice fusciscentibus, pedibus testaceis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 714.*  
*Habitat in Europa.*
- gibbosus. 141. El. testaceus, thorace gibboso obscuro, clytris striatis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 720.*  
*Habitat in Europa.*
- foricinus. 142. El. murinus, thorace gibbo, clytris testaceis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 721.*  
*Habitat in Europa.*
- rufipes. 143. El. niger, clytris striatis, tibiis rufis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 723.*  
β) Elater clytris tibiisque rufiscentibus. *Mus. Lesk. p. 33. n. 722.*  
*Habitat in Europa.*
- funereus. 144. El. testaceus, clytris striatis, capite fusco. *Mus. Lesk. p. 33. n. 724.*  
*Habitat in Europa.*
- chalybeus. 145. El. nigro-aeneus nitidus, femorum anticorum basi tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 725.*  
*Habitat in Europa.*
- obscurus. 146. El. ferrugineus, capite thoraceque fuscis, hoc posterius, clytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 726.*  
*Habitat in Europa.*

- fuliginosus. 147. *El. piceus subpubescens*, antennis, pedibus elytrisque testaceis: his margine fuscis. *Mus. Lesk. p. 33. n. 728.*  
*Habitat in Europa.*
- pufillus. 148. *El. brunneus*, antennarum articulis tribus ultimis lamellatis, elytris levissime striatis pubescentibus. *Mus. Lesk. p. 33. n. 730.*  
*Habitat in Europa, statura dermestoidis, magnitudine pediculi.*
- Limbellus. 149. *El. thorace fordide flave: disco fusco, elytris striatis nigro-fuscis: margine omni flavescente.* *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787. 3. n. 3. 23.*  
*Habitat ad caput bonae spei, inter minores.*

210. CICINDELA. *Antennae setaceae.**Palpi sex filiformes: posteriores pilosi.**Mandibula prominens, multidentata.**Oculi prominuli.**Thorax rotundato-marginatus.**\* labio tridentato.*

- longicollis. 15. *C. cyanea*, thorace elongato cylindrico, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 185. n. 1.*  
*Habitat in Siam, magna, elongata.*
- grossa. 16. *C. nigra*, elytris acuminatis: maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 282. n. 1. mant. inf. 1. p. 185. n. 2.*  
*Habitat in Coromandel, maxima.*
- cyanea. 17. *C. cyanea nitida*, ore testaceo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 285. n. 3.*  
*Habitat in India, subtus nitidior, antennis fuscis.*
- bicolor. 18. *C. viridis nitida*, elytris obscure cyaneis immaculatis, abdominis margine testaceo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 283. n. 2. mant. inf. 1. p. 185. n. 4.*  
*Habitat in Italia, magnitudine et statura campestris.*

Hhhhhh 3

I. C.

- campe-  
trix. 1. *C. viridis*, elytris punctis quinque albis. *Fn. succ.* 746.\*  
*Scop. ent. carn.* 181. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 283. n. 3. *mant.*  
*inf.* 1. p. 185. n. 5.  
*Degeer inf.* 4. p. 113. n. 1. t. 4. f. 1. *Cicindela viridis ni-*  
*tida.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 153. n. 27. *Buprestis inauratus supra*  
*viridis &c.*  
*Mouff. inf.* 145. f. *infim.* *Cantharis quarta.*  
*Fonst. inf.* t. 15. *Cantharis Mouffeti minor quarta.*  
*List. loq.* 386. *mut.* t. 17. f. 12. *Scarabaeus viridis &c.*  
*Sulz. hist. inf.* t. 5. f. 37.  
*Schaeff. ic.* t. 34. f. 8 9. et t. 228. f. 3.  
*Bergstr. nomencl.* 1. p. 15. n. 8-11. t. 2. f. 8-II.  
*Habitat in Europae campis arenosis.*
- hybrida. 2. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulisque duabus albis.  
*Fn. succ.* 747.\* *Scop. ent. carn.* 183. *Fabr. sp. inf.* 1.  
p. 283. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 185. n. 6.  
*Degeer inf.* 4. p. 115. n. 3. t. 4. f. 8. *Cicindela maculata.*  
*Schaeff. elem.* t. 43.  
*icon.* t. 35. f. 10.  
*Bergstr. nomencl.* 1. p. 26. t. 4. f. 5.  
*Habitat in Europae sabulosis.*
- capen-  
sis. 3. *C. subaenea*, elytris albis: linea fusca triramosa. *Musf.*  
*Lud. Ulr.* 84.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 285. n. 10. *mant.*  
*inf.* 1. p. 186. n. 14.  
*Degeer inf.* 7. t. 47. f. 3.  
*Voet. coleopt.* t. 40. f. 5.  
*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 11.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. t. 27. f. 14?  
*Habitat ad caput bonae spei, et in Calabria.*
- germa-  
nica. 4. *C. cuprea*, elytris viridibus puncto lunulaque apicem albis.  
*Scop. ent. carn.* 182. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 285. n. 11. *mant.*  
*inf.* 1. p. 186. n. 15.  
*Schreb. inf.* 10. n. 5. *Cicindela obscurior viridis*, elytris pun-  
ctis quatuor lineolaque albis.

*Geoffr.*


---

*Cicindelae in locis petrosis, aridis, praesertim arenosis, habitant, insectorum alio-*  
*rum, larvarum quoque, etiam hirsutarum tigrides: larva mollis, alba, longa,*  
*hexapus, in foraminibus cylindricis sub terra latet, famelia prodicens insectis prae-*  
*terentibus inhians, mandibula forcipata arripiens, et in forcem trahens, in*  
*qua etiam declaratur.*

*Geoffr. inf. par. I. p. 155. n. 29.* Buprestis inauratus supra fulco-viridis, coleoptris punctis sex albis.

*Poda inf. 42. n. 3.*

*Gron. zooph. 167.*

*Habitat in Germaniae arenosis, campestri simillima, sed triplo minor, colore viridi, nigro et caeruleo varians.*

- tuberculata. 19. C. thorace fusco bituberculato, elytris fusco viridique variis: margine tridentato albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 285. n. 12. mant. inf. I. p. 186. n. 16.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- unipunctata. 20. C. subpurpurascens, labio elytrisque puncto albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 285. n. 13. mant. inf. I. p. 186. n. 17.*  
*Habitat in America.*
- sempunctata. 21. C. viridi-aenea, elytrorum disco obscuriore: punctis tribus albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 285. n. 14. mant. inf. I. p. 186. n. 18.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. t. 46. f. 1.*  
*Habitat ad littus Malabaricum.*
- quadrilineata. 22. C. viridi-aenea, elytris obscuris: margine lineaque media albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 285. n. 15. mant. inf. I. p. 186. n. 19.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 27. f. 15.*  
*Habitat in India, magnitudine sexpunctatae.*
- biramosa. 23. C. obscure aenea, elytrorum margine biramoso albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 286. n. 16. mant. inf. I. p. 186. n. 20.*  
*Thunb. nov. inf. sp. I. p. 26. f. 40.* Cicindela (tridentata) purpurascens-aenea, elytris linea marginati tridentata.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 115. n. 7. t. 27. f. 16.*  
*Habitat in India.*
- sexguttata. 24. C. viridis nitida, elytris punctis tribus marginalibus albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 286. n. 17. mant. inf. I. p. 186. n. 21.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 27. f. 17.*  
*Habitat in Virginia, labio superiori flavo.*
- Catena. 25. C. viridi-aenea, elytris albidis: punctis sex viridibus concatenatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 286. n. 18. mant. inf. I. p. 187. n. 22.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. t. 1. f. 41-43.* Cicindela viridi-aenea, elytris linea flava triramola.  
*Habitat in India.*

- marginata. 26. *C. viridis*, elytris margine fascia undata punctisque duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 23.  
*Habitat in Virginia.*
- octogutta. 27. *C. obscura*, elytris punctis quatuor disci lunulisque duabus marginalibus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 187. n. 24.  
*Habitat in America, parva.*
- trifascia. 28. *C. obscura*, elytris strigis tribus albis: secunda flexuosa. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 20. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 25.  
*Habitat in America, parva, subtus aenea nitida.*
- virginata. 5. *C. nitida*, ore antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 27.  
*Habitat in Virginia, carolinae similis, violacea.*
- carolina. 6. *C. viridis nitida*, elytrorum apicibus, ore, antennis pedibusque flavis. *Amoen. ac.* 6. p. 395. n. 23. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 286. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 26.  
*Gron. zooph.* 576.\*  
*Degeer inf.* 4. p. 120. n. 2. t. 17. f. 24.  
*Habitat in Carolina.*
- cayennensis. 29. *C. supra fusca*, subtus cyanea, ano tibiisque posterioribus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 187. n. 28.  
*Habitat in Cayenna, magnitudine carolinae.*
- aequinoctialis. 7. *C. flava*, elytris fasciis duabus nigris latis. *Antocn. ac.* 6. p. 395. n. 6. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 287. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 187. n. 29.  
*Habitat in Surinamo.*
- sylvatica. 8. *C. nigra*, elytris fascia undata punctisque duobus albis. *Fn. suec.* 748.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 284. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 185. n. 7.  
*Fn. suec.* 1. n. 549. *Cicindela atra*, coleoptris maculis sex fasciaeque albis.  
*Degeer inf.* 4. p. 114. t. 4. f. 7. *Cicindela supra nigra*, subtus viridis nitida &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 155. n. 28. *Buprestis inauratus supra fusco-viridis* &c.  
*Petiv. gazoph.* t. 50. f. 5.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf.* 5. t. 27. f. 13.  
*Habitat in Europae pinetis.*

- littoralis. 30. *C. obscure aenea*, elytris nigricantibus: punctis sex albidis; baseos lunato medio transverso. *Fabr. mant. inf. I. p. 185. n. 8.*  
*Habitat ad Barbariae littora, statura sylvaticae.*
- tristis. 31. *C. nigra*, elytris macula media flava. *Fabr. sp. inf. I. p. 284. n. 6. mant. inf. I. p. 186. n. 9.*  
*Habitat - - -*
- interrupta. 32. *C. elytris fuscis*: puncto baseos fasciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 284. n. 7. mant. inf. I. p. 186. n. 10.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- lunulata. 33. *C. nigra*, elytris lunulis duabus maculisque duabus albis: anteriore transversa. *Fabr. sp. inf. I. p. 284. n. 8. mant. inf. I. p. 186. n. 11.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine et statura hybridae.*
- lurida. 34. *C. obscura*, elytris punctis duobus lunulisque tribus albis: intermedia flexuosa. *Fabr. sp. inf. I. p. 284. n. 9. mant. inf. I. p. 186. n. 12.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- flexuosa. 35. *C. obscura* elytris punctis quatuor lunulisque tribus albis: intermedia flexuosa. *Fabr. mant. inf. I. p. 186. n. 13.*  
*Habitat ad Hispaniae littora, luridae proxime affinis.*
- maura. 9. *C. nigra*, elytris punctis sex albis: tertio et quarto parallelo. *Fabr. sp. inf. I. p. 287. n. 24. mant. inf. I. p. 187. n. 30.*  
*Habitat in Oriente, statura campestris, fronte alba.*
- japonica. 36. *C. violacea*, elytris basi, apice fasciaeque cupreis: punctis duobus fasciaeque luteis. *Thunb. nov. inf. sp. I. p. 25. f. 39.*  
*Habitat in Japonia, magnitudine sylvaticae, subtus e cyaneo et violaceo nitens.*
- sexnotata. 37. *C. capite virescente*, thorace rubro, elytris testaceis: maculis sex nigris. *Lepech. it. 2. p. 203. t. 10. f. 12.*  
*Habitat in Sibiriae fluviorum arena.*
- austriaca. 38. *C. viridis*, pectore abdominisque basi subtus rubro-aeneis, elytris margine aureo tenuissimo: punctis aliquot albis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 69. S. 17.*  
*Habitat in Aultria.*

- litterata. 39. *C. metallica* albo-villosa, elytris cupreis: punctis caeruleis striisque argenteis litteras aequantibus. *Sulz. hist. inf.* p. 55. t. 6. f. 12.  
*Fuessli Verz. schw. Inf.* p. 17. n. 338. *Cicindela arenaria*.  
*Habitat in Helvetiae arena.*
- danica. 40. *C. nigra* supra fusco-aenea, elytris striis lateralibus remotis: dorso speculifero. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 80. n. 865.  
*Müll. Fn. Friedrichsd.* p. 18. n. 178. *Cicindela orichalceica*, dorso speculifero.  
*Habitat in Dania.*
- punctata. 41. *C. nigra*, supra subaenea, elytris striatis: punctis impressis quatuor, pedibus flavo-fulcis. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 80. n. 867.  
*Müll. Fn. Friedrichsd.* p. 18. n. 179.  
*Habitat in Dania.*
- chinensis. 42. *C. subtus* caeruleo-violacea nitida, elytris viridibus: maculis nigris punctisque quatuor albis. *Degeer inf.* 4. p. 119. n. 1. t. 17. f. 23.  
*Habitat in Sina.*
- caerulea. 43. *C. caerulea* nitens, ore albo. *Pall. it.* 2. app. n. 65.  
*Habitat in desertis arenosis australibus ad Irtim Sibiriae positus, fugacissima.*
- gracilis. 44. *C. nigro-aenea*, elytris punctis duobus marginalibus albis: disco posteriori rubente. *Pall. it.* 2. app. n. 66.  
*Habitat in Sibiriae arena ad Sohulbam sita, congeneribus gracilior, pedibus longissimis tenuissimis.*
- ferruginea. 49. *C. ferruginea*, pedibus, elytris, capite thoraceque testaceis, hoc utroque posteriori, elytrorum fascia undata suturaque viridibus. *Mus. Lesk.* p. 34. n. 762.  
*Habitat in Europae aquis, coccinellae statura, capite posteriori bilobo, labio albo, maxillis nigris, thorace anteriori exciso, scutello nullo, elytro utroque striis punctatis 15, basi maculis 3 margine antico contiguis.*
- atrata. 45. *C. tota* atra opaca. *Pall. it.* 1. app. n. 42.  
*Habitat in Sibiriae lacu Inderienti, magnitudine et forma germanicae; an ex hac tribu?*

\*\* labio rotundato acuminato integro, Elaphri Fabricii.



- lateola. 46. *C. elytris* ex fusco viridi-aureis: margine laterali undique late lacteo. *Pall. it. 2. app. n. 41.*  
*Habitat in lacu Sibiriae Inderiensis; an huic tribui accensenda?*
- riparia. 10. *C. viridi-aenea*, elytris punctis latis excavatis. *Fn. succ. 741.\* It. oel. 38. 121. Fabr. sp. inf. 1. p. 287. n. 1. mant. inf. 1. p. 187. n. 1.*  
*Degeer inf. 4. p. 117. n. 4. t. 4. f. 9. Cicindela viridi-aenea maculis rotundis excavatis griseo-viridibus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 156. n. 30. Buprestis viridi-aeneus &c. List. loqu. 385. Scarabaeus parvus inauratus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 13.*  
*Schaeff. ic. t. 86. f. 4.*  
*Habitat in Europae humentibus, colore saepius varians.*
- flavipes. 11. *C. obscure aenea*, elytris subnebulosis, pedibus luteis. *Fn. succ. 750.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 287. n. 2. mant. inf. 1. p. 287. n. 2.*  
*Degeer inf. 4. p. 119. n. 6. Cicindela flavipes.*  
*Habitat in Europae borealis ripis, elytris punctatis.*
- rupestris. 12. *C. nigra*, coleoptris punctis duobus fasciaque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. p. 287. n. 3. mant. inf. 1. p. 188. n. 3.*  
*Habitat in Sueciae rupibus, frequentius sub lichenibus, pediculi majoris magnitudine.*
- quadri-  
maculata. 13. *C. nigra*, elytris fuscis: maculis duabus pallidis, tibiis rufis. *Fn. succ. 751.\**  
*Habitat in Europa.*
- aquatica. 14. *C. aenea nitida*, capite striato. *Fn. succ. 752.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 288. n. 4. mant. inf. 1. p. 188. n. 4.*  
*Schreb. inf. 6. Cicindela pusilla.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 157. n. 31. Buprestis fusco-aeneus. List. mut. t. 31. f. 13.*  
*Habitat ad Europae aquas, frequens.*
- femipun-  
ctata. 47. *C. aenea nitida*, elytris punctatis, dorso glaberrimo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 288. n. 5. mant. inf. 1. p. 188. n. 5.*  
*Degeer inf. 4. p. 118. n. 5. Cicindela striata.*  
*Habitat Halae Saxonum et Berolini.*
- biguttata. 48. *C. aenea*, elytris nitidis apice flavescens. *Fabr. sp. inf. 1. p. 288. n. 6. mant. inf. 1. p. 188. n. 6.*  
*Habitat ad Norwegiae aquas.*

211. BUPRESTIS. *Antennae* filiformes, ferratae, longitudine thoracis.

*Palpi* quatuor filiformes: articulo ultimo obtuso truncato.

*Caput* dimidium intra thoracem retractum.

- unidentata. 31. *B. elytris unidentatis aeneis: margine aureo. Fabr. sp. inf. 1. p. 273. n. 1. mant. inf. 1. p. 175. n. 1.*  
*Habitat* - - -
- bicolor. 32. *B. elytris acuminatis viridi-aeneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 273. n. 2. mant. inf. 1. p. 175. n. 2.*  
*Habitat in America meridionali.*
- gigantea. 1. *B. elytris bidentatis rugosis, thorace laevi, corpore inaurato. Mus. Lud. Ulr. 85.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 273. n. 3. mant. inf. 1. p. 176. n. 3.*  
*Degeer inf. 4. p. 134. n. 1. Buprestis gigantea.*  
*Scop. ann. hist. nat. 5. p. 108. n. 84. Mordella gigantea.*  
*Sloan. jarn. 2. p. 210. t. 236. f. 1. 2. Cantharis maxima, elytris cuprei coloris fulcatis.*  
*Grew mus. 165. t. 13. Cerambyx Indiae orientalis maximus.*  
*Petiv. gaz. t. 147. t. 16. 17.*  
*Merian. surin. t. 50. f. infim.*  
*Seb. mus. 3. t. 84. f. 12.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 38.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 1.*  
*Habitat in America et Asia.*
- vittata. 33. *B. elytris bidentatis punctatis: lineis elevatis quatuor, viridi-aenea: vitta lata aurea. Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n. 4. mant. inf. 1. p. 176. n. 4.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 14.*  
*Habitat in India.*
- fastuosa. 34. *B. elytris truncatis bidentatis punctato-friatis viridibus, dorso aureo. Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n. 5. mant. inf. 1. p. 176. n. 5.*  
*Habitat in America septentrionali.*

35. B.

---

*Larvae buprestis in ligno nidulantur.*

- punctatissima. 35. *B. elytris bidentatis cupreis: punctis violaceis numerosis.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 274. n. 6. mant. inf. I. p. 176. n. 6.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- berolinensis. 36. *B. elytris bidentatis viridi nigroque variis, ano tridentato.*  
*Fabr. mant. inf. I. p. 176. n. 7.*  
*Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 5. et apud*  
*Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 5.*  
*Pall. ic. inf. ross. 2. t. D. f. 10.*  
*Habitat in Germania, statura et magnitudine obscurae.*
- corusca. 37. *B. aenea nitidissima, elytris bidentatis apice abdomineque aureis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 176. n. 8.*  
*Habitat in Jamaica, vittata minor, antennis cyaneis.*
- decora. 38. *B. elytris truncatis bidentatis viridibus: vitta caerulefcente marginibusque aureis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 274. n. 7. mant. inf. I. p. 176. n. 9.*  
*Habitat in America.*
- lurida. 39. *B. obscura, elytris bidentatis, ano tridentato.* *Fabr. sp. inf. I. p. 274. n. 8. mant. inf. I. p. 176. n. 10.*  
*Habitat in America.*
- obscura. 40. *B. obscure aenea: punctis elevatis obscurioribus, elytris bidentatis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 274. n. 9. mant. inf. I. p. 176. n. 11.*  
*Habitat in America boreali, parva, subtus nitida, cuprea.*
- punctata. 41. *B. aenea, capite abdomineque testaceo-maculatis, elytris subbidentatis striatis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 176. n. 12.*  
*Habitat in Barbaria, mediae magnitudinis.*
- fasciata. 42. *B. elytris bidentatis viridi-aeneis apice cyaneis: fasciis duabus ferrugineis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 177. n. 13.*  
*Habitat in America boreali, magnitudine punctatae, viridi-aenea, antennis nigris.*
- cauca. 43. *B. obscure aenea immaculata, elytris bidentatis substriatis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 177. n. 14.*  
*Habitat in Barbaria, parva.*
- striata. 44. *B. elytris truncatis subbidentatis cupreis: lineis elevatis quatuor.* *Fabr. sp. inf. I. p. 274. n. 10. mant. inf. I. p. 177. n. 15.*  
*Habitat in Pennsylvania.*

- rutilans. 45. *B. elytris tridentatis viridibus nigro-maculatis: margine aureo.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n. 11. mant. inf. 1. p. 177. n. 16.*  
*Jacquin miscell. austr. 2. t. 23. f. 2.* Buprestis fastuosa.  
*Habitat in Austria.*
- octogut-tata. 2. *B. elytris fastigiatis muticis: maculis quatuor albis, corpore caeruleo.* *Fn succ. 753. it. scan. 23. Uddm. diff. 42.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 278. n. 32. mant. inf. 1. p. 180. n. 48.*  
*Buprestis elytris integris: maculis quatuor albis, corpore caeruleo.*  
*Degeer inf. 4. p. 132. n. 5. t. 4. f. 20.* Buprestis albo-punctata.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 126. n. 2.* Cucujus viridi-aeneus: punctis quatuor impressis.  
*Schaeff. ic. t. 31. f. 1. et. t. 204. f. 4.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 7. a. b.*  
 β) Buprestis sexpunctata? *Lepech. it. 2. t. 10. f. 10.*  
*Habitat in Europae nemoribus, β) in arena fluviorum Sibiriae.*
- ignita. 3. *B. elytris ferratis, thorace impresso, corpore inaurato, tibiis teretibus.* *Mus. Lud. Ulr. 86.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 274. n. 12. mant. inf. 1. p. 177. n. 17.*  
*Buprestis elytris dentatis, thorace impresso, corpore inaurato.*  
*Grew mus. 166. t. 13.* Beetle.  
*Kaempf. jap. 1. p. 132. t. 10. f. 7.*  
*Pet. gaz. t. 20. f. 8.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 14.*  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t. 28. f. 3.*  
*Habitat in America australi, India et Sina.*
- lineata. 46. *B. elytris truncatis subtridentatis nigro-aeneis: vittis duabus fulvis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 275. n. 13. mant. inf. 1. p. 177. n. 18.*  
*Habitat in America meridionali.*
- ocellata. 47. *B. viridi-nitens, elytris tridentatis: maculis duabus aureis ocellarique flava.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 275. n. 14. mant. inf. 1. p. 177. n. 19.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 15.*  
*Habitat in America australi et India.*
- aerofa. 48. *B. elytris tridentatis, corpore aeneo immaculato.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 275. n. 15. mant. inf. 1. p. 177. n. 20.*  
*Habitat in Coromandel, minor.*

- maculata. 49. *B. elytris tridentatis cyaneis flavo-maculatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 275. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 177. n. 21.  
*Habitat in Sibiria, mediae magnitudinis, subtus aenea, capite cyaneo.*
- maculosa. 50. *B. elytris truncatis striatis dentatis nigris: maculis quatuor flavis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 177. n. 22.  
*Deger inf.* 4. p. 137. n. 6. et *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. p. 118. n. 8. t. 28. f. 8. *Buprestis flavo-punctata.*  
*Habitat in Succia, mediae magnitudinis; capite et abdomine aeneo-nigro; pedibus et thorace nigris, hujus margine flavo.*
- stricta. 4. *B. elytris ferratis fulcatis, tibiis angulatis, abdomine glabro.* *Mus. Lud. Ulr.* 87.\*  
*Habitat in America australi, et India.*
- sternicornis. 5. *B. elytris ferrato-tridentatis, thorace punctato, sterno porrecto, corpore inaurato.* *Mus. Lud. Ulr.* 88.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 275. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 178. n. 23.  
*Buprestis elytris ferrato-tridentatis viridibus: punctis cinereis impressis, sterno porrecto conico.*  
*Grew mus.* 167. t. 13. *Carabus orientalis crassus.*  
*Mouff. inf.* 160. f. inf.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 7. t. 46. f. 2.  
*Habitat in India et America.*
- Chrysis. 51. *B. elytris ferrato-tridentatis castaneis, sterno conico porrecto.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 275. n. 18. *mant. inf.* 1. p. 178. n. 24.  
*Degeer inf.* 4. p. 136. n. 2. t. 17. f. 25. *Buprestis viridi aurata. &c.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. t. 28. f. 2.  
*Schroet. Abb. t. 2. f. 3. Buprestis splendida.*  
*Habitat in India, Sina, an satis distincta a sternicorni?*
- violacea. 52. *B. elytris, truncato-quadridentatis violaceis, corpore elongato cyaneo.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 178. n. 25.  
*Habitat in Sierra Leon Africae, immaculata.*
- aegyptiaca. 53. *B. elytris ferratis fulcatis, corpore depresso obscuro.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 276. n. 19. *mant. inf.* 1. p. 178. n. 26.  
*Habitat in Aegypto.*
- mariana. 6. *B. elytris ferratis longitudinaliter rugosis: maculis duabus impressis, thorace fulcato.* *Mus. Lud. Ulr.* 89.\* *Fr. succ.*

- fuc.* 754.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 276. n. 20. *mant. inf.* I. p. 178. n. 27.
- Fu. fuc.* 557. *Buprestis aeneo-nitida* supra cinerea, clyptis apice attenuatis.
- Degeer inf.* 4. p. 128. n. 1. z. 4. f. 18. *Buprestis nitida* supra fulco-aenea, subtus rubro-cuprea &c.
- Pet. gaz. t.* 2. f. 2. *Cantharis marianus*.
- Schaeff. ic. t.* 49. f. 1.
- *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. t. 28. f. 4.
- Habitat in Europa, et boreali America.*
- farinosa. 54. *B. clytris ferratis viridibus*: fulco abbreviato futurali impresso. *Fabr. sp. inf.* I. p. 276. n. 21. *mant. inf.* I. p. 178. n. 28.
- Habitat in nova Hollandia.*
- fulminans. 55. *B. aeneo nitidissima*, clytris ferratis apice aurcis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 178. n. 29.
- Habitat in India magna.*
- cyanipes. 56. *B. clytris ferratis striatis viridi-aeneis*, thorace plano caeruleo. *Fabr. mant. inf.* I. p. 178. n. 30.
- Habitat in America meridionali, marianae magnitudine.*
- modesta. 57. *B. clytris ferratis corpore obscurioribus*: maculis tribus impressis aureis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 276. n. 22. *mant. inf.* I. p. 178. n. 31.
- Habitat in Brasilia, farinosae magnitudine.*
- blanda. 58. *B. clytris attenuatis ferratis fulcatis viridi-aeneis*: fulcis cupreis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 276. n. 23. *mant. inf.* I. p. 178. n. 32.
- Habitat in America meridionali, mediae magnitudinis.*
- aurata. 59. *B. aurea*, clytris ferratis, thorace aeneo. *Fabr. mant. inf.* I. p. 178. n. 33.
- Habitat in America, magna.*
- tripunctata. 60. *B. clytris ferratis striatis cupreis punctis tribus impressis aureis*. *Fabr. mant. inf.* I. p. 179. n. 39.
- Habitat in America meridionali, statura blandae.*
- elegans. 61. *B. aenea nitida*, clytris ferratis, thoracis lineis duabus clytrorumque unica aureis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 277. n. 24. *mant. inf.* I. p. 179. n. 35.
- Habitat ad caput bonae spei.*

- chryso- 7. *B. elytris ferratis longitudinaliter fulcatis: maculis duabus*  
 stigma. *aureis impressis, thorace punctato. Fn. suec. 755.\* Fabr. sp. inf. I. p. 277. n. 26. mant. inf. I. p. 179. n. 39. Fn. suec. I. n. 556. Buprestis fulco-aenea, elytris maculis aeneis impressis. Degeer inf. 4. p. 129. n. 3. Buprestis fusca. Geoffr. inf. par. I. p. 135. n. 1. Cucujus aureus. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 39. Schacff. elem. t. 31. f. 2. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 28. f. 6. Habitat in Europa.*
- dorsata. 62. *B. obscure aenea, elytris ferratis, abdominis dorso aureo, ano bidentato. Fabr. mant. inf. I. p. 179. n. 38. Habitat in America meridionali, chrysofignate minor.*
- impressa. 63. *B. elytris ferratis laevibus aeneis: punctis tribus impressis. Fabr. sp. inf. I. p. 277. n. 27. mant. inf. I. p. 179. n. 40. Habitat in America australi et India, modestae affinis, at duplo minor.*
- ornata. 64. *B. elytris ferratis obscuris albo-maculatis. Fabr. sp. inf. I. p. 277. n. 28. mant. inf. I. p. 180. n. 41. Habitat in Pennsylvania.*
- taeniata. 65. *B. cinereo-villosa, elytris ferratis nigris: fasciis duabus ferrugineis. Fabr. mant. inf. I. p. 180. n. 42. Habitat in Europa magis australi, parva, antennis nigris.*
- cayennensis. 66. *B. viridi-aenea, elytris ferratis atris: fasciis tribus lineolae apicis viridibus, capite thoraceque fusco maculatis. Fabr. mant. inf. I. p. 180. n. 43. Habitat in Cayenna, parva, antennis nigris.*
- cylindrica. 67. *B. elytris ferratis striatis, thorace villosa, corpore cylindrico nigro. Fabr. sp. inf. I. p. 277. n. 29. mant. inf. I. p. 180. n. 44. Habitat in Oriente.*
- scabra. 68. *B. elytris integris, fronte fulcata, corpore scabro aureo. Fabr. sp. inf. I. p. 277. n. 30. mant. inf. I. p. 180. n. 45. Habitat in America australi et India.*
- Trochilus. 69. *B. aurea nitidissima, dorso elytris integris pedibusque viridibus. Fabr. sp. inf. I. p. 278. n. 31. mant. inf. I. p. 180. n. 46. Habitat in Austria.*

- decastig- 70. *B. elytris integris elevato-striatis fuscis: punctis quinque*  
ma. *flavis. Fabr. mant. inf. 1. p. 180. n. 47.*  
*Habitat in Aultria, statura chrysofignatis.*
- rustica. 8. *B. elytris striatis fastigiatis, thorace punctato. Fn. suec. 756.\**  
*Fn. suec. 1. n. 555. Buprestis viridi-aenea immaculata.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 40. mant. inf. 1. p. 181. n. 57.*  
*Buprestis elytris emarginatis striatis obscure aeneis.*  
*Degeer inf. 4. p. 130. n. 4. t. 4. f. 10. Buprestis violacea.*  
*Scop. ent. carn. n. 188. Mordella rustica.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 126. n. 3. Cucujus viridi-auratus*  
*oblongus.*  
*Schaeff. ic. t. 2. f. 1.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. p. 174. n. 28.*  
*Habitat in Europae nemoribus.*
- canalicu- 71. *B. obscura, elytris integris, abdomine subtus canaliculato*  
lata. *ano quadridentato. Fabr. mant. inf. 1 p. 181. n. 58.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magnitudine rusticae.*
- acumina- 72. *B. elytris integris attenuato-acuminatis obscuris, corpore*  
ta. *cupreo. Fabr. mant. inf. 1. p. 181. n. 59.*  
*Pall. ic. inf. ross. 2. t. D. f. 10.*  
*Habitat in Russia meridionali, statura rusticae.*
- plebeja. 73. *B. elytris emarginatis cupreis fusco maculatis. Fabr. sp.*  
*inf. p. 280. n. 41. mant. inf. 1. p. 182 n. 60.*  
*Habitat in India.*
- tranque- 74. *B. nigra obscura, elytris integerrimis, thorace macula base-*  
barica. *os utrinque impressa. Fabr. mant. inf. 1. p. 182. n. 61.*  
*Habitat Tranquebariae, statura rusticae.*
- lugubris. 75. *B. elytris integris obscuris nigro-scabris, corpore subtus*  
*cupreo. Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 42. mant. inf. 1. p.*  
*182. n. 62.*  
*Pall. ic. inf. ross. 2. t. D. f. 11. Buprestis oxyptera.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 28. f. 14.*  
*Habitat in Aultria et Ungaria.*  
*Feminae aculus brevis ferratus ani.*
- cariofa. 76. *B. atra, elytris integris: atomis albis, thorace varioloso.*  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 182. n. 63. Pall. it. 3. app. p. 708.*  
*n. 52. ic. inf. ross. 2. t. D. f. 6.*  
*Habitat in Russia magis australi, statura B. tenebrionis, at*  
*duplo major.*



- undata. 77. *B. viridi-aenea*, elytris integris apice obscuris: strigis undatis albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 182. n. 64.*  
*Habitat in Germania, B. rubi major.*
- austriaca. 9. *B. elytris striatis aeneis bidentatis*, capite thoraceque viridibus, abdomine violaceo.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 36. mant. inf. 1. p. 181. n. 53.*  
Buprestis elytris integris fulcatis aeneis, capite thoraceque viridibus.  
*Scop. ent. carn. n. 187. Mordella gigantea.*  
*Habitat Idriae, magnitudine rusticae.*
- sibirica. 78. *B. elytris integerrimis atris: vittis duabus cinereo-tomentosis impressis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 37. mant. inf. 1. p. 181. n. 54.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 11.*  
*Habitat in Sibiria, mediae magnitudinis, latiuscula, scabra, subtus cinereo-villosa.*
- splendens. 79. *B. elytris integris viridibus: margine omni aureo lineisque tribus elevatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 37. mant. inf. 1. p. 181. n. 55.*  
*Habitat in Sina.*
- fulca. 80. *B. subtus aenea, elytris integris obscure fuscis, abdomine punctis lateralibus fulvis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 279. n. 38. mant. inf. 1. p. 181. n. 56.*  
*Habitat ad caput bonae spei, fusca, magnitudine et statura splendidis.*
- aurulenta. 10. *B. elytris fastigiatis bidentatis viridibus margine corporeque auratis, thorace subpunctato.*  
*Habitat in Carolina, oblonga, angusta.*
- Tenebrionis. 11. *B. atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace vario-loso dilatato.* *Fn. suec. 761.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 43. mant. inf. 1. p. 182. n. 65.*  
*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 16.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 15.*  
*Habitat in Europa, Africa.*
- fascicularis. 12. *B. elytris integerrimis striatis: punctis fasciculato-villosis, corpore inaurato hirsuto.* *Mus. Lud. Ulr. 90.\* Gron. zooph. 493.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 278. n. 33. mant. inf. 1. p. 180. n. 49.*

*Seb. musf.* 2. p. 22. t. 20. f. 5. Scarabaeus amboinensis.

*Pet. gaz.* 4. t. 13. f. 5. Scarabaeus viridis aureus, pupillis pilis albis obtusis undique hirtus.

*Sulz. hist. inf.* t. 6. f. 4.

*Degeer inf.* p. 7. t. 47. f. 6.

*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. t. 28. f. 9.

*Habitat ad caput bonae spei, rarius nigra, fasciculis pilorum nunc flavis, nunc fulvis.*

variola-  
ris. 81. *B. elytris integris obscuris: punctis impressis numerosis, thorace carinato. Pall. it.* 1. p. 464. n. 37. *ic. inf. ross.* 2. t. D. f. 2. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 278. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 181. n. 50.

*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. t. 28. f. 10.

*Habitat in Russiae onopordo et echinopode, scabra, nigra, subtus hirta, magnitudine et statura fascicularis.*

Onopor-  
di. 82. *B. elytris integris cupreis: sulcis punctisque numerosis albo-villosis, thorace scabro. Fabr. mant. inf.* 1. p. 181. n. 51.

*Habitat in Hispaniae onopordo, aenea, nitida, albo-villosa, fasciculari paulo minor.*

hirta. 13. *B. hirta, elytris integerrimis, pedibus ferrugineis. Musf. Lud. Ulr.* 91.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 278. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 181. n. 52.

*Habitat in Africa, colore varians.*

rubi. 14. *B. cylindrica nigra, elytris fasciis cinereis undulatis. Fabr. sp. inf.* 1. p. 280. n. 44. *mant. inf.* 1. p. 182. n. 66.

*Habitat in Europae magis australis rubo, cichoreo.*

deaurata. 83. *B. supra obscure viridis, elytrorum margine aurco. Fabr. mant. inf.* 1. p. 182. n. 67.

*Habitat Halae Saxonum, mediae magnitudinis, cuprea, antennis nigris.*

nitidula. 15. *B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque depresso, corpore viridi nitido. Fn. succ.* 757.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 282. n. 58. *mant. inf.* 1. p. 184. n. 57.

*Schaeff. ic.* t. 50. f. 7.

*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. t. 28. f. 20.

*Habitat in Europa boreali.*

- laeta. 84. *B. clytris integris viridibus*, capite thoraceque aureis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 282. n. 59. mant. inf. 1. p. 184. n. 88.*  
*Habitat Halae saxonum, an varietas nitidulae?*
- falicis. 85. *B. viridis nitens*, clytris integerrimis aureis basi viridibus.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 282. n. 60. mant. inf. 1. p. 184. n. 89.*  
*Schranck inf. austr. p. 195. n. 365. Buprestis elegantulus.*  
*Schaeff. ic. t. 31. f. 12.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. t. 46. f. 5. a. b.*  
*Habitat in Germaniae salice.*
- cyanea. 86. *B. clytris integerrimis rugosis*, corpore cyaneo. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 282. n. 61. mant. inf. 1. p. 184. n. 91.*  
*Habitat Halae saxonum et Berolini.*
- discoidea. 87. *B. aenea villosa*, clytris integris: disco testaceo. *Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 184. n. 90.*  
*Habitat in Barbariae umbellatis, parva.*
- bimaculata. 16. *B. clytris integerrimis striatis: macula rubra*, corpore  
fulco-viridi. *Mus. Lud. Ultr. 92.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 280.*  
*n. 45. mant. inf. 1. p. 182. n. 68.*  
*Sulz. hist. inf. p. 17. t. 6. f. 15.*  
*Habitat in India.*
- quadri- 88. *B. viridis*, thorace posterius, clytrisque integris maculis  
maculata. duabus aureis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 46. mant. inf.*  
*1. p. 181. n. 69.*  
*Habitat in India.*
- novem- 17. *B. clytris integerrimis: maculis tribus longitudinalibus,*  
maculata. fronte thoracisque lateribus luteis.  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 282. n. 62. Buprestis clytris integerrimis*  
*nigris, maculis tribus flavis.*  
*Sulz. hist. inf. t. 16. f. 17?*  
*Habitat in Barbaria, Calabria, nigra, oblonga, mediae magnitudinis.*
- triflita. 18. *B. clytris integerrimis marginatis*, corpore cupreo, ab-  
dominis punctis decem nigris. *Mus. Lud. Ultr. 93.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 280. n. 47. mant. inf. 1. p. 183. n. 70.*  
*Habitat in America australi et India.*
- aenea. 19. *B. clytris emarginatis: punctis excavatis cicatricantibus*  
apice striatis. *Fn. suec. 758.\**  
*Habitat in Europa.*

- cuprea. 20. *B. elytris integerrimis*, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cuprec laevi. *Mus. Lud. Utr.* 94.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 280. n. 48. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 71.  
*Habitat in America.*
- nobilis. 21. *B. elytris integerrimis*: strigis duabus undatis inauratis, corpore fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 280. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 72.  
*Habitat in America australi et India.*
- barbarica. 89. *B. supra aenea*, subtus cuprea, elytris integerrimis substriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 183. n. 73.  
*Habitat in Barbaria, parva.*
- umbellatarum. 90. *B. elytris integerrimis laevibus*, corpore obscure cupreo immaculato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 183. n. 74.  
*Habitat in Barbariae umbellatis, statura et magnitudine quadripunctatae.*
- quadripunctata. 22. *B. elytris integerrimis punctatis*, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. *Fu. suec.* 759. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 281. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 75.  
*Degeer inf.* 4. p. 134. n. 8. *Buprestis subviridi-nigra*, thorace punctis quatuor impressis.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. t. 28. f. 17.  
*Habitat in Europae floribus, frequens in caltha palustri.*
- cruciata. 91. *B. coleoptris integerrimis aureis*: punctis duobus cruceque posteriore nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 281. n. 51. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 76.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- manca. 23. *B. aurata*, thoracis lineis duabus, elytrisque fuscis. *Syfl. nat.* XII. 2. *add.* p. 1067. n. 10.  
*Fabr. syst. ent.* p. 222. n. 37. *Buprestis bistriata.*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 281. n. 52. *mant. inf.* 1. p. 183. n. 77.  
*Buprestis elytris integris obscuris*, thorace aureo: striis duabus nigris.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 127. n. 4. *Cucujus aeneus &c.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 5. t. 28. f. 18.  
*Habitat in Gallia et Germania.*
- pygmaca. 92. *B. elytris integris cyaneis*, capite thoraceque aeneis nitidis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 183. n. 78.  
*Habitat in Barbariae umbellatis, statura et magnitudine minutae.*

- minuta. 24. *B. clytris integerrimis transverse rugosis, thorace subtri-  
lobo laevi, corpore ovato nigro.* *Fn. suec. 760.\* Fabr.*  
*Sp. inf. 1. p. 281. n. 53. mant. inf. 1. p. 183. n. 79.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 128. n. 6.* *Cucujus fusco-cupreus*  
*triangularis &c.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 19.*  
*Habitat in Europa.*
- medita- 93. *B. clytris integerrimis fusco-nitidis, capite thoraceque eu-  
bunda. preis, corpore aeneo.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 183. n. 80.*  
*Habitat in America boreali, statura viridis, at paulo major.*
- viridis. 25. *B. clytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace  
deflexo, corpore viridi elongato.* *Fn. suec. 762.\* Fabr.*  
*Sp. inf. 1. p. 281. n. 54. mant. inf. 1. p. 184. n. 81.*  
*Degeer inf. 4. p. 133. n. 6. t. 5. f. 1.* *Buprestis viridis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 127. n. 5.* *Cucujus viridi-cupreus*  
*oblongus.*  
*Scop. ent. carn. 190.* *Mordella ferraticornis.*  
*Schaeff. ic. t. 76. f. 9.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 21.*  
*Habitat in Europae betula alba, foliorum margines exedens,  
corpore obscuriori et cupreo varians.*
- bigutta- 94. *B. clytris integerrimis linearibus viridibus: puncto albo,  
ta. abdomine cyaneo: punctis tribus albis.* *Fabr. sp. inf. 1.*  
*p. 281. n. 55. mant. inf. 1. p. 184. n. 82.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 22.*  
*Habitat in Angliae plantis.*
- atra. 26. *B. clytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace de-  
flexo, corpore atro elongato.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 282.*  
*n. 56. mant. inf. 1. p. 184. n. 83.*  
*Habitat in Germania, viridi proxime affinis.* Schreber.
- elata. 95. *B. clytris integerrimis linearibus, corpore elongato aureo  
nitido.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 184. n. 84.*  
*Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr. 1. p. 99. n. 12?* *Bupre-  
stis elongata.*  
*Habitat Berolini et Halae Saxonum, statura atrae, at minor.*
- ruficollis. 96. *B. nigra, clytris integerrimis linearibus, thorace cupreo.*  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 184. n. 85.*  
*Habitat in America, parva, statura elatae.*

- festiva. 27. *B. elytris integerrimis*: maculis sex caeruleis, corpore elongato viridissimo. *Fabr. sp. inf. I. p. 282. n. 54. mant. inf. I. p. 184. n. 86.*  
*Habitat in Africa, viridis magnitudine.*
- linearis. 28. *B. lineari oblonga murino-aenea*, thorace posteriore trilobo.  
*Habitat in America. Rolander.*
- granularis. 29. *B. aeneo-nebulosa*, antennis clavatis. *Fn. suec. 763.\**  
*Habitat in Europa, an hujus generis?*
- depressa. 30. *B. elytris subserratis aeneo-ferrugineis nervoso-punctatis*, thorace depresso. *Mant. 2. p. 533.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 277. n. 25. mant. inf. I. p. 179. n. 37.*  
*Buprestis (porcata) elytris serratis porcatis, thorace angulato, corpore fusco nitido.*  
*Habitat in Oriente.*
- calcarata. 97. *B. elytris bidentatis substriatis, tibiis intermediis dentatis*, corpore cupreo. *Schall. Abb. der hall. Naturf. Gef. I. p. 310.*  
*Herbst Schrif. der berl. Naturf. Fr. I. p. 91. n. 2. Buprestis aeruginosa.*  
*Schaeff. ic. t. 35. f. 7.*  
*elem. t. 31. f. II.*  
*Habitat in Germania, statura et magnitudine rusticae, rarior; elytrorum striis quatuor, thoracis unica media ex atro caerulea.*
- fuliginosa. 98. *B. elytris integerrimis sublinearibus glabris pilosis*, thorace deflexo, corpore fuliginoso. *Forst. nov. inf. sp. I. p. 51. n. 51.*  
*Habitat in Anglia, lecta in floribus crataegi oxyacanthae, magnitudine cantharidis testaceae, antennis moniliformibus, an hujus generis?*
- haemorrhoidalis. 99. *B. aeneo-nitens*, elytris subtridentatis novemfulcatis, abdominis annulo ultimo maculis duabus fulvis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr. I. p. 97. et apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 12.*  
*Habitat Berolini in sepibus, octoguttatae affinis.*
- quercus. 100. *B. viridi-nitens*, thorace orbiculato: puncto impresso, elytris truncatis costatis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr. I. p. 90. n. 1. et apud Fuessli arch. inf. 5. t. 28. f. 13.*  
*Schaeff. ic. t. 35. f. 6?*

*Habitat*

*Habitat in Germaniae ligno querno, pollicem fere longa, pedibus caeruleis, antennis nigricantibus.*

- hirsuta. 101. *B. atra*, villosa, elytris fasciculis sparsis villosis flavis, marginalibus rubris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. t. 46. f. 4.*  
*Habitat in America, fasciculari affinis.*
- immaculata. 102. *B. cylindrica nigra nitens*, frontis macula, thoracis quatuor, elytrorum tribus flavis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. t. 28. f. 23.*  
*Habitat in Ungaria.*
- sexmaculata. 103. *B. cylindrica nigra nitens*, capite thoraceque immaculatis, elytrorum maculis tribus flavis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 121. n. 24.*  
*Habitat in Ungaria, an vere distincta ab immaculata?*
- varicornis. 104. *B. nigricans villosa*, thorace utrinque lobato, elytris acutis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 59. n. 530.*  
*Habitat in Dania.*
- acuta. 105. *B. nigra*, elytris punctatis pone acuminatis, thorace laevi. *Degeer inf. 4. p. 133. n. 7.*  
*Habitat in Europa, 4 modo lineas longa.*
- naevia. 106. *B. atra*, thorace albo nigroque vario. *Lepechin it. 1. p. 232. t. 17. f. 7.*  
*Habitat in Rulliac regno, rusticae affinis.*
- picta. 107. *B. aenea nitens*, elytris violaceo-nigris: maculis symmetricis flavescentibus. *Pall. it. 2. app. n. 46.*  
*Habitat in regionibus Uralensibus magis australibus, octoguttatae fere magnitudine.*
- inaurata. 108. *B. viridi aurea nitidissima*, elytris obtusis integerrimis decemstriatis aeneis. *Pall. it. 2. app. n. 45.*  
*Habitat rarior in regionibus australibus, fluvii Ural et Volgae finitimis, ignitae magnitudine, sed latior.*
- tatarica. 109. *B. nigra*, subtus aenea, elytris laevibus aureis: vitta marginali lineaque margini parallela impressis tomentosis. *Pall. it. 1. app. n. 10.*  
*Habitat in Tataria, marianae magnitudine, at brevior, crassior, et congeneribus magis obtusa.*

- virginica. 110. B. thorace lato fusco: punctis cupreis, elytris ferratis atris: maculis cupreis futuraque metallica. *Drury inf.* 1. p. 66. t. 30. f. 3.  
*Habitat in Virginia.*
- nana. 111. B. nigra nitida, elytris caeruleo violaceis nitidissimis. *Degeer inf.* 4. p. 137. n. 4. t. 17. f. 27.  
*Habitat in Surinamo, pulice vix major.*
- marginata. 112. B. elytris integerrimis nigris: margine flavo. *Müll. Fu. Fridrichsd.* p. 18. n. 182.  
*Habitat in Dania; an distincta species?*
- nigra. 113. B. thorace elytrisque nigris, abdomine subtus albo-tomentoso. *Müll. Fu. Fridrichsd.* p. 18. n. 183.  
*Habitat in Dania.*
- rosacea. 114. B. thorace pone marginato, elytris marginatis apice rotundatis, abdomine supra aeneo fusco. *Scop. ent. carn.* n. 190. *Mordella rosacea.*  
*Habitat in Carnioliae floribus.*
- ungarica. 115. B. viridissima, subtus fronte et thoracis lateribus rubro-aureis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 104. n. 85. *Mordella hungarica.*  
*Habitat in Ungaria, rustica paulo minor, elytris apice rotundatis.*
- nebulosa. 116. B. supra nigra, subtus albicans, elytris integerrimis striis tenuissimis punctatisque albidis nebulosis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 104. n. 86. *Mordella nebulosa.*  
*Habitat in Ungaria, pedibus nigris.*
- bruttia. 117. B. nigra albido punctata, thorace varioloso dilatato albidiore: maculis quinque nitidis nigris. *Petagn. inf. Calabr.* p. 22. n. 108. f. XX.  
*Habitat in Calabriae lentisco*
- Stephanelli. 118. B. viridi-aurea nitens, thorace lineis duabus fuscis, elytris integris. *Petagn. inf. Calabr.* p. 23 n. 110.  
*Habitat in Calabriae monte tre pizzi, minor.*
- rugosa. 119. B. aenea punctata, thorace scabro: sulco obliquo utrinque impresso, elytris striatis fuscis apice truncatis: rugis impressis interruptis. *Mus. Lesk.* p. 34. n. 739.  
*Habitat - - -*



coccinea. 120. B. fusco-aenea punctata, thorace falcato, elytris integris coccineis: rugis quatuor nigris, internis ad futuram ramosis. *Mus. Lesk. p. 34. n. 744.*

*Habitat extra Europam, thoracis fulcis striis villosis griseis repletis, elytris spatio rugis interjecto punctis concatenatis duplici serie striatis.*

HYDROPHILUS. *Antennae clavatae: clava perfoliata.*

*Palpi quatuor filiformes.*

*Pedes posteriores villosi, natatorii, submutici.*

piceus. 1. H. niger, sterno canaliculato posterius spinoso. *Fabr. sp. inf. 1. p. 288. n. 1. mant. inf. 1. p. 188. n. 1.*

*Degeer inf. 4. p. 371. n. 1. t. 14. f. 1. 2. Hydrophilus ruficornis.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 182. n. 1. t. 3. f. 1. Hydrophilus niger, elytris fulcatis, antennis fulcis.*

*Syst. nar. XII. 2. p. 664. n. 1. Fn. suec. 764.\* Scop. ent. carn. 253. Dytiscus antennis perfoliatis, corpore laevi, sterno carinato pollice spinoso.*

*Herbst Besch. der naturf. Berl. Fr. 4. t. 7. f. 2. Dytiscus haltatus.*

*Lyonn. Less. t. 1. f. 15-17.*

*Frisch inf. 2. t. 6.*

*Sulz. hist. inf. t. 6. f. 8.*

*Schaeff. el. t. 71.*

*ic. t. 33. f. 1. 2.*

*Bergstr. nomencl. 1. z. 6. f. 3. et t. 8. f. 1. et t. 9. f. 1.*

*Habitat in Europa, nido eminenter mucronato natante.*

olivaceus. 6. H. olivaceus, sterno canaliculato posterius spinoso, coleoptris emarginatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 289. n. 2. mant. inf. 1. p. 188. n. 2.*

*Habitat in Coromandel, piceo paulo minor.*

araboides. 2. H. niger nitidus, elytris substriatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 289. n. 3. mant. inf. 1. p. 188. n. 3.*

*Degeer inf. 4. p. 516. n. 2. Hydrophilus nigricornis.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 183. n. 2. Hydrophilus niger, elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris.*

*Syst.*

- Syst. nat.* XII. 2. p. 664. n. 2. *Fn. suec.* 765.\* Dytiscus antennis perfoliatis, corpore glabro, striis aliquot recurvis.  
*Raj. inf. p.* 95. n. 7. Hydrocantharus niger subrotundus.  
*Frisch inf.* 13. p. 24. t. 21.  
*Roes. inf. 2. aquat.* 1. t. 4. f. 1. 2.  
*Sulz. hist. inf. t.* 6. f. 41.  
*Schaeff. ic. t.* 53. f. 10.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 5. f. 8. 9. et (larv. pupp.) t. 7. f. 8. 9.  
*Habitat in Europa.*
- lateralis. 7. H. niger nitidus, thoracis elytrorumque marginibus flavis.  
*Fabr. sp. inf. I. p.* 289. n. 4. *mant. inf. I. p.* 188. n. 4.  
*Habitat in insulis Americae oppositis.*
- scara-  
baeoides. 3. H. niger, elytris striatis, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf. I. p.* 289. n. 5. *mant. inf. I. p.* 188. n. 5.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 664. n. 3. Dytiscus ovalis convexus ater laevissimus, antennis filiformibus triarticulatis.  
*Syst. nat.* X. n. 56. Scarabaeus (aquaticus) muticus piceus, elytris striatis, antennis flavescens filiformibus.  
*Geoffr. inf. par. I. p.* 85. Scarabaeus piceus.  
*Habitat in Europa, palpis, non antennis, filiformibus.*
- picipes. 8. H. niger, pedibus piceis, elytris laevibus. *Fabr. mant. inf. I. p.* 188. n. 6.  
*Habitat in Germania, utrum hujus, an insequentis mox generis?*
- orbicula-  
ris. 9. H. subrotundus corpore glabro atro. *Fabr. sp. inf. I. p.* 290. n. 6. *mant. inf. I. p.* 188. n. 7.  
*Habitat in Germania.*
- collaris. 10. H. niger, ore thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis. *Fabr. sp. inf. p.* 290. n. 7. *mant. inf. p.* 188. n. 8.  
*Habitat in America.*
- fuscipes. 4. H. thorace atro: margine griseo, elytris fuscis: margine punctoque posteriore albidis. *Fabr. sp. inf. I. p.* 290. n. 10. *mant. I. p.* 189. n. 12.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 664. n. 4. *Fn. suec.* 766. Dytiscus antennis perfoliatis, elytris striatis margine lividis, pedibus fuscis.  
*Geoffr. inf. par. I. p.* 184. n. 4. Hydrophilus.  
*Habitat Upsaliae, elytrorum punctis interdum obsoletis.*

- luridus. 5. *H. clytris striatis, corpore cinereo-fusco. Fabr. sp. inf. 1. p. 290. n. 8. mant. inf. 1. p. 188. n. 9. Degeer inf. 4. p. 378. n. 4. t. 15. f. 1. 2. Hydrophilus fuscus. Syst. nat. XII. 2. p. 665. n. 5. Fn. suec. 767.\* Dytiscus antennis perfoliatis luridus, elytris punctis tribus fulcentibus, thorace lateribus flavicante. Habitat in Europa.*
- minutus. 11. *H. ovatus niger elytris pedibusque griseis. Fabr. sp. inf. 1. p. 290. n. 9. mant. inf. 1. p. 188. n. 10. Forst. nov. inf. sp. 53. n. 53. Dytiscus dermestoides. Geoffr. inf. par. 1. p. 85. n. 27? Scarabaeus totus rufoniger, maculis nigrioribus. Habitat in Europa, vesperi, sonorus, thorace interdum griseo.*
- griseus. 12. *H. supra cinereus, subtus fuscus. Fabr. mant. inf. 1. p. 189. n. 11. Habitat in Saxonia, statura et magnitudine minuti.*
- tricolor. 13. *H. niger, elytris piccis margine nigris et apice ochroleucis, pedibus spadiceis. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 122. n. 6. t. 28. f. A. b. Habitat Berolini, lineam longus.*
- cordiger. 14. *H. niger, thoracisque margine elytrisque ferrugineis: his macula communi cordata nigra. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 122. n. 7. t. 28. f. A. a. b. Habitat Berolini, vix lineam longus, pedibus piccis.*
- rufus. 15. *H. rufus, elytris laevissimis obscurioribus: margine exteriore albido anterieus bidentato. Scop. ent. carn. n. 298. Habitat in Carniolia.*
- obscurus. 16. *H. lividus, abdomine nigro, elytris nitidis confertim punctatis. Müll. zool. dan. prodr. p. 69. n. 657. Habitat in Dania, an vere distinctus a lurido?*
- pufillus. 17. *H. niger, elytris laevissimis, antennis tarsisque fuscis. Müll. zool. dan. prodr. p. 69. n. 658. Habitat in Dania.*
- Pilula. 18. *H. ater, supra nitidus confertim punctatus. Müll. zool. dan. prodr. p. 69. n. 659. Geoffr. inf. par. 1. p. 184. n. 3. Hydrophilus punctatus. Habitat in Europa.*

19. *H.*

- niger. 19. *H. niger nitidus*, elytris punctis distantibus levissime striatis, antennis plantisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 35. n. 769.*  
*Habitat in Europa, statura caraboidis, at quadruplo minor.*
- ater. 20. *H. ater glaber*, antennis tibiisque rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 35. n. 774.*  
*Habitat in Europa.*

212. DYTISCUS. *Antennae fetaceae.*  
*Palpi sex filiformes.*  
*Pedes posteriores villosi, natatorii, submutici.*

- latissimus. 6. *D. niger*, elytrorum marginibus dilatatis: linea flava. *Fn. suec. 768.\* Fabr. sp. inf. I. p. 290. n. 1. mant. inf. I. p. 189. n. 1.*  
*Miil. zool. dan. prodr. p. 69. n. 663. Dytiscus amplissimus. Degeer inf. 4. p. 390. n. 1. Dytiscus nigro-fuscus. Frisch inf. 2. t. 7. f. 1. 2. Scarabaeus aquaticus magnus niger, margine luteo. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 19. Schaeff. ic. t. 217. f. 1. 2. Bergstr. nomencl. I. t. 5. f. 1. 2. et t. 9. f. 3.*  
*Habitat in Europa boreali, in propriam speciem saeviens, mas glaber, femina sulcata.*
- costalis. 1. *D. niger*, capitis fascia, thoracis margine elytrorumque stria costali ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 291. n. 2. mant. inf. I. p. 189. n. 2.*  
*Habitat in Surinamo. Femina obscurior.*
- marginata. 7. *D. niger*, thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis. *Fn. suec. 769. Scop. ent. carn. 294. Geoffr. inf.*

---

Hydrophili et Dytisci in aquis et humidis habitant, egregie natant, dorso impositi circumgyrando exsiliunt, in umbra quiescunt, noctu volitant, diutius in sicco servati difficiliter submergi possunt; maribus pedum anteriorum plantae hemisphaericae, feminis elytra saepius sulcata, priores dermestidi, posteriores carabis affines; ceterum sexus discerni, species determinari difficulter possunt: larvae subaquaticae voracissimi aquatilium crocodili, pisces ipsos occidunt innumeros, uti Baruthi 1762. teste Schrebero neue Samml. 1763. 3. p. 680. de semistriato, alias de latissimo compertum est.

*inf. par.* 1. p. 186. n. 2. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 291. n. 3.  
*mant. inf.* 1. p. 189. n. 3.

*Degeer inf.* 4. p. 391. n. 2. t. 16. f. 2. *Dytiscus nigro fuscus nitidus.*

*Monff. inf.* 164. *Hydrocantharis.*

*Raj. inf.* p. 93. n. 1. *Hydrocantharis nostras.*

*Aldr. inf.* 707.

*List. mut. t.* 5. f. 2.

*Roef. inf.* 2. aq. 1. t. 1. f. 9. II.

*Sulz. hist. inf. t.* 6. f. 42.

*Schaeff. ic. t.* 8. f. 8.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 1. n. 1. t. 1. f. 1. et t. 6. f. 1. 2. et  
(larv. pupp.) t. 7. f. 4. 5. β) 1. t. 7. f. 1.

*Habitat in Europa.*

femistriatus. 8. *D. fuscus*, elytris fulcis dimidiatis decem villosis. *Fn. suec.*  
772.\* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 187. n. 3. t. 3. f. 2.

*Fn. suec.* 1. n. 568. *Dytiscus supra fuscus, subtus ater.*

*Raj. inf.* p. 94. n. 2. *Hydrocantharis elytris striatis sive canaliculatis?*

*Frisch inf.* 2. t. 7. f. 4.

*Bradl. nat. t.* 26. f. 2.

*Roef. inf.* 2. aq. 1. t. 1. f. 10.

*Degeer inf.* 4. p. 391. n. 2. t. 16. f. 1.

*Schaeff. ic. t.* 8. f. 7.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 2. n. 2. t. 1. f. 2.

*Fn. suec.* 1. n. 567. *Dytiscus elytris striis 20 dimidiatis.*

*Habitat in Europa, ense recurvo, acuto, recondito instruetus, ova oblonga, magna, alba pariens, marginalis, ut videtur, femina.*

punctulatus. 2. *D. niger*, clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori  
albis, elytris striis tribus punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p.

292. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 189. n. 4.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 185. n. 1. *Dytiscus margine coleopterorum thoracisque flavo.*

*Degeer inf.* 4. p. 396. n. 3. *Dytiscus laterali-marginatus,*  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 70. n. 664. *Dytiscus virens.*

*Roef. inf.* 2. aq. 1. t. 2.

*Frisch inf.* 13. t. 1. f. 7.

*Schaeff. elem. t.* 7.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 31. n. 45. t. 6. f. 4. 5. t. 8. f. 4. et  
t. 9. f. 2.

β) *Bergstr. nomencl.* 1. t. 8. f. 6. 7.

*Habitat*

*Habitat in Germaniae rivulis silvaticis.*

*Femina elytrorum sulcis decem dimidiatis.*

- limbatus. 3. *D. niger*, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo, elytris laevissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 292. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 189. n. 5.  
*Habitat in Sina, et India, abdomine atro: punctis utrinque 3 ferrugineis.*
- ruficollis. 4. *D. niger*, fronte thoraceque fulvis, elytris striga baseos margineque exteriori testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 189. n. 6.  
*Habitat in Siam, sulcati magnitudine.*
- striatus. 9. *D. fuscus*, elytris transversim subtilissime striatis. *Fn. suec.* 770. \* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 293. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 190. n. 9.  
*Degeer inf.* 4. p. 399. n. 5. t. 15. f. 16. *Dytiscus transverse striatus.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscus. 10. *D. fuscus*, elytris transverse substriatis.  
*Habitat in Europa; an specie distinctus a striato?*
- Lanio. 5. *D. niger*, ore verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 293. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 190. n. 10.  
*Habitat in Madra.*
- cicurius. 24. *D. ater laevis*, ore verticis puncto thoracisque margine rufis, elytris flavo-striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 190. n. 11.  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine striati.*
- vittatus. 25. *D. ater laevis*, elytris vitta marginali flava: macula baseos atra. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 293. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 190. n. 12.  
*Habitat in India.*
- cinereus. 11. *D. cinereus*, elytrorum margine thoracisque medietate flavis. *Fn. suec.* 771. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 188. n. 4. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 293. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 190. n. 13. *Degeer inf.* 4. p. 397. n. 14. *Dytiscus fuscatus.*  
*List. mut. t.* 5. f. 1.  
*Petiv. gaz. t.* 70. f. 3.  
*Akt. Nidros.* 425. t. 70. f. 3.  
*Huffn. inf.* 2. t. 12.

Roef.

*Roef. inf. 2. aq. 1. t. 3. f. 6.*

*Schaeff. ic. t. 90. f. 7.*

*Habitat in Europa frequentissimus.*

- griseus. 26. *D. cinereus*, elytris fascia dentata nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 293. n. 12. mant. inf. 1. p. 190 n. 14.*  
*Habitat in India, cinereo paulo major.*
- fliticus. 12. *D. pallens*, elytris griseis: puncto oblongo laterali impresso nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 294. n. 13. mant. inf. 1. p. 190 n. 15.*  
*Habitat in Africa.*
- decem- 27. *D. ater glaber*, elytris punctis albis quinque. *Fabr. sp. punctatus. inf. 1. p. 294. n. 14. mant. inf. 1. p. 190. n. 16.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- fulcatus. 13. *D. elytris fulcis decem longitudinalibus villosis.* *Fn. suec. 773.\* Geoffr. inf. par. 1. p. 189. n. 5. Fabr. sp. inf. 1. p. 292. n. 6. mant. inf. 1. p. 190. n. 7.*  
*Raj. inf. p. 94. n. 3. et 10. Hydrocantharis minor, corpore rotundo plano.*  
*Bradl. mut. t. 26. f. 2. A.*  
*Frisch inf. 13. p. 13. t. 7.*  
*Roef. inf. 2. aq. 1. t. 3. f. 7.*  
*Schaeff. ic. t. 3. f. 3.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 5. f. 3-5. et t. 7. f. 6. 7.*  
*Habitat in Europa et America, maris elytris glabris.*
- fasciatus. 28. *D. elytris flavis: fasciis duabus punctoque apicis nigris.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 293. n. 7. mant. inf. 1. p. 190. n. 8.*  
*Habitat in India.*
- erythro- 14. *D. ovato-oblongus niger*, capite pedibusque rufis. *Fn. cephalus. suec. 774.\* Degeer inf. 4. p. 404. n. 12. Fabr. sp. inf. 1. p. 295. n. 24. mant. inf. 1. p. 192. n. 31.*  
*Habitat in Europa.*
- planus. 29. *D. ovato-oblongus planus niger*, tibiis folis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 501. mant. inf. 1. p. 192. n. 32.*  
*Habitat in Dania, statura erythrocephali.*
- varius. 30. *D. thorace rufo*, elytris cinereo nigroque striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 295. n. 25. mant. inf. 1. p. 192. n. 33.*  
*Habitat in Patagonia.*

- notatus. 31. *D. fuscus*, thorace flavo: punctis quatuor nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 296. n. 26. mant. inf. 1. p. 192. n. 34. Berg str. nomencl. 1. t. 5. f. 10.*  
*Habitat in Germania, statura palustris, thorace interdum rufo, aut punctis fasciave abbreviata nigris vario.*
- depressus. 32. *D. thorace ferrugineo: punctis duobus baseos nigris, elytris fuscis ferrugineo-maculatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 296. n. 27. mant. inf. 1. p. 192. n. 35.*  
*Habitat in Suecia.*
- dorsalis. 33. *D. capite thoracis margine elytrorumque puncto baseos distincto margineque inaequali ferrugineis. Fabr. mant. inf. 1. p. 192. n. 36.*  
*Habitat Kilonii, sexpustulato affinis, at major.*
- sexpustulatus. 34. *D. ater, capite ferrugineo, elytris maculis tribus rufis: baseos majore. Fabr. sp. inf. 1. p. 296. n. 28. mant. inf. 1. p. 192. n. 37.*  
*Habitat in Sueciae aquis stagnantibus.*
- maculatus. 15. *D. niger, thorace nigro: fascia pallida elytris albo nigroque variis. Fn. succ. 777.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 296. n. 29. mant. inf. 1. p. 192. n. 38. Uddm. diff. 43.*  
*Habitat in Europa.*
- ferrugineus. 16. *D. ferrugineus totus. Habitat in Europa, cimicis magnitudine. Afcianus.*
- bipustulatus. 17. *D. ater laevis, capite posterius punctis duobus rubris. Fabr. sp. inf. 1. p. 294. n. 15; mant. inf. 1. p. 190. n. 17. Degeer inf. 4. p. 401. n. 8? Dytiscus ater. Geoffr. inf. par. 1. p. 189. n. 6? Dytiscus totus niger laevis. Schaeff. ic. t. 8. f. 9.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- cinctus. 35. *D. capite thoraceque flavis, elytris nigris: margine omnino albo. Fabr. sp. inf. 1. p. 294. n. 16. mant. inf. 1. p. 190. n. 18.*  
*Habitat in America.*
- bipunctatus. 36. *D. ater, thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris flavo fuscisque variis. Fabr. mant. inf. 1. p. 190. n. 19.*  
*Habitat in Germania, mediae magnitudinis.*

37. *D.*



- fenestra- 37. *D. subtus ferrugineus*, supra niger, elytris punctis duobus  
tus. fenestratis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 294. n. 17. mant. inf. 1. p. 190. n. 20.*  
*Habitat Hamburgi, statura bipustulati.*
- Hübneri. 38. *D. laevis ater*, ore thoracisque margine ferrugineis, elytris linea marginali flava. *Fabr. mant. inf. 1. p. 190. n. 21.*  
*Habitat in Germania, magnitudine et statura transversalis.*
- stagnalis. 39. *D. laevis niger*, thorace anterieus ferrugineo, elytris fuscis flavo-lineatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 191. n. 22.*  
*Habitat in Germania, statura et magnitudine transversalis.*
- transver- 40. *D. ater*, thorace anterieus ferrugineo, elytrorum margine  
salis. strigaque baseos abbreviata flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 294. n. 18. mant. inf. 1. p. 191. n. 23.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 668. Dytiscus niger*, thorace utrinque fasciaque antica, elytris margine lineaque transversa baseos flava.  
*Pontopp. atl. Dan. 1. t. 29.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 5. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- Herman- 41. *D. gibbus capite thorace elytrorumque basi ferrugineis*,  
ni. elytris truncatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 295. n. 19. mant. inf. 1. p. 191. n. 24.*  
*Fabr. syst. ent. p. 232. n. 14. Dytiscus gibbus*, elytris fascia undata baseos ferruginea.  
β) *Herbst Besch. der berl. naturf. Fr. 4. t. 7. f. 3. Dytiscus tardus.*  
γ) *Schranck enum. inf. austr. n. 379. Dytiscus undulatus.*  
*Habitat in Afsatiae aquis stagnantibus.*
- abbrevia- 42. *D. niger*, elytris striga abbreviata baseos punctisque duobus  
tus. flavescens. *Fabr. mant. inf. 1. p. 191. n. 25.*  
*Habitat Kilonii, statura transversalis, at duplo minor.*
- gibbus. 43. *D. gibbus ferrugineus*, elytris nigris apice acuminatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 295. n. 20. mant. inf. 1. p. 191. n. 26.*  
*Habitat Kilonii in aquis stagnantibus.*
- haemor- 44. *D. niger*, thorace elytrorumque basi apiceque ferrugineis.  
rhoidalis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 191. n. 27.*  
*Habitat Kilonii, magnitudine uliginosi.*

- ovatus. 18. *D. ovatus fuscus*, capite thoraceque ferrugineis. *Fn. succ.* 2282. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 30. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 39.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 191. n. 10. *Dytiscus ovatus fuscus*, capite thoraceque rubicundis.  
*Degeer inf.* 4. p. 402. n. 9. t. 14. f. 17-19. *Dytiscus sphaericus*.  
*Habitat in Europae aquis stagnantibus, consueto interdum duplo major, margine elytrorum albo-maculato.*
- picipes. 45. *D. niger*, thorace anteriori ferrugineo, elytris flavo-lineatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 192. n. 40.  
*Habitat in Germania, parvus.*
- litturatus. 46. *D. niger*, elytris basi litturaeque apicis pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 31. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 41.  
*Habitat in Italia, parvus.*
- chryso-melinus. 47. *D. supra cinereus subtus niger*. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 192. n. 42.  
*Habitat in Germania, parvus.*
- signatus. 48. *D. niger*, capite thoraceque rufis: signaturis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 32. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 43.  
*Habitat in Patagonia.*
- halensis. 49. *D. ater*, thorace rufo: baseos medio nigro: puncto rufo, elytris cinereis nigro striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 192. n. 44.  
*Habitat in Germania, parvus, planus.*
- palustris. 19. *D. niger laevissimus*, elytris litturis duabus lateralibus albidis. *Fn. succ.* 775.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 29. *mant. inf.* 1. p. 192. n. 38.  
*Habitat in Europa, thorace ferrugineo.*
- uliginosus. 20. *D. ater nitidus*, antennis pedibus elytrorumque latere exteriori ferrugineis. *Fn. succ.* 776.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 295. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 191. n. 28.  
*Habitat in Europa.*
- irroratus. 50. *D. testaceus nigro irroratus*, capite pectoreque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 295. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 191. n. 29.  
*Habitat in America.*
- bimaculatus. 21. *D. testaceus*, elytris macula nigricante.  
*Habitat in Gallia, magnitudine seminis oryzae, elytris substriatis.* Gouan.

- granularis. 22. *D. niger*, elytris lineis duabus flavescens, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 296. n. 33. *mant. inf.* 1. p. 193. n. 45.  
*Scop. ent. carn.* n. 297. *Dytiscus minimus.*  
*Habitat in Europae borealis aquis stagnantibus, pulicis magnitudine.*
- confluens. 51. *D. niger*, capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis lineis quatuor dilci nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 193. n. 46.  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- obliquus. 52. *D. ferrugineus*, elytris maculis quinque obliquis fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 193. n. 47.  
*Habitat Kilonii, statura granularis.*
- impressus. 53. *D. oblongus flavescens*, elytris cinereis: punctis impressis striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 193. n. 48.  
*Schall. Abh. der hall. naturf. Fr.* 1. p. 312. *Dytiscus impresso-punctatus.*  
*Habitat in Europa.*
- lineatus. 54. *D. ferrugineus*, coleoptris fuscis: lineis flavescens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 297. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 193. n. 49.  
*Bergstr. nomencl.* 1. p. 32. n. 8. 9. t. 6. f. 8. 9.  
*Habitat in Allatae aquis stagnantibus.*
- inaequalis. 55. *D. ferrugineus*, elytris nigris: lateribus inaequaliter ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 297. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 193. n. 50.  
*Habitat in Saeciae aquis stagnantibus.*
- minutus. 23. *D. elytris fuscis basi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ovato.* *Fr. suec.* 778.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 297. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 193. n. 51.  
*Dytiscus flavescens, elytris fuscis, margine flavo maculato.*  
*Degeer inf.* 4. p. 404. n. 18. t. 16. f. 9. *Dytiscus ruficollis.*  
*Habitat in Europa.*
- crassicornis. 56. *D. fuscus*, capite thoraceque flavis, antennis medio incrassatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 193. n. 52.  
*Müll. zool. dan. prodr.* n. 779. *Dytiscus crassicornis.*  
*Geoff. inf. par.* 1. p. 193. n. 15.  
*Degeer inf.* 4. p. 402. n. 10. *Dytiscus clavicornis.*  
*Habitat in Europa magis boreali, parvus.*

- pictus. 57. *D. ferrugineus*, thorace ferrugineo, elytris pallidis, futura maculaque laterali nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 194. n. 53.*  
*Habitat in Germania, minutus.*
- pusillus. 58. *D. ater*, thorace elytrisque margine albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 297. n. 37. mant. inf. I. p. 194. n. 54.*  
*Habitat in Italia, vix pediculi magnitudine.*
- ovalis. 59. *D. elytris fuscis pallido-lineatis*, thorace ferrugineo, abdomine atro. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 19. n. 33.*  
*Habitat Upsaliae, magnitudine nitidulae aquaticae, ovato major.*
- intricatus. 60. *D. flavicans*, supra nigro-virens intricatus, elytris excavato-friatis: margine apice thoraceque flavis. *Schall. Abb. der hall. naturf. Ges. I. p. 311.*  
*Müll. Naturf. 7. p. 99. Dytiscus semifulcatus.*  
*Habitat Halae Saxonum in stagnis, statura et magnitudine punctulati.*
- varicolor. 61. *D. fulvus*, elytris maculis oblongis nigris. *Schall. Abb. der hall. naturf. Ges. I. p. 313.*  
*Habitat Halae Saxonum in stagnis, ovatus, magnitudine chrysomelae nemorum.*
- Schalleri. 62. *D. niger*, capite thorace pedibusque ferrugineis, elytris fuscis: margine extimo rufo. *Schall. Abb. der. hall. naturf. Ges. I. p. 313.*  
*Habitat Halae Saxonum.*
- lamina-  
 tus. 63. *D. fulvus*, elytris stratis nigro-punctatis, laminis duabus ad basin abdominis. *Schall. Abb. der hall. naturf. Ges. I. p. 314.*  
*Habitat rarior Halae Saxonum, magnitudine chrysomelae nemorum.*
- acicula-  
 tus. 64. *D. thoracis elytrorumque margine maculisque tribus abdominis flavis*, elytris striis excavatis decussantibus abruptis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 123. n. 4.*  
*Habitat in India, limbo affinis.*
- fuscus. 65. *D. ater*, elytris fuscis laevibus, pedibus obscure testaceis. *Schranck inf. austr. p. 203. n. 382.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 190.*  
*Habitat in Aultria superiore.*

- oculatus. 66. D. capite cinereo: margine posteriori maculisque duabus trigonis frontis nigris, elytris piceis: margine omni flavo. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 125. n. 13.*  
*Habitat Berolini, in paludibus, 5 fere lineas longus.*
- ornatus. 67. D. niger, subtus piceus, ore, maculis elytrorum, et duabus inter oculos rotundis, thorace et antennis ferrugineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 125. n. 15. t. 28. f. B.*  
*Habitat Berolini, 4 lineas longus.*
- unilineatus. 68. D. niger, elytrorum margine fesso lineaque dimidia flavescens. *Schranck inf. austr. p. 204. n. 384.*  
*Habitat in Germania.*
- dispar. 69. D. niger, laevis, ore flavo, elytris variegatis thoraceque piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 126. n. 18.*  
*Habitat Berolini, 1½-3 lineas longus.*
- fordidus. 70. D. niger, antennis ferrugineis apice nigris, pedibus piceis, elytris atris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 126. n. 19.*  
*Habitat Berolini, 2 lineas longus.*
- insularius. 71. D. subtus spadiceus, capite thoraceque luteis, elytris nigris punctatis cancellatis: margine fulvo. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 127. n. 20.*  
*Habitat in Pomerania, vix 2 lineas longus.*
- aquaticus. 72. D. spadiceus, oculis, elytris thorace et ventre nigris, thoracis fascia media et margine spadiceis, elytrorum margine obsolete ferrugineo. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 127. n. 21.*  
*Habitat Berolini, ultra 2 lineas longus.*
- parvulus. 73. D. subtus piceus, capite thoraceque fulvis, elytris nigris: margine striisque duabus dimidiatis flavis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 127. n. 22.*  
*Habitat Berolini, vix 1½ lineas longus.*
- piccolus. 74. D. subtus niger, capite thoraceque spadiceis, elytris piceis: margine obsolete fulvo. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 127. n. 23.*  
*Habitat Berolini, 3½ lineas longus.*
- simplex. 75. D. niger, capite, thoracis elytrorumque margine, antennis pedibusque piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 127. n. 24.*  
*Habitat Berolini, statura et magnitudine undulati.*

- capricornis. 76. *D. lutescens*, ventre oculisque nigris, antennarum articulis mediis multo latioribus, elytris fuscis punctato-excavatis. *Fuessli apud Herbst arch. inf. 5. p. 128. n. 25. t. 28. f. C. et b. c.*  
*Habitat* Berolini, 2 lineas longus.
- variolosus. 77. *D. flavescens*, subtus ex fusco luteus oculis nigris, elytris ex viridi lutescentibus, variegatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 128. n. 26.*  
*Habitat* Berolini, statura et magnitudine capricornis.
- orbicularis. 78. *D. niger*, laevis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace elytrisque ex luteo fuscis pellucidis: maculis obsoletis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 128. n. 27.*  
*Habitat* Berolini, vix lineam longus.
- pedicularius. 79. *D. laevis*, subtus thorace elytrisque fuscis, capite nigro, pedibus piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 128. n. 28.*  
*Habitat* Berolini,  $\frac{1}{2}$  lineam longus.
- marginellus. 80. *D. niger*, thoracis margine flavo, elytris flavescens punctatis: maculis obsoletis nigricantibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. p. 129. n. 29.*  
*Habitat* Berolini, 1 -  $1\frac{1}{2}$  lineam longus.
- feminulum. 81. *D. niger laevis*, elytris pellucidis spadiceis: apice rubro, pedibus ferrugineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. p. 129. n. 30.*  
*Habitat* Berolini, vix ultra lineam longus.
- oblongus. 82. *D. obsolete niger*, capite, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. p. 129. n. 31.*  
*Habitat* Berolini, fusculo affinis, 2 lineas longus.
- Zeylanicus. 83. *D. niger*, thorace elytrorumque margine flavo, sterno mutilo. *Gron. mus. 2. p. 164. n. 552.*  
*Habitat* in Zeylon.
- Gronovii. 84. *D. niger laevis*, antennis ferrugineis, capite posterius maculis binis rubris. *Gron. mus. 2. p. 164. n. 555.*  
*Habitat* - - - an diversus a bipustulato?
- Scopolii. 85. *D. niger*, thoracis margine lineaque media transversa rufis, elytris testaceis subpellucidis: posterius fascia abrupta punctisque plurimis atris. *Scop. ent. carn. n. 295.*  
*Habitat* in Carnioliā.

- glaber. 86. *D. fuscus*, clytris glabris, ventre pedibusque ferrugineis.  
*Forst. nov. inf. sp. 1. p. 55. n. 55.*  
*Habitat in Angliac aquis stagnantibus, striato affinis.*
- nebulosus. 87. *D. lividus nigro-nebulosus*, antennis pedibusque ferrugineis ventre atro: margine ferrugineo. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 56. n. 56.*  
*Habitat in Angliac aquis stagnantibus, magnitudine uliginosi.*
- exfoletus. 88. *D. lividus*, antennis, capite, thorace, abdomine pedibusque pallidis. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 57. n. 57.*  
*Habitat in Angliac aqua stagnante inter lemnum, cimicis fere magnitudine.*
- danicus. 89. *D. niger*, margine thoracis extimo elytrorumque flavo.  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 669.*  
*Habitat in Dania.*
- Mülleri. 90. *D. elytris acuminatis glabris apice bipunctatis.* *Müll. Fn. Fridrichsd. p. 20. n. 194. zool. dan. prodr. p. 71. n. 670.*  
*Habitat in Dania.*
- lacustris. 91. *D. flavicans*, thoracis margine flavo, elytris sparsim punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 671.*  
*Habitat in Dania.*
- piceus. 92. *D. niger*, corpore subtus et thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 673.*  
*Habitat in Dania.*
- foetidus. 93. *D. ferrugineus*, supra niger, margine thoracis elytrorumque extimo flavo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 674.*  
*Habitat in Dania.*
- Comma. 94. *D. flavicans*, supra nigro-aeneus, elytrorum margine exteriori lineolaque lutescente. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 676.*  
*Habitat in Dania.*
- quadripunctatus. 95. *D. ferrugineus*, elytris nigris: fascia, macula punctisque quatuor albis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 71. n. 677.*  
*Habitat in Dania.*
- biocellatus. 96. *D. rufus*, elytris aeneis: maculis albis longitudinaliter dispositis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 72. n. 768.*  
*Habitat in Dania.*

- erythro- 97. *D. niger*, antennis tarsisque rufis. Müll. *zool. dan. prodr.*  
melas. p. 72. n. 770.  
*Habitat in Dania.*
- roridus. 98. *D. flavus*, thorace macula media, elytris nigro irroratis.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 72. n. 771.  
*Habitat in Dania.*
- rubripes. 99. *D. nigro-aeneus nitidus*, antennis, pedibus, elytrorum  
apice punctisque duobus ferrugineis. Müll. *zool. dan.*  
*prodr.* p. 72. n. 772.  
*Habitat in Dania.*
- quadrico- 100. *D. ovatus rufus*, thoracis medio nigro, elytris fuscis:  
lor. margine inferiore punctoque baseos flavis. Müll. *zool. dan.*  
*prodr.* p. 73. n. 780.  
*Habitat in Dania.*
- cimicoi- 101. *D. virens*, elytris virescentibus: margine inferiore macu-  
des. lisque albis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 781.  
*Habitat in Dania.*
- velox. 102. *D. ovatus rufus*, elytris striis octo fuscis. Müll. *zool.*  
*dan. prodr.* p. 73. n. 783.  
*Habitat in Dania.*
- nanus. 103. *D. niger*, thorace anterieus flavo, elytris fulco abrupto,  
pedibus piccis. Müll. *zool. dan. prodr.* 73. n. 784.  
*Habitat in Dania.*
- ruffrons. 104. *D. niger*, thorace utrinque, elytris basi lateribusque fla-  
vis, capite pedibusque rufis. Müll. *zool. dan. prodr.* p.  
73. n. 785.  
*Habitat in Dania.*
- tricolor. 105. *D. rufus*, elytris luteis: disco macula communi nigra fi-  
nuata. Müll. *prodr. zool. dan.* p. 73. n. 786.  
*Habitat in Dania.*
- exilis. 106. *D. ovatus niger*, antennis basi pedibusque ferrugineis,  
elytris laevibus. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 788.  
*Habitat in Dania.*
- quadripu- 107. *D. niger*, elytris maculis quatuor flavis, pedibus rufis.  
ftulatus. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 73. n. 789.  
*Habitat in Dania.*



- flavicans. 108. *D. ater*, supra flavicans, thorace posterius, elytris striis maculisque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 74. n. 790.*  
*Habitat in Dania.*
- naevius. 109. *D. fulvus*, maculis sparsis nigris. *Geoffr. inf. par. I. p. 189. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- fimbriatus. 110. *D. fuscus*, elytris anterioribus et exterioribus flavis. *Geoffr. inf. par. I. p. 190. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- rufipes. 111. *D. ovatus ater*, pedibus antennarumque basi ferrugineis, elytris punctatis subpubescentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 73. n. 782.*  
*Fn. succ. I. n. 568. 2. p. 216. n. 772. b.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 190. n. 9?*  
*Habitat in Europa.*
- gibbus. 112. *D. flavicans*, capite thoraceque virente, elytris obscure laevibus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 72. n. 778.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 191. n. 11.*  
*Habitat in Europa.*
- quadrinotatus. 113. *D. niger*, thorace flavo, elytris laevibus: maculis limboque luteis. *Geoffr. inf. par. I. p. 192. n. 13.*  
*Habitat in Gallia.*
- unifurcatus. 114. *D. niger*, elytris maculis et limbo luteis: stria unica. *Geoffr. inf. par. I. p. 192. n. 14.*  
*Habitat in Gallia.*
- bilineatus. 115. *D. elytris fuscis*, corpore subtus fulvo, thorace fulvo: linea duplici nigra. *Degeer inf. 4. p. 400. n. 6.*  
*Habitat in Europa, 7 lineas longus.*
- femiginus. 116. *D. corpore subtus toto nigro*, thorace elytrisque obscure fuscis: margine rufo. *Degeer inf. 4. p. 401. n. 7.*  
*Habitat in Europa, 7 lineas longus.*
- nubilus. 117. *D. niger*, supra maculis striisque griseis, pedibus rufo fuscis. *Degeer inf. 4. p. 403. n. 11.*  
*Habitat in Europa, minutus.*
- hyalinus. 118. *D. virescens*, elytris hyalinis: maculis lateralibus albidis. *Degeer inf. 4. p. 406. n. 14. r. 15. f. 21-23.*  
*Habitat in Europa, 2½ lineas longus, velocissime natans.*

119. *D.*

- virescens. 119. *D. testaceus* supra virescens, thoracis elytrorumque marginibus externis flavis, his longitudinaliter striatis, pedibus posterioribus crassioribus. *Mus. Lesk. p. 35. n. 778.*  
*Habitat in Europa.*
- testaceus. 120. *D. testaceus*, thoracis margine anteriori et posteriori fuscis, medio, elytrorum linea suturali atomisque marginalibus lividis. *Mus. Lesk. p. 35. n. 783.*  
*Habitat in Europa.*
- niger. 121. *D. niger*, thoracis margine antico externis latiore, elytrorum marginibus lividis longitudinaliter ferrugineo punctatis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 784.*  
*Habitat in Europa.*
- carbonarius. 122. *D. oblongo-ovatus niger*, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 788.*  
*Habitat in Europa.*
- bilobus. 123. *D. oblongo-ovatus niger*, ore, verticis macula biloba, thorace, elytrorum linea suturali basi marginibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 789.*  
*Habitat in Europa, thoracis disco maculā transversā nigra picto.*
- ferrugineus. 124. *D. ferrugineus*, capite thoracisque margine posteriori nigris, illo anterieus, maculis inter oculos duabus, thorace elytrorum linea suturali marginibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 790.*  
*Habitat in Europa.*
- flavus. 125. *D. flavus*, ore, punctis inter oculos duobus, thoracis elytrorumque marginibus externis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 791.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 126. *D. ferrugineus*, capite thorace elytrisque testaceo-fuscis, maculis inter oculos duabus ferrugineis, ore, thoracis elytrorumque marginibus pallidis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 792.*  
*Habitat in Europa.*
- denigratus. 127. *D. niger*, ore, punctis inter oculos duobus et abdomine luteis: segmentis utrinque macula nigra, elytris fuscis: atomis marginibusque externis lividis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 793.*  
*Habitat in Europa.*

- unipunctatus. 128. *D. ater*, antennis ferrugineis, elytris pone medium utrinque puncto testaceo. *Mus. Lesk. p. 36. n. 795.*  
*Habitat in Europa.*
- biguttatus. 129. *D. niger*, pedibus, abdominis apice, antennis, ore, punctis inter oculos duobus, thorace elytrisque testaceis, his fusco maculatis, thoracis medio guttis duabus nigris. *Mus. Lesk. p. 36. n. 796.*  
*Habitat in Europa.*
- octomaculatus. 130. *D. lividus*, thorace viridi-livido, elytris fusco-lividis: singulis maculis quatuor connatis striisque brevibus pone medium lividis. *Mus. Lesk. p. 36. n. 802.*  
*Habitat in Europa.*
- lividus. 131. *D. lividus*, capite angusto, thorace anterieus angustiore, elytris punctis fuscis in strias seriatis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 805.*  
*Habitat in Europa.*
- quadrilineatus. 132. *D. niger*, elytris profunde punctatis fuscescentibus: lineis quatuor marginibusque externis flavescentibus ramosis, pedibus ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 809.*  
*Habitat in Europa.*
- denticulatus. 133. *D. piceus*, ore antennisque ferrugineis, elytris glabris: baseos fascia bidentata, maculis tribus, et margine externo, thorace anterieus pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 810.*  
*Habitat in Europa.*

213. CARABUS. *Antennae filiformes.**Palpi sex: articulo ultimo obtuso, truncato.**Thorax obcordatus, apice truncatus, marginatus.**Elytra marginata.*\* *majores.*

- maxillofus. 44. *C. apterus ater*, mandibulis exertis longitudine capitis, thorace posterius producto bilobo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 298. n. 1. mant. inf. 1. p. 194. n. 1.*

Thunb.

- Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 69.* Carabus apterus ater, thorace postice producto bilobo unicolore.  
*Voet coleoptr. t. 39. f. 47. 48.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. t. 47. f. 3.*  
*Habitat ad caput bonae spei, congenerum maximus.*
- thoraci- 45. C. apterus ater, thorace posterius producto bilobo: lateribus elytrorumque marginibus albo-villosis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 69. f. 82. Fabr. mant. inf. 1. p. 195. n. 2. Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. t. 47. f. 2.*  
*Habitat ad caput bonae spei, maxilloso proxime affinis.*
- coriaceus. 1. C. apterus ater opacus, elytris connatis: punctis intricatis subrugosis. *Scop. ent. carn. 265. Fabr. sp. inf. 1. p. 298. n. 2. mant. inf. 1. p. 195. n. 3.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 141. n. 1. Buprestis ater, elytris rugosis.*  
*Sulz. hist. inf. 1. t. 6. f. 44.*  
*Poda inf. 45.*  
*Pontopp. atl. Dan. 1. t. 29.*  
*Degeer inf. 4. p. 9. n. 4.*  
*Schaeff. ic. t. 36. f. 1.*  
*Voet coleoptr. t. 38. f. 43.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 13. f. 7.*  
*Habitat in Germaniac silvis, inter maximos europaeos.*
- variolo- 46. C. apterus ater, elytris punctis variolosis impressis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 195. n. 4.*  
*Habitat in Transylvania, magnus.*
- granula- 2. C. apterus nigricans, elytris aeneis striatis: interjectis punctis elevatis longitudinalibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 301. n. 17. mant. inf. 1. p. 197. n. 25.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 668. n. 2. Fn. suec. 780. Carabus apterus, elytris longitudinaliter convexe punctatis.*  
*Fn. suec. 511. Carabus ater &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 82. n. 2. Carabus subapterus &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1, p. 143. n. 3. Buprestis niger &c.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 2.*  
*Schaeff. ic. t. 18. f. 6.*  
*Voet coleoptr. t. 37. f. 31.*  
*Bergstr. nomencl. 1. t. 12. f. 4. 5.*  
 β) Carabus niger, elytris subvirescentibus convexe punctatis striatisque. *Fn. suec. 512.*

γ) Carabus purpurascenti-niger, elytris convexe punctatis striatisque. *Fn. suec.* 513.

*Hufn. inf.* 2. t. 3.

*Habitat in Europae arvis.*

hortensis. 3. C. apterus niger, elytris laevibus, punctis aeneis excavatis triplici serie, margine cyaneo. *Fn. suec.* 783. *Stroem. act. Nidros.* 3. p. 401. t. 6. f. 7. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 196. n. 16.

*Degeer inf.* 4. p. 90. n. 5. t. 3. f. 1. Carabus striatus.

*Raj. inf.* p. 96. n. 2. *List. mut. t.* 8. f. 4. *Cerambyx purpurea punctata.*

*Schaeff. ic. t.* 11. f. 3.

*Voet coleoptr. t.* 37. f. 33.

*Berg str. nomencl. I. t.* 10. f. 4. 5.

*Habitat in Europae hortis et silvis, elytrorum punctis interdum concoloribus.*

taedatus. 47. C. apterus niger, elytris sublaevibus fuscis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 196. n. 17.

*Habitat in America boreali, statura et magnitudine hortensis.*

arvensis. 48. C. apterus nigro-cupreus, elytris striatis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 196. n. 18.

*Habitat in Germania, statura taedati, at paulo minor.*

calidus. 49. C. apterus niger, elytris crenato-striatis punctisque aureis excavatis triplici serie. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 19.

*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*

retusus. 50. C. apterus, elytris striatis virescentibus: punctis aeneis excavatis triplici serie, basi retusis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 20.

*Habitat ad Patagoniae littora.*

Maderac. 51. C. apterus ater, elytris basi retusis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 301. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 21.

*Habitat in insula Madera.*

convexus. 52. C. apterus convexus ater laevis, thorace posterius emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 301. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 22.

*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. t. 29. f. 2.

*Habitat in Germaniae silvis.*

- leucophthalmos. 4. *C. elytris laevis*: striis obsoletis octo. *Fn. suec.* 784.\*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 304. n. 29. *mant. inf.* I. p. 198. n. 41.  
*Carabus elatus ater*, elytris striatis, thorace canaliculato.  
*Degeer inf.* 4. p. 96. n. 13. *Carabus niger striatus*.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 146. n. 7. *Buprestis ater*, elythro sin-  
gulo striis 8 laevis, pedibus nigris.  
*List. scar. angl.* p. 390. n. 23. *Scarabaeus ex toto niger*.  
*Schaeff. ic. t.* 18. f. 2.  
*Bergstr. nomencl.* I. p. 9. n. 13. t. I. f. 13.
- β) *Carabus niger*. *Schall. Abb. der. hall. Naturf. Ges.* I. p. 315.  
*Habitat in Europae quisquiliis frequens, magnitudine va-*  
*rius, thorace, quam in congeneribus, minore.*
- attelaboides. 53. *C. apterus ater*, thorace angustiori, capite posterius at-  
tenuato, elytris fulcatis truncatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 305.  
n. 30. *mant. inf.* I. p. 198. n. 42.  
*Habitat in Coromandel, magnitudine leucophthalmi.*
- trilineatus. 54. *C. apterus ater* thorace posterius angustato: marginibus  
albis, elytris albidis: futura lineaque atris. *Fabr. sp. inf.*  
I. p. 305. n. 31. *mant. inf.* I. p. 198. n. 43. *Thunb.*  
*nov. inf. sp.* 4. p. 71. f. 85. *Herbst apud Faessleri arch. inf.*  
8. t. 47. f. 6.  
*Habitat in Coromandel, et ad caput bonae spei, prioribus*  
*minor.*
- cicindeloides. 289. *C. apterus ater*, thorace posterius angustato, elytris ova-  
tis planis ferrugineis villosis: margine albo. *Swederus*  
*nov. act. Stockh.* 8. 1787. n. 3. 24.  
*Habitat ad caput bonae spei, trilineato affinis, at paulo ma-*  
*ior, cicindelae facie.*
- clathratus. 5. *C. apterus nigricans*, elytris aeneis porcatis interjectis pun-  
ctis excavatis longitudinalibus. *Fn. suec.* 782.\*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 302. n. 18. *mant. inf.* I. p. 197. n. 26.  
*Carabus apterus nigricans*, elytris aeneis striatis interje-  
ctis punctis excavatis cupreis.  
*Habitat in Europa.*
- porcatus. 55. *C. apterus ater*, elytris striatis apice granulatis. *Fabr. sp.*  
*inf.* I. p. 302. n. 19. *mant. inf.* I. p. 197. n. 27.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- reflexus. 56. *C. apterus ater*, thoracis margine rotundato reflexo, ely-  
tris fulcatis: maculis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* I. p.  
302. n. 20. *mant. inf.* I. p. 179. n. 28.  
*Habitat in Coromandel.*

- angulatus. 57. *C. apterus hirtus ater*, thorace canaliculato, coleoptris sulcatis: fasciis duabus flavis interruptis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 302. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 29.  
*Habitat in Coromandel, reflexo affinis.*
- nitens. 6. *C. apterus*, elytris porcatis: striis passim interruptis sulcisque scabriusculis inauratis. *Fn. suec.* 185.\* *It. oel.* 96.  
*Scop. ent. carn.* 262.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 302. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 30.  
*Carabus apterus*, elytris porcatis scabris viridibus: margine aureo.  
*Degeer inf.* 4. p. 91. n. 6. *Carabus aureus.*  
*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 3.  
*Schaeff. ic. t.* 51. f. 1.  
*Voet coleopt. t.* 38. f. 41.  
*Habitat in Europae silvis.*
- auratus. 7. *C. apterus*, elytris porcatis: striis sulcisque laevibus inauratis. *Fn. suec.* 780.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 301. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 23.  
*Carabus apterus*, elytris auratis sulcatis, antennis pedibusque rufis.  
*Degeer inf.* 4. p. 104. n. 1. t. 7. f. 20. *Carabus sulcatus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 142. n. 2. t. 2. f. 5. *Buprestis viridis &c.*  
*Raj. inf.* p. 96. n. 6. *Cerambyx dorso in longas regulas diviso, omnium pulcherrimus.*  
*Schaeff. ic. t.* 202. f. 4.  
*Voet coleopt.* 1. t. 36. f. 21.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 12. f. 8. 9.  
*Habitat in Europae locis suffocatis, silvis.*
- futuralis. 58. *C. apterus*, elytris striatis viridibus: futura aurea. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 301. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 24.  
*Habitat in Terra del fuego.*
- violaceus. 8. *C. alatus*, elytris laeviusculis nigris: margine aureo, thorace subviolaceo. *Fn. suec.* 787.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 299. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 195. n. 5. *Carabus alatus niger*, thorace elytrorumque marginibus violaceis.  
*Degeer inf.* 4. p. 89. n. 3. *Carabus apterus aenco-niger nitidus.*  
*Raj. inf.* p. 96. n. 1. *Scarabaeus major e purpura nigricans.*  
*List. scar. angl.* p. 389. n. 22. *Scarabaeus maximus e viola nigricans.*

- Frisch inf.* 13. t. 23. Scarabaeus terreitris nigricans.  
*Schaeff. ic. t.* 3. f. 1. et t. 88. f. 1.  
*Bergstr. nomencl.* 1. p. 16. n. 14. t. 2. f. 14. et t. 10. f. 6.  
*Habitat in Europae silvis passim.*
- purpura- 59. C. apterus ater, thoracis elytrorumque margine violaceo,  
 icens. elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 195. n. 6.  
*Habitat in Germania, magnus, violaceo affinis.*
- cyaneus. 60. C. apterus niger violaceo-nitens, elytris punctis intricatis  
 rugosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 299. n. 4. *mant. inf.* 1. p.  
 195. n. 7.  
*Fn. succ.* 780. Carabus (intricatus) violaceo-niger, elytris  
 intricatis elevato-striatis punctatisque.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 144. n. 4. Buprestis nigro-violaceus,  
 elytris dense striatis.  
*Pontopp. atl. Dan.* 1. t. 29.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 10. f. 7.  
*Voet coleopt.* t. 37. f. 30.  
*Habitat in Europa boreali, rarior.*
- hispanus. 61. C. apterus niger, thorace cyaneo, elytris rugosis aureis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 195. n. 8.  
*Habitat in Hispania, statura cyanei.*
- cephalo- 9. C. apterus, elytris atris laevibus, thorace exserto oblon-  
 tes. go. *Fn. succ.* 788.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 304. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 198. n. 39.  
 Carabus apterus ater laevissimus, thorace orbiculato con-  
 vexo.  
*Frisch inf.* 13. p. 25. t. 22. Scarabaeus.  
*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 4.  
*Schaeff. ic. t.* 17. f. 1.  
*Voet coleopt.* t. 33. f. 2.  
*Habitat in Europa boreali.*
- laeviga- 62. C. alatus depressus ater, thoracis angulis posterius rotun-  
 tus. datus, thorace elytrisque laevissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
 304. n. 28. *mant. inf.* 1. p. 198. n. 40.  
*Habitat in Coromandel, majusculus, congeneribus magis  
 planus.*

10. C.

Carabi larvae saepe intra ligna putrida, muscas, terram &c. degunt, imagines vero  
 insectorum, imprimis larvarum leones sunt, cursu festinantes.



- decem- 10. *C. apterus ater*, thorace angustato, coleoptris novemful-  
guttatus. catis: punctis decem albis. *Mus. Lud. Ulr.* 96.\* *Fabr.*  
*sp. inf.* 1. p. 299. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 195. n. 9.  
*Forsk. Fn. arab.* p. 77. n. 4? *Carabus ferrator.*  
*Habitat in Africa, maximus.*
- sexgutta- 63. *C. apterus thorace posterius angulato*, elytris laevibus  
tus. atris: punctis duobus griseis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n.  
6. *mant. inf.* 1. p. 195. n. 10.  
*Thunb. nov. inf. sp.* 4. p. 70. f. 84. *Carabus apterus ater*,  
thorace maculis duabus, elytris quatuor tomentoso-albis.  
*Habitat in Surate.*
- sexmacu- 64. *C. apterus ater*, thorace posterius angustato: margine al-  
latus. bo, elytris striatis: maculis tribus albis. *Fabr. mant.*  
*inf.* 1. p. 196. n. 11.  
*Habitat in Barbaria, sexguttato fere duplo major.*
- quadrigut- 65. *C. apterus*, thorace posterius attenuato, elytris fulcatis:  
tatus. maculis duabus griseis remotis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300.  
n. 7. *mant. inf.* 1. p. 196. n. 12.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- tabidus. 66. *C. apterus ater*, thorace posterius angustato, elytris rugo-  
so-fulcatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 8. *mant. inf.* 1.  
p. 196. n. 13.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- variega- 67. *C. apterus ater*, elytris planis laevibus: margine sinuato  
tus. punctisque disci albis. *Fabr. sp. inf.* 2. app. p. 501. *mant.*  
*inf.* 1. p. 196. n. 14.  
*Forsk. ic. anim. t.* 24. f. A. *Cicindela.*  
*Habitat in Oriente, mediae magnitudinis.*
- gemma- 68. *C. apterus niger*, elytris striatis: punctis aeneis bilobis  
tus. excavatis triplici serie. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 300. n. 9.  
*mant. inf.* 1. p. 196. n. 15.  
*Habitat Hamburgi, statura hortensis.*
- inquisitor. 11. *C. alatus*, elytris striatis viridi-aeneis: punctis triplici  
ordine. *Fn. suec.* 789.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 303. n. 23.  
*mant. inf.* 1. p. 197. n. 31.  
*Roland. act. Stokh.* 1750. p. 292. t. 7. f. 3. *Carabus ala-*  
*tus viridi-aeneus*, concave punctatus striatusque, pedi-  
bus antennisque nigris.

- Degeer inf.* 4. p. 94. n. 9. Carabus alatus, clytris striatis margine aeneis &c.
- Geoffr. inf. par.* 1. p. 145. n. 6. Buprestis clytris latis, singulo striis sedecim.
- Voet coleoptr. t.* 38. f. 39.
- Bergstr. nomencl.* 1. t. 12. f. 3.
- Habitat in Europae locis suffocatis, clytris variis totis nigris.*
- scrutator. 69. C. alatus, clytris striatis viridibus: punctis triplici serie, thorace cyaneo: margine reflexo aurato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 303. n. 24. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 32.
- Habitat in Virginia.*
- reticulatus. 70. C. alatus niger, clytris reticulatis viridi-aeneis, thoracis margine virescente. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 197. n. 33.
- Habitat in Europa, statura et magnitudine inquisitoris.*
- scyophanta. 12. C. aureo-nitens, thorace caeruleo, clytris aureo-viridibus striatis, thorace subatro. *Mus. Lud. Utr.* 95.\* *Fn. suec.* 790.\*
- Fabr. sp. inf.* 1. p. 303. n. 25. *mant. inf.* 1. p. 197. n. 34.
- Carabus alatus violaceo-nitens, clytris striatis aureis.
- Degeer inf.* 4. p. 105. n. 2. t. 17. f. 19.
- Podal. inf.* 46.
- Geoffr. inf. par.* 1. p. 144. n. 5.
- Reaum. inf.* 2. t. 37. f. 18.
- Rob. jun. t.* 20. f. 2.
- Sulz. hist. inf. t.* 7. f. 1.
- Schaeff. elem. t.* 2. f. 1.
- icon. t.* 66. f. 6.
- Bergstr. nomencl.* 1. t. 12. f. 1. 2.
- Voet coleoptr. t.* 37. f. 32.
- β) Carabus punctato-lulcatus. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 357. n. 12. t. 7. f. 14.
- Habitat in Europa, maximus europaeorum.*
- Larva nigra, noctu larvas phalaenarum devastat.
- indagator. 71. C. apterus ater, thoracis margine rotundato, clytris laevissimis: punctis aeneis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 197. n. 35.
- Habitat in Barbaria, scyophantae propior, quam hortensi.*
- rostratus. 72. C. apterus, clytris laevibus nigris, thorace angustiore, capite angustissimo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 304. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 198. n. 36.
- Syst. nat.* XII. 2. p. 577. n. 20. *Fn. suec.* 123. Tenebrio rostratus.
- Habitat*

*Habitat in Europa boreali, etiam in Calabria elytris deflexis ad tenebriones accedens.*

- elevatus. 73. *C. apterus*, thoracis margine rotundato deflexo, elytris violaceis, corpore atro. *Fabr. mant. inf. I. p. 198. n. 37.*  
*Habitat in America meridionali, magnitudine et statura rostrati.*
- unicolor. 74. *C. apterus*, thoracis margine rotundato reflexo, corpore atro, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 198. n. 38.*  
*Habitat in America meridionali, elevata proxime affinis.*
- fimbriatus. 75. *C. apterus ater*, thoracē simplici: lateribus elytrorumque marginibus albo-tomentosis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 70. f. 83. Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. t. 47. f. 1.*  
*Habitat ad caput bonae spei, laevis, magnitudine thoracici.*
- alacer. 76. *C. apterus ater immaculatus*, thorace posterius rotundato fulcato. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 70.*  
*Habitat ad caput bonae spei, fimbriato proxime affinis.*
- spinosus. 77. *C. apterus ater*, elytris octo-fulcatis punctato-rugosis, posterius spinosis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 70.*  
*Voet coleaptr. I. t. 38. f. 44. 45.*  
*Habitat ad caput bonae spei, leucophthalmi magnitudine, glaber.*
- lunulatus. 78. *C. apterus ater*, thorace lunato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 72. f. 86.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glaber, magnitudine violacei, at latior et magis depressus.*
- difformis. 79. *C. apterus ater*, thorace transverso posterius truncato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 72.*  
*Habitat in interioribus regionibus pone caput bonae spei sitis, statura et magnitudine hortensis.*
- dorsalis. 80. *C. ater*, antennis elytrisque rubris: margine nigro. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 73.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glaber, magnitudine fere leucophthalmi.*
- obtusus. 81. *C. thorace elytrisque fuscis*, capite antennis pedibusque rubris. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 74.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine fere cephalosis, crepitanti similis.*

- adspersus. 82. *C. apterus*, supra viridi-aeneus obscurus, subtus niger, elytris punctis excavatis aureis quadruplici ordine fulcisque elevatis.  
*Degeer inf. 4. p. n. 1. t. 3. f. 12.* Carabus aeneo-punctatus  
*Voet coleoptr. 1. t. 37. f. 35.*  
*Habitat in Europae silvis, sub cespite; elytris interdum nigris.*
- Herbstii. 83. *C. elytris* transversim undulatis: punctorum aureorum ordine triplici. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 131. n. 15.*  
*Habitat in Germania, inquisitori simillimus, sed major, pollicem longus, nunc virefcens, nunc niger.*
- pomera- 84. *C. cupreus* subtus niger, elytris decussatim striatis: punctorum elevatorum serie triplici. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 132. n. 16.*  
 nus. *Habitat in Pomerania, granulato affinis, 9 fere lineas longus.*
- cylindri- 85. *C. ater* cylindricus, thorace angustato, medio fulcato, elytris novemfulcatis: margine exteriori punctato. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 132. n. 17. t. 29. f. 3.*  
 cus. *Habitat - - - ultra 9 lineas longus.*
- problema- 86. *C. apterus* niger caeruleo-nitens, elytris obsolete striatis.  
 ticus. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 177. n. 67. t. 47. f. 5.*  
*Habitat in Aultria, cyaneo intricatoque affinis, at brevior et latior.*
- nemora- 87. *C. niger*, elytris aeneis: lineolis intricatis subrugosis punctisque excavatis triplici serie. *Müll. zool. dan. prodr. p. 75. n. 809. Fn. Fridrichsd. p. 21. n. 211.*  
 lis. *Habitat in Dania; an vere distincta species?*
- rubicun- 88. *C. apterus*, subtus niger, thorace violacco, elytris rubicundis: sutura atque marginibus albis. *Lepech. it. 2. p. 195. t. 10. f. 1.*  
 dus. *Habitat in Russiae fissuris montium.*
- catenula- 89. *C. elytris* porcatis: punctorum elevatorum triplici serie tribus  
 tus. striis elevatis scabriusculis decussata. *Scop. ent. carn. n. 264.*  
*Habitat in Carniolia et Helvetia.*
- atoma- 228. *C. apterus* ater glaber, elytris sublaevibus: punctis minutissimis sparsis confluentibus, marginibusque subviolaceis. *Muf. Lesk. p. 37. n. 818.*  
 rius. *Habitat in Europa.*

- miliarius. 229. *C. apterus ater*, elytris marginibus externis violaceo-aeneis punctisque elevatis sparsis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 819.*  
*Habitat in Europa.*
- rugosus. 230. *C. apterus ater*, elytris rugosis: rugis alternis confusis fractis. *Mus. Lesk. p. 37. n. 820.*  
*Habitat in Europa.*
- aeruginosus. 231. *C. apterus ater*, elytris confertim striatis: punctorum impressorum viridium serie triplici. *Mus. Lesk. p. 37. n. 823.*
- cyprius. 232. *C. apterus niger*, capite, thorace elytrisque cupreis: his rugis quatuor singulis triplici punctorum elevatorum serie discretis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 824.*  
*Habitat in Europa.*
- \*\* minores.
- afer. 90. *C. niger*, antennis pedibusque rufescentibus, elytris laevibus. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 73.*  
*Habitat ad caput bonae spei sub lapidibus montium, magnitudine vulgaris, subtus piceus, oblongus.*
- capensis. 91. *C. ferrugineus*, thorace elytrorumque futura lineae longitudinali nigra. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 75. f. 88.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura marginati, sed paulo minor, glaber, abdomine nunc nigro, nunc ferrugineo.*
- fasciatus. 92. *C. ferrugineus fascia elytrorum nigra.* *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 75. f. 89.*  
*Habitat ad caput bonae spei, quadrimaculato affinis.*
- striatulus. 93. *C. niger*, thoracis basi utrinque puncto impresso, elytris striatis medio glabris. *Fabr. sp. inf. I. p. 305. n. 32. mant. inf. I. p. 199. n. 44.*  
*Habitat ad Patagoniae littora.*
- caliginosus. 94. *C. ater*, thorace quadrato laevi, antennis piceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 305. n. 33. mant. inf. I. p. 199. n. 45.*  
*Habitat in America, capitis punctis duobus impressis.*
- arenarius. 95. *C. pallidus*, elytris maculis duabus dorsalibus atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 305. n. 34. mant. inf. I. p. 199. n. 46.*  
*Habitat in Cambriae arena mobili.*

- fabulosus. 96. *C. pallidus*, capite coleoptrorumque macula dorsali nigris.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 47.*  
*Habitat in Saxoniae fabuletis, arenario, affinis.*
- ruficornis. 97. *C. ater*, elytris fulcatis laevibus, antennis pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 305. n. 35. mant. inf. 1. p. 199. n. 48.*  
*Geoffr. inf par. 1. p. 146. n. 8. Buprestis niger &c.*  
*List. scarab. angl. p. 390. n. 24. Scarabaeus niger, pedibus corniculisque croceis.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 843. Carabus cursor.*  
*Habitat in Europae silvis, frequens.*
- bicolor. 98. *C. supra niger*, subtus ferrugineus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 36. mant. inf. 1. p. 199. n. 49.*  
*Habitat in America boreali.*
- flavicornis. 99. *C. niger*, thoracis margine antennis pedibusque flavescens. *Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 50.*  
*Habitat Halae Saxonum, mediae magnitudinis.*
- buprestoides. 13. *C. niger*, capite recepto, antennis palpisque ferrugineis, pedibus piceis.  
*Habitat in Europa australi, mediae magnitudinis.*
- fastigiatus. 14. *C. ferrugineus*, abdomine elytrisque fastigiatis nigris. *Mus. Lud. Utr. 97.\**  
*Habitat ad caput bonae spei. Tulbagh.*
- lividus. 15. *C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris: lateribus lividis. Fn. suec. 791.\**  
*Habitat in Europa.*
- marginatus. 16. *C. niger*, elytris margine tibiisque testaceis. *Fn. suec. 804. Fabr. sp. inf. 1. p. 310. n. 51. mant. inf. 1. p. 202. n. 84. Geoffr. inf par. 1. p. 162. n. 41. Buprestis viridis, pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis.*  
*Pontopp. atl. Dan. 1. t. 29.*  
*Habitat in Europa, aliquando viridis.*
- cinctus. 100. *C. fuscus*, capite thoraceque viridi-aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 510. n. 62. mant. inf. 1. p. 202. n. 85.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. t. 29. f. 7.*  
*Habitat in Coromandel, marginato major.*

- pallipes. 101. *C. ater*, thoracis rotundati coleoptrorumque limbo et pedibus pallidis. *Fabr. mant. inf. I. p. 202. n. 86.*  
*Habitat in America, marginato minor.*
- limbatus. 102. *C. supra ferrugineus*, thorace macula, elytris fasciis undatis viridi-aeeneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 310. n. 63. mant. inf. I. p. 202. n. 87.*  
*Herbst Besch. der berl. naturf. Ges. 4. t. 7. f. 4.*  
*Habitat in Germania sub lapidibus.*
- nitidulus. 103. *C. niger*, elytrorum margine aeneo nitido. *Fabr. mant. inf. I. p. 202. n. 88.*  
*Habitat in Camtschatca, statura et magnitudine cuprei.*
- complanatus. 17. *C. pallidus*, elytris fasciis duabus undulatis nigricantibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 306. n. 41. mant. inf. I. p. 200. n. 57.*  
Carabus thorace orbiculato, rufus, elytris fasciis duabus nigris.  
*Habitat in insula S. Dominici.*
- pilicornis. 104. *C. thorace rotundato*, elytris striatis punctisque impressis, antennis pilosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 307. n. 48. mant. inf. I. p. 200. n. 65. Lesk. it. p. 18. t. A. f. 7.*  
*Habitat in Anglia, nunc niger, nunc aeneus.*
- spinibarbis. 105. *C. cyaneus*, thorace orbiculato, ore antennis tibiisque rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 307. n. 47. mant. inf. I. p. 200. n. 64.*  
*Habitat in Anglia.*
- sempustulatus. 106. *C. rufus*, elytris nigris: punctis sex rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 307. n. 46. mant. inf. I. p. 200. n. 63.*  
*Habitat in America meridionali.*
- bimaculatus. 107. *C. niger*, fascia communi flava interrupta, antennis pedibusque testaceis. *Mant. p. 532.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 307. n. 45. mant. inf. I. p. 200. n. 62.*  
Carabus niger, capite elytrisque truncatis puncto bascos fasciaque media ferrugineis.  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 5.*  
*Voet coleoptr. t. 34. f. 10. II.*  
*Habitat in India, thorace mox flavo, mox nigro, mox maculato.*
- crepitans. 18. *C. thorace capite pedibusque ferrugineis*, elytris nigris. *Fn. succ. 272. Fabr. sp. inf. I. p. 307. n. 44. mant. inf. I. p. 200. n. 61.*

- Degeer inf. 4. p. 103. n. 22. t. 3. f. 18.* Carabus alatus ferrugineus &c.
- Geoffr. inf. par. I. p. 151. n. 19.* Buprestis capite, thorace pedibusque rubris &c.
- Rol. act. Stockh. 1750. p. 292. t. 7. f. 2.* Cicindela capite, thorace pedibusque rufis &c.
- Schaeff. ic. t. 11. f. 13.*
- Voet coleopt. I. t. 36. f. 26.*
- Berg str. nomencl. 1. t. 13. f. 9.*
- Habitat in Europae nemoribus, persequentes carabos majores crepitu ventris pellens.*
- fumans. 108. C. ferrugineus, elytris nigro-cyaneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 307. n. 43. mant. inf. I. p. 200. n. 60.*  
*Habitat in America, crepitanti affinis, at triplo major.*
- lateralis. 109. C. niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis. *Fabr. mant. inf. I. p. 200. n. 59.*  
*Habitat Kilonii, statura et magnitudine americani.*
- americana- 19. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. nus. sp. inf. I. p. 306. n. 42. mant. inf. I. p. 200. n. 58.*  
*Degeer inf. 4. p. 107. n. 3. t. 17. f. 21.*  
*Habitat in America, crepitanti similis, sed quadruplo major.*
- sj.inipes. 20. C. piceus, thorace linea excavata longitudinali, manibus spinosis. *Fn. succ. 793. Scop. ent. carn. 267.*  
*Habitat in Europa, super tritici spicas frequens.*
- cyanoc- 21. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis. *Fn. succ. 794.\* Fabr. sp. inf. I. p. 310. n. 65. mant. phalus. inf. I. p. 203. n. 90.*  
*Fn. succ. 525.* Carabus capite elytrisque caeruleis, thorace rubro.  
*Degeer inf. 4. p. 100. n. 17. t. 3. f. 17.* Carabus alatus, capite elytrisque viridi-caeruleis &c.
- Geoffr. inf. par. I. p. 149. n. 40.* Buprestis capite elytris- que caeruleis, thorace rubro.
- Raj. inf. p. 89. n. 1.* Cantharis elytris et capite caeruleis, icopulis croceis.
- Schaeff. ic. t. 10. f. 14.*  
*Habitat in Europae silvis.*
- ruficollis. 110. C. thorace obcordato ferrugineo, elytris truncatis striatis viridibus, capite plano atro. *Fabr. mant. inf. I. p. 203. n. 91.*  
*Habitat in America meridionali, mediac magnitudinis.*



- amethy- III. *C. cyaneus*, capite thoraceque aeneis nitidis. *Fabr. mant.*  
stinus. *inf. I. p. 203. n. 92.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine cyanocephali.*
- flexuosus. II2. *C. niger*, elytris ferrugineis: macula media sinuata punctoque apicis nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 311. n. 66. mant.*  
*inf. I. p. 203. n. 93.*  
*Habitat in India.*
- melano- 22. *C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris.*  
cephalus. *Fn. succ. 795.\**  
*Fn. succ. I. n. 526.* Carabus capite elytrisque atris, thorace rubro.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 310. n. 64. mant. inf. I. p. 202. n. 89.*  
Carabus niger, thorace pedibusque ferrugineis.  
*Voet coleoptr. I. t. 35. f. 15.*  
β) *Fn. succ. 524.* Carabus niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis.  
*Degeer inf. 4. p. 93. n. 8.* Carabus apterus niger nitidus &c.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 162. n. 42.* Buprestis nigro &c.  
*Habitat in Europae locis suffocatis.*
- vapora- 23. *C. thorace fusco, pedibus antennis elytrisque anterieus et*  
riorum. *apice ferrugineis. Fn. succ. 796.\* Fabr. sp. inf. I. p. 312.*  
*n. 76. mant. inf. I. p. 205. n. 110.*  
*Fn. succ. I. n. 529.* Carabus ater, elytris antice griseis.  
*Müll. prodr. zool. dan. p. 78. n. 850.* Carabus nigricans,  
antennis, thorace, pedibus elytrisque antice ferrugineis.  
*Voet coleoptr. I. t. 35. f. 18.*  
*Habitat in Europa, frequens, meridiano quadruplo major.*
- latus. 24. *C. niger, elytris striatis crenatis, antennis pedibusque*  
ferrugineis. *Fn. succ. 521.\* Fabr. sp. inf. I. p. 308. n. 54.*  
*mant. inf. I. p. 201. n. 73.*  
*Degeer inf. 4. p. 101. n. 18.* Carabus alatus niger nitidus &c.  
*Schaeff. ic. t. 194. f. 7.*  
*Habitat in Europa frequens.*
- abdomi- II3. *C. niger, antennis, abdominis disco pedibusque ferru-*  
nalis. *gineis. Fabr. mant. inf. I. p. 201. n. 74.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura et magnitudine lati.*
- Lincola. II4. *C. thorace subaequali ferrugineus, elytris lincola nigra.*  
*Fabr. sp. inf. I, p. 309. n. 55. mant. inf. I. p. 201. n. 75.*  
*Habitat in America septentrionali.*

- ferrugi- 25. *C. ferrugineus*, thorace glaberrimo. *Fn. suec.* 798.\*  
neus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 309. n. 56. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 76.  
Carabus ferrugineus elytris striatis obscurioribus.  
*Degeer inf.* 4. p. 101. n. 19. Carabus alatus flavo-griseus nitidus &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 162. n. 43. Buprestis ferrugineo-lividus &c.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. t. 29. f. 6. c.  
*Habitat in Europae arvis.*
- pallens. 115. *C. pallidus*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 309.  
n. 57. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 77.  
*Habitat Dresdae, an satis distinctus a ferrugineo?*
- dorsiger. 116. *C. ferrugineus* abdomine coleoptrorumque lunula lata  
nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 201. n. 78.  
*Habitat in Barbaria, statura pallentis.*
- germa- 26. *C. cyaneus*, capite, pedibus elytrisque testaceis, elytris  
nus. apice violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 317. n. 71. *mant. inf.*  
1. p. 204. n. 102.  
*Schaeff. ic. t.* 31. f. 13.  
*Habitat in Germania, interdum niger.*
- vulgaris. 27. *C. nigro-aeneus*, antennis pedibusque nigris. *Fn. suec.*  
799.\* *Scop. ent. carn.* 268. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 308. n. 52.  
*mant. inf.* 1. p. 201. n. 70.  
*Degeer inf.* 4. p. 97. n. 14. Carabus alatus supra viridi-  
aeneus nitidus &c.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 158. Buprestis fusco-aeneus.  
*Schaeff. ic. t.* 18. f. 2.  
*Habitat in Europae silvis frequens.*
- azureus. 117. *C. cyaneus*, antennis pedibusque rubris. *Fabr. sp. inf.*  
1. p. 508. n. 53. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 71.  
*Bergstr. nomencl.* 1. t. 10. f. 3.  
*Habitat in Lipsiae collibus arenosis.*
- erythro- 118. *C. niger*, capite rufo, antennis pedibusque flavis. *Fabr.*  
cephalus. *mant. inf.* 1. p. 201. n. 72.  
*Habitat Kilonii, mediae magnitudinis.*
- caerulef- 28. *C. nigro-caeruleus*, antennis basi rubris. *Fn. suec.* 800.\*  
cens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 308. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 200. n. 66.  
Carabus nigro-caeruleus, elytris striatis.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 76. n. 817. Carabus virens.  
*Schaeff. ic. t.* 18. f. 3. 4.  
*Habitat in Europae hortis, viis.*

- lepidus. 119. *C. viridi-aeneus*, thorace quadrato posteriore utrinque biltriato, elytris striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 200. n. 67. Lesk. it. 1. p. 17. n. 8. t. A. f. 6.*  
*Habitat in Lusatiae arenosis, magnitudine et statura caerulefcentis.*
- cupreus. 29. *C. cupreus*, antennis basi rubris. *Fn. suec. 801.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 308. n. 50. mant. inf. 1. p. 201. n. 68. Degeer inf. 4. p. 97. n. 13. t. 3. f. 15.* *Carabus alatus supra viridi-aeneus &c.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 161. n. 40.* Buprestis totus viridi cupreus, antennis nigris.  
*Habitat in Europae silvis.*
- Carnifex. 120. *C. alatus viridi-aeneus*, antennis pedibusque rufis, thorace angustato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 308. n. 51. mant. inf. 1. p. 201. n. 69.*  
*Habitat in Terra del fuego.*
- piceus. 30. *C. niger*, pedibus antennisque piceis. *Fn. suec. 802.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 37. mant. inf. 1. p. 199. n. 51.*  
*Carabus thorace obcordato, antennis tibiisque piceis, elytris striatis.*  
*Gron. zooph. 501.* *Carabus apterus niger.*  
*Schaeff. ic. t. 18. f. 9.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- holofericeus. 121. *C. holofericeo-niger*, capite aeneo nitido. *Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 52.*  
*Habitat Kilonii, statura picea.*
- femoralis. 122. *C. capite thoraceque aeneis*, elytris striatis obscurioribus, femoribus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 38. mant. inf. 1. p. 199. n. 53.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- madidus. 123. *C. niger*, thorace posteriore utrinque impresso, femoribus rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 306. n. 39. mant. inf. 1. p. 199. n. 54.*  
*Habitat in Anglia.*
- binotatus. 124. *C. ater*, capite punctis duobus frontalibus rubris, antennis basi flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 199. n. 55.*  
*Habitat Kilonii, statura et magnitudine ruficornis.*

- interru- 125. *C. ater*, thorace posterius rotundato abdomineque remo-  
ptus. tis. *Fabr. sp. inf. I. p. 306. n. 40. mant. inf. I. p. 200. n. 56.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. t. 29. f. 4. a.*  
*Habitat in Oriente, an forte tenebrio?*
- velox. 31. *C. nigricans*, pedibus tibiisque pallidis. *Fn. suec. 803.\**  
*It. gotl. 207.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 312. n. 72. mant. inf. I. p. 204. n. 103.*  
Carabus nigricans, antennis pedibusque pallidis, elytris  
obtusissimis.  
*Habitat in Europae arena volatili, agilissimus.*
- rufescens. 126. *C. ferrugineus*, thorace rotundato, vertice anoque nigris.  
*Fabr. sp. inf. I. p. 312. n. 73. mant. inf. I. p. 204. n. 104.*  
*Habitat in Anglia.*
- viridanus. 127. *C. viridi-aeneus*, elytris ferrugineis: macula communi  
nigro-aenea. *Fabr. mant. inf. I. p. 204. n. 105.*  
*Habitat in Germaniae quisquiliis, statura c. vaporariorum,*  
*thorace interdum nigro.*
- bipustula- 128. *C. thorace orbiculato elytrisque nigris: maculis duabus*  
tus. rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 312. n. 74. mant. inf. I. p.*  
*204. n. 106.*  
*Habitat in Anglia.*
- aequino- 129. *C. flavus*, thorace cordato, elytris fuscis: maculis dua-  
ctialis. bus flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 312. n. 75. mant. inf. I.*  
*p. 204. n. 107.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. t. 29. f. 8. d.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, parvus.*
- lunatus. 130. *C. niger*, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris flavis:  
maculis tribus nigris. *Fabr. syst. ent. p. 247. n. 60. mant.*  
*inf. I. p. 204. n. 108.*  
*Habitat in - - -*
- prasinus. 131. *C. niger*, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris macula  
magna communi posteriore nigra. *Fabr. mant. inf. I.*  
*p. 204. n. 109.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 74. f. 87.* Carabus thorace capi-  
teque cyaneis, elytris rubris: postice macula communi  
fulca.  
*Habitat Hafniae et ad caput bonae spei, statura c. vaporariorum,*  
*at paulo major.*

- multipun- 32. *C. subaeneus*, elytris punctis vagis plurimis impressis.  
 ctatus. *Fn. suec.* 805.\* *Fabr. sp. inf.* I. p. 309. n. 58. *mant. inf.* I.  
 p. 201. n. 79.  
*Habitat in Europae sabulosis.*
- hafnien- 132. *C. niger*, elytris striatis: punctis dorsalibus plurimis im-  
 fis. pressis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 202. n. 80.  
*Habitat Hafniae, mediae magnitudinis.*
- aeneus. 133. *C. ferrugineus*, thorace elytrisque aeneis. *Fabr. sp. inf.* I.  
 p. 309. n. 59. *mant. inf.* I. p. 202. n. 81.  
*Habitat in Lipsiae hortis.*
- nigricor- 134. *C. niger*, thorace cupreo elytris striatis viridibus, pedi-  
 nis. bus piccis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 202. n. 82.  
*Habitat in Dania, statura sexpunctati, at paulo major.*
- bipuncta- 33. *C. subaeneus*, elytris punctis duobus impressis. *Fn.*  
 tus. *suec.* 806.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 313. n. 86. *mant. inf.* I. p. 205. n. 121.  
*Carabus aeneus, antennis nigris, tibiis pallidis.*  
*Habitat in Europae quisquiliis.*
- angusta- 135. *C. thorace cylindrico cyaneo, elytris testaceis apice ni-*  
 tus. *gris.* *Fabr. mant. inf.* I. p. 205. n. 122.  
*Habitat in Germania, parvus, an hujus generis?*
- quadripu- 34. *C. capite ferrugineo, thorace atro, elytris maculis duabus*  
 stulatus. *flavis.* *Fn. suec.* 811.\*  
*Habitat in Europa.*
- sexpun- 35. *C. subaeneus*, elytris punctis longitudinalibus sex impressis.  
 ctatus. *Fn. suec.* 807.\*  
*Fn. suec.* I. n. 519. *Carabus nitens, capite thoraceque cya-*  
*neo, elytris purpureis.*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 309. n. 60. *mant. inf.* I. p. 202. n. 83.  
*Carabus capite thoraceque viridibus, elytris cupreis.*  
*Degeer inf.* 4. p. 99. n. 16. *Carabus alatus, capite thora-*  
*ceque viridi-aureis &c.*  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 149. n. 14. *Buprestis nitens, capite*  
*thoraceque viridibus &c.*  
*Goed. inf.* 2. p. 126. t. 31.  
*Schaeff. ic.* t. 66. f. 4.  
*Voet coleopt.* I. t. 33. f. 4.  
*Habitat in Europa et boreali America.*

- meridia- 36. *C. niger*, elytris antierius pedibusque testaceis. *Fabr. sp.*  
nus. *inf. I. p. 312. n. 77. mant. inf. I. p. 205. n. 111.*  
*Habitat in Europa, parvus.*
- Comma. 136. *C. niger*, thorace fusco, elytris griseis: macula lineari  
nigra. *Fabr. sp. inf. I. p. 312. n. 78. mant. inf. I. p. 205.*  
*n. 112.*  
*Habitat in America.*
- testaceus. 37. *C. pallide testaceus*, elytris glabris. *Fn. suec. 812.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 84. mant. inf. I. p. 205. n. 119.*  
Carabus capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 153. n. 25. Buprestis testaceus, ca-*  
*pite nigro.*  
*Habitat in Europa.*
- abbrevia- 137. *C. thorace rotundato rufo*, elytris abbreviatis testaceis.  
tus. *Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 85. mant. inf. I. p. 205. n. 20.*  
*Habitat in Norwegiae rupibus.*
- ustulatus. 38. *C. thorace nigro*, elytris obscuris pallido-bifasciatis. *Fn.*  
*suec. 810. Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 81. mant. inf. I.*  
*p. 205. n. 115.*  
*Fn. suec. 528. Carabus niger, coleoptris pone fascia ferru-*  
*ginea; lateribus macula ferruginea.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 151. n. 20.*  
*Voet coleoptr. I. t. 34. f. 7.*  
*Habitat in Europae quisquiliis, maculis interdum magnis ob-*  
*soletis rubro-pallidis varius.*
- kilonien- 138. *C. thorace rotundato nigro*, coleoptris pallidis: macula  
fis. magna dorsali nigra. *Fabr. mant. inf. I. p. 205. n. 116.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- Crux ma- 39. *C. thorace capiteque nigro-rubefcente*, coleoptris ferru-  
jor. gineis: cruce nigra. *Fn. suec. 808.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 311. n. 67. mant. inf. I. p. 203. n. 94.*  
Carabus thorace orbiculato rubro, coleoptris truncatis ru-  
bris, cruce nigra.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 150. n. 18.*  
*Schaeff. ic. t. I. f. 13.*  
*Habitat in Europae silvis.*
- vittatus. 139. *C. thorace marginato rufo*, elytris atris: vitta alba. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 311. n. 68. mant. inf. I. p. 203. n. 95.*  
*Habitat in America boreali.*

- turcius. 140. C. thorace orbiculato rufo, elytris nigris: lunula bascos pallida. *Fabr. mant. inf. I. p. 203. n. 96.*  
*Habitat - - - statura et magnitudine vittati.*
- haemor- 141. C. thorace fuborbiculato, elytris nigris apice rufis. *Fabr.*  
 rhoidalis. *mant. inf. I. p. 203. n. 97.*  
*Habitat Dresdae, rufus.*
- picipes. 142. C. ater nitidus, thorace rotundato, elytris fuscis, pedi-  
 bus ferrugineis. *Fabr. mant. inf. I. p. 203. n. 98.*  
*Habitat in Suecia, parvus, oblongus, agilis.*
- agilis. 143. C. rufus, thorace rotundato, elytris abdomineque nigris,  
*Fabr. mant. inf. I. p. 204. n. 99.*  
*Habitat Uplaliae, statura vittati.*
- Crux mi- 40. C. thorace luteo glabro, elytris posterius nigris. maculis  
 nor. duabus flavis. *Fn. suec. 809.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 311. n. 69. mant. inf. I. p. 204. n. 100.*  
 Carabus thorace orbiculato rufo, coleoptris apice nigris,  
 macula rufa.  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 18. f. 8. et t. 41. f. 13.*  
*Habitat in Europa, praesertim Anglia.*
- Andreae. 144. C. thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis: fascia  
 media nigra. *Fabr. mant. inf. I. p. 311. n. 70. mant.*  
*inf. I. p. 204. n. 101.*  
*Habitat in Italia, statura c. crucis minoris.*
- quadri- 41. C. thorace ferrugineo glabro, elytris obtusissimis fuscis:  
 maculatus. maculis duabus albis. *Fn. suec. 813.\** *Fabr. sp. inf. I.*  
*p. 313. n. 79. mant. inf. I. p. 205. n. 113.*  
*Fn. suec. I. n. 532.* Carabus niger, thorace ferrugineo,  
 elytrorum maculis 4 lividis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 152. n. 24.* Buprestis niger, thorace  
 plano ferrugineo &c.  
*Pontopp. atl. Dan. I. t. 29.*  
*Habitat in Europae quisquiliis.*
- quadri- 145. C. thorace rotundato atro, elytris nigris: punctis qua-  
 guttatus. tuor albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 80. mant. inf. I.*  
*p. 205. n. 114.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. t. 29. f. 9. c.*  
*Habitat in Anglia.*

- atricapil- 42. *C. flavus*, capite nigro, elytris obtusissimis.  
 lus. *Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 82. mant. inf. I. p. 205. n. 117.*  
*Carabus thorace rotundato rufo, elytris obtusis testaceis,*  
*capite atro.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. t. 29. f. 10. f?*  
*Habitat in Europa boreali.*
- bigutta- 146. *C. capite rotundato aeneo, elytris nigris: macula apicis*  
 tus. *pallida. Fabr. sp. inf. I. p. 313. n. 83. mant. inf. I. p.*  
*205. n. 118. Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 76.*  
*Habitat in Norwegia, sub arborum corticibus, in Suecia,*  
*et ad caput bonae spei, pediculo duplo major.*
- truncatel- 43. *C. niger*, supra aeneus, elytris apice subtruncatis. *Fn.*  
 lus, *suec. 814.\**  
*Fabr. mant. inf. I. p. 206. n. 123. Carabus thorace rotun-*  
*dato, supra obscure aeneus, subtus ater.*  
*Habitat in Europae quisquiliis, parvus.*
- Thunber- 147. *C. elytris testaceis: macula communi violacea, capite*  
 gii. *thoraceque nigris. Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 20. n. 34.*  
*Habitat Upsaliae, caerulefcentis magnitudine, c. vaporario-*  
*rum affinis.*
- upsalien- 148. *C. elytris viridibus striatis, thorace plano aeneo punctato.*  
 fis. *Thunb. nov. act. Upsf. 4. p. 20. n. 35.*  
*Habitat Upsaliae, vulgaris magnitudine, cupreo affinis, at*  
*thorace punctato distinctus.*
- fericeus. 149. *C. ater*, capite thorace et elytris viridinitentibus, an-  
 tennis pedibusque rufis. *Forst. nov. inf. sp. I. p. 58. n. 58.*  
*Habitat in America septentrionali, spinipede paulo major.*
- lineatus. 150. *C. thorace ferrugineo, pedibus elytrisque griseis: futurae*  
*linea communi alteraque media nigra, tarsis nigris. Forst.*  
*nov. inf. sp. I. p. 59. n. 59.*  
*Habitat in America septentrionali, magnitudine crucis mi-*  
*noris.*
- marchi- 151. *C. subtus niger, capite thoraceque caelis, palpis anten-*  
 cus. *nisque fuscis basi ferrugineis. Herbst apud Fuessli arch.*  
*inf. 6. p. 137. n. 38.*  
*Habitat Berolini, germano affinis.*
- Schran- 152. *C. viridi-aeneus, abdomine nigro, pedibus antennisque*  
 ckii. *pallide rufis. Schranck inf. austr. p. 213. n. 401.*  
*Habitat in Germania, 5 lineas longus.*



- indicus. 153. *C. niger*, antennis apice griseis, thorace linea impressa, elytris septemfulcatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 138. n. 40. t. 29. f. 11.*  
*Habitat in India, 9 lineas longus.*
- splendidus. 154. *C. fuscus*, capite thoraceque viridi-aeneis, pedibus pallidis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 138. n. 41.*  
*Habitat in India, cincto proxime affinis, an satis distinctus?*
- marginellus. 155. *C. piceus*, pedibus spinulosis, antennis thoracisque margine flavescens, elytris octostriatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 138. n. 42.*  
*Habitat in India, angustus, 7½ lineas longus.*
- Frischii. 156. *C. niger*, thoracis sulco unico medio, elytrorum octo. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 138. n. 43.*  
*Habitat Berolini, 8-9 lineas longus, oculis albis.*
- varius. 157. *C. supra nigro-aeneus subtus niger*, corpore ovato brevi, thorace convexo, elytris laevibus, antennis basi rufis. *Degeer inf. 4. p. n. 15.*  
*Habitat in Europa, 3 circiter lineas longus.*
- Herbstii. 158. *C. niger*, antennis thoracisque glaberrimi margine anteriori ferrugineis, pedibus piceis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 138. n. 45.*  
*Habitat Berolini.*
- Mülleri. 159. *C. aeneo-niger*, elytris punctato-striatis: punctis tribus impressis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 139. n. 46.*  
*Müll. zool. dan. prodr. n. 842. Carabus sexpunctatus.*  
*Habitat in Europa, 3 lineas longus.*
- obscurus. 160. *C. niger*, subtus badius, elytris fuscis: striis 8 punctatis, antennis pedibusque luteis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 139. n. 47. t. 29. f. 12. g.*  
*Müll. zool. dan. prodr. n. 819.*  
*Habitat in Europa.*
- Pelidnus. 161. *C. niger*, thorace orbiculato, elytris sordide luteis octostriatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 139. n. 48.*  
*Habitat Berolini.*
- hungaricus. 162. *C. ex fusco rufus*, elytris striatis, thorace rotundato. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 108. n. 103. Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 139. n. 49.*  
*Habitat in Hungaria et Germania, vix ultra 2 lineas longus.*

- aterri- 163. *C. totus ater nitidus, thorace rotundato, elytris obsolete  
mus. striatis: punctis quatuor ad futuram excavatis. Herbst  
apud Fueslli arch. inf. 6. p. 140. n. 50. t. 29. f. 13.  
Habitat Berolini, statura multipunctati, at major, sex li-  
neas longus.*
- terricola. 164. *C. niger, subtus fuscus, elytris caeruleis: striis novem  
punctatis; extima crenata. Herbst apud Fueslli arch. inf.  
6. p. 140. n. 51. t. 29. f. 14.  
Habitat Berolini, 7-8 lineas longus.*
- platys. 165. *C. totus niger, thorace submarginato, elytris glabris  
obsolete striatis. Herbst apud Fueslli arch. inf. 6. p. 140.  
n. 52.  
Habitat Berolini, lato proximie affinis, at latior.*
- Aethiops. 166. *C. totus niger nitidus. Herbst apud Fueslli arch. inf. 6.  
p. 141. n. 53.  
Habitat Berolini, vulgari affinis, an propria species? 5-6  
lineas longus.*
- Virgo. 167. *C. niger, antennis pedibusque fuscis, thorace posterius  
sinuato, elytris obsolete striatis. Herbst apud Fueslli  
arch. inf. 6. p. 141. n. 54.  
Habitat Berolini, vulgari similis, 3 lineas longus.*
- glaber. 168. *C. niger nitidus, elytris fuscis striatis, ore palpis pedi-  
busque piecis. Herbst apud Fueslli arch. inf. 6. p. 141.  
n. 55.  
Habitat Berolini, vulgari affinis, sed angustior.*
- globosus. 169. *C. niger, thorace hemisphaerico, elytris punctato-stria-  
tis, ore palpisque ferrugineis, antennis basi fulvis submo-  
niliformibus. Herbst apud Fueslli arch. inf. 6. p. 142.  
n. 58. t. 29. f. 17. k.  
Habitat Berolini, vix sesquilineam longus, an hujus generis?*
- chalcos. 170. *C. aeneus subtus niger, antennis basi ferrugineis, thorace  
punctato, elytris punctato-striatis. Herbst apud Fueslli  
arch. inf. 6. p. 142. n. 59.  
Habitat Berolini, 2½ lineas longus.*
- micros. 171. *C. badius, elytris punctato-striatis, oculis nigris. Herbst  
apud Fueslli arch. inf. 6. p. 142. n. 60.  
Habitat Berolini 2 lineas longus.*

- lampros. 172. *C. nitens glaberrimus aeneo-niger, subtus niger, elytris punctato-striatis; antennis griseis, pedibus fulcis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 143. n. 61.*  
*Habitat Berolini, ad ripas humidas, chalco affinis, at minor, 1½ lineas longus.*
- pyropus. 173. *C. ater nitens, thoracis margine elevato, antennis pedibusque piceis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 143. n. 62.*  
*Habitat Berolini, statura lati, 4 lineas longus.*
- mixtus. 174. *C. luteus, capite nigro, elytris posterioribus nigro irroratis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 143. n. 63.*  
*Habitat Berolini, 2 lineas longus.*
- Geerii. 175. *C. supra niger, subtus flavus, elytris maculis binis, pedibus antennisque fulvis. Degeer inf. 4. p. 102. n. 20.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 840? Carabus bimaculatus. Habitat in Europa.*
- didymus. 176. *C. ex nigro caeruleus, elytris flavis: macula didyma fusca. Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 849.*  
*Habitat in Dania.*
- minimus. 177. *C. thorace subnigro, elytris striatis pedibus antennisque fuscis. Müll. Fn. Fridrichsd. p. 21. n. 212. zool. dan. prodr. p. 77. n. 833.*  
*Habitat in Dania, herbariis quoque infestus, vix pediculi magnitudine.*
- flavus. 178. *C. flavus, elytris striatis, capite, thorace maculaque apicis elytrorum viridi. Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 846.*  
*Habitat in Dania.*
- fenestratu. 179. *C. niger, elytris fuscis: maculis obliquis flavis fenestratu. Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 812.*  
*Habitat in Dania.*
- inflexus. 180. *C. niger, tibiis tarsisque piceis, elytris punctorum impressorum serie flexuosa. Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 814.*  
*Habitat in Dania.*
- fulvipes. 181. *C. niger, elytris aeneis, pedibus antennisque fulvis. Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 816.*  
*Habitat in Dania.*

- nigricans. 182. *C. ater*, elytris, antennis, palpis pedibusque piceis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 76. n. 819.  
*Habitat in Dania.*
- celer. 183. *C. piceus*, capite thorace elytrisque striatis nigris. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 76. n. 823. *act. nidros.* 4. p. 32.  
*Habitat in Scandinavia.*
- caeruleus. 184. *C. niger*, elytris cyaneis, antennis palpis pedibusque fulvis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 77. n. 827.  
*Habitat in Dania.*
- similis. 185. *C. niger*, thorace posteriorius utrinque excavato, elytrorum striis subpunctatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 77. n. 828.  
*Habitat in Dania.*
- aestivus. 186. *C. flavus*, capite ferrugineo, thorace elytrisque nigris. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 77. n. 832.  
*Habitat in Dania.*
- flexilis. 187. *C. flavicans*, capite nigro, elytris lividis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 78. n. 837. *act. nidros.* 4. p. 30.  
*Habitat in Scandinavia.*
- laevis. 188. *C. aeneus*, capite thoraceque viridi, elytris cupreis, pedibus piceis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 78. n. 841.  
*Habitat in Dania.*
- vernalis. 189. *C. niger*, antennis palpis pedibusque flavis, elytris striato-punctatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 78. n. 847.
- pullus. 190. *C. niger*, elytris striatis, pedibus piceis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 78. n. 848.  
*Habitat in Dania.*
- ater. 191. *C. ater*, elytris striatis, unguibus subferrugineis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 78. n. 851.  
*Habitat in Dania.*
- discolor. 192. *C. ater*, subtus rufus, elytris mollibus. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 79. n. 857. *act. nidros.* 4. p. 31.  
*Habitat in Europa boreali.*
- aurichalceus. 193. *C. flavescens supra aeneus*. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 79. n. 859.  
*Habitat in Dania.*

- fulvicornis. 194. *C. niger* glaber, elytris striatis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 826.*  
*Geoff. inf. par. 1. p. 147. n. 9.* *Buprestis niger.*  
*Degeer inf. 4. p. 95. n. 10.* *Carabus niger ruficornis.*  
*Habitat in Europa.*
- leprofus. 195. *C. caeruleus*, antennis basi pedibusque ferrugineis, elytris fuscis: maculis binis albis.  
*Pontopp. Naturg. Dinem. p. 211. t. 16.* *Carabus quadriguttatus.*  
*Habitat in Dania.*
- Inderiensis. 196. *C. obscure viridis*, subtus ater, pedibus testaceis, elytris striatis: margine laterali ex griseo lutescente. *Pall. it. 1. app. n. 39.*  
*Habitat circa lacum Sibiriae Inderiensem, paulo major.*
- pictus. 197. *C. depressus* testaceus, elytris striatis pedibusque griseis. *Pallas it. 1. app. n. 40.*  
*Habitat in Sibiriae campis aridissimis sub cadaveribus torrefactis.*
- elegans. 198. *C. thorace lineari* elytra aequante, pedibus rufis. *Scop. ent. carn. n. 269.*  
*Habitat in Carniola.*
- metallicus. 199. *C. supra aeneus* nitens, thorace lateribus connivente, antennis basi fulvis. *Scop. ent. carn. n. 270.*  
*Habitat in Carniola.*
- cordatus. 200. *C. thorace inverse cordato.* *Scop. ent. carn. n. 271.*  
*Habitat in Carniola et Helvetia.*
- junceus. 201. *C. corpore sublineari*, thorace pone angustiori. *Scop. ent. carn. n. 272.*  
*Habitat in Carniola et Helvetia.*
- Scopolii. 202. *C. aeneo-viridis*, elytris testaceis: margine toto fasciisque fuscis. *Scop. ent. carn. n. 275.*  
*Habitat in Carniola.*
- salicinus. 203. *C. niger punctatus*, elytris fuscis striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n. 276.*  
*Habitat in Carnioliae salice cuprea.*
- arenosus. 204. *C. aeneo-fuscus*, thorace subrotundo pone dentato, pedibus rufis. *Scop. ent. carn. n. 277.*  
*Habitat in Carnioliae et Helvetiae arena.*
205. *C.*

M m m m m m 4

- lucidus. 205. *C. niger nitens*, elytris pedibusque testaceis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 108. n. 104.  
*Habitat in Hungaria, parvus.*
- octostriatus. 206. *C. viridis punctatus*, elytris octostriatis, pedibus pallidis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 147. n. 11. Buprestis &c.  
*Habitat in Gallia.*
- nitidus. 207. *C. viridi-nitens*, elytris octostriatis: punctis tribus impressis, pedibus pallidis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 148. n. 12.  
*Habitat in Gallia.*
- viridis. 208. *C. viridis*, elytris octostriatis, anterieus et margine fulvis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 148. n. 13.  
*Habitat in Gallia.*
- aeruginosus. 209. *C. nitens*, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo: punctis duodecim. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 149. n. 15.  
*Habitat in Gallia.*
- nobilis. 210. *C. niger*, thorace atro, elytris rubris: cruce nigra. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 150. n. 17.  
*Habitat in Gallia.*
- strigosus. 211. *C. niger*, thorace ferrugineo, elytris striatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 152. n. 22.  
*Habitat in Gallia, an vere diversus a quadrimaculato?*
- nigricollis. 212. *C. totus niger*, elytris striatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 152. n. 23.  
*Habitat in Gallia, an varietas quadriguttati?*
- octomaculatus. 213. *C. niger*, elytris striatis: maculis octo lividis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 153. n. 24.  
*Habitat in Gallia.*
- minutus. 214. *C. totus niger laevis*. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 153. n. 26.  
*Habitat in Gallia.*
- variegatus. 215. *C. cupreo viridique variegatus*: punctis quatuor impressis, pedibus pallidis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 157. n. 32.  
*Habitat in Gallia.*
- tenebrioides. 216. *C. ater*, thorace lato, elytrorum striis punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 159. n. 34.  
*Habitat in Gallia.*

- laticollis. 217. *C. totus viridis, thorace lato. Geoffr. inf. par. 1. p. 159. n. 35.*  
*Habitat in Gallia.*
- lugubris. 218. *C. ater opacus, palpis antennisque fulvis, tibiis tarsisque ferrugineis. Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 820. Geoffr. inf. par. 1. p. 160. n. 37. Buprestis lugubris.*  
*Habitat in Europa.*
- pubescens. 219. *C. niger tomentosus, elytris striatis, antennis palpis pedibusque fulvis. Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 825. Geoffr. inf. par. 1. p. 160. n. 38. Buprestis nigro-fericeus.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscipes. 220. *C. ater laevis, pedibus antennarumque basi ferrugineis. Geoffr. inf. par. 1. p. 161. n. 39.*  
*Habitat in Gallia.*
- fuscus. 221. *C. fuscus, elytris striatis, corpore subtus rufescente, pedibus antennisque ferrugineis. Degeer inf. 4. p. 96. n. 11. Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 830? Carabus fulvus. Schaeff. ic. t. 18. f. 7.*  
*Habitat in Europa, mediae magnitudinis.*
- versicolor. 222. *C. aeneus, corpore ovato brevi supra nigro-aeneo, subtus nigro, thorace convexo, elytris laevibus, antennis basi rufis. Degeer inf. 4. p. 98. n. 15. Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 824. Carabus varius.*  
*Habitat in Europa, parvus.*
- substriatus. 223. *C. niger nitidus, elytris substriatis: punctis quatuor impressis. Degeer inf. 4. p. 102. n. 21.*  
*Habitat in Europa, inter minimos hujus generis.*
- pensylvanicus. 224. *C. rufo-fuscus, capite obscuro, elytris striatis, corpore subtus, antennis pedibusque testaceis. Degeer inf. 4. p. 108. n. 4. t. 17. f. 22.*  
*Habitat in Pennsylvania, 7 lineas longus.*
- halensis. 225. *C. niger, elytris striatis versus thoracem ferrugineis, antennis pedibusque testaceis. Schall. Abh. der hall. naturf. Ges. 1. p. 317.*  
*Habitat rarior Halae Saxonum in locis humidis sub lapidibus, ruficornis magnitudine, sed magis oblongus.*

- Schalleri. 226. *C. ater* laevis, elytris striis subtilissimis punctatis. *Schall. Abb. der hall. naturf. Ges. 1. p. 318.*  
*Habitat* Halae Saxonum, *in viis inter agros, cuprei statura et magnitudine.*
- tristis. 227. *C. niger*, elytris striatis thoraceque scabris opacis. *Schall. Abb. der hall. naturf. Ges. 1. p. 318.*  
*Habitat ravior* Halae Saxonum, *in viis campestribus, cuprei statura et magnitudine.*
- quinque-lineatus. 233. *C. ater*, thorace lateribus rotundato posteriori truncato: linea dorsali et utrinque lineola bascos duplici impressa, elytris rugosis, rugarum quinque interiorum apice cum sexta confluyente. *Mus. Lesk. p. 38. n. 836.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 234. *C. nigro-ferrugineus*, capite, antennarum basi thoraceque nigris, antennis cinereis glabris, elytris depressis striatis apice truncatis thoracisque marginibus externis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 837.*  
*Habitat in Europa.*
- confluens. 235. *C. ater*, thorace lateribus rotundato, elytris striatis: rugis prima et octava, secunda et septima apice unitis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 843.*  
*Habitat in Europa.*
- holofericeus. 236. *C. ater*, capite thoraceque nigris, elytris fuscis holofericeis striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 844.*  
*Habitat in Europa.*
- trichrous. 237. *C. niger*, antennis pedibusque ferrugineis, elytris levissime striatis, capite thoraceque aeneis: hujus linea dorsali et posteriori utrinque lineolis duabus impressis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 845.*  
 β) *Carabus* antennis basi rubris. *Mus. Lesk. p. 39. n. 861.*  
 γ) *Carabus ater*. *Mus. Lesk. p. 40. n. 880.*  
 δ) *Carabus niger*. *Mus. Lesk. p. 40. n. 888.*  
*Habitat in Europa.*
- pullus. 238. *C. nigro-ferrugineus*, elytris striatis, antennis rufis. *Mus. Lesk. p. 38. n. 846.*  
*Habitat in Europa.*



- quadra- 239. C. thorace subquadrato: linea dorsali et posterius utrin-  
tus. que lineola impressa, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 39.*  
*n. 848. et 860.*  
*Habitat in Europa.*
- plicatus. 240. C. ater, thorace suborbiculato posterius utrinque plicato,  
elytris rugosis. *Mus. Lesk. p. 39. n. 849.*  
*Habitat in Europa.*
- picatus. 241. C. piceus, elytris atris striatis, thoracis linea dorsali et  
posterius utrinque lineolis duabus impressis: interna altio-  
re. *Mus. Lesk. p. 39. n. 850.*  
*Habitat in Europa.*
- emargina- 242. C. ater, thorace subquadrato, posterius truncato, elytris  
tus. striatis apice emarginatis. *Mus. Lesk. p. 39. n. 851.*  
*Habitat in Europa.*
- chaly- 243. C. niger, capite thoraceque aeneis, elytris aeneo-nigris  
beus. striatis: marginibus externis virescentibus. *Mus. Lesk.*  
*p. 39. n. 852.*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 244. C. niger, thorace subquadrato ad latera rotundato, ely-  
ceras. tris striatis, antennis rufis, pedibus ferrugineis. *Mus.*  
*Lesk. p. 39. n. 853.*  
*Habitat in Europa.*
- concolor. 245. C. niger, thorace subquadrato, elytris atris levissime striatis.  
*Mus. Lesk. p. 39. n. 854.*  
β) Carabus niger, elytris levissime striatis. *Mus. Lesk. p. 39.*  
*n. 866.*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 246. C. niger, thorace posterius quadrato, elytris striatis, an-  
pus. tennis pedibusque rufis. *Mus. Lesk. p. 39. n. 859.*  
β) Carabus elytris punctato-striatis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 875.*  
*Habitat in Europa.*
- crenatus. 247. C. niger, elytris striatis punctato-crenatis. *Mus. Lesk.*  
*p. 39. n. 862.*  
*Habitat in Europa.*
- distinctus. 248. C. supra niger, subtus ferrugineus, thorace posterius trun-  
cato. *Mus. Lesk. p. 39. n. 865.*  
*Habitat in Europa.*

249. C.

- rubricor- 249. *C. niger*, antennis rubris, thorace posteriorius truncato :  
 nis. linea dorsali impressa. *Mus. Lesk. p. 29. n. 868.*  
*Habitat in Europa.*
- punctula- 250. *C. niger*, elytris punctulorum minimorum ordine notatis.  
 tus. *Mus. Lesk. p. 39. n. 869.*  
 β) *Carabus elytrorum punctis sex impressis. Mus. Lesk. p.*  
*40. n. 881.*  
*Habitat in Europa.*
- bispinosus. 251. *C. niger*, thorace posteriorius truncato, tibiis anticis crassis  
 bispinosis. *Mus. Lesk. p. 39. n. 870.*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 252. *C. niger*, antennis tibiisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p.*  
 melas. 39. n. 871.  
 β) *Carabus thorace posteriorius truncato, elytris striatis. Mus.*  
*Lesk. p. 40. n. 873.*  
*Habitat in Europa.*
- glaber. 253. *C. niger glaber*, thorace posteriorius truncato utrinque im-  
 presso, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 872.*  
*Habitat in Europa.*
- viridans. 254. *C. nigro virescens*, antennis pedibusque rufis, elytris  
 striatis: rugis planis levissime punctatis. *Mus. Lesk. p.*  
*40. n. 874.*  
*Habitat in Europa.*
- multicolor. 255. *C. niger*, capite thoraceque viridibus, elytris viridi-cae-  
 rulefcentibus lutefcente-villosis, ore antennarum basi pedi-  
 busque rufis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 876.*  
*Habitat in Europa.*
- obfusca- 256. *C. fuscus*, thorace posteriorius truncato, elytris striatis,  
 tus. antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 877.*  
*Habitat in Europa.*
- moestus. 257. *C. niger*, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk.*  
*p. 40. n. 879.*  
*Habitat in Europa.*
- discolor. 258. *C. niger*, thorace posteriorius truncato: linea dorsali pun-  
 ctisque utrinque impressis, elytris striatis margine virescen-  
 tibus, antennis ferrugineis basi rufis. *Mus. Lesk. p. 40.*  
*n. 882. 883.*  
*Habitat in Europa.*

- excifus. 259. *C. ferrugineus glaber*, thorace anteriorius truncato, posteriorius excifo, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 884.*  
*Habitat in Europa.*
- limbatus. 260. *C. niger*, thorace marginato posteriorius plicato, elytris striatis, pedibus nigro-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 885.*  
*Habitat in Europa.*
- truncatulus. 261. *C. niger*, thorace posteriorius truncato, elytris striatis, pedibus fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 886.*  
*Habitat in Europa.*
- chloromelas. 262. *C. niger*, supra viridis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 887.*  
*Habitat in Europa.*
- sinuatus. 263. *C. niger*, elytris striatis apice sinuatis, antennis basi rufis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 889.*  
*Habitat in Europa.*
- pallidicornis. 264. *C. niger*, elytris striatis, thorace posteriorius truncato: marginibus externis, antennis pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 892.*  
*Habitat in Europa.*
- aurichalceus. 265. *C. nigro-aeneus*, antennis pedibusque rufis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 894.*  
*Habitat in Europa.*
- rotundatus. 266. *C. niger*, supra aeneus, thorace rotundato, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 40. n. 897.*  
*Habitat in Europa.*
- lituratus. 267. *C. piceus*, capite, pedibus striatisque elytris testaceis: macula ad apicem communi magna thoraceque violaceis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 899.*  
*Habitat in Europa.*
- truncatus. 268. *C. ater* thorace posteriorius truncato, elytris striatis tibiisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 901.*  
β) *Carabus piceus*, tibiis totis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 903.*  
γ) *Mus. Lesk. p. 41. n. 910.*  
*Habitat in Europa, antennis rufis, femoribus fuscis.*

- ferruginolus. 269. *C. ferrugineus*, thorace rotundato, elytris striatis, antennis pedibusque lividis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 904.*  
 β) *Carabus capite nigro. Mus. Lesk. p. 41. n. 918.*  
*Habitat in Europa.*
- denigratus. 270. *C. niger*, thorace rotundato, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis, femoribus compressis supra nigris. *Mus. Lesk. p. 41. n. 905.*  
*Habitat in Europa.*
- cylindricus. 271. *C. testaceus cylindricus*, capite nigro, thorace orbiculato rufo. *Mus. Lesk. p. 41. n. 909.*  
*Habitat in Europa.*
- geniculatus. 272. *C. niger*, thorace suborbiculato, elytris pedibusque testaceis: geniculis fuscis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 911.*  
*Habitat in Europa.*
- quadriguttatus. 273. *C. niger*, thorace orbiculato, elytris fusco-caeruleis: guttis quatuor pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 916.*  
*Habitat in Europa.*
- sexpunctatus. 274. *C. nigro-aeneus*, thorace rotundato, elytris striatis: punctis ad futuram impressis aeneis trium parium. *Mus. Lesk. p. 41. n. 917.*  
*Habitat in Europa.*
- porphyropus. 275. *C. piceus*, thorace truncato, elytris striatis, antennis tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 920.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscicornis. 276. *C. niger supra aeneus*, thorace rotundato punctato, elytris crenato-striatis, antennis fuscis, pedibus rufis. *Mus. Lesk. p. 41. n. 921.*  
*Habitat in Europa.*
- atratus. 277. *C. niger*, thorace orbiculato, elytris pallidis nigro-variis, antennis pedibusque fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 924.*  
*Habitat in Europa.*
- trispinosus. 278. *C. niger*, capite thoraceque orbiculato aeneis, elytris ferrugineo-aeneis striato-punctatis, pedibus rufis: femoribus crassis, tibiis trispinosis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 925.*  
*Habitat in Europa.*

moestus. 279. *C. ferrugineus*, thorace rotundato, elytris striatis, capite fusco, antennis pedibusque testaceis. *Mus. Lesk.* p. 42. n. 926.

*Habitat in Europa.*

lepidus. 280. *C. supra aeneo-viridis*, subtus caerulelescens, thorace subquadrato postice triis quatuor impressis, tibiis anticis apice dilatatis. *Lesk. it.* p. 17. t. A. f. 6.

*Habitat in Lusitaniae monte Keulenberg, 6 lineas longus, vulgari affinis.*

214. TENEBRIO. *Antennae moniliformes: articulo ultimo subrotundo.*

*Thorax plano-convexus, marginatus. Caput exsertum.*

*Elytra rigidiuscula.*

\* *palpis sex filiformibus: tibiis anterioribus fossoriis, palmato-dentatis. Scaritae Fabricii et Pallavii.*

complanatus. 13. *T. ater*, thorace subquadrato, elytris laevissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 206. n. 1.

*Habitat in Cayenna, magnus.*

marginatus. 14. *T. ater*, thorace subquadrato, elytris fulcatis: margine cyaneo. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 206. n. 2.

*Habitat in Cayenna, an varietas depressi?*

giganteus. 15. *T. ater*, mandibulis fulcatis, elytris laevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 314. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 206. n. 3.

*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. t. 47. f. 4.

*Habitat in Africa aequinoctiali, subterraneo proxime affinis, at triplo major.*

subterraneus. 16. *T. ater*, capite anterieus fulcato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 314. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 206. n. 4.

*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 6. p. 133. n. 18. t. 29. f. 4. a.

*Carabus interruptus.*

*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 4.

*Voet colcopt. t.* 33. f. 2.

cyaneus. 17. *T. cyaneus glaberrimus*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 314. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 206. n. 5.

*Habitat in nova Hollandia.*

7. T.

- Foffor. 7. *T. piceus*. *Fn. suec.* 817. *Fabr. sp. inf.* I. p. 314. n. 4.  
*mant. inf.* I. p. 206. n. 6.  
*Degeer inf.* 4. p. 350. n. 1. t. 30. f. 1. 2. *Attelabus* Foffor.  
*Habitat in Europae collibus arenosis, quos perforat.*
- Cursor. 8. *T. fuscus*, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis.  
*Fn. suec.* 818.\*  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 314. n. 5. *mant. inf.* I. p. 206. n. 7. *Scarites testaceus*, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 74. n. 798. *Tenebrio fuscus*.  
*Habitat in Europae collibus arenosis, pediculi longitudine.*
- arabs. 10. *T. niger*, thorace ferrato, antennis pedibusque testaceis.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 314. n. 6. *mant. inf.* I. p. 206. n. 8.  
*Habitat in Oriente.*
- minutus. 12. *T. niger*, thorace marginato, antennis clavatis pedibusque piceis.  
*Fabr. sp. inf.* I. p. 315. n. 7. *mant. inf.* I. p. 207. n. 9. *Scarites piceus*, antennis clavatis.  
*Habitat in Sueciae, duplo major in Saxoniae sabuletis; an hujus generis?*
- collaris. 19. *T. niger*, elytris punctato-friatis et capite fuscis, antennis pedibusque piceis: anterioribus spinosis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. p. 141. n. 56. t. 29. f. 15.  
*Habitat Berolini, 3 fere lineas longus.*
- bucephalus. 20. *T. totus fuscus punctatus*, oculis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. p. 141. n. 57. t. 29. f. 16. i.  
*Habitat in India, 3 lineas longus.*
- \*\* *palpis inaequalibus filiformibus*, *Scaurus Fabricii*.
- atratus. 21. *T. totus ater glaber*. *Fabr. sp. inf.* I. p. 320. n. 1. *mant. inf.* I. p. 270. n. 1.  
*Habitat in Aegypto, elytris connatis, pedibus anterioribus bidentatis.*
- \*\*\* *palpis quatuor, anterioribus subclavatis, posterioribus filiformibus*, *Tenebriones Fabricii*, *Myllarides Pallasi*.
- laminatus. 22. *T. niger*, thorace subquadrato laevi, elytris sulcatis, tibiis anterioribus incurvis apice lamina ferruginea acutis.  
*Fabr. mant. inf.* I. p. 211. n. 1.  
*Habitat in India, maximus sui generis.*

- Gigas. 1. *T. ater*, clytris striatis, thorace laevi. *Amoen. ac.* 6. p. 396. n. 26.  
*Pall. ic. inf. Ross.* 1. p. 37. t. C. f. I. *Mylaris gigantea*.  
*Habitat* Surinami, *lucani cervi magnitudine, antennis subclavatis.*
- punctatus. 23. *T. niger*, thorace quadrato: marginibus subdenticulatis, clytris striato-punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 211. n. 2.  
*Habitat* in India, *magnus, palpis securiformibus.*
- ferratus. 24. *T. ater glaber*, clytris striatis, tibiis posterioribus ferratis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 322. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 211. n. 3.  
*Habitat* in Sierra Leon Africae.
- Molitor. 2. *T. totus niger*, femoribus anterioribus crassioribus. *Fn. suec.* 875. *Scop. ent. carn.* 259.  
*Fn. suec.* 547. *Mordella antennarum articulis lentiformibus: ultimo globoso.*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 322. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 211. n. 4. *Tenebrio oblongus piceus, clytris striatis.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 349. n. 6. *Tenebrio atra oblonga &c.*  
*Degeer inf.* 5. p. 34. n. 3. t. 2. f. 4. *Tenebrio elatus nigro fulvus &c.*  
*Raj. inf.* 4. (larva) *Vermis farinarius.*  
*Frisch inf.* 3. p. 1. t. 1.  
*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 52.  
*Schaeff. ic.* t. 66. f. 1.  
*Habitat* in farina pistorum, molendinis, pane sicco, faccharato.  
*Larva pallida, glabra, segmentis 13, mollis, lusciniis gratissimus cibus.*
- luridus. 26. *T. niger*, pedibus fuscis. *Fabr. mant.* 1. p. 211. n. 5.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 325. n. 9. *Helops luridus.*  
*Habitat* in Brasilia.
- chalybeus. 3. *T. violaceus*, pedibus antennisque piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 323. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 211. n. 7.  
*Degeer inf.* 5. p. 53. n. 4. t. 13. f. 11. *Tenebrio aeneus, Habitat* in Guinea.
- mauritanicus. 4. *T. niger*, subtus piceus, thoracis marginibus anterieus posteriorisque dente angulatis.  
*Habitat* Algiriae, *chalybeo similis, at quintuplo minor, pedibus antennisque piceis.* Brander.

- variegatus. 27. *T. oblongus*, fusco cinereoque varius. *Fabr. sp. inf.* I. p. 323. n. 5. *mant. inf.* I. p. 211. n. 8.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, fuscus, pilis griseis varius.*
- abbreviatus. 28. *T. ovatus ater*, elytris striatis capite tuberculato. *Fabr. sp. inf.* I. p. 323. n. 6. *mant. inf.* I. p. 211. n. 9.  
*Habitat in India.*
- capensis. 30. *T. ovatus niger*, elytris striatis, tibiis anterioribus dentato-spinosis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 323. n. 7. *mant. inf.* I. p. 212. n. 10.  
*Habitat ad caput bonae spei, an forsan primae tribus?*
- cornutus. 31. *T. thoracis bicornis* marginibus crenatis angulisque prominulis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 324. n. 8. *mant. inf.* I. p. 212. n. 11.  
*Habitat Smirnae.*
- fanguinipes. 32. *T. ater*, antennis pedibusque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 323. n. 9. *mant. inf.* I. p. 212. n. 12.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- buprestoides. 33. *T. ater*, thorace ovali marginato, elytris connatis laevibus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 323. n. 10. *mant. inf.* I. p. 212. n. 13.  
*Pall. it.* 2. p. 719. n. 44.  
*Habitat ad caput bonae spei, caraboidi proxime affinis, at major.*
- dermeoides. 34. *T. ater*, thorace ovali marginato, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 212. n. 14.  
*Habitat Halae Saxonum, buprestoidi affinis.*
- culinaris. 5. *T. ferrugineus*, elytris striatis, clypeo emarginato. *Fn. suec.* 816. *Fabr. mant. inf.* I. p. 212. n. 15.  
*Fn. suec.* 546. *Mordella ferrugineo rufa*, thorace antice depresso.  
*Schaeff. ic. t.* 66. f. 2.  
*Habitat in Hispaniae arena mobili, in Sueciae quisquiliis, et frumentorum acervis.*
- barbarus. 6. *T. ater glaberrimus*, thorace orbiculato, capitis clypeo anterieus margine elevato.  
*Habitat*

Tenebriones et Pimeliae in locis suffocatis, umbrosis, quisquiliis potissimum in terra ipsa, larvae ibidem, in ligno, farina, aliisque cibariis degunt.



*Habitat in Mauritania, nitidus, carabi mediocris magnitudine, elytris connatis.* Brander.

- erraticus. 9. *T. niger*, antennis thorace suborbiculato elytrisque ferrugineis, his apice fuscis. *Fn. suec.* 819.\*  
*Habitat in Europa.*
- pallens. 10. *T. pallide testaceus*, thorace transverso. *Fn. suec.* 820\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 16.  
*Habitat ad caput bonae spei, parvus.*
- ferrugineus. 35. *T. ferrugineus*, elytris striatis testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 17.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, pallente minor et magis depressus.*
- villosus. 36. *T. fuscus cinereo-villosus*, elytris laevibus ferrugineis.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 212. n. 18.  
*Habitat in Europae quisquiliis, parvus.*
- caraboides. 25. *T. niger*, thorace ovali marginato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 324. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 212. n. 19.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 677. n. 25. *Fn. suec.* 825. *Tenebrio apterus*, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis.  
*Fn. suec.* 595. *Tenebrio ater*, coleoptris pone rotundatis, maxillis prominentibus.  
*Degeer inf.* 4. p. 97. n. 7. t. 3. f. 13. *Carabus coadunatus.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 64. n. 5. *Platycerus fuscus*, elytris striatis.  
*Habitat in Europae quisquiliis.*
- brunnipes. 37. *T. ater glaber nitidus*, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 212. n. 20.  
*Habitat Dresdae, parvus.*
- laevigatus. 29. *T. oblongus ater*, elytris laeviusculis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 323. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 211. n. 6.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 678. n. 29. *Tenebrio apterus niger laevis*, elytris laevibus, thorace lunato subtus caeruleus.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, molitore paulo minor.*
- gibbosus. 38. *T. subovatus totus acneus*, elytris gibboso-convexis: striis tenuissimis crenulatis. *Pall. ic. inf. Ross* 1. p. 38. t. C. f. 2.  
*Habitat in Brasilia, pimeliae mortifagae magnitudine.*

- spinimanus. 39. *T. thorace marginato laevi, elytris laevissimis posterius obtusis, tibiis primoribus spina robustissima arcuata productis. Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 55. t. C. f. 23.*  
*Habitat in Russia australi, circa Boryllhenem, pimeliae mortisagae magnitudine, sed crassior et magis convexus, aterrimus, nitidus, glaberrimus, durus.*
- uncinus. 40. *T. apterus niger, thorace marginato subaequali, elytris striato-punctatis angulatisque, femoribus anterioribus clavatis maximis biuncinatis. Forst. nov. inf. sp. 1. p. 60. n. 60.*  
*Habitat in Hispania, pimeliae mortisagae magnitudine, sed gracilior, elytris brevioribus.*
- piceus. 41. *T. depressus niger, subtus piceus, elytris striatis. Schaller Abb. der hall. naturf. Ges. 1. p. 319.*  
*Habitat Halae Saxonum sub corticibus et in ligno saligno putrescente; an a mauritanico vere diversus?*
- cylindricus. 42. *T. aterrimus, thorace punctis elevatis, antennis fuscis, tarsis subtus flavo-pilosis. Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 144. n. 3.*  
*Habitat Berolini, molitori proxime affinis.*
- montanus. 43. *T. totus ater, elytris opacis. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 103. n. 102.*  
*Habitat in Hungariae inferioris montanis.*
- tristis. 44. *T. niger subopacus, punctis excavatis variolosus. Scop. ent. carn. n. 256.*  
*Habitat in Carniolia.*
- pomonae. 45. *T. supra piceus, infra niger, elytris striis elevatis quinis. Scop. ent. carn. n. 257.*  
*Habitat in Carnioliae arboribus pomiferis, larvis binis ternisve reticulo laxo tectis in folio convoluto latentibus.*
- capreae. 46. *T. niger, thorace punctis impressis elytrisque testaceis. Scop. ent. carn. n. 258.*  
*Habitat in Carnioliae et Helvetiae salice caprea.*
- flavus. 47. *T. flavus, oculis nigris. Scop. ent. carn. n. 260.*  
*Habitat in Carnioliae umbelliferis.*
- aestivus. 48. *T. niger, palpis pedibusque flavis. Müll. zool. dan. prodr. p. 74. n. 795.*  
*Habitat in Dania.*

- friatus. 49. *T. niger*, abdomine subtus dense striato. Müll. zool. dan. prodr. p. 74. n. 796.  
*Habitat in Dania.*
- festinans. 50. *T. totus niger glaber*, thorace ferrugineo.  
*Habitat - - - cicindelae affinis, pediculi magnitudine, femoribus clavatis.*
- globosus. 51. *T. ater*, thorace globoso: lineis duabus scabris elevatis.  
*Lepech. it. 2. p. 209. t. 11. f. 34.*  
*Habitat in Sibiria.*
- incurvatus. 52. *T. totus picus*, elytris striatis medio transversaliter impressis. *Lepech. it. 2. p. 210. t. 11. f. 25.*  
*Habitat in Sibiria.*
- ovatus. 53. *T. ovatus nigro-fuscus*, elytris striis octo laevibus. *Geoffr. inf. par. 1. p. 348. n. 4.*  
*Habitat in Gallia.*
- rotundatus. 54. *T. niger totus laevis*, coleoptris pone rotundatis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 351. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- subvillosus. 55. *T. totus ferrugineus subvillosus.* *Geoffr. inf. par. 1. p. 351. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- glaber. 56. *T. totus ferrugineus laevis.* *Geoffr. inf. par. 1. p. 351. n. 10.*  
*Habitat in Gallia. \*)*
- lignarius. 57. *T. thorace cavitatibus duabus, elytris violaceis vel rufis, antennis pedibusque ferrugineis.* *Degeer inf. 5. p. 38. n. 4. t. 2. f. 15-18.*  
*Habitat in Europa, larva sub cortice pinuum in terra jacentium, quarum librum corroduunt; imago 5 lineas longa; mas minor.*
- lardarius. 58. *T. oblongus flavo-fulvus, oculis nigris, elytris striis punctatis.* *Degeer inf. 5. p. 45. n. 7. t. 2. f. 25. 26.*  
*Habitat in Belgis, larva in vesica suilla; imago pulicis magnitudinis.*

- curvipes. 59. *T. ovatus piceus*, elytris punctato-friatis, femoribus arcuatis: posterioribus subtus ciliatis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 937.*  
*Habitat in Europa.*
- bicolor. 60. *T. ovatus*, elytris friatis, supra niger, subtus antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 938.*  
*Habitat in Europa.*
- ater. 61. *T. ater*, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 939.*  
*Habitat in Europa.*
- lunatus. 62. *T. niger depressus*, thorace lunato, elytris friatis, pedibus ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 941.*  
*Habitat in Europa.*
- hispidus. 63. *T. niger hispidus*, elytris friatis: basi macula utrinque rufa, antennis tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 942.*  
*Habitat in Europa.*
- glaber. 64. *T. ferrugineus*, capite thoraceque glabris elytrisque atris: his friatis, ore ferrugineo, pedibus lividis. *Mus. Lesk. p. 42. n. 943.*  
*Habitat in Europa.*

PIMELIA. *Antennae filiformes.*  
*Palpi quatuor.*  
*Thorax plano-convexus, marginatus.*  
*Caput exsertum.*  
*Elytra rigidiuscula. Alae (plurimis) nullae.*

\* *antennis apice moniliformibus.*

↳ *palpis clavatis, Blaps Fabricii.*

- Gages. 1. *P. nigra*, thorace rotundato, elytris mucronatis laevissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 321. n. 1. mant. inf. 1. p. 210. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 14. Tenebrio Gages.*  
*Sulz. hist. inf. p. 64. t. 7. f. 9.*  
*Habitat in Europa magis australi, simillima mortisagae, at duplo major.*
- fulcata. 2. *P. coleoptris mucronatis fulcatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 321. n. 2. mant. inf. 1. p. 210. n. 2.*

*Forsk.*

*Forsk. Fn. arab. p. 79. n. 10.* Tenebrio (polychrestus) apterus, elytris mucronatis, singulis striis novem elevatis.

*Habitat in Aegypti hortis frequens.*

*Commendantur contra aurium dolores scorpionumque morsum, et coctae a feminis turcis saginandi causa comeduntur.*

mortifaga. 3. *P. atra*, coleoptris mucronatis laevibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 321. n. 3. mant. inf. 1. p. 210. n. 3.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 15.* Tenebrio (mortifagus) apterus, thorace aequali, coleoptris laevibus mucronatis.

*Fn. succ. 594. 822. \* Scop. ent. carn. 252.* Tenebrio ater coleoptris acuminatis.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 346.* Tenebrio atra aptera &c.

*Degeer inf. 5. p. 31. n. 1.* Tenebrio acuminatus.

*Mouff. inf. 139.* Blatta foetida.

*Raj. inf. p. 90. n. 12.*

*List. scar. angl. p. 388. n. 21.*

*Fonst. inf. t. 16.*

*Aldr. inf. 499.*

*Petiv. gazoph. t. 24. f. 7.*

*Frisch inf. 13. t. 25.*

*Schaeff. elem. t. 24. f. 1.*

*icon. t. 6. f. 13. et t. 37. f. 6.*

*Habitat in Europae umbrosis suffocatis.*

excavata. 4. *P. thorace posterius angulato*, elytris excavato-punctatis acutiusculis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 322. n. 4. mant. inf. 1. p. 210. n. 4.*

*Petiv. gazoph. t. 92. f. 14.*

*Aët. angl. 271. 861. 13.*

*Habitat in Coromandel.*

striata. 5. *P. ater*, thorace posterius angulato, elytris obtusis striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 322. n. 5. mant. inf. 1. p. 210. n. 5.*

*Habitat in Coromandel, statura excavatae.*

crenata. 6. *P. griseo-fuscus*, thorace posterius angulato, elytris crenato-striatis obtusis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 322. n. 6. mant. inf. 1. p. 210. n. 6.*

*Habitat in Coromandel, statura striatae, at duplo minor.*

speciosa. 7. *P. subovata aenea alata*, elytris politissimis striatis cupreo viridique lineatis.

*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 39. t. C. f. 3.* Mylaris speciosa.

*Habitat in Brasilia, attelabi ceramoidis magnitudine.*

- chryso- 8. *P. ovata* scaberrima, thorace longitudinaliter rugoso, ely-  
meloides. trorum porcis tribus verrucosis. *Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 52.*  
*Habitat in Mauritania, glandis magnitudine, an forsau ad*  
*alteram tribum ableganda.*
- costata. 9. *P. subglobosa* glabriuscula opaca, elytris singulis costis tri-  
bus crenulatis: extima carinata.  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 52. t. C. f. 18.* *Tenebrio costatus.*  
*Habitat, ravior, in torridis deserti caspici inter Survios Vol-*  
*gam et Ural intermedii; an forte insequentis tribus?*
- torulosa. 10. *P. ovato subglobosa*, elytris tuberculatis undique conve-  
xis enerviis.  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 51. n. 17. t. C. f. 17.* *Tenebrio to-*  
*ruulosus.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine variabilis.*
- agricola. 11. *P. rufescens*, thorace capiteque nigris. *Scop. ann. hist.*  
*nat. 5. p. 108. n. 101.*  
*Habitat in agro Laibacensi, tenebrionis molitoris magnitudine.*
- fabulosa. 12. *P. atra*, coleoptris rugosis pone acuminatis. *Geoffr. inf.*  
*par. 1. p. 347. n. 2. t. 6. f. 6.*  
*Habitat in Gallia et Helvetia.*
- oclostria- 13. *P. nigra*, elytrorum striis octo punctatis per paria dispositis.  
tus. *Geoffr. inf. par. 1. p. 348. n. 3.*  
*Habitat in Gallia. \*)*
- — *palpis filiformibus.*
- striata. 14. *P. atra* glabra, elytris striis quatuor sanguineis. *Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 316. n. 1. mant. inf. 1. p. 207. n. 1.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 45. t. C. f. 11. a. b.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mortifuga major, nitida.*
- unicolor. 15. *P. glabra nigra*, elytris immaculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p.*  
*316. n. 2. mant. inf. 1. p. 207. n. 2.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 46. t. C. f. 12.* *Tenebrio gibbus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 9.* *Tenebrio gigas.*  
*Habitat ad caput bonae spei, striatae affinis, at paulo minor.*

16. *P.*

\*) Species 11-13 an hujus generis ordinisve sint, haud certo constat.

- gibba. 16. *P. atra*, thorace globofo, elytris linea abbreviata elevata carinatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 207. n. 3.*  
*Habitat in India.*
- hispida. 17. *P. atra*, corpore muricato hispido. *Fabr. sp. inf. I. p. 316. n. 3, mant. inf. I. p. 207. n. 4.*  
*Forstk. Fn. arab. p. 79. n. 8. Tenebrio hispidus.*  
*Pall. ic. inf. Ross. I. p. 42. t. 6. f. 1. Tenebrio fetofus.*  
*Habitat rarior in Africa, mortifagae magnitudine, sed brevior et crassior.*
- longipes. 18. *P. atra*, elytris connatis muricatis, pedibus longioribus. *Fabr. sp. inf. I. p. 316. n. 4, mant. inf. I. p. 208. n. 5.*  
*Habitat in Aegypto.*
- cephalotes. 19. *P. thoracis* margine anteriori et posteriori ciliato, elytris scaberrimis: nervis quatuor lateralibus carinatis subferratis. *Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 16?* *Tenebrio (grossus) apterus niger glaber, coleoptris nervosis: nervis lateralibus scabris, thorace emarginato.*  
*Pall. ic. inf. Ross. I. p. 49. t. C. f. 15. Tenebrio cephalotes.*  
*Habitat in desertis aridissimis salis australibus Uralensibus, muricata brevior, et ut plurimum minor.*
- muricata. 20. *P. nigra*, coleoptris obtusis: striis muricatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 316. n. 5, mant. inf. I. p. 208. n. 6.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 12. Mus. Lud. Ulr. 100.\* Pall. ic. inf. Ross. I. p. 48. t. C. f. 14. Tenebrio muricatus.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 352? Tenebrio atra aptera rotundata, elytris fulcis tribus elevatis.*  
*Pet. gaz. II. t. 92. f. 14.*  
*Habitat in Europa australi, Aegypto, in deserto arenoso Naryn, inter fluvios Volga et Ural, nemorum posteriorum attritu ad elytra stridens, mortifaga major.*
- tuberculata. 21. *P. nigra*, thorace scabro, elytris tuberculato-muricatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 208. n. 7.*  
*Habitat in Europa magis australi, statura muricatae, at duplo minor.*
- bipunctata. 22. *P. atra*, thorace globofo: punctis duobus impressis, elytris rugosis: striis elevatis tribus laevibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 316. n. 6, mant. inf. I. p. 208. n. 8.*  
*Habitat in Italia, statura muricatae.*

- scabra. 23. *P. atra*, elytris scabris lineisque elevatis tribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 317. n. 7. mant. inf. 1. p. 208. n. 9.*  
*Habitat ad caput bonae spei, et in Barbariae ruderatis.*
- angulata. 24. *P. clytris spinosis: linea laterali elevata ferrata.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 317. n. 8. mant. inf. 1. p. 208. n. 10.*  
*Forsk. Fn. arab. p. 80. n. 13. Tenebrio spinosus.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 55. t. H. f. C. 22. Tenebrio asperimus.*  
*Habitat Alexandriae in Aegypto.*
- echinata. 25. *P. thoracis lateribus spinosis, elytris lineis elevatis tribus echinatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 317. n. 9. mant. inf. 1. p. 208. n. 11.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura angulatae.*
- dentipes. 26. *P. thorace scabro, elytris pilosis muricatis, femoribus anterioribus unispinosis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 208. n. 12.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura echinatae, ut paulo minor.*
- dentata. 27. *P. nigra, thorace glabro, elytris fuscis: lineis elevatis tribus serratis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 208. n. 13.*  
*Habitat ad caput bonae spei, pedibus inermibus elongatis.*
- porcata. 28. *P. thorace laevi nitido, elytris lineis elevatis tribus: interjectis punctis elevatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 317. n. 10. mant. inf. 1. p. 209. n. 14.*  
*Habitat ad caput bonae spei, echinata minor.*
- maculata. 29. *P. thorace nigro, elytris cinereis fusco-maculatis: lineis tribus elevatis; secunda subundata.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 317. n. 11. mant. inf. 1. p. 209. n. 15.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- ferrata. 30. *P. thorace varioloso, elytris lineis tribus elevatis echinatis: interstitiis rugosis, pedibus elongatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 317. n. 12. mant. inf. 1. p. 209. n. 16.*  
*Habitat ad caput bonae spei, parva, atra.*
- minuta. 31. *P. thorace laevi obscuro, elytris cinereis hispidis: lineis tribus elevatis laevibus.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 318. n. 13. mant. inf. 1. p. 209. n. 17.*  
*Habitat ad caput bonae spei, pedibus cinereis.*



- rugosa. 32. *P. thorace scabro, elytris rugosis anterieus angustioribus.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 318. n. 14. mant. inf. 1. p. 209. n. 18.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 27?* *Tenebrio apterus niger, elytris rugosis, abdomine pedibusque caeruleiscentibus, thorace lunato.*  
*Habitat in Aegypto.*
- gibbosa. 33. *P. nigra laevis, thorace orbiculato convexo anterieus truncato.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 676. n. 18. Fn. suec. 824.\** *Tenebrio gibbus.*  
*Habitat in Europa et Africa.*
- linearis. 34. *P. nigra laevis, pedibus ferrugineis, antennis brevissimis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 23.* *Tenebrio linearis.*  
*Habitat in Suecia, magnitudine culicis; an haec et gibbosa huic generi tribuuique adscribendae, iudicent autoptae.*
- pubescens. 35. *P. ovata lanuginosa opaca, elytris singulis costis quatuor denticulatis.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 53. t. C. f. 19.* *Tenebrio pubescens.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 22.* *Tenebrio (angulatus) apterus, thorace teretiunculo, elytris striis quatuor elevatis: tertia crenata.*  
*Voet coleoptr. 1. t. 39. f. 52?*  
*Habitat in Aegypto et torridis deserti caspici inter fluvios Volgam et Ural intermedii, rarior, supra aterrimus, costato magis oblongus.*
- spinosa. 36. *P. thorace marginato anterieus et posterius spinoso, elytris striis elevatis laevibus.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 318. n. 15.*  
*mant. inf. 1. p. 209. n. 19.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 24. Mus. Lud. Ulr. 101.\** *Tenebrio spinosus.*  
*Habitat in Europa australi, Oriente.*
- acuminata. 37. *P. thorace marginato: marginibus anterieus et posterius spinosis, elytris laevibus ca. inatis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 209. n. 20.*  
*Habitat in Europa magis australi, spinosae proxime affinis, tota atra.*
- reflexa. 38. *P. thorace marginato: marginibus reflexis, elytris muricatis: linea laterali carinata laevi.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 318. n. 16. mant. inf. 1. p. 209. n. 21.*

Forfk.

*Forsk. Fn. arab. p. 79. n. 9. Tenebrio vulgaris.*  
*Pall. ic. inf. Ross. I. p. 41. t. C. f. 6. Tenebrio pterygodes.*  
*Habitat in Oriente, frequens in Aegypto, auritae affinis,*  
*at minor.*

- aurita. 39. P. thorace marginato anterieus dilatato, elytris utrinque bicarinatis laevissimis muticis.  
*Pall. ic. inf. Ross. I. p. 40. t. C. f. 5 a. b. Tenebrio auritus.*  
*Habitat ad lacum Sibiriae Inderientem, tota atra, mortifuga major et magis oblonga.*
- fasciata. 40. P. atra, thorace suborbiculato, elytris fasciis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 318. n. 18. mant. inf. I. p. 209. n. 22.*  
*Habitat in India.*
- collaris. 41. P. nigra, elytris laevibus uniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo carinato. *Fabr. sp. inf. I. p. 319. n. 19. mant. inf. I. p. 209. n. 23.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 21. Tenebrio (collaris) apterus niger, elytris laeviusculis uniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo carinato.*  
*Habitat in Europa australi, e geniculis oleum flavescens exsudans.*
- carinata. 42. P. nigra, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus laevibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 319. n. 20. mant. inf. I. p. 209. n. 24.*  
*Forsk. Fn. arab. p. 878. n. 6. Tenebrio aegypticus.*  
*Habitat in Gallia, Calabria, Aegypto.*
- lineata. 43. P. thorace rotundato scabro, elytris striis tribus punctato-scabris posterius lineolis albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 319. n. 22. mant. inf. I. p. 209. n. 26.*  
*Habitat in Sibiria, parva.*
- ciliata. 44. P. nigra depressa, thorace elytris reflexo-marginatis ciliatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 319. n. 23. mant. inf. I. p. 209. n. 25.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- glabra. 45. P. atra, thorace rotundato, elytris glaberrimis. *Fabr. sp. inf. I. p. 319. n. 23. mant. inf. I. p. 209. n. 27.*  
*Forsk. Fn. arab. p. 78. n. 7. Tenebrio laevis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 30? Tenebrio (latipes) apterus niger laevis, elytris laevibus thorace sublunato, subtus ater.*  
*Pall.*

- Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 44. t. C. f. 10?* *Tenthredo hypolithus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 351. n. 8?* *Tenebrio nigra tota laevis,*  
*coleoptris pone rotundatis.*  
*Voet coleopt. 1. t. 32. f. 5.*  
*Habitat in Africa, Calabria, et frequens in arenosis aridis*  
*sub Taxis latens ad Volgam.*
- angustata. 46. *P. glabra, thorace posterius angustato, elytris acuminatis.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 320. n. 24. mant. inf. 1. p. 209. n. 28.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 44. t. C. f. 9. Tenebrio longicornis?*  
*Habitat in deserto australi circa Volgam, sub lapidibus*  
*et in stercore vaccino sicco vere frequens, et in Aegypto,*  
*carabi mediocris magnitudine.*
- orbicula- 47. *P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis.* *Fabr.*  
 ta. *sp. inf. 1. p. 320. n. 25. mant. inf. 1. p. 209. n. 29.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 43. t. C. f. 8. Tenebrio Nomias.*  
*Barrel. ic. plant. t. 945.*  
*Habitat in Oriente, in universo deserto tatarico, et campis*  
*aridis Sibiriae australis tota aestate frequens, durissima.*
- didyma. 48. *P. thorace late marginato, posterius bicorni, elytris angu-*  
*latis supra biconvexis.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 42. Tenebrio didymus.*  
*Habitat in Mauritania, mortifugae fere magnitudine, tota*  
*atra, glabra.*
- caspica. 49. *P. ex ovato depressiuscula, thorace anteriori posteriusque*  
*excavato, elytris utrinque carinatis: fasciis scaberrimis lac-*  
*vigatisque alternis.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 47. t. C. f. 13. Tenebrio caspicus.*  
*Habitat in ripis elatioribus maris caspii, praesertim orientem*  
*versus fitis, mortifuga duplo crassior.*
- subglobo- 50. *P. subglobosa, elytris toruloso-laevigatis: nervis subqua-*  
 la. *ternis; extimis carinatis crenulatis.*  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 50. t. C. f. 16. a. b. Tenebrio sub-*  
*globolus.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 28. Tenebrio (variabilis) apte-*  
*rus niger laevis, elytris elevato-punctatis angulatisque.*  
*Habitat in Gallia australi, circa Volgam, et in limosis tor-*  
*ridis deserti tatarici magis australis, lente incedens, inter-*  
*diu fere immota, gordiis frequenter infestata, varicata*  
*brevior, et magis globosa; an vere distincta a rugosa?*

- filphoides. 51. *P. thoracis lateribus posterioribus acuminatis, anterioribus excisis, clytris striis tribus elevatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 677 n. 26. Tenebrio filphoides.*  
*Syst. nat. X. p. 360. n. 9. Silpha maura.*  
*Habitat in Mauritania.*
- tibialis. 52. *P. nigra laevis, tibiis anterioribus compressis unidentatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 678. n. 31. Tenebrio tibialis.*  
*Habitat in Africa, Hispania, vix chrysomela major, tota opaca. Brander.*
- femoralis. 53. *P. nigra laevis, femoribus crassiusculis, subtus canaliculatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 679. n. 32. Tenebrio femoralis.*  
*Habitat in Germania, chrysomela minor.*
- friatula. 54. *P. nigra, coleoptris ovato-oblongis striatis.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 679. n. 33. Tenebrio friatulus.*  
*Habitat in Hispania.*
- laticollis. 55. *P. ovalis depressa aterrima laevissima, thorace marginato latissimo anterioribus excavato, posterioribus truncato, clytris substriatis.*  
*Pall. ic. inf. Ross. I. p. 56. t. H. f. C. 21. Tenebrio laticollis.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine glabrae, sed multo magis depressa. \*)*
- vittata. 85. *P. gibba atra, clytris connatis glabris: sutura et utrinque striis tribus coccineis, pedibus incrumbibus nigris.* *Muf. Lesk. p. 42. n. 932.*  
*Habitat extra Europam.*
- \*\* *antennis totis filiformibus.*  
 † *palpis quatuor filiformibus, Sepidia Fabricii.*
- tricuspidata. 56. *P. thorace tricuspidato, corpore griseo.* *Fabr. sp. inf. I. p. 315. n. 1. mant. inf. I. p. 207. n. 1.*  
*Forsk. Fn. arab. p. 80. n. 12? Tenebrio alexandrinus.*  
*Habitat in Aegypto.*
- cristata. 57. *P. thorace tricuspidato cristato, corpore variegato.* *Fabr. sp. inf. I. p. 315. n. 2. mant. inf. I. p. 207. n. 2.*  
*Pall. ic. inf. Ross. I. t. C. f. 26.*  
*Habitat in Aegypto.*

58. P.

\*) De his posterioribus speciebus, potissimum 52-55, incertum, cui tribui accensendae.

- reticulata. 58. *P. thoracis lateribus angulatis, elytris reticulatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 315. n. 3. mant. inf. 1. p. 207. n. 3.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura et magnitudine tricuspidae.*
- corrugata. 59. *P. atra, thorace laevi nitido, elytris rugosis: linea elevata unica. Fabr. sp. inf. 1. p. 315. n. 4. mant. inf. 1. p. 207. n. 4.*  
*Habitat ad caput bonae spei, reticulatae proxime affinis.*
- vittata. 60. *P. thorace subangulato elytris atris: vittis duabus albis lineaque elevata unica. Fabr. sp. inf. 1. p. 315. n. 5. mant. inf. 1. p. 207. n. 5.*  
*Habitat ad caput bonae spei, reticulata duplo minor.*
- †† *palpis anterioribus securiformibus, posterioribus clavatis, Helopes Fabricii.*
- caerulea. 61. *P. caerulefcens, thorace suborbiculato, elytris striatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 324. n. 1. mant inf. 1. p. 213. n. 1. Mus. Lud. Ur. 98.\**  
*Syst. nat. XII. 2. p. 677. n. 19. Tenebrio apterus caerulefcens, thorace suborbiculato, coleoptris obtusis.*  
*List. angl. app. 4. f. 14.*  
*Pet. gaz. t. 22. f. 6.*  
*Habitat in Europa, magis australi.*
- lanipes. 62. *P. aurea, elytris striatis acuminatis. Fabr. sp. inf. 1. p. 324. n. 2. mant. inf. 1. p. 213. n. 2.*  
*Mant. 1. p. 533. Tenebrio alatus aeneus, elytris subbifido mucronatis, plantis subtus hirtutis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 349. n. 5. Tenebrio nigro-cuprea &c. Scop. ent. carn. 255. Tenebrio aeneus.*  
*Habitat in Germaniae quisquiliis.*
- aeruginosa. 63. *P. viridi-aenea, antennis, elytris pedibusque nigris. Fabr. mant. inf. 1. p. 213. n. 3.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura et magnitudine lanipedis.*
- ferrata. 64. *P. nigra, digitis ferrugineis, palpis porrectis. Fabr. sp. inf. 1. p. 324. n. 3. mant. inf. 1. p. 213. n. 4.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 675. n. 11? Tenebrio (depressus) alatus niger, elytris caerulefcensibus, antennis tibiisque languineis, thorace depresso.*

Schall.

*Schall. Abb. der hall. Gef. naturf. Fr. I. p. 324. Tenebrio rutiba bis.*

*Sulz. act. Dresd. I. Serratula.*

*Habitat in Anglia et Germania.*

barbata. 65. *P. nigra*, palpis porrectis pedibusque flavescens. *Fabr. mant. inf. I. p. 213. n. 5.*

*Habitat Halae Saxonum, statura ferratae, at duplo minor.*

canaliculata. 66. *P. niger* thorace canaliculato utrinque impresso, elytris striatis, palpis porrectis. *Fabr. mant. inf. I. p. 213. n. 6.*

*Schall. Abb. der hall. Gef. naturf. Fr. I. p. 326. Tenebrio dubius.*

*Habitat Halae Saxonum, statura ferratae, alata.*

laevis. 67. *P. nigra* thorace canaliculato, posteriori attenuato, elytris laevibus. *Fabr. mant. inf. I. p. 213. n. 7.*

*Habitat Halae Saxonum, statura canaliculatae.*

equestris. 68. *P. atra*, elytris fascia abbreviata aurea. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 4. mant. inf. I. p. 214. n. 8.*

*Habitat in Brasilia.*

maura. 69. *P. atra*, thorace utrinque rotundato laevi, elytris excavato-punctatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 5. mant. inf. I. p. 214. n. 9.*

*Habitat in India, magna.*

morio. 70. *P. atra*, thorace quadrato laevi, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 6. mant. inf. I. p. 214. n. 10.*

*Habitat in America boreali.*

nigrita. 71. *P. atra*, thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato-fulcatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 7. mant. inf. I. p. 214. n. 11.*

*Fabr. syst. ent. p. 256. n. 4. Tenebrio atratus.*

*Habitat in America meridionali.*

rufipes. 72. *P. nigra*, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I. p. 325. n. 8. mant. inf. I. p. 214. n. 12.*


*Habitat in nova Hollandia.*

granulata. 73. *P. depressa*, elytris granulato-subspinosis. *Fabr. mant. inf. I. p. 214. n. 13.*

*Habitat ad caput bonae spei, tribulibus minor et latior.*

- longipes. 74. *P. nigra*, elytris striatis, pedibus elongatis: pedibus secundi paris barbatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 14.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, tibiis raro omnibus laevibus.*
- atra. 75. *P. atra*, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 15.  
*Degeer inf.* 5. n. 4. *Pyrochroa (nigra) nitida*, corpore ovato, thorace convexo, antennis pedibusque fuscis.  
*Habitat Lipsiae.*
- anglica. 76. *P. nigra*, thorace anterieus rotundato, elytris punctato-striatis, antennis apice rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 214. n. 16.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 318. n. 17. *Pimelia Morio*.  
*Habitat rarior in Anglia.*
- indica. 77. *P. atra*, elytris sulcato-punctatis, femoribus anterioribus acute dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 17.  
*Habitat in Coromandel, statura atrae, sed paulo minor.*
- quisquilia. 78. *P. nigra*, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 18.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 676. n. 13. *Fn. Juec.* 821.\* *Tenebrio niger*, ore pedibusque ferrugineis.  
*Habitat in Europae quisquiliis, subtus tota ferruginea.*
- ruficollis. 79. *P. ferruginea*, elytris striatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 214. n. 19.  
*Habitat Halae Saxonum, statura quisquiliae.*
- laevis. 80. *P. corpore atro laevi*. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 326. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 214. n. 20.  
*Habitat in Europae quisquiliis.*
- cyanea. 81. *P. caerulea*, thorace punctato, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 214. n. 21.  
*Habitat Hafniae, tota caerulea immaculata.*
- violacea. 82. *P. cylindracea* splendidissima caeruleo violaceoque varians, abdomine posterieus rubro, elytris punctato-striatis.  
*Pall. ic. inf. ross.* 1. p. 40. t. C. f. 4. *Mylaris violacea*.  
*Habitat in Brasilia, tenebrione molitore longior et gracilior. \*)*
83. *P.*

\*) de hac et duabus sequentibus dubium adhuc, an ad hanc tribum spectent.



leucogra- 83. *P. ovata*, thorace scaberrimo difformi, elytris carinatis  
pha. scabris: fasciis longitudinalibus albatis laevibus.  
*Pall. it. 2. app. p. 719. n. 43.* Tenebrio leucogrammus.  
*Pall. ic. inf. Ross. 1. p. 54. t. C. f. 20.* Tenebrio leucographus.  
*Habitat frequens ad fluvium Irтин, rarior ad fluvios Ural,*  
*Volga, Selenga Russiae orientalis.*

buparia. 84. *P. alata atra glabra*, thorace lunato, maxillis validis denta-  
tis longitudine capitis.  
*Forster, nov. inf. sp. 1. p. 61. n. 61.* Tenebrio buparius.  
*Habitat in Hispania ad fretum Gaditanum, magnitudine*  
*et statura lucani interrupti, habitu tenebrionis fossoris.*

**MANTICORA.** *Antennae filiformes: articulis cy-*  
*lindricis.*

*Palpi quatuor filiformes.*

*Thorax anterieus rotundatus, po-*  
*sterius apice emarginatus.*

*Caput porrectum. Mandi-*  
*bula exserta, porrecta.*

*Elytra connata. Alae nullae.*

maxillofa. I. *M. Fabr. sp. inf. 1. p. 320. n. 1. mant. inf. 1. p. 210. n. 1.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 1. p. 25. t. 1. f. 38.* Cicindela (gigan-  
tea) nigra, elytris colta longitudinali ferrata acuta, tho-  
race bilobo.

*Degeer inf. 7. p. 623. n. 10. t. 46. f. 14.* Carabus (tuber-  
culatus) apterus niger, elytris scabris: tuberculis con-  
cis hirsutis, tibiis obscure ferrugineis.

*Habitat ad caput bonae spei, vulgaris carabi majoris ma-*  
*gnitudine, celerrime currens et mordens.*

**ERODIUS.** *Antennae moniliformes.*

*Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla cornea, bifida, truncata.*

*Labium corneum, emarginatum.*

testudina- I. *Er. gibbus ater*, elytris connatis scabris: lateribus pulverulen-  
rius. to-albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 326. n. 1. mant. inf. 1. p. 215. n. 1.*

*Habitat ad caput bonae spei, magnus, subtus planus.*

2. *Er.*



- gibbus. 2. Er. gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 326. n. 2. *mant. inf.* I. p. 215. n. 2.  
*Foršk. Fn. arab.* p. 80. n. 11? *Tenebrio* (cothurnatus) apterus niger, thorace laevi utrinque antice unidentato, elytris tuberculatis, striis duabus eiatis.  
*Habitat in Africae arena mobili, in Aegypto frequens.*
- planus. 3. Er. ater, elytris linea elevata unica. *Fabr. sp. inf.* I. p. 327. n. 3. *mant. inf.* I. p. 215. n. 3.  
*Habitat in Aegypto.*
- minutus. 4. Er. ater, elytris laevissimis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 327. n. 4. *mant. inf.* I. p. 215. n. 4.  
*Habitat in Oriente.*

## LYTTA. Antennae filiformes.

Palpi quatuor inaequales: posteriores clavati.

Thorax subrotundus: Caput inflexum, gibbum.

Elytra mollia, flexilia.

- vesicatoria. I. L. viridis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 328. n. I. *mant. inf.* I. p. 215. n. I.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 679. n. 3. *Fn. succ.* 827. *Scop. ent. carn.* 185. *Meloë* (vesicatorius) alatus viridissimus nitens, antennis nigris.  
*It. scan.* 186. *Cantharis officinarum.*  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 341. n. I. t. 6. f. 5. *Cantharis viridi aurata*, antennis nigris.  
*Degeer inf.* 4. p. 12. n. 2. t. I. f. 9. *Cantharis vesicatoria.*  
*Raj. inf.* I. 341. *Cantharis vulgaris officinarum.*  
*Mouff. inf.* 144.  
*Fonst. inf.* p. 76. t. 7. *Dnia*  $\frac{14}{20}$  *u.s.* *czarowca* 1843 roku  
*Aldrov. inf.* 276. *Jedna samica z tego gatunku zniosta*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 55. 828 jay* (*binset Dwadziestka Obm*)  
*Schaeff. elem. t. 33.*  
*icon. t. 47. f. I. Kłóre wazyty dwa grana, byty blade*  
*Habitat in Ligultro, Fraxino, Sambuco, Syringa, Perhae cytryno-*  
*populo tremula, Tatariae lonicera tatarica, Calabriae quo-* wo zółte  
*que asperula, officinalis pro vesicatoriis.* *potyknijze*

Dniem uprosz & Tapa. 0000002

now i w sklanceczce brzymana

zniosta z jaja w <http://drcia.org.pl>

60 *Elepiong kuybis.*

2. *L. asperulata*  
 na obu kon-  
 cach taokw-  
 glone.

*J. Jarocki*

- nitidula. 2. *L. viridi-aenea*, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 328.  
n. 2. *mant. inf.* 1. p. 215. n. 2.  
*Habitat in Anglia.*
- collaris. 3. *L. atra*, vertice thorace pedibusque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 215. n. 3.  
*Habitat in Russia meridionali, magna; mas duplo minor.*
- fyriaca. 4. *L. viridi-caerulea*, thorace ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 4.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 680. n. 4. *Mus. Lud. Ulr.* 102. *Gron. zooph.* 620. *Meloë alatus viridi-caeruleus*, thorace luteo.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 6. t. 30. f. 1.  
*Habitat in Sibiria, India, Oriente, et frequens in australi Europa.*
- festiva. 5. *L. viridi-aenea nitida*, elytris testaceis maculis viridi-aeneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 5.  
*Pall. it.* 2. app. p. 721. n. 54. *Meloë festiva.*  
*Habitat in Sibiria.*
- marginata. 6. *L. atra*, elytrorum marginibus cinerascens. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 6.  
*Forst. nov. inf. sp.* 1. p. 62. n. 62. *Meloë (cinereus) alatus cinereus*, antennis elytrisque atris margine cinereis.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- atrata. 7. *L. corpore atro immaculato.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 321. n. 7.  
*mant. inf.* 1. p. 216. n. 8.  
*Habitat in Barbaria.*
- erythrocephala. 8. *L. atra*, capite testaceo, thorace elytris que cinereo lineatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 9.  
*Pall. it.* 1. app. n. 46.  
*Scop. ann. hist. nat.* 5. p. 103. n. 81.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 6. t. 30. f. 2.  
*Habitat in Europa australi, et Russia, atratae affinis.*
- vittata. 9. *L. elytris nigris: vitta marginibusque flavis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 329. n. 6. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 7.  
*Habitat in America.*

10. *L.*


---

*Lyttæ Meloæque, larvæ et imagines, foliis vescuntur.*

- dubia. 10. L. atra, capitis vertice fulvo, thorace elytrisque immaculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 329. n. 9. mant. inf. 1. p. 216. n. 10.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 12.* Meloë algericus.  
*Habitat in Sibiria, erythrocephalae proxime affinis.*
- afra. 11. L. nigra, thorace rufo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 330. n. 10. mant. inf. 1. p. 216. n. 11.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 680. n. 10.* Meloë alatus niger, thorace rufo.  
*Habitat in Africa, atratae affinis.*
- indica. 12. L. nigra, thorace convexo, elytris laevissimis fuscescenti-luteis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. p. 145. n. 4. t. 30. f. 3.*  
*Habitat in America, vesicatoriae affinis.*
- ruficollis. 13. L. caerulea, thorace orbiculato rubro, elytris punctatis pubescentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. p. 179. n. 6. t. 48. f. 4.*  
*Habitat in India, syriacae affinis, sed multo latior.*
- quadrimalata. 14. L. nigra glabra, pectore pubescente, elytris ex griseo luteis: maculis duabus subquadratis nigris. *Pall. it. 2. app. n. 48.*  
*Habitat in Sibiria, statura et magnitudine fenestratae, et instar ejus oleum suaveolens ex pedibus exsudans.*
- fenestrata. 15. L. glabra pallide testacea, thorace depresso, elytris griseis apice nigris: maculis duabus quadratis hyalinis. *Pall. it. 2. app. n. 47.*  
*Habitat ad Volgam inter flores, statura vesicatoriae, mediae magnitudinis.*
- clematidis. 16. L. ex chalybeo atra nitida, elytris dilute testaceis immaculatis. *Pall. it. 2. app. n. 51.*  
*Habitat in regionibus a fluvio Irtis versus orientem sitis in clematide, vesicatoriae affinis.*
- uralensis. 17. L. nigra opaca glaberrima. *Pall. it. 2. app. n. 56.*  
*Habitat ad montes Uralenses, muscae domesticae magnitudine, proscarabaeo affinis, elytris tamen longioribus, et capite latiore.*
- sibirica. 18. L. atra opaca glaberrima, elytris margine albis, capite rubro, oculis ore antennisque nigris. *Pall. it. 2. app. n. 50.*  
*Habitat gregaria in Sibiriae lotis et astragalis; maris antennarum articulis mediis compressis et dente munitis.*

- lutea. 19. *L. atra lanuginosa*, elytris ventricosis subcompressis luteis: punctis sex nigris. *Pall. it. app. n. 54.*  
*Habitat ad fluvium Irtis, major ad fluvium Ural, syriacae fere magnitudine.*
- ocellata. 20. *L. nigra lanuginosa*, pedibus testaceis, capite thorace elytrisque flavescens, elytris ocellis sex medio nigris. *Pall. it. app. n. 53.*  
*Habitat prope mare caspium, statura meloës trifasciatae, et duplo major, instar luteae oleum ex pedibus exsudans.*
- pectinata. 21. *L. antennis pectinatis*, corpore atro, fronte rubra. *Lepechin it. 2. p. 200. t. II. f. 26.*  
*Habitat in Sibiria.*
- cinnabarina. 22. *L. nigra*, thorace supra, elytris et capite utrinque rubris. *Scop. ent. carn. n. 186.*  
*Habitat in Carniolia.*
- rufa. 26. *L. nigra*, capite rufo. *Scop. ann. hist. nat. p. 103. n. 82.*  
*Habitat in Carnioliae calidioris collibus.*
- subvillosa. 27. *L. flavescens subvillosa*, elytris attenuatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 343. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*
- bicolor. 28. *L. testacea*, elytris apice nigris. *Geoffr. inf. par. I. p. 344. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- formicaria. 29. *L. fusca*, elytris anterioribus thoraceque elongato rubris. *Geoffr. inf. par. I. p. 344. n. 8.*  
*Habitat in Gallia. \*)*
- pensylvanica. 30. *L. tota nigra opaca.* *Degeer inf. 5. p. 16. n. I. t. 13. f. I.*  
*Habitat in Pennsylvania, 4½ lineas longa.*
- pubescens. 31. *L. nigra*, capite thoraceque pubescentibus, elytris flavis: macula posterioribus utrinque ferruginea. *Muf. Lesk. p. 43. n. 949.*  
*Habitat - - -*
- ferruginea. 32. *L. ferruginea*, capite thoraceque rufis, elytris fuscis basi testaceis. *Muf. Lesk. p. 43. n. 949. b.*  
*Habitat in Europa.*

\*) Species 17, 19-29 utrum huic generi adscribendae, an sequenti, dubium.

215. MELOË. *Antennae moniliformes.*  
*Thorax subrotundus.*  
*Elytra mollia, flexilia.*  
*Caput inflexum, gibbum.*

\* *alis nullis, elytris abbreviatis.*

Profscarabaeus. I. M. corpore violaceo. *Fn. succ.* 826. *Scop. ent. carn.* 184.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 327. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 215. n. 1.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 377. n. 1. Meloë.

*Degeer inf.* 5. p. 31. t. 1. f. 1. *Cantharis profscarabaeus.*

*Lister scarab. angl.* p. 392. n. 27. *Scarabaeus mollis, e nigra viola nitens.*

*Mouff. inf.* 162. f. med. *Profscarabaeus.*

*Fonst. inf.* p. 74. t. 1. *Profscarabaei femina.*

*Clut. hemerob.* p. 81. n. 73. *Vermis majalis.*

*Goed. inf.* 2. t. 42.

*Frisch inf.* 6. t. 6. f. 5.

*Hufn. inf.* 2. t. 9.

*Sulz. hist. inf.* t. 7. f. 10. et 54.

*Schaeff. elem.* t. 82.

*icon.* t. 3. f. 5.

*Bergstr. nomencl.* 1. p. 17. n. 15. t. 2. f. 15.

*Habitat, vere potissimum in Europae campis apricis arenosis, coloris ranunculosis, veratrum c. c. comedens, ova suaveolentia citrini pariens, tacta oleum limpidissimum flavicans, e geniculis praesertim pedum exsudans valde diureticum, cum melle vel oleo mixta in rabie canina commendata.*

majalis. 2. M. segmentis dorsalibus abdominis rubris. *Fabr. sp. inf.*

*I. p. 327. n. 2. mant. inf.* 1. p. 215. n. 2.

*Frisch inf.* 6. t. 6. f. 4. *Profscarabaeus alter.*

*Pontopp. atl. dan.* 1. t. 29.

*Schaeff. ic.* t. 3. f. 6.

*Habitat in Europa australi, profscarabaeo valde affinis.*

marginata. 3. M. nigra, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.

*Fabr. sp. inf.* 1. p. 328. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 215. n. 3.

*Schranck Beytr. z. Naturg.* p. 71. n. 19. Meloë (hungarus)

apterus ater laevis, thoracis basi elytrorumque margine interiori ferrugineis.

*Habitat in Italia et Hungaria, profscarabaeo duplo minor.*

000000 4

\*\* ala-

\*\* *alatae, elytris alas tegentibus.*

† *maxilla bifida, Mylabrides Fabricii.*

- fasciata. 4. *M. nigra, elytris fascia media flava. Fabr. sp. inf. I. p. 330. n. 1. mant. inf. I. p. 216. n. 1. Habitat in India.*
- cichorei. 5. *M. nigra, elytris flavis: fasciis tribus nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 330. n. 2. mant. inf. I. p. 216. n. 2. Syst. nat. XII. 2. p. 680. n. 5. Mus. Lud. Ulr. 103.\* Meloë alatus niger, thorace hirtuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis. Degeer inf. 5. p. 17. n. 2. t. 13. f. 2. Cantharis cichorei. Hufselq. it. p. 410 n. 101. Chrysomela cichorei. Imper. hist. nat. 78. Cantharis fasciata. Sulz. hist. inf. t. 7. f. 11. Habitat in totius Orientis, etiam Sibiriae et Calabriae cichoreis, proscarabaei magnitudine, in Sina officinalis, antennis interdum apice flavis.*
- decempunctatus. 6. *M. atra, elytris testaceis: punctis quinque nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 331. n. 5. mant. inf. I. p. 216. n. 5. Syst. nat. XII. 2. p. 680. n. 6. Meloë (quadripunctata) alatus niger, elytris flavis: maculis quinque nigris, antennis clavatis. Habitat in Italia, m. cichorei similis, at triplo minor, antennarum articulo ultimo clavato.*
- capensis. 7. *M. nigra, elytris maculis sex flavis, prima arcuata, antennis flavis. Mus. Lud. Ulr. 104.\* Fabr. sp. inf. I. p. 330. n. 4. mant. inf. I. p. 216. n. 4. Degeer inf. 7. t. 48. f. 14. Habitat ad caput bonae spei, m. cichorei duplo minor.*
- chryso-meloides. 8. *M. viridi-caerulescens, subtus nigro-violacea. Amoen. ac. 6. p. 396. n. 25. Habitat Surinami, an hujus generis?*
- quadripunctata. 9. *M. atra, elytris testaceis: punctis duobus nigris. Fabr. mant. inf. I. p. 217. n. 6. Habitat in Russia, decempunctatae affinis.*
- trimaculata. 10. *M. nigra, coleoptris flavis: fascia punctoque communi fuscis. Fabr. sp. inf. I. p. 331. n. 6. mant. inf. I. p. 217. n. 7. Habitat in Oriente.*

- algirica. 11. *M. nigra*, elytris testaceis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 330. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 216. n. 3.  
*Fabr. syst. ent. app.* 828. *Mylabris immaculata*.  
*Degeer inf.* 7. n. 53. t. 40. f. 17. *Cantharis fulva*.  
*Habitat in India.*
- testacea. 14. *M. testacea*, pectore elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 331. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 217. n. 8.  
*Habitat in Sibiria, congeneribus paulo minor.*
- americana. 15. *M. nigra*, thorace femicirculari, elytris fasciis tribus flavis: prima arcuata, reliquis confluentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. p. 145. n. 2. t. 30. f. 5. a.  
*Habitat in America, antennarum apice clavato, ochraceo.*
- indica. 16. *M. nigra*, elytris flavescens posterioribus fulvis: puncto, bascos litura triloba, fascia media dentata apicisque margine semilunari nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. p. 147. n. 5. t. 30. f. 6.  
*Habitat in India, congeneribus latior.*
- elongata. 17. *M. nigra nitida*, elytris flavis, caeruleo variis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. p. 147. n. 6. t. 30. f. 7. b.  
*Habitat - - - satis angusta.*
- undulata. 18. *M. nigra*, elytrorum vittis duabus angustis undulatis dentatis spadiceo-marginatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. p. 179. n. 8. t. 48. f. 3.  
*Habitat in India.*
- aurea. 19. *M. viridi-aurea*, elytris fulvis. *Degeer inf.* 7. n. 54. t. 48. f. 18.  
*Habitat - - - 4 lineas longa; an vere distincta species.*
- arcuata. 20. *M. nigra hirsuta*, elytris anterieus macula arcuata fasciisque binis undatis flavis.  
*Pall. ic. inf. Ross.* 2. t. E. f. 3. b? *Meloë phalerata*.  
*Degeer inf.* 7. n. 52. t. 48. f. 15. *Cantharis undato-bifasciata*.  
*Habitat - - - tres lineas longa, antennis nigris apice clavatis.*
- bifasciata. 21. *M. nigra hirsuta*, elytris anterieus macula rotunda, et ad angulum exteriorem altera fasciisque binis transversis flavis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. p. 179. n. 7. t. 48. f. 2.  
*Degeer inf.* 7. n. 50. t. 48. f. 13. *Cantharis bifasciata*.  
 β) *Pall. ic. inf. Ross.* 2. t. E. f. 3. a. *Meloë plagiata*.  
 Oooooo 5 *Habitat*

*Habitat in India, magna, antennis flavis, elytrorum basi picea, a 9½ lineis ad 3 lineas ultra pollicem longa; in β) ad elytrorum angulum anteriorem macula nulla.*

- trifascia- 22. *M. ex virefcente chalybea sericea cana, elytris griseo-pal-*  
ta. lidis: fascia communi alteraque ex virefcente atra. *Pall. it. 2. app. n. 52.*  
*Habitat in vicinia maris caspii, magnitudine meloës Schaefferi, statura m. cichorei, antennis apice clavatis.*
- atrata. 23. *M. aterrima nitens, elytris fascia flava versus apicem un-*  
dulata. *Pall. it. 2. app. n. 55.*  
*Habitat in confiniis maris caspii, frequens in gypsumphillis et veronicis florescentibus, antennis apice clavatis, oleum ex pedibus exsudans.*
- necyda- 24. *M. nigra, elytris ruberrimis, abdomine paulisper brevio-*  
lea. ribus, apice distantibus. *Pall. it. 2. app. n. 49.*  
*Habitat in Russici imperii provinciis orientalibus, oleum pariter suaveolens exsudans.*
- chloro- 25. *M. nigra subvillosa, elytris flavis. Geoffr. inf. par. 1.*  
ptera. *p. 344. n. 6.*  
*Habitat in Gallia, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.*
- pensylva- 26. *M. nigra opaca tota.*  
nica. *Degeer inf. 5. p. 16. n. 1. t. 13. f. 1. Cantharis pensylvanica.*  
*Habitat in Pennsylvania. \*)*
- Marci. 13. *M. nigra, pedibus ferrugineis, palpis clavatis crispis.*  
*Habitat Calmariae Suecorum, an hujus generis?*
- melanu- 30. *M. elytris flavis: maculis quatuor apiceque nigris, anten-*  
ra. nis clavatis. *Petagn. inf. Calabr. p. 127. n. 136. f. 13.*  
*Habitat Brancalemi in Calabria in frumenti spicis, m. cichorei simillima, sed major.*
- ochropte- 31. *M. nigra, elytris croceis basi nigris: utrinque gutta crocea*  
ra. ante et pone medium, fascia interrupta apiceque nigris.  
*Mus. Lesk. p. 43. n. 952.*  
*Habitat extra Europam.*

32. *M.*

\*) Huic tribui inscendae videntur species ab Ill. Pallas descriptae, et in ic. inf. Ross. delineatae luxata T. B. f. 5. a. b. variabilis t. E. f. 7. et 14. b. et Ionenica t. E. f. 12. de speciebus 13. 22. 26 magis dubium.



bicolor. 32. *M. nigra*, elytris flavis: basi utrinque punctulo, in medio fascia ad margines externos latiore apiceque nigris. *Mus. Lesk. p. 43. n. 953.*  
*Habitat extra Europam.*

— — *maxilla integra*, *Cerocomata Fabricii*.

Schaefferi. 12. *M. viridis*, antennis pedibusque luteis. *Fabr. sp. inf. I. p. 331. n. 1. mant. inf. I. p. 217. n. 1.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 358. n. 1. Cerocoma.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 681. n. 12. Meloë alatus viridis, pedibus luteis, antennis basi abbreviatis clavatis brevibus irregularibus.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 13.*  
*Schaeff. el. t. 37.*

*ic. t. 53. f. 8. 9.*  
*Habitat in Europa magis australi et Sibiria; statura vestigatoriae, sed dimidio minor.*

VahlII. 27. *M. viridis*, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 217. n. 2.*  
*Habitat in Barbariae umbellatis, statura et magnitudine m. Schaefferi.*

Schreberi. 28. *M. viridis*, antennis pedibus abdominisque segmentis tribus flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 331. n. 2. mant. inf. I. p. 217. n. 3.*  
*Habitat in Europa magis australi, m. Schaefferi nimis affinis, at duplo major, antennis flavis.*

Gouani. 29. *M. atra*, elytris apice fasciaque sanguineis. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1068. n. 11.*  
*Habitat in Gallia, pediculi magnitudine; an hujus ordinis?*

216. MORDELLA. *Antennae moniliformes, aut pectinatae.*

*Palpi quatuor, anteriores clavati, posteriores filiformes.*

*Caput deflexum sub collo, in territa.*

*Elytra deorsum curva apicem versus.*

*Ante femora lamina lata ad basin abdominis.*

\* *antennis pectinatis.*

ferruginea. 7. *M. rufa, pectore ano pedibusque nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 332. n. 1. mant. inf. 1. p. 217. n. 1. Habitat in India.*

nafuta. 8. *M. corpore atro immaculato. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 66. f. 77. Fabr. mant. inf. 1. p. 217. n. 2. Habitat in Japonia, glabra, aculeata quadruplo major.*

pectinata. 9. *M. rufa, elytris nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 332. n. 3. mant. inf. 1. p. 217. n. 3. Habitat in America.*

paradoxa. 1. *M. thoracis lateribus elytrisque testaceis. Fn. suec. 831.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 332. n. 2. mant. inf. 1. p. 218. n. 4. Habitat rarior in Europae plantis umbellatis.*

flabellata. 10. *M. testacea, ore pectore abdominisque dorso atris. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 501. mant. inf. 1. p. 218. n. 5. Habitat in Italia, ferrugineae affinis, at duplo fere minor.*

punctata. 11. *M. thoracis testaceo nigro punctato, elytris nigris: margine testaceo. Fabr. mant. inf. 1. p. 218. n. 6. Habitat in Cayenna, statura pectinatae, atra, capite testaceo.*

\*\* *antennis moniliformibus.*

sexmaculata. 12. *M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis: macula nigra. Fabr. sp. inf. 1. p. 332. n. 4. mant. inf. 1. p. 218. n. 7. Habitat in America.*

13. M.

- bimaculata. 13. *M. ferruginea*, pectore atro, elytris testaceis: macula nigra. *Fabr. mant. inf. I. p. 218. n. 8.*  
*Habitat in Hungaria, magna.*
- dimidiata. 14. *M. atra*, elytris basi flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 332. n. 5. mant. inf. I. p. 218. n. 9.*  
*Habitat - - - statura sexmaculatae, abdomine obtuso fere truncato.*
- limbata. 15. *M. ferruginea*, vertice thoracis disco elytrisque atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 332. n. 6. mant. inf. I. p. 218. n. 10.*  
*Habitat - - - statura sexmaculatae, antennis ferratis, pedibus nigris.*
- aculeata. 2. *M. atra*, ano spina terminato. *Fn. suec. 832. Scop. ent. carn. 192.*  
*Fn. suec. 534. Mordella oblonga atra, cauda aculeo terminata.*  
*Fabr. sp. inf. I. p. 333. n. 7. mant. inf. I. p. 218. n. 11.*  
*Mordella ano aculeato, corpore atro immaculato.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 353. n. 1. Mordella atra caudata unicolor.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 46.*  
*Schaeff. elem. t. 84.*  
*ic. t. 127. f. 7.*  
β) *Lepech. it. 2. t. 10. f. 15.*  
*Habitat frequens in Europae borealis floribus semistulosis, umbellatis, in Calabriae thapsia.*
- fasciata. 16. *M. nigra*, ano aculeato, elytris fasciis duabus cinereis. *Fabr. sp. inf. I. p. 333. n. 8. mant. inf. I. p. 218. n. 12.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 354. n. 2. Mordella atra caudata, fasciis villosis aureis.*  
*Habitat in Germaniae et Europae magis australis floribus, an varietas aculeatae?*
- octopunctata. 17. *M. ano aculeato*, elytris nigris: punctis quatuor flavis; primo lunato. *Fabr. sp. inf. I. p. 333. n. 9. mant. inf. I. p. 218. n. 13.*  
*Habitat in America septentrionali et Bavaria.*
- testacea. 18. *M. atra*, elytris testaceis: marginibus nigris. *Fabr. mant. inf. I. p. 218. n. 14.*  
*Habitat in Africae daeco, statura et magnitudine aculeatae, ano aculeato.*

19. *M.*

- abdomi- 19. *M. nigra*, thorace abdomineque fulvis, ano aculeato.  
nalis. *Fabr. sp. inf. I. p. 333. n. 10. mant. inf. I. p. 219. n. 15.*  
*Sulz. bist. inf. t. 7. f. 15. Mordella bicolor.*  
*Habitat in Germania.*
- humera- 3. *M. atra*, ore lateribus thoracis pedibusque flavis. *Fabr.*  
lis. *sp. inf. I. p. 333. n. 11. mant. inf. I. p. 219. n. 16.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 682. n. 3? Fn. suec. 833.\* Mordella*  
*atra, lateribus thoracis baseosque elytrorum flavescens.*  
*Habitat in Europae floribus.*
- frontalis. 4. *M. atra*, fronte pedibusque flavescens. *Fn. suec. 834.\**  
*Fabr. sp. inf. I. p. 333. n. 12. mant. inf. I. p. 219. n. 17.*  
*Habitat in Europae borealis floribus.*
- thoracica. 5. *M. atra*, capite thoraceque flavis. *Fn. suec. 835.\* Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 333. n. 13. mant. inf. I. p. 219. n. 18.*  
*Habitat in Europae floribus.*
- flava. 6. *M. flava*, elytrorum apicibus nigris. *Fn. suec. 836.\* Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 334. n. 14. mant. inf. I. p. 219. n. 19.*  
*Habitat frequens in Europae floribus umbellatis.*
- tricuspida. 20. *M. flava*, lamina abdominali cyanea, elytrorum punctis tri-  
bus nigris thorace posterius tricuspido. *Lepech. it. I.*  
*t. 19. f. 8.*  
*Habitat in deserto Uralensi.*
- murina. 21. *M. pubescens undulata*, cinerea thoracis maculis tribus  
nigris. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6. p. 148. n. 3.*  
*Habitat Berolini, statura et magnitudine fasciatae.*
- sexpunctata. 22. *M. atra nitida*, elytrorum punctis tribus albis. *Herbst*  
*apud Fueßli arch. inf. 6. p. 148. n. 4.*  
*Habitat in Marchia, murina fere major.*
- oxyacanthae. 23. *M. testacea*, capite nigro, thorace fusco. *Forst. nov. inf.*  
*sp. 1. p. 63. n. 63.*  
*Habitat in Angliae floribus crataegi oxyacanthae, aculeatae*  
*fere magnitudine.*
- melanopus. 24. *M. nigra*, clytris, thorace capite pedibusque testaceis.  
*Forst. sp. inf. nov. I. p. 64. n. 64.*  
*Habitat cum m. oxyacanthae, magnitudine pediculi majoris.*
- bicolor. 25. *M. atra*, clytris testaceis apice nigris fasciaque nigra in  
medio. *Forst. nov. inf. sp. I. p. 65. n. 65.*  
*Habitat*

*Habitat in Anglia, frequens in floribus crataegi, rumicis, umbellatarum, pediculi magnitudine.*

- perlata. 26. *M. nigranitida* subpilosa, thoracis margine posteriore, elytrorumque maculis quatuor perlatis. *Sulz. hist. inf. p. 67. t. 7. f. 14.*  
*Habitat in Rhætia.*
- rufipes. 27. *M. fulca*, pedibus ferrugineis. *Geoffr. inf. par. I. p. 355. n. 5.*  
*Habitat in Gallia.*

\*\*\* *antennis clavatis.*

- clavicornis. 28. *M. tota picea.* *Forst. nov. inf. sp. I. p. 66. n. 66.*  
*Habitat in Anglia, cursitans in rhei rhabarbari floribus, thoracicae magnitudine, vel paulo major; utrum hujus, an perinde ac I. 7-11. proprii generis?*

## 217. STAPHYLINUS. *Antennae moniliformes.*

*Palpi quatuor.*

*Elytra dimidiata. Alae tetrae.*

*Cauda simplex, exferens duas vesiculas oblongas.*

\* *palpis omnibus filiformibus.*

- aureus. 27. *St. capite thorace elytrisque villosis-aureis, abdomine nigro: fasciis cinereis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 219. n. 1.*  
*Habitat in Siam, hirti magnitudine.*
- hirtus. I. *St. hirsutus niger, thorace abdomineque posteriore nigris.*  
*Fn. suec. 839.\* Fabr. sp. inf. I. p. 334. n. 1. mant. inf. I. p. 219. n. 2.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 363. n. 7. Staphylinus niger villosus &c.*  
*Degeer inf. 4. p. 20. n. 5. Staphylinus bombylius.*  
*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 16.*  
*Schaeff. monogr. 1754. t. 2. f. 12.*  
*ic. t. 36. f. 6.*  
*Habitat in Europae arenosis.*

- murinus. 2. St. pubescens cinereus nigro-nebulosus. *Fn. suec.* 840.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 334. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 219. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 362. n. 1. Staphylinus villosus e  
 fulco cinereoque viridi tessellatus.  
*Degeer inf.* 4. p. 12. n. 1. t. 1. f. 1. Staphylinus villosus.  
*Schaeff. ic. t.* 4. f. 11.  
*Stroem. act. Nidr.* 6.  
*Habitat in cadaveribus, fimo, elytris subtus caeruleis.*  
 Larva hexapus, nuda, pallida, capite segmentisque tribus  
 anterioribus fuscis; cauda setis duabus articulatis subtus-  
 que tuberculo pediformi cylindrico tubuloso.
- olens. 28. St. niger opacus immaculatus, capite thorace latiore.  
*Fabr. mant. inf.* 1. p. 219. n. 4.  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 97. n. 1090. *Fn. Fridrichsd. p.*  
 23. n. 28. Staphylinus totus niger, capite thoraceque sca-  
 briusculo.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. p. 149. n. 4. Staphylinus  
 unicolor.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 360. n. 1. t. 7. f. 1. Staphylinus ater  
 extremo antennarum articulo lunulato.  
*Raj. inf. p.* 109. n. 1. Staphylinus major totus niger.  
*Habitat in Europae cadaveribus.*
- maxillo- 3. St. pubescens niger, fasciis cinereis, maxillis longitudine  
 fus. capitis. *Fn. suec.* 841.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 334. n. 3.  
*mant. inf.* 1. p. 220 n. 5.  
*Degeer inf.* 4. p. 18. n. 4. t. 1. f. 7. 8. Staphylinus bal-  
 teatus.  
*List. loq.* 391. Scarabaeus majusculus niger, forcipibus infeltis.  
*Mouff. inf.* 197.  
*Gron. zooph.* 630.  
*Fonst. inf. t.* 17. f. 1-3.  
*Bocc. mus. 2. t.* 31. f. A. A.  
*Habitat in Europae silvis, victitans rapina.*
- oculatus. 29. St. ater nitidus, capite utrinque macula fulva. *Fabr. sp.*  
*inf.* 1. p. 335. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 220. n. 6.  
*Habitat in novis Hollandia et Seelandia.*

30. St.

---

Staphylini voracissimi, rapina insectorum victitant, mordaces, humentibus ut pluri-  
 mum delectantur, vesiculas caudales periculo imminente exserunt; larvae subterra-  
 neae: *Spec.* 7-9. 21. 30. 96-100. thorace scutiformi, abdomine utriusque pilis  
 hispido apice setoso gaudent.

- dilatatus. 30. St. thorace marginato, atro nitidulo, elytris fuscis, antennis serratis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 220. n. 7.*  
*Habitat Halae Saxonum, erythroptero major.*
- bicolor. 96. St. ater, antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 997.*  
 β) Staphylinus ater, antennis, elytris pedibusque rufo-testaceis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 999.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscus. 97. St. fuscus, elytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 1000.*  
*Habitat in Europa.*
- clavatus. 98. St. ater glaber, elytris testaceis: marginibus externis fuscis, antennis clavatis, pedibus fusco-testaceis. *Mus. Lesk. p. 44. n. 1001.*  
*Habitat in Europa.*
- flavus. 99. St. niger, thorace marginibus externis late, anteriore posteriorique summo elytrisque flavis: vitta media margineque externo fuscis, antennis pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 1004.*  
*Habitat in Europa.*
- melanophthalmus. 100. St. thorace capiteque rufis, oculis, nucha abdomineque nigris, elytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p. 45. n. 1005.*  
*Habitat in Europa.*
- erythropterus. 4. St. ater, elytris, antennarum basi pedibusque rufis. *Fr. suec. 842. \* Scop. ent. carn. 306. Stroem. act. nidr. 3. p. 404. t. 6. f. 8. Fabr. sp. inf. 1. p. 335. n. 5. mant. inf. 1. p. 220. n. 8.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 364. n. 9. Staphylinus ater non nitens. Frisch inf. 5. p. 49. t. 25. Scarabaeus rapax elytris brevibus. Degeer inf. 4. p. 21. n. 6. Schaeff. elem. t. 117. icon. t. 2. f. 2.*  
 β) Staphylinus ater, capituli vertice, thorace, elytris tibiisque ferrugineis, antennis fuscis. *Mus. Lesk. p. 44. n. 968?*  
*Habitat saepius in Europae fimo.*
- erythrocephalus. 31. St. ater, capite rufo, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 335. n. 6. mant. inf. 1. p. 220. n. 9.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

PPPPPP

32. St.

- pilosus.* 32. *St. pilosus niger*, abdomine fusco, elytris scabris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 220. n. 10.  
*Habitat in Cayenna, parvus, brevis, crassus.*
- politus.* 5. *St. niger*, thorace elytrisque nitidis. *Fn. suec.* 843.\* *Scop. ent. carn.* 304. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 335. n. 7. *mant. inf.* 1. p. 220. n. 11.  
*Fn. suec.* 605. *Staphylinus niger*, thorace aeneo-nitido, elytris atro-caeruleis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 361. n. 3. *Staphylinus ater* &c.  
*Degeer inf.* 4. p. 22. n. 7. *Staphylinus niger nitidus* &c.  
*Schaeff. ic. t.* 89. f. 12.  
*Habitat in Europae cadaveribus, recens odorem ambrosiacum spargens.*
- brunnipes.* 33. *St. niger*, pedibus antennarum basi apiceque ferrugineis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 220. n. 12.  
*Habitat in Anglia, statura et magnitudine politii.*
- nitidus.* 34. *St. ater nitidus*, elytris testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 220. n. 13.  
*Habitat Kilonii, statura et magnitudine politii, an ejus varietas?*
- fulgidus.* 35. *St. ater nitidus*, elytris plantisque testaceis, capite punctulato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 220. n. 14.  
*Habitat Kilonii, statura politii, at tenuior.*
- margina-* 36. *St. ater*, thoracis lateribus pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 15. *Act. Nidros.* 4. p. 332. n. 33.  
*tus.*
- obtusus.* 9. *St. testaceus*, elytris anterieus anoque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 17.  
*Habitat in Germania, Anglia, pediculi magnitudine, pectore inter femora posteriora fusco.*
- lignorum.* 10. *St. fuscus*, elytris sutura abdomine pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 848.\*  
*Habitat in Europa.*
- filphoides.* 11. *St. niger*, thoracis lateribus pedibusque lividis, elytris lividis: margine maculaque longitudinali nigris.  
*Habitat in Europa, obtuso similis.*
- subterra-* 12. *St. niger*, elytris anterieus extrorsum flavis, pedibus nigris. *Fn. suec.* 849.\*  
*neus.* *Habitat in Europa.*

13. *St.*



- flavescens. 13. St. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Fn. suec.* 850.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 16.  
*Habitat in Europa boreali.*
- biguttatus. 15. St. niger, elytris puncto fulvo. *Fn. suec.* 851.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 20.  
Staphylinus niger, elytris puncto albido, oculis prominulis.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 371. n. 24?  
*Müll. zool. dan. prodr.* p. 99. n. 1123?  
*Habitat ad littora maris baltici.*
- cicindeloides. 37. St. niger rugosus, antennis pedibusque testaceis: geniculis nigris. *Schaller Abb. der. hall. naturf. Ges.* 1. p. 324.  
*Habitat Halae Saxonum, statura et magnitudine biguttati.*
- bipustulatus. 16. St. niger, elytris puncto ferrugineo. *Fn. suec.* 847.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 18.  
*Habitat in Europa boreali, antennis extrorsum crassioribus.*
- analis. 38. St. ater nitidus, antennis, elytris, ano pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 221. n. 19.  
*Habitat Kilonii, bipustulato major.*
- clavicornis. 39. St. niger immaculatus, thorace rotundato laevi, antennis extrorsum crassioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 25.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 371. n. 25?  
β) *Scop. ent. carn.* n. 303. Staphylinus clavicornis.  
*Habitat Kilonii, β) pedibus rufis sub Carnioliae pyri cortice.*
- Cantharellus. 17. St. niger, elytris glaucis apice flavicantibus.  
*Habitat in Suecia ad Hammarby, cantharidi biguttatae simillimus.*
- littoreus. 18. St. niger, elytris anterieus griseis, pedibus rufis. *Fn. suec.* 852.\* *It. gotl.* 173.  
*Habitat in littoribus.*
- sanguineus. 19. St. niger, elytris sanguineis. *Fn. suec.* 853.\*  
*Habitat in Europa.*
- caraboides. 20. St. flavus immaculatus. *Fn. suec.* 854.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 337. n. 23. *mant. inf.* 1. p. 222. n. 33.  
*Fn. suec.* 613. Staphylinus totus testaceus.  
*Degeer inf.* 4. p. 25. n. 12. Staphylinus fulvus,  
*Habitat in Europa boreali.*

- chryso- 21. St. niger, thorace elytris pedibusque testaceis. *Fn. succ.*  
melinus. 855.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 685. n. 21. *mant. inf.* 1. p. 221.  
n. 28.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 368. n. 18.  
*Habitat in Europa boreali.*
- fuscipes. 22. St. niger, elytris pedibusque testaceis. *Fn. succ.* 857.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 221. n. 22.  
*Habitat in Europae stercore.*
- hypno- 40. St. ater laevis, thoracis lateribus, elytris pedibusque te-  
rum. 40. itaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 336. n. 16. *mant. inf.* 1. p.  
221. n. 23.  
*Habitat in Angliae hypnis.*
- nitidulus. 41. St. ater, thoracis marginibus flavescens, elytris ferru-  
gineis: margine nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 337. n. 17.  
*mant. inf.* 1. p. 221. n. 24.  
*Habitat in Anglia.*
- atricapil- 42. St. thorace rufo, elytris fuscis: puncto baseos margineque  
lus. 42. posteriore albis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 337. n. 19. *mant.*  
*inf.* 1. p. 221. n. 25.  
*Habitat in Anglia.*
- marginel- 43. St. ater, elytrorum margine laterali et posteriore ferru-  
lus. 43. gineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 337. n. 20. *mant. inf.* 1. p.  
221. n. 26.  
*Habitat in Angliae stercore, mediae magnitudinis.*
- canalicu- 44. St. flavus, capite abdominisque cingulo atris, thorace ca-  
latus. 44. naliculato. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 221. n. 29.  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- tricolor. 45. St. ater, antennis thoraceque rufis, elytris pedibusque  
45. testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 221. n. 30.  
*Habitat in Daniae boletis, parvus.*
- rufipes. 24. St. ater glaber, pedibus rufis. *Fn. succ.* 858.\* *Fabr. sp.*  
24. *inf.* 1. p. 337. n. 22. *mant. inf.* 1. p. 222. n. 31.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 367. n. 19. Staphylinus niger &c.  
*Degeer inf.* 4. p. 24. n. 11. t. 1. f. 14. Staphylinus ovatus  
glaber &c.  
*Habitat in Europa, interdum testaceus, aut niger, pedibus  
testaceis.*

- melano- 46. St. ferrugineus, capite atro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 222.*  
cephalus. n. 32.  
*Habitat in Suecia, minutus.*
- rugosus. 47. St. niger, thorace elytrisque rugosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 338.*  
n. 24. *mant. inf. 1. p. 222. n. 34.*  
*Habitat in Anglia.*
- piccus. 25. St. niger, elytris piceis, thorace depresso: lineis elevatis  
tribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 338. n. 25. mant. inf. 1. p.*  
*222. n. 35.*  
*Habitat in Europa boreali, pediculi magnitudine, sed ma-*  
*gis oblongus.*
- boleti. 26. St. fuscus, elytris pallidioribus, antennis pedibusque li-  
vidis. *Fn. juec. 859.\**  
*Habitat gregarius in boletis abietinis, quorum fistulas tan-*  
*quam apis suas fistulas intrat, pulice dimidio minor.*
- obscurus. 48. St. niger opacus obsolete punctatus, antennis basi fuscis,  
versus apicem incrassatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf.*  
*6. p. 149. n. 8.*  
*Habitat Berolini, magnitudine polito, statura murini.*
- tricornis. 49. St. niger, fronte bicuspidata, thorace posterius cornuto,  
elytris rubris: margine superiori et interiori nigricante.  
*Herbst apud Fuesli arch. inf. 6. p. 149. n. 9. t. 30. f. 8. c.*  
*Habitat rarior Berolini, polito tertia parte minor.*
- blattinus. 50. St. ater, thorace lato, elytris pedibusque testaceis nitidis.  
*Schranck inf. austr. p. 236. n. 447.*  
*Habitat in Austria in terra, habitu blattae lucifugae.*
- minor. 51. St. niger glaber, elytris pallide, antennis basi fuscis, pe-  
dibus luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 97. n. 1096.*  
*Habitat in Europa boreali, ultra 3 lineas longus.*
- saxatilis. 52. St. ater nitidus subpubescens, elytris pedibus abdominis-  
que apice testaceis. *Schranck inf. austr. p. 234. n. 442.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 365. n. 13.*  
*Habitat in Germania et Gallia, in terra sub lapidibus, mi-*  
*nore minor.*
- similis. 53. St. niger, pedibus luteis: femorum apice nigro. *Herbst*  
*apud Fuesli arch. inf. 6. p. 151. n. 15.*  
*Habitat Berolini, statura et magnitudine biguttati.*

- Domicella. 54. *St. niger*, thorace elytris pedibusque badiis. *Schranck inf. austr. p. 235. n. 444.*  
*Habitat in Austria superiori, 2 lineas longus.*
- glaberri- 55. *St. niger nitidus*, antennis apicem versus incrassatis: arti-  
mus. culo primo longissimo. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 6.*  
*p. 151. n. 17.*  
*Habitat Berolini, 4 circiter lineas longus.*
- buphthal- 56. *St. niger immaculatus*, oculis magnis exfertis. *Schranck*  
mos. *Beitr. zur Naturg. p. 72. §. 21. inf. austr. p. 235. n. 445.*  
*Habitat in Austria ad hortorum muros.*
- ophthal- 57. *St. atro-caeruleus punctatus*, oculis macula pallida lunu-  
nicus. lata suffufis. *Scop. ent. carn. n. 300.*  
*Habitat in Carniola.*
- fulvipes. 58. *St. atro-caeruleus*, palpis pedibusque fulvis. *Scop. ent.*  
*carn. n. 301.*  
*Habitat in Carniola.*
- brassicae. 59. *St. ferrugineus*, capite et corpore nigris, elytris puncta-  
tis, antennis extrorsum crassioribus villosis. *Scop. ent.*  
*carn. n. 309.*  
*Habitat in Carnioliae brassica.*
- arnicae. 60. *St. niger*, thorace antennisque ferrugineis, pedibus testa-  
ceis. *Scop. ent. carn. n. 310.*  
*Habitat in Carnioliae arnica.*
- hellebori. 61. *St. niger*, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Scop.*  
*ent. carn. n. 311.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 366. n. 14?*  
*Habitat in Carnioliae helleboro, et Gallia.*
- fossor. 62. *St. fusco rufus*, elytris apice pedibusque rufis. *Scop. ann.*  
*hist. nat. 5. p. 109. n. 105.*  
*Habitat in fungis metallorum Schemnizensium.*
- foedina- 63. *St. caerulefcens villosus*, tarsis rufis. *Scop. ann. hist. nat.*  
rum, *5. p. 109. n. 106.*  
*Habitat ad ligna cuniculorum Schemnizensium, statura fos-*  
*foris.*
- niger. 64. *St. totus niger*, capite thoraceque nitido non punctato.  
*Müll. prodr. zool. dan. p. 98. n. 1109. Fn. Fridrichsd.*  
*p. 23. n. 229.*  
*Habitat in Dania.*

65. *St.*

- cursor. 65. *St. niger*, thorace depresso: litura duplici, elytris pedibusque flavis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 97. n. 1095.*  
*Habitat in Dania.*
- agarici. 66. *St. luteus*, capite nigro, abdomine rufo. Müll. *zool. dan. prodr. p. 97. n. 1097.*  
*Habitat in Daniae agaricis.*
- latus. 67. *St. niger*, elytrorum summo margine posteriori pedibusque flavis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 97. n. 1011.*  
*Habitat in Dania.*
- pene-trans. 68. *St. niger*, antennis elytris pedibusque castaneis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 97. n. 1102.*  
*Habitat in Dania.*
- vernalis. 69. *St. fulvus*, elytris anterieus, abdomineque posteriori nigris, medio rufo. Müll. *zool. dan. prodr. p. 98. n. 1103.*  
*Habitat in Dania, facie chrysomelini, vere potissimum conspicuus.*
- marginatus. 70. *St. niger*, thoracis marginibus, elytris, pedibus abdominisque apice flavis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 98. n. 1107.*  
*Habitat in Dania.*
- fuscicornis. 71. *St. niger*, capite thoraceque nitidis, elytris margine inferiore antennisque lividis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 98. n. 1112.*  
*Habitat in Dania.*
- floreus. 72. *St. niger*, thorace convexo punctulato, elytris pedibusque flavis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 99. n. 1117.*  
*Habitat in Daniae floribus.*
- fracticornis. 73. *St. linearis niger*, pedibus antennisque fuscis: infimo articulo atro. Müll. *zool. dan. prodr. p. 99. n. 1118.*  
*Habitat in Dania.*
- formicarius. 74. *St. linearis niger*, infimo antennarum articulo atro. Müll. *zool. dan. prodr. p. 99. n. 1119.*  
*Habitat in Dania, aliquando rufus, capite et abdomine, aut etiam thorace, aut infimul elytris nigris.*
- punctatus. 75. *St. atro-caeruleus*, femoribus testaceis. Müll. *zool. dan. prodr. p. 99. n. 1121. Act. Nidros. 4. p. 36.*  
*Habitat in Dania.*

- friatus. 76. St. ater, thorace punctato striatoque. Müll. zool. dan. prodr. p. 99. n. 1122. Aët. Nidrosf. 4. p. 35.  
*Habitat in Dania.*
- spinipes. 77. St. niger, pedibus testaceis, tibiis spinosis. Pontopp. Naturg. Dännem. p. 211. n. 9. t. 16.  
*Habitat in Dania.*
- tataricus. 78. St. totus ater nitidus, thorace cylindrico capite angustiore, elytris subtilissime punctatis. Pall. it. 2. app. n. 74.  
*Habitat ad lacum Tatariae falsum Inderientem, maximus, gracilis, longus, glaberrimus.*
- pubescens. 79. St. villosus nigro-fuscus, nigro viridi griseoque maculatus, subtus argenteus, abdominis apice subrotundato. Degeer inf. 4. p. 17. n. 2.  
*Habitat in Europa in terra et fimo, 6½ lineas longus.*
- chalcocephalus. 80. St. obscure fuscus, capite thoraceque aeneis nitidis, tibiis fasciisque rufo-fuscis. Degeer inf. 4. p. 22. n. 8.  
*Habitat in Europa, polito paulo minor.*
- aeneus. 81. St. glaber aeneo-viridis nitidus, abdomine pedibusque nigris. Degeer inf. 4. p. 23. n. 9.  
Geoffr. inf. par. 1. p. 367. n. 17.  
Müll. zool. dan. prodr. p. 98. n. 1110.  
*Habitat in Europa, 4 lineas longus.*
- glaber. 82. St. niger nitens, elytris laevibus pedibusque testaceis. Geoffr. inf. par. 1. p. 364. n. 10.  
Müll. zool. dan. prodr. p. 98. n. 1106.  
*Habitat in Europa.*
- glaucus. 83. St. atro caerulefcens, extremo antennarum articulo lunulato. Geoffr. inf. par. 1. p. 361. n. 2.  
*Habitat in Gallia.*
- macropterus. 84. St. ater, elytris thorace duplo longioribus. Geoffr. inf. par. 1. p. 362. n. 4.  
*Habitat in Gallia.*
- ochrocephalus. 85. St. pubescens, capite flavo, thorace elytrisque fusco nigroque nebulosis: punctis impressis. Geoffr. inf. par. 1. p. 363. n. 8.  
*Habitat in Gallia.*

86. St.

- punctulatus. 86. *St. niger nitens*, elytris punctatis pedibusque testaceis. *Geoffr. inf. par. I. p. 365. n. 11.*  
*Habitat in Gallia.*
- curtulus. 87. *St. niger nitens*, thorace plano marginato, elytris punctatis pedibusque fuscis. *Geoffr. inf. par. I. p. 365. n. 12.*  
*Habitat in Gallia.*
- fulcatus. 88. *St. niger*, thorace marginato sulcato, pedibus rufis. *Geoffr. inf. par. I. p. 730. n. 45.*  
*Habitat in Gallia.*
- limbatus. 89. *St. niger*, elytris fuscis: margine flavo. *Geoffr. inf. par. I. p. 368. n. 19.*  
*Habitat in Gallia, flavescente multo major.*
- maculatus. 90. *St. niger*, thorace utrinque elytrisque macula flava. *Geoffr. inf. par. I. p. 369. n. 20.*  
*Habitat in Gallia.*
- rubricollis. 91. *St. atro-caerulescens*, thorace rubro. *Geoffr. inf. par. I. p. 370. n. 23.*  
*Habitat in Gallia.*
- cylindricus. 101. *St. cylindricus totus ater glaber.* *Mus. Lesk. p. 44. n. 967.*  
*Habitat in Europa.*
- dichrous. 102. *St. ater*, capitè thoraceque glabris, elytris fusco-ferrugineis, antennarum basi et articulis quinque ultimis planisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 44. n. 970.*  
*Habitat in Europa.*
- picatus. 103. *St. ater*, capite thoraceque piccis glabris. *Mus. Lesk. p. 44. n. 972.*  
*Habitat in Europa.*
- glaber. 104. *St. ater glaber.* *Mus. Lesk. p. 44. n. 973.*  
*Habitat in Europa.*
- erythropus. 105. *St. ater*, antennis pedibus elytrisque rufis: his basi nigris. *Mus. Lesk. p. 44. n. 974.*  
*Habitat in Europa.*
- eruentatus. 106. *St. ater*, elytris singulis disco gutta sanguinea. *Mus. Lesk. p. 44. n. 975.*  
*Habitat in Europa.*

- lugubris. 107. St. niger, antennis, elytris pedibusque fuscis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 976.*  
 β) St. ater, elytris antennis pedibusque fusco-testaceis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 982.*  
*Habitat in Europa.*
- biclavatus. 108. St. ater glaber, elytris pedibusque fusco-testaceis, antennis biclavatis: basi longa clavata atra. *Muf. Lesk. p. 44. n. 978.*  
*Habitat in Europa.*
- rufescens. 109. St. capite thoraceque atris punctatis, abdomine nigro, elytris antennis pedibusque fusco-rufescentibus. *Muf. Lesk. p. 44. n. 979.*  
*Habitat in Europa.*
- cephalotes. 110. St. ater, capite magno, elytris fuscis, antennis ferrugineis, pedibus testaceis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 980.*  
*Habitat in Europa.*
- brevipes. 111. St. ater, elytris pedibusque testaceis, tibiis brevibus. *Muf. Lesk. p. 44. n. 981.*  
*Habitat in Europa.*
- marginellus. 112. St. niger, thoracis abdominisque marginibus, antennarum basi, elytris pedibusque testaceis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 982.*  
*Habitat in Europa.*
- haemorrhoidalis. 113. St. ater, thorace utrinque impresso, elytris pedibus, ore anoque testaceis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 983.*  
*Habitat in Europa.*
- crassipes. 114. St. ater, thorace longo subquadrato glabro, elytris fuscis, antennis pedibusque rufescentibus, femoribus anticis crassis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 986.*  
*Habitat in Europa.*
- flavicornis. 115. St. ater, punctis elevatis minimis undique obsessus, antennis flavis apice fuscis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 990.*  
*Habitat in Europa.*
- litturatus. 116. St. ater, elytris testaceis, basi macula communi et in medio ad marginem externum utrinque macula fusca, antennis pedibusque testaceis. *Muf. Lesk. p. 44. n. 991.*  
*Habitat in Europa.*

117. St.



- alatus. 117. St. fuscus, elytris longis, pedibus rufo-fuscescentibus.  
*Mus. Lesk. p. 44. n. 992.*  
*Habitat in Europa.*
- \*\* *palpis posterioribus securiformibus*, Oxypori Fabricii.
- rufus. 6. St. rufus, capite elytrorum abdominisque posterioribus, femoribus basi nigris. *Fn. suec. 844. Fabr. sp. inf. 1. p. 338. n. 1. mant. inf. 1. p. 222. n. 1. Scop. ent. carn. 307. Geoffr. inf. par. 1. p. 370. n. 22. Staphylinus flavus. Gadd sat. 80. Staphylinus pallide rufus elytris caerulecentibus, capite et apice abdominis nigris. Degeer inf. 4. p. 24. n. 10. t. 1. f. 11. 12. Schaeff. ic. t. 35. f. 3.*  
*Habitat in Europae boletis.*
- lunulatus. 7. St. rufus, capite abdominis elytrorumque posticis nigris, femoribus totis rufis. *Fn. suec. 845.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 338. n. 2. mant. inf. 1. p. 222. n. 2.*  
*Oxyporus flavus, elytris nigris basi apiceque pallidis.*  
*Habitat in Europae boletis.*
- parvus. 92. St. flavus, elytris basi anoque atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 222. n. 3.*  
*Habitat Kilonii, antennis flavis apice fuscescentibus.*
- thoracicus. 93. St. nigricans, thorace rufo, elytris fuscis basi albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 338. n. 3. mant. inf. 1. p. 222. n. 4.*  
*Habitat Kilonii in boletis.*
- pygmaeus. 94. St. nigricans, thorace elytrisque pallidis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 339. n. 4. mant. inf. 1. p. 222. n. 5.*  
*Habitat Kilonii in boletis.*
- flavipes. 22. St. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. suec. 856.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 339. n. 5. mant. inf. 1. p. 222. n. 6.*  
*Oxyporus niger, elytris tibiisque fuscis.*  
*Habitat in Europae boletis.*
- abdominalis. 95. St. rufus, abdomine atro nitido. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 501. mant. inf. 1. p. 222. n. 7.*  
*Habitat in Norwegia, reliquis hujus tribus minor.*

\*\*\* *pal-*

\*\*\* *palpis anterioribus clavatis*: Paederi Fabricii.

- riparius. 9. St. rufus, elytris caeruleis, capite abdominisque apice nigris. *Fn. succ.* 846.\* *It. gotl.* 173. *Degeer inf.* 4. p. 28. n. 14. z. 1. f. 1. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 339. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 223. n. 1.  
*Scop. ent. carn.* 308. Staphylinus gregarius.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 369. n. 21.  
*Schaeff. ic. t.* 71. f. 3.  
*Habitat ad Europae ripas frequens.*
- ruficollis. 96. St. niger, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 339. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 223. n. 2.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. t. 48. f. 5. a. b.  
*Habitat in Germania sub lapidibus.*
- elongatus. 14. St. niger, elytris posterius pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 339. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 223. n. 3. Paederus niger, elytris postice pedibusque fulvis.  
*Habitat in Europa boreali.*

## 218. FORFICULA. *Antennae setaceae.*

*Palpi inaequales, filiformes.*

*Elytra dimidiata. Alae tectae.*

*Cauda forcipata.*

- auricularia. 1. F. elytris apice albis, antennis 14articulatis. *Fn. succ.* 860. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 375. n. 1. *Scop. ent. carn.* 312. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 340. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 224. n. 1. *Degeer inf.* 3 p. 545. n. 1. t. 25. f. 16. Forficula major.  
*Mouff. inf.* 171. f. inf. Forficula auricularia vulgaris.  
*Petiv. gaz. t.* 74. f. 5. Forficula vulgaris.  
*List. scar. angl. p.* 391. *mut. t.* 31. f. A. Scarabaeus subrufus, cauda furcata.  
*Frisch inf.* 8. p. 31. t. 15. f. 1. 2. Vermis auricularius.  
*Fons. inf. t.* 16. f. 2.  
*Merian. inf. t.* 30.  
*Sulz. inf. t.* 7. f. 50.  
*hist. inf. t.* 7. f. 17.

Schaeff.

---

Forficulae larvae agiles curstant.

Schaeff. *elem. t.* 63.

*icon. t.* 144. *f.* 3. 4.

*Habitat in Europae fructibus frequens, aures dormientium interdum intrans, spiritu frumenti pellenda.*

gigantea. 3. *F. pallida supra nigro variegata, ano bidentato: forcipe porrecta unidentata. Fabr. mant. inf. 1. p. 224. n. 2.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. t. 49. f. 1. Forficula bilineata,*

*Habitat in Europa magis australi, maxima.*

bipuncta. 4. *F. nigra capite posterius pedibusque rufis, elytris macula alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 340. n. 2. mant. inf. 1. p. 224. n. 3.*  
*Habitat in Italia, antennis 11articulatis.*

albipes. 5. *F. atra, thorace posterius, elytris basi alis pedibusque albis. Fabr. mant. inf. 1. p. 224. n. 4.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, mediae magnitudinis.*

minor. 2. *F. elytris testaceis immaculatis, antennis 10articulatis. Fn. suec. 861.\* Geoffr. inf. par. 1. p. 376. n. 2. Fabr. sp. inf. 1. p. 340. n. 3. mant. inf. 1. p. 224. n. 5.*  
*Fn. suec. 600. Forficula alis elythro concoloribus, Degeer inf. 3. p. 553. n. 2. t. 25. f. 26. 27.*  
*Schaeff. ic. t. 41. f. 12. 13.*  
*Habitat rarior in Europa, antennarum apice albido.*

flexuosa. 6. *F. forcipe flexuosa, elytris punctis duobus flavis. Fabr. sp. inf. 1. p. 341. n. 4. mant. inf. 1. p. 224. n. 6.*  
*Habitat in Cayenna.*

dentata. 7. *F. fusca, antennis 10 articulatis, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcipe basi dentata. Fabr. sp. inf. 1. p. 341. n. 5. mant. inf. 1. p. 224. n. 7.*  
*Habitat in Madera.*

parallela. 8. *F. nigra, thoracis marginibus elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi. Fabr. sp. inf. 1. p. 341. n. 6. mant. inf. 1. p. 224. n. 8.*  
*Habitat in Madera.*

Morio. 9. *F. atra*, antennis fascia alba. *Fabr. sp. inf. I. p. 341. n. 7.*  
*mant. inf. I. p. 224. n. 9.*

*Habitat in Tahiti.*

pallipes. 10. *F. forcipe elongata unidentata nigra*, pedibus albis. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 341. n. 8. mant. inf. I. p. 224. n. 10.*

*Habitat in insulis promontorii viridis.*

livida. 11. *F. livida minima*, forcipe ad lentem dentata. *Mus. Lesk.*  
*p. 46. n. 3.*

## II. HEMIPTERA.

*Os* rostrumque inflexum versus pectus.

*Alae* hemelytratae : superioribus semicoriaceis  
(per suturam rectam minime conniventibus) sed margine interiore impositis.

219. BLATTA. *Caput* inflexum.  
*Antennae* setaceae.  
*Palpi* inaequales, filiformes.  
*Elytra* alaeque planae, subcoriaceae.  
*Thorax* planiusculus, orbiculatus, marginatus.  
*Pedes* cursorii.  
*Cornicula* duo supra caudam (plurimis)

*gigantea*. I. Bl. livida, thoracis clypeo macula quadrata fusca. *Mus. Lud. Ulr.* 106. *Gron. zooph.* 633. t. 16. f. 3.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 341. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 1.  
*Seb. mus.* 3. t. 77. f. 1. 2. et 4. t. 85. f. 17. 18.  
*Drury inf.* 2. t. 36. f. 2.  
*Habitat in Asia et America, diametro ovi gallinacei.*

*maderae*. II. Bl. fusca, thorace elytrisque lividis fusco variegatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 341. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 2.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. t. 49. f. 3.  
*Habitat in insula Madera, statura giganteae, at paulo minor.*

*aegyptiaca*. 2. Bl. atra, thoracis margine anteriori albo. *Mus. Lud. Ulr.* 107.\* *Gron. zooph.* 637. t. 15. f. 2.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 342. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 225. n. 3.  
*Drury inf.* 2. t. 36. f. 3.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. t. 49. f. 4.  
*Habitat in Aegypto, Oriente.*

*occidentalis*. 12. Bl. thorace atro: margine omni pallido punctisque duobus baseos fulvis, elytris olivaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 225. n. 4.  
*Habitat in America, aegyptiaca minor.*

3. Bl.

- furina- 3. Bl. livida, thoracis margine anteriori albo. *Fabr. sp. inf.*  
 menfis. I. p. 342. n. 4. *mant. inf. I. p. 225. n. 5.*  
*Sulz. inf. t. 8. f. 1.*  
*Degeer inf. 3. t. 44. f. 8.*  
*Habitat in Surinamo.*
- americana. 4. Bl. ferruginea, thoracis clypeo posterius exalbido. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 342. n. 5. mant. inf. I. p. 225. n. 6.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 381. n. 2.* Blatta fusco-flavescens.  
*Degeer inf. 3. t. 44. f. 1. 2. 3.* Blatta ferruginea.  
*Raj. inf. 623.* Blatta molendinaria ab insula Jamaica allata  
 major.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. t. 49. f. 5.*  
*Merun. surin. I. t. 1.*  
 β) Blatta alata. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. t. 49. f. 6.*  
*Habitat in America, cum saccharo in Europam delata.*
- australi- 13. Bl. ferruginea, thorace atro, annulo albo, clytris basi line-  
 fia. ola alba. *Fabr. sp. inf. I. p. 342. n. 6. mant. inf. I. p.*  
*225. n. 7.*  
*Capta frequens in navi ex oceano australi reduce.*
- erythro- 14. Bl. atra, capite pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. I.*  
 cephal. p. 342. n. 7. *mant. inf. I. p. 225. n. 8.*  
*Habitat - - - magna.*
- capensis. 15. Bl. fusca, capite pedibusque rubris. *Thunb. nov. inf. sp.*  
 4. p. 77. *Fabr. mant. inf. I. p. 225. n. 9.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura et magnitudine ameri-*  
*canae, glabra.*
- indica. 16. Bl. grisea, thorace atro: margine anteriori albo. *Fabr.*  
*sp. inf. I. p. 343. n. 8. mant. inf. I. p. 225. n. 10.*  
*Habitat in India.*
- nivea. 5. Bl. alba, antennis flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 343. n. 9.*  
*mant. inf. I. p. 226. n. 11.*  
*Degeer inf. 3. t. 44. f. 10.*  
*Drury inf. 2. t. 36. f. 1.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. t. 49. f. 8.*  
*Habitat in America meridionali, magnitudine tabani.*
- irrorata. 17. Bl. pallida, thorace elytrisque fusco irroratis, alis disco  
 nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 343. n. 10. mant. inf. I. p. 226.*  
*n. 12.*

*Thunb.*

*Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 76?* Blatta pallida thorace elytrisque fulco irroratis, alis basi nigris.

*Habitat ad caput bonae spei et in nova Hollandia, giganteae fere magnitudine.*

viridis. 18. Bl. viridis, antennis thoracisque linea laterali flavis, alis albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 343. n. 11. mant. inf. 1. p. 226. n. 13.*

*Habitat in America.*

brasiliensis. 19. Bl. pallida, abdomine atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 343. n. 12. mant. inf. 1. p. 226. n. 14.*

*Degeer inf. 3. p. 538. n. 3. t. 44. f. 5.* Blatta abdomen nigrum.

*Habitat in Brasilia.*

Petiveriana. 20. Bl. nigra, elytris maculis quatuor flavescens. *Fabr. na. sp. inf. 1. p. 343. n. 13. mant. inf. 1. p. 226. n. 15.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 578. n. 28.* Callida petiveriana.

*Pallas spic. zool. 9. p. 9. t. 1. f. 5.* Blatta heteroclitia.

*Petiv. gaz. t. 71. f. 1.* Cimici affinis niger.

*Seb. mus. 4. t. 95. f. 21.*

*Schroet. Abb. 1. t. 1. f. 7. 8.*

*Sulz. hist. inf. t. 11. f. A. B.*

*Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. t. 49. f. 7.*

*Habitat in India, statura cassidae.*

orientalis. 7. Bl. ferrugineo-fusca immaculata, elytris abbreviatis: fulco oblongo impresso. *Fn. succ. 862.\* Scop. ent. carn. 313. Gron. zooph. 635. 636 Geoffr. inf. par. 1. p. 380. t. 7. f. 5. Fabr. sp. inf. 1. p. 343. n. 14. mant. inf. 1. p. 226. n. 16. Kaln it. 2. p. 406.*

*Degeer inf. 3. p. 530. n. 1. t. 25. f. 1. 2.* Blatta culinaria.

*Frisch inf. 5. t. 3.* Blatta lucifuga f. molendinaria.

*Mouff. inf. 138. f. 2. 3.* Blatta molendinaria.

*Raj. inf. 68. n. 1.* Blatta prima f. mollis Mouffeti.

*Column. ephr. 1. p. 40. t. 36.* Scarabaeus alter testudinatus minor atque alatus.

*Foult. inf. t. 13. f. A.* Grylli.

*Sulz. inf. t. 7. f. 47.*

*hist. inf. t. 8. f. 2.*

*Schaeff. ic. t. 155. f. 6. 7.*

*Sonner. it. t. 12.*

*Habitat in America, hospitatur in Oriente et Europa, a 200 inde annis in Bohemia, a 1739 in Belgio, et antea*

Q99999

in

in Finlandia, et Russia, frequens in farina, pane, abis cibaribus, calceis &c. quae consumit, lucifuga, velocissime currens, a tenthredine magna caerulea infestatur.

Femina aptera larvae similis parit ovum magnitudine dimidia abdominis subcylindricum; carina crenulata.

- cincta. 21. Bl. flavescens, thoracis elytrorumque marginibus albis. *Fabr. mant. inf. I. p. 226. n. 17.*  
*Habitat in America, statura et magnitudine orientalis, corpore fusco, elytris nunc brevior, nunc longior, pedibus albidis.*
- picta. 22. Bl. atra, elytris vitta fanguinea. *Fabr. mant. inf. I. p. 226. n. 18.*  
*Habitat in Brasilia.*
- variegata. 23. Bl. thorace flavescente, elytris testaceis apice nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 344. n. 15. mant. inf. I. p. 226. n. 19.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- lapponica. 8. Bl. flavescens elytris nigro maculatis. *Fn. suec. 863.\* Fabr. sp. inf. I. p. 344. n. 16. mant. inf. I. p. 226. n. 20.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 381. n. 3. Blatta flavescens &c. Degeer inf. 3. p. 533. n. 2. t. 25. f. 8. 9. Blatta nigro-fusca. Sulz. hist. inf. t. 8. f. 3. Schaeff. elem. t. 26. f. 2. icon. t. 88. f. 2. 3.*  
*Habitat in Europa, cibaria consumens, in australioris tamen humidis silvis minus noxia, thorace interdum toto, frequentius margine tantum flavescente.*
- germanica. 9. Bl. livida, corpore flavescente, thorace lineis duabus parallelis nigris. *Fabr. sp. inf. I. p. 344. n. 17. mant. inf. I. p. 226. n. 21.*  
*Pontopp. atl. dan. I. t. 29. Blatta transfuga. Habitat in Europa, Brasilia, insulis oceani australis, magnitudine lapponicae.*
- ruficollis. 24. Bl. thorace ferrugineo, corpore pallido testaceo. *Fabr. mant. inf. I. p. 226. n. 22.*  
*Habitat in India, statura et magnitudine germanicae.*
25. Bl.

---

Blattae lucifugae cum larvis suis rodunt cibaria, coria, putridaque varia, celeri cursu se subtrahentes; fumo lithantracis occid: cum gryllis. Scopoli. An a Seba delineatae fusca mus. 4. t. 85. f. 13. 14. et cinereo-fusca f. 15. 16. propriae species?



- maculata. 25. Bl. thorace nigro: margine albido, elytris pallidis: macula magna apicis nigra. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 501. mant. inf. 1. p. 226. n. 23.*  
*Schreber Naturf. 15. p. 89. t. 3. f. 17. 18.*  
*Habitat in Germaniae pinuetis et ericetis.*
- margina- 26. Bl. nigra thorace rufo albo marginato, elytris nigris: lim-  
 ta. bo albo. *Fabr. sp. inf. 2. app. p. 502. mant. inf. 1. p. 226. n. 24.*  
*Schreber Naturf. 15. p. 88. t. 3. f. 16.*  
*Habitat in Italia, maculata paulo minor.*
- oblonga- 10. Bl. oblonga livida, thorace punctis duobus lunulaque ni-  
 ta, gris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 345. n. 18. mant. inf. 1. p. 226. n. 25.*  
*Degeer inf. 3. p. 541. n. 9. t. 44. f. 11.* Blatta oblonga.  
*Habitat in Surinamo, forma cantharidis.*
- nitidula. 27. Bl. thorace ferrugineo, elytris cyaneis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 345. n. 19. mant. inf. 1. p. 226. n. 26.*  
*Habitat in Surinamo, minuta, nitida.*
- fulca. 28. Bl. fusca immaculata capite, antennis, pedibus, thoracis hemelytrorumque marginibus ferrugineis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. 77.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine americanae, glabra.*
- deusta. 29. Bl. fusca immaculata, capitis hemelytrorumque basibus rufis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 77.*  
*Habitat ad caput bonae spei, germanica paulo major.*
- chloro- 30. Bl. polita ex griseo lutea, elytris subpellucidis virenti-ve-  
 nolis: margine crassiore opaco prasino; margine extimo basique lutescentibus. *Pallas spic. zool. 9. p. 11. t. 1. f. 6.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine et statura fere orientalis.*
- latissima. 31. Bl. fusca punctata, thoracis margine anoque flavis, abdomine subtus nigro, tibiis spinulosis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 184. n. 1. t. 49. f. 2.*  
*Habitat in Surinamo.*
- aterrima. 32. Bl. nigra immaculata, tarsis albis, geniculis fuscis, tibiis spinosis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 185. n. 8. t. 49. f. 9.*  
*Habitat in India.*

- perspicillaris. 33. Bl. flavescens, thorace medio fulvo: margine hyalino. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 186. n. 12. t. 49. f. 11.*  
*Habitat in Marchia, an varietas lapponicae, cui perquam affinis?*
- asiatica. 34. Bl. grisea, oblonga elytris alisque abdomine longioribus apice angustatis. *Pallas it. 3. p. 263.*  
*Habitat in Asia australi, cum mercibus Sinarum in Sibiriam delata, germanica major.*
- Schaefferi. 35. Bl. nigricans, thorace elytrorumque margine flavescente, pedibus luteis: femoribus nigris.  
*Schaeff. ic. t. 158. f. 2.*
- sylvestris. 36. Bl. subtus nigra, antennis nigris, thoracis margine elytrisque testaceis. *Scop. ent. curm. p. 104. n. 314.*  
*Poda mus. graec. p. 50.*  
*Habitat in Carniola.*
- pensylvanica. 37. Bl. fusca, thoracis clypeo albido: medio nigro-fusco, elytris flavo-fuscis anterieus albidis. *Degeer inf. 3. p. 537. n. 2. t. 44. f. 4.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longa.*
- livida. 38. Bl. fusca, corpore subtus pedibusque fulvo-griseis, alis longitudine abdominis. *Degeer inf. 3. p. 538. n. 4. t. 44. f. 6.*  
*Habitat in Surinamo, 8½ lineas longa.*
- rufa. 39. Bl. oblonga rufa, pedibus testaceis, alis abdomine longioribus. *Degeer inf. 3. p. 539. n. 5. t. 44. f. 7.*  
*Habitat in Surinamo, 9 lineas longa.*
- grisea. 40. Bl. oblonga cinereo-grisea: punctis aliquot fuscis minutissimis. *Degeer inf. 3. p. 540 n. 7. t. 44. f. 9.*  
*Habitat in Surinamo, 10½ lineas longa.*
- minutissima. 41. Bl. ovata nigro-fusca, antennis brevioribus, thoracis lateribus alisque hyalinis. *Degeer inf. 3. p. 542. n. 10. t. 44. f. 13. 14.*  
*Habitat in Surinamo, cimicis lectularii magnitudine.*
- aptera. 42. Bl. aptera fusca punctata, abdominis segmentis margine posteriori tibiisque lividis, alis ferrugineis, tibiis spinosis.  
*Mus. Lesk. p. 46. n. 5.*  
*Habitat extra Europam.*

- punctulata. 43. Bl. fusca, thorace punctis elevatis impressisque variegato, alis albis. *Mus. Lesk. p. 46. n. 7.*  
*Habitat extra Europam, statura et facie orientalis, an varietas?*
- ocellata. 44. Bl. brunnea, fronte thoracisque disco macula rubra: posteriori ocellis duobus fuscis varia. abdominis segmentis margine anteriore supra infraque rubris. *Mus. Lesk. p. 46. n. 8.*  
*Habitat extra Europam.*

**PNEUMORA.** Corpus ovatum, inflatum, hyalinum.  
 Caput inflexum, maxillosum.  
 Thorax convexus, subtus carinatus.  
 Elytra deflexa, membranacea.  
 Pedes cursorii.

- immaculata. 1. Pn. elytris immaculatis. *Thunb. act. Stockb. 1775. 3. p. 255. t. 7. f. 1.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 363. n. 10. mant. inf. 1. p. 286. n. 12.*  
 Gryllus (papillofus) viridis, albo maculatus scutello carinato utrinque dentato, abdomine vesiculoso variegato.  
*Habitat ad caput bonae spei, in stoebe cernua, a Septembri ad Novembrem frequens; viridis, elytris aliquando minutissime nigro-punctatis, rarius flavescens aut rubescens, gryllo domestico duplo major.*
- maculata. 2. Pn. elytris viridibus: maculis quadratis albis. *Thunb. act. Stockb. 1775. 3. p. 256, t. 7. f. 2.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 693. n. 4. Mus. Lud. Ulr. 120.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 363. n. 11. mant. inf. 1. p. 236. n. 13.*  
 Gryllus (variolosus) viridis calloso-punctatus abdomine vesiculoso albo variegato.  
*Habitat ad caput bonae spei, in stoebe annua, Novembri et Decembri conspicua, immaculatae magnitudine, tota viridis, albo-maculata.*
- sexguttata. 3. Pn. elytris viridibus: maculis tribus argenteis. *Thunb. act. Stock. 1775. 3. p. 257. n. 3. t. 7. f. 3.*  
*Fabr.*

Q99999 3

Pneumorae quasi totae membrana cava constant, pedes dentatos ad corpus fricando, crepusculo et nocte sonum edunt, lucem emicantem petunt.

*Fabr. sp. inf. I. p. 363. n. 9. mant. inf. I. p. 236. n. II.*  
*Gryllus (inanis) viridis, elytris maculis duabus albis*  
*abdomine vesiculoso: utrinque maculis tribus albis.*  
*Habitat ad caput bonae spei, Decembri conspicua, macu-*  
*lata quadruplo major, viridis.*

220. MANTIS. *Caput nutans, maxillosum, palpis fi-*  
*lififormibus instructum.*

*Antennae fetaceae.*

*Alae 4 membranaceae, conyolutae:*  
*inferiores plicatae.*

*Pedes anteriores compressi, subtus*  
*ferrato-denticulati, armati un-*  
*gue solitario et digito seraceo, la-*  
*terali, articulado.*

*posteriores 4 laeves, gressorii.*

*Thorax linearis, elongatus, angusta-*  
*tus.*

filiformis. 15. *M. corpore filiformi aptero. Fabr. mant. inf. I. p. 227.*  
*n. I. Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 187. n. 5. t.*  
*51. f. 2. 3?*

*Scop. delic. insubr. I. p. 60. t. 24. f. A. 1-3. Plocaria do-*  
*mestica?*

*Habitat in America, India, Italia, fusca, pedibus corpore*  
*longioribus, antennis nigris.*

Gigas. 1. *M. thorace teretiufculo scabro, elytris brevissimis, pedibus*  
*spinosis. Mus. Lud. Ulr. 109.\* Fabr. sp. inf. I. p. 345.*  
*n. I. mant. inf. I. p. 227. n. 2.*

*Marcgr. bras. 251. Arumatia.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 19. f. 9. 10.*

*Bradl. natur. t. 27. f. 6.*

*Petiv. gaz. t. 60. f. 2.*

*Seb. mus. 4. t. 77. f. 1. 2.*

*Habitat in Asia, alis maximis.*

cylindri- 54. *M. thorace cylindrico, pedibus anterioribus thoraci an-*  
*ca. terius annexis, elytris griseis basi subtusque rufis, alis*  
*fuscis albo guttatis. Mus. Lesk. p. 46. n. 12.*

*Habitat*

*Habitat extra Europam, alarum guttis vagis, fenestrais, spina prostrata utrinque ad basin elytrorum abdomen respiciente.*

- phthifica. 2. M. thorace teretiufculo muricato, elytris brevissimis, pedibus inerminibus. *Mus. Lud. Utr. 110.\**  
*Habitat in America australi et India.*
- ficcifolia. 3. M. thorace denticulato, femoribus ovatis membranaceis. *Mus. Lud. Utr. 111.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 347. n. 14. mant. inf. 1. p. 228. n. 16.*  
*Roes. inf. 2. gryll. t. 17. f. 4. 5.*  
*Edw. glean. t. 258.*  
*Merian. surin. t. 66.*  
*Seligm. av. 7. t. 48.*  
*Habitat in America australi et India.*
- gongylo-  
des. 4. M. thorace subciliato, femoribus anterioribus spina terminatis; reliquis lobo. *Mus. Lud. Utr. 112.\** *Gron. zooph. 639.\** *Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 8. mant. inf. 1. p. 227. n. 10.*  
*Amoen. acad. 1. p. 504.* *Gryllus thorace lineari alarum longitudine: margine denticulis ciliato.*  
*Aldr. inf. t. 13. f. 21. Mantis.*  
*Marcgr. bras. 246. Gaayra.*  
*Aët. angl. 301. t. 20. f. 3.*  
*Seb. mus. 4. t. 68. f. 9-12.*  
*Roes. inf. 2. gryll. t. 7.*  
*Sut. hist. inf. t. 8. f. 56.*  
*Aubent. misc. t. 65. f. 2.*  
*Drury inf. 1. t. 56. f. 2.*  
*Habitat in Africa et Asia, capitis vertice subulato bifido, antennis rarius pectinatis.*  
*Larvae pedes lobis membranaceis alati.*
- pauperata. 16. M. thorace lineari spinuloso, femoribus anterioribus spina terminatis; reliquis lobo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 9. mant. inf. 1. p. 227. n. 11.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 61. Mantis thorace apice dilatato spinuloso, femoribus lobo simplici terminatis.*  
*Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. t. 51. f. 1.*  
*Habitat in India, gongyloda minor et angustior.*
- mendica. 17. M. thorace marginato dentato, elytris albo viridique variis: margine albo-punctato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 347. n. 10. mant. inf. 1. p. 228. n. 12.*  
*Habitat Alexandriae.*

- religiosa. 5. *M. thorace laevi subcarinato elytris viridibus immaculatis.* *Scop. ent. carn.* 315.  
*Roef. inf.* 2. *gryll. t.* 1. 2.  
*Seb. mus.* 4. *t.* 67. *f.* 7. 8.  
*Sulz. hist. inf.* 1. *t.* 8. *f.* 4.  
*Schaeff. elem.* 1. 81.  
*Seligm. av.* 1. 4.  
*Habitat in Sibiria, Austria, Africa, tota viridis, an mera varietas oratoriae?*
- oratoria. 6. *M. thorace laevi, elytris viridibus, alis macula nigra anteriorius rufescentibus.* *Mus. Lud. Ulr.* 115.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 348. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 21.  
*Mantis thorace laevi, elytris viridibus immaculatis.*  
*Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 399. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 4. *Mantis.*  
*Mouff. inf.* 118. *f.* 3.  
*Aldr. inf.* 4. *t.* 3. *f.* 10.  
*Seb. mus.* 4. *t.* 67. *f.* 9. 10.  
*Roef. inf.* 2. *gryll. t.* 1. 2.  
*Degeer inf.* 3. *t.* 37. *f.* 2.  
*Habitat in Oriente et australi Europa Francofurtum ad Moenum usque.*
- irrorata. 7. *M. thorace laevi subcarinato, elytris viridibus: punctis ferrugineis vagis.* *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 29. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 348. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 20.  
*Habitat in America meridionali, precariae similis.*
- precaria. 8. *M. thorace subciliato, elytris virefcentibus: ocello ferrugineo.* *Mus. Lud. Ulr.* 114.\* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 349. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 22.  
*Merian. surin.* 1. 66.  
*Seb. mus.* 4. *t.* 67. *f.* 3-6.  
*Degeer inf.* 3. *p.* 406. *n.* 3. *t.* 36. *f.* 4.  
*Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *t.* 50. *f.* 1.  
*Habitat in America et Africa, elytrorum ocello anterieus dimidiato albo, aut toto interdum albo.*
- sancta. 18. *M. viridi-flavescentis, thorace ferrulato, elytris viridibus immaculatis, alis subhyalinis.* *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 23.  
*Habitat in Gallia magis australi, statura oratoriae, at triplo minor.*

- monacha. 19. *M. testacea*, thorace laevi, elytris alisque viridi-hyalinis.  
*Fabr. mant. inf. 1. p. 228. n. 24.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura precariae, at duplo minor.*
- obscura. 20. *M. obscure grisea*, thorace ferrulato, elytris macula ba-  
 ficos, alis apice nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 349. n. 21. mant.*  
*inf. 1. p. 228. n. 25.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura precariae, at minor.*
- hyalina. 21. *M. thorace ciliato*, elytris hyalinis: margine viridi, fronte  
 bidentata. *Fabr. sp. inf. 1. p. 349. n. 22. mant. inf. 1. p.*  
*229. n. 26.*  
*Degeer inf. 3. p. 410. n. 4. t. 37. f. 1.*  
*Habitat in America.*
- fenestrata. 22. *M. thorace laevi*, alis hyalinis, elytrorum margine ex-  
 teriori fusco. *Fabr. sp. inf. 1. p. 349. n. 23. mant. inf.*  
*1. p. 229. n. 27.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura hyalinae.*
- bidens. 23. *M. thorace scabro*, elytris viridibus: fasciis nigris, alis  
 fuscis disco atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 24. mant.*  
*inf. 1. p. 229. n. 28.*  
*Habitat in America.*
- ministra- 24. *M. thorace scabro crenato* longitudine capitis antierius fer-  
 lis. rugineo, elytris viridibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n.*  
*25. mant. inf. 1. p. 229. n. 29.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- urbana. 25. *M. thorace integro*, elytris viridibus: puncto fasciaeque  
 ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 26. mant. inf. 1.*  
*p. 229. n. 30.*  
*Habitat in America australi et India.*
- rustica. 26. *M. thorace laevi fusco*, elytris ala brevioribus fusco-hya-  
 linis, antennis pilosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 27.*  
*mant. inf. 1. p. 229. n. 31.*  
*Habitat ad Patagoniae littora, paganae magnitudine.*

Qqqqqq 5

27. M.

*An forsitan hujus generis insectum a Queronio fusco adhaerens in mari mediterraneo re-  
 pectum in act. paris. extr. 9. p. 329. sub nomine puce de mer arpentense descri-  
 ptum et delineatum? repugnat habitatio in mari.*

- nasuta.** 27. *M. thorace spinoso ciliatoque, fronte porrecta spinosa emarginata.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 229. n. 32.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*
- lobata.** 28. *M. thorace trilobo, capitis fronte cornu bifido, oculis conico-acuminatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 28. mant. inf. 1. p. 229. n. 33.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 62. f. 73. Mantis virefcens, capitis cornu oculisque conico-acuminatis.*  
*Habitat ad caput bonae spei, parva.*
- pulchra.** 29. *M. viridis, thorace integro, alis fusco-hyalinis basi ferrugineis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 229. n. 34.*  
*Habitat Tranquebariae, parva.*
- fausta.** 30. *M. linearis cinereo-fusca immaculata.* *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 63. Fabr. mant. inf. 1. p. 229. n. 35.*  
*Habitat ad caput bonae spei, numen tutelare Hottentottorum.*
- perspicua.** 31. *M. obscura, elytris alisque hyalinis, alis macula marginali apiceque fuscis.* *Fabr. mant. inf. 1. p. 230. n. 36.*  
*Habitat in Cayenna, statura minutae, at paulo major.*
- pagana.** 32. *M. alis reticulatis albis: macula laterali ferruginea, manibus chelatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 29. mant. inf. 1. p. 230. n. 37.*  
*Pall. spic. zool. 9. p. 14. t. 1. f. 8. Mantis Perla.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 916 n. 2. Raphidia (mantispa) pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis thorace brevioribus.*  
*Scop. ent. carn. 712.*  
*Poda inf. 101. t. 1. f. 15.*  
*Habitat in Calabria, Gallia, et Germania.*
- minuta.** 33. *M. thorace cylindrico flavescente, elytris hyalinis: costa virefcente.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 350. n. 30. mant. inf. 1. p. 230. n. 38.*  
*Habitat in America meridionali, et circa Aurelianum.*
- pufilla.** 34. *M. thorace cylindrico flavescente, elytris alisque hyalinis immaculatis.* *Fabr. sp. inf. 1. p. 351. n. 31. mant. inf. 1. p. 230. n. 39.*  
*Pall. spic. zool. 9. p. 15. t. 1. f. 9. Mantis pufilla.*  
*Habitat in Africa, raphidia ophiopsi major.*



- carolina. 9. M. thorace subciliato carinato, elytris albidis fusco nebulosis. *Amoen. acad.* 6. p. 396. n. 28.\*  
*Habitat in Carolina, precariae similis, elytris alisque abdomine brevioribus.*
- pectini-cornis. 10. M. thorace laevi, elytris viridibus, alis oblique striatis, vertice subulato, antennis pectinatis. *Amoen. acad.* 6. p. 396. n. 27.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 347. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 17.  
*Drury inf.* 1. t. 50. f. 1.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. t. 50. f. 2.  
*Habitat in India, australi America, Jamaica.*
- oculata. 35. M. thorace triangulo filiformi, oculis oblongis porrectis acuminato-spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 348. n. 16. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 18.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis, capite pallido, thorace testaceo, elytris alisque albo-hyalinis, pedibus obscuris.*
- superficialis. 36. M. thorace filiformi triangulo anterieus ferrulato, elytris virescentibus, alarum costa transverse striata. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 348. n. 17. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 19.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magna.*
- bicornis. 11. M. thorace laevi, capite bipartito subulato. *Mus. Lud. Ulr.* 116.\*  
*Habitat in America australi et India, pedibus inermibus.*
- tricolor. 12. M. thorace lateribus expanso-lobato, capite cornuto, pedibus anterioribus latissimis. *Mus. Lud. Ulr.* 117.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 347. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 14.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. t. 51. f. 4.  
*Habitat in India, oculis in cornicula auriformia acuta desinentibus.*
- cancelata. 37. M. thorace utrinque dilatato membranaceo plano. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 347. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 15.  
*Habitat in America australi et India.*
- strumaria. 13. M. thorace utrinque membranaceo dilatato obcordato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 347. n. 11. *mant. inf.* 1. p. 228. n. 13.  
*Roes. inf.* 2. gryll. t. 3.  
*Merian. surin.* t. 27.  
*Seb. mus.* 4. t. 69. f. 7. 8.  
*Habitat in America australi et India.*

- necyda- 14. *M. thorace scabro, elytris ovatis angulatis brevissimis, alis*  
 loides. oblongis. *Amoen. acad. 6. p. 397. n. 3. Fabr. sp. inf. 1. p. 345. n. 2. mant. inf. 1. p. 227. n. 3.*  
*Roef. inf. 2. gryll. t. 19.*  
*Degeer inf. 3. t. 36. f. 2.*  
*Habitat in Asia; mas angustior, femina crassior, thorace laevi.*
- atrophica. 38. *M. thorace quadrispinosa, elytris brevissimis basi aristato-*  
 mucronatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 345. n. 3. mant. inf. 1. p. 227. n. 4.*  
*Pall. spicil. zool. 9. t. 1. f. 7.*  
*Habitat in insula Java, capite inermi.*
- spinosa. 39. *M. capite thoraceque spinosis, elytris brevissimis acutis.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 4. mant. inf. 1. p. 227. n. 5.*  
*Habitat in India.*
- bispinosa. 40. *M. thorace teretiufculo anterieus bispinosa, elytris brevif-*  
 finis: margine flavo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 5. mant. inf. 1. p. 227. n. 6.*  
*Habitat in America.*
- jamaicen- 41. *M. linearis viridis, elytris brevissimis: margine exteriori*  
 fis. flavo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 6. mant. inf. 1. p. 227. n. 7.*  
*Drury inf. 2. t. 49. f. 1.*  
*Habitat in Jamaica.*
- lateralis. 42. *M. linearis nigra, elytris brevissimis gibbis: lateribus fla-*  
 vis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 346. n. 7. mant. inf. 1. p. 227. n. 8.*  
*Habitat in Brasilia.*
- linearis. 43. *M. linearis fusca, elytris brevissimis basi subspinosis. Fabr.*  
*mant. inf. 1. p. 227. n. 9.*  
*Habitat in India, antennis filiformibus.*
- labiata. 44. *M. linearis virefcens inermis, capitis lateribus viridibus.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 61.*  
*Habitat in India.*

45. *M.*


---

*An huc omnes species a Seba in thesauri vol. IV. delineatae? tridens t. 68. f. 7. 8. clavata (an varietas gongyloidis?) t. 68. f. 11. 12. parvula t. 68. f. 13-16. tricornis t. 69. f. 1. 2. cubitata t. 69. f. 3. 4. oculoseta t. 69. f. 5. 6. aeruginosa t. 70. f. 7. 8. rubro-maculata t. 70. f. 9. 10. plumbea t. 70. f. 13. 14. nigro-venulata t. 73. f. 6. paradoxa t. 73. f. 9. 10. nigro-punctata t. 75. f. 3. 4. bisubulata t. 75. f. 11. falcataria t. 76. f. 1-4. dentata t. 76. f. 5. 6. pater noster t. 76. f. 7-12. spuria t. 76. f. 13. 14. tessulata t. 78. f. 1-4. foliata t. 80. f. 13. 14. Species huius generis insecta alia venantur; larva puppaque hexapode agili, illa penitus aptera.*

- maculata. 45. *M. cinerea*, thorace alato spinuloso, pedibus intus nigro-maculatis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 61.*  
*Habitat in Japonia, bipollicaris.*
- capensis. 46. *M. cinerea*, thorace inermi, capite conico integro. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 62.* Mantis nasuta.  
*Habitat ad caput bonae spei et in India, sesquipollicaris.*
- parva. 47. *M. livida laevis*, elytris alisque hyalinis; abdominis segmentis nigro-marginatis.  
*Drury inf. 2. p. 75. t. 39. f. 5.*  
*Habitat in America, fere sesquipollicaris.*
- cingulata. 48. *M. thorace subfusco*, elytris viridibus atro-reticulatis: maculis quatuor nigricantibus, alis nigricantibus nigro-lineatis: margine ex fulco flavescente.  
*Drury inf. 2. p. 89. t. 49. f. 2.*  
*Habitat in Jamaica, abdomine nigro-cingulato, apice bispinoso.*
- gigantea. 49. *M. fuscescens*, collo, thorace femoribusque ferratis.  
*Drury inf. 2. p. 89. t. 50.*  
*Habitat in Italia superiori, 8 fere pollices longa.*
- angusta. 50. *M. virescens*, cauda bifurca, antennis longitudine corporis filiformibus. *Drury inf. 1. p. 130. t. 50. f. 3.*  
*Habitat in insula Antigua.*
- fibrica. 51. *M. corpore flavo fuscoque vario*, alis hyalinis: nervulis rufescentibus. *Lepe. h. it. 1. p. 271. t. 17. f. 8.*  
*Habitat in Sibiriae helianthemo et umbellatis; an pusillae varietas?*
- brachy-  
ptera. 52. *M. cinerea*, thorace dentato, alis abdomine dimidio brevioribus. *Pall. it. 2. app. n. 81.*  
*Habitat in desertis aridissimis, etiam salis, ad Irin sitis, rarior in Uralensibus, oratoria major.*
- pennicor-  
nis. 53. *M. verticis spina conica*, antennis pennatis linearibus, femoribus posterioribus lobo terminatis. *Pall. it. 2. app. n. 81.*  
*Habitat rarior in desertis, mari caspio finitimis, australibus, forma et colore gongylodis.*

221. GRYLLUS. *Caput inflexum, maxillosum, palpis filiformibus instructum.*  
*Antennae fetaceae vel filiformes.*  
*Alae quatuor, deflexae, convolutae: inferiores plicatae.*  
*Pedes posteriores saltatorii. Ungues ubique bini.*

\* *antennis ensiformibus, capite conico thorace longiori, Acridae sive Truxalides Fabricii.*

- nasutus. 1. Gr. corpore viridi. *Mus. Lud. Ulr. 118.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 352. n. 1. mant. inf. 1. p. 231. n. 1.*  
*Mouff. inf. 119. Mantis africana.*  
*Roef. inf. 2. gryll. t. 4.*  
*Sulz. inf. t. 8. f. 57.*  
*hist. inf. t. 8. f. 5.*  
*Drury inf. 2. t. 40. f. 1.*  
*Seb. mus. 4. t. 96. f. 41.*
- turritus. β) *Gryllus capite conico, antennis ensiformibus, alis hyalinis.*  
*Syst. nat. X. p. 427.*  
*Seb. mus. 4. t. 80. f. 1. 2.*  
*t. 96. f. 46.*  
*Habitat in omni Africa, in Sicilia, Calabria, ad mare Caspium, ore ad basin, antennis ad apicem capitis positis, thorace non longioribus.*
- conicus. 62. Gr. corpore fusco, elytrorum costa dimidiata viridi, linea punctorum alborum. *Fabr. sp. inf. 1. p. 352. n. 2. mant. 1. p. 231. n. 2.*  
*Habitat in nova Hollandia, nasuto nimis affinis.*
- vittatus. 63. Gr. testaceus, capite prominulo thorace femoribusque vitta laterali argentea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 231. n. 3.*  
*Habitat in Sina, nasuti magnitudine.*
- brevicornis. 2. Gr. viridis, capite prominulo, antennis compressis longitudine thoracis. *Amoen. acad. 6, p. 398. n. 37.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 352. n. 3. mant. inf. 1. p. 231. n. 4.*  
*Degeer inf. 3. p. 499. n. 16. t. 41. f. 7. Acrydium ensicorne.*  
*Habitat in America meridionali.*

64. Gr.

- giganteus. 64. Gr. viridis, vittis duabus rubescentibus, antennis ferrugineis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 191. n. 1. t. 52. f. 6.*  
*Habitat in America, nasuto major.*
- ungaricus. 65. Gr. obscure viridis, pedibus spadiceis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 192. n. 2. t. 52. f. 7.*  
*Habitat in Ungaria.*
- oxycephalus. 66. Gr. capitis apice spatulato, elytris abdomine longioribus: striga longitudinali fulca, alis flavescentibus margine hyalinis. *Pall. it. 1. app. n. 54.*  
*Habitat in desertis Russiae australibus, inter glycyrrhizam vagans, Augusto vulgaris, nasuto perquam similis.*
- foliaceus. 67. Gr. alis flavescentibus, antennis foliaceis.  
*Seb. mus. 4. t. 74. f. 9. 10.*  
*Habitat in Asia.*  
 \*\* *Thorace carinato, antennis filiformibus longiore, palpis aequalibus: Bullae f. Acrydia Fabricii.*
- unicolor. 3. Gr. unicolor, thorace brevissimo, antennis scutello brevioribus. *Mus. Lud. Ulr. 119.\**  
*Habitat in America australi et India flavus aut ruber, varioloso similis, sed thorace non cristato, an hujus tribus?*
- afer. 68. Gr. thoracis scutello plano acuminato abdominis longitudine. *Fabr. mant. inf. 1. p. 230. n. 1.*  
*Habitat in Sierra Leon, niger, bipunctati magnitudine.*
- carinatus. 6. Gr. thorace cymbiformi laevi, vertice depresso. *Mus. Lud. Ulr. 122.\**  
*Habitat in America australi et India; an hujus tribus?*
- bipunctatus. 7. Gr. fuscescens, thoracis scutello longitudine abdominis.  
*Fn. suec. 864.\* Scop. ent. carn. 316. Fabr. sp. inf. 1. p. 351. n. 1. mant. inf. 1. p. 230. n. 2.*

Fn.

*An species a Seba musci vol. IV. delineatae, tapetum persicum t. 74. f. 1. viridimaculatus t. 74. f. 3. pallidissime virens t. 74. f. 4. griseo-rubicundus t. 74. f. 5. nigro-fuscus t. 74. f. 6. nigricans t. 79. f. 5. 6. albo-maculatus t. 80. f. 3. 4. coffens t. 83. f. 6. testaceus t. 83. f. 7. obscure flavus t. 83. f. 8. rufescens t. 83. f. 10. cinereus t. 83. f. 11. nigro-maculatus t. 84. f. 7. purpurascens t. 84. f. 8. nigro-striatus t. 84. f. 9. varicolor t. 84. f. 10. ad hanc tribum referendae?*

- Fn. suec.* 1. n. 623. *Gryllus elytris nullis*, thorace in elytron longitudinale extenso: macula utrinque nigra rhombea.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 394. n. 5 *Acrydium elytris nullis*, thorace producto, abdomine aequali.  
*Degeer inf.* 1. p. 483. n. 11. t. 23. f. 15. *Acrydium scutellatum*.  
*Raj. inf.* 60. *Locusta minor fuscifcens*, cucullo longo rhomboideo.  
*Sulz. hist. inf.* t. 8. f. 6.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. t. 52. f. 1.  
**fstriatus.** β) *Gryllus linea albida a fronte per medium scutellum percurrente.* *Lepech. it.* 2. p. 211. t. 10. f. 17.  
*Habitat in Europae collibus arenosis apricis.*
- subulatus.** 8. *Gr. thoracis scutello abdomine longiore.* *Fn. suec.* 865.\*  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 351. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 230. n. 3.  
*Degeer inf.* 3. p. 484. n. 12. t. 23. f. 17.  
*Fn. suec.* 624. *Gryllus elytris nullis*, thorace producto abdomine longiore.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 395. n. 6. *Acrydium elytris nullis*, thorace producto abdomine longiore.  
*Sulz. hist. inf.* t. 8. f. 7.  
*Schaeff. ic.* t. 154. f. 9. 10. t. 161. f. 2. 3.  
*Habitat in Europa ad fossas et aquas stagnantes, bipunctato valde affinis, nunc griseus, nunc fuscus.*
- opacus.** 69. *Gr. spadiceus aut niger*, thorace carinato ad latera sinuato abdominis longitudine. *Herbst aud Fueßli arch. inf.* 8. p. 190. n. 3. t. 52. f. 2.  
*Habitat Berolini in fossis sabulosis, statura bipunctati, at minor.*
- bifasciatus.** 70. *Gr. fuscus albo-maculatus: fasciis duabus lateralibus ochroleucis.* *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. p. 190. n. 4. t. 52. f. 3.  
*Habitat Berolini in arenosis, statura et magnitudine opaci.*
- bimaculatus.** 71. *Gr. thorace fusco: utrinque lunula ochroleuca.* *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. p. 190. n. 5. t. 52. f. 4.  
*Habitat Berolini, statura et magnitudine subulati.*
- granulatus.** 72. *Gr. ex griseo viridi nigricanteque varius punctis elevatis asper ad latera complanatus, thorace tubovali gibbo.* *Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. p. 198. n. 6. t. 52. f. 5.

leucostictos. 219. Gr. fuscus, thoracis scutellique dorso elevato pallido, scutello utrinque basi macula alba. *Mus. Lesk. p. 46. n. 16. b.*  
*Habitat in Europa.*

griseus. 220. Gr. griseus scutello basi et pone laminam alarum utrinque puncto nigro. *Mus. Lesk. p. 47. n. 16. c.*  
*Habitat in Europa.*

binotatus. 221. Gr. griseus, scutello versus apicem laminae alarum macula utrinque ferruginea. *Mus. Lesk. p. 47. n. 16. d.*  
*Habitat in Europa.*

\*\*\* *antennis setaceis, palpis inaequalibus, thorace rotundato cauda, bifida: Achetæ.*

Gryllotalpa. 10. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus anterioribus palmatis tomentosis. *Mus. Lud. Ulr. 123.\* Fn. suec. 866.*  
*Scop. ent. carn. 317. Geoffr. inf. par. 1. p. 387. n. 1.*  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 353. n. 1. mant. inf. 1. p. 231, n. 1.*  
*Degeer inf. 3. p. 517. n. 2. Gryllus supra sulcus, subtus ferrugineo-flavus &c.*

*Raj. inf. 64. Jonsf. inf. t. 12. f. ult. Gryllotalpa.*

*Mouff. inf. 104.*

*Aldr. inf. 571.*

*Welsch hecast. 1. p. 39.*

*Goed. inf. 1. t. 76.*

*Barthol. act. Hafn. 4. p. 5. f. 1-6.*

*Blanck. herb. t. 81. f. 10.*

*Imperat. nat. 921. f. 2.*

*Frisch inf. 11. t. 5.*

*Seb. mus. 4. t. 89. f. 3. 4.*

*Roes. inf. 2. gryll. t. 14. 15.*

*Catesb. Carol. 1. t. 8.*

*Sulz. inf. t. 9. f. 59.*

*Schaeff. ic. t. 37. f. 1.*

*Habitat in Europæ, borealis Americæ et Asiæ, ipsius Javæ (minor tamen) cutis, hortorum pestis, fimo equino allicienda, porcino pellenda.*

monstruosus. 73. Gr. elytris alisque caudato-convolutis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 353. n. 2. mant. inf. 1. p. 231. n. 2.*  
*Drury inf. 2. t. 43. f. 1.*  
*Habitat in India.*

minutus. 11. Gr. flavescens, alis caudatis, tibiis posterioribus trispinosis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 355. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 232. n. 14.  
*Degeer inf.* 3. p. 524. n. 8. t. 43. f. 8. Gryllus testaceus.  
*Habitat in America meridionali, semipollicaris, statura domestici, subtus fuscus.*

domestici. 12. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glauco. *Fn. suec.* 868. *Scop. ent. carn.* 318.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 353. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 389. n. 2. Gryllus pedibus anticis simplicibus.  
*Degeer inf.* 3. p. 509. n. 1. t. 24. f. 1. 2. Gryllus griseotuficus pallidus &c.  
*Raj. inf.* 63. *Monff. inf.* 135. Gryllus domesticus.  
*Fonst. inf.* t. 12.  
*Hufn. inf.* 11. f. 4.  
*Seb. mus.* 4. t. 65. f. 24.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 12.

*Hospitatur hodie in Europae muris domesticis, in Guinea sextuplo major, tota nocte, praesertim pluvia ingruente stridens, caloris fornacum amans, sanie et liquore carniū vescens, blattis, ut fertur, non cohabitans, pilulis ex arsenico et dauci recente radice farinae tritici immixtis, aut nymphaeae radicibus lacti incoctis, ut perhibent, necandus, a campestri, si inquilinum se reddiderit, pellendus.*

affimilis. 74. Gr. alis caudatis elytro longioribus, abdomine stilis duobus apice fissis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 344. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 4.

*Habitat in insulis Americae meridionali oppositis.*

reticulatus. 75. Gr. niger, elytris rufo-reticulatis, antennis albo-annulatis.  
*Fabr. sp. inf.* 1. p. 354. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 5.  
*Habitat ad caput bonae spei, antennis corpore duplo longioribus.*

76. Gr.

---

Grylli, si primum tribum exceperis, quae aliis insectis victitant, plantis vescuntur, achetae potissimum radicibus tettigoniae et locustae foliis; larva et puppa omnium hexapus, agilis, imagini similima, illa aptera; sub terra saepe habitans, haec non raro cum imagine vorans; paucis speciebus elytra aut alae nullae, et tunc interdum modo feminis; in paucis ocellus elytrorum vitreus stridoris est instrumentum; japonicae oryzam infestant.



- brasiliensis. 76. Gr. fuscus, alis caudatis elytris longioribus, dorso pallidior, cauda ascendente longitudine corporis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 354. n. 6. mant. inf. 1. p. 231. n. 6.*  
*Habitat in Brasilia.*
- orientalis. 77. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis, corpore atro, capite pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 354. n. 7. mant. inf. 1. p. 232. n. 7.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- capensis. 78. Gr. niger, alis caudatis elytris longioribus, elytris fuscis basi flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 354. n. 8. mant. inf. 1. p. 232. n. 8.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- Morio. 79. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis apice nigris, corpore atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 354. n. 9. mant. inf. 1. p. 232. n. 9.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura et magnitudine campestris.*
- campestris. 13. Gr. alis elythro brevioribus, corpore nigro: stylo lineari. *Mus. Lud. Ulr. 124. Scop. ent. carn. 319. Fabr. sp. inf. 1. p. 355. n. 10. mant. inf. 1. p. 232. n. 10.*  
*Raj. inf. 63. Gryllus campestris Mouffeti.*  
*Frisch inf. 1. t. 1.*  
*Seb. mus. 4. t. 65. f. 23. et t. 96. f. 24.*  
*Schaeff. elem. t. 66.*  
*icon. t. 157. f. 2-4.*  
*Habitat in Europa magis australi, a primo Maji die ad aequinoctium usque stridens.*
- umbraculatus. 14. Gr. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis deflexo. *Habitat in Mauritania, facie campestris, at capite magis ferrugineo, et membrana obovata ante caput deflexa distinctus.*
- convolutus. 15. Gr. corpore nigro nebuloso, elytris convolutis albidis. *Amoen. acad. 6. p. 399. n. 38.\**  
*Habitat in Surinamo.*
- hospes. 80. Gr. alis caudatis elythro longioribus albis: costa fusca, elytris nigris albo maculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 355. n. 11. mant. inf. 1. p. 232. n. 11.*  
*Habitat in America.*

- Crucis. 81. Gr. fuscus, alis caudatis elytro longioribus, elytrorum margine flavo nigro-punctato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 232. n. 12.*  
*Habitat in insula S. Crucis, statura campestris.*
- Allioni. 82. Gr. capite thoraceque flavescens, elytris aqueis longitudine alae. *Fabr. sp. inf. 1. p. 355. n. 12. mant. inf. 1. p. 232. n. 13.*  
*Habitat in Italia, parvus.*
- gryllodes. 83. Gr. griseus, thorace depresso, abdomine fuscescente elytris paulo brevioribus, alis elytris longioribus reticulatis griseo-hyalinis. *Pall. spic. zool. 9. p. 16. t. 1. f. 10.*  
*Habitat in Jamaica, habitu ferre domestici, sed gracilior et longior; an huc spectat?*
- binotatus. 84. Gr. niger, elytrorum basi maculis binis flavis, antennis corpore brevioribus. *Degeer inf. 3. p. 338. n. 4. t. 43. f. 4.*  
*Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. t. 53. f. 1. Acheta bimaculatus*  
*Habitat in Europa.*
- pellucens. 85. Gr. albidus, thorace trapeziformi. *Scop. ent. carn. 324. delic. insubr. 1. p. 65. t. 24. f. E.*  
*Habitat in Carnioliae et Italiae vineis et hortis semipollicaris, aestate tota fere nocte stridens, habitu domestici, at duplo major, capite lucido, thoracis maculis tribus fuscis, elytris flavescens distinctus.*
- Gigas. 86. Gr. badius.  
*Sulz. hist. inf. p. 83. t. 8. f. 8.*  
*Habitat in America, domestico dimidio major.*
- tessellatus. 87. Gr. ex fusco testaceus, alis albo nigroque tessellatis.  
*Drury inf. 2. p. 80. t. 42. f. 3.*  
*Habitat in insula S. Johanna.*
- membranaceus. 88. Gr. pallide testaceus, thorace collari flavescens, alis ochraceis caudatis. *Drury inf. 2. p. 81. t. 43. f. 2.*  
*Habitat - - -*
- desertus. 89. Gr. alis caudatis elytro longioribus, corpore nigro. *Pall. it. 1. app. n. 53.*  
*Habitat terrestris in desertis australibus Uralensibus, domestico affinis.*

- furina- 90. Gr. griseo-fuscus, thorace plano, elytris macula oblonga  
menfis. nigra, pedibus posterioribus corpore duplo longioribus.  
*Degeer inf. 3. p. 519. n. 1. t. 43. f. 1.*  
*Habitat in Surinamo.*
- muticus. 91. Gr. capite elytrisque badiis, pedibus testaceis, cauda fe-  
minae mutica. *Degeer inf. 3. p. 520. n. 2. t. 43. f. 2.*  
*Habitat in Surinamo.*
- ater. 92. Gr. ex nigro fuscus, cauda feminae mutica. *Degeer inf. 3.*  
*p. 520. n. 3. t. 43. f. 3.*  
*Habitat in Surinamo.*
- fasciatus. 93. Gr. fuscus, thorace elytrisque lineis longitudinalibus ful-  
vis. *Degeer inf. 3. p. 522. n. 5. t. 43. f. 5.*  
*Habitat in Pennsylvania.*
- niveus. 94. Gr. albidus, elytris alisque niveis, thorace elongato, an-  
tennis femoribusque posterioribus longissimis. *Degeer*  
*inf. 3. p. 522. n. 6. t. 43. f. 6.*  
*Habitat in Pennsylvania.*
- punctula- 95. Gr. ex griseo fuscus, elytris hyalinis: puncto fusco, alis  
tus. earneis antennisque longissimis, thorace elongato. *De-*  
*geer inf. 3. p. 523. n. 7. t. 43. f. 7.*  
*Habitat in Pennsylvania.*
- \*\*\*\* *antennis setaceis, palpis inaequalibus, cauda femi-*  
*nis ensifera, Tettigoniae, Fabricia Locustae.*
- citrifoli- 16. Gr. thorace tetragono angulis scabro. *Mus. Lud. Ulr. 125.*  
us. *Gron. zooph. 657.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 356. n. 1. mant. inf. 1. p. 232. n. 1. Lo-*  
*custa thorace tetragono, angulis crenatis.*  
*Degeer inf. 3. p. 437. n. 7. t. 37. f. 3. Locusta viridis.*  
*Roef. inf. 2. gryll. t. 16. f. 1.*  
*Habitat in America australi et India.*
- laurifoli- 17. Gr. thorace subtetragono laevi trilobo, alis lanceolatis ely-  
lius. tro obtusiore longioribus. *Mus. Lud. Ulr. 126.\** *Fabr.*  
*sp. inf. 4. p. 356. n. 2. mant. inf. 1. p. 232. n. 2.*  
*Degeer inf. 3. p. 445. n. 6. t. 38. f. 2. Locusta oblongifolia.*  
*Sloan. jam. 2. p. 101. t. 236. f. 1. Locusta maxima viridis,*  
*alis latissimis.*  
*Marcgr. bras. 246. Tucurubi.*  
*Habitat in America, nova Hollandia.*

- myrtifolius. 18. Gr. thorace subtetragono laevi, alis deflexis elythro longioribus, tibiis muticis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 356. n. 3. *mant. inf.* I. p. 232. n. 3. *Locusta* thorace subtetragono laevi, alis deflexis elythro longioribus, ense brevissimo recurvo. *Degeer inf.* 3. p. 447. n. 8. t. 38. f. 4. *Locusta* viridis, pedibus testaceis, thorace tetragono plano, elytris ovatis ala acuminata brevioribus. *Drury inf.* 2. t. 41. f. 2. *Habitat in America meridionali, laurifolio quadruplo minor.*
- camillifolius. 96. Gr. thorace deflexo, elytris concavis apice rotundatis alae longioribus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 356. n. 4. *mant. inf.* I. p. 232. n. 4. *Degeer inf.* 3. p. 438. n. 2. t. 37. f. 5. *Locusta* ficeifolia. *Habitat in America.*
- thymifolius. 97. Gr. thorace tetragono laevi, elytris sublinearibus fuscopunctatis, alis brevioribus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 357. n. 5. *mant. inf.* I. p. 233. n. 5. *Habitat in nova Hollandia, nunc viridis, nunc ferrugineus.*
- graminifolius. 98. Gr. thorace tetragono, elytris filiformibus fuscis ala brevioribus, capite acuminato. *Fabr. sp. inf.* I. p. 357. n. 6. *mant. inf.* I. p. 233. n. 6. *Habitat ad caput bonae spei.*
- specularis. 99. Gr. thorace deflexo, elytris concavis viridibus: basi ocellodorsali vitreo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 357. n. 7. *mant. inf.* I. p. 233. n. 7. *Habitat in America.*
- australis. 100. Gr. virefcens, thorace rotundato, elytris alis aequalibus, pedibus anterioribus spinosissimis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 233. n. 8. *Habitat in insula Amsterdam, spinipedi affinis, at major.*
- spinipes. 101. Gr. thorace rotundato, elytris viridi-hyalinis ala brevioribus, pedibus anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 357. n. 8. *mant. inf.* I. p. 233. n. 9. *Habitat in Brasilia.*
- maxillofolius. 102. Gr. viridis, antennis maxillisque flavis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 357. n. 9. *mant. inf.* I. p. 233. n. 10. *Habitat in insulis Americae oppositis.*

- conocephalus. 19. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis ala brevioribus, tibiis muticis, capite conico obtuso. *Fabr. sp. inf. 1. p. 358. n. 15. mant. inf. 1. p. 234. n. 18.*  
*Habitat in Africa, viridis, magnitudine domestici.* Brünniche.
- elongatus. 20. Gr. thorace subquadrato laevi, elytris alisque griseis corpore longioribus. *Mus. Lud. Ulr. 127.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 10. mant. inf. 1. p. 233. n. 11.*  
*Rocf. inf. 2. gryll. t. 18. f. 7.*  
*Habitat in India.*
- femoratus. 103. Gr. thorace scabro griseo, alis lanceolatis elythro obtusiore longioribus, femoribus subtus membranaceis dentatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 233. n. 12.*  
*Habitat Tranquebariae, statura et magnitudine elongati.*
- lamellosus. 21. Gr. thorace subquadrato, foliolis ovatis ante femora posteriora. *Mus. Lud. Ulr. 128.\**  
*Habitat in America australi et India, magnus.*
- ocellatus. 22. Gr. thorace rotundato, alis ocello notatis. *Mus. Lud. Ulr. 129.\* Gron. zooph. 649.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 12. mant. inf. 1. p. 233. n. 14.*  
*Seb. mus. 4. t. 73. f. 7. 8.*  
*Habitat in America australi et India.*
- lanceolatus. 104. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis alae aequalibus, fronte porrecta lanceolata subtus unidentata. *Fabr. sp. inf. 1. p. 357. n. 13. mant. inf. 1. p. 233. n. 15.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- pallens. 105. Gr. albidus, thorace laevi, alis lanceolatis elytris longioribus. *Fabr. mant. inf. 1. p. 234. n. 16.*  
*Habitat in Cayenna, parvus, tener.*
- acuminatus. 23. Gr. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescentibus longitudine corporis. *Mus. Lud. Ulr. 130.\* Gron. zooph. 650.\* Fabr. sp. inf. 1. p. 358. n. 14. mant. inf. 1. p. 234. n. 17.*  
*Degeer inf. 3. p. 443. n. 4. t. 37. f. 8.* *Locusta acuminata.*  
*Sloan. jam. 2. p. 202. t. 236. f. 3.*  
*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 1.*  
*Habitat in America meridionali.*
- triops. 24. Gr. thorace rotundato, vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Mus. Lud. Ulr. 131.\**  
*Fabr.*

2066 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. (*Tettigonia*.) *Locusta*.

*Fabr. sp. inf. 1. p. 358. n. 16. mant. inf. 1. p. 234. n. 19.*  
*Locusta vertice acuminato subtus puncto ocellari nigro,*  
*elytris alae aequalibus.*

*Habitat in America australi et India, abdomine brevi, en-*  
*sem non superante.*

rugosus, 25. Gr. thorace rotundato rugoso cristato, capite acuminato,  
 femoribus posterioribus subtus repandis. *Mus. Lud.*  
*Ulr. 132.\**

*Habitat in America australi et India, cristâ compressa cre-*  
*nata versus apicem thoracis.*

corona- 26. Gr. thorace spinis erectis coronato, elytris varioloso-con-  
 tus. cavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 358. n. 17. mant. inf. 1. p. 234.*  
*n. 20.*

*Degeer inf. 3. p. 448. n. 9. t. 38. f. 5. Locusta coronata.*

*Habitat in America australi et India, antennis corpore tri-*  
*plo longioribus, ense lanceolato longo.*

aquilinus. 27. Gr. thorace rotundato subverrucoso, alis latissimis: nervis  
 quindecim. *Mus. Lud. Ulr. 133.\**

*Habitat in America australi et India, magnus, elytris lan-*  
*ceolatis, tibiis quadrifariam spinosis.*

melano- 28. Gr. thorace rotundato laevi, elytris abdomine dimidio bre-  
 pterus. vioribus, alis nigris. *Mus. Lud. Ulr. 134.\* Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 358. n. 18. mant. inf. 1. p. 234. n. 21.*

*Habitat in America australi et India, elytris ovatis.*

fastigia- 29. Gr. thorace rotundato laevi, elytris ovatis, alis truncatis,  
 tus. spinis tibiaram filiformibus. *Mus. Lud. Ulr. 135.\**

*Habitat in America australi et India.*

coriaceus. 30. Gr. thorace rotundato laevi, elytris coriaceis, alis pallidis,  
 antennis longissimis. *Mus. Lud. Ulr. 136.\* Fabr. sp.*  
*inf. 1. p. 358. n. 19. mant. inf. 1. p. 234. n. 22.*

*Habitat in America australi et India, magnus, colore flavo*  
*corii, femoribus teretibus.*

albifrons, 106. Gr. thorace posteriorius rotundato laevi, elytris cinereo ni-  
 groque variis, capite pallido, ense apice ferrato. *Fabr.*  
*sp. inf. 1. p. 359. n. 20. mant. inf. 1. p. 234. n. 23.*

*Habitat in insula Madera.*

- falx. 107. Gr. fuscus, thorace laevi posterius rotundato, capite pallido, ense falcato atro. *Fabr. sp. inf. I. p. 359. n. 21. mant. inf. I. p. 234. n. 24.*  
*Habitat in insula Madera.*
- griseus. 108. Gr. fuscus, thorace posterius carinato rotundato, ense falcato atro basi utrinque pallido. *Fabr. sp. inf. I. p. 359. n. 22. mant. inf. I. p. 234. n. 25.*  
*Habitat in Italia, antennis flavescens longitudine corporis, pedibus virescentibus, elytris fusco cinereoque variis.*
- viridissimus. 31. Gr. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis, antennis longissimis. *Fn. suec. 869.\* Scop. ent. carn. 320. Fabr. sp. inf. I. p. 359. n. 23. mant. inf. I. p. 234. n. 26. Geoffr. inf. par. I. p. 397. n. 2. t. 8. f. 3. Locusta cauda ensifera recta.*  
*Degeer inf. 3. p. 428. Locusta viridis cantatrix. List. goed. 301. t. 121. Agrigoneus. Goed. inf. 2. p. 165. t. 40. Zinann. obs. t. 7. f. 7. Robert. ic. t. 27. Frisch inf. 12. t. 2. f. I. 2. Roef. inf. 2. gryll. t. 10. II. Schaeff. elem. t. 79. icon. t. 139. f. 3-5.*  
*Habitat in Europae arboribus, graminosis, agris hordeaceis, sub canicula noctu stridulus, totus viridis.*
- cinerarius. 32. Gr. antennis longissimis, elytris deflexis verticalibus. *Amoen. acad. 6. p. 397. n. 31.\**  
*Habitat in Brasilia.*
- verrucivorus. 34. Gr. thorace subquadrato laevi, alis viridibus fusco-maculatis, antennis setaceis longitudine corporis. *Fn. suec. 870.\* Scop. ent. carn. 321.*  
*It. wgoth. 253. Gryllus cauda ensifera recta, corpore subviridi. Fabr. sp. inf. I. p. 359. n. 24. mant. inf. I. p. 234. n. 27. Locusta alis viridibus fusco maculatis, antennis longitudine corporis. Geoffr. inf. par. I. p. 398. n. 1. Locusta cauda ensifera curva. Degeer inf. 3. p. 430. n. 2. t. 21. f. 1. 2. Locusta verrucivora. Raj. inf. 61. Locusta viridis major. Frisch inf. 12. t. 2. f. I. 2. Locusta major viridis. Mouff. inf. 117. f. 5.*

*Rob. ic. t. 27.*

*Fonst. inf. t. II. f. 1-3.*

*Merian. inf. t. 176.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 8.*

*Sulz. inf. t. 9. f. 61.*

*Schaeff. ic. t. 62. f. 5.*

*Habitat in Europa, e murino fuscescens, a rusticis Suecis manuum verrucis admotus, quas praemordet, et liquorem in vulnus evomendo, ut contabescat, efficit.*

varius. 109. Gr thorace viridi flavo lineato, fronte acuminata, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 360. n. 25. mant. inf. 1. p. 234. n. 28.*

*Degeer inf. 3. p. 433. n. 3. Locusta thalassina.*

*Goed. inf. 2. p. 142. t. 40.*

*Frisch inf. 12. t. 2. f. 4.*

*Sulz. hist. inf. t. 8. f. 9.*

*Habitat in Lipsiae hortis, viridissimo affinis, at quadruplo minor.*

brachypterus. 110. Gr. griseo-fuscus, clytris alisque corpore dimidio brevioribus. *Fn. suec. 868. Fabr. sp. inf. 1. p. 360. n. 26. mant. inf. 1. p. 234. n. 29.*

*Degeer inf. 3. p. 434. n. 4. t. 22. f. 2. 3. Locusta brachyptera.*

*Habitat in Europae borealis graminosis, ense elongato recurvo.*

Papus. 34. Gr. apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. *Amoen. acad. 1. p. 322. Fabr. sp. inf. 1. p. 360. n. 27. mant. inf. 1. p. 234. n. 30.*

*Degeer inf. 3. p. 453. n. 13. t. 39. f. 5. Locusta Papa spinosa.*

*Pet. gazoph. t. 13. f. 7. Locusta talpa capensis pedibus longis.*

*Kundm. promptuar. 118. n. A. 184.*

*Roef. inf. 2. gryll. t. 6. f. 3.*

*Habitat in Aethiopia, scutello magno rotundato spinis ciliato, femoribus posterioribus subtus quadridentatis.*

spinulosus. 59. Gr. thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero. *Fabr. sp. inf. 1. p. 361. n. 28. mant. inf. 1. p. 234. n. 31. Edw. glean. 2. p. 161. t. 285. f. 3-5.*

*Habitat in America australi et India, ense recurvo, abdomine nigro: maculis testaceis.*



- Onos. 111. Gr. thorace laevi nigro: lateribus griseis, corpore aptero.  
*Pall. spic. zool. 9. p. 18. t. 2. f. 1. Fabr. sp. inf. 1. p. 361. n. 29. mant. inf. 1. p. 234. n. 32.*  
*Petiv. gazoph. t. 39. f. 9?* *Locusta echinata impennis* e  
 Chulan.  
*Habitat in Sibiria, ense longitudine abdominis.*
- ephippi- 112. Gr. thorace posterius elevato, elytris brevissimis fornicatis.  
 ger. *Fiubig Schr. der naturf. berl. Ges. 5. t. 3. f. 6-8. Fabr. mant. inf. 1. p. 235. n. 33.*  
*Habitat in Europae magis australis pratis, magnus.*
- dubius. 113. Gr. thorace laevi posterius rotundato, elytris brevissimis  
 apice capiteque albidis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 235. n. 34.*  
*Habitat in Italia, statura ephippigeri.*
- Laxman- 114. Gr. thorace posterius marginato dentato, ense recurvo  
 ni. apice deflexo, femina aptera. *Pall. it. 1. app. n. 52. spic. zool. 9. p. 20. t. 2. f. 2. 3. Fabr. sp. inf. 1. p. 361. n. 30. mant. inf. 1. p. 235. n. 35.*  
*Habitat in Sibiria.*
- glaber. 115. Gr. fuscus, thorace subdepresso laevissimo, elytris medio  
 viridibus fusco maculatis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 193. n. 6.*  
*Schaeff. ic. t. 62. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania verrucivoro affinis.*
- indicus. 116. Gr. viridis, fronte obtuse conica, thorace anterior et  
 posterius elevato, medio excavato, abdomine alisque fuscis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 8. p. 193. n. 7. t. 53. f. 2.*  
*Habitat in India, ephippigero affinis.*
- leucostictos. 117. Gr. fusco-testaceus, elytris margine maculisque flavis,  
 femoribus in junctura puncto albißimo notatis.  
*Roefel inf. 2. gryll. p. 128. t. 20. f. 8-10.*  
*Habitat in Germania, femina virescens.*
- palpatus. 118. Gr. apterus fusco testaceus, palpis anterioribus pedibusque  
 posterioribus longissimis.  
*Sulz. hist. inf. p. 83. t. 9. f. 2.*  
*Habitat in Sicilia.*
- cantans. 119. Gr. thorace rotundato maculato, elytris rotundatis: macula  
 bateos rotunda hyalina antennis longissimis. *Fueßli inf. belv. p. 23. n. 439. f. 5. a. 5. b.*

Müll. zool. dan. prodr. p. 101. n. 1144? *Locusta viridis*.  
*Habitat in Europa, viridissimo affinis, at paulo minor, ely-*  
*tris brevioribus.*

falcatus. 120. Gr. elytris viridibus ala brevioribus, antennis longissimis  
 ente inflexo ferrugineo quadruplici. *Scop. ent. carn. p.*  
*108. n. 322.*

*Fuessli inf. helv. p. 23. n. 440.*

*Lepechin it. 1. p. 79. d.*

*Poda mus. graec. p. 52.*

*Schaeff. ic. t. 138. f. 1-3.*

*Habitat in Germania, Helvetia, Sibiria.*

Pedo. 121. Gr. gracilis mollis, pedibus posterioribus longioribus gra-  
 cillimis. *Pall. it. 1. app. n. 51.*  
*Habitat in Sibiria.*

flavescens. 122. Gr. flavescens, elytris rubescentibus atro reticulatis, en-  
 se ex flavo atro.

*Schaeff. ic. t. 91. f. 6.*

*Habitat in Germania, statura verrucivori, oculis caeruleis,*  
*ense adscendente.*

bipustula- 123. Gr. fuscus, ense thoracisque punctis binis atris, elytris  
 tus. subflavescentibus atro tessulatis ala brevioribus.

*Schaeff. ic. t. 138. f. 4. 5.*

*Habitat in Germania.*

margina- 124. Gr. viridis variegatus, thoracis margine flavo.  
 tus. *Schaeff. ic. t. 236. f. 1-4.*

*Habitat in Germania, statura verrucivori.*

rubicun- 125. Gr. capite femoribusque rubicundis atro-squamatis.  
 dus. *Schaeff. ic. t. 242. f. 5. 6.*

β) *Schaeff. ic. t. 249. f. 1. 2.*

*Habitat in Germania, statura verrucivori.*

rufipes. 126. Gr. viridis, ense femorumque nodulis fuscis, pedibus  
 rubris.

*Schaeff. ic. t. 255. f. 1. 2.*

*Habitat in Germania.*

luteus. 127. Gr. luteus, alis intime viridescentibus, ense aterrimo.  
*Schaeff. ic. t. 258. f. 1. 2.*

*Habitat in Germania.*

128. Gr.

- cinereus. 128. Gr. griseus, capite thoraceque fasciis duabus nigris, femina aptera.  
*Degeer inf. 3. p. 436. n. 5. Locusta griseo-aptera.*  
*Habitat in Suecia, brachyptero major, antennis longissimis.*
- cornutus. 129. Gr. viridis, thorace rotundato, capitis vertice cornuto rugoso, femoribus spinosissimis, antennis testaceis elytro brevioribus. *Degeer inf. 3. p. 441. n. 3. t. 37. f. 7.*  
*Habitat in Surinamo, 3 lineas ultra 2 pollices longus.*
- tuberculatus. 130. Gr. thorace planiusculo, vertice tuberculato laevi, elytris elongatis angustis, antennis testaceis longitudine elytrorum. *Degeer inf. 3. p. 444. n. 5. t. 38. f. 1.*  
*Habitat in Surinamo, viridis, acuminato minor.*
- curvicaudus. 131. Gr. totus viridis, thorace tetragono plano, elytris elongatis ala brevioribus, pedibus posterioribus longissimis. *Degeer inf. 3. p. 446. n. 7. t. 38. f. 3.*  
*Habitat in Pennsylvaniae pratis, laurifolio paulo minor.*
- vulturinus. 132. Gr. thorace angulato laevi, femoribus anterioribus muticis, fronte macula abdomineque subtus fascia nigris, antennis corpore triplo longioribus. *Degeer inf. 3. p. 451. n. 11. t. 39. f. 2.*  
*Habitat in Surinamo, vix 2 pollices longus.*
- falconarius. 133. Gr. thorace rotundato, femoribus teretibus longis: intermediis muticis, elytris lanceolatis, antennis longissimis. *Degeer inf. 3. p. 452. n. 12. t. 39. f. 4.*  
*Habitat in Surinamo, ultra 2 pollices longus.*
- capitatus. 134. Gr. capite magno, thorace plano laevi: fasciis binis longitudinalibus nigris, elytris longitudine abdominis. *Degeer inf. 3. p. 455. n. 14. t. 40. f. 1.*  
*Habitat - - - sesquipollicaris.*
- spini-frons. 135. Gr. thorace planiusculo laevi, vertice spinoso, fronte nigra, corpore rufo fusco, elytris viridi-purpureis pallidis. *Degeer inf. 3. p. 456. n. 15. t. 40. f. 2.*  
*Habitat in Surinamo, pollicem longus.*
- agilis. 136. Gr. griseo-viridis, abdomine fusco, thorace planiusculo, pedibus posterioribus antennisque longissimis, alis elytro longioribus. *Degeer inf. 3. p. 457. n. 16. t. 40. f. 3.*  
*Habitat in Pennsylvania, vix pollicem longus.*

- fasciatus. 137. Gr. viridis, abdomine fasciis sulphureis fuscisque, thorace planiusculo, alis elytro longioribus, pedibus posterioribus longissimis. *Degeer inf.* 3. p. 458. n. 17. t. 40. f. 4. *Habitat in Pennsylvania, 9 modo lineas longus.* \*)
- teres. 138. Gr. ex flavo lividus, oculis maximis, alis elytro longioribus, pedibus anterioribus spinosissimis. *Degeer inf.* 3. p. 458. n. 18. t. 40. f. 5. *Habitat in Surinamo, 7 modo lineas longus.*
- muticus. 222. Gr. thorace oblongo-quadrato marginato, femoribus tibiisque bifariam spinosis, ense laevi adscendente longitudine fere abdominis. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 22. *Habitat extra Europam.*
- macro- 223. Gr. thorace rotundato alis albidis fusco lineatis elytra pal-  
pterus. lide immaculata superantibus, abdomine filis quatuor terminato, femoribus posterioribus subtus tibiisque quatuor anterioribus bifariam spinosis. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 13. C. *Habitat extra Europam.*
- nigroma- 224. Gr. thorace rotundato laevi, capite elytrisque pallidis,  
culatus. antennis longissimis, alis caeruleo-virescentibus: macularum nigrarum undularum ordinibus septem transversis. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 24. *Habitat extra Europam, pedibus pallidis, tibiis anterioribus longis spinis armatis.*
- testaceus. 225. Gr. testaceus, abdomine elytris longiore subtus et thoracis margine externo flavo, ense adscendente quadrivalvi. *Mus. Lesk.* p. 47. n. 28. *Habitat in Europa.*
- fulvicor- 226. Gr. fusco cinereoque varius, antennis flavescensibus lon-  
nis. gitudine corporis, thorace plano posterioribus subcarinato, elytris fusco-griseis: punctorum pallidorum ordine obsoleto, ense adscendente. *Mus. Lesk.* p. 48. n. 33. *Habitat in Europa.*

227. Gr.

\*) An propriae species hac referendae a Seba *mus.* vol. 4, delineatae? flavus t. 70. f. 11. 12. tessulatus t. 71. f. 7. 8. nigro-notatus t. 72. f. 1. 2. chloropterus t. 75. f. 5. 6. duplicatus t. 75. f. 7-10. subulatus t. 78. f. 6. bifurcatus t. 79. f. 13-16. albo-punctatus t. 80. f. 7. 8. capite et cauda subulatis t. 83. f. 9. ensiferi consueti t. 96. f. 39. 40.

- longicor- 227. Gr. thorace rotundato supra testaceo, capite viridi: fronte  
nis. acuminata testacea antennis longissimis, elytris testaceis  
abdomine dimidio brevioribus, ense adscendente testaceo  
basi viridi. *Mus. Lesk. p. 48. n. 34.*  
*Habitat in Europa.*
- \*\*\*\*\* *antennis fusiiformibus, palpis simplicibus, cau-  
da simplici, Locustae, Grylli Fabricii.*
- reticula- 4. Gr. thorace cymbiformi posterius producto acuto, elytris  
tus. reticulatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 362. n. 7. mant. inf. 1.  
p. 236. n. 7.*  
*Habitat in Bengala, magnitudine fere ferrati.*
- ferripes. 139. Gr. thorace cymbiformi posterius producto, elytris fus-  
cis, femoribus posterioribus ferratis. *Fabr. mant. inf. 1. p.  
236. n. 8.*  
*Habitat in America australi et India, magnitudine fere ferrati.*
- ferratus. 5. Gr. thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acumi-  
nato, abdomine caeruleo. *Mus. Lud. Ulr. 121.\* Gron.  
zooph. 142.\**  
*Fabr. sp. inf. 1. p. 363. n. 8. mant. inf. 1. p. 236. n. 9.*  
Gryllus thorace cymbiformi carinato ferrato postice pro-  
ducto acuto.  
*Degeer inf. 3. p. 493. n. 10. t. 41. f. 6. Acrydium ferratum.*  
*Roes. inf. 2. gryll. t. 16. f. 2.*  
*Sulz. inf. t. 8. f. 58.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- turcius. 140. Gr. cinereus, thorace cymbiformi, elytris basi fasciatae  
fuscis, alis basi atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 236. n. 10.*  
*Habitat in India, parvus.*
- Lunus. 9. Gr. thoracis segmento crista semiorbiculata, elytris nigris:  
fasciis albis. *Amoen. acad. 6. p. 397. n. 30. Fabr. sp.  
inf. 1. p. 362. n. 6. mant. inf. 1. p. 236. n. 6.*  
*Habitat in America meridionali, alis nigris immaculatis.*
- Elephas. 35. Gr. thorace carinato integro, corpore aptero. *Fabr. sp.  
inf. 1. p. 361. n. 1. mant. inf. 1. p. 235. n. 1.*  
*Roes. inf. 2. gryll. t. 6 f. 2.*  
*Habitat in Africa, reliquis hujus tribus major et ponderosi-  
or, viridis femoribus muticis, rudimentis alarum duarum.*

- fuccin- 36. Gr. thoracis carina margineque posteriori elytrorumque  
ctus. margine dorsali flavis, gula cornuta. *Amoen. acad.* 6. p. 398. n. 36. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 362. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 235. n. 2.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. t. 54. f. 2.  
*Habitat in America australi, et duplo major in India, antennis flavis, tibiatarum posteriorum spinis luteis apice atris.*
- criftatus. 37. Gr. thorace cristato, carina quadrifida, alis apice fuscis. *Muf. Lud. Ulr.* 137.\* *Amoen. acad.* 1. p. 21. t. 17. f. 4. *Gron. zooph.* 658. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 362. n. 3. *mant. inf.* 1. p. 235. n. 3.  
*Huffelq. iv.* 413. *Gryllus arabicus.*  
*Olear. mus. t.* 17. f. 5. *Gryllus ex Aegypto.*  
*Frisch inf.* 9. t. 1. f. 1.  
*Seb. mus.* 4. t. 72. f. 11. 12.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 5.  
*Edw. glean. t.* 312.  
*Habitat frequens in Arabia, Aegypto, Arabibus esculentus.*
- Dux. 141. Gr. thorace carinato scabro, elytris viridibus, alis rufis fulco maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 362. n. 4. *mant. inf.* 1. p. 235. n. 4.  
*Drury inf.* 1. t. 44.  
*Habitat in America meridionali, magnus, virefcens, capite flavefcente, antennis nigris.*
- aegyptia- 142. Gr. thorace cristato: carina trifida, alis fascia nigra. *Fabr. cus. sp. inf.* 1. p. 362. n. 5. *mant. inf.* 1. p. 235. n. 5.  
*Habitat in Aegypto.*
- morbillo- 38. Gr. thorace quadrato rubro verrucoso, elytris fuscis albo-  
fus. punctatis, alis rufis. *Muf. Lud. Ulr.* 141.\* *Gron. zooph.* p. 179. n. 662. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 364. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 236. n. 15.  
*Seb. mus.* 4. t. 79. f. 7. 8.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 18. f. 6.  
*Seligm. av.* 1. t. 43.  
*Herbst apud Fueßli arch. inf.* 8. t. 54. f. 1.  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- punctatus, 143. Gr. thorace verrucoso, elytris atris flavo punctatis, alis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 364. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 236. n. 16.



*Habitat in Tataria, variis annis numerosissimis gregibus in Europam migrans, et omnia vegetabilia excedens, ab Aegyptiis vivus prunis injectus, rejectis alis pedibusque esitatur.*

tataricus. 42. Gr. thorace subcarinato: segmentis tribus, capite rotundato: maxillis concoloribus. *Mus. Lud. Ulr.* 139.\*

*Fabr. sp. inf.* I. p. 365. n. 18. *mant. inf.* I. p. 237. n. 21.

Gryllus thorace segmentis tribus, fronte impressa, mandibulis concoloribus.

*Roef. inf. gryll.* t. 18. f. 8.

*Drury inf.* I. t. 49. f. 2.

*Habitat in Africa, elytris praesertim cinerascensibus fusco maculatis, migratorio affinis.*

ruficornis. 147. Gr. thoracis dorso nigro: carina flava, antennis tibiisque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 237. n. 23.

*Habitat in Sierra Leon Africae, statura migratorii, at paulo minor.*

Lincola. 148. Gr. thorace subcarinato fusco: linea dorsali rufa, femoribus posterioribus intus sanguineis, tibiis caeruleis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 365. n. 20. *mant. inf.* I. p. 237. n. 24.

*Habitat in Italia, magnitudine migratorii.*

variegatus. 43. Gr. thorace lineato flavo, elytris viridibus, alis caeruleis. *Mus. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. sp. inf.* I. p. 366. n. 21. *mant. inf.* I. p. 237. n. 25.

*Herbst. apud Fueslii arch. inf.* 8. t. 53. f. 3.

*Habitat in America, fronte rubra atro maculata, antennis nigris rubro annulatis.*

vocans. 149. Gr. thorace carinato, elytris pallidis: maculis ocellaribus fulcis, alis basi ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 366. n. 22. *mant. inf.* I. p. 237. n. 26.

*Habitat in nova Hollandia.*

luridus. 150. Gr. niger, thorace subcarinato, pectoris macula abdominisque cingulis sanguineis, fronte porrecta. *Fabr. sp. inf.* I. p. 366. n. 23. *mant. inf.* I. p. 237. n. 23.

*Habitat in Africa aequinoctiali, magnitudine striduli.*

musicus. 151. Gr. thorace carinato, elytris anterieus nigris fascia alba, posterioribus griseis nigro variis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 366. n. 24. *mant. inf.* I. p. 237. n. 28.

*Habitat in nova Hollandia.*

152. Gr.



- scaber. 152. Gr. thorace scabro, alis rufis apice cinereis, femoribus posterioribus supra infraque carinatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 366. n. 25. *mant. inf.* I. p. 238. n. 30.  
*Habitat in Jutlandiae arenosis.*
- cifti. 153. Gr. thorace scabro: crista bifida, alis rubris: fascia nigra: femoribus posterioribus canaliculatis. *Fabr. mant. inf.* I. p. 237. n. 29.  
*Habitat in cilito halimifolio, stridulo paulo major.*
- caerulefcens. 44. Gr. thorace subcarinato, alis virescenti-caeruleis: fascia nigra. *Muf. Lud. Ulr.* 145.\* *Scop. ent. carn.* 325. *Fabr. sp. inf.* I. p. 369. n. 37. *mant. inf.* I. p. 239. n. 43.  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 392. n. 2. *Acrydium elytris nebulosis, alis caeruleis extimo nigro.*  
*Degeer inf.* 3. p. 473. n. 3. *Acrydium caeruleipenne.*  
*Raj. inf.* 60.  
*Frisch inf.* 9. t. 1. f. 3.  
*Seb. mus.* 4. t. 65. f. 19.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 4.  
*Sulz. inf.* t. 9. f. 60.  
*Schaeff. ic.* t. 27. f. 6. 7.  
*Habitat in Sibiria et Europa magis australi.*
- furina-mus. 45. Gr. thorace lineis quatuor flavis, alis caeruleis, elytris viridibus. *Muf. Lud. Ulr.* 146. *Fabr. sp. inf.* I. p. 367. n. 28. *mant. inf.* I. p. 238. n. 34.  
*Habitat in America meridionali, femorum basi sanguinea.*
- italicus. 46. Gr. fuscus, thorace carinato, alis rubris, apice hyalinis. *Muf. Lud. Ulr.* 147.\* *Scop. ent. carn.* 327. *Fabr. sp. inf.* I. p. 367. n. 29. *mant. inf.* I. p. 238. n. 35.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 6.  
*Schaeff. ic.* t. 27. f. 8. 9.  
*Habitat in Europa magis australi.*
- thalassinus. 154. Gr. thorace laevi viridi, alis hyalinis latere tenuiori viridibus, apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 367. n. 31. *mant. inf.* I. p. 238. n. 37.  
*Habitat in Italia, capite thoraceque viridi, ore oculisque fuscis, tibiis sanguineis.*
- germanicus. 155. Gr. testaceus, alis sanguineis apice hyalinis, femoribus posterioribus nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 367. n. 30. *mant. inf.* I. p. 238. n. 36.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 7.  
*Habitat in Germaniae agris.*

- virginia- 156. Gr. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris basi  
nus, virescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 32. *mant. inf.*  
1. p. 238. n. 38.  
*Habitat in America boreali.*
- stridulus. 47. Gr. thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris. *Fn.*  
*suec.* 872.\* *Scop. ent. carn.* 326. *Fabr. si. inf.* 1. p.  
366. n. 26. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 31.  
*It. ocl.* 158. *Gryllus elytris nebulosis, alis rubris extimo*  
*nigris*  
*Uddm. diff.* 50.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 393. n. 4. *Acrydium elytris nebu-*  
*lofis, alis rubris externe nigris.*  
*Degeer inf.* 3. p. 472. n. 2. *Acrydium rubripenne.*  
*Frisch inf.* 9. t. 1. f. 2.  
*Seb. mus.* 4. t. 65. f. 20.  
*Roef. inf.* 2. gryll. t. 21. f. 1.  
*Schaeff. elem.* t. 15.  
*icon.* t. 27. f. 10. II.  
*Habitat in Europae siccis arenosis, tota die in seram noctem*  
*stridens, niger, aut nigro flavoque varius.*
- ferrugi- 157. Gr. thorace tuberculato, elytris obscuris immaculatis,  
neus, alis ferrugineis, capite acuminato. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
367. n. 27. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 33.  
*Habitat in Africa aequinoctiali.*
- morio. 158. Gr. obscurus, thorace subcarinato, alis atris immacu-  
latis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 238. n. 32.  
*Habitat in Africa, stridulo affinis, at paulo minor.*
- caerulans. 48. Gr. thorace laeviusculo, elytris pallidis nigro maculatis,  
alis latere tenuiore caeruleiscentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p.  
368. n. 33. *mant. inf.* p. 238. n. 39.  
*Habitat in Europae magis australis campestribus.*
- carolinus. 49. Gr. thorace subcarinato, alis nigris: margine posteriore  
flavo. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 34. *mant. inf.* 1. p. 238.  
n. 40.  
*Cateb. carol.* 2. p. 89. t. 89. *Locustella carolina, elytris*  
*fuscis, alis inferioribus nigris, ad extremitates luteis.*  
*Degeer inf.* 3. p. 491. n. 7. t. 41. f. 2. 3. *Acrydium ca-*  
*rolinum.*  
*Habitat in America boreali, elytris obscuris fusco punctatis.*

- obscurus. 50. Gr. thorace subcarinato, alis disco rubro fascia nigra, apice hyalinis. *Mus. Lud. Utr.* 144. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 35. *mant. inf.* 1. p. 230. n. 41.  
*Degeer inf.* 3. p. 492. n. 8. t. 41. f. 4. *Acrydium obscurum*.  
*Seb. mus.* 4. t. 80. f. 15. 16.  
*Drury inf.* 2. t. 41. f. 1.  
*Habitat in Africa, femoribus interne basi atris.*
- fibricus. 51. Gr. thorace subcarinato, antennis clavatis, tibiis anterioribus ovato-clavatis crassis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 368. n. 36. *mant. inf.* 1. p. 238. n. 42.  
*Pall. it.* 1. app. n. 48. *Spicil. zool.* 9. p. 29. t. 1. f. 11. *Gryllus clavimanus*.  
*Laxmann nov. omm. Petrop.* 14. t. 25. f. 8.  
*Habitat in Sibiria, femina tibiis simplicibus.*
- cinerascens. 159. Gr. thorace carinato, elytris margine tenuiore viridibus, alis basi flavescens apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 369. n. 38. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 44.  
*Habitat in Italia, flavo affinis, at duplo major.*
- sulphureus. 160. Gr. obscurus thorace carinato, alis flavissimis apice nigricantibus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 369. n. 39. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 45.  
*Habitat in America boreali, parvus.*
- flavus. 52. Gr. thorace carinato, alis flavis, fascia nigra apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 369. n. 40. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 46.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 702. n. 52. *Gryllus* thorace subcarinato, alis disco flavo, fascia nigra apice hyalinis.  
*Scop. delic. insubr.* 1. p. 63. t. 24. f. C. *Gryllus* alis femiluteis: fascia fusca, corpore tinctus fusco-ferrugineo.  
*Degeer inf.* 3. p. 493. n. 9. t. 41. f. 5? *Acrydium nigrotalarum*.  
*Petiv. gazoph.* 6. t. 3. f. 6. *Locusta capensis*, alis inferioribus luteis.  
*Habitat in Europa magis australi, et Africa, tibiis posterioribus sanguineis, elytris fuscis: maculis obsolete albis.*
- insubricus. 161. Gr. elytris testaceis, alis basi rubris: fascia fusca. *Scop. delic. insubr.* 1. p. 64. t. 24. f. D.  
*Habitat in Insubria, italico minor.*

- nitidulus. 162. Gr. viridis, capite lucido luteo. *Scop. delic. insubr. I. p. 62. t. 24. f. B.*  
*Habitat circa Mediolanum, bipollicaris, ad tetragonias remittendus.*
- cyanipes. 163. Gr. fuscus, linea dorsali flava, tibiis posterioribus flavis apice cyaneis. *Fabr. sp. inf. I. p. 370. n. 41. mant. inf. I. p. 239. n. 47.*  
*Degeer inf. 3. p. 489. n. 4. t. 40. f. 3. Acrydium flavofasciatum.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*
- rusticus. 164. Gr. griseus, elytris basi fuscis flavo maculatis apice cinereo fuscoque variis. *Fabr. sp. inf. I. p. 370. n. 42. mant. inf. I. p. 239. n. 48.*  
*Habitat in Insulis Americae meridionali oppositis.*
- lateralis. 165. Gr. thorace fusco: margine punctoque utrinque tibiisque flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 370. n. 43. mant. inf. I. p. 239. n. 49.*  
*Habitat in insulis Americae meridionali oppositis.*
- velox. 166. Gr. fuscus, thoracis plani margine pedibusque virescentibus. *Fabr. mant. inf. I. p. 239. n. 50.*  
*Habitat in Sina, parvus.*
- apricarius. 53. Gr. thorace cruciato, antennis longitudine corporis. *Fn. suec. 873.\* It. oel. 157.*  
*Habitat in Europae campis siccissimis.*
- viridulus. 54. Gr. thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Fn. suec. 874.\* Fabr. sp. inf. I. p. 370. n. 44. mant. inf. I. p. 239. n. 51.*  
*It. mgoth. 276. Gryllus capite, thorace elytrisque superne viridibus.*  
*Degeer inf. 3. p. 480. n. 7. Acrydium albo marginatum.*  
*Frisch inf. 9 t. 1. f. 7.*  
*Schaeff. ic. t. 141. f. 2. 3.*  
*Habitat frequens in Europae arvis sterilioribus.*
- biguttulus. 55. Gr. thorace cruciato, elytris nebulosis: puncto oblongo albo versus apices. *Fn. suec. 875. Fabr. sp. inf. I. p. 370. n. 45. mant. inf. I. p. 231. n. 51.*  
*Degeer inf. 3. p. 479. n. 6. Acrydium biguttulum.*  
*Schaeff. icon. t. 190. f. 1. 2.*  
*Habitat in Europae magis borealis arvis sterilioribus, frequens.*  
 56. Gr.

- rufus. 56. Gr. thorace cruciatio, corpore rufo, clytris griseis, antennis subclavatis acutis. *Fn. suec.* 876.\* *Scop. ent. caru.* 329. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 48. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 55. Gryllus fuscus, abdomine rufo, antennis subclavatis. *Schaeff. ic. t.* 136. f. 4. 5. *Habitat in Europae arvis sterilioribus frequens.*
- captivus. 167. Gr. fuscus thorace cruciatio, femoribus tibiisque posterioribus fascia alba. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 47. *mant. inf.* 1. p. 231. n. 54. *Habitat in nova Hollandia.*
- danicus. 57. Gr. thorace subearinato femoribusque virescentibus, tibiis posterioribus sanguineis. *Habitat in Dania, verrucivori magnitudine.* Brünniche.
- grossus. 58. Gr. femoribus sanguineis, clytris virescenti-subrufis, antennis cylindricis. *Fn. suec.* 877.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 46. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 53. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 393. t. 8. f. 2. Acrydium femoribus sanguineis, aîis subfulcis reticulatis. *Degeer inf.* 3. p. 477. n. 5. t. 22. f. 4. Acrydium rubripes. *Hollar. inf. t.* 10. f. 5. 6. *Frisch inf.* 9. p. 5. t. 4. *Habitat in Europae arvis arenosis frequens.*
- pedestris. 60. Gr. corpore incarnato aptero. *Fn. suec.* 878.\* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 49. *mant. inf.* 1. p. 23. n. 56. *Degeer inf.* 3. p. 474. n. 4. t. 239. f. 8. 9. Acrydium apterum. *Habitat in Europa, et ad Sibiriae montem Tischeremshan.*
- perspicillatus. 61. Gr. alarum rudimentis oculo atro, oculis aureis. *Amoen. acad.* 6. p. 398. n. 34. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 371. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 239. n. 57. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 357. n. 11? *mant. inf.* 1. p. 233. n. 13? *Locusta* (specularis) thorace rotundato, clytris griseis basi oculo dorsali vitreo, antennis longissimis. *Habitat in America australi et India.*
- annulatus. 168. Gr. thorace planiusculo, fronte gibbosa, alis caeruleo-nigris intus caeruleis. *Herbst apud Fueslli arch. inf.* 8. p. 195. n. 5. t. 53. f. 4. *Habitat in America, punctis elevatis scaber, ex rubescente griseus, abdominis annulis aliquot virescentibus, antennis flavicantibus nigro annulatis.*

- triangularis. 169. Gr. spadiceus, scutello abdominisque segmento primo macula triangulari, elytris margine flavis, alis flavescensibus.  
*Roefel inf. 2. gryll. p. 138. §. 2. t. 22. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- verficolor. 170. Gr. viridi rubro flavoque varius, capite cum antennis elytrorumque margine viridi, thorace elytrisq. fulcis.  
*Sulz. hist. inf. p. 84. t. 9. f. 4.*  
*Habitat in Insuebia.*
- Centurio. 171. Gr. fuscus atro maculatus, alis ruberrimis: basi margine strisque tenerrimis undulatis atris.  
*Drury inf. 2. p. 78. t. 41. f. 3.*
- caeruleus. 172. Gr. viridis, alis caeruleis apice cinereis, femoribus viridi-flavis, tibiis nigerrimis.  
*Drury inf. 2. p. 79. t. 42. f. 1.*  
*Habitat in Africa.*
- Miles. 173. Gr. viridis, frontis fasciis thoracisque punctis binis flavis, elytris spadiceis, alis alternatim rufescentibus et atris.  
*Drury inf. 2. p. 80. t. 42. f. 2.*  
*Habitat in America.*
- lunulatus. 174. Gr. thorace subcucullato: lineis tribus elevatis; lateribus lunulatis.  
*Roef. inf. 2. gryll. p. 128. §. 5. t. 20. f. 6. 7.*  
*Scop. ent. carn. p. 110. n. 328.*  
*Habitat in Germania.*
- subcarinata. 175. Gr. thorace subcarinato viridescente, alis basi luteis: apicis macula nigricante. *Lepech. it. 1. p. 256. c. t. 47. f. 4.*  
*Habitat in Sibiriae desertis Uralensibus.*

176. Gr.

---

*An huc referendi, tanquam propriae species, a reliquis distinctae, Gryllus femoratus Lepech. it. 1. t. 19. f. 1. 2. t. 20. f. 5. pluresque a Seba Mus. vol. 4. delineati, cyaneus t. 65. f. 18. singularis t. 65. f. 22. fuscus t. 67. f. 11. purpurascens t. 70. f. 3. 4. albo-marginatus t. 70. f. 5. 6. pallide flavus t. 71. f. 1. 2. taeniolatus t. 71. f. 3. 4. luteo-fuscus t. 71. f. 5. 6. hyalinus t. 71. f. 11. 12. cinereus t. 72. f. 7. 8. cinereo-fuscus t. 72. f. 9. 10. capito t. 75. f. 1. 2. fusco-maculatus t. 79. f. 1. 2. viridi-purpurascens t. 79. f. 9. 10. olivaceus t. 79. f. 11. 22. Locustella t. 80. f. 5. 6. cinnabarinus t. 80. f. 9. 10. capensis t. 80. f. 11. 12. exiguus t. 87. f. 19. alique anonymi t. 69. f. 9-12. t. 96. f. 34-38. depilli, minutus et virens Hermanni?*

- fuscus. 176. Gr. fuscus, elytris fasciis duabus albis. *Lepechin it. 1. p. 314.*  
*Habitat in desertis Uralensibus.*
- Lepechini. 177. Gr. thoracis scutello abdominis longitudine: linea albida a fronte per medium scutellum decurrente. *Lepechin it. 2. t. 10 f. 17.*  
*Habitat in Sibiria.*
- fuliginosus. 178. Gr. thoracis dorso triangulo, elytris ex griseo fulcescentibus, alis fuliginosis. *Pallas it. 2. app. n. 77.*  
*Habitat in Sibiriae campatribus, italici magnitudine.*
- muricatus. 179. Gr. thorace pentagono, alis flavescens: arcu fusco, femoribus posterioribus exterius muricatis. *Pallas it. 1. app. n. 47.*  
*Habitat in desertis Uralensibus, obscuro major, colore varians.*
- miniatus. 180. Gr. thorace subcarinato, alis miniatis: apicis arcu nigro. *Pallas it. 1. app. n. 49.*  
*Habitat in desertis australibus ad fluvium Ural, caeruleo forma et magnitudine.*
- variabilis. 181. Gr. thorace subcarinato, alis nigro reticulatis: area ad marginem crassiora atra apice fusco-hyalino. *Pallas it. 1. app. n. 52.*  
*Habitat in campis per fluvium Samara irrigatis, magnitudine facieque striduli, alis nunc hyalinis, nunc albicantibus, nunc pallidis, nunc caeruleo reticulatis.*
- fulvus. 182. Gr. thorace subcarinato, alis fascia nigra lata, basi roseis, apice hyalinis. *Pallas it. 2. app. n. 78.*  
*Habitat in desertis salinis aridissimis ad fluvios Ural et Irtysh sitis, facie fere caeruleo reticulatis.*
- tibialis. 183. Gr. elytris nebulosis, alis caeruleo reticulatis fusco reticulatis, tibiis albidis longius spinosis. *Pallas it. 2. app. n. 78. b.*  
*Habitat in regionibus australibus Uralensibus, facie et magnitudine salini.*
- barabensis. 184. Gr. elytris pallidis punctis fuscis irroratis, alis hyalino-flavescens: margine et apice venis punctisque fuscis. *Pallas it. 2. app. n. 79. 3. p. 433.*  
*Habitat in pinetis arenosis deserti Barabensis, magnitudine tibialis, chenopodii amans.*

- numidi- 185. Gr. thorace carinato, alis minimis squameis. *Poiret*  
cus. *Journ. de physiq.* 1787. *Apr. p.* 242. *t.* I. *f.* I.
- cruenta- β) Gr. maculis sanguineis coopertus. *Poiret Journ. de physiq.*  
tus. 1787. *Apr. p.* 244.  
*Habitat in Numidia, voracissimus, glaberrimus, totus vi-*  
*ridis, elephante minor, sed longior, ova glutine coacta*  
*in arena sepeliens.*
- cinereus. 186. Gr. fusco punctatus, thorace subcarinato, alis albis.  
*Müll. zool. dan. prodr. p.* 100. *n.* 1138.  
*Habitat in Dania.*
- flavescens. 187. Gr. flavescens, elytris fuscescentibus obsolete macula-  
tis, alis flavo nigroque reticulatis.  
*Schaeff. ic. t.* 228. *f.* 1. 2.  
*Habitat in Germania.*
- rhomboides. 188. Gr. elytris cinereis apice albidis: maculis atris rhomboides.  
*Schaeff. ic. t.* 228. *f.* 6. 7.  
*Habitat in Germania.*
- angulatus. 189. Gr. flavescens, abdomine fusco: annulorum segmentis  
obtusè angulatis.  
*Schaeff. ic. t.* 232. *f.* 2. 3.  
*Habitat in Germania.*
- rubicundus. 190. Gr. capite, thorace elytrorumque margine anteriore vi-  
ridi, elytris lunula media albida, alis cinereis, abdomine  
posterioribus pedibusque rubicundis.  
*Schaeff. ic. t.* 241. *f.* 5. 6.  
*Habitat in Germania.*
- pullus. 191. Gr. atro-fuscus, thorace quadrato: margine flavescente.  
*Schaeff. ic. t.* 232. *f.* 6. 7.  
*Habitat in Germania.*
- lineatus. 192. Gr. viridescens, thoracis linea longitudinali elytrorum-  
que futura aurantiis.  
*Schaeff. ic. t.* 243. *f.* 3. 4.  
*Habitat in Germania.*
- sphaericus. 193. Gr. viridescens, elytrorum basi maculis binis albis sphae-  
ricis.  
*Schaeff. icon. t.* 247. *f.* 3. 4.  
*Habitat in Germania.*



- rubricol- 194. Gr. flavidus, thorace rubro: margine flavo.  
 lis. *Schaeff. ic. t. 247. f. 3. 4.*  
*Habitat in Germania.*
- rofaceus. 195. Gr. varius, thorace viridi: margine rofaceo.  
*Schaeff. ic. t. 252. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- similis. 196. Gr. thorace subearinato, alis atris: disco et margine rubris.  
*Schaeff. ic. t. 253. f. 1. 2.*  
 β) Gryllus alis apice maculatis.  
*Schaeff. ic. t. 253. f. 5. 6.*  
*Habitat in Germania, stridulo affinis, an varietas?*
- purpure- 197. Gr. alis clytrisque pallidis maculatis, thorace abdomi-  
 nisque annulis tribus anterioribus purpureis.  
 us. *Schaeff. ic. t. 263. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- flavens. 198. Gr. flavescens, thorace lineis duabus longitudinalibus  
 obscurioribus.  
*Schaeff. ic. t. 264. f. 4. 5.*  
*Habitat in Germania.*
- viridis. 199. Gr. viridis, hinc inde flavescens.  
*Schaeff. icon. t. 265. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania; an propria species?*
- fexmacu- 200. Gr. subfuscus, alis flavescens: maculis fex fuscis lon-  
 latus. gitudinaliter positis.  
*Schaeff. ic. t. 265. f. 4. 5.*  
*Habitat in Germania, parvus.*
- maculo- 201. Gr. elytris maculosis, alis rofaceis apice cinerascens.  
 fus. *Schaeff. icon. t. 267. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*
- polytti- 202. Gr. fuscescens hinc inde pallide punctatus, alis rufescen-  
 etos. tibus: apice anis nigricantibus.  
*Schaeff. icon. t. 267. f. 4. 5.*  
*Habitat in Germania.*
- limbatus. 203. Gr. viridis, clytris apice et margine exteriori rufis.  
*Degeer inf. 3. p. 481. n. 8. Acrydium rufum marginatum.*  
*Habitat in Europae pratis, 9 lineas longus.*

- pratenfis. 204. Gr. viridis, elytris apice nigris, antennis corporis dimidio longitudine.  
*Degeer inf. 3. p. 481. n. 9. Acrydium nigro-terminatum.*  
*Habitat in Europae pratis, limbato minor.*
- albipes. 205. Gr. thorace cristato: segmento quadruplici, elytris obscure virentibus, alis violaceis, femoribus posterioribus albo maculatis. *Degeer inf. 3. p. 487. n. 2. t. 40. f. 7.*  
*Habitat in Surinamo, 2½ pollices longus.*
- roseus. 206. Gr. viridis, antennis flavis, alis dimidiato tibiisque posterioribus roseis. *Degeer inf. 3. p. 488. n. 3. t. 41. f. 1.*  
*Habitat in Sina, 2½ pollices longus.*
- sanguinolentus. 207. Gr. capite flavo rubro nigroque maculato, thorace flavo, elytris viridibus, tibiis rubro maculatis. *Degeer inf. 3. p. 489. n. 5. t. 40. f. 9.*  
*Habitat - - - sesquipollicaris.*
- denticulatus. 208. Gr. viridis thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, fasciis binis longitudinalibus griseis.  
*Degeer inf. 3. p. 495. n. 11. t. 42. f. 2. Acrydium ferrato-fasciatum.*  
*Habitat in Surinamo, gracilis, 2 pollices longus.*
- dentatus. 209. Gr. fuscus nebulosus, thorace cymbiformi rugoso: carina laevi, femoribus posterioribus denticulatis, capite ovato. *Degeer inf. 3. p. 496. n. 12. t. 42. f. 3.*  
*Habitat in India, 2½ pollices longus.*
- chloropterus. 210. Gr. fuscus, alis viridibus, thorace rotundato laevi, femoribus posterioribus linea flava.  
*Degeer inf. 3. p. 497. n. 13. t. 42. f. 4. Acrydium flavo-lineatum.*  
*Habitat in Surinamo, 15 lineas longus.*
- erythropus. 211. Gr. griseo-fuscus, femoribus posterioribus subtus rubris, intus flavescens nigro maculatis, tibiis posterioribus rubris.  
*Degeer inf. 3. p. 498. n. 14. t. 42. f. 5. Acrydium Femur rubrum.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longus.*
- chryso-melas. 212. Gr. viridis, thorace carinato, elytris fuscis: margine inferiore viridi, alis nigris basi luteis.  
*Degeer inf. 3. p. 498. n. 15. t. 42. f. 6. Acrydium viridi fasciatum.*  
*Habitat in Pennsylvania, pollicem longus.*

- varius. 213. Gr. viridi-obscurus, alis caeruleis, corpore fasciis maculisque flavis, femoribus basi sanguineis.  
*Degeer inf.* 3. p. 500. n. 17. t. 42. f. 8. *Acrydium variegatum*.  
*Habitat in Surinamo, 9 lineas longus.*
- longipennis. 214. Gr. viridi-flavus, elytris abdomine duplo longioribus capite thoraceque fasciis binis nigris. *Degeer inf.* 3. p. 501. n. 18. t. 42. f. 9.  
*Habitat in Surinamo, 11 lineas longus.*
- acutus. 215. Gr. thorace nigro: macula flavo-viridi, elytris fuscis: macula viridi, femoribus posterioribus fasciis tribus nigris.  
*Degeer inf.* 3. p. 54. n. 19. t. 42. f. 10. *Acrydium acuminatum*.  
*Habitat in Surinamo, 9 lineas longus.*
- chalcops. 216. Gr. griseo-fuscus, thorace fasciis binis nigris, elytris unica grisea, femoribus posterioribus intus tibiisque sanguineis.  
*Degeer inf.* 3. p. 501. n. 20. t. 42. f. 11. *Gryllus aeneo-oculatus*.  
*Habitat in Surinamo, 10 lineas longus.*
- sticticus. 217. Gr. griseo-fuscus, elytris lineis punctatis nigris.  
*Degeer inf.* 3. p. 503. n. 21. t. 42. f. 12.  
*Habitat in Surinamo, 10 lineas longus.*
- hamatus. 218. Gr. thoracis scutello abdomine longiore anteriori hamato, antennis longitudine abdominis, alis nigris, elytris nullis. *Degeer inf.* 3. p. 503. n. 22. t. 42. f. 13.  
*Habitat in Surinamo.*
- rugosus. 228. Gr. apterus, viridis cinereo varius, capite vesiculoso: fronte rugis duabus dentatis et utrinque ruga minore denticulata, vertice impresso: margine elevato dentato, thorace morbilloso spinoso: crista elevata compressa rugosodentata. *Mus. Lesk.* p. 48. n. 39.  
*Habitat extra Europam, interdum cinereus fusco varius, abdominis segmentis singulis utrinque macula fusca notatis, utrinque dentibus 2, et praeterea crista dentata armatis, femoribus tibiisque posterioribus supra infraque dentatis.*
- lunaris. 229. Gr. thorace carinato, alis basi rufis: lunula media margine anteriori maculisque tribus versus apicem ad marginem

nem potteriozem fuscis, tibiis potterioribus albis nigro-spinosis, griseo-villofis. *Mus. Lesk. p. 48. n. 49.*

*Habitat* - . . .

- flavipes. 230. Gr. thorace supra elytrisq. brunneis: margine anteriori viridi-flavis, femoribus posterioribus subtus sanguineis tibiisque flavis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 50.*  
*Habitat in Europa.*
- griseus. 231. Gr. thorace cruciato supra fusco, elytris griseo-fusco-nebulosis, pedibus quatuor anterioribus griseo-fusco-maculatis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 51.*  
*Habitat in Europa.*
- cruciger. 232. Gr. thorace cruciato viridi: cruce alba elytris dorso viridibus margine inflexo fuscis apice albis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 52.*  
*Habitat in Europa.*
- nubilus. 233. Gr. thorace carinato viridi: utrinque linea fracta alba, elytris fusco-nebulosis supra viridibus. *Mus. Lesk. p. 49. n. 53.*  
*Habitat in Europa.*
- virens. 234. Gr. viridis, thorace cruciato, antennis corpore longioribus. *Mus. Lesk. p. 49. n. 56.*  
*Habitat in Europa.*
- venosus. 235. Gr. thorace cruciato rufo, elytris hyalinis rufo-venosis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 58.*  
β) Gr. elytrorum maculis sex fuscis seriatis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 59.*  
*Habitat in Europa.*
- bicolor. 236. Gr. griseus apterus, femoribus posterioribus subtus rufis. *Mus. Lesk. p. 49. n. 60. b.*  
*Habitat in Europa.*
- distinctus. 237. Gr. apterus viridis, femina dorso, mare femoribus posterioribus viridescente. *Mus. Lesk. p. 49. n. 61. c.*  
*Habitat in Europa.*

222. FULGORA. *Caput fronte producta, inani.*  
*Antennae breves infra oculos: articulis duobus; exteriore globoso majore.*  
*Rostrum inflexum, elongatum: vagina quinquearticulata.*  
*Pedes gressorii.*

Laternaria. I. F. fronte rostrata recta, alis lividis: posterioribus ocellatis.  
*Mus. Lud. Ulr. 152.\* Gron. zooph. 668. Fabr. sp. inf. 2. p. 313. n. 1. mant. inf. 2. p. 260. n. 1.*

*Grew. mus. 158. t. 13. Cucujus peruvianus.*

*Merian. surin. t. 49. Laternaria.*

*Reaumur inf. 5. t. 20. f. 6. 7.*

*Roefel inf. 2. gryll. t. 28. 29.*

*Seb. mus. 4. t. 77. f. 3. 4.*

*Degeer inf. 3. p. 195. n. 1.*

*Stoll. cicad. t. 1. f. 1.*

*Habitat in America meridionali, prominente fronte noctu luceu vividissimam spargens.*

ferrata. IO. F. fronte rostrata adscendente quadrifariam ferrata. *Fabr. sp. inf. 2. p. 313. n. 2. mant. inf. 2. p. 260. n. 2.*

*Seb. mus. 4. t. 77. f. 5. 6.*

*Lindenb. Naturf. 13. p. 19. t. 3. f. 1. 2.*

*Habitat in Surinamo.*

Diadema. 2. F. fronte rostrata muricata: apice trifido, alis nigris rubro maculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 313. n. 3. mant. inf. 2. p. 260. n. 3.*

*Drury inf. 3. t. 50. f. 4. Fulgora armata.*

*Seb. mus. 4. t. 77. f. 7. 8.*

*Lindenb. Naturf. 13. p. 20. t. 3. f. 3.*

*Stoll. cicad. 1. t. 5. f. 22.*

*Habitat in India, candelaria major.*

Candalaria. 3. F. fronte rostrata adscendente, clytris viridibus luteo maculatis, alis flavis apice nigris. *Mus. Lud. Ulr. 153.\**

*Atl. Stockh. 1746. p. 63. t. 1. f. 5. 6. Fabr. sp. inf. 2. p. 313. n. 4. mant. inf. 2. p. 260. n. 4.*

*Degeer inf. 3. p. 197. n. 2.*

*Roef.*

*Roef. inf. 2. gryll. p. 189. t. 30.*

*Edw. av. t. 120.*

*Sulz. inf. t. 10. f. 62.*

*Habitat in Sina.*

- phospho- 4. F. fronte rostrata subulata adscendente, corpore griseo glau-  
rea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 5. mant. inf. 2. p. 313.*  
*n. 5.*  
*Degeer inf. 3. p. 201. n. 4. t. 32. f. 6. Cicada filirostris.*  
*Habitat in America meridionali.*
- noctivida. 5. F. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore viridi,  
alis hyalinis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 6. mant. inf.*  
*2. p. 313. n. 6.*  
*Degeer inf. 3. p. 202. n. 5. t. 32. f. 4. Cicada conirostris.*  
*Habitat in America meridionali.*
- lucerna- 6. F. fronte rostrata prominente, corpore supra viridescente,  
ria. subtus flavo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 7. mant. inf. 2.*  
*p. 313. n. 7.*  
*Degeer inf. 3. p. 202. n. 6. t. 32. f. 6. Cicada brevirostris.*  
*Habitat in America meridionali.*
- flammea. 7. F. fronte rostrata adscendente tereti truncata. *Amoen. ac.*  
*6. p. 399. n. 39. Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 8. mant.*  
*inf. 2. p. 260. n. 8.*  
*Stoll. cicad. t. 2. f. 7.*  
*Habitat in America meridionali.*
- tenebrofa. 11. F. fronte rostrata recta truncata, elytris griseis scabris.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 314. n. 9. mant. inf. 2. p. 260. n. 9.*  
*Degeer inf. 3. p. 200. n. 3. t. 32. f. 1. Cicada laternaria*  
*fulca.*  
*Habitat in Guinea.*
- obscurata. 12. F. fronte rostrata recta truncata, elytris cinereis nigro  
maculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 10. mant. inf. 2. p.*  
*260. n. 10.*  
*Stoll. cicad. 1. t. 6. f. 28.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- adscen- 13. F. fronte rostrata subulata adscendente, elytris ferrugineo-  
dens. fuscis albo punctatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 260. n. 11.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*

- fasciata. 14. F. fronte rostrata adscendente, elytris ferrugineo-fuscis: falcis duabus punctoque posteriore viridibus. *Fabr. mant. inf. 2. p. 261. n. 12.*  
*Habitat in Cayenna, adscendentis statura, an varietas?*
- truncata. 8. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 11. mant. inf. 2. p. 261. n. 13.*  
*Amoen. acad. 6. p. 399. n. 40. Cicada viridi-albicans, alis deflexis compressis pollice truncatis.*  
*Habitat in India.*
- plana. 15. F. flavescens, fronte porrecta plana, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 261. n. 14.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- pallipes. 16. F. fronte porrecta plana, elytris viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 261. n. 15.*  
*Habitat in Cayenna, statura planae.*
- hyalina. 17. F. fronte conica inaequali, elytris hyalinis: striga atra. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 12. mant. inf. 2. p. 261. n. 16.*  
*Habitat in Bengala, obscurata major.*
- festiva. 18. F. fronte conica, elytris fuscis: margine exteriori virescente, punctis nigris fulvisque, alis basi rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 13. mant. inf. 2. p. 261. n. 17.*  
*Habitat in Coromandel.*
- fenestrata. 19. F. fronte conica bifurcata, elytris hyalinis: macula marginali fusca. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 14. mant. inf. 2. p. 261. n. 18.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, europaea minor.*
- europaea. 9. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis, plantis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 315. n. 15. mant. inf. 2. p. 261. n. 19.*  
*Sulz. hist. inf. 1. 9. f. 5.*  
*Schulz. Naturf. 9. t. 2.*  
*Stoll cicad. 1. t. 11. f. 51.*  
*Habitat in Europa australi, cicadae spumantis magnitudine.*
- minuta. 20. F. fronte conica, capite thoraceque flavescens: linea dorsali, elytris albidis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 262. n. 20.*  
*Habitat Halae Saxonum, parva cicadae statura.*

Folium. 21. F. flavo-viridis, fronte rostrata brevi recta, alis amplissimis verticalibus compressis. *Degeer inf.* 3. p. 204. n. 7. t. 32. f. 7.  
*Habitat in America.*

223. CICADA. *Rostrum inflexum.**Antennae fetaceae.**Alae quatuor membranaceae deflexae.**Pedes (plerisque) saltatorii.*

\* *antennis subulatis fronti insertis*, Membracides Fabricii.

† *thorace compresso-membranaceo, corpore majore*, Foliaceae.

inflata. 52. C. thoracis folio inflato testaceo reticulato. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 262. n. 1.

*Habitat in Cayenna, magnitudine et statura foliatae.*

rhombea. 1. C. folio thoracis rhombeo posterius latiore. *Baker act. angl.* 1765. p. 55. t. 6. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 316. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 262. n. 2.

*Habitat in America.*

foliata. 2. C. thorace rotundato atro: arcibus albis. *Gron. zooph.* 677. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 316. n. 3.

*Fabr. mant. inf.* 2. p. 262. n. 5. Membracis (lunata) thorace foliaceo rotundato atro: lunulis tribus albis.

*Degeer inf.* 3. p. 205. n. 8. t. 32. f. 9. 10. Cicada foliata fasciata.

*Merian. surin.* t. 5. f. ult.

*Habitat in America meridionali.*

flaveola. 53. C. thorace rotundato flavo: fascia maculaque atris.

*Fabr. mant. inf.* 2. p. 262. n. 4. Membracis foliacea.

*Stoll. cicad.* t. 1. f. 2.

*Habitat in America meridionali, statura foliatae, at paulo major.*

54. G.

---

Cicadae succis plantarum vivunt; larva aptera, puppa solis alarum rudimentis instructa, ceterum utraque hexapus, currens imagini simillima, cercopidum agillima; imago gryllorum instar stridula; manniferarum larvae, veterum Tettigomettae, per annum fodiunt, et sub terra latent, declaratae masculinae lamellis duabus abdomen subtus obtegentibus sonorae in arbuſtis strident mutasque in venerem feminas provocant.



- fasciata. 54. C. thorace rotundato atro: fasciis duabus; anteriore fulva, posteriore alba. *Fabr. mant. inf. 2. p. 262. n. 6.*  
*Habitat in Cayenna, statura foliatae.*
- bracteata. 55. C. thorace viridi immaculato. *Fabr. mant. inf. 2. p. 263. n. 7.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- fronditia. 3. C. thoracis dorso repando sinuato: apice porrecto obtusissimo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 316. n. 2. mant. inf. 2. p. 262. n. 3.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 705. n. 3. Gronov. zooph. 676.\* Cicada foliacea, dorso repando, rostro obtusissimo.*  
*Degeer inf. 3. p. 208. n. 11. t. 32. f. 15. 16. Cicada foliata sinuata.*  
*Stoll cicad. 1. t. 6. f. 3. A. B. C.*  
*Habitat in Surinamo.*
- squamigera. 4. C. anteriorius posteriorisque rostrata acuta.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 316. n. 4. mant. inf. 2. p. 263. n. 8.*  
Membracis thorace foliaceo antice posticeque acuto griseo.  
*Degeer inf. 3. p. 209. n. 12. t. 32. f. 17. 18. Cicada hastata.*  
*Habitat in America meridionali.*
- genistae. 56. C. thorace fusco posteriorius producto, abdomine dimidio brevior. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 17. mant. inf. 2. p. 265. n. 27.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 424. n. 19. Cicada thorace inermi pone producto.*  
*Habitat in Angliae genista tinctoria.*
- inermis. 57. C. thorace virescente posteriorius subulato longitudine abdominis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 16. mant. inf. 2. p. 265. n. 26.*  
*Habitat in Americae plantis.*
- mutica. 58. C. thorace ferrugineo posteriorius producto carinato longitudine abdominis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 15. mant. inf. 2. p. 265. n. 25.*  
*Habitat in America boreali.*
- convoluta. 59. C. thorace laevi virescente: margine flavo posteriorius producto abdomine longiore. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 14. mant. inf. 2. p. 265. n. 24.*  
*Habitat in Brasilia, mediae magnitudinis, flavo capite, thorace flavescente, apice atro.*

- arcuata. 60. *C. nigro fusca*, thorace compresso verticali: arcu flavescente.  
*Degeer inf.* 3. p. 206. n. 9. t. 32. f. 10.  
*Habitat in Surinamo.*
- fusca. 61. *C. tota fusca*, thorace compresso verticali. *Degeer inf.*  
3. p. 208. n. 10. t. 32. f. 14.  
*Habitat in Surinamo.*
- gibbosa. 62. *C. nigra*, thorace carinato gibbo, anterieus obtuso, po-  
sterius acuto, elytris flavo-lividis, pedibus fulvis. *De-*  
*geer inf.* 3. p. 311. n. 13. t. 32. f. 20. 21.  
*Forst. nov. inf. spec.* 1. p. 67. n. 67. Cicada carinata.  
*Habitat in America.*
- binotata. 63. *C. thorace subinermi posterius producto*, abdomine bre-  
viore testaceo, elytris macula bascos nigra. *Fabr. sp.*  
*inf.* 2. p. 318. n. 12. *mant. inf.* 2. p. 265. n. 22.  
*Habitat in nova Hollandia.*

†† thorace utrinque cornuto: Cruciatæ.

- Crux. 5. *C. thorace cruciformi corpus totum tegente.* *Mus. Lud.*  
*Ulr.* 154.\*  
*Habitat in America australi et India.*
- hastata. 64. *C. thoracis cornu supra caput porrecto compresso carina-*  
*to, corpore griseo.* *Fabr. mant. inf.* 2. p. 263. n. 9.  
*Habitat in America meridionali, parva.*
- lanceo- 65. *C. thoracis cornu supra caput porrecto incurvo, corpore*  
*lata. atro: maculis duabus dorsalibus albis.* *Fabr. mant. inf.*  
2. p. 263. n. 10.  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- spinosa. 66. *C. thorace tricorni posterius producto longitudine alarum.*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 316. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 263. n. 11.  
*Subz. hist. inf.* 1. p. 9. f. 6.  
*Habitat in America australi et India.*
- acumina- 67. *C. thorace tricorni: cornu intermedio longiori compresso.*  
*ta. Fabr. sp. inf.* 2. p. 317. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 263. n. 12.  
*Habitat in Pennsylvania.*
- cornuta. 6. *C. thorace bicorni nigro posterius subulato longitudine ab-*  
*dominis, alis fuscis.* *En. jucc.* 879.\* *Scop. ent. carn.* 435.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 317. n. 9. *mant. inf.* 2. p. 264. n. 19.  
*Geoffr.*

*Geoffr. inf. par. 2. p. 423. n. 18.* Cicada thorace acute bicorni, pone producto.

*Schreb. inf. 7. f. 3. 4.* Cicada cornuta.

*Degeer inf. 3. p. 181. n. 3. t. 11. f. 22.* Cicada fusca.

*Petiv. gazoph. t. 47. f. 2. 3.* Ranatra cornuta.

*Sulz. inf. t. 10. f. 63.*

*Schaeff. ic. t. 96. f. 2.*

*Habitat in carduis, falicibus.*

Taurus. 68. C. thorace bicorni fusco posteriorius producto filiformi longitudine abdominis: cornubus arcuatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 10. mant. inf. 2. p. 264. n. 20.*  
*Habitat in Coromandel.*

Vitulus. 69. C. thorace bicorni viridi posteriorius subulato longitudine abdominis, alis albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 11. mant. inf. 2. p. 265. n. 21.*  
*Habitat in America.*

Bonasia. 70. C. thorace bicorni posteriorius producto: margine albo, alis puncto baseos albo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 13. mant. inf. 2. p. 265. n. 23.*  
*Habitat in America.*

aurita. 7. C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato rotundato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 7. mant. inf. 2. p. 263. n. 13.*

*Geoffr. inf. par. 2. p. 422. n. 17.* Cicada thorace obtuse bicorni.

*Schreb. inf. 8. f. 1. 2.* Cicada cristata, thorace bicorni, corniculis subrotundis.

*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 7.*

*Schaeff. icon. t. 96. f. 3.*

*Habitat in quercu, corylo, tabani magnitudine, tota cinerea.*

sinensis. 71. C. thorace bicorni posteriorius producto abdomine longiori atro: margine flavescente. *Fabr. mant. inf. 2. p. 263. n. 14.*

*Stoll cicad. 1. t. 11. f. 53. B.*

*Habitat in Sina, magna.*

horrida. 72. C. thorace bicorni posteriorius producto bicalvato apice tripinolo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 264. n. 15.*

*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*

2096 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Mannifera*.) *Tettigonia*.

- trifida. 73. *C. pilosa*, thorace quadricorni posterius producto trifido: laciniis subulatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 264. n. 16.*  
*Habitat in Cayenna, magnitudine c. tauri.*
- clavata. 74. *C. thorace quadricorni posterius producto trifido: laciniis lateralibus ante apicem clavatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 264. n. 17.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- brasilien- 75. *C. thorace bicorni albo punctato posterius producto abdomine longiori. Fabr. sp. inf. 2. p. 317. n. 8. mant. inf. 2. p. 264. n. 18.*  
fis. *Habitat in Brasilia.*
- \*\* non saltantes, Manniferae, Tettigoniae Fabricii.
- ciliaris. 8. *C. alis posterioribus ferrugineo-fuscis: vittis longitudinalibus luteis, abdominis segmentis ciliatis. Mus. Lud. Ulr. 155.\**  
*Rumpf amb. 3. p. 210. t. 135? Folium ambulans.*  
*Habitat in America australi et India.*
- fornicata. 11. *C. thorace virescente, abdomine fornicato. Mus. Lud. Ulr. 156.\**  
*Habitat in America australi et India.*
- stridula. 12. *C. elytris margine dilatato: punctis septem albis. Mus. Lud. Ulr. 157.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 320. n. 9. mant. inf. 2. p. 266. n. 13.*  
*Cicada villosa, elytris griseis, alis flavis: omnibus margine hyalino.*  
*Drury inf. 2. t. 37. f. 2. Cicada catenata.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- cingulata. 76. *C. thorace maculato, elytris hyalinis: costa maculaque fuscis, abdomine atro: fasciis flavis. Fabr. sp. inf. 2. p. 310. n. 10. mant. inf. 2. p. 266. n. 14.*  
*Habitat in nova Seelandia.*
- villosa. 77. *C. thorace fusco viridique variegato, pectore albo villoso. Fabr. sp. inf. 2. p. 320. n. 11. mant. inf. 2. p. 267. n. 15.*  
*Habitat ad caput bonae spei, minor, fronte viridi, utrinque atro-friata.*
- eruentata. 78. *C. thorace variegato, elytris hyalinis: costa flavescente, abdomine atro: fasciis sanguineis. Fabr. sp. inf. 2. p. 320. n. 12. mant. inf. 2. p. 267. n. 16.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

79. *C.*

INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (Mannifera.) *Tettigonia*. 2097

- conspur- 79. *C. atra*, elytris basi flavo maculatis, ano flavo. *Fabr. sp.*  
cata. *inf. 2. p. 320. n. 13. mant. inf. 2. p. 267. n. 17.*  
*Habitat in India.*
- capensis. 13. *C. alis inferioribus limbo posteriore fuscescente palmato*  
*pieto. Mus. Lud. Ulr. 158.*  
*Petiv. gaz. 7. t. 4. f. 1. Cicada capensis variegata, margi-*  
*nibus transparentibus.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- haemato- 14. *C. nigra immaculata, abdominis incisuris sanguineis. Fabr.*  
des. *sp. inf. 2. p. 320. n. 14. mant. inf. 2. p. 267. n. 18. Scop.*  
*ent. carn. 347.*  
*Petiv. gazoph. t. 15. f. 7.*  
*Gron. zooph. 675.*  
*Fuessli inf. helv. p. 24. n. 452.*  
*Stoll cicad. t. 2. f. 11.*  
*Habitat in Europa magis australi, mediae magnitudinis,*  
*gibbosa.*
- plebeja. 15. *C. scutelli apice bidentato, elytris anastomosibus quatuor*  
*lineisque sex ferrugineis. Scop. entom. carn. 345.*  
*Mouff. inf. 127. Rœv. XXV. f. 4. } Tom. II.*  
*Aldrov. inf. 307. XXVI. f. 4. 6. 7. 8.*  
*Matthiol. Diosc. 264.*  
*Habitat in Italia, Africa, maxima.*  
*Et cantu querulae rumpent arbusa cicadae. Virgil.*
- orni. 16. *C. elytris intra marginem tenuiorem punctis sex concate-*  
*natis anastomosibusque interioribus fuscis. Scop. ent.*  
*carn. 346.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 320. n. 15. mant. inf. 2. p. 267. n. 19.*  
*Cicada nigra flavo maculata, alis albis basi flavis: macu-*  
*lis duabus nigris.*  
*Reaum. inf. 5. t. 5. f. 16-19.*  
*Seb. mus. 4. t. 85. f. 4. 5.*  
*Roef. inf. 2. gryll. t. 25. f. 1. 2. XXVI. f. 3. 5.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 65.*  
*Schaeff. icon. t. 4. f. 14.*  
*Habitat in Europa australi; larva eduli.*  
*Sole sub ardenti resonant arbusa cicadis. Virgil.*
- repanda. 17. *C. elytris linea flexuosa, alis margine hyalino. Mus.*  
*Lud. Ulr. 159.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 321. n. 16. mant.*  
*inf. 2. p. 267. n. 20.*

*Degeer inf. 3. p. 219. n. 15. t. 33. f. 1. Cicada nigra.*  
*Habitat in India.*

reticulata. 18. *C. grisea*, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 321. n. 17. mant. inf. 2. p. 267. n. 21.*  
*Degeer inf. 3. p. 227. n. 24. t. 23. f. 15. 16. Cicada fusco-*  
*testacea.*  
*Habitat in America meridionali.*

atrata. 80. *C. atra* alis albis basi nigris: venis testaceis. *Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 321. n. 18. mant. inf. 2. p. 267. n. 22.*  
*Habitat in Sina.*

sanguinea. 81. *C. nigra*, ore, thoracis maculis duabus abdomineque san-  
 guineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 321. n. 19. mant. inf. 2. p.*  
*267. n. 24.*  
*Degeer inf. 3. p. 221. n. 18. t. 33. f. 17. Cicada sanguinea.*  
*Habitat in Sina.*

testacea. 82. *C. nigra*, abdomine sanguineo, elytris alisque testaceis:  
 venis nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 267. n. 23.*  
*Stoll cicad. 1. t. 8. f. 41. C.*  
*Habitat Tranquebariae, mediae magnitudinis.*

splendi- 83. *C. elytris fusco-aureis*, tibiis anterioribus incrassato den-  
 dula. tatis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 321. n. 20. mant. inf. 2.*  
*p. 267. n. 25.*  
*Habitat in Sina.*

muta. 84. *C. elytris hyalinis*: colla sanguinea, abdomine linea dor-  
 sali sanguinea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 21. mant. inf.*  
*2. p. 267. n. 26.*  
*Habitat in nova Seelandia.*

grossa. 85. *C. thorace viridi nigro sublineato*, alis albis posterioribus  
 macula baseos flava. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 1. mant.*  
*inf. 2. p. 265. n. 1.*  
*Habitat in Brasilia.*

javana. 86. *C. capite thoraceque nigris rufo maculatis*, elytris nigris:  
 fascia abbreviata alba. *Fabr. mant. inf. 2. p. 265. n. 2.*  
*Stoll cicad. 1. t. 4. f. 17.*  
*Habitat in Java, magna.*

grisea. 87. *C. grisea*, elytris aqueis: margine posteriori nigro pun-  
 ctato, colla anterieus alba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 318. n. 2.*  
*mant. inf. 2. p. 265. n. 3.*  
*Habitat in insulis Americae oppositis.*

88. *C.*

- limbata. 88. *C. thoracis* margine dilatato acuto, alis atris: margine albo.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 3. mant. inf. 2. p. 265. n. 4.*  
*Stoll cicad. 1. t. 12. f. 57.*  
*Habitat in America.*
- dilatata. 89. *C. atra*, thoracis margine dilatato, alis albidis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 4. mant. inf. 2. p. 266. n. 5.*  
*Habitat in Jamaica.*
- bispinosa. 90. *C. fusca*, thorace utrinque unispinosa, elytris obscuris: striga maculari nigra. *Fabr. mant. inf. 2. p. 266. n. 6.*  
*Habitat in Sumatra, magna.*
- vaginata. 91. *C. testacea*, elytris albidis: costa nigra, *Fabr. mant. inf. 2. p. 266. n. 7.*  
*Habitat in Sumatra, magna.*
- Tibicen. 19. *C. elytris* anastomosibus ferrugineis, scutelli apice emarginato. *Mus. Lud. Ulr. 160.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 5. mant. inf. 2. p. 266. n. 8. Tettigonia* scutello emarginato, alarum costa virescente.  
*Degeer inf. 3. p. 212. n. 14. t. 22. f. 23. Cicada Lyricca.*  
*Brown jam. 436. t. 43. f. 15. Panorpa.*  
*Marcgr. bras. 256. Gueruca Eremenbi.*  
*Merian. inf. surin. t. 49. Tibicen.*  
*Seb. mus. 4. t. 85. f. 9. 10.*  
*Habitat in America, thorace nunc nigro, nunc nigro brunneoque vario.*
- septendecim. 20. *C. nigro virescens*, elytris margine flavescente, capite utrinque octoftriato.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 6. mant. inf. 2. p. 266. n. 9. Tettigonia* nigra, elytris albis, costa flava.  
*Kalm act. Stockh. 1756. p. 101. Cicada* maxilla utraque lineis octo transversis concavis, alarum margine inferiore lutescente.  
*Collins. act. angl. 1765. p. 65. t. 8.*  
*Habitat in America.*
- catena. 92. *C. thorace* variegato, elytris hyalinis anterieus nervis punctatis, posterius strigis duabus undatis fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 7. mant. inf. 2. p. 266. n. 10.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

- pustulata. 93. *C. atra*, capite thoraceque rubro maculatis, elytris fuscis basi obscurioribus: venis testaceis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 266. n. 11.*  
*Habitat in America meridionali, magna.*
- maculata. 94. *C. atra*, thorace elytris alisque flavo maculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 319. n. 8. mant. inf. 2. p. 266. n. 12.*  
*Drury inf. 2. t. 37. f. 1.*  
*Habitat in Siria.*
- violacea. 21. *C. violacea*, alis apice fuscis. *Mus. Lud. Ulr. 162.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 22. mant. inf. 2. p. 267. n. 27.*  
*Fuessli inf. helv. p. 24. n. 455.*  
*Habitat in Europa magis australi.*
- querula. 95. *C. capite thoraceque griseis: characteribus maculisque nigris.* *Pallas it. 2. app. n. 83.*  
*Habitat in australibus circa fluvium Ural, haematodi affinis.*
- prafina. 96. *C. dilute viridis, thoracis maculis fuscis inauratis.* *Pallas it. 2. app. n. 84.*  
*Habitat in desertis magis australibus circa fluvios Ural et Irtis, Junio frequens, querula minor.*
- marginel-  
 la. 97. *C. pallida, thoracem inter et alas nigra: macula alba acuminata, thorace marginato.* *Scop. entom. carn. p. 116. n. 342.*  
*Habitat in Carnioliae salicetis.*
- graminis. 98. *C. elytris albidis: lineis tribus ocellisque duodecim.* *Scop. ent. carn. p. 116. n. 343.*  
*Habitat in Carnioliae gramine.*
- notata. 99. *C. pallide flavicans, elytris albidis nigro punctatis.* *Scop. ent. carn. p. 117. n. 344.*  
*Habitat in Carnioliae plantis variis.*
- montana. 100. *C. abdominis segmentis margine rubellis.* *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 109. n. 108.*  
*Habitat in Carnioliae montanis circa Idriam, c. orni duplo minor.*
- Schaeffe-  
 ri. 101. *C. ex fusco lutea, elytris alisque flavo-fenestratis.* *Schaeff. icon. 2. t. 121. f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*



\*\*\* *antennis filiformibus, sub oculis insertis.*

† *rostri vagina porrecta, obtusa, superne canaliculata.*  
Cercopides Fabricii.

- afra. 102. *C. elytris fusco-griseis; macula marginali fulva cinereaque.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 328. n. 1. mant. inf. 2. p. 273. n. 1. Cer-*  
*copis grossa.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, in hac tribu magna.*
- atra. 103. *C. atra, elytris utrinque vitta marginali sanguinea.* *Fabr.*  
*mant. inf. 2. p. 273. n. 2.*  
*Habitat in America meridionali, magna.*
- maculosa. 104. *C. thorace atro: fascia fulva, elytris fulvis: maculis api-*  
*ceque nigris.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 2. mant. inf. 2.*  
*p. 273. n. 3.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura aefrae.*
- quadrifaf- 10. *C. flava: fasciis quatuor fuscis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 329.*  
ciata. *n. 6. mant. inf. 2. p. 274. n. 9.*  
*Degeer inf. 3. p. 225. n. 21. t. 33. f. II. Cicada flava, fasci-*  
*is quatuor transversis nigris.*  
*Habitat in America meridionali.*
- bifascia- 11. *C. flavescens elytris fuscis: fasciis duabus albis.* *Fabr. sp.*  
ta. *inf. 2. p. 330. n. 13. mant. inf. 2. p. 275. n. 20.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 706. n. 11. Fn. suec. 898.\* Fn. suec. I.*  
*n. 633. Cicada fusca, fasciis alarum binis albis.*  
*Degeer inf. 3. p. 186. n. 6. t. II. f. 25. Cicada trifasciata.*  
*Habitat in Europae borealis plantis.*
- sanguino- 22. *C. atra, elytris maculis duabus fasciaque sanguineis.* *Fabr.*  
lenta. *sp. inf. 2. p. 329. n. 3. mant. inf. 2. p. 274. n. 4. Scop.*  
*ent. carn. 330.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 418. t. 8. f. 5. Cicada nigra, elytris*  
*maculis sex rubris.*  
*Goeze Naturf. 6. t. 2.*  
*Fuessli inf. Helv. p. 24. n. 456.*  
*Habitat in Europae salicibus et gramine.*
- Schach. 105. *C. nigra, elytris fuscis: fascia interrupta sanguinea.* *Fabr.*  
*mant. inf. 2. p. 274. n. 5.*  
*Habitat in America septentrionali, statura sanguinolentae.*

23. C.

*An huic etiam inferendae tanquam propriae species cicadae a Seba musci vol. 4. deli-*  
*neatae, fusca t. 85. f. 1. 2. albo-guttata t. 85. f. 3. 4. scutata t. 85. f. 7. 8.*  
*et fusco-maculata t. 85. f. 11. 12?*

- coleoptra-23. *C. elytris totis coriaceis alas obtegentibus griseis fusco irroratis. Fabr. sp. inf. 2. p. 330. n. 9. mant. inf. 2. p. 274. n. 14.*  
*Habitat in Germaniae plantis, mediae magnitudinis, capite thoraceque flavescens, abdomine fusco.*
- rustica. 106. *C. grisea immaculata, alis albis. Fabr. sp. inf. 2. p. 330. n. 10. mant. inf. 2. p. 275. n. 15.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- gibba. 107. *C. nigra, elytris albo maculatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 334. n. 11. mant. inf. 2. p. 275. n. 16.*  
*Habitat in Daniae nemoribus.*
- biguttata. 108. *C. nigra flavo-maculata, elytris fuscis: puncto marginali albo. Fabr. sp. inf. 2. p. 325. n. 22. mant. inf. 2. p. 275. n. 17.*  
*Habitat in Germania, statura leucophthalmae.*
- kilonien-109. *C. flavescens, elytris obscuris: fascia maculisque duabus fis. oppositis albidis. Fabr. mant. inf. 2. p. 275. n. 18.*  
*Habitat Kilonii, statura et magnitudine biguttatae.*
- unifascia-110. *C. cinerea, elytris fascia obliqua fusca. Fabr. sp. inf. 2. ta. p. 330. n. 12. mant. inf. 2. p. 275. n. 19.*  
*Habitat in agro Pedemontano, gibba major.*
- spumaria. 24. *C. fusca, elytris maculis binis albis lateralibus: fascia duplici interrupta albida. Fn. suec. 881.\* Scop. ent. carn. 331. Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 7. mant. inf. 2. p. 274. n. 10. Fuessli inf. helv. n. 450.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 415. n. 2. Cicada fascia duplici albida interrupta transversa.*  
*Degeer inf. 3. p. 163. n. 1. t. 11. f. 1-21. Cicada spumaria graminis.*  
*Degeer act. Stockh. 1741. p. 221. t. 7.*  
*Reaumur act. paris. 1705. p. 162.*  
*Raj. inf. 67.*  
*Swammerd. quart. p. 83.*  
*bibl. 1. p. 215.*  
*Merian. inf. 77. t. 51.*  
*Petiv. gazoph. t. 61. f. 9.*  
*Blanck. inf. 97. t. 11. f. N. O. P.*  
*Frijch inf. 8. p. 26. t. 12.*  
*Roef. inf. 2. gryll. p. 139. t. 23.*

Sulz.

*Sulz. inf. t. 10. f. 64.*

*Schaeff. elem. t. 42.*

*Habitat in Europae plantis variis, frequens in rosis, graminibus, salice viminali, more plurimum hujus et sequentis tribus ramis insidendo ano evacuaus numerosas vesiculas, quasi spumam, intra quam latitat.*

- aurea. III. *C. cinereo-aurea nitida immaculata. Fabr. mant. inf. 2. p. 274. n. 11.*  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- hafnien- II2. *C. nigra, capite, thorace clytrorumque margine albis.*  
 sis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 274. n. 12.*  
*Habitat Hafniae, statura spumariae.*
- albifrons. 27. *C. nigra, fronte alba. Fn. succ. 884.\**  
*Habitat in Europa, an hujus tribus?*
- striata. 30. *C. elytris albido nigroque ad angulum acutum futurae dorsalis striatis. Fn. succ. 887.\**  
*Raj. inf. 68. n. 1.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 424. n. 20.*  
*Habitat in Europa, an ex hac tribu.*
- lineata. 31. *C. flavescens, coleoptris striis tribus nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 330. n. 8. mant. inf. 2. p. 274. n. 13.*  
*Syfl. nat. XII. 2. p. 709. n. 31? Fn. succ. 888? Cicada exalbida; linea utrinque longitudinali nigra.*  
*Habitat in Europa, mediae magnitudinis.*
- populi. 32. *C. subtus flavescens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis. Fn. succ. 890.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 331. n. 14. mant. inf. 2. p. 275. n. 21.*  
*Cercopis nebulosa, vertice punctis duobus, abdomineque basi atris.*  
*Habitat in Europae borealis plantis.*
- rubra. 45. *C. alis deflexis fuscis: fasciis duabus flavis.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 4. mant. inf. 2. p. 274. n. 6. Cercopis (cruentata) rufa, clytris nigris: fasciis duabus flavis.*  
*Degeer inf. 3. p. 224. n. 20. t. 33. f. 8.*  
*Stoll cicad. t. 2. f. 10. C.*  
*Habitat in America meridionali, alis inferioribus hyalinis immaculatis.*

- Carnifex. 113. *C. fanguinea*, thorace macula, elytris fasciis duabus nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 329. n. 5. mant. inf. 2. p. 274. n. 7.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- varia. 114. *C. capite thoraceque virescentibus*, elytris fuscis: maculis duabus bateos strigaque posteriore flavis. *Fabr. mant. 2. p. 274. n. 8.*  
*Habitat in Cayenna, atra, abdomine rufo.*
- lineolata. 208. *C. elytris griseis fusco lineolatis: disci litura transversa.*  
*Mus. Lesk. p. 117. n. 46.*  
*Habitat in Europa.*
- guttata. 209. *C. fusca*, elytris maculis lacteis. *Mus. Lesk. p. 117. n. 47.*  
*Habitat in Europa.*
- unicolor. 210. *C. pallida immaculata.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 48.*  
*Habitat in Europa.*
- bicolor. 211. *C. grisea*, thorace supra sanguineo. *Mus. Lesk. p. 117. n. 49.*  
*Habitat in Europa.*
- punctulata. 212. *C. fusca*, thorace anterieus punctis impressis, elytris maculis duabus albis lateralibus. *Mus. Lesk. p. 117. n. 50.*  
*Habitat in Europa.*
- leucoptera. 213. *C. elytris albis: striis fuscis interruptis.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 51.*  
*Habitat in Europa.*
- venosa. 214. *C. alis hyalinis albo venosis: posterius fasciis duabus fuscis irregularibus.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 52.*  
*Habitat in Europa.*
- nebulosa. 215. *C. alis albis luteo-nebulosis.* *Mus. Lesk. p. 117. n. 53.*  
*Habitat in Europa.*
- †† *rostri vagina brevissima, membranacea, cylindrica, obtusa, Cicadae Fabricii.*
- † *saltatoriae, Ranatrae.*
- perspicillata. 115. *C. atra*, alis macula ocellari albo-hyalina, abdomine apice flavo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 1. mant. inf. 2. p. 268. n. 1.*  
*Stoll cicad. 1. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in India, in hac tribu magna.*

- elongata. 116. C. thorace rubro flavo lineato, elytris longiffimis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 324. n. 16. mant. inf. 2. p. 270. n. 22.*  
*Habitat in nova Hollandia, parva, gibba.*
- cayen- 117. C. capite thoraceque fusco-aureis nigro variis, elytris  
 nensis. hyalinis apice obscurioribus: macula aurea. *Fabr. mant. inf. 2. p. 269. n. 20.*  
*Habitat in Cayenna, fusca, femoribus posterioribus flavis, statura ferrugineae.*
- aurulenta. 118. C. capite thoraceque rufis, elytris fuscis apice cinereis.  
*Fabr. mant. inf. 2. p. 269. n. 19*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine obtusae.*
- obtusa. 119. C. nigra, elytris apice cinereo-hyalinis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 269 n. 18.*  
*Habitat in Cayenna, statura ferrugineae.*
- ferrugi- 120. C. capite, thorace scutelloque nigro punctatis, elytris ru-  
 nea. fis, alis atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 269 n. 17.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*
- nervosa. 25. C. fusca, alis hyalinis fusco maculatis: nervis punctatis.  
*Fn. succ. 882.\* Scop. ent. carn. 341. Fuesli inf. Helv. p. 24. n. 459.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 35. mant. inf. 2. p. 272. n. 48.*  
 Cicada alis fuscis, nervis albo nigroque punctatis.  
*Degeer inf. 3. p. 182. n. 4. t. 12. f. 1. 2. Cicada nervoso-punctata.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 415. n. 1.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- variegata. 121. C. atra viridi variegata, alis hyalinis: punctis tribus co-  
 stalibus nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 36. mant. inf. 2. p. 272. n. 49.*  
*Habitat in Germania.*
- lyncea. 122. C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellaribus  
 nigris, elytris hyalinis: margine flavescente. *Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 37. mant. inf. 2. p. 272. n. 50.*  
*Habitat in India.*
- fulgida. 123. C. flava, elytris fusco-auratis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 38. mant. inf. 2. p. 272. n. 51.*  
*Habitat in Angliae plantis.*

- punctata. 124. *C. elytris flavescens fusco punctatis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 39. mant. inf. 2. p. 272. n. 52.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 417. n. 4. Cicada fusco-pallida &c.*  
*Habitat in Europae nemoribus.*
- leucophthalma. 26. *C. nigra, oculis albis.* *Fn. suec. 883.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 325. n. 21. mant. inf. 2. p. 270. n. 28.*  
*Habitat in Europae borealis plantis.*
- leucocephala. 28. *C. nigra, capite albo.* *Fn. suec. 885.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 325. n. 23. mant. inf. 2. p. 270. n. 29.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 421. n. 13.*  
 β) *Schaeff. ic. t. 237. f. 6.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- lateralis. 29. *C. nigra, elytris latere albis.* *Fn. suec. 886.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 324. n. 18. mant. inf. 2. p. 270. n. 24. Fuesli inf. helv. p. 24. n. 460.*  
*Raj. inf. 68. 2. Locusta pulex fusca, utrinque in lateribus alarum arcu albicante.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 416. n. 3.*  
*Habitat in Europae pratis.*
- bimaculata. 125. *C. supra nigra, scutello elytrorum maculis duabus dorsalibus margineque exteriori flavescens.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 325. n. 19. mant. inf. 2. p. 270. n. 25.*  
*Habitat in Brasilia.*
- fenestrata. 126. *C. supra nigra, capite scutelloque flavis, elytrorum margine hyalino.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 325. n. 20. mant. inf. 2. p. 270. n. 26.*  
*Habitat in insula Tahiti oceani australis.*
- flavipes. 127. *C. nigra, capite pedibusque flavis, elytris apice hyalinis nigro striatis.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 270. n. 27.*  
*Habitat in insula Rotterdam oceani australis, fenestratae proxime affinis.*
- flavicollis. 33. *C. fusca, capite thoraceque flavis.* *Fn. suec. 891.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 325. n. 25. mant. inf. 2. p. 271. n. 33.*  
*Cicada nigra, capitis margine posteriori thoraceque flavis*  
*Habitat in Europae graminibus.*
- flava. 34. *C. flava unicolor.* *Gron. zooph. 681.*  
*Habitat in Europa,*

- interru- 35. *C. elytris flavis*: linea nigra duplici interrupta longitudi-  
pta. nali. *Fz. suec.* 889.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 325. n. 24.  
*mant. inf.* 2. p. 270. n. 30.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 419. n. 9.  
*Petiv. gazoph. t.* 61. f. 10.  
*Degeer inf.* 3. p. 186. n. 7. t. 12. f. 6.  
*Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 462.  
*Habitat frequens in Europae plantis.*
- Hybneri. 128. *C. pallida*, capite thoraceque nigro punctatis, elytris  
lineatis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 270. n. 31.  
*Habitat Halae Saxonum, statura interruptae.*
- abbrevia- 129. *C. flavescens*, elytris cinereis: vitta abbreviata atra. *Fabr.*  
ta. *mant. inf.* 2. p. 271. n. 32.  
*Habitat Hafniae, statura interruptae.*
- vittata. 36. *C. flava*: vitta ferruginea longitudinali duplici repando-  
dentata. *Fz. suec.* 889.\* *Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 463.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 324. n. 17. *mant. inf.* 2. p. 270. n. 23.  
*Habitat in Europae hortis.*
- Lanio. 37. *C. viridis*, capite thoraceque carneis. *Fuessli inf. helv.*  
p. 24. n. 464. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 326. n. 27. *mant. inf.* 2.  
p. 271. n. 38.  
*Habitat in Europae plantis.*
- ochrome- 130. *C. nigra*, capite fasciis duabus flavis, elytris albo striatis.  
las. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 271. n. 39.  
*Habitat in Kilonii plantis, statura viridis.*
- ignita. 131. *C. virescenti-nitidula*, capite scutello abdomineque fulvis.  
*Fabr. mant. inf.* 2. p. 272. n. 40.  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- turca. 132. *C. atra*, abdomine flavo, alis apice fuscis: lunula  
hyalina. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 326. n. 28. *mant. inf.* 2.  
p. 272. n. 41.  
*Habitat in Europae plantis.*
- maura. 133. *C. nigra*, pectore abdomineque sanguineis. *Fabr. sp.*  
*inf.* 2. p. 326. n. 29. *mant. inf.* 2. p. 272. n. 42.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- nebulosa. 134. *C. nigra*, elytris hyalinis basi fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2.  
p. 326. n. 30. *mant. inf.* 2. p. 272. n. 43.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

- hyalina. 135. *C. fusca*, elytris fascia abbreviata margineque posteriori hyalinis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 326. n. 31. mant. inf. 2. p. 272. n. 44.*  
*Fabr. syst. entom. p. 688. n. 1. Cercopis fenestrata.*  
*Habitat in India.*
- pellucida. 136. *C. grisea*, elytris fascia media hyalina. *Fabr. sp. inf. 2. p. 326. n. 32. mant. inf. 2. p. 272. n. 45.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- cynosbatos. 137. *C. fusca*, alis albo-hyalinis: margine fusco punctato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 33. mant. inf. 2. p. 272. n. 46.*  
*Habitat in Daniae rosis.*
- ferratulae. 138. *C. flava*, elytris albis: puncto fasciisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 327. n. 34. mant. inf. 2. p. 272. n. 47.*  
*Habitat in Angliae carduis.*
- aptera. 38. *C. aptera atra*, elytris abbreviatis, tibiis antennisque pallidis. *Fn. suec. 894.\**  
*Habitat in Sudermania ad Akeroum, pulicis magnitudine.*
- tricolor. 139. *C. elytris lacteis: punctis nigris, capite thoraceque virentibus.* *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 21. n. 36.*  
*Habitat Upsaliae frequens et Lutatiis, pediculo vix duplo major.*
- reticulata. 140. *C. elytris hyalinis fusco reticulatis, capite thoraceque albis nigro maculatis.* *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 21. n. 37.*  
*Habitat Upsaliae, interrupta paulo major.*
- variabilis. 141. *C. elytris fusco-flavescentibus: margine maculis duabus pallidis, capite thoraceque flavescentibus.* *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 22. n. 38.*  
*Habitat frequens Upsaliae, interrupta vix major, elytris nunc flavescentibus, nunc fusco flavoque variis, nunc fuscis.*
- cineta. 142. *C. elytris fuscis: margine maculis duabus albis, capite thoraceque fuscis.* *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 23. n. 39.*  
*Habitat Upsaliae, magnitudine nervosae, variabili sextuplo major.*
- exclamationis. 143. *C. elytris nigris: linea punctoque albis, capite thoraceque nigris.* *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 24. n. 40.*  
*Habitat Upsaliae, bifasciatae magnitudine, supra nigra, subtus flavescens.*



- guttata. 144. *C. fusco varia*, capite thorace elytrisque ferrugineis: punctis flavis alisque, tergo coccineo. *Forst. nov. inf. sp. I. p. 68. n. 68.*  
*Habitat in America septentrionali, magnitudine spumariae, an ejusdem tribus?*
- cruenta. 145. *C. capite thorace alisque subfuscis, abdomine nigro, elytris ruberrimis apice flavis.*  
*Drury inf. 2. p. 73. t. 38. f. 5. 6. Cicada sanguinea.*  
*Habitat in Jamaica.*
- falicina. 146. *C. grisea, pedibus rufo-testaceis.*  
*Degeer inf. 3. p. 180. n. 2. Cicada spumaria falicis.*  
*Habitat in falice, an ad cercopides releganda?*
- muscae-formis. 147. *C. fronte quadrata, thorace brevissimo, scutello albido: punctis duobus impressis, alis fusciscentibus: basi fasciaque abrupta albis. Schranck inf. austr. p. 253. n. 482.*  
*Habitat in Aultria superiore, infra 3 lineas longa.*
- bicincta. 148. *C. pallide fusca, capite thoraceque fascia albida. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 75. §. 26. inf. austr. p. 254. n. 483.*  
*Habitat in Aultria superiori, infra 3 lineas longa.*
- decima-quarta. 149. *C. pallida, elytris numero 14 nigro notatis. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 76. §. 28. inf. austr. p. 254. n. 485.*  
*Habitat in Aultria, infra 3 lineas longa.*
- quadri-maculata. 150. *C. ferruginea, elytris ad marginem exteriorem maculis duabus albis. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 77. §. 30. inf. austr. p. 254. n. 486.*  
*Habitat Siennae aultriae, 2½ lineas longa.*
- Schranckii. 151. *C. fusca subtus flava, alis hyalinis: apice nervis nigris feneltratis. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 74. §. 24. inf. austr. p. 255. n. 487.*  
*Habitat in Aultria superiore, 2½ lineas longa.*
- aultriaca. 152. *C. nigra, pedibus pallidis, oculorum basi alba, alis hyalinis: fasciis subtribus nigris. Schranck Beytr. zur Naturg. p. 73. §. 23. inf. austr. p. 255. n. 488.*  
*Habitat in Aultria, 2½ lineas longa.*
- haemorrhousa. 153. *C. nigra, thorace maculis duabus sanguineis. Schranck inf. austr. p. 256. n. 490.*  
*Habitat in Aultriae arbutis, vix ultra 2 lineas longa.*

- trilineata. 154. *C. ferruginea*, lineis tribus longitudinalibus nigris. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 75. §. 27. inf. austr. p. 258. n. 496.*  
*Habitat in Austria superiore.*
- erythro- 155. *C. flavescens*, oculis rubris, tibiis anterioribus nigro mar-  
thralma. ginatis, alis hyalinis: lineolis obscuriutculis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 77. §. 31. inf. austr. p. 258. n. 498.*  
*Habitat in Austria.*
- melano- 156. *C. sulphurea*, capite punctis duobus, elytris maculis ali-  
ficta. quot nigris: apice fulco. *Schranck inf. austr. p. 259. n. 499.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 426.*  
*Habitat in Austria superiore et Gallia, sesquilineam longa.*
- arunci. 157. *C. tota ferruginea*, oculis fuscis. *Scop. ent. carn. p. 113. n. 332.*  
*Habitat in Spiraea Arunco.*
- margina- 158. *C. fusca*, elytri margine externo pedibusque flavescenti-  
lis. bus, corpore luteo. *Scop. ent. carn. p. 113. n. 333.*  
*Habitat in Carniolia.*
- bicorda- 159. *C. elytris nigris: latere utroque et linea media, pedibus-*  
ta. *que flavis. Scop. ent. carn. p. 114. n. 334.*  
*Habitat in Carnioliae corylo, frontis macula media nigra, cujus apici utrique insidet macula obcordata nigra.*
- oenothe- 160. *C. flavescens*, oculis nigris, elytris rivulis fuscis. *Scop.*  
rae. *ent. carn. p. 114. n. 336.*  
*Habitat in Carnioliae oenothera bienni, spumans, spumaria major; an ex cercopidum tribu?*
- carnioli- 161. *C. nigricans*, elytris margine omni lineolisque tribus lon-  
ca. gitudinalibus luteis. *Scop. ent. carn. p. 114. n. 337.*  
*Habitat in Carnioliae fruticibus.*
- pallida. 207. *C. pallida* thorace punctis sex impressis. *Geoffr. inf. par.*  
*I. p. 419. n. 8.*  
*Habitat in Gallia et Calabria.*
- biguttata. 216. *C. nigra*, thorace utrinque gutta sanguinea. *Mus. Lesk.*  
*p. 116. n. 20.*  
*Habitat in Europa.*

- rivulosa. 217. *C. testacea*, elytris ferrugineo variis: rivulis transversis albis. *Mus. Lesk. p. 116. n. 25.*  
*Habitat in Europa.*
- frigosa. 218. *C. scutello thoraceque transversim strigoso rufescentibus, elytris fusco, rufo cinereoque variis, ano setoso, pedibus posterioribus longis: tibiis ipinis ciliatis.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 26.*  
*Habitat in Europa.*
- casta. 219. *C. fusco-pallida immaculata.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 28.*  
*Habitat in Europa.*
- quadri-  
striata. 220. *C. elytris nervosis elevato-punctatis rugosis tiliarumque apice griseis, thorace depresso: striis quatuor longitudinalibus, pedibus anterioribus latis.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 27.*  
*Habitat in Europa.*
- lutea. 221. *C. lutea, elytris ad scutelli margines albis.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 29.*  
*Habitat in Europa.*
- bipuncta-  
ta. 222. *C. flava, fronte punctis duobus fuscis, elytris albis luteo venosis.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 30.*  
*Habitat in Europa.*
- flavi-  
frons. 223. *C. lutea fronte flava: punctis duobus minimis nigris.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 31.*  
*Habitat in Europa.*
- reticulata. 224. *C. flava, elytris albis luteo venosis.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 32. 35.*  
*Habitat in Europa.*
- lineolata. 225. *C. fusca, elytris albidis fusco venosis: lineolis interruptis albis.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 33.*  
*Habitat in Europa.*
- virescens. 226. *C. ex flavo virescens.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 34.*  
*Habitat in Europa.*
- lugubris. 227. *C. elytris albis: margine interno posteriorique nigro, dorso interrupto.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 36.*  
*Habitat in Europa.*
- hyalina. 228. *C. elytris hyalinis albo venosis.* *Mus. Lesk. p. 118. n. 37.*  
*Habitat in Europa.*

2112 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. (*Deflexa*.)

- laecea. 229. *C. pallida*, alis lacteis. *Mus. Lesk. p. 118. n. 38.*  
*Habitat in Europa.*
- denigrata. 230. *C. flava*, alis albis, abdomine supra nigro. *Mus. Lesk. p. 118. n. 39.*  
*Habitat in Europa.*
- maculosa. 231. *C. fusca*, elytris albidis fusco maculatis. *Mus. Lesk. p. 118. n. 40.*  
*Habitat in Europa.*
- pallens. 232. *C. aptera pallida.* *Mus. Lesk. p. 116. n. 42.*  
*Habitat in Europa.*
- †† *alis deflexis, latera obvolvuntibus, Deflexae.*
- ocellata. 162. *C. elytris compressis adscendentibus viridibus: punctis ocellaribus ferrugineis.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 2. mant. inf. 2. p. 268. n. 2.*  
*Degeer inf. 3. t. 33. f. 2.*  
*Habitat Tranquebariae.*
- aequino- 163. *C. elytris deflexis viridibus: margine rubro; interiori ctialis. basi nigro punctato.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 3. mant. inf. 2. p. 268. n. 3.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magna.*
- marginata. 39. *C. flava*, elytris deflexis nigris: linea laterali alba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 322. n. 4. mant. inf. 2. p. 268. n. 4.*  
*Habitat in America, lateralis magnitudine, alis pallidis.*
- phalae- 40. *C. exalbida*, alis patulis, elytris anterieus nigro punctatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 5. mant. inf. 2. p. 268. n. 5.*  
*Degeer inf. 3. p. 222. n. 19. t. 33. f. 6.* Cicada flava, alis amplissimis deflexis albidis nigro punctatis.  
*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 10.*  
*Stoll cicad. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in America meridionali, hemerobio perlae similis.*
- bipuncta- 41. *C. exalbida*, elytris deflexis griseis, thoracis margine anteriori punctis duobus impressis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 6. mant. inf. 2. p. 268. n. 6.*  
*Habitat in America meridionali, cornutae magnitudine.*
- retusa. 164. *C. exalbida immaculata*, capite anterieus retuso. *Fabr. mant. inf. 2. p. 268. n. 7.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine marginatae.*

165. *C.*

- grisea. 165. *C. grisea*, elytris deflexis, capite apice puncto nigro.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 7. mant. inf. 2. p. 268. n. 8.*  
*Habitat in insulis Americae meridionali oppositis.*
- tripuncta- 166. *C. elytris deflexis viridibus: punctis tribus albidis. Fabr.*  
 ta. *sp. inf. 2. p. 323. n. 8. mant. inf. 2. p. 268. n. 9.*  
*Habitat in America meridionali, viridis, vivida major.*
- vivida. 167. *C. viridis*, elytris deflexis, alis albis, fronte conica.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 323. n. 9. mant. inf. 2. p. 268. n. 10.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, in nova*  
*quoque Hollandia.*
- minuta. 168. *C. elytris deflexis viridibus: dorso scabro, capitis mar-*  
 gine posteriori thoraceque linea dorsali sanguinea. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 323. n. 10. mant. inf. 2. p. 268. n. 11.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- lanata. 42. *C. alis nigris: punctis caeruleis, fronte lateribusque ru-*  
 bris, ano lanato. *Mus. Lud. Utr. 163.\* Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 324. n. 12. mant. inf. 2. p. 268. n. 13.*  
*Sulz. hist. inf. t. 9. f. 11.*  
*Drury inf. 2. t. 37. f. 11.*  
*Stoll cicad. 1. t. 10. f. D. 49.*  
*Habitat in America australi et India, nigricans, oculis*  
*spinosis.*
- tomen- 169. *C. elytris deflexis viridibus fulvo subfasciatis, alis albis:*  
 tosa. *fasciis duabus atris. Fabr. sp. inf. 2. p. 324. n. 13. mant.*  
*inf. 2. p. 269. n. 14.*  
*Habitat in India.*
- barbata. 170. *C. fusca*, abdomine virecente, ano lanato niveo. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 324. n. 14. mant. inf. 2. p. 269. n. 15.*  
*Habitat in India.*
- atrata. 171. *C. atra*, thorace maculis quatuor griseis, abdominis mar-  
 gine flavo: punctis niveis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 269. n. 16.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine lanatae, an-*  
*tennis testaceis, genibus flavis.*
- villosa. 172. *C. viridis*, elytris deflexis exalbidis, ano lanato. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 324. n. 15. mant. inf. 2. p. 270. n. 21.*  
*Habitat in America meridionali.*

- leporina. 43. *C. alis exalbidis: anterieus anastomofibus pallidis supra lineolam nigricantem, ano lanato. Fn. succ. 895.\**  
*Habitat in Europa.*
- cunicularia. 44. *C. alis hyalinis: ftriga fascia punctisque fufcis, ano lanato. Fabr. fp. inf. 2. p. 323. n. 11. mant. inf. 2. p. 268. n. 12.*  
*Habitat in India, fronte ovata ferruginea.*
- viridis. 46. *C. elytris viridibus, capite flavo: punctis nigris. Fn. succ. 896. Geoffr. inf. par. 1. p. 417. n. 5. Fuessli inf. helv. p. 24. n. 465. Fabr. fp. inf. 2. p. 326. n. 26. mant. inf. 2. p. 271. n. 34.*  
*Raj. inf. p. 68 n. 3. Locusta pulex paulo minor. Petrv. gaz. 73. t. 76. f. 6. Kanatra viridescens. Habitat in Europa, elytris rarius caerulefcntibus.*
- lacta. 173. *C. fupra nigra nitida: punctis caerulefcntibus. Fabr. mant. 2. p. 271. n. 34.*  
*Habitat in Cayenna, viridi minor, fubtus flavescens, ano co: cino.*
- quadriguttata. 174. *C. elytris rufefcentibus: maculis duabus viridibus apice hyalinis. Fabr. mant. inf. 2. p. 271. n. 36.*  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis, fubtus flavescens.*
- marginella. 175. *C. nigra, capitis thoracis elytrorumque margine coccineis. Fabr. mant. inf. 2. p. 271. n. 37.*  
*Habitat in Cayenna, parva.*
- compressa. 47. *C. flava compressa. Fn. succ. 897.\**  
*Habitat in Europa.*
- aurata. 48. *C. flava, elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris posteriorisque auratis. Fn. succ. 899.\* Fabr. fp. inf. 2. p. 328. n. 41. mant. inf. 2. p. 273. n. 55. Fuessli inf. helv. p. 24. n. 466.*  
*Habitat in Europae magis borealis plantis.*
- ulmi. 49. *C. alis viridi luteis: apicibus nigricantibus inauratis. Fn. succ. 900.\* Fabr. fp. inf. 2. p. 328. n. 42. mant. inf. 2. p. 273. n. 56. Geoffr. inf. par. 1. p. 427. n. 27.*  
*Degeer inf. 3. p. 189. n. 8. Cicada mufeiformis ulmi. Habitat in Europae ulmis.*
- nitidula. 176. *C. elytris pallide auratis albo nigroque punctatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 273. n. 57.*  
*Habitat Halaec Saxonum, parva, flava.*

- cuspidata. 177. *C. grisea*, capite depresso plano apice fusco. *Fabr. sp. inf. 2. p. 328. n. 43. mant. inf. 2. p. 273. n. 58.*  
*Habitat in Angliae plantis.*
- quercus. 178. *C. flavescens*, elytris sanguineo apice fusco maculatis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 328. n. 44. mant. inf. 2. p. 273. n. 59.*  
*Habitat in quercu.*
- rosae. 50. *C. flava*, alis albis apice fusco striatis. *Fn. suec. 902.\**  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 428. n. 28. Fabr. sp. inf. 2. p. 327.*  
*n. 40. mant. inf. 2. p. 272. n. 53.*  
*Fuessli inf. helv. p. 24. n. 467.*  
*Degeer inf. 3. p. 103. n. 9. Cicada musciformis rosae.*  
*Reaum. inf. 5. t. 20. f. 10-14.*  
*Frisch inf. 11. p. 13. t. 20.*  
*Habitat in rosae foliis.*
- fuscata. 179. *C. grisea*, elytris punctis apiceque fuscis, alis albis apice fuscis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 272. n. 54.*  
*Habitat in Europa, statura et magnitudine C. rosae.*
- coryli. 51. *C. alis fuscis convolutis* fascia albida pone maculam cordatam caeruleo-centem. *Fn. suec. 901.\**  
*Habitat in corylo.*
- coccinea. 180. *C. flava*, capite thorace scutello tergo elytrisque coccineis, elytris lineis duabus longitudinalibus obliquis videntibus. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 69. n. 69.*  
*Habitat in America septentrionali, compressae circiter magnitudine.*
- americana. 181. *C. elytris maculatis*, ano lanato.  
*Habitat in America, an vere distincta a 42, 169-172 species?*
- albida. 182. *C. albida*, elytris nigro punctatis.  
*Habitat in America; an distincta a 42, 169-172 species?*
- globulifera. 183. *C. atra*, capite conico in spinam longissimam desinente: pedunculis quatuor globuliferis. *Pall. miscell. zool. p. 187. spicil. zool. IX. p. 22. t. 1. f. 12. D. E. F.*  
*Habitat - - - pediculo duplo vel triplo major.*
- erythroptera. 184. *C. fusca*, capite flavicante, elytris rubris: strigis quatuor nigris. *Lepechin it. 2. p. 209. t. 11. f. 24.*  
*Habitat in Sibiria.*

- nitens. 185. *C. griseo-viridis*, alis hyalinis nitidissimis, femoribus anterioribus tridentatis. *Degeer inf. 3. p. 220. n. 17. t. 33. f. 4.*  
*Habitat in Surinamo, II lineas longa.*
- collaris. 186. *C. flavo-fulva*, thorace fascia rubra pallida, antennis longioribus. *Degeer inf. 3. p. 226. n. 22. t. 33. f. 12.*  
*Habitat in Surinamo, muscae minoris magnitudine.*
- melano- 187. *C. fusca*: utrinque linea laterali flava, alis nigris. *De-  
ptera. geer inf. 3. p. 226. n. 23. t. 23. f. 14.*  
*Habitat in Surinamo, statura et magnitudine collaris.*
- gibberula. 188. *C. fusco-viridis reticulata*, alarum basi dilatata. *Geoffr. inf. par. 1. p. 418. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- fexpun- 189. *C. flavescens*, thorace punctis sex impressis. *Geoffr. inf. 3. p. 429. n. 8.*  
ctata. *par. 1. p. 429. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- crocata. 190. *C. nigra*, thorace elytrisq[ue] fascia crocea. *Geoffr. inf. par. 3. p. 422. n. 16.*  
*Habitat in Gallia.*
- castaneae. 191. *C. tota nigra.* *Geoffr. inf. par. 3. p. 422. n. 15.*  
*Habitat in Galliae castanea.*
- tristriata. 192. *C. fusca*, elytris albidis: fasciis tribus transversis fuscis. *Geoffr. inf. par. 3. p. 425. n. 21.*  
*Habitat in Gallia.*
- bistriata. 193. *C. flava*, elytrorum fasciis duabus transversis fuscis. *Geoffr. inf. par. 3. p. 425. n. 22.*  
*Habitat in Gallia.*
- tripuncta- 194. *C. viridi-flava*, elytris punctis tribus nigris apice fuscis. *Geoffr. inf. par. 3. p. 426. n. 25.*  
ta. *Geoffr. inf. par. 3. p. 426. n. 25.*  
*Habitat in Gallia.*
- geogra- 195. *C. viridis*, elytris maculis plurimis fuscis ovatis. *Geoffr. inf. par. 3. p. 427. n. 26.*  
phica. *inf. par. 3. p. 427. n. 26.*  
*Habitat in Gallia.*
- igualida. 196. *C. fusca elytris nebulosis: nervis albidis.* *Müll. zool. dan. prodr. p. 102. n. 1152. Geoffr. inf. par. 1. p. 422. n. 14.*  
*Habitat in Europa.*



- quadrino-197. *C. nigricans*, thorace bipunctato, elytris totis coriaceis:  
tata. fascia duplici interrupta alba. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 102. n. 1149.  
*Habitat in Dania.*
- pallefcens. 198. *C. elytris abbreviatis striatis fusco maculatis*, alis albis.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 102. n. 1150.  
*Habitat in Dania.*
- fufca. 199. *C. flavescens*, elytris fuscis nervosis, oculis nigris. Müll.  
*zool. dan. prodr.* p. 102. n. 1151.  
*Habitat in Dania.*
- pufilla. 200. *C. pallida*, alis membranaceis albis: punctis raris nigris.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1163.  
*Habitat in Dania, adeo exilis, ut saliens tantum oculis percipiatur.*
- diaphana. 201. *C. luteo-alba*, oculis cinereis. Müll. *zool. dan. prodr.*  
p. 103. n. 1169.  
*Habitat in Dania.*
- arvenfis. 202. *C. lutea*, fronte, abdomine fubtus, lateribusque nigris.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103, n. 1170.  
*Habitat in Daniae arvis.*
- neuropte-203. *C. flavescens*, alis hyalinis nervosis: maculis fubfulvis.  
ra. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103, n. 1171.  
*Habitat in Dania.*
- cancellata. 204. *C. lutea*, feutello tripunctato apice fusco, alis albis re-  
ticulatis. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1172.  
*Habitat in Dania.*
- glabra. 205. *C. fufca*, thorace nigro, elytris politis fulvis. Müll.  
*zool. dan. prodr.* p. 103. n. 1173.  
*Habitat in Dania.*
- amphibia. 206. *C. antennis crassis elevatis*, alis nullis, pedibus pofteri-  
rioribus natatoriis. *Pontopp. Naturg. Daennem.* p. 214.  
n. 13. t. 16. a. b. *atl. dan.* 1. t. 29.  
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 103.  
*Habitat in Dania, magnitudine pulicis, feminae abdomine enfiifero; an hujus generis?*

224. NOTONECTA, *Rostrum* inflexum.  
*Antennae* thorace breviores.  
*Alae* quatuor cruciatio-com-  
 plicatae, anterieus co-  
 riaceae.  
*Pedes* posteriores pilosi, na-  
 tatorii.

\* *labio elongato.*

- glauca. 1. *N. elytris* griseis margine fusco punctatis apice bifidis. *Fu.*  
*suec.* 903.\* *Scop ent. carn.* 348. *Fuessli inf. helv.* p.  
 24. n. 468. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 331. n. 1. *mant. inf.* 2.  
 p. 275. n. 1.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 476. n. 1. t. 9. f. 6. *Notonecta* ca-  
 pite luteo &c.  
*Degeer inf.* 3. p. 382. n. 5. t. 18. f. 16. 17. *Nepa noto-*  
*necta.*  
*Petiv. gazoph.* t. 72. f. 6. *Notonecta vulgaris* nigro palli-  
 doque mixta.  
*Raj. inf.* 58. *Cicada aquatica* Mouffetii.  
*Bradl. nat.* t. 26. f. 2. E.  
*Hufn. inf.* t. 12. f. 19.  
*Frisch inf.* 6. p. 28. t. 13.  
*Roef. inf.* 3. app. 1. p. 165. t. 27.  
*Pod. inf.* t. 1. f. 5.  
*Sulz. inf.* t. 10. f. 67.  
*Schaeff. elem.* t. 90.  
*icon.* t. 33. f. 5. 6.  
*Stoll cimic.* 2. t. 12. f. IX. X.  
*Habitat in Europae aquis, piscibus molesta.*
- america- 4. *N. grisea*, posterius nigra, scutello atro, utrinque puncto  
 na. baseo flavo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 331. n. 2. *mant. inf.* 2.  
 p. 275. n. 2.  
*Habitat in Americae aquis.*

5. N.

---

*Notonectae et Nepae sub aquis degunt, animalculis aquaticis visitantes; larva et puppa hexapus, agilis, natans imagini similima, haec cum alarum rudimentis, illa aptera.*

- nivea. 5. *N. elytris albis immaculatis apice rotundatis.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 332. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 275. n. 3.  
*Habitat in India.*
- minutif- 3. *N. grisea, capite fusco elytris truncatis.* *Fabr. sp. inf.* 2.  
funa. p. 332. n. 4. *mant. inf.* 2. p. 275. n. 4.  
*Syst nat.* XII. 2. p. 713. n. 3. *Fn. suec.* 905. *Notonec̄ta*  
*elytris cinereis maculis fuscis longitudinalibus.*  
*Fn. suec.* I. n. 690. *Notonec̄ta arenulae magnitudinis.*  
*Geoffr. inf. par.* I. p. 477. n. 2. *Notonec̄ta cinerea anelytra.*  
*Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 470.  
*Habitat in Europae aquis.*
- minuta. 6. *N. capite flavo, thorace elytrisque viridibus: lineis trans-*  
*versis fuscis.* *Sulz. hist. inf.* p. 91. t. 10. f. 1.  
*Habitat in Europae aquis.*
- novebo- 7. *N. flavescens, elytris concoloribus: maculis tribus nebulosis*  
racentis. *fulcis longitudinalibus.* *Forst. nov. inf. spec.* I. p. 70. n. 70.  
*Habitat in Noveboraco.*
- octopun- 8. *N. capite flavo, thorace subfusco, scutello nigro: punctis*  
ctata. *quinque albis, elytris fuscis: margine albo; punctis*  
*quatuor atris.*  
*Schaeff. ic. t.* 97. f. 1.  
*Habitat in Germania, magnitudine friatae.*
- indica. 9. *N. glauca, elytris apice nigris.* *Mant.* 2. p. 534.  
*Habitat in India.*
- atomaria. 10. *N. alba, supra elytrisque pallide griseis, alis lacteolis.*  
*Pall. it.* I. app. n. 55.  
*Habitat in fluento Russiae Volchova ad Novogrodium, pedi-*  
*culi magnitudine.*
- lutea. 11. *N. elytris albidis: striga marginali nigra.* *Müll. zool. dan.*  
*prodr.* p. 103. n. 1175.  
*Habitat in Daniae aquis.*
- margina- 12. *N. elytris nigris: margine futuraque luteis.* *Müll. zool.*  
ta. *dan. prodr.* p. 104. n. 1176.  
*Habitat in Dania. De his 6-12 dubium, utrum huic, an*  
*sequenti tribui accensendae.*

\*\* *labio nullo*, *Sigarae* Fabricii.

- lineata. 13. N. elytris fuscis: lineis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 276. n. 1.*  
*Habitat in Cayenna, statura striatae, at paulo major.*
- striata. 2. N. elytris fuscis: lineolis transversis undulatis numerosissimis fuscis. *Fn. suec. 904.\* Scop. ent. carn. 349. Fabr. sp. inf. 2. p. 332. n. 1. mant. inf. 2. p. 276. n. 2.*  
*Petiv. gazoph. t. 72. f. 7. Notonecta vulgaris compressa fusca. Geoffr. inf. par. 1. p. 478. n. 1. t. 9. f. 7. Corixa. Degeer inf. 3. p. 389. n. 6. t. 20. f. 1. 2. Nepa striata. Joblot microsc. 1. p. 1. t. 7. f. 2. 3. Roef. inf. 3. app. 1. p. 177. t. 29. Schaeff. elem. t. 50. icon. t. 97. f. 2. Stoll cemic. 2. t. 15. f. XIII. B. Habitat in Europae aquis frequens, magnitudine varians.*
- coleoptra- 14. N. elytris totis coriaceis fuscis: margine exteriori flavo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 332. n. 2. mant. inf. 2. p. 276. n. 3.*  
*Habitat in Kilonii aquis.*

## 225. NEPA. *Rostrum inflexum.*

*Antennae breves.*

*Alae quatuor cruciato - complicatae: anterus coriaceae.*

*Pedes anteriores cheliformes; reliqui quatuor ambulatorii.*

\* *antennis palmato-divisis, labio nullo.*

- grandis. I. N. ecaudata testacea flavo maculata. *Fabr. sp. inf. 2. p. 332. n. 1. mant. inf. 2. p. 276. n. 1.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 713. n. 1. Mus. Lud. Ulr. 164.\* Gron. zooph. 685. Nepa testacea scutello laevi, alis albis maculis venisque flavis. Degeer inf. 3. p. 379. n. 4. Nepa furinamentis. Marcgr. bras. 250. f. 259. Insectum magnitudine brusci. Merian. inf. surin. t. 56. Roef. inf. 3. app. 1. t. 26. Habitat in Americae aquis.*

- rubra. 2. *N. fusca*, abdomine supra alarumque nervis rubris. *Mus. Lud. Ulr.* 165.\*  
*Fabr. mant. inf.* 2. p. 277. n. 6. *Nepa* cauda bifeta corpore ovato, cauda corpore longiore.  
*Stoll cimic.* 2. t. 7. f. V. *Scorpio aquaticus*.  
*Habitat* Tranquebariae.
- annulata. 8. *N. ecaudata* subrotunda, pallide fusca, tibiis anterioribus pallidis fusco annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 2.  
*mant. inf.* 2. p. 276. n. 2.  
*Habitat in* Coromandel, *congeneribus latior, magis rotundata*.
- rustica. 9. *N. ecaudata* fusca, thoracis elytrorumque margine anteriore albido. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 276. n. 3.  
*Sut. hist. inf.* t. 10. f. 2. *Nepa plana*.  
*Stoll cimic.* 2. t. 7. f. VI.
- fusca. 3. *N. fusca*, cauda bifeta, scutello rugoso, alis niveis. *Mus. Lud. Ulr.* 166.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 4. *mant. inf.* 2. p. 277. n. 4.  
*Stoll cimic.* 2. t. 1. f. I.  
*Habitat in* Indiae aquis, *cauda corporis longitudine*.
- grossa. 10. *N. cauda bifeta*, corporis ovati longitudine. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 277. n. 5.  
*Habitat in* Sina, *rubra major, cinerea, abdomine supra rubro, medio nigro, ano cinereo*.
- atra. 4. *N. atra* thorace inaequali, corpore oblongo.  
*Habitat in* Africa, *cinereae simillima, at duplo major et duplo longior*.
- cinerea. 5. *N. cinerea*, thorace inaequali, corpore oblongo ovato. *Fn. succ.* 906. *Scop. ent. carn.* 350. *Fuessli inf. helv.* p. 24. n. 471.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 333. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 277. n. 6. *Nepa* cauda bifeta, corpore ovato.  
*Fn. succ.* 1. n. 691. *Nepa* abdominis margine integro.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 481. n. 2. *Nepa* corpore ovato.  
*Degeer inf.* 3. p. 361. n. 1. t. 18. f. 1. *Nepa Scorpio aquaticus*.  
*Mouff. inf.* 321. *Scorpio palustris*.  
*Raj. inf.* 58. *Scorpio palustris ad cimices referenda*.  
*Fonst. inf. t.* 25. f. 1. 2. *Scorpiones aquatici*.

Pet.

*Pet. gazoph. t. 74. f. 4.* Scorpio vulgaris aquaticus.

*Bauh. ballon. 212. f. 2.* Araneus aquaticus.

*Swammerd. bibl. 1. t. 3. f. 4.*

*Bradl. natur. t. 26. f. 2. C.*

*Frisch inf. 7. t. 15.*

*Hufn. inf. t. 11. f. 2.*

*Roef. inf. 3. app. 1. p. 136. t. 22. f. 6-8.*

*Sulz. inf. t. 10. f. 68.*

*Schaeff. elem. t. 69.*

*icon. t. 33. f. 7. 9.*

*Stoll cimic. t. 1. f. 11. a.*

*Habitat in Europae aquis, abdomine supra rubro, antennis palmato-bifidis.*

maculata. II. N. nigra, thorace scutelloque ferrugineo maculatis, alis nigris, cauda bifeta. *Fabr. sp. inf. 2. p. 334. n. 6. mant. inf. 2. p. 227. n. 8.*

*Habitat in Indiae aquis.*

linearis. 7. N. linearis, manibus spina laterali pollicatis. *Fn. suec. 908. Gron. zooph. 683.*

*Fabr. sp. inf. 2. p. 334. n. 7. mant. inf. 2. p. 277. n. 9.* Nepa cauda biteta corpore lineari.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 480. t. 10. f. 1.* Nepa corpore lineari.

*Degeer inf. 3. p. 369. n. 2. t. 19. f. 1. 2. Fuessli inf. helv. p. 25. n. 473.* Nepa linearis.

*Raj. inf. 59.* Locusta aquatica Mouffeti.

*Swammerd. bibl. nat. 1. p. 233. t. 3. f. 9.*

*Frisch inf. 7. p. 24. t. 16.*

*Roef. inf. 3. app. 1. p. 141. t. 23.*

*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 4.*

*Schaeff. ic. t. 5. f. 5. 6.*

*Habitat in Europae et Indiae aquis.*

\*\* *labio porrecto rotundato, Naucorides Fabricii.*

cimicoi- 6. N. abdominis margine ferrato. *Fn. suec. 907. Gron. zooph. des. 686. Geoffr. inf. par. 1. p. 474. n. 1. t. 9. f. 5. Fabr. sp. inf. 2. p. 334. n. 1. mant. inf. 2. g. 277. n. 1. Fuessli inf. helv. p. 24. n. 472.*

*Degeer inf. 3. p. 375. n. 3. t. 19. f. 8. 9.* Nepa Naucoris.

*Frisch inf. 6. p. 31. t. 14.* Cimex aquaticus latior.

*Roef. inf. 3. app. 1. p. 176. t. 28.*

*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 3.*

*Schaeff. elem. t. 87.*

*Schaeff.*

*Schaeff. icon. t. 33. f. 3. 4.*

*Stoll cimic. 2. t. 12. f. VIII. C. B.*

β) *Naucoris futura integra. Mus. Lesk. p. 117. n. 62.*

*Habitat in Europae aquis.*

antiguen- 12. N. abdominis margine integro.

fis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 2. mant. inf. 2. p. 277. n. 2.*

*Naucoris nepaeformis.*

*Habitat in insula Antigua.*

226. CIMEX. *Rostrum inflexum.*

*Antennae thorace longiores.*

*Alae quatuor cruciato-complicatae:  
superioribus anterie coriaceis.*

*Dorsum planum: thorace marginato.*

*Pedes cursorii.*

\* *antennis ante oculos insertis.*

† *labio nullo, Acanthiae Fabricii.*

‡ *apteri.*

lectula- I. C. apterus. *Fn. suec. 909. Scop. ent. carn. 354. Geoffr.*  
rius. *inf. par. 1. p. 434. n. 1. Fuessli inf. helv. p. 25. n. 474.*

*Degeer inf. 3. t. 17. f. 9. Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 1.*

*mant. inf. 2. p. 278. n. 1.*

*Mouff. inf. 269. f. superiores, Cimex domesticus.*

*Bonann. microsc. t. 65.*

*Aldr. inf. 534.*

*Fonst. inf. 89.*

*Rij. inf. 7.*

*Ledermüll. microsc. t. 52. 63.*

*Sonthall tr. of Buggs. Lond. 1730. oct.*

*Sulz. inf. t. 10. f. 69.*

*Stoll cimic. 2. t. 19. f. 131.*

*Habitat in Europae domibus, exoticus, ante epocham saluta-  
rem jam in Europa, vix ante 1670. in Anglia, noctur-  
nus, foetens, sanguisugus, varius, aliquando tamen,  
testibus Scopolio et Hermanno, alatus, vivus facile oc-  
cidendus, nidore carbonum, terebinthinae oleo accenso, men-  
tha arvensi, lepidio ruderali, myrica, geranio robertiano,*

XXXXXX

aga

*agarico muscario, cinicifuga, cannabis seminibus herbaque, opuli bacis, ledo palustri, tabaci oleo, capsici fumo, plumbaginis europaeae infuso, ucoro palustri, melontheo oleo infuso, medusa, cimice personato, formicis rubris pellendus.*

TT *elytris fere totis coriaceis, coleoptrati.*

Zosterac. 122. *C. niger*, elytris abdomine longioribus apice hyalino striatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 2. mant. inf. 2. p. 278. n. 2.*

*Fabr. it. norm. Acanthia pellucens.*

*Habitat ad littora maris, velocissime supra fucos zosteramque decurrens, Kilonii frequens.*

ater. 123. *C. ater nitidus*, elytris apice pallefcentibus. *Fabr. mant. inf. 2. p. 278. n. 3.*

*Habitat Kilonii, c. zosterac duplo minor.*

grylloides. 13. *C. apterus niger*, elytris ovatis marginae luteis abdomine brevioribus. *Fn. suec. 910.\**

*Fabr. sp. inf. 2. p. 335. n. 3. mant. inf. 2. p. 278. n. 4.*

*Acanthia (coriacea) aptera, elytris coriaceis nigro-griseis. Habitat in Europa, thorace gryllum referens.*

clavipes. 124. *C. apterus niger*, pedibus piceis: femoribus anterioribus incrassatis dentatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 278. n. 5.*

*Habitat Tranquebariae, magnitudine c. zosterac.*

pedemontanus. 125. *C. apterus*, elytris connatis abbreviatis cinereis, ano fetoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 336. n. 4. mant. inf. 2. p. 278. n. 6.*

*Habitat in agro Pedemontano, parvus, totus cinereus.*

littoralis. 14. *C. elytris fordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro. Fn. suec. 914. 915.\** *Fabr. sp. inf. 2. p. 336. n. 7. mant. inf. 2. p. 279. n. 12.*

*Degeer inf. 3. p. 278. n. 21. t. 14. f. 17. 18. Cimex ovatus nigricans.*

*Habitat in Europae littoribus.*

15. *C.*

---

*Cimices plurimi foetent, omnes, reduviis exceptis, plantarum, omnes animalium, praesertim insectorum molliorum succo visitant. quem, volatilium more, rostro sugunt; larva et puppa hexapus, agilis, obambulat, imagini simillima, illa aptera, haec alarum rudimentis instructa.*



- rugosus. 15. *C. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anterioribus crassissimis. Fn. suec. 916. Fabr. sp. inf. 2. p. 336. n. 8. mant. inf. 2. p. 279. n. 13.*  
*Habitat in Europa boreali.*
- lunatus. 126. *C. thorace lunato: margine prominente, abdomine ferrato. Fabr. sp. inf. 2. p. 337. n. 9. mant. inf. 2. p. 279. n. 14.*  
*Stoll cimic. 2. t. 13. f. 84.*  
*Habitat in America australi et India.*
- clavicornis. 16. *C. elytris nervoso-carinatis reticulato-punctatis, antennis clavatis. Fn. suec. 911.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 336. n. 5. mant. inf. 2. p. 278. n. 7. Fueßli inf. helv. p. 25. n. 480. Reaum. inf. 3. t. 34. f. 1-4. Geoffr. inf. par. 1. p. 461. n. 56.*  
*Habitat in Europae horticis.*
- ferratulae. 127. *C. niger, elytris pallescentibus, alis apice fuscis. Fabr. sp. inf. 2. p. 336. n. 6. mant. inf. 2. p. 278. n. 9.*  
*Habitat in Angliae ferratulis.*
- lavaterae. 128. *C. niger, elytris abdomineque basi rufis. Fabr. mant. inf. 2. p. 278. n. 8.*  
*Habitat in Barbariae lavateris, parvus in hac tribu.*
- fasciatus. 129. *C. ater, elytris pallescentibus: fasciis duabus abbreviatis nigris. Fabr. mant. inf. 2. p. 278. n. 10.*  
*Habitat Kilonii, parvus, nitidus.*
- Mülleri. 130. *C. niger, pedibus fulvis. Müll. zool. dan. prodr. p. 105. n. 1188.*  
*Habitat in Dania.*
- maculatus. 131. *C. fuscus, thorace albo trimaculato, abdomine subtus albo: margine nigro-punctato. Fabr. mant. inf. 2. p. 279. n. 11.*  
*Habitat Tranquebariae, parvus.*

III membranacei et valde depressi.

- corticulis. 17. *C. abdominis margine imbricatim fecto, corpore nigro. Fn. suec. 917. Fabr. sp. inf. 2. p. 337. n. 10. mant. inf. 2. p. 279. n. 15.*  
*Schaeff. ic. t. 51. f. 6. 7.*  
*Habitat in Europae arboribus silvaticis.*

- parado- 132. C. thorace abdomineque lobatis ciliato-spinosis. *Spurrm.*  
xus. *act. Stockh.* 1777. p. 234. t. 6. f. A. B. C. *Fabr. sp. inf.*  
2. app. p. 510. *mant. inf.* 2. p. 279. n. 16.  
*Habitat ad caput bonae spei, statura corticalis, folia deci-  
dua emortua aemulans.*
- laevis. 133. C. niger, abdomine laevi brunneo, alis pallidis. *Fabr.*  
*sp. inf.* 2. p. 337. n. 11. *mant. inf.* 2. p. 279. n. 17.  
*Habitat in Anglia.*
- betulac. 18. C. thorace denticulato, capite muricato, elytris anterioribus  
dilatatis. *Fn. suec.* 918. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 337. n. 12.  
*mant. inf.* 2. p. 279. n. 18.  
*Degeer inf.* 3. p. 305. n. 36. t. 15. f. 16. 17. Cimex depre-  
sus betulac.  
*Habitat in Europa borealis betula alba.*
- crassipes. 134. C. abdomine incrassato fusco: apice flavescente, tibiis  
anterioribus incrassatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 337. n. 13.  
*mant. inf.* 2. p. 279. n. 19.  
*Habitat Dresdae.*
- crofus. 19. C. abdomine flavo: fascia nigra, thoracis margine sinua-  
to, tibiis anterioribus incrassatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 337.  
n. 14. *mant. inf.* 2. p. 279. n. 20.  
*Degeer inf.* 3. p. 350. n. 25. t. 35. f. 13. 14. Cimex Scorpio.  
*Habitat in America meridionali.*
- niger. 585. C. niger, thorace ferrugineo marginato conico: apice  
truncato, elytris abdomine dimidio brevioribus margine  
externo ferrugineis, abdomine supra albo maculato: lo-  
bis utrinque sex ferrugineis, totidemque subtus paribus  
guttarum albarum. *Mus. Lesk.* p. 117. n. 66. b.  
*Habitat extra Europam.*
- umbra- 135. C. ferrugineus, thorace marginato: margine antierius scu-  
culatus. telloque apice albis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 337. n. 15. *mant.*  
*inf.* 2. p. 279. n. 21.  
*Habitat Hafniae.*
- leucopte- 136. C. thoracis margine ferrato, corpore griseo, alis albis  
rus. fusco maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 16. *mant.*  
*inf.* 2. p. 279. n. 22.  
*Habitat* . . . . .

- filicis. 20. *C. elytrorum* apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. *Fn. suec.* 919.\*  
*Habitat in filicibus.*
- cardui. 21. *C. scutello* lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. *Fn. suec.* 920.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 17. *mant. inf.* 2. p. 280. n. 24  
*Degeer inf.* 3. p. 309. n. 38. t. 6. f. 1. *Cimex depressus* ovatus grileus nigro-maculatus.  
*Habitat in Europae borealis cardui capitulis.*
- pyri. 137. *C. thorace* triangulari: scutello foliato, elytris reticulatis basi gibbis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 18. *mant. inf.* 2. p. 280. n. 25.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 461. n. 57.  
*Habitat in pyri communis foliorum pagina inferiori, quam maculat.*
- rhombeus. 22. *C. thorace* acutangulo, abdomine dilatato rhombeo posteriorius sexdentato. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 19. *mant. inf.* 2. p. 280. n. 26.  
*Habitat in Africae arboribus.*
- fylvestris. III. *C. ater*, elytris albis: arcu apicis nigro. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 279. n. 23.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 731. n. III. *Fn. suec.* 965. *Cimex oblongus niger*, alis elytrisque albo fuscoque caeruleis, pedibus rufis.  
*Habitat in Europae silvis, parvus.*
- corticatus. 138. *C. thoracis* denticulati corporis pedumque cortice nigricante viridi, antennis clavatis.  
*Sulz. hist. inf.* t. 10. f. 7.  
*Drury inf.* 2. p. 76. t. 40. f. 2.  
*Habitat in Brasilia.*

†† *labio elongato, subulato, annulato.*

‡ *scutello longitudine abdominis, Scutellati.*

- Stockerus. 2. *C. corpore* viridi: maculis nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 167.\*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 338. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 280. n. 1. *Cimex scutellaris* ovatus, corpore viridi, maculis nigris abdomine ferrugineo.  
*Pet. gazoph.* 34. t. 21. f. 12. *Stockerus benghalensis* viridis nigro-maculatus.

Xxxxxx 3

Stoll

*Stoll cimic. 2. t. 3. f. C.*

*Habitat in Sina, nobili affinis, subtus ferrugineus: lateribus cyaneis.*

- nobilis. 3. *C. viridi-auratus nigro maculatus. Amoen. acad. 6. p. 409. n. 46.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 338. n. 2. mant. inf. 2. p. 280. n. 2. Cimex scutellaris oblongus caeruleo-auratus nigro maculatus.*  
*Sulz. hist. inf. t. II. f. C.*  
*Schroet. Abb. 1. t. 1. f. 9.*  
*Stoll cimic. 1. t. 1. f. 1.*  
*Habitat in Asia, subtus rufus, fasciis lateralibus caeruleo auroque nitentibus.*
- regalis. 139. *C. thorace scutelloque aureis, thorace punctis duobus, scutello maculis duabus caerulefcentibus. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 3. mant. inf. 2. p. 280. n. 3.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- imperialis. 140. *C. thorace scutelloque rufis, abdomine cyaneo: margine sanguineo. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 4. mant. inf. 2. p. 280. n. 4.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- nigellae. 141. *C. niger obscurus, thorace anteriori, abdominis margine pedibusque albis. Fabr. mant. inf. 2. p. 280. n. 5.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 5. Cimex (rusticus) scutellaris niger obscurus, abdominis margine ferrugineo, pedibus pallidis.*  
*Habitat in Barbariae nigella, elytris intus sanguineis.*
- cerinthes. 142. *C. niger obscurus immaculatus. Fabr. mant. inf. 2. p. 280. n. 6.*  
*Habitat in Africae nigella sativa, statura et magnitudine c. nigellae.*
- annulus. 143. *C. virefcens, maculis annularibus nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 6. mant. inf. 2. p. 281. n. 7.*  
*Drury inf. 3. t. 46. f. 9. Cimex Argus.*  
*Habitat ad fluvium Senegal, alis apice nigris, interdum obscure pallidus.*
- sexguttatus. 144. *C. supra testaceus, thorace punctis duobus, scutello quatuor cyaneo-nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 7. mant. inf. 2. p. 281. n. 8.*

*Habitat*

- Habitat in America meridionali, mediae magnitudinis, antennis nigris.*
- Druraci. 145. *C. sanguineus*, punctis maculisque nigris, subtus atro-caerulefscens. *Mant. p. 534.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 339. n. 8. mant. inf. 2. p. 281. n. 9.* Cimex scutellaris supra rufus, maculis difformibus nigris.  
*Sulz. hist inf t. 10 f. 5.*  
*Drury inf. 1. t. 42 f. 1. 5.*  
*Habitat in America meridionali.*
- Fabricii. 146. *C. purpureus*: punctis sanguineis, subtus atro-caerulefscens. *Mant. p. 534.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 340 n. 9. mant. inf. 2. p. 281. n. 10.* Cimex scutellaris subpurpurafscens fulvo-punctatus.  
*Habitat in Cayenna, altero sexu supra rufefcente, altera obscure caerulefscente.*
- Argus. 147. *C. niger*: punctis ocellaribus fulvis numerosis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 281. n. 11.*  
*Stoll cimic. 2. t. 7. f. 50.*  
*Habitat in Surinamo, statura et magnitudine c. Fabricii, subtus flavus nigro varius.*
- Schulzii. 148. *C. atro-aeneus*, scutello utrinque macula baseos coccinea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 10. mant. inf. 2. p. 281. n. 12.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine scarabaeoidis, praecedentibus minor.*
- paganus. 149. *C. cyaneus*, scutello abdomineque rufis cyaneo maculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 11. mant. inf. 2. p. 281. n. 13.*  
*Habitat in nova Hollandia, thorace interdum macula rufa, abdomine medio punctis 4 cyaneis insignito.*
- illustris. 150. *C. glaucus*, thorace scutelloque punctis duobus fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 12. mant. inf. 2. p. 281. n. 14.*  
*Stoll. cimic. 2. t. 24. f. 166.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnus.*
- lineola. 151. *C. supra cyaneus*, capite thoraceque linea dorsali, scutello punctis duobus rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 13. mant. inf. 2. p. 281. n. 15.*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis, antennis nigris.*

- trilineatus. 152. *C. niger*, lineis tribus flavescens. *Fabr. sp. inf. 2. p. 340. n. 14. mant. inf. 2. p. 281. n. 16.*  
*Habitat in America meridionali, lineato minor, subtus niger, viridi irroratus, abdomine utrinque linea punctorum rubrorum insignito.*
- scarabaeoides. 4. *C. corpore atro-aeneo. Fn. suec. 912.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 342. n. 25. mant. inf. 2. p. 282. n. 29. Fuesli inf. helv. p. 25. n. 475.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 435. n. 2. Cimex hemitphaericus nigro-aeneus &c.*  
*Sulz. inf. p. 26. t. II. f. 70.*  
*Habitat in Europa, frequentius in ranunculi floribus.*
- pallipes. 153. *C. nigro-aeneus, scutelli abdominisque margine pedibusque pallidis. Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 26. mant. inf. 2. p. 282. n. 30.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 29. Cimex (acaroides) scutellatus ater, thorace scutello abdomineque albo marginatis.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, flavipedi affinis, at paulo major.*
- flavipes. 154. *C. nigro-aeneus, margine omni pedibusque flavis. Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 27. mant. inf. 2. p. 282. n. 31.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- VahlII. 155. *C. ater nitidus, capite lituris duabus, thorace scutellique margine pedibusque flavis. Fabr. mant. inf. 2. p. 283. n. 32.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*
- maurus. 5. *C. corpore griseo. Fn. suec. 913.\* Scop. ent. carn. 352. Fuesli inf. helv. p. 25. n. 476.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 342. n. 20. mant. inf. 2. p. 282. n. 23.*  
*Cimex scutellaris cinereus, scutello basi punctis duobus albis.*  
*Sulz. hist. inf. t. 4. f. d.*  
*Schaeff. ic. t. 43. f. 3. 4. 15. 16.*  
*Habitat in Oriente, Calabria, in Europa quadruplo minor.*
- costatus. 156. *C. griseus, alarum costa basi pedibusque rufis. Fabr. mant. inf. 2. p. 282. n. 22.*  
*Habitat in insula Rotterdam oceani australis, mauro proxime affinis.*

- hottentot- 157. *C. ferrugineus immaculatus*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 342.*  
 ta. *n. 21. mant. inf. 2. p. 282. n. 24.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 435. n. 3? Cimex fuscus &c.*  
*Habitat in Arabia.*
- leuco- 158. *C. griseus albo striatus*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 342. n. 22.*  
 grammes. *mant. inf. 2. p. 282. n. 25.*  
*Habitat in Italia, minor.*
- ruficus. 159. *C. fuscus, capite thoracisque anteriore ferrugineis, sub-*  
 tus albo fuscoque varius. *Fabr. mant. inf. 2. p. 282. n. 26.*  
*Habitat Tranquebariae, mediae magnitudinis, antennis fer-*  
*rugineis apice fuscis.*
- irroratus. 160. *C. virefcens fusco irroratus*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 342.*  
*n. 23 mant. inf. 2. p. 282. n. 27.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*
- lanatus. 161. *C. aeneo niger griseo-hirtus*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 342.*  
*n. 24. mant. inf. 2. p. 282. n. 28.*  
*Pall. it. 2. app. p. 729. n. 82.*  
*Stoll cimic. 2. t. 9. f. 61.*  
*Habitat in Sibiria, oblongus, chrysomelae majoris magnitu-*  
*dine, frequens ad spicas etymi canini.*
- lineatus. 6. *C. niger, thorace lineis quinque, scutello tribus aurantiis,*  
 abdomine flavo punctis nigris. *Scop. ent. carn. 351.*  
*Gron. zooph. 689. Fueßli inf. helv. t. 20. f. 6.*  
*Mouff. inf. 174. f. 5.*  
*Podu inf. 55. n. 2.*  
*Buchholz de hepatomphal. Arg. 1768. t. 2. f. 3.*
- nigroli- β) *C. ruber, thorace lineis quinque, scutello tribus nigris, ab-*  
 neatus. domine flavo: punctis nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 341.*  
*n. 15. mant. inf. 2. p. 281. n. 17.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 6.*  
*Schaeff. elem. t. 44. f. 1.*  
*icon. t. 2. f. 3.*  
*Stoll cimic. 2. t. 11. f. 9.*  
*Habitat in Europae magis australis potissimum montosis, in*  
*floribus mali et sambuci.*
- femipun- 162. *C. supra rufus, thorace punctis decem, scutello lineis*  
 ctatus, quatuor nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 341. n. 16, mant. inf.*  
*2. p. 281. n. 18.*

*Stoll cimic. 2. t. II. f. 8.*

*Habitat in America, Europa australi.*

- anchora- 163. *C. cyaneus*, scutello basi apiceque flavescente, abdomi-  
go. nis margine flavo nigro punctato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 341. n. 17. mant. inf. 2. p. 281. n. 19.*  
*Habitat in America boreali, ubi mas rufus, ibi femina flava.*
- grammi- 7. *C. corpore flavescente: supra lituris longitudinalibus nigris.*  
cus. *Fabr. sp. inf. 2 p. 341. n. 18. mant. inf. 2. p. 281. n. 20.*  
*Habitat in Africa, mediae magnitudinis.*
- Allioni. 164. *C. fuscus*, atomis numerosissimis albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 342. n. 19. mant. inf. 2. p. 281. n. 21.*  
*Habitat in agro Pedemontano, grammico paulo minor.*
- fuligino- 8. *C. scutello fuliginoso: lituris quinque nigris; posteriore*  
tus. *alba bifida. Fn. suec. 914.\* Fueffi inf. helv. p. 25. n. 478.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 28. mant. inf. 2. p. 283. n. 33.*  
*Schaeff. ic. t. II. f. 10-12.*  
*Habitat in Europa et Oriente.*
- litura. 165. *C. niger*, scutello lituris tribus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 29. mant. inf. 2. p. 283. n. 34.*  
*Habitat in Arabia.*
- tubercula- 166. *C. obscurus*, scutello scabro ante apicem tuberculato.  
tus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 30. mant. inf. 2. p. 283. n. 35.*  
*Habitat in Italia, litura paulo minor.*
- inunctus. 167. *C. ater*, scutello basi pedibusque griseis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 343. n. 31. mant. inf. 2. p. 283. n. 36.*  
*Habitat in Angliac nemoribus.*
- arabs. 9. *C. thorace spinoso, corpore ovato livido, ano bidentato.*  
*Mus. Lud. Ulr. 168.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 32. mant. inf. 2. p. 383. n. 37.*  
*Sloane jam. 2. t. 237. f. 15. 16. Cimex sylvestris foetens viridis triangularis.*  
*Habitat in America meridionali.*
- ferratus. 10. *C. thorace spinoso, corpore livido, abdominis marginibus ferratis.* *Mus. Lud. Ulr. 169.\**  
*Habitat in Arabia.*



- stolidus.** 11. *C. thorace subangulato, corpore supra viridi subtus flavo, ano bidentato. Mus. Lud. Utr. 170.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 33. mant. inf. 2. p. 283. n. 38. Degeer inf. 3. t. 34. f. 3. Habitat in America australi et India.*
- Histrio.** 12. *C. thorace scabro depresso griseo pallidoque vario. Habitat in America australi, India, Sibiria.*
- filphoides.** 168. *C. niger, thorace posteriori, scutello anteriori margine linea media maculisque duabus albis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 29. Stoll cimic. p. 19. t. 4. f. 21. Habitat ad caput bonae spei, glaber, ovatus, magnitudine c. baccarum, facie silphae.*
- diophthalmus.** 169. *C. ruber, thorace punctis duobus nigris, pedibus cyanis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 30. f. 45. Habitat ad caput bonae spei, ovatus, glaber, magnitudine fere scarabaei stercorarii.*
- multipunctatus.** 170. *C. ruber, thorace scutelloque punctis minutissimis plurimis nigris. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 30. Stoll cimic. p. 40. t. 9. f. 60. Habitat ad caput bonae spei, ovatus, glaber, subtus griseus, magnitudine grisei.*
- grandis.** 171. *C. rufus, maculis thoracis tribus scutellique quinque nigris. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 31. f. 46. Habitat in India, oblongus, convexus, glaber, subtus violaceus, magnitudine fere scarabaei stercorarii.*
- liligerus.** 172. *C. ferrugineus, scutello punctis nigris duobus fasciaque undulata albida. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 32. Stoll cimic. p. 40. t. 9. f. 59. Habitat in interioribus regionibus ad caput bonae spei, ovatus, convexus, glaber, magnitudine stoeckeri.*
- guttigerus.** 173. *C. cinereus, scutello basi punctis duobus albis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 32. f. 47. Habitat in Japonia, scarabacoe vix major.*
- ocellatus.** 174. *C. supra purpureus, thorace spinoso, scutello ocellis fenis. Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 60. f. 72. Habitat*

---

*An huc quoque referendi a Seba mus. vol. 4. delineati cimices, nigro-punctulatus t. 95. f. 26. et nigro dense punctulatus t. 95. f. 27?*

- Habitat in Japonia et Sina, oblongus, convexus, rufipedis magnitudine.*
- furina- 175. *C. niger*, scutelli appendice rubra, elytris rubellis po-  
mentis. terius nigricantibus. *Schroet. Abh. zur Naturg. p. 338.*  
*t. 2 f. 4.*  
*Habitat in Surinamo.*
- exanthe- 176. *C. nigricans*: supra punctis confertis albis. *Scop. ent.*  
maticus. *carn. p. 121. n. 353.*  
*Habitat prope Tergeltum.*
- torridus. 177. *C. fuscus*: punctis miniatis. *Scop. ann. histor. nat. 5.*  
*p. 110. n. 109.*  
*Habitat in America torrida.*
- Frischii. 178. *C. nigricans excavato-punctatus*, elytris coriaceis con-  
natis, alis nigris.  
*Frisch inf. 13. p. 26. n. 28. t. 24.*  
*Habitat in Germania, rostro rufescente, antennarum arti-  
culis 4.*
- Schran- 179. *C. obscure ferrugineus* subtus flavus, scutello carinato:  
ckii. carina et ad basin utrinque macula flavis. *Schranck*  
*Bevtr. zur Naturg. p. 78. §. 32.*  
*Habitat in Austria.*
- variega- 180. *C. fuscus*, abdominis limbo pedibusque luteo fuscoque  
tus. variis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 467. n. 65.*  
*Habitat in Gallia.*
- fuscus. 181. *C. nigro-ferrugineus*, scutello ad anum usque producto.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 467. n. 66.*  
*Habitat in Gallia.*
- cuculla- 182. *C. ater punctatus*, scutello ad anum usque producto.  
tus. *Geoffr. inf. par. 1. p. 468. n. 67.*  
*Habitat in Gallia.*
- fagittifer. 183. *C. supra ater*, infra exalbidus nigro punctulatus, scutello  
atro albo-punctato posterius fagittato.  
*Schaeff. ic. t. 41. f. 1-3.*  
*Habitat in Germania.*
- carneus. 184. *C. thorace croceo*, elytris incarnatis.  
*Schaeff. ic. t. 57. f. 3.*  
*Habitat in Germania.*

- flavo-viri- 185. *C. flavo-virescens*, scutelli apice nitide albo.  
dis. *Schaeff. ic. t. 109. f. 8. 9.*  
*Habitat in Germania.*
- caruncu- 186. *C. flavo viridique varius*, abdomine atro: margine flavo,  
latus. ano tuberculis sex fanguineis.  
*Schaeff. ic. t. 244 f. 1. 2.*  
*Habitat in Germania.*

TT *thorace utrinque spina armato, spinosif.*

- Taurus. 187. *C. griseus*, thoracis spinis porrectis compressis truncatis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 344. n. 34. mant. inf. 2. p. 283. n. 39.*  
*Habitat in Coromandel, magnus.*
- Cervus. 188. *C. viridis*, elytris fuscis: margine albo, thoracis spinis  
obtusis subbifidis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 283. n. 40.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- bidens. 23. *C. ovatus griseus*, thorace acute spinoso, antennis rufis.  
*Fn. succ. 921.\* Fuessli inf. helv. p. 25. n. 482. Fabr. sp.*  
*inf. 2. p. 344. n. 35. mant. inf. 2. p. 283. n. 41.*  
*Degeer inf. 3. p. 259. n. 6. t. 13. f. 9. Cimex ovatus fuscus &c.*  
*Sulz. inf. t. II. f. 72.*  
*Habitat in Europa.*
- fanguini- 189. *C. fuscus*, thoracis spinis obtusis, scutello apice albido,  
pes. abdominis margine maculato, pedibus rufis. *Fabr. sp.*  
*inf. 2. p. 344. n. 36. mant. inf. 2. p. 283. n. 42.*  
*Habitat in Italia, statura grisei.*
- rufipes. 24. *C. ovatus griseus*, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris.  
*Fn. succ. 922.\* Fuessli inf. helv. p. 25. n. 483. Fabr. sp.*  
*inf. 2. p. 344. n. 37. mant. inf. 2. p. 283. n. 43.*  
*Degeer inf. 3. p. 253. n. 2.*  
*Raj. inf. p. 54. n. 2.*  
*Schaeff. icon. t. 57. f. 6. 7.*  
*Habitat in Europa frequens.*
- lentigino- 586. *C. ovatus griseus*, thorace obtuse spinoso, elytrorum  
fus. punctis antennisque fuscis; articulis 2. 3. 4. lividis, mem-  
brana maculis lentiginosis adspersa. *Mus. Lesk. p. 118.*  
*n. 78. b.*  
*Habitat in Europa.*

- multicolor. 587. *C. ovatus fuscus*, thorace elytrisque rufo-griseis, antennis albo-annulatis, femoribus nigris basi albis, tibiis albis: apice plantisque nigris. *Mus. Lesk. p. 118. n. 78. c.*  
*Habitat in Europa.*
- luridus. 190. *C. thorace obtuse spinoso subvirescente*, elytris griseis: macula fulca, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 345. n. 38. mant. inf. 2. p. 283. n. 44.*  
*Habitat in Angliæ nemoribus.*
- nigricornis. 191. *C. subferrugineus*, thorace obtuse spinoso, spinis antennisque nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 345. n. 39. mant. inf. 2. p. 284. n. 45.*  
*Habitat in Saxonia.*
- nigrispinus. 192. *C. supra griseus*, thorace obtuse spinoso, capite spinisque nigris, antennis annulo albo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 284. n. 46.*  
*Habitat in Sina, statura et magnitudine nigricornis.*
- ictericus. 25. *C. ovatus incarnatus subtus flavus*, thorace acute spinoso. *Amoen. acad. 6. p. 399. n. 41.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 345. n. 40. mant. inf. 2. p. 284. n. 47.*  
*Cimex thorace spinoso, oblongus supra rufescens subtus flavus.*  
*Habitat in America et Calabria.*
- floridanus. 26. *C. ovatus niger rubro varius*, scutello maculis tribus rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 49. mant. inf. 2. p. 284. n. 52.*  
*Habitat in America, mediæ magnitudinis.*
- armatus. 193. *C. thorace acute spinoso*, scutello nigro: punctis duobus apiceque testaceis, antennis pedibusque rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 45. mant. inf. 2. p. 284. n. 53.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- haemorrhous. 27. *C. oblongus niger*, abdomine rufo, elytris punctis linearibus quinque nigris. *Amoen. acad. 6. p. 400. n. 45.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 46. mant. inf. 2. p. 284. n. 54.*  
*Habitat in America.*

28. *C.*

*An huc etiam referendæ species a Seba vol. mus. 4. delineatæ, flavo-tesellatus t. 95. f. 25. spinosus t. 95. f. 31. 32. quadrispinosus t. 95. f. 33. 34. hispidus t. 97. f. 35.*

- margina- 28. C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato acuto,  
tus. antennis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 70. mant. inf. 2. p. 287. n. 82.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 719. n. 28. Fn. suec. 923.\* Scop. ent. carn. 363. Fuessli inf. helv. p. 25. n. 484.* Cimex oblongo-ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, antennis medio rubris.  
*Fn. suec. 1. n. 662.* Cimex oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.  
*Degeer inf. 3. p. 272. n. 17.* Cimex auriculatus.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 446. n. 20.*  
*Schaeff. ic. t. 41. f. 415.*  
*Stoll cimic. 2. t. 5. f. 37.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- spiniger. 194. C. thorace obtuse spinoso dentatoque, capite quadri-spinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 71. mant. inf. 2. p. 287. n. 83.*  
*Habitat in Italia, statura marginati, at duplo minor.*
- pugnator. 195. C. oblongus supra fuscus subtus flavescens, thorace acute spinoso, antennis rufis apice nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 287. n. 84.*  
*Habitat Tranquebariae, statura et magnitudine spinigeri.*
- fascicula- 196. C. cinereus, thorace subspinoso, alis fuscis, pedibus  
tus. fasciculato tuberculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 72. mant. inf. 2. p. 287. n. 85.*  
*Habitat ad caput bonae spei, marginato duplo minor.*
- insidia- 197. C. supra rufus subtus flavescens, thorace acute spinoso.  
tor. *Fabr. mant. inf. 2. p. 287. n. 86.*  
*Habitat in Barbaria, quadrato minor, alis albidis.*
- quadra- 198. C. supra fuscus subtus flavescens, thorace obtuse spinoso,  
tus. abdomine quadrato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 73. mant. inf. 2. p. 287. n. 87.*  
*Stoll cimic. 2. t. 5. f. 36.*  
*Habitat in Germania.*
- hastatus. 199. C. thorace acute spinoso dentatoque, elytris obscuris. striga posteriore alba. *Fabr. mant. inf. 2. p. 287. n. 88.*  
*Habitat Tranquebariae, statura quadrati, at minor.*

- velox. 200. C. thorace acute spinoso bipunctato, clytris puncto ba-  
seos ltrigaque flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 74. mant.*  
*inf. 2. p. 287. n. 88.*  
*Habitat in America.*
- Merianac. 201. C. thorace subspinoso, elytris fuscis albo reticulatis,  
abdominis basi spinosa. *Fabr. sp. inf. 2. p. 350. n. 75.*  
*mant. inf. 2. p. 287. n. 89.*  
*Merian. inf. surin. t. 51.*  
*Habitat in Surinamo.*
- bipustula- 29. C. oblongiusculus niger, punctis verticis duobus coccineis.  
tus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 346. n. 47. mant. inf. 2. p. 284. n. 55.*  
Cimex thorace spinoso niger, elytris lividis, capite pun-  
ctis duobus coccineis.  
*Degeer inf. 3. p. 334. n. 8. t. 34. f. 10. Cimex balteatus.*  
*Habitat in America meridionali.*
- scaber. 30. C. oblongiusculus testaceus, thorace angulato-spinoso,  
alis nigris, femoribus denticulatis. *Amoen. acad. 6. p.*  
*400. n. 43.\**  
*Habitat in Java.*
- punicus. 31. C. ovatus niger, scutello lunula apiceque rubris. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 346. n. 48. mant. inf. 2. p. 284. n. 56.*  
*Habitat in Africa, magnitudine c. baccarum.*
- Ypsilon. 32. C. ovatus lividus, scutello ypsilon flavo inscripto. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 346. n. 49. mant. inf. 2. p. 284. n. 57.*  
*Degeer inf. 3. p. 332. n. 6. t. 34. f. 7. 8. Cimex ypsilon*  
*acneus.*  
*Habitat in America meridionali.*
- clypea- 33. C. ovatus viridis, fascia flavicante, capite clypeato. *Fabr.*  
tus. *sp. inf. 2. p. 346. n. 50. mant. inf. 2. p. 284. n. 58.*  
*Gron. zooph. 691. Cimex ovatus, thorace utrinque acu-*  
*leato fascia transversali flavicante, scutello gibboso, ca-*  
*pite clypeato, ano serrato.*  
*Habitat in Sina.*
- albicollis. 202. C. supra viridis, thorace dentato, capite thoracisque an-  
teriore scutellique basi flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 347.*  
*n. 51. mant. inf. 2. p. 284. n. 59.*  
*Drury inf. 2. t. 36. f. 4. Cimex flavicollis.*  
*Habitat in Jamaica, subtus flavescens.*

- punctatus. 34. *C. ovatus punctatus*, tibiis annulo albo. *Fn. suec.* 924.\*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 345. n. 41. *mant. inf.* 2. p. 284. n. 48.  
 Cimex thorace subspinoso fuscus, abdominis margine variegato, tibiis annulo albo.  
*Degeer inf.* 3. p. 269. n. 14.  
*Habitat in America boreali, subtus griseus, antennis nigris.*
- varius. 203. *C. supra rufus* subtus flavescens, thorace obtuse spinoso, scutello nigro basi apiceque albo. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 284. n. 49.  
*Habitat in Hispania, statura et magnitudine albipedis, capite antennisque nigris, pedibus rufis.*
- albipes. 204. *C. supra nigricans*, thoracis subspinosi margine scutellique apice albis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 345. n. 42. *mant. inf.* 2. p. 284. n. 50.  
*Habitat in Italia, subtus pallidus, statura punctati.*
- dentatus. 205. *C. thorace acute spinoso ferrulato*, corpore cinereo nigroque vario. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 346. n. 43. *mant. inf.* 2. p. 284. n. 51.  
*Habitat in India.*
- haemorrhoidalis. 35. *C. ovato-oblongus griseus*, thorace acute spinoso, antennis nigris, sterno porrecto. *Fn. suec.* 925.\* *Fuessli inf. helv.* p. 25. n. 485.  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 347. n. 52. *mant. inf.* 2. p. 285. n. 60.  
 Cimex thorace obtuse spinoso subvirescens, antennis nigris, sterno porrecto.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 465. n. 63.  
*Degeer inf.* 3. p. 254. n. 3. t. 35. f. 7.  
*Sulz. hist. inf.* t. 11. f. 72.  
*Schaeff. ic. t.* 57. f. 8?  
*Habitat in Europae graminosis.*
- spinidens. 206. *C. fuscus*, thorace acute spinoso, scutello apice elytris margine albis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 285. n. 61.  
*Habitat Tranquebariae, magnus, spinis unidentatis.*
- oculatus. 207. *C. griseus*, scutello punctis duobus flavis, tarsis anterioribus apice compresso membranaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 347. n. 53. *mant. inf.* 2. p. 285. n. 62.  
*Habitat in Sina.*
- annulatus. 208. *C. griseus*, tibiis albo annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 347. n. 54. *mant. inf.* 2. p. 285. n. 63.  
*Habitat in Virginia.*

Yyyyyy

209. C.

- quadri- 209. *C. thorace crenato obtuse spinoso scutelloque punctis duo-*  
 pustulatus. *bus rufis. Fabr. sp. inf. 2. p. 347. n. 55. mant. inf. 2.*  
*p. 285. n. 64.*  
*Habitat in America.*
- macula- 210. *C. virescens, thorace obtuse spinoso: maculis quatuor,*  
 tus. *scutello clytrisque apice fulcis. Fabr. sp. inf. 2. p. 347.*  
*n. 56. mant. inf. 2. p. 285. n. 65.*  
*Habitat in America, clytrorum apice varius concolore.*
- pugnax. 211. *C. oblongus virescens, thorace acute spinoso, anten-*  
 nis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 57. mant. inf. 2.*  
*p. 285. n. 66.*  
*Habitat in America.*
- emeritus. 212. *C. virescens, thorace acute spinoso, abdomine lineis dua-*  
 bus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 58. mant. inf. 2.*  
*p. 285. n. 67.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- gladiator. 213. *C. thorace acute spinoso scutelloque flavescens nigro*  
*punctatis elytris punctis albis scabris. Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 348. n. 59. mant. inf. 2. p. 285. n. 68.*  
*Stoll cimic. 2. t. 2. f. 12.*  
*Habitat in America et ad caput bonae spei.*
- fureatus. 214. *C. fuscus, thorace acute spinoso ferrato, clypeo acumi-*  
 nato bitido. *Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 60. mant. inf. 2.*  
*p. 285. n. 69.*  
*Habitat in Patagonia, nonnunquam totus griseus.*
- pugilla- 215. *C. fuscus, subtus fulvus nigro punctatus: margine flavo*  
 tor. *thorace acute spinoso. Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 61.*  
*mant. inf. 2. p. 285. n. 70.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magnus.*
- vicior. 216. *C. fuscus, thorace acute spinoso, scutello apice rufo,*  
 pedibus pallidis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 348-*  
*n. 62. mant. inf. 2. p. 285. n. 71.*  
*Habitat in Brasilia, et insulis Americae oppositis.*
- ciliatus. 217. *C. thorace ciliato obtuse spinoso nigro: margine fascia-*  
 que posteriore flavis, femoribus posterioribus ferratis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 63. mant. inf. 2. p. 286. n. 72.*  
*Habitat in America.*



- bellator. 218. *C. supra fuscus subtus flavescens, antennis atris albo annulatis. Fabr. mant. inf. 2. p. 286. n. 73.*  
*Habitat in Cayenna, mediæ magnitudinis.*
- armiger. 219. *C. griseus, thorace acute spinoso, scutello punctis duobus, antennis pedibusque pallidis. Fabr. sp. inf. 2. p. 348. n. 64. mant. inf. 2. p. 286. n. 74.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali.*
- feorbuti- 220. *C. fuscus, thorace obtuse spinoso, pedibus pallidis nigro punctatis. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 65. mant. inf. 2. p. 286. n. 75.*  
*Habitat in America,*
- delirator. 221. *C. flavescens nigro punctatus, thorace acute spinoso posterius elytrisque fuscis. Fabr. mant. inf. 2. p. 286. n. 76.*  
*Habitat in Cayenna, parvus.*
- melacan- 222. *C. obscure ferrugineus, thoracis spinis acutis atris, abdomine atro: vittis flavescentibus. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 66. mant. inf. 2. p. 286. n. 77.*  
*Habitat in Africa æquinoctiali, parvus.*
- aggressor. 223. *C. corpore flavescente, thoracis spinis acutis subconcoloribus, ano quadridentato. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 67. mant. inf. 2. p. 286. n. 78.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- vittatus. 224. *C. virefcens, thorace subspinoso, elytris vitta submarginali flava. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 68. mant. inf. 2. p. 286. n. 79.*  
*Habitat ad caput bonæ spei, antennis ferrugineis, alis albidis.*
- hamatus. 225. *C. viridis, thorace acute spinoso, abdomine ferrato: denticulis nigris. Fabr. mant. inf. 2. p. 286. n. 80.*  
*Habitat in India, magnus, antennis nigris.*
- defensor. 226. *C. corpore viridi, thoracis spinis acutis nigris, ano quadridentato. Fabr. sp. inf. 2. p. 349. n. 69. mant. inf. 2. p. 287. n. 81.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- valgus. 36. *C. oblongus niger, thorace ferrato, femoribus posterioribus incurvis tibiisque posterioribus unidentatis. Mus. Lud. Ulr. 171.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 76. mant. inf. 2. p. 288. n. 91.*

Yyyyyy 2

*Habitat*

- Habitat ad caput bonae spei, basi abdominis nunc inermis nunc quadridentata.*
- tragus. 227. C. thoracis spinis compresso-lunatis ferratis, tibiis posterioribus membranaceo-ferratis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 92.*  
*Habitat in Sina, statura et magnitudine valgi.*
- tenebrofus. 228. C. thorace ferrulato, femoribus posterioribus incurvis clavatis, abdomine basi trispinose. *Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 93.*  
*Habitat in India, statura et magnitudine valgi.*
- fulvicornis. 229. C. fuscus, thorace ferrato, femoribus bidentatis: posterioribus multidentatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 94.*  
*Habitat in India, magnus, antennis ferrugineis.*
- femoratus. 230. C. thorace ferrulato, femoribus posterioribus incurvis dentatis, tibiisque posterioribus compressis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 77. mant. inf. 2. p. 288. n. 95.*  
*Habitat in India.*
- curvipes. 231. C. thorace acute spinoso, femoribus omnibus apice bidentatis, posterioribus incurvis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 78. mant. inf. 2. p. 288. n. 96.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura femorati.*
- magnipes. 232. C. obscurus, thorace ferrato, femoribus multispinosis: posterioribus incrassatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 288. n. 97.*  
*Habitat in Sina, femorato triplo minor.*
- membranaceus. 233. C. thorace acute spinoso nigro: fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 79. mant. inf. 2. p. 288. n. 98.*  
*Habitat in insula S. Jago promontorii viridis.*
- quadrispinosus. 37. C. elongatus ruber, thorace quadrispinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 91. mant. inf. 2. p. 290. n. 115.*  
*Degeer inf. 3. p. 347. n. 22. t. 35. f. 7.*  
*Habitat in America meridionali, antennis longissimis capillaribus.*
- phyllopus. 113. C. nigricans, thorace immaculato, elytris fascia albicante, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 80. mant. inf. 2. p. 289. n. 99.*  
*Stoll cimic. 2. t. 8. f. 54.*  
*Habitat in America australi, mediae magnitudinis.*

- auctus. 235. C. thorace subspinoso nigro: maculis duabus fulvis, elytris fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 81. mant. inf. 2. p. 289. n. 100.*  
*Habitat in Cayenna, phyllopedi proxime affinis.*
- Gonagra. 236. C. thorace subspinoso: fascia alba, elytris fuscis: puncto cinereo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 351. n. 82. mant. inf. 2. p. 289. n. 101.*  
*Habitat in insula S. Thomae in oceano americano.*
- kermesinus. 116. C. oblongus rufus: fascia albida nigro punctata, femoribus posterioribus multidentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 83. mant. inf. 2. p. 289. n. 102.*  
*Degeer inf. 3. p. 337. n. 11. t. 34. f. 15. Cimex rubro balteatus.*  
*Habitat in Surinamo, antennis fuscis.*
- australis. 237. C. oblongus niger, thorace subspinoso: fascia anteriore rubra, tibiis posterioribus basi membranaceis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 84. mant. inf. 2. p. 289. n. 103.*  
*Habitat in insula Tahiti maris australis.*
- cruciger. 238. C. oblongus supra niger, thorace acute spinoso lineis, elytris cruce ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 85. mant. inf. 2. p. 289. n. 104.*  
*Habitat in Brasilia.*
- sanctus. 239. C. oblongus rufus, thorace acute spinoso elytris nigris: cruce ferruginea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 352. n. 86. mant. inf. 2. p. 289. n. 105.*  
*Habitat in Brasilia.*
- laetus. 240. C. viridis capite fascia elytrorum abdominisque femoribusque flavis, elytris atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 289. n. 106.*  
*Habitat in Cayenna, magnus, oblongus.*
- funatus. 241. C. niger, thorace arcu anteriore, elytris fascia, corpore maculis albis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 289. n. 107.*  
*Habitat in Cayenna, statura laeti.*
- elatus. 242. C. thorace acute spinoso viridi: margine ferrugineo, elytris striatis ferrugineis, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 290. n. 108.*  
*Habitat in Cayenna, lunato minor.*

- balteatus.** 243. *C. oblongus ferrugineus*, elytris linea transversa flava, femoribus posterioribus multidentatis. *Mant. p.* 534.  
*Fabr. sp. inf. 2. p.* 352. *n.* 87. *mant. inf. 2. p.* 290. *n.* 109.  
*Drury inf. 1. t.* 43. *f.* 3.  
*Habitat in America meridionali.*
- sinuatus.** 244. *C. lividus*, thorace acute spinoso, tibiis posterioribus compressis sinuatis nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p.* 290. *n.* 110.  
*Habitat in Cayenna, statura ferripedis, at major.*
- ferripes.** 245. *C. oblongus rufus*, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p.* 353. *n.* 88.  
*mant. inf. 2. p.* 290. *n.* 111.  
*Habitat in nova Hollandia.*
- dentipes.** 246. *C. elongatus*, femoribus posterioribus elongatis ferratis, corpore fulco subtus lateribus albis. *Fabr. mant. inf. 2. p.* 290. *n.* 112.  
*Habitat in Sierra Leon Africae, lineari proxime affinis.*
- linearis.** 247. *C. elongatus fuscus*, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus elongatis denticulatis. *Fabr. sp. inf. 2. p.* 353. *n.* 89. *mant. inf. 2. p.* 290. *n.* 113.  
*Habitat in Sina.*
- crenulatus.** 248. *C. thorace dentato rufo: macula nigra*, femoribus posterioribus dentatis, corpore atro. *Fabr. sp. inf. 2. p.* 353. *n.* 90. *mant. inf. 2. p.* 290. *n.* 114.  
*Drury inf. 1. t.* 45. *f.* 1.  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, capite nigro, rubro-lineato.*
- spinifex.** 249. *C. linearis cinereus*, scutello bispinoso. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p.* 33. *f.* 48.  
*Habitat - - - facie et magnitudine tipularii.*
- setosus.** 250. *C. oblongus griseus*, thorace capite pedibusque hispidis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p.* 33.  
*Habitat in America australi et India, annulati magnitudine, at duplo angustior.*
- acutus.** 251. *C. linearis cinereus*, thoracis margine albido, abdomine punctis sex nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p.* 34.  
*Habitat - - - magnitudine et facie clavati.*

- clavatus. 252. *C. lineari-oblongus ferrugineus, femoribus posterioribus incrassatis, scutello immaculato. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 34. f. 49.*  
*Habitat in Japonia, annulati magnitudine, sed paulo angustior.*
- Jaculus. 253. *C. linearis fuscus, femoribus posterioribus incrassatis spinosis, scutello linea alba. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 34. f. 50.*  
*Habitat - - - magnitudine et facie pilosi.*
- pilosus. 254. *C. linearis ferrugineus, linea capitis pectorisque laterali albida. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 35.*  
*Habitat - - - clavato paulo minor, subtus pallidus.*
- villosus. 255. *C. spinoso-tuberculatus totus piceus villosus. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 35.*  
*Stoll cimic. t. 13. f. 90.*  
*Habitat - - - annulato major.*
- Crux. 256. *C. niger, thorace flavo: cruce nigra. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 35.*  
*Stoll cimic. t. 9. f. 65.*  
*Habitat ad caput bonae spei, personati magnitudine.*
- pungens. 257. *C. oblongus supra fuscus subtus albidus, pectore abdominisque lateribus nigro punctatis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 36.*  
*Habitat ad caput bonae spei, annulati magnitudine, glaber.*
- notatus. 258. *C. oblongus supra ferrugineus subtus cinereus, abdomine sextuplici serie punctorum nigrorum. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 37.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glaber, vix annulati magnitudine.*
- trigonus. 259. *C. testaceus, elytris scutelloque puncto albo. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 37.*  
*Stoll cimic. t. 11. f. 78. 79.*  
*Habitat in Japonia et Surinamo, glaber, c. abietis magnitudine.*
- muricatus. 260. *C. oblongus cinereus muricatus, tibiis posterioribus basidilatatis. Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 38. f. 51.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine c. hyoscyami, femorato similis.*

- unipun- 261. *C. oblongus testaceus*, elytris puncto nigro. *Thunb.*  
ctatus. *nov. inf. sp. 2. p. 38. f. 52.*  
*Habitat in Japonia, glaber, trigono plus quam duplo major.*
- thoraci- 262. *C. oblongus viridi-aureus*, thoracis margine luteo. *Thunb.*  
cus. *nov. inf. sp. 2. p. 39.*  
*Stoll cimic. t. 8. f. 55. A.*  
*Habitat in India et Surinamo, annulati magnitudine, sed longior.*
- analis.<sup>1</sup> 263. *C. oblongus viridis*, abdomine rubro, ano nigro. *Thunb.*  
*nov. inf. sp. 2. p. 39.*  
*Stoll cimic. t. 10. f. 72. B.*  
*Habitat in India et Surinamo, thoracici magnitudine, sed paulo latior.*
- transver- 264. *C. rotundatus viridis*, capite thoraceque anterieus flavis.  
sus. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 40. f. 53.*  
*Habitat in Africa, juniperini magnitudine, glaber.*
- humera- 265. *C. ovatus viridis*, elytris basi luteis. *Thunb. nov. inf.*  
lis. *sp. 2. p. 40. f. 54.*  
*Habitat - - - juniperino quadruplo major, punctis impressis.*
- subulatus. 266. *C. ovatus virefcens*, scutelli linea elevata subulata.  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 41. f. 55.*  
*Habitat - - - humeralis magnitudine et facie, subtus albidus.*
- Comma. 267. *C. rotundatus cinereus*, scutello linea flava. *Thunb.*  
*nov. inf. sp. 2. p. 41. f. 56.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine c. baccarum.*
- reticula- 268. *C. cinereus nigro varius*, thorace ferrato. *Thunb. nov.*  
tus. *inf. sp. 2. p. 42.*  
*Stoll cimic. t. 16. f. III.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glaber, magnitudine c. baccarum.*
- Fullo. 269. *C. ovatus niger*, albo irroratus, capite thoraceque linea  
alba. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 42. f. 57.*  
*Habitat in Japoniae insula Dezima, rufipede major, scarabaeo fulloni similis.*
- tibialis. 270. *C. ovatus brunneus albo fuscoque lineatus*, scutello maculis  
tribus albis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 43. f. 58.*  
*Habitat - - - magnitudine c. baccarum, glaber.*

- fulcatus. 271. *C. ovatus cinereus fusco-nebulosus*, abdomine fulcato.  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 43.*  
*Stoll cimic. t. 6. f. 47.*  
*Habitat in India, c. baccarum paulo major.*
- fuscus. 272. *C. oblongus ferrugineo-fuscus*, antennis pedibusque hirsutis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 44.*  
*Habitat - - - - valgi fere magnitudine.*
- fordidus. 273. *C. cinereus*, thorace denticulato, antennis pedibusque piloso-hilpidis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 44.*  
*Habitat in Japonia, marginati magnitudine.*
- senegalen-274. *C. thorace acute spinoso flavo: maculis nigricantibus,*  
 sis. *scutello viridi-friato posterius flavo, elytris dimidiato nigricantibus: striis obliquis viridibus, posterius fuscis: striis longitudinalibus nigris, corpore rubro: margine nigro maculato.*  
*Drury inf. 2. p. 70. t. 38. f. 4. Cimex variegatus.*  
*Habitat ad fluvium Senegal, ano denticulato, alis cinerascenscentibus nigro-reticulatis.*
- bidentatus. 275. *C. longus fuscus*, rostro arcuato, thorace subtus anterieus bidentato. *Geoffr. inf. par. 1. p. 438. n. 6.*  
*Habitat in Gallia.*
- Levia-276. *C. planus fuscus*, thorace elytrisque alatis, capite anterior cornuto, antennis brevibus crassis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 439. n. 9.*  
*Habitat in Gallia.*
- rostratus. 277. *C. oblongus fuscus immaculatus*, thorace utrinque obtuse angulato, capite inter antennas bidentato. *Geoffr. inf. par. 1. p. 446. n. 21.*  
*Habitat in Gallia.*
- acutangu-278. *C. oblongus rufus immaculatus*, thorace utrinque acute lus. angulato: margine laevi. *Geoffr. inf. par. 1. p. 447. n. 22.*  
*Habitat in Gallia.*
- immacu-279. *C. oblongus rufus immaculatus*, thorace utrinque acute lus. angulato: margine spinoso. *Geoffr. inf. par. 1. p. 447. n. 23.*  
*Habitat in Gallia.*
- porphy-280. *C. ovatus flavo-viridis*, thorace angulato, clytris pallide ropterus. purpureis, antennis nigris, pedibus roseis. *Degeer inf. 3. p. 258. n. 5. t. 13. f. 152.*

Yyyyyy 5

*Habitat*

*Habitat in Europae arboribus herbisque, mediae magnitudinis, an hujus tribus?*

- pustulatus. 281. C. ovatus rufus: maculis flavescentibus sparsis, thorace angulato, scutello elongato. *Degeer inf. 3. p. 329. n. 2. t. 34. f. 2.*  
*Habitat in India, varioloso paulo minor, an hujus tribus?*
- leucostictos. 282. C. ovatus flavo-griseus, thorace acute spinoso scutelloque punctis excavatis nigris, elytris punctis elevatis albis. *Degeer inf. 3. p. 331. n. 5. t. 34. f. 6.*  
*Habitat in Surinamo, satis magnus.*
- pensylvanicus. 283. C. subrotundus totus viridis, thorace angulato. *Degeer inf. 3. p. 330. n. 4. t. 34. f. 5.*  
*Habitat in Pennsylvania; an hujus tribus?*
- litteratus. 284. C. oblongo-ovatus griseus, scutello ypsilon flavo inscripto, antennis pedibusque testaceis. *Degeer inf. 3. p. 333. n. 7. t. 34. f. 9.* Cimex Ypsilon griseus.  
*Habitat in Surinamo, ypsilon affinis.*
- tigripes. 285. C. oblongus supra fuscus subtus griseus, femoribus dentatis nigro maculatis. *Degeer inf. 3. p. 335. n. 10. t. 34. f. 12.*  
*Habitat in Surinamo, muscae domesticae magnitudine.*
- austriacus. 286. C. ovatus ferrugineus, scutello interstincto: fascia nigra. *Schranck Beytr. z. Naturg. §. 33. p. 78. t. 3. f. 16.*  
*Habitat prope Mauer Austriae inferioris.*
- chalybeus. 588. C. nigro-aeneus immaculatus. *Mus. Lesk. p. 118. n. 78. d.*  
*Habitat in Europa.*
- beryllinus. 589. C. thorace obtuse spinoso utrinque dentato, spinarum apicibus clypeoque bifido ex caeruleo virescentibus. *Mus. Lesk. p. 118. n. 79.*  
*Habitat in Europa, antennarum articulo quarto posterius dimidio albo.*
- adultus. 590. C. thorace acute spinoso, capite, spinarum apice, scutelli medio, elytris utrinque ad basin scutelli membranarumque marginibus externis nigris. *Mus. Lesk. p. 118. n. 80.*  
*Habitat in Europa.*



- bidens. 591. C. thorace obtuse spinoso, elytrorum margine interno et posteriore anoque bidentato sanguineis, elytris pallidis. *Mus. Lesk. p. 118. n. 81.*  
*Habitat in Europa.*
- bilobus. 592. C. thorace obtuse dentato, elytris griseis punctatis aut rufescentibus, ano bilobo. *Mus. Lesk. p. 118. n. 82.*  
*Habitat in Europa.*
- distinctus. 593. C. oblongus, thorace obtuse spinoso subtus luteo, supra antennisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 119. n. 83.*  
*Habitat in Europa.*
- rubricornis. 594. C. thorace hispido obtuse spinoso, antennis hispidis coccineis: articulo ultimo nigro. *Mus. Lesk. p. 119. n. 84.*  
*Habitat in Europa.*
- aculeatus. 595. C. griseus, thorace spinoso: spinis anterieus antennarumque articulis secundo tertioque nigris. *Mus. Lesk. p. 119. n. 85.*  
*Habitat in Europa.*
- conspersus. 596. C. thorace obtuse spinoso: anterieus punctis duobus impressis, abdomine subtus utrinque nigro punctato, gutta ad anum nigra. *Mus. Lesk. p. 119. n. 86.*  
*Habitat in Europa.*

III thorace mutico.

† rotundati s. ovati.

- aurantius. 287. C. aurantius, capite, thoracis margine anteriori, abdominis maculis marginalibus pedibusque atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 290. n. 116. Sulz. hist. inf. t. 10. f. 10.*  
*Drury inf. 2. t. 36. f. 5. Cimex incarnatus.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 46.*  
*Stoll cimic. 2. t. 6. f. 39. et. t. 2. f. 10. A.*  
*Habitat in Java, Zeilona, India, magnus.*
- Punctum. 288. C. supra nigricans, thorace posterius aurantio, elytris albis: puncto nigro. *Fabr. mant. inf. 2. p. 291. n. 117.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 9. Cimex nigripes.*  
*Stoll cimic. 2. t. 6. f. 40.*  
*Habitat in Java, magnus.*
- melanopus. 289. C. supra sanguineus, scutello maculis duabus, elytris unica nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 92. mant. inf. 2. p. 291. n. 118.*

*Drury*

- Drury inf. 2. t. 36. f. 5. Cimex incarnatus.*  
*Stoll cimic. 2. t. 2. f. 10.*  
*Habitat in India, scutelli maculis interdum nullis.*
- torquatus. 290. *C. viridis, capite thoraceque antierius flavescens.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 93. mant. inf. 2. p. 291. n. 119.*  
*Habitat in India, Italia.*
- rutilans. 291. *C. viridi-aeneus, thorace fascia anteriore sanguinea, scutello elytrisqne antierius flavescens.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 353. n. 94. mant. inf. 2. p. 291. n. 120.*  
*Stoll cimic. 2. t. 18. f. 122. A.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magnus, antennis nigris.*
- guttatus. 292. *C. viridi-aeneus albido punctatus, tibiis anterioribus membranaceis dilatatis.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 291. n. 121.*  
*Habitat in Siam, magnus.*
- viridulus. 39. *C. supra flavus: punctis viridibus, subtus viridis.* *Musf. Lud. Ulr. 172.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 95. mant. inf. 2. p. 291. n. 122.*  
*Habitat in America australi et India.*
- peregrinator. 40. *C. suborbiculatus depressus griseo pallidoque varius, thorace scabro.* *Musf. Lud. Ulr. 173.\**  
*Habitat in America australi et India.*
- bipunctatus. 41. *C. pallide griseus: puncto albo utrinque ad basin scutelli.*  
*Musf. Lud. Ulr. 174.*  
*Habitat in Syria.*
- sexpunctatus. 42. *C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo: punctis sex nigris.* *Musf. Lud. Ulr. 175.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 105. mant. inf. 2. p. 293. n. 136.*  
*Habitat in America australi, India, Sibiria.*
- signatus. 293. *C. griseus, scutello vitta nigra.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 106. mant. inf. 2. p. 293. n. 137.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- gravis. 294. *C. fuscus, scutello punctis duobus flavis, elytris puncto nigro.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 107. mant. inf. 2. p. 293. n. 138.*  
*Habitat in nova Seelandia, mediae magnitudinis.*
- Forsk. 295. *C. viridis, thoracis abdominisque margine sanguineo.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 356. n. 108. mant. inf. 2. p. 293. n. 139.*  
*Habitat in Oriente.*

296. *C.*

- Hybneri. 296. *C. virefcens*, thorace fascia fanguinea. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 293. n. 140.  
*Habitat* Tranquebariae, *ftatura et magnitudine cincti, fubtus flavefcens.*
- eruentus. 297. *C. viridis*, thoracis abdominisque marginibus, antennis pedibusque fanguineis. *Fabr. fp. inf.* 2. p. 356. n. 109.  
*mant. inf.* 2. p. 293. n. 141.  
*Habitat in Surinamo.*
- geniculatus. 298. *C. obfcurus*, thoracis abdominisque margine flavefcente, ano pedumque geniculis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 293. n. 142.  
*Habitat in Cayenna, magnus, capite nigro.*
- mixtus. 299. *C. punctatus grifeus nigro maculatus*, abdominis margine nigro: punctis flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 294. n. 143.  
*Habitat in Cayenna, magnus, antennis fufcis.*
- tripterus. 300. *C. flavo rufoque varius*, antennis nigris: ultimo articulo apice albo. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 294. n. 144.  
*Habitat in Cayenna, ftatura mixti, at paulo minor.*
- grifeus. 43. *C. grifeus*, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulofis, fterno porrecto. *Fn. fuc.* 926.\*  
*Fabr. fp. inf.* 2. p. 356. n. 110. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 145.  
*Cimex ovatus grifeus*, abdominis lateribus albo nigroque variis, ventre antice fpinofa.  
*Degeer inf.* 3. p. 261. n. 8. t. 14. f. 9. *Cimex betulae.*  
*Habitat in Europa, antennis nigris flavo annulatis.*
- interftinctus. 44. *C. grifeus*, abdominis lateribus rubro nigroque variis, alis albis, fterno porrecto. *Fn. fuc.* 927.\*  
*Fabr. fp. inf.* 2. p. 356. n. 111. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 146.  
*Cimex ovatus grifeus*, abdominis margine nigro maculato.  
*Habitat in Europae cultis.*
- papillofus. 301. *C. fufcus*, antennis nigris, fterno gibbo compresso. *Fabr. fp. inf.* 2. p. 356. n. 112. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 147.  
*Stoll cimic.* 2. t. 1. f. 2.  
*Drury inf.* 1. t. 43. f. 2.  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*
- funebri. 302. *C. ater*, antennis, pedibus alisque concoloribus. *Fabr. fp. inf.* 2. p. 356. n. 113. *mant. inf.* 2. p. 294. n. 148.  
*Habitat in Sierra Leon Africae.*

- ruficornis. 303. *C. ater*, antennis rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 356. n. 114. mant. inf. 2. p. 294. n. 149.*  
*Habitat in India.*
- baccarum. 45. *C. subfulvus*, abdominis margine fusco maculato. *Fn. succ. 928. Scop. ent. carn. 360. Fabr. sp. inf. 2. p. 356. n. 115. mant. inf. 2. p. 294. n. 150. Fuessli inf. helv. p. 25. n. 486.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 466. n. 64. Cimex fuscus*, antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.  
*Degeer inf. 3. p. 257. n. 4. t. 14. f. 5. Cimex verbasci.*  
*Raj. inf. p. 54. n. 2. Cimex scapulis magnis extantibus*, macula e flavo rubente in centro crucis dorsalis.  
*List. loq. 396. mut. t. 31. f. 19. Cimex ex luteo virescenti* infuscatus ad alvi margines nigris maculis.  
*Fonst. inf. t. 17. f. 9.*  
*Schaeff. icon. t. 57. f. 1. 2.*  
*Habitat in Europae baccis frequens.*
- Cribrum. 304. *C. fuscus*, thorace scutelloque punctatis, abdominis punctis genibusque flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 357. n. 116. mant. inf. 2. p. 294. n. 151.*  
*Habitat in America, magnus, antennis nigris.*
- brevicornis. 305. *C. obscure cupreus*, antennis brevibus compressis, femoribus anterioribus dentatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 294. n. 152.*  
*Habitat in Sina, statura c. baccarum.*
- glaucus. 306. *C. glaucus*, elytris apice puncto nigro. *Fabr. sp. inf. 2. p. 357. n. 117. mant. inf. 2. p. 295. n. 153.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- Janus. 307. *C. rotundatus supra sanguineus*, capite scutelli basi alisque atris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 357. n. 118. mant. inf. 2. p. 295. n. 154.*  
*Drury inf. 3. t. 46. f. 7. Cimex aser.*  
*Stoll cimic. 2. t. 6. f. 41.*  
*Schroet. Abb. 1. t. 2. f. 4.*  
*Habitat in America.*
- dumosus. 46. *C. subrotundus griseus*, margine undique sanguineo. *Fn. succ. 929.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 101. mant. inf. 2. p. 293. n. 131.*  
*Habitat in Europa.*

- tripunctatus. 308. *C. rotundatus flavescens*, capite lineis, scutello punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 102. mant. inf. 2. p. 293. n. 132.*  
*Habitat in America.*
- atoma- 309. *C. griseo fuscoque varius*, alis albis fusco punctatis. *Fabr. rarius. sp. inf. 2. p. 355. n. 103. mant. inf. 2. p. 293. n. 133.*  
*Habitat in insula terrae novae.*
- nubilus. 310. *C. griseo nigroque varius*, alis albis nigro striatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 104. mant. inf. 2. p. 293. n. 134.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*
- tristriatus. 311. *C. flavescens*, elytris apice puncto ocellari atro, abdomine lineis tribus albis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 293. n. 135.*  
*Habitat in agro Pedemontano, statura parva nubili.*
- variolo- 47. *C. flavus*, thorace subspinoso punctis fuscis excavatis vario-  
sus. lofo, scutello basi gibbo.  
*Habitat in America majusculus, auron ad praecedentem tri-  
bum relegandus?*
- juniperi- 48. *C. subrotundus viridis*, margine undique scutelloque api-  
nus, ce flavo. *Fn. succ. 930.\* Scop. ent. carn. 359. Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 98. mant. inf. 2. p. 292. n. 125. Fuessli inf. helv. p. 25. n. 487.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 464. n. 61. Cimex subrotundus viridis. Raj. inf. p. 53 n. 1. Cimex sylvestris viridis. Degeer inf. 3. p. 231. t. 13. f. 1. 2.*  
*Habitat in Europae juniperetis.*
- smarag- 312. *C. viridis*, scutello punctis tribus baseos flavis. *Fabr. sp. dulus. inf. 2. p. 354. n. 99. mant. inf. 2. p. 292. n. 126.*  
*Habitat in insula Madera.*
- Beryllus. 313. *C. pallidus*, thoracis margine aurantio, elytris macula ferruginea lineolisque marginalibus nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 292. n. 127.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*
- calidus. 314. *C. supra fulvus*, subtus testaceus, antennis nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 292. n. 128.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, mediae magnitudinis.*

- caelebs. 315. *C. fusco griseus*, scutello punctis tribus apiceque flavescentibus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 355. n. 100. mant. inf. 2. p. 292. n. 129.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- iratus. 316. *C. viridi-fuscus*, thorace fascia flava. *Fabr. mant. inf. 2. p. 292. n. 130.*  
*Habitat in Cayenna, parvus, antennis nigris.*
- prafinus. 49. *C. subrotundus totus viridis*, scutello concolore. *Fn. suec. 931. Fuessli inf. helv. p. 25. n. 488.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 96. mant. inf. 2. p. 292. n. 123.*  
*Cimex ovatus viridis immaculatus, antennis apice albo fulcoque annulatis.*  
*Degeer inf. 3. p. 266. n. 9. Cimex viridis totus.*  
*Stoll cimic. 2. t. 19. f. 127.*  
*Habitat in silvis Europae et ad caput bonae spei.*
- diffimilis. 317. *C. supra viridis subtus ferrugineus.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 354. n. 97. mant. inf. 2. p. 292. n. 124.*  
*Habitat in Germania, prasino proxime affinis.*
- caeruleus. 50. *C. caeruleus immaculatus.* *Fn. suec. 933.\* Fuessli inf. helv. p. 25. n. 489. Fabr. sp. inf. 2. p. 359. n. 129. mant. inf. 2. p. 296. n. 169.*  
*Degeer inf. 3. p. 268. n. 11.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 472. n. 75.*  
*Schaeff. ic. t. 51. f. 4.*  
*Stoll cimic. t. 31. f. 221.*  
*Habitat in Europae thesio.*
- Morio. 51. *C. ater, plantis rufis.* *Fn. suec. 932.\* Fuessli inf. helv. p. 25. n. 491. Fabr. sp. inf. 2. p. 359. n. 130. mant. inf. 2. p. 296. n. 170.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 77.*  
*Schaeff. icon. t. 57. f. 11. et t. 82. f. 6.*  
*Stoll cimic. t. 32. f. 223.*  
*Habitat in Europae oleraceis.*
- triftis. 318. *C. ater, clypeo orbiculato, thorace retuso.* *Fabr. sp. inf. 2. p. 360. n. 131. mant. inf. 2. p. 296. n. 171.*  
*Degeer inf. 3. p. 269. n. 13. Cimex niger spinipes.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 470. n. 70.*  
*Habitat in Europae plantis.*

- spinipes. 319. *C. ater*, pedibus piceis, tibiis spinosissimis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 360. n. 132. mant. inf. 2. p. 296. n. 172.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, nitidus, magnitudine et statura morionis.*
- Aethiops. 320. *C. ater*, thorace striga media impressa, tibiis spinosissimis nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 296. n. 173.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine oleracei.*
- Iugens. 321. *C. fuscus*, thoracis lineola, scutello abdominisque margine albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 360. n. 133. mant. inf. 2. p. 297. n. 174.*  
*Habitat in America.*
- melanocephalus. 322. *C. subrotundus griseus*, capite scutellique basi nigro-aeneis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 360. n. 134. mant. inf. 2. p. 297. n. 175.*  
*Habitat in Anglia et Italia.*
- Lineola. 52. *C. thorace laevi anterius atro, posterius livido distincto punctis excavatis.*  
*Habitat in America, magnitudine fere tabani, capite atro, abdomine flavo, elytris incarnatis pallidisque.*
- oleraceus. 53. *C. caeruleo-aeneus*, thorace lineola, scutello apice elytrisque puncto albo rubrove. *Fn. suec. 934.\* Fueßli inf. helv. p. 25. n. 492. Fabr. sp. inf. 2. p. 359. n. 126. mant. inf. 2. p. 296. n. 165.*  
*Raj. inf. p. 54. n. 6. Cimex sylvestris caerulefcens.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 471. n. 74.*  
*Degeer inf. 3. p. 266. n. 10. t. 15. f. 22.*  
*Schaeff. icon. t. 46. f. 4. 5.*  
*Stoll cimic. 2. t. 5. f. 32. 33.*  
*Habitat in Europae tetradynamis, quas 1760 in Suecia devastavit.*
- picus. 323. *C. subrotundus supra ater*, thorace lineis tribus, scutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 359. n. 127. mant. inf. 2. p. 296. n. 166.*  
*Habitat in India.*
- verficolor. 324. *C. varius*, capite abdomineque atris albo lineatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 296. n. 167.*  
*Habitat Tranquebariae, statura et magnitudine piceti.*

- biguttatus. 54. *C. niger*, margine undique albo, elytris puncto albo. *Fn. suec.* 935.\* *Scop. ent. carn.* 356. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 359. n. 128. *mant. inf.* 2. p. 296. n. 168. *Fuessli inf. helv.* p. 25. n. 493.  
*Habitat in Europae plantis.*
- bicolor. 55. *C. elytris nigro alboque variis, alis albis.* *Fn. suec.* 936.\* *Scop. ent. carn.* 357. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 358. n. 125. *mant. inf.* 2. p. 296. n. 164. *Fuessli inf. helv.* p. 126. n. 494. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 470. n. 73. *Cimex ovatus niger*, thoracis lateribus elytrorumque maculis quatuor albis. *Degeer inf.* 3. p. 268. n. 12. *Cimex ovatus niger nitidus*, thorace elytris tibiisque spinosis albo maculatis. *Raj. inf.* p. 54. n. 5. *Cimex colore nigro splendente, maculis albis picto.* *List. scar.* p. 396. n. 38. *Cimex niger, maculis candidis notatus.* *Petiv. gazoph.* t. 14. f. 7. *Cimex niger albo maculatus.* *Schaeff. icon.* t. 41. f. 8. 9. *Stoll cimic.* t. 32. f. 224.  
*Habitat in Europae hortis.*
- ornatus. 56. *C. nigro rubroque varius, capite alisque nigris.* *Fn. suec.* 937.\* *Scop. ent. carn.* 361. *Fuessli inf. helv.* p. 26. n. 495. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 357. n. 119. *mant. inf.* 2. p. 295. n. 155.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 469. n. 69.  
*Sulz. inf.* t. 11. f. 73.  
*Schaeff. icon.* t. 60. f. 10.  
*Stoll cimic.* 2. t. 2. f. 11.  
*Habitat in Europa et Oriente.*
- festivus. 57. *C. nigro rubroque varius, thorace punctis sex nigris, alis fuscis: margine albido.* *Fuessli inf. helv.* p. 26. n. 490. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 358. n. 120. *mant. inf.* 2. p. 295. n. 156. *Scop. ent. carn.* 362. *Cimex dominulus.*  
*Habitat in America boreali, Carniolia, Calabria, statura bicoloris, sed magis oblongus.*
- rutilus. 325. *C. thorace abdomineque rufis, thorace maculis quatuor, abdomine fasciis nigris.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 358. n. 121. *mant. inf.* 2. p. 295. n. 157.  
*Habitat in nova Hollandia.*



- cruciatus. 326. *C. nigro pallidoque varius*, scutello nigro: cruce alba.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 358. n. 122. mant. inf. 2. p. 295. n. 158.*  
*Habitat in India.*
- discoi- 327. *C. flavescens*, capite disco communi pedibusque nigris.  
 deus. *Fabr. mant. inf. 2. p. 295. n. 159.*  
*Habitat in Cayenna, statura et magnitudine ornati.*
- biocula- 328. *C. rotundatus supra niger*, thorace rufo: punctis duo-  
 tus. bus nigris, scutello margine rufo. *Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*358. n. 123. mant. inf. 2. p. 295. n. 160.*  
*Habitat in America.*
- grami- 329. *C. rotundatus viridis immaculatus.* *Fabr. mant. inf. 2.*  
 neus. *p. 295. n. 161.*  
*Habitat Tranquebariae, parvus.*
- fimbria- 330. *C. rotundatus viridis*, elytris griseis: macula fusca mar-  
 tus. gineque viridi. *Fabr. mant. inf. 2. p. 295. n. 162.*  
*Habitat in Sina, parvus.*
- italicus. 331. *C. obscure rufus*, scutello punctis duobus apiceque albis,  
 abdominis margine nigro punctato. *Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*358. n. 124. mant. inf. 2. p. 296. n. 162.*  
*Habitat in Italia, magnitudine oleracei.*
- ruber. 58. *C. ruber*, alis fuscis, elytris lineola transversa alba. *Fn.*  
*suec. 938.\**  
*Habitat in Europae urticis aliisque plantis.*
- acumina- 59. *C. ovalis* anterieus attenuatus cinereo-exalbidus, antennis  
 tus. incarnatis. *Fn. suec. 939.\* Fueßli inf. helv. p. 26. n. 498.*  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 360. n. 135. mant. inf. 2. p. 297. n. 176.*  
*Cimex ovalis antice attenuatus exalbidus fulco striatus,*  
*antennis apice rufis.*  
*Degeer inf. 3. p. 271. n. 16. t. 14. f. 12. 13. Cimex ro-*  
*stratus.*  
*Raj. inf. p. 56. n. 6. Musca cimiciformis.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 472. n. 77.*  
*List. mut. t. 31. f. 20.*  
*Schaeff. icon. t. 42. f. 11.*  
*Habitat in Europae plantis.*
- minutus. 61. *C. elytris lividis apice fuscis.* *Fn. suec. 941.\**  
*Habitat in Europa.*

- collaris. 63. C. rostro arcuato, corpore nigro, thorace posteriore elytrisque anterioribus ferrugineis, elytris posterioribusque nigris. *Habitat in Guinea, oblongus, magnitudine et statura personati, an forte ejusdem cum eo tribus?*
- javanicus. 332. C. luteus ano obtuso, antennis pedibusque ferrugineis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 45.*  
*Stoll cimic. t. 1. f. 2.*  
*Habitat in Java, glaber, inter maximos hujus generis.*
- sinensis. 333. C. flavescens, ano quadridentato, sterno porrecto. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 45. f. 59.*  
*Habitat in Japonia et Sina, glaber, inter maximos hujus generis.*
- brunneus. 334. C. supra brunneus subtus fuscus, antennis pilosis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 45.*  
*Habitat in India, rufipede paulo major, glaber.*
- Anchora. 335. C. rotundatus thorace elytrisque maculis sex nigris, scutello anchora alba. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 47. f. 60.*  
*Habitat in Japonia et Sina, grisei magnitudine, cruciatio affinis.*
- capensis. 336. C. rotundatus niger, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 47. f. 61.*  
*Habitat ad caput bonae spei, oleraceo paulo major, glaberrimus.*
- Thunbergii. 337. C. rotundatus nigro cinereoque variis scutello punctis duobus flavis, capite thoraceque albo lineatis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 48. f. 62.*  
*Habitat - - - - grisei magnitudine, punctatissimus.*
- venosus. 338. C. rotundatus ruber fusco pictus, abdomine serie sextuplici punctorum nigrorum. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 49.*  
*Habitat ad caput bonae spei, oleracei magnitudine.*
- costatus. 339. C. cinereus, linea elytrorum nigra. *Thunb. nov. inf. sp. p. 50. f. 63.*  
*Habitat in regionibus interioribus capitis bonae spei, oleraceo paulo major, glaber.*
- cornutus. 340. C. depressus cinereus, thorace lineis tribus elevatis, antennis fusiformibus. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 50.*  
*Habitat in Japonia, facie et magnitudine c. cardui, an hujus tribus?*

- melaleucos. 341. *C. ater*, elytris albis: maculis duabus nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 50.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine scarabaeoidis, nitidus.*
- hirtus. 342. *C. ater*, totus hirtus. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 51.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine olivacei, opacus.*
- niger. 343. *C. ater*, thorace tibiisque ciliatis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 51.*  
*Habitat ad caput bonae spei, in America australi, India, olivacei magnitudine, aterrimus.*
- aterrimus. 344. *C. ater*, elytris dimidiato hyalinis. *Forster nov. inf. sp. 1. p. 71. n. 71.*  
*Habitat in Hispania, circa fretum Gaditanum, magnitudine ornati.*
- flavatus. 345. *C. niger*, scutello elytrisque apice lateribusque flavis, thoracis margine lineaque media flavis. *Schranck Beytr. z. Naturg. p. 79. §. 34.*  
*Habitat Vindobonae.*
- viennensis. 346. *C. caeruleo-aeneus*, elytris margine albo. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 80. §. 35.*  
*Habitat Vindobonae.*
- venustissimus. 347. *C. argenteus*, capite thoracis scutellique basi violaceo-aeneis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p. 80. §. 36.*  
*Habitat in Austria superiore.*
- dubius. 348. *C. atro-caeruleus punctatus niteas*, thoracis elytrorumque margine exteriori albo. *Scop. ent. carn. p. 121. n. 355.*  
*Habitat in Carniolia.*
- aeneus. 349. *C. pallide aeneus*: punctis impressis nigris, scutello abdomeni subaequante: basi punctis duobus albis. *Scop. ent. carn. p. 122. n. 358.*  
*Habitat prope Idriam Carnioliae.*
- danicus. 350. *C. niger*, elytris fasciis duabus luteis. *Müll. Fn. Friedrichsd. p. 29. n. 274. zool. dan. prodr. p. 106. n. 1202.*  
*Habitat in Dania.*
- roseus. 351. *C. fuscus*, abdomine incarnato, pedibus pallidis: femoribus puncto nigro. *Müll. zool. dan. prodr. p. 105. n. 1197.*  
*Habitat in Dania.*

- 2160 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Rotundatus*.)
- alatus. 352. *C. rufus* elytris alas mentientibus, antennis clavatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 106, n. 1204.*  
*Habitat in Dania.*
- rufescens. 353. *C. thorace* obtuse angulato, corpore e viridi rubroque nebuloso. *Geoffr. inf. par. 1. p. 465, n. 62.*  
*Habitat in Gallia.*
- pullus. 354. *C. ex fusco niger*, alis pallidis. *Geoffr. inf. par. 1. p. 470, n. 71.*  
*Habitat in Gallia.*
- leucomelas. 355. *C. niger*, elytrorum limbo exteriore albo. *Geoffr. inf. par. 1. p. 470, n. 72.*  
*Habitat in Gallia.*
- arboreus. 356. *C. supra fusco-viridis*, subtus flavescens, thorace linea transversa flava, elytris rubro marginatis, ano bidentato rubro. *Degeer inf. 3. p. 260, n. 7.*  
*Habitat in Europae arboribus, 5 lineas longus.*
- pufillus. 357. *C. griseus* albo marginatus nigro punctatus, abdomine aeneo nigro. *Degeer inf. 3. p. 270, n. 15.*  
*Habitat in Europa.*
- parnassiae. 584. *C. thorace rubro*, alis fuscis, corpore nigro. *Mayer Abb. boehm. Gef. 4. p. 183.*  
*Habitat in Bohemiae floribus parnassiae palustris, minimus, lente incedens, volatu agilis.*
- fulvus. 597. *C. fulvus*, alis posterius ex fusco violaceis, abdomine subtus pallido: apice quadridentato. *Mus. Lesk. p. 119, n. 88.*  
*Habitat extra Europam.*
- varius. 598. *C. rotundatus ater*, scutelli abdominisque marginibus, elytris thoraceque rubris: hoc anterius linea atra, membranis fuscis, alis luteis apice fuscis. *Mus. Lesk. p. 119, n. 89.*  
*Habitat extra Europam.*
- tricolor. 599. *C. subrotundus* virefcens, margine undique flavo, antennis rufis. *Mus. Lesk. p. 119, n. 91.*  
*Habitat in Europa.*

- albidus. 600. C. subrotundus albidus, antennis nigris: geniculis albis, elytris livido rufoque variis, scutelli apice albo. *Musf. Lesk. p. 119. n. 93.*  
*Habitat in Europa.*
- undatus. 601. C. ovalis pallidus, capite acuminato: lineis quatuor, scutelli thoracisque punctis, antennis elytrorumque rugis transversis undatis nigris. *Musf. Lesk. p. 119. n. 97.*  
*Habitat extra Europam.*
- pallidus. 602. C. pallidus nigro punctatus thoracis scutellique apice elytrorumque marginibus externis albidis. *Musf. Lesk. p. 119. n. 98.*  
*Habitat in Europa.*
- nigerimus. 603. C. niger immaculatus. *Musf. Lesk. p. 119. n. 103.*  
*Habitat in Europa.*
- melanoleucus. 604. C. ovatus niger, thorace elytrorumque margine exteriori albo. *Musf. Lesk. p. 119. n. 104.*  
*Habitat in Europa.*
- ciliatus. 605. C. niger, capite, thorace elytrisque ciliatis et pedibus nigris. *Musf. Lesk. p. 120. n. 105.*  
*Habitat in Europa.*
- excifus. 606. C. griseus, elytrorum membrana extus excisa, abdomine nigro. *Musf. Lesk. p. 120. n. 106.*  
*Habitat in Europa.*

†† Oblongi.

↓ antennis apice capillaribus.

- trifasciatus. 67. C. corpore nigro rubroque vario. *Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 202. mant. inf. 2. p. 305. n. 267.*  
Cimex oblongus niger, antennis apice capillaribus, elytris fasciis tribus rufis. *Schaeff. icon. t. 13. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*
- olivaceus. 358. C. elytris fusco-ferrugineis basi coccineis: puncto atro. *Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 203. mant. inf. 2. p. 305. n. 268.*  
*Schaeff. icon. t. 13. f. 2.*  
*Habitat in Germania.*

feticornis. 359. *C. ater*, elytris fuscis basi pallidis apiceque puncto coccineo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 204. mant. inf. 2. p. 305. n. 269.*

*Habitat* Lipsiae, capite rarius rufo.

capillaris. 360. *C. flavescens*, elytris apice coccineis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 205. mant. inf. 2. p. 305. n. 270.*

*Habitat* in Lipsiae hortis.

femiflavus. 68. *C. corpore nigro*, thorace pedibusque testaceis.

*Habitat* in Suecia, statura atris, capite antennarumque basi pilis albis hirta testaceis.

erythropus. 69. *C. rostro arcuato*, thorace posterius emarginato, pedibus rubris.

*Habitat* in Barbaria, nigro rubroque varius, antennis fuscis, elytris rufis, abdomine nigro: margine albo nigroque vario; an forte ad ultimam cimicum tribum relegandus?

ater. 72. *C. corpore atro*. *Fn. suec. 944. Fabr. sp. inf. 2. p. 371. n. 197. mant. inf. 2. p. 305. n. 261.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 460. n. 54. Cimex oblongus ater*, antennis seta terminatis.

*Habitat* in Europa boreali, etiam Calabria.

tyrannus. 361. *C. ater*, rostro femoribusque sanguineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 371. n. 198. mant. inf. 2. p. 305. n. 262.*

*Habitat* in Italia, atro proxime affinis.

Schach. 362. *C. ater*, capite scutello maculisque duabus elytrorum coccineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 371. n. 199. mant. inf. 2. p. 305. n. 263.*

*Habitat* in Italia, statura tyranni.

gothicus. 73. *C. niger*, scutello elytrorumque apicibus coccineis. *Fn. suec. 966.\* Scop. ent. carn. 381. Fuessli inf. helv. p. 26. n. 501. Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 206. mant. inf. 2. p. 305. n. 271.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 445. n. 19. Cimex oblongus niger*, thoracis lateribus scutelloque flavis, elytris antennis pedibusque flavo variegatis.

*Schaeff. icon. t. 13. f. 5.*

*Habitat* in Europa, frequens.

tricolor. 363. *C. ater*, elytris apice macula coccinea. *Fabr. mant. inf. 2. p. 306. n. 272.*

*Habitat*

*Habitat in Hispaniae urtica, gothico proxime affinis, alis nigris, macula marginali transversa pallida.*

- umbrati- 90. C. niger, elytris albo maculatis. *Fn. succ. 951.\**  
 lis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 305. n. 265.* Cimex oblongus niger,  
 elytris flavo lineatis apice fascia alba, antennis apice capil-  
 laribus.  
*Habitat in Suecia, mediae magnitudinis, pedibus piceis.*
- flavicollis. 364. C. niger, capite thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 371. n. 201. mant. inf. 2. p. 305. n. 266.*  
*Habitat in Anglia.*
- inclavatus. 97. C. niger, elytris fuscis: fasciis duabus nigris.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 371. n. 200? mant. inf. 2. p. 305. n. 264?*  
 Cimex (bifasciatus) oblongus fuscus, elytris fasciis duabus  
 albis, antennis apice capillaribus.  
*Habitat Lipsiae.*
- cimbri- 365. C. thorace elytrisque rubellis: apice macula coccinea, ni-  
 cus. gra duplicique alba. *Müll. prodr. zool. dan. p. 106. n. 1212.*  
*Habitat in Dania; an varietas gothici?*
- trilinea- 366. C. niger, thorace pedibusque cinereis, elytris fuscis: li-  
 tus. neolis transversis tribus candidis. *Müll. zool. dan. prodr.*  
*p. 106. n. 1213.*  
*Habitat in Dania.*
- spissicor- 367. C. niger, pedibus flavis, antennis incrassatis. *Fabr. sp.*  
 nis. *inf. 2. p. 372. n. 207. mant. inf. 2. p. 306. n. 273.*  
*Habitat Hamburgi.*
- planicor- 368. C. niger, alis lactescentibus, pedibus ex griseo lutescen-  
 nis. tibus, antennarum articulo medio compresso maximo.  
*Pall. spic. zool. 9. p. 23. t. 1. f. 13.*  
*Habitat in Belgio, parvus.*
- hasticor- 369. C. rufus, pectore abdomineque fasciis albis nigrisque, an-  
 nis. tennarum articulo penultimo compresso rotundato. *Thunb.*  
*nov. inf. sp. 3. p. 53. f. 64.*  
*Habitat in Aittonia capensi, ad caput bonae spei, Decembri*  
*frequens, glaber, personati magnitudine.*
- punctipes. 607. C. flavescens, femoribus fusco punctatis. *Mus. Lesk. p.*  
*121. n. 137.*  
*Habitat in Europa.*

- quadrimaculatus. 608. *C. flavescens*, thorace maculis quatuor fuscis. *Musf. Lesk. p. 121. n. 138.*  
*Habitat in Europa.*
- fuliginosus. 609. *C. niger*, capite thorace elytris que rufescentibus, thorace posterius fusco, scutello flavescente, elytrorum apice inflexo coccineo. *Musf. Lesk. p. 121. n. 139.*  
*Habitat in Europa.*
- erythrochlorus. 610. *C. oblongus rufescens*, thorace scutelloque flavis. *Musf. Lesk. p. 121. n. 140.*  
*Habitat in Europa.*
- chrysocephalus. 611. *C. niger*, capite flavo: linea longitudinali nigra, elytris ex fusco rufis: apice inflexo coccineo. *Musf. Lesk. p. 121. n. 141.*  
*Habitat in Europa.*
- stramineus. 612. *C. niger*, elytris pallidis: apice inflexo coccineo. *Musf. Lesk. p. 121. n. 142.*  
*Habitat in Europa.*
- concolor. 613. *C. fuscus*, capite thoraceque rufis, antennis scutelloque flavis, pedibus pallidis. *Musf. Lesk. p. 121. n. 143.*  
*Habitat in Europa.*
- tomentosus. 614. *C. capite thoraceque fuscis fulvo tomentosus*, abdomine rufo, elytris fusco pallidis: apice inflexo flavo, puncto extremo nigro. *Musf. Lesk. p. 122. n. 144.*  
*Habitat in Europa.*
- melano-chrysos. 615. *C. niger*, scutello posterius, elytris apice inflexo flavis. *Musf. Lesk. p. 122. n. 145.*  
*Habitat in Europa.*
- bivenis. 616. *C. niger*, elytris e flavo fuscis: apice inflexo flavo venisque duabus rubris. *Musf. Lesk. p. 122. n. 146.*  
*Habitat in Europa.*
- leucozonias. 617. *C. angustus niger*, antennis basi rubris, thorace posterius scutelloque flavis, elytris rufis: fascia obliqua apiceque inflexo albis. *Musf. Lesk. p. 122. n. 147.*  
*Habitat in Europa.*
- tricolor. 618. *C. niger*, elytris flavis: fascia transversa apiceque fuscis. *Musf. Lesk. p. 122. n. 148.*  
*Habitat in Europa.*



- ochromelas. 619. *C. niger*, antennarum elytrorumque basi, horum apice inflexo pedibusque flavis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 149.*  
*Habitat in Europa.*
- exoletus. 620. *C. niger*, thorace posterius tibiis elytrisque pallidis, horum apice inflexo rufo marginato. *Mus. Lesk. p. 122. n. 150.*  
*Habitat in Europa.*
- phoenicopterus. 621. *C. fuscus*, capite thorace elytrisque rufescentibus, antennis pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 151.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscoculus. 622. *C. flavus*, oculis fuscis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 152.*  
*Habitat in Europa.*
- leucogrammus. 623. *C. supra rufescens*, capite dorsali, abdomine subtus utrinque linea alba, thoracis tribus, elytris medio et margine externo albis: apice inflexo flavo. *Mus. Lesk. p. 122. n. 153.*  
*Habitat in Europa.*
- expallefcens. 624. *C. fuscus*, capite ventre elytrisque pallidis, his fusco subnebulosis, thorace subconico: lineolis tribus fuscis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 154.*  
*Habitat in Europa.*
- flavescens. 625. *C. pallide flavus*. *Mus. Lesk. p. 122. n. 155.*  
β) *Cimex flavescens*, capite utrinque, scutello basi elytrisque apice inflexo fuscis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 156.*  
*Habitat in Europa.*
- pallefcens. 626. *C. pallidus rufo adspersus*. *Mus. Lesk. p. 122. n. 158.*  
β) *Cimex pallidus rufescens*, scutello flavo. *Mus. Lesk. p. 122. n. 159.*  
*Habitat in Europa.*
- leucodermis. 627. *C. ovatus pallidus*: membrana elytrorum alba. *Mus. Lesk. p. 122. n. 162.*  
*Habitat in Europa.*
- discolor. 628. *C. niger*, elytris griseis: apice membranarumque apice albis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 160.*  
*Habitat in Europa.*
- imperialis. 629. *C. niger*, elytrorum margine externo, basi et apice inflexo flavis. *Mus. Lesk. p. 122. n. 161.*  
*Habitat in Europa.*

- melano- 630. *C. antennis*, thoracis margine, scutelli apice, pedibus  
rhous. et abdomine flavis, hujus apice nigro. *Mus. Lesk.* p. 122.  
n. 163.  
*Habitat in Europa.*
- vittatus. 631. *C. niger*, thorace anteriorius posterioriusque scutelloque fla-  
vis, antennarum basi elytrisque rufis: vitta apiceque in-  
flexo albis. *Mus. Lesk.* p. 122. n. 164.  
*Habitat in Europa.*
- melano- 632. *C. ovatus rufescens* abdomine medio subtus atro. *Mus.*  
gaster. *Lesk.* p. 123. n. 166.  
*Habitat in Europa.*
- fordens. 633. *C. ovatus niger*, thorace pedibusque rufis, his fusco va-  
riis. *Mus. Lesk.* p. 123. n. 167.  
*Habitat in Europa.*
- vitelli- 634. *C. ovatus flavus*, elytris apicem versus rufescentibus.  
nus. *Mus. Lesk.* p. 123. n. 168.  
*Habitat in Europa.*
- haemato- 635. *C. ovatus niger*, elytris rufo-fuscis: apice capiteque rufis.  
cephalus. *Mus. Lesk.* p. 123. n. 169.  
*Habitat in Europa.*
- leonus. 636. *C. ovatus flavo-rufus*, thorace anteriorius maculis duabus  
nigris, elytris pallidis: apice inflexo fusco. *Mus. Lesk.*  
p. 123. n. 170.  
*Habitat in Europa.*
- carbona- 637. *C. ovatus totus niger.* *Mus. Lesk.* p. 123. n. 171.  
rius. *Habitat in Europa.*
- notatus. 638. *C. ovatus pallidus*, elytrorum apice inflexo: singulis an-  
gulo puncto fusco. *Mus. Lesk.* p. 123. n. 172.  
*Habitat in Europa.*
- discors. 639. *C. ovatus supra pallidus subtus flavus.* *Mus. Lesk.* p.  
123. n. 173.  
*Habitat in Europa.*
- fusces- 640. *C. ovatus niger*, capite elytrisque pallidis: margine ex-  
cens. terno apiceque inflexo fuscescentibus. *Mus. Lesk.* p. 123.  
n. 174.  
*Habitat in Europa.*

- melano- 641. *C. ovatus fuscus*, elytris nigris: basi, medio marginis  
 pterus. antici apiceque inflexo, capite et thorace anterieus flavis.  
*Mus. Lesk. p. 123. n. 175.*  
*Habitat in Europa.*
- leucoce- 642. *C. fuscus*, antennis, elytris pedibusque albidis. *Mus.*  
 ras. *Lesk. p. 123. n. 176.*  
*Habitat in Europa.*
- ochropte- 643. *C. ater*, thorace, elytris pedibusque flavescens. *Mus.*  
 rus. *Lesk. p. 123. n. 177.*  
*Habitat in Europa.*
- melano- 644. *C. ovatus niger*, capite, thoracis dorso, elytrorumque  
 leucos. fascia media et apice inflexo albis. *Mus. Lesk. p. 123.*  
*n. 178.*  
*Habitat in Europa.*
- erythro- 645. *C. ovatus*, thorace anterieus nigro capite elytris que palli-  
 gaster. dis: punctis apiceque inflexo fulcis, abdomine rufescente.  
*Mus. Lesk. p. 123. n. 179.*  
*Habitat in Europa.*
- flisticus. 646. *C. ovatus niger*, capite elytris que pallidis, femoribus  
 nigro punctatis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 180.*  
*Habitat in Europa.*
- nubilus. 647. *C. ovatus niger*, elytris albis fusco nebulosis, pedibus  
 rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 123. n. 181.*  
*Habitat in Europa.*
- leucopus. 648. *C. fuscus*, antennis, thorace, elytris pedibusque albidis.  
*Mus. Lesk. p. 123. n. 182.*  
*Habitat in Europa.*
- conspersus. 649. *C. ovatus rufescens*, elytris albis rufo adpersis. *Mus.*  
*Lesk. p. 123. n. 183.*  
*Habitat in Europa.*
- chloro- 650. *C. pallidus*, thorace, elytris abdomineque virentibus.  
 pterus. *Mus. Lesk. p. 123. n. 184.*  
*Habitat in Europa.*
- albicans. 651. *C. ovatus pallidus*, alis albis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 185.*  
*Habitat in Europa.*
- albidus. 652. *C. ovatus rufescens*, elytris antennis pedibusque albidis.  
*Mus. Lesk. p. 123. n. 186.*  
*Habitat in Europa.*

- brunneus. 653. *C. ovatus brunneus*, alis albis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 187.*  
*Habitat in Europa.*
- chryso- 654. *C. ovatus niger*, capite elytrorum margine externo pedi-  
pus. busque flavis. *Mus. Lesk. p. 123. n. 188.*  
*Habitat in Europa.*
- 11 *antennis clavatis.*
- Branderi. 66. *C. rostro arcuato*, thorace subsexspinoso, elytris punctis  
tribus albis.  
*Habitat in Barbaria, mediae magnitudinis, griseus, subtus*  
*testaceus, antennis rufis, statura personati.*
- crassicor- 92. *C. subgriseus rubro punctatus.* *Fn. suec. 952.\* Fabr. sp.*  
nis. *inf. 2. p. 369. n. 188. mant. inf. 2. p. 303. n. 139.*  
*Schueff. icon. t. 13. f. 10.*  
*Habitat in Europa.*
- Colon. 370. *C. rubro nigroque varius*, membranis elytrorum albis:  
puncto nigro. *Thunb. nov. inf. spec. 3. p. 57.*  
*Habitat in Japonia, campestris magnitudine.*
- deustus. 371. *C. rufo-fuscus*, scutelli apice, thoracis abdominisque  
marginibus rubris. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 58.*  
β) *Stoll cimic. t. 13. f. 87.*  
*Habitat - - - magnitudine c. hyoscyami.*
- tubercu- 372. *C. abdomine supra rufo*, antennarum nodis binis: ex-  
lofus. tremo longiore. *Scop. ent. caru. p. 128. n. 372.*  
*Habitat prope Idriam Carnioliae.*
- Oculus 373. *C. ex livido flavus: maculis sanguineis, oculis capitulo*  
cancri: cylindrico insidentibus. *Degeer inf. 3. p. 343. n. 18.*  
*t. 34. f. 24.*  
*Habitat in Surinamo.*
- moestus. 374. *C. fuscus, subtus rufo-lividus*, thoracis margine livido.  
*Degeer inf. 3. p. 340. n. 14. t. 34. f. 20.*  
*Habitat in Pennsylvania.*
- subrufus. 677. *C. pallide rufus*, elytrorum fenestratorum apice, clava,  
scutelloque rufis, hujus apice pallido. *Mus. Lesk. p. 120.*  
*n. 119.*  
*Habitat in Europa.*

- fistopte- 678. *C. niger*, elytris griseis punctatis: apice maculis tribus  
 rus. fuscis, membrana alba truncata, antennis pallidis: clava  
 nigra. *Mus. Lesk. p. 120. n. 120. b.*  
*Habitat in Europa.*
- ictericus. 679. *C. fuscus*, capite thoraceque rufescentibus. *Mus. Lesk.*  
*p. 121. n. 130.*  
*Habitat in Europa.*
- 111 *antennis filiformibus.*  
 → *pedibus muticis.*
- leucoce- 60. *C. niger*, capite pedibusque fulvis. *Fn. suec. 940.\* Fabr.*  
 phalus. *sp. inf. 2. p. 370. n. 192. mant. inf. 2. p. 304. n. 255.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 472. n. 76.*  
*Degeer inf. 3. p. 290. n. 28.*  
*Habitat in Europa.*
- transver- 375. *C. viridis*, thorace lineola interrupta, elytris macula fuf-  
 falis. cis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 304. n. 256.*  
*Habitat Kilonii, statura leucocephali, at duplo minor.*
- haemato- 376. *C. sanguineus*, capite elytrorumque apicibus albidis, alis  
 des. fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 193. mant. inf. 2. p.*  
*304. n. 257.*  
*Habitat in Germania.*
- tripustu- 377. *C. niger*, scutello maculisque elytrorum tribus coccineis.  
 latus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 194. mant. inf. 2. p. 304. n. 258.*  
*Habitat in urticae dioicae racemis, Hafniae frequens, parvus.*
- Indus. 74. *C. abdomine rubro bidentato*, elytris fuscis pallide striatis.  
*Mus. Lud. Ulr. 176.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 362. n. 140.*  
*mant. inf. 2. p. 297. n. 183.*  
*Habitat in America australi et India.*
- militaris. 378. *C. rufus nigro maculatus*, alis exalbidis: striga baseos atra.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 362. n. 141. mant. inf. 2. p. 297. n. 184.*  
*Habitat in Oriente.*
- laniarius. 75. *C. rufus*, elytris apice sanguineis, thorace nigricante,  
 abdomine flavo.  
*Habitat in Succia, mediae magnitudinis.*
- hyoscya- 76. *C. rubro nigroque varius*, alis fuscis immaculatis. *Fn.*  
 mi. *suec. 945.\* It. oel. 155.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 362. n. 144.*  
*mant.*

*manr. inf.* 2. p. 298. n. 189. *Fuessli inf. helv.* p. 26. n. 502.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 441. n. 12. Cimex oblongus rubro nigroque variegatus, scutelli nigri apice rubro.

*Degeer inf.* 3. p. 274. n. 18. t. 14. f. 14. 15. Cimex oblongus ruber nigro maculatus &c.

*List. scar. angl.* p. 397. n. 39. Cimex miniatus nigris maculis notatus.

*Raj. inf.* p. 55. Cimex sylvestris minor, corpore oblongo angulato.

*Periv. gazoph.* t. 62. f. 2.

*Merian. inf. eur.* t. 51. f. 1.

*Sulz. inf. t.* 11. f. 75.

*Schaeff. icon.* t. 13. f. 1.

familia- 379. C. rubro nigroque varius, alis fuscis: puncto baseos albo.  
ris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 145. *manr. inf.* 2. p. 298. n. 190.  
*Habitat in Europae et Indiae plantis, statura et magnitudine c. bysicyami.*

rostratus. 380. C. rufus, scutello vitta marginali flava. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 146. *manr. inf.* 2. p. 298. n. 191.  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

malabari- 381. C. fuscescens, thorace scutelloque punctis duobus nigris.  
cus. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 147. *manr. inf.* 2. p. 298. n. 192.  
*Habitat ad littora malabarica.*

aulicus. 382. C. rubro nigroque varius, elytris fascia atra, alis atris: lineola basis alba. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 363. n. 148. *manr. inf.* 2. p. 298. n. 193.

β) Cimex irroratus. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. p. 55. f. 65.  
*Habitat in insulis Americae meridionali oppositis, β) ad caput bonae spei.*

383. C.

---

*Huc inter oblongos scilicet cimices referas plures a Seba mus. vol. 4. delineatas species, productiorem t. 95. f. 28. pallide virescente flavum t. 95. f. 29. sphaerico-collarem t. 95. f. 30. setaceum t. 95. f. 35-37. luteo-fuscum t. 97. f. 3. nigro-rufum t. 97. f. 5. apterum serratum t. 97. f. 12. informem t. 97. f. 21. 22. nigricantem t. 97. f. 23. brunneo-atrum t. 97. f. 24. 25. setipedem t. 97. f. 28. 29. sordidum t. 97. f. 30. 31. fusco discolorum t. 97. f. 32. nigro-cinerascentem t. 97. f. 33. 34. ovatis contra accensas foliaceum t. 96. f. 28. petoidem t. 96. f. 29. rubripedem t. 97. f. 2. et plures a Schaeffero in iconibus depictos t. 46. f. 6. t. 46. f. 7. 8. t. 57. f. 4. t. 57. f. 5. t. 57. f. 10. t. 57. f. 11. t. 79. f. 4. t. 170. f. 4. 5. t. 210. f. 3. a. b. t. 219. f. 3. a. b. t. 250. f. 5. 6. t. 272. f. 3. 4. t. 272. f. 5. 6. quorum descriptio ab Hanero expectanda.*

- varicor- 383. *C. variegatus*, capite pedibusque rufis, thoracis margi-  
nis. nibus pallidis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 298. n. 194.*  
*Habitat in India, magnus.*
- pallens. 384. *C. pallefcens*, thorace elytrisque fuscis: margine palli-  
do. *Fabr. sp. inf. 2. p. 363. n. 149. mant. inf. 2. p. 299.*  
*n. 195.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*
- cingula- 385. *C. thorace testaceo antcrius nigro: margine albo, elytris*  
tus. puncto nigro. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 150. mant. inf.*  
*2. p. 299. n. 196.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- supersti- 386. *C. rufus*, antennis, thoracis basi, fascia elytrorum alis-  
tiolus. que nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 151. mant. inf. 2.*  
*p. 299. n. 197.*  
*Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 55. f. 66.* Cimex oblongus rufus,  
thorace fascia nigra albo adjecta, elytris puncto nigro.  
*Habitat in America et ad caput bonae spei, equestris ma-*  
*gnitudine.*
- erythro- 387. *C. rufus*, elytris nigris: fascia alba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364.*  
melas. *n. 152. mant. inf. 2. p. 299. n. 198.*  
*Degeer inf. 3. p. 335. n. 9. t. 34. f. 11.* Cimex albo fasciatus.  
*Habitat in Surinamo, thoracis elytrorumque margine albido.*
- ruficollis. 388. *C. glaucus*, capite atro, thorace antcrius rufo. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 364. n. 153. mant. inf. 2. p. 299. n. 199.*  
*Habitat in Brasilia.*
- scabrosus. 389. *C. niger*, thoracis margine elytrorumque fasciis duabus  
rufescentibus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 154. mant. inf.*  
*2. p. 299. n. 200.*  
*Habitat in America.*
- leprofus. 390. *C. thorace nigro, basi margine punctisque duobus rubris,*  
elytris atris immaculatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 155.*  
*mant. inf. 2. p. 299. n. 201.*  
*Habitat in America.*
- leucurus. 391. *C. niger*, capite elytrisque rubris, alis atris basi apice-  
que albis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 299. n. 202.*  
*Habitat in insula oceani australis Amsterdam, magnitudine*  
*c. Koenigii.*

- Koenigii. 392. *C. testaceus*, elytris puncto nigro, alis atris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 364. n. 156. *mant. inf.* 2. p. 299. n. 203.  
*Stoll cimic.* 2. t. I. f. 5.  
*Habitat* Tranquebariae.
- Stanbulichii. 393. *C. fanguineus*, thorace fascia abbreviata, scutello, elytris puncto alisque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 299. n. 204.  
*Habitat in* Sina, *statura et magnitudine c. Koenigii*.
- equestris. 77. *C. rubro nigroque maculatus*, thorace anterieus posteriusque atro, alis atris albo maculatis. *Fabr. mant.* 2. p. 298. n. 185.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 726. n. 777. *Fn. suec.* 946.\* *It. oel.* 155.  
*Mus. Lud. Utr.* 177. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 362. n. 142.  
*Cimex oblongus rubro nigroque varius*, alis fulcis albo maculatis,  
*Scop. ent. carn.* 369. *Cimex speciosus*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 442. n. 14.  
*Degeer inf.* 3. p. 276. n. 19.  
*Schaeff. elem.* t. 44. f. 2.  
*icon.* t. 48. f. 8.  
*Habitat in* Europae *potissimum vincetoxico, c. hyoscyami duplo major*.
- civilis. 394. *C. rubro nigroque varius*, thorace lunulis duabus nigris, alis fulcis albo maculatis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 298. n. 186.  
*Habitat* Tranquebariae, *equestri affinis*.
- crudelis. 395. *C. rubro nigroque varius*, alis exalbidis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 362. n. 143. *mant. inf.* 2. p. 298. n. 187.  
*Habitat ad* caput bonae spei, *statura equestris*.
- apterus. 78. *C. rubro nigroque varius*, elytris rubris: punctis duobus nigris, alis nullis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 366. n. 169. *mant. inf.* 2. p. 301. n. 222. *Scop. ent. carn.* 370. *Fuessli inf. helv.* p. 26. n. 504.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 440. n. 11. t. 9. f. 4.  
*Degeer inf.* 3. p. 276. n. 20.  
*Raj. inf.* p. 55. n. 3.  
*Sulz. hist. inf.* t. 10. f. 14.  
*Stoll cimic.* 2. t. 15. f. 103.  
*Habitat gregarius in* Europa, *rarius in malva silvestri, interdum alatus*.



- striatulus. 396. *C. flavescens*, scutello elytris alisque fuscis, elytris apice cinereis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 366. n. 170. mant. inf. 2. p. 301. n. 224.*  
*Habitat in Brasilia.*
- nuffax. 397. *C. fuscus*, abdominis margine maculato, tibiis anterioribus femoribusque posterioribus basi pallidis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 366. n. 171. mant. inf. 2. p. 302. n. 223.*  
*Habitat in Italia, mediae magnitudinis.*
- aegyptius. 79. *C. rubro nigroque varius*, elytris rubris: puncto nigro. *Mus. Lud. Ulr. 178.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 364. n. 157. mant. inf. 2. p. 300. n. 205.*  
*Habitat in Aegypto.*
- mendicus. 398. *C. rubro fuscoque varius*, alis atris: apice lineolaque baseos albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 365. n. 158. mant. inf. 2. p. 300. n. 200.*  
*Habitat in Malabaria.*
- servus. 399. *C. rubro nigroque varius*, elytris apice albis, alis nigris apice albidis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 300. n. 207.*  
*Habitat in Sina, parvus, statura mendici.*
- famelicus. 400. *C. supra ater thorace elytrisque punctis duobus flavescen- tibus*, alis lineola baseos alba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 365. n. 159. mant. inf. 2. p. 300. n. 208.*  
*Stoll cimic. 2. t. 8. f. 56?*  
*Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.*
- quadriguttatus. 401. *C. elytris rufis: fascia nigra*, alis punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 365. n. 160. mant. inf. 2. p. 300. n. 209.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- discolor. 402. *C. niger*, elytris rufis: puncto medio atro, alis atris: punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 365. n. 161. mant. inf. 2. p. 300. n. 210.*  
*Habitat in Italia, parvus.*
- australis. 403. *C. elytris rufis: striga undata nigra*, alis nigris: puncto medio albo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 365. n. 162. mant. inf. 2. p. 300. n. 211.*  
*Habitat in nova Hollandia.*

- fanguino- 404. *C. fanguineus*, antennis elytris pedibusque fuscis. *Fabr.*  
lentus. *sp. inf. 2. p. 365. n. 163. mant. inf. 2. p. 300. n. 212.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*
- hispani- 405. *C. thorace elytrisque rufis: maculis duabus nigris.* *Fabr.*  
cus. *mant. inf. 2. p. 300. n. 213.*  
*Habitat in Hispania, magnitudine et statura sanguinolenti.*
- cruenta- 406. *C. rufus*, thoracis maculis duabus, antennis, alis pedi-  
tus. *busque fuscis.* *Fabr. mant. inf. 2. p. 301. n. 214.*  
*Habitat in India, sanguinolento proxime affinis.*
- futuralis. 407. *C. rufus*, antennis alisque nigris: futuris omnibus albis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 365. n. 164. mant. inf. 2. p. 301. n. 215.*  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*
- rubigi- 408. *C. supra rufus*, alis albidis: macula magna fusca. *Fabr.*  
notus. *mant. inf. 2. p. 301. n. 216.*  
*Habitat ad caput bonae spei, futurali major.*
- excavatus. 409. *C. rufus*, antennis, pectore, ano pedibusque atris, scu-  
tello canaliculato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 365. n. 165. mant.*  
*inf. 2. p. 301. n. 217.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magnus.*
- fuscatus. 410. *C. fanguineus*, thoracis lineis, scutello, alis, ano pedibus-  
que atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 301. n. 218.*  
*Habitat in Guinea, magnus.*
- Carnifex. 411. *C. rufus*, antennis tibiisque fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*366. n. 166. mant. inf. 2. p. 301. n. 219. Thunb. nov.*  
*inf. sp. 2. p. 51.*  
*Habitat ad caput bonae spei, potissimum in tanaceto crith-*  
*nifolio, magnitudine c. Rolandri.*
- Augur. 412. *C. rufus*, antennis alis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 366. n. 167. mant. inf. 2. p. 301. n. 220. Thunb.*  
*nov. inf. sp. 3. p. 57.*  
*Stoll cimic. 2. t. 18. f. 124.*  
*β) Stoll cimic. 2. t. 13. f. 89.*  
*Habitat ad caput bonae spei, India, Sina, carnifici affinis,*  
*equestri major.*
- maestans. 413. *C. supra rufus*, thorace scutelloque punctis duobus nigris.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 366. n. 168. mant. inf. 2. p. 301. n. 221.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*

- Andreae. 80. *C. fanguineus*, antennis tibiis rostro alisque nigris. *Musf. Lud. Ulr.* 179.\*  
*Sloane jam.* 2. p. 237. f. 29. 30. Cimex sylvestris oblongus e cinereo et nigro variegatus, supina parte cruce S. Andreae notatus.
- β) Cimex ruficollis. *Musf. Lud. Ulr.* 180.  
 γ) Cimex thorace nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. p. 56.  
*Habitat in America. γ) in Japonia.*
- faxatilis. 81. *C. niger*, thoracis margine laterali lineaque rubris, elytris maculis tribus rubris. *Scop. ent. carn.* 371. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 298. n. 188.  
*Habitat in Europa magis australi, subtus rubro nigroque varius, capitis macula rubra antierius bifida.*
- succin- 82. *C. thoracis elytrorumque margine exteriore femorumque*  
 ctus. *basi rufis. Amoen. acad.* 6. p. 400. n. 44. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 369. n. 185. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 241.  
*Degeer inf.* 3. p. 339. n. 13. t. 34. f. 19. Cimex rubrocinctus.  
*Habitat in Americae borealis plantis.*
- tunicatus. 414. *C. supra ferrugineo-fuscus, corpore elytrorumque margi-*  
 ne flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 369. n. 186. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 242.  
*Habitat in Germania, antennis rufis: articulorum apice nigro.*
- pubicor- 415. *C. rufus, antennis, pectore elytris tibiisque nigris. Fabr.*  
 nis. *sp. inf.* 2. p. 369. n. 187. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 243.  
*Habitat in America.*
- Kalmii. 83. *C. viridis, scutello macula cordata flava, elytris maculis*  
 duabus nigris. *Fn. succ.* 948.\*  
*Habitat in Europa.*
- superci- 84. *C. niger, palpebra elytrorumque margine albis.*  
 liofus. *Habitat in Suecia, mediae magnitudinis. Modecr.*
- pratensis. 86. *C. flavescens, elytris viridibus. Fabr. sp. inf.* 2. p. 370.  
 n. 190. *mant. inf.* 2. p. 303. n. 247.  
*Syst. nat.* XII. 2. p. 728. n. 86. *Fn. succ.* 949.\* *Scop. ent. carn.* 386. Cimex oblongus griseus, scutello macula cordata flava, elytris apice puncto fusco.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 451. n. 33.  
*Habitat in Europae pratis frequens.*
- floralis. 416. *C. supra obscure griseus, elytris apice puncto rubro, fe-*  
 moribus posterioribus elongatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 303. n. 248.

*Habitat in Hafniae floribus, statura pratensis, antennis pallidis.*

- norwegi- 417. *C. viridis*, thorace bipunctato, elytris pallidioribus: puncto apicis flavo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 191. mant. inf. 2. p. 304. n. 249.*  
*Habitat in Norwegiae plantis.*
- inquina- 418. *C. flavescens*, elytris nigris albo variis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 304. n. 250.*  
*Habitat Kilonii, mediae magnitudinis.*
- nassatus. 419. *C. viridis*, antennis pedibusque flavescens. *Fabr. mant. inf. 2. p. 304. n. 251.*  
*Habitat Hafniae in tilia, parvus, immaculatus.*
- tiliac. 420. *C. virescens*, fasciis tribus fuscis; media angulata. *Fabr. sp. inf. 2. p. 374. n. 218. mant. inf. 2. p. 304. n. 252.*  
*Habitat Kilonii.*
- campe- 87. *C. flavescens*, elytris macula ferruginea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 370. n. 189. mant. inf. 2. p. 303. n. 246.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 728. n. 87. Fn. suec. 950.\* Cimex oblongus viridis, scutello macula cordata viridi, elytris macula ferruginea.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 452. n. 34.*  
*Habitat in Europae campis.*
- nemora- 421. *C. niger*, thorace elytrisque flavescens, scutello macula disci nigra. *Fabr. mant. inf. 2. p. 303. n. 245.*  
*Habitat in Barbaria, statura et magnitudine campestris.*
- melano- 88. *C. niger*, thorace, elytris antennis pedibusque pallidis. cephalus. *Habitat in Suecia, parvus. Solander.*
- histrioni- 89. *C. niger*, scutello flavo, elytris pedibusque testaceis. cus. *Habitat in Europa, magnitudine culicis.*
- nemo- 91. *C. niger*, elytris alisque fusco alboque variis, pedibus testaceis. *Fn. suec. 953.\**  
*Habitat in Europa.*
- faltato- 93. *C. niger*, elytris striatis, alis posterioribus flavo maculatis. *Fn. suec. 954.\* It. oel. 121. Fabr. sp. inf. 2. p. 371. n. 196. mant. inf. 2. p. 305. n. 260.*  
*Raj. inf. p. 57. n. 2. Cimex brevis et fere rotundus nigricans.*  
*Habitat in Europa ad littora.*

- triguttatus. 94. *C. niger*, elytris alisque apice puncto nigro. *Fabr. sp. inf. 2. p. 371. n. 195. mant. inf. 2. p. 305. n. 259.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 729. n. 94.* Cimex oblongus niger, elytris testaceis: punctis tribus niveis; interiore minore.  
*Habitat in Europa, pediculi magnitudine.*
- arenarius. 95. *C. niger*, elytris cinereis, alis albis. *Fn. suec. 955.\* It. oel. 121. Fabr. sp. inf. 2. p. 369. n. 184. mant. inf. 2. p. 303. n. 240.*  
*Habitat in Europa boreali frequens.*
- pini. 96. *C. ater*, elytris fuscis: macula rhombea atra. *Fn. suec. 956. Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 173. mant. inf. 2. p. 302. n. 227.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 449. n. 28.*  
*Degeer inf. 3. p. 279. n. 22. t. 14. f. 22.*  
*Schaeff. icon. t. 42. f. 12.*  
*Habitat frequens in Europae borealis pinetis.*
- sylvaticus. 422. *C. ater*, elytris fuscis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 174. mant. inf. 2. p. 302. n. 228.*  
*Habitat in Europae borealis nemoribus.*
- Rolandri. 97. *C. ater*, alis macula rhombea flava. *Fn. suec. 957. Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 175. mant. inf. 2. p. 302. n. 229.*  
*Fuessli inf. helv. p. 26. n. 511.*  
*Degeer inf. 3. p. 294. n. 33.* Cimex fulvo maculatus.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 459. n. 51.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 76.*  
*Schaeff. icon. t. 87. f. 7.*  
 β) Cimex bimaculatus. *Syst. nat. X. 1. p. 449. n. 76.*  
*Habitat in Europae pinetis.*
- Forsteri. 423. *C. ater*, scutelli apice, thoracis elytrorumque margine sanguineis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 368. n. 176. mant. inf. 2. p. 302. n. 230.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura et magnitudine c. Rolandri.*
- squalidus. 424. *C. niger*, thorace posterius, elytris pedibusque griseis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 302. n. 231.*  
*Habitat Tranquebariae, mediae magnitudinis.*
- fexpustulatus. 425. *C. niger*, thorace elytrisque maculis duabus rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 368. n. 177. mant. inf. 2. p. 302. n. 232.*  
*Habitat in Jamaica.*

- lynceus. 426. *C. niger*, elytris griseis: apice macula nigra; puncto albo.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 368. n. 178. mant. inf. 2. p. 302. n. 233.*  
*Habitat in Angliae et Calabriae plantis.*
- urticae. 427. *C. niger*, elytris griseis, alis albis: puncto nigro. *Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 368. n. 179. mant. inf. 2. p. 302. n. 234.*  
*Habitat in Angliae urtica.*
- Lundii. 428. *C. niger*, elytris fuscis apice nigro punctatis, alis nigris  
puncto baseos apicisque albo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 368.*  
*n. 180. mant. inf. 2. p. 302. n. 235.*  
*Habitat Hafniae, parvus statura lyncei.*
- lunaris. 429. *C. niger*, thorace maculato, elytris lunula marginali  
flava. *Fabr. mant. inf. 2. p. 302. n. 237.*  
*Habitat in Cayenna, statura lyncei.*
- ferrugi- 99. *C. ferrugineus*, capite thorace scutelloque nigris.  
neus. *Habitat in Suecia, c. Rolandri similis.*
- populi. 109. *C. albo fuscoque nebulosus.* *Fn. suec. 963. Fabr. sp. inf.*  
*2. p. 374. n. 219. mant. inf. 2. p. 304. n. 253.*  
*Habitat in Europae populo tremula.*
- coryli. 121. *C. niger*, pedibus antennisque flavis. *Fn. suec. 974.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 369. n. 188. mant. inf. 2. p. 303. n. 244.*  
*Habitat in Europae borealis corylo.*
- S. Crucis. 430. *C. supra obscure griseus*, scutello linea dorsali albida.  
*Fabr. mant. inf. 2. p. 302. n. 226.*  
*Habitat in insula S. Crucis oceani americani, parvus.*
- agilis. 431. *C. thorace atro: margine posteriore flavo, elytris fuscis,*  
 *basi apiceque pallidis. Fabr. sp. inf. 2. p. 374. n. 220.*  
*mant. inf. 2. p. 306. n. 274.*  
*Degeer inf. 3. p. 295. n. 34. Cimex flavo quadrimaculatus.*  
*Habitat in Germania, statura et magnitudine c. populi.*
- Daldorfii. 432. *C. flavescens*, capite scutellique margine atris. *Fabr.*  
*mant. inf. 2. p. 306. n. 275.*  
*Habitat Kilonii, parvus.*
- multico- 433. *C. supra sanguineus*, thorace elytris scutelloque albo  
lor. marginatis. *Thunb. nov. inf. sp. 2. p. 52.*  
*Habitat ad caput bonae spei, magnitudine pratensis, subtus*  
*cinereus vel lividus, glaber, capite rufescente.*

- adsperfus. 434. C. supra ferrugineus: margine fuscio, subtus cinereus nigro punctatus. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 53.*  
*Habitat - - - magnitudine equestris, glaber.*
- hexophthalmus. 435. C. supra cinereus, subtus albus pectore fasciis tribus sanguineis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 54.*  
*Habitat ad caput bonae spei, annulati magnitudine, capite rubro medio nigro, antennis pedibusque nigris.*
- albidus. 436. C. rubro nigroque varius, membrana clytrorum nivea. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 56.*  
*Stoll cimic. t. 2. f. 80.*  
*Habitat ad caput bonae spei, et in Surinamo, punctis lineisque rubris nigrisque varius, equestris magnitudine, antennis, rostro, scutello pedibusque nigris.*
- purpureus. 437. C. sanguineus, capite, membrana clytrorum pedibusque nigris. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 57. f. 67.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glaberrimus, statura annulati, at multo angustior, immaculatus, capite antennisque nigris.*
- nebulosus. 438. C. flavescens, thorace lineis quatuor, elytris fasciis tribus fuscis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 59.*  
*Habitat ad caput bonae spei, statura et magnitudine campestris, glaber.*
- cafer. 439. C. niger, thorace fascia alba, elytris ferrugineis: maculis quatuor albis. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 59. f. 70.*  
*Habitat ad caput bonae spei, glaber, statura et magnitudine arenarii.*
- Candelabrum. 440. C. niger, rubro viridique notatus, thoracis basi rubra candelabrum referente: candelam supra caput porrecta. *Drury inf. I. p. 107. t. 45. f. 1.*  
*Habitat in insula Antigua.*
- claviger. 441. C. niger, elytris maculatis, abdominis incisuris rubris, thorace incarnata: striis obliquis nigris, maculaque clavaeformi cinerea. *Drury inf. I. p. 109. t. 45. f. 5.*  
*Habitat in Antigua insula.*
- triops. 442. C. griseus, elytris punctis tribus nigris in longitudinem dispositis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 107. n. 1216.*  
*Habitat in Dania.*

- inauratus. 443. *C. flavescens*, thorace linea interrupta nigra, elytris duabus obliquis luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 107. n. 1221.*  
*Habitat in Dania.*
- hirtus. 444. *C. niger*, elytris litura longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr. p. 108. n. 1234.*  
*Habitat in Dania.*
- cantharinus. 445. *C. niger*, thorace unidentato: circulo albo, elytris cinereis: maculis quatuor scutelloque luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 108. n. 1235.*  
*Habitat in Dania.*
- sexmaculatus. 446. *C. ater*, elytris maculis sex pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 108. n. 1238.*  
*Habitat in Dania.*
- defes. 447. *C. niger*, thorace lineis tribus scutello margineque elytrorum flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 108. n. 1239.*  
*Habitat in Dania.*
- rubellus. 448. *C. fanguineus*, elytris membranaceis albis, antennis pedibusque pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 108. n. 1241.*  
*Habitat in Dania.*
- ochromelas. 449. *C. luteus*, thorace punctis quatuor elytrisque striis sex nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 108. n. 1242.*  
*Habitat in Dania.*
- leucostictos. 450. *C. fanguineus*, thorace linea transversa nigra, elytris apicem versus puncto albo. *Müll. zool. dan. prodr. p. 108. n. 1243.*  
*Habitat in Dania.*
- gallorum. 451. *C. niger*, antennis brevioribus, elytris fuscis: macula flavescente alboque. *Degeer inf. 3. p. 279. n. 23.*  
*Habitat in plantarum partibus ab aphidibus devastatis et relictis, pediculi magnitudine.*
- fulvus. 452. *C. flavo-fulvus*, elytris fuscis: vasis fulvis, pedibus nigro maculatis. *Degeer inf. 3. p. 341. n. 16. t. 34. f. 22.*  
*Habitat in Surinamo.*
- erythrochlorus. 453. *C. fuscus*, thorace anterieus flavo, elytrorum basi rubra: macula media flava. *Degeer inf. 3. p. 342. n. 17. t. 34. f. 23.*  
*Habitat in Surinamo, muscae domesticae magnitudine.*
454. *C.*



- nanus. 454. C. flavo-tellaceus, oculis nigris prominentibus, thorace maculis quatuor, elytrisque fasciis nigris. *Degeer inf.* 3. p. 343. n. 19. t. 34. f. 25.  
*Habitat in Surinamo.*
- arcuatus. 455. C. niger, rostro arcuato, elytris albidis: macula alba arcuque nigro, femoribus quatuor clavatis rubris. *Degeer inf.* 3. p. 346. n. 21. t. 35. f. 4.  
*Habitat in Surinamo, muscae domesticae magnitudine; an hujus tribus?*
- erythro- 456. C. nigro-fuscus, rostro arcuato, thoracis abdominisque zonias. margine fasciisque transversis rubris. *Degeer inf.* 3. p. 349. n. 24. t. 35. f. 12.  
*Habitat in India, magnus.*
- bifurca- 457. C. nigricans, abdomine luteo bifurcato.  
tus. *Schaeff. icon.* t. 11. f. 15. 16.  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*
- triangula- 458. C. luteo-nigricans, thorace nigro triangulari: macula ris. media lutea, elytrorum apice maculis binis coccineis.  
*Schaeff. ic.* t. 13. f. 2.  
*Habitat in Germania, antennarum articulis tribus.*
- haemato- 459. C. luteus, elytris maculis duabus sanguineis.  
stictos. *Schaeff. ic.* t. 13. f. 3.  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*
- digram- 460. C. flavicans: maculis rubentibus, elytrorum apice lineo- mus. lis duabus albidis.  
*Schaeff. icon.* t. 13. f. 9.  
*Habitat in Germania.*
- quinque- 461. C. fusco-nigricans: dorso punctis quinque albis.  
puncta- *Schaeff. icon.* t. 13. f. 12.  
tus. *Habitat in Germania.*
- Rubecula. 462. C. collo thoraceque rubicundo, pedibus rubris.  
*Schaeff. ic.* t. 112. f. 7.  
*Habitat in Germania.*
- stolatus. 463. C. laete sanguineus, elytris striis duabus nigris longitudinalibus.  
*Schaeff. icon.* t. 119. f. 3.  
*Habitat in Germania.*

- sextstriatus. 464. *C. fulvo-nigricans*, elytrorum margine ftriis tribus nigris.  
*Schaeff. icon. t. 185. f. 4. 5. a. b.*  
*Habitat in Germania.*
- M flavum. 465. *C. nigricans*, thorace elytrorumque marginibus M flavum referentibus.  
*Schaeff. ic. t. 199. f. 4. 5.*  
*Habitat in Germania.*
- V. flavum. 466. *C. flavo-luteoque varius*, thoracis margine V flavum referente.  
*Schaeff. ic. t. 199. f. 6. 7.*  
*Habitat in Germania.*
- Circulus. 467. *C. nigricans*, elytris maculis quatuor albis, thorace sphaerico: margine albo punctato.  
*Schaeff. ic. t. 248. f. 3. 4.*  
*Habitat in Germania.*
- infignitus. 468. *C. aterrimus*, elytris litura rubra.  
*Schaeff. icon. t. 266. f. 4. a. b.*  
*Habitat in Germania.*
- eeler. 469. *C. aeneo-fuscus*, impresso punctatus, abdomine supra rubro apice emarginato. *Scop. ent. carn. p. 126. n. 366.*  
*Habitat in littoribus aultriacis maris adriatici.*
- rugosus. 470. *C. capite utrinque dentato abdomine rubello, dorso plicis quatuor longitudinalibus.* *Scop. ent. carn. p. 126. n. 367.*  
*Habitat in Carniolia superiore.*
- Pandurus. 471. *C. rubro nigroque varius*, thorace rubro nigro lineato, elytris rubris: macula media nigra, apiceque punctis tribus albis. *Scop. ent. carn. p. 126. n. 368.*  
*Habitat in Carniolia.*
- trinervis. 472. *C. elytris membranaceis: nervis fusco punctatis punctoque ferrugineo trigono marginali.* *Scop. ent. carn. p. 129. n. 373.*  
*Habitat Idriae circa fossorum et rusticorum aedes.*
- maritimus. 473. *C. nigricans*, elytris testaceis fusco punctatis: macula cordata nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p. 129. n. 374.*  
*Habitat circa littora maris Adriatici.*

- alpinus. 474. *C. nigricans*, elytrorum corio ferrugineo-punctato, membrana fusco lineata, pedibus ferrugineis. *Scop. ent. carn. p. 129. n. 375.*  
*Habitat in alpinis Vachinenfibus.*
- idriacus. 475. *C. nigricans*, elytris pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p. 130. n. 377.*  
*Habitat Idriae.*
- hybridus. 476. *C. niger*, rostro arcuato, abdomine elytrique corio rubro: maculis duabus atris, membrana fuscescente: macula ad basin nigra. *Scop. ent. carn. p. 131. n. 380.*  
*Habitat in Carnioliae collibus.*
- meriopterus. 477. *C. rostro pedibusque citrinis*, antennarum articulo secundo compresso villosulo articulis binis setaceis pallidis terminato. *Scop. ent. carn. p. 131. n. 382.*  
*Habitat in Carniolia, in origani vulgaris et eupatorii cannabini floribus; an hujus tribus?*
- aequinoctialis. 478. *C. elytris totis coriaceis villosis albidis: nervis fusco punctatis*, femoribus anterioribus crassioribus. *Scop. ent. carn. p. 132. n. 383.*  
*Habitat in Carnioliae floribus, praesertim cynoglossae omphalode, circa aequinoctium vernum frequens.*
- umbellatarum. 479. *C. ferrugineus*, abdomine apicisque femorum fasciis fuscis. *Scop. ent. carn. p. 133. n. 385.*  
*Habitat in Carnioliae umbellatis.*
- euonymi. 480. *C. niger*, thoracis macula media oblonga, scutelli lineis duabus, elytrorum striis elevatis flavis: unica ramosa. *Scop. ent. carn. p. 133. n. 387.*  
*Habitat in euonymo.*
- avellanae. 481. *C. niger*, elytrorum corio fusco: basi apiceque albis, pedibus fulvis. *Scop. ent. carn. p. 134. n. 388.*  
*Habitat in corylo avellana.*
- genistae. 482. *C. fuscus subvillosus*, alis hyalinis. *Scop. ent. carn. p. 134. n. 390.*  
*Habitat in genista tinctoria.*
- hortensis. 483. *C. niger*, antennis trinodiis, rostro pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p. 134. n. 390.*  
*Habitat in Carnioliae hortis.*

- pellucidus. 484. *C. fusco-niger*, pedibus pallidis, elytris pellucidis: apice fusco. *Geoffr. inf. par. I. p. 438. n. 7.*  
*Habitat in Gallia.*
- marmoratus. 485. *C. luteo nigroque varius*, oculis crassissimis. *Geoffr. inf. par. I. p. 438. n. 8.*  
*Habitat in Gallia.*
- trigonus. 486. *C. niger*, thorace elytrisque rubris, elytris apice macula triangulari nigra. *Geoffr. inf. par. I. p. 439. n. 10.*  
*Habitat in Gallia.*
- leucopterus. 487. *C. rubro nigroque varius*, alis basi albis. *Geoffr. inf. par. I. p. 442. n. 13. Raj. inf. p. 55. n. 2.*  
*Habitat in Gallia.*
- maculosus. 488. *C. rubro nigroque varius*, elytris puncto nigro, alis fuscis: maculis albis. *Geoffr. inf. par. I. p. 443. n. 15.*  
*Habitat in Gallia.*
- tessellatus. 489. *C. thorace nigro: lineis tribus rubris*, elytris rubro nigroque tessellatis: limbis nigris. *Geoffr. inf. par. I. p. 443. n. 16.*  
*Habitat in Gallia.*
- croceus. 490. *C. croceus*, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato. *Geoffr. inf. par. I. p. 444. n. 17.*  
β) *Cimex niger*, pedibus rufis.  
γ) *Cimex niger*, capite, thorace pedibusque rufis.  
*Habitat in Gallia, an hujus tribus?*
- subfuscus. 491. *C. viridi-fuscus*, elytrorum nervis punctatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 448. n. 25.*  
*Habitat in Gallia.*
- melanochros. 492. *C. fuscus*, antennis, pedibus abdominisque margine nigro luteoque variis. *Geoffr. inf. par. I. p. 449. n. 26.*  
*Habitat in Gallia.*
- naevius. 493. *C. cinereo nigroque varius*, alis glaucis. *Geoffr. inf. par. I. p. 449. n. 27.*  
*Habitat in Gallia.*
- cinereus. 494. *C. niger*, thorace posteriori cinereo, elytris fuscis: apice albo. *Geoffr. inf. par. I. p. 450. n. 29.*  
*Habitat in Gallia.*
- viridescens. 495. *C. pallide viridescens*, femoribus nigro punctatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 450. n. 30.*  
*Habitat in Gallia.*

- erythro- 496. *C. niger*, elytris anterieus rufis, alis albo maculatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 451. n. 31.*  
*Habitat in Gallia.*
- punctula- 497. *C. atro fuscus punctatus*, alis venosis. *Geoffr. inf. par. I. p. 451. n. 32.*  
*Habitat in Gallia.*
- cordiger. 498. *C. spadiceus*, scutello macula cordata lutea, elytris apice luteis. *Geoffr. inf. par. I. p. 453. n. 35.*  
*Habitat in Gallia.*
- reticor- 499. *C. flavescens*, thorace fasciis duabus nigris, scutello maculis flavis, antennis apice porrectis. *Geoffr. inf. par. I. p. 453. n. 36.*  
*Habitat in Gallia.*
- termacu- 500. *C. niger*, thorace fasciis tribus flavis, scutello elytrorumque apice maculis luteis. *Geoffr. inf. par. I. p. 454. n. 37.*  
*Habitat in Gallia.*
- Chloris. 501. *C. viridi-flavus*, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus. *Geoffr. inf. par. I. p. 455. n. 39.*  
*Habitat in Gallia.*
- obfusca- 502. *C. viridis*, elytris macula fusca. *Geoffr. inf. par. I. p. 455. n. 40.*  
*Habitat in Gallia.*
- lineolatus. 503. *C. viridis*, elytrorum apice albido, scutello lineola fusca. *Geoffr. inf. par. I. p. 455. n. 41.*  
*Habitat in Gallia.*
- viridiuf- 504. *C. viridis*, thorace scutelloque lineis quatuor nigris, elytris interius fuscis. *Geoffr. inf. par. I. p. 456. n. 42.*  
*Habitat in Gallia.*
- conicus. 505. *C. fusco-cinereus*, oculis prominulis, elytris nervosis. *Geoffr. inf. par. I. p. 458. n. 49.*  
*Habitat in Gallia.*
- adultus. 506. *C. niger*, capite, elytrorum apice genibusque ferrugineo-rubris. *Geoffr. inf. par. I. p. 459. n. 50.*  
*Habitat in Gallia.*
- chloro- 507. *C. niger*, pedibus viridi nigroque variis. *Geoffr. inf. par. I. p. 459. n. 52.*  
*Habitat in Gallia.*

508. *C.*

- atratus. 508. C. totus ater, alis atris. *Geoffr. inf. par. I. p. 460. n. 53.*  
*Habitat in Gallia.*
- brachy- 655. C. pallidus, corpore lineari, elytris abdomine tertia par-  
pterus. te brevioribus. *Mus. Lesk. p. 124. n. 189.*  
*Habitat in Europa.*
- lutescens. 656. C. flavescens, abdomine lutescente. *Mus. Lesk. p. 124. n. 190.*  
*Habitat in Europa.*
- grami- 657. C. pallidus, thorace utrinque linea fusca, elytris viref-  
neus. centibus, abdomine lutescente. *Mus. Lesk. p. 124. n. 191.*  
*Habitat in Europa.*
- herbaceus. 658. C. virescens, capite antennisque rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 124. n. 194.*  
*Habitat in Europa.*
- pictus. 659. C. pallidus, thorace lineis tribus fuscis, abdomine ni-  
gro: margine dilatato rubro flavove subtus fusco medio pallido. *Mus. Lesk. p. 124. n. 195.*  
*Habitat in Europa.*
- rubellus. 660. C. rufescens. *Mus. Lesk. p. 124. n. 196.*  
*Habitat in Europa.*
- albipes. 661. C. niger, thoracis lateribus elytris pedibusque albidis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 197.*  
*Habitat in Europa.*
- squama- 662. C. niger, pedibus pallidis, elytrorum loco squamis albis.  
tus. *Mus. Lesk. p. 124. n. 198.*  
*Habitat in Europa.*
- purus. 663. C. ater immaculatus. *Mus. Lesk. p. 120. n. 113.*  
*Habitat in Europa.*
- annulatus. 664. C. niger, elytris anterieus, thorace posterius griseis, pe-  
dibus fusco annulatis. *Mus. Lesk. p. 120. n. 114.*  
*Habitat in Europa.*
- macropus. 665. C. niger, elytris griseis ad membranam nigro macula-  
tis, femoribus anticis crassissimis, tibiis rufescentibus. *Mus. Lesk. p. 120. n. 115.*  
*Habitat in Europa.*

- fenestratus. 666. *C. pallidus*, coleoptris fenestratis: nervis pallide rufis.  
*Mus. Lesk. p. 120. n. 118.*  
*Habitat in Europa.*
- melanopus. 667. *C. fuscus*, elytris griseis apice fuscis, femoribus nigris  
basi griseis. *Mus. Lesk. p. 120. n. 121.*  
*Habitat in Europa.*
- denigratus. 668. *C. niger*, elytris griseo-fuscis: membrana basi maculae  
que apicis alba. *Mus. Lesk. p. 120. n. 122.*  
*Habitat in Europa.*
- biguttatus. 669. *C. fuscus*, elytris maculis albis disco fuscis: membrana alba:  
venis maculisque duabus fuscis, pedibus pallidis. *Mus.  
Lesk. p. 120. n. 123.*  
*Habitat in Europa.*
- leucophlebs. 670. *C. niger*, elytris brunneis: membrana venis albis. *Mus.  
Lesk. p. 120. n. 124.*  
*Habitat in Europa.*
- unipunctatus. 671. *C. niger*, elytris fusco-luteis: puncto albo, membrana  
utrinque gutta alba, pedibus luteis. *Mus. Lesk. p. 121.  
n. 125.*  
*Habitat in Europa.*
- erythrus. 672. *C. rufescens*, pedibus elytrisque pallidis, his apice ru-  
fescentibus. *Mus. Lesk. p. 121. n. 126.*  
*Habitat in Europa.*
- ochrochous. 673. *C. fuscus*, ano luteo, elytris luteo-pellucidis: disco pun-  
cto gemino apiceque solitario fusco. *Mus. Lesk. p. 121.  
n. 128.*  
*Habitat in Europa.*
- platycerus. 674. *C. rufescens*, antennis compressis latis rufis. *Mus. Lesk.  
p. 121. n. 129.*  
*Habitat in Europa.*
- quadri- 675. *C. griseus*, thorace lineis quatuor longitudinalibus ele-  
striatus. vatis. *Mus. Lesk. p. 121. n. 131.*  
*Habitat in Europa.*
- fuscicaudis. 676. *C. capite*, thorace elytrorumque griseorum apice fuscis.  
*Mus. Lesk. p. 121. n. 132.*  
*Habitat in Europa.*

E b b b b b b

- - - pe

→ → *pedibus dentatis aut spinosis.*

- Phasianus. 509. C. fuscus, femoribus arcuato-clavatis unidentatis, abdominis basi subtus gibba. *Fabr. sp. inf. 2. p. 136. n. 226. mant. inf. 2. p. 297. n. 177.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, magnus.*
- bellicosus. 510. C. fuscus, femoribus posterioribus arcuatis dentatis, abdomine quadrispinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 361. n. 137. mant. inf. 2. p. 297. n. 178.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, statura valgi, at duplo minor.*
- Meleagris. 511. C. fuscus, antennarum articulo ultimo tibiisque anterioribus flavis, femoribus posterioribus ferratis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 297. n. 179.*  
*Habitat in Sina, magnus.*
- Gallus. 512. C. clytris fuscis flavo striatis, abdominis disco rubro, femoribus posterioribus ferratis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 361. n. 138. mant. inf. 2. p. 279. n. 180.*  
*Habitat in Surinamo, statura et magnitudine indi.*
- Faber. 513. C. niger, abdomine fusco: margine flavo, femoribus anterioribus apice bidentatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 297. n. 181.*  
*Habitat in Pulicandor, magnus.*
- Harpator. 514. C. niger, subtus rubro punctatus, femoribus dentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 361. n. 139. mant. inf. 2. p. 297. n. 180.*  
*Habitat in America.*
- calcaratus. 114. C. fuscus, abdomine supra sanguineo, femoribus posterioribus sexdentatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 367. n. 172. mant. inf. 2. p. 302. n. 225.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 732. n. 114. Fn. suec. 968\* Cimex oblongus niger, capite linea rubra, femoribus posticis subtus sexdentatis.*  
*Degeer inf. 3. p. 280. n. 24. t. 14. f. 23. 24.*  
*Schaeff. icon. t. 123. f. 2. 3.*  
*Habitat in Europa.*
- denticulatus. 515. C. thoracis margine laterali denticulato, abdomine bidentato, femoribus posterioribus spinosis. *Scop. ent. carn. p. 125. n. 365.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 16.*  
*Habitat Tergelti.*

516. C.



collium. 516. *C. niger*, elytris nucis colore: puncto nigro, femoribus anterioribus denticulo notatis. *Scop. ent. carn. p. 130. n. 376.*

*Habitat in Carnioliae collibus.*

armatus. 680. *C. niger*, elytris fuscis: margine externo striis, posteriore punctis griseis, femoribus anticis crassissimis dente armatis. *Mus. Lesk. p. 120. n. 116.*

*Habitat in Europa.*

lactcolus. 681. *C. niger*, femoribus anterioribus crassis dente armatis, elytris basi griseis, membrana basi gutta lactea. *Mus. Lesk. p. 120. n. 117.*

*Habitat in Europa.*

setosus. 682. *C. fuscus*, femoribus et elytris rufescentibus, his apice fractis, tibiis albis setolo spinosis. *Mus. Lesk. p. 121. n. 126.*

*Habitat in Europa.*

|||| antennis setaceis.

→ pedibus dentatis.

abietis. 115. *C. maculato-fulvus*, pedibus rufis: femoribus crassis. *Fn. suec. 969.\* Scop. ent. carn. 364. Fabr. sp. inf. 2. p. 375. n. 222. mant. inf. 2. p. 307. n. 290.*

*Degeer inf. 3. p. 308. n. 37. t. 15. f. 20. 21. Cimex grosfipes.*

*Habitat in Europae borealis abiete.*

→ → pedibus inermibus.

pabulinus. 83. *C. viridis immaculatus*, alis hyalinis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 373. n. 210. mant. inf. 2. p. 306. n. 279.*

*Syst. nat. XII. 2. p. 727. n. 83. Fn. suec. 947.\* Scop. ent. carn. 132. Cimex oblongiusculus flavescenti-viridis totus.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 456. n. 53.*

*Degeer inf. 3. p. 293. n. 31.*

*Habitat in Europae pratis.*

laevigatus. 101. *C. exalbidus*, lateribus albis. *Fn. suec. 958.\* Fueßli inf. helv. p. 26. n. 512. Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 208. mant. inf. 2. p. 306. n. 276.*

*Geoffr. inf. par. 1. p. 452. n. 25.*

*Degeer inf. 3. p. 292. n. 30.*

*Habitat in Europae pratis, frequens.*

Bbbbbbb 2

517. C.

- lateralis. 517. *C. niger*, lateribus albidis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 372. n. 209. mant. inf. 2. p. 306. n. 277.*  
*Habitat Kilonii.*
- holfatus. 518. *C. exalbidus*, thorace lineis duabus, elytris interius fuscis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 306. n. 278.*  
*Habitat Kilonii, statura laevigati.*
- virens. 102. *C. viridis*, plantis antennarumque apicibus rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 373. n. 211. mant. inf. 2. p. 306. n. 280.*  
*Habitat in Europa, pabulino duplo major.*
- pallidus. 519. *C. pallidus*, capite corporeque atris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 306. n. 281.*  
*Habitat in Suecia, parvus.*
- dolabra- 103. *C. elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba. Fn. suec. 959. Fabr. sp. inf. 2. p. 373. n. 212. mant. inf. 2. p. 307. n. 282.*  
*Habitat in Europae festuca nutante.*
- calens. 104. *C. capite, thorace elytrisque nigris, scutello fulvo. Gron. zooph. 712. Fabr. sp. inf. 2. p. 373. n. 213. mant. inf. 2. p. 307. n. 283.*  
*Habitat in India.*
- fstriatus. 105. *C. niger, elytris flavo fuscoque striatis, apice pedibusque rufis. Fn. suec. 960.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 374. n. 217. mant. inf. 2. p. 307. n. 289.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 454. n. 38.*  
*Degeer inf. 3. p. 290. n. 29. t. 15. f. 14. 15.*  
*Petiv. gazoph. t. 26. f. 1.*  
*Schaeff. ic. t. 13. f. 4.*  
*Habitat in ulmi campeltris foliis.*
- Gronovii. 106. *C. thorace elytrisque atris, linea flava fasciam elytrorum formante. Fabr. sp. inf. 2. p. 373. n. 214. mant. inf. 2. p. 307. n. 284. Gronov. zooph. 711.\**  
*Habitat in India.*
- erraticus. 107. *C. nigricans, elytris albis, antennis lividis: infimo articulo nigro. Fn. suec. 961.\**  
*Habitat in Europa.*

- ferus. 108. *C. griseus immaculatus.* *Fn. succ.* 962.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 374. n. 215. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 285.  
*Habitat in Europae silvis.*
- vagans. 519. *C. griseus*, capite thoraceque linea nigra, pedibus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 307. n. 286.  
*Habitat in Suecia, statura feri.*
- orientalis. 520. *C. fuscus*, capite thoraceque lineis tribus, elytris margine omni albo. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 307. n. 287.  
*Habitat in India, marginello proxime affinis.*
- marginellus. 521. *C. niger*, thoracis lineis tribus, elytris margine omni albis punctoque apicis coccineo. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 374. n. 216. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 288.  
*Habitat in Italia, statura feri.*
- ulmi. 110. *C. supra rubiginosus*, elytris striis fanguineis, alis albo fulcoque variis. *Fn. succ.* 964.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 375. n. 223. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 291.  
*Habitat in ulmo campestri.*
- mutabilis. 112. *C. niger*, alis caeruleis, antennis pedibusque flavis. *Fn. succ.* 967.\*  
*Habitat in Suecia.*
- fauciatus. 522. *C. viridis*, elytris maculis sex roseis, pedibus rubro tinctis. *Degeer inf.* 3. p. 293. n. 32.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 457. n. 4.  
*Habitat in Europa.*
- subapterus. 523. *C. griseus*, alis brevissimis, abdomine nigro punctato. *Degeer inf.* 3. p. 287. n. 27. t. 15. f. 10.  
*Habitat in Europa.*

† † † lineares, corpore angusto elongato.

‡ antennis setaceis.

- pedes. 524. *C. fusco flavoque varius*, femoribus posterioribus elongatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 375. n. 224. *mant. inf.* 2. p. 307. n. 292.  
*Habitat in India.*
- filiformis. 525. *C. pallide virescens*, antennis ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 375. n. 225. *mant. inf.* 2. p. 308. n. 293.  
*Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis.*

11 *antennis filiformibus.*

- angustatus. 526. *C. niger*, capite thoraceque elongato. *Thunb. nov. inf. sp. 3. p. 59. f. 71.*  
*Habitat - - - - tipularii magnitudine, glaber.*
- squalidus. 683. *C. fuscus*, elytris griseo fuscoque variegatis, pedibus linearibus antennisque griseo fuscoque alternatim annulatis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 201.*  
*Habitat in Europa.*
- fossarum. 527. *C. supra fuscus*, thoracis scutellique marginibus lineaque dorsali flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 375. n. 226. mant. inf. 2. p. 308. n. 294.*  
*Habitat in India.*
- lacustris. 117. *C. supra niger depressus*, pedibus anterioribus brevissimis. *Fn. suec. 970. iz. mgoth. 182. Geoffr. inf. par. 1. p. 463. n. 59. Scop. ent. car. 394. Fabr. sp. inf. 2. p. 375. n. 227. mant. inf. 2. p. 308. n. 295.*  
*Degeer inf. 3. p. 311. n. 39. t. 16. f. 7. Cimex Najas.*  
*Raj. inf. p. 57. n. 1. Cimex aquaticus figurae longioris.*  
*Baub. Ballon. 213. f. 1. Insectum Tipula dictum.*  
*List. mut. t. 5. f. 4.*  
*Bradl. nat. t. 26. f. 2. d.*  
*Frisch inf. 7. t. 20.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 78.*  
*Stoll cimic. 2. t. 9. f. 63.*  
*Habitat in Europae aquis pacatis.*
- stagnorum. 118. *C. teretiuseculus niger*, thorace medio punctis duobus globosis. *Fn. suec. 9715. Scop. ent. carn. 395. Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 228. mant. inf. 2. p. 308. n. 296.*  
*Degeer inf. 3. p. 322. n. 40. t. 15. f. 24. Cimex Acus.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 463. n. 60.*  
*Petiv. gazoph. t. 9. f. 12.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 17.*  
*Habitat in Angliae lacubus frequens.*
- rivulorum. 528. *C. niger*, albo punctatus, abdomine fulvo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 229. mant. inf. 2. p. 308. n. 297.*  
*Habitat in Asiae rivulis montosis, lacustri quadruplo minor.*

- pallipes. 529. *C. niger*, pedibus pallidis, pectore hispinofo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 230. mant. inf. 2. p. 308. n. 298.*  
*Habitat in Italia, statura lacustris.*
- culiciformis. 530. *C. griseus*, thorace multispinofo, elytris lituris nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 231. mant. inf. 2. p. 308. n. 299.*  
*Habitat in Americae aquis.*
- angustus. 531. *C. supra griseus* subtus flavescens, antennis pedibusque subtestaceis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 308. n. 300.*  
*Habitat in Sina, statura culiciformis.*
- Filum. 532. *C. fuscus*, alis abbreviatis, pedibus longissimis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 376. n. 232. mant. inf. 2. p. 308. n. 301. Degeer inf. 3. p. 352. n. 26. t. 35. f. 16? Cimex longipes.*  
*Habitat in India.*
- macropus. 533. *C. ater*, thoracis margine elytrorumque fascia sanguinea. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 233. mant. inf. 2. p. 308. n. 302.*  
*Habitat in America.*
- cursitans. 534. *C. supra fuscus* subtus cinerascens, pedibus longissimis, ano bidentato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 234. mant. inf. 2. p. 308. n. 303.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- vagabundus. 119. *C. griseus*, pedibus pallidis: anterioribus brevissimis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 236. mant. inf. 2. p. 308. n. 305.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 732. n. 119. Fn. succ. 972.\* Cimex linearis variegatus, pedibus anticis brevissimis crassis inflexis.*  
*Fn. succ. 1. n. 683. Cimex linearis, pedibus quatuor longioribus, antennis longissimis albo fuscoque variis.*  
*Degeer inf. 3. p. 323. n. 41. t. 17. f. 1. 2. Cimex culiciformis.*  
*Frisch inf. 7. p. 11. t. 6. Cimex arborum oblongus, alarum signatura alba.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 462. n. 58.*  
*Habitat in Europae muscis.*
- linearis. 535. *C. viridis*, antennis antrorsum porrectis. *Fuessli inf. helv. p. 26. n. 519.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 458. n. 47.*  
*Habitat in Valesia.*

2194 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. (*Oblongus*.)

- denigra- 536. *C. albidus*, oculis fuscis, scutello macula nigra. *Geoffr.*  
tus. *inf. par. 1. p. 458. n. 48.*  
*Habitat in Gallia.*
- horto- 537. *C. viridis*, oculis fuscis, antennarum articulo secundo  
rum. basi albo, tibiis pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 109.*  
*n. 1248.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 456. n. 43.*  
*Degeer inf. 3. p. 293. n. 31.*  
*Habitat in Europae hortis; an forsan ad praecedentem tri-*  
*bum relegandus ob antennis?*
- tipuloi- 538. *C. griseus*, antennis rubro maculatis, femoribus apice  
des. rubris, pedibus omnibus subaequalibus. *Degeer inf. 3.*  
*p. 354. n. 27. t. 35. f. 18.*  
*Habitat in Surinamo.*
- meridio- 539. *C. nigro-fuscus*, pedibus testaceis, femoribus crassis, ely-  
nalis. tris abdomine brevioribus. *Degeer inf. 3. p. 355. n. 29.*  
*t. 35. f. 21.*  
*Habitat in Surinamo.*
- tetra- 540. *C. nigricans*, abdomine atro: lineis quatuor albis obliquis.  
grammos. *Schaeff. icon. t. 43. f. 7. 8.*  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*
- araneoi- 541. *C. luteus*, pedibus longissimis.  
des. *Schaeff. icon. t. 169. f. 7.*  
*Habitat in Germania, antennarum articulis quatuor.*
- 111 antennis clavatis.
- trispino- 542. *C. griseo fuscus*, antennis longis, spinis dorsalibus tri-  
fus. bus erectis. *Degeer inf. 3. p. 354. n. 28. t. 35. f. 19.*  
*Habitat in Surinamo.*
- 1111 antennis biclavatis.
- fucicis: 543. *C. cinereus*, femoribus clavatis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377.*  
*n. 237. mant. inf. 2. p. 308. n. 306.*  
*Habitat in Suecia.*
- 11111 antennis bicaudatis.
- tipulari- 120. *C. exalbidus*, pedibus omnibus longissimis, femoribus  
us. clavatis. *Fn. succ. 973.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 234.*  
*mant. inf. 2. p. 308. n. 304.*

*Frisch*

*Frisch inf. 7. p. 28. f. 20.* Cimex arboreus culiciformis.  
*Habitat in Europae borealis muscis.*

**\*\* antennis supra oculos insertis, rostro arcuato.** Reduvii.

Gigas. 544. C. niger, thoracis margine elytrorumque fascia obsolete flexuosa rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 1. mant. inf. 2. p. 309. n. 1.*  
*Habitat in India.*

Acantharis. 38. C. thorace spinoso, abdomine spinis ciliato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 29. mant. inf. 2. p. 314. n. 45.*  
*Brown jam. p. 434. t. 44. f. 11. Acantharis.*  
*Sulz. hist. inf. 1. 10. f. 8.*  
*Habitat in Jamaica.*

Guttula. 545. C. ater nitidus, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 314. n. 46.*  
*Habitat in Germania, mediae magnitudinis.*

elongatus. 546. C. elongatus rufus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 383. n. 30. mant. inf. 2. p. 314. n. 47.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, reliquis hujus tribus angustior.*

cristatus. 62. C. corpore fusco-ferrugineo, scutello cristato. *Anoen. acad. 6. p. 399. n. 42.\**  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 23? mant. inf. 2. p. 313. n. 36?*  
Reduvius (ferratus) niger, elytris ferrugineis, rostro antennis tibiisque flavis, scutello cristato serrato.  
*Forster nov. inf. sp. 1. p. 72. n. 72? Cimex carinatus.*  
*Sulz. hist. inf. 1. 10. f. 12.*  
*Drury inf. 2. t. 36. f. 6.*  
*Stoll cinic. 2. t. 1. f. 6.*  
*Habitat in America meridionali.*

leucopus. 547. C. fuscus, antennarum annulis, tibiis abdominisque punctis lateralibus albis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 24. mant. inf. 2. p. 313. n. 37.*  
*Habitat in Europa media, statura aegyptiaci, at paulo major.*

tessulatus. 548. C. thorace elytrisque obscure ferrugineis, abdomine atro: margine albo vario. *Fabr. mant. inf. 2. p. 313. n. 38.*  
*Habitat Mospelii, statura albipedis.*

- aegyptia- 549. C. corpore villoso griseo, abdominis margine nigro va-  
cus. riegato. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 25. mant. inf. 2. p. 313. n. 39.*  
*Habitat in Aegypto.*
- Diadema. 550. C. niger, capite thoraceque spinosis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 26. mant. inf. 2. p. 313. n. 40.*  
*Habitat in America boreali.*
- quinque- 551. C. thorace nigro, posterius spinis quatuor flavis, scutello  
spinofus. apice recurvo spinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 27. mant. inf. 2. p. 313. n. 41.*  
*Habitat in India, capite posterius attenuato, antennis rostro-  
que pallidis.*
- scutatus. 552. C. niger, elytris apice alisque medio puncto albo, scu-  
tello apice recurvo spinoso. *Fabr. mant. inf. 2. p. 313. n. 42.*  
*Habitat in Cayenna, mediae magnitudinis.*
- zonalis. 553. C. capite thoraceque nigris, elytris flavescens: fascia,  
alis apice nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 313. n. 43.*  
*Habitat in Cayenna, parvus, magis elongatus.*
- maurita- 554. C. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, tho-  
naicus. race anterior subspinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 382. n. 28. mant. inf. 2. p. 314. n. 44.*  
*Habitat in Mauritania.*
- persona- 64. C. antennis apice capillaribus, corpore subvilloso fusco.  
tus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 377. n. 2. mant. inf. 2. p. 309. n. 2. Fuesli inf. helv. p. 26. n. 499.*  
*Syst. nat. XII. 2. p. 724. n. 64. Fn. suec. 942. Scop. ent. carn. 379. Geoffr. inf. par. 1. p. 397. n. 38. Cimex ro-  
stro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore oblongo  
subvilloso fusco.*  
*Degeer inf. 3. p. 281. n. 25. t. 15. f. 7. Cimex quisquilius.*  
*List. scar. angl. p. 397. n. 38. Cimex maximus pullus, alis  
nudis ex toto membranaceis.*  
*Frisch inf. 10. t. 10. Cimex ltercorarius major oblongus.*  
*Raj. inf. 56. Musca cimiciformis graviter volans.*  
*Sulz. inf. t. 11. f. 74?*  
*Schaeff. ic. t. 13. f. 6. 7. et t. 57. f. 9.*  
*Habitat in Europae quisquiliis.*  
*Larva horrida consumit lectularium.*



- barbicornis. 555. *C. niger*, thorace abdominisque basi olivaceis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 3. mant. inf. 2. p. 309. n. 3.*  
*Drury inf. 3. t. 45. f. 1.*  
*Habitat in Sierra Leon Africae, thorace rarius nigro, antennis alterius sexus barbatis.*
- afer. 556. *C. rufus*, thorace maculis quatuor, elytris tribus nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 4. mant. inf. 2. p. 309. n. 4.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, annulato minor.*
- stridulus. 557. *C. glaber niger*, elytris fuscis nigro maculatis: margine rufo. *Fabr. mant. inf. 2. p. 309. n. 5.*  
*Habitat Monspelii, parvus, primo vere agilis, antennis continuo motitans, thoracis attritu stridens.*
- nitidulus. 558. *C. ater*, thorace olivaceo, femoribus anterioribus rufis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 5. mant. inf. 2. p. 309. n. 6.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, nitidus, barbicorni affinis.*
- pilipes. 559. *C. ater*, thorace elytrorumque apice villosis cinereis, pedibus hirtis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 309. n. 7.*  
*Habitat in Cayenna, capite posterius attenuato, alis albis.*
- longipes. 65. *C. ruber*, elytris nigris basi fasciaque rubris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 378. n. 6. mant. inf. 2. p. 309. n. 8. Gron. zooph. 709.*  
*Habitat in insula S. Thomae oceani americani, magnitudine personati.*
- Bankii. 560. *C. supra rufus*, alis nigris, abdomine atro: margine rufo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 7. mant. inf. 2. p. 309. n. 9.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*
- erythropus. 561. *C. ater*, elytris griseis nigro venosis, abdominis margine pedibusque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 309. n. 10.*  
*Habitat in Cayenna, magnus.*
- binotatus. 562. *C. supra niger*, elytris puncto apicis rufo. *Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 8. mant. inf. 2. p. 310. n. 11.*  
*Habitat in Surinamo, statura annulati.*
- facer. 563. *C. flavescens*, thoracis cruce impressa, elytris abdominisque medio nigris. *Fabr. mant. inf. 2. p. 310. n. 12.*  
*Habitat in India, mediae magnitudinis.*

- guineen- 670. *C. niger*, thorace scutelloque acute spinosis, elytris punctis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 22. mant. inf. 2. p. 313. n. 35.*  
*Stoll cimic. 2. t. II. f. 64.*  
*Habitat in Guinea, magnitudine valgi.*
- annula- 71. *C. antennis apice capillaribus, corpore nigro subtus sanguineo maculato. Fn. succ. 943.\* Geoffr. inf. par. 1. p. 437. n. 5. Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 9. mant. inf. 2. p. 310. n. 13. Fuessli inf. helv. p. 26. n. 500.*  
*Degerer inf. 3. p. 286. n. 26. Cimex niger rufipes.*  
*Sulz. hist. inf. t. 10. f. 13.*  
*Schaeff. icon. t. 5. f. 9-11.*  
*Habitat in Europa corylo.*
- monspe- 564. *C. rufus*, capite, pectore abdominisque striis maculari-  
 lienfis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 310. n. 14.*  
*Schaeff. icon. 1. t. 5. f. 9. 10.*  
*Habitat Montspeli, statura et magnitudine annulati.*
- praecin- 565. *C. rufescens*, antennis pedibusque flavo nigroque annu-  
 ctus. *Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 10. mant. inf. 2. p. 310. n. 15.*  
*Habitat in America boreali.*
- obscurus. 566. *C. ater*, thorace posterius, elytris abdominisque margine obscure pallidis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 11. mant. inf. 2. p. 310. n. 16.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, parvus.*
- cayen- 567. *C. obscure fuscus* antennarum apice elytrorumque litura  
 nenfis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 310. n. 17.*  
*Habitat in Cayenna, parvus.*
- attelaboi- 568. *C. testaceo nigroque varius*, thorace anterieus testaceo,  
 des. *dentibus duobus nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 379. n. 12. mant. inf. 2. p. 311. n. 18.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- pilicornis. 569. *C. ater*, thorace posterius, scutello, elytrorum margine,  
 abdomine femoribusque basi rufis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 311. n. 19.*  
*Habitat Tranquebariae, mediae magnitudinis, antennis hirtis.*

- quadri- 570. *C. fuscus*, capite, abdominis margine pedibusque oliva-  
dentatus. ceis, thorace anteriori quadridentato. *Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 380. n. 13. mant. inf. 2. p. 311. n. 20.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.*
- nigripes. 100. *C. elytrorum bafi*, antennis pedibusque rubris, tibiis  
anterioribus hirsutissimis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 14.*  
*mant. inf. 2. p. 311. n. 21.*  
*Degeer inf. 3. p. 344. n. 20. t. 35. f. 1. Cimex hirtipes.*  
*Habitat in America meridionali.*
- unicolor. 571. *C. ater*, immaculatus, thorace subspinoso, tibiis cylin-  
dricis hirsutissimis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 311. n. 22.*  
*Habitat in Cayenna, statura nigripedis.*
- barbari- 572. *C. niger*, thorace elytris obscuris ferrugineis, scu-  
cus. tello lineola media alba. *Fabr. mant. inf. 2. p. 311. n. 23.*  
*Habitat in Barbaria, statura nigripedis.*
- Rohrii. 573. *C. ater*, thorace subspinoso, elytris lineola, abdominis  
margine femorumque articulatione sanguineis. *Fabr.*  
*mant. inf. 2. p. 311. n. 24.*  
*Habitat in Cayenna, statura nigripedis.*
- carbona- 574. *C. ater*, elytris posterioribus albis, capite posteriori attenuato  
rius. cylindrico. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 15. mant. inf. 2.*  
*p. 312. n. 25.*  
*Habitat in India, statura attelaboidis.*
- pacificus. 575. *C. rufus nigroque varius*, abdominis margine dente me-  
dio erecto obtuso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 16. mant.*  
*inf. 2. p. 312. n. 26.*  
*Habitat in nova Hollandia.*
- Edleri. 576. *C. niger*, thorace subspinoso, elytris maculis tribus albis.  
*Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 17. mant. inf. 2. p. 312. n. 27.*  
*Habitat in India.*
- oetoma- 577. *C. thorace posteriori testaceo, elytris alisque atris: ma-*  
culatus. culis quatuor laete flavis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 380. n. 18.*  
*mant. inf. 2. p. 312. n. 28.*  
*Habitat in India, reliquis hujus tribus minor.*
- stigma. 578. *C. thorace testaceo, elytris alisque nigris: macula media*  
flava. *Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 19. mant. inf. 2. p. 312.*  
*n. 29.*  
*Habitat in India, oetomaculato proxime affinis.*

579. G.

- curtipes. 579. *C. niger*, elytris pallidis: puncto atro, abdomine rufo: ano atro. *Fabr. mant. inf. 2. p. 312. n. 30.*  
*Habitat in India, parvus, pedibus anterioribus brevibus.*
- uncinatus. 580. *C. niger*, elytris basi pallidis, alis macula communi rufa, pectore spinoso. *Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 20. mant. inf. 2. p. 312. n. 31.*  
*Habitat in America meridionali, mediae magnitudinis.*
- iracundus. 581. *C. niger*, thorace abdominisque marginibus rubro maculatis, elytris rufis. *Scop. ent. carn. 378. Fabr. sp. inf. 2. p. 381. n. 21. mant. inf. 2. p. 312. n. 32.*  
*Schranck Beytr. p. 81. n. 37. t. 3. f. 17. Cimex sanguineus. Poda mus. p. 58. n. 17.*  
*Habitat in Germania superiori.*
- fuscipes. 582. *C. rufus*, thoracis fascia, elytrorum margine interiori pedibusque fuscis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 312. n. 33.*  
*Habitat in India, statura iracundi, at paulo minor.*
- bifidus. 583. *C. ater*, elytris fascia rufa, scutello spina erecta apice bifida. *Fabr. mant. inf. 2. p. 312. n. 34.*  
*Habitat in Sina, magnus.*
- membranaceus. 684. *C. niger*, abdominis apice membranisque duabus ovatis rufis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 202.*  
*Habitat extra Europam.*
- superbus. 685. *C. niger*, abdomine rufo basi nigro, elytris in medio ad marginem anticum puncto coccineo notatis, femoribus apice tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 203.*  
*Habitat extra Europam.*
- naevius. 686. *C. griseus* abdomine elytris dimidio longiore: dorso nigro, margine elevato rufo fulcoque vario. *Mus. Lesk. p. 124. n. 207.*  
*Habitat in Europa.*
- quinque-maculatus. 687. *C. niger*, elytris abbreviatis, abdominis margine elevato: maculis quinque albis inverse conicis, pedibus griseis fusco annulatis. *Mus. Lesk. p. 124. n. 208.*  
*Habitat in Europa.*
- staphylinus. 688. *C. apterus niger*, elytris abbreviatis pedibusque rubris: femoribus quatuor anticis compressis. *Mus. Lesk. p. 125. n. 209.*  
*Habitat in Europa, staphylinis affinis.*

**MACROCEPHALUS.** *Rostrum* inflexum : vagina univalvi triarticulata setis tribus, maxillis palpis labioque nullis.

*Antennae* porrectae, brevissimae, submoniliformes, clavatae.

*Caput* oblongum, supra cylindricum.

*Scutellum* longitudine abdominis, depressum, membranaceum.

cimicoi-  
des. 1. *M. griseo-ferrugineus*, scutello cinerascens : macula coeleoprata flava, alis purpurascens-violaceis, tibiis anterioribus incrassatis. *Swederus nov. act. Stockb.* 8. 1787. 3. n. 3. t. 8. f. 1.  
*Habitat in Georgia Americae, cimice eroso paulo minor.*

227. **APHIS.** *Rostrum* inflexum, vagina articularum quinque: seta unica.

*Antennae* setaceae, thorace longiores.

*Alae* quatuor erectae aut nullae.

*Pedes* ambulatorii.

*Abdomen* saepius posterius bicornis.

longiro-  
ftris. 34. *Aph. cinerea*, rostro corpore triplo longiore. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 314. n. 1.  
*Habitat Dresdae, sub arborum corticibus, formicarum larvis victitans, mediae magnitudinis.*

ribis. 1. *Aph. Ribis rubri.* *Fu. succ.* 975.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 315. n. 7.  
*Leeuwenh. arc. epist.* 90. p. 545. t. 548.  
*Blank. inf.* 164. t. 14. f. D. E.  
*Erisch inf.* 11. p. 9. t. 14.

*Reaum.*

*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 7-10.*

*Habitat sub ribis rubri foliis monstrosis pustulatis frequens.*

- arundinis. 35. Aph. arundinis epigeios. *Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 7.*  
*mant. inf. 2. p. 315. n. 8.*  
*Habitat in arundinis epigeios foliis.*
- ulmi, 2. Aph. ulmi campestris. *Fn. suec. 976.\* It. scan. 203. Fabr.*  
*sp. inf. 2. p. 387. n. 32. mant. inf. 2. p. 316. n. 37.*  
*Degeer inf. 3. p. 81. n. 13. t. 5. f. 7-18.* Aphis (foliorum  
 ulmi) nigricans tuberculata foliorum convolutorum ulmi.  
*Reaum. inf. 3. t. 25. f. 4-7.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 494. n. 1. t. 10. f. 3.*  
*Habitat in ulmo campestri.*
- papaveris. 36. Aph. papaveris somniferi. *Fabr. sp. inf. 2. p. 388. n. 33.*  
*mant. inf. 2. p. 316. n. 38.*  
*Habitat in Hollatiae papavere somnifero.*
- pastinacae. 3. Aph. pastinacae fativae. *Fn. suec. 977.\* Fabr. mant. inf.*  
*2. p. 315. n. 13.*  
*Habitat in pastinaca sativa.*
- pruni. 37. Aph. pruni domesticae. *Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 12.*  
*mant. inf. 2. p. 315. n. 14.*  
*Degeer inf. 3. p. 49. n. 5. t. 2. f. 1-8.* Aphis dilute viri-  
 dis albo farinosa, corniculis brevibus, pruni.  
*Reaumur inf. 3. t. 23. f. 9. 10.*  
*Habitat in pruni domesticae foliis.*
- sambuci. 4. Aph. sambuci nigrae. *Fn. suec. 978. Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*384. n. 3. mant. inf. 2. p. 315. n. 4.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 495. n. 3.* Aphis sambuci tota cae-  
 rulea atra.  
*List. angl. p. 397. n. 40.* Cimex exiguus nunc niger nunc  
 viridis, cui alae ex toto membranaceae, praegrandis.  
*Frisch inf. 11. p. 14. t. 18.*  
*Reaum. inf. 3. t. 8. f. 5-15.*  
*Habitat in Sambuci nigrae ramis.*
- solidagi- 38. Aph. solidaginis virgaureae. *Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n.*  
 is. *4. mant. inf. 2. p. 315. n. 5.*  
*Habitat in Norwegiae solidaginis virgaureae caulibus, ma-*  
*juscula, junior testacea, alias fusca, anterieus angustata,*  
*fronte emarginata, pedibus pallidis: geniculis nigris, cor-*  
*niculis elongatis setaceis, stilo duplo longioribus.*

- cerafi. 39. *Aph. pruni cerafi*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 5, mant. inf. 2. p. 315. n. 6.*  
*Müll. zool. dan. prodr. p. 110. n. 1256.*  
*Habitat in pruni cerafi foliis.*
- rumicis. 5. *Aph. rumicis lapathi*. *Fn. suec. 979.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 11. mant. inf. 2. p. 315. n. 12.*  
*Habitat in rumice acuto.*
- acetosae. 6. *Aph. rumicis acetosae*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 43. mant. inf. 2. p. 317. n. 48.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 496. n. 9. Aphis (acetosae) atra, fascia transversa viridi.*  
*Reaum. inf. 3. p. 286.*  
*Habitat in rumice acetosa, acetosella.*
- ligustici. 40. *Aph. ligustici scotici*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 44. mant. inf. 2. p. 317. n. 49.*  
*Habitat in Norwegiac ligustico scotico, nigra, antennis tibiarumque basi pallida.*
- lychnidis. 7. *Aph. lychnidis divicae*. *Fn. suec. 980.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 1. mant. inf. 2. p. 315. n. 2.*  
*Fn. suec. 719. Aphis cucubali.*  
*Habitat frequens in lychnidis divicae caulibus.*
- capreae. 41. *Aph. falicis capreae*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 384. n. 2. mant. inf. 2. p. 315. n. 3.*  
*Habitat in Europae falice.*
- padi. 8. *Aph. pruni padi*. *Fn. suec. 981. Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 45. mant. inf. 2. p. 317. n. 50.*  
*Reaum. inf. 3. t. 23. f. 9. 10.*  
*Habitat in pruno pado.*

9. Aph.

---

Aphides a vere in serun auctumnum vivos pariunt foetus, auctumno post copulam ova; post quartam demum metamorphosin pariunt, alisque instruuntur; a copula parentum nascuntur filiae, neptes, proneptes, abneptes; aliae apterae, aliae alatae, absque sexus discrimine in eadem specie; plurimae cornibus duobus posterioribus abdominis excernunt rorem mellium, qui formicas allicit; ab ichneumonis specie quadam infestatae. Species difficile distinguuntur, difficiliter definiuntur, nec semper in diversis plantis diversae species, adeoque pauciores aphides, quam plantarum aphidiferae.

Ccccccc

- rosae. 9. *Aph. rosae*. *Fn. succ.* 982.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 25.  
*mant. inf.* 2. p. 316. n. 30.  
*Degeer inf.* 3. p. 65. n. 10. t. 3. f. 10. *Aphis viridis*, corniculis longissimis, rosae.  
*Reaum. inf.* 3. t. 21. f. 1-4.  
*Lederm. microgr.* 53. t. 25.  
*Sutz. inf.* t. 12. f. 79.  
*Habitat in rosae pedunculis.*
- hortensis. 42. *Aph. atriplicis hortensis*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 26.  
*mant. inf.* 2. p. 316. n. 31.  
*Habitat in atriplicis hortensis summitatibus.*
- picridis. 43. *Aph. picridis hieracioidis*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 27.  
*mant. inf.* 2. p. 316. n. 32.  
*Habitat in picridis hieracioidis caulibus.*
- aegopodii. 44. *Aph. aegopodii podagrariae*. *Scop. ent. carn.* 399. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 28. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 33.  
*Habitat in aegopodii podagrariae foliis.*
- dauci. 45. *Aph. dauci carotae*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 29. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 34.  
*Habitat in dauci carotae umbella.*
- urticata. 46. *Aph. urticae dioicae*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 30. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 35.  
*Habitat in urticae dioicae caulibus, foliis.*
- nymphaeae. 10. *Aph. plantarum aquaticarum*. *Fn. succ.* 983. *Fabr. mant. inf.* 2. p. 315. n. 17.  
*Habitat in nymphaeis, potamogetonibus.*
- corni. 47. *Aph. corni fanguineae*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 315. n. 18.  
*Habitat in corni fanguineae foliis.*
- tiliae. 11. *Aph. tiliae europaeae*. *Fn. succ.* 984. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 388. n. 34. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 39.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 495. n. 6. *Aphis alis antennis pedibusque nigro punctatis.*  
*Degeer inf.* 3. p. 77. n. 12. t. 5. f. 1-5. *Aphis (tiliae nigropunctata) flavo-viridis lineis punctisque nigris, alis nigro maculatis, corniculis brevioribus.*  
*Frisch inf.* 11. p. 1. n. 3. t. 17. *Pediculus arboreus tiliae.*  
*Reaum.*



*Reaum. inf. 3. t. 23. f. 1-8.*

*Habitat in Europae tilia.*

- juniperi. 48. Aph. juniperi communis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 388. n. 35.*  
*mant. inf. 2. p. 316. n. 40.*  
*Degeer inf. 3. p. 56. n. 7. t. 4. f. 7. 8.* Aphis obscure fusca  
 cinereo maculata, corniculis brevioribus grossis, juniperi.  
*Habitat in juniperi communis foliis.*
- brassicæ. 12. Aph. brassicæ oleraceæ. *Fn. suec. 985. Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 388. n. 36. mant. inf. 2. p. 316. n. 41.*  
*Frisch inf. 11. p. 10. t. 3. f. 15.* Pediculus brassicæ.  
*Habitat in brassicæ oleraceæ foliorum pagina inversa, unde*  
*tabescunt.*
- craccae. 13. Aph. viciæ craccae. *Fn. suec. 986. Fabr. sp. inf. 2. p. 390.*  
*n. 46. mant. inf. 2. p. 317. n. 51.*  
*Degeer inf. 3. p. 58. n. 8. t. 2. f. 14. 15.* Aphis nigra  
 caeruleicens albo farinola, corniculis brevioribus, viciæ  
 craccae.  
*Habitat in viciæ craccae foliis.*
- lactucae. 14. Aph. lactucae oleraceæ. *Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 47.*  
*mant. inf. 2. p. 317. n. 52.*  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 3-5.*  
*Habitat in lactuca oleracea.*
- sonchi. 15. Aph. sonchi oleracei. *Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 48. mant.*  
*inf. 2. p. 317. n. 53.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 497. n. 13.*  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 3-5.*  
*Habitat in soncho oleraceo.*
- cirsi. 16. Aph. ferratulae arvensis. *Fn. suec. 987.\* It. wgoth. 307.*  
*Habitat in ferratula arvensi.*
- cardui. 17. Aph. cardui. *Fn. suec. 988.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 385.*  
*n. 13. mant. inf. 2. p. 315. n. 15.*  
*Habitat in carduorum caulibus.*
- achilleae. 49. Aph. flavescens, abdomine viridi, antennis pedibusque al-  
 bidis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 385. n. 14. mant. inf. 2. p. 315.*  
*n. 16.*  
*Habitat frequens Kilonii in achillea millefolio.*
- tanacet. 18. Aph. tanacet. vulgaris. *Fn. suec. 989.\* Fabr. sp. inf. 2.*  
*p. 387. n. 31. mant. inf. 2. p. 316. n. 36.*

CCCCC 2

Geoffr.

- Geoffr. inf. par. 1. p. 496. n. 8.* Aphis tanacetii fusca, abdomine nigro caeruleo, antice viridi.  
*Habitat in tanacetii vulgaris caulibus.*
- absinthii. 19. Aph. artemisiae absinthii. *Fn. succ. 990.\* Fabr. mant. inf. 2. p. 315. n. 19.*  
*Habitat in artemisia absinthio.*
- millefolii. 50. Aph. fusca, abdomine virescente, antennis pedibus corniculisque nigris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 16. mant. inf. 2. p. 316. n. 20.*  
*Degeer inf. 3. p. 60. n. 9. t. 4. f. 1-5.* Aphis millefolii.  
*Habitat in achillea millefolio.*
- euonymi. 51. Aph. euonymi europaei. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 17. mant. inf. 2. p. 316. n. 21.*  
*Habitat in euonymi europaei foliis.*
- avenae. 52. Aph. avenae fativae. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 18. mant. inf. 2. p. 316. n. 22.*  
*Habitat in Europae avena fativa.*
- fraxini. 53. Aph. fraxini excelsioris. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 19. mant. inf. 2. p. 316. n. 23.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 494. n. 2.* Aphis fraxini nigro viridique variegata.  
*Habitat in fraxini excelsioris ramis.*
- jaceae. 20. Aph. centaureae jaceae. *Fn. succ. 991.\**  
*Habitat in centaurea jacea.*
- betulae. 21. Aph. betulae albae. *Fn. succ. 992.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 20. mant. inf. 2. p. 316. n. 25.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 496. n. 7.* Aphis marginibus incisarum abdominis punctis nigris.  
*Degeer inf. 3. p. 45. n. 3.* Aphis nigro punctata corniculata viridis, dorso tuberculis nigris, betulae.  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 2.*  
*Habitat in betulae albae foliis.*
- alni. 54. Aph. betulae alni. *Fabr. sp. inf. 2. p. 386. n. 21. mant. inf. 2. p. 316. n. 26.*  
*Degeer inf. 3. p. 47. n. 4. t. 3. f. 15-17.* Aphis flavescens alba tuberculata, alni.  
*Habitat in betulae alni foliis.*

- roboris. 22. *Aph. nigra*, corniculis obsoletis atris medii abdominis.  
*Fn. suec.* 993. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 388. n. 37. *mant. inf.* 2.  
 p. 317. n. 42.  
*Habitat in Quercu robore.*
- fagi. 23. *Aph. fagi sylvaticae lanata.* *Fabr. mant. inf.* 2. p. 316.  
 n. 24.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 497. n. 2.  
*Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 1.  
*Habitat in fago sylvatica.*
- quercus. 24. *Aph. quercus roboris proboscide longissima.* *Fabr. sp. inf.*  
 2. p. 388. n. 38. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 43.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 498. n. 14. *Aphis fusca* proboscide  
 corpore triplo longiore.  
*Reaum. inf.* 3. t. 28. f. 5-14.  
*Habitat in Galliae potissimum quercu, atra, inter maximas,*  
*alis hyalinis: margine exterius atro, anternarum pedum-*  
*que articulis basi ferrugineis, abdomine mutico.*
- pini. 25. *Aph. pini sylvestris ramulorum.* *Fo. suec.* 994. *Fabr. sp.*  
*inf.* 2. p. 389. n. 39. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 44.  
*Degeer inf.* 3. p. 27. n. 1. t. 6. f. 9-16. *Aphis (nuda pini)*  
*fusca tuberculata, pedibus nudis, pini.*  
*Habitat in pini sylvestris ramis junioribus.*
- pineti. 55. *Aph. pini sylvestris foliorum.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 389.  
 n. 40. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 45.  
*Degeer inf.* 3. p. 39. n. 2. t. 6. f. 19. 33. *Aphis (tomentosa*  
*pini) nigra albo farinosa tuberculata, pedibus villoso to-*  
*mentosis.*  
*Habitat in pini sylvestris foliis, pedibus posterioribus elon-*  
*gatis ciliatis.*
- salicis. 26. *Aph. salicis.* *Fn. suec.* 995.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 389. n. 41.  
*mant. inf.* 2. p. 317. n. 46.  
*Reaum. inf.* 3. t. 22. f. 2.  
*Habitat in salicibus variis.*
- vitis. 56. *Aph. vitis viniferae.* *Scop. ent. carn.* 398. *Fabr. sp. inf.*  
 2. p. 390. n. 49. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 54.  
*Habitat in Europae magis australis vite vinifera.*
- populi. 27. *Aph. populi tremulae foliorum.* *Fn. suec.* 996.\* *Fabr. sp.*  
*inf.* 2. p. 386. n. 22. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 27.  
*Habitat sub populi tremulae foliis convolutis fornicatis.*

- tremulac. 28. Aph. populi tremulae ramulorum. *Fn. succ.* 997.\*  
*Degeer inf.* 3. p. 94. n. 15. t. 7. f. 1-7. Aphis caerulea nigro-tomentosa, corniculis nullis, populi tremulae ramulorum.  
*Habitat in populi tremulae ramulis, ubi foliis approximatis conteguntur.*
- viburni. 57. Aph. viburni opuli. *Scop. ent. carn.* 396. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 386. n. 23. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 28.  
*Sulz. hist. inf.* t. 11. f. 1. 2.  
*Habitat in viburni opuli foliis et caulibus.*
- mali. 58. Aph. pyri mali. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 387. n. 24. *mant. inf.* 2. p. 316. n. 29.  
*Degeer inf.* 3. p. 53. n. 6. t. 3. f. 20. Aphis pomi flavo-viridis, corniculis longioribus pedibus antennisque nigrescentibus.  
*Habitat sub pyri mali foliis.*
- burfaria. 29. Aph. populi nigrae. *Fn. succ.* 998.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 8. *mant. inf.* 2. p. 315. n. 9. *it. scan.* 311.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 497. n. 11. Aphis populi nigra lanata.  
*Hofm. altd. hort.* 51.  
*Seb. mus.* 1. t. 38. f. 8.  
*Fung verm.* 161. 162.  
*Rupp. jenens.* 3. p. 333.  
*Swammerd. bibl.* 45. f. 22-25.  
*Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 7-11.  
*Hort. amb.* t. 96.  
*Merian. inf. europ.* 1. p. 15. t. 42.  
*Habitat in populi nigrae foliis succatis, petiolorumque utriculis coloratis.*
- aparines. 59. Aph. galii aparines. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 9. *mant. inf.* 2. p. 315. n. 10.  
*Habitat in galio aparine.*
- urticae. 30. Aph. urticae alba lanata posteriore truncata.  
*Frisch inf.* 8. p. 34. t. 17.  
*Habitat in Germaniae urtica, inter maximas sui generis, setis, subtus lana obiecta.*
- aceris. 31. Aph. aceris platanoidis. *Fn. succ.* 999.\*  
*Fabr. sp. inf.* 2. p. 385. n. 10. *mant. inf.* 2. p. 315. n. 11.  
 Aphis aceris campestris.

Geoffr.

*Geoffr. inf. par. 1. p. 495. n. 5.* Aphis (accris) viridis maculis nigris.

*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 6-10.*

*Habitat in aceris campestris et platanoidis foliis.*

atriplicis. 32. Aph. atriplicis. *Fa. suec. 1000.*

*Habitat sub atriplicis, imprimis littoralis, foliis, intra cylindrum ex foliis revolutis confectum obambulans.*

pistaciae. 33. Aph. nigra, alis albidis, tibiis longissimis, thorace verrucoso.

*Fabr. sp. inf. 2. p. 389. n. 42. mant. inf. 2. p. 317. n. 47.*

Aphis pistaciae lentilci.

*Siml. vit. ges. 49.*

*Camer. epit. 51.*

*Lob. ic. 100.*

*Dodon. pempt. 780.*

*J. Baub. hist. 1. p. 279.*

*Theodor. hist. 1439.*

*Habitat in pistacia vera, terebintho, lentisco, antennis moniliformibus, oculis nigricantibus, abdomine posterius mutico, lanugine alba globulis mista tecto, alis interdum erectis, in folliculo, e foliorum basi enascente, ventricoso, utrinque attenuato, spithameo, pollice crassiore, primo viridi, post exitum aphidis incarnato.*

perficae. 60. Aph. amygdali perficae.

*Sulz. hist. inf. p. 105. t. 11. f. 3.*

*Habitat in amygdalo perfica, inter majores, viridis, capite thorace tibiisque nigris, alis longissimis, antennis corpore longioribus, rostro brevi.*

polyanthis. 61. Aph. polyanthis tuberosae.

*Sulz. hist. inf. p. 105. t. 11. f. 4. 5.*

*Habitat in polyanthe tuberosa, fusca, globosa, antennis corpori aequalibus; mare minore, dorso griseo, ut plurimum alato.*

saligna. 62. Aph. griseo-fusca, rostro longissimo, antennis brevioribus, corniculis nullis.

*Sulz. hist. inf. t. 11. f. 6.*

*Habitat in salice.*

plantaginis. 63. Aph. plantaginis. *Bonnet insectol. 1. p. 56.*

*Habitat in plantaginum caulibus.*

Ccccccc 4

64. Aph.

- archange- 64. Aph. angelicae archangelicae. Scop. entom. carn. p. 137.  
licae. n. 400.  
*Habitat in angelica archangelica, nigra, rostro et abdomine virentibus.*
- leucan- 65. Aph. chrysanthemi leucanthemi. Scop. ent. carn. p. 138.  
themi. n. 404.  
*Habitat in chrysanthemo leucanthemo, nigra, abdomine rostroque virescentibus, hoc apice fusco.*
- scabiofae. 66. Aph. scabiofae. Scop. ent. carn. p. 138. n. 405.  
*Habitat in scabiosis.*
- fabae. 67. Aph. viciae fabae. Scop. ent. carn. p. 139. n. 406.  
*Habitat in vicia faba, quam sterilem reddit.*
- genistae. 68. Aph. genistae tinctoriae. Scop. ent. carn. p. 139. n. 409.  
*Habitat in genista tinctoria, nigra, alis puncto fusco.*
- coryli. 69. Aph. coryli avellanae. Goeze entom. Beytr. 2. p. 311.  
*Habitat in coryli avellanae foliorum pagina inferiori, albi- da, minor.*
- juglandis. 70. Aph. juglandis regiae.  
*Frisch inf. II. p. 12. n. 10. t. 16.*  
*Habitat in juglande regia, flavo-viridis, antennis brevioribus, corpore segmentis quinque supra nigris constante.*
- balsami- 71. Aph. tanacetii balsamitae. Müll. zool. dan. prodr. p. 109.  
tae. n. 1252.  
*Habitat in tanaceto balsamita, nigra, abdomine viridi, oculis rubris.*
- gallarum. 72. Aph. gallarum ulmi. Degeer inf. 3. p. 89. n. 14. t. 4. f. 15.  
*Reaum. inf. 3. p. 299. t. 25. f. 4-7.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 494. n. 1. t. 10. f. 3.*  
*Habitat in folliculis foliorum ulmi, nigricans, corniculis nullis.*
- farinosa. 73. Aph. salicis farinosa. Degeer inf. 3. p. 76. n. 11.  
*Habitat in salice, obscure viridis, tuberculis lanuginosis albis, corniculis longioribus.*
- xylostei. 74. Aph. lonicerae xylostei. Degeer inf. 3. p. 96. n. 16. t. 7.  
f. 8.  
*Habitat in lonicera xylosteo, tomentosa, corniculis nullis.*

75. Aph.

Mayeri. 75. Aph. rubra, antennis thorace brevioribus, abdomine extenuato, tibiis brevioribus. *Mayer Abb. boehm. Gef. 4. p. 183.*

*Habitat in Bohemiae foliis tanacetii vulgaris, aptera.*

228. CHERMES. *Rostrum* vagina pectorali: fetis tribus inflexis.

*Antennae* cylindricae, thorace longiores.

*Alae* quatuor deflexae.

*Thorax* gibbus.

*Pedes* saltatorii.

graminis. 1. Ch. airae flexuosae. *Fn. suec. 1001.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 1. mant. inf. 2. p. 317. n. 1.*

*Habitat in Europae graminibus, imprimis aira flexuosa.*

ulmi. 2. Ch. ulmi campestris. *Fn. suec. 1002.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 2. mant. inf. p. 317. n. 2.*

*Habitat intra ulmi campestris folia revoluta.*

cerastii. 3. Ch. cerastii viscosi. *Fn. suec. 1003. Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 4. mant. inf. 2. p. 317. n. 4.*

*Habitat in cerastii viscosi foliis, in capitulum conniventibus.*

pyri. 4. Ch. pyri communis. *Fn. suec. 1004.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 390. n. 3. mant. inf. 2. p. 317. n. 3.*

*Degeer inf. 3. p. 141. n. 2. t. 9. f. 2. Chermes (pyri) viridi-fulca maculis fasciisque obscuris, alis fusco maculatis.*

*Habitat in pyri communis foliis.*

forbi. 5. Ch. forbi aucupariae. *Fabr. sp. inf. 2. p. 391. n. 7. mant. inf. 2. p. 318. n. 7.*

*Habitat in sorbo aucuparia, supra lituris lineisque variis nigris varia, subtus virens, thorace flavescente, anterieus punctis duobus, posterius lineis quatuor nigris.*

C e c e c e c 5

18. Ch.

---

Chermis larvae pedatae, saepius villosae; imagines saliant, plantis insident, ceterum aphidibus similes.

- perficac. 18. Ch. amygdali perficac. *Fabr. sp. inf. 2. p. 391. n. 8.*  
*mant. inf. 2. p. 318. n. 8.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 506. n. 4.* Chermes perficac oblongus.  
*Reaum. inf. 4. t. 1. f. 1. 2.*  
*Habitat in amygdali perficac ramis.*
- calthae. 6. Ch. calthae palustris. *Fn. succ. 1005.\* Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*391. n. 9. mant. inf. 2. p. 318. n. 9.*  
*Habitat in calthae palustris floribus.*
- buxi. 7. Ch. buxi sempervirentis. *Fabr. sp. inf. 2. p. 391. n. 5.*  
*mant. inf. 2. p. 317. n. 5.*  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 485. n. 2.* Pfylla viridis, antennis  
tetaceis, alis fusco-flaveicentibus.  
*Reaum. inf. 3. t. 19. f. 1-14.*  
*Habitat intra Europae magis australis buxi folia summa*  
*conniventia, Majo interdum Argentorati frequentissima,*  
*excrementa dulcia, cito tamen acefcentia, et postea foeti-*  
*da excernens.*
- urticae. 8. Ch. urticae dioicae. *Fn. succ. 1006.\* Fabr. sp. inf. 2. p.*  
*391. n. 10. mant. inf. 2. p. 318. n. 10.*  
*Degeer inf. 3. p. 134. n. 1. t. 9. f. 17-19.* Chermes (ur-  
ticae) fusca f. virefcens, abdominis lateribus albo maculatis.  
*Habitat in urticae dioicae foliis.*
- betulae. 9. Ch. betulae albae. *Fn. succ. 1007.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 391.*  
*n. 11. mant. inf. 2. p. 318. n. 11.*  
*Habitat in betulae albae ramis.*
- alni. 10. Ch. betulae alni. *Fn. succ. 1008.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 391.*  
*n. 12. mant. inf. p. 318. n. 12.*  
*Degeer inf. 3. p. 148. n. 3. t. 10. f. 8.* Chermes alni la-  
nata viridis.  
*Geoffr. inf. par. 1. p. 486. n. 3.* Pfylla viridis, antennis  
tetaceis, alis aqueis.  
*Frisch inf. 8. p. 48. t. 13.* Vermis fuctorius alni.  
*Sulz. inf. t. 12. f. 80.*  
*Schaeff. elem. t. 39.*  
*Habitant in betulae alni ramulis larvae, caudis plumosis*  
*tectae.*
- quercus. 11. Ch. quercus roboris. *Fn. succ. 1009.\**  
*Habitat in quercus foliis, ex flavo albicans ad marginem*  
*alarum interiorem litura, ad exteriorem quatuor fuscis.*



- fagi. 12. Ch. fagi sylvaticae. *Fn. suec.* 1010. *it. scan.* 65. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 391. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 317. n. 6. *Reaum. inf.* 3. t. 26. f. 1-6.  
*Habitat in fagi sylvaticae foliis.*
- abietis. 13. Ch. pini abietis. *Fn. suec.* 1011.\* *fl. lappon.* 218. p. 347. E. *it. gotl.* 180. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 13. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 13.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 487. n. 5. Pſylla pallide flavescens, oculis fuscis, alis aqueis.  
*Degeer inf.* 3. p. 99. n. 17. t. 8. f. 1-3. Aphis (gallarum abietis) tomentosa, corniculis nullis.  
*Frisch inf.* 12. p. 10. t. 2. f. 3. Insectum tuberculi muricati arboris taxi.  
*Clus. pannon.* 20. 21. *Picea pumila.*  
*Habitat frequens in turionum abietis gallis strobiliformibus, squamatis, imbricatis.*
- falicis. 14. Ch. falicis. *Fn. suec.* 1012. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 14. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 14.  
*Habitat in Europae falicibus.*
- fraxini. 15. Ch. fraxini excelsioris. *Fn. suec.* 1013. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 15.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 486. n. 4. Pſylla nigro luteoque variegata, alarum ore in apicibus fuscis.  
*Habitat in fraxino.*
- aceris. 16. Ch. aceris platanoidis. *Fn. suec.* 1014. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 16. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 16.  
*Habitat in aceris platanoidis racemis.*
- ficus. 17. Ch. ficus caricae. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 392. n. 17. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 17.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 484. n. 1. Pſylla fusca, antennis crassis pilosis, alarum nervis fuscis.  
*Reaum. inf.* 3. t. 29. f. 17-24.  
*Habitat in Europae magis australis ficu carica.*
- pini. 19. Ch. pini lanata. *Fn. suec.* 1. n. 699.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 488. n. 6.  
*Habitat in pinu; an eadem cum ch. abietis?*

20. Ch.

- lichenis. 20. Ch. fusca nigro punctata, antennis corpore longioribus,  
 alis nervosis fusco maculatis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 88. n. 7.*  
*Habitat in lichenibus.*
- castanea. 21. Ch. fusca, antennis fetaceis laevibus, alis nervosis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 489. n. 8.*  
*Habitat in variis plantis.*
- rubra. 22. Ch. rubra, alis nervosis.  
*Geoffr. inf. par. I. p. 489. n. 9.*  
*Habitat in variis plantis.*
- pruni. 23. Ch. pruni domesticae. *Scop. ent. carn. p. 140. n. 414.*  
*Habitat in pruno domestica, abdomine rubro: punctis fasciisque lateralibus fuscis.*
- crataegi. 24. Ch. crataegi oxyacanthae. *Scop. ent. carn. p. 139. n. 412.*  
*Habitat in crataego oxyacantha; larva ex plumpeo virente: plica abdominis longitudinali media.*
- euonymi. 25. Ch. euonymi europaei. *Scop. ent. carn. p. 139. n. 411.*  
*Habitat in euonymo europaeo, nigra, pedibus pallidis.*
- fenecionis. 26. Ch. fenecionis vulgaris. *Scop. ent. carn. p. 140. n. 413.*  
*Habitat in fenecione vulgari, ex flavo virens, antennarum articulo ultimo crassiore, duobus pilis terminato.*

229. COCCUS. *Rostrum* vagina fetisque pectoralibus,  
*Antennae* filiformes.  
*Abdomen* posterius fetosum.  
*Alae* duae erectae masculis; *feminae* apterae.

hesperidum. 1. *C. hybernaculorum*. *Fn. succ.* 1015.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 1. *Modeer act.* Gothenb. 1. p. 19. §. 8.  
*Fn. succ.* 722. *Coccus hesperidum*.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 505. n. 2. *Chermes hesperidum*.  
*Act. Paris.* 1692. p. 14. t. 14.  
*Reaum. inf.* 4. t. 1.  
*Frisch inf.* 12. p. 12.  
*Sulz. inf. t.* 12. f. 81.  
*Schaeff. elem.* t. 43.  
*Habitat in hybernaculorum arboribus sempervirentibus, frequentissimus, e. g. citro, lauro, quassia, spadiceus, ovato-oblongus.*

Aonidum. 2. *C. indarum arborum*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 2. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 2. *Modeer act.* Gothenb. 1. p. 30. §. 26.  
*Habitat in Asiae arboribus sempervirentibus, Camellia &c. cocco hesperidum minor, apterus, flavescens, oblongus, vel suborbicularis, antennis longitudine fere thoracis, testa orbiculata, planiuscula, atro-purpurascens: centro s. vertice tuberculato, rotundo, rubro, in senescentibus aperto.*

capensis. 3. *C. ovalis subtomentosus conico-gibbus: apice operculato*.  
*Amoen. acad.* 6. p. 401. n. 47.\* *Fabr. mant. inf.* 2. p. 318. n. 3. *Modeer act.* Gothenb. 1. p. 31. §. 28.  
*Habitat ad caput bonae spei in gnaphalio muricato.*

Adonidum. 4. *C. rufus farinaceus pilosus*. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 4. *Modeer act.* Gothenb. 1. p. 48. §. 34.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 511. n. 1. *Coccus adonidum, corpore oleo farinaceo, alis fetisque niveis.*  
*Fn. succ.* 1. n. 1169. *Pediculus adonidum.*

β) *Lederm.*

β) *Lederm. microsc.* 1762. t. 9. *Pediculus coffeae.*

*Habitat in Americae, Africae, nunc in Europae calidioris arboribus, corpore ovato oblongiusculo albo, antennis pedibusque fuscis; linea dorsali longitudinali elevata, cum puncto elevato in singulis segmentis, laterum marginibus acutis, cum incisuris punctisque prominentibus 14, area inter lineam dorsalem et marginem totidem punctis secundum longitudinem dispositis conspersa, cauda bifida: Senior folliculum struit, se sexies majorem, in quo se suaque ova flava condit.*

quercus. 5. *C. quercus roboris.* *Fn. suec.* 1016. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 4. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 5.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 508. n. 13. *Chermes quercus reniformis.*

*Reaum. inf.* 4. t. 6. f. 1-4.

*Habitat in Quercu Robore.*

ilicis. 6. *C. quercus cocciferae.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 318. n. 6. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 24. §. 19.

*Garid. aixensf.* 250. t. 53.

*Reaum. inf.* 4. t. 5.

*Geoffr. mat. med.* 2. p. 782.

*Lederm. microsc.* 72. t. 36.

*Habitat in Galloprovinciae quercu coccifera, nitens fuscus albo-villosus, aceto immersus et supra lintea exsiccatus tinctorius.*

betulae. 7. *C. betulae albae.* *Fn. suec.* 1017. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 8. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 10. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 23. §. 16.

*Habitat in Europae betula alba, teres, spadiceus.*

carpini. 8. *C. carpini betuli.* *Fn. suec.* 1018. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 9. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 11. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 29. §. 24.

*Habitat*

---

Cocci, hybernaculorum pestis, juniores in ramis foliisque arborum decurrunt, volandoque saliant, aliquas subeunt metamorphoses, ut tamen Adonidum, polonicus, spurius, cacti phalaridis, pilosellae, uvae ursi et alui faciem vix mutant; adultiores, feminae praesertim maribus multoties majores, oculis nigris antennis pedibusque minimis instructae, fertilissimae, ut singulae per rimam caudalem foecundatae ad 1000 ova contineant, tardi, adhaerent plantis, saepe ramis, alii radicibus, fere immobiles,

*Habitat in carpino betulo, subsphaericus, pallide rubescens, stria ad latus elevata.*

- ulmi. 9. *C. ulmi campestris.* *Fn. suec.* 1019. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 393. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 8. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 27. §. 21.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 507. n. 8. *Chermes ulmi rotundus.*  
*Degeer inf.* 6. p. 436. n. 1. t. 28. f. 7. *Coccus ovatus albus fulco transverse striatus, ulmi.*  
*Habitat in ulmo campeltri, brunneus; fasciis transversis fuscis.*
- coryli. 10. *C. coryli avellanae.* *Fn. suec.* 1020. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 7. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 9. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 29. §. 23.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 507. n. 10. *Chermes coryli hemisphaericus.*  
*Reaum. inf.* 4. t. 3. f. 4-10.  
*Habitat in corylo avellana, citreus, rubro maculatus.*
- tiliae. 11. *C. tiliae europaeae.* *Fn. suec.* 1021. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 10. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 12. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 30. §. 25.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 507. n. 9. *Chermes tiliae hemisphaericus.*  
*Reaum. inf.* 4. t. 3. f. 1-3.  
*Habitat in tilia europaea.*
- rusci. 12. *C. rusci, testa octo clypeolis cincta.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 11. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 13. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 31. §. 29.  
*Column. purp.* 16. t. 17. *Lepas nova f. myrti morbus.*  
*Ginann. adr.* 1. p. 60. t. 3. f. 27. *Balanus terrestris compositus e multis testis.*  
*Klein ostr.* 116. *Lepas tessellata.*  
*Bocc. mus. t.* 107. f. XXIII. h. h.  
*Habitat in Apuliae myrto, rusco; testa truncata, octogona, perforata, clypeolis, praeter duos laterales oppositos, in medio granulo notatis.*
- myricae. 13. *C. myricae quercifoliae.* *Fabr. mant. inf.* 2. p. 319. n. 14. *Modeer act. Gothenb.* 1. p. 31. §. 27.  
*Habitat ad caput bonae spei, in myrica quercifolia, pisi minoris magnitudine, semiovatus, pallide incarnatus, vertice*

*vertice obtuse acuminato cum poro tenuissimo; poro alio posterius supra marginem cartilagineum crassiolem, albuu, utrinque septem circiter torulis protuberantem.*

- capreae. 14. *C. falicis cinereae. Fabr. sp. inf. 2. p. 394. n. 12. mant. inf. 2. p. 319. n. 15. Modeer act. Gotbenb. I. p. 22. §. 15. Deycer inf. 6. p. 440. n. 2. t. 28. f. 13. Coccus subrotundus fuscus, linea dorsali nigra, falicis.*  
*Habitat in Europae falicibus, quibus folia hirsuta, pisi majoris magnitudine, semiamplexicaulis, ovatus, anterius obtusus et bifidus, colore seminis staphyleae, linea media nigra, nitens, glaber.*
- falicis. 15. *C. falicis hermaphroditae. Fn. suec. 1022.\* Modeer act. Gotbenb. I. p. 21. §. 12.*  
*Habitat in falicis hermaphroditae cortice, minimus, depressusculus, cinereus.*
- vitis. 16. *C. vitis viniferae. Fabr. sp. inf. 2. p. 395. n. 18. mant. inf. 2. p. 319. n. 25. Modeer act. Gotbenb. I. p. 20. §. 9. Geoffr. inf. par. I. p. 506. n. 6. Chermes vitis oblongus. Act. bonon. 2. p. 279. t. 284. Reaum. inf. 4. t. 6. f. 5-7.*  
*Habitat in vitis viniferae ramis, cinnamomeus.*
- ficus. 23. *C. ficus religiosae et indicae. Fabr. mant. inf. 2. p. 319. n. 7. Kerr act. angl. 1781. p. 374. f. a. b. Coccus Lacca.*  
*Habitat in Indiae ficu religiosa et indica, gummilaccam producens, ruber, antennis ramosis, cauda bifeta. Swagermann.*
- polonicus. 17. *C. radiceis scleranthi perennis. Fn. suec. 1023. Fabr. sp. inf. 2. p. 395. n. 20. mant. inf. 2. p. 319. n. 23. Modeer act. Gotbenb. I. p. 34. §. 31.*  
*Fn. suec. 720. Coccus radicum purpureus. Geoffr. inf. par. I. p. 504. n. 1. Chermes radicum purpureus. Breyn act. phys. med. 6. 3. app. 5. t. 1. Coccus tinctorius radicum. Camer. epit. 691. Polygonum cocciferum. Baub. pin. 281. Rupp. jen. 86. Raj. hist. 186. Bauh. hist. 3. p. 378.*

*Friseh*

*Frisch inf.* 5. p. 6. t. 2.

*Aët. ups.* 1742. t. 1.

*Reaum. inf.* 4. p. 1.

*Habitat in telerantheri perennis radicibus, oblongo-ovatus, purpureus aut spadiceus olim, Colaccis adhuc tinctorius.*

fragariae. 24. *C. fragariae vescae.* S. G. *Gmelin it.* 1. p. 205. 3. p. 312.

*Aët. angl.* 1765. p. 91. t. 10.

*Mayer aët. soc. priv. boh.* 4. p. 152. 184. Coccus potentillae.

*Habitat in Europa et Sibiria ad fragariae vescae, potentillae vernae, reptantis, albae radices, rusticis Russis ad tingenda colore kermesino lintea usitatus, rostro nigro, thorace trirugi, ano pilis nigrescentibus cincto,*

hyperico-25. *C. hypericonis perforati.* *Pallas it.* 1. p. 21.

*Habitat in Russiae hypericone perforato.*

pilosellae. 18. *C. radiceis hieracii pilosellae.* *Fn. suec.* 1024. *Fabr. sp.*

*inf.* 2. p. 394. n. 13. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 16. *Modeer*

*aët. Gothenb.* 1. p. 49. §. 36.

*Sim. Paul. quadr.* 113.

*Aët. upsal.* 1742. p. 54. t. 2.

*Habitat in hieracii pilosellae radicibus.*

uvae urfi. 19. *C. radiceis arbuti uvae urfi.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 394. n. 14.

*mant. inf.* 2. p. 319. n. 17. *Modeer aët. Gothenb.* 1. p. 49.

§. 37.

*Habitat sub muscis ad radices arbuti uvae urfi, tinctorius, spadiceus.*

phalaridis. 20. *C. radicum phalaridis.* *Fn. suec.* 1026. *Fabr. sp. inf.* 2.

p. 395. n. 15. *mant. inf.* 2. p. 319. n. 18. *Modeer aët.*

*Gothenb.* 1. p. 48. §. 35.

*Geoffr. inf. par.* 1. p. 512. n. 2. t. 10. f. 5. Coccus graminis, corpore roseo.

*Habitat ad graminum, praesertim phalaridis canariensis, radices, oblongo-ovatus, albidus vel pallide rubescens.*

oxyacanthae. 21. *C. crataegi oxyacanthae.* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 395. n. 16.

*mant. inf.* 2. p. 319. n. 19. *Modeer aët. Gothenb.* 1. p. 20.

§. 10.

*Reaum. inf.* 4. t. 6. f. 11. 12.

*Habitat in crataegi oxyacantha, oblongus, spadiceus.*

- ferratulae. 26. *C. ferratulae arvensis*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 395. n. 17. mant. inf. 2. p. 319. n. 20.*  
*Habitat in Angliae ferratula arvensi.*
- zosterac. 27. *C. zosteracae marinae*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 395. n. 19. mant. inf. 2. p. 319. n. 22.*  
*Habitat in maris balthici zosteracae marinae.*
- cacti. 22. *C. cacti coccinelliferi*. *Fabr. sp. inf. 2. p. 395. n. 21. mant. inf. 2. p. 319. n. 24. Modeer act. Gothenb. I. p. 44. §. 33.*  
*Brown jam. 435. Coccinella alis destituta, corpore rugoso. Degeer inf. 6. p. 447. n. 1. t. 80. f. 12-14. Coccus cacti coccinelliferi. Act. angl. 1762. Hernand. mex. 78. Sloan. jam. 2. p. 153. praef. t. 9. Pet. gazoph. 3. t. 1. f. 5. Reaum. inf. 4. t. 7. f. 11. 12. Rausch hist. nat. de la cochinille. t. 1. f. 1-5.*  
*Habitat in Americae cactis opuntiiis, depressus, tomentosus, transverse rugosus, dorso margine laterali utrinque duplici: superiore brevior, abdomine purpurascens, pedibus brevibus nigris, antennis subulatis, corpore tertio parte brevioribus, eximie tinctorius.*
- liriiodendri. 28. *C. liriiodendri tulipiferae*. *Hamburg. Magaz. 12. p. 1-24.*  
*Habitat in liriiodendro tulipifera.*
- farinosus. 29. *C. ovatus tomentosus pallide fuscus albo-farinosus. Degeer inf. 6. p. 442. n. 3. t. 38. f. 16. 17. Modeer act. Gothenb. I. p. 50. §. 38.*  
*Habitat in betula albo, depressus sculus.*
- clematidis. 30. *C. clematidis oblongus. Geoffr. inf. par. 1. p. 506. n. 1.*  
*Habitat in clematidibus.*
- persicae. 31. *C. persicae rotundus. Modeer act. Gothenb. I. p. 28. §. 22. Geoffr. inf. par. 1. p. 506. n. 5. Reaum. inf. 4. t. 2. f. 4-5.*  
*Habitat in amygdala persica, nitens, rubicundus, spadiceus aut niger.*



- abietis. 32. *C. abietis rotundus*. *Modeer act. Gothenb. I. p. 27. §. 20.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 507. n. 7.*  
*Habitat in pinu abiete; badius.*
- fuscus. 33. *C. quercus fuscus*. *Modeer act. Gothenb. I. p. 24. §. 18.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 507. n. 11.*  
*Reaum. inf. 4. t. 5. f. 2.*  
*Habitat in quercu robore, albo tomento obductus.*
- variegatus. 34. *C. quercus rotundus ex albo, flavescente nigroque varius.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 508. n. 12.*  
*Reaum. inf. 4. t. 5. f. 3. a.*  
*Habitat in quercu robore.*
- lanatus. 35. *C. quercus oblongus: serico albo.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 508. n. 14.*  
*Habitat in quercu robore; nonne mera varietas fusci?*
- mespili. 36. *C. mespili: serico albo.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 508. n. 16.*  
*Habitat in mespilis.*
- conchiformis. 37. *C. arborum linearis. Modeer act. Gothenb. I. p. 22. §. 14.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 509. n. 17.*  
*Reaum. inf. 4. t. 5-7.*  
*Habitat in ulmo, angustus, fuscus.*
- aceris. 38. *C. aceris ovatus. Modeer act. Gothenb. I. p. 21. §. 13.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 509. n. 18.*  
*Habitat in acere, ovato-depressus, striis ad latera longitudinalibus albis aut cinereis.*
- laniger. 39. *C. fuscus: serico albo.*  
*Geoffr. inf. par. I. p. 512. n. 3.*  
*Reaum. inf. 4. t. 7. f. 1. 2. 6. 9.*  
*Habitat in ulmo campestri.*
- diosmatis. 40. *C. diosmatis crenatae. Modeer act. Gothenb. I. p. 21. §. 11.*  
*Habitat in capitis bonae spei diosmate crenato et pulchello, ovato-oblongus.*
- alni. 41. *C. betulae alni. Modeer act. Gothenb. I. p. 23. §. 17.*  
*Habitat in betulae alni dichotomia ramorum, oblongo-ovatus, rubescens.*

- Uva. 42. *C. testa fusca sphaerico-gibba, subflavescente. Modcer act. Gothenb. 1. p. 32. §. 30.*  
*Habitat in Succia sub lapidibus.*
- spurius. 43. *C. ovatus hinc inde pilosus spadiceus subtus pallide flavus. Modcer act. Gothenb. 1. p. 43. §. 32.*  
*Habitat in ulmi ramorum dichotomia.*

230. THRIPS. *Rostrum* obsoletum, intra os absconditum,  
*Antennae* filiformes longitudine thoracis.  
*Corpus* lineare; *abdomen* sursum reflexile.  
*Alae* quatuor rectae, dorso incumbentes, longitudinales, angustae, subcruciatæ.

- paradoxa. 1. *Thr. fusca, alis abbreviatis, antennis pectinatis fissilibus aliformibus. Amoen. acad. 6. p. 401. n. 48.\**  
*Habitat in Sina, an hujus generis?*
- phyfapus. 2. *Thr. elytris glaucis, corpore atro. Fn. suec. 1027.\* Geoffr. inf. par. 1. p. 485. n. 2. Scop. ent. carn. 418. Fabr. sp. inf. 2. p. 396. n. 1. mant. inf. 2. p. 320. n. 1.*  
*Degeer inf. 3. p. 6. n. 1. t. 1. f. 1. Thrips atra, alis albis, antennis sexnodis.*  
*Degeer act. Stockh. 1744. p. 3. t. 4. f. 4. Phyfapus ater, alis albis.*  
*Schoeff. elem. t. 127.*  
*Habitat frequens in Europae floribus compositis, loti corniculatae flores clausos tumidosque reddens, secalis spicas exinaniens.*
- mintitif. 3. *Thr. elytris corporeque glauco, oculis fuscis. Fn. suec. 1028.\* Fabr. sp. inf. 2. p. 396. n. 4. mant. inf. 2. p. 320. n. 4.*  
*Habitat in Europae floribus.*

4. *Thr.*

- juniperi-  
na. 4. *Thr. elytris niveis*, corpore fusco. *Fn. succ.* 1029.\* *Fabr. sp. inf.* 2. p. 396. n. 2. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 2.  
*Degeer inf.* 3. p. 10. n. 2. t. 1. f. 5. Thrips griseo-fusca, oculis nigris, alis albescensibus.  
*Degeer act. Stockh.* 1744. p. 6. t. 1. f. 2. *Physapus fuscus*, alis albicantibus.  
*Habitat in juniperi gallis.*
- ulmi. 6. *Thr. nigra*, alis niveis ciliatis, ano acuminato. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 396. n. 3. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 3.  
*Geoffr. inf. par.* 1. p. 384. n. 1. t. 7. f. 6. Thrips elytris albidis, corpore nigra abdominali seta.  
*Degeer inf.* 3. p. 11. n. 3. t. 1. f. 8-13. Thrips (corticis) nigra, alis hyalinis niveis, barbibus longissimis, antennis octonodiis.  
*Habitat gregaria in ulmi cortice.*
- urticae. 7. *Thr. flava*, elytris albidis. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 397. n. 5. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 5.  
*Schranck Beytr. zur Naturg.* 31. t. 1. f. 25. 26.  
*Habitat in urticae, vitis, coryli aliorumque foliorum pagina inferiori, solitaria.*
- fasciata. 5. *Thr. elytris albo nigroque fasciatis*, corpore fusco. *Fn. succ.* 1030.\* *Geoffr. inf. par.* 1. p. 385. n. 3. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 397. n. 6. *mant. inf.* 2. p. 320. n. 6.  
*Degeer inf.* 3. p. 18. n. 4. Thrips atra, alis fasciis transversis tribus albis, antennis annulo albo.  
*Sulz. inf. t.* 7. f. 48. b.  
*Habitat in Europae floribus compositis.*
- fusca. 8. *Thr. nigricans*, elytris glaucis. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 96. n. 1083.  
*Habitat in Dania, an forsitan femina fasciatae?*
- obscura. 9. *Thr. flavescens*, elytris pallidis, oculis abdominisque annulis nigris. *Müll. zool. dan. prodr.* p. 96. n. 1084.  
*Habitat in Dania.*

Ddddddd 3

10. Thr.

Thripes in floribus frequentes agilissimae fere subsiliunt, abdomine saepius sursum flexo, tarsi vesiculosi; larvae aequae agiles currunt, saepius rubrae.

2224


INSECTA HEMIPTERA, Thrips.

rufa. 10. Thr. rufa. v. Gleichen *Neuestes im Reich der Pflanz.*  
t. 16. f. 6. 7.

*Habitat in tritici spicis, an forsan larva minutissimae?*

variegata. 11. Thr. variegata. v. Gleichen *Neuestes im Reich der Pflanz.*  
p 22. t. 21. f. 6. 7.

*Habitat in linaria.*



















St.

Inst. Zool. PAN  
Biblioteka

K. 4125.