



5/12 mym

Stapitibus
naturae. In primis Stettin.

B III d 2 4 E

K.5385

<http://rcin.org.pl>

DAVID HENRICI HOPPE

MEDICINAE DOCTORIS

SOCIETATIS BOTAN. RATISBON. ET NATVR.

CVRIOS. HALENS. SODALIS

ENVMERATIO

I N S E C T O R V M
ELYTRATORVM

CIRCA

E R L A N G A M

INDIGENARVM

SECVNDVM SYSTEMA FABRICIANVM

OBSERVATIONIBVS ICONIBVSQVE

ILLVSTRATA

ERLANGAE

IN BIBLIOPOLIO PALMIANO

M D C C L X X X X V



In insectis, animalium licet minimis, maxime elucet infinita Creatoris sapientia et potentia. Hoc sufficeret ad excitandum hominem ad horum considerationem, si nec plura eandem persuaderent.

Addamus unum: nobiscum cohabitare et in omnes res nostras dominium quoddam nobis utile, vel noxiuum exercere; sunt enim ministri vel beneficia vel supplicia Dei nutu gentibus adferentes; iustum igitur, notitiam hostis aequae ac evergetae quaeri, illius, ut repellatur, huius, ut faveatur, fine qua frustra esset media vel defrumenta vel foventia curare. Hinc facile patet utilitas historiae naturalis, ut taceam delicias eius tantas, ut nihil excedat: quid enim jucundius Deum quovis gressu in operibus suis invenire, in animo mirari? numne finis nostrae et omnis creationis, ut eum quam plurimum cogitemus, contemplemur, veneremur? sequeremur ne ejus praecepta cuius divinitatis vestigia quotidie videmus, sentimus!

MÜLLER praef. ad faun. insect. Friedrichsd.

V I R O

PERILLVSTRI ET GENEROSISSIMO

D. IO. CHRISTIANO DANIELI
DE SCHREBER

S. R. I. NOBILI

ACADEMIAE CAESAREAE NATVRAE
CVRIOSORVM PRAESIDI

CONSILIARIO ARCHIATRO ET COMITI PALATINO
CAESAREO POTENTISSIMI BORVSSORVM REGIS
CONSILIARIO AVLICO INTIMO
MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE IN ACADEMIA
REGIA FRIDERICO ALEXANDRINA P. P. O.
CELEBERRIMO ETC.

DE

TOTA RE PVBLICA LITTERARIA

AEQVE AC DE ARTE MEDICA EIVSQVE ADDISCENDAE
STVDIOSIS IMMORTALITER MERITO

FAVTORI ATQVE PRAECEPTORI

S V M M O PIETATIS CVLTV
PROSEQVENDO

PRO BENEFICIORVM AMPLITVDINE

NEC NON

BENEVOLENTIAE ET FAVORIS

MAGNITVDINE

SVMMAS EASQVE NVNQVAM INTERITVRAS

ANIMI GRATES PALAM TESTIFICATVRVS

HOC STVDIORVM SVORVM SPECIMEN

SACRVM ESSE VOLVIT

AVCTOR

PROOEMIVM.

M*hi inde* iam a tribus annis in alma literarum universitate, quae Erlangae floret, ad artis medicae studium incumbenti, nec minus rectam rerum ex historia naturali cognitionem acquirendam concupiscenti, praelectionibus zoologicis virorum in orbe litterario satis illustrium DE SCHREBER et ESPER uti contigit. Entomologia, in qua Viri laudati tam magnopere versati sunt, erat mihi in deliciis, et ad cupiditati meae satisfaciendum musea eorum aequa ac cel. RVDOLPH et REICH diligenter frequentare licuit, quod semper grato animo reclusum habebo.

In variis quoque Germaniae regionibus peregrinatus celeberrimorum Entomologorum SCHRANK Ingolstadii, BRAHM Moguntiae,



BADER Manhemii, FRANZ Frankenthalii,
GERNING Francofurti, HARRER et HA-
BEL Ratisbonae, FEY Wirceburgi, KLIN-
GER Wonsideliae, PANZER, SCHWARZ,
STVRM Norimbergae, aequo ac FABRICII
notitiam acquisivi, et partim collectionibus
Eorum, partim confuetudine et commercio lite-
rario, melius erudiri fortuna secunda mihi
praebuit occasionem.

Novissimis in re entomologica operibus
usus sum, et horis subsecivis regiones nostra-
tes comitatu plurium Entomologorum, inter
quos viros cel. SCHNITZLEIN, FUNCK,
LANG et KROHN appello, permeavi. In-
terdum remotiores montes et sylvas inve-
stigavi, animalium excrementa perquisivi;
eorum cadavera anatomice diffecata at-
que perscrutata in agros detuli, et illis ad-
volantia infecta collegi. A pescatoribus in-
fecta aquatica, et a detractoribus pellum fil-
phas et affinia infecta accepi. Quibus omni-
bus mea hujus regionis insectorum collectio
fere completa reddebatur.

Nunc




Nunc vero, stadio academico finito, publicam et accuratam harum mearum collectionum observationumque expositionem in dissertationis inauguralis argumentum elegi; sperans, fore ut nominum insectorum, in hac regione viventium, collectio litterarum in hac alma universitate studiosis, Entomologia occupatis, jucunda sit atque utilis. Ex catalogo facile perspiciendum est, quid hic invenerim, quid non? Quod posterius attinet, nova detegere et auditamenta facere, investigantibus non deerit occasio, cuius ad diligentiam adhibendam stimulus atque incitatio nunquam peribit. Observationes quoque peritis jam Entomologis certo quodam respectu haud erunt nauci; nam faepius in rerum natura longe diversame deprehendisse insecta, ac in scriptis entomologicis, non possum quin libere profitear; quod non est admirandum, quum latus naturae campus, et museum, duo sint opposita, non semper conjungenda. Exinde fit, ut multa pro varietatibus vendantur insecta, quae verae sunt species, et alia pro veris speciebus habeantur, quae sexu tantum differunt. Inde evenit, ut unius vel alterius infecti patria in



Italiam, Angliam, quin etiam in Indiam transferatur, quae tamen melius in Germania locanda est. Inde fit, ut multa insecta singularibus tantummodo Germaniae regionibus adscribantur, quae per omnem Germaniae tractum habitant.

Haec qualiscunque prolusio ad persuadendum lectorem valebit, me non exscriptisse alios, sed ipsum collegisse, et inquisivisse.

Duplicem adhuc adjiciam annotationem. Primo: Amicis meis Entomologis pro benigna communicatione infectorum, et instructione gratias ago quas possum maximas. Deinde cuicunque Entomologo, quaedam a me de scripta insecta appetenti offero, ea pro aliis mihi deficientibus speciebus cum illis communicare, cum mihi nihil iucundius esse possit, quam res naturales mutuo dare et accipere.



ENV.

ENVMERATIO
INSECTORVM ELYTRATORVM

CIRCA

ERLANGAM

INDIGENARVM

SECUNDVM SYSTEMA FABRICIANVM

OBSERVATIONIBVS ICONIBVSQVE

ILLVSTRATA

SCARABAEVS

Typhoeus
nasicornis
subterraneus
Fosfor
Scrutator
fulcatus
foctens
scybalarius
testaceus
fimetarius
vaccinarius *Herbst.*
conflagratus

SCARABAEVS

erraticus
conspurcatus
inquinatus
fordidus
luridus
granarius
haemorrhoidalis
pusillus *Herbst.*
stercorarius
stercorosus *Hart.*
vernalis
rufipes

A 5

SCA.

SCARABAEVS	HISTER
nigripes	unicolor
contaminatus	pygmeus
quadrimaculatus	fulcatus
testudinarius	oblongus
merdarius	sinuatus
quisquilius	bimaculatus
porcatus	quadrimaculatus
tomentosus <i>Brahm.</i>	quadrinotatus <i>Scrib.</i>
lunaris	aeneus
emarginatus	
Lemur	SPHAERIDIVM
Taurus	scarabaeoides
Vacca	lunatum
Capra	bipustulatum
bituberculatus <i>Scrib.</i>	marginatum
Coenobita	unipunctatum
assimilis <i>Mibi</i>	haemorrhoidale
nuchicornis	ruficolle
austriacus <i>Schneid.</i>	fimetarium
Xiphias	seminulum
nutans	
Schaefferi	BYRRHVS
Schreberi	Pilula
flavipes	fasciatus
ovatus	ater
similis <i>Scrib.</i>	varius
	nitens <i>Panz.</i>

TROX

TROX	CARABVS
fabulosus	coriaceus
arenarius	glabratuſ
hispidus <i>Brabm.</i>	violaceus
	purpurascens
OPATRVM	catenulatus
fabulosum	cyaneus
gibbum	hortensis
minutum.	arvensis
	convexus
SCARITES	auratus
gagates <i>Hellw.</i>	granulatus
piceus <i>Hellw.</i>	clathratus
	nitens
BLAPS	planus
mortifaga	ruficornis
glabra	piceus
	crepitans
TEN. BRIO	spinibarbis
molitor	cephalotes
	striola
TRAGOSITA	metallicus
caraboides	Sycophanta
	Inquisitor
HELOPS	holosericeus
lanipes	pilicornis
ater	coeruleuscens
quisquilius	junceus <i>Scop.</i>

CARA.

CARABVS

fulvicornis
vulgaris
cupreus
ovatus
latus
ferrugineus
nigricornis
parumpunctatus
sexpunctatus
marginatus
melanocephalus
cyanocephalus
crux major
crux minor
bipustulatus
lunatus
prasinus
vaporariorum
meridianus
quadrimaculatus
ustulatus
cisteloides *Hellw.*

CICINDELA

campestris
hybrida
sylvatica

CICINDELA

germanica

ELAPHRVS

uliginosus
riparius
aquaticus

SCOLYTUS

limbatus

HYDROPHILVS

piceus
caraboides
scarabaeoides
orbicularis

DYTISCVS

latifissimus
marginalis
Roefelii
fulcatus
cinereus
uliginosus
bipustulatus
Hybneri
punctatus *Mibi*
zonatus *Mibi*

GYRI-

GYRINV S

natator

ELOPHORV S

aquaticus

elongatus

CLERV S

mutillarius

formicarius

unifasciatus

apiarius

alvearius

NOTOXV S

mollis

Monoceros

CANTHARIS

fusca

livida

melanura

testacea

MALACHIV S

aeneus

bipustulatus

sanguinolentus

MALACHIV S

fasciatus

equestris

DERMESTES

lardarius

Pellio

undatus

vulpinus

murinus

teffelatus

violaceus

fumatus

picipes

ANOBIV M

Boleti

festivum *Bloch.*ferrugineum *Fröl.***PTINV S**

Fur

sexpunctatus

Scotias.

NICROPHORV S

germanicus

Humator

NICRO-

NICROPHORVS

Vespillo
mortuorum

ANTHRENVS

Scrophulariae
museorum.

SILPHA

littoralis
clavipes. *Sulzer.*
grossa
thoracica
rugosa
atrata
laevigata
obscura
reticulata
opaca
sinuata
quadripunctata

COCCINELLA

bipunctata
quinquepunctata
sexpunctata
septempunctata
quatuordecimpunctata
sedecimpunctata
ocellata
Argus Scrib.
vigintipunctata
vigintiduopunctata
vigintiquatuorpunctata
conglomerata
conglobata
oblongoguttata
parvula
quatuordecimguttata
octodecimguttata
bipustulata
variabilis
quatuorpustulata
quatuorverrucata

NITIDVLA

bipustulata
obscura
varia
colon
discoidea
aenea

ANTHRENVS

Pimpinellae

sexpustulata
decempustulata

Coc-

COCCINELLA	CHRYSOMELA
quatuordecimpustulata	decempunctata
	pallida
CASSIDA	lapponica
viridis	Polygoni
affinis	cerealis
nebulosa	fastuosa
murracea	limbata
ferruginea	sanguinolenta
nobilis	marginata
	analis
CHRYSOMELA	marginella
tenebricosa	hannoverana
coriaria	litura
hottentotta	haemorhoidalis
Adonidis	aenea
graminis	Armoraciae
bulgarensis <i>Schrank.</i>	
haemoptera	CRIOCERIS
violacea	merdigera
Centaurii	Convallariae <i>Harr.</i>
varians	duodecimpunctata
Populi	Asparagi
P. tremulae	Phellandrii
Staphylleae	campestris
polita	
Salicis	GALLERVCA
Viminalis	Tanaceti
	GAL-

GALLERVCA

rustica
 Alni
 Salicis *Degeer.*
 S. vitellinae
 vigitipunctata
 Nymphaeae
 Capreae
 calmariensis
 flavipes
 nigricornis
 oleracea
 Brassicae
 Hyoscyami
 Verbasci *Hellw.*
 tabida
 nemorum
 hemisphaerica

CRYPTOCEPHALVS

cordiger
 tridentatus
 auritus
 cyaneus
 scopolinus
 bipunctatus
 obscurus
 Vitis
 sericeus
 nitens
 vittatus
 Moraei
 hieroglyphicus
 bipustulatus
 flavipes
 Pini
 sanguinicollis *Fröl.*

CISTELA

cervinæ
 ceramboides
 sulphurca
 fulvipes
 murina

HISPA

atra

LAGRIA

pubescens
 hirta
 nigra

CRYPTOCEPHALVS

longipes

caerulea

CERO-

CEROCOMA	DONACIA
Schaefferi	micans <i>Mibi</i>
LYTTA	dentata <i>Mibi</i>
vesicatoria	fasciata <i>Mibi</i>
LYMEXYLON	marginata <i>Mibi</i>
dermestoides	aurea <i>Mibi</i>
CVCVIVS	aenea <i>Mibi</i>
depressus	violacea <i>Mibi</i>
flavipes	discolor <i>Mibi</i>
	linearia <i>Mibi</i>
LAMPYRIS	cinerea <i>Mibi</i>
splendidula	mucronata <i>Mibi</i>
PYROCHROA	TRICHIVS
coccinea	Eremita
LYCVS	nobilis
fanguineus	octopunctatus
Aurora	fasciatus
MORDELLA	hemipterus
aculeata	CETONIA
fasciata	aurata
frontalis	fastuosa
flava	marmorata
	metallica
	hirta
	stictica
	B
	MELO-

MELOLONTA

Fullo
vulgaris
villofa
solstitialis
brunnea
Frischii
horticola
abdominalis
fruticola
agricola
ruricola
squamosa
argentea
pulverulenta
variabilis

BVPRESTIS

fulminans *Schrink.*
rutilans
mariana
chrysoftigma
octoguttata
rustica
quatuorpunctata
viridis
biguttata
elata

BVPRESTIS

nitidula
laeta
Salicis

ELATER
murinus
holosericeus
testellatus
aeneus
pechinicornis
cupreus
castaneus
mesomelas
obscurus
marginatus
thoracicus
brunneus
haematodes
sanguineus
Ephippium
balteatus
Sputator
striatus

LVCANVS

Cervus
parallelepipedus

Lvca-

LVCANVS	RHAGIVM
caraboides	Mordax
rufipes <i>Herbst.</i>	Inquisitor
PRIONVS	bifasciatum
Faber	Indagator
coriarius	SAPERDA
CERAMBYX	Carcharias
moschatus	scalaris
Cerdo	oculata
Heros	linearis
nebulosus	nigricornis
griseus	coerulescens
fasciculatus	populnea
hispidus	P. tremulae
pubicornis <i>Schrink.</i>	virescens
	ferruginea
	praeusta
LAMIA	CALLIDIVM
Textor	Bajulus
aedilis	fennicum
atomaria	violaceum
varia	femoratum
curculionoides	variabile
Fuliginator	rusticum
CALOPVS	sanguineum
ferraticornis	triste

CALLIDIVM

hafniense

striatum

arcuatum

Arietis

Salicis

Gazella

rufifcrus *Schrank.*

detritum

Verbasci

mythicum

figuratum *Schrank.*

Alni

LEPTVRA

collaris

virginica

NECYDALIS

thalassina

melanura

simplex

coerulescens

ustulata

MOLORCHVS

umbellatarum

LEPTVRA

melanura

livida

sanguinolenta

meridiana

villica

rubra

testacea

atra

nigra

octomaculata

attenuata

fasciata *Mibi*

quatuorfasciata

SPONDYLIS

buprestoides

BOSTRICHVS

typographus

polygraphus

Scolytus

ligniperda

villosus

piniperda

BRVCHVS

Pisi

granarius

BRV-

BRVCHVS.

villofus

ANTHRIBVS

albinus

latirostris

albirostris

planirostris

ATTELABVS

Coryli

curculionoides

Bacchus

Betuleti

Populi

Craccae

Sorbi

RHINOMACER

curculionoides

fulvus *Brahm.*

CVRCVLIO

Pini

Jaceae

colon

nitens

Salicariae

CVRCVLIO

Linariae *Schnitzl.*

Sifymbrii

Pseudacori

Lythri

Carecti *Mibi*

granarius

filiformis

paraplecticus

Bardanae

Spartii *Mibi.*

Abietis

Lapathi

germanus

Scrophulariae

Thapsi

Echii

Cerasi

violaceus

Nucum

Druparum

Tortrix

Salicis

viridis

Hinnulus *Schrantz.*

marmoratus

fulcirostris

glaucus

CVRCVLIO	HYPOPHLOEVS
cicatricosus <i>Mibi</i>	castaneus
albidus	linearis
vagus <i>Laich.</i>	depressus
globatus <i>Herbst.</i>	
scabriculus <i>Herbst.</i>	LYCTVS
lineatus	politus
incanus	crenatus
arenarius <i>Herbst.</i>	nitidus
granulatus <i>Herbst.</i>	
grammicus <i>Panz.</i>	TETRATOMA
micans.	fungorum
Salviae <i>Schrantz.</i>	
niger	SCAPHIDIVM
laevigatus	agaricinum
Ligustici	
fulcatus <i>Herbst.</i>	IPS
gemmaeus	nigripennis
Pyri	
argentatus	DIAPERIS
oblongus	Boleti
ovatus	
MYCETOPHAGVS	MELOE
quadrimaculatus	majalis
piceus	Proscarabaeus
bifasciatus	brevicollis
	tecta
	STA-

STAPHYLINVS

hirtus
murinus
olens
maxillofus
erythropterus
politus

OXYPORVS

rufus

OXYPORVS

lunulatus
bipustulatus
chrysomelinus

PAEDERVS

riparius
ruficollis
elongatus

OBSERVATIONES.

SCARABAEVS *Typhoeus*.

Rarissimum in hac regione insectum. Feminam
semel tantum, vespertino tempore volan-
tem, in sylva Norimbergensi cepi. Circa Franco-
furtum copiose deprehenditur, potissimum in lo-
cis sylvestribus in stercore cervino, referente
cel. GERNING. Anno 1793. autumnali tem-
pore ipse multa collegi exemplaria inter Han-
viam et Francofurtum in stercore bovino, via
regia passim cumulato. Definitio hujus speciei
a LINNEO *) et FABRICIO **) prolata ad
marem tantum quadrat, quod in infectorum de-
finitionibus saepius accidit. In tali vero casu
necessere mihi videtur annotationem addere, prae-
fertim cum, uti in his, tanta sit in sexu diffe-
rentia,

Mas

*) *Syst. nat.* 2. 543. 9.

**) *Ent. syst.* 1. 12. 34.

Mas nimirum thorace tricorni: cornu intermedio minori; *femina* cornuum loco tuberculis gaudet.

SCARABAEVS *naficornis*.

Circa *Erlangam* nondum ipse inveni hoc insectum; sed teste cel. ESPER interdum reperitur. Circa *Wonsidelium* tanta copia in quodam vaporario hortulani adfuit, ut hoc ab eo totum fere devastatum fuerit, de quo cel. KLINGER me certiore fecit. *Halae Magdeburgicae* ipse hoc insectum observavi, quod in salinis (*Salzkothen*), quae ligno putrido abundant, aptum domicilium et nutrimentum invenit; qua de causa etiam vulgo *Kothkäfer* dicitur, quod nomen ergo a stercore minime est derivandum.

Feminae cornu deest, sed ejus loco gibbus cum denticulo in apice adest; desunt quoque thoracis tubercula, adest eorum loco ruga elevata transversa *). Larvam et imaginem optimè descripsit, delineavitque cel. ROESEL **).

B 5

SCA-

*) SCHRANK. *Enum. insect. aust.* p. 3.

**) *Ins. z. tab. 6. 7.*

SCARABAEVS *Foffor.*

Varietas elytris testaceis haud raro obser-vatur, quae male pro *Sc. oblongo* SCOPOLI *) venditur. Alii *Sc. rufipedem* FABRICII cum *Sc. oblongo* SCOPOLI conjungunt. Sed insectum Scopolianum, uti ex descriptione, et potissimum ex iconе, quam coram habeo, elucet, vera est *Melolontha*, quamobrem FABRICIVS omni iure id ad *Melolonthas* retulit.

SCARABAEVS *luridus.*

FABRICIVS in definitione hujus insecti **), caput tuberculatum, et in descriptione sua ibi-dem adjuncta caput et thoracem muticum ei ad-scribit, quae contradicтio statim in oculos inci-dit. Hanc ob causam cel. HERBST ***) dubi-tat: an sua specimina, quae capite mutico gau-dent, Scarabaeo lurido adnumerandi sint? Quae dubitatio vero nullum invenit locum, cum *Scra-baeus*

*) *Entom. carn.* n. 19.

**) l. c. n. 91.

***) *Arch.* p. 8. p. 26. *Tab.* 19. f. II.

rabaeus luridus semper capite mutico, absque ulla tubculo reperiatur. Ergo hujus insecti definitio Fabriciana corrigenda, locusque in systemate mutandus est.

Patriam in *Angliam* ponit FABRICIVS, sed in *Germania* quoque abundanter obsevvari satis constat.

SCARABAEVS *Taurus*.

Copiose in stercore bovino locis fabulosis reperitur. Feminae cornua plane desunt, quae in mare magna, arcuata reperiuntur et reclinata. Variat interdum cornubus brevioribus; haec autem variatio minime est *Scarabaeus Capra*, uti nonnulli credunt, sed multo magis diversa. *Scarabaeus Capra* semper cornubus minoribus rectis gaudet, quamobrem definitio hujus est corrigen- da, saltem vocabula: "cornubus subarcuatis" in: "cornubus brevioribus rectis" commutanda sunt, unde rectissime hanc speciem cel. LESKE *) *Scarabaeum recticornem* denominavit.

SCA-

*) Iter pag. 45. Tab. A. fig. 8. 9.

SCARABAEVS *affimilis* Mibi.

Sc. niger, thorace inermi, occipite (maris) in laminam rhomboiden procedente, angulo apicis in cornu antrorsum nutans elongato, angulis lateralibus ad oculos.

Habitat in stercore bovino.

Descript. Mas feminae, demto capite, similimus, earundemque dimensionum. Long. 4¹/₂; lat. 2¹/₂. Subtus corpus totum nigrum, pilis rufis ad juncturas. Clypeus capitis thoraxque nigri, cum aliqua violae rubidine, punctis excavatis inspersa, glabris in mare, pilos breves rufos exferentibus in femina. Elytra fuliginosoferruginea, futura maculisque minutis nigris. Antennarum capitulum canescens. Capitis clypeus in mare antice in triangulum truncatum angustatus, reflexus, subrepandus, postice in laminam rhomboiden abit, angulis tribus manifestis: duobus lateralibus ex plica ad oculos ortis, tertio apicis elongato in cornu antrorsum flexum, apice tamen subreflexum. Thorax quidem

dem in mare antice excavatus in foveam cornu capitis recipientem, sed absque omni tubere in utroque sexu. Pro cornu in clypeo feminae erigitur lamina segmentum circuli referens.

Hisce notis differt inter alia a *Sc. nutante*, cui occipitis lamina triangularis absque angulis lateralibus, et thorax basi tubere bilobo in utroque sexu; a *Sc. Coenobita* (cui valde affinis) quod huic alia magnitudo, aliis color, cornu rectius, clypeus antice rotundatus, manifestius excisus; a *Sc. austriaco*, quod huic statura major, anguli laminae occipitis in eodem plano siti in mare, et eadem lamina quadrangula: angulis prominulis, in femina.

Observe. *Scarabaeus* supra descriptus hac in regione haud infrequens, praesertim tempore autumnali reperitur. Pro *Scarabaei nuchicornis* varietate olim male vendebatur; at distincta est species, in sistema Fabricianum nondum recepta. Cum *Sc. fracticorni PREISLERI**) multum conve-

nire

*) **HARRER** *Beschr. der Schäff. Insett.* p. 21. seq.

nire videtur, sed hujus insecti nec iconem nec specimina videre hucusque mihi licuit. Quidquid sit, descriptio accurata et paullo amplior insecti dubii, supra exhibita, mihi haud esse videatur superflua.

CARABVS fulvicornis.

C. ater, elytris striatis: striis laevibus: extima punctata; palpis, antennis pedibusque pallide flavis.

Carabus fulvicornis GMEL. S. N. L. Tom. I.
p. 1985. n. 194.

Le bupreste noir à pattes jaunes. GEOFFR.
paris. I. 147. n. 9.

Habitat sub lapidibus in montosis.

Descr. Thorax obcordatus, postice truncatus, cum capite nitentissimus, etsi ad marginem posticum minute et dense punctulatus. Elytra laevia, minus nitentia; striae octo laeves seu non punctatae in utroque, ita tamen ut extima stria puncta complura majuscula habeat.

Mar-

Margo elytrorum subtus ferrugineus. Palpi, antennae, pedes toti, ex pallide ferrugineo flavescunt.

SCOLYTUS limbatus.

Elegantissimo hoc et in aliis terris rarissimo insecto nostra abundat regio. Plerumque quidem sub aquis in solo arenoso reperitur, minime tamen insectum aquaticum est habendum, quod satis ex pedum structura elucet, quibuscum quam citissime supra terram currit, cum e contrario in aquis semper anxie circumrepat, et stridentem sonum edat, quod experimentum saepius in vitro aqua repleto institui.

DYTISCVS Roezelii.

ROESELIVS *) in opere suo laudatissimo utriusque sexus historiam, descriptionem et iconem omnibus numeris absolutam dedit. FABRICIVS **) marem et feminam, non recte produabus habuit speciebus. *Dytiscus punctulatus* enim

*) *Insect. 2. Aquat. 2. Tab. 1.*

**) *I. c. pag. 188. nro. 4. 5.*

enim FABRICII est mas, *Dytiscus Roeselii*, *femina*; prior elytris glabris: striis tribus longitudinaliter punctatis, distinguitur, posterior vero elytris, ab innumeris in longitudinem et latitudinem concurrentibus striis, fere rugosis.

DYTISCVS punctatus Mih.

D. laevis, thorace testaceo: punctis tribus obscurioribus; elytris fuscis margine ferrugineo.

Habitat in piscinis prope Defendorf.

Mensurae.

Long. 5'''.

Lat. 3'''.

Obs. Si bene inspiciatur, tota elytra ferruginea sunt, sed ita dense punctis nigris obsita, ut inde color nigricanti-fuscus refultet. Puncta excavata striaeque defunt. Caput nigrum est, regione oris fusco-ferrugineum, maculaque fusca frontali. Thorax fusco-ferrugineus seu testaceus, punctis tribus obscurioribus. Subtus ater: pedibus testaceis.

DYTI-

—

DYTISCVS zonatus Mibi.

D. supra niger, subtus testaceus; fascia marginaque toto thoracis, elytrorumque externo flavis.

Habitat cum antecedente, iisdem locis.

Mensurae.

Long. $6\frac{1}{4}$. cum excessu.

Lat. $3\frac{1}{4}$.

Obs. Supra niger, sed, si per lentem inspicatur, nigredine elytrorum punctis flavis variegata numerosissimis. Os flavum nigro varie pictum. Margo thoracis totus flavus, et fascia per medium. Margo elytrorum flavus, et non-nihil (in aliquibus) futura ad scutellum. Subtus testaceus una cum pedibus. Mas in pedibus anticis scutellas gerit.

CLERVVS unifasciatus.

C. niger, elytris fascia alba basi rubris. FABR.

Ent. syst. Tom. I. p. 207. n. 8.

C

Formi-

Formicarius minor. HERBST Arch. 5. p. 87.

n. 5.

Attelabus S V L Z. Insect. Tab. 4. fig. 13. b.

Habitat in locis fabulosis sub arborum foliis.

Rarissimum hoc insectum semel tantum mihi obvium fuit. Cel. HERBST illud circa Francofurtum legit, et cel. F E Y exemplaria prope Wirsburgum lecta mecum benevole communicavit.

Descr. Minor *Clero formicario*, totus pubescens. Antennae nigræ decemarticulatae; primus articulus major est et ovatus. Caput atrum, nitidum, globosum, sub thorace fere reconditum. Thorax ater nitidus, antice latior, postice angustior. Elytra fornicata, punctato-striata, ad basin rufa, ad apicem nigra, cum fascia alba in medio. Abdomen pedesque nigri.

CRYPTOCEPHALVS bipustulatus.

♂ C. ater, elytris macula apicis rufa. F A B R.

Ent. syst. Tom. I. p. II. pag. 67. n. 74.

S C H A E F F E R. Icon. Tab. 30. f. 4. 5.

♀ C.

♀ C. ater, elytris flavis rubrisve: singulis marginē vittaque atris.

Cryptocephalus lineola FABR. l. c. p. 59.

n. 30. SCHAEFFER. l. c. Tab. 77. f. 8.

Buprestis sanguinolenta SCOPOL. carn. n. 203.
non synon.

Habitat in Corylo Avellana in horto aulico.

Obs. *Femina* hujus insecti a nonnullis pro *Cryptoceph. bipunctati* varietate, ab aliis pro distincta specie habetur; sed perperam, cum saepius me docuerit experientia, alterum esse sexum *Cryptoceph. bipustulati*.

Descr. feminae. Magnitudo maris, aut paulo major; tota aterrima, nitens. Sola elytra fulva, margine tamen omni et vitta in disco cujusvis elytri nigrae. Recte observat SCOPOLI, in quovis elytro striae decem punctatas haberi, quarum sex vittam atram occupant, duabus utrinque in fulva parte adjacentibus.

LYTTA *vesicatoria.*

Insectum hoc, jam diu in pharmacopoliis usitatum, olim ex Hispania ad nos delatum est, unde etiam *musca hispanica* nominatur. Postea ex Belgio illud accepimus, nunc vero quotannis in nonnullis quoque Germaniae regionibus reperitur, et anno 1783 Halae Magdeburgicae degens, plusquam centum libras in officina Kohliana collectas vidi. Sustentantur foliis Ligustris, Syringae, Fraxini excelsioris aliarumque Sepiarium, et cum tempore meridiano in terram descendant latebras quaesiturae, ex rosione foliorum, et ex odore illis proprio, statim colligi potest, an in loco obvio repertiantur. Adsum plerumque mense Junio per breve temporis spatium, interdum paucos tantum dies, quo tempore sensim sensimque pereunt et evanescunt. Olim in peregrinas regiones illas migrare opinabatur, cum subito disparere soleant; haec autem migratio indoli hujus infecti tardissimae repugnare videtur, et procul dubio non migrant, sed in domiciliis suis pereunt.

Dio-

DIOSCORIDIS temporibus loco *Lyttae vesicatoriae Mylabrem Cichorei* et alias hujus generis species usitatas fuisse, ex DIOSCORIDIS *) et PLINII **) scriptis satis patet, cum eorum descriptio optime cum *M. Cichorei* quadrat, immo et hodie in Pharmacopoliis Chinensibus officinali-
lem esse testetur FABRICIVS ***). Non dubi-
tandum quoque est, et alia affinia Germaniae
insecta eadem vi irritandi pollere ac *Lyttæ ve-
sicatoria*, e. g. *Cerocoma Schaefferi*, quam ob rem
quoque in eundem usum vertenda essent, quod
vero adhuc medicis in Entomologia versatis in-
vestigandum dijudicandumque restat.

Plura de hujus insecti historia atque usu
prolata sunt in b. a. LINNE dissertatione de
MELOE vesicatorio †). Quae de ejus metamor-
phosi innotuerunt, accepta referimus laboribus

C 3

ill.

*) Lib. 2. cap. 54.

**) Lib. 39. cap. 4.

***) Ent. syft. p. 2. p. 88.

†) Amoen. academ. vol. sext. p. 134. edit. Schrebe-
rianae.

ill. Prof. Loschge, qui larvam juniorem accurate descripsit et depinxit *).

DONACIA.

Quod ad Donaciae genus attinet, LINNEVS **) id Lepturis adnumerasse satis constat; unica tantum species sub *Lepturae aquatica* nomine ab eo descripta fuit. Primus cel. FABRICIVS hoc genus constituit, et supra laudatam speciem sub nomine *Donaciae crassipedis* proposuit. In systematis sui novissima editione ***) plures species a cel. SCHMIDT acceptas descripsit; nihilo tamen secius aliae adsunt, nuperrime a me detectae, quas v. cl. ipse in collectione mea vidit, et ut eas describerem, auctor suasorque mihi fuit, quoniam de quibusdam adhuc dubitat, cum nusquam ei fuerit eas colligendi observandique occasio. Hoc EJVS consilium fecutus tentavi, quid humeri valeant quid ferre

recu-

*) *Naturforscher*, 23. Stlick. p. 37. tab. I.

**) *Syl. nat.* 2. 637.

***) *Tom. I. pars II. pag. 116. seq.*

recusent, non dubitans, quin aliae adhuc supersint species hucusque mihi incognitae, quas si futuro tempore invenero, describere non morabor. Quinimmo mihi erit jucundissimum atque semper grato accipiam animo, si quis Entomologorum unam vel alteram a me nondum descriptam hujus generis speciem mecum communicare velit. Iis, qui meas species desiderabunt, libenter eas mittam, si meam collectionem aliis insectis ditare ipsis placuerit, excepta *D. mucronata*, cuius ipse unicum solummodo exemplar possideo, quod hanc ob causam mihi auro est carius. Non despero tamen, fore ut et hujus plura colligam exemplaria, quibus tunc entomophilorum desideria explere non tardabo.

* *Femoribus posticis bidentatis.*

DONACIA micans Mibi.

D. elytris violaceo - micantibus, femoribus posticis bidentatis, tibiis omnibus simplicibus.
Tab. nostr. fig. I.

C 4

Leptu-

Leptura subaeneo-violacea; femoribus posticis dentatis. LINN. faun. suec. I. n. 510.
2. n. 677. β.

Habitat in plantis aquaticis, aestate.

Descr. Antennae nigrescentes; articulorum apices subtestacei. Caput laeve, linea longitudinali in medio. Thorax viridis impunctatus canaliculatus, lateribus anticis prominulis. Elytra plana punctato-striata viridi-violacea, apice subtruncata. Corpus subtus cinereo-villosum. Pedes testacei: femora postica clavata, bidentata; dentes aequales recti; tibiae posticae simplices.

DONACIA dentata Mibi.

D. clytris viridi-nitidulis, femoribus bidentatis, tibiis posticis quinquedentatis. Tab. nostr. fig. 2.

Habitat iisdem cum praecedenti locis et tempore.

Descr. Antennae ac caput ut in priori. Thorax cylindricus punctato-rugosus canaliculatus,

tus, lateribus anticis tuberculatus. Elytra fornicata punctato-striata viridia, apice truncata, subappendiculata. Corpus subtus cinereo-villosum. Pedes rufo-testacei: femora postica incrassata bidentata: dentes posteriores longiores recurvi: tibiae posticae quinque-dentatae.

Observe. Vtraque supra descripta species a cel. FABRICIO sub *Donaciae crassipedis* nomine conjungitur, sed haud recte. Secundum plures observationes individuorum copula conjunctorum, genuinas species esse, adfirmare possum.

** *Femoribus posticis unidentatis.*

DONACIA fasciata Mibi.

D. elytris viridibus, in medio fascia longitudinali coccinea, abdomine pedibusque aureis.
Tab. noſt. fig. 3.

Donacia dentipes. FABR. *Ent. syst. Tom. I.*

pars II. p. 116. n. 3.

Habitat in plantis aquaticis, vere.

C 5

De-

Descript. Antennae nigrescentes. Caput subtilissime punctatum; linea longitudinali in medio. Thorax cylindricus, canaliculatus, punctatus, lateribus anticis tuberculatus. Elytra lacunosa viridia; fascia media longitudinali coccinea, cum macula impressa aurea juxta marginem interiorem versus basin, apice rotundata. Corpus subtus cum pedibus aureo - villosum. Femora postica unidentata.

Obs. Nomen triviale FABRICII mutavi, cum omnes fere Donaciae species pedibus dentatis gaudeant.

DONACIA marginata Mibi.

D. elytris aureis, margine basique macula rufis, abdomine pedibusque argenteis. *Tab. nostr.*
fig. 4.

Habitat iisdem cum praecedente locis et tempore.

Descrip. Antennae nigrae; articulorum apices argentei. Caput punctatum, lineatum. Thorax

rax cylindricus rugosus canaliculatus, lateribus anticis tuberculatus. Elytra lacunosa aurea, margine basique macula oblonga, apice attenuata, truncata rufa. Corpus subitus, uti pedes, argenteo - villosum: femora postica unidentata.

DONACIA aurea Mibi.

D. elytris viridi - aureis lacunosis, apice truncatis, abdomine pedibusque aureis. *Tab. nostr. fig. 5.*

Donacia Sagittariae FABR. l. c. n. 5.

Habitat cum praecedente.

Descript. Antennae nigricantes. Caput aeneum canaliculatum. Thorax rugosus, canaliculatus, lateribus anticis prominulis. Elytra lacunosa, punctato - striata, viridi - aurea, apice attenuata truncata. Corpus subitus, pedesque, aureo villosa. Femora postica unidentata; tarsi nigri.

Obs.

Obs. Etiam in hac specie nomen triviale FABR. mutavi, cum omnes Donaciae species in Sagittariam volent.

Variat rarissime thorace cyaneo.

DONACIA aenea Mibi.

D. elytris aeneis aequalibus apice rotundatis, abdomine pedibusque aeneis. *Tab. nostr.* fig. 6.

Habitat ad piscinas in plantis aquaticis, Majo.

Descri. Tota aenea. Caput lineatum laeve. Thorax cylindricus, canaliculatus, laevis, lateribus anticis tuberculatus. Elytra aequalia argute punctato-striata, apice rotundata. Femora postica unidentata; tarsi nigri.

DONACIA violacea Mibi.

D. elytris violaceis, apice rotundatis, abdome argenteo-villoso. *Tab. nostr. fig. 7.*

Habitat cum praecedente.

Descri.

Descr. Antennae nigrae. Caput et thorax violacea canaliculata. Elytra violacea aequalia linearia apice rotundata. Pedes nigri: femora postica unidentata.

DONACIA *discolor* Mibi.

D. elytris aeneis nigrisve apice rotundatis, pedibus rubro-testaceis.

♂ Leptura consimilis, aenea; antennis pedibusque testaceis, femoribus posticis dentatis; elytris simplicibus. SCHRANK *enum. insect. aust.* p. 155. n. 293.

♀ Leptura assimilis, nigra; pedibus testaceis, posticis dentatis: elytris simplicibus SCHRANK *l. c.* p. 156. n. 294.

Habitat in Calthae palustris floribus. Majo.

Descript. Antennae pedesque rubro-testacei. Thorax obsolete punctatus, tuberculatus. Elytra obsolete punctato-striata, apice rotunda-ta. Femora incrassata: postica clavata unidentata.

Observ.

Observ. In *femina* caput, thorax, elytra et corpus subtus nigra sunt. *Tab. nostr.* fig. 8.

In *mare*, caput, thorax cum elytris aenea; corpus subtus cinereo villosum. *Tab. nostr.* fig. 9.

*** *Femoribus omnibus simplicibus.*

DONACIA linearis Mibi.

D. elytris linearibus apice truncatis aeneo-nitidulis, pedibus subtestaceis. *Tab. nostr.* fig. 10.

Habitat ad piscinas in plantis aquaticis. Majo.

Descript. Antennae nigricantes. Caput punctatum, lineatum. Thorax rugosus, canaliculatus. Elytra argute punctato-striata, linearia, apice truncata. Abdomen cinereo-nitidulum. Pedes subtestacei; femora omnia simplicia.

DONACIA cinerea Mibi.

D. elytris cinereo-nitidulis apice rotundatis, corpore pedibusque cinereis. *Tab. nostr.* fig. 11.

Dona-

Donacia Hydrocharis FABR. l. c. n. 10.

Habitat in plantis aquaticis, praesertim Typhis, Majo.

Descript. Antennae cinereae. Caput lineatum. Thorax rugosus tuberculatus. Elytra cinereo-nitidula, obsolete punctato-striata, apice rotundata. Corpus subitus pedesque cinerei: femora omnia simplicia.

DONACIA mucronata Mibi.

D. supra livida, capite, antennis et subtus atra; thoracis lineolis duabus divergentibus, elytrorumque apice mucronatorum striis punctatis atris. Tab. nostr. fig. 12.

Habitat ad piscinas in plantis aquaticis, Majo.

Descript. Tota atra; sed thorax, pedes, elytra, livida, seu pallide cerei coloris. Antennae setaceae, longitudine corporis. Mentum cum ore flavicans. In thoracis disco lincolae duae atrae retrorsum divergentes. Elytra punctato-

ctato-striata: punctis ipsis atris, corpore paullo longiora, subtruncata, cuspide acuta ex angulo truncaturae externo emergente. Scutellum atrum. Pedes longiusculi: apices omnium articulorum atri.

Obs. Rarissimum et elegantissimum hoc insectum semel tantum ad Piscinam prope *Weissen-dorf* in Equiseto limoso, colligere licuit.

MELOLONTHA argentea.

Multi variique inter Entomologos sunt de hoc insecto errores, quos autem cel. SCRIBA plane fere refutavit. In Symbolis *) suis nimirum tres varietates sub Melolonthae farinosae titulo exacte descripsit atque depinxit, et descriptionem nonnullarum affinium specierum adjunxit. Quum mihi anno praeterito contigerit, varias *Melolontharum* species observare et colligere, sequentes adhuc observationes ad cel. SCRIBAE annotationes illustrandas addo.

Omnia tria individua a cel. SCRIBA descripta et depicta unam eandemque speciem constituant.

*) Erst. Heft pag. 38. Tab. 4. fig. 7. 8. 9.

stituunt. Simillima iis quam saepissime in Pomonae floribus, mense Aprili, locis montosis collegi, ubi semper ea tam magnitudine, quam colore inter se discrepantia, copula conjuncta vidi.

Cel. SCRIBA figuram suam ix *Melolonthae pulverulentae* FABRICII adnumerari vult, ast minus recte; etiam hoc insectum nostra in regione copiosissime vidi et collegi, quod mense Junio in salictis semper habitat, ubi individua copula conjuncta frequentissime vidi, sed omnino nullam differentiam externam inter marem et feminam observavi. Hanc speciem cel. SVLZER *) depinxit.

Ex meis, sine omni praejudicata opinione institutis observationibus, sequentia fluunt confectoria:

1. N. I. II. III. nec minus fig. VII. VIII. IX.

SCRIB. I. c. merae sunt varietates *Melolonthae argenteae* FABR.

2. N. IV. est *Melolontha pulverulenta* FABR.

3.

*) *Inf. Tab. 1. f. 7.*

3. N. v. est *Melolontha farinosa* FABR.

4. N. vi. est *Melolontha squamosa* FABR.

quae exemplaribus fccis probare semper possum.

MELOLONTHA variabilis.

Colore multoties variat, quam ob rem de hac non convenit inter auctores *) specie, et cel. STV R M sub hujus titulo Melolontham brunneam depinxit **). Specimina asservo quae fere nigra sunt, alia quae colore testaceo gaudent, et varia quae intermedium obtinent colorem.

Habitat frequens in viis fabulosis, et in plantis arenosis e. g. Artemisia campestris, Cerastio arvensi, Achillea Millefolio cet. autumno. Vere superioris anni eam quoque in pratis flumini adjacentibus sub quisquiliis ab inundante aqua relictis collegi, exemplaria vero minus elegantia, quaeque, ex detritu fortasse, superficiem holosericeam plane amiserant.

Synonyma hujus speciei sequentia sunt:

Melo-

*) HARRER. *Beschr. Regensb. Inf.* p. 36.

**) *Insect. Cabin. 1stes Stiik.*

Melolontha chrysomelina FABR. Ent. syst.

Tom. II. n. 82.

Melolontha berolinensis HERBST Arch. p. 155.

n. 21.

Melolontha holofericea SCRIB. Ent. Journ. I.

n. 56.

Scarabaeus pellucidulus SVLZ. abg. Gesch. 18.

Tab. I. Fig. 9.

Trox holofericeus v. LATCHART. Verz. ty-

rol. Inf. I. p. 31. n. 4.

BUPRESTIS fulminans.

B. cyanea, viridive aurata, thorace vittis duabus atris; elytris apice integris ferrulatis, vittis marginalibus aureo - ignitis undulatis.

SCHRANK im Naturforscher XXIV. 84. n. 52.

Buprestis candens. PANZER. faun. germ. I. 9.

Habitat in Pomonae floribus; volat mense Majo.

Obs. Duae habentur elegantissimi hujus infecti varietates: una, exceptis vittis aureo-igni-

D 2

tis,

tis, tota cyanea, quam descripsit SCHRANKIVS, depinxitque PANZERVS; altera undique viridi-aurea, demtis elytris, ita tamen ut et haec ad basin et futuram viridi-aurea sint, qui viror in cyaneum abit colorem, reliquum totum elytrum, quantum a vitta aureo-ignita liberum est, occupantem. Cum hoc insectum tam splendidum sit ac rarum, tanti quoque est pretii, ut quatuor florenis ematur.

BUPRESTIS *rutilans*.

B. viridi-aurea; thoracis elytrorumque stria-torum margine ignito.

Buprestis rutilans PALLAS *icon. inf. Tab. D.*
fig. 1. SCHRANK. Naturf. XXIV. 83.
n. 51.

Buprestis rustica SCHRANK. *enum. inf. austr.*
n. 363.

Buprestis fastuosa JACQ. *Misc. 2. p. 385. Tab. 23.*
f. 2. ubi cel. v. WELL primam et accura-tam descriptionem et iconem dedit.

Habi-

Habitat locis montosis in *Tilia europaea* rarius. Circa Ratisbonam copiose a cel. HABEL repertum esse, vir laud. mihi ipse aperuit. Volat aestate.

Descr. Viridi-aurea tota, lateribus thoracis elytrorumque plus minus ignitis. Maxillis palpisque nigris, antennis tarsisque nigro-viridibus. Elytra striata, saepius (non semper, et forte ex detritu) maculis seu punctis nigris, ut stercore muscarum, notata. Supra in thorace, capite, elytrisque puncta excavata sparsim et dense disseminata sunt. Abdomen supra obscure cyaneum, nitidum; oculi in vivo infecto obscure rubri.

BVPRESTIS *octoguttata*.

Hoc insectum olim non peregrinum tantum, sed et rarissimum putabatur. B. Eq. a LINNE' in *Faunae Suecicae* edit. prima illud nondum recensuit; in secunda in pinetis Sueciae reperi, tradit *). Cel. SCHMIDLEIN **) inquit: "Es ist

D 3

hier

*) pag. 213. n. 754.

**) *Einleit. zur Insect.* p. 28.

hier zu Lande rar, und muß durch Kauf in die Kabinetter kommen." Nostris vero temporibus a non-nullis Entomologis in Germania repertum est, quin etiam mihi ipsi anno praeterito illud hac in regione, unico quidem loco, abundantiter tamen, detegere, contigit. In pineto nempe, quod inter Erlangam est et Norimbergam, per integrum fere mensem Julium, medio die, sole flagrantissimo illud circumvolans, atque in horizontalibus Pini sylvestris radicibus confidens vidi. Locum ejus natalem, metamorphosin, larvam, victum et copulam nec fortuito observare, nec omni diligentia adhibita indagare potui, quae omnia de toto hocce genere adhuc fere sunt incomperta.

Inter numerum ferme centenorum exemplariorum sequentes observare licuit varietates:

1. cuius elytra albis adspersa sunt maculis, quam b. a LINNE' *) atque FABRICIUS

*) *Syst. nat.* p. 659. n. 2.

CIVS *) descripscrunt, DE GEERIVS **) autem et PALLASIVS ***) pinxerunt.

2. Maculae elytrorum flavae sunt; hanc descriptam, pictamque a SCHAEFFERO †), et HERBSTIO ††) accepimus.

Parem vero utriusque varietatis numerum collegi, quod me movet, ut sententiam cel. HERBST amplectar, qui earum diversitatem in sexu solummodo consistere opinatur; quamquam utriusque varietatis majora et minora reperi exemplaria.

3. Convenit cum priori, exceptis tantummodo mediis maculis singuli elytri, quae confluunt, ita ut lineae, extrorsum sinuatae, esse videantur.

D 4

4. In

*) l. c. n. 72.

**) Icon. 1. 4. 79. 5. Tab. 4. f. 20.

***) l. c. f. 14.

†) Icon. Tab. 31. f. 1.

††) Arch. Tab. 28. a f. 7.

4. In qua omnia in var. 2. jam enarrata reperiuntur, ea tamen differentia, ut caput ac thorax in ceteris coeruleo, in his autem viridi colore tincta conspicantur.

Hae duae varietates rarissimae sunt, cum omni cura adhibita, unicum tantum utriusque exemplar invenerim; quae eo majoris ergo sunt aestimandae.

Fuerunt, qui putaverint hoc insectum speciem esse *Elateris*, e.g. SCHAEFFER *), PANZER **), GOETZE ***); sed certe Buprestis generi adnumerandum esse, ex notis characteristicis et habitu luculenter patet.

BUPRESTIS *rufica*.

Rarissimum nostris regionibus insectum, quod interdum quidem volans vidi, ob perniciatem vero ipse haud arripere potui; tamen ab cel.

Praef.

*) l. c.

**) HARRER *Beschreib. der Schäffer. Inf. prim. edit.*
p. 64.

***) Ent. *Beitr. 2. praefat.* p. 57.

Praef. de SCHREBER in pinifero monte captum,
et a Viro laudato mecum benignissime est com-
municatum.

Obs. Differt a *B. haemorrhoidali* 1) colore
totius insecti nigrescenti-cupreo in thorace,
nigrescenti-orichalceo in elytris; 2) oculis non
marginatis; 3) ano abdomini concolore.

ELATER *mesomelas.*

E. thorace margineque elytrorum ferrugineis,
corpore elytrisque nigris FABR. *Ent. syst. Tom.*
II. n. 42.

Habitat apud nos frequens in Betula Alno,
locis subhumidis, ubi illum saepius in copula
observavi.

Obs. Haec definitio *feminam* tantum respi-
cit. *Mas* hujus speciei, thorace rubro, elytris
testaceis gaudet. *Synonyma maris* sequentia
funt:

Elater livens FABR. *l. c. n. 41.*

Elater linearis FABR. *l. c. n. 43.*

Elater bicolor PANZ. *faun. germ.* 8. *Tab. II.*

Lepturoides linearis HERBST *Arch. IV.* p. 103.
n. l. *Tab. 26.* fig. 28.

PRIONVS *coriarius.*

Rectissime quidem *Cerambycem imbricornem* LINNEI cum *Priono suo coriario FABRICIVS* *) coniunxit; at ille nullo modo est *Prioni coriarii* varietas, sed potius *mas*; hanc ob causam hujus insecti definitio corrigenda, vel saltem sequens annotatio est addenda: *mas*: thorace bidentato, corpore ferrugineo. *Femina* thorace tridentato, corpore piceo.

CALLIDIVM *bafniense.*

Insectum ex rarioribus, cum pauca tantum exemplaria in horto aulico mihi obvia facta sint.

Nonnulli Entomologi iconem descriptionemque sub aliis dederunt nominibus, e. g.

Callidium confusum HERBST. *Arch. V.* p. 98.
n. 18. *Tab. 26.* fig. 18.

Cal-

*) *I. c. Tom. I.*, p. 2. p. 247.

Callidium liciatum PANZER. *Naturf.* XXIV.

Tab. I. fig. 38. n. 38.

LEPTVRA fasciata Mibi.

Sub hac denominatione *Lepturam calcaratam* una cum *L. subspinosa* FABRICII *) comprehendo, quae sexu tantum differunt, ut innumeris, copula conjunctis, edoctus sum, cum vulgare sit in hac regione insectum. Prior mas, altera femina est.

Cel. HERBST **), iconem maris sub titulo *Leptura armata* dedit, et cel. STVRM ***) sub *Leptura Scopoliana feminam* depinxit,

CVRCVLIO Caretti Mibi.

C. longirostris, femoribus simplicibus, rostro pedibusque testaceis, thorace elytrisque cervinis, ventre cinerascenti-nigro.

Habitat in Caricibus, cum Donaciis.

Descr.

*) *I. c. p. 347. n. 41. 42.*

**) *Arch. V. pag. 101. n. II. Tab. 26. fig. 24*

***) *Insect. Cabin. 4tes Stük.*

Descript. Insectum oblongum, uti Curculio pyri, capite thorace depresso globoſo, elytrisque cinerascenti - cervinis; roſtrum arcuatū tenuē cum pedibus obſcure testaceum; antennae obſcuriſſime testaceae et fere nigrae. Venter ci-nerascenti - niger. Long. a fronte ad anum 2¹¹¹; Lat. trans elytra 1¹¹¹.

CVRCVLIO *spartii* Mibi.

C. sublongirostris, femoribus simplicibus, ob-longus, griseus, thorace vitta lata, elytris punctis in series longitudinales dispositis atris.

Habitat in Spartio scopario.

Descr. Ad Curculiones longirostres adhuc reſerendus, quod roſtrum ſatis tenuē et incurvum thoraciſ longitudinalē paullulum ſuperet. Long. a fronte ad anum paullo ultra 2 $\frac{2}{3}$ lin. Latit. 1 $\frac{1}{3}$ lin. excedit.

Color totius inſecti cinereo - griseus, ſed tho-raciſ dorsum taenia lata inſcribitur, quae in me-dio longitudinaliter ſubobſcure in duas diſperti-tur. Elytra nudo oculo vittis tribus nigris ad-

parent

parent picta, quarum una communis futuram occupat, una in quovis elytro decurrit; verum ad lentem vitream disparent hae vittae, elytrae que non nisi dorso, quam lateribus, apparent obscuriora, lineola praeterea unica in quovis elytro, quae tamen vix ante illius medium incipit, albidore; ad haec seriebus pluribus punctorum nigrorum percurruntur, et maculis duabus fere quadratis ad scutellum insigniuntur. Femora simplicia sunt.

CVRCVLIO cicatricosus Mibi.

C. brevirostris, femoribus muticis, canus, thorace lacunoso, nigrolineato, elytro singulo maculis tribus ad futuram, una ad marginem externum, et communi ad scutellum atris.

Habitat in locis fabulosis montosis, ubi, praeter familiae morem, quam citissime, Carabi instar, currit.

Mensurae.

Long. ab ore ad anum	-	-	$5\frac{3}{4}'''$
rostri cum capite	-	-	$1\frac{1}{2}$
thoracis	-	-	$1\frac{1}{4}$
elytrorum	-	-	3
Lat.			

Lat.	rostri	$\frac{1}{2}$ "
	thoracis	$I \frac{1}{3}$

Descr. Corpus totum propriè atrum, ut tam
en ex subtilissimo tomento canum evadat; id
tomentum quibusdam locis densius est, in aliis
plane deest, hinc singularis illa canitiei nigredi-
nisque distributio. Rostrum carina glabrescente
et ad latera nigrum, coetera canum. Thorax
circumscriptione cylindricus, sed lacunosus, ru-
goso - punctatus, striis tribus glabris atris: ex-
terioribus postice bifidis. Abdomen oblongo-
ovatum, elytris lanceolatis, striato - punctatis,
canis, macula communi parallelogramma ad scu-
telli regionem, tribus triangulis in vitta magis
cana prope futuram, et una reniformi ad margi-
nem exteriorem, glabris atris. Macula postica
in vitta cana cuiusvis elytri tuberculum occupat,
et palpebra albidiori tegitur, finum quoque ma-
culae marginalis punctum oblongum occupat. Ad
lentem puncta duo albidiora pone maculam posti-
cam comparent: unum ad basin tuberculi, alte-
rum ad apicem elytri. Venter et pectus obscure
cinerea, nigro inordinate punctata.

CVR.

CURCVLIO granulatus.

C. brevirostris, femoribus simplicibus, apterous nigricans, squamis ferrugineo-aureis tectus; elytris subsulcatis, ordinibus pluribus punctorum squama centratorum.

Curculio granulatus HERBST Arch. 84. n. 80.

Tab. 24. fig. 33.

Habitat in Spartio scopario.

Mensurae.

Long. ab ore ad anum paullo ultra	-	-	3 $\frac{1}{3}$
— thoracis	-	-	$\frac{3}{4}$
— elytrorum	-	-	2

Reliquum mensurae caput cum rostro con-
ficit.

Lat. thoracis	-	-	1 $\frac{1}{3}$ fere.
trans elytra	-	-	1 $\frac{1}{2}$ fere.

Descr. Caput, thorax, et abdomen nigra. Elytra connata obscure testacea. Pedes semipel-lucido-testacei; ceterum totum insectum squa-mis orbicularibus ferrugineo-aureis parte superna-tum, abdomen et pedes pilis ejusmodi hispida-funt.

sunt. Thorax fere globosus, convexo-punctatus, quod tamen nonnisi detritis squamis manifestum fit. In quovis elytro sulci parum profundi, seu potius striae latiusculae, duae, quarum quaevis ordine punctorum excavatorum percurritur, quorum centra reliquis quidem omnino similis, sed ad lentem manifeste distincta squamula occupat; pilis praeterea ferrugineo-aureis subdecumbentibus minutis rigent elytia.

Obs. HERBSTII figura hunc Curculionem, ut oculo nudo adparet, egregie refert, sed nimis magna est, $4\frac{1}{2}$ nempe lineas longa, quod vel cel. Viri textui repugnat.

CURCVLIO *fulcatus*.

C. brevirostris, femoribus dentatis, oblongus ater; elytris crenato-striatis, thorace carinato, excavato-punctato.

Curculio fulcatus HERBST Arch. 85. Tab. 24.

fig. 35.

? Curculio fulcatus. FABR. Ent. syst. T. 2.

n. 382.

Habi-

Habitat in montosis arenosis.

Mensuræ.

Long. a basi thoracis ad anum	4 $\frac{1}{4}$
rostri	1 $\frac{1}{2}$
thoracis	1 $\frac{1}{2}$
elytrorum	2 $\frac{3}{4}$
Lat. thoracis	1 $\frac{1}{3}$
trans elytra	1 $\frac{1}{2}$

Descri. Oblongus, totus ater; rostrum declinatum, praeter familiae morem tenué. Thorax fere conicus (cono ad caput truncato) levi carina percurritur, ceterum punctis excavatis fere confluentibus. Elytra qualia in Curculionibus apteris occurunt; quodvis striis elevatis tribus notatum, campo intermedio punctorum excavatorum dupli serie (immo inter marginem externum et striam extimam triplici cum dimidia) per totam longitudinem insculpta. Femora omnia unidentata.

E

Obl.

Obs. Cl. HERBSTII icon egregia, sed nimis magna, ut quae a basi thoracis ad anum 5^{um} metiatur. . Ceterum in elytris nec maculas ferrugineas, quas cel. FABRICIVS, nec albidas quas cel. HERBSTIVS vidit, nec depinxit, conspexi, utpote, ut observat posterior, facilime detergendas.

CVRCVLIO *Pyri.*

Tres hujus elegantissimi infecti reperi varietates, quibus haec regio abundat, praesertim in fruticetis subhumidis, ubi in Rhamno cathartico tempore florescentiae habitant. Varietates autem potissimum colore capitum, thoracis et elytrorum inter se discrepant. In *prima* enim omnes hae partes viridi colore gaudent, ita ut *Circulionem argentatum* fere aequent, exceptis tantummodo splendore, nec non pedum colore. *Alteram* tota est nigra, et corpus magis ovatum. *Tertia* omni modo similis est antecedenti, exceptis tantummodo squamis aureis quibus tegitur, ita tam-

men ut color niger hinc inde appareat. Haec tertia varietas multum convenire videtur cum Curculione lepidoptero FABR. *), tamen ex brevi descriptione nihil pro certe colligere au- sim.

Pedes in omnibus supra notatis varietati- bus rufi sunt.

MELOE *Proscarabaeus*.

Hoc insectum olim non tantum, sed et ho- die, in numerum medicamentorum receptum, et nostris temporibus praecipue in Hydrophobia lau- datum esse, inter omnes constat.

Cum autem a recentioribus Entomologis plures hujus generis species sint detectae, quae *Meloen Proscarabaeum* maxime aequant, non du- bitandum est, has species pro usu medico inter se haud semper satis distinguuntur, sed interdum pro- miscue

*) *Ent. syst. Tom. 4. p. 454.*

misce a pharmacopolis in Entomologia non ver-
satis, vendantur, cum experientia me docuerit,
vel ipsam *Melolontham vulgarem* pro *Meloe Pro-*
scarabaeo saepius venum dari, quae commutatio
ex germanico idiomate originem ducere videtur,
in quo prius insectum *Maykäfer*, alterum autem
Maywurm nominatur. Re sic se habente, haud
valde miranda est specierum inter se commuta-
tio, quae eo pejor effet, si ut in partibus ex-
ternis, sic etiam in virtute medica inter se
differrent; quod autem adhucdum ignoramus.
Quidquid sit, haud superfluum fore credo, si
differentias specificas omnium specierum a me
collectarum protulere:

1. *MELOE majalis* segmentis dorsalibus abdo-
minis rubris.
2. *MELOE proscarabaeus* corpore violaceo.
3. *MELOE testa atra*, elytris abdomine longio-
ribus, antennis medio crassissimis.
4. *ME-*

4. *Meloe brevicollis* atra, thorace transverso
elytrisque subpunctatis.

Omnis quatuor species saepius simul in locis graminosis, in collibus et pratis, primo vere, reperiuntur.

Quod ad *Meloen Proscarabaeum* attinet, is magis quam reliquae species, vulgaris est, et differt: a *Meloe majali* statura minore, segmentis abdominis elytrisque violaceis; a *Meloe testa*, elytris brevioribus dimidium tantum corpus tegentibus, et antennis linearibus; a *Meloe brevicolli* statura oblonga, antennis elytra aequantibus.

Denique et novam speciem, sub *MEOES minimae* nomine, adjungere possem, quae cum *M. Proscarabaeo* omnibus fere partibus convenit, sed dimidia tantum magnitudine gaudet. Cum autem unicum tantum exemplar huc usque in hac regione reperire mihi contigerit, de ejus differ-

differentia judicare nondum ausus sum; plura fortasse de hoc infecto observare et in medium proferre in posterum licebit, si fides habenda proverbio, in historia naturali veritati maxime consentaneo: dies diem docet.

Erlangae

Typis Hilpertianis.

Fig. 1. *Donacia micans*. Hopp. — *crassipes*. Ahr. Monogr.

Fig. 2. *D. dentata*. Hopp. — Ahr. Monogr.

Fig. 3. *D. fasciata*. Hopp. — *denticipes*. F. Ahr. Monogr.

Fig. 4. *D. marginata*. Hopp. — *clavata*. F. Ahr. Monogr.

Fig. 5. *D. aurea*. Hopp. — *digitata*. F. Ahr. Monogr.

Fig. 6. *D. aenea*. Hopp. —

Fig. 7. *D. violacea*. Hopp. —


Fig. 8. ♀. Fig. 9. ♂. *D. discolor*. Hopp.

Fig. 10. *D. linearis*. Hopp.

Fig. 11. *D. cinerea*. Hopp. *D. Hydrocharis*. L.

Fig. 12. *D. mucronata*. Hopp.





St.

Inst. Zool. PAN

Biblioteka

K.5385

