


11068

Corrections Flora Prusicae margini adscriptae desumptae
Joh: Philippri Breyneij Prefatione ad Georgij Andrej Helianu
Quatinodogenitam, in qua de Scriptoribus Aerum Naturalium BB
et Poloniis agitur, & multi locores flore Prusice modeste co
4^o. Gedani. 1712.

X
Hb

1919. 99.



FLORA
PRUSSICA,
SIVE

PLANTÆ
IN REGNO PRUSSIÆ
SPONTE NASCENTES.

Quarum Catalogum & Nomina

JOHANNES LOESELIUS

Phil. & Med. Doct. & P.P. Ordinar.

Olim differuit,

Nunc additis nitidissimis Iconibus Rariorum,
partim ab aliis nondum delineatarum plerarumq;
Prussiæ propriarum & inquilinarum Plantarum,
Earundemque accuratâ descriptione,

NEC NON

Adiectis Synonymiis Veterum Botanico-
rum, interspersisq; Observationibus Historico-Philolo-
gico-Criticis & Medico-Practicis noviter efflorescentes,

Curante

JOHANNE GOTTSCHED,
Phil. & Med. D. hujusq; Extraord. Phys. Ord. P.P.
Regiæ Scientiarum Societatis Brandenburgicæ Membro.

REGIOMONTI, Anno MDCC III.
SUMPTIBUS TYPOGRAPHIÆ GEORGIANÆ.



Biblioteka Muzeum i Inst. Zoologii PAN

K. 12068



200000000022

Przedruk w druku zbędnych

Biuletyn

Rozprawy Muzeum i Instytutu Zoologicznego
<http://rcin.org.pl>

*AUGUSTISSIMO,
SERENISSIMO ac POTENTISSIMO*
**PRINCIPI
AC
DOMINO,
DOMINO
FRIDERICO,
REGI
IN PRUSSIA,
MARCHIONI BRANDENBURGICO
SAC. ROM. IMP.
ARCHI - CAMERARIO
ET
PRINCIPI ELECTORI,
SUPREMO ARAUSIONUM
PRINCIPI.**

MAGDEBURGI, CLIVIÆ,
JULIÆ, MONTIUM, STETINI, PO-
MERANORUM, CASSUBIORUM, VANDA-
LORUM, ITEM IN SILESIA CROSNÆ

D U C I.

PRINCIPI HALBERSTA-
DII, MINDÆ ET CAMINI.


COMITI IN HOHEN-
ZOLTERN , MARCÆ ET
RAVENSBERGÆ,

LINGÆ, MOERSIÆ, BÜRÆ ET
LEERDAMI,

MARCHIONI VERIA-
RUM ET FLISSINGÆ.

DOMINO IN RAVENSTEIN , NEC
NON TERRARUM LAUENBURG ET
BÜTAU, ARLAIÆ AC BREDÆ, &c. &c.&c.

REGI OPTIMO,
PIO, FELICI, AUGUSTO.
DOMINO MEO CLEMENTISSIMO.



AUGUSTISSIME,
SERENISSIME ac POTENTISSIME
R E X ,
Domine Clementissime ,
Nutritie Munificentissime.



Acratissimo Regiæ Ma-
jestatis Tuæ Throno
humillimè advolutam,
quam cernis, *REX Se-*
renissime , FLORA
PRUSSICA est. Nu-
dis quondam verborum linteis involuta,
nunc verò & splendidiori apparatu &
)

am-

ampliori syrmate felicius resulgescens.
A Gratiâ Serenitatis Tuæ splendorem
omnem mutuata, quam tot decoribus,
quot nitidissimis iconibus, gravi ære re-
demptis, donare & exornare voluisti:
Coronatus hōc ipsō quasi Divam hanc
Patriam tūm temporis, cùm à Deo Im-
mortali concessam, Regiam Tibi adapta-
res Coronam. Idem jam olim Serenissi-
mus Parens, Magnus ille FRIDERICUS
WILHELMUS, gloriosissimæ memo-
riæ, meditatus, nisi camporuñ eō tempore
devastator & Floræ hostis infensissimus
Mars, Floram hanc tūm Adolescentem,
alumnum verò ejus, cuius curæ Flora
erat concredita, mors præcox contumu-
lāssent. Volentibus sic Fatis, ut Plantæ
Prussicæ non nisi tūm demum in apricum
prodirent, cùm circumſævientibus undi-
que & ubiq; Bellorum procellis in solâ
ferè

ferè Prussiâ exoptatissimæ pacis spirarent
Etesiæ. Auspice Rege, cuius pietas esset
campus, immarcescibiles quarumcunque
Regiarum Virtutum flores alens; quas
inter summa in Musas Clementia eminet,
non stipendorum saltem augmentatione,
sed & Academiarum & Societatum Sci-
entiarum novâ fundatione nuperrimé
demonstrata. Hâc spe animatus, foetum
hunc Botanicum, non totum quidem
meum, impigro tamen labore partum,
Sacratisimis Regiæ Tuæ Majestatis pe-
dibus substerno; felicius pullulaturum,
si gratosissimis Clementiæ Tuæ radiis
eum fovere fueris dignatus. Mihi verò
hæc Gratia pro semente erit, ex quâ
DEO benedicente, plurimus quondam
fructus germinet. DEUS Ter Optimus
Maximus TUAM REGIAM
MA-

MAJESTATEM, Totamque DO-
MUM REGIAM *semper vivo flore*
coronet, faciatque, ut Thronum Tuum
Regium meræ semper stipent CONSO-
LIDÆ REGALES & CORONÆ
IMPERIALES!

Ita novet

S. R. M. T.

Regiomonti

Dic 1. Octobr. M DCC III.

AM

JOHANNES GOTTSCHED.

••• 10 (•••

Ad Lectorem.



Edium ferè Seculum , dempto anno,
elapsum, ex quo Johannes Lœfelius,
Johannis Filius, Juvenis adhuc, ob Pa-
rentis adversam tunc valetudinem, ex
manuscripto ejusdem , PLANTAS IN
BORUSSIA SPONTE NASCENTES divul-
gavit; certò pollicitus, fore, ut, quamprimum Parens
sanitati restitutus fuisset; Descriptiones Rariorum Plan-
tarum unà cum Iconibus publici juris fierent. Sed, cum
Anno sequente, Parens ipse, *Anatomiae & Botanices P. P.*
Ordinar. Celeberrimus, Deo animam redderet, factum,
ut opus hoc diu desideratum, mancum, mutilum & im-
perfectum ingemisceret. Solo igitur Plantarum Ca-
talogo, Anno 1654. divulgato, contenta vixit Juventus
Medica, nec, distractis magis magisq; & disiectis injuria
temporis manuscriptis, cum Filius relicto medico Ju-
risprudentiæ studium amplecteretur, quicquam perfe-
cti sperare unquam potuit. Cumq; exemplaria annua-
tim rariora, tandem omnia ferè essent divendita , vix
meo iam tempore, unum atq; alterum, quibus utere-
mur Botanices Studiosi, existit. Defectum tamen hunc
facile fidelis, assidua & freqventata manuductio *Prænobis-*
lissimi, Excellentiss. atq; Exper. Dni. Doct. Joh. Heinr. Starckii,
S.R.M. in Prussia Consiliarii Aulici & Archiatri, Anatomiæ & Bo-
tanices tum temporis, nunc Theoretices P.P. Ord. celeberrimi, Præ-
ceptoris & Patroni summoperè honorandi, refarcivit.
Singulis quippe annis freqventissimè nobiscum in cam-
pos excurrere solitus, singulari quâ utebatur enchei-

)o(

resi

AD LECTOREM.

res, fidelitate & humanitate effecit, ut tanquam aliud agendo, summo animi cum prolabio, cognitionem Plantarum Patriarum nobis compararemus. Regiomonto dehinc Bartensteinium, ad Praxin ibi Medicam exercendam delatus, tantum abfuit, ut studium Botanices neglexerim, quin potius majori ardore horis subservivis, per aliquot aestates in id juxta incubuerim, comitem mihi adsciscens Pharmacopœum, hospitem meum, rei herbariæ perquam gnarum. Evolvendo quoque Antiquiorum Botanicorum Pandectas, Synonymicas appellationes herbarum excerptendo, rem totam familiariorum mihi reddidi. Cumque deinde, DEO sic dirigente, Regiomontum repeterem, indeptis in Academiâ Patriâ, ante Novennium, summis in Medicinâ honoribus, adeptâ quoque à Serenissimo Rege Professione Extraordinariâ, calcar mihi valdissimum fuit additum, de Arte Medicâ quocunq; modo benè merendi. Cui demum Soceri mei, Domini Hermanni Dieterici Hessen; S. R. M. in Prussia Secretarii intimi, & Xenodochii Regii Praefecti benè meriti, Agentis quondam Brandenburgici apud Invictissimum Magnæ Russie CZARRIUM fidelissimi, (qui secunda repetens vota in thalamum duxerat laudatissimi Domini Doct. Lœselii Filiam,) ante septennium & quod excurrit, accessit cohortatio, qui manuscripta Botanica Doct. Lœselii, sed heu! quadraginta jam annorum injuriam passa, manca, adeoque fragmenta saltem, unâ cum Iconibus æri incisis mecum communicans, maxime institit, ut manum tandem operi admoverem, nec opportunam adeò Publico inserviendi occasionem prætermitterem. Cujus precibus eò lubentius obtemperavi,

AD LECTOREM:

ravi, quò majori ipse, ne opus toties expetitum plane
interiret, flagrabit desiderio. Tempus itaq; reliquum,
quantum à frequentatâ praxi & privatis Collegiis re-
stebat, huic negotio impendi, Catalogumq; plantarum
olim editum, cum fragmentis manuscriptis, meisque
excerptis conferendo, hâc tandem formâ, qua in pu-
blicum prodire posset, FLORAM PRUSSICAM in-
dui. Prodiissetq; jam ante Triennium, & amplius, nisi
Icones ænei ab Hæredibus redimendi obicem posuif-
sent, quem tamen Gratia Serenissimi Regis facile su-
stulit. Ipsis siquidem *Coronationis Regiae suæ Majestatis*
Feriis, ante biennium cum dimidio, ad supplicem mei
instantiam, & humillimam Excellentissimorum Domi-
norum Archiatrorum commendationem, Munificen-
tissimus Rex Icones æneos ab hæredibus pretio non
levi coëmit, mihiq;, ut iisdem uterer, singulari Rescri-
ptô Regiô, clementissimè concessit & demandavit.
Nec subsistebat hîc inexhausta Regis Serenissimi Cle-
mentia, sed, ut summum mihi *Rerum Prussiae Naturalium*
amorem & stimulum adderet, Professione Physices Or-
dinariâ Philosophicâ gratiosissimè me mactabat. Quam
singularem & immeritam Clementissimi Regis Grati-
am submississimâ cum veneratione exosculatus, nolui
amplius & Regi & Publico deesse, sed FLORAM hanc
PRUSSICAM, tanquam *Primam partem Historie Natu-*
ralis Prussiae, Erudito Orbi in præsens communicare &
præmittere; certò ratus, fore, ut, DEO vitam & vires,
Rege autoritatem & Gratiam sufficientibus, *Pars se-
cunda de Prussiae Animalibus*, & *Tertia de ejusdem Mineralibus*,
(subnexâ aut præfixâ Parte Meteorologicâ, cuius gratia

)o(2

obser-

AD LECTOREM.

observationes quotidianas condo) Totaqe adeo *Historia Prussiae Naturalis*, Opus utut à Professione meâ tum Medicâ, cum Physicâ imprimis non alienum, multisqe Eruditis expetitum, maximè tamen arduum, aliquando subsequatur. Hisce Benevolum Lectorem morari necessarium duxi, tum, ut Serenissimi Regis Gratiam & Municientiam, quem non Orbis angulum pervagantem? deprædicando, omnibus & singulis commendatissimam redderem, cùm ut veniam impetrarem apud Eruditos, si opus hoc minus exasciatum & perfectum judicarent. Idem huic FLORÆ factum obtigisse arbitrati, quod orphanis, quos raro tàm feliciter Tutores educant quàm Parentes. Synonymias Veterum Botanicorum propterea adjunxi, ut omnibus constaret, quam plantæ speciem sub titulo nostro palmario intelligamus? Eandem enim plantam diversi Autores & populi diversimode nominant. Indices, tàm Germanicus quàm Latinus, ob eandem rationem fusiores facti, ut sub quâlibet synonymicâ appellatione quâlibet Planta facile reperiri posset. Qvo ipsô illos quoqe, qui lingvæ Latinæ gnari non sunt, adjutos puto, ne desiderio suo excidant. Eruptiones quasdam Philologicas, Criticas & Historicas, nec non seriis jocoseria quædam interspersi, ne nimia rei Botanicæ (horto vivo si destituatur) ariditas, curiosos Lectores deterreret, Icones omnes ad exemplar vivum, quantum fieri potuit, accuratissimè delineati & incisi sunt. Cæterum etiam atqe etiam Lectorem Benevolum rogo, velit qualemcumqe hunc nostrum laborem æqui boniqe consulere, meqe non nisi de Publico sollicitum, sincero semper favore fovere & complecti.

INDEX

INDEX AUTORUM in hoc libro citatorum.

Ægin. Paulus Ægineta.
 Aet. Aëtii Amideni Tetrabiblos.
 A. Gell. Aulus Gellius.
 Alex. Alexis Fabulæ.
 Alexand. Alexandrides.
 Anthol. Anthologia Magna.
 Anthologia Græcorum Epigrammatum.
 Anserius de Busbeck.
 Apollod. Apollodorus de Deorum Originibus.
 Apul. Apulejus.
 Arnob. Arnobius.
 Athen. Athenæus.
 August. Augustinus de Civitate Dei.
 Baal Hatturim. *Vid.* Hatturim.
 Bauh. Caspar. Bauhin. Prodromus Theatri Botanici.
 Pinax.
 In Matthiolum.
 Bock. Hieronymus Bock. *vid.* Tragus.
 Brunf. Otto Brunsfelsius. Herbarium c. Vivis Iconibus. Latinè
 Bubikir Volumen Elhavi. (& Germanicè.
 Busbeck. Anserius de Busbeck.
 Cæsalp. Cæfalpinus Andreas, De Plantis. Lib. XVI.
 Camerar. Joachimus Camerarius, Joh. Filius, in Matthiolum.
 Hortus medicus.
 Hercyniæ stirpes,
 sive Silva Hercynia.
 Carrichter. Bartholomæus. Kräuter- und Arznei-Buch.
 Carystius. Antigoni Carystii Histor. mirabilis.
 icero.
 Clus. Clusius, Pannon.
 Historia Rariorum Plantarum.
 Editio Hispanica.

INDEX AUTORUM.


- Column.** Fabius Columna in Phytobasano.
min. Cogn. stirp. & rar. Minus cognitarum stirpium &
rariorum. Part. II.
- Cord.** Hist. Valerius Cordus. Historia Stirpium lib. IV.
Hispan. Lingvâ Hispanicâ editus.
in Diosc. In Dioscoridem Commentarius.
- Dalecampius.** Jacobus. in Plinium Commentar.
- Dodon.** Dodonæus Idiomate Latino, Germanico, Pannonico, Ba-
Drexelius. Lib. de Æternitate. (tavo.
- Eusebius de Præparatione Evangelicâ.
- Eystett.** Eystettensis Hortus.
- Fer. M. M. Augerius Ferrerius Method. medendi.
- Fern. Johan. Fernelii Opera Medicinalia.
- Fuchs. Leonhardus Fuchsius. Comment. (de Historiâ stirpium)
- Galen. Galeni Opera varia. (in Matthiolum.
- Gellius,
- Gesn. Hort. Conradus Gesnerus de Hortis Germaniæ.
in monte fracto. Descriptio montis fracti s. montis Pilati
propè Lucernam in Helvetiâ.
- Catalogus Plantarum Latin. Græc. Germ. & Gallicè de-
Gyraldus. (scriptus.
- Hatturim (Baal) Marginal. in Biblia Venet.
- Henricus ab Heer. Observationes Medicæ.
- Hesychius de Illustr. Philosophis.
- Horstii Gregorii Senioris Observationes Medicinales.
- Juvenalis.
- Kyber. David Kyberus in Tragum. Cujus Commentariorum
Lactantius. (lib. 3. Latinè vertit 1552. 4to. Argentorati
Laërtius.
- Landinus. Christophorus, in Georgic. Virgil.
- Lobel. Lœbel. Matthias de Lobel. seu Lobelius. Icones.
- J. L. Joh. Lœf. Johannes Lœselius. } Adversaria.
- Lonicer. Joh. Lonicerus in Diosc. Schola nova. } Observations.
- Lucanus.
- Lucretius.
- Lugdunensis Hortus.

Mar-

INDEX AUTORUM.

- Martialis.
Matthiol. Petrus Andreas Matthiolus Latinè Germanicè.
Nicetas.
Ovidius.
Pausanias.
Pedianus.
Pena. Petrus Pena Nova stirpium Adversaria.
Petræus. Henricus. Lib. Nos. Diff. Nosologia Dissertationibus 50
Phanius de Plantis. (disceptata)
Plinius. C. Plinii Secundi Historia mundi Lib. XXXVII.
Plutarchus. Qvæstiones. Græcæ. Romanæ. Vitæ Reg. & Prin-
Porta Joh. Baptista. (cipum.)
Propertius.
Prudentius.
Ruellius. Joh. de Naturâ Stirpium.
Scaliger. Exercitationes.
Schwenck. Lib. Stirp. Casparus Schwenckfeldius Stirpium &
Fossilium Silesiæ Catalogus.
Sebizijs Melchior in Tragum Latinè & Germanicè.
Servius Commentar. in Virgil.
Statius Papinius.
Sweert. Sweertius. Florilegium.
Tabern. Jacob. Theodor. Tabernæmontani Kräuter-Buch.
Tertullianus.
Thal. Sylv. Johannis Thalii Sylva Hercynia.
Theophrastus. Historia Plantarum.
Trag. Hieronymus Tragus (Germanicè Boc) de Stirpibus
Villanova Comment. in Galenum. (Commentar. lib. 3.)
Virgilius.
Vitruvius.
Vopiscus.

NB. Herbae Asterismo * notatæ, illæ sunt; quarum Icones exstant. Ico-
nes ipsi numeris, ad quam paginam pertineant, insigniti sunt, ut eo melius
loco debito inseri possint.



* * * * *
GEORGII WOSEGINII,

Phil. ac Medicinæ Doct. P. P. Primarii,

Academiae Senioris,

Ac p. t.

Pro-Rectoris Magnifici,

SENIS OCTOGENARII.

Ad

V I R U M

JOHANNEM Gottschedi

Phil. ac Med. Doct. Hujusque Extraord.

Physices Ordinar. P. P.

Regiæ Societatis Scientiarum Brandenburgicæ

M E M B R U M,

Floram Prussicam

publici juris facientem,

EPIGRAMMA.



RUSSIA dat Patriam *Floræ*, sed nomine
vulgi,

Quod tamen expoliit Gratia LOESELII.
GOTTSCHEDIUS lucem affundens congeffit amœ-
Utile doctrinæ consiliique decus. (num

Multa dedere alii *Floræ*, stat Gloria in uno;

Qui *Floræ* vultum contulit, Omne dedit.

••• () •••

PLAN-



PLANTÆ IN PRUSSIA SPONTE NASCENTES.

L.

Bies, Bauh. in Matth. f. 102. Lob. ic. 231. o. Tab. lib. 3.
fol. 640. Picea Dod. Lat. 863. Grähnen Holz Thuringis.
Abies Plinii, & fœmina Theophrasti, Clus.
Pann. p. 21. Clus. Hist. lib. 1. fol. 34. Abies alba sive
fœmina C. B. πτυ. 505. weißer Thannen Baum ἐλάτη Græc.
Thanne Germ. Im Löbenichtschen Wald/ & passim in ali-
is sylvis.

Caudicis abiegni ima & enodis pars *Sapinus*, superior no-
dosa *Fusterna* est Plinio lib. 16. c. 39. Viscum abietis Plinius
ex Theophrasto *Stelin* nominat, baccis illud est albis, notante
Clusio. Cortices inter *lacryma* continetur, quam pro The-
rebinthina Veneta Institores sæpe distrahunt. Vim habet
molliendi, dissipandi, abstergendi, vulnera solidandi, calculum
expellendi. Oleum ejus stillatitum in ulceribus & vulneratio-
nibus internis magnæ utilitatis.

Libra una vel altera resinæ abiegnæ cerevisiæ inter coven-
dum admista, eam ab acore præservat; sed cum infatuandi vir-
tute. Cacumina abietis decocta & pota, scorbuticum expu-
gnare malum certò creduntur.

Piceam, veluti feralem arborem & Diti sacram, in lugubri
domo Patriciorum, amissis fratribus, liberis & propinqvis, ap-
ponere olim mos erat. Apud nos, quæ ad funus olim perti-
nuit

A

nuit

PLANTÆ IN PRUSSIA

nuit arbor, festivitatem nuptialem jam indicit, ante fores locata. Hanc vulgus, ubi scythissat, cantilenā sæpius honorat:
D Dannenbaum/ D Dannenbaum/ du bist ein edler Zweig

Strobili abiegni, copiosius pullulantes, opimas tritici messes ac largas vindemias promittunt. Ex abiete factus est eqvus Ilio fatalis, quem Lucretius lib. 1. *durateum* vocat, sive ligneum. Δέρος enim veteribus Græcis lignum erat, unde δέρας & δέρατος ligneus. Propertius verò *abiegnum* dixit lib. 4. eleg. 1. *Læserat abiegni venter apertus eqvi.* Vaccam quoque Pasiphaës abiegnam dixit idem Propertius lib. 3. eleg. 18. Dædalus è piceâ simulachrum Herculis fecit. Vide Apollodorum lib. 2. de Deor. orig. Statius 4. Thebaid. v. 425.

*Nec caret umbra Deo. Nemori Latonia cultrix
Additur: hanc Piceæ, cedrique & robore in omni
Effictam sanctis occultat sylva tenebris.*

II. Abrotanum campestre, C. B. π^{iv} 136. Tab. lib. 1. fol. 62. Abrotanum sylvestre, vel 4. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. 271. Artemisia leptophyllum, Ges. hort. fol. 248. Ambrosia Matth. deutsch, 359. Ambrosia altera, Bauh. in Matth. 619. **Wesemkraut/ Wildstabwurz mit schmallen Blättern.** Caules alit modò rubentes, modò albicantes, racemoso semine, botryos instar, refertos: Adstringit, reprimit, ac repellit: gar-garisatione fauciū ac tonsillarum inflammations, infessu mulierum profluvia corrigit secundūm Matth. **In der Sartau & alibi &c.**

III. Absinthium, Brunf. tom. 3. fol. 142. Sebitz in Trag. deutsch fol. 265. Matth. deutsch 276. Bauh. in Matth. 508. Absinthium latifolium. Dod. Lat. fol. 23. Absinthium vulgare Fuch. fol. 1. Lob. Ic. p. 752. Tab. lib. 1. fol. 1. Absinthium Ponticum. Ruell. lib. 3. fol. 493. Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis. C. B. π^{iv} 138. **Wer-muth/**

muth/ Gemeiner Vermuth. Pol. Piolin Polny. Passim. Aperit, detergit, jecur & ventriculum adstrictione roborat, appetitum excitat, humoresq; biliatos ac pituitos vacuat, tum per alvum, tum per urinas; vermes evocat; ac lienosos, fæculentum sanguinem $\ddot{\alpha}\nu\omega \pi\gamma \pi\alpha\tau\omega$ magnô impetu sèpè egerentes, egregiè juvat, Dod. Radix dulcis est ac insipida ferè, quod mirum, cum succum tanti amaroris è terrâ sorbeat.

IV. Acer major Cordi, Lob. ic. p. 199. o. Borussis Leint-Baum/ Nasholder/ Ahorn. Ligni Materies tenera ac fissilis. Folia petiolo longo insistentia ampla sunt, profundiùs incisa, seu crenata. Flores fert in umbellis mense Majo, quibus succedunt siliquæ binæ circa connexum duræ & à fructu extumidæ. Effigie scarabæorum alas exprimentes. Cortex verno tempore sauciatus, liqvorem fundit limpidum, quò non nulli aquæ betulinæ locô utuntur. Radix tufa & foris affirmata, dolores compescere repertum, Auctore Ruelliô lib. i. c. 47. Auf den Huben bey Königsberg.

Acer operum elegantia ac subtilitate cedro secundum, teste Pliniô lib. XVI. Natur. Hist. c. 15. Vertumnus acernus de se apud Propertium lib. IV. Eleg. 2.

*Stipes acernus eram, properanti falce dolatus,
Ante Numam grata pauper in urbe Deus.*

Ovidius lib. I. de arte, vaccam *acernam* dixit, quæ Propertio abiegnæ bos dicebatur. Ovidius deniq; in Ibin, equi acerni meminit,

Utg, loquax in equò est elisus guttura acernò.

V. Acetosa pratensis, C. B. π^{iv} 114. Oxalis, Trag. Seb. in Trag. Deutsch 249. Matth. Deutsch 151. b. Fuch. 464. Dod. Lat. 648. Bauh. in Matth. 353. Oxalis, Acetosa 1. Tab. lib. 2. fol. 149. Oxalis sive laparsum oxalida, Lob. ic. 290. Gemein Saurampff. Szczaw Polonis.

Jecur & lienem aperit, renum infractus expedit & crassa incidit. Hinc ictero medetur, lienem aperit, arenulas expurgat, & menses moderate citat. Semen malignitati obfistit, lumbricos necat, dysenterias, alvi profluvia & sanguinis sputa adstrictione leni coercet, ac robur æstuanti ventriculo, hepatici ac cordi confert. *Bey Holland* & passim in pratis copiose.

Radix acetosæ, prout in Officinis divenditur decocta, cerevisiam & colore & supernatante pulcherrimâ spumâ exactissimè æmulatur & incautos fallit. Præterea addito parum Cinnamomi potum egregium extemporaneum, biliolis praesertim, porrigit, quô ægri nonnulli per annum integrum & quod excurrit, usitantes, ab oppilatione hepatis liberati fuerunt. Æstatis tempore, peregrinantes, decocto ejus, loco eerevisiæ utplurimum acescentis, ruri uti poterunt.

VI. *Acetosa arvensis lanceolata*, C. B. π^{iv} 114. *Acetosella*, Lon. deutsch. 119. *Oxalis minima*, Frag. Sebiz. in *Trag.* 249. Dod. Lat. 650. *Oxalis minor*, Bauhin. Matth. 354. *Oxalis tenuifolia sinuata vervecina*, Adv. Lob. 120. *Oxalis ovina* Tab. lib. 2. fol. 150. *Klein Saurampff*/Schaaff *Saurampff*/Szczawik Polonis. Pingvius & aridius solum plantæ magnitudinem variat. Eadem, quæ prior agit, nec infirmioribus pollet viribus. Rufuli ejus flores elegantissimam dant tinturam, rosis vix cedentem, quam foriolis in febribus malignis salutarem censeo. *Am Tragheimischen Walle* copiose.

VII. *Aconitum racemosum*. C. B. π^{iv} 183. *Christophoriana*. Dod. Lat. 402. Lob. Ic. 682. Tab. lib. 2. fol. 454. *St. Christoffels Kraut* Omieg Polon. Baccæ ejus Augusto aut serius, maturantur. Exitialis ac novercalis est planta. *Bey der Neuhäusischen Mühl am Berge*. Item *beym Penartschen Walde*.

VIII.

VIII. Aconitum cœruleum L Napellus I, C. B. π^v.
 183. Napellus, Bauh. Matth. 768. Dod. Lat. fol. 442. Napellus verus Cœruleus. Adv. Lob. 301. Napellus maj. Latifol. & angusti foli⁹, Tab. lib. 2. fol. 286. Eysenhart/ Marrenkap/ Münchskap. Foliis est modò latioribus, modò angustioribus: flore sæpiùs cœruleo, aliquando purpureo vel albō. Tota internecina animalibus, excepto muscarum genere, cantharidibus haud absimili, quod turmatim napello insidere scribitur; Flores ejus rostellō delibans. Bey Rogitten. Item Bey der Hoppenbruchschen Mühl in Districtu Balensi. It. Bey der Creuzburgschen Papier Mühl am Flüß. Provenierat etiam olim bey Margen/ am Berge beym Haff/ sed post à rusticis effossus, in hortum translatus ac coronamenti additus, vocatus est Königsblum. Napelli radicem unam vel alteram eqvisones antidoto præsentissimo porrigitur eqvis in detestabili affectu, quem nominant die Wurstsucht/ den fliessenden Wurm. Malum hoc tubera quædam farcimina facie imitantia, ac depilia sæpè, excludit, quæ temporis tractu in sinuosa & maligna abeunt ulceræ. Exstantias has fertiles in quibusdam locis vanescere, in aliis iterum extumescere haud raro conspicies, antequam congressu sordidam sui exulcerationem ostendunt. Sunt, qui opinantur, vivos vermiculos carnem inter & tergus eqvitare, tubera excitare, eademq; exedere, qui acu exempti, & ad lychnum possiti, deorsum sursum cursitent. Hos Aquâ Forti immissa neant, ac vino adusto sinuosas mox eluunt ulcerationes.

Aconitum olim pœna. Aristoteles ob Pœana fusum ad Hermiam Evnuchum sacerum suum, judicum sententiis damnatus, aconiti poculo interiit. Hesych. Illustr. de Philosophis.

IX. Acorus verus, sive calamus aromaticus officinarum

A 3

C. B.

C. B. π^{iv}. 34. Acorus Diosc. & Acoros Theophrasti, officinis falsò calamus, Lob. ic. 57. Acorum, & Acorum cum suo julo, Tab. lib. 3. fol. 329. Acorum legitimum Clus. Hispan. p. 121. *Ackerwurz oder Calmus.*

Calefacit & siccatur ordine tertio, Gal. 6. simpl. Radix alexipharmacum est, attenuat, incidit, abstergit, aperit, urinas mouet. In alveis apum suspensa facit, ne examinent, Apulejus. Zu Schwartis bey der Mühl copiosè, cum nucamentis, quæ Matthiol. se non vidisse confitetur. It. zu Brandenburg am Haff, ubi absq; julis provenit. Anserius de Busbeck Clusio retulit, quod nec semen, nec florem proferat, ubi sponte nascitur, sed duntaxat quædam nucamenta. Clus. Hisp. Inquirendum hoc exactius.

X. Acorus adulterinus C. B. π^{iv} 34. Acorum officinarum, Fuch. fol. 12. Pseudoacorus, Bauhin. Matth. 21. Acorum adulterinum. Trag. Seb. in Trag. deutsch 555. Acorus palustris, & Butomon Theophr. Lob. ic. 58. Iris palustris lutea, Tab. lib. 2. fol. 330. Pseudoiris Dod. Lat. 248. Butomon, Clus. hist. fol. 232. Fœmellis *Ackerwurz*. Alias Geel Wasser-Lilgen / Drachen-wurz. Polonis Kosaciec dziki zolty. In fossis, in der Hollen-Grund.

Radix siccatur, adstringit, unde magnas obtinet vires in sistendo sanguine, undeeunq; erumpente, Dod. Sunt, qui radice, Majo mense eradicata, collo (ut scrobicum cordis attingat) appensa post in rivum conjecta foriolos, & ad lasanum cerebrius conquiniscentes, restituere satagunt. An robur concipiendi mulieribus adimat, ut opinatus est ille apud Clusium Medicus, affirmare non possum.

XI. Adianthum aureum minus, Tab. lib. 2. fol. 476. Polytrichon Apuleji, vel 2. Lonic. deutsch 249. Muscus capillaris, Dod. Lat. 475. Polytrichum aureum medium C. B.

π^{iv} . 356. Wiedertodt/ Guldewiedertodt/ Jungfrauenhaar.
Mátky Bozey wloshi złotek Pol. Siccat ac discutit aliquantulum, adeoq; $\sigma\mu\mu\eta\tau\sigma\nu$ est & temperatum. In locis muscosis, carieq; exesis lignis saepius visitur.

XII. Alcea Matth. Bauhin. in Matth. fol. 663. Fuch. fol. 80. Tab. lib. 2. fol. 446. Alcea & herba Simeonis Brunf. tom. I. fol. 197. Alcea malvæ roseæ sylv. genus, Trag. Kyb. in Trag. Lat. 365. Alcea vulgaris Dod. Lat. fol. 656. Lob. Observ. 374. adv. 295. Alcea vulgaris major C. B. π^{iv} 316. Syng. marswurz/ Simarswurz. Lentum ac viscidum quod obtinet planta, potissimum radix, quaæ glutinosa, dulcis & modicè constringens est degustata. Dysentericis ac ruptis medetur radix, ex vino vel aqua pota. Sunt, qui radicibus alceæ, altheæ loco utuntur in tumoribus emolliendis ac solvendis. Collo suspensa radix aciem oculorum tueri creditur vulgo. In der Hollen-Grund.

XIII. Alchimilla, Trag. Seb. in Trag. deutsch 408. Dod. Lat. 140. Tab. lib. 1. fol. 308. Pes leonis, Brunf. tom. 3. fol. 79. Fuchs. 612. Lonic. deutsch 245. Stellaria Matth. deutsch 513. Bauhin. Matth. 819. Δροσερὰ Δρόσιον sive Φιαδὸν, Cord. hisp. fol. 147. Sinnaw/ Sonnenaw. Lewensfuß. Unser Frau- en Mantel. Przywrot Pol. Bey der Altstädtischen Ziegel- Schwein & alibi passim. Flores communiter pallidi ac herbacei, rariis albi. Foliis ros saepè, in guttulas coactus, perlarmodo insidet. Abstergit, mundat, adstringit & solidat, unde vulneraria audit.

XIV. Alga marina Lob. Ic. 248. o. Fucus marinus alter, Dod. Lat. 479. Alga angustifolia vitreriorum C. B. π^{iv} 364. Meergras. An der See hin und wieder. Folia, nunc latiora, nunc angustiora, initio saturate viridia, post exsiccata prorsus candida. Algâ marinâ in fasciculum collectâ & pi-

& pileis aptatâ, levis armaturæ milites cristarum locô, quas sub vertice gerunt, quondam utebantur. Superbiusculi algâ succo baccarum rubi Idæi infectâ, incedebant. In Insulâ Jarsay, vel Gerzey, Vnglorum Imperio subjecta, cum exiguum ignis alimentum ferat, pro lignis algâ marinâ (Uraje vocant) utuntur incolæ.

XV. Alliaria Seb. in Trag. deutsch fol. 67. Fuch. 104. Lob. ic. p. 530. Bauhin. in Matth. 613. Alliastrum, Gesn. hort. 245. b. Knobloch-Kraut / Lauchel / Salz-Kraut. wsnaczech Polon. Im Dominauschen Walde. Aperit, incidit, tenuat, digerit, putredini resistit, abstergit, mundatq.; Primò vere decerpta folia intinctibus ac salsamentis adduntur. Semine viscidos in pectore incidit humores, ac herbæ succo febribus ulceribusq; succurrit malignis. Cit sternutamentum succô vel semine naribus immissô, uteriq; strangulatum tollit, cervici inditum semen linteo conclusum. Succus mense Majô expressus, seu liqidus, seu inspissatus, ut & sal magmatis, in gangrænâ, & ulceribus sordidis ac malignis perutilis.

XVI, Allium ursinum, Bauh. in Matth. fol. 422. Fuchs. 739. Com. in Matth. 173. A. Clus. hist. lib. 1. fol. 190. Allium ursinum latifolium, Lob. ic. p. 159. Allium sylv. Brunf. tom. 3. fol. 137. Seb. in Trag. deutsch 594. Allium sylv. latifolium C. B. π' 74. Molus, sive Allium ursinum, Florib. Swert. part. 1. fol. 61. Wald-Knoblauch / Hunds-Knoblauch / Acker-Knoblauch. Czosnech Babczy Pol. Hinter Lattenwalde.

Allium ursinum totum theriacæ locô ingerunt rustici Lithvani, cum modico salis & paucillo panis, parvi ritum facientes Veterum. Olim allium qui gustâsse, à delubro & sacris arcebatur. Hinc Stilpon Philosophus somnians, Deam adstantem

stantem allii esum sibi exprobrare, respondit hæc in somniis: *Præbe mihi quod edam, & allio non vescar.* Factum hoc fuerat ob gravissimum allii odorem, unde σκορδίζει, molestiâ & dolore est afficere. Aristophanes in eqvitibus sub personâ Populi Atheniensis, Φάσκων Φιλέν μ' ἐυσκορόδιστας h. e. dum ais te diligere me, alliasti me, Affine est hujic Xenophontis κρομμιῶν οὐδεν, cepe olore, quod in sordidos & illatos quadrat. Allium quantum calculus prosit, in vulgus notum est; facile enim reliquis omnibus antinephritis palmam præripit.

XVII. Allium montanum bicine angustifolium flore purpurascente, C. B. π^{iv} p. 74. Ampelopraspon proliferum, Lob. Ic. 156. Allium sive Moly montanum 2. Clus. Hist. lib. 2. fol. 193. Moly montanum carmesino colore, Swert. Zweihörnichter schmalblätterichter Berg - Knoblauch mit Purpurfarber Blüht. In montosis.

XVIII. Allium montanum capite rotundo, C. B. π^{iv}. 75. Allium seu Moly montanum 5. Clus. Pann. p. 219. (Cui & Moly montanum purpureo elegantissimo flore) & hist. lib. 2. fol. 195. Bergknoblauch mit runden Purpurfarben Käpflein. Cauli viridi, rotundo, duorum vel trium cibitorum altitudine excrescente, ac tribus vel quatuor sæpè oblongis tenuibusq; foliis ornato, capitulum insidet sphærale φύσιγξ dictum ex plusculis floribus, petiolis fultis, congestum, qui sex foliola, elegantiore purpurâ nitentia, & nunquam se explicantia obtinent. Semina mox adsunt copiosa rotunditate oblonga, candida, glumis ex nigro purpurascensibus induita. Radix bulbosa αὐλιθας, seu nucleos quosdam tunicâ vestitos, ad latera interdum egerit. In der Hollen, Grund. Floruit mense Julio. Notandum

hic, quod $\Phi\sigma\gamma\xi$ propriè folliculus sit turgidus in allii capite, quo semen continetur. Allio coronatus est Andronicus Imperator Orientalis, ab Isaacio Angelo victus, & post atrocissimos cruciatus, præcisâ dextrâ, oculo altero effosso, pedibus vivus suspensus. Nicetas & ex eo Drexel. l. de Æternitate.

L. S. X.

*XIX. Alnus Brunf. tom. 3. fol. 235. Seb. in Trag. deutsch 860. Bauh. in Matth. 132. Lob. ic. o. 191. Tab. lib. 3. fol. 690. Alnus vulgaris, Clus. hist. lib. 1. fol. 12. Alnus rotundifolia glutinosa viridis C. B. π' pag. 428. Elenbaum. Bey den Huben. Siccat, refrigerat, & adstringit, cortice ac foliis. Lassitudinem viatorum levant folia, calceis imposita. Cortex cum nucamentis & ferri scoriâ aquâ maceratus atrum suppeditat colorem coria tingentibus utilem. Aqua alni, ex foliis prolecta, expertum est medicamentum in arthritide, dolores quippe velut incantamento quodam aufert, foris admota. Eo nomine secretò ut habeatur, sunt ἀλωπεκί-
ζοτες, cum vulpe vulpinantes, qui aquam alni transnomi-
nant & aquilanam vocant.*

* *Alnus mense Aprili inter julos copiosissimos, eō tempore defluos, semine plenos, corpora quedam edit nana, novocidη, ruffa ac squammata, petiolis fulta suis, quæ genuini sunt alni flores, & conos post se relinquunt subvirides initio, tandem ad nigrem abeentes, & hiscentes. Verrucæ alni tubercula sunt globosa, & inæqvalia sæpe, arbori clavorum instar defixa, quo levi brachio, immisso cultro, eximi possunt. His pueri globorum utuntur loco, ruri lusitantes. Lintres, lembi ac scaphæ initio ex alno parabantur juxta illud Virg. i. Georg.*

Tunc alnos primū fluvii sensere cavatos.

Emplastrum Lœselii ex Alno ita habet: R. ol. veteris libr. 1. cortic. verrucarum alni, radicum alni ana libr. $\frac{1}{2}$ gemmarum alni

alni Uncias 4. fructuum alni auctumn. coll. Uncias 2. ebulliant, ac stent in aheno per 4. dies ac noctes, colato & expresso oleo adde Lithargyr. aurei triti ac creti Unc. 15. Coqvantur aliquamdiu spatulâ debitè materiam agitando, & inter coqvendum affunde: Succi foliorum alni, corticum, radicum alni, aquæ foliorū alni ana librami. Ultimò ubi adverteris justam ferè emplastri consistentiam, adde per incerniculum pulveris florum alni, jularum alni, foliorum alni, fructuum alni autumno collector. ana Unc. 2. M. F. l. a. absq; cerā emplastrum. Usus discutit, dolores ac cruciatus arthriticos egregiè sistit. Erysipelata, omnesq; partium intemperaturas fervidas potentissimè exstingvit. Tumores resolvit, vulnera cruenta placat, ac ulcera haud sordidata, nec non ossa fracta optumè solidat. Eò nomine cerato diachalcitidis Galeni, seu Diapalmæ, hoc longè præferendum existimo.

XX. Alnus nigra baccifera, C. B. *πίν.* p. 428. Frangula Bauh. in Matth. 875. Dod. Lat. 784. Tab. lib. 3. fol. 753. Arbor fœtida, Lon. Deutsch 60. Faulbaum Trag. Kyb. in Trag. p. 981. Hüneraugen Borussis. *In der Hollen-Grund.*

Vaccæ foliorum pastu lac reddunt copiosius. Cortex interior luteus, vere delibratus, & siccatus obstructa expedit viscera & humores biliosos, pituitosos, ac serosos fortiter educit drachm. $\frac{1}{2}$ vel Scrup. 2. pondere cum correctore maci, vel zingibere sumptus. Aceto mistus & impositus scabiem aufert humidam, *Seb. in Tragum.*

XXI. Aloë palustris C. B. Pin. pag. 286 Stratiotes sive militaris aizoides Adv. Lob. 334. Sedum aquatile, sive stratiotes potamios Dod. Lateinisch fol. 589. Wassersegen / Wasserseiche. *Im Graben bey dem kleinen Brückchen / nach Jerusalem zu.*

*st Alsine littorea
folys Portulacæ
C. B. Pin: 291.
renaria proplodes
N. 1.*

XXII. *Alsine marina foliis portulacæ. Joh. Lœsel.
 „Plantula est longissimâ radice albicante, sub terrâ repente,
 „quæ novis subinde radiculis constitutis horsum vorsum ra-
 „dicationem instituit, ac nova alsines germina excludit: Thyr-
 „sulis est succosioribus, rotundis, geniculatis, albicantibus,
 „nonnunquam & rubentibus, quorum geniculis ministeria
 „præstant, bina exadversum folia crassâ, succo plena, viri-
 „dia, ex oblongo acuminata, gustu ferè fatua. Flosculos
 „alit qvinq; foliis candidos, mense Julio, aliis quinis foli-
 „olis intervirentibus suffultos, quorum singulis assistit sta-
 „minulum subluteum. Capsæ post succedunt virides, orbi-
 „culatæ, quinis locis extumidæ, aliquantulum fastigiatæ,
 „ac in meditullio tenuissimis filamentis instructæ, quæ dif-
 „fractæ, septem semina offerunt lutea, parte convexâ ro-
 „tunda, simâ compressiunculis ternis, & pluribus insignita,
 „& plana. Meerhûnerdarm mit dicken Gartenbirchels Blät-
 tern. In der Sackau.

XXIII. Alsine major, C. B. Pin. pag. 250. Alsine, sive Hippia major, Lob. ic. 459. Centunculus, Cæs. lib. 6. c. 53. p. 259. Groß Hünnerbiss / Meyerkraut / Vogelkraut / Meyer. Bey Königsberg.

XXIV. Alsine minor repens. Joh. Lœsel. Klein fri-
 chender Hünnerdarm / oder Vogelkraut. Hinter Latten-
 walde nach Kunzen zu. Aviarii oscines suas aves, cibum
 fastidentes, herbulâ hâc recreant.

XXV. Alsine minor multicaulis, C. B. Pin. pag. 250. Alsine minor, Fuchs. fol. 23. Lon. deutsch 203. Tab. lib. 2. fol. 382. Alsine minima, Dod. lateinisch fol. 30. Adv. Lob. fol. 193. Centunculus minutissimis caudiculis, Cæs. lib. 6. cap. 53. pag. 259. Klein vielstengelicht Vogelkraut / oder Meyer. Am Wall.

XXVI.

Num. 2. ad pag. 12.

*Alsine marina foliis
Portulacæ.*



Arenaria peploides. L.

Num. 3 ad pag. 13.

*Alsine bifolia fructu
Coriandri radice ge-
niculata.*



XXVI. Alsine triphyllos cærulea, C. B. Pin. pag. 250.
Håndelkraut cœruleis flosculis, Trag. Kyber. in Trag. pag. 401. Alsine parva recta, folio Alsines hederaceæ, sed rutæ modo diviso. Lob. ic. pag. 464. Alsine recta, Tab. lib. 2. fol. 383. **Håndelkraut / Hünerrauten / Dreyblättericht Vogel-Meyer mit blauen Blümlein.** Auff den Aeckern.

XXVII. Alsine veronicæ foliis, flosculis caudicalis ad-hærentibus, C. B. Pin. p. 250. Alsine folio veronicæ, Tab. lib. 2. fol. 384. Alysson, Colum. in Phytobas. p. 28. **Hünerdarm mit Ehrenpreiß-Blättern.** Auff den Aeckern.

XXVIII. Alsine hederulæ folio, C. B. Pin. p. 250. Alsine mas. Gesn. hort. fol. 245. Alsine spuria prior, sive morsus gallinæ, Dod. lateinisch fol. 31. Morsus gallinæ folio hederulæ, Lob. ic. 463. Centunculus hirsutior, Cæs. lib. 6. cap. 53. pag. 259 & seq. Alsine hederacea. Tab. lib. 2. fol. 384. **Hünerdarm mit Epheu-Blättern.** Am Wall.

XXIX. Alsine spergula dicta major. C. B. Pin. pag. 257. Saginæ spergula. Lob. ic. pag. 803. Spergula; Dod. lateinisch. fol. 573. Wasserperlen Borussis. Unter dem Getreidig.

XXX. Alsine foliis Trifflaginis, Lob. ic. p. 464. Tab. lib. 2. fol. 384. Alsine chamædrifolia flosculis pediculis oblongis insidentibus C. B. Pin. pag. 250. Alsine media, Fuchs. fol. 22. Alsine spuria altera, Dod. lateinisch. fol. 31. **Hünerdarm mit Ganianderlein-Blättern / dessen Blüht auff länglichen Stengeli.** Am Steindamschen Wall.

XXXI. *Alsine bifolia fructu Coriandri radice geniculatâ. Joh. Lœselii. **Vogelkraut mit Coriander Saamen.** Plantula est triuncialis, & sæpè major, thyrsulis instructa suis, quorum singulis geniculis bina assistunt foliola in acutiem abeuntia, flosculos fert dilutè purpureos, foliis pro-

est Plaux mari
Pin : 215.

„ximè assidentes , quibus succedunt conceptacula , seu vascula
 „rotunda , acuminata Coriandri facie , minutulum semen ,
 „nigricans & triangulum , concludentia . Radice nititur ge-
 „niculatâ , filamentis comitatâ . Bey Kahlholz in districtu
 Balgensi auff der Wiesen . Floret mense Junio .

XXXII. Anagallis mas phœnicea , Lob. ic. pag. 465.
 Anagallis mas , Sebit. in Trag. deutsch fol. 307. Bauli. in Matth.
 464. Fuchs. fol. 18. Dod. lateinisch fol. 32. Lon. deutsch fol. 204.
 Anagallis phœniceo flore , C. B. Pin. pag. 252. Clas. hist. lib.
 6. fol. 182. Rother Gauchheil. Rother Meyer Borussis. Un-
 ter dem Getreidigt. Anagallis mas in sifendo sangvine adeo
 efficax , ut in volâ duntaxat manus servata eundem sufflam-
 net . Lonicerus addit fol. 204. Venam in brachio sectam
 sangvinem haut fundere , herbulâ hâc manu detentâ . In-
 mensum nimio fluxu collo affirmetur , ut scrobiculum cor-
 dis attingat .

XXXIII. Anagallis aquatica major folio oblongo ,
 C. B. Pin. pag. 252. Berula major . Tab. lib. 2. fol. 389. Große
 Bachbungen / mit länglichen Blättern . An den Flüssen
 hin und wieder .

XXXIV. Anagallis aquatica minor foliō oblongō ,
 C. B. Pin. pag. 252. Anagallis aquatica minor 2. Tab. lib. 2.
 fol. 389. Kleine Bachbungen mit Poley - Blättern . Rivulis
 ac fossis afficit .

XXXV. Anagallis aquatica folio subrotundo , re-
 ptante caulinco . Joh. Lœsel. Kleine frichende Wasserbun-
 gen . Auff der Wiesen gegen Jerusalem über . Convenit
 cum reliquis cum anagallide aquatica minore foliō subro-
 tundō , C. B. Pin. pag. 252. nisi quod hæc caulinco obtineat
 in superficie terra longius reptantes , & ex intervallo quo-
 dam fibris radicationem impetrantes .

XXXVI.

XXXVI. Anagallis aquatica breviore oblongo folio semine biscutato, J. Lœsel. Kleine Bachbungen mit kurzen länglichen Blättern / dessen Saam in doppeltē Schildlein. Tota radix capillata, quæ caulinulos numeroſissimos qua-“ quaversum sparsos gestat, humi jacentes ac reptantes, quo-“ rum nonnulli reptatu novas subinde acquirunt fibras, in “ rectum radicantes. Foliis est curtis, oblongis & acumina-“ tis, articulis thyrsulorum pari responso affirmatis. Semen “ in scutigerulâ delitescit thecâ. In Dorff Sarkau nach “ dem Curischen Hafe zu in loco arenoso.

XXXVII. Anagallis aquatica longiore angusto folio, semine biscutato. Joh. Lœsel. Kleine Bachbungen mit langen schmalen Blättern / dessen Saam in doppelten Schildlein. Radice crescit nodosâ, villis instructa suis: “ caulinulo geniculato ac levi, bina longiora, angustissima “ & tenuiter serrata, situ aduerso præstò sunt folia, ex quo-“ rum sinu emergunt pediculi in tenellos alias pedicellos “ inordinatos abeuntes, qui flosculos alunt quadrifolios, par-“ vos ex rubro albicantes, quos vanescentes scutulæ gemi-“ næ, Thlaspios instar, tenuissimâ instructæ aristâ, seqvuntur, seminis servatores Magnitudine variat: pumila saepius “ est, vix spithamam alta rariùs cubitalis & procerior. Hinter “ dem Tragheimischen Wall / nicht weit vom Oberteich.

XXXVIII. Angelica aquatica, C. B. Pin. pag. 156. Archangelica, Lob. ic. pag. 701. Dod. lateinisch. fol. 318. Clus. Pann. pag. 695. Clus. hist. lib. 6. fol. 195. Cam. pag. 17. Wasser-Angeliche, Arcydziegel Pol. In der Wiesen nach Lochstädt zu copioso. Floret circa finem Junij. Ulnas saepè quinque longitudine suâ excedit. Angelica sub eleva-“ tione poli 47. 48. 49. nata, ac Ole. s. &. occupante effos-“ fa, efficaciter operari creditur.

XXXIX.

Angelica sylvestris
ita inodora C. B.
 : 156.

XXXIX. Angelica sylvestris major hyrsuta. Joh. Lœsel. Wilde rauhe Angelick / Hundgiersch / Boruss. Radix crassa & fibrosa, nigricans foris, intus albicans, caule effert bicubitalem, & ulterius sèpè productum, rotundum, medullā intus albicante, hirsutie asperum, viridē, in alas brachiatum, qui digitis tritus odoris est nonnihil aromatici. Foliis crescit podagrariæ, sed profundius in ambitu incisis, hispidis, atrovirentibus, & in acutiem abeuntibus, quæ similiter comminuta odorem hyssopi ferè spirant. Flos in umbellis albicat, semine nigro post se relicto. Radix inodora ferè & exiguè acris calefacit & siccatur. In Penartischen Walde.

XL. Angelica sylvestris minor sive erratica, C. B. Pin. p. 155. Pycnocomos. Brunf. tom. 3. fol. 165. Podagaria. Adv. Lob. fol. 311. Ægopodium, Tab. lib. 1. fol. 301. Herba Gerardi, Dod. Lateinisch. fol. 320. Angelica sylvestris communis, pestis hortorum, Cam. pag. 17. Angelica vitium, & osteritium sylvestre, Sebit. in Trag. Deutsch / 333. Geusfuss. Nostratis, Giersch. Girz Pol. Succulenti ejus thrysuli, abjectis foliis verno tempore edules sunt, & creberrimi usūs. Tota vulneraria est, arthriticos unà insigniter juvans foris & intus administrata. Radix sudorem movet aliquot dies cum vino hausta, ac febres fugat. In sylvis umbrosis passim.

XLI. Anonis spinosa flore purpureo, C. B. Pin. 389. Ononis, Bauh. Matth. fol. 501. Ononis, Anonis, Resta bovis, Cama. Matth. fol. 227. Resta bovis, Sebit. in Trag. Deutsch / fol. 683. Lon. Deutsch / fol. 103. Anonis. Fuchs. fol. 60. Dod. Lateinisch. fol. 743. Dod. Niederländisch fol. 1164. Ononis, Cord. in Diosc. fol. 51. Gesn. hort. fol. 269. Lob. Observ. fol. 492. Adv. Lob. fol. 378. Thal. sylv. 81. Ononis I. Tab.

Tab. lib. 2. fol. 226. Remora aratri quibusdam. **Braun Hauhechel / Stachlicht Stallkraut / Ochsenbrech.** Cortices radicum vino decocti praestantissimi sunt in frangendo calculo, & lotio ciendo, *Diosc. & Plin.* Infarctus quoque jecoris & lienis expeditunt, ictericis & hydropicis summoperè utiles. Novi quendam, (inquit Matth.) qui radicis pulvere duntaxat plurimis mensibus sumpto carnosum ramicem absumpsit & sanatus est: licet à Medicis nullo alio medicamento, quam solâ sectione ustioneq; hunc curari posse antea statutum esset. Equis porrigitur decoctum Ononidis ischuriâ laborantibus. Olim planta adhuc tenera muriatica erat ex genere condimentario, quam sale conditam diutulè servabant edulem, cui anima fœtebat. Lævis est vere, & primâ æstatis parte, post aculeos contrahit. In hortiscoli non debet Ononis, ne fiat Anonis, hoc est inutilis, & noxia aliis herbis, Gesn. **Bey der Pillau auf dem Haacken.** Floret mense Julio. Resta bovis efficacissima creditur sub elevatione Poli 48 nata & collecta Sole 8 ο occupante.

XLII. Anonis spinis carens purpurea, C. B. Pin. 389.
Braune Hauhechel ohne Stacheln. Anonis mitior prima, Clus. histor. lib. 1. fol. 99. Anonis non spinosa, Clus. Pann. p. 52. Eystett. Ononis perpetuò lævis, Gesl. hort. fol. 269. Ononis 3. non spinosa purpurea, Tab. lib. 2. fol. 227. Anonis sive Ononis sine spinis, Camer. hort. p. 17. **Bey Elbing** copiosè.

XLIII. Aparine, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 393. Bauh.
 Matth. fol. 590. Fuchs. fol. 50. Dod. lateinisch. fol. 353. Cord. in Diosc. fol. 57. Lon. deutsch 270. Lob. ic. pag. 800. Cæf. lib. 8. c. 9. pag. 324. Aparine aspera, Thal. pag. 10. Aparine vulgaris. C. B. Pin. pag. 334. φιλαίρθεωπ, Diosc. **Kelbkraut** Ostrzyca Pol. **Am Kneiphofischen Wall** passim. Phalangiorum

& viperarum morsiunculis auxiliatur, Trag. Aqua in puncturis & doloribus hypochondriorum perutilis.

XLIV. Aparine palustris lævis, Thal. pag. 10. Gallium album Tab. lib. i. fol. 537. Gallium palustre Dod. lateinisch fol. 355. Gallium palustre album, C. B. Pin. p. 335. Weiß glatt **Meyerkraut.** In locis palustribus paſſim circa Regiomontum.

XLV. Apium montanum folio ampliore, C. B. Pin. 153. Oreoselinum sive Veelgutta, id est multibona, Dod. lateinisch 696. Oreoselinum, Lob. ic. pag. 707. Clus. hist. lib. i. 195. Oreoselinum i. Tab. lib. i. fol. 342. Bergpeterlein / Berggeppich / Samlod Bor. Zu Dvednau aufin Berge. Opych gorny, Pol. Rusticis in frequenti est usu in sanandis pecoribus.

XLVI. Aquilegia sylvestris, C. B. Pin. p. 144. Aquilegia Sebitz. in Trag. deutsch fol. 108. Fuchs. fol. 102. Lon. deutsch fol. 116. Cæl. lib. 15. cap. 38. fol. 589. Aquilegia simplex, Cam. pag. 19. Aquilina, Bauh. in Matth. fol. 469. Lob. ic. pag. 761. Tab. lib. i. fol. 118. Wilde Agley / Cynowod Pol. In der Österreichen Heyde hinter dem Schilling (lacus est). Item in der Johansburgschen Heyde am Wege. Semen drachmæ unius pondere cum pauxillo croci sumptum obstructa reſerat viscera, & experimentum est in iētero, Trag. Variolas quoq; & morbillos egregiè provocat. Cam. Flores cordiales sunt. Aqua ejus stillatitia faciem emaculat & nitidam reddit, aciem oculorum firmat, & caliginem fugat. Aquilegiæ radix & folia colliguntur sole in i. & existente: flores, sole in ultimo II gradu: semen, ex ultimo & gradu emigrante.

XLVII. Artemisia vulgaris major, C. B. Pin. 137. Artemisia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 273. Bauh. in Matth. fol. 617. Cord. in Diosc. fol. 58. Cam. pag. 21. Artemisia latioris folii Dod. lateinisch fol. 33. Artemilia mater herbarum, Lob.

Lob. ic. 764. Artemisia rubra & alba, Tab. lib. 1. fol. 34.
Beyfus. Bylicá Pol. *Ali den Baumēn* passim.

Menses movet, secundinas fœtusq; extrahit, & uteri præclusioni confert. Carbo sub radice, æstivō solstitio, & maximè Divi Johannis Baptiste pro Festo, erutā, inventus, singularis est virtutis in epilepsia, teste Fernel. & aliis. Ejus rei experimentum Matrem Illustr. Hassiæ Principis Wilhelmi semel atq; iterum fecisse tradit Petræus, lib. 1. Nos. diff. 6. §. 53. Artemisiæ decoctum veterinarii jumentis tussi devexatis utiliter porrigunt.

XLVIII. Arundo palustris, Bauh. in Matth. fol. 137.
Tab. lib. 1. fol. 703. Harundo phragmitis, Ruell. lib. 1. fol. 129. Arundo vulgaris sive *Φεγγυμίτης*, Diosc. C. B. Pin. 17. Calamus sive arundo alia gracilis, Cæs. lib. 4. cap. 59. fol. 186. *Gemein Rohr / Deckrohr.* Vitetur ejus ἀνθηλη seu ἀνθος ἐπιπλέμενος flos nempe lanosus, qui særissimè aures exsurdat. *Alm frischen und Curischen Haase* it. in Königsberg in locis palustribus copiosissimè. *Arundo coronat.* Arundine Lacedæmonii coronabantur festis Promachiorum diebus. Quodnam id festum sit, certò dicere non possum. Existimo ἀπυσὶ καὶ ἀπνευσὶ, ac sine inspiratione bibentes festo eo honorari. Προμάχοι quippe antesignani sunt, qui aliis bibendo præeunt. Arundine autem utebantur, ob dolorem & gravitatem capitis, à vini potu molestam. Vinculum enim quodvis temporibus admotum prodesse credebant veteres. *Arundo mortem infert.* Alexinus Philosophus, qui Ἀλέξανδρος φιλοσοφός ἐναι, h. e. ob contentionis studium ἐλεγχός dicebatur, è vulnere arundine puncto, mortem oppetiit, in Alphæo amne natans.

XLIX. Asarum, Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch fol. 50.


Fuchs. fol. 10. Bauh. in Matth. fol. 36. Dod. lateinisch fol. 358.
 Gesn. hort. fol. 249. Lon. deutsch fol. 156. C. B. Pin. pag. 197.
 Tab. lib. 2. fol. 423. Asarum Baccaris sive baccatus, Lob. ic.
 pag. 601. Haselwurz, Kopytnik Pol. Floret mense Aprili.
 Beym Lautschen Leich am Berge / in locis umbrosis.

Virtutes emeticæ, si crudum aut infusum sumatur; diureticæ & diaphoreticæ si decoqvatur, utroq; autem modo antifebries in vulgus notæ sunt. Asarum virtutibus maximè potens censemur, sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. proveniens. Colligatur Ole 15. & occupante.

L. Asclepias albo flore, C. B. Pin. p. 303. Hirundinaria, Trag. Sebitz. in Trag. fol. 144. Lon. deutsch fol. 163. Vincetoxicum, Matth. deutsch fol. 336. Dod. lateinisch fol. 407. Asclepias, Fuchs. fol. 130. Gesn. hort. fol. 249. Cæf. lib. 6. c. 72. fol. 269. Schwalbenwurz. Zwycie zyiad, Pol. In der Hollen-Grund hinter der Bleich am Berge. Item bey S. Albrecht an den Seebergen copiosissimè.

LI. Asparagus maritimus Dioscoridis, Lob. ic. p. 786. Asparagus marinus, Clus. Hisp. pag. 462. Clus. hist. lib. 5. fol. 179. Asparagus palustris, Tab. lib. 1. fol. 515. Bauh. in Matth. fol. 373. Asparagus maritimus crassiore folio, C. B. Pin. 490. Spargen / Corallenkraut / Jáblonki Pol. Bey S. Lorenz an der See. Item in der Sarchau / ubi à nobilium ministris sæpiuscule effoditur & in hortum defertur. Moderate refrigerat, siccatur & abstergit. Jecur ac renes infarctu liberat tum radice, tum semine, regioq; morbo succurrit. Urinam ciet, calculos exturbat, semen genitale auget, Veneremq; stimulat. Turiones ejus in acetariis sumpti alvum emolliunt. Asparagus in solo etiam infelici uberat, cornua ovilla, hircina, aut arietina vel integra, vel in pollinem acta, radici si adderis.

*Atractylis aculeata foliis maxime
raciniatis, capitulis albis.*



Num. 4. ad pag. 21

deris. Crescit quoq; Asparagus in campis & pascuis ad digitum majoris crassitatem, sed saporis amariusculi. Bey Ragnit auf den Kanopen und Wiesen copiosè.

LII. Asperula, sive Rubeola montana odora, C. B. Pin. p. 334. Matrisylvia, Trag. Sebitz. in Trag. fol. 394. Lon. deutsch fol. 270. Matrisylvia vulgaris, Thal. p. 77. Asperula aut Asperula odora nostras, Lob. ic. 801. Asperula odorata. Dod. lateinisch fol. 355. Asperula odorato flore, Clus. hist. lib. 5. fol. 175. Aspergula odora nostras. Adv. Lob. fol. 357. Hepatica stellata Tab. lib. 2. fol. 489. Stern-Leberkraut / Waldmeister / Herzfreude / Meeske Nostratibus. Beym Lautschen Teich am Berge. Floret mens. Maii. Wotrobie ziele gwiádziste Polonis.

LIII. Aster montanus luteus salicis glabro folio, C. B. Pin. 266. Aster Atticus secundus, Clus. Pann. pag. 528. Bubonium luteum, Tab. lib. 2. fol. 50. Arnica item Alisma, Officinis. Gelb Weydenblättericht unrauhes Sternkraut/Wolfserlen mulierculis. Radix odorata, & folia subamara adstringunt, siccant & in herniis ac ingvinum tumoribus celebrantur. Vulgus ex præcipitio lapsum iisdem saepiuscule utitur ad grumos sangvinis dissolvendos, & internas læsiones personandas. Bey Wiesdrehlen im Gerdauischen am Berge. Flor. circa fin. Julij. Hirsuties notanda, quam Tab. quoque ei tribuit, Clus. detrahit. Folia aspera sunt, & ex atrovirent.

LIV. Aster luteus hirsuto salicis folio, C. B. Pin. 266. Aster Pannonicus tertius, Clus. Pann. pag. 530. Aster flore luteo, Tab. Lib. 2. fol. 51. Gelb Weydenblättericht rauhes Sternkraut mit gelben Blumen. Bey Olenberg (pagus est.) item bey Gladaw am Teich. Floret circa fin. mens. Julij.

LV. *Artractylis aculeata foliis maxime laciniatis,
C 3 capi-
thoides montanae flore flavescente Pin. 3
folijs tenuibus laciniatis C 3. Pin. 320.

videtur Cirsium
Carduus pra-
Eriothales. Li-

capitulis albis. Joh. Lœf. **Stachlichte weißköpfiche Fliegen-Distel / Mückendistel mit sehr zerschnittenen Blättern.** Ex „radice multis & crassis fibris assurgit caulis bicubitalis, rotundus, striatus pallidè virens, cui ad radicem paucula, assistunt folia maximè laciniata, cardui instar spinosa, dorso triangulo, pronâ parte excavato, his consimilia succedunt folia, unum alterum ex intervallo fotu suo caulem ambientes: in summitate caulis nonnihil brachiatus capitula effert hirsuta, foliis diffulta suis, quibus flosculi insistunt purpureascentes, ætatis tractu albicantes, capillacei, semen post se minutum albicans, pappo instructum, velut in scolymo relinquentes. Caulium summitati muscæ numerosæ adhærent quandoque, & capitella florum siccata, ac concussa pulvrem reddunt subalbidum, qui, num seminium sit insectorum, judicet aliis. **Bey Königsberg copiosè.**

LVI. Atriplex sylvestris folio sinuato candicante, C.B. Pin. 119. Atriplex sylvestris sinuata, Lob. ic. pag. 254. Atriplex sylvestris 2. Bauh. in Matth. fol. 362. Atriplex sylvestris, Cord. in Diosc. fol. 44. Cæs. lib. 4. cap. 23. pag. 160. Tab. lib. 2. fol. 135. Atriplex fimeteria major, Thal. p. 8. **Wilde Schweif-milde w't weißlichen Blättern.**

Alternat herba soli natalis respectu: Folia modò tota ex nigro virent, modò aversâ parte alblicant, nunc integra eadem sunt, nunc laciniata, & parùm in ambitu incisa. **Bey Königsberg passim.**

LVII. Atriplex sylvestris prima, Matth. deutsch fol. 158. Atriplex sylvestris Polygoni aut Helxines foliis, Lob. ic. 257. Atriplex sylvestris Polygoni folio, Cam. pag. 24. Atriplex sylvestris humillima, Dod. lateinisched 615. **Kleine wilde Purpur-Mülde.** Foliis est crassis, succulentis, seminibns in folliculis

culis herbaceis. Semen ictericos juvat. **Beym Altstädtischen Wall nicht weit vom Baum.**

LVIII. Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio, C. B. Pin. 119. Blitum s. & Atrolicis sylv. genus, Trag. Sebitz. in Trag. 568. Chenopodium 2. Tab. lib. 2. fol. 136. Breitblättriger Piñer / Gänse-Fuß / oder Säwtodt. Sues interimit, Tab. Bey Königsberg passim.

LIX. Balsamine lutea, seu, Noli me tangere, C.B. Pin. 306. Mercurialis sylvestris altera, Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch 152. Tithymalus sylvestris, Lon. Deutsch fol. 130. Noli me tangere, Gesn. hort. fol. 268. Cam. pag. 106. Tab. lib. 2. fol. 540. Persicaria siliquosa, sive noli me tangere, Lob. ic. 318. Persicaria siliquosa Lœbelii Cam. pag. 122. Impatiens herba Dod. lateinisch fol. 659. Catanance altera, Cæl. lib. 6. cap. 68. pag. 266. **Springsaamenkraut / Springkraut / Waldwolfs-Milch / Hirschmalde / Borussis.**

Rustici hâc plantulâ æstivô tempore aucupium instituunt, & attagenes herbâ allectos tendiculis suis illaqueant. **Hinter dem alten Hammer / in locis umbrosis.**

LX. Barba capræ floribus compactis, C. B. Pin. 164. Barbula caprina prior, Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch 224. Barba caprina i. Lon. Deutsch fol. 127. Barbicapra & Ullmaria vulgi, Lob. ic. p. 711. Adv. Lob. fol. 318. Regina prati, Dod. lateinisch fol. 57. Pann. pag. 699. Clus. hist. libr. 6. fol. 198. Cam. pag. 182. Tab. lib. 2. fol. 452. Argentilla major, Thal. p. 5. **Greißbart / Wurmkraut / Meedesüß Boruf. Jlmowna Pol. Bey Königsberg in pratis passim.**

LXI. Bellis sylvestris caule folioso major, C. B. Pin. 261. Oculus bovis, Brunf. tom. i. fol. 259. Buphtalmum majus, Lon. Deutsch fol. 120. Bellis major, Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch

deutsch 114. Matth. deutsch fol. 388. Fuchs. fol. 148. Dod. lateinisch fol. 265. Cæs. lib. 12. cap. 26. fol. 494. Cam. p. 27. Lob. ic. 478. Bellis sylvestris major, Gesn. hort. 250. Bellium majus, Tab. lib. 2. fol. 45. Große Gänseblum / S. Johansblum / grosse Maßlieben oder Zeitlosen. S. Iana glowka Pol. Hinter dem Königsbergschen Wall in locis arenosis passim.

LXII. Bellis sylvestris minor. C. B. Pin. 261. Primula veris Cæs. lib. 2. c. 26. pag. 493. Bellis minor Bauh. in Matth. fol. 654. Bellis minor sylvestris, Fuchs. fol. 147. Gesn. hort. 250. Tab. lib. 2. fol. 43. Kleine wilde Maßlieben / oder Zeitlosen Stoikroc, Pol. Beym Oberteich in locis palustribus.

Plantula hæc experimentum singulare est, ubi quis medios inter aestus, siti exagitatus, aquam frigidam $\alpha\mu\sigma\varsigma\pi\eta$ $\alpha\pi\nu\epsilon\sigma\varsigma\pi$, h. e. raptim ductimq; sineq; interrespiratione hau sit, viperibus damno inæstimabili inde attracto. Hoc casu bellidis folia emundata, & cum olivo, aceto & pauxillo salis, in acetarium componat, totam miscellam ingerat bibo. Quâ sumptâ præsentaneum auxilium visceribus à tono dejectis accessurum brevi cognoscet spatio. Remedium hoc tanto in honore habuit Mindererus de Medic. militari, c. 2. p. 71. & seqq. ut seriò svadeat, valvis foribusq; in universum omnibus, publicis & privatis, id affirmandum esse, quod messores miseri, hemerodromi, & hujus gentilitatis plures, scirent, se malo pressos ab interitu vindicare.

LXIII. Bellis lutea foliis profundè incisis major, C. B. Pin. 262. Bellis major lutea, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 114. Chrysanthemum, Dod. lateinisch fol. 263. Chrysanthemum folio virentiore, & plures divisuras habente, Camp. hort. pag. 41. Chrysanthemum segetum folio multisciesso, Adv. Lob. 237. Chrysanthemum segetum, Lob. ic.

pag.

pag. 552. Chrysanthemum arvense, Tab. lib. I. fol. 454. Grosse gelbe Maßlieben mit tieff zerschnittenen Blättern. Steatomata floribus dissolvit, & dolores sistit podagricos. Nach Lauten inter segetes. In hortum translatum foliis floribusq; oppidò luxuriat.

LXIV. Betonica purpurea, C. B. Pin. pag. 235. Betonica. Brunf. tom. I. fol. 88. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 157. Bauh. in Matth. fol. 672. Fuchs. fol. 350. Dod. lateinisch fol. 40. Gesn. hort. fol. 250. Lob. ic. pag. 532. Cæs. lib. II. cap. 21. pag. 444. Thal. pag. 19. Tab. lib. 2. fol. 245. Betonica vulgaris, Clus. hist. lib. 4. fol. 39. Vetonica, Cord. in Diosc. fol. 61. Cord. hist. fol. 165 Braun Betonien. Potenge Nostratib⁹. Bukwika Brunatna, Pol. Duplex est: altera spicâ breviore, altera longiore. Bey Straubek copiosè. Beym Penarischen Walde/ Item in pratis editioribus passim.

Betonica omnium efficacissima, Ole 30 II visitante: flores colligendi sole sextum vel decimum gradum occupaturo.

LXV. Betonica alba, C. B. Pin. pag. 235. Brunf. tom. 3. fol. 180. Tab. lib. 2. fol. 245. Betonica albo flore, Dod. lateinisch fol. 39. Clus. Pann. pag. 598. Clus. hist. lib. 4. fol. 38. Cam. hort. pag. 28. Betonica candida, Trag. Kyber. in Trag. lateinisch 197. Vetonica alba, Cord. hist. fol. 165. Weiß Betonien. Bukwika Biala, Pol. Hinter Fischhausen im Rosenpusch.

LXVI. Betula virgulis erectis, Joh. Lœsel. Gemeine Birck. passim. Folia calefaciunt, siccant, resolvunt, attenuant, abstergent & aperiunt. Cortex bituminosus emollit ac discutit. Ex foliis pingviter succosis propolis apum exstruitur, & ablactantium tergo imposita lactis ubertatem disturbat, & in arthritis humores crucios egregiè discutit. Folia

betulæ, antequam vergente autumno decidua sunt, marcida ac vieta, luteo ex marcore jam contracto colore, si diutius in arbore hæreant, hyemem promittunt conclamati frigoris. Res hæc ad trutinam experientiæ ulterius vocetur, quod constet, utrum rusticorum standum sit effatis.

LXVII. *Betula pendulis virgulifera*, Joh. Lœsel. *Betula*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 881. Lob. ic. p. 190. Dod. lateinisch fol. 839. *Hangelbirke*. Zu Gladau aufm Berge & alibi passim.

Caudex arboris Martio mense sauciatus dulcem reddit aquam, facile in acorem abeuntem. Diuretica est, ac lithontriptica, sanatq; icterum. Refrigerat acore contracto. Destillata omnem amittit gratiam, unde cocta potius cum succo citri miscetur. *Birken-Wasser*. Sunt autem audaculi satis rustici nostrates in betulis promiscuè vulnerandis, liquoris causa, nescientes capitale olim fuisse supplicium arbores alienas incidere, juxta Servium ad illud Virgilij: atq; malâ vites incidere falce novellas. Plinius hist. natur. lib. XVIII. c. i. Fuit & arboruni cura legibus priscis, cautumq; è XII tabulis, ut qui injuria cecidisset alienas, lueret in singulas æris XXV. Virgæ accensæ, & in pelvim positæ succum fundunt pinguitudine oculorum albugines & cicatrices emaculantem, Lob. in Obs. Dum gemmat arbor, nonnulli gemmulas leetas & siccatas in pollinem agunt, emplastrum confecturi; arthriticas cruciabilitates frangens. Ex foliis colorem elicunt pictores, *Schüttgelb* dictum, hoc modò: Folia tenera ac minuscula adhuc, in aheno affusâ aquâ per horam ac diutius decoquunt, mox aliquantulo cretæ, in porphyrite pistilli circumactu comminutæ, & aluminis addito, iterum coquunt & colatum decoctum in fistili asservant, ut subsidat spissius.

Id

Id paulò post, abjectâ aquâ, in umbrâ exsiccant, & usui servant. Dum coquitur materies, spathâ δοκιμασῃ sæpe pauxillum ejus frusto cretæ immittitur, & plus cretæ addit, dilucior si expetatur flavedo. Stymma incolo reliquum tritum, ex fusco flavum suppeditat colorem.

Eadem folia absque cretâ decocta pauxillo alumine juncto, colorem alium pictoribus conferunt, quem **Gutgrün** nuncupant.

Axungiam quoq; betula fundit, quam vulgo *dagget* nominant. Eâ saucia ac phthiriasi infestata pecora unguntur à veterinariis. Plebs infantorum umbilico eam immittit, cum vermiculantur, quin & aliquot guttas internè propinat. Cortex molâ confractus cerdonum materies est, **Loh** dicta, coriis præparandis destinata. Betula terribilis erat Magistratum virgis: nam fasces olim ex eâ constabant. Cur autem Magistratum virgæ sint colligatæ, appendentibus & securibus, hanc reddit causam Plutarchus quæstionum Romanarum 82. quia vitia alia sunt sanabilia, alia insanabilia: virgæ eos corrigan, qui in melius mutari possunt, secures præcidunt id, quod corrigi non potest.

LXVIII. *Betula pumila.* Joh. Lœsel. **Kleine niedrige Birke.** Cubitalis & productior sæpe est, foliis subrotundis, julis crassis & curtis. **Im Gebrüch bey Lautenmühl.**

LXIX. *Bistorta major* radice minus intorta, C. B. Pin. 192. *Colubrina* & *Dracunculus major*, Brunf. tom. 1. fol. 64. *Bistorta major*, Trag. Sebitz. in Trag. german. fol. 253. Thal. pag. 19. Tab. lib. 2. fol. 143. Clus. hist. libr. 4. fol. 69. *Bistorta Cord.* hist. fol. 87. Bauh. in Matth. fol. 674. Dod. lateinischi fol. 333. Cæl. lib. 4. cap. 23. fol. 167. *Bistorta Britannica*, Lob. ic. pag. 292. *Colubrina Lon.* Deutsch fol. 132.

Limonium, Gesn. hort. fol. 265. Große Schlangen- oder Naturwurz.

LXX. Blitum polyspermon à seminis copiâ, C. B. Pin. 118. Blitum 3. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 568. Blitum sylvestre, Cam. in Matth. 134. Polyspermon, Lob. ic. pag. 256. Tab. lib. 2. fol. 506. Blitum polyspermum, Bauh. in Matth. fol. 358. Vielsamen / Fischmolde / wilder Meyer.

Est piscibus gratissima esca. In simetis & pingvioribus locis majus in siccioribus minus conspicitur. Iconismus verior apud Lobelium & Cam. in Matth. Braunius qui alteram Tabernæmontani partem edi accuravit, Polyspermon hoc Dioscoridis vel Tragi Lithospermum esse falso existimat.

LXXI. Blitum rubrum majus, C. B. Pin. 118. Blitum rubeum, Bauh. in Matth. 357. Blitum rubrum, Lob. ic. p. 249. Adv. Lob. fol. 94. Cam. hort. pag. 29. Cæl. lib. 4. cap. 26. pag. 161. Blitum rubens, Dod. lateinisch. fol. 617. Blitum Tab. lib. 2. fol. 141. Lob. Observ. fol. 125. Grosser rother Meyer / Blutkraut. Vulgus semine ruffo utitur in dysenteria, & mensium immoderato fluxu, Tab.

LXXII. Blitum rubrum minus. C. B. Pin. p. 118. Blitum nigrum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 567. Blitum sylvestre rubrum, Gesn. hort. fol. 250. Blitum rubrum supinum, Lob. ic. p. 250. Blitum alterum sylvestre. Cæl. lib. 4. cap. 26. pag. 161. Kleiner liegender rother Meyer.

Craspis & succulentis est foliis, sinuatis, pronâ parte virentibus, supinâ albicantibus: caulis humi jacentibus, rotundis & viridibus, & rubicundis insignitis. Sæpe etiam prorsus rufescunt caules, quandoq; & folia, cum racemoso semine. Nach dem Bleichgarten bey der Hospital-Wiesen in simetis.

B: campesina
 LXXIII. *Brassica campestris* perfoliata flore luteo. Joh. Lœsel. *Brassica sylvestris* perfoliata, Dod. lateinisch 626. Perfoliata altera, Trag. Kyb. in Trag. pag. 483. Perfoliata minor, Gesn. hort. fol. 271. *Brassica campestris* i. Clus. Hisp. p. 409. Clus. hist. lib. 5. fol. 127. Perfoliata *Napifolia* Anglorum siliquosa, Lob. ic. 396. Perfoliata siliquosa, Adv. Lob. 172. obs. Lob. 215. Perfoliata *Napifolia*, Tab. lib. 2. fol. 433. *Brassica campestris* perfoliata flore albō, C. B. Pin. 112. Gelber Durchwachs mit Steckrüben-Blättern. Kapusta Ptonna, Pol. Inter segetes passim. Provenit apud nos flore luteo.

LXXIV. *Brassica sylvestris* foliis circa radicem cichoraceis C. B. Pin. 112. *Brassica sylvestris* virgata, Cord. hist. fol. 96. *Brassica Sylvestris* major latifolia, Thal. pag. 16. Wiezyczki, Polonis. Ad viarum margines sæpe.

LXXV. *Bryonia alba* baccis nigris, C. B. Pin. 297. *Bryonia nigra*, Dod. lateinisch fol. 399. Cord. hist. fol. 116. *Vitis nigra*, Cord. in Diosc. 76. Hundeskürbs / Hundesräben / schwarze Teuffelskirschen. Ad sepes hortorum bey Lautenmühl; item bey dem Brandenburgischen Schloß.

LXXVI. *Buglossum vulgare*, Bauh. in Matth. fol. 825. *Buglossa vulgaris*, Tab. lib. 2. fol. 128. *Buglossum angustifolium majus*, C. B. Pin. pag. 256. *Buglossa*, Cæs. lib. II. cap. 2. p. 432. *Buglossa Italica*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 186. Lon. deutsch fol. 176. *Buglossa longifolia*, Card. hist. 135. *Cirsium Italicum*, Fuchs. fol. 343. *Echium Italicum spinosum*, Fuchs. ic. 196. *Anchusa Alcibiadion*, Dod. lateinisch fol. 629. *Buglossum vulgare angustifolium*, Adv. Lob. fol. 246. *Buglossum Italicum*, & *Hispanicum grande*, Cam. hort. 30. *Buglossum Italicum* flore cæruleo. Eystett. Grosse schmal-blättrige gemeine Ochsenzunge. Wołowy Język, Pol. Bey

Königsberg passim in locis campestribus & sabulosis. Flos interdum totus rubet.

LXXVII. Buglossum sylvestre flore albo. Joh. Lœsel.
Bey Kragau in districtu Fischhusiensi, item bey Holland.

LXXVIII. Buglossum sylvestre minus alterum & asperius C. B. Pin. 256. Buglossa sylvestris Trag. Sebitz. in Trag. fol. 188. Anchusa minima Cord. hist. fol. 93. Lycopsis, Lon. deutsch fol. 176. Waldochsenzung. In agris cultis sæpe reperitur flore cyaneo. Radix vulneribus medetur. Trag. & Lon.

LXXIX. Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus, C.B. Pin. 257. Alysson germanicum Echoïdes. Lob. ic. p. 803. Aparine major Plinij, Tab. lib. 2. fol. 467. Buglossæ sylvestris species, Thal. pag. 19. Crucialis quædam, Cæs. lib. 8. cap. 12. pag. 325. Asperugo spuria, Dod. Niederländisch / fol. 578. Wilde Dchsenzunge mit liegenden Stengeliu/Schlangenäuglein. Am Kneiphöfischen Wall passim.

LXXX. Bursa pastoris major folio sinuato, C. B. Pin. 108. Bursa pastoris major, Brunf. tom. 3. fol. 30, Trag. Sebitz. in Trag. fol. 171. Gesn. hort. fol. 251. Bursa pastoris, Matth. deutsch fol. 213. Adv. Lob. fol. 76. Lob. ic. p. 221. Lon. deutsch 168. Thal. pag. 20. Cæs. lib. 8. cap. 74. pag. 365. Pastorina bursa, Fuchs. fol. 611. Dod. lateinisch fol. 103. Bursa Pastoris major, Tab. lib. 1. fol. 632. Gross Deschelkraut / Hirtentasch Hirtenseckel / Seckelkraut. Tobotky Pol. Bey Königsberg passim in locis arenosis.

Bursa pastoris manibus contrectata vel pedibus conculcata, ut incalescat, narium hæmorrhogiam certò sistere dicitur. Verior medela hæc: è gradibus gemoniarum scalarum ligneolum latum, quò signo erecto altrinsecus affirmantur gradus (das Verzwicthölzlein) eximatur, sanguine stillantium narium

rium cruentetur, & inversum in locum pristinum deferatur, tudide id fortiter impellendo. Remedio hoc hæmorrhagiæ tolli, deprehenditur experimento. Bursæ pastoris sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. 49. efficacissima est.

LXXXI. Bursa pastoris minor loculo oblongo, C. B. Pin. 108. Bursa pastoris sexta, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 172. Paronychia Alsinefolia, Lob. ic. pag. 469. Paronychia vulgaris, Dod. lateinisch. fol. 112. Humilis herba affinis Bursæ pastoris, Cæs. lib. 8. cap. 75. pag. 366. Thlaspios minima species, Thal. pag. 122. Alsine minima, Tab. lib. 2, fol. 382. Gänseblüm / Brunf. lateinisch tom. 2. fol. 34. Klein Teschel- Kraut mit langlächtigen Schöttlein Zanokcica, Pol. Primo prodit vere in locis arenosis & sabulosis circa Regiomontum passim.

LXXXII. Calamintha arvensis verticillata, C. B. Pin. 229. Nepeta agrestis, vel 4. Trag. Kyber. in Trag. p. 17. Calamintha aquatica, Matth. Bauh. in Matth. 529. Calamintha aquatica Belgarum & Matthioli, Lob. ic. 595. Pulegium agreste officinarum, Lob. Obs. fol. 270. Calaminthæ secundum genus Fuchs. fol. 435. Calamintha arvensis, Gesn. hort. fol. 251. Tab. lib. 2. fol. 68. Nepeta Lon. deutsch fol. 142. Ackermünz / Kornmünz / wilde Poley. Grati & acris est odoris. Tenuium est partium, incidendo & abstergendo infarctus omnes expedit, urinas ac menses expellit, regium morbum & asthma expugnat. Bey Königsberg passim.

LXXXIII. Caltha palustris flore simplici, C. B. Pin. 176. Caltha Virgilii, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 113. Tus- silago altera, sive farfugium, Bauh. in Matth. fol. 616. Chelidonia palustris, Cord. hist. 122. Caltha palustris, Gesn. hort. fol. 251. Dod. lateinisch, fol. 598. Lob. ic. pag. 594. Cam. hort.

hort. pag. 33. Caltha palustris vulgaris, Clus. hist. lib. 5. fol. 114. Chrysanthemum, Lon. deutsch. fol. 119. Epimedium Dodonæi pag. 42. Populago, Tab. lib. 2. fol 422. Goldwiesen Blum / Schmalzblum / Moosblum / Mottblum / Gelbwiesen Blum / oder Dotterblum / Kuhbluhmen Nostratibus, Kniec' Pol.

Mense Majo in pratis copiosissimè. Prudentius lib. Catemerin. hymn. V. Caltha dixit numero plurium, eaq; vocat pingvia.

Ilici purpureis tecta rosariis

*Omnis fragrat humus, calthaq; pingvia
Et molles violas, &c.*

LXXXIV. Campanula vulgarior foliis urticæ, vel major & asperior. C. B. Pin. 94. Uvularia major. Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 727. Campanula, Fuchs. fol. 432. Cervicaria, Lon. deutsch fol. 206. Cervicaria major, Dod. lateinisch fol. 164. Cervicaria major secunda, Tab. lib. 2. fol. 121. Trachelion, Cervicaria & Uvularia Tragi & Herbariorum Lob. ic. 326. Trachelium foliis urticæ, Clus. Pann. pag. 687. Trachelium vulgare, Clus. hist. lib. 5. fol. 170. Archangelica, Cæs. lib. 9. cap. 29. pag. 386. Rapi sylvestris genus foliis ferè urticæ, Ges. hort. 276. Cervicaria maxima Thal. pag. 32. *Ge mein Näßelblättericht scharffes Halskraut.* Semel etiam trachelium hoc viri longitudine reperi. Nach dem Penartischen Walde zu. Caulis eodem tempore mihi idem præstabat, qvod Nasos vel farcta militibus. Siccatur, refrigeratur, abstergit solidat & adstringit. In ulceribus & inflammationibus faucium, casu uvulae, tonsillarum tumore, gargarismatu celebris. In locis montosis bey Königsberg.

LXXXV. Campanula vulgaris μονόχλωρη foliis urticæ

ticæ flore candido. Joh. Lœf. *Nesselblättericht Halskraut*
mit weißer Blüth. Priori assimilis, sed unicaulis. *Hinter*
Lattenwald im Gebirg.

LXXXVI. *Campanula pratensis* flore conglomerato
C. B. Pin. 94. *Uvularia exigua*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch
727. *Rapi sylv. genus*, *Uvularia in pratis*, Gesn. hort. 276.
Trachelium minus, Lob. ic. pag. 326. Adv. Lob. 139. Clus.
hist. lib. 5. fol. 171. *Cervicaria tertia*, sive minor, Dod. la-
teinisch 165. *Klein Halskraut mit deicht an einander gesetz-
ten Blumen. In der Hollen-Grund.*

Flores vel in summitate caulis in orbem sunt congesti,
vel singulares per caulem sparsi. Bracchiata adeò nonnun-
quam est, ut sedecim in uno caule notārim ramos, floribus
calathyformibus onustos. *Bey Lautenmühl in locis arenosis.*

LXXXVII. *Campanula oblongifolia* flore cæruleo
in summis caulinis, Joh. Lœf. *Blaue Glockenblum mit*
*länglichen Blättern/ dessen Blümlein auf den obersten Sten-
geln. Vid. Num. 418. Bey Penardschen Wald. Floret mense*
Junio & Julio.

LXXXVIII. *Campanula oblongifolia* flore albo in
summis caulinis. Joh. Lœsel. *Weisse Glockenblum mit*
*länglichen Blättern/ dessen Blümlein auf den obersten Sten-
geln. Bey Cumainen in locis montosis & umbrosis. Flo-
ret mense Junio.*

LXXXIX. *Cannabis erratica* C. B. Pin. pag. 320. *Can-
nabis fœmella* Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 279. *Cannabis*
erratica paludosa sylv. Lob. ic. 526. Adv. Lob. 227. Obs. Lob.
284. *Cannabis sterilis*, Dod. lateinisch fol. 535. *Wilder Hanff.*
*Am Kneiphöfischen Wall copiosissimè. Cannabis hujus er-
raticæ decoctum cimices necat. Cannabina aquatica folio*

tripartito diviso C.B. Pin. Hepatorium aquaticum Dod. verbenä supina vel. 3. Trag. Sebitz. in Trag. Bidens foliis tripartito divisis Cæs. Conyza palustris foliis tripartito divisis. J.L. **Wasserdürwurz mit tieff zerschnittenen Blättern.**

Plantula est vulneraria, sed à nostris chirurgis negligitur. In humidis & squalidis passim exit. Floret Jul. & Aug.

XC. Carduus in avenâ proveniens, C. B. Pin. 377. Carduus syl. in avenâ Trag. Sebitz. in Trag. 674. Carduus avenarius Thal. pag. 34. Carduus arvensis Tab. lib. 2. fol. 375. **Ackerdistel / Haberdistel.** Osat Pawloczwy, Pol. Flosculis est purpureis. Inter segetes passim.

XCI. Carduus lanceolatus, Tab. lib. 2. fol. 374. Carduus lanceatus latifolius C. B. Pin. 385. Breitblätterig **Speerdistel.** Secus vias sèpissimè reperitur.

corpus. L.S.
XII. *Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris, C. B. Pin. 385. Agriacantha, Ruel. fol. 18. lin. 9. Carduus sylvestris tertius, Dod. lateinisch fol. 740. Carduus spinosissimus vulgaris. Polycantha Theophrasti, Lob. ic. 21, o. Aculeosa Gazæ, Adv. Lob. fol. 374. Polyacantha Theophrasti Tab. lib. 2. fol. 376. **Wielstachlichte Ackerdistel mit schmalen Blättern/ klein Wegdistel/ wilde sehr stehende Distel.** Passim.

„ Radix ex numerosis filamentis, crassis, longis, rotundis,
„ fibratis, albis, constituta, caulem emittit digitæ crassitie,
„ bicubitalem, viridem, striatum, quinis locis fimbriatum,
„ aculeatum, strenuè brachiatum, concavum: folia in solo
„ humidiore luxuriantia, ac terræ proxima, duodecim un-
„ cias longa sunt, tres lata, in ambitu profunde satis incisa
„ hirsuta, pronâ parte atrovirentia, supinâ cum lanugine
„ pallentia: ramulorum singulorum exortui subservit folium
„ spinosum, cuius generis alia ex intervallo exadversum ra-
mulis

mulis assistunt folia, minus profundè in circuitu secta ac
hirta: flores ramulorum apicibus inhærent purpurei, ex
concurso capitulorum squamosorum trium, quatuor, quin-
que vel sex interdum glomerati, tractu ætatis in pappos abe-
untes: semen oblongum & album est pappis remotis.

XCIII. Carduus spinosissimus angustifolius pratensis. *videtur saltem*
Joh. Lœl. Vielstachlichte Wiesen-Distel mit schmalen Blättern. *Cardui spinosissimi*
gustifolij vulg. *Cin. 385.*
 Diversitas est in hoc carduo ratione ætatis. Qui an-
 nosa est radice, unicaulis særissimè visitur, raro multicau-
 lis, quatuor ulnarum proceritate, crassitie unciali, & quod
 excedit. Thrysus est egregiè striatus, quibusdam in locis
 fimbriatus, foris viridis, quandoq; atrorubens, spinis hor-
 ridus, intus concavus, in fastigio ramosus, floribus purpu-
 reis congestis, in pappos dilapsis, oppidò luxurians. Fo-
 lia proximè terram majora sunt, profundius incisa, aculeata,
 hirsuta, queis inordinate disposita, succedunt folia, cauli
 adhærentia, ex nigro viridia, carduo lanceolato effigie pro-
 xima, aversâ parte lanugine tecta. Radix ex multis fila-
 mentis rotundis, crassis & candidis constituta, sapore est
 aromatico, modicè adstringente & siccante. Tenerior ra-
 dice carduus, ætate majori cedens, ramulorum ferè expers
 est, foliis paucioribus, ad nervum usq; Jaceæ instar, pro-
 fundissimè dissectis, quorum infima intrinsecus dilutè vi-
 ridia & minora. Seminis figura rotunda. *In der Hollen-*
Grund hinter der Bleich auf der Wiese.

XCIV. Carlina acaulos magno flore, C.B.Pin. 380. *Eber-*
wurz / Brunf. deutsch fol. 218. Chamæleon albus, Bauh. in-
 Matth. fol. 490. Cord. in Diosc. fol. 50. Cerdopatium caule
 nullo, Gesn. hort. 251. Carlina herbariorum, Lob. Obs.
 fol. 479. Chamæleon albus Dioscoridis, Lob. ic. 4. o.

Clus. histor. lib. 5. fol. 155. Carlina altera, Dod. lateinisch fol. 727. Carlina vulgo, Cæs. lib. 13. cap. 38. pag. 527. Carlina sessili flore *ἄναυλος*. Cam. hort. 35. Weisse ohnstängliche Eberwurz. Osetek Pol. Sudo cœlo floris capitulum hiscit, ac patulum perstat, imbrico ac pluvio clauditur. Partium est tenuium, sudores movet, jecoris ac lienis obstrukiones solvit, saccatum humorem mensesq; citat, ac latas interaneorum tineas expellit. In der Österodischen Heyde hinter dem Schling gegen Werlitten (pagus est) über. Floret circa finem Julii.

XCV. Carum. Bauh. in Matth. fol. 553. Cord. in Diosc. fol. 54. Lob. ic. pag. 724. Dod. lateinisch fol. 299. Tab. lib. 1. fol. 171. Cuminum pratense, carui officinarum, C. B. Pin. 158. Caros, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 361. Carus, Caros, vulgo carui, Gesn. hort. fol. 251. Careum, Fuchs. ic. pag. 224. Carui, Lon. deutsch fol. 260. Cæs. lib. 7. cap. 25. pag. 291. Thal. p. 28. Wiesenkümmel. Kmin pólny. Pol. Calefaeit & siccatur, aperit, incidit, digerit, concoquit & dissolvit. Radix pastinacæ instar edulis est, apris admodum expedita. In pratis & campestribus pingvibus. Zu Langkayn & Wiesdehleben / in Districtu Gerdaviensi aliquot modii saepe colliguntur seminis.

XCVI. Caryophyllata vulgaris, C. B. Pin. pag. 321. Garyophyllata, Burnf. lateinisch tom. 3. fol. 24. Trag. Kyber. in Trag. 67. Lon. deutsch fol. 156. Caryophyllata Matth. Bauh. in Matth. fol. 697. Dod. Niederländisch 198. Tab. lib. 1. fol. 403. Caryophyllata vulgaris, Cam. hort. 35. Clus. hist. lib. 5. 102. Vulgaris Caryophyllata, Lob. ic. pag. 693. Adv. Lob. 309. Caryophyllata seu benedicta herba, Thal. 28. Benedicta Gesn. hort. fol. 250. Gariofilata, Cæs. lib. 14. c. 12. pag. 550. Benedictenwurz / Benedictenkraut / Mardenwurz /

Ha-

Nº 6 ad pag 37



Caryophyllata
flosculis elegantiissimis. prolifera.

Hasenauge / Heyl aller Welt. In der Hollen Grund passim.

Radix Caryophyllatae eruatur Olei I. & occupante: flores, Ole 30. II inhabitante. Caryophyllatae & hyperici radices taffetto insutæ, & collo appensa, melancholiam avertunt, memoriam & oculorum aciem firmant, & catharros absument. Radices effodiantur, Sole I. & tenente: taffetto vel sindoni includantur, Ole 15. X inhabitante: collo appendantur, Ole I. & occupante.

XCVII. *Caryophyllata aquatica* nutante flore, C. B. Pin. 321. Benedicta sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch 412. Geum rivale, Gesn. hort. fol. 260. *Caryophyllata septentrionalium* rotundifolia papposo flore, Lob. ic. 694. Adv. Lob. 309. *Caryophyllata montana* Dalechampii, Eystett. *Caryophyllata montana prima* Clus. Pann. pag. 434. Clus. hist. lib. 5. fol. 103. *Caryophyllata palustris major seu purpurea*, Thal. pag. 28. *Caryophyllata palustris*, Cam. hort. pag. 36. *Wasser-Benedicten Wurzel/ Wald-Benedicten Wurz mit hangender Blüth.* In locis uliginosis bey Königsb. passim.

XCVIII.**Caryophyllata prolifera* flosculis elegantissimis Joh. Lœs. *Fruchtbar Benedicten Wurz mit herrlicher Blüth.* Planta est cubitalis ferè, quandoq; minor caule sub-“ hirsuto foliis circa radicem majusculis, *Caryophyllatae mon-*“ *tanæ æmulis*: flosculos fert sedecim, quandoq; pauciores,“ qui è tenui origine sensim producti dilatantur & in summita-“ te crenatâ conspicuntur. Flores hi caulem ambient susten-“ tati à foliolis octo vel duodecim. Caulis è medio flosculo-“ rum ulterius progrediens iterum flosculis ornatur, foliolis “ proximè subvectis. Radice nititur longiusculâ foris subrufâ “ ac filamentis suis instructâ. *Zu Birkenfeld.* Item in Schacken.

Caryophyllata hæc καλλιπυξη benè dici potest, h. e.

pulchrè turrita, cùm florem turris instar extrudat. Vocanda est ex agro in urbem ob florū elegantiam, veluti puellæ illæ rusticānæ καλλίπυγοι dictæ, ob natum pulchritudinem in urbem accersebantur, de quibus hæc memoriæ proditur historia: Rustici viri formosæ duæ filiæ in publicam viam egressæ, ambitiosius inter se decertabant, utri pulchriores natæ essent. Prætereunti juveni, cuius pater senior erat, inspi ciendas se ambæ obtulerunt. Utramq; ille conspicatus, natu majoris pulchriores esse judicavit, & ejus amore captus est. Reversus in urbem, cum æger decubuisse, juniori fratri exposuit, quod acciderat. Rus ille profectus, & puellas contutus, alteram amavit. Juvenum pater cum instaret, ut splendidius matrimonium sibi quærerent, idq; persuadere non posset, puellarum non invito parente, illas evocat ex agro, & cum filiis collocat. Eas cives καλλίπυγες, natibus & clunibus pulchras vocârunt, & eo nomine templum Veneri, quam & Callipygon nominârunt, exstruxerunt. Cæterum inter laudes mulierum etiam fuere olim καλλιπλόκα μοι καλλισφυξοι: inter vitia, compernis, vulgo, valga extritus talus, crura exiliora. Quibus erant extriti tali, λαγυσποδιας vocabant, tenuiora crura crotila quasi κωτίλα.

XCIX. Caryophyllum arvensis glaber flore majore, C. B. Pin. pag. 210. Euphrasia gramen, Trag. Kyber. in Trag. 329. Gramen Fuchſ. fol. 136. Gramen Leucanthemum, Dod. Ia: reinisch p. 365. Gramen λευκάνθεμον Dodonæi, Cam. in Matth. fol. 345. Thal. 49. Gramen alterū Bauh. in Matth. fol. 708. Holosteum Diosc. floribus albis, vel ολόσεσν Αeginetæ, Adv. Lob. 17. Holostium Ruellii, Lob. ic. p. 46. Euphrasia major, Lon. Deutsch fol. 133. Gramen floridum Tab. l. i. f. 667. Gramen floridū majus Tab. ic. 232. Unraue Acker Nâglein mit grosser Blüth/ Augen:

No. 7 ad pag. 39.

Cyperus annuus Linn. forma numerosa.



Augentrost · Gras / Teuffelsbluhmen / Brustkraut. Sitna
Trawa, Pol. In sylvis passim.

C. *Caryophyllum arvensis hirsutus* flore majore C. B.
Pin. 210. *Caryophyllum holostius*, Lob. ic. pag. 446. Holos-
tium *Caryophyllæum* Tab. lib. i. fol. 668. Rauge Acker-
Näglein mit grosser Blüth / Weiß Näglein · Gras / Herz-
Replein · Gras. Am Kneiphofischen Wall passim.

CI. *Caryophyllum arvensis hirsutus* flore minore,
Joh. Lœf. *Holostium caryophyllæum arvense*, Tab. lib. i. fol.
668. Rauges weiss Acker-Näglein · Gras mit kleiner Blüth.
NB. Hirsuties apud Tab. desideratur.

CII. *Caryophyllum barbatus sylvestris*, C. B. Pin. 209.
Armeria sylvestris altera, Lob. ic. pag. 448. *Caryophyllæa*
sylvestris prima, Thal. pag. 25. *Flos Gariofilus sylvestris mi-*
nimi floris saturatæ purpuræ, Cæf. lib. 6. c. 45. pag. 253 & 254.
Wilde rothe bartige Näglein / Thiernäglein Nostratibus.
Calyculi ejus cincti sunt foliis fastigiatis. *Flosculi rubei*. Bey
der Walga am Hase. Item bey dem alten Hammer.

CIII. **Caryophyllum arvensis calyculo florum nu-*
meroso. Joh. Lœf. Radice est subnigrâ, aliquantulum fi- “
bratâ, caulinis subasperis, ad genicula foliis duobus tenuis- “
simis, quorum summo insident calyculi florum plures pur- “
purascentes. Convenit ferè cum *Caryophyllo barbato syl-*
vestri C. B. nisi quod hic obtineat folia tenuiora, & calices
florum minus foliis stipatis. Bey Holland in arvis copiosè.

CIV. *Caryophyllum minimus muralis*, C. B. Pin. p.
211. *Tunica minima*, Lugdun. Kleine Maur · oder Weg-
näglein. In sylvis propè vias saepiusculè observatur.

CV. *Caryophyllum plumarius albus*, Tab. ic. pag. 286.
Caryophyllum flore tenuissimè dissecto. C. B. Pin. 209. Su-
perba,

perba. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 459. Lon. deutsch, fol. 218 Superba, Tragi. Thal. pag. 105. Cam. hort. 165. Betonica sylvestris altera, Fuchs. icon. p. 201. Caryophyllæus minor Dod. lateinisch 174. Superba recentiorum, Adv. Lob. 198. Superba alba, medio corolla purpureo-violaceâ obsoletâ cincta Lob. ic. 450. Caryophyllei sylvestris quinta species tertia, Clus. hist. lib. 3. fol. 284. Caryophyllus sylvestris flore, albo picto Eystett. superba alba corolla purpureo-rubra. Swert. florileg. part. 2. fol. 18. Weiß Pflaum-näglein Tab. Hochmuth und Muthwillen / Lon. Feder-Nägelchen Borussis, Svarissimi est odoris. In der Brandenburgischen Heyde copiosè.

CVI. Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius, C. B. Pin. 209. Caryophyllus montanus albus, Tab. ic. pag. 288. Flore est candido, purpurascente, in medio variegato eng-blätterige Waldnäglein / dessen Blüht bald weiß / bald purpurfarb / bald sprenglicht. Weiße wilde Steinnäglein / Tab. Heydnägelchen Nostratibus. In der Brandenburgischen Heyde passim. ¶

CVII. Caryophyllus montanus minor, C. B. Pin. 211. Pseudomoly Dodonæi, Gesn. hort. fol. 268. Gramen polyanthemum minus, Dod. lateinisch, 564. Dod. Niederländisch 896. Gramen marinum minus Clus. Pann. pag. 327. Tab. lib. 1. fol. 664. Caryophyllus marinus omnium minimus. Lob. 452. Adv. Lob. 189: Amerius montanus tenuifolius minor. Clus. hist. lib. 3. fol. 287. Klein Meer-Gras / Tab. See-Gras / Meernäglein / Meer-oder See-Gras-Bluhmen vulgo. Auf der Curischen Nährung zwischen Lattenwald und Kunzen im Gebirge. Floret mense Augusto.

CVIII. Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, seu

seu flosculi C. B. Pin. 210. Flos cuculi pratensis, Trag. Sebitz, in Trag. deutsch 319. Flos cuculi, Lon. deutsch. fol. 207. Tab. lib. 2. fol. 13. Odontitis Plinii, Gesn. hort. fol. 269. Odontis quorundam. Cam. pag. 169. Odontitis Plinii simplici flore, Clus. hist. lib. 3. fol. 292. Armerius sylvestris, Dod. lateinisch fol. 177, Armoraria pratensis sylvestris. Flos cuculi, Lob. ic. 451. Armoraria sylvestris pratensis, Adv. Lob. fol. 189. ξοκαυλος altera, Thal. pag. 59. Gauchblunt. Tab. Lon. Sebitz. in Trag. Guckgucktbluhme Nostratibus. Est & flore albo, In pratis passim bey Königsberg.

CIX. Centaurium minus, C. B. Pin. 278. Centaurea, Brunf. lateinisch. Tom. 3. fol. 125. Cæs. lib. 6. c. 63. pag. 264. Centaurium minus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 140. Bauh. in Matth. fol. 488. Matth. deutsch, fol. 255. Fuchs. fol. 387. Dod. lateinisch 336. Dod. Niederländisch / 541. Cord. in Diosc. fol. 50. Cam. hort. pag. 37. Thal. pag. 26. Centaurium minus flore rubro. Eystett. Centaurium parvum, Lob. Obs. fol. 218. Centaureum minus, Lon. deutsch 117. Klein Tausendgilden / Fuchs. Seb. in Trag. Lon. Gemein Tausendgilden und Erdgall / Matth. deutsch. Fieberkraut / Fieberkraut / Tausendgildenkraut. Aurin vulgo. Laurin Nostratibus.

Calefacit & siccatur, abstergit, attenuat, aperit. Bilem & crassos humores per alvum exigit, menses movet, & alvi tinea pellit. Recens tusa illitu vulnera conglutinat, ulcera purgat, & cicatrice obducit, Diesc.

Ex plantula recente lege artis spiritus maxime igneus elicetur sine additamento. Bem Penartischen Walde. It. bey Mülhausen und Holland copiosissime in agris inculti, praesertim editoribus.

CX. Centaurium minus floribus albis. Joh. Lœsel.

F

Fie-

Fieberkraut mit weissen Blühmen. Rarius occurrit, hortis digna planta.

CXI. *Cerasus avium racemosa*, Lob. ic. 174. o. *Cerasus racemosa*, Adv. Lob. fol. 436. *Pseudoligustrum*, Dod. lat. deutsch fol. 777. *Cerasia racemosa rubra & nigra*, Tab. lib. 3. fol. 695 & 696. *Cerasus avium*, Clus. hist. lib. 1. fol. 65. *Cerasus racemosa sylvestris*, Eystett. An *Cerasus sylvestris*? Cæs. lib. 2. cap. 20. pag. 51. *Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli*, C. B. Pin. 451. *Arbuscula sylvestris Cerasi foliis*, fructu virgæ sangvineæ ferè, Gesn. hort. fol. 248. **Schwarze und rothe Vogel-Kirschen** Tab. *Arbor Borussis Faulbaumi / baccæ Ahlkirschen* dicuntur. Nuclei, qui in ossiculis continentur, cerasi nucleos sapore referunt. Temperatè sunt calidi, & urinam movent, Dod. *Fructus in racemis nigricans etiamsi sit dulcis*, facile tamen nauseam parit. Astringens est & alvum cohibens. Estur à pueris innoxie. **In der Holle**. Grund passim.

CXII. *Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro*, C. B. Pin. 451. *Halimus Trag. Seb. in Trag. deutsch* fol. 780. *Lon. deutsch* fol. 63. *Periclymeno cognatus sylvestris fructus*, Gesn. hort. fol. 271. *Xylosteum*, Dod. lat. deutsch fol. 412. Cam. hort. pag. 183. *Xylosteon*, Dodonæi, Thal. pag. 133. *Periclymenum alterum Allobrogum*, *cornus fœminæ effigie*, Adv. Lob. 280. *Periclymenon Allobrogum*, sive *Periclymenum rectum*, Lob. ic. 633. *Periclymenum rectum fructu rubro*, Clus. Pann. 87. *Periclymenum rectum primum*, Clus. hist. lib. 1. fol. 57. *Periclymenum rectum*. Tab. ic. 899. *Xylostium floribus albis vulgatius*, Eystett. **Auffrichte Waldrinde / oder Zäunling / Tab. Beinhölzen Helvetiis**, Gesn. hort. **Hundskirschen / Teufelskirschen vulgo**. **Bey Brandenburg**

No 8 ad pag. 43.



Chamæcistus vulgaris flore luteo, C.B.

Cistus helianthemum. L.

denburg auff dem Lenzenberge. It. im Neuhausischen Schloß-
graben.

CXIII.* Chamæcistus vulgaris flore luteo. C.B.Pin.465.
Hyssopus campestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 177. Pa-
 nax chironium, sive flos Solis. Bauh. in Matth. 546. Gratia
 Dei. Gesn. hort. 261. Helianthemon Plinii. Clus. Hisp. 153.
Chamæcistus primus. Clus. hist. lib. 1. fol. 73. Flos solis. Dod.
 lateinisch 193. Flos solis Matth. Cam. hort. pag. 61. Helian-
 themum secundum Germanicum Tab. lib. 3. fol. 767. Helian-
 themum, Cord. hist. fol. 89. Lob. ic. pag. 117. o. Helian-
 themum flore luteo, Eystett. Consolida aurea Chirurgis quibus-
 dam, Cord. hist. 89. Hyssopus montanus sive sylvestris, Lon.
 deutsch 150. Chironica, Cæs. lib. 10. cap. 46 pag. 397. Guld-
 den Heylkrant. Heiden- oder Berg-Ysopp/ Lon. Sonnen-
 Blum oder Sonnengünzel/ Tab. Heiden-Ysopp oder Elisa-
 beth-Kraut vulgò. Bey dem Penartischen Walde in locis
 incultis.

Plantula est cubitalis, succulosa, radiculis lignosis, contor-
 tulis sæpè, foris atrorubentibus, intus candidis, fibris pluscu-
 lis: Cauliculis rotundis, virentibus; ætatis tractu rufescenti-
 bus, hirsutis ac nodosis: foliis ad genicula binis majusculis, ob-
 longis, viridibus, hispidis, alia minora sub se habentibus: flos-
 culis croceis, quinq; foliolis, in ambitu leviter crispatis con-
 stantibus, ac in meditullio luteolæ stamina, petiolum ambien-
 tia, foventibus. Vanescens floribus succedit semen mi-
 nutum ac ruffulum, pericarpiis oblongis, triangulis, ternis
 glumis striatis circumdatis, inclusum.

CXIV. Chamædris spuria major altera s. frutescens
 C.B. Pin. 248. Teucrium quartum, Clus. hist. lib. fol. 349.
Teucrium i. vel teucrium majus Pannonicum latifolium, Clus.

Pann. 612. *Susankenfraut / Mutterkraut / Borussis.* Aperit, incidit, abstergit, lotium mensesq; citat, jecur & lienem infra-ctu expedit. In ascensu valli Palæopolitani passim. Decoctum ejus frequentissimi & saluberrimi usus est rusticis fœmellis, in præfocatione uteri.

CXV. *Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Diosc. C. B. Pin. 135. Chamæmelon Leucanthemum Fuchs. fol. 25. Chamæmelum Leucanthemum, Ges. hort. 252. Anthemis vulgarior, sive Chamæmilla, Adv. Lob. 342. Chamomilla 3, & sylv. Trag. Sebitz, in Trag. deutsch 118. Anthemis Cord. in Diosc. fol. 59. Anthemis, sive Chamæmelon. Bauh. in Matth. 649. Chamillen / Brunf. deutsch fol. 136. Chamæmelon Thal. p. 33. Chamæmelon. Tab. lib. 1. fol. 71. Chamilen-Blum Tab. Camillen, Fuchs. Chamillen / Seb. in Trag. Magdt Blum/Haugen Blum/vulgò. Romeo Nostratisbus. Ad sepes hortorum.*

CXVI. *Chamæmelon Fœtidum, C.B. Pin. 135. Cotula fœtida, Gesn. hort. fol. 271. Lon. deutsch. fol. 121. Cam. hort. pag. 49. Eustett. Chamomilla secunda & Sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 118. Cotula alba, Dod. lateinisch 258. Parthenium Fuchs. fol. 583. Adv. Lob. fol. 344. Parthenium Dioscoridis Tab. lib. i fol. 84. Cotula fœtida Parthenii 4. species. Brunf. lateinisch tom. I. fol. 255. Buphthalmū minus, Cord. in Diosc. fol. 60. Cotula fœtida officinarum est Parthenium vel Virginea, Lob ic. 773. Chamæmelum album, seu fœtidum Thal. 33. Cota vulgò, Buphthalmon Diosc. Gall. & Plinij. Cæf. I. 12. c. 23. p. 492. Kröttendill/Tab. Lon. Seb. in Trag. Fuchs. Hundsdill und Hundsbumen Cord. Diosc. Hundromey Borussis. Calefacit, incidit, aperit, sangvinis grumos dissolvit, tineas expellit, ac fœminas præfocatas, ab utero juvat. Jumentis*

tis ac ovibus porrigitur astmate correptis. Cæterum apibus infensa est, fugatq; pulices in loca pulicosa conjecta. Inter segetes passim.

CXVII. Chamæmelon inodorum C. B. Pin. 135. Cotula alba non fœtida. an Melandrium Plinii? Dod. lateinisch. fol. 258. 259. Buphthalmum Fuchs. fol. 144. Buphthalmum majus. Cord. in Diosc. 60. Chamomilla fatua & 4. Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 119. Cotula inodora. Adv. Lob. 345. Cotula, Tab. lib. 1. fol. 86. Kindsaugen oder wilde Chamilen/ und Streich-Blum/ Tab. Kuhdill/ Hundsaug/ Kuhaug Dod. in locis arenosis & fabulosis bey Königsberg.

CXVIII. Chelidonium majus vulgare C. B. Pin. 144. Chelidonium majus Trag. Seb. in Trag. deutsch 82. Matth. deutsch. 246. Dod. lateinisch. fol. 48. Gesn. hort. fol. 252. Fuchs. fol. 865. Cord. in Diosc. 49. Lob. ic. pag. 760. Tab. lib. 1. fol. 122. Cæf. lib. 6. cap. 73. pag. 269. Thal. p. 33. Chelidonium majus. Hirundinaria major. Adv. Lob. 399. Chelidonia (quam hirundo εἰαρή ζεφύρε πρωτάγγελος εγνις, erupturam nunciat) Brunf. lateinisch/ tom. 1. fol. 236: Schelwurz oder Schwalbenkraut. Tab. Groß Schwalbenkraut. Matth. Goldwurz. Dod. Schin-Kraut. Borussis.

Ejus usus insignis est in pluribus morbis, de quibus apud Practicos. Succus verrucas sanat illitus. Difficulter abluitur partes corporis commaculans. Ult Chelidonium manus croceo inficit colore, difficulter abluendo, sic pulvicularius est, argentum absq; hydrargiro verè ac constanter inaurans. Res hæc cum scitu sit digna, eam lectori detegere hic stat sententia. Modus talis est: Auri obryzi, antimonii ope perpurgati, drachmis duab⁹ affunde, vel spirit⁹ salis, pauxillo Spiritus nitri fortificati, vel aquæ Regis, s. q. soluto auro adde salis nitri candi-

dissimi scrupulos quatuor. Eliqvatonitro, linteum purissimum auro soluto iñmitte, quò omnem imbibat tincturam. Imprægnatum mox linteum in tigillum defer, structo carbonum igne circulari, & exure sensim omnia, ut candescant vi ignis, nō liquefcant. Pulveri in fundo relichto in vase vitreo limpidam infunde aquam, & plenè dulcatum & siccatum serva auraturæ. Uſus: pauxillum pulveris humectati alutæ, excipiatur ac deaurando inducatur argento. Bey Königsberg passim. It. an den Zäunen in Gärten. Chelidoniae majoris vis excellens sub elevatione Poli 45. 46. 47. 48. Radix eluenda, Ole in primo ♂ gradu versante: folia colligenda 20. ♂, sole occupante, semen in ultimo ♂ gradu constituto sole.

CXIX. Chelidonia rotundi folia minor. C.B.Pin.309. Chelidonium minus Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch 89. Matth. Deutsch. 248. Cord. in Diosc. fol. 49. Cord. hist. fol. 121. Lon. Deutsch fol. 291. Dod. lateinisch fol. 49. Fuchs. fol. 867. Ges. hort. fol. 252. Tab. lib. 2. fol. 427. Thal. p. 33. Lob. ic. p. 539. Chelidonium minus, sive hirundinaria minor. Adv. Lob. 257. Favagello. Cæs. lib. 14. cap. 7. pag. 546. Feigwarzen-Kraut / klein Schöl-Kraut / Matth. Feigblätter-Eppig Seb. in Trag. Kleine Schelwurz. Lon. Schörbocks-Kraut / Biber-Hödlein / Pfaffen-Hödlein / Blatern-Kraut und Meyen-Kraut vulgo Gefelblum Nostratisbus.

Causticum non est, nec calefacit excessu, ut quidam existimant, cùm inter acetaria sæpiusculè in usum veniat, & omnis acrimoniæ prorsus sit expers. Diversum itaq; est nostrum Chelidonium minus à Chelidonio Veterum, cui Galenus 8. simpl. causticam assignat vim, idq; calidius chelidonio majore pronunciat. Erumpit primo vere, sæpius Martio Mense, quò tempore Rhodiis olim illud medicandi genus

No. 9 ad pag. 47



*Chrysanthemum
folios Tanaceti.*

Anthemis tinctoria. L

nus erat usitatum, *χελιδονίδη* h. e. hirundinare, vel hirundinis nomine stipem rogare, nominabant, ubi acclamabatur:

*Venit tandem, venit hirundo, quæ pulchra
Tempora, & annos adducit pulchros
Albo candida, tergo nigra.*

Tempus hoc etiam illi Leporum generi quos Chelidonios appellabant veteres, nomen dedit. Existimo lepores esse Martio Mense natos, vel captos, quorum sangvis dysentericis perutilis. Circa Regiomontum passim. Item in der Hollen-Grund.

CXX. *Chrysanthemum foliis tanaceti. Joh. Lœsel, *anthemis tenuifolia*. Goldblum mit Reinfahr-Blätterit. est *Buphtalmū Tanacet minoris folij.*

Radix lignosa & fibrosa caulinulos edit rotundos subhirsutos, ramosos: folia multifida tanaceti instar levi hirsutie incana propè terram numerosa, post alternatim caulinulis adhærentia: flores fert aureos in caulum summitatibus velut Chrysanthemum Matth. Bey Landheim circa viam am Berge It. Bey Wiesdehlen am Berge.

CXXI. Cichorium Sylvestre sive officinarum C. B. Pin. 125. Cichorium agreste. Lon. deutsch. fol. 125. Cichorium sylvestre, Picris, Dod. lateinisch. fol. 635. Cichorium, Cord. hist. 141. Tab. lib. 1. fol. 577. Cæf. lib. 13. c. 2. fol. 506. Solsequium Brunf. tom. 3. fol. 94. Intybum agreste Gesn. hort. fol. 262. Intubum sylvestre Fuchs. fol. 679. Seris Sylvestris Picris, Cichorium, Adv. Lob. 82. Seris Picris. Sylvestre Cichorium. Lob. ic. 228. Cichorea sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 216. Intybus erraticus, sive cichorium sylvestre, Matth. deutsch 176. Feldwegwart / Matth. Wegwart. Tab. Brunf. wilde Wegwart. Sebitz. in Trag. Sonnenwirbel und Hundläufft / Lon. Sonnenwend / Sonnenkraut

nen Kraut / und Sonnen Braut vulgò. verfluchte Jungfrau Borussis. Hinter dem Kneiphöfischen Wall. Item zwischen Pinnau und Brandenburg circa vias copiosè.

Caulis cichorii, scrobiculo prius terra erutâ facto , proximè radicem exscindatur , post ictericus radicem lotio perpluat, abscessum caulem in locum natalem componat , ac terrâ iterum obruat, liberandus ab auragine, remedio si sit fidens.

CXXII. Cichorium sylvestre flore albo. Joh. Lœsel. wilder Wegwart mit weissen Blumen. Hinter Morungen circa vias. It. Beym Ritter-Kruse im Walgischen.

CXXIII. Cicutaria palustris latifolia alba. C. B. Pin. 161. Cicutaria palustris , flore candido. Cam. pag. 41. Breitblätteriger Wasser-Schirling / Witscherling / Gerstraut / quia pecora ab ejus usu intumescunt. Gross Wehdendunck Nostratisbus, In locis palustribus bey Königsberg passim.

Pœna legis Corneliae tenebantur pigmentarii, si cui temere cicutam , aconitum & mandragoram dedissent. I. ejusd. ff. ad legem Corneliam de sicariis , & beneficiis. Apud Athenienses publica pœna frequens cicuta , aut venenum erat. Plin. lib. XXV. c. 13. Laertius in Socrate, &c. Antocles & Epicles , postquam magnas Niciæ & Pergasei divitias dilapidâissent , ad paupertatem redacti , vitæ tedium epotâ cicuta finierunt. Attalus Philomator pro oblectamento habuit , cicutam , helleborum & aconitum , venenosasq; herbas plantare , ut fructum inde legeret. Plutarchus in vitâ Demetrii & Justin. lib. 36.

CXXIV. Cicutaria palustris tenuifolia , C. B. Pin. 161. Phellandrium , Dod. lateinis h fol. 591. Cicutaria palustris Lob. ic. 733. Tab. lib. 2, fol. 460. Cicta aquatica Gesn. hort. fol. 253. Cicutaria palustris alia , sive Phellandrium. Cam. 41. Li-

Ligusticum & Phæniculum sylvestre, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 336. Silaus Plinii, Cæs. lib. 67. c. 26. p. 291. Schmalblätteriger Wasserschierling / Tab. Barzenkraut Saxonibus. Gesn. hort. Wilder Liebstöck / Sebitz. in Trag. Klein Wendunck fæmellis. In paludum marginibus passim bey Rönnigsberg.

Vetulæ utuntur herbâ in discutiendis tumoribus, axungiæ porcinæ veteri mistâ.

CXXV. Cistus Ledon foliis rorismarini ferrugineis C. B. Pin. 467. Rosmarinum sylvestre. Dod. niederländisch fol. 437. Matth. Bauh. in Matth. fol. 576. Tab. lib. 3. fol. 772. Ledum Silesiacum, Clus. Pann. pag. 68. Clus. hist. lib. 1. fol. 83. Chamæpeuce, Cord. in Diosc. fol. 71. Cord. hist. fol. III. Ledum foliis Rosmarini alterum. Lob. ic. pag. 124. o. Wilde Rosmarin. Dod. Niederländisch. Porsch Borussis.

Multibibis fœmellis Ledum potandum sæpe offertur temulentiaæ accelerandæ causâ. His svavia danda esse vult Cato. Plin. lib. 14. c. 13. causam addit: Cato ideò propinquis fœmellis osculum dare jussit, ut scirent, an temetum olerent. Rustici Ledum in porcile seu haram congerunt, porcis plhyriasi infestatis. Im Gebrüch bey Schwanis copiosè. Item bey Judenkirch in ericetis uliginosis.

CXXVI. Clinopodium origano simile. C. B. Pin. 224. Clinopodium vulgare, Matth. Bauh. in Matth. 595. Clinopodium majus Matthioli, Cam. hort. 44. Clinopodium 1. Matth. deutsch fol. 337. Clus. Pann. pag. 624. Origanum minus Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 29. Origanum verticillatum Thal. pag. 81. Pulegium montanum Lon. deutsch 146. Clinopodium. Cord. in Diosc. fol. 57. Clinopodium 1. Tab. lib. 2. fol. 69. Clinopodium vel Polycmenum, Gesn. hort.

254. *Acinos*, Lob. ic. 504. *Acynus*, sive *sterilis*, Adv. Lob.
 215. *Wirbeldost*/Matth. Tab. *Klein Wolgemuth*/Seb. in Trag.
Wald-Poley/oder *Berg-Poley* Lon. In der Hollen-Grund.

CXXVII. *Cnicus sylvestris spinosior*, C. B. Pin. 378.
Heracantha, Tab. lib. 2. fol. 372. *Atractylis*, sive *Carthamus sylv.* Trag. Seb. in Trag. deutsch 676. *Cartamus sylv.* Lon. deutsch fol. 100. *Carduus vulg.* Matth. Bauh. in Matth. fol. 497. *Atractylis sylvestris*, seu *Cnici sylvestris species*, Thal. 6. *Atractylis media*, Gesn. hort. fol. 249. *Atractylis mitior* Fuchs. fol. 121. *Cirsium luteum Sequanorum*, Lob. ic. 14. o. *Carlina sylvestris*, Dod. lateinisch 728. *Carlina sylv. vulgaris*, Clus. hist. lib. 5. fol. 156. *Colus rustica*, Cord. in Diosc. fol. 57. *Wilder stachlicher Feld-Saffran* / *Dreumdistel* / und *Schönhaarlein*/Tab. *Dreydistel*. Sebitz. in Trag. *Wilder Feld-Saffran* / Fuchs. *Wilde Stichwurz fæmellis*.

Lixivio decocta pilos nitescere, ac lenes marcescere facit. In locis montanis & aridioribus bey Quednau.

CXXVIII. *Consolida media pratensis coerulea*, C. B. Pin. 260. *Bugula*, Dod. lateinisch fol. 135. Clus. Pann. p. 609. *Guldengünzel*/Brunf. deutsch fol. 90. *Consolida media* Matth. deutsch fol. 402. Fuchs. fol. 391. Eystett. *Sympytum medium* Lon. deutsch 179. *Bugula*, quibusdam *Prunella Obs.* Lob. 252. *Prunella cærulea prior* Trag. Kyber. in Trag. 309. *Consolida media prima*, Tab. lib. 2. fol. 257. *Consolida media major* Thal. pag. 28. *Chamæcisi alterum genus*, Cæl. lib. 11. c. 36. p. 453. *Blau Guldengünzel* / Tab. Matth. Bey dem Penartischen Walde. It. bey Haberstroh.

CXXIX. *Consolida media pratensis purpurea*, C. B. Pin. 260. *Roht Guldengünzel*. Rubris floribus reperta. Bey Haberstroh. Item im Penartischen Walde, ubi flos ex rubro coeruleus fuit,

CXXX.

CXXX. *Consolida regalis arvensis*. C. B. Pin. 142.
 Tab. ic. p. 61. *Consolida regalis*, Brunf. tom. 1. fol. 84.
 Gesn. hort. fol. 255. & 256. *Consolida regalis flore cœruleo*
minore Cam. 46. *Consolida regia*, Trag. Sebitz. in Trag.
deutsch 453. Fuchs. ic. pag. 15. Lon. *deutsch* fol. 217. *Flos re-*
gius 2. vel *sylvestris*, Dod. *lateinisch* 252. *Chamæmelum eran-*
themon, Fuchs. fol. 27. *Segetum consolida regia strigo-*
sior tota, Lob. ic. 739. *Delphinium vulgare*, Clus. hist. lib.
 6. fol. 207. *Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis*, Gesn.
 hort. 256. *Wild Rittersporen* / Tab. *Rittersporen* / Lon.
 Sebitz. in Trag. S. Otilien-Kraut oder Blum / Ritterblum
 und Lerchen-Klaw/vulgò.

Temperata est, siccans cum adstrictione. Vulnera sanat,
 ardores qvarumcunq; partium mitigat, visum acuit, vene-
 nis obſiſtit, calculos atterit, & interaneorum expellit ver-
 mes. Semen viribus haud cedit plantaginis semini, unde
 foriolos juvat & sangvinem reddentes. Eligitur hanc in
 rem flore cœruleo, & sativa. Am Kneiphofischen Wall. It.
 beym Tümpel Krug inter segetes copioſe.

CXXXI. *Convolvulus major albus*. C. B. Pin. 294.
Convolvulus major flore albo, Eystett. *Convolvulus ma-*
jer Gesn. hort. fol. 255. *Smilax lævis vel lenis major*, Lob.
 ic. 619. *Volubilis major*, Trag. Sebitz. in Trag. *deutsch* 634.
 Lon. *deutsch*. fol. 236. Tab. lib. 2. fol. 550. Thal. pag. 131,
Campanula alba sylvestris, Swert. florileg. part. 2. fol. 14.
Helxine cisampelos, Cord. in Diosc. fol. 64. *Smilax lævis*,
 Matth. Bauh. in Matth. 839. Fuchs. fol. 720. *Smilax lævis*
major, Dod. *lateinisch* 392. *Große Winde* Tab. *Groß weiß*
Windglocken/Seb. in Trag. *Groß glatt Winden*/weiß *Win-*
den. *Zaunglocken*/ und *Wackenbraut* / Lon. *In der Hollen-*
Grund.

CXXXII. *Convolvulus minor arvensis*. C. B. Pin. 294.
Volubilis arvensis flore roseo, Tab. lib. 2. fol. 551. *Smilax laevis minor*, Dod. lateinisch fol. 393. *Volubilis minor*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 635. Lon. deutsch fol. 136. Thal. pag. 131. *Helxine in segetibus nascens*, Cord. in Diosc. fol. 64. *Convolvulus minor*, Gesn. hort. fol. 255. Cæs. lib. 9. c. 24. p. 383. Clus. hist. lib. 4. fol. 50. *Helxine Cissampelos*, Matth. Bauh. in Matth. 715. Fuchs. fol. 258. *Convolvulus minor purpureus*, Lob. ic. 619. *kleine winde* Tab. *kleine weiße Acker-winde / oder Glocken* / Sebitz. in Trag. *Weidenwinden / Wein-Gart-winden / Zaun-winden und kleine Glatt-winde* Lon. *Mittel-winde*/ Fuchs. Inter segetes passim.,

CXXXIII. *Convolvulus minor semine triangulo*.
C. B. Pin. 295. *kleine Winde mit dreykantigem Saamien*.
Convolvulo similis herba, Gesn. hort. fol. 255. *Volubilis media*, seu *nigra* Thal. 131. *Orobanche seu Cæstus alter Serapionis*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 527. *Volubilis nigra* Tab. lib. 2. fol. 552. *Helxine Cissampelos altera Atriplicis effigie*, Lob. ic. 624. *Elatine*, Cord. in Diosc. fol. 64. *Convolvulum nigrum*, Dod. lateinisch 396. *Formentone alterum genus* Cæs. lib. 4. cap. 31. pag. 166. *Schwarze Winde / Seb.* in Trag. *Buchwinde*. Tab. *In der Hollen-Grund*.

CXXXIV. *Conyza cœrulea acris*. C. B. Pin. pag. 265. *Dentelaria* Gesn. hort. fol. 256. *Conyza cœrulea* Tab. ic. pag. 861. ubi *hirsuties omissa*. *Erigerum quartum*, Dod. lateinisch, 641. *Conyzæ genus tenuifolium*, Thal. 21. *Tinctorius flos alter*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 123. *Scharfe blaue Dürnwurz*, Tab.

Cubitalis & procerior quandoq; est planta suffitatem versus brachiata, thyrsulis tenellis striatis, ex nigro ruffulis, hirsutie

tie insigni, quorum singulis exortibus subservit folium oblongum, angustum, hirtum, gustu acre: flosculis tenuissimarum exilitatum in caulum fastigiis apud nos albis, medullium ex staminulis luteis constitutum festivè ac copiose circumdantibus, ocissimè, ac sèpe intra horæ spatium vanescenibus, succedente mox papposâ lanugine. Radix ex nigro flavescens, capillamentis instructa suis, ubi manditur acritate linguam ferit. Floret Mense Julio. In locis arenosis & petrosis passim bey Königsberg.

CXXXV. *Conyza aquatica laciniata*, C. B. Pin. p. 266. *Conyza Helenitis* foliis laciniatis, Lob. ic. 347. *Conyzæ mediæ species altera*, Dod. lateinisch 52. *Wasser-Dürwurz mit zerschnittenen Blättern*. In locis aquosis bey Brandenburgischen Schloß. Item bey Nordenburg im Stadt-Grabem copiose.

CXXXVI. *Conyza major* flore globoso. C. B. Pin. p. 266. *Dürwurz mit Kugelrunder Blüth*. *Conyza minor* Trag. Kyber. in Trag. 166. Matth. deutsch fol. 365. Tab. ic. p. 860. *Conyza minima* Lob. ic. 345. Dod. lateinisch, fol. 52. Thal. pag. 21. *Conyza minor seu fœmina*, Lon. deutsch 160. *Psyllium*, Cord. hist. fol. 154. *Kleine Dürwurz* Matth. Tab. *Flohkraut und Hunds Augen* alias. *Vetulis Kerstindenkraut* aut *Krestinden-Kraut*. Major est & minor. Ictericis tussientibus & suspriosis salutaris. In locis irriguis bey Königsberg.

CXXXVII. **Conyza palustris* foliis tripartitò divisis, Joh. Lœf. Bidens foliis tripartitò divisis, Cæsalp. lib. 12. cap. 17. p. 483. *Hepatorium aquatile*, Dod. lateinisch fol. 595. *Verbena supina vel tertia*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. 168. *Verbenaca recta* Cord. in Diosc. 66. *Forbesina Benoniensis*

+ est

Gesn. hort. fol. 259. Pseudohepatorium alterum Dodonæi seu fœmina, Thal. 85. Cannabina aquatica folio tripartito diviso C. B. Pin. p. 321. Wasser-Dürrwürz mit tieff zerschnittenen Blättern / Hanenkamp Germanis. Cord. in Diosc. Stuppars Moravis & Silesiis, Gesl. in hort. Radix ex multis filamentis sub albidis constituta, caules promit rotundos , ramosos, rectos rufescentes, qvibus folia in tres, qvinq; vel sex profundas lacinias, in circuitu serratas, digitorum instar, dirempta adnascuntur. Cacumina caulium excipiunt florum capitula globosa, ex numerosissimis calyculis luteis , in summitate parùm incisis, ac in meditullio lingulam bifidam , exilem nigricantem foventib⁹ exstructa, qvorum ambitum luteoli exornant flores. His succedunt oblonga ac pulla semina, in apice ternis hispidulis aculeis , qvorum intermedius brevior, horrida. Horum ope vestibus, & contrectantium digitis facile adhærescunt. Passim in locis uidis bey Königsberg.

+ est

CXXXVIII. *Conyza palustris foliis serratis. Joh. Lœsel. Eupatorium cannabinum chrysanthemum , Tab. Lib. 1. fol. 418. Bidens folio non dissecto , Cæsalp. I. c. Eupatorium cannabinum fœmina Septentrionalium , stellato & odoro flore , Lob. ic. 529. Fœmina cannabinæ septentrionalium , stellato & odoro flore , Advers. fol. 227. Wasser-Dürrwürz mit schlecht zerschnittenen Blättern. Priori assimilis est demptisfoliis. Caules alit ramosos, pallide virentes & exigue hirsutos quib⁹ folia oblonga, in ambitu duntaxat crenata serviunt. Conyza palustris . Hort. Eyst. Cannabina aquatica folio non diviso, C. B. Pin. 321. Wasser-Wundkraut / Wassersternkraut / Geel-Fieberkraut und Kunigundkraut Weible. Tab. Bey der Laute. Auch unter dem Getreidigt an feuchten Dertern.

CXXXIX. Cornus fœmina C. B. Pin. p. 447. Hartriegel.

No. 11. ad pag. 54



*Conyza palustris
foliis serratis.*

riegel. Trag. Kyber, in Trag. 1004. Virga Sangvinea, Matth. Bauh. in Matth. 214. Gesn. hort. fol. 286. Dod. lateinisch. 782. Sangven vulgò, Cæs. lib. 3. cap. 26. p. 110. Ossea, Lon. Deutsch fol. 65. Cornus fœmina. Gesn. hort. f. 255. Lob. ic. p. 169. o. Thal: p. 33. Tab. lib. 3, fol. 752. Pseudocrania, Cord. hist. fol. 187. Hartriegel Matth. Cornelbaum Tab. Kürbeeren alias. *Bey Fischhausen im Rosen-Pusch.*

CXL. *Corylus sylvestris*, C. B. Pin. 418. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 868. Lob. ic. p. 192. o. Clus. hist. lib. I, fol. II. Lon. deutsch fol. 46. *Avellana nux sylvestris* Fuchs. fol. 398. *Avellana*, *Corylus sylvestris*, Gesn. hort. fol. 249. *Nux avellana agrestis*, Brunf. lateinisch tom. 3. fol. 225. *Nux avellana sylvestris* Matth. Bauh. in Matth. fol. 229. *Nux avellana*, sive *Corylus* Dod. lateinisch fol. 816. Pontica *nux* in *corylo vulgari*, Cord. in *Diosc.* fol. 25. *Wilde Haselnuß* Sebitz. in Trag. *Haselbaum* / *Haselnüßbaum* / oder *Haselstrauch* Lon. *Haselnuß* / Fuchs.

Adeò fructifera sæpe est *Corylus* apud nos, ut modò septendecim, modò viginti unam, imò simul viginti duas nuces, uno pediculo fultas, & glomeramen quasi quoddam constituentes, hic observarim. Eiusmodi nucum glomeramina ex concursu multorum florum exorta credo. Cæterum 4 numero differentias sæpe notavi: 1. nux est calyculo clauso. 2. Calyculo aperto. 3. Calyculo semiaperto. 4. Calyculo curto. Oblongiores citius, rotundæ tardius in nucleus maturescunt, omnium verò primò, quæ *Augstnuss* salutantur.

Corylus ipsa ligno est vel fragili vel obsequioso. Hoc ob lentitiam finditur & ex eo textiles sellarum sedes, & circuli vasis ligneis firmandis deservientes, parantur.

Falluntur, qui coryli flores credunt esse julos, quippe flo-

flosculos edit, in gemellarum summo constitutos, staminum instar, ruffulos, laccam Florentinam colore æmulantes, & quidem apud nos inclinante Aprili, aut Majo Mense inchoante. Juli ejus, dum Corylus floret, concussi, pulvisculum reddunt luteum, pictoribus Schuttgelb / Bleylegelb vocatum. Deservit hic pulvis pictoribus elegantissimo colore, tonsoribus vi consolidante, siccante, refrigerante & adstringente, vulneribus inspersus. Notandum: Corylus quo magis julis abundat, eò copiosiores alit flores, destituta iisdem paucissimos ostendit. Arbor hæc materies est virgulæ metallorum indagatricis, Wünscheltut dictæ, quam Nicolaus Niger Hapelius (ita se transnominavit Raphaël Eglinus Iconius, Theol. D. & Prof. olim Marburgicus) in Disquis. Heliana ita vult cœdi & tractari: Cédatur virga bifurcata horna, i. e. unius anni, ex corylo vel quercu, cuius cornua sint æqualia, & sine vizio, (quidam eandem putant ante solis exortum, maxime crescente lunâ, & quidem potissimum circa diem Annunciationis Mariæ cædendam) hoc facto sumantur due furculæ in utramq; obversam manum, cælum versus digitis compressis, utring; videlicet extremitatibus flagellorum furcæ ad utrumq; compressum pollicem extra manum prominentibus: ipse autem furcæ caudex extrinsecus intra duas manus vergat. Quodsi quis argenteos globulos thoraci prefixos gestet, etiam si omni nixu comprimat virgam utrāq; manu, tamen gyrum mouendo per se faciet, & versus thoracem sese introrsum usq; ad globos cæsa illa caudicis pars vertet: sin verò omni metallo extutus, argentum aurumve ponas in terram, tunc etiam renitente & invito te, qui tenes virgam, pars caudicis cæsa extrorsum verget, donec validissimo indicio & motu metallum percutiat. Quā de re passim Autores Chymici & Physici consulantur.

Nuci-

Nucibus ludunt pueri. Catullus in epithalamio Julii & Mallii:

*Da nucem pueris, iners
Concubina, satis diu
Lusisti nucibus.*

Ovidius lib. de nuce, sigillatim multos declarat ludos, qui nucibus fiunt:

*Has puer aut certo rectas diverberat ictu,
Aut pronas digito bisve semelve petit.*

Augustus laxandi animi causâ cum pueris facie liberali ocellatis nucibus lusisse dicitur à Tranquillo. Hic per nuces ocellatas exaudiunt nonnulli carystias seu avellanas, alii amygdalas. Alexander ab Alexandro lib. 3. genial. dier. c. 21. nucleos esse affirmat, qui in Perficiis pomis inveniuntur, dictasq; ocellatas nuces existimat propter ocellos, & foramina, quibus muniantur undiq;. Corylus eò fructuosior, quò pejus tractatur. Veterum adagium est: *Corylus nucleis dives, nuptiarum præsaga est: Existimo exaudiendum hoc esse de furtivis, quibus se commaculant sæpe, coryleta inter aqualiculantes nucum collegæ.* Aliâs memini priscos, nuptiarum solemnibus, nuces sparsisse, vel sponsum pueritiae jam renunciâsse indicantes, vel jactu tripudium excitantes, vel deniq; gemino nucum operimento, totidem involucris fœtus novæ nuptæ circumdataum iri, significantes.

Melancholici & qui tristitia dissolventa dederunt pectora, περιπατον̄ hoc confici curant in multis expertum. In nucem avellanam, cæstro excavatam & enucleatam κατοπτηρον̄ seu speculum pavonis deferatur, superstructo hydrafyro: mox foramine cera virginea obturatō nux syndone involvatur, ac collo appendatur.

Nux ludicræ rei materies: Notabilem hic in memoriam
H mihi

mihi revocant historiam nuces, qvæ in Regio apud nos monte quondam acciderat. Ex sartorum genere quidam epulum Magistrale Meister - Rost tribulibus suis apparatus, alia inter edulia tenebatur vigore statutorum & consuetudinis inveteratæ carnes croco tinctas, amygdalis conspersas, apponere. Quid sit? nuces hic elegit amygdalarum loco. Renano integro elapso divulgatâ, nuces pro amygdalis appositâ fuisse stomachari incipit tota opificum tribus, hominem de integro ad dapes magistrales apparandas durâ verborum gravitate cogens. Ab insolenti hoc postulato junior ille Magistellus ad Senatum urbicu[m] se recipit, sententiam hâc super re tristiculo expectans animo. Senatus rem pensiculatiu[m] trutinans decernit., cum in epulo Magistrali nil præter amygdalas desideratum sit amplius, æqvum esse, ut sartorum tribules adjiciales seu adipales parent cœnas, easque crocata[s], ipse verò addat amygdalas. Ita litigium optuma sententiâ sublatum. De carnis crocatis Vulgare est dicterium;

Ruhfleisch in gelber Brüh/
Ein Ritter ohne Müh /
An diesen beyden ist verloren
Der Saffran und die gûlden Sporen.

Taubmannus ita:

*Caro crocata Vacce,
Expers eques labore,
Fraudique sunt probroque
Calcaribus crocoque.*

Nux miraculum præbuit. De Sebastiano Vogelsbergo hæc memoriae prodidit Melissus:

*Fortis erat bello vir & acribus inclytus armis,
Cui volucris nomen monsque perenne dabat.*

Jusse-

SPONTE NASCENTES.

49

Jusserat huic Quintus caput à cervice recidi,
Cede forà Auguste nunc quoque tincta rubent.
Ille sibi cernens ensemque necemque paratam
Carnifici intrepida talia voce refert :
En morior, moriarq; , jubet quia Cæsar is ira:
Quod precor, hoc votis parce negare meis ,
Truncus ubi gelidâ fuero tellure sepultus
In tumulo factum consere rite nucis.
Nux ea, si merui pœnas, arescet ; at insons
Si plector, crescet ; grandis & arbor erit.
Vota valent, arbos succrevit, & alta sub auræ
Explicuit patulis brachia densa comis.

CXLI. Cuscuta major. C. B. Pin. pag. 219. Cassytha
 Plinii vel Theophrasti, Gesn. hort: fol. 251. Cassytha Plinii,
 Cuscuta officinarum, Lob. ic. 427. Cassutha. Fuchs. fol: 384.
 Tab. lib. 2. fol. 592. Dod. lateinisch fol: 554. Thal. pag. 28.
 Androsaces, vulgò Cuscuta Trag. Kyber. in Trag. 810. Cus-
 cuta Matth. Bauh. in Matth. fol. 879. Lon. deutsch. fol. 236.
 Cæs. lib. 8. c. 41. fol. 343. Seiden-Kraut / Tab. Filz-Kraut
 Flachs-Seiden / Flachs-Dottern Lonic. Nefel-Rancken
 Borussis. Bey Königsberg paſsim. Urticæ præsertim ma-
 jori adhæret.

CXLII. Cyanus segetum C. B. Pin. 273. Cyanus cœ-
 ruleus, Gesn. hort. fol. 256. Cyanus, Lon. deutsch fol. 216.
 Cæs. lib. 13. cap. 52. f. 538. Cyanus flos Dod. lateinisch fol.
 251. Baptisecula, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 450. Cya-
 nus vulgaris Lob. ic. pag. 546. Adv. Lob. fol. 236. Obs.
 Lob. 296. Cyanus major Matth. Bauh. in Matth. fol. 389.
 Cam. hort. pag. 51. Cyanus cœruleus arvensis, Tab. lib. 1.
 fol. 531. Cyanus arvensis cœruleus Thal. pag. 29. Eystett.

H 2

NB.

NB. Incisuræ apud Lon. Matth. & Sebitz. in Trag. omissæ. Blau Kornblum/ Tab. Große Korn-Blum Matth. Ro-cken-Blum und Zacharias- Blum/ alias. Inter segetes pas-sim. Flores cyani cœruleum pictoribus suppeditant colorem. In mortario lapideo , flores pistillo contunduntur ligneo, ad-jecto aluminis pauxillo : contusorum pars linteo terso & ex-tenso inducitur, ac involvitur: mox alia portio eidem linteo superinducitur , ac rursum involvitur , & sic ulterius cum florum minutali agitur, strato super strato constituto. Por-tiones ita linteo inductæ ac involutæ, præsto lævi manu com-mittuntur , qvò succus omnes lintei partes æqvabiliter impræ-gnet. Post crassamentum abjicitur , ac linteum siccatur. Usus Tempore lintei particula aquæ, in quâ gummi Arabicum di-solutum immergitur , & colorem reddit amœnulè cœrule-um, quem pictores Tüchlein-blau nominant. NB. Cyanus in quibusdam infantum morbis remedium expertissimum est.

CXLIII. Cynoglossum majus vulgare, C. B. Pin. p. 257. Cynoglossus vulgaris, Gesn. hort. fol. 256. Cynoglos-sum cum flore Dod. lateinisch. fol. 54. Cynoglossum, Adv. Lob. fol. 250. Cynoglossum cum flore. Tab. lib. 2. fol. 408. Cynoglossum vulgare , Matth. deutsch fol. 570. Cynoglossum vulgare cum flore, Lob. ic. 580. Cynoglossum vulgare, Clus. hist. lib. 5. fol. 161. Eystett. Große Hunds-Zunge Brunf. deutsch fol. 169. Gemeine Hunds-Zung Matth. Hunds-Zung mit Blumen/ Tab. am Kneiphofischen Wall passim.

CXLIV. Cynoglossum minus. C. B. Pin. pag. 257. Elatine Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 156. Lon. deutsch fol. 166. Klettenkraut / Seb. in Trag. Lon.

Apud nos cubitalis sœpè est planta, secus ac in Angliâ, ubi vix semipalmaris reperitur. In Neuendorff am Tham co-piose

piosè. It. am Kneiphofischen Wall/nach dem Schießhause zu.

Siccat, adstringit & solidat. Decocta dysentericos & fo-
riolos juvat, & dolores compescit. Gargarismis additur.

CXLV. Dens leonis latiore folio C. B. Pin. 126. Dens leonis vulgi, sive Urinaria, Lob. ic. p. 232. Dens leonis. Brunf lateinisch tom. 3. fol. 70. Matth. Bauh. in. Matth. fol. 388. Dod. lateinisch. fol. 636. Dens leonis 1. Tab. lib. I. fol. 595. Taraxacon minus Lon. deutsch 123. Hieracium majus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch. 209. Hieracium parvum Cord. in. Diosc. fol. 55. Hieracium minus, Gesn. hort. fol. 262. Caput Monachi, Matth. deutsch fol. 178. Hedypnois, dens leonis, Fuchs. ic. pag. 387. Aphaco Cæs. lib. 13. cap. 3. pag. 508. Pfaffenblatt / oder Röhrlein-Kraut / Tab. Pfaffenrörlein / Klein Habichtskraut / Lon. Pfaffenkraut / Löwen-Zahn / Saurushel / Sausschnabel Saublum / Pfaffenstiel / Hundsbhum / Eyerblum / Münchsblatt / Weglattich / Wiesenlat-
tich / Hundslattich / und Merzenblum vulgo. Sommerdorn Hassis. Bey Königsberg/ in locis sabulosis passim. Radix Taraxaci collo suspensa in oculorum caligine efficax creditur.

CXLVI. Dentaria heptaphyllum baccifera, C. B. Pin. 322. Dentaria bulbifera, Lob. ic. 687. Dentaria baccifera, Clus. Pann. Clus. Hist. Dentaria septifolia, Tab. Siebenblätte-
riger Schuppenwurz mit schwarzen Beeren. In der Sarkau
in fruticetis ac locis umbrosis.

CXLVII. Digitalis lutea magno flore, C. B. Pin. 244. Digitalis lutea, Fuchs. f. 894. Tab. lib. I. fol. 270. Cam. hort. p. 55. Lon. deutsch. fol. 105. Thal. 38. Digitalis flore luteo. Eystett. Digitalis 3. Dod. lateinisch f. 169. Campanula sylvestris, seu Digitalis flore luteo, Trag. Kyber. in Trag. 889. Geelsingerhutt/ Tab. Fuchs. Geeler Finger-Hutt oder Wald-Glöcklein/Lon.

Hinter Dvednau auff dem Berge in locis umbrosis. Item in der Osterodischen Heyde copiosè.

CXLVIII. *Dipsacus sylv. aut virga pastoris major*, C. B. Pin. 385. *Dipsacus Lon. deutsch* fol. 99. *Dipsacus purpureus* Fuchs. fol. 225. *Dipsacus primus* Tab. lib. 2. fol. 366. *Carduus fullonum*, Brunf. lateinisch / tom. 3. fol. 32. *Labrum Veneris*, Cord. in Diosc. fol. 50. *Lob. ic. p. 18. o. Lob. Obs. fol. 487.* *Carduus fullonius erraticus*, Trag. Seb. in Trag. deutsch 667. *Labrum Veneris flore purpurascente*, Cæl. lib. 13. c. 27. p. 519. *Labrum Veneris alterum*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 493. *Groß Kartendistel / oder Weberkarten / Bubenstreet und Wolffstreet* / Lon. *Braun Kartendistel* Fuchs. In elegantem nonnunquam excrescit magnitudinem, ita ut 4 ulnas sœpe apud nos exæqvæt. *Bey der Neuhäusischen Mühl.* Item im Werder hinter Elbing in agrorum limitibus copiosè.

CXLIX. *Dracunculus palustris sive radice arundinaceâ* Plinii C. B. Pin. 195. *Aron palustre*, Ges. hort. fol. 248. *Dracunculus aquaticus*, Matth. deutsch fol. 228. *Dracunculus aquaticus* Plinii, Cam. hort. p. 56. *Dracunculus aquatilis*, Dod. lateinisch 331. *Dracunculus palustris minor*, Lon. deutsch fol. 232. *Angvina aquatica*, sive *Dracunculus*, Lob. ic. p. 600. *Dracontium palustre* Tab. lib. 2. fol. 417. *Wasser-Schlangenrœut* Matth. *Klein Schlangenrœut* Lon. *Wasser-Aron* und *Drachenwurz vulgò*. *Schweinkräut* Nostratibus. *Folia quippe concisa porculatores aquâ macerant*, furfures addunt & miscelâ hâc porcos saginant. Calefacit, siccatur & subtilium est partium, hinc suspiriosis utilis est radix, quæ degustata, fucum quasi lingvæ divendit, mox eandem insigniter suâ acrimoniâ ferit. Aro persimile quiddam obtinet, auctore Gal. 6. simpl. *Viscera expurgat*, lenta ac viscida incidit, opti-

optimumq; remedium est contumacium ulcerum. Baccæ ex vino sumptæ ἐχιοδήντοις prosunt. Hinter Judenkirch in locis uliginosis.

CL. Dracunculus pratensis ferrato folio , C. B. Pin. 98. Wiesen-Bertram mit zerkerbten Blättern. Ptarmica I. Matth. Bauh. in Matth. fol. 441. Ptarmice, Lon. deutsch fol. 263. Ptarmica, sive Ptarmica folio Taraconis, vel sternumentoria Lob. ic. pag. 455. Ptarmica Fuchsii Cam. hort. p. 132. Tanacetum album, seu acutum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / 379. Tanacetum album acutum Tab. lib. 2. fol. 454. Tarchon aquaticum, Gesn. hort. fol. 274. Draco sylv. sive Ptarmice, Dod. lateinisch 710. Ptarmica sylvestris germanica, Thal. pag. 86. Ptarmica vulgaris, Eystett. Weiß Reinsarn Tab. Wild Bertram / Lon. Matth. Bey der Altstättischen Ziegelscheine in pratis siccioribus. Item bey dem Penartischen Walde. Item in der Langkaase (pratum est) zwischen Lattenwalde und Kunzen.

CLI. Echium scorpioides arvense C. B. Pin. 254. Auricula muris cœrulea Tab. lib. 1. f. 630. Auricula muris minor tertia Trag. Seb. in Trag. deutsch 221. Scorpioides tertium minus Dod. Eystett. Scorpioides aquaticum Ges. hort. f. 280. Scorpioides tertium, Dod. lateinisch fol. 72. Heliotropium min^o alterum Cæl. lib. II. p. 439. Echii palustris alia species, Thal. p. 40. Alsine Myosotis, sive auricula muris, Lob. ic. 461. Myosotis hirsuta reptans, Adv. Lob. 193. Observ. Lobel. 245. Blaue Mäus-Ohrlein/Tab. Vergiß mein nicht/ Ges. hort. Circa Regiomontum passim. Variat magnitudine, aliquando vulgata quadruplo major est & hispidior.

CLII. Echium scorpioides arvense flosculis niveis, Joh. Lœs. Weisse Ackermann-Mäus-Ohrlein. Am Thiergarten bey Neuhausen in locis umbrosis.

CLIII.

CLIII. *Echium Scorpioides palustre* C. B. Pin. 254.
Euphrasia cœrulea Trag. Seb. in *Trag. deutsch* 260. *Eufrasia cœrulea* Tab. lib. 1. fol. 630. *Echium palustre* Cordi, Thal. pag. 40. *Cynoglossa minor*, Brunf. *lateinisch* tom. 1. fol. 176. *Myosotis scorpioides* partim repens, partim erecta, Lob. ic. 462. *Scorpioides tertium majus* Dodonæi, Eystett. *An auralia muris*, Matth. *deutsch* fol. 249? *Blaue Wassermäuse-Ohrlein / blauer Augentrost / Tab. Kleine Hundszung / Brunf. das rechte Mäuse-Ohrlein* *Dioscoridis*. Matth. *Bey Königsberg* passim.

CLIV. *Echium vulgare* C. B. Pin. 254. *Echium* Matth. *deutsch* / 420. *Dod. lateinisch* 631. *Gesn. hort.* fol. 257. *Echiū sive Buglossum sylvestre*, Lob. ic. 579. *Echium vulgare*, Clus. *hist.* lib. 5. fol. 163. *Anchusa sylvestris* Thal. p. 9. *Buglossum sylvestre*, Lon. *deutsch* 175. *Echium, buglossum agreste*, Adv. Lob. fol. 249. *Echium floribus purpurantibus rubellis*, Obs. Lob. 312, *Lycopsis*, Cord. in *Diosc.* fol. 63. *Wilde Ohrsenzung / Matth. Lon. Bey Lautenmühl / Item heym Heydekrug / im Brandenburgischen in locis aridis & salebris copiose.*

CLV. *Elichrysum feu Stœchas citrina angustifolia*, C. B. Pin. 264. *Stœchas citrina*, Matth. *Bauh. in Matth.* fol. 736. *Dod. lateinisch* fol. 268. *Gesn. hort.* fol. 283. *Tab. lib. 2. fol. 103. Coma aurea*, Lob. ic. pag. 485. *Chrysocome aureave coma*, Adv. Lob. fol. 203. *Amarantus luteus* Fuchs. fol. 99. *Amaranthus luteus*, Lon. *deutsch* fol. 134. *Chrysocome prima vulgaris*, Clus. *hist.* lib. 3. fol. 326. *Helichryson, & Amaranthus Galeni*, Cæs. lib. 12. c. 13. pag. 484 & 485. *Schmalblättrige gelbe Rheinblumen. Rheinblume / Tab. Matth. Rheinblumen oder Mottenblumen / Lon. Mottenblumen / Winter-*

Winterblumen / vulgò Winterblümchen. Kattenpoten Nostratisbus.

Amariuscule & aromatico est sapore. Excalfacit, siccatur, aperit, & abstergit. Flores decocti cachecticos, & aurugiosos juvant: furfures capitis abstergunt, & pediculos enecant. Vestimentis associati tineas pellunt. In locis aridioribus & siccioribus beym Altstädtischen Gericht. Flores cum pane Butyraceo vitulis dati certissimum diarrhoeæ remedium esse rusticis creduntur.

CLVI. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis: 3. in Prodr. C. B. pag. 24. Wasser-Roß-Schwanz mit sehr dünnen langen Blättern. In palustribus bey Königsberg passim.

CLVII. Equisetum sylvaticum tenuissimis setis C. B. p. 16. Equisetum sylvaticum, Tab. lib. 1. fol. 699. Hipparis minor altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 550. Klein Schaffthew / oder Kazenschwanz / Trag. Wald-Schaffen-thew / Wald-Roß-Schwanz / in locis umbrosis passim.

CLVIII. Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermon: πολύγονος θηλυ C. B. Pin. pag. 15. Polygonum fœmina Matth. Bauh. in Matth. fol. 676. Polygonus fœminea Gesn. hort. fol. 273. Dod. lateinisch 13. Tab. 1. 2. fol. 505. Equisetum tertium, Cæl. lib. 16. c. 15. p. 599. Polygonon fœmina semine vidua Lob. ic. p. 792. Adv. Lob. fol. 354. Sangvinalis fœmina Cord. in Diosc. fol. 61. Limnopeuce Cord. hist. fol. 150. Polygonon fœmineum, Thal. p. 87. Vielsamiger Wasser-Roß-Schwanz mit kleinen Blättern. Thannenwadel / Tab. Matth. Klein Kazenwadel / nonnullis. In locis uliginosis bey der Altstädtischen Klapperwiesen. ἡς ἢ τὸ πολὺ sine semine reperitur, quandoq; polyspermon est.

CLIX. Equisetum foliis tractu ætatis nudum, 'Joh.
Lœl. Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum.
ππγεις ἀφυλλά C. B. Pin. pag. 16. Hippuris major, Trag.
Seb. in Trag. deutsch fol. 548. Hippuris nuda, Equisetum nudum
Tab. ic. pag. 251. Hippuris major altera, Lon. deutsch fol. 212.
Polygonon foemineum ἀφυλλόκαυλον, Thal. p. 87. Ohnblätter-
ger Rosschwanz nach Länge der Zeit. Schaffthew ohne Blät-
ter / Tab. ic. Groß Schaffthew / oder Ross-Schwanz / Lon.

Equisetum hoc foliosum est primâ ætate. Senescens ve-
rò & quidem mense Julio, foliis prorsus exuitur, & nudum
conspicitur. Id saepiusculè ἀυτόπτης notavi. Reliquias folio-
rum icon apud Tragum monstrat. In locis palustribus in Königsberg passim.

CLX. Equisetum foliis nudum, ramosum C. B. Pin. 16.
Equisetum tertium, Matth. Germ. fol. 441. Hippuris minor,
Lob. ic. pag. 794. Wielästiger Rähenzagal oder Schafftheu
ohne Blätter. Im Amt Hollandt wird das Kraut ge-
nandt Heermosß. Hinc adagium: Der Pferde Brodt / der
Kühe Todt. Equis gratissimum & salutare est pabulum,
contrà ovibus & vaccis noxiun. Vaccæ eo saturatæ den-
ticidio urgentur, foriolæ fūnt, & fordæ ab ejus esu aborti-
unt ac persæpe moriuntur. Hinc foenum sumentes vaccæ,
particulam foeni (cui immistum esse sentiunt equisetum hoc)
rursum ore projiciunt, ut noxia herba, hoc modo excutia-
tur. Oves ab esu hujus herbæ prorsus abhorrent, ac oris
lingvæq; dexteritate illum ab utili pabulo separare sciunt.

CLXI. Equisetum foetidum sub aquâ repens. 5. in
Prodr. C. B. 25. Stinkend Schafftheu so unter dem Wasser
freucht. Equisetum pini foliis simile apud Plinium & Hippu-
ris minima à Diosc. non descripta, Dalech. in Plinio fol. 547.

&

& 548. Cauliculis provenit tenuissimis, rotundis, per obliquum, ut saccharum penidum, striatis. Odoris est lutosi ac sulphurei. Siccata planta friabilis est, ac digitis facilè in pollinem redigitur. *Bey Osterrode in fundo lacus Schilling, ad pagum Werlitten.*

CLXII. *Equisetum sub aquâ repens foliis bifurcis. *Centophyllum am.*
Joh. Lœs. Kriechend Wasser-Schäfftheu mit vielen zweizähnigkeiten kleinen Blättern.

Cauliculis est rotundis geniculatis non striatis ; foliis tenuissimis, summum versùs bifurcis ad genicula concurrentibus. Friabilis est exsiccata, ac digitis facilè atteritur. In piscinis passim, ex quibus sagenâ saepius evellitur.

CLXIII. Erica vulgaris glabra, C. B. Pin. 485. Erica vulgaris Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 747. Thal. p. 40. Erica folio Myricæ, Clus. Pann. p. 35. Clus. hist. lib. I. p. 41. Erica vulgatior folio Myricæ, Adv. Lob. fol. 447. Erice Fuchs. fol. 255. Erica Tab. lib. 3. fol. 809. Cord. in Diosc. fol. 18. Lon. deutsch fol. 53. Erica prima Matth. Bauh. in Matth. fol. 141. Erica prior Dod. lateinisch fol. 767. Heyd, Tab. Matth. Heiden. Sebitz. in Trag. Lon. Fuchs. In locis arenosis passim.

CLXIV. Erica baccifera tenuifolia baccis nigris. Joh. Lœs. Foliis assimilis est ericæ bacciferæ tenuifoliæ, Tab. lib. 3. fol. 810. Schmallblätterichte Heide mit schwarzen Beeren. Auf der Eurischen Nahrung hinter Kunzen copiosè. *me judice non Erica baccifera tente nigra.* Kräenbeeren Nostratisbus. Item hinter Schreittlacken.

CLXV. Eruca lutea latifolia, sive Barbarea, C. B. Pin. 98. Barbarea fœmina Tab. lib. 2. fol. 165. Barbarea seu Pseudobunias Lob. icon. pag. 207. Barbarea Dod. lateinisch fol. 712. Herba S. Barbaræ. Trag. Kyber. in Trag. pag. 101. Lon. deutsch fol. 201. Bunium adulterinum Cam. hort.

p. 31. Nasturtium palustre Gesn. hort. fol. 268. Nasturtium hybernum Thal. pag. 80. S. Barbaræ herba Fuchs. fol. 746. Gelb breitblätterich Senffkraut oder S. Barbellkraut Weiblein. Tab. S. Barbara-Kraut. Fuchs. Lon. Senffkraut oder Barbelkraut Sebitz. in Trag. Rapunzel nostratisbus. Wintertkress nonnullis. Propè pratorum fossas bei Königsberg.

CLXVI. Eruca sylv. minor luteo parvoq; flore C. B. Pin. 98. Eruca palustris minor, Tab. lib. 2. fol. 159. Eruca sylvestris Fuchs. fol. 263. Sinapi primum genus Fuchs. ic. p. 304. Kleiner wilder Senff mit gelber und kleiner Blüth. Klein Wasserrauken Tab. Wild weiß Senff. Fuchs. In locis uliginosis passim.

CLXVII. Eruca maritima Italica siliquā hastæ cuspidi simili. C. B. Pin. 99. Eruca genus in maritimis. Cæl. lib. 8. c. 63. fol. 360. Cakile Serapionis Eruca folio, Napi flore; vulgo eruca marina. Lob. ic. p. 223. Cakile Serapionis. Cam. hort. p. 32. Meerfresse vulgo. Ad littus maris passim.

CLXVIII. Eruca sylv. minor foliis subasperis in orbem sparsis. Joh. Lœl. In der Fischhaussischen Heide. Item bei Rungen in montosis. Kleiner wilder Senff mit scharfen Blättern / so an der Erde in die Runde herumb liegen.

mbris arenos.
L. 15.
Radice nititur exili, subflavescente, villis instructa suis: cui succedunt folia laciniata, subaspera, humi circumcircata strata, quorum insima majora sunt ac viridiuscula, his incumbentia, & in meditullio constituta incanæ ac minora. Cauliculos edit hirsutos & brachiatos, quorum summo insidente flosculi nivei: Hos deciduos seqvuntur siliquæ teretes, exile ac subruffum semen gustu acre continentes.

CLXIX. * Eruca sylvestris major foliis subasperis in orbem sparsis. Joh. Lœl. Grosser wilder Senff mit scharfen

No. 13. ad pag 68.

*Eruca sylvestris minor foliis
Subasperis in orbem sparsis.*



Sisymbrium Arenosum L.

No. 1 ad pag. 69.

Erysimum hirsutum
Siliquis Cruca.



Risymbrium loeselii. L.

sen Blättern / so an der Erde in die Runde herumb liegen.

Cum erucâ sylv. minore convenit quidem , foliis tamen “ hæc vehementissimè luxuriat , ita , ut vel sexaginta obser-“ vârîm semel in unicâ planta , humi in orbem sparsa , incisa “ & subaspera . In der Wange an den Seebergen copiosè .

CLXX. Eryngium maritimum C. B. Pin. p. 386. Eryngium marinum Matth. deutsch fol. 273. Lob. ic. pag. 21. o. Lob. obs. fol. 490. Dod. lateinisch 730. Clus. hist. lib. 5. fol. 159. Eystett. Cam. hort. p. 58. Cæl. lib. 13. cap. 29. pag. 521. Meermans-Treue / Matth. Seemans-Treue und Meerwurzel vulgo. Circa portum Pillaviensem copiosè .

CLXXI. Erysimum. Irio. 1. Tab. ic. p. 448. Erysimum vulgare C. B. Pin. pag. 100. Irio. 1. Matth. Bauh. in Matth. fol. 431. Cæl. lib. 8. c. 64. pag. 360. Irio Cord. in Diosc. fol. 46. Lon. deutsch fol. 201. Verbena fœmina & sinapi 7. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 79. Verbenaca recta , sive mas. Fuchs. fol. 592. Irio , sive Erysimum Diocoridis , Lob. ic. 206. Adv. Lob. 69. Irio , sive Erysimum Dod. lateinisch fol. 714. Erysimum Nostras. Thal. p. 40. Wegsenff / Hederich 1. Tab. Ic. Eisenkraut-Weiblein Lon. Schnödseenff / Schützenff und Steinseenff / Cord. in Diosc. Eisenkraut- Männle / Fuchs. Bey Königsberg in locis præsertim salebrosis passim.

CL.XXII. *Erysimumhirsutum siliqvis Erucæ. Joh. Læs. härichter Wegsenff.

Radix subflavescens , ac fibris instructa caulem effert rotundum , viridem , hirsutie asperum , cui folia profundè incisa & hispida annata , quæ propriis terram longis pediculis innituntur. In caulum summo flosculi parvi , conglomerati ac luteoli visuntur , siliqvas minusculas in apice clypeatas , “ longis ac hirsutis petiolis insistentes , post se relinqventes .”

„Facie prorsus assimili est Erysimo 2. Tab. lib. 2. p. 162.
 „descripto, hirsutie demptâ. Reperi id mense Junio zu
 Danzig am Wall.

CLXXIII. *Evonymus vulgaris* granis rubentibus. C. B. Pin. 428. *Evonymus*. Matth. deutsch. fol. 83. Dod. lateinisch. fol. 783. Tab. lib. 3. fol. 754. Gesn. hort. fol. 258. *Evonymus Theophrasti* Lob. ic. pag. 168. o. Adv. Lob. fol. 435. Obs. Lob. 591. *Carpinus Theophrasti*. Trag. Kyber. in Trag. pag. 983. Lon. deutsch fol. 60. Siler Plinii Cæf. lib. 3. c. 50. p. 128. *Anonymus*, aliis *Evonymus*. Cord. hist. fol. 176. *Spindelbaum* Matth. Tab. *Spindelbaum* Hanhödlein Kyber. in Trag. *Pinnholz* nonnullis. *Zwickholz* Nostratibus.

Carbones *Evonymi* usurpant pictores in rebus delineandis, vel in hōrum defectu carbones *Coryli*. In der Holzen Grund.

CLXXIV. *Eupatorium cannabinum* flore purpureo Joh. Lœl. *Eupatorium cannabinum* C. B. Pin. pag. 320. *Eupatorium Avicennæ*. Gesn. hort. fol. 258. Lon. deutsch 246. Cam. hor. 58. *Eupatorium adulterinum*, Fuchs. fol. 265. Herba S. Kunigundis, Trag. Seb. in Trag. deutsch 390. Herba Kunigundis prima, Tab. lib. i. fol. 417. *Eupatorium Avicennæ* seu *vulgare* Matth. deutsch 432. *Hepatorium vulgare*, Dod. lateinisch fol. 28. *Cannabina aquatica*, sive *Eupatorium mas*, Lob. ic. 528. *Pseudohepatorium mas*, Herba Cunegundis, seu *Hepatorium Avicennæ* quorundam. Thal. fol. 85. Wasser-Dost mit Purpurfarben Blumen / Kunigundkraut / Tab. Matth. Hirschflee / oder Wasserrost / Lon. Sebitz. in Trag. Hirschfustel und S. Kunigundskraut / Dosenkraut / Albfraut / und Hirsch-Wundkraut vulgo.

Cervis

Cervis sauciū sacrum. Amarum est, abstergit, incidit, apertit, expurgat, lotiumq; movet. Hepaticis, liensis, ictericis, fœdā scabie, ac productis tertianis divexatis perutilis. Chirurgis vulneraria est planta, qui radicis pulvisculum cum $\epsilon\nu\phi\omega\gamma\alpha$ offerunt, unde & Bruchwurz quibusdam dicitur. In uliginosis in der Hollen-Grund.

Colligenda Ole 15. M occupante sub elevatione Poli 46, 47, 48, 49.

CLXXV. Eupatorium cannabinum flore candido.
Johann. Lœsel. Weiß Wasserost.

Priori aſſimile est structurā, foliorum caulumq; colore nonnihil diſſimile. Quippe prius foliis gaudet ex fusco vi-ridibus, thyrſulis rubicundis: hoc foliis & caulis pallidè virentibus. In der Hollen-Grund.

CLXXVI. Eupatorium Veterum ſive Agrimonia, C. B. Pin. 321. Agrimonia, Brunf. lateinisch Tom. 3, fol. 68. Lon. deutsch fol. 245. Cæſ. lib. 8. c. 4. p. 319. Agrimonia, ſive Eupatorium. Dod. lateinisch fol. 28. Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum. Gesn. hort. 258. Eupatorium Græcorum, Agrimonia officinarum Lob. ic. 692. Adv. Lob. 308. Eupatorium vulgare Trag. Kyber. in Trag. pag. 513. Eupatorium Matth. Bauh. in Matth. fol. 717. Cord. in Diſc. fol. 64. Tab. lib. 1. fol. 409. Fuchs. 244. Odermennig / Tab. Fuchs. Oder- meng / Lon. Odermennig / Agrimonien / Bruchwurz / Le- berkletten und Königsfraut. In der Hollen-Grund.

CLXXVII. Euphrasia officinarum C. B. Pin. 233. Eu- phrasia, Fuchs. fol. 246. Eufrasia, Tab. lib. 2, fol. 533. Dod. la- teinisch 54. Euphrasia ſive Euprosine. Ocularis. Lob. ic. 496. Eufragia Matth. deutsch fol. 438. Cæſ. lib. 8. c. 34. pag. 339. Eu- phragia altera major Thal. pag. 40. Euphrasia Argentinensi- ſium

sium vel 2. & 6. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 259. Augentrost / Tab. Seb. in Trag. Matth. In pratis bey Königsberg passim. Item bey der Altstädtischen Kältschein auf der Mauer semel hanc plantam inveni.

CLXXVIII. Euphrasia pratensis rubra C. B. Pin. 234
Odontites prima. Tab. lib. 1. fol. 681. Eufrasia altera Dod.
lateinisch 55. Euphrasia 2. Dodonæi Lob. ic. p. 496. Ericoides
rubrum Thal. pag. 40. Brauner Augentrost. Tab.

In locis uliginosis saepe & aridis. Spithamas duas nonnunquam alta est. Flos communiter rubicundus. Semel pumilam inveni flore albo, bey Wartnicken in locis incultis. Phthirias in jumentis accersit crebrius esitata,

CLXXIX. Fagus, Brunf. tom. 3. fol. 235. Bauh. in Matth. 180. Cam. in Matth. 66. Matth. deutsch 72. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 876. Dod. lateinisch 832. Lob. Obs. fol. 587. Adv. Lob. fol. 433. Lon. deutsch 49. Tab. lib. 3. fol. 683. Nothe Büche oder Buchbaum / Tab.

Folia refrigerant, siccant, & parùm adstringunt. Glans fagea dulci nucleo diuretica est, suemq; facit hilarem. Largius esitata dementat ac inebriat rusticos. Cinis deservit panis tingendis, ac vitris conflandis. Hinter Brandenburg copiosè. Et alibi. Circa diem Omnia Sanctorum assula ex fago arbore excisa, siccata existens, modestiam hyemis, humida ferociam ejus signat vulgo. Fagus olim etiam serviebat simulacris faciendis. Anthologia Græcor. Epigrammat. lib. 1. cap. 68. meminit faginei Colossi Herculis. Faginus guttus gutturnium est ex fago, quo olim sacrificabant. Plinius lib. VI. cap. 38.

CLXXX. Festuca avenacea sterilis elatior, C. B. Pin. pag. 9. Aegylop 1. & avena fatua, Tab. ic. p. 234. Lolii primum

mum genus. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 520. Aegylops. 1. Matth. deutsch fol. 119. Aegylops vera Gesn. hort. fol. 245. Bromos herba, Dod. lateinisch 540. Bromos sterilis, Lob. ic. p. 32. Avena græca, Cæs. lib. 4. c. 48. p. 178. Festuca & avena græca, Lon. deutsch 285. Avena sterilis, Adv. Lob. 9. Thal. p. 14. Gerstenthwalch / Gauchhaber / und Habergras / Tab. ic. Gauchhaber und Mausshaber / Trag. Seb. in Trag. Gauchhaber und Taubhaber / Lon. Inter segetes passim. Vitium plerumq; hordei est.

CLXXXI. Filipendia, Trag. Seb. in Trag. deutsch 695. Matth. deutsch fol. 364. Dod. lateinisch 56. Lon. deutsch fol. 248. Gesn. hort. 259. Cord. hist. 94. Thal. p. 42. Filipendula prima & saxifraga rubra, Tab. lib. 1. fol. 521. Filipendula vulgaris, Eystett. Oenanthe, Fuchs. fol. 562. Cord. in Diosc. 58. Oenanthe filipendula Lob. ic. 729 Oenanthe vulgaris. Adv. Lob. 325. Rother Steinbrech. Tab. Matth. Roth Steinbrech / oder Erdeichel und Erdeiche / Lon. Bey Lautenmühl im Gepusch. Item hinter Fischhausen nacher Lochstatt zu / in montosis.

Calefacit radix, siccatur, aperit, discutit, & parùm adstringit. Lotium movet, calculos atterit, tormina ventris sedat, & epilepticos mirè juvat.

CLXXXII. Filix non ramosa dentata, C. B. Pin. p. 358. Filix mas, Matth. deutsch fol. 539. Dod. lateinisch fol. 462. Fuchs. fol. 595. Adv. Lob. fol. 362. Tab. lib. 2. fol. 471. Lon. deutsch fol. 250. Waldfar / Brunf. deutsch fol. 305. Filix vulgaris Trag. Kyber, in Trag. fol. 546. Filix mas secunda, Thal. p. 43. Filix foemina, Gesn. hort. fol. 259. Cæs. lib. 16. c. 3. pag. 592. Filix mascula, Cord. in Diosc. fol. 76. Cord. hist. fol. 169. Ohnästiges gezähntes Farnkraut. Farnkraut Männlein / Matth. Tab. Lon. Waldfarn Männlein / Fuchs.

Fuchs. Waldfarn Kyber. in Trag. In der Hollen Grund
in umbrosis.

CLXXXIII. *Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis.* C. B. pin. 357. *Filix fœmina.* Matth. Deutsch fol. 539. Lob. ic. p. 812. Adv. Lob. fol. 362. Fuchs. fol. 569. Tab. lib. 2. fol. 471. Dod. Lateinisch fol. 462. *Filix sylv.* Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 127. *Filix mas major sive fœmina credita vulgò,* Clus. Pann. 705. *Filicis majoris primum genus,* Trag. Kyber. in Trag. 542. *Filix.* Cæs. lib. 16. c. 2. p. 591. Thilypteris *filix fœmina,* Cord. in Diosc. fol. 76. *Filix mas,* Ges. hort. fol. 259. *Großästiges ohngezähntes Farnkraut.* *Farnkraut weiblein/* Tab. Matth. *Waldfarn weiblein/* Fuchs. in der hollen Grund. it. in agris incultis passim.

CLXXXIV. *Filix ramosa pinnulis dentatis.* C. B. Pin. 358. *Filicula petræa fœmina* 4. Tab. ic. p. 794. *Pteridion masculum,* Cord. hist. fol. 169. *Filix fœmina altera tenuifolia,* Thal. p. 43. *Kleinästiges gezähntes Fahrn-Kraut.* *Klein Steinfahrn weiblein.* Tab. *Im Neuhauschen Schloß-Grazben in saxis muscō obsitis.*

CLXXXV. *Filix palustris maxima.* Joh. Lœs. Radix rotunda, quæ dissecta genuinæ aquilæ figuram exhibit. Herba in pollinem acta, & vulneribus inspersa, vulnera solidat. Hinc pecori & armentis perutilis est herba, in mixtu sangvineo, certissimo rusticis remedio. Wenn es frisch/ ist es grün/ wenn es trocken/ wird es braun. Wächst im Löbnicht-schen Walde im Elren-Bruch. *Filix palustris maxima dentata,* C. B. in Prodromo. Radix dissecta, formam semihominis & literas C. I. exhibit. *Gezähntes Wasser-Fahren-Kraut/* so hoch wächst.

CLXXXVI. *Filum marinum.* Joh. Lœs. *Meersfaden oder*

oder Meerstrang. Ejectamentum hoc maris chordis seu filis sonantibus assimile est formâ. Constat autem ex longissimis filis, crassis, rotundis, concavis, multifariè inter se complicitis, ac viscoſo qvôdam humore inunctis : quæ exſiccata partim ſubflavescunt, partim nigricant, viſciditate prorsus exutâ. In littore maris bey der Wange.

CLXXXVII. Folliculus marinus. Joh. Lœſ. **Waffer-Gall.** Lacus Curonicus hujusmodi ejicit folliculos, rotundos, membraneos, aqvâ turgidos, qui ſiccati planiſſimi ſunt & viridantis coloris.

CLXXXVIII. Fragaria vulgaris C. B. Pin. 326. **Fragaria.** Trag. Seb. in Trag. **deutsch** 398. Matth. Bauh. in Matth. fol. 721. Fuchs. icon. pag. 487. Lon. **deutsch** fol. 242. **Erdbeer-Kraut**, Brunf. **deutsch** fol. 200. **Fragaria & Fraga.** Lob. ic. pag. 697. Lob. obs. fol. 396. Dod. **Lateinisch** fol. 672. **Fragum** 1. & **Trifolium frugiferum.** Tab. ic. p. 118. **Fraga fructu rubro** Eykett. **Fragula** Cord. hist. fol. 173. **Fragaria major**, Thal. pag. 43. **Erdbeer-Kraut**/ Matth. **Erdbeer.** Tab. Lon. **Ge-meine Erdbeer** Thal. **Fraga circa festum Pentecostes** jam maturrima, vindemiam pollicentur uberein. In sylvis & locis apricis paſſim.

CLXXXIX. Fragaria caulinis maximè reptantibus. Joh. Lœſ. **Weitkriechend Erdbeer-Kraut.**

Radix multò capillitiō fibrata, & ex atro ruffa, caulinos spargit horum vorsum teretes subrubicundos hirsutos quatuor & plurimum ulnarum longitudine, lumi jacentes, & ex intervallo radicationem filamentis suis multoties iterantes, ac nova subinde folia excludentes, hirsuta, per ambitum incisa, supinâ parte incana, pronâ viridia, ætatis tractu rufſcentia. **Anſſ der Eurischen Nährung** / in pago Lattenwalde.

CXC. Fraxinus, Brunf. Lateinisch Tom. 3. fol. 237. Lon.
 deutsch Trag. Sebitz. in Trag fol. 888. Dodon. latin. fol. 833.
 fol. 66. Lob. ic. pag. 107. o. Adv. Lob. fol. 415. Matth.
 deutsch fol. 39. Gesn. hort. fol. 259. Tab. lib. 3. fol. 722 Fra-
 xinus excelsior. C. B. Pin. 416. Eschbaum. Tab. Deschen-
 Baum. Brunf. Eschern-Holz. Seb. in Trag. Esch-Baum.
 Eschern/ oder Steinäschern/ Lon. Eschren-Baum/ Matth.
 auff den Huben. Ejus fructus vel semen officinis lingva avis
 & lingva passerina nominatur. Calefacit & siccatur, lotium
 citat, ac Venerem stimulat. Cortex & folia cum moderato
 calore efficaciter siccant. Τυρέυματα τὸ ξύλον, ligni ra-
 menta potu exitiosa credi tradit Dioscorides. Sunt tamen,
 qui decocto ejus vice ligni Gvajaci felicissimo utuntur succe-
 su, autore Cæsalpino. Vulnera quoq; consolidat, Lignum certò
 tempore ab arbore resectum, vulnera cruentatum, ac debitè
 post tractatum. Cæditur circa Festum Divo Johanni sacrum, 3.
 vel 4. à novilunio die. Alii refecant tempore Solstitii æsti-
 valis in ipso meridie. Sunt, qui id factitant ante exortum
 Solis ipsò Baptista die veteris styli. Modus facilis est: Li-
 gnum fraxini, orientem versus ab arbore pendens, ante Solis
 exortum, die Johannis Baptista, cædatur unicō ac fervido
 iectu. Catamitus vel venereus haut sit, qui cædit. Decorti-
 cans ita lignum servet, ne vel humectetur, vel à muliere, men-
 strua solvente, contrectetur. Usus: Ensiculus seu ferrum,
 quod quis vulneratus, acie suâ singulis diebus per lignum sæpiùs
 traducatur, lignum loco blanditer calido ac terso servetur,
 vulneratae parti curationem brevi spondens. Stupendum
 quid est, lignum ferrò oblidenti semel inductum, improviso
 vulnerum hæmorrhagiam ac dolores sistere. Hiantia vulne-
 ra fraxinei ligni interiore cortice deligata, ita angustantur, ut
 futurâ opus haud sit.

CXCI.

No. 15, ad pag 77.

Fucus marinus Πολυχίος



Fucus fastigiatus L.

SPONTE NASCENTES.

77

CXCI. **Fucus marinus* πολυχιδης. Joh. Lœsel. *F. fastigiata*
Rundblätteriges / und in der Spitz zweyspaltiges Meer-
Grass. Est *Fucus seu Alga exigua dichotomos foliorum segmentis*

Fucus hic littore maris ejectus subviridis est, mox siccatus lis erapis & su-
horridum nigrorem induit. Ex rotundisculis filamentis Ray syn: 4.
constituitur, quæ in progressu multifariam dirempta, tan-
dem in extremitate ut plurimum bifida redduntur. Radix
capillamentis tenuissimis & numerosis constructa est, quæ
implicatione variâ invicem firmissimè cohærent. Circa lit-
tus maris passim.

CXCII. *Fumaria*, Trag. Sebiz in Trag. deutsch fol. 86. Cord. in Diosc. fol. 70. Fuchs. fol. 338. Lon. deutsch fol. 202. Dod. Lateinisch fol. 59. Gesn. hort. fol. 259. Capnos fumaria. Adv. Lob. fol. 338. *Fumaria fumus terræ*, Matth. deutsch 507. *Fumus terræ*, Brunf. Lateinisch tom. 1. fol. 99. Thal. p. 43. Cam. hort. 62. *Fumaria officinarum & Dioscoridis*. C. B. Pin. 143. Erdrauch/ Fuchs. Seb. in Trag. Erd-
rauch/ Tauben-Kropff Matth. Erdrauch/ Tauben-Kropff/
Käzenkörbel-Kraut/ und Feld-Kraut/ vulgo inter segetes
nach Lauten Mühl zu.

Fumaria sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. efficax.
Colligenda Ole 1. II inhabitante, ac recens usurpanda.

CXCIII. *Fumaria bulbosa radice cavâ major*, C. B.
Pin. 143. *Aristolochia rotunda*, Brunf. Lateinisch tom. 1.
fol. 49. *Aristolochia rotunda vulgaris*, Trag. Seb. in Trag.
608. Gesn. hort. fol. 248. *Aristolochia rotunda vulgaris*, Fuchs. Cam. hort. 21. *Pistolochia* Fuchs. fol. 91. Ra-
dix cava major, Dod. Lateinisch 327. Clus. hist. libr. 2. fol.
271. Radix cava Herbariorum, Lob. ic. pag. 759. Adv. Lob.
fol. 338. Radix cava. Clus. Pann. pag. 242. *Fumaria altera*

K 3

Matth.

Matth. Bäuh. in Matth. fol. 807. Aristolochia vulgaris flore purpureo, Eystett. Capnos, sive capnium phragmites majus & Pes Gallinaceus Cord. -in Diosc. fol. 70. Chelidonia phragmitis altera, Cord. hist. fol. 122. Radix cava herbariorum, sive Aristolochia flore purpureo, Floril. Swert. part. 2, fol. 7. Capnos chelidonia, Lon. deutsch. 162. Leontopetalon alterum, Cæl. lib. 6. c. 75. pag. 270. & 271. Runde Hollwurz das Weiblein. Brunf. deutsch. 147. Groß Erdrauch mit runder holer Wurzel. Rund Hollwurz/ Seb. in Trag. Fuchs. Gemein Hollwurz/ Lon. Hollwurz/ Bibewurz/ und Hirsch-Kraut/ Brunf. Radix insigni est amarore. Calefacit, abstergit, mundat & adstringit, sudores lotiumq; movet, ac ulceræ sanat sinuosa, durities quoq; & tumores inveteratos faucium ac tonsillarum discutit. Officinæ radice utuntur loco Aristolochiæ rotundæ veræ, quæ foliis crescit hederæ, aut brassicæ marinæ in Montanis Montis Pessulanii. Hinter Neuendorff im Walde.

CXCIV. Fumaria bulbosa, radice non cavâ. C. B. Pin. 144. Aristolochia rotunda vulgaris radice majore solidâ Trag. Kyber. in Trag. 766. Chelidonia capnitis radice nigrâ, Thal. pag. 33. Aristolochiæ rotundæ fabæ altera species solidâ, Gesn. hort. 248. Aristolochia rotunda flore albô, Eystett. Capnos sive capnium phragmites minus, Cord. in Diosc. fol. 70. Erdrauch mit runder dichter Wurzel. Runde feste Hollwurz. Solidâ quæ est radice, nunquam reperitur illis in illis, ubi fumaria radice cavâ pullulat. Diversum namq; amat solum. Semen potum herniosis pueris commendatur. Hinter Brandenburg auff dem Lenzken-Berge. Item in der Hollen-Grund. Erumpit primò vere, ubi

suum

*suum tireli tiritirlire tractim
Candida per vernum ludit alauda solum.*

CXCV. Fungus vescus I. Joh. Lœf. Fungi favaginosi, sive fungi rugosi favis mellis similes, Lob. ic. 274. o. Morcheln. Fungus est vernalis, rugosus, cute membranacea, in cellulas fari instar distincta, capitello & petiolo, quo sustinetur, concavis. In frusta concisus, lotus, ebullitus, expressus, & in sartagine cum butyro frixus, delicatulum est ferculum, & ex fungino genere optumum. *Im Morungschen.* it. im *Ortelsburgschén.*

Hunc & alios fungos, tanquam *νωγαλένυματα* seu lauta edulia sumentes vulgus indoctum apud Borussos vinum bibere jubet, legem Zaleuci flocci habens, *ne quis injussu Medici vi- no utatur sub pœna capitū*, quæ Locris Epizephyriis duntaxat posita. Idem Medici svadent, sed *ἀκρατέστερος* vel meracius vinum eligunt, jubentq; *τερπεζοποιάς* mensarum struētores, fungos apponant ante alios cibos. Crescunt in agris mense Aprili & Majō. *zu Robitten.*

CXCVI. Fungus vescus II. Fungi 4. genus. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 736. Capreolini Tab. lib. 3. fol. 814. Reizken. Duplex est, in pinetis alias, alias sub abietibus. Uterq; totus est flavus, capitello inferius striato, succum fundens croceum & acrem. Ille crassior est, & oras habet saepiusculē rursum reflexas, hic tenuior: utriusq; capitulum saepè nonnihil æruginosi suprà in meditullio obtinet, saepè etiam albicat. Repperi eundem quoq; inter juniperi fructeta. Puteo dum anima intertrahitur, pauxillo ejus abluuntur, elixantur, mox abjecto jure de integro cum cepis coquuntur, tandem coctione absūptā aquâ, cum butyro & pipere friguntur. Itali abjectis petiolis, eorum cavo oleum affundunt,

*Fungorum pluri-
Loeseliæ recensit:
alios ab Aut-
oribus reduci-
nec dum sah-
minati, ad aliud
remittit.*

dunt, additō sale & pipere, & in craticulis vel prunis integros assant. Sæpius ebulliti, Sale conditi, ac ligneis inclusi vasculis, venundantur in forð. Minusculi autem delicatissimi sunt, grandiores, quorum diameter secuncialis sæpè, viliores.

CXCVII. Fungus vescus III. Joh. Lœf. Stein-Reiß-
fen. Capitellum hujus suprà flavescit, & sæpè contortulum
est, infrà albescit, sulcis veris destitutum, sed non nihil inæ-
qvale. Substantiâ est crassiore, & solidiore, pediculô crassio-
re, flavo. Frequentissimè aliquot connascuntur, figurâ pror-
sus inæquali. Succum reddunt copiosum croceum & acrem.
Unam ex his prorsus degenerem vidi, ἄκαυλον, sex uncias
longum, cymbii formâ, substantiâ crassitudine unciali, & so-
lidâ, quæ diffracta æruginosi quid contraxerat. Inter abie-
tes. Minutal horum in sartagine frixum, sapore & melius est,
nec ita viscosum, ac Capreolinorum. Calculosos juvant ex
vetularum arbitratu.

CXCVIII. Fungus vescus IV. Joh. Lœf. Eich-Reiß-
fen. Duorum generum. 1. superiore parte ex rubro lateri-
tio fuscum, inferiore flavum & sulcatum, pediculô crassô. 2.
Capitellum summâ parte croceum est, imâ ex albo flavescens
& fulcata, sed ex meris tenellulis & profundis plicis consti-
tutum, quod diffractum lacteum, sæpè etiam croceum fun-
dit succum. Pediculus ochræ, vel curcumenæ est colore,
propius radicem crassus. Coctus hic fungus, recens acrimo-
niæ est alicujus, palato ingratus. Lentitemq; seu lentorem
obtinet. *Werden roh gegessen von den Weibern.*

CXCIX. Fungus vescus V. Joh. Lœf. Bruch-Reiß-
fen. Triplex est: Unus supernè ex rubedine & fuscedine fla-
vescit, infernè subalbicat, pediculô flavulô & longulô, geele
Bruch-

Bruchreizke. Alter supernè cœruleus est ex albo cum pediculo, infernè albido, blau **Bruchreizken.** Prior crudus ingeritur à vulgo, & quidem cum sale, uterq; lactescit digitis pressus, & acris est saporis, lingvam vellicantis. Tertius totus est lateritus colore, etiam diffractus, thrysulo unciali, tenui. **Nothe Bruch-Reizken.** Gustu fatuus. Et hic nonnihil lactescit.

CC. Fungus vescus VI. Joh. Lœf. **Geelohrchen/** totus flavescit, strias habet in pediculum radiatim desinentes, nec putrescit, sed ætatis tractu arescit. In senio ubi constituitur, oræ incurvantur, & crispantur, sursum totæ cum reliquâ parte abeuntes. Grati est odoris, & subacris saporis. Muscosa eligit loca betulas inter & abietes.

CCI. Fungus vescus VII. Joh. Lœf. **Süßling/** multi-genus est. 1. supernè balauistii instar rubescit cum petiolo, infernè albicat. 2. suprà ex rubedine fuscus est, infrà albus. 3. superiori parte flavus, inferiore albus cum pediculo. 4. suprà ex viridi totus cœruleus, infrà cum Pediculo candidulus. 5. in meditullio supernè ex viridi cœruleus, circumcirca albus. Priores duo tardius, posteriores citius vermiculantur. Omnes dulcis saporis. In locis uidis: quale solum omnes ferè exoptant fungi. Hinc Aristæus proverbio dixit: *Fungos concupiscit lapidosus ager.* Convenit illis, qui ambiunt & optant, ad quod non sunt apti. Fungi enim nascuntur in molli & humidâ terrâ, non inter saxa. Simile adagium est, *Optat ephippia bos piger.*

CCII. Fungus vescus VIII. Joh. Lœf. **Stöbling.** Fungus est orbicularis & planus, striis parte inferiore ad petiolum longum radiatim excurrentibus, supernè pallidè fuscus, oras versus tenuiter striatus, infernè subalbus.

Tenellus adhuc pileolo ex fusco flavescente, & punctato est suprà. Succulentus & gustu subacriusculus. Cæduis lignis copiosè innascitur.

CCIII. Fungus vescus IX. Joh. Lœf. fungus albus acris. C. B. fungus piperitis, quia instar piperis lingvam vellit, Porta. *Pfefferling* oder *Bitterling*.

De fungis notandum, quod pro incolarum diversitate & regionum diversis quoq; nominibus insigniantur. Nos itaq; & nomina & descriptiones fungorum, prout in nostris terris figurantur & nominantur, hic tantum apposuimus.

Totus est candidus, lacteum succum fundens, ferventissimi saporis. Carpinis & quercubus se associat. Lac ejus cum Syrupo de Altheâ sumptum, experimento certo calcium frangit, & urinam citat. Verrucas aufert illitu.

CCIV. Fungus vescus X. Joh. Lœf. *Herbstling*. Candidus est totus effigie fungi piperitidis. Subacris saporis. Ostryas amat, & qvercus.

CCV. Fungus vescus XI. Joh. Lœf. *Birdling*, Trium est generum 1. supernè ex albo & fusco ruffescit, & lanuginem ostendit circa oras incurvas maximè conspicuam: infernè strias alit subalbidas, & pediculum dilutè ruffescentem. Concisus succum fundit lacteum, acreidine suâ lingvâ maximè vellicantem. 2. Parte supernâ albicat viscoso nonnunquam humore inunctus, oris externis deorsum incurvatis in lanuginem fermè abeuntibus: infernâ parte sulcatur & albicat, pediculô albô fultus. Acreidine cedit priori, & degustantium naribus odorem ireos ferè ingerit. Succus ejus initiò albicat, mox luteolus est, ac sulphuris colore. 3. Dilutè capitello suo parte supernâ flavescit, oris ut in cæteris incurvatis, pediculum versus crassus, infernâ albescit, & totus succum reddit sulphureum concisus, gustu acrem. gelbe *Birdling*.

CCVI.

CCVI. Fungus vescus XII. Joh. Lœs. **Glatting.** Suprà fusci est coloris, infrà subalbidi, pediculo candido. Acris saporis. Aquâ coctus cum pauxillo piperis, salis & butyi, additis cepis non contemnendum est ferculum. In ericetis & locis muscosis.

CCVII. Fungus vescus XIII. Joh. Lœs. **Lahcke/ jure suo Beisserling.** Incurvus est capitello pediculum versus crassum & brevem, supernè ex fusco subalbus, striis infernè albicantibus. Dentibus diutulè comminutus, acris & piperi proximus prorsus igneæ est naturæ, cæteros acumine vincens. Pulpa intus satis firma albicat.

CCVIII. Fungus vescus XIV. Joh. Lœs. **Stein-Pülkē.** Supernè infusci est coloris, infernè candidi, crassiore pediculo. Senescens colorem mutat, & infernè ex viridi flavescit. Substantia ejus solidior est, ac in cæteris fungis. Inveteratus etiam nomen mutat, & vocatur **Rühe-Pülkē.** Fungum hunc κυμινοκίμβιξ ή κυμινοπρίσης auctumni tempore in schidia dissecat, siccatur, usui servat, post ablutum, ebullitum, & in minutal redactum, cum vino, additis butyro, pipere & cepis de integro coquit, ut ferculum existat helluantium, vel potius ex heluco malè habentium. Succus ejus putridus cimices interficit, parietum & lectulorum rimis immissus. Siccatus fungus, aquâ emollitus & impositus tumorem discutit.

CCIX. Fungus vescus XV. Joh. Lœs. **Heide-Stein-Pülkē.** Croceus est parte superiore, & nonnihil maculosus, inferiore itid. flavus & porosus, pediculo longiore flavescente. In musæo meo diem unum servatus totus abiit in succum quendam glutinosum, horridum, atramento prorsùs similem, cui myrias vermiculorum jungebatur. Vulgus proinde temperet gulæ in hoc ancipiti cibo.

CCX.

CCX. Fungus vescus XVI. Joh. Lœf. Kozelarke. Duplex: unus suprà & infrà albicat, puritate suâ haud cedens priori, weiß Kozelarke. Alter parte summâ infusci est coloris, imâ candidi, pediculo candido, maculis quibusdam nigris asperso, ei vocamen: Schwarze Kozelarke. Locis oblectatur muscosis & uidis.

CCXI. Fungus vescus XVII. Joh. Lœf. Rothkopffchen. Pediculo modo crasso, modò longiore, & maculis nigris velut à muscis conspurcato, pileolus insitit ex fusco lateritus, sæpè nonnihil miniatus, infernâ parte candidus, substantiâ durâ, & in senescentibus quasi spongiosâ. Est & aliud genus superiore parte flavescentia, aliquantillum Curcumæ coloris particeps. Pressus re qvâpiam ærugineum quasi quandam contrahit colorem. Graminosum eligit solum.

CCXII. Fungus vescus XIIIX. Joh. Lœf. Ziegen-Pulzke. Duplex & hic est. 1. totus flavescit, pileolo maculis fuscis variato, petiolo longiore, qui interdum aliquid rubedinis contrahit. Tener & uncialis, ubi est adhuc capitello, subtus amœnulé croceus est. 2. superné lateritio est colore, infernē flavo pediculo fultus & subflavescente, & nigris punctis notato. Ericeta & muscosa amat.

CCXIII. Fungus vescus XIX. Joh. Lœf. Astiger Ziegenbart. Ramosa est planta, musci ferè Ceratoidis formâ, caudice suo albicans, reliquâ sui parte flavescentia. Ætatis tractu mutat colorem, & ruffulus seu pallidè incarnatus existit. Im Eichen-Walde in locis incultis.

CCXIV. Fungus vescus XX. Joh. Lœf. Bock. Duplex est, alias Eich-Bock/ alias Hasel-Bock/ quercinus radice alba ex multis latiusculis agglutinamentis, circa oras partim con-

contortulis, partim laceris, imbricatim quasi cohærentibus, constituitur, supernâ parte infuscis, infernâ candidis & spongiosis. Autumno exit, & in tantam sœpè excrescit molem, ut voratus aliquot satiet homines. Aqueus, & gustu subacris. In coryleto natus æstivis diebus, longè minor est, coloris marini, radice candidâ.

CCXV. *Fungus vescus XXI.* Joh. Lœsel. viel koppfigter grauer Bock. Est radice latâ, sessili & albicante, ramuli oriuntur numerosissimi, brachiati, qvorum summitatibus capitula parva, unciam lata, & minora, insident, convexâ parte fusca, imâ sine striis alba, pediculis candidis fulta. Servatus in conclavi aliquot dies, ramusculos inter, & ad radicem teneram quandam acqvirit lanam, eamq; albicantem, quæ pòst horridum induit nigrorem. Gustu acris est.

CCXVI. *Fungus vescus XXII.* Joh. Lœsel. Wörusken. Tenuis est. & infernæ coloris infusci, supernæ subflavi. Exilis & subdulcis est ligni παρφυὰς in locis uidis, qui omnium cîtissimé pullulat.

CCXVII. *Fungus vescus XXIII.* Joh. Lœsel. Kuhmilden. Novellus adhuc terræ ita affigitur, ut faciem mentiatur crepus lupi, integer namq; est, & infernæ clausus, pediculo brevi. Mox hincit parte infernâ, & pediculo fimbriam relinquit. Strias inferiùs habet infuscas ad pediculum excurrentes, alutamento quasi quodam crasso, & albicante superiùs vestitus, quô abstracto pulpam ostendit albicantem saporis subacris. Fungus hic, & alter piperinus, ubi è terrâ erumpunt, reliqui vanescunt. In locis sœpè stercrosis equorum culpâ.

De hoc vesco fungô idem affirmare nobis licet, quod Doriani tibicini olim de pisce Rajâ. Qvippe dicenti cuidam,

svavem in cibo Rajam esse, respondit ille: perinde ac detrito pallio si quis elixo vescatur.

CCXVIII. Fungus vescus XXIV. *Schweinichen*. Parte superiore ex albo fuscus existit, inferiore candidus, sulcis ad pediculum excurrentibus, qui longior est ac colore cerussatus. Gustu fere fatuo est. Cuticula capitellum cingens abraditur, antequam in usum trahitur.

CCXIX. Fungus vescus XXV. Joh. Lœf. *Pömpchen*. Tenellus ac recens adhuc, fastigiatus leviter est parte supernâ rufula splendente, ac madidâ pingvi ungvine, tunicâ cinctus parte infernâ hymene seu membranulâ albicante clausus, quâ ruptâ flavescens ac porosa visui ingeritur pulpa. Fractus, aut tunicâ suâ, quæ levi brachio abstrahitur, spoliatus, candidâ intus est substantiâ, ac sapore mucilaginosus. Pediculus in novello longior, & albidi coloris, in senescente subflavus, & maculosus.

CCXX. Fungus vescus XXVI. Joh. Lœf. *Grüßling*. Totus albicat cum pediculo, parte inferiore striatus, & oris incurvis. Acris est, & linguam vellicans. Plebi totus in craticulâ commendabilis. Querceta amat.

CCXXI. Fungus vescus XXVII. Joh. Lœf. *Gänstchen*/ Pol. Prozonke geele *Schweinichen*/ quod & Polonicum nomen indicat. Capitellum ex fusco-viridi flavescens est supra, sulcatum infra & dilutè flavum, cum pediculo longiore. Colorem illum pictores *Schüttgellb* nominant. Condiuntur ut capreolini, & gustu sunt aqvei.

CCXXII. Fungus vescus XXIX. *Abreißchen*. Joh. Lœf. Fungus vetustis lignis assidens est, capitello nunc majore, nunc minore, supernâ parte circum circa pallidi, quandoque atrorubicantis, in medallio subalbidi, & ad flavedinem tenden-

dentis coloris. Ambitus hujus, successu temporis crispari assolet. Inferna capitis pars terram versus foliosa est; foliolis ac sulcis profundis super pediculo ad extimam circumferentiam excurrentibus, fusci coloris. Pediculo nititur rotundo, striato, partim albi, fastigium versus, partim ex ruffo fusci, radicem versus coloris. Aqvosi & ad acredinem quandam tendentis est saporis. Edulium saepius à me esitatum nec contemnendum, si elixatus abjecto jure iterum coqvatur, cepis priùs quoq; coctis, pipere & butyrò adjectis. Crescit mense junio.

Cæterū omnes fungi vesci parcè ingerendi, cum terræ sint ulcera, & succi pravi. Aristonicus olim legem tulit, de piscatoribus, 1.) si plus licerent pisces, in carcerem deducerentur, relictis in foro pīcibus, ut marcescant, nec venundari possint. 2.) ne sedentes vendant pisces, sed recti stent perpetuò. 3.) ut appensis tabulis pretium scribant, quō ci- tiūs mercaturi reverterentur domum. Fungivendis vetulis lex imponenda, ut non nisi prægustatos à se venditent fungos ingenti pretiō, tabulasq; in forum adducant hortatrices:
Ab ancipi cibo abstinentum omnino!

CCXXIII. Fungus non vescus I. **Schwarzer reh-haa-richter Fliegen-Schwam.** Pileus, cuius diameter septem uncianum, parte superiore fuscus & scaber est: inferius cinereus pilosus, pilis suis capreoli animantis prorsus similes, pediculo biunciali crasso, & cinereo nitri capite. Hunc & subseqventes qui degulant fungos, fungi sunt, h. e. stulti & stolidi, quibus remedio est illud, de quo Bubikir Zachariæ Errasis filius in volumine, Elhavi seu continens in scripto, lib. 21. c. 1. num. 25. *Stercus humanum, inquit, sumptum per os curat nocumentum eveniens ex usu fungorum lethalium.*

Volu-

Volumen hoc Brixiae impressum est per Jacobum Britannicum Brixianum anno 1486, nec citatum planè (quod minor) in Bibliothecâ universali à magno Gesnero.

CCXXIV. Fungus non vescus II. Rother *Fliegen-Schwam*. Capitulo est summâ parte miniatuli, vel balaustini coloris, numerosis maculis, iisq; albis insignito, infimâ parte candido, & striato, pediculo crasso, rubente & sœpè fimbriato. Maculæ nil nisi partes membranulæ sunt senescente fungo laceratione factæ. Credo fungum tenellum adhuc totum membranulâ albâ vestiri, quæ paulò pôst in plusculas disrumpitur partes, fungo augmentum intumescendo sumente. Subtus interdum ex albo flavescit cum pediculo. Loca amat fungorum der *Stein-Pilzchen*. Siccatus & aceto rursum mollitus, utiliter peste laborantium imponitur tuberculis. Fungo hoc non ita pridem sex Lithvani in Districtu Insterburgensi suffocati. Fortè, & Evripides poëta in Icarum profectus, hujus fungi esu uxorem cum duobus filiis adultis, & unâ puellâ olim amisit. Quo de spolio seqvens epigramma composuisse fertur ab Eparchide:

*O Sol, qui sempiternum cœli verticem peragras,
Adeone indignum facinus oculis tuis antehac conspexisti?
Matrem, virginem filiam, & fratres duos consanguineos,
Eodem die fato ereptos.*

Hinc Junius adagio: *tanquam fungus suffocat*.

CCXXV. Fungus non vescus III. Geeler *Fliegen-Schwam/ Eichen-Fliegen-Schwam*. Totus est croceus, maculis purpurascenscentibus in pileoli parte superiori intercurrentibus, pediculo crassiore. Inter abietes & qvercûs.

CCXXVI. Fungus non vescus IV. *Hasel-Fliegen-Schwam/ Grau-Fliegen-Schwam*. Capitellum parte supernâ

pernâ murini ferè coloris, infernâ subalbum, & sulcatum, pediculo crasso. Diffractus pulpam intùs ostendit niveam. Capitellum est ex fuscō murinum suprà, frustulis membranaceis, & punctulis quibusdam constans. Oræ ejus sæpe sursum ita abeunt, ut tubulum quasi quandam exhibeant.

CCXXVII. Fungus non vescus V. *Weisser Fliegen-Schwam*. Albicat suprà ex dilutâ flavedine, infrà prorsus nivei coloris, & pediculo nititur longiore, albicante & fimbriato.

CCXXVIII. Fungus non vescus VI. *Heide Fliegen-Schwam*. Triplex est: supernè ex albo flavus, infernè fuscus, strias habens, pediculo crassiore & subalbo, in summo velut fimbriato. 2. Suprà ex viridi albicans, infernè candidus, pediculo ad capitellum fimbriato. 3. Supernâ parte flavus, infernâ albus, pediculo flavescente. Muscæ hos & antè recensitos amant fungos, sed cum exitio.

CCXXIX. Fungus non vescus VII. *Weisser Kölben-ähniger Fliegen-Schwam*. Typhæ palustris ferè est capitulo, rotundato, oblongo, unciarum quatuor longitudine, duarum crassitudine, foris tunicâ pallente primùm cinctus, quâ disruptâ incrementis augescente fungo, pluscula frustilla, tunicæ pileolo albido adhærentia advertuntur: intùs initio albulus est, mox horridè nigrescit sulcis suis, oris laceris, ac fimbriam pediculo relinquentibus, sursum actis, ac latum capitulum efformantibus. Petiolo nititur longiore, semunciam crasso, albicante. Graveolentiâ totus est molestus.

CCXXX. Fungus non vescus VIII. *Schwolstspülzken*. Totus candidus, pediculo imâ parte crasso. Digitis pressus exemplò colorem acqyirit cyaneum, visu eleganssimum. Italis *azurro oltramarino* dictum. Diutulè durat,

rat, nec facile corruptitur. In sylvis abiegnis. Siccatus, aceto maceratus, & carbunculis pestilentibus affirmatus, venenum certo experimento evocat.

CCXXXI. Fungus non vescus **IX.** *Blutpulzken.* Crassus est, hepatis ferè effigie, initio foris albicans, post manibus contrectatus rufescens ac tenuissimis maculis sanguineis insignitus. Dissectus pulpâ est rubicundâ, quæ digitis pressa, succum reddit sangvinolentum, loturæ carnium assimilem.

CCXXXII. Fungus non vescus **X.** *Holzschwämme.* Capitulum summâ parte luridum est, cum pediculo propè terram crasso, infimâ subalbum. Lignis assistit, in cæduis sylvis.

CCXXXIII. Fungus non vescus **XI.** *Holz-Geelchen.* Arborum trunculis adnatus, nunc ex flavo albicat, nunc totus flavescit, & capitulo superius est molli velut alutâ investito, inferius copiosis villis instructo, thrysulo longiore.

CCXXXIV. Fungus non vescus **XII.** Fungus ovatus, & crepitus lupi, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 737. Fungus glomeratae rotunditatis, Lob. ic. p. 275. o. *Wettersfist / Pawenfist / terrâ primùm erumpens eximii candoris est, post pallescit, & fuligine quasi obducitur.* Tener adhuc pulpam intus habet caseosam feré, quæ tractu ætatis in fumanem abit pulverem. In cæduis sylvis & siccioribus pratis. *Am Kneiphöfischen Wall aufm Haberberg.* Fungum hunc repperi insolitæ magnitudinis, cuius perimeter cubitum, ac duos quadrantes superabat. Sancte mihi est contestatus chirurgus quidam, fungum hunc se repperisse aliquando, tricubitali in ambitu crassitudine. Fungus hic,

hic, ubi putret, ac in furno siccationem sustinere cogitur, fœtorem initio naribus injicit, qualem asellantis πυρδὴ τεχνιλον ιεῖσα μέλο. Ab eo fortè vocamen *Pofist*, vel *Pawenfist*. Pulverulenta ejus substantia cum pauxillo vitrioli albi, beneficio calami scriptorii, jumentorum oculis immittitur, lippitudine discruciatis. Hæmorrhoides, & sanguinem undecunq; fluentem sistit, partesq; sanat ulceratas. Vitulis ac jumentis communiter porrigitur, diarrhæâ infestatis.

CCXXXV. Fungus non vescus XIII. Fungus virilis penis arrecti facie, Lob. ic. 275. o. Fungus fœtidus penis imaginem referens, C. B. Pin. 374. Fungi perniciosi 23 generis, species 5. Clus. CCLXXXVII. *Pintchen* / *Erdschmeer*. Tuberis facie primùm emergit, post ruptâ extimâ tunicâ colles exilit albus, glande instructus suo, ex atro virescente. Muscæ eô gustato intereunt, cuius causâ honoratur hic phallus à vetulis. Olim alteri phallo alias habebatur honos. Figuram membra virilis priscis temporibus, mense Augusto, matronæ divinis colebant honoribus, eam extrâ portam Collinam, ad ædem Veneris, cum pompa sacrorum deferentes: mox à castissimâ & spectatæ pudicitiæ matronâ, præter matronale decus, in sinum Veneris dabatur. Vide Christoph. Landinum in Georg. Virgilii fol. 47. p. 2. Divum Augustin. de civitate Dei lib. 7. c. 21. Gyraldum item de Diis Gentilium, Arnobium, Tertullianum, Lucanum, & Lactantium. Bacchi etiam festa dum celebrabantur, virile membra plaustro per forum vehebatur, cui matronæ spectatæ pudicitiæ, velut sancto numini coronam imponebant.

CCXXXVI. Fungus non vescus XIV. Fungus membranaceus auriculam referens, sive sambucinus, C. B. Pin.

372. Fungus ad sambucum. Trag. Kyber. in Trag. 941. Fungorum perniciosorum 1. genus, Clus. hist. CCLXXVI. Auricula Judæ vulgò. Hollunderchwäm / Flöderorchen. Membranaceus est, ac sinuosus, coloris ex cinereo nigricantis. Arboris caudici innascitur, dum folia erumpunt. Siccat, adstringit, & in tumoribus, ac inflammationibus faucium, oculorum & aliarum partium perutilis, mollescit, aquâ maceratus ac intumescit.

CCXXXVII. Fungus non vescus XV. Straßling. Exilis est fungus capitulo unciali, totus subalbus, lentâ & alutaceâ substantiâ, infrà sulcatus, pediculo rotundo & oblongo. Unus alteri sâpe & capitello & radice connascitur.

CCXXXVIII. Fungus non vescus XVI. Gefrausier Ziegenbart. Ramosus non est, velut alter edulis, sed ramlorum loco membranulas obtinet anfractibus multis, tortuosas & sinuosas, visu elegantissimas, agninas lactes apertus jam & in globum convolutas effigie suâ imitantes. Foris subflavus est, intus candidus, radice crassâ. Inter corylos.

CCXXXIX. Fungus non vescus XVII. Mäusörchen. Suprà & infra ruber est ac lavis, pediculo tenuissimo fili instar, lignis vetustis annatus, in locis graminosis.

CCXL. Fungus non vescus XVIII. Hasen-örchen. Fungus est, externis folliculis circa extrema & connatis & hiantibus sursum prorrectis constitutus, foris exfuscus, intus albus, thrysulo unciali, sâpe & productiore, ex fusco albicante. Tota planta concava est pediculo, ferè tiaram referens. Octobri mense collecta, quæ vernô tempore inter abietes provenit.

CCXLI. Fungus non vescus XIX. Schlangenpütz-cken.

Cfen. Orbiculare est capitellum suprà ex fusco glaucum, versùs oras nonnunquam striatum, infrà cretaceum & sulcatum, petiolo longiore albo non cavo.

CCXLII. Fungus non vescus XX. **Grosser Krottenstuel.** Variat. 1.) latitudine secunciali est, caput orbiculare, suprà ex fusco variegato flavescentis, infrà ex aquilo fuscum, plicaturis latiunculis, ad pediculum longum ex fusco-flavo rufescente abeuntibus. 2.) Pileus, cuius diameter sexuncialis, suprà ex flavo albicat, & alutamento quasi quodam vestitur, oris deorsum inæqualiter & sinuosè flexis: infrà striis ad pediculum brevem excurrentibus, colore ex fusco flavo. 3.) Capitulo, cuius diameter quatuor unciarum summâ parte est ex fusco lateritio, oris in tenello pediculum versùs magis inflexis, in adultiore minus: imâ sulcato, & ex fusco viridi: petiolo in juniore albicante, in seniore ex fusco rufescente & splendente. 4.) Biunciale ejus capitulum suprà ex fusco album, infra pallidè striatum, & pallidè fuscum cum pediculo.

CCXLIII. Fungus non vescus XXI. **Klein Krottenstuel.** Fungus est unciali capitello, & minore pediculo longiore. Ejus aliquot species. 1.) totus ex albo violaceo fuscus, infrà striatus, caule non cavò. 2.) superiori parte ex violaceo albicans, inferiore violaceus, petiolo non cavo. 3.) capitello rotundisculo, subalbo, infernè rufulus seu ex albo incarnatus. 4.) Supra ex albo flavus, & velut alutamento quodam investitus, infrà ex cinereo fuscus. Senescens parte inferiore prorsus infusci est coloris. 5.) totus ex croceo rufus, pediculo longiore contortò. 6.) Croceus ex toto, pediculo longiore recto. 7.) capitello suprà candidus, oris sursum reflexis subalbidis, infrà striatus & albus. 8.) Su-

prà subalbus ac lèvis, infrà sulcatus & candidus, thyrsulo nonnihil incurvo. Sui generis adstites habet sæpiusculé sibi annatos. Omnes in locis incultis beym Penartischen Walde.

CCXLIV. Fungus non vescus XXII. *Groß Poggensuel.* Capite est suprà albido, infrà horridè nigro, petiolo longiore candido. In simetis & agris. In agro enatus orbes nostros majores magnitudine exæqvat.

CCXLV. Fungus non vescus XXIII. *Klein Poggensuel.* Exilis est fungus & varius. 1.) totus ex flavo fuscus, infernè sulcatus, pediculo longiore non cavo. Cum vitriolo coctus in elephantiasi & scabie foëdâ à vetulis extollitur. Sæpe ex butyro frixus illinitur in achoribus & malignâ capitis scabie. 2.) Ex fusco cinereus suprà, infrà ex atro fuscus, petiolo longiore tenui & concavo. 3.) in primâ ætate totus subalbus, post ex cinereo fuscus, pediculo longiore, tenuissimo & concavo. 4.) Capitello est suprà ex fusco flavescente, infrà striato, consimilis coloris, thyrsulo longiore subcroceo. Omnium capitella nonnihil fastigiantur.

CCXLVI. Fungus non vescus XXIV. Fungus παλυκέφαλος caulibus ad radicem connatis. *Bieltöpfcheter Poggensuel.* Ex numerosis constituitur fungis (viginti sex semel, semel quadraginta tres connatos notavi magnitudine differentes) concursu pedicularum unam radicem exstruentibus: Petioli longitudine septem unciarum, crassitudine semunciali, candiduli & contortuli sunt, rotundi partim, partim lati: capitella, quorum diameter sæpe quatuor unciarum, vel longior, cretata veluti suprà existunt, infrà sulcata & albida, quæ altitudo ætatis tractu superiore capitum parte in fuscedinem abit. Radici succus quandoq; adhæ-

adhærescit, qui inficcatus nitet & pellucidus est. **Bey dem Zollhause am Kneiphöfischen Wall.**

CCXLVII. Fungus non vescus **XXV.** Fungus bi-orchis anthracinus, **Schwartling.** Ater est in quercu natu-
tus, gravis, biuncialis magnitudine, ex duobus quasi fungis orbiculatis constitutus, radice brevissimâ. Sauciatus & con-
fossus succum reddit horridè nigrum, gustu modicè adstrin-
gentem. Ad lancem recens positus drachmas quinq;
pon-
dere exhibuit.

CCXLVIII. Fungus non vescus **XXVI.** Fungus tu-
rundæ effigie langlächtiger **Klößchen-Schwam.** Biuncia-
lis est altitudine, oblongus, subrotundus, digitæ minimi cras-
itudine, totus infuscus, radicem versus curta attenuatus.
Pennato musco annatus. **Hinter Lattenwalde im Gebirge.**

CCXLIX. Fungus non vescus **XXVII.** **Reizkenblüt.**
Capitellum ejus orbiculatum, ligneolæ ferè est indolis, parte
superiore circinationes quasdam exhibens, ex albo fusco
flavescentes. Inferius tenuiter porosum est, ex fusco subal-
bum, pediculo unciali, biunciali & longius producto, ex
fusco flavescente fultum. Morbidus aliquando fungus, & ad
interitum vergens, suprà viridiusculus est maximam partem,
infrà infuscus.

CCL. Fungus non vescus **XXVIII.** **Boletus cervinus**
communis officinarum. **Gemeine Hirschbrunst / Steinpülz-**
ken / Blüht Fœmellis. Fungus est $\sigma\varphi\alpha\rho\omega\eta\varsigma$, maculosus
& subalbus, biunciali magnitudine, saepe & major, petiolo
carens. Interior pulpa nigricat, & compactior est primi-
tus, post in fuliginem abit. Repperi ex his unum candidâ
prorsus intus substantiâ, cuius frusta chartâ involuta, post
croceo tingeantur colore unâ cum segestri. Existimo im-
maturum

maturum illum fuisse. Terræ affigitur crepitūs lupi instar. Libram unam horum fungorum à Belgis quatuor florenis redimunt nostrates, à fungivendis vetulis hic locorum quatuor grossis impetrandam. Αφροδίσιον quid est, sicutq; sanguinem pulpā vulneri immissā. **Bey Selnicken** in locis muscosis.

CCLI. Fungus non vescus **XXIX.** **Wässerichter Galretschwam.** Pediculo crasso, anguloſo, plura iſſiſtunt capitula crassa, ſemicircularia, ſinuata, ſupernè ad fuſcedinem abeuntia, infernè veluti pilis albicantibus obſita. Totus pellucidus eſt carnium instar galredæ lentiſ, viſcidus, aquoſus. Putrido ligno abiegnō adnatuſ Octobri Mense. **Im Löbenichtſchen Walde.**

CCLII. Fungus non vescus **XXX.** Flos arborum fungo affinis, **Zauber-Butter** Vetulis. Cremore eſt initio fluidus ex putrilagine abietis natuſ, curcumæ colore ſiccatus amoeniſſimè flavescit, & ſpongiosus nonnihil eſt. Colorem pictoriibus ſuppeditabit. In Sylvâ Lœbnicensi mense Octobri.

CCLIII. Fungus non vescus **XXXI.** Fungus racemosis vetuſtis ligniſ adnatuſ **Poggenaug.** Fungulus, eſt minutus globosus, ſociennos multos racematiſ ſibi cohærentes habens, colore ex atrō fuſcus, punuliſ minutissimiſ inſignitus. pediculo nullo. Fractuſ pulviſculuſ, tunicā incluſum ſuā, viſu elegantiſſimum offert, pallide purpureuſ, qui cum oleō ſubactuſ hepatarius fit colore.

CCLIV. Fungus non vescus **XXXII.** Fungus granulosus corallinus. **Körnichter Corallenſchwam.** Fungus omnium tenerrimus eſt, rotundulo capitello, thyrsulum, versuſ longeſcente, papaverini ſeminis magnitudine, Coral-

lli qvidem colore, sed multò amoeniore, incarnato, pediculo curto & tenui, fili instar. Socienos numerosos aetè sibi adjunctos habet, in natali ligno putrido. Succo intus turgidulus est, pictoribus commendabili.

CCLV. Fungus non vescus XXXIII. Fungus granulosus incarnatus. Körnichter Fleischfarber-Schwam. Priore grandior non nihil est, pileolo rotundo, incarnato, minutis seminis magnitudine, intus cavo & subalbo, pediculo pertenui candido. Numerosæ annascitur terræ muscum inter pyxidatum.

CCLVI. Fungus pyxioides coccineus XXXIV. Schr-lach-rother Büchsenschwam. Coryli, aliarumq; arborum ramulis cæduis putrilaginem minitantibus insidet, effigie pyxidulae minutæ, intus coccinei, foris subalbidi coloris, pediculo exili. Repertus mense Febr. 1648. in der Hollen-Grundhyeme aurâ maximè blandiente, quæ flores asaro, erygero, taraxaco & consimilibus plantis, hoc tempore indulserat, præcoquam maturitatem & aëris ferventias omnibus cum stupore admirantibus.

CCLVII. Fungus non vescus XXXV. Fungus cuculatus. Kappenschwam. Cæduo & putrido ligno adnascitur serie quâdam, cuculli alicujus aut pallii muliebris forma, foris candidus, lanuginosus, intus ex albo flavescens, & rugosus. Totus lentus ac gustu fatuus.

CCLVIII. Fungus non vescus XXXVI. Fungus farreus. Mehlschwam. Ex multis frustis latis, scabratis ac camuris, imbricatim sibi adjunctis, coassatur, annosis assistens arboribus, foris subflavus, intus candidus, qui levî manu in pollinē farinæ prorsus similem atteritur, solidandis ulceribus, additis aliis, misericè utilem, veterarum experimento. Im Löbenichtschen Walde in den hollen Eichen. N CCLIX.

CCLIX. Fungus non vescus XXXVII. Fungus lignosus pediculo longiore. **Holz-achtiger Schwam** mit einem langen Stiel. Vetustis & aridis insitit lignis, capitulo supra scabro, fusco, at in meditullio saepe fossulum, cavum illud umbilici, quod γαγγαμων dicitur græcis, repræsentantem, oris sursum reflexis fimbriam facientibus: infrà striis ad pediculum excurrentibus, spithamum longum & productiorem saepe, qui infimâ parte crassior, & tactu holosericus. Duos foris alveario adnatos domi servo.

CCLX. Fungus non vescus XXXVIII. **Scheibenbüchsen-Schwam.** Truncis adsistit semicirculi formâ, summâ parte circinnatâ, & saepe tuberosâ, imâ venustè foraminulentâ, tortuosâ, plicatili, flexibus labyrinthæis, quos inter minuscula hinc inde granula. Fagorum, quercuum aliarumque arborum οὐρανοῖς. Cum nitro & sulphure diutule coquendus est, ut mollescat. **Wird zu den Scheibenbüchsen gebraucht.**

CCLXI. Fungus non vescus XXXIX. Fungus ~~τυεράδης~~ **Rätsichter Holzschwam.** Fungum hunc, qui domi compluitur, saepe advertit tignis & asseribus suis annatum, rotundum saepe, aut alterius figuræ, solidum foris, lactescens. De homine illo proverbium est: τὸν ἀκόθεν Κρεκχύδην σὺν Θεος ὄικτείης.

CCLXII. Fungus non vescus XL. Fungus arborum lignosus. **Harter Holzschwam.** Tuber est ligneum semi-circuli figurâ, cui novus quandoq; allabens succus incrementum largitur. Foris partim nigricat, partim ex albo flavescit, subtùs candidum prorsus est tuber, & tenuissimè fungosum.

CCLXIII. Fungus non vescus XLI. * **Fungus pyxiodes**

lentifera. L. I.

Nº. 16. ad pag. 98.

Fungus pyxioides seminifer



Peltiza lentiformis L.

Nº. 17. ad pag. 99.
Fungus digitatus alveariorum.



des seminifer. *Kleiner saattragender Büchsenschwam.* Fungus est exilis, asseri vetusto, è pino facto, plerumque (eā sāpē serie, quā spectantur apium locumenta, queis ingeritur mel) annatus, quandoq; etiam terræ assidens, radicatione fibrillis quibusdam tenellulis impetratā. Ubi primum erumpit, capitello est ochræ colore, reliquo corpore incano ac villoso: dissectus pulpā intus est albicante, ostenditq; seminum rudimenta pulpæ ceu matrici suæ inhærentia, quā medullaceā temporis tractu absumptā materie, hiare incipit fungus, & abjecto operculo seu velamine pyxidem, formā refert elegantem, in quā copiosum & aspectu jucundum sistitur seminium.

CCLXIV. Fungus non vescus XLII. *Fungus digitatus alveariorum, das Händchen / das Mütterchen / Pol. Rēnka, Materka Podpora. In apiario, ubi favi, cellæ, seu locumenta apium, quandoq; reperitur fungus, ligno annatus, quem apiarii sacratissimum habent, ac veluti thesaurum pretiosissimum curatè asservant. Figurā sāpius variat: ὡς Πτή τὸ πολὺ, digitatus est, rarius aliā visitur formā. Apud Nobilem quendam ab Aulak inventum eum effigie humanā, rettulit mihi Vir fide dignus. Wulffsdorfio, prædio nobilissimo Illustris Comitis & Burggrabii à Dönhoff, fungum obtineo grandiusculum, mirè digitatum & cornutum, cui in unā extremitate elongatæ, & contortulæ subserviunt portiones, fungos referentes capitatos, pediculis innitentes suis. Birckenfeldiæ duos vidi, ex alveariis primū desumptos, quorum major *xergetoides*, minor *xergeroides*. Major ex admistâ fuscedine albus, intus candidissimus, bicornis erat, uno in latere undecim, in altero novem alia cornicula gestans. Minor fuscus totus, ac eleganti mantis effigie, tuberoso erat pol-

lice, digitis reliqvis parùm incurvatis. Utriusq; substantia mansu lenta, ac gustu fatua, odore iridis Florentinæ, ex mellario primùm petiti. Reperitur plerumq; in alveariis juniorum apum. Ussus. 1. pollen ejus haustus steriles fœcundat mulieres. 2. pueris epilepticis exhibitus fert opem. 3. Potui immissus anginá laborantes juvat. 4. colicâ paſſione discriuciatis præsentissimo est remedio. Ita sentiunt, mellatione qui fruuntur ubere. Adhæc mella & examina copiosa promittit apiariis: Injuriam apum, scilicet exuſtionem, & florum vitiationem avertere nesciens. De exuſtione lex est: si, cum apes meæ ad tuas advolâſſent, tu eas exuſſeris, legis Aquiliæ actionem competere, Celsus ait: 1. si servus ff. ad legem aquiliam. De florum vitiatione id memoriæ proditum est: Pauper & dives in agro vicino erant junctis hortulis. Habebat dives in horto flores, pauper apes: qvestus est dives, flores suos decerpi ab apibus pauperis; denunciavit, ut transferret: illô non tranferente, flores suos veneno sparſit; apes pauperis omnes perierunt. Reus erat dives damni injuriâ dati. Sed hæc obiter.

CCLXV. Gallium luteum, C.B. Pin. 335. Adv. Lob. fol. 358. Gallion luteum, Thal. p. 54. Gallium primum Tab. lib. 1. fol. 536. Galion, Matth. Bauh. in Matth. fol. 793. Galion luteum: Cord. in Diosc. 69. Gallium luteum Lob. ic. p. 804. Gallium flore luteo. Cam. hort. p. 63. Gallii primum genus Trag. Seb. in Trag. deutsch p. 391. Gallium Fuchs. fol. 196. Lon. deutsch. p. 270. Dod. niederländisch 575. Meyer-ſraut. Tab. Lon. Unser Frauen Wegſtroh Fuchs. Wallstroh/ Unser Frauen Bett- oder Wegſtroh Matth. Lobſraut und Raymyrhēn Saxonibus, Gliedſraut vulgò.

Subacris & siccantis est facultatis, Flos in cancro & malignis

lignis ulceribus perutilis: tusus & impositus sacris ignibus medetur; & sanguinis profluvia sistit. Lac coagulat in eodem maceratus. Fotu articulos juvat luxatos. Odore savissimo cœlum pluvium & tempestuosum pronunciat. Savius etiam olet Iride apparente. Ad viarum crepidines saxe.

CCLXVI. *Genista tinctoria Germanica* C. B. Pin. 395. *Ferula Trag.* Seb. in *Trag. deutsch* / 480. *Genista tinctoria vulgaris* Clus. hist. lib. 1. fol. 101. *Genista tinctoria*, Dod. lat. *lateinisch* fol. 763. *Genistella infectoria vulgi*, Lob. ic. pag. 89. o. *Genistella tinctoria* Tab. lib. 3. p. 803. *Tinctorius flos*, Fuchs. fol. 808. *Flos tinctorius* Lon. *deutsch* fol. 138. *Coroneola*, Cæs. lib. 6. cap. 39. p. 251. *Geel-Färbkraut* / Lon. *Klein Farbpfrimmen*. Tab. *Geel-Färberblumen und Heydenschmuck* / Seb. in *Trag. Gilblum* Fuchs. *Galeise opilionibus*. *Gens* oder *Genser vulgo*. *Calfacit* & *siccatur* ordine secundo, maximè semen, quod gustu est amaricante. Lineas & laneas vestes tingit flos, hinc & *tinctorius* nominatur. *Bey Morungen copiosè*.

CCLXVII. *Centiana minor* sive *Cruciata*, Lob. ic. p. 188. *Madelgeer* / Brunf. *deutsch* fol. 139. *Cruciata*. *Trag.* Seb. in *Trag. deutsch* fol. 203. Fuchs. 420. Lon. *deutsch* fol. 183. Eystett, Gesn. hort. fol. 255. *Cruciata*, sive *Gentiana minor* Dod. *lateinisch* 343. *Gentiana cruciata*, C. B. Pin. p. 188. *Gentiana minor* Matth. Bauh. in *Matth.* fol. 481. Tab. lib. 2. fol. 399. *Gentiana minor*, *cruciata recentiorum* Adv. Lob 130. *Gentiana III.* *cruciata*, Clus. hist. lib. 3. fol. 313. *Gentiana III.* Clus. Pann. p. 283. *Gentiana media*, Cam. hort. p. 65. *Cruciata gentianella*, Thal. p. 28. *Modelgeer* Tab. Lon. *Modelgeer* / und *Creuzwurz* / Matth. *Klein Gentian* / *Speerenstich*

und Heyl aller Schaden vulgò. Zu Gôrgenburg hinter dem
Schloß / it. in Wiesdahlen in locis incultis.

CCLXVIII. *Gentiana palustris angustifolia*. C. B. Pin.
188. *Gentiana minima*, Matth. deutsch fol. 258. *Gentianæ*
4. species, Clus. hist. lib. 3, fol. 313. *Gentiana angustifolia vel*
qvarta, Clus. Pann. 284. *Pneumonanthe Tab. lib. 2, fol. 466.*
Pneumonanthe Lob. ic. p. 309. Pneumonanthe Cordi Lob.
Obs. fol. 166. Calathiana viola autumnalis, Gesn. hort. 251.
Lungenblumen Tab. blauer Tarant Nostratibus. Amarore
suo siccatur, calcatur & abstergit. Vulneraria est planta, tussi-
entibus & suspiciose utilis. Cunis imponitur à credulo
vulgo contrà fascina. In districtu Gerdaviensi bey Wiesdah-
len in pratis editioribus. It. bey Creuzburg. Herba hæc,
ubi florere incipit, fœniseum parant rustici.

CCLXIX. *Geranium batrachoides folio Aconiti* C.
B. Pin. 317. *Geranium sive batrachium cæruleum, Tab. ic. pag. 58.*
Geranii species tertia, Gesn. hort. fol. 260. Geranium Batra-
choides cæruleum & Geranium batrachoides flore albo, Ey-
stett. Blaue Storchenschnabel mit Eysenhut's Blättern. Ad
margines pratorum bey Kobbeldude.

CCLXX. *Geranium batrachoides folio Aconiti,*
flore ex cæruleo albicante. Joh. Lœf. In Birckenfeld ad
fossas. It. bey Holland am Mühlflusß.

CCLXXI. *Geranium columbinum, Pes Columbinus*
Tab. ic. p. 56. *Geranium folio Malvæ rotundo, C. B. Pin.*
318. *Geranii vulgaris species, Gesn. hort. fol. 260. Geranium*
alterum, Trag. Seb. in Trag. deutsch 276. Matth. Bauh. in
Matth. fol. 621. Fuchs. fol. 205. Geranium secundum Thal.
p. 44. Pes columbinus. Dod. lateinisch fol. 61. Pes columbi-
nus, seu alterum Geranium Dioscoridis, Lob. ic. 658. Adv.
Lob.

No. 18 ad pag 103



*Geranium columbinum
erectum tenuius laciniatum
flore magno.*

Lob. 296. Geranium Malvaceum sive Balsaminum Cam. hort. p. 66. *Taubenfuß / Storckenschnabel* Tab. ic. *Taubenfuß / Fuchs. Sonnenwirbel / Rusticis*, qui armentis sangvinem mingentibus, herbam in lacte ebutyrato coctam, præsentissimo remedio offerunt. Moderatè calefacit & siccatur, cum adstrictione quâdam. Hinc vulneraria est planta, herniosis perutilis, foris & intus usurpata. *Bey Königsberg* pa-

sim in arenosis.

CCLXXII. **Geranium columbinum* erectum tenuius laciniatum flore magno Joh. Lœs. *Tieff zerschnittener Taubenfuß mit großer Blüth.* Radix ruffula, contorta, “ longius sub terrâ incedens, nova subinde germina exclu-“ dens, ac gustu validè adstringens, caulinulos rectâ in altum “ mittit cubitales sæpius minores, teretes, egregiè hirsutos, “ brachiatos, ac geniculatos; ad singula genicula, tribus glu-“ mis rufescens firmata, folia visuntur viridia, petiolo “ longo nitentia, hirsutie aspera, rotunda, in septem pro-“ fundas lacinias secta, quæ in summitate plerumq; tripar-“ titæ: flos mense Junio & Julio est purpurascens, siccatus “ verò violaceus, ex qvinq; foliis sinuatis majusculis constru-“ ctus, quibus subserviunt alia quina foliola viridia, exili in “ apice filamento prædita: flori succedit acus, in qvinq; exi-“ litates tenuissimas exiens, cuius semen oblongum nigricans, “ ætatis tractu sursum apicem versùs tendit, ac inflectitur, ceu “ videre est in geranio Columbino procumbente. Tota “ planta insignis est adstrictionis, tormentillæ viribus haud ce-“ dens. *Hinter Quednau aufm Berge copiosissimè. Zwischen der Liep und Sandkrug nach dem Pregel zu* copiosè. Herba hæc ubi legebatur, jaculus è serpentum genere sepe obtulit trucidandus, in cuius ventriculo delituere pulli quinq; degu-

degulati avium, quorum unus feré consumptus. Ipsa avium
mater mortua ibidem loci spectabatur, ex gulâ mordicûs à
serpente prius fracta.

CCLXXIII. *Geranium columbinum procumbens
tenuius, laciniatum flore parvo J. L. Geranium columbinum
tenuius laciniatum C. B. Pin. 318. quod in prodr. 2. p. 138. Lieff
zerschnittener Taubensuß mit kleiner Blüt. Radix oblonga,
„filamentis instructa luteis, caulinos edit copiosos, pal-
„mares, virides, hyrsutos, ac in terram pronus, queis fo-
„lia rotunda, in qvinq; profundas lacinias primùm & mox
„in alias dissecta, serviant, pediculis longis fulta: flores ad
„latera, thyrsulorum fert nanos, cærulos, quadrifolios, quos
„vanescentes rostella, seu utriculi rostrati parvi, turgidi ex-
„cipiunt, quorum semen maturitate lasciviens, rotundum,
„fuscum, ac glumâ vestitum, sursum ad rostri apicem refle-
„ctitur, capreolo quasi insidens.

CCLXXIV. Geranium cicutæ folio moschatum &
inodorum C. B. Pin. 319. Myrrhida Plinii, Rostrum ciconiæ
Lob. ic. 658. Geranium primum Matth. deutsch fol. 621.
Lon. deutsch fol. 188. Fuchs. fol. 204. Geranium Trag. Ky-
ber. in Trag. p. 347. Geranium supinum Dod. lateinisch 63.
Geranium supinum majus Cord. hist. fol. 108. Geranium
myrrhinum, Rostrum ciconiæ Tab. ic. 58. Geranium musca-
tum, Cam. hort. p. 66. Eystett. Geranium σκανδικόφυλλον,
Thal. pag. 44. Storchen-Schnabel mit Schierlings-Blät-
ter. Bey Lautenmühl passim.

CCLXXV. Geranium cicutæ folio minus & supi-
num C. B. Pin. 319. Geranium minus & primum. Trag. Seb.
in Trag. deutsch 276. Geranium minus, Geranium arvense
Tab. p. 57. Myrrhida Plinii, & rostrum ciconiæ inodorum
vulga-

vulgatum, Lob. ic. 659. Geranium septimum, sive Geranium gruimum, Dod. Lateinisch 64. Geranium Moschatum inodorum, Eystet. Kleiner liegender Storchenschnabel mit Schülings Blättern. Acker-Schnabel-Kraut. Tab. ic. Storch- oder Kranich-Schnabel. Seb. in Trag. Klein Schnabel-Kraut und Acker-Schnabel-Kraut vulgo. Bey Königsb. in locis arenosis passim.

CCLXXVI. Geranium Robertianum, Lob. ic. 657. Dod. Lateinisch 62. Cam. hort. p. 66. Geranium Rupertianum Tab. ic. p. 56. Geranium tertium Matth. Bauh. in Matth. 622. Fuchs. 206. Robertiana, & herba Roberti. Lon. deutsch. 188. Geranium tertium, seu Robertianum Thal. pag. 44. Geranium Robertianum primum C. B. Pin. 319. Gratia Dei, vel Geranion quibusd. Trag. Kyber. in Trag. 108. Rubertiana vulgo, Cæl. lib. 14. c. 28. p. 559. Ruprechtskraut Fuchs. Lon. Gottes-Gnad/Seb. in Trag: S. Ruprechts-Kraut/ Gicht-Kraut / Rothlauffen Kraut / und kleine Schöllwurz/ oder klein Schwalben-Kraut vulgo. Bey Königsberg passim.

CCLXXVII. Gladiolus floribus uno versu dispositis major, C. B. Pin. 41. Victorialis rotunda & gladiolus verus, Gesn. hort. fol. 286. & 260. Xiphion-Spatha, seu segatalis gladius. Ruell. fol. 589. Victorialis rotunda, Eystett. Victorialis herba Lon. Germ. Victorialis foemina, seu gladiolus sylvestris, Cord. hist. fol. 97. Gladiolus Germanicus. Tab. lib. 2. fol. 323. Gladiolus nostras, Cam. hort. p. 67. Gladiolus Narbonensis, Lob. ic p. 98. Gladiolus, Dod. Lateinisch fol. 41. Xyphion minus, Clus. hist. lib. 2. fol. 190. Clus. Pann. p. 226. Große Braunschwertel Thal. Runde Siegwurz/ und Allermann Harnisch vulgo. Ad sylvarum declivi

O

declivi

declivi loco sitarum margines bei Königsb. Vivum exemplar inspiciendum.

Loc nomine de pingit, CCLXXVIII. *Glaux aquatica folio sub-rotundo. Joh.
Glaux maritima Lœf. Glaux maritima C. B. Pin. 215. Glaux exigua maritima.
An Glaux Dioscoridis. Lob. obs. 227. Glaux exigua maritima.
ull Auctor, sed Adv. Lob. 178. Glaux marina minor Tab. lib. 2, fol. 507.
ex palustris flore, „Mild Kraut mit rundeckten Blättern. Radice fulcitur
clauso, folijs por-, „tenera, albicante, thyrsulos ramosos, subrectos partim, par-
. In s. vel Glaux, „tim humi jacentes, ac horsum prorsum serpentes, excluden-
olio Shuringiae, „te, qui inter reptandum villis radicantur exiguis: hos bina
n: 215. „oblonga, ac rotundata subinde & ex adversum excipiunt
lio portula L. „folia, capsis rotundis, fimbriatis, ad eorum exortum succe-
„dentibus, in quibus minutissimum semen. Calida & hu-
„mida est, ad revocandum extincti lactis ubertatem nutricibus
„salutaris, auctore Diosc. & Äginetâ. In lacunis hæsitat, ac
ruffescit aquis destituta. *Hinter dem Tragheimischen Wall.*

CCLXXIX. Glyzyrrhiza siliquosa, vel Germanica.
C. B. Pin. 352. Glyzyrrhiza altera, Matth. Bauh. in Matth.
486. Glyzyrrhiza vulgaris, Dod. Lateinisch. f. 341. Liqviri-
cia, Brunf. Lateinisch. tom. 3. fol. 123. Glyzyrrhiza siliquosa,
Lob. ic. p. 86. o. Adv. Lob. fol. 405. Observ. Lob. 529.
Glyzyrrhiza Fuchs. 192. Cord. hist. fol. 164. Gesn. hort.
fol. 260. Dulcis radix, Trag. Seb. in Trag. deutsch. 733.
Dulcis radix communis, Gesn. hort. fol. 257. Süssholz Brunf.
Fuchs. Lakarize vulgo. *In der hollen Grund.*

CCLXXX. Gnaphalium montanum flore rotun-
diore C. B. Pin. 263. Gnaphalium montanum purpure-
um & album Adv. Lob. 202. Gnaphalium montanum al-
bum & purpureum Tab. lib. 2. fol. 106. 107. Lagopus secun-
dus, Trag. Seb. in Trag. deutsch. 263. Gnaphalium monta-
num

num svave rubens, Eystett. Pilosella minor Fuchs. fol. 606. Pilosella minor Dodonæi. Thal. p. 83. **Berg-Rühr-Kraut** mit runder Blüth. Hasen-Pfötlein/ Seb. in Trag. Weiß und braun Engelblümlein Tab. Meuß-Dehrlein Fuchs. Rühr-Kraut vulgò. In collibus herbosis & salebrosis ubertim provenit bey Königsb.

CCLXXXI. Gnaphalium vulgare majus C. B. Pin. 263. Impia Plinii Gesn. hort. fol. 262. Gnaphalium vulgare, Matth. Bauh. in Matth. fol. 625. Gnaphalium vulgare, Filago, centunculus, Adv. Lob. 201. Lob. ic. p. 480. Gnaphalium vulgare minus, Thal. p. 55. Gnaphalium II. vulgare Tab. lib. 2. fol. 105. Filago, sive impia, Dod. Lateinisch 66. Gnaphalium. Fuchs. fol. 222. Heliochrysos sylvestris, Trag. Seb. in Trag. 262. Herba impia Cæl. lib. 12. c. 15. p. 485. Tomentum Lon. deutsch f. 210. Tomentum seu centunculus, Cord. Diosc. f. 58. **Groß gemein Rühr-Kraut/** Matth. Tab. Fuchs. In locis apricis & arenosis passim bey Königsb.

CCLXXXII. Gnaphalium majus angusto oblongo folio alterum. C. B. Pin. 263. Gnaphalium Anglicum, vel Belgicum folio longiore Lob. ic. fol. 482. Gnaphalium Anglicum folio longiore, perperam Leontopodium alterum Matth. Adv. Lob. 202. Leontopodium alterum vulgare, Cam. hort. p. 86. Filago major quibusdam **Groß Rühr-Kraut mit schmalen länglichen Blättern.** In salebrosis passim bey Königsb.

CCLXXXIII. Gnaphalium medium. C. B. Pin. 263. Tab. ic. p. 390. Filago minor, Lob. ic. p. 481. Dod. Lateinisch fol. 66. **Klein Rühr-Kraut** Tab. ic. In agris incultis præsertim editioribus copiosè.

CCLXXXIV. Gramen Parnassi albo simplici flore, C. B. Pin. 309. Hepatica alba, Cord. hist. fol. 152. Gramen

Parnassum Dod. Lateinisch. 564. Gramen Parnassi, Lob. ic. p. 603. Eystett. Gramen hederaceum, Flos hepaticus, Tab. ic. p. 214. Gramen Parnassi, hederaceum recentiorum. Adv. Lob. 263. Obs. Lob. 330. Hepatica flos Tab. 1. Weiß einfach Parnasser Gras. Gramen Parnassi, & Enneadynamis Polonorum, Gesn. hort. 261. Parnasser Gras oder Leber-Blümlein Tab. Weisse Leber-Blum Nostratibus. In riguis & humidis pratis hinter Fischhausen nach Lochstädt zu copiosè.

CCLXXXV. * Gramen mannæ esculentum Prutenicum. Joh. Lœsel. Schwaden Nostratibus. Diversum longe est à gramine mannæ esculento. Lob. p. 24. In iconibus, quod Germanis quoq; Schwaden nuncupatur, & inter gramina ischæma numeratur. Nostrum verò gramen est paniculatum pratense, hoc, ubi rorescit, pinguisculum reddit liquorem eumq; dulcissimum mannæ instar; dulcorum hunc facile advertit is, qui roratum pitissando attingit semen. Manna hæc esculenta ut fiat, ita laboratur: 1. Escale semen in pratis incerniculo ex setis eqvinis, horsum vorsum ducto, colligitur sublucano tempore, & quidem mense Julio. 2. apricatione sub dio siccatur. 3. siccatum infusitudinâ, supposito stramine, bacillo ligneo modestè tunditur, & à glumis extimis laboriosè admodum liberatur. 4. Furfur & crassius purgamentum flatu dejicitur, seu ventilando tollitur. 5. De integro in eodem fustuario accuratiūs tunditur, subjectis vel calendulae floribus siccis, vel pomi, vel coryli foliis, quibus nitor & color tunso accedit semini. 6. toties ac toties in mortario fustigatum semen iterum atque iterum ab apludâ, & minutissimâ paleâ, nec non foliorum reliquiis, ventilatur, purgatur, ac synceritate esui aptum redditur. In pratis & locis uidis copiosè. Item aussiden

Nº. 21 ad pag. 108.

Gramen
lentum

mannaæ escu -
Prutenicum.



den Wiesen beym Naszen Garten bey Königsb. Semen, quod deglubitum est, nostrates à Polonis plerumq; parvo emunt. Ustilagine petitur nonnunquam. Furfures ejus equos juvant vermbus infestatos. Aurigæ horum loco secalis furfures porrigit, certissimo adversùs vermes præsidio, & horis demum aliquot elapsis equos potum agunt.

CCLXXXVI. Gramen officinarum. Joh. Lœsel. Gramen caninum arvense, sive gramen Dioscoridis. C. B. Pin. p. 1. Gramen canarium, Medicatum officinarum. Adv. Lob. fol. 2. Gramen caninum I, Tab. lib. 1. fol. 637. Gramen Ruell. fol. 593. Dod. Lateinisch. fol. 558. Cord. in Diosc. f. 63. Graminis primi Dioscoridis species major, Thal. p. 50. Gramen Dioscoridis Gesn. hort. f. 260. *Hunds-grass* Tab. *Quicken/Quack Grass/ und Grass/Cord.* in Diosc. Inter segetes passim: Spica variat: nonnunquam densior & compactior est, aliquando sparsa, aristis, petiolis longis innuentibus, velut in avenâ. Floret elegantissimè secalis instar.

Moderatè refrigerat, siccatur & abstergit. Jecoris & rerum obstruktiones aperit, prodestq; regio morbo correptis, & nephriticis. Potissima vis in radice.

CCLXXXVII. Gramen caninum supinum minus. C. B. Pin. 1. Gramen caninum supinum secundum, Tab. lib. 2. fol. 637. Gramen caninum supinum Lob. ic. p. 21. *Klein liegend Hund-Grass* Tab. Passim bey Königsb.

CCLXXXVIII. Gramen geniculatum caninum marinum Lob. ic. p. 21. Gramen caninum maritimum spicatum. C. B. Pin. 1. Gramen caninum tertium, Tab. lib. 1. fol. 637. *Geährtes Hund- und See-Grass. Am Eurischen Hause* in locis arenosis.

CCLXXXIX. Gramen dactylon folio latiore, C. B.

Pin. p. 8. Ischæmon Plinii. Clus. hist. lib. 6. fol. 217. I-
schænum I. Tab. lib. 1. fol. 658. Sangvinaria. Comitis de
Nevenare, seu crus Galli. Trag. Kyb. in Trag. p. 714. Ischæ-
mon vulgare Lob. ic. p. 24. Adv. Lob. fol. 4. Fünff Finger-
Gras mit breiten Blättern. Eine Gras Art kräfftig Blut zu
stillen/ Gesn. Cat. p. 46. Hahnen-Bein/ Kyber. in Trag.
Blutt-Gras Tab. Subdulce est: siccantis & adstringentis
naturæ. Semen sangvinem sistit & foriolos juvat. Hinter dem
fordersten Krüge in der Sarchau. it. am Wege forn am
Krüge. it. Zwischen Marsheinen und Forcken Krüge am
Wege.

Hoc et sequens, varie-
de saltem differunt
cum Gramine pratense
spica flavescente
B. Pin: B. 1: in que ra-
ione loci natalis mag-
am deprehendi varie-
atem 1: convenient.

CCXC. *Gramen montanum odoratum spicatum. Joh. Lœl. Wollreichend spitziges Kornähriges Berg-Gras. „ Radix longissimis capillamentis albicans, & in cespites abi- „ ens, proximè terram numerosa & exilia alit folia, spargit- „ que culmos paucis geniculis, erectos, foliorum volvis, ex „ cæsio-virescentibus, conclusos, in summitate spicam ex pa- niculis curtis habentes. Hinter Frauenburg.

CCXCI. Gramen arvense odoratum spicatum. Joh. Lœl. Wollreichend Kornähricht Acker-Gras. Radice nititur, tenuissimis & albicantibus filamentis, quæ in altum pro- trudit culmos geniculatos, in utriculis foliorum viridium & angustorum, maximam partem delitescentes, in fastigio secalis instar spicatos, læves: Odoratissimum est gramen, bonâ fra- grantia vernali tempore, gramine Mariæ haud cedens. In in- cultis passim bey Königsberg.

CCXCII. *Gramen arvense spicâ compactâ divulsâ. Joh. Lœl. Acker-Gras mit dichten von einander gezogenen Lehren/ bey Königsberg.

CCXCIII. *Gramen cristatum radiculis nigricanti- bus.

N. 22 ad p. 110.



*Gramen montanum
odoratum spicatum.*



No. 23 ad p. 110:
Gramen arvense spicā

Compactā
divulsa.



16.24 ad pag. 110.



*Gramen Cristatum
radiculis nigricantibus.*




Nº 25. ad pag. 111.

Gramen paniculatum molle
paniculâ dilutâ cœruleâ.



Holcus lanatus L.



No; 26. ad pag. 111



Gramen Mar
iae Borussorum.

Holcus odoratus. L.

bus. Joh. Lœs. Fadem-blättriges subtile Berg-Graß mit sehr kleinen schwarzen Wurzeln/ hinter Frauenburg. est *Gr. foliolis juncis brevibus minus.* C.B. Pin. 5

CCXCIV. Gramen montanum paniculâ spadiceâ delicatiore 12. in Prodr. C. B. p. 6. lieblich Castanien-bräunes Graß. Radix alba, brevis, cirris numerosis, veluti è cespite culmos exiles, teretes, geniculatos, uno alteroq; folio vestitos, exire patitur, in fastigio paniculam amœnulè formatam spadicei coloris efferentes. Foliis adhæc proximè terram curtis est, ac pusillis. In arenosis.

CCXCV. Gramen pratense paniculatum medium. C. B. Pin. p. 2. Mittel-Strauß-tragendes Wiesen-Graß. Gramen minus, Tab. ic. p. 201. Lob. ic. p. 1. Gramen pratense secundum, Dod. Lateinisch. fol. 560. Klein gemein Graß. Tab. ic. passim in pratis & uidis.

CCXCVI. *Gramen paniculatum molle paniculâ dilutè cæruleâ. Joh. Lœs. Weiches Graß mit einem licht-blauen Strauß. Bey Königsberg. est varietas *Graminis malensis paniculata*

CCXCVII. *Gramen Mariæ Borussorum. Joh. Lœs. Gramen paniculatum odoratum 13. in Prodr. p. 6. C. B. Marien-Graß. Morgen-Graß Nostratibus. est *Gr. paniculatum odoratum*

Radiculis provenit candidis, geniculatis: foliis angustis, " & prodr. 7. ubi etiam longioribus, acuminatis, odoratis: paniculam in culmi sum- " repenter, sed quo mitate gestat exiguum, leviter sparsam, tortuosis pedicellis " modo hoc Gramen est insistentem, ex virore subflavescentem, ac splendentem: " haec puerò Flora pro Gramen hoc in fasciculos manuales colligitur sèpè à pueris, " est satis laudabilis & ante templi fores diebus festis distrahitur. Pluff den Wies- " sen hinter dem Bretter-Kruse. *Holcus odoratus L. 7.*

CCXCVIII. Gramen segetum altissimâ paniculâ sparsâ. C. B. Pin. 3. Gramen segetale paniculatum Tab. lib.

1. 638. Gramen segetum paniculâ speciosâ latiore, Lob. ic.
p. 2. Ackerstraß. Gras Tab. unter dem Getreidig.

CCXCIX. Gramen segetum paniculâ arundinaceâ.
C. B. Pin. p. 3. Gramen pratense tertium Dod. Lateiniſch.
561. Gramen harundinaceum arvense Tab. lib. 1. fol. 648.
Gramen loliaceum octavum. Trag. Seb. in Trag. deutsch 531.
Agrorum venti spica, & gramen agrorum, latiore, arundina-
ceâ, comosâ paniculâ, Lob. ic. Ackerwind Gras. Tab. A-
ckerwindhalm/ der Hirschen nicht ungleich/ Rohr Gras vulgo.
In pratis passim, non raro & inter segetes.

CCC. Gramen leporinum. Gramen tremulum Tab.
ic. 231. Gramen tremulum majus C. B. Pin. p. 2. Graminis
loliacei decimum genus. Thal. p. 52. Phalaris pratensis mi-
nor Lob. ic. p. 44. Adv. Lob. fol. 16. Lolium decimum, &
Ægilops Plinii Trag. Seb. in Trag. deutsch. 532. Ægilops,
Lon. deutsch fol. 287. Gesn. hort. 245. Amourettes trem-
blantes. Clus. hist. lib. 6. fol. 218. Zitterndes Haasen Gras/
Tab. Haasen Brodt und Hasen Dehrlein Lon. Zitter Gras
und unser lieben Frauen Flachs vulgo. In monte Apollinis,
in Quednau. Item im Penartschen Walde.

er: Caryophyllum mon-
vania" C. B. Pin. 48°
g. Figura que in
Prussia, Bauchini-
longe proferenda.
ex digitata L.
20.

CCCI. *Gramen Caryophyllum polycarpon fru-
etu triangulo. Joh. Lœf. An gramen caryophyllum mon-
tanum spicâ variâ? 23. in Prodr. C. B. p. 9. Fruchtreiches
Nâglein Gras mit dreykantiditem Saamen.

„ Radix multis filamentis nigricantibus, folia excludit angu-
„sta, spithamam sœpē longa, viridia, graminis caryophyllæi fo-
„liis Tab. lib. 1. fol. 641. assimilia, quæ inter culmi aliquot
„tenues, virescentes, foliis destituti assurgunt, geminam in
„summitate spicam ex ruffulâ volvâ exeuntem, ostentantes,
„quarum una divulsa & polycarpos est, fructu triangulo,
gluma-

glumâ subrubenti cincto, altera compacta, & longitudine in acutiem abiens. Bey Domnau in incultis.

CCCII. Gramen hirsutum nemorosum Lob. ic. pag. 16. Gramen sylvaticum pilosum, Tab. ic. p. 227. Gramen hirsutum latifolium majus C. B. Pin. p. 7. Breit Wald-Graß mit härichten Blättern/ haarechtig Wald- oder Busch-Graß/ Tab. Wald-Stachel-Graß quibusdam. Hirsutie est copiosissimâ, quam nonnunquam ex parte deperditam gerit.

CCCIII. Gramen thyphoides maximum spicâ longissimâ, 25. in Prodr. C. B. pag. 10. Großes langes Kölblein- oder Fuchsschwanz-Graß mit einer zwieblechten Wurzel. Radici bulbosæ geniculatae, fibris exiguis, & numerosis instructæ, culmus insistit rectus, bicubitalis, spicâ superbiens, cuius longitudini mensus pollice ac indice explicato, Λιχας Græcis, sæpius exæqvatur. Spica modò longior, modò brevior. In arvis sæpè reperitur bey Königsberg.

CCCIV. Gramen thyphoides asperum primum. C. B. Pin. p. 4. Gramen typhinum primum Tab. ic. 217. Liesch-Graß Tab. Scharff Kölblein-Graß. In monte Apollinis zu Quednau.

CCCV. Gramen thyphoides spicâ angustiore C. B. Pin. p. 4. Gramen aloperuroides minus alterum. Lob. ic. p. 9. Gramen alopecurinum secundum Tab. lib. I. fol. 64I. Kölblein-Graß/ Fuchsschwanz-Graß Tab. hinter der Haberbergschen Kirchen ad margines pratorum. It. bey Schwabis im Gebrauch.

CCCVI. Gramen thyphoides culmo reclinato. C. B. Pin. p. 4. Gramen alopecurinum tertium. Tab. lib. I. fol. 64I. Kölblein Graß mit zurücktretendem Helm. Gramen alopecuroides minus. Lob. ic. p. 9. Fuchsschwanz-Graß das dritte Tab. In arvis passim. P CCCVII.

CCCVII. Gramen pratense tomentosum paniculâ sparsâ. C. B. Pin. p. 4. Baumwolltragendes Binsen-Graß. Linagrostis, Tab. lib. 1. fol. 665. Gramen tomentarium. Linum pratense. Tab ic. p. 230. Gramen Eriophoron, Dod. Lateinisch. fol. 562. Gnaphalion, Trag. Kyber. in Trag. pag. 683. Linum pratense, Lon. deutsch fol. 210. Juncus bombycinus, Tomentum & linum pratense Cordi, & Gnaphalium Hieronymi Bockii Lob. ic. p. 87. Juncus bombycinus. Adv. Lob. fol. 44. Gramen junceum lanigerum, Thal. 55. Flachs, Graß Tab. Matten-Flachs Kyb. in Trag. Matten- und Wiesen-Wollen/ Lon. Wiesen-Flachs und Matten-Woll-vulgò. In pratis humectis, & vallis uliginosis passim.

CCCVIII. Gramen junceum spicatum seu triglochin, C. B. Pin. p. 6. Binsen-Graß mit einer langen Ahr. Gramen junceum spicatum, Tab. ic. p. 224. Carex minor, Lon. deutsch fol. 209. Gramen marinum spicatum alterum, Lob. ic. 17. Gramen marinum spicatum alterum majus. Cam. hort. 69. Gramen mixtum ex junco & gramine Thal. p. 55. Gramen junceum 4. Tab. Geährt Bins-Grass. Tab. ic. Klein Ried-Graß Trag. Kyber in Trag. Binsen-Grass vulgò. In pratis humectis circa Regiomontum passim. it. Bey der Neuhäuschen Mühle am Berge.

CCCIX. Gramen junceum folio articulato sylvaticum. C. B. Pin. p. 5. Gramen junceum sylvaticum Tab. ic. p. 223. Wald-Binsen-Graß/ und Wald-Bies-Graß mit zergliederten Blättern. In der hollen Grund in uliginosis. It. Beym Zoll-Haus am Wall.

CCCX. *Gramen junceum aquaticum semine rameoso. Joh. Loef. Radix est geniculata, longiuscula, fibris instructa suis, foris subflava, intus albicans, ex quâ sub terra

No: 27. ad pag. 114.




Gramen Caryophyllatum
poly carpon fructu
triangulo.

No: 28. ad pag. 114



Gramen juncium aquatilium Semine racemoso.





No. 29. ad pag. 115.

Gramen juncum Semine acuminato.



Juncus Squarrosus. L

terra longius incedente, & nova gramina excludente, caulis exsurgit, paucis foliis juncis comitus, in summitate nonnihil brachiatus, cuius ramusculis fructus insistit racemosus. Forte illud est, quod Bauhino fuerat missum à D. Fleissero. **Wässer-Binsen-Graß mit traubichem Saamen.**
Hinter Österrod im Bruch.

CCCXI. *Gramen junceum semine acuminato. Joh. Lœs. **Binsen-Graß mit schwärzgespitztem Saamen.** Radix è villis longiusculis structa, thyrsulos promit uncias novem altos, laves ac virides, in fastigio genicula habentes, è qui- bus novi & exiles coliculi, foliolis acutis rubicundisq; fulti, enascuntur, semen in exortu geminis pallidisq; paleis insitens, mox aliis horridè nigris vestitum, oblongum, splendens, & in acutiem tendens, sustinentes. Remotis paleis semen subalbidum est, escam gratissimam volucrum generi, ut existimo, conferens. Foliis est tenellulis, copiosis, quinque vel sex unciarum longitudine, quæ ad radicem congressa bulbum quasi quandam concursu emetiuntur suo. Flos ei purpureus mense Junio. **In den Wäldern am Wege.**

CCCXII. Gramen junceum sextum Tab. lib. 1. fol. 660. Gramen nemorosum caliculis paleaceis. C. B. Pin. p. 7. Holosteum Matth. Lob. ic. p. 18. Gramen epigonato-cavlon, Thal. p. 55. Holostium i. Matth. Bauli: in Matth. f. 687. **Krotten-Graß** Tab. ic. **Poggen-Graß** quibusdam. **In der hollen Grund** passim.

CCCXIII. Gramen Cyperoides palustre majus spicâ divisâ. C. B. Pin. 6. Gramen Cyperoides parvum aquaticum, Lob. ic. p. 19. Gramen cyperinum palustre minus. Tab. ic. p. 220. **Groß Wässer Ziper-Graß mit zertheilten braun-**

braun-gelben Lehren. Klein wild Galgen-Graß Quibusdam. Variat magnitudine, cùm foliis sit modò latioribus, modò majoribus, modò angustioribus, modò brevioribus. In Pratis nach dem Bretter Krüge.

CCCXIV. *Gramen Cyperoides palustre spicâ pendulâ. Joh. Lœl. Wasser-Cyper-Graß mit hangenden „schwarz-grünen Lehren. Radix ex crassulis lignosis & rotundis villis maximam partem constituta, ac mirè capillata, caules in altum egerit sesquicubitales, acutos, triangulos, quibus ad internodia spicæ tres, quatuor vel quinque, quarum binæ ultimæ sèpiusculè steriles, è capsis oblongis, tenellis, numerosissimis, viridibus, paleis interspersis nigris, constitutæ, ac sesquiunciam longæ, alternatiim sibi succeden tes, assistunt, folio circa exortum suffultæ longiore & acutiore. Foliis reliquis est arundinaceis sesquicubitalibus peracutis, è radice enascentibus, & caulem fotu quodam amplexantibus. Notabile est, hujus graminis radici, nonnunquam & cauliculo, adnasci Mense Julio corpuscula quædam oblonga, exilia, albicantia, formicarum ovis assimilia, quæ aperta exiguissimos intrà conclusos ostendunt vermiculos. Exsiccata ova rubrum acquirunt colorem. Fortè ex ipsis vermiculis muscæ tandem generantur, quemadmodum id observavi in Ranunculo longifolio palustri majore. C. B. auff den Wiesen nach dem Bretter-Krug. It. bey Sunnicken.

CCCXV. *Gramen Cyperoides minus repens spicâ divisâ. Joh. Lœl. Klein kriechend Cyper-Graß mit zertheilten braun-gelben Lehren. Hinter Frauenburg in montosis. Radix fusca internodiis distincta suis, summâ tellure reptando incedit, tenellulis aliis radiculis, ad singula genicula ortis, & capillacea quasi lanugine instructis, sustentata:



Gramen Cyperoides polystre spica pendula.

No. 31. ad pag. 116.
Gramen Cyperoides minus
repens spica divisa.



Carex Avenaria . L.

No. 32. ad pag. 117.



Gramen Cyperoides

spicis curvis divisis.

Carex canescens. L.

ex geniculis passim caulinis oriuntur virides, triquetri, unci-
arum sex longitudine, queis spicæ aliquot perbreves (formâ
assimiles spicis, qui in gramine cyperoide palustri majori C.B.
advertuntur) spadiceo-lutei coloris, cui & quantillum viridis
admixtum, alternatim dispositæ, quarum prima foliolū sub-
iectū habet, adhærescunt: foliis est tenuissimis & acutissimis.

CCCXVI. *Gramen Cyperoides spicis curtis divul- *est Gr: Cyperoides*
sis Joh. Lœs. *Cyper-Gras mit kurzen abgesonderten Achren.* *plumbus spicis mi-*
Radix villosa & egregiè capillata thrysulos semicubitales,
majores sèpe, sèpè minores, acutos ac triquetros, exire pati-
tur, quorum columina quinq; , sex vel plures exornant spicæ
curtæ, virides, ex tenellis, rubicundis, & in acutiem abeunti-
bus granulis constructæ, alternatim cauli affirmatæ. Folia
sunt tenuia & acuta. In locis uidis passim.

CCCXVII. Gramen Cyperoides spicâ variante. Joh. *est graminis ne-*
Lœs. *Klein Cyper-Gras mit zweierley Achren.* Gramen *verni varietas m-*
hoc ex teneris radicum fibris exsurgens, thrysos edit triangu-
los, semicubitales, & longius evagantes, quorum fastigiis tres
vel quatuor pumiles spicæ, ex viridibus & rotundatis aliquot
capsis, paleisq; ad nigrorem tendentibus intermisiis, orna-
mento sunt, per exiguo à se dissidentes spatio, & in exorto fo-
liolo tenui & acuto firmatæ. Præter has spicas alia, diversa
prorsus ab illis, ac in extimâ graminis parte velut in speculâ
hærens, visitur, quæ tenuis, erecta & squamosa est, coloris spa-
diceo-lutei. Passim.

CCCXVIII. Gramen exile Cyperoides spicis nigris. *est graminis ne-*
Joh. Lœsel. *Klein Cyper-Gras mit schwarzen Achren.* *verni varietas m-*
In pratis nach dem Bretter-Kruse zu. Plantula hæc
ferè dodrantalis radice est fibrosâ, lignosâ tamen ac nigri-
cante: ex hâc foliola exsurgunt graminea, & caulinis trique-

tri subasperi, quorum summo insident spicæ plerumq; tres, alternatim sibi succedentes, nigrantis coloris. Flosculos habet minutissimos, subluteos.

CCCXIX. Gramen exile hirsutum Cyperoides. Lob. ic. 15. Gramen hirsutum capitulis Psyllii. C. B. Pin. 7. Gramen cyperinum pilosum Tab. lib. I. fol. 656. Cyperella Cordi & Pseudocyperi species pumila Gesn. hort. 256. Haarechtig Cyper-Graß. Tab. Primo vere passim prodit in incultis.

CCCXX. Gramen Cyperoides hirsutum repens spicis minoribus minusq; compactis Joh. Lœf. Haarechtig friechend Cyper-Graß mit weichen Ähren. In incultis hinter der Neuen Kirch.

CCCXXI. Gramen arundinaceum enode majus montanum. C. B. Pin. 7. Groß Berg-Rohr-Graß ohne Knoten. Gramen harundinaceum montanum Tab. lib. I. fol. 666. Juncus λυχνίας major, Thal. p. 60. Scirpi primum genus, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 542. Birken-Halm/ Wald-Rohr oder Schmelen / Seb. in Trag. Berggriedt/ Tab. Berg-Rohr quibusdam. Grosse Schmel Nostratisbus, qui scopas seu excutias (die Rehr-Bürsten/ quibus pulveres ac paleæ excutiuntur) ex eodem parant, frumentum ventilaturi. Gramen hoc proverbio: nodum in scirpo qvarere, celebre quidem est, nodos tamen proxime radicem obtinet. Nassæ quoq; & fiscellæ ex eodem conficiuntur. Dicitur & Motel nonnullis, unde Polonis Miotta ein Besem. Culmi ejus viri proceritatem attingunt. Hinter Mohrungen. Im Mohrungischen Walde copiose. Item bey Lauten-Mühle. Ex scirpo olim effigies siebant, quæ per Virgines Vestales annis singulis jaciebantur in Tyberim. Ovid. Fastorum lib. V. v. 621:

Tunc

Tunc quoq; prisorum Virgo simulacra Virorum
Mittere roboreo scirpea ponte solet.

Apud Asc. Pedianum in Orat. Cic. pro C. Cornelio, legimus, simulachra effigiesq; hominum è fæno fuisse facta, quibus objectis ad spectaculum præbendum, tauri irritabantur. Existim, fæni vocabulo scirpum hic esse exaudiendum aut stramen, ein Stroh-Männchen. Wie bey uns in der Bähren-Heze.

CCCXXII. Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum. C. B. Pin. 7. Juncus λυχνάρις tenuis major, Thal. p. 60. Scirpi alterum genus. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 542. kleine Schmel. Klein Waldrohr. Gras ohne Knoten. Corbulæ ac pileoli elegantissimi ex hoc scirpo parantur. Radiculis est albicantibus. Passim.

CCCXXIII. Gramen arundinaceum, paniculâ molli spadiceâ majus. C. B. Pin. p. 6. Graminis loliacei octavi alia species. Thal. p. 51. Gramen tomentosum & acerosum. Calamogrostis quorundam, & vulgi gramen plumosum, Lob. ic. p. 6. Groß Röhr-Gras mit seinem weichen braun-rohten Strauß. Quibusd. Schmeel/sed falsò. Bey dem Dorff Witteberg.

CCCXXIV. Gramen palustre paniculatum altissimum. C. B. Pin. 3. Straußtragendes sehr hohes Wasser-Riedgras. Gramen aquaticum harundinaceum paniculatum. Tab. lib. 1. fol. 653. In fossis beym Bretter-Kruse.

CCCXXV. *Gramen arundinaceum foliis acutissimis paniculâ multiplici, Cyperi facie, Joh. Lœl. Viel. ^{um} 63. Pin. 6. straußiges scharfes Cyperähriges Rohr-Gras. In locis uidis. ^{Gramineus} ^{Spiritus sup}

CCCXXVI. * Gramen arundinaceum paniceum divisâ paniculâ. Joh. Lœl. Radice est lignosâ, fibrosâ & albicante, " ^{1.1. Jr: arundin} ex quâ culmi tricubitales, rotundi, concavi, ac geniculati, " ^{acerosa" gluma} ^{Part. Sk: 1273.} explan-

„explantantur, folia acuta & lata veluti per tubulos transe-
„untes, ac in summo paniculam subflavescentem, eamq; di-
„visam sustinentes. Ilbi defloruit, semina fert exigua, fol-
„liculis inclusa suis, oblonga, splendentia, spadicei feré co-
„loris, & qvidem mense Julio. Am Thamm beym Bret-
ter Krüge zu.

CCCXXVII. Gramen paniceum spicâ simplici. Ely-
magrostis. C. B. Pin. 8. Hirsegras mit schlechten Ähren.
Panici effigie gramen simplici spicâ, Lob. ic. p. 13. Gra-
men paniceum 1. Tab. lib. 1. fol. 663. Panicastrella, Cæl.
Lib. 4. c. 58. p. 185. Lolium 6. & Miliaria herba Plinii, Trag.
Seb. in Trag. deutsch. 531. Fenich-Gras das 1. Tab. Se-
men avibus grata esca. In der hollen Grund. It. beym
Krüge in der Sarkau.

CCCXXVIII. Gramen paniceum spicâ aristis longis
armatâ. C. B. Pin. p. 8. Hirsegras mit langspitzigen Äh-
ren. Gramen paniceum secundum Tab. lib. 1. fol. 663.
Panici effigie gramen aristis circumvallatum. Lob. ic. p. 14.
Fenchgras das 2. Tab. In der hollen Grund. It. circa
vias nach dem alten Hammer zu. Nudum sæpè aristis con-
spicitur, ætatis tractu iis deciduis factis, & tum facile pro
panico herbariorum sylvestri Lob. agnoscitur.

CCCXXIX. Gramen marinum spicâ fecalinâ. Joh.
Lœs. Meergras mit Korn Ähren. Gramen hoc culmo ac
radice secali assimilatur, spicâ tamen est grandiore, in quâ
exusta visuntur granula oblonga, nigrantia. Circa littus
maris bey S. Albrecht. It. Ben Sarkau copiosè.

CCCXXX. Gramen latifolium spicâ triticeâ di-
vulsâ, 54. in Prodr. C. B. Pin. 18. * Breitblätterig Gras
mit zertheilten Weizen-Ähren. Sparsim.

CCCXXXI

CCCXXXI. Gramen loliaceum spicâ longiore. C. B. Pin. p. 9. Lolium & triticum temulentum, Lob. ic. p. 35. Frumentum fatuum Lon. deutsch fol. 287. Lolium, Ruell. fol. 325. Cord. in Dios. fol. 43. Tab. lib. 1. fol. 675. Matth. deutsch fol. 127. Cæs. lib. 4. c. 49. fol. 179. Dod. Lateinisch. fol. 538. Lüch oder Dört. Tab. Taubkorn Lon. Unkraut/ Dörten Matth. Drespe Saxonibus & Nostratibus. Zwaldz/ Weizen/ Lolch und Durt quibusd. Inter segetes passim.

CCCXXXII. Gramen montanum avenaceum spicatum. C. B. Pin. p. 10. Geährtes Haber-Berg-Graß. Gramen sylvaticum secundum, Tab. lib. 1. fol. 661. Gramen montanum spicatum. Clus. hist. lib. 6. fol. 219. Wald-Graß dasander/ Tab. In monte Apollinis zu Quedianu. It. im Penartschen Walde.

CCCXXXIII. Glossularia multiplici acino five non spinosa hortensis rubra, five Ribes officinarum. C. B. Pin. 455. Ribes Arabum Lob. ic. p. 202. o. Ribes rubra Adv. Lob. f. 445. Ribes Fuchs. fol. 663. Tab. lib. 3. fol. 784. Lon. deutsch fol. 63. Ribes vulgaris Matth. deutsch 54. Ribesium fructu rubro, Eystett. Ribes hortense, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 708. Ceanothus levis, Gesn. hort. fol. 252. Ribes vulgò Cæs. lib. 3. c. 12. pag. 99. S. Johannis Beerlein Fuchs. S. Johannis Traublein Tab. Matth. Seb. in Trag. Zahme S. Johannis Traublein. Lon. In der Hollen-Grund in umbrosis, item auff dem Lenzenberg hinter Brandenburg.

CCCXXXIV. Grossularia non spinosa fructu nigro C. B. Pin. fol. 455. Ribes vulgaris nigro fructu Clus. hist. lib. 1. fol. 120. Ribes sylv.: Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 780. Ribes sylvestris Thal. p. 96. Ribesium fructu nigro, Dod. Niederländisch. fol. 1172. Ribes nigra, Adv. Lob. fol. 445. Lob. ic. p. 202. o. Tab. lib. 3. fol. 784. Ribes baccis nigris

Cam. hort. p. 141. Amomum falsum & Pseudoamomum, Gesn. Hort. fol. 246. Ribes fructu nigro, Eystett. Schwarze Johannis Träublein. Tab. Gicht-Beeren und Bocks-Beren Nostratibus. Zu Schwanis am Mühl-Fluß copiosè. It. in der Hollen-Grund.

CCCXXXV. Grossularia sylvestris rubra. C. B. Pin. 455. Ribes sylv. Cam. hort. p. 141. Ribes sylv. Matth. Bauh. in Matth. fol. 151. Lon. deutsch. fol. 63. Ceanothi levis genus sylv. Gesn. hort. fol. 252. Wilde S. Johannis Träublein Lon. Helvetiis Reoz-Beer. Wilde Corinthen Nostratibus. Hinter Latten-Walde in montibus passim. Foliis proventit oxyacanthæ ferè, pronâ parte hirsutis, supinâ lævibus, solidis & crassiusculis: Qvatuor vel quinq; baccæ utplurimum unipediculo assistunt, acinis duobus, vel tribus instructæ. Degustatæ baccæ dulci sunt sapore, ac viscidam humiditatem obtinent. Tussi mederi creduntur.

CCCXXXVI. Hedera helix, Matth. deutsch fol. 245. Brunf. Lateinisch tom. 2. fol. 7. & 8. Fuchs. fol. 423. Lon. deutsch fol. 235. Cæs. lib. 3. c. 5. p. 93. Tab. lib. 2. fol. 567. Dod. Lateinisch fol. 413. Cam. hort. p. 71. Helix sive provoluta sterilis Hederæ Lob. ic. p. 614. Hederæ species tertia, Helix vocata Thal. p. 57. Hederæ arboreæ sylvestre genus. Gesn. hort. 261. Hederæ major sterilis. C. B. Pin. p. 305. kleiner Ephæ Matth. Tab. kleiner Wald-Ephæ / Lon. Baum-Ephæ / Brunf. deutsch. Nloff / Nostratibus. Siccatur, calefacit & non nihil adstringit. Succum in affectibus oculorum vulgus commendat. Im Morungschen Walde / hinter dem Mohrung / lacus est, copiosè in umbrosis. It. im Bruchwalde bey Brandenburg.

CCCXXXVII. Hedera terrestris, Brunf. tom. 1. fol. 167. Tab. lib. 2. fol. 568. Cæs. lib. 2. cap. 36. p. 452. Dod. Lateinisch.

teinisch fol. 394. Matth. Bauh. in Matth. fol. 467. Hedera terrestris herbariis communiter appellata, Thal. 57. Hedera terrestris vulgaris, C. B. Pin. p. 306. Humilis hedera, Hederaula, sive Chamæcissus Adv. Lob. 268. Humilis Hedera, Chamæcissus, corona terræ, terrestris hedera, Lob. ic. 613. sive Chamæcissos, seu hedera terrestris, Trag. Kyb. in Trag. 799. Chamæcissus vulgaris Hort. Cam. p. 38. Chamæcissus Fuchs. fol. 876. Chamælema, Cord. hist. fol. 160. Gundelrâb/ Tab. Fuchs. Gundelrâb/ oder Erd-Epheu. Matth. Gundreb oder Gundelreb/ Kyb. in Trag. Wdram Nostratibus. Passim in arenosis bey Königsb. Floret Mensa Majo. Foliis aliquo tuberculata adnascuntur. Hedera terrestris cum pauxillo vini contusa, succo eorum oculis manè & vesperi immisso albuginem certò tollit, affirmantibus hyppocamis.

CCCXXXVIII. Helenium vulgare C. B. Pin. p. 176. Helenium Matth. Bauh. in Matth. fol. 72. Cord. in Diosc. fol. 10. Gesn. hort. fol. 261. Eystett. Tab. lib. 2. fol. 264. Dod. Lateinisch f. 344. Cam. hort. p. 71. Helenion, Adv. Lob. fol. 246. Helenium & Inula, Angvillaræ Panax chironium, Lob. ic. 574. Enula campana, Brunf. tom. 3. fol. 100. Enula, Lon. deutsch fol. 161. Cæf. lib. 12. c. 34. p. 499. Elenion Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 137. Allantwurz Tab. Allant oder Allant-Kraut Lon. Allantwurzel/ Sebiz in Trag. Calefacit, aperit, attenuat. Fern. 5. M. m. Extra hortos ad sepes zu Neuhausen.

CCCXXXIX. Helleborine latifolia montana C. B. Pin. p. 186. Breit-blätterige Berg-Niesewurz mit brauner Blüth. Helleborine, sive Epipactis recentiorum. Lob. ic. 312. Elleborine recentiorum secunda, Clus. hist. lib. 2. fol. 272. Helleborine, Dod. Lateinisch fol. 384. Helleborine i. Tab. lib. 2. fol. 395. Satyrium octavum Trag. Seb. in

Trag. deutsch fol. 619. Epipactis latifolia, Eystett. Damasonium calliphylon, Cord. hist. fol. 151. Sigillum S. Mariæ vulgo. Cæs. lib. 10. cap. 49. fol. 431. Wilde Niesewurz Tab. Folia gustu sunt amaro & ingrato. Hinter der Sartau im Gebirg.

CCCXL. Helleborine latifolia montana flore albo. Joh. Lœs. Wilde breitblätterige weiße Berg-Niese-Wurz. Foliis cum priori convenit. Hinter Osterod am Berge.

CCCXLI. Helleborine montana angustifolia purpurascens. C. B. Pin. 187. Schmalblätterige Purpurbraune Berg Niese-Wurz. Helleborine angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 396. Damasonium tenuifolium Cord. hist. fol. 151. Alisma tenuifolium, Thal. p. 13. Elleborine quinta Clus. Pan. p. 275: Elleborine recentiorum sexta, Clus. hist. lib. 2. f. 273. Sigillum S. Mariæ tertium, Cæs. lib. 10. c. 49. p. 431. Wild schmalblätterig Niese-Wurz/Tab. Hinter Osterod am Berge.

CCCXLII. Helleborine angustifolia pratensis ex albo purpurascens. Joh. Lœs. Schmalblättrige Wiesen-Niese-Wurz mit weiß-brauner Blüth. In pratis in der Holen-Grund und hinter der neuen Bleich.

CCCXLIII. Hieracium foliis & facie Chondrillæ, Lob. ic. p. 239. Habicht-Kraut mit Wegwart-Blättern/ Hieracium foliis & facie chondrillæ Lobelii, Cam. hort. p. 75. Hieracium chondrillæ folio hirsutum, C. B. Pin. p. 127. Hieracium secundum, Tab. lib. 1. fol. 607. Klein Habicht-Kraut/ Tab. Lævius est nostrum, infimis foliis maximè laciniatis, supremis integris corniculis duobus caulem amplectentibus. Am Kneiphöfsschen Wall passim.

CCCXLIV. Hieracium Chondrillæ folio glabrum; C. B. Pin. p. 127. Urtauhes Habicht-Kraut mit Wegbreit Blät-

Blättern. Hieracium Aphacoides, Tab. ic. p. 182. **Habicht-Kraut.** Tab. In fabulis passim bey Königsb.

CCCXLV. Hieracium phlomoides, Tab. ic. p. 184. Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum flore magno, C. B. Pin. 128. Hieracium latifolium Pannicum, Cam. hort. p. 75. Hieracium primum latifolium, Clus. Pann. pag. 640. Clus. Hist. lib. 5. fol. 139. **Wullhabichtkraut.** Tab. **Rauhes Habicht-Kraut mit breiten Blättern und grosser Blüth.** Foliis est modò sinuatis, modò laciniatis, lividis aliquando maculis insignitis, aliquando etiam minus hirsutis. Plura quoq; folia habet, ac in ione visuntur apud Clus. & Tab. Zu Quednau in monte Apollinis.

CCCXLVI. Hieracium montanum latifolium non sinuatum. Joh. Lœf. **Berg-Habicht-Kraut mit breiten unzerschnittenen Blättern.** Radix exilis, nigra, filamentis comitata flavis, folia proximè terram alit; modò plura, modò pauciora, qvincunciali fermè altitudine, secunciali latitudine, viridia, aspera, obtusius acuminata, è quorum medio caulis recta assurgit cubitalis, singularis, rotundus, striatus, viridis, aphyllocavlos, & asper, cuius fastigium luteoli flores, singuli petiolis brevibus, incumbentes, agminatim exornant, ætatis tractu in lanugines, per aëra volitantes, transeuntes. **Bey Gerdauen am Berge nach dem alten Hause zu.**

CCCXLVII. Hieracium montanum hirsutum ramosum, Joh. Lœf. **ästiges Berg-Habicht-Kraut mit rauhen Blättern.** Cubitale & longius est sæpè, radice albicante, villosis instructa: caule rotundo, striato, hirsutie aspero, ac ramoso: foliis viridibus, hirtis, alternis thyrsum amplexantibus, ex lato in cacumen abeuntibus, & in ambitu parum sinuatis: floribus luteis, cacumina caulum petiolis longis oc-

cupantibus, quibus papposa succedit lanugo, hiante calyce avolans. Formam refert hieracii montani latifolii minoris, Tab. I. I. f. 610. Hirsutiem asperam ei si demas. In der Hollen-Grund.

CCCXLVIII. Hieracium montanum latifolium glabrum minus C. B. Pin. 129. Hieracium montanum latifolium minus. Tab. lib. I. fol. 610. Klein Berg-Habicht-Kraut mit breiten Unraugen Blättern. Tab. In der Hollen-Grund.

CCCXLIX. Hieracium alterum grandius Lob. ic. p. 240. Gross-staudiges Habicht-Kraut mit schmalen Blättern. Hieracium montanum angustifolium primum Tab. lib. I. fol. 610. Hieracium alterum grandius Lobelii, Cam. hort. pag. 75. Hieracium fruticosum angustifolium majus. C. B. Pin. p. 129. Hieracium primum, Dod. Lateinisch fol. 638. Hieracium Sabaudum, Obs. Lob. fol. 124. Hieracium majus angustifolium, vel tertium, Clus. Pann. 642. Hieracii tertii genus alterum angustifolium. Clus. hist. lib. 5. fol. 141. Berg-Habicht-Kraut mit schmalen Blättern/ Tab.

Refrigerant Hieracia, siccant cum adstrictione, aperiunt, abstergunt, ac mundant. Succus in caligine oculorum perutilis, melli ac vino edentulo mistus & instillatus, Tab. In der Hollen-Grund. It. in monte Apollinis zu Dvednau.

CCCL. Hieracium dentis leonis folio monoclonon. C. B. Pin. 127. Habicht-Kraut mit Pfaffenröhreins-Blättern. Hieracium intybaicum Tab. ic. p. 183. Wegwarten-Habicht-Kraut Tab. Subaspera est planta, thyrsulo sæpè uno, nonnunquam pluribus, ex radice assurgentibus, rarissimè brachiatis. Folia etiam nunc magis, nunc minus sunt incisa. Bey Lauten-Mühl inter fruticeta.

CCCLI. Hieracium foliis oblongis in ambitu aculeatis monoclonon Joh. Lœf. Habicht-Kraut mit langlächten und

und am Rande stachlichten Blättern. Joh. Lœl. *Einstänglich
stachliches Habicht-Kraut mit längslächtigen Blättern.* Hier-
racium hoc ex supellectili herbaria D. D. Halbachii obtinuit
Lœselius, ipsi nunquam visum, repertum fuit in fruticeto beym
Spittel-Hoffe / floruit Julio.

CCCLII. Holosteо affinis, cauda muris, C. B. Pin. 190.
Cauda murina, Dod. Lat. fol. 112. Cauda muris, Tab. lib.
1. fol. 679. Adv. Lob. fol. 187. Myosuros, cauda muris,
Lob. ic. p. 440. Myosuron, quorundam Holostium, Thal.
p. 79. Holostium Loniceri, Cam. hort. p. 75. Coronop-
pus sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 76. Holosteon, Lon.
deutsch fol. 210. Mäus-Schwänzlein Tab. Hunds-Graß
oder Hunds-Zahn Lon. Wild Rappensüßlein Seb. in Trag.
Zausent-Krohn/ Adv. Lob. Mäus-Graß/ und Mäuse-Zäh-
lein vulgò. Am Kneiphöfischen Wall passim.

CCCLIII. Hyoscyamus albus. Matth. deutsch 460.
Lob. ic. p. 269. Observ. Lob. 139. Dod. Lat. fol. 451. Lon.
deutsch fol. 115. Eystett. Gesn. hort. fol. 262. Cam. hort. pag.
77. Hyoscyamus candidus, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol.
107. Apollinaris tertia, Cord. in Diosc. fol. 66. Hyoscy-
ami alterum genus in maritimis, Cæs. lib. 8. c. 45. p. 345. Hy-
oscyamus secundus, Tab. lib. 2. fol. 278. weiß Bilsen. Seb. in
Trag. Bilsen-Kraut/ Tab. weiß Bilsen. Lon. weiß Bilsen-
Kraut Matth. Bilsen/ Sawbon/ Doll-Kraut/ Schlaff-
Kraut/ Kind's Wurzel und Zigeuner-Kraut/ vulgò. Aluff
der Kneiphöfischen Klapper-Wiese & circa pagos in incultis
passim. Succus hyoscyami illitu aliquantis per continuato
albuginem emaculat. Aëtius tetrabibl. 2. serm. 3. c. 40.

CCCLIV. Hypericum Brunf. tom. 3. fol. 81. Matth.
Bauh. in Matth. fol. 667. Lob. ic. p. 398. Adv. Lob. fol. 172.
Obser.

Observ. Lob. 216. Fuchs. fol. 831. Eystett. Dod. Lateinisch f. 76. Tab. lib. 2. fol. 536. Cæl. lib. 9. c. 41. p. 394. Lon. deutsch fol. 158. Cam. hort. p. 77. Hypericum vulgare C. B. Pin. pag. 279. Ascyon. Cord. in Diosc. f. 61. Hypericum vulgare, & herba perforata, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 56. S. Joh. Kraut Tab. Lon. Fuchs. Matth. Gemein Harthau Seb. in Trag. Unseres Herren Gottes Wunden-Kraut Nostratisbus. In sabulosis bey Königsb. passim.

Herba hæc, quæ eo nomine fuga Dæmonum salutatur, vulgo seminis suffitu omnem fugat Dæmonem, corpori vel domui appropinquantem, uti nugigerulus mulierum fabulatur sexus. De Sexu hoc obiter cape, quod habet Baal Hatturim ad margin. Bibl. Venetor. & Basil. Gen. 3. v. 20. Decem cabi Confabulationum, inquit, descenderunt in mundum, & novem istorum abstulerunt mulieres. Inde Adam vocavit nomen mulier Chayah, quia (multum) loqvitur.

Hypericum sub elevatione Poli 45. 46. 47. optimum. Flores colligendi Sole 10. ☉ obsidente. Tota planta legatur Sole 6. ♀ occupante; semen, Sole 15. Libræ ingresso.

CCCLV. Jacea nigra squamoso capite major. C. B. Pin. 271. Jacea squamato capite montana prima, Clus. hist. lib. 4. fol. 6. Jacea Austriaca prima, Clus. Pann. pag. 542. Gross Schwarze Flocken-Blum mit schuppichten Köpfen. Flore est purpureo. Vulneraria est planta. Hinc à Chirurgis in fracturis & vulneribus consolidandis extollitur: sunt, qui eadem in faucium & tonsillarum tumoribus utuntur. Passim in locis siccioribus bey Königsb.

CCCLVI. Jacea nigra squamoso capite, flore albo. Joh. Lœs. weiß-blühende schwarze Flocken-Blum mit schuppichten Köpfen. Hinter Germanu am Berge, A priore nihil differt, nisi florum colore.

CCCLVII.

CCCLVII. Jacea laciniata squamata, C. B. Pin. 271.
Jacea squamata capite tertia Cretica, Clus. hist. lib. 4. fol. 6.
Flocken-Blum mit zerschnittenen Blättern und schuppenden Köpfen. Bey Lauten-Mühl, circa vias.

CCCLVIII. Jacea latifolia capite hirsuto. C. B. Pin. 271.
Jacea Austriaca secunda, vel *Jacea* mōtana villoso capite elatior. Clus. Pann. p. 543. *Iacea* Austriaca villoso capite, sive quarta elatior, Clus. hist. lib. 4. f. 6. & 7. *Cyanus* sylv. montanus integrifolius, *Cyanus* sylv. κυανος λωστος Φυλλος, Thal. p. 29. breit-blättrige Flocken-Blum mit harichten Köpfen. Flore est purpureo; foliis tenuiter crenatis, & thyrsulis subrubentibus. Crenas in suo cyano prorsus abesse tradit Thal. Beym Penartschē Walde am Fluss.

CCCLIX. *Jacea* latifolia capite hirsuto flore albo. Joh. Lœf. Weiß-blühende Flocken-Blum mit haarichten Köpfen. Folia cum caulis dilute virescens. Hinter der Löbnichtschen Wind-Mühl. Vor dem Sackheimischen Thor.

CCCLX, *Jacobeæ*. Dod. Lateinisch. fol. 642. *Jacobæa* vulgaris laciniata. C. B. Pin. p. 131. *Jacobæa* vulgaris Clus. hist. lib. 4. fol. 22. *S. Jacobs*-Blum. Brunf. Deutsch. fol. 317. *Flos* *S. Jacobi*, *Trag.* *Seb.* in *Trag.* Deutsch. fol. 228. Lon. Deutsch. fol. 128. *Herba Jacobæa* 1. Tab. lib. 1. fol. 576. *Senecio major*, sive *flos* *S. Jacobi*. Matth. Bauh. in Matth. 794. *Jacobæa* *Senecio*, & *herba* *S. Jacobi*. Lob. ic. p. 227. *Jacobæa* *Senecio* Adv. Lob. fol. 79. *Herba* *S. Jacobi* Cæs. lib. 12. c. 37. p. 500. Fuchs. fol. 742. *Artemisia polyclonos* Dodonæi, sive *flos* *Jacobæus*, Thal. 9. *S. Jacobs*-Blum. *Seb.* in *Trag.* Lon. Fuchs. Tab. *S. Jacobs*-Kraut vulgò. *S. Jacobs*-Blum quibusd. Abstergit & consolidat. In faucium ulceribus gargarrisatu utilis. In agrorum marginibus passim.

CCCLXI. **Jacobæa* *Barbareæ* instar *lanciniata* Joh. Lœf. *S. Jacobs*-Blum mit Winter-Kress-Blättern. Foliis “

, est barbareæ sive Pseudobuniados, per ambitum incisis, & post insigniter laciniatis. **Bey dem Zollhause auff der Wiese.**

CCCLXII. Iberis Nasturtii folio. C. B. Pin. 97. Iberis Matth. deutsch. fol. 212. Iberis secunda, Tab. lib. 2. fol. 170. **Groß Besem Kraut und wilde Kreßen.** Tab. Viâ quâ itur nach der neuen Brück in simetis copiosè.

CCCLXIII. Iris pratensis angustifolia humilior, C. B. Pin. 32. Kleine schmall-blättrige blaue Wiesen-Schwertel. Iris tenuifolia. Cord. hist. fol. 133. Gesn. hort. fol. 263. Xiphion, seu gladiolus cœruleus minor Trag. Seb. in Trag. deutsch. 557. Iridis undecimæ altera species, Clus. Pann. p. 253. Iridis Angustifoliæ secundæ species altera. Clus. Pann. lib. 2. fol. 229. Xyris minor, Cam. hort. p. 183. Kleine blaue Schwerter Seb. in Trag. **Bey dem Penartschen Walde ad margines pratorum;** It. bey Birkenfelde in pratis nach der Ziegelscheune zu. Iridis flores lupos nominari Philinus scribit apud Athenæum, quod lupi rictui labrisq; similes sint.

CCCLXIV. Juncus palustris major. Trag. Seb. in Trag. deutsch 542. Tab. lib. 1. fol. 695. Juncus maximus, sive scirpus major. C. B. Pin. p. 12. Juncus aquaticus maximus. Lob. ic. pag. 85. Iuncus holoschoenos. Dod. Lateinisch. fol. 605. Juncus grandis holoschoenos, Cord. in Diosc. fol. 65. & 66. Juncus levis aquaticus maximus. Thal. p. 60. Juncus rotundus tertius. Cæf. lib. 4. c. 60. p. 188. **Groß weicher Binzen.** Seb. in Trag. Tab.

Accolæ lacūs Curlandici elynchia sua ac redimicula pileorum parant ex medullâ. Alias ex junco sellarum fiunt sedes, ac storeæ. **Im Pregel nach Jerusalem zu** copiosè. It. im frischen und Eurischen Hass passim.

CCCLXV. Juncus floridus major. C. B. Pin. 13.

Blu-

No. 36 ad pag. 131 Juncellus

cyperoides capitulo
Simplici.



Blühende Wasser-Binsen. *Juncus floridus*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 731. *Juncus Cyperinus floridus*, Tab. lib. 1, f. 696. *Calamogrostis secunda*, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 537. *Gladiolus palustris*, Cord. hist. fol. 124. *Gladiolus aquatilis*, Dod. Lateinisch. fol. 601. *Juncus cyperoides paludosus*, Eystett. *Juncus cyperoides floridus paludosus*, Lob. ic. p. 86. Adv. Lob. 44. *Butomus*, Cæf. lib. 14. c. 17. p. 553. *Cyper-Schwertel*. Tab. *Binzen-Schwertel* quibusd. Flore quandoq; conspicitur candido. In palustribus passim bey Königsberg.

CCCLXVI. *Juncus laevis paniculâ non sparsâ*, C. B. Pin. p. 12. glatte Wasser-Binsen. *Juncus Matth. deutsch*. fol. 445. *Juncus palustris minor*, Tab. lib. 1. fol. 695. An *juncus rotundus primus?* Cæf. lib. 4. c. 60. p. 188. *Juncus laevis globulato flore*, Lob. ic. p. 84. klein Wasser-Binzen/ Tab. *Binzen Matth. Klein Weyher/ oder Wasser-Binzen/ vulgo. Passim in uliginosis.*

CCCLXVII. **Juncellus cyperoides capitulo simplifici*. Ioh. Lœl. Schlechtköpfigte kleine Cyper-Binzen. In pratis nach dem Breter Kruge zu passim. *est Juncus capitulus equiseti major.*

CCCLXVIII. *Juniperus fruticosa baccifera*. *Juniperus vulgaris fruticosa* C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris*, Trag. Seb. in Trag. deutsch 850. *Juniperus vulgatior*. Adv. Lob. 448. *Juniperus*, Brunf. tom. 3. fol. 182. Lob. ic. p. 222. O. Dod. Lateinisch. fol. 852. Matth. Bauh. in Matth. f. 118. Lon. deutsch. fol. 40. *Juniperus*, & *juniperus baccifera*, Tab. lib. 3. fol. 650. *Juniperus minor*, Cord. in Diosc. 17. Fuchs. fol. 78. *Juniperi primum genus*, Cæf. lib. 3. c. 58. p. 136. *Juniperus humilis*, Gesn. hort. f. 263. *Juniperus nostras*, Cam. hort. p. 81. *Weckholder-Baum*/ Matth. Lon. Seb. in Trag. *Weckholder Tab. Brunf. Fuchs. Wacholder oder Wacholder-Baum*

und Kramot Baum vulgò. Helvetiis Rechholder/ fortè quasi Reuchholder à suffitu. Cord. in Diof. Nostratibus Rattic. Calfacit & siccatur. Baccæ venenis resistunt, crassos & glutinosos humores tenuant, renes detergunt, & urinam mensesque pellunt. Pota vitiis thoracis, tussibus, inflammationibus, & torminibus auxiliantur. Lacryma Arabum est Sandaracha, officinarum vernix. In hæmoptoë, dysenteriâ, diarrhæâ, mensium ac hæmorrhoidum fluxu salutaris. *Bey Brandenburg und Königsberg* inter ericeta copiosissimè.

CCCLXIX. Juniperus vulgaris arbor. C. B. Pin. 488. Juniperus vulgaris celsior & arborescens. Clus. hist. 1. fol. 38. Clus. Hispan. p. 101. In districtu Insterburgicò, zu Cumetschen. Juniperus quondam annosa & vegeta visa fuit, cuius caudicis perimeter cubitorum ferè trium, altitudo sedecim cubitorum. Tres ejus rami cubitalis fuerunt crassitudinis. Baccifera exstitit adolescens, post ad senium devergens, spatio jam quinquaginta annorum, nullas amplius genuit baccas, attestate hoc cernuo ac decrepito quodam Sene. Gummi adhæc copiosum fudit antehinc, tunc nullum. Nascitur ibidem & alia, cubitum, & quod excedit, crassa, baccas ferens non rotundas, sed oblongas, prorsum similes iis, quas frutex juniperus excludit. Ætate fertur viginti annorum, & necdum gummifera est.

CCCLXX. Kali folio gramineo semine pastinacæ. Joh. Lœl. Meerstachel Kraut mit Pasternack Saamen. Radix oblonga, lignosa, alba, pauculis fibris, gustu modicè acris, caulem edit virescentem, cubitalem & minorem sèpè, incurvum, in plures ramos, inordinate dispositos brachiatum, quos folia longiuscula, subhirsuta, aculeata nonnihil, ac pallidè virescentia alternatim excipiunt: Flos ex duobus foliolis nanis & candidis, Julio erumpentibus, constituitur, cui semen succedit

dit latiusculum, subnigricans, insipidum ferè, pastinacæ effigie, cauli adhærens & folio suffultum. **Bey der Pillau** und **Sarekau** in locis arenosis passim. An Kali sit gramineo folio C. B. quod. 2. in Prod. p. 133. subdubito.

CCCLXXI. Kali spinoso affinis C. B. Pin. p. 289. Tragum Math. Bauh. in Matth. fol. 731. Tragon. Tab. lib. 2. fol. 377. Tragus Lon. deutsch fol. 93. Tragon Matth. Lob. ic. p. 797. Meerstachel-Kraut Tab. Bocks-Kraut Lon. Untreund Scorpion-Kraut quibusd. **Bey Germanu und Pillau** in littore maris passim.

CCCLXXII. Lamium purpureum & album non fœtens folio oblongo, C. B. Pin. 231. Lamium sive archangelica flore albo. Lob. ic. p. 520. Adv. Lob. fol. 223. Galeopsis Matthioli seu urtica vulgaris mortua. Thal. 55. Urtica labeo foemina. Brunf. Lateinisch Tom. 1. fol. 155. Galeopsis vera Dioscoridis, Clus. hist. lib. 4. fol. 35. Galiopsis, Matth. Bauh. in Matth. fol. 791. Lamium album & purpureum, Tab. lib. 2. fol. 237. Urtica iners, sive Lamium primum, Dod. Lat. f. 153. Todte Nesseln mit weissen und blauen Blumen Tab. Taube oder todte Nesseln Matth. Am Kneiphöfsschen Wall passim. It. secūs vias hinter der Kneiphöfsschen Wind-Mühl.

CCCLXXIII. Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis, C. B. Pin. p. 230. Urtica non mordax vulgaris, fœtens, purpurea, Lob. ic. pag. 520. Galiopsis vulgaris fœtens purpurea, Adv. Lob. fol. 222. Urtica iners altera. Dod. Lateinisch fol. 153. Galeopsis, Cæs. lib. 8. c. 48. f. 349. Galeopsis, Cord. in Diosc. fol. 69. Lon. deutsch fol. 138. Galiopsis secunda Tab. lib. 2. f. 238. Lamium Trag. (vel urtica 8. 9. 10.) Sebitz. in Trag. deutsch fol. 3. Urtica mortua Gesn. hort. fol. 287. Taub/ oder todte Nessel Tab.

Binsauge/ Lon. Stinkende und braune Wald-Nessel/ vulgo. Am Kneiphöfsschen Wall & alibi passim.

CCCLXXIV. Lamium folio oblongo luteum, C. B. Pin. 231. Lamium luteum, Lob. ic. p. 521. Adv. Lob. fol. 223. Tab. lib. 1. fol. 237. Galiopsis flore croceo, vel urtica sexta, Trag. Kyber. in Trag. p. 5. Galeopsis flore luteo, vel urtica tacea Cam. hort. p. 63. Urtica iners tertia, sive lamium luteo flore, Dod. Lateinisch 153. Leucas montana, Cæs. lib. II. c. 31. p. 450. Taube oder todte Nessel mit geelen Blumen. Geele taub/ oder todte Nesseln/ Tab.

Efficacissimum alia inter, quasvis durities, carcinomata, & strumas discutit, tumentes hæmorrhoides, imposito succo aperit, & sanguinem congestum educit, thymum circa sedem curat. Bey dem alten Hammer/ und Löbnichtschen Walde in umbrosis passim.

CCCLXXV. Lamium maximum sylvaticum fœtidum C. B. Pin. p. 231. Große stinkende taube Wald-Nessel. Urtica Herculea, Tab. ic. p. 536. Galeopsis legitima, vel vera Diosc. Clus. hist. lib. 4. fol. 35. & 36. Heraclea vel urtica undecima, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 4. Urtica fœtida maxima porphyranthemos Thal. p. 132. Wald-Nessel. Lon. deutsch fol. 139. Wald-Nessel Seb. in Trag. Tab. Hirsuta est planta, quæ hirsuties apud Tab. & Trag. à sculptore expressa non est, apud Clusium verò elegantissimè. Im Penartschen Walde/ und in der Hollen-Grund passim.

CCCLXXVI. Lamium folio caulem ambiente minus. C. B. Pin. p. 231. kleine taube Nessel/ dessen Blätter umib den Stengel herumb gehen. Morsus Gallinæ folio Hederaulæ alterum, Lob. ic. p. 463. Leucas quarta, Cæs. lib. II. c.

31. p.

31. p. 456. Hüner Biß mit Gundelreb-Blättern. Inter segetes und am Kneiphofischen Wall passim.

CCCLXXVII. *Lapathum aquaticum* folio cubitali. C. B. Pin. p. 116. *Wässer Grindwurz*/ deßen Blätter eine Ell lang. *Hydrolapathum magnum*, sive *aquaticum*, Adv. Lob. 117. *Hydrolapathum magnum*, Lob. ic. p. 285. *Rumex palustris*, Trag. Seb. in Trag. Deutsch. 249. *Lapathum sativum*, Dod. Lateinisch fol. 648. *Lapathum palustre*, Tab. lib. 2. fol. 147. *Hippolapathum*, Gesn. hort. fol. 263. Lon. deutsch fol. 119. *Rumicis quintum genus*, Cord. in Diosc. fol. 44. *Hippolapathum sylvestre* Matth. Bauh. in Matth. 354. *Hippolapathum sylvestre*, *Hydrolapathum* Thal. p. 57. *Weyerampfser*/ Tab. *Wässerampfser oder Rossampfser*, Lon. In aquosis & uliginosis passim bey Königsberg.

CCCLXXVIII. *Lapathum aquaticum minus*. C. B. Pin. 116. *Klein Wässer Grindwurz*/ *Hydrolapathum minus* Lob. ic. 286. Tab. lib. 2. fol. 147. *Klein Weyerampfser*/ Tab. Bey Poketen am frischen Hafe. It. auff der Altsätschen Klapper-Wiese nach dem Baum zu.

CCCLXXIX. *Lapathum folio subrotundo*. C. B. Pin. p. 115. *Lapathum folio minus acuto*. Lob. ic. p. 285. *Lapathum folio retuso*. Adv. Lob. 117. *Hippolapathum sylv.* Tab. lib. 2. fol. 146. *Rumex agrestis*, Cord. in Diosc. fol. 44. *Grindwurz mit hohen rundlechten Blättern*/ *wilde Mengolwurz*/ Tab. *Hasenampfser*/ *Gassenwurz*/ *Butterampfser* und *Butterlachsig*. Cord. in Diosc. *Streifwurz*/ *wilder Mangold*/ vulgo. *Folia alvum lubricant, semina fistunt*. Passim in incultis.

CCCLXXX. *Lapathum folio acuto crispo*. C. B. Pin. 115. *Grindwurz mit spiken Krausen Blättern*. *Lapathum*

thum acutum crispum. Tab. lib. 2. fol. 147. Krause spicæ Mengolwurz/ Tab. Passim bey Königsberg.

CCCLXXXI. Lapathum unctuosum C. B. Pin. 115. Stolzer Heinrich/ Guttheinrich/ Brunf. deutsch fol. 75. Bonus Henricus. Matth. Bauh. in Matth. fol. 449. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 250. Tab. lib. 2. fol. 134. Tota bona sive bonus Henricus, Lob. ic. 256. Tota bona, Dod. Lat. fol. 651. Rumicis tertium genus, Fuchs. fol. 463. Tota bona, spinaciæ facie, Adv. Lob. fol. 97. Tota bona Dodonæi. i. Thal. p. 128. Guter Heinrich oder Schmerbel/ Tab. Schmerbel Seb. in Trag. Gut oder Stolz Heinrich vulgo. In pagis passim.

CCCLXXXII. Lappa major purpurea. Joh. Lœf. Lappa major, Arcium Dioscoridis, C. B. Pin. 198. Lappa major, Trag. Kyb. in Trag. p. 837. Brunf. Lat. tom. 3. fol. 54. Cæs. lib. 3. c. 50. p. 536. Bardana, sive Lappa major, Dod. Lateinisches fol. 38. Personata, Lappa major, Bardana, Lob. ic. p. 588. Adv. Lob. fol. 253. Personatia, Lappa major, Bardana. Matth. deutsch 506. Personata, Lon. deutsch fol. 97. Personatia Fuchs. fol. 72. Arctium, Personata, Lappa major, Thal. p. 13. Arcion, Cord. in Diosc. fol. 198. Große Klett mit Purpurfarben Bluhmen/ Grosse Kletten/ Matth. Fuchs. Ross-Kletten/ Kyber in Trag. Lon. Brunf. Buzen-Kletten/ und grosse Kletten/ Cord. in Diosc.

Caulibus est rubentibus nonnihil, foliis ex atro-virentibus. Radice ac semine urinas pellit, renes infarctu liberat, arenulas calculosq; excutit. Phthisicos quoque & hæmoptoicos juvat radix. Ejus medullacea pars, antequam caulescit, edulis est, ac verno tempore delicatissima inter acetaria habetur.

Lappa major in laqveari domis suspensa credulo vulgo tonitrua avertit. Rustici siccata, linteamine sive obducto involutâ & in-

incensâ lappâ, festivitatis nuptialis tempore, saliare in modum, ubi horsum vorsum cursitant, tædarum loco utuntur. In arenosis passim bey Rönigsb. Solœatæ mulieres, quæ ab utero sæpe præfocantur, folia Bardanæ tibialibus suis immitunt, eademque pedibus conculcant, remedium adversus hystericam passionem inculpatum experturæ. Vertici capitis admota folia malum accelerant: Lappæ majoris radices porrigunt hippiatri equis vermiculantibus. Observabile quid est, Augustæ Vindelicorum aliquando in corde equi, celerrimè extincti, vermem fuisse repertum dodrantalem, fili bombycini crassitudine, albicanem, & in gyros varie fætorquentem.

CCCLXXXIII. Lappa major candida Joh. Lœf. **Große Klette mit weißen Blumen.** Hæc caulis & foliis est viridibus, floribus candidis, cætera priori similis.

Ejus semine communiter utuntur mulieres, ab utero præfocatæ, loco seminis cumini. **Um Wege nach dem Dorff Laffstæn.**

CCCLXXXIV. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis, C. B. Pin. 198. Xanthium, Matth. Bauh. in Matth. fol. 834. Fuchs. fol. 579. Cord. in Diosc. fol. 72. Cord. hist. fol. 159. Dod. Lat. 39. Gefn. hort. fol. 287. Cæs. lib. 8. c. 3. p. 319. Lon. deutsch 98. Lappa minor, Trag. Kyber. in Trag. fol. 839. Tab. lib. 2. fol. 448. **klein Kletten/ Bruns. deutsch.** fol. 233. Hieron. Bock. fol. 317. Xanthium, sive strumaria Lob. ic. p. 588. Adv. Lob. fol. 254. Xanthion seu Lappa minor, Thal. 133. **kleine Klette.** Tab. Lon. **kleine Kletten/ Bettlersläuse/ Matth. Bubenläuse/ Igelslauß/ und Igels- Kletten vulgò.** Radix & semen strumas ac tumores discutunt

tiunt. Fruetus flavedinem inducit crinibus. In summis nach
der neuen Brücken zu.

CCCLXXXV. *Lathyrus latifolius* C. B. Pin. 344.
Clymenum, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 690. *Lathyrus sylv. major*, seu *purpureus*, Thal. 74. *Lathyrus sylv. latifolius*. Cam. hort. 84. *Clymenum Matthioli*, Clus. Pann. p. 742. *Cicercula Sylvestris* Tab. lib. 2. fol. 202. *Lathyris latiore foliō*. Lob. ic. p. 68. o. *Lathyris Narbonensis latiore foliō*, Adv. Lob. 398. Observ. 517. *Ervilium*, Cæs. lib. 6. c. 6. p. 233. *wilde Küchern* Tab. In der Hollen-Grund
passim,

galus sylvestris foliis
glabris. Ob. p. 1351.
luteus foliis glan-
s. fol. 363.

CCCLXXXVI. **Lathyrus angustifolius* radice tuberosâ. Joh. Lœs. *Wilde schmalblättrige Küchern*. Beym Altstättischen Gericht. *Orobis tuberosa*. L. 5.

CCCLXXXVII. *Lathyrus sylv. luteus* foliis viciæ. C. B. Pin. 344. *Vicia* Tab. lib. 2. fol. 207. *An Aracus* flore luteo, Adv. Lob. fol. 398. *Lathyrus sylvestris* floribus luteis, Thal. 74. *Glandibus terrestribus* congener flore luteo, Clus. Pann. 744. *Legumen terræ glandibus simile*, Dod. Lateinisch. fol. 550. *Geel Wicken* Tab. In rubetis & dumetis passim.

CCCLXXXVIII. *Laureola* folio deciduo flore purpureo. *Officinis laureola* fœmina, C. B. Pin. 462. *Chamælea*, sive *Mezereon*, Trag. Seb. in Trag. deutsch. fol. 751. *Laurus pusilla*, Lob. ic. p. 367. *Daphnodes* flore purpureo, Tab. lib. 3. fol. 776. *Daphnodes* Fuchs. fol. 227. *Piper montanum*, Gesn. hort. fol. 272. *Thymelæa*, Cord. in Disc. fol. 75. *Chamelæa Germanica* Dod. Lateinisch 364. Cam. hort. p. 39. *Chamelæa Germanica* seu *nostras*, Thal. 35. *Chamædaphne*, sive *pusilla laurus*, Adv. Lob. fol. 155. Rel:

Kellershalb Tab. Seidelbast oder Läusekraut Seb. in Trag. Zeiland/ Fuchs. Scheißlotbeeren Matth. Wolfsbast aliis. Autore Traog graviter spirat totâ substantiâ, demptô flore, qui jucundi est odoris. Folia, flores, cortex, & grana gustata, fauces & guttus acrius vellicant.

Fructus hujus Laureolæ Coccognidium est officinarum, quod à Belgis redimunt nostrates. Rusticos & Polyphæmos fortiter & cum dysphoriâ purgat granorum quindecim dosi. Hinter Morungen im Walde. It. Zu Neuhausen am Thier-Garten. In umbrosis.

CCCLXXXIX. *Lenticula palustris vulgaris* C. B. Pin. 362. *Lens palustris* Matth. deutsch. fol. 783. Lob. ic. p. 249. o. Cord. in Diosc. f. 68. *Lenticula aquatica*, Thal. p. 73. *Lenticula aquæ*, Brunf. tom. 3, fol. 118. *Lens lacustris* Dod. Lateinisch fol. 578. *Lenticula palustris*, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 547. Tab. lib. 2, fol. 206. Cæs. lib. 16. c. 35. p. 612. *Lenticula*, Adv. Lob. fol. 129. *Wasserlinsen*/ Tab. Matth. *Meerlinsen*/ Brunf. Seb. in Trag. *Wassermost* quibusdam. *Enten-Flott Nostratibus*. Aquis stagnantibus passim innata. Im Graben beym Philosophischen Gang.

CCCXC. *Lenticula aquatica trisulca* C. B. Pin. 362. *Hederula palustris*, Tab. lib. 2. fol. 570. *Hederula aquatica* Lob. ic. p. 36. o. *Wasser-Ephem.* Tab. Drenspiziger Wasser-Eppich quibusdam. In fossis nach dem Bretter-Krige zu copiose.

CCCXCI. *Lenticula palustris bifolia fructu tetragonô* C. B. Pin. 362. *Callitricha Plinii*, Colum. min. cogn. part. 1. p. 316. Klein kriechend Linsen-Kraut mit viereckichter Frucht. *Pusilla est planta*, fundo rivotum tenuissimis fibris

inhærens ac repens. Im Wiesen-Graben unten auffm Boden gegen Jerusalem über.

Stellaria aquatica, CCCXCII. *Lenticula palustris angustifolia folio in apice dissecto. Joh. Lœf. Schmalblättericht Linsen-Kraut/ deßen Blätter in der Spize zerschnitten.

Fibris terræ insistens, coliculos exire patitur virides, ramosos reptatu horsum vorsum euntes, binis ex intervallo foliolis angustis, longis, in summitate obtusis, ac tenerrimè femel incisis, quæ in caulum fastigio congressu suō stellulam quasi quandam effigiant, instructos. Foliola inter visuntur saepe nova quædam capitella albida, rotunda, pediculis suis fulta. In der Hollen-Grund. It. beym Bleich-Garten in lacunis.

CCCXCIII. Lichen petræus latifolius sive hepatica fontana. C. B. Pin. 362. Lichen, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 732. Dod. Lat. fol. 473. Thal. p. 73. Fuchs. fol. 476. Cæs. lib. 16. c. 19. f. 601. Lichen herba, Cord. in Diosc. fol. 65. Leber-Kraut/ Brunf. deutsch f. 177. Epatica Lon. deutsch. f. 247. Hepatica prima Tab. lib. 2. fol. 488. Lichen, hepatica, Lob. ic. p. 246. o. Jecoraria, seu hepatica fontana, Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 416. Leberkraut das I. Tab. Stein-Leberkraut/ Match. Fuchs. Lon. Brunnen-Leberkraut/ Seb. in Trag. Steinflechten/ Moßflechten und Leberkraut/ Cord. in Diosc. bey Schwanis in palustribus. It. in der Hollen-Grund ad fossarum margines.

CCCXCIV. Lilium floribus reflexis alterum, lanagine hirsutum. C. B. Pin. 78. Lilium montanum, sive sylvestre primum majus. Clas. hist. lib. 2. fol. 134. Lilium Saracenicum, Tab. lib. 2. fol. 328. Hemerocallis flore rubello, Lob. ic. p. 168. Lilium purpureum mas, Gesn. hort. fol.

No. 38 p. 140. n Lenticula palustris angustifolia folio
in apice dissecto.



Callitricha autumnalis. L. sp. 2.

fol. 264. Bleichrothe punctirte wilde Lilien mit umbgebo-
genen Blumen. Berg Lilien. Hemerocallis herbariorum.
Rauhe umbgebogene Berg Lilien. Heydnisch-Lilien/ oder
Heydniche Blumen. Tab. Goldwurz/ vulgo. In der Oste-
rodschen Heyde passim. It. bey Rastenburg/ und im Walde
bey Neuhoff/ nicht weit von Lagerben.

CCCXCV. *Lilium convallium album.* C. B. Pin. p.
304. *Lilium Convallium,* Trag. Seb. in Trag. deutsch fol.
456. Tab. lib. 2. fol. 428. Dod. Lat. fol. 205. Gesn. hort.
fol. 246. Matth. deutsch fol. 345. Clus. hist. lib. 2. fol. 190.
Cæs. lib. 5. c. 34. p. 224. Antholog. mag. fol. 90. Eph-
emerum non lethale, Fuchs. fol. 240. *Lilium convallium*
vulgare, Cam. hort. p 89. *Lilium convallium, vel vernum*
Theophrasti, Lob. ic. p. 172. *Lilium convallis, & sylvestre*
lilium, Brunf. Lateinisch tom. I. fol. 211. *Cacalia,* Lon. deutsch
fol. 217. *Meyen-Blümlein / Tab.* Brunf. Fuchs. Meyen-
Blümlein oder Zaucken/ Matth. Meyenryß / Gesn. hort.
Copiosè hinterm Kranz Krige. It. bey Königsb. in um-
brosis sylvis passim. Baccas habet post deciduos flores ru-
bellas. Sub elevatione Poli 46. 47. efficacissimum est. Sole
in 1. ☽ Constituto. Semen colligatur, Sole 15. ☿ inco-
lente: cerebrum confortat, & memoriam acuit juxta quos-
dam, ac præfertur ipsis floribus.

CCCXCVI. *Lilium convallium minus.* C. B. Pin.
304. *Morphyllon.* *Unifolium recentiorum,* Lob. ic. p. 303.
Monophyllum, *unifolium Thal.* p. 77. *Einblatt / Brunf.*
deutsch f. 235. *Unifolium,* Tab. lib. 2. fol. 428. Dod. Latei-
nisch 205. Cam. hort. 183. Eystett. *Cotyledon sylvestre, &*
unifolium Trag. Seb. in Trag. deutsch 386. *Bifolium pri-*
mum, Lon. deutsch fol. 269. *Monophyllum* Matth. Bauh. in
Matth. fol. 709. *Einblatt/ Tab.* Lon. *Bey Lauten-Mühl in*
umbrosis passim.

Radix drachmæ unius pondere, cum aceto sumpta mox in initio, pesti medetur.

CCCXCVII. Linaria vulgaris lutea flore majore. C. B. Pin. p. 212. Linaria vulgaris, Trag. Seb. in Trag. deutsch 284. Eystett. Cam. hort. p. 90. Linaria vulgò. Gesn. hort. f. 265. Cæs. lib. 8. c. 51. p. 350. Scheiß-Kraut / Leinkraut Brunf; deutsch f. 78. Linaria prima, Lon. deutsch fol. 190. Dod. Lat. fol. 284. Osyris Matth. Bauh. in Matth. fol. 837. Cord. in Diosc. fol. 72. Fuchs. fol. 545. Osyris Linaria sive Urinaria, Lob. ic. p. 406. Osyris major, Tab. lib. 2. fol. 497. Scheiß- Lein- und Harn-Kraut / Lon. Groß-Harn-Kraut Tab. wilder Flachs / unser Frauen Flachs / Krotten-Flachs / und Nabel-Kraut vulgò Frauen-Flachs / Bor.

Amara est, ac jecoris obstrunctiones expedit, Gal. 8. simpl. Dodonæo aperiendi, lotiumque ciendi vi prædita. Ictericis & calculosis utilis, Tab. Hæmorrhoidum dolores ad miraculum compescit, Horst. lib. 4. Observ. 42. In locis siccis & apricis bey Königsb. passim.

CCCXCVIII. *Linaria maritima floribus odoratis. Joh. Lœl. Meer-Haenkraut mit wolriechenden Blumen. "Foliis provenit Olyridis Matth. sed crassioribus, & magis succulentis, gustu amaris. In capsulis semen nigrum idq; copiosum & elatum continentibus, effigie renem quoque referens. Flosculis luteis Cheiri odorem spirantibus, minoribus tamen, quam in vulgarilinariâ. Radice nititur longiusculâ, albicante, fibris instructâ suis. Bey Sartau an den See- Bergen.

CCCXCIX. Lithospermum majus erectum. C. B. Pin. 298. Erhabene große Meer-Hirszen. Lithospermum, Fuchs. fol. 489. Adv. Lob. 192. Cord. in Diosc. fol. 60. Cord.

16.39 ad p. 142.



*Linaria maritima
floribus odoratis.*

Cord. Hist. fol. 94. Lon. deutsch fol. 250. Lithospermum arvense, Tab. lib. 2. fol. 521. Lithospermum commune, Gesn. hort. fol. 265. Lithospermon minus, Matth. Bauh. in Matth. fol. 657. Lob. ic. 457. Dod. Lat. fol. 83. Lithospermon vulgare minus Cam. hort. p. 91. Saxifragia tertia, Brunf. Lat. Tom. 2. fol. 188. Lithospermum sativum Fuchs. ic. p. 274. Milium solis sativum. Trag. Seb. in Trag. deutsch 426. lithospermum legitimum Clus. hist. lib. 5. fol. 163. Anchusa tertiæ similis altera Cæs. lib. II. c. 8. p. 435. Milium soler Mauritanis, quoniam in montibus Soler freqvens nascitur. Ineptè ergò milium solis vulgò appellatur, Gesn. hort. 265. Lithospermum alterum fruticosum, Thal. p. 74. Meerhirschen / oder Steinsamen / Lon. kleine Meer-Hirse / Tab. Beym Neuhäusischen Schloß, in arenosis, copiose.

CD. Lithospermum arvense radice rubrâ, C. B. Pin. 258. Acker-Meerhirse mit rothen Wurzeln. Anchusa arvensis minor facie milii solis, Tab. lib. 2. fol. 520. Lithospermum sylv. Trag. Seb. in Trag. deutsch 427. Anchusa degener facie Milii solis, semine Buglossi Loc. ic. p. 459. Lithospermum tertium Dod. Lateinisch fol. 83. Anchusa tertia lithospermo similis, Cæs. lib. II. c. 8. p. 435. Anchusa arvensis alba, Thal. p. 9. Rothe Ochsen-Zung Tab. Wild Meerhirschen Seb. in Trag. Am Kneiphofischen Wall passim. Ex anchusa radice fucus quoque confici potest, quem παιδεγαῖα dixere Veteres. Is rubro colore genas tingit, qualis in pueris advertitur & placet. Fuci hujus cum Alexis in Fabulâ, quam Isoftasium inscripsit, mentionem olim fecerit, ac meretricium apparatus, comptumque artificiosum, lepidè descripsiterit, lubentia fuit, totam rem lectu jucundissimam, obiter hic apponere:

Præ-

Præcipuum studium (meretricum intellige) ad quæstum est, & eos,
 Qui proprius se admovent spoliandos: supervacua cetera:
 Omnibus struunt insidias: ubi verò ditatae sunt,
 Novitias meretrices assumunt, tyrocinium artis facturas:
 Ipsas statim informant, ut nec ingenium
 Nec vultus ac facies semper eadem permaneat.
 Brevi si corpore quædam est, suber crepidis
 Infarcitur: si grandior, solea tenui calceus suppingitur:
 Et capite in humerum dejecto prodit:
 Hoc de proceritate nonnihil adimit: si cui gracilior coxa est,
 Assuta subtus veste induit, ut pulbris esse natibus
 Exclament, qui viderint: venter
 Si tumidior est, fasciis ritè obstringitur
 A tergo si pectoris gibbus prominet,
 Virgulis statim ac tabellis anteriora versus
 Ut contis in ventrem repellunt:
 Ruffa quæ supercilia sunt, pinguntur fuligine:
 Quæ nigrò colore est, cerussà oblitinitur:
 Quæ nimis candida est, PÆDEROTA huic affricant.
 Quod in corpore pulchrum est, nudum id ostenditur.
 Quibus elegantes sunt naturâ dentes, ridere coguntur invitæ.

- CDI. Loto affinis vulneraria pratensis, C. B. Pin.
332. Anthyllis leguminosa Belgarum, Lob. ic. p. 87. o. Anthyllis leguminosa, Clus. Pann. p. 744. Clus. hist. lib. 6. fol. 232. Anthyllis lenti similis Dod. Lat. fol. 552. Lagopodium flore luteo, Tab. lib. 2. fol. 223. Anthyllis leguminosa, Lobe-
lii, Cam. hort. P. 17. Vulneraria rustica, Gesn. hort. fol. 287. Arthetica Saxonum, Thal. p. 10. geeler Haasen Klee Tab. Wund Kraut Gesn. hort. Berg Kraut accolis lacus Curlandici. Sangvinem discutit grumosum, ac in vulneri-
bus

bus, ulceribusque sanandis extollitur à Rusticis. Zwischen Kunzen und Sardau an den See, Bergen procerior & succosior provenit. It. Bey Lauten-Mühl in incultis, ubi exilior, & macrior.

CDII. *Lotus* sive *Melilotus pentaphyllos minor glabra*. C. B. Pin. 332. Kleine unrauge fünffblättrige gelbe Schoten Klee. *Trifolium siliquosum minus*. Tab. lib. 2. fol. 219. *Lotus pentaphyllos*, Gesn. hort. fol. 265. *Melilotus Germanica*, Fuchs. fol. 527. Lon. deutsch 136. *Trifolium corniculatum primum*, Dod. Lat. 573. *Lagopus primus* & *Meliloti exigui species altera*, vel septima & nobilis. *Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 472*. *Meliloti tertium genus*. Fuchs. ic. 298. *Melilotus coronata*: Adv. Lob. f. 386. *Melilotum vulgò*, Cæs. lib. 6. c. 22. p. 244. Kleiner Schoten Klee/ Tab. Lon. Unser Frauen Schuhlein. Fuchs. Schöne Gold-geelege gedrungene Klee Blume/ Seb. in Trag. Horn-Klee und Honig-Klee/ vulgò.

In pratis proveniens foliis est majoribus, & siliquis tenuioribus: in montanis foliis minoribus, & siliquis crassioribus, adstringentis & digerentis est facultatis. Fuchs. Hinter dem Altstättischen Wall. It. Bey Lauten-Mühl passim.

CDIII. *Lunaria Græca nostras*. Joh. Lœl. Preusche Pfennig-Blum. *Tricubitalis ferè est planta*, radice ac siliquis à Lunariâ Græcâ seu Bolbonâ Lob. p. 322. in iconibus differens. Foliis nascitur crenatis, velut illa Lobelii, flosculis ex cæruleo albicantibus, quos deciduos seqvuntur siliqvæ longiores, ex tribus laminis constructæ, semen latisculum formam renis exprimens, continentes. Radice nititur oblongâ, & sibratâ nonnihil, bulbulis prorsus destituta. *Lunaria hæc Violæ lunari* 2. Tab. lib. 2. fol. 31. assimilis

T

quidem

quidem est siliquis, foliis verò dissimillima, Hinter Latten-Walde im Gebirge.

CDIV. Lunaria racemosa, Lob. ic. p. 807. Traubich-re Mohn-Raute. Lunaria racemosa, Ceterach folis, racemulis Ophioglossi, Adv. Lob. fol. 360. Lunaria racemosa minor vel vulgaris, C. B. Pin. 354. Lunaria botryitis polyphyllus, Thal. p. 74. Lunaria botryitis. Cam. hort. p. 91. Eystett. Ruta lunaria, Ruta jecoraria, Tab. ic. p. 137. Lunaria minor, Matth. Bauh. in Matth. fol. 647. Lon. deutsch fol. 253. Gesn. hort. fol. 266. Fuchs. 482. Lunaria minor seu racemosa, Cæl. lib. 16. c. 18. p. 600. Epimedum Dioscoridis, Colum. in Phytobas p. 80. Lunaria botryitis minor, Clus. hist. lib. 5. fol. 118. Lunaria Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 719. Dod. Lateinisch. fol. 139. Mohnraut und Leberrant/Tab. Klein Mohnraut. Fuchs. Traut Babbi-chen sieh mich an/ vetulæ quædam. Am Lautschen Teich in collibus herbosis nach Bladau zu. Sistit alba menstrua.

CDV. Lupulus mas, C. B. Pin. p. 298. Lupulus Brunf. Lat. Tom. 3. f. 113. Matth. Bauh. in Matth. f. 839. Dod. Lat. fol. 409. Clus. hist. lib. 1. fol. 126. Tab. lib. 2. fol. 583. Lupus salictarius spontaneus sive lupulus & vitis septentrionalium, Lob. ic. p. 629. Lupulus sativus & sylvestris Trag. Seb. in Trag. deutsch/ 641. Lupus salictarius, Fuchs. f. 164. Gesn: hort. fol. 266. Cæl. lib. 4. c. 17. p. 157. NB. Lu-pulus, qui fructum fert, non floret, qui verò floret, sine fructu est Cæl. cit. loc. Lupulus salictarius spontanea, Adv. Lob. fol. 276. fruchtbahrer Hopfen. Tab. Matth. Fuchs. Zahm und wild Hopfen/ Seb. in Trag. Amaror & odoris gravitas, vim aromaticam floribus decernunt. Menses ac lotium cident, infarctus jecoris ac lienis expeditunt, humores crassos extenuant, abstergunt & discutiunt. Turiones seu asparagi lupuli, ve-tulis.

tulis Hopffen-Kühn/ acetaria inter sunt, alvum mollientia & sangvinem mundantia. In sylvis passim.

CDVI. Lupulus fœmina, C. B. Pin. p. 298. unfruchtbaerer Hopfen Cam. hort. p. 93. Foliis ad radicem tantum serratis, non incisis provenit, editque flosculos subpallidos, in pollinem luteum abeuntes, nullō post se fructu relictō. Inter sepes & fruteta passim.

CDVII. Luteola herba salicis foliō, C. B. Pin. p. 100. Luteola Adv. Lob. ic. p. 353. Pseudostruthium, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 442. Eystett. Antirrhinon Trag. Kyb. in Trag. p. 362. Struthium Gesn. hort. fol. 283. Catanance, Lon. deutsch fol. 191. Catanance prima, Tab. lib. 1. f. 395. Antirrhinon, Tragi Thal. p. 9. Lutum herba, Dod. Lat. fol. 80. Guadarella vulgō, Cæl. lib. 9. c. 35. p. 388. Weiden-blättriges Streich-Kraut / Tab. Orant oder Stärck-Kraut/ Lon. Kyb. in Trag. Ackerpfriemen quibusdam. Am Altstättchen Wall nach dem Baum zu.

CDVIII. Lychnis sylvestris alba simplex. C. B. Pin. 204. Ocymastrum, sive Ocumoides, Bauh. in Matth. f. 706. Matth. deutsch 422. Cam. in Matth. 344. Tab. lib. 2. fol. 14. Rosæ Marianæ similis tertia. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 101. Strutio similis, Walcken-Kraut/Lon. deutsch 109. Ocumoides major, Cæl. lib. 6. c. 47. p. 256. Ocumoides album, Gesn. hort. f. 269. Lychnis sylvestris alba Cam. hort. p. 93. weißer Wiederschöß Tab. wilde Basilien/ Matth. Cam. in Matth. Marien-Kößlein quibusdam. Foliis est hirsutis; floribus in summis ramulis candidis, quibus cytini seu conceptacula seminum succedunt, velut in hyoscymo. Semen λεπτομερὲς siccantis est indolis, demorsis à serpentibus utile. Inter segetes passim.

CDIX. *Lychnis sylv.* floribus purpureo-rubentibus
Dod. Lat. p. 171. *Lychnis sylv.* rubra Cam. hort. 93. *Ocymastrum rubrum*, Tab. lib. 2. fol. 15. *Lychnis sylv.* rubello
flore. An Hesperis Theophrasti. Lob ic. p. 335. Observ.
Lob. 181. *Lychnis sylv.* aquatica purpurea simplex. C. B.
Pin. 204. *Rosæ Marianæ similis quarta Trag.* Seb. in *Trag.*
deutsch fol. 101. *Melandryum Plinii genuinum Clas. hist.*
libr. 3. fol. 294. *Lychnis sylv.* Eystett. *Ocymoides rubrum*
Thal. p. 81. *Ocymoides purpureum vel roseum*, Gesn. hort.
fol. 269. Roth Wiederstofz / Tab. Roth Margentroßlein
und wilde Christus-Anglein vulgò. Juxta pratorum &
fluviorum margines passim.

CDX. *Lychnis segetum major*. C. B. Pin. 204.
Nigellastrum Dod. Lat. fol. 173. *Pseudomelanthium*, Mat.
fol. 33. Lob. ic. p. 38. Adv. Lob. f. 12. Lon. deutsch 114.
Nigella Brunf. Lateinisch tom. 1. fol. 242. *Lolium*. Fuchs.
p. 127. *Pseudomelanthium*, αὐθεντικὸς Φυλλῶδες Theophrasti,
Thal. 86. *Githago Rosæ Marianæ sexta species*, *Trag.* Seb.
in *Trag.* deutsch. 101. *Lychnis arvensis*. Tab. lib. 2. fol. 10.
Pseudomelanthium flore rubescente, Eystett. *Lychnis alia*
inter triticum, Cæs. lib. 6. c. 43. p. 253. Raden Tab. Lon. Raden
oder Korn-Anglein Matth. Ratten-Blum, Brunf. Ratten.
Fuchs. Groß Raden Seb. in *Trag.* Inter segetes passim.

Radix *Pseudomelanthii*, die corporis Christi, sole meridianum
punctum occupante, effossa, manibus servata, ut incalescat, quamvis hæmorrhagiam sistere à quibusdam dicitur.

CDXI. *Lychnis sylv.* quæ *Beenalbum vulgò*. C. B.
Pin. 205. *Papaver spumeum*, sive *Ocymastrum alterum*, Lob.
Ic. p. 340. *Papaver spumeum*, Cam. hort. 117. *Beenalbum*
Gesn. hort. *Beenalbum* sive *Polemonium*, Dod. Lateinisch
fol.

fol. 172. Polygonaton & Rosa Mariana qvinta, Trag. Seb. in Trag. deutsch 103. Herba articularis, Tab. ic. p. 298. Lychnis sylv. Lon. deutsch fol. 171. Polemonium primum Dodonæi. Thal. p. 92. Melandryum Plinii quorundam, Clus. hist. lib. 3. fol. 293. Polemonia, Cæs. lib. 6. c. 50. p. 258. Gliedweich und wild Margen-Rößlein Lon. Lydreich Seb. in Trag. Sphæpettel und Glied-Kraut Tab. Semen & effigie, & sapore assimile est semini papaveris nigri. In fabulosis passim.

CDXII. Lychnis sylv. viscosa rubra angustifolia. C. B. Pin. pag. 205. Klebriche Purpurrothe Marien-Rößlein mit schmalen Blättern. Lychnis sylv. purpurea, Tab. lib. 2. fol. 11. Lychnis sylvestris prima flore rubrō, Clus. Pann. pag. 328. & 329. Lychnis Sylvestris quarta Clus. hist. lib. 3. fol. 289. Lychnis viscosa sylvestris flore incarnatō, Eystett. ἡξάραυλος ruber Thal. p. 59. Wild Purpurrothe Marien-Rößlein Tab. Vulnerarium esse plantam, viscum ejus attestatur. In monte Apollinis bey Quednau.

CDXIII Lychnis viscosa flore muscoso C. B. Pin. pag. 206. Muscipula sive Armoraria altera Lob. ic. p. 453. Muscipula sive Viscaria altera flore muscoso. Adv. Lob. 190. Otites Lychnidis sylvestris genus, Tab. ic. pag. 820. Viscago Cæs. Lib. 6. cap. 49. pag. 257. Viscago major Cam. hort. 178. Sesamoides magnum Salmanticum, Clus. hist. lib. 3. fol. 295. ογαυρόφιλον, Thal. pag. 68. Dhr. Löfflein-Kraut Tab. Varietas est in hac planta. Flores nunc sunt minusculi, copiosi & congesti, nunc calyculis exiguis, curtis & albicantibus inhærentes: nunc majores ac distracti, calyculis longioribus subpurpleis, conclusi, quos vanescentes sequuntur seminum capsæ majusculæ, in caulis & foliis

hirsuties quædam advertitur. In der Brandenburgischen und Fischhäusischen Heyde/ secus vias passim.

Lychnis sylvestris viscosa foliis Otididis.
Joh. Lœl. Klebrige weiß Marien Rößlein mit Dhr. Löffel-
Kraut Blätter. Radix lignosa ferè est, cortice subalbidō tecta,
quæ caulinum modò unum, modò plures effert cubitales,
& minores, rotundos, hirsutos, geniculatos, viscosos, nunc
subvirentes, nunc rubescentes, quorum geniculis singulis
duo ex adversum folia innata viridia in acumen tendentia
ac hispida, ramulis plerumque binis, ad genicula exclusis,
subservientia: Horibus in fastigiō caulis ac surculis mense Ju-
lio est candidis ac dilabidis brevi spatiō, foliolis decem con-
stantibus, circa summum leviter incisis, tractu ætatis mox
incurvis ac reflexis, quorum stamina tria vel plura ex albo
purpurea post: Semen in capsis flavescētibus subnigricans
est, papaveris semini proximum, sed minus; folia summā
tellure copiosa alit. Radix hirsuta, oblonga, in extremitate
subrotunda, pediculis prolixis nitentia, otididis facie. Zu
Quednau auffin Berge. Item bey Lauten-Mühl.

Lysimachia lutea major: quæ Dioscoridis
C. B. Pin. 245. Lysimachia lutea. Trag. Sebitz, in Trag.
deutsch fol. 146. Fuchs. fol. 492. Tab. lib 2. fol. 524. Adv.
Lob. fol. 185. Cæs. lib. 6. cap. 50. p. 261. Eystett. Lysi-
machia lutea sive Salicaria Lob. ic. pag. 342. Lysimachia
lutea communis Clus. hist. lib. 4. fol. 50. Lysimachium lu-
teum Gesn. hort. fol. 266. Thal. pag. 71. Lysimachia pri-
ma, Matth. Bauh. in Matth. fol. 675. Lon. deutsch fol. 164.
Lysimachia vera, Cord. in Diosc. fol. 61. Großer geeler
Weiderich Tab. Fuchs. Matth. Lon. In der Hollengrund/
juxta rivos passim. Lysimachia lutea sub Elevatione poli
45. 46. 47. 48. optima. Ra-

No. 40 ad pag. 150.



*Lycnis Sylvestris Viscosa
foliis Oritis.*

SPONTE NASCENTES.

151

Radix & folia adstringunt, & omnis generis fluxus compescunt.

Herba ac flores lutei colligendi, Sole 15. & occupante. In lixiviō decocti flores flavedinem inducunt crinibus.

CDXVI. *Lysimachia bifolia* flore globosō lutes C. B. Pin. 245. Zweyblättriger Weiderich mit einer gelben runden Blüth. *Lysimachium aquatile*. Dod. Niederländisch fol. 958. *Lysimachia lutea altera* Clus. hist. lib. 4. fol. 50. Wasser-Weiderich Dod. Niederländisch. Ben Schwämis im Gebrauch. It. In der Hollen-Grund ad fossas.

CDXVII. *Lysimachia siliquosa hirsuta magnō flore* C. B. Pin. 245. Rauger Schoten-tragender Weiderich mit großer Bluthe. *Lysimachia purpurea*, Fuchs. fol. 491. *Lysimachiæ purpureæ primum genus* Fuchs. ic. pag. 278. *Lysimachia siliquosa prima* Tab. lib. 2. fol. 524. Antoniana major hirsuta Gesn. hort. fol. 247. *Lysimachia seu Salicaria altera Trag. Kyber.* in Trag. p. 182. *Onagra campestris hirsuta*, Cæs. lib. 6. Cap. 70. & 71. pag. 268. *Lysimachia secunda & tertia flore purpureo vel rubro*, Lon. deutsch 164. *Lysimachii majoris purpurei prima species*, Thal. pag. 70. Weiderich - Rößlein Tab. Roth Weiderich Fuchs. Braun und roth Weiderich Lon. Plantam hanc in pago Langheim ad oram rivuli alluentis reperi: ejus caulis rotundus, hirsutus ac concavus quatuor surgebat in ulnas.

CDXVIII. *Lysimachia siliquosa hirsuta, parvō flore* C. B. Pin. 245. Großer rauger Schoten-tragender Weiderich mit kleiner Blüth. *Lysimachia siliquosa secunda* Tab. lib. 2. fol. 525. Weiderich Rößlein Tab.

CDXIX. *Lysimachia siliquosa glabra major* C. B. Pin. pag. 245. Großer unrauger Schoten-tragender Weiderich

derich. *Lysimachia siliquosa*, filius ante Patrem Lob. ic. p. 343. *Lysimachia siliquosa major*, Clus. hist. lib. 4. fol. 51. *Lysimachia siliquosa flore albō* Tab. ic. pag. 853. *Pseudo-Lysimachium purpureum primum* Dod. Lateinisch fol. 85. *Lysimachii majoris purpurei secunda species* Thal. pag. 70. *Onagræ alterum genus Cæs.* pag. 265. *Weißer Weiderich* Tab. *Pota dysenterias, sangvinis rejectiones, & muliebre profluvium sanat.* Gal. 7. simpl. In locis uidis.

CDXX. *Lysimachia siliquosa glabra minor* C. B. Pin. pag. 245. *Kleiner unrauger Schoten-tragender Weiderich.* *Lysimachia minor & tertia* Tab. lib. 2. fol. 524. *Lysimachia siliquosæ varietas* Adv. Lob. fol. 145. *Lysimachii medium genus*, Thal. p. 70. *Klein Weiderich.* Tab. *In der Hollen-Grund in uliginosis.*

CDXXI. *Lysimachia siliquosa glabra minor flore albō.* Joh. Lœsel. *Klein unrauger Schoten-tragender Weiderich mit weißer Bluhm.* *Bey Gerdauen am Mühl-Teich in umbrosis.*

CDXXII. *Lysimachia Chamænerion dicta latifolia* C. B. Pin. pag. 245. *Lysimachia vulgò altera, Cam. Hort.* p. 93. *Antoniana, s. S. Antonii herba, foliis lœvibus.* Gesn. Hort. ap. pag. 290. *Chamænerion & Epilobion,* Eystett. *Sanct Antonii Kraut.* Foliis duntaxat lœvibus passim apud nos provenit, quæ Gesnero rarioꝝ inventu. *In der Hollen-Grund.* Item dieſeſit Neuendorff am Graben.

CDXXIII. *Lysimachia spicata purpurea forte* Plinii C. B. Pin. 246. *Lysimachia purpurea forte* Pliniana Lob. ic. pag. 342, *Lysimachia purpurea* Tab. lib. 2. fol. 524. *Lysimachia flore purpureo* Cam. Hort. pag. 93. Cæs. Lib. 6. cap. 55. pag. 261. *Lysimachia altera* Matth. Bauh. in Matth.

Matth. fol. 675. Eystett. *Lysimachia purpurea* sub Elevatione Poli 45. 46. 47. 48. optima. Pseudo-*Lysimachium purpureum* alterum. Dod. Lateinisch fol. 86. *Solidaginis Saracenicæ* alia species, Trag. Kyber. in Trag. p. 487. *Lysimachium purpureum* Gesn. hort. fol. 266. *Lysimachia purpurea* communis major, Clus. Hist. lib. 4. fol. 51. *Brauner spiciger Weiderich* Tab.

Radix collecta, Sole ultimum \varnothing gradum accidente, ac collo appensa certissimum Epilepsiae remedium. Flores colligendi, Sole ultimum \varnothing gradum inhabitante. Utiles sunt in sputo ac mictu sanguinis, mensiumque nimiò fluxu, pulvisculô eorum exhibitô. Faciem emaculat aqua florum destillata. Semen colligatur Sole 2. \varnothing occupante, herba verò tota 8. \varnothing Sole adeunte, *Lysimachia purpurea*, ipsô Jacobi die, vesperâ ingruente effossa, torrefacta, in sacculum conjecta, & novendum collo appensa, post in profluentem missa, putrilaginem gingivarum scorbuticam corrigerere creditur. In incultis est juxta rivos passim.

CDXXIV. *Lysimachia spicata cærulea*. C. B. Pin. 246. *Lysimachia Cærulea hortensis* Lob. ic. pag. 344. *Lysimachia cærulea hortensis*, *Veronica recta* quorundam Adv. Lob. fol. 145. *Veronica recta cærulea* Eystett. Pseudo-*Lysimachium cæruleum* Dod. Lateinisch fol. 86. *Lysimachii tertium genus*, Gesn. hort. fol. 266. *Lysimachia cæruleo* flore Clus. Hist. lib. 4. fol. 52. *Spiciger blauer Weiderich*. In ascensu montis bey der Neuhäusischen Mühl. It. bey Wiesdrehlen in pratensisibus.

CDXXV. *Lysimachia cærulea galericulata*, vel *Gratiola cærulea* C. B. Pin. 246. *Blauer gehelmter Weiderich*. *Lysimachia flore cæruleo*. Cam. hort. pag. 93. Tertia-

tianaria Tab. lib. 2. fol. 93. Lysimachia galericulata Lob. ic. pag. 344. Herba Judaica altera, Dod. Niederländisch. f. 127. Gratia Dei Cæs. lib. 6. cap. 65. pag. 265. Lysimachia galericata, Lobelii. Clus. Hist. Lib. 4. fol. 53. Sideritis cærulea, Thal. pag. 104. Fieber-Kraut. Tab. Ad fluviorum ripas passim.

Lichys palustris foedda.

Pin. 1236.

CDXXVI. *Lysimachia hirsuta purpurea, flore galericulatō. Joh. Lœl. Rauger gehelmter Weiderich mit Purpurfarben Bluhmen. Sæpe bicubitalis altitudine in locis humectis, sæpe multò minor in aridioribus, caulis est quadrangulis, striatis, hispidis, geniculatis, concavis, ἐπὶ τὸ πλεῖστον brachiatis, quorum geniculis bina serviant folia oblonga, viridia, hirsuta, tactu holoserica, in ambitu crenata, nova thyrsulorum germina haud rarò amplexu suō foventia. Caulum summitas flosculorum gaudet concursu duobus ad quodvis geniculum foliis suffultorum, verticillatim thyrsum ambientium, capsis in summō incisis insistentium, galericulatorum, hiantium, maculosâ purpurâ tenuissimis intus staminibus, quorum intermedium in cacumine bifurcum. Flosculis deciduis, in quālibet capsâ quatuor advertes semina rotunda. Radix nodosa albicans & concava, willis circa nodos instruitur plusculis. Ad rivorum margines, sæpe & inter segetes.

CDXXVII. Malva sylvestris folio sinuato C. B. Pin. 314. Große wilde Pappel. Malva sylvestris major Tab. lib. 2 fol. 442. Thal. pag. 76. Malva agrestis major Gesn. hort. fol. 266. Malvæ vulgaris altera species. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 292. Malvæ sylvestris procerior vulgaris Lob. ic. pag. 650. Malva vulgaris major, Lon. deutsch fol. 191. Cam. Hort. pag. 95. Malva sylvestris elatior, Fuchs. fol.

Nº 41 ad p. 156.



Lysimachia hirsuta
purpurea flore galericulato.

Nº. 42 ad p. 167.
Muscus pennatus major
Cauliculis ramosis, in Sum-
mitate velut spicatus.



Stypnum crista castrensis. L.

fol. 509. *Malva sylvestris vulgaris*, Cord. in Diosc. fol. 44. *Malva sylvestris procerior* Dod. Lateinisch 653. *Malva sylvestris recta*. Cord. hist. fol. 114. Tab. *Hasen-Pappeln*; *Graß-Pappeln* Lon. *Ros-Pappel*. Fuchs. *Folia sæpè ita sinuata sunt in nostrate, ut in acutiem tendant eorum partes.* Cauliculi hirsuti sunt, ac flores violacei. *Hinter Fischhausen/ viâ, quâ itur nach Lochstädt.* Item am alten Schloß zu Gerdauen.

CDXXVIII. *Malva sylvestris rotundô folio*. C. B. Pin. 314. *Rund-blättrige Kleine Wald-Pappeln*. *Malva sylvestris pumila* Fuchs. fol. 508. Thal. pag. 76. Dod. Lateinisch fol. 653. *Malva vulgatissima*. Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 292. *Malva minor* Lon. deutsch fol. 191. *Malva vulgaris minor*, Cam. hort. pag. 45. *Malva sylvestris minor* Tab. lib. 2. fol. 442. *Gänß-Pappeln*. Brunf. deutsch f. 228. *Malva Matth.* Bauh. in Matth. fol. 359. *Malva sylvestris re-cens pumila* Lob. ic. pag. 651. *Malva sylvestris*. Adv. Lob. fol. 292. *Malva agrestis minor*, Gesn. hort. fol. 266. *Malva sylvestris supina*, Cord. hist. fol. 149. *Gänß-Pappeln* Tab. Fuchs. *Gemeine Räß-Pappel*, Sebitz. in Trag. *Kleine Pappeln* Lon. *Hasen-Pappeln* Nostratisbus. Phanias libro de plantis ait, in malvâ seminis formam placentam vocari, quia sit ei similis. *Vetulis & pueris apud nos Räßchen-Räßchen* dicitur. Circa hortos, pagos, & rudera paßim.

CDXXIX. *Malus sylvestris minor*, Tab. ic. p. 1009. *Mala sylvestria*, quæ & alba & rubra. C. B. Pin. pag. 433. *Mala sylvestria rubentia* Tab. ic. pag. 1008. *Malus sylvestris major alba*. Tab. ic. pag. 1008. *Klein Holz-Apfel*. *Holz-Strömling*; *Weisse große Holz-Apfel* Tab. *Hölzten*

Borussis. Ex his præparatur potus, quem *Hölzken-Schem*: per nominant. In sylvis & pagis passim. Pomic olim pugnatum, retulit Chares Mytyleneus, Alexandrum, cum mala pulcherrima in agris circa Babyloniam reperisset, iis scaphas complevisse, ac illorum jactu è navibus, ut pugnarent, imperasse, unde prælium illud dictum fuit *μηλομαχία*. Obiter jocum huc adscribam. Dum circa arborem hanc cum Amicô versor, austera fustibus mala decutiens, ex illo, otii causâ, qværo: cur *Malum* homini os claudat, *Mala* verò aperiant? Causam cùm daret prorsùs alienam, dixi literam M hoc præstare, quæ omnes inter literas os claudit, reliquis id aperientibus. Rem ut exactius caperet, Epigramma hoc in voculam *SCIP* à me olim fusum ipsi recito:

*Literula M claudit, reliquarum tota caterva
Os aperit; res est pensiculata diu.
SCIP dictum factum claudit rursum ora puellæ,
Et vult lege suâ mente tegenda tegi,
SCIP cur collectum claudit, cur pandit amicæ
Os, ubi literulas ordine SCIP recitat?
SCIP, quod rivalis docuit, recludere non fas,
SCIP schola quod docuit, tutò aperire potest.*

Adhæc qvæsivi ex eodem, qvì fiat, quod litera M nunquam finiat voces Grajas:

*Literulas inter Latias quæ claudere sueta
Voices, cur Grajas claudere non potis est?
Causæ locô attulit illud Ausonii:
Vocibus in Grajis nunquam ultima conspicior M.*

CDXXX. *Marrubium album vulgare* C. B. Pin. pag. 230. *Marrubium Fuchs.* fol 590. Dod. *Latinisch* f. 87. Cord.

Cord. in Diosc. fol. 58. Cæl. lib. II. cap. 24. pag. 447. Marrubium vulgare Clus. hist. lib. 4. fol. 34. Eystett. Marrubium album Lob. ic. pag. 517. Tab. lib. 2. fol. 239. Gesn. hort. fol. 267. Marrubium candidum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 8. Marrubium sive Prassium, Matth. deutsch fol. 346. **Andorn**-Weiblein Brunf. deutsch fol. 83. Marrubium album odorum Adv. Lob. fol. 222. **Weißer gemeiner Andorn** Tab. Fuchs. Matth. **Gottes Vergess** quibusdam. In pagô Kraptepellen / ubi succini hamiotæ, copiosissimè visitur. Item in Gerdauen / und bey der alten Pfund-Bude in incultis. Sub Elevatione poli, 45. 46. 47. 48. 49. Radix perutilis, Sole in 1. & constitutô effossa. Folia colligenda Sole 16. & occupante; flores Sole 1. & ingresso.

CDXXXI. Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Dioscoridis C. B. Pin. 230. Ballote sive marrubium nigrum Lob. ic. pag. 518. Dod. lat. fol. 90. Marrubium nigrum Gesn. hort. fol. 267. Lon. deutsch fol. 140. Marrubiastrum Tab. lib. 2. fol. 240. Ballote, Matth. Bauh. in Matth. fol. 601. Cord. in Diosc. fol. 57. Cæl. lib. II. cap. 22. pag. 445. Marrubium majus Trag. Kyb. in Trag. p. 8. **Schwarzer stinkender Andorn** Tab. Fuchs. Matth. Lon. **Groß und schwarz Andorn** Kyber. in Trag. **Am Kneiphöfischen Wall.** Item bey Lauten-Mühl in ruderibus passim.

CDXXXII. Marrubium Cardiaca dictum, forte primum Theophrasti C. B. Pin. 230. Cardiaca Matth. Cam. in Matth. fol. 397. Lob. ic. pag. 516. Adv. Lob. fol. 221. Tab. lib. 2. fol. 248. Dod. Lateinisch fol. 94. Cæl. lib. II. cap. 23. pag. 445. Fuchs. fol. 395. **Andorn**-Männlein Brunf. deutsch fol. 82. Melissa sylvestris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 12. **Herz-Gespann** Tab. **Herz-Gesperr** und **Herz-Kraut**/Kyber. in Trag. Flosculis albis provenit in

arce zu Lieb, Mühl. Amara est, calidæ ac siccæ indolis. In Epilepsia & cordis affectibus singularis creditur esse virtutis. Sepibus & rivulis uliginosis passim se associat. Quæritur, cur plantæ siccatione plerumque citius nigrescant parte pronâ quam aversâ, uti in hâc videre est? ▽ hujus plantæ destillata viridis (nî fallor) est coloris. Uti ▽ Pulsatillæ & Spiritus Pimpinellæ cærulea, an ob cupream vesicam? non satis stannô obductam? sicque per accidens. An per se? In vitro destillationem nunquam tentavi. Sic contra Chymicorum assertum, Tincturæ vegetabilium transcenderent alembicum.

CDXXXIII. *Marrubium palustre glabrum* C. B. Pin. 230. unrauger Wasser Andorn. *Marrubium palustre* Lon. deutsch fol. 140. *Marrubium aquanticum* Trag. Kyber. in Trag. pag. 9. Thal. pag. 76. *Marrubium aquatile* Dod. Lateinisch fol. 595. *Marrubium aquaticum vulgi*. *Sideritis secunda* Matthioli Lob. ic. 524. *Marrubium aquaticum vulgi* Adv. Lob. fol. 211. *Sideritis prima* Heraclia Matth. Bauh. in Matth. fol. 711. *Sideritis prima* Cam. hort. pag. 160. *Verbenæ alterum genus* Cæf. lib. 11. cap. 33. pag. 451. *Lancea Christi*, Gesn. Hort. fol. 263. Wasser oder weicher Andorn Lon. Gliedt-Kraut das i. Matth. Bruch oder Wasser Andorn quibusdam, juxta rivos & uliginosa passim.

CDXXXIV. *Melampyrum purpurascente comâ*. C. B. Pin. 234. *Triticum vaccinum* Dod. Lateinisch fol. 541. Braunechte Wald-Hirse oder Ruh-Weizen. Hinter der Liep in locis uidis.

CDXXXV. *Melampyrum luteum latifolium* C. B. Pin. pag. 234. Breit-blättrige gelbe Wald-Hirse oder Ruh-Weizen. *Milium sylvaticum* primum & secundum Tab. I. I. fol.

fol. 682. solô coloris flore differunt hoc & præcedens. Melampyrum primum Tal. pag. 79. Parietaria sylvestris secunda, Clus. hist. lib. 4. fol. 44. Clus. Pann. pag. 603. Parietaria sylvestris Eystett. Cratægonon Adv. Lob. ic. pag. 36. Wald-Hirschen Tab. Ruh-Weizen quibusdam. Nacht und Tag vetulis. Ad margines sylvarum passim.

CDXXXVI. Melilotus officinarum Germaniæ, C. B. Pin. pag. 331. Melilotus germanica Lob. ic. pag. 430. Cam. hort. pag. 99. Melilotus germanica flore luteô. Eystett. Melilotus vulgaris major Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 471. Lotus urbana Matth. Bauh. in Matth. fol. 809. Lotus sylvestris Tab. ic. pag. 508. Cæs. lib. 6. cap. 17. pag. 241. Melilotus vera, Gesn. Hort. fol. 267. Loti sive trifolii species, Cord. in Diosc. fol. 70. Saxifraga lutea, Fuchs. fol. 749. Trifolium odoratum, sive Melilotus, Dod. Lat. fol. 567. Trifolium odoratum Imum Dodonæi Thal. pag. 125. Wilder Stein-Klee. Sieben-Gezeit Tab. Gemeiner oder großer Stein-Klee Matth. Geeler Stein-Klee vulgò. Dießeits Friedland propè viam, in tantâ copiâ Melilotus tûm luceô tûm albidô flore crescit, ut vel hamaxa seu currus herbâ onerari possit. Odorata herba est, ο μελίλωθος εἰς πλεῖστα χρόνον ἐνοσμῷ διαμένει, inquit Theophrastus. Hinc fragrantia odoris coronis texendis olim serviebat.

CDXXXVII. Mentha cataria vulgaris & major. C. B. Pin. 228. Nepeta vulgaris. Trag. Seb. in Trag. deutsch 12. Menta felina, Cattaria Tab. ic. pag. 348. Eystett. Cattaria sive mentha Catti, Lob. ic. pag. 511. Adv. Lob. fol. 519. Nepeta fruticosa Cord. in Diosc. fol. 52. Nepeta Germanica, Cam. hort. pag. 106. Herba gattaria, Matth. Bauh. in Matth. fol. 530. Cattaria herba, Dod. Lateinisch. fol. 99.

Ca-

Calaminthæ primum genus. Fuchs. fol. 434. *Calamintha* tertia seu *Nepeta*. Tal. pag. 34. *Calaminthæ* species quibusdam, Gesn. hort. fol. 251. *Calamintha montana* Lon. deutsch fol. 142. *Gattaria vulgò*, *Calaminthæ* tertium genus *Dioscoridis*, Cæs. lib. ii. c. 63. pag. 472. *Räthen-Münz*/ *Räthenappt* Tab. Nept. / Zahn. *Räthen-Kraut*. Sebitz. in *Trag. Worgemünz und Stein-Münz* Lon. *Marien-Nessel* Nostratibus. In pago Laffsken ad hortorum sepes.

CDXXXVIII. *Menthastrum* vel *mentha sylvestris* altera, *Trag.* Sebitz. in *Trag.* deutsch fol. 15. *Menthastrum* Matth. deutsch fol. 291. Dod. *Lateinisch* f. 96. Fuchs. fol. 292. Clus. *Hist. lib. 4.* fol. 32. Lob. ic. pag. 509. Cord. *Hist. fol. 157.* *Mentha sylvestris longiore folio*. C. B. Pin. pag. 227. *Langblättrige wilde Ros-Münz*. *Mentha sylvestris* Gesn. hort. fol. 267. Lon. deutsch fol. 143. *Ros-Münz*. Brunf. deutsch fol. 254. *Menthastrum sylvestre*, Eystett. *Mentha sylvestris altera*, Cæs. lib. ii. cap. 64. pag. 473. *Wilde Münz*/ oder *Ros-Münz* Matth. *Räthen-Balsam* Sebitz. in *Trag. Wild Balsam/ oder wilde Münz* Lon. *Bicubitalis* est planta, nonnunquam & longius excrescit. *Magnam vim obtinet calafaciendi ac resolvendi*. Zu *Langtheim am Graben*. Item bey *Schönbruch und Creuzburg am Mühlen Flüß*. Item zu *Glommen am Graben*.

CDXXXIX. *Mercurialis spicata* sive *fœmina*, *Dioscoridis & Plinii*. C. B. Pin. 121. *Mercurialis fœmina* Dod. *Lateinisch* fol. 658. Matth. deutsch 541. Fuchs. fol. 473. Cam. in Matth. 434. Tab. lib. 2. fol. 254. Lob. *Observ.* fol. 131. Adv. Lob. fol. 100. *Phyllon Thelygonon Theophrasti*, Cord. in *Diosc.* fol. 59. *Mercurialis vulgaris & prima*, *Trag.* Sebitz. in *Trag.* deutsch 151. *Ringel-Kraut* *Weiß-*

Weiblein Tab. Matth. Fuchs. Bengel. Kraut Sebitz. in Trag. Küh-Wurz / Mercurius-Kraut / Küh-Kraut und Scheiß-Kraut vulgò. Incidit, emollit, abstergit, digerit, bilem & aquosos humores educit. Locis muliebribus subdita menses & secundas ejicit. Pota & genitalibus admota, mulierem foemellis generandis aptam reddit. Diosc. Mas è foliorum sinu in curtis petiolis coleos duos gestat, semini Aparines formâ & asperitate consimiles. Fœmina spicas alit, racemosis flosculis onustas, absque fructu vel semine vanescentes. Ad hortorum sepes.

CDXL. Mercurialis montana spicata. C. B. Pin. pag. 122. Mercurialis sylvestris fœmina, Cord. Hist. fol. 111. Thal. pag. 77. Cynocrambe fœmina. Matth. Bauh. in Mat. fol. 891. Cynocrambe sive Mercurialis fœmina sylvestris, Cam. hort. pag. 101. Wild Bengel-Kraut/Weiblein Mat. Im Sartauschen Gebirge/ in opacis copiosissimè. Item bey Trunz copiosè. Ejus cauliculi exsiccati tractu temporis cæsum acquirunt colorem.

CDXLI. Mespilus apii foliō sylvestris spinosa sive oxyacantha C. B. Pin. 454. Cynosbatos Theophrasti Trag, Sebitz. in Trag. deutsch fol. 771. Lon. deutsch fol. 60. Oxyacantha Tab. lib. 3. fol. 741. Lob. ic. pag. 200. o. Cæf. lib. 3. cap. 13. pag. 99. Cam. Hort. pag. 113. Oxyacantha, acuta spina, Matth. Cam. in Matth. fol. 46. Oxyacantha Matthioli Thal. pag. 81. Sorbus aculeata Cord. hist. fol. 176. Spina Appendix Plinii, Clus. hist. lib. 1. fol. 121. Oxyacantha Dioscoridis Cord. in Diosc. fol. 19. Oxyacantha Dioscoridis & Plinii spina appendix, Gesn. Hort. fol. 270. Saurach Tab. Hagedorn Matth. Sebitz. in Trag. Lon. Mählbaum Nostratibus. Baccæ συπτικῆν, nuclei λί-

Dav. Geplin. obtinent virtutem. Inter fruticeta in der Hollen-Grund passim.

CDXLII. *Millefolium vulgare album* C. B. Pin. pag. 140. *Weisse gemeine Schaaff-Garbe*. *Millefolium vulgare Trag. Kyber*, in *Trag.* pag. 477. *Millefolium vulgo*, Gesn. hort. fol. 268. *Millefolium terrestre vulgare*. *Stratiotes Millefolium* *Dioscoridis* Lob. ic. pag. 747. *Militaris sive Millefolium* flore albō Adv. Lob. f. 333. *Millefolium* flore albō Eystett. Cam. Hort. pag. 101. *Millefolium album Brunf.* Lateinisch fol. 171. *Stratiotes millefolia*, Fuchs. fol. 727. *Millefolium terrestre majus*, Cord. Hist. fol. 139. Tab. lib. 1. fol. 462. *Millefolia stratiotes* Cod. in *Diosc.* fol. 70. *Achillaea & Millefolium Lon.* deutsch fol. 267. *Millefolium Thal.* pag. 77. *Millefolium sive Achillaea* Dod. Lateinisch fol. 100. *Groß-Garben-Kraut* Tab. *Feld-Garben/ Groß-Garben/ Groß Schaaffribb* Lon. *Schaaffrip oder Gerwel* Kyber. in *Trag.* *Weisse Garb* Brunf. In arenosis passim. Item am Wege nach dem Dorff Lassken copiosè.

CDXLIII. *Millefolium purpureum*. Tab. lib. 1. fol. 463. *Millefolium purpurei floris* Dod. Lateinisch fol. 100. *Millefolium vulgare purpureum minus* C. B. Pin. pag. 140. *Millefolium terrestre purpureis floribus* Lob. ic. pag. 747. *Militaris sive Millefolium* flore purpureō Adv. Lob. fol. 333. *Millefolium minus* Matth. Bauh. in Matth. fol. 799. *Millefolium vulgare* flore diluti ruboris, *Trag. Kyber*. in *Trag.* 477. *Millefolium rubrō colore*, Clus. hist. lib. 3. pag. 331. *Purpur-rothe Schaaff-Garbe* Tab. Am Kneiphöfsschen Wall nach dem Brandenburgischen Thor zu.

CDXLIV. *Millefolium aquaticum lenticulatum*. C. B. Pin. pag. 141. *Feniculum aquaticum galericulatum*, Tab.

Tab. lib. i. fol. 230. *Millefolium aquaticum* flore luteo galericulato Lob. ic. pag. 791 *Wasserhelm-Kraut* und *Wasser-Fenchel* Tab. *Wasser-Garb* mit geelen Blühmlein. *Beym Krauß-Krug* item in fossis nach dem *Bretter-Krug* zu. *Siccat & vulnera solidat*.

CDXLV. *Millefolium aquaticum* flosculis ad foliorum nodos C. B. Pin. 141. *Myriophyllum aquaticum minus*. Clus. hist. lib. 6. fol. 252. Clus. Pann. pag. 711. Knottigte *Wasser-Garbe* mit kleinen weißen Blühmlein. *Thysalis* est rotundis numerosis nodis interceptis, radicationem capillaceis fibris impetrantibus. Singulis foliis assistunt tenuissimè incisa, radicem versus longiora, in cacumine breviora, quæ in caulum summitate ad quodvis geniculum flosculos gerunt candidos, octonis foliolis difficulter se explicantibus, instructos, tractu temporis in tubercula degenerantes. πολυκαρπη conspicitur Julio mense. In fossis bey der Hollen-Grund.

CDXLVI. *Millefolium aquaticum* filamentis foliacis. Joh. Lœf. *Myriophyllum*, *Maratriphyllum palustre alterum*. Lob. ic. pag. 790. *Peucedanum aquanticum* Tab. lib. i. fol. 230. *Millefolium aquaticum* foliis fœniculi ranunculi flore & capitulō C. B. Pin. 131. *Myriophylli species coliculis fluitantibus*. Thal. pag. 77. Fademblättrigte *Wasser-Garb*/ *Wasser-Fenchel*/ der 4. Tab. Foliis est squalidis, strictis, oblongisculis, teneris, filamentorum instar, coliculis in summo ex intervallo flosculis jam deciduis, fructus innascitur oblongus, subrotundus, tetrorchis sœpè, cuius cavo velut in cochleā incurvum & flavescens corpusculum continetur. In der Sarkanischen Bäcke.

CDXLVII. *Millefolium aquaticum pennatum, spicatum*

tum, quod 4. in Prodr. C. B. pag. 73. Matth. Bauh. in Matth. 813. Feder-Wäser-Garb. Hinter dem Altstädtischen Wall nach der Hollen-Grund zu in fossis.

CDXLVIII. Millefolium aquaticum, seu viola aquatica caule nudō, C. B. Pin. pag. 141. Wäser-Garb oder Wäser-VioLEN mit nackten Stengeln: foeniculum aquaticum secundum. Tab. Lib. i. fol. 230. Myriophyllum alterum equisetifolium fluviatile Lob. Obs. fol. 460. Adv. Lob. fol. 354. Myriophyllum alterum Matth. Bauh. in Matth. f. 812. Viola aquatilis, Dod. Lat. fol. 584. Stratiotes fluviatilis Gesn. hort. fol. 283. der dritte Wäser-Fenchel Tab. die ander Fenchel-Garb. Matth. In lacunis passim.

CDXLIX. Mollugo montana angustifolia, vel Galium album latifolium C. B. Pin. 334. Mollugo vulgarior Herbariorum, Galion album quorundam Lob. ic. p. 802. Galion candidō flore. Cord. in Diosc. fol. 69. Cæl. lib. 8. c. 11. pag. 325. Gallion tertium, Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 391, Gallion album, Thal. pag. 54. Mollugo prima Tab. lib. i. fol. 538. Dod. Lateinisch fol. 354. Gallium flore albō, Cam. hort. pag. 63. Groß-Stern Meger-Kraut. Tab. Breit-blättriges weißes Meger-Kraut und Wallstroh. Seb. in Trag. In arenosis bey Königsberg passim. An Mollugo montana sive secunda Dod. Lat. fol. 354. quæ in monte bey Niedenau reperitur?

CDL. Muscus terrestris vulgaris Lob. ic. pag. 242. o. Muscus palustris. Dod. Lateinisch fol. 472. Muscus vulgarissimus C. B. Pin. pag. 360. Muscus hortensis Trag. Kyber. in Trag. pag. 946. Gemein Erd-Mos. Im Gebrauch bey Lauten-Mühl copiosè. Flore utplurimum purpureo ibi repertus.

CDLI.

Nº. 43 ad p. 167.

*Muscus pennatus minor Cauli
culis ramosis, in Summitate
Velut spicatus.*



Stypnum abietinum. L.

No. 441 ad. p. 167.



Muscus filicinus minor repens.

de per utr. et al.

uult emolumens uulcens uulcens
uulcens



Nº 45. ad pag. 167.

*Muscus bifolius procumbens foliis
Subrotundis.*



Jungermannia Asplenioidea L.

CDLI. *Muscus pennatus*: in prodr. C. B. pag. 151.
Wald-Feder-Moß. In petrosis ac sylvis freqvens est.

CDLII. *Muscus pennatus* tectis vetustis insidens
 Joh. Lœl. *Feder-Moß* so auf den alten Dächern sitzt. Vi-
 ticulis suis brevibus ac ramosis latè serpit hic muscus, foliis-
 que minutis pennam æmulantibus exornatur. Color ejus
 ex luteo virescit. Adnascitur etiam haud rarenter muris in
 senio constitutis.

CDLIII. **Muscus pennatus major* caulinis ramo-
 sis in summitate velut spicatus, Joh. Lœsel. *Gespizter*
großer Feder-Moß mit astigen Stengelchen. Im Löbe-
 nichtschen Walde.

CDLIV. **Muscus pennatus minor* caulinis ramo-
 sis in summitate velut spicatus. Joh. Lœsel. *Gespizter*
kleiner Feder-Moß mit astigen Stengelchen. Cauliculi e-
 jus textiles quasi sunt minutiis ac contortis foliolis copiose
 ornati. Ramosi adhæc caulinis, parvulas quasi spicas in
 summitate habentes. Viridis est muscus, sed quâ terram
 spectat ferrugineus. Im Löbnichtschen Wald.

CDLV. **Muscus filicinus minor* repens. Joh. Lœl.
Klein kriechender Waldfahren-Moß. Viticulis est exiguis,
 ramulosis, per terram serpentibus, in summitate velut spi-
 catis, foliolis viridiusculis, tenerrimè dissectis. Radicatio-
 nem fibris tenellulis refert acceptam. Bey Lauten-Mühl
 im Walde.

CDLVI. **Muscus bifolius* procumbens foliis sub-
 rotundis Joh. Lœl. *Zweyblättriger liegender Moß* mit
 breiten rundlichen Blättern. Tenellula radix viticulosas
 promit humi procumbentes, foliolis binis subrotundis, vi-
 ridiusculis, arctè se inseqventibus, instructas ad latera pul-

Slypnus costa ca
L. 19.

Slypnus abieti
L. 20.

l. Muscus filicin

C. B. p. n. 360.

Slypnus 15. Muscas

nes facie, folijs utr

lindis splendens

germanni

Jungermania aspre

Iulum sæpe seu ramusculum extrudentes. Im Löbnichtschen Walde.

*aus ad Polytrichoidem
s. arbusculam referens
ngis. Ray Syn: 36. se
aliquando cum capi-*

CDLVII. *Muscus ramosus erectus oblongifolius Joh. Lœsel. Moß mit breiten länglichen Blättern. Ex radiculâ villosâ , nigricante caulinus exit foliosus , in summitate ramosus, foliolis oblongis, latiusculis, virentibus numerosis, alterne incedentibus vestitus. Tenerior adhuc ramulis destituitur. Bey Selnicken oder Sunnicken.

*sus Stellaria rosea
: 351.*

CDLVIII. *Muscus errectus foliis in orbem sparsis Stern-Moß. Thrysulis nascitur uncialibus sæpè & majoribus, quorum summo foliola insident amœnulè in orbem disposita, virentia & acuminata. Bey Selnicken.

*usus Brachioidez Ma.
o Purpur, tuberculi
ulentia donatur, e
Ray Syn: 332.
n paschalis. L. 69.*

CDLIX. Muscus uvida amans foliis subrotundis expansis. Joh. Lœsel. Wasser-Moß mit runden ausgebreteten Blättern. Cauliculis crescit nigricantibus, quibus foliola adhærent subrotunda, viridia, aliquantulum crispa , alternatim sibi succendentia. Radiculæ tomentô quasi quodam subnigricante obducuntur. Im Gebrüch beym Säufischen Kruge.

*usus Brachioidez Ma.
o Purpur, tuberculi
ulentia donatur, e
Ray Syn: 332.
n paschalis. L. 69.*

CDLX. *Muscus cupressiformis ramosus. Joh. Lœsel. Nestiger Cypressen-Moß. Cupressus quasi est, incanus, ramulosus, ramusculis intus cretulæ in modum candidis, queis indiscreta granulorum congeries assistit. Validissime siccata, attritu digitorum in pollinem cinereum actus, Beym Löbenichtschen Walde.

CDLXI. *Muscus membraneus pilosus Joh. Lœsel. Dünner haarichter Baum-Moß. Assulatim adhæret corticibus arborum, musci pulmonarii instar, foris totus hirsutus & incanus, subtus membraneus & albidus. Im Löbnichtschen Walde.

CDLXII.

Nº 46. p. 168.



Muscus ramosus erectus oblongifolius N° 47.



Muscus erectus foliis in orbem sparsis.



Lichen paschalii. L

Nº. 48. ad pag. 168.

Muscus cupressiformis ramosus.



Muscus membraneus pilosus. Nº. 49 -



CDLXII. Muscus erectus ramosus saturè viridis C. B. Pin. pag. 360. Selago tertia, Thal. pag. 116. ~~Mür-~~
semari Nostratibus. Thyrsulis est ad radicem arctim conjunctis, superius verò latius à se invicem disjunctis, in summo plerumque divaricatis, foliolis saturatè viridibus, quæ inter granula quædam asservantur. Iulos petiolis insistentes suis, quales muscus clavatus profert, edit nullos. Ruptis, sugillatis, & præcipitatis auxiliò est. Purgat fortiter, tineas necat, menses citat, & foetus expellit, hinc ægrè distrahitur in officinis. Equorum usitatissimum est medicamen. In der Fischhäuserischen Heyde.

CDLXIII. Muscus terrestris clavatus C. B. Pin. pag. 360. Muscus clavatus Lob. ic. pag. 242. o. Muscus terrestris Trag. Kyber. in Trag. pag. 555. Matth. Deutsch fol. 16. Muscus terrestris, sive Lycopodium Dod. Lateinisch fol. 472. Lycopodium Tab. lib. 2. fol. 487. Selaginis species altera, Thal. pag. 116. Chamæpeuce Cord. hist. fol. III. Musci genus, quod pro spicâ Celticâ vendebatur Cæl. lib. 16. cap. 21. pag. 602. Beer Lapp Kyber. in Trag. Matth. Ra-then Leiterlein. Tab. Gurtel-Kraut/ Seil-Kraut/ Haars-Shaar und Teuffels Klauen Dod. Löwen-Fuß / Neun- heil und Neungleich quibusdam.

Clavi hujus plantæ pulverem reddunt elegantissimum, Plaun Russis dictum, quem distrahit vesicæ bubulæ inclusum. Clavos Augusto mense maturatos copiosè colligunt, in furno siccatos, tundunt ac pulvisculum excutiunt, quem in vulneribus & ulceribus siccandis commendatissimum habent, ac intertrigine infantum etiam nihil albo præferunt. Adhæc Russi pulvisculo hoc ignes suos celebrant Chaldai-
cos,

cos, flammæ eo excitantes aspectu ludicras. Pixidulæ lamineæ, ulnæ dimidiatae longitudine ac Pyramidis formâ, Plaun istud ingerunt, orificio admotâ seu face seu candelâ, post pixidulum deorsum impetu quôdam trahendo commovent, ut pulvîsculus lychnum tangat, & in flammæ vertatur. Id ubi multoties iteratur, flammis subinde novis excitatis jucundum redditur adstantibus spectaculum. Sunt & qui tubulum Tabaci Plaun hōc complent admistō aliō pulvere, & inter scyphos convivis flammæ offerunt cum stri-dore insperatas. Mirum est, pulverem hunc non accendi igne, nisi insuffletur. Olearius in descript. Itineris Persici pag. 331. In locis umbrosis inter ericeta passim. Item in der Fischhäusern Heyde.

CDLXIV. *Muscus clavatus* foliis cupressi C. B. Pin.
 361. *Savina sylvestris* Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol.
 441. *Savina sylvestris* Tragi, Gesn. hort. fol. 278. *Sabina sylvestris* Lon. deutsch fol. 213. *Chamæcyparissus* Tab. Lib. 3. fol. 649. *Savina Tragi sylvestris* seu *silaginis* Plinianæ prima species, Thal. p. 115. *Wald-Cypres* Tab. *Wald-Sadenbaum* Sebitz. in Trag. Lon. *Gertlein / Gertel / Gertwurz / und Schoßwurz* quibusdani. *Wilder Saderbaum* Nostratisbus. Calefacit & siccatur. Contra oculorum vitia suffitu prodest. *Hinter der großen Glas / Hütte im Scapen / in ericetis.*

CDLXV. *Muscus Coralloides muralis* Joh. Lœsel.
Maur-Moss. Cinerei est coloris, ac muris adeò firmiter adhærescit, ut baculō decussus aliquid lateritiæ substantiæ radicis loco secum auferat. Non inutile credo in hæmorrhagiâ

rhagia, & forte Usneæ Cranii præferendum. In pago Mar-
genau an der Kirch.

CDLXVI. *Muscus Pyxioides terrestris* C. B. Pin.
pag. 361. Büchsenformiger Erd-Moß. *Muscus terrestris*
pyxidatos alabastriculOS imitatus. Lob. ic. pag. 267. o. In
der Fischhäusern Heyde, in Ericetis passim.

CDLXVII. *Muscus pyxioides saxatilis*, in Prodr. de-
scriptus C. B. pag. 152. Büchsenformiger Stein-Moß / Sa-
xis passim adnascitur.

CDLXVIII. *Muscus terrestris Coralloides erectus*
incanus, C. B. in Prodr. pag. 152. Gerader grauer Coral-
len-Moß/ bey dem Löbnichtschen Walde.

CDLXIX. *Muscus terrestris Coralloides erectus*,
cornibus rufescens C. B. in prodr. pag. 152. Ge-
rader Corallen-Moß/ mit röthlichen Hörnern. In locis ari-
dioribus inter ericeta nach dem Löbenichtschen Walde zu.

CDLXX. **Muscus arboreus pyxioides pilosus* Joh.
Loef. Härigter Büchsenformiger Baum-Moß. Incanus est to-
tus, ramusculis instructus plurimis, pilosis, ac velut in cor-
nua disiectis, qui vel ad latera, vel in fastigio passim tubulos
gestant, sed depiles, quales in pyxioide terrestri. In Qver-
cubus bey Selnicken und im Löbnichtschen Walde. *L1 Muscus arbo-*
tulus cavis. C.B.

CDLXXI. *Muscus capillaceus cinerei coloris* è ra-
mis ilicis dependens, Clus. Hist. In Indice apud Clus. non
est. *Muscus capillaceus longissimus* C. B. Pin. pag. 361.
sehr langer Aschfarber Baum-Moß. In sylvis passim, item
in der Fischhäusern Heyde. *Muscus alter M*
ro Passifull Moß. C
335. ubi ebam
Loeseliana prae
Lichen ilicis .

CDLXXII. *Muscus arboreus*, Trag. Kyber. in Trag.
pag. 946. Matth. Bauh. in Matth. fol. 65. Thal. pag. 77.
Dod. Lateinisch fol. 471. *Muscus arboreus*. *Usnea officina-*

rum C. B. Pin. pag. 361. Muscus Cord. in Diosc. fol. 7. Muscus arborum Tab. Lib. 2. fol. 482. Lon. deutsch fol. 87. Muscus quernus Lob. ic. p. 242. Baum-Moß. Tab. Moos oder Baum-Moos Lon. Eichen Moß quibusdam. Pinus & abietinus, isque candidus melior censemur quernō. In sylvis passim obvius.

CDLXXIII. Muscus pulmonarius, sive pulmonaria Officinarum Lob. ic. pag. 248. o. Pulmonaria, Trag. Kyber. in Trag. pag. 524. Tab. Lib. 2. fol. 259. Fuchs. fol. 637. Dod. Lateinisch fol. 474. Lon. deutsch fol. 247. Pulmonaria tertia, Clus. Pann. pag. 675. Pulmonaria secunda, Bauh. in Matth. fol. 733. Pulmonaria vulgaris Thal. pag. 89. Pulmonaria Lichenis quoddam genus, Cæl. Lib. 16. c. 20. pag. 602. Lungen-Kraut. Tab. Matth. Lon. Fuchs. Eichen-Lung Rusticis. Passim in sylvis.

Lichen terrestris cinereus

Syn: 73.

CDLXXIV. Muscus pulmonarius corpusculis fuscis papillatus. Lungen-Moß mit dunkeln Warzeln. Im Löbenichtschen Walde.

CDLXXV. *Muscus marinus λιθοπάγων dictus Joh. Lœs. Meer-Moß oder Steinbart. Ex numerosissimis villis, modò latiusculis, modò tenuissimis barbæ instar à lapide pendentibus, eidemque firmissimè annatis, constituitur, qui siccati crispuli sunt filamentis contractis. Color jam subviridis est, jam purpureus, jam albicans. Barbatii lapides in littore maris freqventes. Bey German an der See.

CDLXXVI. Muscus marinus capillaceus, Joh. Lœs. Langer See-Moß. In littore maris.

CDLXXVII. *Muscus aquaticus Ceratoides, Joh. Lœs. Gehörnter Wasser-Moß. Septem octo-uncia-

Nº. 55. ad pag. 172
Muscus marinus λιθοπάχυν
dictus.



in fortis h. amicu*m* i*l*
m*l*



Muscus aquaticus N^o. 52, p. 572
Ceratoides.




Muscus aquatica denticulatis N. 53, pag. 173.



Fontinalis antipyretica. L.

N^o. 54. ad p. 173.

*Muscus aquaticus bombycinus
retiformis.*




Conferva reticulata L.

z m i n i s t r o
z u m i n i s t r o z u m i n i s t r o
z u m i n i s t r o z u m i n i s t r o

Nº. 55. pag. 173.

Muscus aquaticus bombycinus
tenuissimis filamentis.



Conjerva bullosa. L.

ciarum s̄ep̄e est, s̄ep̄ius minor, totus ex atrō virens, non-nunquam & incanus, thyrsis rotundis, spongiosis, ramulosis, in extremitate trifidis, quadrifidis, cornua quasi quædam effigie exprimentibus. Lignis putridis adnascitur sub aquis, & putidulus seu graveolens existit, vel diutulè servatus vel etiam siccatus. Im Mühlen-Fluß zu Schwanis. Item zu Kahlhoff im Teich bey der Rupffer-Mühlen.

CDLXXVIII. *Muscus aquaticus denticulatus, Joh. Lœsel. Zähnigter Wässer-Moß. Ramosus est, sub aquis fluitans, saxis nonnunquam & lignis firmiter annatus, foliis exiguis, numerosis, subviridibus, ex oblongo in acumen ab-euntibus, quæ trinâ constitutâ serie cauliculos ita ambiunt, ut quasi trisulci appareant. Im Fluß Zahm bey Glaubitten. Item Zu Bladau im kleinen Bächichen nach Neuhäusen zu.

CDLXXIX. *Muscus aquaticus bombycinus retiformis Joh. Lœsel. Subtiler Ness-formiger Wässer-Moß. In fossis nach dem Bretter-Krige zu. est *Conferva reticulata* Ray Hist: append: 18

CDLXXX. *Muscus aquaticus bombycinus tenuissimis filamentis Joh. Lœsel. Wässer-Moß von ganz zarten Fädemchen. In fossis nach dem Bretter-Krige.

CDLXXXI. Muscus aquaticus tenuissimis foliis, cauliculis adhærentibus Joh. Lœsel. Wässer-Moß mit ganz kleinen subtilen Blätterchen. Bey Robitten in paludibus. Muscus hic in locis uidis natus & exsiccatus tectis inservit, suppositus lateribus Bieber-Schwänz vocatis, Soll befere und dichtere Dächer geben / als wenn die Ziegel mit dem besten Kalck verschmieret würden.

CDLXXXII. Muscus aquaticus subterraneus Johan. Lœsel. Langer Wässer-Moß/ so tieff unter der Erden gestan-

hen. In prædiō Wandlacken anno 1648. puteum dum, fodiunt, vena offenditur ampla, exsaltim ludentem copiosè exspuens aquam. Cujus profunditatem contô ligneô, orgyias duæ longô ubi explorare desudant, contus abyssô delusus, non solum impete vastô ab aquâ derepentè redditur, sed & unâ muscus quidam incognitus, cubitô longior egeritur, quem putearii & infruniti adstantium animi negligenter habuere, terrâ eum statim obruentes.

CDLXXXIII. Myagrum siliquâ longâ. C. B. Pin. pag. 109. Lein-Dotter mit langen Schoten. Camelina, Myagrum alterum Thlaspi effigie Lob. ic. pag. 225. Myagrum secundum Lobelii Tab. Lib. 2. fol. 538. der ander Leindotter Tab. Cauliculis est rotundis, striatis, asperis, saepius virentibus, quandoque rufescentibus, quorum fastigiis quadrangulæ siliquæ nanis flosculis luteis succedentes, ac pedicellis suis fultæ insistunt. Folia oblonga & exiliter sinuata, aspera sunt. Radix contorta ac filamentis instructa albitat. Passim bey Königsberg.

CDLXXXIV. Myagrum sativum C. B. Pin. pag. 109. Myagrum primum Tab. Lib. 2. f. 358. Pseudomyagrum Bauh. Matth. fol. 815. Linaria quinta Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 283. Myagrum adv. Lob. f. 115. Sesamum Lon. deutsch f. 189. Camelina sive Myagrion Dod. Lateinisch f. 532. Camelina Dodonæi seu Myagron Thal. p. 28. Dorella, Cæf. Lib. 8. cap. 79. pag. 367. Leindotter oder Flachs-Dotter Lon. Flachs-Kraut quibusdam. Lino passim se admiscet. Utrum hoc Sesamum in Linum degeneret, notandum.


agro simili sili-
tunda, C.B. Pin
CDLXXXV. *Myagrum monospermon hirsutum
siliquis rotundis. Joh. Lœs. Myagri duæ species. Cam.
in

No. 56 pag 174.



Myagrum monospermon hirsutum
siliqvis rotundis.

Myagrum paniculatum L.



in Matth. deutsch f. 454. Rauger Leindotter mit runden Schöttlein. Bicubitali quandoque est caule, viridi, proximè radicem digitum minimum crasso, concavô, hirsutô, striato ac ramosô. Foliis Thlaspi hirsutie asperis, acuminate, in exortu lobis duobus caulem amplexantibus: foliis in ramorum fastigiis nanis, luteis foliolis quatuor instructis, quos deciduos excipiunt plusculæ capsæ virescentes, duriusculæ, ex lato rotundatae: petiolis longis innitentes, filamento in apice exili, quæ diffractæ in singulis theculis unicum asservant semen. Radix ei albicans lignosa, paucis fibris. Floret mense Julio, imò & Octobri illud floruisse memini. Hinter dem Kneiphöfischen Wall im Stadt-Grabem.

CDLXXXVI. Myrrhis sylvestris seminibus lævibus C. B. Pin. pag. 160. Cicutaria Gesn. Hort. f. 253. Lon. deutsch f. 266. Myrrhis Fuchs. f. 525. Myrrhis sylvestris Cam. Hort. pag. 104. Busch-Mören mit glatten Saamen. Busch-Mören oder Kälber-Korn Lon. Wilde Körfel Fuchs. Kälberkopff Nostratibus. Radix menses & secundas ejicit, pulmonum ulcera abstergit ac solidat. Bey Königsberg copiosè.

CDLXXXVII. Myrrhis sylvestris seminibus asperis C. B. Wilder Körfel mit scharffen Saamen. Myrrhis sylvestris nova Æquicolorum. Colum: min. cogn. stirp. & rar. pag. 113. part. I. Büsch-Möhren mit raugen Saamen. Passim am Königsbergischen Wall.

CDLXXXVIII. Myrrhis sylvestris inodora Joh. Lœs. Wilder Körbel/ so keinen Geruch hat. Im Gepusch bey Bladau.

CDLXXXIX. Nasturtium aquaticum Dod. Lateinisch
Y 3 f. 592.

f. 592. Lon. deutsch f. 144. Nasturtium aquaticum & secundum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 82. Nasturtium aquaticum supinum C. B. Pin. pag. 104. Sion Cratevæ Erucæfolium Lob. ic. pag. 209. Sisymbrium aquaticum Bauhin. in Matth. f. 379. Cæs. Lib. 8. cap. 68. pag. 362. Sisymbrium aquaticum primum Tab. Lib. 2. f. 167. Sisymbrium Cardamine, Fuchs. fol. 723. Sisymbrium alterum Cord. in Diosc. f. 45. Sisymbrium alterum Dioscoridis. Gesn. hort. fol. 281. die Iste Brunn-Kreß. Tab. Kyb. in Trag. Fuchs. Brunn-Kreß oder Wasser-Kreß Lon. Ad marginem des Penartischen und Löbenichtschen Waldes in fossis, item hinter Selnicken am Land-Grabent zwischen Lenzen und Dörkeiten. Folia nonnihil quandoque laciniata sunt. Folia colligenda Sole in 8 versante, flores in 1. ♂.

CDXC. Nasturtium pratense vel tertium. Trag. Kyber. in Trag. pag. 83. Nasturtium pratense magnō flore C. B. Pin. pag. 104. Nasturtium aquaticum simpliciflore Eystett. Sisymbrium aquaticum secundum Tab. Lib. 2. f. 168. Iberis Fuchs. ic. pag. 185. Cardamine altera simplici flore, Clus. hist. Lib. 5. f. 128. Cardamine altera sive Sisymbrium Cardamine secundum Lob. ic. pag. 210. Nasturtium agreste Fuchs. fol. 325. Lon. deutsch f. 195. Sisymbrio aquatio non absimilis. Cæs. Lib. 8. cap. 68. pag. 362. Gauch-Blum Brunf. deutsch f. 131. flosculi Dod. Lateinisch f. 592. Iberis sive Dardamantice Nasturtii foliō, Thal. pag. 60. Lepidium minus Cord. in Diosc. f. 48. Gauch-Blum Lon. Fuchs. Die andere Brunn-Kreß. Tab. Wiesen-Kreß mit großer Blüth. In riguis passim bey Königsberg.

CDXCI. Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum C. B. pin. pag. 105. Wilde Kreß oder Sophien-Kraut mit ganz

ganz kleinen zertheiletent Blättern. Sophia Chirurgorum Lob. ic. pag. 738. Sophia Dod. Lateinisch f. 133. Nasturtium sylvestre Gesn. hort. f. 268. Thalictrum, Herba Sophia latitolia, Tab. ic. pag. 6. Seriphium Germanicum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 338. Seriphium absynthium Fuchs. fol. 2. Seriphium Lon. deutsch f. 184. Thalictrum Dodonæi, seu Sophiæ, & Nasturtium μυριόφυλλον Thal. p. 121. Accipitrina Cæs. Lib. 8. cap. 66. pag. 361. Wellsamen Lon. Kyber. in Trag. Sophien-Kraut-Männlein Tab. Semen ejus officinis est semen sangvinariæ. In incultis bey Königsberg passim.

CDXCII. Nummularia major lutea C. B. Pin. pag. 309. Nummularia Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 637. Matth. Bauh. in Matth. fol. 716. Dod. Lateinisch fol. 600. Eystett. Cam. hort pag. 107. Numularia Lon. deutsch fol. 239. Cæs. Lib. 6. cap. 56. pag. 261. Centummorbia, Fuchs. f. 401. Nummularia sive Centmorbia, Lob. Adv. ic. p. 474. Numularia Tab. Lib. 2. fol. 547. Egel-Kraut Fuchs. Groß und klein Egel-Kraut Tab. Egel-Kraut/Pfennig Kraut/ und klein Matter-Zung Lon. Schlangen-Kraut quibusdam. Wasser-Pollen vetulis. In locis humidis circa fluentia passim.

CDXCIII. Nymphæa lutea major C. B. Pin. p. 139. Große gelbe See-Kannen. Clus. Hist. Lib. 4. f. 77. Nymphæa lutea Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 552. Dod. Lateinisch fol. 585. Lon. deutsch fol. 213. Matth. deutsch fol. 372. Lob. ic. pag. 594. Tab. Lib. 2. f. 413. Fuchs. fol. 536. Eystett. Nenuphar luteum, Brunf. Lateinisch tom. I. fol. 38. Nymphæa citrina. Cord. Hist. fol. 99. Nymphæa altera Cord. in Diosc. f. 59. Nymphæa altera flore ex toto luteo
Cæs.

Cæs. lib. 15. cap. 7. pag. 568. Geele See-Blum Tab. Seb. in Trag. Fuchs. Matth. Geele See-Bluhmen / Kellerwurz / Keulwurz / Wasser Mohr / Haarwurz und Herculis-Wurz. Lon. Haarstrang und Wasser-Lilien quibusdam. Geele Mummeln Nostratibus, item geele See-Kannen. In aquis stagnantibus passim. Folia Nymphæa infensas sibi habent erucas, hinc raro folium invenitur non erosum aliquâ sui parte. Erucæ illæ albicant, & inter duo foliorum frustula, quæ erodendô abstulerunt, nave quasi constructâ, delitescentes super aquis vehuntur.

CDXIV. Nymphæa lutea minor parvô flore C. B. Pin. pag. 194. An Nymphæa parva alia Cam. in Matth. fol. 306. Nymphæa lutea minor Septentrionalium. Lob. ic. pag. 595. Kleine gelbe Seekannen in fossis nach dem Bretter-Krug zu.

CDXCV. Nymphæa alba major. C. B. Pin. p. 193. Nymphæa alba Matth. deutsch fol. 372. Dod. Lateinisch f. 585. Tab. lib. 2. fol. 412. Cord. hist. fol. 59. Thal. fol. 80. Lob. ic. pag. 595. Lon. deutsch fol. 212. Nymphæa candida Trag. Seb. in Trag. deutsch fol. 552. Fuchs. fol. 535. Nymphæa alba, Lotus Ægyptia Alpini. Clus. hist. lib. 4. fol. 77. Nymphæa major alba, Eystett. Nenuphar album, Brunf. tom. 1. fol. 38. Weisse See-Bluhm Matth. Lon. Tab. Fuchs. Weisse See-Kannen/ und weisse Mummeln Nostratibus. Refrigerant flores & humectant. Radix vino nigrô dococata potu. immoderatum mensium fluxum efficaci ac certo remedio sistit. Porcis ægrotantibus offertur à Nostratibus. In fossis & piscinis passim.

CDXCVI. Nymphæa alba minima. C. B. Pin. pag. 193. Morsus ranæ Dod. Lateinisch fol. 583. Lob. ic. pag. 596. Nym-

Nymphaea alba minor, Tab. Lib. 2. fol. 412. Kleine weisse See-Blum Tab. Frosch-Biß. In fossis nach dem Bretter-Kruse zu.

CDXCVII. *Ocimum vulgatius* C. B. Pin. pag. 226. *Ocimum sive Basilicum medium vulgatius* Lob. ic. pag. 503. *Ocimum medium vulgatius* Adv. Lob. fol. 215. *Ocimum medium* Matth. deutsch f. 197. Eystett. Cam. in Matth. f. 164. *Ocimum magnum*, Tab. ic. pag. 343. *Basilica minor* & *Baccharis Germanica*. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 23. *Ocimum mediocre*, Fuchs. fol. 548, *Ocimum tertium* & *medium* Cæf. Lib. II. cap. 59. pag. 469. Mittel-Basilien Matth. Fuchs. Klein Basilgen Sebitz. in Trag. Groß Basilien Thab. Hinter dem Wall bey der Haberbergischen Kirche. Item bey Lauten-Mühl inter segetes.

CDXCVIII. *Onobrychis floribus viciæ dilutè cæruleis* C. B. Pin. pag. 351. *Onobrychis secunda*, Clus. hist. lib. 6. fol. 239. Clus. Pann. pag. 753. *Onobrychis Clusii secunda*, Tab. Lib. 2. fol. 214. Hanen-Kopff mit licht-blauen Wicken-Blühlein. Ad littus maris bey S. Albrecht. Item zwischen dem Sand- und Dümpele-Kruse. In arenosis.

CDCXIX. *Ophioglosson*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 447. Trag. Kyber. in Trag. pag. 323. Dod. Lateinisch fol. 139. Thal. pag. 81. Cam. hort. pag. 110. Eystett. *Ophioglossum Lon.* deutsch f. 132. Tab. Lib. 2. f. 519. Fuchs fol. 577. *Lancea Christi* & *Ophioglossum Gesn.* hort. fol. 263. & 269. *Ophioglossum vulgatum* C. B. Pin. f. 354. *Lingua serpentina*, Cæf. Lib. 16. cap. 17. pag. 600. *Ophioglosson*, sive *Enophyllum*. Lob. ic. pag. 808. *Lingula vulneraria* Cord. Hist. fol. 153. Mutter-Zinglein Kyber. in Trag. Tab.

Tab. Lon. Fuchs. In Dollsteimischen Ros-Garten in muscosis, mense Junio. Variat lingulâ, quæ communiter simplex, quandoque duplex vel triplex. Mansu subdulcis est herba & glutinosa nonnihil. Radix cum amarore subacris, exsiccat cum exiguo calore, tumores discutit, recentia & ligna vulnera glutinat, Phtisicos, hæmoptoicos ac herniosos egregiè juvat, pota vel admota. Chirurgi plantam oleo macerant, quò diutiùs insolato post felicissimè utuntur. Ab apibus læsum succus illitu curat. In loca hortorum umbrosa translata durat.

D. Ophrys bifolia C. B. Pin. pag. 87. Ophrys Bauh. in Matth. f. 846. Fuchs. f. 566. Tab. Lib. 2. f. 396. Cæs. lib. 10. cap. 48. pag. 430. Bifolium Adv. Lob. ic. pag. 302. Cam. hort. pag. 28. Lon. Deutsch f. 269. Alisma Gesn. hort. fol. 245. Bifolium & Satyrium decimum. Trag. Kyber. in Trag. p. 784. Pseuderorchis. Bifolium Dod. Lateinisch fol. 242. Perfoliata mascula Brunf. Lateinisch Tom. I. fol. 182. Zwey-Blatt Tab. Matth. Fuchs. Lon. Durchwachs-Männlein Brunf. In uliginosis ac tenebrosis beym Kranz-Krug. Item beym Penartischen Walde.

DI. *Ophrys ~~μονόφυλλη~~ bulbosa. Joh. Lœs. Ein-blatt mit zweiblechter Wurzel. Radix bulbosa & fibrosa, cui ~~πρόσθια~~ interdum bulbulus alias caulinum simpli-cem & rotundum exire patitur, spithamæ longitudine, sèpè & productiorem, folium latum & oblongum præstò haben-tem, cacumen versus numerosis instructum capsis, tenui pe-diculò fultis, quibus flosculi paulò antè insederant. Bey Rositten im Gebrüch.

DII. *Ophrys ~~du~~^{di} ~~φύλλη~~ bulbosa, Joh. Lœs. Bifolium bulbosum Dod. Lateinisch f. 242. Ophrys bifolia bulbosa C. B.

sequens foliorum
balteum d. Horant.
Chamaeorchis
a C. B. Pin: 84.
enophyllas. L.

Lœselii. L. 8.

Nº. 57. pag. 180.



Ophrys Monophyllum bulbosa.

Ophrys Monophyllum. L.

081.119.52.01



1658 pag. 180.

Ophrys digyna bulbosa.



Ophrys Loeselii. L.

C. B. Pin. pag. 87. Zwey-Blatt mit zwieblechter Wurzel. Radix bulbosa uvam veluti quandam adstitem habet uvæ crispæ ferè assimilem, stipulam exilem sursùm efferentem. Exilio est priore, utraque ophris defloruerat, ubi eas accepseram. Ad rupta & vulnera glutinanda efficax. Hinter Fischhausen auff der Wiesen nach Lochstat zu.

DIII. *Orchis alba bifolia minor calcare oblongo*
 C. B. Pin. pag. 83. testiculus vulpinus primus, cujus flores culices exprimunt Lob. ic. pag. 178. Testiculus vulpinus latifolius Tab. lib. 2. fol. 349. *Orchis bifolius Cam. hort.* pag. III. *Orchis flore albō minor Eystett.* Testiculus bifolius Cord. Hist. fol. 150. *Orchis Serapias primus Dod.* Lateinisch fol. 237. *Fuchs-Höddlein oder Fliegen-Bluhmen Tab. Standhart vetulis.* In locis herbosis beym Penartschen Walde.

DIV. *Orchis palmata palustris tertia C. B. Pin. pag.* 86. *Palma Christi palustris secunda, Tab. lib. 2. fol. 357.* *Cynosorchis palustris lævi folio & angusto, seu Leptophylla omnium vilissima C. Gemmæ Lob. ic. pag. 193.* *Wasser-handleins-Wurz Tab.* mit glatten schmalen Blättern. In riguis bey dem Penartischen Walde.

DV. *Orchis palmata pratensis maculata C. B. Pin.* pag. 85. *Palma Christi maculata Tab. ic. Eystett.* *Satyrion foemina foliis maculatis Thal.* pag. 113. *Orchis foemina altera Trag. Sebitz.* in *Trag. deutsch* fol. 616. *Palma Christi. Serapias foemina pratensis Lob. ic. pag. 188.* *Satyrion foemina. Swert. florileg. part. I. fol. 63.* *Satyrion Basilicon Græcorum, officinarum Christi palma Rueil. fol. 564.* *Orchis Serapias Lobelii Cam. hort.* pag. III. *Satyrion Basilicon foemina Lon. deutsch* fol. 234. *Dod. Lateinisch* fol. 240.

Palma Christi, Cord. hist. fol. 130. Cæl. lib. 10. cap. 47.
pag. 430. Håndlein-Wurz/ Creuz/ Bluhm Tab. Creuz,
Blum/ Weidlein Kyber. in Trag. Lon. Gesprengte Hånd-
leins-Wurzel Nonnullis. In riguis beym Penartschen
Walde copiose.

vireum viride.
L. 2.

DVI. *Orchis palmata flore galericulatō dilute vi-
ridi. Joh. Lœs. Håndlein-Wurz mit gehelinter lichtgrü-
ner Blüth. Coliculum effert novem unciarum in longitu-
dine, striatum, pallidè virentem ac lævem, cui folia assistunt
plantaginis nervosæ facie, quorum ima terræ appronata
majora ac rotundiora, cætera thyrso in progressu servientia,
minora & acutiora. Flosculis in fastigio est galericulatis,
labro prominulo, scrophulariæ aquaticaæ quoquo modo æ-
mulis, infimâ parte rubentibus, supernâ pallidè virentibus,
ac foliolis suffultis. Radix variat, quæ modò palmata est,
modò egregiè digitata. Convenit ferè cum Orchide pal-
mata, flore viridi, C. B. in prodr. pag. 30. descriptâ. Floret
mense Juniô. Im Grünhöfischen im Dollkeimischen
Röß-Garten.

DVII. Orchis palmata palmis inversis flore albō,
Joh. Lœs. umbgefehrte Håndlein-Wurz mit weißer Blüthe.
Caulis hujus orchidis undecim uncias longus est genicula-
tus, foris candidus ac splendens, concavus intus, cujus geni-
culis foliorum loco valva quædam apponitur, ad fuscum
nonnihil devergens colorem. Fastigio thyrsi mense Julio
flosculi insident galericulati, candidi, effigie muscas ferè refe-
rentes, quibus quinque alia subflava ac semiunciam longa as-
sistunt folia. Tota florum compages petiolō nititur exili,
cui ad geniculum caulis unicum substernitur foliolum ob-
longum & acuminatum. Radix fusca est ac palmata, ex
fru-

frustulis quatuor constituta, quæ in summo bifida, trifida ac quadrifida, palmas erectas ferè facie præsentantia. *Hinter Kraffken im Walde.* Mense Julio.

DVIII. *Orchis muscam* referens major. C. B. Pin. pag. 83. *Testiculus muscarius* quartus Tab. Lib. 2. f. 346. *Orchis Myodes altera*, foliō læviore & flore grandiusculō Lob. ic. pag. 182. *Braunrothe glatte Fliegen-Ständel-Wurz* mit großer Blüth; *Die vierde Stendel-Wurz* Tab. *Beym Kranz-Krige und Quednau.* Radicibus utuntur officinæ in conficiendo electuario.

DIX. **Orchis muscæ* corpus referens maculosa. Joh. Lœs. *Fleckicht Fliegen-Stendel-Wurz.* Radix geminō bulbō, quorum alter turgidus & albus, nucis moschatæ magnitudine, cauli modò affirmatur tenellis duobus filamentis, & capsulâ quasi quâdam, in summo bulbi enatâ, exortis; modò absque medio thyrso neestitur: alter flaccidus totus, rugosus & succo inanitus, thyrso tenaciter jungitur, villis longiusculis dependentibus instructus. Caulis erat viridis, semicubitum proceritate superans, rotundus, cavus, striatus, fastigium versus contortus, cui flores initiō purpurascentes, temporis lapsu albescentes, è volvis oblongis, viridibus & contortis, cauli indiscriminatim & copiosè adsistentibus, queis singulis foliolum subservit viride, exeunt. Labellum florū inferius in quatuor elegantissimè divisum est partes, pronâ facie albicans, maculisque purpureis insignitum, aversâ candidum, lobum exilem purpurascētē, sæpiùs album, & nonnihil inflexum imâ parte alens. Superiùs flos seu galea qvina alit folia, quorum tria suprema majora, duo sub se alia minora abscondunt, convexâ parte purpurei, simâ pallidi coloris, in meditullio corpusculum sublateum

*1st Cynosorchis
pratensis humiliata
81. Orchis Cannabina
Clus. Hist.*

sæpe pallidum, muscæ capitulum referens, concludentia. Cæterū grandiora proximè terram folia nervosa sunt, ex quibus unum vel alterum in medio caulis constituta eundem fotu suo velut in vaginâ conclusum servant ac tenuuntur. Grandior radicis bulbus viscidus succi, gustu subdulcis est initiō, mox acredine quantillâ lingvam vellicat, adstrictionem qualem qualem post se relinquens. Floret mense Majo, & Junio incipiente. *Bey Lauten-Mühl.*


*Orchis bifolia, flo
lide virentibus,
mentzel: pagill.
monorchis.
II.*

DX. **Orchis coleô unicô, seu Monorchis flosculis pallide viridibus Joh. Lœl. Einhödlein Wurz mit lichtgrüner Blüth.* Plantula est septem unciarum & pauciorum sæpe altitudine, thyrsulô exili striatô, foliis propè terram binis, coliculum aplexantibus, queis in processu thyrsi foliolum succedit acuminatum: flosculis in summitate est pallide virentibus, thecularum effigie, in ambitu foliosis. Radix coleô unicô ac transparente ferè, filamentis quibusdam crassiusculis superbit. Floret mense Junio. *Im Grünhoffischen und Dollkeimischen Ros-Garten.*

DXI. *Orchis abortiva fusca C. B. Pin. pag. 86. dund-
le missgebürtige Knaben-Wurz.* Nidus avis ex speciebus Satyrii abortivi. *Orchis abortiva Lob. ic. 194. Eystett.* *Satyrium abortivum species Hypocysti Lob. ic. pag. 271. o.* *Satyrium novum Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 620.* *An Orobanche prima Tab. Lib. 2. fol. 358. Orchis sylvestris Lon. deutsch fol. 233.* *Orchis abortiva Lobelii. Clus. hist. lib. 2. fol. 270.* *Neottia Dod. Lateinisch fol. 553 das neunde Margendrehen.* *Sebitz, in Trag. Wild Knabenwurz Lon.* *Im Buch-Walde zwischen Schwanis und Persch-
ke, in umbrosis.*

DXII. *Origanum vulgare Trag. Sebitz, in Trag.*
deutsch


No 63. pag 184.



*Orchis Coleo unico, Seu
Monorchis flosculis pallide
Viridibus.*

Ophrys Monorchis - L.

481. 869. v. 2A



Deutsch fol. 29. Matth. deutsch fol. 284. Lon. deutsch fol. 148. Eystett. Oryganum Sylvestre. Cunila bubula Plini C. B. Pin. pag. 223. Agrioriganum sive Onitis major Lob. ic. pag. 492. Origanum sylvestre Dod. Lateinisch fol. 285. Cord. in Diosc. f. 52. Cam. hort. pag. 112. Origanum sylvestre seu vulgare Fuchs. f. 552. Tab. ic. pag. 346. Origanum Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 159. Origanum Italicum, Cæs. Lib. 11. cap. 52. pag. 463. Gemein Dosten oder Wollgemuth Tab. Wollgemuth Brunf. Fuchs. Berg-Münz und brauner Feld-Dost quibusdam. Calefacit & siccatur tertio excessu, incidit, extenuat, Gal. 6. simpl. Folio ex umbellâ infarctus omnes expedit tussientes, spleneticos & ictericos juvat, mensisque dicit: Oedemata, aliosque laxos tumores fotu illituque discutit. Prurigines, scabies balneo expurgat. Cerevisia additum eam ab acore præservat. Inter coryleta bey Bladau. Sub Elevatione Poli 45. 46. 47. 48. 49. Flores colligendi Sole 15. & occupante: Semen, Sole 8. ☐ obidente.

Origanum olim columbis vulneraria erat planta. Antigonus Carystius, hist. mirab. c. 42. ή Φάτη δε ὅταν πληγὴ τὴν ὄργιονον ἔσταξεν εἰς τὸ ἐλκΘ, καὶ γίνεται τότον τὸ τρόπον υγίης. Palumbes percussa origanum vulneri indit, hocque modo sanatur. Ubi notandum Antigonum fœminino genere origanum ponere. Eodem genere protulit sive Cantharus sive Plato: *Ex Arcadiâ bic Origanum attulit acerri-mam.* Sunt, qui masculino genere Origanum dixerunt. Alexandrides: *Aſparagum condidit ac lentiscum, & origanum, qui admixtus Coriandro, ſalfamentis gratiam addit & ornamentum.* Ion. *Eius manu abditus est statim origanus.* Neutro & Epi-charmus & Ameiprias Origanum efferunt genere.

DXIII. Origanum sylvestre album C. B. Pin. pag. 223. Origanum album. Tab. lib. 2. fol. 58. Origanum sylvestre flore albō Cam. hort. pag. 112. *Weißer Feld-Dost.* Vul-gari respondet demptō flore. Passim.

DXIV. Ornithogalum luteum C. B. Pin. pag. 71. Cord. in Diosc. fol. 46. Lob. ic. pag. 165. Tab. Lib. 2. f. 321. Sweert. Florileg. part. I. fol. 57. Bulbus agrestis Trag. Kyber. in Trag. pag. 737. Bulbus sylvestris Tragi, Cam. hort. pag. 31. Bulbus esculentus Lon. deutsch, fol. 226. Bulbus sylvestris alias bifolius. Gesn. Hort. fol. 251. Sifyrinchion, Cord. hist. fol. 122. *Acker-Zwiebel/Feld-Zwiebel und Wild-Zwiebel.* Kyber. in Trag. *Geele Feld-Zwiebel* Tab. *Feld-* oder *Acker-Zwiebel.* Lon. *Klein Erd-Nuß,* Cord. in Diosc. *Ziegen-Lauch Nostratibus.* Mense Aprili cōpiosē inter dumeta in der Hollen-Grund.

DXV. Orobanche major, garyophillum olens C. B. Pin. pag. 87. Hypogenista, Rapum genistæ à similitudine Lob. ic. pag. 268. o. Orobanche, Matth. deutsch fol. 198. Cord. in Diosc. fol. 46. Lon. deutsch fol. 276. Eystett. Cæl. pag. 342. Thal. pag. 80. Orobanche vera Gesn. hort. fol. 270. Leonina herba & Legumen Leoninum Ruell. fol. 390. & fol. 326. circa finem. Orobanche prima Clus. hist. lib. 2. pag. 270. Orobanche secunda Tab. lib. 2. f. 358. Limodoron sive Orobanche Dod. Lateinisch f. 552. Sommer-Wurz / Lon. Tab. *Wollriechende Sommer-Wurz/Erwennwürger* Matth. Orobanche hæc semper alterius plantæ radici adnascitur, eidemque alimoniam subtrahit, unde & Limodoron Theophrasto nominatur. *Hinter Lopānen in incultis nach der See zu.*

DXVI.

D XVI. Orobanche *μονόχλωρ* flosculis pediculis insidentibus, radice acuminata J. L. **Spizwurzige Sommer-Wurz**/desen Blüth auff kleinen Stangen. An Orobanche hypopytis C. B. qua 3. in Prodr: p. 31. quæ sub piceis abietibus & pinastris provenit. In der Fischhäuserchen Heyde passim.

D XVII. Orobanche radice dentata major. C. B. Pin. p. 88. Dentaria major Bauh. in Matth. f. 685. Dentaria major Matth. Lob. ic. pag. 270. o. Cam. hort. pag. 54. Eystett. Dentaria Matthioli Tab. Lib. 2. fol. 88. Anblatum Cord. hist. fol. 89. Dod. Lateinisch fol. 553. Anblatum Cordi seu dentaria major Thal. pag. 7. Dentaria major, seu *αφυλλ* I. Clus. hist. lib. 5. fol. 120. Squamatia Lon. deutsch fol. 303. Große Schuppen-Wurz Tab. Anblatt/ Freysam Kraut/ Blumen-Kraut/ S. Georgen-Wurz und Klein-Kahl-Zahn-Kraut vulgò. Sau-Brot Rusticis. Bey Neuhausen am Thier-Garten / ubi effossa radix odorem spargit Iridis florentinæ. Item bey Trunz copiosè. Floret mense Aprili in der Hollen-Grund.

D XVIII. Orobus sylvaticus purpureus vernus C. B. Pin. pag. 351. Braurothe frühzeitige Wald-Küchern. Orobos Pannonicus primus Clus. hist. lib. 6. fol. 230. Clus. pann. pag. 736. Orobos Sylvestris vernus Thal. Orobos pannonicus Eystett. Arachus latifolius alter Dod. Niederrändisch fol. 868. Orobos sylvaticus vernus Cam. Hercyn. Stirp. ic. 6. Thal. pag. 80. Astragalus, Colum. in Phytobas. pag. 60. In der Sarckau. Item bey Bladau im Ros-Garten.

D XIX. Orobos sylvaticus viciæ foliis C. B. Pin. pag. 382. Würffel-saamigte Wald-Küchern mit Wicken-Blättern. Orobos Pannonicus secundus, Clus. hist. Lib. fol. 230. Astragaloides Dod. Lateinisch fol. 551. Astragoloides altera herbariorum Lob. ic. pag. 78. o. Würffel-Saamen

quibusdam. Bey Lauten-Mühl am Teich. Planta recens inspicienda est & conferenda cum illâ, quæ provenit in der Hollen Grund. Conf. Clus. Pann. sub tit. Orobos Pann. purpur. 2. pag. 737.

DXX. Ostrya ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis C. B. Pin. pag. 427 Ornus Trag. Kyber. in Trag. fol. 1109. Lon. deutsch fol. 49. Betulus Lob. ic. pag. 190. Carpinus Bauh. in Matth. fol. 135. Tab. Lib. 3. fol. 682. Dod. Lateinisch fol. 841. Lob. Observ. fol. 607. ♂ Theophrasti Clus. hist. lib. 1. fol. 55. Ostrya Cordi, ornus Tragi. Thal. pag. 83. Fagus sepium, Gesn. hort. fol. 258. Haubüchen oder Hagen-Büchent Kyber. in Trag. Haubüchen oder Buchäschern Lon. Spindel-Baum Tab. Hayn/Buch Nostratibus: Totæ sylvæ passim.

DXXI. Papaver erraticum majus: *pōias* Dioscoridi Theophr. Plinio C. B. Pin. 171. Papaver erraticum, Bauh. in Matth. fol. 745. Dod. Lateinisch fol. 447. Tab. Lib. 2. fol. 276. Cord. in Diosc. fol. 66. Gesn. hort. fol. 170. Cæs. lib. 15. Cap. 10. pag. 571. Lon. deutsch fol. 112. Papaver erraticum rubrum Eystett. Papaver Rhœas, sive caducō flore puniceō papaver, Lob. ic. pag. 275. Papaver rubrum Brunf. Lateinisch Tom. 3. fol. 52. Papaver erraticum primum Fuchs. fol. 515. Klapper-Rosen Tab. Klapper- oder Korn-Rosen Matth. Feldmagsahnen/Hirnschaal und Grindi-Mageii vulgo. Wilder Mohn Nostratibus. Am Kneiphofischen Wall. Item inter segetes passim.

DXXII. Pastinaca sylvestris tenuifolia Dod. Lateinisch fol. 679. Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis vel Daucus officinarum C. B. Pin. 151. Daucus vulgaris Clus. hist. lib. 6. fol. 198. Pastinaca sylvestris Matth. Bauh.

in

in Matth. fol. 549. Staphylinus sylvestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 348. Pastinaca erratica Fuchs. fol. 684. Cord. in Diosc. fol. 54. Tab. lib. I. fol. 239. Daicum usitatus officinarum Wilde dünneblättriche Möhren. Pastinaca sylvestris genuina Diosc. Lob. ic. pag. 721. Wild Pastenach Tab. Matth. Wilde Rüben Sebitz. in Trag. Wilde Pastanen Fuchs. Wilde Möhren. Vogels-Nest und Esels-Möhren vulgò. Calfacit & siccata ordine tertio Tab. præsertim semen, quod radice calidius. Urinam pellit, calculos exterit & mulierculis ab utero suffocatis auxilio est. Hinter der Schackischen Kirchen/ prædium versùs Melchioris à Rappen. Item in monte Apollinis bey Niednau. Item bey Gesau am Wege. Item bey Wolffshoffen.

DXXIII. Pastinaca sylvestris tenuifolia altera. Joh. Lœf. Wilde Pastenach die andere. Hæc foliis est diversissimis à priore. Gestat namque folia majora & latiora nec ita incisa, quemadmodum in Dauco videre est. 2. Varietas est in umbellâ, quæ subtus foliis latis & acuminatis fulcitur, cùm Dauci umbella foliis Nigellæ in modum incisis sustentetur. 3. Thyrſuli umbellæ in hâc distractæ nonnihil, in Daucô conjunctiores, & ad nidamentum aptiores. Semen guttandum & radix ubi recens; fortè & in his discrimen à Dauco. In monte Apollinis hinter Niednau. Item bey Selnicken inter Coryleta.

DXXIV. Pastinaca sylvestris Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 346. Breitblättriger wilder Pastenach Gesn. hort. fol. 271. Cam. hort. p. 118. Pastinaca sylvestris Cord. Thal. p. 84. Pastinaca Brunf. Lateinisch Tom. 3. f. 172. Elaphoboscum Bauh. Matth. f. 568. Elaphoboscum Erraticum, Branca Leonina Tab. ic. pag. 77. Siser sylvestre Fuchs. fol. 753. Baucia, Pastinaca

A a z

syl-

sylvestris Arabum, an Elaphoboscum? Adv. Lob. fol. 317. Pastinaca sylvestris latifolia Dod. Lateinisch fol. 681. C. B. Pin. pag. 155. Wild Hirsch-Pastenach/ wild Morellen Tab. Bestenau Brunf. Wild-Möhren Fuchs. Potentior est hortensi, urinas & menses provocat cùm herbâ tūm maximè semine & radice, Gal. 8. simpl. c. de Staphil. Semen officinis usitatum venenis adversatur, & in calceos mingentes strenuè in Venerem agit. Im Rosß-Garten bey der Altstädtischen Ziegelscheune. Item zu Jerusalem am Berge.

DXXV. Pedicularis pratensis lutea, vel crista galli C. B. Pin. pag. 163. Pedicularia lutea Tab. Lib. 2. fol. 470. Crista galli Herbariorum Lob. ic. pag. 529. Crista Galli, seu Alectorolophos lutea Thal. pag. 33. Crista galli, Dod. Lateinisch fol. 556. Crista simplici caule Cæs. Lib. 8. cap. 37. pag. 341. Pedicularis pratensis secunda Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 201. Crista gallinacea Clus. Hist. Lib. 5. fol. 211. Geel Läuse-Kraut Sebitz. in Trag. Geel-Rödel Tab. Hanen-Pann quibusdam. Klapper Nostratibus. Semen ejus secali mistum atrum reddit panem. In pratis præsertim editioribus, item inter segetes copiose.

DXXVI. Pedicularis pratensis purpurea C. B. Pin. pag. 163. Pedicularis Lob. ic. pag. 748. Tab. Lib. 2. fol. 470. Pedicularis altera Lon. deutsch fol. 182. Pedicularis campestris prior, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 201. Fistularia Dod. Lateinisch fol. 556. Alectorolophus tertius, Clus. Pann. pag. 709. Alectorolophi tertii alterum genus, Clus. hist. lib. 6. fol. 211. Alectorolophus Dodonæi prima, seu Fistularia, Thal. pag. 7. Läuse-Kraut mit Purpurfarben Blühmen. Rödel-Kraut Tab. Braun Läuse-Kraut/ oder Rödel Lon. Braun Wiesen-Läuse-Kraut Sebitz. in Trag.

Trag. Fistulas ac sinuosa ulcera sanat : menses & sanguinem undecunque fluentem sistit, vino austero decocta; In pratis riguis passim.

DXXVII. Pedicularis pratensis candida. Joh. Lœf. Leuse Kraut mit weissen Bluhmen. Purpureæ facie prorsus est assimilis dempto flore niveo. Esitata jumentis phthiriasin accersit. In pratis beym Bretter-Krige.

DXXVIII. Persicaria urens, seu Hydropiper, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria prima, sive Hydropiper, Tab. ic. pag. 857. Persicariæ primum genus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 71. Hydropiper, Fuchs. fol. 845. Cord. in Disc. fol. 47. Cæs. lib. 4. cap. 35. pag. 168. Hydropiper, sive Persicaria, Bauh. in Matth. fol. Hydropeperi Dod. Lateinisches fol. 607. Hydropiperi. Persicaria Hydropiper, Lob. ic. pag. 351. Persicaria mordax, seu Hydropiper, Thal. p. 85. Pulicaria mascula, Brunf. Lateinisch tom. 2. f. 14. Persicaria mas, Lon. deutsch fol. 198. Scharff Flohe-Kraut/ Flöh-Kraut/Wäser-Pfeffer Tab. Matth. Flöh-Kraut Männlein Brunf. Groß Pfersing-Kraut / oder Pfersing-Kraut Männlein/Lon. Wäser-Pfeffer/Schmerzen / Cord. in Disc. Mücken-Kraut quibusdam. In locis palustribus & ad rivulorum margines passim.

DXXIX. Persicaria mitis maculosa & non maculosa, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria altera, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 71. Tab. lib. 2. fol. 528. Persicaria mitis maculosa, Lob. ic. pag. 315. Persicaria Fuchs. fol. 630. Dod. Lateinisch fol. 608. Pulicaria foemina, Lon. deutsch fol. 197. Gelind Flöh-Kraut. Das ander Flöh-Kraut Tab. Sebitz. in Trag. Matth. Flöh-Kraut Weiblein/ Brunf. Pfersing-Kraut-Weiblein / Lon. Folia quandoque sunt maculata, quandoque non. Persicaria hæc lateres inter ignitos tosta,

& imposita, dolores sifit arthriticos certo experimento. Sunt, qui ulceribus inveteratis solidam & citam curationem. Persicariâ hâc promittunt. Eam Lunâ decrescente partibus ulceratis alligant, & spatio XXIV. horarum elapsô, recentem apponunt, applicatione in dies continuatâ, usque dum Luna juvenescere seu iterum crescere incipit. Remotam ab ulcere sterquilinio committunt, putredine consumendam. Consumpta ulcus curatum ostendit. Persicaria in frigidam conjecta, foris maxillæ affirmata, ut incalescat prorsus, mox fimo commissa, ut tota putrefaciat, dentium dolores mitigat. De Persicariâ vide plura in Marci Marci Philosoph. Veterum restitutâ pag. m.495. Auf dem Tham nach dem Bretter-Krûge zu. Sub elevatione poli 46. 47. 48. 49. Junientis radix porrigitur, à viscerum ægritudine tumidis. Folia legenda Sole 15. my ingresso; flores. Sole 8. & occupante: semen Sole & deserente.

DXXX. Persicaria minor, C. B. Pin. pag. 102. Persicaria pumila, Tab. lib. 2. fol. 528. Persicaria pusilla repens, Lob. ic. pag. 316. Klein Flöh-Kraut Tab. In fossis hinter dem Friedländschen Thor nach dem Penartischen Walde zu.

DXXXI. Petasites major & vulgaris C. B. Pin. pag. 167. Große gemeine Pestilenz-Wurz. Petasites, Trag. Kyber. in Trag. pag. 415. Dod. Lateinisch fol. 597. Cord. hist. fol. 123. Fuchs. fol. 644. Gesn. hort. fol. 271. Lob. ic. pag. 591. Adv. Lob. fol. 254. Observ. Lob. fol. 321. Lon. deutsch fol. 254. Tab. lib. 2. fol. 421. Cæf. lib. 12. cap. 20. p. 489. Petasites florens & sine flore Clus. Hist. lib. 5. fol. 116. Petasites flore punicante Thal. pag. 91. Tussilago major, Bauh. in Matth. fol. 615. Petasites mas, Cam. hort. pag. 122. Pestilenz-Wurz Tab. Kyber. in Trag. Matth. Fuchs. Lon.

Lon. Neunkrafft Nostratibus. Vulgus radices offert vaccis die pro festo Joh. Baptista, quō præcavere student, ne lac vaccis detrahatur. Flos punicans est & odoratus. Bey der Neuhäusischen Mühl.

DXXXII. Petasites minor C. B. Pin. pag. 197. Kleine Pestilenz-Wurz. Petasites albo flore Cam. hort. pag. 122. Clus. hist. lib. 5. fol. 116. Petasites flore candido, Thal. pag. 91. Petasites foemina & Leucanthemos, Cam. hort. pag. 122. Am frischen Hafe copiosè. Flos ex candido subflavus est, & inodorus ferè. Radix resinam fundit copiosam, in peste salutaris existens. Cum Zedoariâ & Angelicâ præstans est remedium in uteri strangulatu. Cam. in hort. pag. 122.

DXXXIII. Phalangium non ramosum Dod. Lateinisch fol. 106. Tab. lib. 1. fol. 685. Phalangium non ramosum. Liliago Cordi, Lob. ic. pag. 48. Phalangium parvo flore non ramosum C. B. Pin. pag. 29. Liliago, Asphodelus Germanica, Phalangium, Cord. hist. fol. 150. Phalangium caulinis simplicibus Cæl. lib. 10. cap. 27. pag. 416. Ohnästiges Erd-Spinnen-Kraut/ Tab. Groß-Lilgen vulgo. Hinter Brandenburg/ inter ericeta & aspera. Folia, flores ac semina scorpionum & phalangiorum ictibus succurrunt, ac tormina passos juvant. Diosc.

DXXXIV. Pilosella major erecta, C. B. Pin. pag. 162. Pilosella major altera Tab. lib. 1. fol. 626. Groß gerades Mäus-Dehrlein / In der Hollen-Grund. Item bey Lauten-Mühl iner fruticeta.

DXXXV. Pilosella major repens hirsuta, C. B. Pin. pag. 162. Pilosella, Matth. deutsch fol. 405. Pilosella prima Tab. lib. 1. fol. 625. Pilosella, auricula muris, Adv. Lob. fol.

200. Pilosella, & Holostium Lacunæ, Lob. ic. pag. 479. Auricula muris, Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 119. Auricula muris minor, Trag. Kyber. in Trag. pag. 278. Lon. deutsch fol. 126. Pilosella major, Fuchs. fol. 605. Dod. Lateinisch fol. 67. Pilosella media, Thal. pag. 83. Kriechendes rauhes Mäus-Dehrlein. Mäus-Dehrlein Tab. Klein Maus-Ohr-Nagel-Kraut Lon. Mäus-Dehrlein Brunf. Amaroore & acredine quantillâ hepatis, lienis & mesenterii infarctus expedit, crassa tenuat, resolvit, educitque bilem: in utero, hydrope ac tabe salutaris. Matthiolo siccatur, refrigerat, vehementer adstringit, solidat, glutinat, tenuat, & abstergit: in sputo sangvinis, dysenteriâ, diarrhœâ, ac puerorum herniis perutilis, vi suâ vulnerariâ. Chalybs candens succo ejus saepiusculè extinctus, tantam contrahit duritiem, ut lapides ferrumque atterat. Vi etiam est præsentissima ad calculum, Lob. Passim in incultis.

XXXVI. Pilosella major repens minus hirsuta, C. B. Pin. pag. 262. Auricula muris minor secunda, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 221. Lactucella sylvestris repens, Cam. hort. pag. 82. Pilosella vulgò. Cæs. lib. 13. cap. 18. pag. 514. Das ander Mäus-Ohr / Sebitz. in Trag. In collibus hinter dem Altstädtischen Walle nach der Hollen-Grund zu.

XXXVII. Pimpinella saxifraga major umbellâ candidâ, C. B. Pin. pag. 159. Pimpinella Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 28. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 370. Gesn. hort. fol. 272. Pimpinella major Fuchs. fol. 608. Pimpinella major Fuchsii, Lob. ic. pag. 720. Pimpinella saxifraga Bauh. in Matth. f. 729. Pimpinella saxifraga major, Cam. hort. pag. 125. Tragofelinum majus. Pimpinella major,

major, Tab. ic. p. 88. *Saxifraga magna*, Dod. *Lateinisch* f. 315. *Bipinella Saxifraga major*, Adv. Lob. f. 321. *Pimpinella nostras communis major*, Thal. p. 87. *Saxifraga vulgaris major*, Clus. Pann. p. 697. *Groß Bibinell*/ Fuchs. Tab. Sebitz. in *Trag. Bi-*
benel Matth. Brunf. Groß Bock's Peterlein vulgò. In umbellâ hujus *Pimpinellæ saxifragæ*, semina inter visuntur quandoque orbiculares, capsæ virides, pediculis inhærentes, quæ diffractæ eruculam ostentant coccinei coloris. Radicibus quandoq; adnascuntur cossa rubra, quibus tinctores utuntur ad colorem carmesinum rebus inducendum. Inter coryleta *bey Blada* passim. Radix *pimpinellæ colligatur Sole* \varnothing deferente: folia, Sole in \varnothing commorante: semen, Sole in 1. \varnothing existente.

DXXXVIII. *Pimpinella saxifraga minor*, C. B. Pin. pag. 160. Cam. hort. pag. 125. *Pimpinella nostras communis minor*, Thal. pag. 87. *Pimpinella minor*, Fuchs. fol. 609. *Tragoselinum petræum*, Tab. lib. 1. fol. 316. *Bipinella*, *Saxifraga hircina*, Adv. Lob. f. 321. *Bipinella*, *Saxifraga minor* Lob. ic. p. 719. *Saxifraga parva*, Dod. *Lateinisch* fol. 315. *Pimpinellæ tertia species*, Trag. Seb. in *Trag. deutsch* f. 370. *Daucus Selenoides*, Cord. hist. fol. 154. *Saxifraga hircina minor*, Gesn. hort. fol. 279. *Tragium*, *Column*, in *Phytobas* pag. 76. *Saxifraga*, *Pimpinella Germanica minor*. Clus. hist. lib. 6. fol. 197. *Saxifraga*, sive *Pimpinella Germanica minor*, Clus. pann. pag. 697. *Saxifraga altera* Cæl. lib. 7. cap. 57. *Stein-Bibernell*/ Tab. *Klein Bibenel*/ Fuchs. *Die dritte Bibernell*/ Sebitz. in *Trag. Stein-Peterlein*/ *Mauer-Peterlein* und *Krauß-Bibernell vulgò*. Vicem *petroselini Macedonici* sustinere potest, si illud deficiat.

DXXXIX. *Pimpinella sangvisorba major*, C. B. Pin. pag. 160. *Sangvisorba major*, Fuchs. fol. 788. Cam. hort.

125. Tab. lib. 1. fol. 391. Cord. hist. fol. 143. Sangvisorba altera major, sive Pimpinella, Lob. ic. pag. 719. Adv. Lob. f. 320. Pimpinella Italica major sangvisorba Clus. hist. lib. 6. f. 197. Thal. pag. 87. Pimpinella, sive sangvisorba major, Bauh. Matth. fol. 729. Pimpinellæ Italicæ secundum genus, Trag. Sebitz, in Trag. deutsch 373. Sideritis secunda Dioscoridis. Colum. min. cogn. stirp. & rar. part. 1. pag. 125. Groß Sperben-Kraut/ Große Welsche Bibernell / Tab. Herr Gotts Bartlein/ Welsche Bibenel Matth. Sebitz. in Trag. Groß Röbles-Kraut/ Fuchs. Groß Blutt-Kraut/ Groß Blutt-Tropfflein/ und Wurm-Wurz vulgò. Braun Leber-Blum Nostratibus. Refrigerat radix, siccata & adstringit. Fluores alvi, & sangvinem undecunque fluentem efficacissimè sistit, ac intestinorum exulcerationes sanat. Flos siccatus & ex vinô rubrô sumptus, dysentericos juvat. In pratis aridioribus & graminosis locis.

DXL. Pinus sylvestris, C. B. Pin. pag. 491. Matth. deutsch f. 24. Pinus sylvestris sive Pinaster, Dod. Lateinisch f. 860. Pinus sylvestris montana, Tab. lib. 3. fol. 638. Pinaster, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. f. 238. Lob. ic. pag. 226. o. Gesn. hort. f. 272. Thal. pag. 90. Pinus sponte proveniens. Cord. in Diosc. f. 15. Wilder Fichten-Baum Matth. Wilder Berg-Zirbel-Baum Tab. Harz-Baum / Kien-Holz. Rieser Holz vulgò. Fichten Nostratibus. Gabatæ. Totæ Sylvæ passim. Pinus eas inter arbores refertur, quæ cariem vetustatemque haut sentiunt. Cupressus ac pinus, inquit Vitruvius lib. 2. c. 9. in vetustatem sine vitiis conservantur: quod is liquor, qui inest penitus in corporibus eam, habet amarum saporem; qui propter acitudinem non pati-

patitur penetrare cariem, neque eas bestiolas, quæ sunt nocentes. Ideoque quæ ex his generibus opera constituuntur, permanent ad æternam diuturnitatem. Pinus in Isthmicas ludis primum priùs erat coronamentum, post apium. Notandum, pinea tigna, abiegnæ, querna, & consimilia, ædificiis struendis destinata, ubi exalcentur, facile hiscere, ac rimas agere; contra per meditullium ferrâ dissecta tale quid haud pati. Sic asperes ferratos ac siccatos meditullium versus curvari advertes, ob fibras ex peripheria ad centrum concurrentes, non contrâ. Ferunt, & fissos asperes non ita incurvari, ac qui ferrâ sunt defecti.

DXLI. Pisum marinum. Joh. Lœl. Wilde Seeschoten. Radix flavescens, & longius sub arenâ incedens, sarmen- ta excludit angulosa, striata, foliis uncialibus, binis semper ex intervallo sarmenta ambientibus, è quorum meditullio exoritur ala, novem aut decem foliorum contrario & alterno situ nascentium, cujus extremitas in capreolos tandem exit. Flores aut siliquas cujus indolis producat, mihi hactenus observare non licuit. Auf den See-Bergen nacher Kunzen zu.

DXLII. Plantago latifolia sinuata, C. B. Pin. pag. 189. Plantago major, Matth. Bauh. in Matth. fol. 375. Fuchs. f. 38. Dod. Lateinisch. f. 107. Gesn. hort. fol. 273. Cam. hort. f. 273. Cam. hort. pag. 128. Tab. lib. 2. f. 402. Arnoglossa, Plantago latifolia lævis, Lob. ic. pag. 303. Adv. Lob. fol. 127. Plantago rubea Brunf. Lateinisch tom. 1. f. 25. Plantago latifolia Cord. in Diosc. fol 44. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 180. Lon. deutsch f. 172. Plantago πολύφυτη major sive rubea Thal. pag. 86. Plantago & centinervia Cæs. lib. 8. cap. 16. pag. 327. Großer Wegrich. Tab. No-

ther Wegrich Sebitz. in Trag. Lon. Brunf. Breit Wegrich Fuchs. Weg-Wätter Nostratibus. Adstringit, abstergit ac digerit: jecoris obstructiones solvit, renum ac vesicæ ulcera sanat, dysentericos, sangvinis eruptiones & alvi profluvia sistit, tūm foliō, tūm semine. Folia vel integra ulceribus inducta saniem extergunt: succus ulcerum malignitatem corrigit, expurgataque ad cicatricem dicit. Secùs vias copiosè.


DXLIII. *Plantago angustifolia major*, C. B. Pin. pag. 189. *Plantago quinqvenervia*, sive *Lanceola* Lob. ic. pag. 305. Adv. Lob. fol. 128. *Plantago πεντάνευρη* major, Thal. pag. 86. *Plantago lanceolata*, Tab. lib. 2. f. 406. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 180. *Plantago minor* Brunf. Lateinis̄ch Tom. I. f. 24. Fuchs. f. 39. Lon. deutsch. f. 174. Dod. Lateinis̄ch f. 107. Gesn. hort. fol. 273. *Lanceola*, Cæs. lib. 8. cap. 17. pag. 328. *Spiżer Wegrich* Sebitz. in Trag. Tab. Fuchs. Brunf. *Spiž* oder *klein Wegrich* / Lon. *Rößripp* quibusdam. In pratis præsertim editioribus passim, spicâ reperita bey Lauten-Mühl geminâ. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. Radix colligenda Sole in Π versante: flores, Sole in ☽: Semen, Sole in ☉ constituto.

DXLIV. *Plantago angustifolia minor* C. B. Pin. pag. 189. Tab. lib. 2. fol. 402. *Plantago πεντάνευρη* minor, Thal. pag. 86. *Lanceola minor*, Cæs. lib. 8. cap. 17. pag. 328. *Kleiner spiziger Wegrich* / Tab. Hinter dem Kneiphofischen Walle in sabuletis. Majore viribus imbecillior est.

DXLV. *Plantago latifolia glabra minor*, C. B. Pin. pag. 189. *Plantago latifolia minor*, Tab. lib. 2. fol. 402. *Kleiner breiter Wegrich*.

DXLVI. *Plantago latifolia incana*, C. B. Pin. pag. 189. *Plantago major incana*. Lob. ic. pag. 304. Clus. hist. lib. 5. f. 109.

Nº. 62. ad pag. 199.



Plantago aquatica
Λεπτονακρόφυλλος

f. 109. *Plantago major*, Matth. deutsch f. 169. Cam. hort. pag. 128. Brunf. Lateinisch tom. I. f. 23. Lon. deutsch f. 172. *Plantago media*, Dod. Lateinisch fol. 107. Gesn. hort. f. 273. *Plantago media* Dodonæi, Thal. pag. 86. *Plantago latifolia*, vel *media & secunda*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 180. *Plantago minor* Dioscoridis, Tab. Schaffs-Zunge/ Tab. Breiter Wegrich/ Brunf. Lon. Sebitz. in Trag. Bey Bircken-Feld in incultis copiosè. Item bey Lauten-Mühl se-
cùs viam.

DXLVII. *Plantago aquatica latifolia*, C. B. Pin. pag. 191. *Plantago aquatica* Brunf. Lateinisch tom. I. fol. 27. Matth. deutsch f. 170. Tab. lib. 2. f. 405. Fuchs. f. 42. Dod. Lateinisch f. 606. Gesn. hort. fol. 273. Thal. pag. 86. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 181. Cæl. lib. 14. cap. 15. pag. 552. Lon. deutsch f. 174. *Plantago aquatica*, foliis Betæ aut Plantaginis, flore Gallii albi, Lob. ic. pag. 300. Breit-blättriger Wasser-Wegrich Tab. Matth. Fuchs. Wasser-Wegrich/ oder Frosch-Löffel-Kraut/ Lon. Frosch-Wegerich quibusdam. In paludibus passim.

DXLVIII. **Plantago aquatica* λεπτομακρόφυλλος Joh. Lœselii. Radix est capillacea, albula partim, partim rufula, caules nonnunquam tricubitales, erectos, rotundos, ex intervallo brachiatos, in altum mittens, quorum cacuminibus flosculi innascuntur albi, & vanescientibus his exigua capitula, minutum semen asservantia. Folia promit radix numerosa, digitum transversum lata, bicubitalia, & longius excurrentia. Wasser Wegrich mit schmalen langen Blättern. Im Pregel passim bey der Hospithal-Wiese.

DXLIX. *Polygala vulgaris*, C. B. Pin. pag. 215. Polygala Lon. deutsch. f. 217. *Poligala vulgaris minor*, Clui. hist.

lib. 3. f. 325. Polygalon Trag. Kyber. in Trag. p. 571. Polygala recentiorum, Adv. Lob. f. 179. Polygala recentiorum rubeis & albis floribus, Lob. ic. p. 416. 417. Polygalon flore rubro purpurecente: & flore cæruleo, Eystett. Polygala Tragi, Thal. pag. 88. Cam. hort. Polygala cærulea, purpurea, alba, Tab. lib. 2. fol. 501. Flos Ambarvalis, Dod. Lateinisch fol. 253. Blau/ braun und weiß Creuz-Blümlein / Tab. Rämsel/ Creuz-Blum/ Lon. Kyber. in Trag. Milch-Blum quibusdam. Zwischen Lauten-Mühl und Bladau in locis herbosis.

DL. Polygonatum latifolium vulgare, C. B. Pin. pag. 303. Polygonatum Bauh. Matth. fol. 678. Lob. ic. pag. 637. Cord. hist. fol. 113. Cord. in Diosc. fol. 61. Polygonatum vulgare, Cam. hort. pag. 129. Ppolygonatum vulgatius, Eystett. Polygonatum majus, Lon. deutsch/ fol. 206. Polygonum majus, Adv. Lob. f. 283. Polygonatum majus, seu vulgare, aut latifolium, Thal. pag. 85. Polygonatum latifolium, Fuchs. fol. 585. Dod. Lateinisch f. 346. Tab. lib. 2. fol. 755. Sigillum Salomonis, Brunf. Lateinisch tom. 3. f. 92. Gesn. hort. fol. 281. Sigillum Salomonis latifolium, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 316. Frassinella, Cæs. lib. 5. c. 32. pag. 224. Breitblättrige gemeine Weiß-Wurz/ Weiß-Wurz / Matth. Fuchs. Brunf. Weiß-Wurz-Männlein/ Tab. Große Weiß-Wurz/ Lon. Weiß-Wurz / Gelend-Wurz/ Cord. hist. Polygonatum latifolium baccis nigris. Inter tetanothra, quæ Plinio sunt medicamenta cutem erugantia, habetur Cataplasma antipodagricum quorundam. R. rad. Sigill. Salom. Libr. I. Smegm. Venet. libram I. Croc. drachm. 3. Coq. in mensurâ vini adusti, ad cataplasmatis consist. In der Hollen-Grund / und Penartischen Walde in umbrosis.

DLI.

DLI. *Polygonatum angustifolium non ramosum*, C. B. Pin. pag. 303. *Unästige schmalblättrige Weiß-Wurz*. *Polygonatum angustifolium*, Fuchs. fol. 586. Eystett. Clus. Pann. pag. 263. *Polygonatum angustifolium primum*, Tab. lib. 2. fol. 431. *Polygonatum quintum, sive angustifolium primum*, Clus. hist. lib. 2. fol. 277. *Polygonatum alterum*, Dod. Lateinisch f. 345. *Polygonatum tenuifolium*, Cord. hist. f. 113. *Polygonatum erectum*, Gesn. hort. f. 273. *Sigillum Salomonis angustifolium*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 316. *Polygonatum minus* Lob. ic. pag. 805. Lon. deutsch f. 206. *Polygonatum minus, rubris foliis, ambitu stellato*, Adv. Lob. f. 358. *Polygonatum tenuifolium majus*, Thal. pag. 85. *Polygonato similis in Alpibus*, Cæl. lib. 5. c. 33. pag. 224. *Weiß-Wurz-Weiblein*/Tab. *Schmale Weiß-Wurz*/Fuchs. *Kleine Weiß-Wurz*/Lon. Sebitz. in Trag. Flosculis provenit albidis. *Bey Birckensfeld hinter der Ziegel-Scheune*.


DLII. *Polygonon latifolium*, C. B. Pin. pag 281. *Centumnodia*, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 128. *Polygonum mas*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 676. Dod. Lateinisch fol. 113. Fuchs. fol. 614. Thal. pag. 87. Cæl. lib. 4. cap. 36. p. 168. & 169. *Polygonum mas vulgare*, Sangvinaria, Centumnodia, Lob. ic. pag. 419. Adv. Lob. f. 179. *Polygonon masculum*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 391. *Polygonum vulgare*, Cam. hort. pag. 130. *Polygonus mas*, Gesn. hort. f. 273. *Polygonum majus* Tab. lib. 2. fol. 502. *Polygonum majus seu mas*, Lon. deutsch f. 204. *Groß-Weg-Gras* Tab. *Große Wege-Tritt*/Matth. *Weg Gras* / Brunf. Fuchs. *Wege-Tritt*/oder *Weg-Gras*. Lon. *Denn-Gras* / und *Blutt-Kraut* quibusdam. *Jungfer-Tritt* Nostratibus. *Secùs vias ac semitas copiosè*.

DLIII.

DLIII. *Polygonum oblongo angusto folio*, C. B. pin.
pag. 281. *Polygonum tertium*, Tab. lib. 2. fol. 503. Weg:
Tritt mit langen schmallen Blättern. Blatt-Kraut. Re-
frigerat gradu secundo, siccatur & adstringit. Sangvinariæ
nomen ab effectu obtinuit, quippe eo sive integro, sive tu-
fo, stillanti parti inducto, sangvis coit, & in grumos con-
crescit. Collectionibus fervidis & ignibus sacris auxiliatur.
Bey Juden-Kirch secus viam. Colligenda herba Sole i. &
ingresso.

DLIV. *Polygonum minus*, seu *Millegrana major*,
C. B. pin. pag. 281. *Polygonum minus* Matth. deutsch. fol.
677. *Herniaria*, Gesn. hort. f. 261. Cam. hort. pag. 74.
Thal. pag. 56. Tab. lib. 2. fol. 507. *Empetron*, *Trag.*
Kyber, in *Trag.* pag. 527. Lon. deutsch fol. 249. *Herba*
Turca, sive *Herniaria*, Lob. ic. pag. 421. *Herba Turca*,
Herniaria multigrana serpilli facie, Adv. Lob. fol. 180. *Mil-
legrana*, Cord. hist. fol. 98. *Harn-Kraut* Tab. Brunf. Klei-
ner Weg-Tritt/ Matth. *Harn-Kraut*/ *Stein Kraut*/ Lon.
Bruch-Kraut/ oder *Groß Tausend-Korn vulgò*. *Jungfer-
Gras Fœmellis*. *Dürr-Kraut Rusticis*. In incultis bey
Brandenburg. Item hinter dem *Kneiphofischen Wall*/ in
petrosis.

DLV. *Polygonum minimum*, seu *Millegrana mi-
nima*, C. B. pin. 282. *Millegrana minima*, Lob. ic. p. 424.
Herniaria altera, Thal. pag. 57. *Das allerkleineste Tau-
send-Korn*. *Plantula est exilis polycavlos, ramulosa*, folia
disposita habens Alsines instar multicaulis, sed minuscula.
*Thrysulorum bifurcationes fermè singulas binis foliolis co-
mitatas, rotundiusculum excipit capitellum*, seu granulum;
*Cacumina verò numerosiora hujusmodi occupant gra-
nula*.



No. 63, ad pag. 203.



Polygonum folius gramineis
Spergula Capitulis.

Armeria rubra Campastris. L. &.

nula. Radix longiuscula, & sèpè contorta. Im Dorff
Sarcfau.

DLVI. *Polygonum minus polycarpum*, Tab. lib. 2.
f. 530. *Hund-Würgel*. *Polygonum minus*, seu *fœmina*,
Lon. deutsch fol. 205. *Saxifraga Anglicæ*, forte *Alsines mi-*
nimum genus, *Cynanche*, *Dalechampii Lob. ic. pag. 428.*
Saxifraga Anglicæ Adv. Lob. fol. 183. *Polygonon Germanis* *Knäwel/ Trag. Kyber. in Trag. pag. 393.* *Polygonum angustissimo & acuto*, vel *gramineo folio minus repens*,
C. B. pin. 281. *Knäwel/ Dod. Lateinisch fol. 115.* *Klein fruchtbaerer Weg-Tritt/ Tab. In incultis; item inter se-*
getes passim. In *Poloniâ Polygonum quoque reperitur cocciferum*, *Kosmaczek dictum*, cujus radiculis *cocca elegan-*
tissimo rubore commendata innascuntur. Provenit
idem *Polygonum propè Rostochium in locis arenosis*, cu-
jus *cocca pueri die Profesto Johannis Baptista colligunt*,
vocantque *Johannis-Wurmlein.* Collegit ipse eadem
Lœselius Rostochii vivens, & advertit paulò post *muscas è*
coccis exeuntes, & *avolantes.* *Succo Sericum tingi posset*,
quæ *tinctura ὁλόβηρος* i. e. tota vera salutanda haud est,
utpote quæ *Imperatoribus olim debebatur l. auratas.* C. de
vestibus holoberis.

DLVII. **Polygonum foliis gramineis Spergulæ ca-*
pitibus. Joh. Lœl. Weg-Tritt mit kleinen Körpfchen und
gar zarten Blättern. Radice nititur longiuscula, subflavâ,
& villosâ nonnihil, quæ caulinulos edit exiles, numerosos,
ἐπικλινετέρας, in terram circum circa procumbentes, nodo-
bos, in summitate ramosos. Singulis geniculis folia præ-
sunt tenuia & angusta, magnitudine suâ variantia, modò
plura, modò pauciora, paleaceis & niveis quibusdam mem-

Cc

*branulis**Arenaria rubra*

L. 8. x


branulis fulta: flosculis est in summo caulinorum dilutè purpureis, quos vanescentes parva, ac quinis foliolis conclusa subseqvuntur vascula, rotunda, & in acumen vergentia, Spergulae capitulis similia, in quibus minusculum seminum. Hinter Juden-Kirch am Wege nach Selnicken zu. Item secùs viam, quâ itur nach Neuhausen.

aula nodosa. L. 3
DLVIII. * Polygonum foliis gramineis alterum. Joh. Lœf. Anderer Weg-Tritt mit gar garten Blättern. Thysalis est exiguis, rotundis, geniculatis, quincuncialibus sæpè: Initio per brevibus aliquot ad quævis genicula foliis, concursu suò veluti fructum aliquem referentibus, quæ ætatis tractu elongantur, & graminea fiunt: flosculos habet niveos, & his deciduis vascula nana, acuminata, exile semen servantia. Radicula paucis fibris donata est. Am Bollwerck beym Zoll-Haus.

DLIX. Polypodium, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 430. Fuchs. fol. 588. Cord. in Diosc. fol. 76. Cord. hist. fol. 171. Gesn. hort. fol. 273. Tab. lib. 2. fol. 478. Cæs. lib. 16. cap. 6. pag. 593. Cam. hort. pag. 130. Lon. deutsch/ fol. 251. Filicula, seu Polypodium, Bauh. Matth. fol. 87. Polypodium vulgare, C. B. Pin. pag. 359. Engelsfuss / Brunf. deutsch/ fol. 307. Polypodium, Filicula, Herba Radioli Apuleji Lob. ic. pag. 814. Polypodium majus Dod. Lateinisch/ fol. 464 Engelsfuss / Tab. Fuchs. Lon. Sebitz. in Trag. Süßfarn; Süß-Wurzel / Baumfarn / Tropffen-Wurz vulgo. In petris muscosis zu Neuhausen. Im See-Gebirg zwischen Sarckau und Lattenwalde copiosè. Nonnunquam vetustis arboribus innascitur, ben Wiesdrehlen im Walde.

DLX. Populus nigra, C. B. Pin. pag. 429. Matth. deutsch/ fol. 41. Dod. Lateinisch/ fol. 836. Lob. ic. p. 194. o. Cord.

Nº. 54. ad pag. 204.
Polygonum foliis gramineis
alterum.



Spergula nodosa. L. 3.

No. 65. ad pag. 205.



Potamogeton rotundifolium alterum.

Cord. in Diosc. fol. 18. Tab. lib. 3. fol. 687. Cæl. lib. 3. cap. 45. pag. 120. Populus alba, Lon. deu: sch fol. 42. Trag. Kyber. in Trag. pag. 1080. Schwarzer Pappel Baum/ Tab. Matth. Böllen/ Pappel- Baum Lon. Schwarzh Albeer- Baum/ Gar Baum quibusdam. In pagis passim.

DLXI. *Populus tremula*, C. B. Pin. pag. 429. *Populus Lybica*, Matth. deutsch fol. 41. Lob. ic. pag. 194. o. Tab. lib. 3. f. 687. Dod. Lateinisch fol. 836. *populus nigra*, Trag. Sebitz, in Trag. deutsch fol. 859. Lon. deutsch f. 43. *Populo nigræ similis in Alpibus*, Cæl. lib. 3. cap. 45. pag. 120. *Populi tertia species*, Cord. in Diosc. fol. 17. *Aspen/ oder Poppel- Weiden/ Lon. Lybischer Pappel Baum/ Tab. Aspen und Bellen- Baum Trag. Espen Nostratisbus.* Cortex nigræ & albæ populi particulatim cæsus, & sulcis stercoratis mandatus, omni anni tempore edules fungos profert, Diosc. In sylvis copiosè.

DLXII. *Potamogeton rotundifolium*, C. B. Pin. pag. 193. *Potamogeton*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 688. Matth. deutsch/ fol. 496. Lon. deutsch fol. 211. Tab. lib. 2. fol. 411. Fuchs. fol. 651. Cæl. lib. 8. cap. 22. pag. 332. *Potamogetoni similis rotundiore folio*, Cord. in Diosc. fol. 69. *Potamogeton λειόφυλλον*, Thal. pag. 85. *Rund-blättriges Saam-Kraut Tab. Matth. Lon. Fuchs.* In aquis stagnantibus passim.

DLXIII. **Potamogeton rotundifolium alterum* Joh. Lœsel. *Ander rundblättriges Saam-Kraut.* Folium unum æquo ferè intervallo ab altero distat, ubi verò novus exsurgit ramulus, bina concurrunt folia, exortum ejus quasi firmantia. Am Pregel.

DLXIV. *Potamogeton Salicis folio* C. B. Pin. p. 193. *Schmal-blätterig Saam- Kraut.* *Potamogeiton*, Dod.

Lateinisch fol. 582. *Potamogeton angustifolium*, Tab. lib. 2.
fol. 411. *Phyllitis lacustris*, Cord. hist. fol. 150. *Potamogeton sive Fontalis*, & *spicata*, Adv. Lob. f. 129. *Potamogeton ιτεόφυλλον*, Thal. pag. 86. **Spizig Saam-Kraut**
Tab. In aquis stagnantibus bey Königsberg paſsim.

DLXV. *Potamogeton* foliis latis ſplendentibus.
Saam-Kraut mit weichen breiten glänzenden Blättern.
C. B. Pin. p. 193. *Potamogeton altera*, Dod. Lateinisch fol.
582. *Potamogeton μαλακόφυλλον*, Thal. p. 86. **Am Frisching.**

DLXVI. *Potamogeton* foliis crispis, sive *Lactuca ranarum*, C. B. Pin. 193. **Saam-Kraut** mit kraufen Blättern. *Fontilapathum pusillum*, Lob. ic. pag. 286. Adv. Lob. fol. 117. *Potamogeton λάριφυλλον*, seu *crispum*, aut *fimbriatum*, Thal. pag. 86. *Tribulus aquaticus minor*, Clus. hist. lib. 6. fol. 252. Clus. Pann. pag. 714. *Alga secunda*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 545. **Das ander Saam-Kraut.** Sebitz. in Trag. **Kleiner Brunn-** oder **Frosch-Lattich** quibusdam. In lacunis hinter dem Altstädtischen Walle nach der Hollen-Grund zu. Foliis provenit crispis, quæ majora ac longiora sunt, quam in *Fontilapatho pusillo*, Lob. Crispitudo tamen foliorum minor est.

DLXVII. **Potamogeton gramineum latifolium*. Joh. Lœs. Klein großächtiges breites **Saam-Kraut**. Im Graben beym Bretter-Krige. *P. gramineum* L. 10.

DLXVIII. **Potamogeton gramineum tenuifolium*, Joh. Lœs. Klein großächtiges schmales **Saam-Kraut**. Plantula est ramosa, ac foliis crescit gramineis, longiusculis, atrovirentibus: in summitate caulis spica seu capitulum visitur exile, flosculis minutis exornatū. Im Graben beym Bretter-Krige.


DLXIX. *Potentilla*, Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 45.
Bauh.

Potamogeton caule com-
fito Graminis ca-
Ray Hist: 189.


Potamogeton pusillum
neo folio caule ro-
Ray Hist: 190.
pusillum L. 12.


Nº 66. pag. 206.

Potamogeton gramineum
latifolium



16-67 pag. 206





Bauh. Matth. f. 718. Lon. deutsch f. 268. Cæl. lib. 14. cap. 23. pag. 557. Fuchs. fol. 619. Thal. pag. 91. Argentina Dod. Niederländisch fol. 948: Argentilla, Potentilla, Lob. ic. pag. 693. Anserina, Tab. lib. 1. fol. 425. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 382. Argemone altera, Gesn. Hort. f. 248. Genserich Tab. Matth. Lon. Fuchs. Grensich/Grensing/und Genserich/ Sebitz. in Trag. Gåns/Kraut/ Grinsig/ Grunsing und Silber-Kraut vulgo. Plantula est in ius euntibus à Sagis commendatissima. Hanc statu tempore lectam rabula superstitiosus calceis immittit, ne causâ cadat. Verùm præstant diævopæj, nummorum aut sportularum elargitio. In Glossario: διαερούη χρυσίς, διαερούη ἀργυρός, sportulæ. Restituenda hæc vox Plinio & Trajano epistolis 117. 118. ubi diamones scriptum pro dianomes: Sportulas explicat ipse Trajanus. De his donariis, à rabulâ elargitis, verè Cyprianus: Qvantis hic sordibus emit, ut fulgeat? Circa vias & semitas passim. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. graduum nata, vulgo efficax. Radix effodienda, Sole primum arietis gradum obsidente: folia colligenda, Sole 15. Arietis inhabitante: flores, Sole in 1. & constituto.

DLXX. Potentilla repens hirsutie incanâ, Johan. Lœs. Kriechender Gånsing mit raugen grauen Blättern. Bey Neuendorff am Wege.

DLXXI. Potentilla erecta major hirsutie incana. Großer gerader Gråsing mit raugen grauen Blättern. Spithamas duas longitudine planta, tota hirsutie incana, superat. Foliis profunde incisis, pronâ parte viridé pallentibus, supinâ albantibus. Am Wege nacher Neuendorff.

DLXXII. Prunus sylvestris, C. B. Pin, pag. 444.

Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 186. Matth. deutsch fol. 103.
 Dod. Lateinisch fol. 753. Fuchs. fol. 404. Lon. deutsch fol.
 68. Cord. in Diosc. fol. 25. Gesn. hort. fol. 274. Lob. ic.
 pag. 176. o. Tab. lib. 3. fol. 700. Cæs. lib. 2. cap. 15. pag.
 48. *Prunus sylvestris vulgaris*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch
 fol. 796. *Wilder Schlehen-Baum*/ Tab. *Schlehen-Dorn*
 Matth. Lon. *Schlehen*/ Brunf. Fuchs. Sebitz. in Trag.
 Refrigerat, siccatur, & adstringit, maximè fructus. Ejus suc-
 cus *Acacia* est officinarum, sed non vera. Aqua ex floribus
 cum vino destillata, in laterum doloribus, & cordis com-
 pressionibus magni est usus, Trag. Vinum pendulum octi-
 dui spatio restituunt pruna immatura adhuc, contusa & im-
 missa. Exsiccata & contusa efficaciter idem agunt, Trag. &
 Tab. Folia & radices faucium ulcera sanant, & fluxiones
 avertunt gargarisatu. *In der Hollen-Grundt* copiosè. Item
hinter Brandenburg nach dem Lenzen Berg zu.

DLXXXIII. *Prunella*, Fuchs. f. 621. Tab. lib. 2. f. 256.
 Cæs. lib. 11. cap. 37. pag. 453. *Brunella major* folio non
 dissesto, C. B. Pin. pag. 260. *Brunella*, Brunf. Lateinisch/
 tom. 3. fol. 26. Dod. Lateinisch fol. 136. *Symphytum pe-
 trænum*, *Consolida minor*, Matth. Lob. ic. pag. 474. *Sym-
 phytum petrænum*, Cord. in Diosc. fol. 62. *Consolida mi-
 nor*, Matth. Bauh. in Matth. fol. 684. *Consolida minima*,
 sive *Prunella* flore purpureo vulgaris, Cam. hort. 45. *Pru-
 nella* aut potius *Brunella* Officinarum, Eystett. *Prunella vul-
 garis*, vel sexta, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch 245. *Brau-
 nellen*/ Tab. Brunf. Fuchs. Sebitz. in Trag. *Gottheil und*
S. Antonii Kraut vulgo. Vulneribus medetur, grumos
 sangvinis dissolvit, & pulmoni exulcerato aliisque sauciis par-
 tibus auxilio est. In asperis passim. *Bey Rath's Hoff*/ zu
Stein-

Stein-Wäck &c. Brevisimā spicā reperta est in der Öster-
rodischen Heide.

DLXXIV. *Prunella* flore albo. Joh. Lœl. Brunel mit
weißer Blüth. Bey Fischhausen hinter der Ziegel-Scheune.
Item bey Hoppenbruch in Districtu Balensi.

DLXXV. *Pulsatilla vulgaris*, Lob. ic. pag. 281. *Pul-
satilla recentiorum*, Cæl. lib. 14. cap. 11. pag. 550. *Pulsatilla
communis*, Cam. hort. pag. 134. *Pulsatilla folio crassiore
& majore flore*, C. B. Pin. pag. 177. *Pulsatilla*, Bauh. Matth.
fol. 462. Dod. Lateinisch fol. 433. Gesn. hort. fol. 274. Pul-
satilla prima, Tab. lib. 1. fol. 97. *Pulsatilla vulgaris dilutio-
re flore*, Clus. hist. lib. 2. fol. 246. Clus. Pann. pag. 385.
Küchenschell/ Brunnf. deutsch fol. 143. Herba Venti, Trag.
Kyb. in Trag. p. 413. Lon. deutsch fol. 113. Anemones species,
Thal. pag 15. Küchen-Schellen/ Tab. Lon. Matth. Kyber.
in Trag. Küheschell / Hackel Kraut / Schlotten-Bluhm
vulgò. Aqua Pulsillæ verno tempore extracta , experi-
mento certo, febrifuga est, unciarum trium pondere sumpta.
Vomitum movet acri sapore. Cœruleo colore destillata pro-
dit. Vide suprà marrubium cardiaca dictum. Bey Bran-
denburg und Frauenburg in siccioribus copiosè. Item in
der Wormditschen Heyde.

DLXXVI. *Pulsatilla folio Anemones secundæ sive sub-
rotundo: quæ s. in Prodr. C. B. pag. 94.* Bey Lauten-Mühl
in collibus arenosis. Hinter der kleinen Schleuß jenseit des
Thames auff dem Berge copiosissimè. Aprili & Majo floret.

DLXXVII. *Pyrola rotundifolia major*, C. B. Pin. p.
191. Groß rundblättriges Winter-Grün. Pyrola, Brunnf. Læ-
teinisch/ tom. 3. fol. 8. Math. deutsch fol. 411. Eystett. Tab.
lib. 2. fol. 432. Dod. Lateinisch fol. 138. Pirola, Gesn. hort.
fol.

fol. 272. Pyrola à Pyri folio, Lob. ic. pag. 294. Adv. Lob.
 fol. 122. Pyrola major, seu Beta sylvestris Thal. pag. 84.
 Pyrola & Limonium sylvestre, Lon. deutsch fol. 219. Pyro-
 la vulgarior, Clus. hist. lib. 5. fol. 116. Antholog. magn. fol.
 104. Pirola alia in campestribus, Cæs. lib. 8. cap. 32. p. 338.
 Limonium, Fuchs. fol. 467. Limonium sylvestre, Trag. Ky-
 ber. in Trag. Winter-Grün/ Tab. Matth. Kyber. in Trag.
 Fuchs. Brunf. Wald-Mangolt/ Wald-Kohl/ Holz Man-
 golt vulgo, wilde Bete Nostratibus. In opacis & muscosis
 bey Schwanis und Neuhausen.

DLXXVIII. Pyrola rotundifolia minor. C. B. Pin.
 pag. 191. Klein rundblätterig Winter-Grün. pyrola quarta
 minima Clus. hist. lib. 5. fol. 118. Clus. Pann. pag. 509. Py-
 rola minima, Eystett. Anthol. mag. fol. 104. Inter ericeta
 bey Kunzen und Bladau.

~~ado Orchis C. B.
 + Orchis minor
 creata Camerarij.
 viii. respars.~~
 L. 7.
 DLXXIX. *Pyrola acutifolia polyanthos radice ge-
 niculatâ. Joh. Lœs. Spiz-blättericht Winter-Grün mit
 vielen weißen Blümlein. Radix alba ac nodosa caulinco
 subservit viridi, rotundo, hirsuto, geniculato, pedem alto, sæ-
 pè productiori, cui proximè terram folia adstant octo, fre-
 quentiùs pauciora, virentia, ex oblongo mucronata: sin-
 gulis porrò geniculis, cacumen versùs, foliolum exile &
 acutum, caulem velut in vaginulâ servans, jungitur: tandem
 subsequntur numerosi flosculi, à calyculis suis foliolo tenu-
 issimo fultis, prodeentes & albicantes. In der Fischhäusern
 Heide. Item hinter Latten-Walde.

DLXXX. Pyrola folio mucronato serrato, C. B.
 Pin. pag. 191. Winter-Grün mit gespitzten und zerfetzten
 Blättern. Pyrola minor Thal. pag. 85. Pyrola secunda
 tenerior, Clus. hist. lib. 5, fol. 117. Clus. Pann. pag. 505. Py-
 rola

rola Pannonica secunda, Cam. hort. 134. In der Fischhäusern Heyde.

DLXXXI. Pyrola frutescens arbuti folio, C. B. Pin. pag. 191. Staudechiges Wintergrün mit zerkerbten langleichten Blättern. Pyrola tertia vel fruticans, Clus. Pann. pag. 505. Clus. hist. lib. 5. fol. 117. In der Fischhäusern Heyde.

DLXXXII. Pyrola alsines flore Europaea, C. B. Pin. pag. 191. Wintergrün mit Hunerdarms Blüt, Alsinanthemon, Thal. pag. 15. Alsine alpina, Schwenck. lib. 1. stirp. pag. 17. Im Penartischen und Löbnichtschen Walde.

DLXXXIII. Pyrus sylvestris C. B. Pin. pag. 439. Wilder Birn-Baum. Pyra sylvestria, Tab. lib. 3. fol. 720. Pyra sylvestria majora, Tab. lib. 3. f. 720. Holz-Birn/ große Holz-Birn / Tab. Kruschken Borussis. Junonis vetustissimum simulachrum è pyro sylvestri fabricatum memoratur Pausaniæ lib. 2. Vide quoque Eusebium de Præparat. Evangelica c. 8.

DLXXXIV. Quercus, Trag. Kyb. in Trag. pag. 1102. Matth. deutsch fol. 69. Lon. deutsch / fol. 48. Tab. lib. 3. fol. 669. Fuchs. fol. 229. Quercus cum longo pediculo, C. B. Pin. pag. 420. Quercus vulgaris, Lob. ic. pag. 154. O. Quercus vulgaris, Hemeris, Cord. in Diosc. fol. 21. Quercus Pannonica latifolia, rectius Cerrus, Cam. hort. pag. 135. Eich-Baum / Tab. Matth. Lon. Fuchs. Eichen vulgo. * Flores habet elegantissimos, longius ab arbore pendentes. Ramulis assistunt nonnunquam rotundiuscula corpora, squamea primùm, mox villosa, Bedegvaris ferè effigie. Galla seu fructus quercus, quæ *κηρις* Dioscoridi, infecta aliquando intus alit. Ex Gallis majoribus diffraictis, nunc pestilitatem, nunc bellum, nunc annonæ caritatem, præfagus colligit vul-

Dd

gus,

B. robur.

gus, & quidem hōc modō: araneum si contineat Galla, pestem & malignas febres: mufcam si alat, bella: eruculam si concludat, famem incolis portendit. Sunt alii, prognosticum augurale ita constituentes: Auctumnō effractā gallā, araneus annum inauspicatum: musca tolerabilem: acarus frugiferum spondet. Cassa verò si sit galla, & nihil horum contineat, funera indicit. Præcoces & uberrimæ circa Festum Michaëlis gallæ, hyemem signant temporiūs adventuram & nivosam. Adstringit cortice, foliō, glande & gallā. Juvat sangvinem tussientes, egerentes, foriolas, & genituræ profluvio laborantes. Emplastrum ex queru Lœselii ita paratur: R. corticum tenerorum quercūs, radicum quercūs, turionum quercūs, florum quercūs, rasuræ ligni qverni ana libr. semis. olei veteris libr. III. coquantur, ac in infusione commorentur aliquot dies, post colaturæ adde lithargyrii aurei triti ac creti libr. 1 $\frac{1}{2}$. coquantur aliquandiu, & inter coquendum assundantur succi foliorum quercūs, aquæ foliorum quercūs ana libr. 1 $\frac{1}{2}$ tandem ubi bullæ volantes in auras assurgunt, & consistentia debita adest, per incerniculum insperge pulveris foliorum quercūs, florum quercūs ana Unc. 3. corticum quercūs Unc. 2. visci querc. cum foliis, gallarum, cupularum, glandium, granorum chermes analunc. 1 $\frac{1}{2}$. agitentur omnia quercinâ radiculâ, fiatque l. a. emplastrum sine cerâ. Uſus: validè adstringit, siccat, repellit, intercipit, discutit, & glutinat. Herniosos ergò, vomitores, foriolas, sanguinem sputantes, vel per alvum, aliaque loca egerentes, juvat, & abortationes prægnantium præcavet. Sacros ignes, & consimiles ferventias, mulcet, tumores discutit, & arthriticos sistit dolores. Ulcera adhæc ichoribus fatigata solidat, & ossa fracta ferruminat. In Borussiâ propè Welaviam in pago

pago Oppen reperta est olim quercus, cuius perimeter viginis septem ferebatur in ulnas. Annosa & cava jam quercus equitem equo ephippiato insidentem, ac intus tumultuantem, ultrò admisit, quod tentaverat etiam divus Albertus, primus Borussiæ Dux, ejusque Filius Albertus Fridericus. Tale quidpiam legimus etiam de Platano, auctore Plinio Lib. XII. c. i. quæ in Lyciâ nata, ac cavata, specum intus habuit in circuitu octuaginta & unius pedum. In hâc specû Lucinius Mutianus ter COS. cum octodecim aliis viris, salarem in morem epulatus est. Perdurat autem annos sàpè trecentos & multò plures ipsa quercus. Seculum crescendo, seculum vigorem servando, ac denique seculum marcescendo insumere creditur vulgo. In Vaticano ilex vetustior erat urbe Româ, teste Pliniô Lib. XVI. c. 44. ubi simul tradit, Romæ in area Lucinæ lotum fuisse arborem CCCCL. tunc circiter annorum. Sunt, qui de quercu numen faciunt, de Numine φ φ. ut loquitur Buchananus in Franciscano. Hinc Sacra olim erat quercus idololatris Borussis ob Gorcho, esculentorum & potulentorum Deastrum, quem sedem in quercu, ubi locorum nunc est oppidum Heiligenbeil/ seu Hieropolis, habuisse ferunt. Huic Gorcho perpetuus servabatur ignis, & omnis generis primitiae offerebantur, v. gr. frumenti, farinæ, mellis, lactis, captorum piscium, aliorumque eduliorum, oblatæque Mulcibero igni tradebantur. Quercum hanc post unâ cum idolo Anshelmus primus Ermlandiaæ Episcopus correptâ bipenni excidit, & in cineres redegit. Alia quercus latissima & trifida habebat Rickojothi in medio Natangensis tractus, in qua triplex colebatur idolum, Potollo, Perkunos, & Potrympo. Potollo sacrificii loco immolabantur capita extictorum hominum ac pecorum. Deaster hic sàpissimè domos infestabat ditiorum maximè, ubi è vivis quôdam sub-

latō pauciores essent in victimis offerendis. Tūm enim noctū homines adortus, crebriūs illis facessebat negotium. Solemnibus diebus huic in honorem sebum in ollis cremabatur. Perkunos alter erat Deaster, cui fovebatur ignis ex lignis quercinis, iisque aridis accensis, perpetuō flagrans, sacrificiis cremandis destinatus: eō extinctō sacrificulus incurrebat discrīmen vitæ. Potrympo tertius erat Deaster, cui à sacrificulo angvis lacte enutritus ac frumento cooperatus consecrabatur. Ejus in honorem infantes necabantur, thus ac cera cremabantur. Quercus hæc idolis instructa, foliorum viorem nunquam amisisse, sed perpetuō, etiam brumali tempore, eundem servâsse perhibetur. Huic arbori decus & Autoritatem Ancus Marcius, Rex Romanus, addidit, qui usu æris nondum repertō, primas leges Romanas, & priscos qualescumque ritus, in quercinas tabulas incidit. Proverbium est apud Græcos & Nostrates, loqui à quercu, & ad quercum. Sensus est, omni positō metū, cum omni securitate verba facere. Quercus enim cū sit arbor Jovis, ad hanc quisquis confugiebat, in tuto credebatur usque, & sub tutelâ Numinis. In congressu venereo coles ne masculescat fascino rem ita disturbant: Quernus ramulus, sursum rectâ pullulans, solem versus acuitur, ac resecatur: post acumine suo terræ defigitur, quam lotio paulò ante perpluit fascinandus. Defixus ita ramulus, ac proculcatus, impotentiā creat, donec eruatur. Fascinum hoc solvunt scopæ betulinæ inversæ, lotio in summitatem diffusam immisso. Quò largior glandium proventus, eō frumentorum est parciōr. Ante fruges cognitas Arcadibus, & in universum gentibus priscis, glandes fuere frumenti locō: Sicut pyra Argæis & Tirynthiis. Virgilius i. Georgic.

Con-

Concussag, famem in sylvis solabere quercū. Sed deinde

Quernag, glans victa est utiliore cibo. Ovid. lib. i. Fast.

Hinc post esum sequebantur ructus. Juvenal. Satyr. 6. v. 10.

- - - - *Glandem ructante marito.*

Iberi in Symposiis glandes in secundis mensis apponebant. Cuivis olim glandem suam, in alienum fundum procidentem, tollere licuit in alieno. Ita cautum est, lege XII. tabularum, auctore Pliniō lib. XVI. c. 5. Idque attestatur Jurisconsultus in l. unica ff. de glande legendā. Sed & tu interim vide I. Julianus §. 2. ff. ad exhib. Extemporaneum atramentum scriptorium si expetas, succō ex gallis expressō pulvisculum vitrioli ammisce, addito, ne situm contrahat, pauxillo salis vel gummi Arabici. Quercus inter duas laurus plantata olim erat Romæ ante Palatum Imperatorium, tacitè innuens, Heroicā virtute ac fortitudine Principum niti Rēpublicam. Quercus namque signum est conservati Civis: Laurus verò victoriæ ac triumphi. Hinc Cæsares bello victores in Capitolium ducebantur lauro redimiti, milites verò, qui pro Civium salute fortissimè omnium steterant, quernā cingebantur coronā, unde & hæc corona, ex quernā fronde scilicet, civica olim dicebatur, cui & aurea cessit. Hujus coronæ proprium erat, ut illâ donatis perpetuò eam gestare liceret. Tradebatur militibus ab Imperatore vel Duce exercitū. Graminea verò seu obsidionalis corona, ex illo siebat gramine, ubi cives obsidione liberabantur, & dabatur servatori ab universo exercitu. Hæc aestimatione immensā cæteris coronis longè præcelle-re credita est. De quercu adhuc notabile id est: Saxum aliquod ingentis molis, obstaculo existens, ubi in frusta redigere animo habes, fac struem circum circa segminum quer-

cinorum, quâ accensâ candescat saxum, pôst ferrei mallei impetuoso, ac fervidè iteratô concussu, saxum aliquoties terre, in frusta mox dissiliendum, & loco amovendum. Hoc artificiô diffractum novi saxum, duodecim molares lapides portionibus suppeditans suis. Ne mirare, verum est, moli-tores seu moletrinæ si consulueris artifices, vel potius experientiam ipsam.

DLXXXV. *Quercus marina*, Lob. ic. pag. 255. o. Tab. lib. 3. fol. 670. Clus. Hisp. pag. 25. Clus. hist. lib. 1. fol. 21. *Fucus maritimus*, vel *Quercus maritima* vesiculas habens, C. B. Pin. pag. 365. *Meer oder See-Eich*/ Tab. *See-Eich mit Blasen*. Chamarum testis & lapidibus ferrumine quasi quôdam affirmatur, radice destitutâ. Folia e-jus atrô sunt virore, recenter è mari expulsa: siccata nigre-scunt, & glutinis instar splendent. Succi est ferruginei & stiptici. *Im Germanischen und hinter Küthen*. Copiosius in littoris glessaria ejecta, succini parum promittit legenti-bus. Fuci verò marini quô plus egeritur, eò uberior gressi seges.

DLXXXVI. *Quinqefolium majus repens*, C. B. Pin. pag. 325. *Quinquefolium vulgare quartum*, Tab. lib. 1. fol. 436. *Quinquefolium majus luteum*, Fuchs. fol. 624. *Quinquefolium*, Matth. Bauh. In Matth. fol. 719. Cord. in Diosc. fol. 64. Cæs. lib. 14. cap. 19. pag. 554. *Quinquefoli-um*, sive *Pentaphyllum vulgare*, Lob. observ. fol. 393. *Quinquefolium majus*, Dod. *Lateinisch*/ fol. 116. *Pentaphyllum*, Gesn. hort. fol. 271. *Pentaphyllum repens*, Cam. hort. p. 119. *Pentaphyllum primum & secundum*, Lon. *Deutsch*/ fol. 242. *Pentaphyllum minus* Brunf. *Lateinisch*/ tom. 2. fol. 34. *Pentaphyllum vulgare*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 505. Pen-

Pentaphyllum majus, Thal. pag. 88. Gemein Fünff-Finger-Kraut / Tab. Groß Fünff-Finger-Kraut / Fuchs. Fünff-Blatt / Fünff-Finger-Kraut / Matth. Klein Fünff-Finger-Kraut / Brunf. Groß gemein kriechend Fünff-Finger-Kraut. Radice est oblongâ, foris nigricante, intus subrubente: Cauliculis rotundis virentibus, quaquà versùm humi reptantibus fragariae instar, & latè se diffudentibus: foliis quinquefoliis, viridibus, oblongis, serratis, pediculis longiusculis: floribus Anserinæ luteis, itidem longis petiolis instructis. Reliqua inter quinquefolia efficacissimum, & officinale usuale. Radices, folia & flores vehementer sed citra morsum ac manifestum calorem adstringunt, & siccant tertio recessu, venenæ ac pesti resistunt, & sangvinem undecunque fluentem cohibent. Radix decocta, ac triginta dies pota epilepsia medetur. Auf dem Tragheimischen Kirchhoffe. Item Bey der Schwanischen Mühl. Quinquefolium optimum sub elevatione poli graduum 45. 46. 47. 48. 49. natum, ac effosum Sole primum Arietis gradum inhabitante.

DLXXXVII. Qvinquefolium minus repens luteum, C. B. Pin. pag. 325. Klein kriechend Fünff-Finger-Kraut. Qvinquefolii minimum genus, vel primum, Trag. Kyber. in Trag. 505. Pentaphyllum minus luteum, Adv. Lob. fol. 307. In locis arenosis passim bey S. Albrecht.

DLXXXVIII. Qvinquefolium minus repens lanuginosum luteum, C. B. Pin. pag. 325. Pentaphyllum sive Qvinquefolium minus, Tab. ic. pag. 123. Qvinquefolii quarti flavo flore prima species, Clus. hist. lib. Qvinquefolii quarti secunda species, Clus. Pann. pag. 429. Klein kriechend Fünff-Finger-Kraut unten mit Aschfarben Blättern. Gemein Klein Fünff-Finger-Kraut / Tab. Foliis est suprà viridibus, infra

infrà cinereis, flosculis croceis. Radix & folia cum adstrictione siccant. In saxosis passim bey Königsberg.

Quinquefolium folio
eo. C. B. Pin. 325.

DLXXXIX. Qvinquefolium erectum luteum dorso foliorum incano. Joh. Lœs. Stehend Fünff-Finger-Kraut/ dessen Blätter auf einer Seiten ganz weiß. Radice est longiuscula, ex atro rufescente, & fibrosa: caulinis erectis cubitalibus, rufulis, lanugine candida, fastigium versus pubescentibus, & in ramulos abeuntibus: Foliis inferioribus longissimo albicante & hirsuto pediculo innitentibus, qui in reliquis brevior. Dividuntur autem folia in quinque lacinias, ex angusto ampliatas, per ambitum profundius incisas, superiore parte virescentes, dorso incanas. Flores habet croceos, quinquefolios, staminulis aureis, quos insequitur minutissimum semen, Bey der Kneiphofischen Wind-Mühl in arenosis.

Villa Norvegica. L.

DXC. *Qvinquefolium hirsutum luteum paucioribus laciniis. Joh. Lœs. Gelb raug Fünff-Finger-Kraut mit wenigern Blättern. Radix foris ex pullo ruffa, intus albicans & lignosa, longis fibris, caulinos edit cubitales, sèpè & maiores, rotundos, virides, hirsutos, multifariam brachiatos ac humili procumbentes, quibus folia adnascuntur oblonga, in tres tantum lacinias divisa, longis suffulta pediculis, pronâ parte virentia, dorso pallido, hirsutie villosa, per oras incisa, duobus aliis ad exortum pedicularum foliolis instructa, ex quibus novi subinde se emergunt thyrisci. Cacumina horum luteis exornantur flosculis, foliolis sustentatis suis, quibus succedit capitulum exile, frago haud absimile, in minutissima & facilè diffluentia semina transiens. Am Altstädtischen Wall nicht weit vom Baum.


DXCI. Qvinquefolium palustre rubrum, C. B. Pin.
pag.

Nº. 70. ad pag. 218.



Quinquefolium hirsutum
luteum paucioribus
lacinis.

Potentilla Norvegica. L.



pag. 178. Lob. ic. pag. 674. Tab. lib. 1. fol. 132. Gelbe Wald-Violen. *Ranunculus phragmites* flore luteo, Gesn. hort. fol. 246. *Ranunculi sylvestris* alterum genus, Trag. Kyber. in Trag. p. 97. *Ranunculi quarta species* lutea, Fuchs. fol. 162 *Anemone sexta*, Dod. Lat. fol. 435. *Ranunculus nonus*, Lon. deutsch fol. 199. *Ranunculi tertia species*, Cord. hist. fol. 120. *Ranunculus nemorosus* flore luteo, Adv. Lob. fol. 300. Eystett. *Anemone montana* colore luteo, Cæs. lib. 14. c. 10. pag. 549. Ein unbekant Wald-Kraut. Brunf. deutsch fol. 111. *Herba sylvestris ignoti nominis*, Brunf. Lateinisch/ tom. 2. fol. 80. Geel Aprillen-Blumen. Geel Wald-Hänlein. Tab. Lon. Fuchs. Geele Hasel-Blumen quibusdam. Vis ei exulcerans. Bey Lauten-Mühl in fruticetis.

DXCIII. *Ranunculus nemorosus* albus, Tab. lib. 1. fol. 132. *Ranunculus nemorosus*, Lob. ic. pag. 673. *Ranunculus candidus*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 74. *Ranunculi quarta species* lactea, Fuchs. fol. 161. *Ranunculi quarta species*, Cord. hist. fol. 120. *Ranunculus sylvarum*, Clus. hist. lib. 2. fol. 247. *Anemone quinta*, Dod. Lateinisch fol. 435. *Anemone sylvestris vulgaris* flore niveo, Clus. Pann. pag. 385. *Ranunculus octavus*, Lon. deutsch/ f. 199. *Ranunculus phragmites* flore albō, Adv. Lob. fol. 300. *Anemone montana* colore candido, Cæs. lib. 14. cap. 10. pag. 549. *Ranunculi tertii*, tertium & quartum genus, Thal. pag. 96. & 97. *Anemone nemorosa* flore majore, C. B. Pin. pag. 176. Weiß Aprillen-Blumen / Sebitz. in Trag. Weiß Wald-Händlein/ Tab. Fuchs. Lon. Augen-Wurz/ und weiß Hirsch-Blum quibusdam. Weiße Violen Boruss. πυρωλίνος est, lingvam acredine vellicans. Succus vertucas aufert illitu. Ternos ejus flores, intuitu primo, verno

tempore notatos ac totidem Hepaticæ nobilis, superstitionis plebs ingerit adversus febrim, quam metuit. In sylvis & frumentis passim. Vere primo.

DXCIV. *Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus*, C. B. Pin. pag. 178. *Aristolochiæ rotundæ concavæ similis herbula*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 608. *Moschatella, Cord. hist. fol. 172. Moschatella Cordi, Thal. pag. 78. Moschatella, Cam. hort. pag. 103. Fumaria bulbosa seu tuberosa minima*, Tab. ic. p. 39. *Ranunculus minimus Septentrionalium herbido musco flore & Muscatella Cordi, Lob. ic. p. 674. Biesem Hanen Fuß. Kleinstes Hollwurz/ Biesem Kraut/ Tab. Acris est & moschum olet. In der Hollen-Grund passim.*

Ranunculus montanus. DXCV. * *Ranunculus nemorosus hirsutus foliis Caryophyllatæ*. Joh. Lœs. *Rauher Wald Hanen Fuß mit Benedicten Wurz Blättern*. Radix è filamentis longiusculis constituta caulem emittit hirsutum in summitate ramosum, cui alternatim assistunt folia, profundis & minus profundis incisuris, hirsuta, thyrsulis longis insistentia, quorum inferiora in latiore solo nonnunquam tam grandia, ut digitis expansis peripheria vix exauriri possit. Sæpius tertiam partem ejus granditatis haut sunt, & subsequentia folia longè minora. Cauliculus ubi promit caulis in exortu, terna iis committit folia, mox cuminumibus eorum flosculos indulget aureos, foliolis quinque constantes, semine post in capitulis congesto. Floret Mense Mayo. *Bey Selnicken in fruticetis. Item im Penartischen Walde/ und in der Hollen-Grund.*

DXCVI. *Ranunculus pratensis erectus acris*, C. B. Pin. pag. 178. *Ranunculus luteus*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 73. *Ranunculus pratensis surrectis cauliculis, Lob.*

No 71 ad pag. 220.



*Ranunculus nemorosus hirsutus
foliis Caryophyllatae.*

Ranunculus Lajuginosus. L.C.



Lob. ic. p. 665. *Ranunculus sylvestris* & *secundus*, Tab. lib. I. fol., 131. *Ranunculus hortensis secundus*, Dod. Lateinisch / fol. 426. *Ranunculus polyanthemus maculatus*, Thal. pag. 98. Aufgerichtet stehend scharffer Wiesen-Hanen-Fuß / wilder Hanen-Fuß. Tab. Gelb Hanen-Fuß. Sebitz. in Trag. Acker-Hanen-Fuß quibusdam. Folia Persicariæ instar nonnunquam maculantur, & tūm vehementius urunt. In pratis passim.

DXCVII. *Ranunculus pratensis repens hirsutus*, C. B. Pin. p. 179. *Ranunculus pratensis etiamq; hortensis*, reptante caulinco, Lob. ic. p. 664. *Ranunculus hortensis primus*, Dod. Lateinisch / fol. 425. *Ranunculus vinealis*, Batrachium vineale, Tab. ic. pag. 54. Kriechender Wiesen-Hanen-Fuß / Weingart-Hanen-Fuß / Weihen-Fuß / Tab. In hortis proveniens latioribus est foliis, in pratis minoribus. Calidus & exurens est. In arvis passim.

DXCVIII. *Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda*, C. B. Pin. pag. 197. *Crus galli*, Brunf. Lateinisch / tom. I. fol. 145. *Ranunculus bulbosus*, Lob. ic. p. 667. Thal. pag. 96. *Ranunculus radice bulbosâ*, Cam. hort. pag. 136. *Ranunculus tuberosus*, vulgo Rapum D. Antonii, Dod. Lateinisch / fol. 431. *Ranunculus exiguus & primus*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 73. *Ranunculi tertia species*, Fuchs. fol. 160. *Ranunculus minor*, flam-mula, seu *Ranunculi nona species*, Cord. hist. fol. 121. *Ranunculus minor*, Tab. lib. I. fol. 131. *Ranunculus quintus*, Bauh. Matth. fol. 459. Lon. deutsch fol. 199. *Ranunculus flammula dictus*, Gesn. hort. fol. 275. *Ranunculus lanuginosus primus*, Cæs. lib. 14. c. 2. p. 544. Vulgo Rapum Divi Antonii, Dod. Lateinisch / fol. 431. *Brenn-Kraut* / Hanen-Fuß

Fuß mit runder Wurzel. Kleiner Hanen-Fuß/ Tab. Brunf. Fuchs. Der kleine und schalchastige Hanen-Fuß/ Sebitz. in Trag. Drüs-Wurz/ Lauben-Fuß/ Lon. Hanen-Fuß oder Gleiß-Blumen die fünsste/ Matth. Rüben-Hanen-Fuß vulgo. Gehößlete Gleiß-Blümlein/ Helvet. Gesn. hort. In locis saxosis minor est, in hortis altior, in pratis medioximus. Radix quotannis nova exoritur, veteri deorsum missa. Pesti correptorum juxta Tragum eadem cum sale tusa femori aut brachio utiliter affirmatur, virus evocandi causâ: Locum quippe celerimè exulcerat, vesicâ inductâ. Bey Königsberg passim. Nach der Lauten-Mühl 3.

DXCIX. Ranunculus arvensis echinatus, C. B. Pin. pag. 179. Ranunculus arvorum Lob. ic. pag. 665. Ranunculus arvensis angustifolius sive decimus quartus, Tab. lib. i. fol. 134. Ranunculus arvensis, Gesn. hort, fol. 275. Ranunculus sylvestris tertius, Dod. Lateinisch fol. 427. Ranunculi hortensis simplicis prima species, Fuchs. fol. 157. Ranunculus sativus, Fuchs. ic. pag. 86. Ranunculus arvensis sive quinta species, Cord. hist. fol. 120. Acker-Hanen-Fuß mit stachlichten Köpfen. Acker-Hanen-Fuß/ Tab. ungeföllter Garten-Hanen-Fuß/ Fuchs. Flosculis provenit luteis, quibus semen succedit spinis horrens. Am Weiseltame/ ubi trajectus pontone Dantisco Elbingam versus.

DC. Ranunculus palustris Apii folio levis, C.B. Pin. pag. 180. Glatter Eppichblättriger Wasser-Hanen-Fuß. Apium aquaticum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 93. Ranunculus palustris rotundiore folio, Lob. ic. pag. 669. Apiastrum primum, Cord. in Diosc. fol. 57. Ranunculus palustris Cord. hist. fol. 119. Thal. pag. 99. Ranunculus palustris folio Apii, Cam. hort. pag. 136. Ranunculus palustris sive tertius, Tab. lib. i. fol. 131. Ranunculus primus, Bauh. Matth.

Matth. fol. 457. Ranunculi primum genus, Gesn. hort. fol. 275. Ranunculus tertius, Lon. deutsch fol. 198. Wasser-Hanen-Fuß / Tab. Lon. Wasser-Eppich / Brunf. Lon. Frisch-Pfeffer / Feig-Blattern-Eppich / vulgò. In locis uliginosis passim.

DCI. Ranunculus palustris Apii folio lanuginosus, C. B. Pin. pag. 180. Ranunculi secunda species, vel Sardous Ranunculus Cord. hist. fol. 119. Ranunculus secundus, Bauh. Matth. fol. 458. Rauher Eppich-blätterichter Hanen-Fuß. Hanen-Fuß oder Gleiß-Blum die andere, Matth. Lanuginosus est, & plusculis foliorum incisuris. In incultis & arenosis passim bey Königsberg.

DCII. Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo, C. B. Pin. pag. 180. Wasser-Hanen-Fuß theils mit runden theils mit haarächtigen Blättern. Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie, Lob. ic. pag. 75. o. Ranunculus fluviatilis, Tab. lib. I. fol. 144. Ranunculus aquatilis, Dod. Lateinisch fol. 587. Wasser-Hänlein / Tab. Flüß-Hänlein / Flüß-Hanen-Fuß / Wasser-Leber-Kraut / Flüß-Leber-Kraut und Wasser-Leber-Blümlein vulgò. In lacunis auf der Alstädtischen Klapper-Wiesen.

DCIII. Ranunculus longifolius palustris major, C. B. Pin. pag. 180. Ranunculus lanceatus major, Tab. lib. I. fol. 135. Ranunculus ~~πλατύφυλλον~~, Thal. p. 100. Gross lang Wasser-Hanen-Fuß / Tab. Grosser Speer-Hanen-Fuß vulgò. Circa radicem, quæ ex filamentis constituitur, caulinuli concavi ac geniculati notantur iisque repentes, à Tabern. omitti, quorum singulis geniculis additæ sunt fibræ, radicationi destinatae. Filamentis illis tenaciter affirmari conspicies corpuscula quædam oblonga ac nigricantia, ex quibus

tractu temporis prodeunt muscæ subvirides, ac velut auratæ, alas sub velamentis gestantes, quæ circa finem mensis Augusti avolant, nidulis suis post se relictis. Accidit hoc in Museo meo, ubi, postquam ranunculum quatuordecim ferè dies servâsssem, ac corpusculum unum, jam nonnihil lacerum, aperuissem, exiit musca lento gressu, qvæ apricitate diei excitata paulò pôst avolabat, me spectante. Provenit in der Hollen-Grund. Item hinter Fischhausen in pratis uliginosis.

DCIV. Ranunculus palustris serratus, C. B. Pin. p. 150. Ranunculus aquatilis angustifolius serratus, Lob. ic. pag. 670. Flammula Ranunculus folio serrato, Dod. Lateinisq. fol. 432. Ranunculus lanceatus serratus, sive decimus nonus, Tab. lib. I. fol. 135. Langer Wasser-Hanen-Fuß Tab. Ge-kersst Speer-Kraut/ und gekersst Langer Wasser-Hanen- Fuß vulgò. In humidis & riguis passim. Radix denti ero-fo inserta, excidium ei parat. In affectu febrili rustici hōc utuntur Ranunculō. Ranunculi hujus folia manuum carpis, ubi arteriæ subsultim ludunt, paroxysmo ingruente, affirmata, die naturali elapso remota, ac flammis cremata, quartanam febrim expugnant, vicibus tribus ante paroxysmum re instituā. Flammulam ranunculum ab ullo unquam ore assumptum fuisse, nuspam invenio apud Botanicos. Verū ex vulgo sunt, qui eundem in scorbuto præsentissimum esse præsidium clamitant, ac multos eo restitutos dicitant. Capiunt autem succi libram unam, commiscēt vini Francici libras duas, maceraturi tempus benè longum miscellam. Pôst dimidium cochlear porrigunt scorbuticum malum vel metu-entibus, vel nutrientibus. A credinē medicamenti in ven-triculo si sentiunt assumentes, indicium est, satis fuisse assumptum, si minus, cochlear totum ingerendum præbent. Ra-nun-

nunculi folia colligenda, Sole in & hærente: flores Sole 15. & inhabitante.

DCV. Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso, C.B. Pin. p. 182. Hanen Fuß mit Wolffwurz Blättern/ und Kugelrunden Blumen. Ranunculus alpinus luteus, sive undecimus, Tab. lib. 1. fol. 133. Trollius flos, Gesn. in monte fracto. Trollius flos ampliore flore & aureo. Clus. Pann. pag. 372. Ranunculus sextus, Bauh. Matth. fol. 459. Anemone montana quædam, Gesn. hort. fol. 247. Ranunculus flore globoso, Dod. Lateinisch. fol. 430. Eystett. Ranunculus montanus alpinus glomeratus, Lob. ic. pag. 675. Ranunculus globosus sive montanus, Cam. hort. pag. 137. Alphanen Fuß. Tab. Troll Blum/ Glocken Blum quibusdam. Ad pratorum margines beym Penartischen Walde.

DCVI. *Ranunculus aconitifolius folio rotundo ad radicem præstolante. Joh. Lœs. Hanen Fuß mit Wolfs- wurzhafstigen Blättern/ da ein rundes Blat an der Wurzel sitzt. Radix ex filamentis albido exstructa, caulem edit cubitali, rotundum, viridem, fastigium versus brachiatum & geniculatum: imo geniculo folium undecim laciniis circumferratis & virentibus superbiens, reliquis geniculis folia paucioribus divisuris assident, queis subservit aliud degener folium, orbiculatum & crenatum, petiolum longum à radice mutuans: flosculis est croceis in caulium summo hæsitantibus. In Districtu Elbingensi, & quidem in cavâ valle, juxta tramitem Pfaffen Steig/ quâ itur à pago Lenzen ad pagum Dörbeck. Item bey Lauten Mühl. Mensa Majo.

DCVII. Raphanus sylvestris, Fuchsl. fol. 660. Thlaspi alterum, Diosc. lib. 2. c. 186. ραφανίς ἀγέια, Diosc. lib.

Ranunculus
folius vernus, syl-
major, vel laevi-
bus, Shore seu Cal-

Breyn Prodri. 1. 4.

lib 2. c. 138. Raphanus major, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 584.
 Gesn. hort. fol. 275. Raphanus vulgaris seu rusticanus, Bauh.
 Matth. f. 350. Thlaspi majus, Cord. in Diosc. f. 46. Lon. deutsch
 fol. 196. Thlaspi magnum. Cæs. lib. 8. cap. 78. pag. 367.
 Raphanus rusticanus, C. B. Pin. pag. 96. Raphanus rusticana-
 nus crassa radice, Lapathii folio, Lob. ic. pag. 320. Rapha-
 nus rusticus, Cam. hort. pag. 138. Raphanis magna, Radi-
 cula magna, aut rusticana, Dod. Lateinisch/ 677. Raphanus
 marinus Tab. lib. 2. fol. 124. Raphanus agrestis sive Ar-
 moracia, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 197. Meerrettich/
 Tab. Fuchs. Sebitz. in Trag. Lon. Kreeu/ Matth. Merrich
 oder Bauren-Senff quibusdam. Calidus tertio, siccus se-
 cundo; tum radice, tum semine, crassa incidit, obstructa ape-
 rit, renes expurgat, urinas mensesque ciet, calculos commi-
 nuit, & scorbuticos juvat. Folia decocta & cum oleo in ca-
 taplasma aptata, jecoris ac lienis duries molliunt, & urinæ
 stillicidio auxiliantur, Dod. In prato beyni Mühlen-Fluß
 zu Schwantis. Semen nullum fert, Autore Gesnero in
 Hort. fol. 196. Raphanus pœna olim erat adulterorum. In
 Attide qui alterius vitiasset uxorem, raphano per obſcœna
 afficiebatur, ut eâ ignominia notatus, à contagio alienæ uxo-
 ris abstineret. Apud Cumæos contrà adultera asino impo-
 sita traducebatur, dicebaturque ὄνθας, teste Plutarcho in
 Quæſtionibus Græcis. Pœna autem raphano iliata ραφαί-
 δοτις, h. e. raphani in podicem impulsio, dicebatur Atheni-
 ensibus, unde ραφαίδως, qui tali pœnâ excruiciabantur:
 quemadmodum ωραῖλεως, quibus vibrissæ ē naribus, &
 pili ē pudendis, ob adulterium, evellebantur. Insignem
 verò dolorem ex raphanidosi patiebantur mœchi, majorem
 ex mugili, omnium sævissimum ex scorpio pisces. Juvenalis:

- - - quosdam Mæchos & mugilis intrat.

Hora-

Horatius aliud quid adultero, alienas permolere uxores dedito,
accidisse memorat, lib. I. Satyr. 2.

*Hunc perminixerunt calones, quin etiam illud
Accidit, ut cuidam testes caudamque salacem
Demeteret ferrum. jure omnes: Galba negabat.*

Notandum hic esse censeo (ut extra oleas ferar sit venia,) vim vulgaris raphani ελκυστικήν, quā orbes stanneos vel ligneos cum adstantium stupore attollit hoc modo: Capitulum raphani cum herbidae caulium substantiā assulosè abscissum, sali communi immittatur, mox creberrimo circumactu in meditullio orbis factō, ut sal liquefaciat, orbi fortiter imprimitur, quo pressu & agitatū capitulum orbi ita affirmatur, ut in altum eundem sustollat, servetque diu. Reliquum quicquid est raphani cum radice, ægrius idem præstat, quod saepius sum expertus. Causam rei alibi evolvemus.

DCVIII. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis, C. B. Pin. pag. 97. Radicula sylvestris, Dod. Lateinis̄/ fol. 677. Raphanus sylvestris officinarum aquaticus, Lob. ic. pag. 319. Raphanus aquaticus Tab. lib. 2. fol. 123. Sisymbrium sylvestre, Cæf. lib. 8. cap. 69. pag. 362. Wässerrettich mit tieff zerschnittenen Blättern/ Wässer-Rettich/ Tab. Wilder Rettich vulgo. Foliis est nunc brevioribus & angustioribus, quorum ambitus quandoque est serratus, quandoque profunde incisus: nanis flosculis luteis, ramusculos caulium exornantibus, & in minutas siliquas desinentibus: radice gustu acri & mordace. In lacunis bey der neuen Brück.

DCIX. Raphanus aquaticus alter, C. B. Pin. pag. 97. cuius icon in Prod. pag. 38. Rapistrum aquaticum, Tab. lib. 2. fol. 118. Wässer-Hederich/ Tab. Radix copiosissimis filamentis

mentis caules promit, inferiùs magnis & latis instructos foliis, quæ cacumina versùs sensim angustantur, acuminantur & incidentur. Caulium summitates flosculis candidis, stellatis exornantur. In Danziger Werder milliare dimidium ab urbe circa fossam.

DCX. Rapistrum flore luteô, C. B. Pin. pag. 95. Rapistrum, Brunf. Lateinisch tom. 3. fol. 159. Dod. Lateinisch fol. 675. Gesn. hort. fol. 275. Sinapis agrestis alterum genus Trag. Kyber. in Trag. pag. 100. Lampsana, Bauh. Matth. fol. 356. Lon. deutsch/ fol. 225. Lampsana flore melino, Tab. lib. 2. fol. 118. Rapistrum arvorum, Lob. ic. 198. Raphani altera species in arvis proveniens, Cord. in Diosc. fol. 44. Radix sylvestris, Cæs. lib. 8. cap. 55. pag. 353. & 354. Hederich/ Brunf. Nostrates verulæ olera decocturæ his plerumque ammiscent folia tenella rapistri lutei, commendata sapore toties. Hederich/ oder Heiden-Rettich/ Lon. Acker-Kohl mit bleichgelben Blumen/ Tab. Kündig Nostratibus. In arvis passim. Foliis est nunc incisis, & sinuatis, nunc integris.

DCXI. Rapunculus spicatus, C. B. Pin. pag. 92. Grossse Rapunzel mit einer Fuchs-Schwanz-Aehr. Rapunculum sylvestre, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 576. Lon. deutsch fol. 224. Rapunculus quintus, sive nemorosus primus, Tab. lib. 2. fol. 120. Rapunculum alopecuron, Dod. Lateinisch fol. 165. Rapunculus sylvestris spicatus albens, Thal. pag. 94. Phyteuma foliis rapunculi, Cæs. lib. 9. cap. 30. pag. 386. Rapuntium majus Alopecuri comoso flore, Lob. ic. pag. 329. Adv. Lob. fol. 140. Rapunculus flore spicato albo, Cam. hort. pag. 138. Rapunculus alopecuroides longiore spicâ Clus. hist. lib. 5. fol. 173. Wald-Rapunzel

Convolvulus



Nº 73. ad pag. 229.



Ranunculus scabiosæ capitulo candido.

ſel/ Tab. Sebitz, in Trag. Lon. In umbrosis bey Gladau.
Item im Penartischen Walde.

DCXII. Rapunculus scabiosæ capitulo cœruleo, C. B. Pin pag. 92. Rapunzel mit blauen scabiosen- Käpflein. Scabiosa minor, Dod. Lateinisch/ fol. 122. Scabiosa sylvestris minor cœrulea, Eystett. Rapuntium montanum capitatum Leptophyllum, Column. min. cogn. stirp. & rar. part. i. pag. 227. Scabiosa media, Lob. ic. p. 536. Scabiosa media serrato angustifolio flore globulariæ, Adv. Lob. fol. 232. Schaaf- Grind-Kraut / Apostemen-Kraut mit hochblauer Bluhm. Folia modò lœvia sunt, modò hirsuta. Icones apud Lob. & Dod. etiam crenas foliis assignant, quas observare in nostrate hactenus non licuit. In incultis præsertim siccoribus passim.

DCXIII. *Rapunculus scabiosæ capitulo candido. Joh. Lœs. Schaaf-Grind-Kraut / Apostemen-Kraut mit weißer Bluhm. Foliis est angustis, tenuibus, lino æmulis, leviter crispatis, ac hirsutis, quæ circa radicem numerosissima. Thyrsulis protensis, rotundis, viridibus, quorum intermedium mediâ suâ parte nudus. Summitati eorum flosculus insidet, albus, conglomeratus, figurâ conglobatâ, qui paulatim præsior dilatatur. Radix villosa albicat. Beym Löbnichtschen Walde in incultis.

DCXIV. Rapunculus persicifolius magno flore. C. B. Pin. pag. 93. Pfirsichen-blätterig Rapunzel mit gros- sen blauen Glocken-Blumen. Campanula persicifolia no- stras, Lob. ic. pag. 327. Campanula persicæ folio, Clus. hist. lib. 5. fol. 171. Phyteuma, Bauh. Matth. fol. 827. Phy- teuma Marthioli, Cam. hort. pag. 125. Campanula angu- stifolia, Tab. lib. 2. fol. 33. Campanula media, Dod. Latei- nisch/ fol. 166. Rapunculus campanulatus Nerii folius pri-

mus, Thal. pag. 95. *Campanula alba & cœrulea*, Eystett. *Klein Glöcklein* Tab. *Blaue Glocken* quibusdam. Flore conspicitur modò cœruleo, modò albo, hinter Latten-Walde im See-Gebirge; item bey Rumänen in umbrosis.

DCXV. *Rhamnus catharticus*, C. B. Pin. pag. 478. *Purgierende Stechdorn oder Creuz-Beer*. *Spina cervina* vulgò dicta *Ialis*, Gesn. hort. fol. 282. *Spina alba* Lon. deutsch fol. 59. *Spina infectoria*, Bauh. Matth. fol. 144. Lob. ic. pag. 181. o. *Spina infectoria pumila prima*, Clus. hist. lib. 1. fol. III. NB. vid. Bauh. loc. cit. sub No. IX. *Rhamni alia species*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 979. *Cervis-pina*, Cord. hist. fol. 175. *Rhamnus solutivus*, Dod. Lateinisch fol. 756. *Spina cervalis vulgò*, Cæs. lib. 3. cap. 17. pag. 101. *Creuz-Beer* Lon. *Wegdorn-Beer* Kyber. in Trag. *Creuz-Holz* Nostratisbus; *Folia refrigerant & siccant*. *Baccæ gustù amaræ & nonnihil adstringentes*, calidæ & siccæ sunt ordine secundo, humores serosos, biliosos ac pituiteos purgant, pollinis drachmâ 1.sumptâ. *Syrupus ex succo baccarum*, qui domesticus nominatur in arthritide cachexia, hydrope, & paralyse commendabilis est. *Baccæ virides ac immaturæ croceum præbent colorem*: nigræ verò ac maturæ cum modico aluminis in mortario pistilli circumactu tritæ, saturatè viridem, quem *Safft-grün* nominant. Suppeditant & puniceum colorem, circa festum Martini ab arbore lectæ. *In der Hollen-Grund*; Item bey Lauten-Mühl inter fruticeta.

DCXVI. *Rhamnus salicis folio angusto, fructu flavescente*, C. B. Pin. 477. *Schmaler Weiden-blättriger Stechdorn*. *Rhamnus secundus*, Matth. deutsch fol. 48. Dod. Lateinisch fol. 755. Lon. deutsch fol. 76. Clus. hist. lib.

lib. i. fol. 110. Clus. Hisp. pag. 67. Rhamnus primus Dioscoridis creditus, Lob. ic. pag. 180. o. Oleaster Germanicus, Cord. hist. fol. 186. Rhamnus quorundam, Cam. hort. pag. 139. Stechdorn der ander. Matth. Lon. Rothe Schlehen Borussis. Ad littus maris passim. Bey Dirschkeim. Item bey der Valga am Hafe. Rhamni alterum genus Cæl.

DCXVII. Ros solis folio rotundo, C. B. Pin. pag. 357. Rund-blättriger Sonnen-Thau. Ros solis, Dod. Lateinisch/ fol. 474. Cam. hort. pag. 142. Lon. deutsch fol. 304. Rorella minor prima, Tab. lib. 2. fol. 490. Rorella sive ros solis, Eystett. Rorida sive Ros solis major. Lob. ic. pag. 811. Salsirora, seu sponsa solis, Thal. pag. 116. Sonnen-Thau/ Lon. Kleiner Sonnen-Thau der erste / Tab. Sindau und Sonnen-Löffel quibusdam. Hinter dem Krantz-Krige diesseits den Sand-Bergen nach der Sarckau zu copiosissimè. Item bey Schwanis in muscosis. Item bey Schreitlacken im Gebrüch. Planta hæc ipsâ meridie guttata est, guttulis se rorans, unde nomen herbæ. Mirabilius est, in Insula Ferro, ex Canariis unâ, omnis pluvia, rivorum ac fluminum experte, arborem dari cottidie foliis suis aquam stillantem lympidam, ac gustu svavem, ad quam hauriendam homines accöteræ animantes ex totâ cursim currunt Insulâ sitis pellendæ causâ. Foliis crescit nucis juglandis, fructus fert querçus. In Itinerariis passim.

DCXVIII. Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. C. B. Pin. 483. Wilde Fleisch-farbe riechende Hahnbotten oder Feld-Rosen. Cynosbatus Dioscoridis, Lon. deutsch. fol. 61. Rosa sylvestris, Bauh. Matth. fol. 166. Tab. lib. 3. fol. 788. Gesn. hort. fol. 276: Dod. Lateinisch/ fol.

fol. 186. *Rosa sylvestris odorata incarnato flore.* Eystett. *Rosa sylvestris primum genus,* Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch/ fol. 773. *Rosa canina odorata,* & *sylvestris Rosa,* Lob. ic. pag. 210. o. *Cynosbatos,* sive *Cynorrhodos procerior,* Cord. in Diosc. fol. 19. *Rosa canina,* Cam. hort. pag. 146. *Rosa sylvestris altior,* Cæs. lib. 3. cap. 10. pag. 97. *Cynorrhodos seu Rosa canina,* Thal. pag. 35. *Hedc Rosen/ Tab.* Sebitz. in Trag. *Hanbutten oder Han Rosen/* Lon. *Feld-Rosen/ Frauen-Rose/ Marien-Dorn/ Korn-Rose/ Haber-Rose/ Hund-Rosen/ Büttel-Rosen/ Heyd-Rose vulgò.* *In der Hollen-Grund inter fruticeta passim.* Item bey *Sünniken* alibique. *Spongiola aliquando adnascitur.* Vid. Dod. loc. cit.

DCXIX. *Rubus vulgaris,* sive *Rubus fructu nigro,* C. B. Pin. pag. 479. *Schwarze Brom-Beeren.* *Rubus, Brunf.* Lateinisch/ tom. 2. fol. 186. Matth. Deutsch fol. 427. Lob. ic. pag. 211. o. Lon. Deutsch/ fol. 57. Fuchs. fol. 152. Dod. Lateinisch fol. 742. *Rubus primus,* Cæs. lib. 3. c. II. pag. 28. *Rubus arvensis,* Tab. lib. 2. fol. 587. *Rubus grandis & secundus,* Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch fol. 660. *Rubus Batis,* Adv. Lob. fol. 446. *Rubus vulgaris,* Gesn. hort. fol. 277. Thal. pag. 102. *Brombeerens/ Brunf.* Fuchs. Lon. Tab. *Brombeer/ Bremen/* Matth. *Bey der Altstädtischen Ziegelscheune.* Item bey *Fischhausen im Rosen-Pusch* copiosè, qui locus verius rubetum dici posset. *Rubus hic virgultis grandioribus retrorsùm reflexis ad terram inclinat, reptatu propagationem acqvirens,* foliis est hirtis aculeatis, ac vegetis, deciduis tūm demūm, ubi novella pululant folia. *Fructus niger est, sapore dulcis, cum acre grato.* *Refrigerat & siccat Aut.* Diosc. *Galeo turiones aqueæ*

aqueæ sunt substantiæ cum modicâ adstrictione. Fructus maturus temperatus est dulcedine suâ, & nonnihil adstringens: immaturus acerbis, vehementius siccans & adstringens. Folia decocta foriolas juvant, dysentericos ac mulieres nimio menstruorum fluxu discriuiatas. Salmonius apud Athenæum rubi fructum appellat Batium. Rubus βάτης est, inde vox βάθος. Rudimentum fructus rubi, vel mori, olim spica vocabatur, quia spicæ simile. Sophocles:

*Primum quidem cernes candidam que floret spicam,
Deinde teres atq; puniceum morum.*

Succo mororum acidorum olim mulieres faciem fucabant, ac inde οὐωπιασμέναι vocabantur. Pugnis eo nomine à maritis exceptæ, verius οὐωπιασμέναι dici possent, à livore oculos & faciem sugillante.

DCXX. Rubus repens fructu cœsio. C. B. Pin. pag. 479. Rubus minor, Dod. Lateinisch fol. 742. Rubus humilis Belgicus, Clus. Pann. pag. 115. Clus. hist. lib. 1. fol. 118. Rubus humilis & primus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 660. Rubi alterum genus, Cæf. lib. 3. cap. 11. pag. 98. Rubus reptans, Adv. Lob. fol. 446. Rubus hic cœsio fructu virgultis suis spinosis terræ se insinuat, ac novis radiculis impetratis sui generationem uberioris promovet, agros sæpè totos occupando. Fructus cœruleus sapore est dulci. Blaue Krähe Beeren Nostratisbus. In arvis passim.

DCXXI. Rubus idæus spinosus, C. B. Pin. pag. 479. Rothe Hind-Beeren. Rubus idæus, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 660. Matth. deutsch f. 428. Lob. ic. pag. 212. o, Gesn. hort. fol. 277. Thal. p. 102. Dod. Lateinisch fol. 743. Rubus idæus Dioscoridis, Lon. deutsch fol. 58. Rubus idæus vulgaris Clus. hist. lib. 1. fol. 117. Rubus idæus exilibus

spi-

spinis, Cord. in Diosc. fol. 63. Rubus rertius montibus proprius, Cæs. lib. 3. cap. II. pag. 98. Hindt / Beeren. Matth. Himbeern. Sebitz. in Trag. Lon. In der Hollen-Grund. Item auff dem Lenzen-Berge.

DCXXII. Rubus saxatilis alpinus, Clus. hist. lib. I. fol. 118. Kleine Stein-Beeren/ Clus. Pann. pag. 115. Chamaerubus saxatilis, C. B. Pin. pag. 479. Rubus parvus saxatilis alpinus Cam. hort. pag. 149. Rubus alpinus humilis, Gesn. hort fol. 277. Rubus minimus, Thal. pag. 102. Stein-Beer/ Thal. Brunitschken/ Accolis maris Balthici. Auf der Curländischen Nährung in den See-Gebirgen passim, hinter Latten-Walde. Item bey Bladau in umbrosis. Antiscorbutica planta est.

Sagittaria Sagittifolia. L. 1. o.
DCXXIII.* Sagitta aquatica foliis variis. Joh. Lœf. Radice est albidis, rotundis & articulosis filamentis, foliis bicubitalibus effigie suâ evariantibus: quorum nonnulla crassiuscula & triangula ferè, intus spongiosa, & in summitate sagittifera sunt: alia latiuscula, nervosa & minus crassa, subacuminantur: alia vel hastulæ in modum effigiantur, vel sagittalis formæ aliquantillum adsciscunt. Caulis est rotundus, lævis, junceâ intus substantiâ, qui in ramulis flosculos gerit albicantes, tribus foliolis, staminibus ex luteo purpurascensibus. His succedit fructus capitosus, uti in vulgari. Groß Pfeil-Kraut mit mancherley Blättern. Im Pregel passim.

DCXXIV. Sagitta aquatica minor latifolia, C. B. Pin. pag. 194. Sagitta, seu sagittalis, Cord. hist. fol. 86. Sagitta minor, Bauh. Matth. fol. 797. Dod. Lateinisch fol. 588. Tab. lib. 2. fol. 415. Adv. Lob. fol. 127. Sagittaria minor, Lob. ic. pag. 302. Klein breitblätterig Pfeil Kraut/ Tab. Matth.

Kleine

No. 74 ad pag. 234.



*Sagitta aquatica
foliis variis.*

Sagittaria Sagittifolia. L.S.

Kleine Otter-Zung quibusdam. In undis stagnantibus passim. Bem Philosophischen Gang.

DCXXV. Sagitta aquatica minor angustifolia, C. B. Pin. 149. Sagitta minor angustifolia, Tab. lib. 2, fol. 416. Klein schmalblätterig spätig Pfeil-Kraut/ Tab. Fœmellis sterilitatem detestantibus salutaris. Am Pregel hinter dem Bretter Krug.

DCXXVI. Salix prima, vel procera, Dod. Lateinisch fol. 842. Salix perticalis, Cord. in Diosc. fol. 21. Salicis quartum genus, Lon. Deutsch fol. 42. Salix Dioscoridis, Lob. ic. pag. 136. Salix vulgaris alba arborescens, C. B. Pin. pag. 473. Große Salweyblättriche Kampweide. Foliis est oblongis in acutiem tendentibus, superiore parte virentibus ac glabris, aversâ molli & albâ, lanugine obsitis, in ambitu exiguè, ac desultoriâ quasi operâ incisis. Ramuscotorum cortex albidus & lanosus ut plurimum est. Perticæ ac pali ex hâc sœpiusculè fiunt. Folia, flores & cortices salicum refrigerant circa morsum, siccant & adstringunt, cruentum vulnus glutinant, ac inflammationi resistunt. Flores cum lanugine naribus inserti, vel in pollinem acti, & calamo sursùm efflati, hæmorrhagiæ medentur. Aqua nucamentorum adversus ἀνασόμωσιν, διαιρετινή ρηγή vasorum, efficax est. Corticum cinis aceto mistus, verrucas & clavos aufert. Folia recentia somnum accersunt, lotionibus addita. In pagis passim. Bey Bladau. Salix rusticis, sagis ac veneficis, virgulas promit, quas Francones Alp-Rutten nominant. Alpen Dæmones esse credunt, in pascuis & uliginosis locis oberrantes, cum quibus fœdera feriant, ut nocentiores sint pecudum, vel etiam hominum generi. Ægritudinem armentis vel hominibus Dæmonum horum ope illatam, Germani Elven vocant.

Unde locutiones: Das Vieh oder der Mensch hat die Elben.
 It: Es sind dahin und dahin so viel Elben ins Leib gezaubert.
 Sciscitanti quid Elben sint, respondent, vermes esse minutos,
 rubellis capitulis, man^o ac pedes frequentissimè occupantes, qui
 non nisi magicis remediis enecantur. Alias licet cultello exscin-
 dantur, de integro tamen dictis in locis generantur. Simile
 quid veneficæ apud nos agunt Dæmonibus subterraneis, quos
 Unter-Erdtschen appellant. Ut autem scias, quid sint illæ
 virgulæ, Alprutten dictæ, rem ita habe: Salices, rubris ma-
 xime corticibus vestitæ, pullulos quandoque geminos è sim-
 plici excludunt gemmâ, firmissimè invicem connatos, ac
 cortice communi tectos, effigie digitorum duorum, glutine
 junctorum. Usus: Germen dictum rustici ante Solis exor-
 tum ab arbore resecant, eoque plagosum pecus, malo hoc dis-
 cruciatum, sèpiùs flagellant, plagis integrum triduum, ante
 ortum & occasum Solis, morbido pecori impositis. Sunt,
 qui obsecros & fascinatos hoc remedio in integrum restitutum
 iri dictitant. Hippiatri equos (die den rittenden Wurm ha-
 ben) hoc præsidio fuisse adjutos, serio attestantur.

DCXXVII. *Salix caprea rotundifolia*, Tab. lib. 3.
 fol. 745. *Salix lato folio*, Gesn. hort. f. 278. *Salix latifolia ro-
 tunda* C. B. Pin. p. 474. *Salix latifolia*, Cam. hort. p. 151. *Sa-
 lik Platiphyllos*. Adv. Lob. p. 423. *Salix platiphyllos alia*, Thal.
 p. 112. Runde breite Seyl-Weiden/ Tab. Salweyden/ Gesn.
 hort. Folia crenis destituta superne virent, inferne canescunt,
 florem edit luteolum, odoratum, apibus gratum, cui longum
 succedit nucamentum, cum semine in pappos abiens. Im
 Domnauschen Walde & aliis saltibus nemorosis.

DCXXVIII. *Salix vulgaris rubens*, C. B. Pin. p. 473.
Salicis primum genus, Lon. Deutsch fol. 41. *Salicis tertium
 genus*,

genus, Fuchs. fol. 336. Salix Sabina, seu Amerina, Thal. p. 112. Salix minor, viminalis & Gallica, Dod. Lateinisch f. 843. Band-Weiden und rothe Weiden/ Lon. Gold-Weide. Cortex insigniter ex fulvo splendet. Folia gerit viridia & serrata. Lentitiae est sequacis, calathis, cistellis ac canistris aptissima. Ven Lauten-Mühl.

DCXXIX. *Salix caprea latifolia*, Tab. lib. 3. fol. 745. *Salix* folio ex rotunditate acuminato, C.B. Pin. 474. Breit-blättrige gespilzte Seil-Weide. In sylvis hinc & inde. Scythæ ex salignis virgis, humi constratis, futura prædicebant, Auctore Herodoto lib. 4. Herniæ remedium: Succosior salix Lunâ decrecente, cultro deorsum impresso, incidatur aliquousque, mox assula excidatur, loco affecto affirmetur, & aliquantis per gestetur, donec sordidula gestamine existat: tandem in locum gentilitium delata, ligno prius avulso recreata, ac debitè, ut concrescat, diligata, ægrum herniosum firmat ac restituit.

Podagræ auxilium: Lunâ extra pisces constitutâ, & quidem postridiè, quam ultimam adiit quadram, saligna stirps, terræ desacranda, miscellæ lotii & sangvinis ægrotantis (locus affectus dicto superius tempore scarificetur, & lotio, spatio bidui reddito, ammisceatur) aliquandiu maceranda committatur: mox tertio ante novilunium die fossula efformetur, stirpi inferendæ apta, in quam & priorem miscellam & salicem transferas: mense abhinc elapso, tertio ante novilunium die, locum circa affectum, de integro scarificetur æger, sangvis lotio confundatur: idem labor, quatuor hebdomadarum spatio exacto, iteretur, sic felicissimè averruncaturus es crucium podagræ malum.

DCXXX. *Salix sylvestris latifolia*, Tab. lib. 3. fol 744.

Gg 2

Salix

Salix, Bauh. Matth. fol. 175. Breite Seil-Weide / Tab.
Spißblättriche Kamp-Weide. Foliis est crenatis, oblongis, acuminatis, supra viridibus, infra modò exalbidis, modò virentibus, quorum exortibus alæ duæ adpositæ sunt. Corbis publatoriis, messoriis, fiscellis ac nassis parandis expetita, Virgultum tenerum hanc in rem Majo & Julio mensibus demitur. Majo resectum das May-Holz / Julio vero S. Jacobs Holz artificibus nominatur. In riguis in der Hollen-Grund.

DCXXXI. *Salix sylvestris angustifolia*, Tab. lib. 3. fol. 744. *Salicis alterum genus*. Fuchs. fol. 335. Lon. deutsch fol. 41. *Salix sativa lutea folio crenato*. C. B. Pin. pag. 473. *Salix tertia*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 855. Cæs. lib. 3. cap. 46. pag. 125. *Salix vitellina*, Cord. in Diosc. fol. 21. **Schmal Seil-Weiden**/ Tab. Geele Weyden/ Bach- Weyden/ Lon. Gelbe Weiden und Dotter-Weiden/ Cord. in Diosc. Gelbe Haar-Weiden quibusdam. Folia habet crenata, superne ex virore splendentia, inferne candicantia, quæ nunc majora, nunc minora. **In der Hollen-Grund.**

DCXXXII. *Salix fragilis latifolia*. Joh. Lœsel. Bruch- Weide mit breiten Blättern. *Salix fragilis*, C. B. Pin. p. 474. *Salicis tertium genus & salix alba*. Lon. deutsch fol. 42. *Salix secunda candido cortice*, Trag. Seb. in Trag. deutsch f. 855. Bruch-Weide und weisse Weide/ Lon. Albicant folia, hirsutie molli, crenis in ambitu vix conspicuis. Foliis quandoque innascuntur vesiculæ oblongæ, erculis gravidæ, Virgulta ejus levi manu franguntur. **Auffm Tham nach der neuen Brücken.**

DCXXXIII. *Salix fragilis tenuifolia*. Joh. Lœsel. Bruch-Weide mit schmalen langen Blättern. Zur Robbel- Wude in Truchsen Walde am Ufer des Frischings.

DCXXXIV

DCXXXIV. *Salix rubra obtuso latiore folio.* Rothe Sprodt-Weide mit breiten stumffen Blättern. Caules habet teretes, ac rubentes: folia latiora, obtusa, crenata, pronā parte atrovirentia, supinā cinerea, alis duabus in exortu stipata. Ad corbes inutilis. In riguis in der Hollen-Grund.

DCXXXV. *Salix oblongo Salviæ folio.* Joh. Lœf. Kleine Salweyblättriche Kamp-Weide. Cauliculis est ramosis, incanis: foliis oblongis, Salviæ æmulis, in ambitu crenatis, supernè atrovirentibus, infernè candidis & lanuginosis, quorum exortibus alæ duæ appositæ. Corbulis deservit texendis. Passim.

DCXXXVI. *Salix humilis angustiore oblongo folio.* Joh. Lœf. Haar-Weide mit schmallen länglichen Blättern. Cauliculis est numerosis, nunc rubentibus, nunc viridibus: foliis oblongis & angustis, nonnihil crenatis, supra viridibus, infrà exalbidis, quibus vesiculæ subrubentes baphico coco assimiles, sæpè innascuntur. In der Sackau. It. Bey der Robbel-Bude am Frisching.

DCXXXVII. *Salix pumila angustifolia prima,* Clus. hist. lib. I. fol. 86. *Salix pumila angustifolia altera.* Clus. hist. Pann. pag. 103. *Salix pumila brevi angustoque folio incano.* C. B. Pin. 474. Kleine schmalblättriche kurze Haar-Weide. Dorso canescunt folia, pronā parte virent, ac vesiculas sæpe habent. Lentitiæ est insignis. Im Gebruch beh Lauten-Mühl. Salix olim rusticis coronamenta dabat. Scopo huic serviebat maximè salix Amerina, quæ ad nexus alias & vitilia fuit idonea. Megisthes, vir humanus & affabilis, totos decem menses Amerinā salice redimitus erat. Esù cornicū salicis, alni, & consimilium arborum, mirè delectatur

Castor, qui, cùm sit animal horrendò morsù, arbores retas olim dictas, juxta flumina dentibus suis croceis ceu ferro cædit, hominesque ad retanda flumina cogit. De his antiquum exstat edictum, quod servavit nobis Gellius Lib. XI. cap. 17. Qui flumina retanda publicè redempta habent, si quis eorum ad me adductus fuerit, qui dicatur, quod cùm ex lege locationis facere oportuerit, non fecisse. Ubi ex Gavio dicit retas esse arbores, quæ aut ex ripis fluminum eminent, aut in alveis eorum exstant, appellatasque esse, quod prætereuntes naves impediunt, & quasi irretiant: Ideoque retanda flumina locari solita esse, id est, purgandum, ne quid moræ, aut periculi navibus, in ea virgulta incidentibus, fieret. Hæc obiter.

DCXXXVIII. Sambucus, Brunf. Lateinisch / tom. 3. fol. 181. Bauh. Matth. fol. 873. Dod. Lateinisch / fol. 845. Fuchs. fol. 64. Lon. deutsch / fol. 64. Lob. ic. pag. 161. o. Gesn. hort. fol. 278. Tab. lib. 3. fol. 731. Sambuci primum ḡnus, Cord. in Diosc, fol. 75. Cæs. lib. 3. cap. 4. pag. 91. Sambucus fructu in umbella nigrō, C. B. Pin. pag. 456. Sambucus vulgaris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 782. Thal. pag. 111. Sambucus campestris, sive vulgaris, Cam. hort. pag. 152. **H**elunder / Matth. Lon. Sebitz. in Trag. Holder. Baum / Tab. Holder / Brunf. Fuchs. Alhorn Nostratibus. Siccantis est naturæ, aquas dicit, sudores movet, venenis resistit, calculos atterit, ac menstrua citat, Galeno 6. simpl. acte tum arboreâ, tum herbaceâ, siccat, glutinat, & modicè digerit. Cortex interior Sambuci, nigro exteriore dempto, cultello sursum apices versus ramusculorum rasus, & condylomatibus inflammati impositus, dolores etiam gravissimos ani sedat. Rasura calfacta abjiciatur, & nova saepius imponatur. Experimentum fuit illustris cujusdam Matronæ, quæ à partu crucio

crucio hoc malo infestata ocissimè hōc remediō fuerat restituta. Sarmatis arbor Sambucus domicilium credebatur *Putschæti*, tutelaris quondam Numinis Iucorum & sacrarum arborum. Huic rustici pane, cerevisiā, cibisque variis, sub arbore hac superstitionē locatis, olim fitare consueverant à *Putschæto* unā contendentes, quo placatum efficeret *Marcopolum*, Deum Magnatum & Nobilium, ne posthac graviore servitute à Dominis premerentur suis. *Barstuccas* etiam, seu subterraneos, quos Germani *Erd-Männlein* vocant, Putschæti auxilio ad se solicitabant, quippe ob Dæmones hos *curvainss* se fortunatiores futuros perfaſſimū habebant. His, vesperā ingruente, mensam in horreo mappâ sternere solebant, caseos, panes, butyrum & cerevisiam addentes, nec dubitabant de fortunarum accessione, si manū viderint cibum illīc abſumptum. Si verò intactus remanserit in mensā, animō vehementer angebantur. Venerabantur etiam Deos quosdam viſibiles, (obiter ut hoc dicam,) qui Græcis Κοβαλοι, Russis Colky, Germanis *Kobold* dicebantur. Hos omni ciborum genere alebant, eò, quod furtiva afferrent frumenta aliunde ex horreis petita. Dæmones hi domicilium occupaturi ſaþe nocturno tempore lignorum segmina in domo congregabant, & multras lacte plenas stercoribus spurcabant. Segmina illa, si Paterfamilias indisjecta servaverit, & lac stercore fruſtulentum cum familiâ comedérat, Dæmones statim, ut gratissimi hīc hospites futuri, & apparuere & permanseré. Vermes notandi, quos sub Sambuco ſepeliunt Sagæ. Biñulus sambuci cortex, ſursum versiis abraſus, lacte decoctus, ac potus, vomitu purgat: aliò versum verò seu deorsum rasus, per alvum, seu gutturem inferiorem (cum Plauto loquar,) dejicit noxia. Remedium odontalgiae trans-

plan-

plantans certum est in sambuco: Sambucum teneram, occidentem versus, cultro deorsum impresso, sanciet aliquis, vultu in orientem misso, ac corticem cum subjecto ligno aliquousque avellat: paulò post assulâ, ex medullio arboris excisâ, dentes ita fodiat, quod cruentetur: cruentatam ac madidam adhuc cruore, in pristinum ac natalem locum deferat, ac avulsam prius arboris partem mox superinducat, partibus fauciis filo cannabino crudo, studiosè in orbem collecto, bene firmatis. Vulnerata hoc modô, diligata, ac spontali coalitù restituta arbor, querqueræ ὁδονταλγίας certa existit salus. Eandem & salix pollicetur vim, debite dicto superius modo tractata. Frustula baculi sambuci, Sole & ingresso, ab arbore resecta, filo in orbem collecta, ac in pari numero collo suspensa, epilepsiam fugant. Dememiniſſe interim haud oportet, ligneola Solis die esse comparanda, tam diu gestanda, donec filo rupto sponte decidua fiant, demum in profluentem esse mittenda. Suppeditat sambucus remedia baccis, acinis baccarum, floribus, turionibus, foliis, cortice mediano flavo, radice, medullâ, & spongiolis seu auriculis Judæ. 1. Bilem, pituitam, & in primis serum expurgat. 2. menses evocat, juvatque mulieres ab utero præfocatas. 3. urinam dicit, sudorem provocat, & calculum expellit. 4. malignitati resistit. 5. dolores quarumcunque partium compescit, cutim rarefaciendo, ac vapores digerendo. Medulla sambuci globulos suppeditat Chirurgis, quos saepiusculè fontanellis immittunt. Medulla hæc Græcis μῆρα nominatur. De voce μῆρα qværit Ulpianus Tyrius apud Athenæum, μῆρα πά κειτη, ubi legitur pro eduli cibo? Mos erat Ulpiano, inter epulas nihil cibi gustare, priusquam dixisset πά κειτη, hoc ubi exstat? Hinc & κειτηκειτη elegantiſſimè

tissimè appellatus est. Notat autem *μῆτρα* vulvam suillam, olim in deliciis habitam, uterum, & medullam arborum. Sambucus glirario infensissima est odore, quippe ramuli sambucei succosi ac odorati, circumcirca scolymum in terram defixi, eum tuentur à gliribus, anhelo gutture scolymum aliàs depascentibus. Idem ebulus præstat, quem horreis immittunt rustici ad fugandos mures.

DCXXXIX. Sambucus humilis, sive Ebulus, C. B. Pin. pag. 456, Ebulus, Brunf. Lateinisch / tom. 3. fol. 65. Matth. deutsch fol. 562. Fuchs. fol. 65. Tab. lib. 2. fol. 451. Dod. Lateinisch / fol. 381. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 628. Lob. ic. pag. 164. o. Cæl. lib. 5. cap. 13. pag. 209. Sambuci alterum genus, sive Ebulus, Lon. deutsch fol. 64. Ebulus, sive parva Sambucus, Cord. in Diosc. fol. 75. Attich / Matth. Tab. Brunf. Fuchs. Attich / oder niedriger Holländer / Lon. Hydropicorum aquas ἀνακατεῖ dicit. Fer. s. m. m. Im Dorff Lopainen an der See. Item zu Abschwangen ad hortorum sepes. In pago Lügeinen im Lochstädtischen copiose. Ebuli radix, Augusto decrescente Lunâ effossa, in ulceribus sordidis, ac vermiculationibus infantum, extollitur, etiam collo appensa. Cæterum oleum corticum radicis ebuli efficacissimum in lumbricis excludendis: circa Jacobi diem, Lunâ in decrementis constitutâ; cortices radicum ebuli, non ablutarum, contundantur, contusò corticum minutali oleum affundatur, in Sole paulò post apricaturo. Olei hujus cochlear unum vel alterum ingeratur, & abdomen linteo stringatur.

DCXL. Sambucus aquatica flore simplici, C. B. Pin. pag. 456. Wasser-Hollunder mit schlechter Blüth. Sambucus aquatica, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch / fol. 786. Tab. H h lib.

lib. 3. fol. 732. Bauh. in Matth. fol. 874. Lob. ic. pag. 201. o.
 Thal. pag. 111. Sambucus palustris, Dod. Niederländisch/ fol.
 1323. Cæs. lib. 3. cap. 4. pag. 91. & 92. Lycostaphylon fœ-
 mina, Cord. hiſt. fol. 174. **Schwelcken.** Sebitz. in Trag.
Schwelcken-Baum/ Tab. Arbor Nostratibus dicitur **Ka-**
ninchen-Baum; Fructus verò **Kaninchen.** Baccas fert ru-
 bicundas, vomitum excitant devoratæ. Succo vis est abster-
 soria, hinc ex eodem Syrupus conficitur, è baccis cuniculo-
 rum, malè officinis dictus, in affectibus faucium salutaris. Lo-
 ca amat rigua. **Beym Penartischen Walde.** Item. in der
Hollen-Grund.

DCXLI. Sanicula officinarum, C. B. Pin. pag. 319.
Heil-Kraut. Sanicula, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol.
 405. Dod. Lateinisch/ fol. 140. Eystett. Lon. deutsch/ fol.
 244. Tab. lib. 1. fol. 302. Cam. hort. pag. 152. Thal. pag.
 111. Cæs. lib. 14. cap. 22. pag. 556. Sanicula & Diapensia,
 Brunf. Lateinisch/ tom. I. fol. 80. & 81. Lob. ic. pag. 663.
 Diapensia, Bauh. Matth. fol. 720. Sanicula mas, Fuchs.
 fol. 671. **Sanickel/** Matth. Tab. Lon. Brunf. **Sanickel-**
Männlein/ Fuchs. **Schernäckel** Vetulis. **Bey Birkenfeld**
 in umbrosis copiosé. Item bey Bladau am Berge.

DCXLII. Saponaria major lævis, C. B. Pin. p. 206.
Groß glatt Seiffen-Kraut. Saponaria, Trag. Kyb. in Trag. p.
 900. Dod. Lat. f. 179. Eystett. Tab. lib. 2. f. 409. Lob. ic. p.
 214. Saponaria prima, Cæs. lib. 6. c. 48. p. 256. Saponaria vulga-
 ris, Cam. hort. p. 153. Struthium, Fuchs. f. 780. Thal. p. 117.
 Struthium primum, Lon. deutsch/ fol. 109. **Seiffen-Kraut/** Ky-
 ber. in Trag. Amara est, acris, abstergens & aperiens. In
 Iue Gallicâ, quæ optima etiam remedia eluserat, efficacissima
 exti-

exstitit. Inventorem habuit Zapata, Empiricum Hispanum. Herba adhuc succida, manibus comminuta, eas sanguinatis instar mundat. In cœmeterio pagi Neuhausen. Item die seorsim hohen Krüge in arenosis copiosè. Flores in umbellâ modò albi, modò rubicundi, modò copiosiores, modò pauciores.

DCXLIII. Satureja hortensis, sive Cunila sativa, Plinii C. B. Pin. pag. 218. Satureja Trag. Kyber. in Trag. p. 45. Dod. Lateinisch f. 289. Lon. deutsch fol. 150. Tab. lib. 2. fol. 74. Cam. hort. pag. 153. Hyssopus agrestis, Brunf. Lateinisch/tom 3. fol. 164. Satureja hortensis, Lob. ic. pag. 426. Adv. Lob. fol. 182. Satureja hortensis, & Thymbra vera, Gesn. hort. fol. 279. & 284. Satureja sativa, Fuchs. fol. 304. Satureja domestica, Eystett. Satureja, sive Thymbra sativa, Cord. in Diosc. fol. 53. Cord. hist. fol. 145. Wilder Hysop/ Kirch-Hysop. Brunf. Satureja oder Garten-Hysop/ Kyber. in Trag. Sedeneh/ oder Saturah/ Lon. Gemeine Saturay/ Tab. Joseplen/ oder Saturon/ Fuchs. Kalbs-Ysop/ Zwiebel-Ysop/ Huner-Füll/ Sergen-Kraut. Pfeffer-Kraut Nostratibus. Calfacit, siccata tenaces humores acredine suâ incidit, menses citat, ac thoracis vitiis medetur ab infarctu crasso. An der Lauten-Mühl auff der Mauer.

DCXLIV. Saxifraga rotundifolia alba, C. B. Pin pag. 309. Rundblättriger weißer Steinbrech. Saxifraga alba, Trag. Kyber. in Trag. pag. 525. Dod. Lateinisch / fol. 316. Gesn. hort. fol. 279. Cam. hort. pag. 154. Thal. pag. 106. Tab. lib. 2. fol. 510. Saxifraga alba, Saxifraga minor, Fuchs. ic. pag. 427. Saxifragia quarta, Bauh. Matth. fol. 694. Saxifraga alba, Lon. deutsch/ fol. 248. Saxifraga alba Chelidonides, Lob. ic. pag. 612. Saxifragia Brunf. Lateinisch tom. 1.

fol. 185. *Saxifraga major*, seu *alba*, Fuchſ. fol. 747. *Saxifraga alba tuberosa* radice, Clus. hist. lib. 3. fol. 308. *Thelygono affinis herba*, Cæf. lib. 8. cap. 31. pag. 338. *Weißer Steinbrech*/ Tab. Kyb. in Trag. *Höher Steinbrech*/ Fuchs. *Auff dem Nasen-Garten in montosis.*

DCXLV. *Saxifraga rotundifolia aurea*, C. B. Pin. pag. 309. *Chrysosplenion*, vel *Saxifraga aurea*, Tab. lib. 2, fol. 512. *Saxifraga aurea*, Dod. *lateinisch*/ fol. 316. Gesn. hort. fol. 279. *Saxifraga aurea Lichenis facie & natalitiis*, Lob. ic. p. 612. *Saxifraga aurea Dodonæi*, Cam. hort. pag. 154. Thal. pag. 106. *Hepatica palustris*, Eystett. *Gulden Milz-Kraut*/ Tab. *Gulden Steinbrech*. Infaretum jecoris ac lienis expedit, & à vaccis comesta butyro flavedinem confert. Viribus est Hepaticæ vel Lichenis. Ad rivulos, scaturigines, & loca uliginosa passim mense Aprili.

DCXLVI. *Scabiosa major squamatis capitulis* C. B. Pin. pag. 269. *Scabiosa major*, Matth. deutsch fol. 405. *Scabiosæ*/ Brunf. deutsch fol. 92. *Scabiosa major* flore purpureo, sive prima, Tab. lib. 1. fol. 546. *Scabiosa major Matthioli*, Cam. hort. pag. 154. *Cyanus sylvestris major arvensis*, Thal. pag. 29. *Groß braun Scabiosen*/ Tab. Calefacit, siccat, incidit, abstergit & expurgat. Secus vias & salebrofa passim.

DCXLVII. *Scabiosa major squamatis capitulis*, flosculis candidissimis, *Groß weiß Scabiosen*. Foliis profundiſſimè incisis, effigiem scabiosæ majoris, Matth. ferè experimentibus. Caules gerit teretes, striatos ac subvrides: flosculos in squamosis capitulis niveos, quorum si evulseris unum, in quatuor filamenta eundem supernè diremptum conspicies. Capitula ex compactili squamarum serie

con-

constant abeuntque squamæ in acutiem, parvulis utrinquac a-culeis, iisque nigris antibus armatae. Radice nititur lignosa, tereti, ac filamentis exornatâ, quæ insipida penè : foris sub-nigra est, intus candida. In pago Sarkau hinter dem fordersten Krüge. Item bey Holland secus viam Elbingam versus.

DCXLVIII. *Scabiosa pratinis hirsuta*, quæ officinarum C. B. Pin. pag. 269. *Scabiosa altera campestris*, sive *Segetum & Satorum*, Iob. ic. pag. 537. *Scabiosa major* flore ex cœruleo purpureo, Tab. lib. 1. fol. 546. *Scabiosæ primum genus*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 194. *Scabiosa vulgaris*, Eystett. *Scabiosa*, Lon. deutsch fol. 179. Fuchs. 716. *Scabiosa dissectifolia major*, Thal. pag. 108. *Groß Scabiosen*/ Tab. Apostem-Kraut/ Fuchs. *Pastemen-Kraut*/ oder *Scabiosen*/ Lon. *Groß Purpur-blane Scabiosen*/ vulgo. Hâc nostrates officinæ non utuntur, sed alterâ illâ, quæ C. B. *Scabiosa major* squamatis capitulis, dicitur. In arvis & pratis nonnihil riguis passim.

DCXLIX. *Scabiosa multifido folio*, flore flavescente, C. B. Pin. pag. 270. *Scabiosa ωχρολευκω* flore sive septima, Clus. hist. lib. 4. fol. 3. *Scabiosa tertia*, Clus. Pann. pag. 538. *Scabiosa Pannonica* flore albo. Eystett. *Scabiosa tenuifolia candida seu major*, Thal. pag. 109. *Scabiosa major* floribus luteis. Cam. hort. pag. 154. *Gelblicht Scabiosen* mit sehr zerschnittenen Blättern. Aufm Berge gegen dem Maßen-Garten über. Item bey Lauten-Mühl und Sarkau passim. *Gelbliche Scabiosen* mit viel zerschnittenen Blättern.


DCL. *Scordium*, C. B. Pin. pag. 247. Trag. Kyber, in
H h 3 Trag.

Trag. pag. 885. Dod. Lateinisch fol. 126. Matth. deutsch/ fol. 340. Tab. lib. 2. fol. 437. Cam. hort. pag. 156. Eystett. Lon. deutsch fol. 231. Scordium, sive Trixago palustris, Adv. Lob. ic. pag. 497. Scordium verum, Gesn. hort. fol. 279. Wasserbathenig/ Läcken-Knoblauch/ Matth. Tab. La- chen-Knoblauch/ Kyber. in Trag. Lon. Wasser-Knoblauch quibusdam. Variat magnitudine: hinc majus & minus. Bicubitale fermè proceritate suâ semel observavi. Acri, a- marâ, excalfactoriâ & facultate alliatâ, omnium viscerum, in- primis pectoris & pulmonum, crassos ac viscosos humores extenuat, virulentos detergit & expurgat: tineas necat, menses & urinas dicit, fotu potuve partum accelerat: Ve- tera ulcera purgat, siccât & cicatrice obducit: Venenis adver- satur, ac putredini mirum quantum obsistit. Chirurgi gan- grænam formidantes ex lixivio parant fomentum, in quo Scordium decoctum. Post fmentationem cataplasma sæ- piusculè imponunt, ex farina lupinorum, pulvere Scordii, oxymelite simplici, & modico lixivio. Auf der Wiese am Flüß zu Bladau.

DCLI. Scorzonera foliis nervosis, C. B. Pin. p. 275. Scorsonera altera Lob. ic. pag. 551. Scorzonera Germanica angustifolia, Tab. lib. 2. fol. 299. Klein deutsch Scorsonera, Tab. Schlangenmordt und Matter-Milch quibusdam. Beym Penartschen Waldt. In monte Apollinis hinter Quednau. Item bey Gerdauen in pratis nach dem alten Hofe und Dru- sen zu. Floret mense Mayo.

Scrophularia aquatica
B. Pin. 275.
DCLII. *Scrophularia aquatica major caule fimbriato. Groß Wasser-Braunwurz. Fœmellis Creuz-Nes- sel. Radix quadrangula, fimbriata, nodosa, cubitalis, semi- unciam crassa, atrovirens, concava, fibris longissimis copio- sissimis





sissimis candidis & villosis instructa, caulem congenoris naturæ spargit angulosum, tricubitalem, fimbriatum, geniculatum, cavum, viridem, ad genicula brachiatum. Adstant autem singulis nodis ex adversum bini caulinculi, qui circa nodos subinde alios excludunt ramos, & hi rursum teneriores, omnes quadratos & fimbriatos. Folia ex viridi nigricant, & serrata sunt: flores in caulum summo purpurascunt, & tandem in acuminata vasa, semen minutulum continentia, abeuntes. Gustu adstringens & subamara est, ac minus fœtet. Vulneribus ulceribusque medetur sordidis. **Bey der Hollen Grund** in fossis. Vetulæ in tineis seu lumbricis latis excludendis eam mirè extollunt. Carrichterus phagedænam seu ulcus depascens sustulisse gloriatur his: Erat Hagenoæ æger, Gabriel Heckher nomine, cui lupus (ita vocat affectum) spatio XXVII. annorum sinistrum oculum, nasum dimidium, os, ac conterminas oris & maxillæ partes depascendo abstulerat, huic (1.) scrophulariæ radices cottidiè potui addidit ordinario. (2.) omnibus edulii pulverem radicis foliorumque lappæ minoris admiscuit, totamque herbam elixis incoqui jussit. (3.) pulvere cardui benedicti ac foliorum senæ, additis corrigentibus, ægrum aliquoties purgavit, (4.) loca exulcerata & sordida aquæ scrophulariæ, cardui benedicti, ac menthæ aquaticæ anaticâ miscellâ manè & vesperi abluit. (5.) oleum corticum betulæ, geminas inter ollas exustum, ac tantundem aquæ cardui benedicti, cum melle decoctæ, ac despumatæ, linteis exceptis, iisdemq; hiulca & comesa opplevit loca. (6.) pulverem herbæ Antonianæ (Feder-Kraut dictam plantam exaudit,) ulceribus ultimo inspersit, sanationem Θεοθεύ qualem qualem assecutus. Scrophulariæ radicis tubera aliquot imparia, Luna de-

cre-

crescente effossa, filo collecta, ac statim collo suspensa, nodos inveteratos, strumas, & omnis generis tumores discutunt, præsertim si manè & vesperi semidrachma pulveris ingeneratur, & radix potui immittatur.

DCLIII. *Scrophularia nodosa fœtida*, C. B. Pin. pag. 235. *Scrophularia*, Bauh. Matth. fol. 791. Dod. Lateinisch/ fol. 50. *Ocimastrum alterum*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 184. *Scrophularia major*, Bruns. Lateinisch tom. I. f. 215. Lob. ic. p. 533. Lon. Deutsch f. 164. Tab. lib. 2. f. 244. Cam. hort. p. 157. *Scrophularia major* Cæf. lib. 8. c. 49. p. 349. *Scrophularia major* prima, & Clymenum mas, Gesn. hort. fol. 280. & 254. *Galeopsis*, Fuchs. fol. 194. *Braunwurz* / Tab. Fuchs. Lon. Kyb. in Trag. *Sauwurz* / Bruns. *Feigwarzen-Kraut vulgò*. Amara est, siccata, tenuat, abstergit, digerit, ac partium tenuitate carcinomata, strumas, parotidas, panos, & consimiles durities disjicit, ac nomis medetur. Succus ex toto expensus & cum cerâ & olivo mixtus, singularis est in auferendâ scabie, Trag. In cœco hæmorrhoidum dolore nihil efficacius. *Scrophulariæ*, sive ipsa plantæ substantia sicca aut viridis, sive decoctum ejus assumatur. Henr. ab Heer. in Observ. Med. obs. 20. Semen lumbricos enecat Drachm. i. pondere sumptum, Trag. & Tab. *In der Hollen Grund* passim. Radix scrophulariæ colligenda, Sole 1. & inhabitante. Bubonibus pestilentibus imposita radix contusa certo experimento venenum evocat. Caules legantur, Sole ultimum gradum 8: folia verò 1. 8. inhabitante.

DCLIV. *Securidaca dumetorum minor pallidè cærulea*, C. B. Pin. pag. 349. *Securidacæ* secundæ altera species, Clus. hist. lib. 6. fol. 237. Clus. Pann. pag. 749. Siliquæ fusci coloris putatoriam falcem formâ exprimunt, & unicum semen

semen ejusdem figuræ continent. Flos ex purpureo albescens est in nostrate. **Bey Holland** in incultis copiosissimè.

DCLV. *Sedum majus vulgare*, C. B. pin. pag. 283. *Sedum majus*, Fuchs. fol. 32. Cord. in Diosc. fol. 68. Tab. lib. 2. fol. 512. *Sempervivum majus*, Bauh. Matth. fol. 785. *Sempervivum primum*, Lon. deutsch fol. 92. *Sedum vulgare*, Eystett.. *Sedum*, Trag. Sebitz. in Trag, deutsch. fol. 298. *Sempervivum majus alterum*, sive *Jovis barba*, Dod. Lateinisch/ fol. 127. *Aizoon*, sive *Sempervivum majus*, Cam. hort. pag. 7. *Sedum seu sempervivum vulgare majus*, Gesn. hort. fol. 280. *Cotyledon altera prima*. *Sedum vulgare* Clus. hist. lib. 5. fol. 63. *Sempervivum majus sive Sedum majus crenatum Myrrhifolium*, Lob. ic. pag. 373. **Große Haßwurz**/ Fuchs. Matth. Lon. **Haßwurz**/ Tab. **Groß Haßwurz**/ **Groß Donner-Kraut**/ **Groß Immer-Grün**/ **Haß-Lauch**/ Cord. in Diosc. **Mauer-Pfeffer**/ vulgò. **Refrigerat**, **humectat** & **leniter adstringit**. **Zu Mühlhausen**; Item zu **Holland im Oberlande** in muris antiquis.

DCLVI. *Sempervivum minus vermiculatum acre*, C. B. Pin. pag. 283. *Sempervivum minimum*, Lob. ic. pag. 379. Bauh. in Matth. fol. 785. *Portulaca tertia*, Brunf. **Latinisch**, tom. 3. fol. 102. *Illecebra sive sempervivum tertium*, Dod. **Latinisch** fol. 129. *Sedum minus tertium & vermicularis*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch f. 301. *Sedum minimum*, Tab. lib. 2. fol. 514. *Sedum minus*, seu *minimum causticum*, Eystett. *Sedum tertium* *Dioscoridis*, Gesn. hort. fol. 280. *Sedi tertium genus*, Fuchs. fol. 36. *Sedum minimum*, *Illecebra*, *Sedi tertium genus non semper virens*, Adv. Lob. fol. 162. *Sempervivum tertium minimum alterum*, Cæs. lib. 15. cap. 12. pag. 578. *Sempervivum secundum*

Lon. deutsch fol. 92. Sedum minus octavum causticum, Clus. hist. lib. 4. fol. 61. Kleinstes Räthen-Träublein / Tab. Kleine Haßwurz / Lon. Räthenträubel / Fuchs. Sebitz. in Trag. Gladloß mulierculis. In arenosis passim, sæpè etiam in subgrundiis & parietibus. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. Radix effodiatur Sole 1. II occupante: cauliculi, Sole 15. ♂ habitante: folia, Sole 1. ♀ visitante: flores, Sole 1. II assecuto.

DCLVII. Sempervivum minus vermiculatum acre, cauliculis repentibus. J.L. Radice nititur exili ac fibratâ, modò rubentis, modò alblicantis coloris, quæ sub terrâ progrediens nova excludit germina. Cauliculi ejus reptantes, folia præter exigua, teretia & succulenta, fibras obtinent copiosas, quibus terræ leviter affirmantur. Inter reptandum novos constituunt pullulos seu ramulos. Flosculos habet luteolos, pediculis suis insistentes. Hinter Sarchau am See, Gebirge.

DCLVIII Senecio minor vulgaris, C. B. Pin. pag. 131. Senecio vulgaris & prima, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 226 Senecio, Matth. deutsch fol. 494. Cord. in Diosc. fol. 69. Fuchs. fol. 286. Gesn. hort. fol. 280. Lon. deutsch/ fol. 128. Verbena fœmina, Brunf. Lat. Tom. I. 120. Senecio seu Erygeron Lob. ic. pag. 225. Senecio prima, Tab. lib. 1. fol. 572. Creuzwurz / Matth. Tab. Seb. in Trag. Lon. Fuchs. Eysen-Kraut / Creuz-Kraut / Eysen Kraut-Weiblein / Brunf. Grind-Kraut / Creuz-Kraut / Baldgreise quibusdam. Passim obvia, præsertim in ruderibus circa matrias. Herba tusa, & inflammatis mammis imposita, experimentum est. Oculo ab apis ictu læso, ac in tuber assurgentí, mirè profuisse senencionem, memini in quodam subjecto.

Ser-

DCLIX. *Serpillum vulgare majus*. C. B. Pin. p. 220.
Serpillum album primum & secundum, Tab. lib. 2. f. 77. & 78.
Serpillum majus flore purpureo, Cam. hort. pag. 159. Weißer
 Dwendel / Tab. Künlein / Hüner-Kohl quibusdam.
 Feld-Kümmel Nostratibus. Flore est albo, est & purpureo.
 In montosis passim. Serpilli radix legenda, Sole 15. & in-
 habitante: caulinis Sole in v existente: flores Sole in ec.

DCLX. *Serpillum vulgare minus*, C. B. Pin. pag. 220. *Serpyllum*, Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch fol. 31. Fuchs. fol. 251. Lon. deutsch fol. 149 Gesn. hort. fol. 280. Cæs. l. 11. cap. 54. pag. 465. Adv. Lob. fol. 180. *Serpyllum syl-vestre*, sive alterum, Bauh. Matth. fol. 533. *Serpillum sylvestre* Cord. in Diosc. fol. 53. *Serpillum minus flore albo & purpureo*, Tab. lib. 2. fol. 78. Kleiner Dwendel mit weißen und braunen Blumen/ Tab. Dwendel/ Fuchs. Lon. In asperis & secis vias sèpissimè reperitur.

DCLXI. *Serpillum minimum repens flore candido*
 Ganz kleiner kriechender Dwendel mit weißer Blüth. Hin-
 ter dem Spittel-Hofe am Wege nach der Fischhäusern
 Heyde zu.

DCLXII. *Serratula*, Bauh. Matth. fol. 672. Lob. ic. pag. 534. Dod. Lateinisch. fol. 42. Cam. hort. pag. 158. *Serratula Matthioli*, Clus. hist. Centauroidis, aut Centaurii majoris sylvestris Germanici prima species, Thal. pag. 26. *Serratula tinctoris*, Eystett. *Serratula tinctoria prima*, Tab. ic. pag. 156. Cerretta, sive Serretta prima, Cæs. lib. 13. cap. 53. pag. 539. Ferberscharten/ Matth. Scharten-Kraut das erste/ Tab. Beym Penartischen Walde.

DCLXIII. *Seseli Æthiopicum*, Matth. deutsch/ fol. 309. b. Lon. deutsch/ fol. 259. *Seseli Æthiopicum & Libanotis alba*, Gesn.

Gesn. hort. f. 264. & 281. Seseli Æthiopicum Matthioli, Clus. hist. lib. 6. fol. 194. Clus. Pann. pag. 693. Seseli Æthiopicum herba, Dod. Lateinisch fol. 312. Dauci alterum genus, Fuchs. fol. 232. Libanotis Theophrasti, Lob. ic. pag. 704. Libanotis Theophrasti alba, sive secunda, Tab. lib. 1. fol. 387. Libanotis latifolia altera sive vulgatior, C. B. Pin. pag. 157. Libanotis Theophrasti altera. Thal. pag. 71. Weisse Hirsch-Wurz/ Tab. Fuchs. Æthiopischer Sesel. Matth. Radix crasso est cortice, sapore initio dulci, deinde amaricante, supremo capite hirsuta: Foliorum alæ qvina maximam partem habent folia, per ambitum ferrata, supernè atrovirentia, infernè subcinerei quodammodo coloris. Flosculos habet caulis in umbellis candidos, qui in oblongum, nigricans & angulosum abeunt semen, Cuminum aut Sileris montani semen odore & sapore referens. Calfacit, siccatur & abstergit. Radix alexipharmacæ est, hinc jumentis, ovibus, porcis, pestilitate, vel aliò morbô correptis præsenti auxilio est. Folia pecoribus & nutriculis data, lac uberiùs pollicentur. Semen calculos atterit, & lotium citat. Ulcera consolidat radix cum melle rosato admota, Tab. In der Österdischen Heyde hinter dem Schilling/ lacus est duorum milliarium.

DCLXIV. Sideritis vulgaris hirsuta erecta, C. B. Pin. pag. 233. Sideritis prima, Fuchs. fol. 769. Cord. in Diosc. fol. 63. Thal. pag. 103. Gesn. hort. fol. 281. Clus. hist. lib. 4. fol. 39. Sideritis Heraclea, sive prima, Tab. lib. 1. fol. 457. Sideritis, sive ferruminatrix, Adv. Lob. fol. 223. Sideritis quarta, Lon. deutsch fol. 115. Außstehend Glied-Kraut mit rauchen gefärbeten Blättern. Glied-Kraut / Fuchs. Glied-Kraut / Beiß-Kraut / Lon. Flores summum caulem verticillatum ambientes in spicam desinunt, galeati aliquantulum,

tulum, albidi, hiatum, sive rictum sangvineis notis conspersum habentes. Crenas habent folia, quas in suā abesse tradit Lonic. Abstergentis, adstringentis, & frigidæ est virtutis. Vulnera sangvinem fundentia firmat, & conglutinat, Cam. Lon. **Bey Holland** in incultis.

DCLXV. Sideritis arvensis latifolia glabra, C. B. Pin. pag. 233. Sideritis secunda, Bauh. Matth. fol. 711. Alyssum majus, Tab. lib. 2. fol. 243. Sideritis Herculea altera Cæs. lib. 11. c. 35. fol. 451. & 452. Sideritis primæ arvensis species altera, Thal. pag. 105. Sideritis arvensis flore pallido, Cam. hort. pag. 161. **Wilde Meliß Fæmellis.** Flosculis provenit albis. In fabulosis **hinter dem Kneiphofischen Walde.**

DCLXVI. Sideritis arvensis angustifolia rubra, C. B. Pin. pag. 233. Alyssum Galeni flore purpureo, Tab. lib. 2. fol. 242. Sideritis arvensis flore rubro, Cam. hort. fol. 161. Sideritidi primæ congener secunda, Thal. pag. 104. **Bey Lauten-Mühl ad agrorum margines.** Item **bey S. Ulbrecht** in fabuletis.

DCLXVII. Sion, sive Apium palustre foliis oblongis, C. B. Pin. pag. 154. Sium verum, Bauh. Matth. fol. 377. Sion odoratum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 465. Apium palustre, Fuchs. fol. 270. Lon. deutsch fol. 264. Sium Cord. in Diosc. fol. 44. Gesn. hort. fol. 281. Dod. Lateinisch fol. 589. Eleoselinum, Apium palustre, Fuchs. icon. pag. 136. Sium primum minus, Tab. lib. 1. fol. 248. Sium sive Laver Dioscoridis olusatri folio, sive Pastinaca aquatica, Lob. ic. pag. 208. **Wasser-Epff/ Wassermerch/ oder Banren-Epff/ Lon. Brunnen-Peterlein/ Kyber. in Trag. Wasser-Peterlein das erste/ Tab. Wasser-Eppich/ Fuchs. Frosch-Eppich**

Eppich quibusdam. Calfacit & siccatur, digerit, infarctus renum expedit, calculos frangit, urinas mensesque citat. Odoratum est, ac gustu amarum. Radix hujus Sii folia saepè tria facie diversissimâ excludit, quorum unum oblongum & in ambitu crenatum, Sio naturale, alterum profundius incisum & crenatum, tertium profundissimè ac tenerimè dissectum, Phellandrii ferè modo. Voco illud * Sion, sive Apium palustre foliis variis. Im Land-Grabent hinter Sellnicken mense Majo.

DCLXVIII. Solanifolia Circæa dicta major, C. B. Pin. pag. 168. Circæa Lutetiana, Lob. ic. pag. 266. Lappa sylvestris Trag. Kyber. in Trag. pag. 843. Circæa, Eystett. Helxine sylvestris sive fluviatilis, Thal. p. 56. Herba D. Stephani, Tab. Icon. pag: 730. Ocimastrum verrucarium, Gesn. hort. fol. 269. S. Steffens-Kraut/ Tab. Bey Schwanis in uliginosis. Item in der Gaußt hinter Kunzen.

DCLXIX. Solanum Officinarum C. B. Pin. pag. 166. Solanum Brunf. Lateinisch tom. 2. pag. 29. Lon. deutsch fol. 107. Solatrum vulgare, Trag. Kyber. in Trag. fol. 303. Solatrum minus, Cæs. lib. 5. cap. 18. pag. 212. Solanum quod edendo est, Cord. in Diosc. fol. 67. Solanum nigrum Cord. hist. fol. 158. Solanum hortense, Matth. deutsch fol. 462. Dod. Lateinisch fol. 454. Gesn. hort. fol. 281. Fuchs. fol. 686. Cam. hort. pag. 162. Solanum sativum, Tab. lib. 2. fol. 281. Solanum hortense, Circæa aut Phaseoli folio, Lob. ic. fol. 262. Nachtschatten/ Tab. Matth. Fuchs. Kyber. in Trag. Nachtschatt/ oder Säu-Kraut/ Lon. Ad sepes horrorum passim.

DCLXX. Solanum scandens, seu Dulcamara, C. B. Pin.

Pin. pag. 167. Dulcamara, Dod. Lateinisch fol. 402. Dulcis amara, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 644. Amara dulcis, Tab. lib. 2. fol. 580. Lon. deutsch fol. 237. Solanum γλυκύπικρον, Thal. pag. 106. Dulcis amara flore cœruleo vulgatior, Eystett. Vitis sylvestris, Bauh. Matth. fol. 881. Vitis sylvestris Matthioli, Cam. hort. pag. 128. Amara dulcis & solanum fruticosum Gesn. hort. fol. 246. & 282. Amara dulcis, Circæa, Lob. ic. pag. 269: Circæa Monspeliensium, Observ. Lob. fol. 136. Salicastrum Plinii, Cæs. lib. 5. cap. 10. pag. 207. Gelänger je lieber Lon. Sebitz. in Trag. Hirsch-Kraut Tab. Alfranc Nostratibus. Juxta fluenta im alten Hammer.

DCLXXI. Solanum quadrifolium bacciferum, C.B. Pin. pag. 167. Herba paris, Matth. deutsch/ fol. 471. Dod. Lateinisch fol. 444. Cæs. lib. 15. cap. 13. pag. 573. Eystett. Herba Paris, Uva lupina, Solanum τετραφύλλον, Thal. p. 57. Aconitum salutiferum, Tab. lib. 2. fol. 391. Solanum tetraphyllum, sive Herba Paris, Lob. ic. pag. 267. Αγνέ, sed non Atticus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 308. Aconitum Pardalianches, Fuchs. fol. 87- Aconitum monococcum, Cord. in Diosc. fol. 67. Cord. hist. fol. 152. Paris herba, Lon. deutsch fol. 180. Cam. hort. pag. 118. Solanum tetraphyllum, Gesn. hort. fol. 282. Einbeer/ Tab. Matth. Wolffs: Beer oder Stern-Kraut/ Kyber. in Trag. Döllwurz/ Fuchs. Foliis quandoque quinque vel sex apud nos provenit. Ben Lauten/ Mühl. Item im Penartischen Walde in umbrosis.

DCLXXII. *Sonchus asper laciniatus latifolius. Såw-Diestel mit breiten zerschnittenen Blättern. Planta est bicubitalis, & altius assurgens, è radice lignosâ, flavescente, fibris instructa suis, thyrsum promens striatum, concavum,

vum, lævem, ad latera, & in summitate ramulosum, flosculis ornatum luteis, quibus vanescentibus succedit candidissima lanugo, semini minuto, anguloſe & subnigro innitens. Caulem alternatim ambiunt folia atrovirentia, supinè pallida, aspera, proximè terram, & in caule ampla, & insigniter laciniata, in ramusculis laciniis ferè destituta, & oblonga. Inter segetes. *Bey den Huben.*

asper. L. S. J.

DCLXXIII. * *Sonchus asper laciniatus angustifolius.* Sau-Diestel mit schmalen zerschnittenen Blättern. Foliis duntaxat a priore differt, quæ in hoc angustiora, viridia, aversa parte exalbida, & elegantiū incisa spectantur. Unter dem Getreid nach Lassken.

DCLXXIV. *Sonchus asper*, Tab. lib. 1. fol. 615. Lon. deutsch fol. 124. Gesn. hort. fol. 282. *Sonchus aspera*, Bauh. Matth. fol. 384. Fuchs. fol. 674. *Sonchus aspera vulgi*, flore Hieracii, foliis Dentis leonis, alias Dipsaci & lactucæ, Lob. ic. pag. 234. *Sonchus asper minor*, Cord. hist. fol. 157. *Sonchus*, Cord. in Diosc. fol. 45. *Sonchus lævis tenerior latifolia*, Lob. observ. fol. 118. *Sonchus asper laciniatus & non laciniatus*, C. B. Pin. pag. 124. *Sau-Diestel*/ Tab. Gänß-Diestel / Dudistel / Lon. *Säumelcken Hasen-Kohl* / Cord. in Diosc. Solum squalidius Soncho huic folia concedit laciniosa Dentis Leonis: lætius verò non laciniata, Dipsaci aut lactucæ. Sapor ei amarus, aquæ dulcedine temperatus: Semen dulce odore papaveris. Refrigerat & modicè adstringit. Diosc. Inter segetes.

DCLXXV. * *Sonchus lævis lanceatus acutifolius.* Sonchen-Kraut mit spangen absatzigten Blättern. Radix numerosis & crassis fibris, foris subflavis, intùs candidis, gustu amaris, caulem effert tricubitalem, & procerius sàpè surgentem, rotundum, striatum, concavum, maximam partem lævem

Nº. 79. pag. 258.



*Sonchus laevis lanceatus
acutifolius.*



folia viridia, supinè pallidula, spithamæ longitudine, unciam lata, alternatim assistunt, proximè terram magis lanceata. His quæ succedunt, & lanceata, & semilanceata, & integra sunt, in acumen abeuntia. Caulis in summitate ramosus nonnihil, flosculos edit luteos in candidos pappos ætatis tractu mutatos. Zu Brandenburg am Frisching. Item hinter Fischhausen nach dem Hafe zu. Foliis in ambitu exigua est asperitas.

DCLXXVI. *Sonchus lævis minor paucioribus laciniis*, C B. Pin. pag. 124. *Sonchus lævis latifolius*, sive tertius, Tab. lib. I. fol. 616. Hasen-Kohl/ Tab. Breiter Hasen-Kohl.

DCLXXVII. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*, C. B. Pin. pag. 124. *Sonchus lævis*, Bauh. Matth. fol. 385. Dod. Lateinisch fol. 643. *Sonchus non aspera*, Fuchs. fol. 675. *Sonchus lævis vulgaris foliis laciniiosis Dentis leonis*, Lob. ic. 235. Intybus sylvestris, seu erratica tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 215. *Sonchus lenis seu lævis*, Cord. hist. fol. 157. *Sonchus lævis alter flore luteo*. Tab. lib. I. fol. 616. Hasen-Kohl/ Tab. Haasen-Reel/ Fuchs. Cum leni adstrictione refrigerat. Inter segetes passim.

DCLXXVIII. *Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus*. C. B. Pin. pag. 124. *Sonchus lævis altera*, Bauh. Matth. fol. 385. *Sonchus alter folio profundis laciniis sinuato hederaceo*, Lob. ic. 236. *Sonchus sylvaticus quartus*, Tab. lib. I. fol. 618. Wild Sonchen-Kraut das Bierdte/ Tab. Im Penartischen Walde/ in umbrosis.

DCLXXIX. *Soncho affinis Lampsana sylvatica*, C. B. Pin. pag. 125. *Sonchus sylvaticus secundus*, Tab. lib. I.

Kk

fol.

fol. 617. Wild Sonchen-Kraut das andere/ Tab. Im
Penartischen Walde.

DCLXXX. *Sorbus sylvestris* foliis domesticæ similiſ, C. B. Pin. pag. 415. *Sorbus sylvestris*, Matth. deutsch/ fol. 101. Tab. lib. 2. fol. 721. *Sorbi quintum genus aucuparium*, Cord. in Diosc. fol. 25. *Sorbus aucuparia*, Clus. hist. lib. 1. fol. 9. Clus. Pann. pag. 8. Thal. pag. 107. *Ornus*, Dod. Lateinisch/ fol. 834. Ruell. fol. 212. *Fraxinea arbor* *Großer Mäl-Baum*/ *Trag.* Kyber. in *Trag.* 1009. *Sorbus sylvestris Alpina*, Lob. ic. pag. 107. o. *Wilde Speer-Birn*/ *Tab.* *Wilder Speerwer-Baum*/ Matth. *Wütschel Beer* *Cord.* in *Diosc.* *Wütschen Prutenis*. *Fructus ejus Græcis* *σα* vel *σα* adstringunt. *Sorba sumus* molles nimium durantia ventres, ait Mart. *Rusticis apud nos usui sunt in calculo expellendo*. Eorum septem & plura sæpè ingerunt cum euphoria. Novi quendam triduum ischuriâ laborantem, qui viginti sorbis absumptis, & lotium copiosè reddidit, & lapillos unà ejecit plusculos. In sylvis passim.

DCLXXXI. *Sparganium ramosum*, C. B. Pin. p. 15. Tab. ic. p. 246. *Sparganium*, Bauh. Matth. f. 702. *Cord.* in *Diosc.* fol. 63. Cæf. lib. 4. cap. 67. pag. 193. Eystett. Cam. hort. pag. 163. *Sparganion*, *Trag.* Kyber. in *Trag.* pag. 677. Gesn. catalog. pag. 118. *Plantaria*, sive *Butomon*. Dod. Lateinisch/ fol. 601. *Plantanaria Dodonæi*, Thal. pag. 91. *Sparganium & Butomos Theophrasti*, Lob. ic. pag. 80. *Butomum*, Ruell. fol. 442. *Schwertel-Ried*/ Igels-Knospen. Tab. ic. *Groß-Ried*/ Matth. *Degen-Kraut*/ *Cord.* in *Diosc.* Ein Kraut gleicht sich dem kleinen *Schwertel* / Gesn. Catalog. *Desiccantis est facultatis*, Gal. 8. simpl. Radix alexi-

Nº. 80. p. 269.



Spergula *bifolia lini*
Capitulis.

No. 83. pag. 263.



Spergula perpusilla lanceatis foliolis.

Limosella aquatica. L.

alexiteria est, ac tumores discutit. In fossis stagnantibus passim.

DCLXXXII. *Spergula bifolia lini capitulis. Joh. Lœs. Zweyblättrige Spergel mit kleinen Flachs-Röpflein. E radice simplici, subalbicante, & nonnihil fibrata caulinis exoriantur modò una, modò plures, spithamæ longitudine, in summitate maximam partem ramosi, quorum geniculis bina foliola brevia assident. Flosculos fert albidos, in meditullio flavescentes, quibus succedunt vascula orbiculata, minutum fermen, idq; flavum & in acutiem vergens, continentia. An caryophyllis hæc annumeranda? *Bey Lauté Mühl* inter fruticeta.

DCLXXXIII. *Spergula perpusilla lanceatis foliolis. Joh. Lœs. Ganz kleine Spergel mit Lanzenähnlichen Blättern. Spergula hæc admodum exilis radiculis est capillaceis, foliolis à radice tenuiter assurgentibus, quæ paulò post grandescunt ac lanceolæ in modum effigiantur; ita ut formam alicujus plantaginellæ angustifoliæ exprimant. Flosculi nivei exiguis nituntur pediculis, ab ipsâ radice exortis, nec altè assurgentibus, quos vanescentes capsulæ excipiunt, semini gestando deservientes. *Bey Sarkau zwischen dem Haff und der See in planicie.*

DCLXXXIV. *Spina alba tomentosa latifolia sylvestris, C. B. Pin. pag. 382. Spina alba tertia, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 675. Acanthium, Bauh. Matth. fol. 499. Dod. Lateinisch/ fol. 721. Adv. Lob. fol. 365. Spina alba sylvestris, Fuchs. fol. 57. Lon. deutsch/ fol. 102. Acanthium vulgare flore purpureo. Tab. lib. 2. fol. 360. *Weg-Diestel mit Purpurfarben Blumen.* Est & flore albô, hinc Tab. Fuchs. & Lon. *Weisse Weg-Diestel* nominatur. Folia densâ lanugine obducuntur, ex quâ collectâ & netâ, vestes bombycinis similes texi possunt, *juxta Diosc.* Calfacit

& siccata cum adstrictione. Radix & folia decocta Opisthotonis, & sangvinem sputantibus utilia. Bey der alten Pfund. Bude. Item zu Brandenburg am Schloß.

DCLXXXV. Spondylium vulgare hirsutum, C. B. Pin. pag. 157. Sphondylium, Bauh. Matth. fol. 577. Lon. deutsch. fol. 101. Cæs. lib. 7. c. 54. pag. 312. Sphondylium seu Spondylium, Gesn. hort. fol. 282. Sphondylium I. Tab. lib. 1. fol. 348. Branca ursina, Brunf. tom. 3. fol. 149. Trag. Kyber. in Trag. fol. 344. Spondylium, Adv. Lob. fol. 313. Dod. Lateinisch/ fol. 307. Acanthus Germanica, Fuchs. fol. 53. Beeren-Klaw/ Tab. Brunf. deutsche Beeren-Klaw Fuchs. Lon. Matth. Beerentäz quibusdam. Bartsch Nostratibus. Radix acrimoniam ferè radicis Angelicæ obtinet. In der Hollen-Grund copiosè. Ex herba hâc quondam in Italiâ ammistro oleo & melle paratus clyster Polono, qui inverso usù clysterem ebilit, vesicam cum cannâ capiti imponens. Advenit Medicus sciscitans clysteris effectum, respondit Polonus, & benè clysterem à se epotum, & alvum egregiè indè solutam. Videns Medicus in vertice capitis exstantem cannam, ac caput unguinosâ vesicâ cinctum, risit sinistrum medicaminis usum, his joculariter additis: prodesse enema ita usurpatum Polono, non Italo. Simile quid hic Regiomonti accidit, in Nauclero quodam Hollando, cui à Medico suppositorium & pillulæ ordinata. Quid fit? Invertit nauta medicaminum usum, glandem devorans, catapotia ano inferius committens. Paulò post inqvirenti Medico, quid effectus egerint præscripta pharmaca, rettulit æger, dat lange Dingschen schmackt mooge / de klenen Dingschen fullen herut.

DCLXXXVI. Succisa hirsuta cærulea. Joh. Lœf. Succisive morsus Diaboli, Matth. deutsch f. 243. Dod. Lateinisch f.

124. Succisa, Fuchs. fol. 715. Morsus Diaboli, Trag. Kyber. in Trag. pag. 246. Adv. Lob. fol. 235. Tab. lib. 1. fol. 559. Gesn. hort. fol. 268. Lon. deutsch fol. 180. Cam. hort. pag. 103. Succisa glabra, C. B. Pin. pag. 269. Teuffels Abbiß Matth. Tab. Fuchs. Abbiß/ Lon. Abbiß-Kraut und Teuffels-Biß vulgò. Prorsus glabram non repperi, sed semper hirsutie quâdam instructam, quæ in foliis proximè terram notabilior. Amara est, calida & sicca gradū secundō intensō Antiquis. Incidit, abstergit, discutit, consolidat, grumos sangvinis dissolvit, tineas alvi necat, & fugillata illitu emendat. In epilepsia, lue Gallicâ, peste & malignis febribus salutaris. Tumores tonsillarum fauciumq; contumaces omnium efficacissimè sanat decoctum radicis ore detentum, Dod. Minutal herbae viridis ac radicis impositum, carbunculos sanat pestiferos, præsentaneo remedio, Matth. Tota equis porrigitur pabulo mista, visu imbecilli, aut verme discruciatis, Tab. In pratis passim. Radices quinque morsus Diaboli Lunâ decrescente effossæ, filo collectæ, collo suspensæ, ac quoad ejus facere poteris, gestatæ, oculorum dolores, cæcitatem minitantes, certò tollunt experimento. Diutulè amuletum hoc tolerandum, nam etiamsi initiò parùm prosit, tractu tamen temporis mirificam ejus vim haud dubiè cognoscet. Sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. 49. efficax. Folia colligenda Sole 15. & ingresso: Flores, Sole 1. II obidente.

DCLXXXVII. Succisa hirsuta candida. Joh. Lœf. Morsus Diaboli flore albo, Tab. lib. 1. fol. 559. Teuffels Abbiß mit weißen Blumen/Weißer Abbiß/Tab. Im Walde bey Selaicken.

DCLXXXVIII. Succisa hirsuta cærulea foliis incisis
Kk 3 & la-

& laciniatis. Joh. Lœf. Teuffels Abbiß mit tieff geschnittenen Blättern. Bey Sellnicken.

DCLXXXIX. *Symphytum consolida major*, C. B. Pin. pag. 259. *Consolida major*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 240. Thal. pag. 28. Cam. hort. pag. 45. *Symphytum Alum*, seu *Alus*, Lob. ic. pag. 583. *Symphytum*, Lon. deutsch fol. 178. *Symphytum majus*, *Consolida major*, Matthiol. deutsch fol. 400. *Symphytum alterum*, Cord. in Diosc. fol. 62. *Symphytum majus flore purpureo & albō*, Tab. lib. 2. fol. 261. *Symphytum majus flore purpureo, rubrō & pallidō*. Eystett. *Consolida vulgō*, Cæl. lib. II. cap. 7. pag. 434. *Wall-Wurz*/ Kyber. in Trag. Lon. Matth. *Weiß und braun Wallwurz*/ *Weinwelle*/ *Schmeer-Wurz*/ *Schwarz-Wurz*/ *Lotwurz*/ Cord. in Diosc. Inter fluminum ripas passim. Radix consolidæ majoris cum $\sigmaυμβάλλον$ μέρος conferat ungvento hopliatrico, cuius autor Anshelmus, Italus Parmensis, qui post sanctus appellatus, operæ pretium esse duxi, ejus & confectionem, & verum addere usum: R. radic. consolid. maj. Santal. rubri ana Unc. 2. lapid. hæmatit. Unc. 2. usneæ craniï hominis strangul. drachm. 3. pulv. lumbicor. terrestr. Unc. semiss. axung. ursi masculi, apri, porci ana libr. semif. Ex his in pollinem actis, & axungiis commissis, pauxillo vini interdato, fiat I. a. ungventum. Usus: in cæsulis oblidens ferrum (eō deficiente, terso ligneolo vulnus refricitur, cruentetur ac deligetur:) verpo inungat aliptes, à dorso aciem versus progrediens: in puncturis, à capulo mucronem versus. Ungvinosum post ferrum, linteo involvendum, ac cottidiè diligandum, nec ferventiis, nec frigoribus committendum, ne querquerum quid ægro attrahas. Interea temporis æger linteamine, aquâ limpidâ madido, deor-

deorsum vulnus diligenter abstergat, eluat, & victus exatam habeat rationem. Vulnerati morituri τεκμήριον prohibent tale: Telo blanditer ad ignem incandescenti, pauxillum miscellæ santali rubri, ac hæmatitæ lapidis inspersum, maculas in ferro si excitat sanguineas, ægro exitium promittit. Alias vulnera non lethalia, seu cæsim seu punctum inficta, sanantur, sauciante telo in pinguedinem anserum, vel lardum porcinum misso. Consolidæ majoris succosa radix contusa, linteo inducta, & partibus affirmata cruciatus podagricos certo tollit præsidio. Flores consolidæ majoris colligendi, Sole 15. & obidente: semen, Sole 1. ≡ inhabitante.

DCXC. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia. C. B. Pin. 259. Pulmonaria Plinii, Gesn. hort. fol. 274. Pulmonaria altera, Bauh. Matth. fol. 733. Symphytum maculosum, Dod. Lateinisch fol. 135. Pulmonaria maculosa Lob. ic. pag. 586. Cam. hort. pag. 133. Eystett. Pulmonaria folio non maculoso, Clus. hist. lib. 5. fol. 169. Lungen-Kraut das ander/ Matth. Hirsch Mangolt quibusdam. Im Penartischen Walde primo vere.

DCXCI. Tanacetum vulgare luteum. C. B. Pin. p. 132. Tanacetum. Matth. deutsch/ fol. 378. Dod. Lateinisch/ fol. 36. Gesn. hort. fol. 283. Cæf. lib. 12. cap. 8. pag. 479. Lon. deutsch/ fol. 187. Trag. Kyber, in Trag. pag. 158. Artemisia Dioscoridis, Tab. lib. 1. fol. 34. Tanacetum vulgare Eystett. Tanacetum citrinum, Thal. pag. 125. Tanacetum millefolii foliis, Lob. ic. pag. 749. Artemisia monoclono, Fuchs. fol. 46. Reinsfaru/ Matth. Tab. Lon. Fuchs. Kyber. in Trag. Wurm-Kraut vulgo. Calefacit, siccatur, maturat, & abstergit. In ulceribus antiquis celebratur

bratur à Tab. Helminthagogon quoque est, hydroticum ac diureticum. In der Hollen-Grund. Item bey Schwanis secùs agrorum margines copiosè.

DCXCII. Tanacetum foliis crispis, C. B. Pin. p. 132. Tanacetum cristatum Anglicum. Lob. ic. 749. Krause gelbe Reinfahren/ bey Laptau.

DCXCIII. Taxus, Matth. deutsch/ fol. 474. Dod. Læteinisch fol. 859. Gesn. hort. fol. 283. Lon. deutsch/ fol. 39. Cam. hort. pag. 166. Thal. pag. 122. Cæs. lib. 3. cap. 54. p. 134. Taxus, Milos Theophrasti, Lob. ic. pag. 232. o. Eiben-
Baum/ Matth. Lon. Bogen-Holz quibusdam. In cœmeterio pagi Trunß provenerat olim, quam eradicatam in hortum transtulit quidam. Arbuscula hæc facile crescit transplantata, duratque ultra seculum. Baccas ejus in Angliâ à pueris innoxie esitari, refert Pena. Rustici taxi lignum lacte decoctum, ejusque scobem, utilissimè porrigunt canibus rabidis, quibus in juventute sæpiusculè vermiculi sub lingvâ nascuntur, quæ lyssæ vel littæ. Scobs ligni experimento vulgi contra morsum canis rabidi ingeritur. Folia taxi Rorimarini loco in coronamenta sumuntur à foemellis, quæ auro incrustant, vel argento, serta & servias apparantes. Im Scapen bey der großen Glashütt/ hinter Latten-Walde in umbrosis. Diesseits Wulffsdorff. Bey Lautischken. Item: Bey Sylen im Ragnitschen/ & alibi.

DCXCIV. Telephium vulgare. C. B. Pin. pag. 287. Telephium primum. Tab. lib. 2. fol. 515. Telephium & Anacampteros, Gesn. hort. fol. 274. & 283. Telephium, Cam. hort. pag. 167. Crassula major: Cæs. lib. 15. cap. 26. p. 579. Thal. pag. 33. Scrophularia media vel tertia, Brunf. Læteinisch/ tom. I. fol. 215. Faba inversa, sive Crassula, Lob. ic. pag.

pag. 389. Acetabulum alterum. Cord. in Diosc. fol. 69. Telephium album, Fuchs. fol. 800. Cotyledon alterum Di scoridis, Cymbalaria, Column. in Phytobas. min. cogn. stirp. & rar. Part. 1. pag. 307. Telephium vulgare, sive secundum, Clus. hist. lib. 4. f. 66. Telephium alterum, sive crassula, Dod. Lateinisch fol. 130. Wund-Kraut / Tab. Knaben-Kraut / S. Johannis-Kraut / Fohzwanck / Gauchheil / Fohzwein / Brunf. Wund-Kraut Weiblein / Fuchs. Fette Henne / Donner-Bonen / Cord. in Diosc. Bruch-Wurzel quibusdam. Wolffs-Bohnen Nostratibus. Die pro festo D. Johannis vulgus Telephium trabibus hypocausti submittit, ex marcidâ plantâ hujus vel illius obitum superstitione hariolans. In der Hollen-Grund. Item inter segetes paßim.

DCXCV. Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ. C. B. Pin. pag. 336. Ruta pratensis, Gesn. hort. fol. 286. Ruta pratensis Herbariorum, Adv. Lob. fol. 391. Thalictrum nigrum, Cord. hist. fol. 97. Thalictrum nigrum Cordi, Thal. pag. 121. Thalictrum, Cord. in Diosc. fol. 69. Thalictrum secundum, sive Germanicum, latifolium, Cam. hort. pag. 167. Thalieterum magnum, Dod. Lateinisch/ fol. 58. Ruta sylvestris prima, Cæl. lib. 9. cap. 2. pag. 371. Heyl-Blatt/ Cord. in Diosc. In monte Apollinis hinter Niedenau; Item bey Neuhäusen am Thier-Garten. Θαλίτρον vel (η in ε ex errore mutato) Θαλιτρόν, modicè calefacit, citra morsum exsiccat, & vetera ulcera cicatrice obducit.

DCXCVI. Thalictrum pratense angustifolium, C. B. Pin. pag. 337. Ruta pratensis major quinta, Tab. lib. 1. fol. 146. Thalictrum tertium angustifolium, Cam. hort. pag. 167. Große Wiesen-Kaut die fünfte / Tab. Bey Lauten-Mühl. Item bey Holland am Flüß copiosè.

DCXCVII. Thalictrum pratense angustissimo folio, C.B. quod i. in Prodr. pag. 146. In pratis beym Penartischen Walde passim.

DCXCVIII. Thlaspi arvense siliquis latis, C.B. Pin. pag. 105. Thlaspi secundum, Bauh. Matth. fol. 427. Thlaspi Dioscoridis Drabæ & Chamælinæ folio, Lob. ic. pag. 212. Adv. Lob. fol. 73. Thlaspi latius, Dod. Lateinisch/ fol. 712. Nasturtium quartum, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch fol. 65. Thlaspi majus Tab. ic. pag. 458. Bauren-Senff/ Tab. Klein Seckel- oder Täschel-Kraut. Inter segetes passim.

DCXCIX. Thlaspi fruticosum incanum, C.B. Pin. pag. 108. Thlaspi incanum Mechlinense, Lob. ic. pag. 216. Thlaspi Machliniense, Clus. Pann. pag. 470. Thlaspi incanum Machliniense, Clus. hist. lib. 5. fol. 132. In der Holzlen-Grund copiosè.

DCC. Tilia fœmina folio majore, C.B. Pin. pag. 426. Tilia fœmina Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 238. Fuchs. fol. 862. Tab. lib. 3. fol. 1692. Bauh. Matth. fol. 156. Gesn. hort. fol. 284. & 285. Cæs. lib. 2. cap. 10. pag. 41 & 42. Tilia fœmina, Theophrasti, Lob. ic. pag. 188. o. Tilia, Lon. deutsch/ fol. 50. Dod. Lateinisch/ fol. 838. Tilia sativa, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 879. Linden / Lon. Linden- Baum/ Tab. Fuchs. Linde Germanis, ob ligni lenitatem & mollitiem. E tiliæ ligno, cuius materies teredinem non sentit, Auctore Plinio lib. XVI. c. 14. sculpta fuisse simula-chra, ex Tertulliano de Idololatriâ constat. Qui de tiliâ, inquit, Martem exsculpst, quanto citius armarium compingit? Succo glutinoso abundat, hinc & longæva est, & in primâ ætate flexuosa. Cortex suppeditat materiam, Bast/ Borus-sis dictam, ex quâ funes & alia parantur. Cortex & folia siccant,

siccant, adstringunt, glutinant, discutiunt, ac repellunt. Flores λεπτομερεῖς ac odorati, calefaciunt & siccant. Cataplasma ex foliis pedum tumores discutit, & singulare contra spasmum flatulentum remedium est in gravidis. Scobs ligni tiliacei aurum exemplò & in ictu ferè oculi eliquat, sequentibus mixta: R. nitri puriss. Unc. 2. sulphur. scob. lign. tiliac. aa Unc. semis. M. F. pulv. subtiliss. Beneficio hujus pulveris, florenum Hungaricum in volâ manus priùs emunitâ, putaminis nucis juglandis interventu, dictum factum liquo, strato superstrato instituto, & carbone accensô. Tilia arbor Borussis olim idololatrica erat, ad quam fanum exstructum, quod unâ cum Tilia summo in honore fuerat habitum: Ad hanc Tiliam, papalibus tenebris adhuc obrutus Divus Albertus, pedestre ac discalceatus Regiomonto peregrinationem semel instituerat. Post conversus diruto fano, & excisâ arbore, Idololatras ad locum illum cultûs gratiâ devenientes, suspendio affecit. Ornant sæpè prædia (quæ Varroni à præstanto: rectius prædia quasi proædia, loca ante ædes posita) tilieto elegantissimo Nobiles. In sylvis copiosè.

DCCI. Tithymalus helioscopius, C. B. Pin. p. 291. Matth. deutſch/ fol. 528. Dod. Lateinisch/ fol. 371. Fuchs. fol. 8ii. Cord. in Diosc. fol. 74. Gesn. hort. fol. 284. Lon. deutſch/ fol. 130. Cam. hort. pag. 169. & 170. Tab. lib. 2. fol. 292. Tithymalus helioscopius Dodonæi, Thal. pag. 127. Tithymalus helioscopius, sive solisequius Portulacifolius Lob. ic. pag. 356. Esula, Brunf. Lateinisch/ tom. i. fol. 194. Esula vulgaris, Trag. Kyber. in Trag. pag. 294. Gemeine Wolffs-Milch/ Kyber. in Trag. Sonnen-wendende Wolffs-Milch/ Matth. Lon. Tab. Fuchs. Wolffs Milch/ Brunf. Hunds-Milch/ quibusdam. In simetis passim.

DCCII. *Tomentilla sylvestris*, C. B. Pin. pag. 326.
Tomentilla, Matth. deutsch/ fol. 436. Brunf. Lateinisch/
 Tom. 1. fol. 85. Dod. Niederländisch/ fol. 118. Trag. Kyber.
 in Trag. pag. 503. Tab. lib. 1. fol. 446. Cord. hist. fol. 94.
 Eystett. Lon. deutsch/ fol. 243. *Tomentilla*, vel *Heptaphyl-*
lon, Lob. ic. p. 696. *Heptaphyllum*, Fuchs. f. 260. Gesn. hort.
 f. 261. *Tomentilla*/ Matth. Tab. Lon. Fuchs. *Tomentilla*/
Rothwurz/ *Bluttwurz* Brunf. *Herzwurz*/ *Feigwurz*/ roht
Gunzel/ roth *Heylwurz*/ *Schür-Wurz* *Birckwurz* vulgo.
Heydeckern Saxonibus. In umbrosis & muscosis passim obvia.

DCCIII. **Tragopogon luteum abortivum*. Geeler
 breitstengelichter *Bock's-Bart*. Radix substantiâ prorsus
 candidâ, at flavescente tunicâ cincta, & villosa, caulem emi-
 serat cubitalem, digitum ferè auricularem crassum, sed egre-
 giè latum, latitudine ad radicem unciali, in progressu sesqui-
 unciali, cuius summo sinuato, & in se reflexo, flos incumbe-
 bat grandior, luteus, uncias quatuor latus, foliis virentibus
 acutis stipatus, qui manè pandendo se extulit, & à meridie
 contrahendo se abdidit, in pappos tandem senescendo va-
 nescens. Foliis erat numerosis, oblongis, angustis, acumi-
 natis, in caule passim indiscriminatim exortis, & contortulis
 quandoque, anfractibus crenas quasi quasdam præsentanti-
 bus. Assistebant adhæc lato illi cauli pulluli thrysulorum
 teretes, novellos in fastigio exituros simplices flores, velut
 in vulgari, promittentes. Floruit Mense Junio, beym
Kneiphöfischen Walle.

DCCIV. *Tragopogon pratense luteum majus*, C. B.
 Pin. pag. 274. *Tragopogon*, sive *Barba hirci*, Bauh. Matth.
 fol. 410. *Tragopogon*, Fuchs. fol. 820. Lon. deutsch/ f. 127.
 Dod. Lateinisch/ fol. 256. *Tragopogon flore luteo*, Eystett.
 Bar.

No. 83, pag. 270.



Tragopogon luteum abortivum.

CTS 1445. fol. 2v

Barbula hirci, Trag. Kyber. in Trag. pag. 280. *Tragopogon luteus communis*, Thal. pag. 121. *Hirci barba*, Cord. in Diosc. fol. 46. Cord. hist. fol. 156. *Tragopogon luteum*, Lob. ic. p. 550. Tab. lib. 2. f. 297. *Barba hirci flore luteo*, Cam. hort. p. 27. *Gelber Bocks-Bart*/ *Tab. Lon. Fuchf. Kyber.* in Trag. *Bocks-Bart*/ *Gauch-Brodt*/ Matth. *Mor-*genstern quibusdam. *Am Kneiphöfischen Wall.*

DCCV. *Tribulus aquaticus*, C. B. Pin. pag. 194. Matth. deutsch/ fol. 408. Dod. Niederländisch/ 922. Trag. Kyber. in Trag. pag. 841. Lob. ic. pag. 596. Adv. Lob. fol. 258. Cord. in Diosc. fol. 62. Lon. deutsch / fol. 98. Gefn. hort. fol. 285. Cæs. lib. 4. cap. 27. pag. 162. *Tribulus aquaticus major*, Clus. Pann. pag. 713. *Tribulus lacustris*, Cord. hist. fol. 161. *Wasser-Nuß*/ Kyber. in Trag. Lon. *Wasser-Nuß*/ *weiher Nuß* / *See-Nuß* / *Stachel-Nuß*/ *Spitz-Nuß*/ Dod. Zu Uderwang im Mühlen-Leich; Item zu Domnau im Schloß-Leich. Olim Thraces ad Strymonem habitantes, foliis tribuli equos saginabant, ipsi nucleo vivebant, panem facientes prædulcem, & ventrem contra-hentem. Effingebant tūm pistores panem in varias formas. Martialis lib. 14. epigramm. 69. Priapi siliginei meminit:

Si vis esse satur, nostrum potes esse Priapum;

Ipsa licet rodas ingvina, purus eris.

DCCVI. *Trifolium palustre*, C. B. Pin. p. 327. Cord. hist. fol. 96. Dod. Lateinisch/ fol. 580. Eystett. *Trifolium fibrinum sive tertium*, Tab. lib. 2. fol. 221. *Trifolium palustre*, seu *Trifolium Castoris*, Thal. pag. 125. *Limonium*, Cord. in Diosc. fol. 62. *Limonium pratense*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 705. *Trifolium paludosum*, Lob. ic. pag. 33. o.

Isopyron & Lotus palustris, Gesn. hort. fol. 263. & 265. *Wiesen-Klee* / Tab. *Wiesen-Mangolt* / Kyb. in Trag. In locis uliginosis & palustribus passim veni Königsberg.

DCCVII. *Trifolium pratense purpureum*, C.B. Pin. pag. 327. Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 467. Fuchs. f. 817. Adv. Lob. fol. 380. *Trifolium pratense*, Matth. Bauhin. in Matth. fol. 609. Dod. Lateinisch/ fol. 565. Lob. ic. pag. 29. o. Tab. lib. 2. fol. 222. *Trifolium pratense rubrum*, Cam. hort. pag. 171. *Trifolium pratense vulgare*, flore rubro, Thal. pag. 123. *Braun Wiesen-Klee* / Fuchs. *Wiesen-Klee* / Tab. Matth. *Braun Fleisch-Blume* / vulgo. Siccantis est indolis. Decoctum ejus in fluore muliebri laudatissimum. In pratis passim.

DCCVIII. *Trifolium pratense album*, C.B. Pin. pag. 327. Fuchs. fol. 818. Adv. Lob. fol. 380. Cam. hort. pag. 171. *Trifolium majus primum* Cluf. hist. *Trifolium acutum*, Lon. deutsch/ fol. 135. *Trifolium pratense alterum*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 467. Bauh. Matth. fol. 609. *Trifolium pratense vulgare* flore candido, Thal. pag. 123. *Weiß Wiesen-Klee* / Fuchs. *Spiß-Klee* / Matth. Lon. Retrigerat, siccatur, & non nihil adstringit. Albo muliebri profluvio mirificè confert, Fuchs. Clyster ex decocto hujus & purpurei adjecto melle, intestinorum rosiones & dolores sedat, viscidos lentosque adhærentes intestinis humores educit. Prästantius & conducibilius album creditur purpureo, in pabulatione jumentorum. In pratis editioribus passim.

DCCIX. *Trifolium pratense luteum* capitulo breviore, C.B. Pin. 328. *Trifolium pratense luteum*, Fuchs. f. 819. *Trifolium luteum primum* capitulo breviori, Thal. pag. 124. *Trifolium arvense* Tab. lib. 2. fol. 222. *Feld-Klee*

Klee mit geelen kleinen K psichen/ Feld-Klee/ Tab. Geesler Wiesen-Klee/ Fuchs. Tenuium est partium & exsiccat, In pratis aridioribus, & secus vias passim.

DCCX. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, vel agrarium, C. B. Pin. 328. Lotus campestris, & Melilotus g. Trag. Sebitz. in Trag. Deutsch/ 472. Trifolium luteum alterum lupulinum, vulgo lupulus sylvaticus, Thal. pag. 124. Trifolium agrarium, Dod. Lateinisch/ fol. 576. R zen-Klee oder Hasen-Pf tlein/ Sebitz, in Trag. Wilder Hopfen F mellis. Ad limites agrorum passim. Trifolium luteum minimum Lob. ic.*

DCCXI. *Trifolium montanum album, C. B. Pin. pag. 328. Trifolium majus albo flore, Clus. Pann. pag. 760. Trifolium majus primum, Clus. hist. lib. 6. fol. 245. Weiß spitzer Berg-Klee. Foliis est oblongis, angustis, duris, nervosis, incanis & in ambitu velut serratis. In monte Apollinis. Hinter Quednau.*

DCCXII. *Trifolium montanum purpureum majus, C. B. Pin. pag. 328. Trifolium aliud montanum majus, Thal. pag. 123. Trifolii altera species & major, Gesn. hort. fol. 285. Trifolium majus secundum, Clus. hist. lib. 6. fol. 245. In montosis passim.*

DCCXIII. *Trifolium montanum spic  longissim  rubente, C. B. Pin. pag. 328. Lagopus altera folio pinnato, Lob. ic. pag. 40. o. Cytisus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 601. Cytisus Columellae, Lon. deutsch / fol. 137. Trifolii majoris tertii altera species, Clus. hist. lib. 6. fol. 246. Lagopus major Eystett. Lagopus major alter Dod. Lateinisch/ fol. 578. Trifolium spicatum, Thal. pag. 124. Grosser Geiß-Klee/ Kyber. in Trag. Dignum horto trifolium.*

Omni-

Omnium herbarum, quæ lactis copiam pariunt, tam pecoribus quam mulieribus, præstantissima est Cytisus. In der Österrodischen Heyde copiosè.

DCCXIV. Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus, C. B. Pin. pag. 328. Lagopus sive pes leporis, Bauh. Matth. fol. 699. Lagopus, Dod. Lateinisch/ fol. 577. Adv. Lob. Fuchs. 494. Lagopus. Pes leporis Obs. Lob. ic. pag. 39. o. Lagopodium Tab. Lib. 2. fol. 222. Lagopus & Lagopyron, Adv. Lob. fol. 383. Lagopus & totus campestris, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 472. Leporinus pes. Herba, Cord. in Diosc. fol. 62. Lagopus major, Cæf. lib. 6. cap. 19. fol. 243. Lagopus minor, Cam. hort. pag. 83. Lagopus vulgaris, Thal. pag. 73. Räthen-Klee/ Tab. Fuchs. Hasen-Fuß/ Hasen-Klee vulgò. Räthen Schwanz Fœmel-lis. Siccando & adstringendo foriolis utilis. Passim inter segetes.

DCCXV. Trifolium sylvestre luteum siliqvâ cornutâ, vel Medica frutescens, C. B. Pin. pag. 330. Medica flavo flore, Clus. hist. lib. 6. fol. 243. Medica flore luteo, Clus. Pann. pag. 759. Lens major repens, Tab. lib. 2. f. 204. Meliloti majoris species tertia, Trag. sebitz. in Trag. deutsch/ 471. Großkriechende Linsen/ Tab. Großer Stein-Klee/ der dritte. Sebitz. in Trag. Bey der Balga am Hafe copiosissimè. Item bey Lauten-Mühl.

DCCXVI. Trifolium acetosum vulgare, C. B. Pin. pag. 330. Oxytriphylon, Trag. Kyber. in Trag. pag. 521. Trifolium acetosum, Brunf. Lateinisch/ tom. 3. fol. 50 Dod. Lateinisch/ fol. 578. Matth. deutsch/ fol. 352. Thal. pag. 123. Trifolium acetosum flore albo. Eystett. Alleluja, Lon. deutsch fol. 246. Oxys Fuchs. fol. 564. Cord. hist. fol. 172. Tab. lib.

lib. 2. fol. 224. Oxys Plinii, Gesn. hort. fol. 270. Oxys Pliniana, Panis cuculi, Alleluja officinarum, Trifolium acetosum, Lob. ic. pag. 32. o. Oxys flore lacteo, Cam. hort. pag. 114. Buchampfer/ Tab. Kyber. in Trag. Sauer-Klee Matth. Fuchs. Guck-Gauch-Klee/ Lon. Gauch-Ampffer/ Brunf. Buch-Klee/ Guck-Gauchlauch/Gauch-Brodt/ Hasen-Klee/ Hasen-Ampffer vulgò. Ruckucks-Kohl Nostratibus. In umbrosis & sylvosis radicibus arborum passim ad-nascitur. Radix colligitur Sole 1. V inhabitante.

DCCXVII. *Trifolium hepaticum* flore simplici, C. B. Pin. pag. 330. *Hepatica* Brunf. Lateinisch/ tom. 1. fol. 190. *Hepatica aurea*, & herba Trinitatis, Gesn. hort. fol. 261. *Hepatica aurea* flore cœruleo, Tab. lib. 2. fol. 225. *Hepatica aurea*, Thal. pag. 56. *Trifolium aureum*, Dod. Lateinisch/ fol. 579. Lon. deutsch/ fol. 246. *Trinitas*, Bauh. Matth. fol. 610. *Trinitas* & *Epimedium*, Cord. hist. fol. 93. *Nobilis hepatica*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 519. *Hepaticum trifolium*, Lob. ic. pag. 34. o. *Trifolium hepaticum* sive *aureum* flore cœruleo, Cam. hort. pag. 172. *Hepatica trifolia* cœruleo flore, Clus. hist. lib. 6. fol. 247. *Blau gilden Leber-Kraut*/ Tab. Edel Leber-Kraut/ Matth. Kyber. in Trag. *Gulden-Klee*/ Hirsch-Klee quibusdam. *Blaue Bi-ole* Nostratibus. In umbrosis bey Schwanis; Item bey Domnau.

DCCXVIII. *Tussilago vulgaris*, C. B. Pin. pag. 197. Cam. hort. pag. 175. *Tussilago*, Bauh. Matth. fol. 614. Fuchs. fol. 140. Cord. in Diosc. fol. 58. Gesn. hort. fol. 258. Cæs. lib. 12. cap. 21. pag. 490. Lon. deutsch/ fol. 254. Tu-

Mm

silago

silago, Farfara, Ungula Cabballina officinorum Adv. Lob.
 ic. pag. 589. Bechion sive Farfara, Dod. Lateinisch/ fol. 596.
 Ungula caballina, Brunf. Lateinisch / tom. 1. fol. 42.
 Trag. Kyber. in Trag. pag. 418. Bechion, Cord. hist. f. 93.
 Huff Lattich/ Matth. Lon. Rosshüb/ Fuchs. Brunf. Kyber.
 in Trag. Brandt Lattich/ Esels Huff/ Brandletschen vul-
 gò. Secùs fontes ac fossarum margines copiosè primo statim
 vere visitur. Tussilaginis vulgaris lanugo collecta, linte-
 mine quodam cum paulo nitro conclusa, in lixivio decocta,
 ac in Sole siccata, igniariis fomitem omnium tenerimum
 administrat. Verbasci albi lanugo idem præstat. Tussila-
 ginatum vel Farfaratum, quô Tabaci locô utendum, ita fieri
 potest: R. vini tincti seu de Alecante, Cerevisiæ Dantisc.
Goppen Bier ana libr. 2. Ebull. cum flor. Rosmar. Lavendul.
 pæoniæ. bugloss. borrag. Violar. à Mj Colaturæ adde succ. flor.
 betonic. rosar. Provincial. tiliæ, lilior. convall. ana Libr. 1.
 coquantur succi cum priori decocto, ac despumentur opti-
 mè: pòst adde salis commun. Mj pulv. Cinamom. nue.
 moschat. macis sem. anis. ana Unc. semis. ambr. gris. veræ,
 spiritu vini dissolutæ, Scrupul. semis. ebulliant iterum, & ut
 crassamentum subsidat, ollam benè tectam aliquandiu serva.
 Mox liquidius trans fusum de integro ebullire permitte, &
 confessim folia tussilaginis, mediæ crescendo ætatem nacta,
 nervo crassiori vel exciso vel fracto, immitte, maceraturus
 ut mollescant. Insuccata ita folia panno involvantur laneo,
 linteò mox inductò, ac simò equinò superpositò, ut fervore
 contractò sui digestionem & ulteriorem elaborationem con-
 sequantur folia. Cottidiè autem eadem inspicienda, nec
 eximenda, donec rufulum contraxerint colorem. Quô ad-
 versò (horridus foliorum, fotû diutiùs continuatò, evite-
 tur

tur nigror, qui corruptionis manifestus index) segestre panneum aufer, ac filo crassiori transfossa collige folia, quæ in loco perflabili & umbrosiore siccata, convoluta tandem ac gyrata, funibus arctissimè constringantur, & in vasculo ligneo firmissimè impacta serventur. Fumus hujus tussilaginati, tubulo haustus, gratior erit & cerebro, & cordi, ejusq; ventilabro pulmoni.

DCCXIX. *Typha palustris major*, C. B. Pin. pag. 20. *Typha Matth. deutsch/ fol. 447*. Fuchs. fol. 823. Tab. lib. 1. f. 686. Lob. ic. pag. 81. Cord. in Diosc. f. 58. Lon. deutsch/ f. 209. *Typha palustris*, Ruell. f. 560. Dod. Lateinisch/ f. 604. Cæs. lib. 4. cap. 68. pag. 194. *Typha aquatica*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 681. *Narren-Kolben/ Fuchs. Kyber. in Trag. Narren-Kolben/ See-Kolben* Matth. Liesch. oder Moß-Kolben / Tab. Kolben / Lon. Liesz-Knospen/ Deitel-Kolben quibusdam. Ejus flos ambustis medetur. In aquis stagnantibus & uliginosis hinter der Altstädtischen Ziegel-Scheune.

DCCXX. *Valeriana sylvestris major*, C. B. Pin. p. 164. *Valeriana vulgaris*, Trag. Kyber. in Trag. pag. 61. *Valeriana & Phu majus commune*, Gesn. hort. f. 272. & 285. *Valeriana sylvestris*, Dod. Lateinisch/ f. 349. Eystett. Lob. ic. pag. 715. *Valeriana sylvestris major*, Thal. pag. 129. *Phu parvum*, Bauh. Matth. fol. 38. *Valeriana altera*, Cæs. lib. 4. cap. 2. pag. 148. *Phu vulgare*, Tab. lib. 1. f. 562. *Valeriana sylvestris prima*, Clus. hist. lib. 4. f. 55. *Phu Germanicum*, Fuchs. f. 857. *Gemein Baldrian/ Matth. Fuchs. Kyber. in Trag. Großer Baldrian/ Tab. Räzen-Wurzel/ großer Denmark/ Augen-Wurzel/ Wend-Wurzel vulgo.* *Valeriana sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Flores legen-*

legendi, Sole 1. my occupante: semen, Sole 8. my incolente. Semen egregiè purgat vino maceratum & assumptum. Radix, Sole 15. ♂ incolente, effossa, concisa, ac vinô malvaticô tâm diu macerata, donec Sol ultimum gradum my attingat, pôst torculari submissa & expressa, oleum reddit tussientibus salubre. Radix ante ortum Solis (Sole 15. ♂ ingresso) effossa, taffetto insuta, ac collo, Sole in 1. ♀ versante, appensa, oculos confortat, aciemq; eorum tuetur.

DCCXXI. Valeriana Græca. Dod. Lateinisch / f. 352. Tab. lib. 1. f. 569. Valeriana cœrulea, C. B. Pin. pag. 164. Phu peregrinum, Gesn. hort. f. 272. Valeriana peregrina Cam. hort. pag. 176. Valeriana peregrina Belgarum & Herbariorum, Adv. Lob. f. 319. Valeriana Græca flore cœruleo, Eystett. Griechischer Baldrian/ Tab. Bey Ju-
den-Kirch auff der Wiese.

DCCXXII. Valeriana palustris minor, C. B. Pin. Valeriana exigua vel 4. Trag. Seb. in Trag. Valeriana sylvestris minor Adv. Lob. Phu minus, Tab. lib. 1. Kleiner Wasser-Baldrian. Ibidem.

DCCXXIII. Valeriana campestris inodora major, C. B. Pin. pag. 165. Album olus, Dod. Lateinisch / f. 647. Phu minimum alterum, Lob. ic. pag. 717. Lactuca agni-
na Tab. lib. 1. f. 570. Valerianæ campestris secunda spe-
cies, Cam. hort. pag. 175. Bupleuron, Cæf. lib. 4. cap. 14.
pag. 156. Locusta quibusdam Gesn. hort. fol. 265. Lam-
mer-Lattich/ Tab. Insipidô ferè est sapore, refrigerat, &
nonnihil humectat. Estur in acetariis hybernô tempore,
quæ tûm lœtissimè viret. Radix Valerianam redolet. In
der Hollen-Grund.

DCCXXIV.

DCCXXIV. Valeriana palustris foliis subrotundis *An Valeriana*
 parum incisis. Klein Wasser Baldrian mit rundlechten *media parum lae-*
Blättern. E radice geniculatâ, ac copiosissimis filamentis *C. B. Pin: 164?*
 præditâ, exsurgit caulis spithamam altus, cui propè terram
 subrotunda, pediculis longis, in progressu vero ad interno-
 dium caulis bina ex adverso sita subserviunt folia, quæ circa
 umbellam florum congestorum ac pallidè rubentium, pa-
 rum inciduntur ac dividuntur. In loco uliginoso propè pa-
 gum Lenzen/ in Dioceſei Elbingensi, Majo Mense.

DCCXXV. Verbasculum pratense odoratum, C. B.
 Pin. pag. 241. Primula veris, Bauh. Matth. f. 801. Loni-
 cerus deutsch/ f. 170. Primula veris sive prima, Tab. lib. 2.
 fol. 34. Primula veris hortensis, Thal. pag. 90. Herba Pa-
 ralysis, Brunf. Lateinisch/ tom. 1. f. 96. Trag. Kyber. in
 Trag. pag. 201. Herba paralysis altera, Cæf. lib. 6. cap. 57.
 pag. 261. & 262. Primula pratensis, Lob. ic. pag. 567. Pri-
 mula pratensis odora lutea, Adv. Lob. f. 243. Verbasculum
 odoratum, Fuchs. fol. 850. Arthritica simplici luteo flore,
 Cam. hort. pag. 22. Primula veris flavo flore elatior, Clus.
 hist. lib. 3. f. 301. Primula veris major, Dod. Lateinisch/
 f. 147. Primula veris flore luteo, Eystett. Alisma prato-
 rum, Colum. in Phytobas. pag. 21. Schlüssel Blumen/
 Tab. Matth. Kyber. in Trag. Geel Schlüssel Blumen/
 Fuchs. Himmel Schlüssel/ Brunf. S. Peters Schlüssel/ weiß
 Betonien/ Gicht Kraut/ Handschuch Blumen quibusdam.
 Ad sylvarum margines passim.

DCCXXVI. Verbascum mas latifolium luteum, C.
 B. Pin. pag. 239. Verbascum mas, Tab. lib. 2. f. 266. Ver-
 bascum mas, Thapsus barbatus. Adv. Lob. fol. 242. Ver-

bascum primum, Bauh. Matth. f. 800. Verbascum aut Phlomos vulgaris mas Dioscoridis, Thapsus barbatus officinarum, Lob. ic. p. 561. Verbascum latius, Dod. Lat. f. 143. Verbascum candidum mas, Lon. deutsch/ f. 161. Varbascum latifolium mas, Eystett. Verbascum album mas, Thal. p. 129. **Wull-Kraut-Männlein**/ Tab. **Wull-Kraut-Königs-Kerze**/ Matth. **Weiß Wull-Kraut-Männlein**/ Lon. **Kerzen-Kraut** / **Brenn-Kraut**/ **Himmelbrandt**/ **Unholden-Kerz**/ **Feld-Kerz** vulgo. **Welcke Nostratibus.** Copiosè visitur hæc planta circa oppidum Holland in ascensu montium. **Bey Rößel** in ingenti copiâ. Herba colligenda Sole 15. \varnothing occupante: flores Sole in \varnothing constituto: Semen Sole in ultimo gradu \varnothing radix Sole in 1. \varnothing . Oleum in podagrâ & contracturis perutile hoc modô paratur: Flores dicto tempore collecti, ac vitro conclusi, Soli exponantur, donec Sol 15. \triangleleft attingat. Podagræ remedium: Verbasci manipulus unus & alter, cum tantulo creta decoquatur, decocto pedes foveantur & abluantur, post in scrobem sordida miscella conjiciatur, terrâ tegatur, putredine peritura, & curatura. Verbasci albi, seu maris, flores tunsi, succum fundunt foemellis servientem, turpes dum vultus ruga senilis arat. Folia lateres inter ignitos cocta, ex calceatu claudicantes equos fotu egregiè juvant.

DCCXXVII. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente, C. B. Pin. 240. Verbascum nigrum, Trag. Kyber. in Trag. p. 218. Tab. lib. 2. f. 267. Dod. Lateinisch/ f. 144. Verbascum nigrum Dioscoridis, Lob. ic. pag. 562. Verbascum nigrum latifolium, Thal. pag. 129. Verbascum tertium, Bauh. Matth. fol. 800. Blattaria Plinii, seu Verbascum nigrum, Eystett. Verbascum nigrum salvifolium purpureo flore, Adv. Lob. 241. Verbascum sylvestre, Fuchs. fol. 849. Verbas-
cum

scum sylvestre minus, Lon. deutsch/ fol. 169. **Schwarz**
Wull Kraut/ Tab. **Wull Kraut das dritte**/ Matth. **Wild**
Wull Kraut/ Fuchs. **Wild Wull Kraut das Kleine** / Lon.
Schwarz Rerzen Kraut vulgo. In der Hollen-Grund.
Item in pagis passim.

DCCXXVIII. Verbascum nigrum flore candido,
in meditullio purpurascente. J. L. Cum verbasco nigro flore
ex luteo purpurascente, C. B. in reliquis convenit, In pa-
go Werlitten im Österrodischen.

DCCXXIX. Verbena communis cæruleo flore,
C. B. Pin. pag. 269. Verbena, Gesn. hort. fol. 285. Lon.
deutsch/ fol. 167. Verbena recta, Trag. Kyber. in Trag.
pag. 210. Verbena communis & sacra recta, Lob. ic. pag.
534. Verbenaca, Matth. Bauh. in Matth. fol. 742. Verbe-
na recta, Dod. Lateinisch/ fol. 150. Tab. lib. 1. f. 471. Ver-
benaca supina, sive fœmina, Fuchs. fol. 593. Verbenaca su-
pina, Cord. in Diosc. fol. 66. Verbena mascula, Brunf. **La-**
teinisch/ tom. 1. fol. 119. Verbena fœmina, Cæf. lib. II. cap.
32. pag. 450. Cam. hort. pag. 176. Verbena vulgaris, Clus.
hist. lib. 4. fol. 45. Eisen-Kraut Männlein / Tab. **Eisen-**
Kraut/ oder Eisenhart Männlein/ Lon. **Eisen-Kraut**/ oder
Eisenhart/ Matth. Eisenrich/ Eisern/ Eisen-Kraut / Tau-
ben-Kraut quibusdam. Verbena sicca & calida est, gustu
amara, adstringens ac glutinans, Tab. Dolorem capitis di-
scutiendo mitigat, Gal. 2. de compos. med. **Im alten Ham-**
mer. Item zu Kunzen in pago copiosè. Verbena sub e-
levatione poli 45. 46. 47. 48. 49. Folia colligenda Sole in
ny existente: flores Sole in 8. Verbena sagmen dicitur
veteribus. Justinianus I. Sanctum. ff. de divisione rerum
& qualitate. Sanctum est, quod ab injuria hominum defen-
sum

sum atque munitum est. Sanctum autem dictum est à sagminibus. Sunt autem sagmina quædam herbæ, quas Legati Populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret. Origo ex Græco σάγμα pro ἄγισμα, unde sagmen.

DCCXXX. Veronica mas supina & vulgatissima, C. B. Pin. pag. 246. Veronica mas, Fuchs. fol. 166. Lon. Deutsch. fol. 96. Thal. fol. 131. Veronica, Tab. lib. 2. fol. 98, Teucrium, Trag. Kyber, in Trag. pag. 207. Veronica vulgò dicta, Gesn. hort. fol. 285. Veronica vulgaris supina, Clus. hist. lib. 3. fol. 347. Veronica vera & major, sive Veronica major Septentrionalium & Veronica mas Fuchsii & Dodonæi: etiam Betonica Pauli, Lob. ic. pag. 471. Veronica major, Cam. hort. pag. 176. Veronica vera & major, Adv. Lob. fol. 197. Veronica mas serpens, Dod. Lateinisch. fol. 40. Auricula muris tertia, Cæs. lib. 8. c. 27. pag. 335. Ehren Preiß/ Tab. Kyber. in Trag. Ehren Preiß/ Männlein / Lon. Fuchs. Grundheil quibusdam. In locis apricis pañim. In pago Latten-Walde Veronicam hanc foliis observavi maximis. Veronica sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Radix effodienda, Sole 15. ☉ occupante: caulinuli, Sole ultimum ☉ gradum inhabitante. Folia Sole 1. ☉ tenente: flores, Sole 15. ☉ obsidente: semen Sole ultimum gradum ☉ tenente. Veronica tussedine discruciatissima commendatissima est planta. Hic ἀκροποδῖτι translire non possum illud, quod nempe quondam hic Regiomonti (in der Krummen Grub) habitârit mulier, Anna pistoris cuiusdam uxor, quæ tussientes & quosvis sputatores ex mirabili antipathiâ ferre non potuit. Minxit namque confestim, ac diras imprecata est, exaudiens screatu vel tussi aliquem sputa moventem Rusticis ubi prou-

frumentis solvendis pecuniam numerabat, inter numerandum si quempiam sputantem advertebat, in hæc mox prorupit verba: *Sprüß deine Mutter die Hure/ & perrexit numerando 6. 7. 8. 9. Sprüß du Huren-Sohn/ 10. 11. 12. Sprüß deine Mutter die Hure/ 13. 14. 15. &c.* Maritus ejus vel in cellam se abdidit tussiens, vel aliò se abduxit, ne audiretur malo pressus. Metuit namque scelerata, quæ in quosvis tussientes promiscuè effutierat, verba. Scaliger Exercit. CCCXLIV. §. 6. tradit, nobilem quendam Vasconem, auditô phormingis sono, iliicò urinam reddidisse.

DCCXXXI. *Veronica spicata angustifolia*, C. B. Pin. pag. 246. *Veronica recta vulgaris major*, Clus. hist. lib. 3. fol. 347. *Veronica spicata cœrulea*, Cam. hort. pag. 177. *Veronica recta Herbariorum Lob.* ic. pag. 473. *Auricula muris quarta*, Cæf. lib. 8. c. 27. *Veronica recta prima & secunda*, Tab. lib. 2. fol. 99. *Auffricht stehender Ehren-Preiß*/ Tab. *Schwalcken-Zagel Nostratisbus*. In ericetis bey Brandenburg/ item bey Lauten-Mühl.

DCCXXXII. *Veronica pratensis serpillifolia*, C. B. Pin. pag. 247. *Teucrium alterum*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ fol. 165. *Veronica pratensis*, Dod. Lateinisch/ f. 41. *Veronica fœmina*, Thal. pag. 131. *Veronica minor serpilli folia*, Lob. ic. pag. 472. *Betonica Pauli quorundam*, Cam. hort. pag. 28. *Auricula muris prima in pratis humectis*, Cæf. lib. 8. c. 27. pag. 335. *Bey Königsberg passim*.

DCCXXXIII. *Vicia sepium folio rotundiore acuto*, C. B. Pin. p. 345. *Aphaca*, Bauh. Matth. f. 416. *Vicia*, Dod. Lat. f. 531. Lob. ic. p. 75. o. Clus. hist. lib. 6. f. 235. Cæf. lib. 6. c. 11. p. 236. *Orobus sylvestris sive Vicia major sylvestris*, & *secunda*, Trag. Seb. in Trag. deutsch/ f. 495. *Aphace*, Fuchs. f. 110.

Nn

Vicia

Vicia sylvestris, Lon. Deutsch/ fol. 285. *Wilde Wicken*/ Matth. Fuchs. *Große Wicken*/ Seb. in Trag. In dumetis & frutetis passim.

DCCXXXIV. *Vicia multiflora hirsuta cærulea*. *Vicia multiflora*, C. B. Pin. pag. 345. Aracus, Tab. lib. 2. fol. 208. *Galega altera*, vel *sylvestris*, aut *Germanica*, Dod. Lateinisch/ 548 *Galega sylvestris Dodonæi*, Thal. pag. 55. *Bogels-Wicken*/ Tab. In dumetis & secùs vias passim.

DCCXXXV. *Vicia multiflora hirsuta purpurea*, Joh. Lœl. *Raue braune vielblütige Wicken*. *In der Hollen-Grund*.

DCCXXXVI. *Vicia multiflora glabra candida*, Joh. Lœl. *Unraue weiße vielblütige Wicken*. *Im Morungischen Walde*.

DCCXXXVII. *Vicia semine rotundo nigro*, C. B. Pin. pag. 345. *Craccæ primum genus*, Dod. Lateinisch/ fol. 582. Aracus, Araca, & Cracca major: *Vicia sylvestris* Lob. ic. 75. o. *Vicia minor*, vel *tertia*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/ 495. *Braune Waldwicken mit runden schwarzen Saamen*. Reperta beym Altstädtischen Gericht in montosis; mense Aprili. *Semen columbarum cibus*, quod inescari possunt, gratissimus. *Flosculis est purpureis*.

DCCXXXVIII. *Vicia segetum cum siliquis plurimiis hirsutis*, C. B. Pin. pag. 345. *Craccæ alterum genus*, Dod. Lateinisch/ fol. 542. *Cracca minor*, Tab. lib. 2. fol. 208. *Vicia minima*, vel *quarta*, Trag. Seb. in Trag. deutsch/ fol. 496. *Aracus sive Cracca minima*, Lob. ic. pag. 76. o. *Kleine wilde Wicken*/ Tab. *Flosculis est tenellis, candidulis*: *siliquis nanis, curtis, hirsutis, binis, trinis, vel quaternis feminulis rotundis gravidis*. Inter segetes passim.

DCCXXXIX.

DCCXXXIX. *Viola Martia purpurea* flore simpli-
ci odoro, C. B. Pin. pag. 199. *Viola purpurea*, Matth. deutsch/
fol. 514. Adv. Lob. fol. 266. Cæl. lib. 9. cap. 39. pag. 393.
Viola Martia purpurea, Tab. lib. 2. fol. 16. *Viola Martia*
odorata nigra seu *purpurea*, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch/
fol 443. *Viola Martia præcox purpurea*, *odora*, simplici
flore, Lob. ic. 608. *Viola nigra*, sive *purpurea* Dod. Latei-
nisch/ fol. 156. *Viola nigra*, Cord. in Diosc. fol. 71. Gesn.
hort. fol. 286. *Viola*, Lon. deutsch/ fol. 214. Blaue oder
braune Violen/ Matth. blaue Violen/ Lond. Blaue oder
braune Merz-Violen/ Tab. In der Hollen-Grund sponte.
Efficax sub elevatione poli 45. 46. 47. 48. Radix effodien-
da Sole i. & ingrediente. Refrigerat, ac pulmonum exul-
cerationibus medetur. Flores efficacissimi Sole in & abeunte.

DCCXL. *Viola Martia inodora sylvestris*, C. B. Pin.
pag. 199. *Viola canina*, Tab. lib. 2. fol. 18. Lon. deutsch/
fol. 214. *Viola sylvestris inodora*, Dod. Lateinisch/ fol. 156.
Viola canina cærulea inodora sylvestris ferotina, Lob. ic pag.
609. *Violæ nigræ sylvestrior species*, Gesn. hort. fol. 286.
Viola purpurea sylvestris sive *canina*, Trag. Sebitz. in Trag.
deutsch/ 443. *Viola Martia canina*, Eystett. *Viola Martia*
sylvestris, Thal. pag. 130. Hunds-Violen/ Lon. Tab. Se-
bitz. in Trag. In der Hollen-Grund passim.

DCCXLI. *Viola tricolor hortensis repens*, C. B. Pin.
pag. 199. Herba sanctæ Trinitatis, Brunf. Lateinisch/ tom.
3. fol. 29. Herba Trinitatis, Fuchs. fol. 803. Lon. deutsch/
fol. 215. Herba Trinitatis sativa, Trag. Sebitz. in Trag. deutsch
fol. 448. *Viola tricolor*, Dod. Lateinisch/ fol. 158. *Viola*
Trinitatis prima, Tab. lib. 2. fol. 24. Jacea, sive flos Tri-
nitatis. Bauh. Matth. fol. 832. *Viola flammnea*, Cæl. lib. 9.

cap. 40. pag. 393. *Viola flammea*, coloria, calida, Lob. ic,
pag. 611. *Freyssam-Kraut* / Tab. Lon. *Treyfaltigkeit-Blum*/
Brunf. *Frembde Sorge Nostratibus.* Cubitum & quadran-
tem alta in lœtiori Sole reperta à me zu Gerdauen. In in-
cultis & desertis passim. Sub elevatione poli graduum 45.
46. 47. 48. Radix eruatur Sole 39. & occupante: folia
cum caulinis, Sole 1. & inhabitante: flores, Sole 30. II
tenente: semen, ultimum & gradum Sole ingresso.

DCCXLII. *Virga aurea solidago Sarracenica dicta*
Joh. Lœf. latifolia, serrata. *Groß heydnish Wund-Kraut mit*
breiten Blättern. Radix ex multis crassis, longiusculis & albidis
fibris constituta, caulem porrigit tricubitalem, nonnunquam
& productiorem, rotundum, ramosum, viridem & striatum,
albicante medullitùs pulpâ, cui folia virentia, tres digitos
transversos lata, ac spithamam ferè longa, lanugine destitu-
ta, & in circuitu egregiè serrata, subserviunt. Fastigia cauli-
um honestantur copiosis flosculis luteis, ætatis tractu in pap-
pos euntibus. *Zur Robbel-Bude am Frisching.*

DCCXLIII. *Virga aurea, Solidago Sarracenica dicta,*
angustifolia serrata, Joh. Lœf. C. B. Pin. pag. 268. *Solidago*
Sarracenica, Dod. *Lateinisch*/ fol. 141. *Trag. Sebitz. in Trag.*
deutsch/ 388. *Fuchs.* fol. 728. *Observ. Lob.* fol. 159. *Adv.*
Lob. fol. 125. *Virga aurea*, Gesn. hort. fol. 286. *Consolida*
aurea, Tab. lib. 2. pag. 258. *Consolida Sarracenica*, Thal.
pag. 27. *Eystett.* *Groß heydnish Wund-Kraut mit schma-*
len Blättern. *Gulden Wund-Kraut* / Tab. *Heydnish*
Wund-Kraut/ *Fuchs.* In longitudinem quatuor imò quinq;
ulnarum excrescit sæpè, caulem pedi loco utendum suppeditans.
Folia dorso lanuginosa ex atro virescunt ac splendent: Quæ
cacumina versùs caulum tendunt, ex incisione crispata veluti
sunt in ambitu. *Zur Robbel-Bude am Frisching.*

DCCXLIV.

DCCXLIV. Virga aurea latifolia serrata, C. B. Pin. p. 268. Virga aurea serratis foliis Tab. lib. 2. f. 546. Virga aurea altera serrato folio, Lob. ic. p. 299. Virga aurea margine crenato, Dod. Lat. 142. *Gülden Wund-Kraut mit breiten Blättern.* *Gülden Wund-Kraut/ Tab. Calida & sicca ordine ferè secundo.* Abstergit, glutinat, adstringit, urinam provocat, & renum calculos atterit, ac expellit. Villanovaⁿ de virtutib⁹ hujus plantæ hæc memoriæ prodit: De virgâ aureâ vidi experimentum in quodam, qui habuit lapidem in vesicâ, & comedit dictam herbam cum ovis omni manè per novem dies, & fractus est lapis, & ipse ostendit mihi manum plenam lapillis. Post addit: Omnia ulcera tām antiqua quām recentia citō consolidat imposita, & ani exitum ac dolorem hæmorrhoidum largè fluentium sanat, in cibo vel potu sumpta. In monte Apollinis hinter Dvednau. Floret Sole in & existente. Optima sub elevatione poli 46. 47. 48. 49. Radix ejus Sole 1. & ingresso collecta, ulcerationibus jecoris & pulmonum deservit. Flores ultimum & gradum Sole occupante colligantur.

DCCXLV. Viscum, Trag. Kyber. in Trag. pag. 949. Fuchs. fol. 329. Dod. Lateinisch/ fol. 826. Matth. deutsch/ fol. 333. Cord. in Diosc. fol. 57. Lon. deutsch/ fol. 87. Tab. lib. 3. fol. 671. Lob. ic. pag. 636. Viscum baccis albis, C. B. Pin. pag. 423. Mistel/ Matth. Kyber. in Trag. Fuchs. Lon. Mispel/ Tab. Emollit, digerit, extrahit, discutit, parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturatōrem perducit, Diosc. Querculanum & in corylo natum epilepticos juvat: In pyro sylvestri proveniens, cum foliis contusum, & pinguedini caponum emplastri instar

mixtum, ac compositum, contracturas sanat. Sebitz. Cortices & baccæ immaturæ aviculis exitiosum.

DCCXLVI. *Viscum fraxini baccis ex albo luteis. Joh. Læs. Eschen-Mispel mit weifgelben Beerlein. Observavi viscum apud nos in abiete, salice, sorbo, tiliâ, quercû, corylô, betulâ, pyrð, pomð, & fraxinô. Quia verò illud è fraxino rarius est, & ante vix ab ullô annotatum, adlibuit in præsenti id paucis depeingere. Hyeme hoc ab arbore dejectum, ex frustis sex, alas veluti quasdam præsentantibus, constituebatur, pediculis nitentibus suis, quorum concursus coronam quasi quandam mentiebatur. Qvælibet ala compressa erat & striata, cubitum ferè alta, uncias duas lata, in fastigio curvata & hiulca. Baccæ, alis & pediculis assistentes, ex albo luteæ spectabantur. Hinter Labiau im Nemonin, quæ cædua est sylva, fraxinis & alnis maximam partem constans, in quâ minimum quatuor mille lignearum struum (quas Achtel-Holz Nostrates dicunt) singulis annis colliguntur, annum redditum Regi nostro sedecim millibus Imperialium augens.


DCCXLVII. Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis, C. B. Pin. pag. 470. Vitis idæa altera, Clus. hist. lib. I. pag. 62. Clus. Pann. pag. 79. Vitis idæa Gefneri major, Cam. hort. pag. 182. Drunckel-Beeren Nostratisbus. Hinter Kar-schau in muscosis. Pulpa baccarum albicat, acini flavescent.

DCCXLVIII. Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. C. B. Pin. 470. Vaccinia nigra, Dod. Lateinisch/ fol. 768. Adv. Lob. fol. 415. Myrtillus, Matth. Deutsch/ fol. 82. Lon. deutsch/ fol. 58. Vitis idæa prima, Tab. lib. 3. fol. 580. Bagolæ primum genus, Cæs. lib. 5. cap. 14. pag. 210. Heidel-Beer/ Tab. Lon. Gemeine Heidel-

No. 85. pag. 280.



Viscum fraxini baccis ex albo luteis.



del Beeren/ Matth. Blau Beeren Nostratibus. In ericetis & muscosis passim.

DCCXLIX. Vitis idaea foliis subrotundis non crenatis baccis rubris, C. B. Pin. 470. Vaccinia rubra, Dod. Lateinisch/ fol. 770. Adv. Lob. fol. 415. Myrtillus exiguus, Trag. Kyber. in Trag. pag. 974. Vitis idaea buxeis foliis. Clus. hist. lib. 1. fol. 61. Vitis idææ species altera acinis rubris, Gesn. hort. fol. 287. Foliis buxi loco utuntur mulieres hybernô tempore in sertis exornandis, quæ sæpiùs inaurant vel argento incrustant. *Bey Schwanis im Gebrüch/ item bey Lauten-Mühl.*

DCCL. Vitis idea foliis oblongis non crenatis baccis rubris. Erica baccifera latifolia, Tab. lib. 3. fol. 810. Hæc in Pinace C. B. omissa. *In der Sarchau.*

DCCLI. Vitis idaea palustris, C. B. Pin. pag. 471. Vaccinia palustria, Dod. Lateinisch/ fol. 770. Lob. ic. pag. 109. o. Oxycoccum, Cord. hist. fol. 140. Eystett. Oxycoccus Valerii Cordi, Cam. hort. pag. 113. Oxycoccum, Cordi, Thal. pag. 83. Vitis idaea tertia in palustribus, Clus. hist. lib. 1. fol. 61. Acinaria palustris, Gesn. hort. fol. 277. Helvetiis & Borussis. *Moss-Beeren. Hinter Karschau.* Item *bey Lauten-Mühl* in muscosis & uliginosis.

DCCLII. Vitis idaea Rorismarini folio, aversâ parte albido ac nervoso. Joh. Lœf. Folia unâ parte virescunt, alterâ albescunt, ac nervo eleganti in duas veluti partes discriminantur. *In der Sarchau/ item bey Schwanis im Gebrüch.*

DCCLIII. Ulmus, πελέα Diosc. & Theophr. Joh. Lœf. Rostern. Folia, cortex & radix adstringunt, abstergunt, glutinant, & fracturas solidant. Foliis se recens vulnus ad συμφυσιν daxis-

Citrus Cedon foliis angustifoliæ,
Abg. Rosmarinus
ælobenos. Clus. Hist.

duxisse scribit Gal. 8. Simpl. Ulmi lignum recens à rusticis sæpè fauciatur, ut nodos crescendo contrahat. Hoc paulò post clavæ & lychnuchi locô utuntur iter facientes. In fylvis passim. Præcox foliorum ulmi ac Persicæ deciduum pestilitatem jumentis portendit. Ulmum arborem servuisse olim censeo horribili illi suppliciorum generi, quod disphendomena vocârunt. Illud ita sumebatur: Arbores proceræ curvabantur, criminoso in deflexis cacumini- bus alligato, quibus repente laxatis, lacerum corpus in di- versa distrahebatur. Hoc suppliciō afficiebatur Bessus, qui Darium interfecrat, perhibente Plutarchō in Alexandro. Membris ita suis plectebatur ab Aureliano Imperatore milles, qui cum hospitis uxore adulterium commiserat, Vopiscō teste.

DCCLIV. Ulmus aut ei similis, cum folliculis, quam aliqui pro Tiliâ mare offerunt, Dod. Lateinisch/ fol. 838. Tilia mas, Matth. Bauh. in Matth. fol. 155. Tab. lib. 3. f. 691. Lob. ic. pag. 188. o. Stein-Linden Tab. Wiecken Nostrati- bus. Foliis insident folliculi purpurei, oblongi, pisī magni- dine, muscas continentes exiles, quæ apertis iisdem avolant. Insunt & nonnunquam vermiculi teretes, qui Cnipes dicun- tur Theophrasto, 2. de hist. Plantar. c. 9. Ex folliculis ul- mi, cum bestiolis innatis, additis aliis, sæpiusculè empla- strum paratur, probatissimo experimento ad puerorum her- nias. Dixi Cnipes vocari ulmi vermes ex Theophrasto. Aliàs στίψ vel κνίψ vermiculus est ligna erodens, quibus e- rosis subinde locum mutat. Hinc proverbium, ο κνίψ είχαγε, i. e. Cnips in regione, dicitur in vagabundum, qui sedem crebriùs mutat, & ex loco in locum migrat, velut Horatius, qui vitio huic se obnoxium fuisse fassus est. Trips simili-

similiter Græcis vermiculum denotat, lignis tām exitiosum, quām Ips cornibus & vitibus. Hinc illud vulgare: *κακὰ μὲν θρίπες, κακὰ δὲ ιπές*, i. e. mali thripes, mali ipes. Lignum arboris tenellum adhuc cultello sæpiusculè circa circum sauciant rustici, ut nodos contrahat, quō resectō pōst clavæ Herculeæ locō utuntur. Ex delibrato cortice Lithvani calceos parant, quos *Parafßen* nominant. In sylvis passim.

DCCLV. Urtica fatua sylvestris aculeata, Thal. p. 131. Cannabis spuria facie urticæ, Lob. ic. pag. 527. Planta hæc C. B. Pin. pag. 232. Urtica aculeata foliis non serratis vocatur, verūm folia serrata obtinet, quæ à pictore omissa, testante Plantinō in iconibus Antverpiæ editis. *Tau-be wilde Nessel/ oder falscher wilder Hanff.* In arenosis passim.

DCCLVI. Urtica urens maxima, C. B. Pin. pag. 232. Urtica major, Fuchs. fol. 107. Tab. lib. 2. fol. 234. Lon. deutsch fol. 138. Thal. pag. 131. Urtica, Cord. in Diosc. fol. 69. Urtica urens altera, Dod. Lateinisch fol. 151. Urtica vulgaris urens prima, Trag. Kyber. in Trag. pag. 2. Urtica sylvestris major, Gesn. hort. fol. 287. Urtica sylvestris asperior, sive Urtica communis, sive major, aut Urtica foemina, Lob. ic. pag. 521. *Große Nessel/ Tab. Gross brennend Nessel* Lon. *Heyter-Nessel* Fuchs. *Donner-Nessel* Nostratibus. Ex hāc elegantissimum ac firmissimum conficitur linteum. Urticā hāc involutum tabacum, biennium & diutiū viribus integrum, servant nautæ. Vilius tabacum hoc segestri munitum, colorem acquirit Nicotianæ Brasilianæ, Circa Regiomontum passim. Copiosissimè crevit

scit in alneto Zwischen dem Pilzchen-Krug und Wonishn-
heim. Attici urticam vocant ἄναληφη, herbam nimirum,
eujus contactu cutis prurit. Miror hinc Antigonom, la-
scivum Juvenem, pro sceptro dextrâ manu pungentes urticas,
& pro aureâ coronâ hederaceam gestasse, & hoc habitu jus
populis dixisse.

DCCLVII. Urtica urens minor, C. B. Pin. pag. 232.
Urtica minor, Fuchs. fol. 108. Cord. hist. fol. 109. Tab.
lib. 2. fol. 335. Lon. Deutsch fol. 138. Thal. pag. 131. Urtica
urens minimia, Dod. Lateinisch fol. 152. Urtica minor a-
crior, Lob. ic. pag. 522. Urtica tertia, Trag. Kyber. in
Trag. pag. 1. Bauh. Matth. fol. 790. Urtica minor, sive
Cania Plinii acrior, Adv. Lob. fol. 223. Heiter-Nessel/ Tab.
Eyter-Nessel/ Lon. Brenn-Nessel Fuchs. Circa loca ha-
bitabilia passim.

DCCLVIII. Vstilago tritici. J. L. Weissen-Brand. Hujus
nulla fit mentio apud Bauh. copiosè tamen reperitur, ita,
ut tritico, antequam pistillæ committitur, aqua sit affun-
denda, pro removendâ ustilagine, quæ paulò post superna-
tat agitato tritico. Urtica fatua sylvestris aculeata Thal.
Cannabis spuria facie urticæ Lob. ic. Urtica aculeata foliis
non serratis C. B. Pin. Laube wilde stachliche Nessel.

DCCLIX. Vstilago secalis, C. B. Pin. pag. 24. Vsti-
lago, Dod. Lateinisch fol. 542. Lob. ic. pag. 35. Lon.
Deutsch fol. 287. Trag. Kyber. in Trag. pag. 66. Vstilago
secalina, Tab. lib. 1. fol. 683. Rubigo & Robigo Horatio
& Virgilio. Korn-Brandt Tab. Brandt/ Lon. Kyber. in
Trag.

Trag. Pulvisculum Vstilaginis pictoribus elegantem colorem fuscum suppeditare scribit. Tab. Fortè intelligit fuliginem hordei usti, quā Gemmarii utuntur in parandis tinturis, quæ Adamanti subduntur. Obiter hoc: Hortorum areas, gressibus destinatas, quas fabulo communiter opplemus, instante hyeme, stramine copiosō si oneraveris, superingesta hybernis frigoribus nix cavebit solidē, ne gramina eo in loco vernō tempore succrescant, quæ alias eradicanda, ut libera sit eundi via.

DCCLX. Vstilago hordei, C. B. Pin. pag. 24. Vstilago hordeacea, Tab. lib. 1. fol. 684. Vstilago polystichi, Lob. ic. pag. 36. Gersten-Brandt Tab.

DCCLXI. Vstilago avenæ, C. B. Pin. pag. 24. Lob. ic. p. 36. Vstilago avenacea, Tab. lib. 1. f. 684. Haber-Brandt Tab. Ex avenaceo vel hordeaceo stramine atramentum, rebus in æs incisis, & exscribendis deserviens: Stramen in minutal concisum, ollæ capaci committitur, eiq; ollar additur, commissuris (ne quid exspiret) benè clausis: post in furnum, ubi vasa figulina coqvuntur, congeritur totum, & uſtulatur aliquandiu: tandem horridè in fundo nigricans materies cum olivo in marmore Porphyretico teritur, ac usui servatur. Præstantius atramentum eam in rem conficitur ita: Fuligo, quæ in vasculis ligneis conclusa passim apud nos distrahitur, ac Dönen-Schwarz salutatur, in ollam figulinam, encausto non pictam, immittitur, orificio exacte clausō. Mox quadrantem horæ, admotis circum circa prunis, exuritur fuligo, ut incandescat. Post calore sponte refrigerato & extincto,

294 PLANTÆ IN PRUSSIA SPONTE NASCENTES.
fuligini ammisetur vernix benè pura & cocta, ac miscella
in marmore tam diu agitatur, donec spissitudinem contrahat.
Cocta vernici aliquantillum aluminis Arabici si addideris,
chrisima obtinebis splendidius. Sunt, qui ex ebore, succino,
vini tartaro ac fæcibus, longè elegantissimum
parant atramentum, rebus ex ære
describendis utile.

F I N I S.



INDEX

INDEX GERMANICUS.

NB. p. paginam, n. numerum indigitat.

2.

Wäfer Alaron p. 62. n. 149.
 Albbis/ Albis / Teuffels Albis.
 bis. p. 263. n. 686.
 Ackerwurz p. 6. n. 10
 klein Holtz-Aepffel p. 157.
 n. 429.
 weiße große Holtz-Aepffel/
 Holtzchen ibid.
 wilde Algley p. 18. n. 46.
 Agrimonien p. 71. n. 176.
 Ahorn/ vid. Leinbaum.
 Allant-Kraut/ Allant-Wurzel
 p. 123. n. 338.
 schwartz Albeer-Baum p. 205
 n. 560.
 Alb-Kraut p. 70. n. 174.
 Alffranck p. 257. n. 670.
 Alhorn/ Ahorn p. 240. n. 638.
 Allerman Harnisch p. 105.
 n. 277.
 Alsp-Nutten p. 235. n. 625.
 Alphanen-Fuß. p. 225. n. 605.
 wäfer-Ampfer/ Röf-Ampfer
 Weyer-Ampfer p. 135. n. 377
 klein Weyer-Ampfer ibid.
 n. 378.
 Haasen-Ampfer / Butter-
 Ampfer p. 135. n. 379.
 Buch-Ampfer p. 275. n. 716.

Anblatt p. 187. n. 517.
 gemeiner weißer Andorn p.
 159. n. 430.
 Andorn-Weiblein ibid.
 schwartziger stinkender An-
 dorn ibid. n. 431.
 Andorn-Männlein ibid. n. 432
 unrauger Wäfer-Andorn
 p. 160. n. 433.
 Wäfer oder rauher Andorn.
 ibid.
 Bruch- oder Wäfer-Andorn
 ibid.
 Wäfer-Angelick p. 15. n. 38.
 wilde rauhe Angelick p. 16.
 n. 39.
 S. Antonii Kraut p. 152.
 n. 422.
 Apostemen-Kraut mit hoch-
 blauer Blum p. 229. n. 612.
 mit weißer Bluth. ibid. n. 613.
 Apostemen-Kraut p. 247.
 n. 648.
 Geel Aprillen-Blumen p. 219.
 n. 592.
 weiß Aprillen-Blumen ibid.
 n. 593.
 Aspen p. 205. n. 561.
 Attich oder niedriger Hollun-
 der p. 243. n. 639.
 Augen-

INDEX GERMANICUS.

- Augen-Trost** p. 72. n. 177.
blauer Augen-Trost p. 64.
n. 153.
brauner Augen-Trost p. 72.
n. 178.
Augenwurk p. 219. n. 593.
Augen-Wurzel vid. Baldrian.
Aurin vid. Laurin.
- B.**
- Bachbungen** klein mit länglich-
 ten Blättern p. 14. n. 33.
 - - mit Polley = Blättern p.
14. n. 34.
 - - mit kurzen länglichsten
 Blättern/ dessen Saam
 in doppelten Schildlein
p. 15. n. 36.
Bären-Klau / Bären-Zah/
 vid. Bartsch.
Bären-Lapp. p. 169. n. 463.
Baldgreiß vid. Creutzwurtz.
Baldrian grosser p. 277. n. 720.
Grüchischer Baldrian p. 278.
n. 721.
Kleiner Wasser - Baldrian/
ibid n. 722.
Wild oder Ragen - Balsam
p. 162. n. 438.
S. Barbara Kraut. vid. Ra-
pungel.
Bartsch p. 262. n. 685.
Barzen-Kraut p. 49. n. 124.
klein/ groß und mittel Ba-
sslien
p. 179. n. 497.
Seidel-Bast p. 139. n. 388.
Wolfs-Bast. ibid.
- Bast** p. 268. n. 700.
Weinwelle p. 264. n. 689.
Weißerling p. 83. n. 207.
Benedicten - Wurk / Kraut/
p. 36. n. 96.
Wässer- und Wald - Benedis-
cten - Wurkel
p. 37. n. 97.
Bengel-Kraut p. 163. n. 439.
Berg-Kraut p. 144. n. 401.
wilder Bertram p. 63. n. 150.
Wiesen-Bertram mit zerkerbs-
 ten Blättern. ibid.
Besem-Kraut vid. Stabwurk.
gross Besem - Kraut p. 130.
n. 362.
weiss Betonien p. 279. n. 725.
Byfusß p. 19. n. 47.
Bibenel p. 195. n. 537.
gross Bibenel/ Stein - Bibenel
ibid.
grosse Welsche Bibenel/
p. 196. n. 539.
Bieber-Kraut. vid. Tausend
Gulden-Kraut.
Bieber-Wurk p. 78. n. 193.
Biesem-Kraut p. 220. n. 594.
Bingel oder Bengel-Krauts-
Weiblein
p. 162. n. 439.
wild Bingel-Kraut Weiblein
p. 136. n. 440.
weiss Bilsen-Kraut p. 127.
n. 353.
gross weiche Binsen p. 130.
n. 364.
blühende Wässer - Binsen p.
131. n. 365
glatte

INDEX GERMANICUS.

- glatte Wäfer-Binsen p. 131.
 n. 366.
 schlechtköpfiche kleine Cy-
 per-Binsen p. 131. n. 367.
 Binzen-Halm p. 118. n. 321.
 gemeine Birck p. 25. n. 66.
 Hangel-Birck p. 26. n. 67.
 Birckling p. 82. n. 205.
 wilder Birn-Baum p. 211.
 n. 583.
 Bitterling p. 82. n. 203.
 Bladloß p. 252. n. 686.
 ein Blat mit Zwieblechter
 Wurzel p. 180. n. 501.
 zwey Blatt p. 180. n. 500
 -- mit zwieblechter Wurzel
 p. 181. n. 502
 Fünff Blatt p. 217. n. 586.
 Blaubeeren. p. 288. 289. n. 748.
 Blumen-Kraut p. 187. n. 517.
 groß Blutt-Kraut p. 196.
 n. 539.
 groß Blutt-Tröpflein p. 196.
 n. 539.
 Blutt-Kraut p. 28. n. 71.
 p. 201. n. 552. 553.
 Bock-Beren p. 122. n. 334.
 Bock-Kraut p. 133. n. 371.
 Bock-Bart/ geeler breitsteng-
 licher p. 270. n. 703. p.
 271. n. 704.
 Bogen-Holz. vid. Eibenbaum.
 Sau-Bohnen. vid. Bilsenkraut.
 Bollen p. 205. n. 500.
 Brand p. 292. n. 758 &c.
 Braunellen p. 208. n. 573.
- groß Wäfer-Braun-Wurz.
 vid. Creuz-Nesel.
 Braun-Wurz p. 250. n. 653.
 Brenn-Kraut p. 221. n. 598.
 Brenn-Kraut vid. Welch.
 Brombeeren p. 232. n. 619.
 Bruchwurz p. 71. n. 174. 176.
 Bruch-Kraut p. 202. n. 554.
 Brunel mit weißer Blüth. p.
 209. n. 573.
 Brunitschken p. 234. n. 622.
 Brust-Kraut p. 39. n. 99.
 rothe Büche oder Buchbaum
 p. 72. n. 179.
 Buch-Aleschen p. 188. n. 520.
- C.**
- Calmus p. 6. n. 10
 Camillen / Chamillen - Blum
 vid. Romey.
 S Christoffels-Kraut p. 4. n. 7
 wilde Christus-Aeuglein p.
 148 n. 409.
 Corallen-Kraut vid. Spargen
 wilde Corinthen. p. 122. n. 335.
 Corneel-Baum p. 55. n. 139.
 Creuz-Blum/blau/ braun und
 weiss p. 182. n. 505. p. 200.
 n. 549.
 Creuz-Holz / Creuz-Beer/
 p. 230. n. 615.
 Creuzwurz / Creuz-Kraut p.
 101. n. 267. p. 252. n. 658.
 wald-Eypres p. 170. n. 464.
- D.**
- Dagget p. 27. n. 67.
 Degen-

INDEX GERMANICUS.

- Degen-Kraut p. 260. n. 681.
großer Dennmarck vid. Bals-
drian.
- Krotten-Dill Hunds-Dill vid.
Hunds-Nomey.
- Ruh-Dill. p. 45. n. 117.
- Acker-Diestel/Haber-Diestel
p. 34. n. 90. breitblätterig
Speer-Diestel p. 34. n. 91.
vielstachliche Acker-Diestel
mit schmalen Blättern / p.
34. n. 92. Weg-Diestel p.
216. n. 684. Dreum-Die-
stel/drey-Diestel p. 50. n.
127. Fliegen-Diestel/Müs-
cken-Diestel p. 22. n. 55.
groß Garten-Diestel/braun
Karten-Diestel p. 62. n.
148. Säu-Diestel mit brei-
ten und schmalen zerschnitte-
nen Blättern p. 257. 258.
n. 672. 673. mit spitzigen
und absätzigen Blättern / i-
bid. n. 675. Vielstachliche
Wiesen-Diestel mit schma-
len Blättern p. 35. n. 93.
- Doll-Kraut. vid. Bilsen-
Kraut.
- Doll-Wurz p. 257. n. 671.
- Dorn/Sommer-Dorn p. 61.
n. 145. Marien-Dorn p.
232. n. 618. Weg-Dorn-
Beer p. 230. n. 615. schma-
ler weidenblättriger Stech-
Dorn p. 230. n. 616.
- Stech-Dorn der ander p.
231. n. 616. Purgierende
Stech-Dorn oder Kreuz-
Beer p. 230. n. 615.
- Dort. p. 121. n. 331.
- Dosen-Kraut/ Alb-Kraut p.
70. n. 174.
- Dost/Wirbel-Dost p. 50. n.
126. Wasser-Dost p. 70.
n. 174. weiß Wasser-Dost
p. 71. n. 175. gemein Dost
p. 185. n. 512. brauner und
weisser Feld-Dost p. 185.
n. 512. p. 186. n. 513.
- Dotter vid. Lein-Dotter.
- Dotter-Bluhm / vid. Ruh-
Bluhm.
- Drachen-Wurz p. 6. n. 10.
p. 62. n. 149.
- Drespe p. 121. n. 331
- Drunkel-Beeren p. 288. n.
747.
- Drüff-Wurz p. 222. n. 598.
- Dreyfaltigkeit-Bluhm p. 286.
n. 741.
- Dürr-Wurz/scharfe/ blaue/
p. 52. n. 134. Wasser-Dür-
Wurz mit zerschnittenen
Blättern p. 53. n. 135. Dür-
Wurz mit Kugel-runder
Blüth. item kleine Dürr-
Wurz ibid. Wasser Dürr-
Wurz mit tieff und schlecht
zerschnittenen Blättern p.
54. n. 127. 128.

Dürr-

INDEX GERMANICUS.

- Dürr-Kraut p. 202. n. 554.
 Durchwachs/ gelb. p. 29. n. 73.
 Durchwachs - Männlein/ p.
 180. n. 500.
- L**
- Eber-Wurz p. 35. n. 94.
 Egel-Kraut/ groß und klein
 p. 177. n. 492.
 Ehren-Preiß p. 282. n. 730.
 Eiben-Baum p. 266. n. 693.
 Eiche / Eich-Baum p. 211.
 n. 584.
 Erd-Eiche/ Erd-Eichel p. 73.
 n. 187.
 Meer oder See-Eiche mit
 Blasen p. 216. n. 585.
 Eichen-Lung p. 172. n. 473.
 Ein-Ber / p. 257. n. 671.
 Ein-Bladt p. 141. n. 396. mit
 Zwieblechter Wurzel p.
 180. n. 501.
 Eisenhart/ Eisen-Kraut / Eis-
 serich p. 5. n. 8. p. 281. n. 729.
 Eisen-Kraut p. 69. n. 171.
 vid. **C**reuz-Wurtz.
 Elisabeth-Kraut p. 43. n. 173.
 Endten-Flott p. 139. n. 389.
 Elren-Baum p. 10. n. 19.
 Engel-Blümlein / weiß und
 braune p. 107. n. 280.
 Engelsüß p. 204. n. 559.
 Berg-Eppich/ Berg-Peters-
 lein p. 18. n. 45.
 Wässer-Eppich/ Wässer-Epf /
 Wässer-Peterlein p. 223.
 n. 600. p. 255. n. 667.
- dreyspitziger Wässer-Eppich
 p. 139. n. 390.
 Grosch-Eppich p. 255. n. 667.
 Feig-Blätter-Eppich p. 223.
 n. 600.
- Wässer-Epheu p. 139. u. 390.
 kleiner Baum- und Wald-
 Epheu p. 122. n. 336. Erd-
 Epheu p. 123. n. 337.
 Erdbeer-Kraut/ gemein und
 weit kriechend p. 75. n. 188.
 189.
 Erd-Gall. vid. **T**ausendgül-
 den-Kräut.
 Erd-Nauch p. 77. n. 192. mit
 runder hohler und dichter
 Wurzel p. 78. n. 193. 194.
 Erd-Schmeer. p. 91. n. 235.
 Erd-Spinnen-Kraut ohne
 Ast/ p. 193. n. 533.
 Erwenwürger p. 186. n. 515.
 Esch-Baum / Eschern-Holz/
 Stein-Eschern p. 76. n. 190.
 Esels-Huff / vid. **H**uff-Lattich
 Espen p. 205. n. 561.
 Eyer-Blum p. 61. n. 145.
- F**.
- Farb-Kraut/ gelb p. 101. n.
 266.
- Farn-Kraut p. 73. n. 182.
 großästiges ohngezähntes
 Farn-Kraut/ p. 74. n. 183.
 kleinästiges/gezähntes Farn-
 Kraut ibid. n. 184. gezähn-
 tes
- Pp

INDEX GERMANICUS.

INDEX GERMANICUS.

- Gänse-Fuß p. 23. n. 58.
 Gänse-Kraut p. 207. n. 569
 Gänzichen p. 86. n. 221.
 Garb/ Wäser=Garb / oder
 Wäser=Violen mit nackten
 Stengeln p. 166. n. 448.
 groß Garben/ groß Garben-
 Kraut p. 164. n. 442. Feld-
 Garb/ weiße Garb. ibid.
 Wäser=Garb mit geelen
 Blümlein p. 165. n. 444.
 knotiche mit kleinen weißen
 Blümlein ibid. n. 445. Fa-
 demblättrige Garb ibid. n.
 446. Feder-Wäser=Garb
 ibid. n. 447.
 Gassen-Wurz p. 135. n. 379.
 Gauch-Blum p. 41. n. 108.
 Gauch-Brodt vid. Bocksbart
 Gauchheil p. 14. n. 32. vid.
 Wolfs-Bohnen.
 Gauch-Haber p. 73. n. 180.
 Geelbörchen p. 81. n. 200.
 Holz-Geelörchen p. 90. n.
 233.
 Geiß-Bart p. 23. n. 60.
 Geiß-Fuß. p. 16. n. 40.
 Genst/ Genster p. 101. n. 266.
 Gelenc-Wurz p. 200. n. 550.
 Gentian (klein) p. 101. n. 267.
 S. Georgen-Wurz p. 187.
 n. 517.
 Gertlein/ Gertel/ Gertwurz/
 p. 170. n. 464.
 Gerwel p. 164. n. 442.
- Gerstenhwalch vid. Gauch-
 Haber.
 Gersten-Brand p. 293. n. 760.
 Gessel-Blum p. 46. n. 119.
 Gicht-Beeren p. 122. n. 334.
 Gicht-Kraut p. 105. n. 276.
 vid. Himmels-Schlüssel.
 Giersch/ Hund-Giersch p. 16.
 n. 39. 40.
 Gil-Blum p. 101. n. 266.
 Blattling p. 83. n. 206.
 Glieder-Kraut p. 160. n. 433.
 Glied-Kraut p. 149. n. 411.
 p. 254. n. 664.
 Gliedweich p. 149. n. 411.
 Glocken-Blum/ blau und weiß
 p. 33. n. 87. 88. p. 225. n.
 605. Wind-Glocken/ Zaun-
 Glocken p. 51. n. 131.
 Wald-Glocklein p. 61. n.
 147. klein Glocklein p. 230.
 n. 614. blaue Glocken ibid.
 Gold-Blum mit Rheinfahre-
 Blätter p. 47. n. 120.
 Goldwiesen-Blum/ vid. Ruh-
 Blum.
 Goldwurz p. 141. n. 394. vid.
 Schin-Kraut.
 Gotts-Bärtlein p. 196. n. 539.
 Gottes Gnad p. 105. n. 276.
 Gottheil p. 208. n. 573.
 Gottes-Vergeß p. 159. n. 430.
 Grähnen-Holz/ vid. Thanne.
 Gråsing vid. Genserich.
 Graß / 49. Figerley. Besiehe
 nach

INDEX GERMANICUS.

- nach der Ordnung von p.
107. bis 121. von n. 284.
bis 332.
- Gried/ Berg-Griedt p. 118.
n. 321.
- Grind-Kraut vid. Creutz-
Wurz. Schaff-Grind-
Kraut p. 229. n. 612.613.
- Grind-Magen p. 188. n. 525
- Grind-Wurz/ dessen Blätter
eine Elle lang p. 135. n. 377.
klein Wäser-Grindwurz
p. 135. n. 378. Grindwurz
mit hohlen rundeckten Blät-
tern p. 135. n. 379. Grind-
wurz mit spiken krausen
Blättern p. 135. n. 380.
- Grinsing p. 207. n. 569.
- Grüssling p. 86. n. 220.
- Grundheil vid. Ehrenpreiß.
- Grunsig p. 207. n. 569.
- Guckguck's Blum p. 41. n. 108.
- Günkel; Gülden Günkel p.
50. n. 128. blau Gülden-
Günkel ibid. roth Gülden-
Günkel ibid. n. 129. roth
Günkel vid. Tormentil.
- Gundreb/Gundelreb p. 123.
n. 337.
- Gürtel-Kraut p. 169. n. 463.
- S.**
- Haar-Schaar und Teuffels-
Klauen. p. 169. n. 463.
- Haarstrang p. 178. n. 493.
- Haarwurz ibid, (Diestel.
- Haber-Diestel vid. Acker-
- Haber-Graf p. 73. n. 180.
- Gauch-Haber / Maus-
Haber/ Taub-Haber p. 73.
n. 180.
- Haberbrandt p. 293. n. 761.
- Habicht-Kraut (klein) mit
Wegwarten-Blättern p.
124. n. 343. unrauhes Ha-
bicht-Kraut mit Wegwart-
Blättern ibid. n. 344. wild-
Habicht-Kraut p. 125. n.
345. rauhes Habicht-Kraut
mit breiten Blättern und
großer Blüth ibid. Berg-
Habicht-Kraut mit breiten
unzerschnittenen Blättern p.
125. 346. Alstiges Berg-
Habicht-Kraut mit rauhen
Blättern p. 125. n. 347. klein
Berg-Habicht-Kraut mit
breiten unraugen Blättern
p. 126. n. 348. Grossstaudi-
ges Habicht-Kraut mit
schmalen Blättern p. 126.
n. 349. Habicht-Kraut mit
Pfaffen-Dehrleins Blät-
tern p. 126. n. 350. Weg-
warten-Habicht-Kraut i-
bid. Habicht-Kraut mit
langleckten und am Rande
stachlichen Blättern p. 126.
127. n. 351.
- Händchen p. 49. n. 264.
- Händel-Kraut/ Hüner-Kau-
ten p. 13. n. 26. Wäser-
händ-

INDEX GERMANICUS:

- Händleins-Wurz mit glatten schmalen Blättern p. 181. n. 504. Händleins-Wurz p. 182. n. 505. gesprengte Händleins-Wurzel ibid. mit gehelunter lichtgrüner Blüth n. 506. umbgekehrt mit weißer Blüth ibid. n. 507
- Hänlein = Wäser = Hänlein / Fluss = Hänlein p. 223. n. 601. gelb und weiß Wald-Hänlein p. 219. n. 592. 593.
- Hagedorn p. 163. n. 441.
- Hahnen-Bein / p. 110. n. 289.
- Hahnen-Fuß / Biesem = Hanen-Fuß p. 220. n. 594. rauger Wald = Hanen-Fuß mit Benedicthen = Wurz Blättern / p. 220. n. 595. scharffer / wilder / gelber Acker- und Wiesen-Hahnen-Fuß p. 221. n. 596. kriechender Wiesen-Hanenfuß / Weingart-Hahnen-Fuß ibid. n. 597. Küben-Hahnen-Fuß / p. 222. n. 598. ungeföllter Garten-Hahnen-Fuß. Äcker-Hahnen-Fuß mit stachlichen Kopffen p. 222. n. 599. Glatter Eppich-blättriger Wäser = Hahnenfuß / p. 222. n. 600. groß lang Wäser- oder Speer-Hahnen-Fuß p. 223. n. 603. langer Wäser-Hahnen-
- Fuß p. 224. n. 604. Hahnen-Fuß mit Wolffswurzhafstigen Blättern / da ein rundes Blat an der Wurzel sitzt p. 225. n. 605.
- Hahn-Höddlein p. 70. n. 173
- Hahnen-Kamm / p. 190. n. 525.
- Hahnen-Kamp / p. 54. n. 157.
- Hahnen-Kopff p. 179. n. 498.
- Hackel-Kraut / p. 209. n. 575.
- Hanbutten oder Han-Rosen p. 232. n. 618. wilde fleischfarbe riechende Hanbutten oder Feld-Rosen / p. 131. n. 618.
- Handschuh-Blumen vid. Simmels-Schlüssel
- Hals-Kraut / gemein Niefel-blättericht scharfes Hals-Kraut p. 32. n. 84. Niefel-blättericht Hals-Kraut mit weißer Blüth p. 33. n. 85. klein Hals-Kraut mit deichtaneinander gesetzten Blumen p. 33. n. 86. (n. 89.
- Hanff / wilder Hanff p. 33.
- Harn-Kraut p. 202. n. 554.
- Groß Harn-Kraut p. 142. n. 397. Meer-Harn-Kraut mit wölreichenden Blumen p. 192. n. 398.
- Hark-Baum p. 196. n. 540.
- HartNiegel p. 55. n. 39.
- Hasel-Nuss / Hasel-Baum / Hasel-Strauch p. 55. n. 140.
- Gee-

INDEX GERMANICUS.

- Geele Haasel= Blumen** / p. 219. n. 592.
- Hasel-Wurz** p. 19. n. 49.
- Hasen-Aug** vid. **Benedicten-Wurtz.**
- Hasen-Brodt** / **Hasen-Oehrlein** p. 112. n. 300. p. 92. n. 240.
- Hasen-Fuß** p. 274. n. 714.
- Hasen-Pfötlein** p. 107. n. 280. p. 273. n. 710.
- Hasen-Gras** p. 112. n. 300.
- Hasen-Kohl** / vid. **Kohl.**
- Hasen-Klee** p. 273. n. 716
- Häubüchen oder Haynbüchen** p. 188. n. 520.
- Haugenblum** vid. **Romey.**
- Hauhechel** / braun/ mit und ohne Stengel/ p. 17. n. 41. 42.
- Hauf-Lauch** / **Haufwurz** / groß und klein p. 251. 252. n. 655. 656.
- Hederich** p. 69. n. 171. **Hederich** oder **Heiden-Rettich**/ p. 228. n. 610. **Wäfer-Hederich** p. 227. n. 609.
- Heer-Moß** / vid. **Moß.**
- Heidelbeer** p. 288. n. 748.
- Heiden** p. 67. n. 163. schmal-blättrige Heide mit schwarzen Beeren p. 67. n. 164.
- Heinrich** / stolzer guter Heinrich/ p. 136. n. 381.
- Heid-Näglein** / vid. **Näglein.**
- Heidnisch Wund-Kraut** / vid. **Wund-Kraut.**
- Heil aller Schaden** p. 102 n. 277.
- Heil aller Welt** vid. **Benedicten-Wurtz.**
- Heiiblat** p. 267. n. 695.
- Heil-Kraut** / **gulden Heil-Kraut** p. 43. n. 113.
- Heim-Kraut** / **Wäfer-Helm-Kraut** p. 165. n. 444.
- Hendel-Kraut** / vid. **Händel-Kraut.**
- Herbstling** p. 82. n. 204.
- Herz-Freude** / vid. **Meeske.**
- Herz-Gespan** p. 159. n. 432. **Herzgesperr** und **Herz-Kraut.** ibid.
- Heyd** / vid. **Heid.**
- Heydecker** / vid. **T tormentill.**
- Heydenschmuck** p. 101. n. 266
- Heydnische Blumen** p. 141. n. 394.
- Himels-Brand** / vid. **Welk.**
- Himmels-Schlüssel** / p. 279. n. 725.
- Hindbeeren** p. 233. 234. n. 621
- Hirnschaal** / p. 188. n. 521.
- Hirsch-Mülde** / p. 23. n. 59.
- Hirsch-Brunst** / p. 95. n. 250.
- Hirsch-Kraut** / p. 78. n. 139. vid. **Alffranden.**
- Hirsch-Wund-Kraut** p. 70. n. 174.
- Hirsch-Wurz** / p. 254. n. 663.
- Hirse** / **Wald-Hirse** / p. 161. n. 435. **Meer-Hirse** / **erhabene**

INDEX GERMANICUS.

- bene grosse Meer-Hirse / p. 142. n. 399. kleine Meer-Hirse p. 143. Acker-Meer-Hirse p. 143. n. 403. wilde ibid. braunechte Wald-Hirse p. 160. n. 434. breitblättrige gelbe Wald-Hirse ibid. Hirten-Tasch / Hirten-seckel / vid. Taschel-Kraut.
- Hödlein / Fuchs-Hödlein / p. 181. n. 503. Einhödlein-Wurz mit lichtgrüner Blüht / p. 184. n. 510.
- Hochmuth und Muthwillen p. 40. n. 105.
- Hollunder / Holder / Holder-Baum / p. 240. n. 638. Wasser - Hollunder mit schlechter Blüth p. 243. n. 640.
- Hollwurz / kleineste Hollwurz p. 220. n. 514. runde / feste / gemeine Hollwurz p. 78. n. 193. 194.
- Hölzken p. 157. n. 429. Holz-Apfel ibid.
- Holz-Birn / vid. Kruschen / p. 211. n. 583.
- Hopffen / wilder Hopffen p. 273 n. 710. fruchtbahrer / zahmer Hopffen p. 146. n. 405. unfruchtbahrer Hopffen p. 147. n. 406. Hopfen-Kühn p. 147. n. 405.
- Huff Lattich vid. Lattich.
- Hüner-Augen vid. Gaulbaum. p. 11. n. 20.
- Hüner-Biß / vid. Meyer. Hüner = Biß mit Gundelreb Blättern p. 135. n. 376.
- Hünerdarm mit Ehrenpreiß Blättern p. 13. n. 27. mit Epheu-Blättern p. 13. n. 28. mit Gamanderlein Blättern p. 13. n. 30. Meer-Hünerdarm p. 12. n. 22.
- Hüner-Fuß vid. Pfefferkraut
- Hüner-Rauten vid. Sändel-Kraut.
- Hunds-Aug. p. 45. n. 117. p. 53. n. 136.
- Hunds-Blum p. 61. n. 145.
- Hunds-Gras p. 127. n. 352.
- Hunds-Milch / vid. Wolfs-Milch.
- Hunds-Nomey / p. 44. n. 116.
- Hunds-Kirschen p. 42. n. 112.
- Hundswürgel p. 203. n. 556.
- Hunds-Viole p. 285. n. 740.
- Hunds-Zahn / p. 127. n. 352.
- Hunds-Zung / kleine / auch große gemeine mit Blumen / p. 60. n. 143. p. 64. n. 153.
- J.**
- S-Jacobs-Blum / S-Jacobs-Kraut p. 129. n. 360. mit Winter-Kreß-Blättern / ibid. n. 361.
- Je länger je lieber p. 257. n. 670.
- Jgels-

INDEX GERMANICUS.

- Igels-Knospen p. 260. n. 681.
 Immer-Grün/ p. 251. n. 655
 S. Johannes-Blum p. 24. n.
 61.
 S. Johannes-Kraut/ p. 128.
 n. 354.
 S. Johannis/ fahme/ wilde
 und schwarze Beerlein/
 Fräublein p. 121. 122. n.
 333. 334. 335.
 Johannis-Würmlein p. 203.
 n. 556.
 ISEN-Kraut vid. Eysenhart.
 Isopp. Berg-Isopp oder Hei-
 den p. 43. n. 113 wilder Is-
 sop/ Kirch-Isop/ Kalbs-Is-
 sop/ Zwiebel-Isop. p. 245.
 n. 643.
 Jungfrau/ verfluchte Jungfrau
 p. 48. n. 121.
 Jungfer-Tritt. p. 201. n. 552.
 Jungfer-Gras p. 202. n. 554.
 Jungfrauen-Haar. p. 7. n. 11.

R.
 Kälberkropff / Kälber-Korn/
 p. 175. n. 486.
 Karten-Diestel/ p. 62. n. 748.
 Kaninchen-Baum/ vid. Was-
 ser-Hollunder.
 Katten-Poten/ p. 65. n. 155.
 Kattich/ p. 132. n. 368.
 Kakken-Käschchen/p. 157. n. 428.
 Kakken-Klee/ p. 273. n. 710.
 Kakken-Münz/ p. 162. n. 437.
 Kakken-Kraut/zahm. p. 162.
 n. 437.
- Kakken-Körbel-Kraut/ p. 77.
 n. 192.
 Kakken-Leiterlein/ p. 169. n. 46;
 Kakken-Upt/ p. 162. n. 437.
 Kakenschwanz / klein und
 groß p. 65. n. 157. p. 274.
 n. 714.
 Kakewädel/ p. 65. n. 158.
 Kakenträublein/p. 252. n. 656
 Kakewurzel/ vid. Baldrian.
 Kellers-Halß p. 139. n. 388.
 Kellerwurz/ p. 178. n. 493.
 Kerz/ Unholden-Kerz/ Feld-
 Kerz/ vid. Welck.
 Keulwurz/ p. 178. n. 493.
 Kien-Holz / Kiefer-Holz p.
 196. n. 540.
 Kirschen/ Ahl-Kirschen/ vid.
 Gaulbaum. Hunds-Kir-
 schen/ Teuffels-Kirschen/p.
 42..n. 112. schwarze Teuf-
 fels-Kirschen.
 Klapper/ p. 190. n. 525.
 Kleb-Kraut/ p. 17. n. 43.
 Klee-Blume/ p. 145. n. 402.
 Buch = Klee/ ibid. Herz.
 Klee Hirz-Günstel/ Herz-
 Wund = Kraut. p. 70. n.
 174. Geeler Haasen-
 Klee. p. 144. n. 401.
 kleine unrauge fünffblättri-
 ge gelbe Schoten-Klee/ p.
 145. n. 402. Horn-Klee/
 Honig-Klee ibid. wilder/
 gemeiner oder grosser/ item
 geeler

INDEX GERMANICUS.

- geeler Stein-Klee. p. 161.
 n. 436. braun Wiesen-Klee
 p. 272. n. 707. weiße Wies-
 sen-Klee ibid. n. 708. geeler
 Wiesenkleib ibid. n. 709. weis-
 ser spitzer Berg-Klee/ p.
 273. n. 711. Gross brauner
 Berg-Klee/ p. 273. n. 712.
 großer Geiß-Klee p. 273. n.
 713. Bieber-Klee p. 272. n.
 706 Spieß-Klee p. 272. n.
 708. Feld-Klee ibid. n.
 709. Rätschen-Klee p. 273. n.
 710. 714. Hasen-Klee p.
 274. n. 714. 716. grosser
 Stein-Klee p. 274. n. 715.
 Guckgauch-Klee p. 275. n.
 716. Buch-Klee/ Saur-
 Klee ibid. Gulden-Klee/
 Hirsch-Klee p. 275. n. 717.
 Klette/ grosse Klette mit weiss-
 en Blumen p. 137. n. 383.
 mit Purpurfarben Blumen
 p. 136. n. 382. kleine Klette
 p. 137. n. 384. Igels-Klet-
 ten ibid. Leber-Kletten p. 71.
 n. 176. Würenkletten p. 136.
 n. 382. Ross-Kletten ibid.
 Kletten-Kraut p. 60. n. 144.
 Knabewurz / wilde / item
 dunkle missgebürtige Kna-
 benwurz p. 184. n. 511.
 Knavel/ Knäwel p. 203. n. 556
 Knoblauch/ Knoblauch-Kraut
 Wald-Knoblauch/ Hundsk-
 oblauch/ Acker-Knob-
 lauch p. 8. n. 15. 16. Berg-
 Knoblauch mit Purpurfar-
 ber Blüth p. 9. n. 17. Berg-
 Knoblauch mit runden
 Purpur-farben Röpflein
 p. 9. n. 17. Lacken-Knob-
 lauch/ Wasser-Knoblauch
 p. 248. n. 650.
 Kolben/ Narrenkolben/ See-
 Kolben/ Mooskolben/ Dei-
 telkolben/ p. 277. n. 719.
 Kolbleskraut/gross p. 196. n. 539
 Königs-Blum. p. 5. n. 8.
 Königs-Braut p. 71. n. 176.
 Königskerze vid. Welck.
 Kohl/ Acker-Kohl mit bleich-
 gelben Blumen p. 228. n.
 610. Hasen-Kohl p. 258. n.
 674. Rückucks-Kohl p.
 275. n. 716.
 Körbel/ wilder Körbel p. 175.
 n. 486. mit scharfsem Saas-
 men p. 175. n. 487. so keinen
 Geruch hat. ibid.
 Korn/ Kälberkorn p. 175. n.
 486. Taub-Korn p. 121.
 n. 331. gross Tausendkorn
 p. 202. n. 554.
 Korn-Blum/ p. 60. n. 142.
 Korn-Brand p. 293. n. 759.
 Korn-Münz/ p. 31. n. 82.
 Kozelar/ schwarz und weiß/
 p. 84. n. 210.
 Krähen-Beren p. 67 n. 164
 Kra-

INDEX GERMANICUS.

- Kramot-Baum** vid. **Wachol-**
der. **Kunigund Kraut Weible** / p.
Kranich = **Schnabel** vid.
Storch- **Schnabel.** **54. n. 128.**
Krauelbeeren/ blaue p. 233.
n. 620.
Kreß/Meer-Kreße p. 60. n. 107
wilde Kreß p. 130. n. 362.
Brun-Kreß/ Wasser-Kreß
die erste und andere p. 176.
n. 489. 490. **Wiesen-Kreß**
mit großer Blüth ibid. **wil-**
de Kreß mit ganz kleinen zer-
theilten Blättern ibid.
Krostlincken/ oder Kerstienken-
Kraut p. 53. n. 136.
Kreuz-Ber vid. **Creutzbeer.**
Krottensiel/ groß und klein/
p. 93. n. 242. 243.
Krotten-Graß p. 115. n. 312.
Kruschken p. 211. n. 583.
Küchern/ braunrothe frühlzeiti-
tige Wald-Küchern p. 187.
n. 518. **Würffelsaamichte**
Küchern mit Wicken-Blät-
tern ibid. **wilde Küchern/**
p. 138. n. 385.
Küh-Blum p. 32. n. 83.
Kuhmilden p. 85 n. 217.
Kuchen-Schellen p. 209. n.
575.
Kürbeeren p. 55. n. 139.
Kürbs/ Hundes-Kürbs p. 29.
n. 75.
Kühwurz/ Küh-Kraut p.
163. n. 439. **L.**
Lab = **Kraut** vid. **Meyer-**
Kraut.
Läuse/ Bettlers-Läuse p. 137.
n. 384. **Buben-Läuse/ Igels-**
Läuse. ibid.
Läuse-Kraut p. 139. n. 388.
geel Läuse-Kraut p. 190. n.
525. **Läuse-Kraut mit Pur-**
purfarben-Blumen ibid. n.
526. **braun Läuse-Kraut/**
braun Wiesen-Läuse-Kraut
ibid. mit weissen Blumen
p. 191. n. 527.
Lahke p. 83. n. 207.
Lakarike p. 106. n. 279.
Lattich/ Weg-Lattich/Wiesen-
Lattich/ Hund-Lattich p.
61. n. 145. **Butter-Lattich**
p. 135. n. 379. **Huff-Lattich**
p. 276. n. 718. **Brand-Lat-**
tich ibid. **Brandletzchen**
ibid. **kleiner Brunn-** oder
Frosch-Lattich p. 206. n.
566. **Lämmer-Lattich** p. 278
n. 723.
Lauch/ Ziegen-Lauch/ p. 186.
n. 514.
Lauchel/vid. **Knoblauch-Kraut**
Laurin/ Laurin/ vid. **Tausend-**
Gulden-Kraut.
Leber-Blumen/ weisse/ p. 108.
n. 284. **braune/** p. 196. n. 539
Lebers-

INDEX GERMANICUS:

- Leber-Klätten/ vid. Kletten.
 Leber-Kraut/ p. 140. n. 393.
 Stein-Leber-Kraut/ braun
 Leber-Kraut/ ibid. Stein-
 Leber-Kraut vid. Meeske.
 blau Gülden Leber-Kraut/
 Edel Leber-Kraut p. 275.
 n. 717.
 Lein-Baum p. 3. n. 4.
 Leindotter mit langen Schoten
 p. 174. n. 483. rauger Lein-
 dotter mit runden Schot-
 lein p. 175. n. 485.
 Lein- und Harn-Kraut p. 142.
 n. 397.
 Lerchen-Klau p. 51. n. 130
 Liebstock/ wilder p. 49. n. 124.
 Lilgen/ Lilien/ groß Lilgen. p.
 193. n. 533. bleichrothe pun-
 ctirte wilde Lilien/ p. 141. n.
 394. Berg-Lilien/ heidnische
 Lilien ibid. Wasser-Lilien/
 p. 178. n. 493.
 Lilgen-Convalgen. vid Mäy-
 en-Blümlein.
 Linde/ Linden-Baum p. 268.
 n. 700. Stein-Linden p.
 260. n. 754.
 Linsen/ Wasser-Linsen/ p. 139.
 n. 389. Meer-Linsen ibid.
 Sichel-Linsen p. 251. n. 654
 groß kriechende Linsen p. 274
 n. 715.
 Linsen-Kraut/ klein kriechend
 Linsen-Kraut mit vierf.
- Fichter Frucht p. 139. n. 391
 schmalbtättericht und zer-
 schnittenes p. 140. n. 392.
 Löwen-Fuß/ vid. Sinnau.
 Löwen-Zahn p. 61. n. 145.
 Lob-Kraut/ p. 100. n. 265.
 Löffel-Kraut/ Frosch-Löffel-
 Kraut/ p. 199. n. 547.
 Lorbeer-en/ Scheiß-Lorbeer-en
 p. 139. n. 388.
 Lüsch/Lolch p. 121. n. 331.
 Lungen-Blumen p. 102. n. 268
 Lungen-Kraut p. 172. n. 473.
 Lungen-Moos mit dunckeln
 Burkeln p. 172. n. 474.
- M.**
- Madelgeer vid. Modelgeer.
 Mähl-Baum p. 163. n. 441
 Magd-Blum vid Romeo.
 Magsahmen/ Feld- Magsaas-
 men p. 188. n. 521.
 Mälde/ Hirsch-Mälde/ p. 23.
 n. 59.
 Mangolt/ Hirsch-Mangelt/
 p. 265. n. 690. Holz-Man-
 golt p. 210. n. 577. Wald-
 Mangolt p. 210. n. 577.
 wilder Mangolt p. 135. n.
 n. 379. Wiesen-Mangolt.
 Mans-Treue/ Meer oder
 See-Mans-Treue p. 69.
 n. 170.
 Margendrehen p. 184. n. 511.
 Märgen-Graß p. 111. n. 297.
 Mar-
- Q q 2

INDEX GERMANICUS.

- Margen-Rößlein roth/ und
wild p. 148. 149. n. 409.
411.
- Marien-Gras p. 111. n. 297.
- Marien-Rößlein/ klebrichte
weiße mit Ohrloßel-Kraut
Blättern p. 150. n. 414.
- Marien-Nessel p. 162. n. 437.
- Masholder vid. Leinbaum.
- Mastlieben/ große und kleine
Mastlieben p. 24. n. 61. 62.
Große gelbe Mastlieben p.
25. n. 63. große gelbe Maß-
lieben mit tiess zerschnitte-
nen Blättern p. 25. n. 63.
- Matten-Flachs p. 114. n. 307.
- Maur-Näglein p. 39. n. 104.
- Mäus-Dehrlein p. 107. n. 280
blaue Mäus-Dehrlein p. 63
n. 151. blaue Wäfer Mäus-
Dehrlein p. 64. n. 153. groß
gerades Mäus-Dehrlein p.
193. n. 534. kriechendes/
rauges/ kleines p. 193. n. 535
536. weiße Acker-Mäus-
Dehrlein p. 63. n. 152.
- Mäus-Dehrchen p. 92. n. 239.
- Mäus-Schwänzlein p. 127.
n. 352.
- Mayholz p. 238. n. 630.
- Medesüß/Med-Kraut p. 23.
n. 60.
- Meer-Fadem/ Meerstrang/
p. 75. n. 186.
- Meer-Gras p. 7. n. 14. rund-
- blättriges und in der Spiz
zweyspaltiges Meer-Gras
p. 77. n. 191.
- Meer-Harn-Kraut vid.
Harn-Kraut.
- Meer-Hirse/ vid. Hirse.
- Meer-Hünerdarm/ vid. Hü-
nerdarm.
- Meer-Kresse/ vid. Kresse.
- Meer-Mans-Treu/ vid.
Mans-Treu.
- Meer-Näglein p. 40. n. 107
- Merrettich/Merrich p. 226.
n. 607.
- Meerstachel-Wurz/ p. 133.
n. 371.
- Meerwurzel/ p. 69. n. 170.
- Meeske p. 21. n. 52.
- Meger-Kraut p. 166. n. 449.
- Meliß/wilde Meliß p. 254. n.
665.
- Mengolwurz/ wild p. 135.
n. 379. krause spitze Mens-
golwurz p. 136. n. 380.
- Mercurius-Kraut p. 163. n.
439.
- Merken-Blum p. 61. n. 145.
weiße Merken-Blum p.
219. n. 593.
- Merk-Violen vid. Violen.
- Meyer-Blümlein p. 141. n. 395
- Meyer/Meyer-Kraut/ groß
und klein p. 12. n. 22. 23. 24.
25. p. 100. n. 265. rother
Meyer p. 14. n. 32. weiß
glat

INDEX GERMANICUS.

- glat Meyer-Kraut p. 18.
 n. 44. wilder Meyer p. 28.
 n. 70. kleiner und großer
 rother Meyer p. 28. n. 71.
 72. groß Stern-Meyer-
 Kraut p. 166. n. 44. breit-
 blättriges weißes Meyer-
 Kraut. Ibid.
 Milch-Blum p. 200. n. 549.
 mit rundleichten Blättern p.
 106. n. 278.
 Milch-Kraut / gülden Milch-
 Kraut p. 246. n. 645.
 Milde/Scheiß-Milde/Pur-
 gier-Milde p. 22. n. 57.
 Mispel/Mistel/ p. 287. n. 745
 Modelgeer p. 101. n. 267.
 Möhren/Busch-Möhren p.
 175. n. 486. mit glattem
 Saamen/ und rauhem p.
 175. n. 487. wilde dünn-
 blättrige Möhren/ p. 189.
 wilde Möhren/Efels-Möh-
 ren/ p. 190. n. 524.
 Mohn/Wäser-Mohn p. 178.
 n. 493. wilder Mohn p. 188
 n. 521.
 Mörcheln p. 79. n. 195.
 Morgenstern vid. Bocksbart
 Moß/Heer-Moß p. 66. n. 160
 gemein Erd-Moß p. 166.
 n. 450. Wald-Feder-Moß
 p. 167. n. 451. Feder-Moß/
 so auff alten Dächern sicht/
 Ibid. p. 452. gespikter gross-
 ser ibid. gespikter kleiner
 Feder-Moß mit ästigen
 Stängelchen p. 167. n. 454.
 klein kriechender Waldfah-
 ren Moß/ibid. n. 455. zwey-
 blättriger liegender Moß/
 ibid. Moß mit breiten läng-
 lichen Blättern p. 168. n.
 457. Stern-Moß/ ibid. n.
 458. Wäser-Moß mit run-
 den ausgebreteten Blät-
 tern/ ibid. n. 459. ästiger
 Cypressen-Moß/ ibid. dünn-
 ner haarichter Baum-Moß
 p. 168. n. 461. Maur-Moß
 p. 170. n. 465. Büchsenfor-
 miger Erd-Moß p. 171. n.
 466. Büchsenformiger
 Stein-Moß n. 467. gerad-
 er/ grauer Corallen-Moß
 n. 468. gerader Corallen-
 Moß mit rothlichen Hör-
 nern n. 469. Langer Asch-
 farber Baum-Moß p. 171.
 n. 471. Meer-Moß p. 172
 n. 475. langer See-Moß/
 n. 476. gehörnter Wäser-
 Moß n. 477. zähnichter
 Wasser-Moß p. 173. n. 478
 subtieler Netzformiger Was-
 ser-Moß n. 479. Wasser-
 Moß von ganz zarten Fä-
 demchen n. 480. mit ganz
 kleinen subtielen Blätter-
 chen ibid. langer Wasser-
 Moß/

INDEX GERMANICUS.

- Mosz/** so tieff unter der Erden gestanden p. 173. n. 482.
Mosz-Beeren/ p. 289. n. 751
Mosz-Blum/ Mott-Blum/ vid. Ruh-Blum.
Mosz-Kolben p. 277. n. 719.
Motten-Blum vid. Rhein-Blume/ p. 64. n. 155.
Münchs-Blatt/ p. 61. n. 145.
Münchs-Kap. p. 5. n. 8.
Münz/Räthen-Münz p. 162. n. 437. Vorgemünz/ Stein-Münz ibid, langblättrige wilde Ros-Münz n. 438.
Mürsemau p. 169. n. 462.
Mummeln/ geel und weiss p. 178. n. 493 495.
Mütterchen p. 99. n. 264.
Mutter-Kraut. vid. Susan-ken-Kraut.
N.
Nachtschatten p. 256. n. 669.
Någlein/ Acker-Någlein/ wilde rothe bärtinge Någlein/ Thier = Någlein / kleine Maur- oder Weg-Någlein p. 38. 39. n. 100. 101. 102. 103. 104. Acker-Någlein mit grosser Blüth p. 38. n. 99. rauge Acker-Någlein mit grosser Blüth p. 39. n. 100. weisse Pflaum-Någlein/ Feder-Någlein p. 40. n. 105. weisse wilde Stein-Någlein p. 40. n. 106.
Wald- und Heid-Någlein/
Meer-Någlein ibid. n. 107.
Korn-Någlein p. 148. n. 410.
Någlein-Gras p. 39. n. 100.
Nabel-Kraut p. 142. n. 397.
Nardenwurz p. 36. n. 96.
Narren-Kap p. 5. n. 8.
Narrenkolben p. 277. n. 719.
Matter-Milch/ p. 248. n. 651.
Matterwurz/ p. 28. n. 69.
Matter-Zung/ p. 177. n. 492.
Matter-Zunglein p. 179. n. 499.
Nept/ p. 162. n. 437.
Nessel/ taube oder todte Nesseln mit weissen/ gelben und blauen Blumen p. 133. n. 372. 373. 374. stinkende braune Wald-Nessel p. 134. n. 373. grosse stinkende taupe Wald-Nessel p. 134. n. 373. kleine taube Nessel/ dessen Blätter umb den Stengelherum gehen p. 134. n. 376. Marien-Nessel/ p. 162. n. 437. taube / wilde Nessel p. 291. n. 755. grosse brennende Nessel / kleine brennende Epter- oder heister-Nessel/ p. 291. 292. n. 756. 757. Donner-Nessel p. 291. n. 756. Creuz-Nessel p. 248. n. 652.
Nessel-Ranken p. 59. n. 141.
Neuns-

INDEX GERMANICUS.

Neunheil und Neungleich / p.
169. n. 463.

Neunkrafft / p. 193. n. 531.

Niese-Wurz / breitblättrige
Berg-Niesewurz mit brauner Blüth p. 123. n. 339.
wilde Niesewurz mit weißer Blüth p. 124. n. 340. schmalblättrige Purpur = braune Berg-Niesewurz p. 124. n. 341. schmalblättrige Wiesen-Niesewurz mit weißbrauner Blüth p. 124. n. 342.

Nuß / vid. Hasel-Nuß. Kleine Erd-Nuß p. 186. n. 514.
Wasser-Nuß / Weiher-Nuß / See-Nuß / Stachel-Nuß / Spitz-Nuß p. 271. n. 705.

O.

Ochsenbrech p. 17. n. 41.
Ochsen-Zung / wilde p. 64. n. 154. grosse schmalblättrige
gemeine Ochsen-Zung p. 29. n. 76. weiße Ochsen-Zung / p. 30. n. 76. Wald-Ochsen-Zung p. 30. n. 79. wilde Ochsen-Zung mit liegenden Stengeln p. 30. n. 79. wild-Ochsen-Zung p. 64. n. 154. rothe Ochsen-Zung p. 143. n. 400.

Odermennig / p. 71. n. 176.
Ohröfflein-Kraut / p. 149. n. 413.

S. Otilien-Kraut p. 51. n. 130
Otter-Zung / kleine / p. 235.
n. 624.

P.

Påppel / grosse wilde Pappel / p. 156. n. 427. Hasen-Pappeln / grosse Ross-Pappeln / ibid. p. 157. rundblättrige kleine Wald-Pappeln / ibid. n. 428. Gåns-Pappeln p. 157. n. 428. Kås-Pappeln / Hasen-Pappeln / gemeine kleine Pappeln ibid.

Påppel-Baum / schwarzer
Påppel-Baum / p. 205. n. 560. Lybischer Påppel-Baum / p. 205. n. 561.

Parosken quid? p. 291. n. 754.
Pastemen-Kraut vid. Apo-stemen-Kraut.

Pastenach p. 189. n. 522.
Pawen-Fist / p. 90 n. 234.
Perlen / Wasser-Perlen p. 130. n. 29.

Pestilenz-Wurz / grosse
gemeine p. 192. n. 530. kleine Pestilenz-Wurz / p. 193. n. 532.

Peterlein / groß Bock's-Peterlein / p. 195. n. 537. Steins-Peterlein / ibid. n. 538.
Mauer-Peterlein / ibid.

Pfaffen-Blat / Pfaffen-Döhrlein / Pfaffen-Stiehl p. 61. n. 145.
Pfef-

INDEX GERMANICUS.

Pfesser/ Mauer- Pfesser / p.
 251. n. 655. Frisch= Pfes-
 ser p. 223. n. 600.
Pfesser-Kraut p. 245. n. 643.
Pfesserling/ p. 82. n. 203.
Pfeil-Kraut/ klein schmalblät-
 trig spitzig Pfeil-Kraut / p.
 235. n. 625. Pfennigblum/
 preusche/ p. 145. n. 403.
Pfennig-Kraut p. 177. n. 492.
Pfersing-Kraut/ Weiblein/ p.
 191. n. 529.
Pfriemen/ Acker- Pfriemen p.
 147. n. 407. klein Färb-
 Pfriemen p. 101. n. 266.
Pinn-Holz. p. 70. n. 173.
Pintchen p. 91. n. 235.
Po-Fist. p. 90. n. 234.
Poggen-Aug p. 96. n. 253.
Poggenstiel p. 94. n. 244.
 245. 246.
Pömpchen/ p. 86. n. 219.
Pollen/ Wald = oder Berg-
 Polley p. 50. n. 126. Was-
 ser-Polley. p. 177. n. 492.
Potenge vid. Betonien.
Pülske/ Stein- Pülske p. 83.
 n. 208. Kuh= Pülske ibid.
Heide-Pülske Stein= Püls-
 ke p. 83. n. 209. Ziegen-
 Pülske p. 84. n. 212.
Schwolst= Pülsken p. 89.
 n. 230. Blutt - Pülsken p.
 90. n. 231. **Schlangen-**
 Pülsken p. 92. n. 241. **Stein-**
 Pülsken Blüth p. 95. n. 250.

O.

Quacken-Kraut p. 51. n. 131.
 Quacken-Gras p. 109. n. 286.
 Quendel vid. Feld-Rümmel
 Quitschen/ Quitschle= Beer/
 p. 260. n. 680.

X.

Raden p. 148. n. 410. Groß
 Raden ibid.
 Ramsel/ p. 200. n. 549.
Rappen-Füßlein/ wild p. 127.
 n. 352.

Rapunkel p. 68. n. 165. große
 Rapunkel mit einer Fuchs-
 schwanz = Alehr p. 228. n.
 611. Wald-Rapunkel ibid.
 Rapunkel mit blauen Sca-
 biosen-Köpflein p. 229. n.
 612. Pfirschen-blätterig
 Rapunkel mit grossen blaue-
 en Glocken-Blumen p. 229.
 n. 614.

Raut/ Hüner-Rauten/ p. 13.
 n. 26. Leber-Raut p. 146.
 n. 404. traubichte Mohn-
 Raute p. 146. n. 404. klein
 Mohn-Raut/ ibid. große
 Wiesen-Raut p. 267. n.
 696.

Rechholder/ vid. Wacholder.
 Reinfarn p. 265. n. 691. weiß
 Reinfarn p. 63. n. 150.

Reizken/ p. 79. n. 196. Stein-
 Reizken/ p. 80. n. 197. Eich-
 Reizken p. 80. n. 198. roth
 und

INDEX GERMANICUS.

- und blau Bruch-Reizken/
p. 80. n. 199. Ab-Reizken/
p. 86. n. 222. Reizken-Blüth
p. 95. n. 249.
- Rettich/ Wasser-Rettich / p.
227. n. 608. wilder Ret-
tich ibid. mit zerschnittenen
Blättern ibid.
- Rhein-Blume/ schwartzblät-
trige gelbe p. 64. n. 155.
- Ried/ Groß Ried / Schwer-
tel-Ried p. 260. n. 684.
Ried-Gras p. 119. n. 324.
- Rinds-Augen p. 45. n. 117.
- Rinds-Wurzel/ vid. Bilsen-
Kraut.
- Ritter-Sporn / Ritterblum
p. 51. n. 130.
- Rödel/ Rödel-Kraut p. 190.
n. 525.
- Rohr/ gemein Rohr/ Deck-
Rohr p. 19. n. 48. Wald-
Rohr p. 118. n. 321. Berg-
Rohr ibid.
- Rohr-Gras/ p. 112. n. 299.
- Rohrlein-Kraut/ p. 61. n. 145.
- Rohr-Kopfchen p. 84. n. 211
- Rothlauffen-Kraut / p. 105.
n. 276.
- Romey/ p. 44. n. 115.
- Rostern p. 259. n. 753.
- Rosen/ Heck-Rosen p. 232. n.
618. Feld-Rosen/ Frauen-
Rosen p. 232. n. 618. Klap-
per-Rosen/ p. 188. n. 521.
- Korn-Rosen / ibid. item p.
282. n. 618. Haber-Rose/
Hunds-Rose/ Büttel-Rose
Heyd-Rose ibid. Herk-
Röslein-Gras p. 39. n. 100
- Rosmarin/wilde p. 49. n. 125.
- Rosripp p. 198. n. 543.
- Roshub vid. Huf-Lattich,
- Ros-Münze p. 162. n. 438.
- Ros-Schwanz / Wasser-
Ros-Schwanz mit sehr
dünnen langen Blättern p.
65. n. 156. Wald Ros-
Schwanz ibid. p. 157.
- Rotten oder Rotten-Blum p.
148. n. 410.
- Ruhr-Kraut/ groß und klein
Ruhr-Kraut / p. 107. n.
281. 283. Groß Ruhr-
Kraut mit schmalen läng-
lichen Blättern p. 107. n.
282. Berg-Ruhr-Kraut
mit runder Blüth p. 107.
n. 280.
- Ruprechts-Kraut p. 105. n.
276.
- S.**
- Saam-Kraut/rundblättriges
Saam-Kraut p. 205. n.
562. schmalblättrig Saam-
Kraut p. 205. n. 564. spitzig
Saam-Kraut p. 206. n.
564. Saam-Kraut mit
weichen breiten glänzenden
Blättern p. 206. n. 565
- Saam-

INDEX GERMANICUS.

- Gaam-Kraut mit Krausen**
 Blättern p. 206. n. 566.
Klein großächtiges Gaam-Kraut p. 206. n. 567.
Klein großächtiges schmales Gaam-Kraut p. 206. n. 568.
Gade-Baum/ wilder/ Wald-Gadebaum p. 170. n. 464.
Gaffran/ wilder/ stachlicher Feld-Gaffran p. 50. n. 127.
Salz-Kraut vid. **Knoblauch-Kraut.**
Samlod p. 18. n. 45.
Ganickel p. 244. n. 641.
Gar-Baum p. 205. n. 560.
Saturan p. 245. n. 643.
Gau-Blum/ Gau-Rüsseli
Gau-Schnabel p. 61. n. 145. **Gau-Brot** p. 187. n. 517. **Gau-Melcken** p. 257. n. 674. **Gaurach** p. 163. n. 441. **Gau-Zodt** p. 23. n. 58. **Gau-Wurz** vid. **Braun-Wurtz.** **Gau-Distel** vid. **Diestel.**
Saurampff p. 3. n. 5. **Schaaff-Saurampff** p. 4. n. 6.
Scabiosen/ groß/ braun und weiss p. 246. n. 646. 647. **Groß Scabiosen** p. 247. n. 648. gelblich **Scabiosen mit sehr zerschnittnen Blättern** p. 247. n. 649.
Schaaff-Garbe/ grosse ge- meine p. 164. n. 442. **gross Schaaffribb/ Schaaffrip/** ibid. **Purpurrothe Schaaff-Garbe** p. 164. n. 443.
Schaafftheu p. 65. n. 157. **Schaafftheu ohne Blätter/** p. 65. n. 159. **Groß Schaafftheu** ibid. mit vielen Nesten
ibid. n. 160. **stinkender Schaafftheu/** so unter dem Wasser freucht p. 66. n. 161. **kriechend Wasser-Schaafftheu** mit vielen zwey-zäncichten kleinen Blättern p. 67. n. 162.
Schaaffs-Zunge p. 199. n. 546.
Scharter-Kraut p. 253. n. 662.
Scheiß-Kraut p. 142. n. 397. p. 163. n. 439.
Scheiß-Lorbeeren p. 139. n. 388.
Schell-Wurz vid. **Schin-Kraut.**
Schernäckel vid. **Sanickel..**
Schin-Kraut p. 45. n. 118.
Schierling/ vid. **Wehdendunk/** schmalblättriger **Wasser-Schierling** p. 49. n. 124.
Schlaff-Kraut vid. **Bilsen-Kraut.**
Schlüssel-Blumen/ geel **Schlüssel-Blumen/** s. **Peters**

INDEX GERMANICUS.

- ters Schlüssel/ p. 279. n.
 725.
 Schlangen=Aeuglein p. 30.
 n. 79.
 Schlangen=Kraut p. 177. n.
 492. klein Wasser=Schlan-
 gen=Kraut p. 62. n. 149.
 Schlangen=Mord/ p. 248. n.
 651.
 Schlangen=Wurz/ grosse / p.
 27. 28. n. 69.
 Schlehen=Baum / wilder p.
 208. n. 572.
 Schlehen / Schlehen=Dorn/
 ibid. rothe Schlehen p. 231
 n. 616.
 Schotten=Blum p. 209. n. 575
 Schmalz=Blum/ vid. Kuh=
 Blum.
 Schmeelen/ klein und groß p.
 118. n. 321. p. 119. n. 322.
 Schmerbel p. 136. n. 381.
 Schnabel=Kraut/ klein Acker=
 Schnabel=Kraut/ p. 105.
 n. 275.
 Schollwurz/ kleine / p. 105.
 n. 276.
 Schön=Härlein p. 50. n. 127.
 Schörbocks=Kraut p 46. n. 119
 Schoßwurz. p. 170. n. 464.
 Schoten=Klee/ p. 145. n. 402.
 Spiegel mit kleinen Flachs=
 Köpfen p. 261. n. 682. mit
 Langächtigen Blättern p.
 261. n. 683.
- Schuppenwurz/ siebenblätt=
 riger mit schwärzen Beeren
 p. 61. n. 146. grosse Schup=
 pen=Wurz p. 187. n. 517.
 Schüttgelb/ wie es bereitet
 wird von den Mahlern p.
 26. n. 67.
 Schwaalcken=Zagel/ p. 283.
 n. 731.
 Schwaden/ p. 108. n. 285.
 Schwalben=Wurz / p. 20. n.
 50.
 Schwalben=Kraut/ klein p.
 105. n. 276. vid. Schin=
 Kraut.
 Schwam/ Schwämme/ Höh=
 schwämme p. 90. n. 232.
 Hollunder = Schwamm p.
 92. n. 236. Lungächtiger
 Klöschchen=Schwamm p. 95.
 n. 248. schwarzer Rehhaar=
 richter Fliegen=Schwamm
 p. 87. n. 223. rother Fliegen=
 Schwam/ geeler / grauer/
 Eichen= Hasel = Fliegen=
 schwam ibid. n. 224. 225.
 226. weißer Fliegen Schwam
 p. 89. n. 227. Heide Flie=
 genschwam p. 89. n. 228.
 weisser Kolbenächtiger Flie=
 genschwam p. 89. n. 229.
 wässerichter Galretschwam
 p. 96. n. 251. Körnichter
 Corallen = Schwam p. 96.
 n. 254. Körnichter Fleisch=
 farber

INDEX GERMANICUS.

- farber Schwam p. 97. n.
 255. Scharlach = rother
 Büchsen-Schwam / p. 97.
 n. 256. Kappenschwam p.
 97. n. 257. Mehlschwam/
 p. 97. n. 258. Holzähnlicher
 Schwam mit einem langen
 Stiel. p. 98. n. 259. Schei-
 ben Büchsen Schwam. p. 98.
 n. 260. Rätsichter Holz-
 Schwam. p. 98. n. 261.
 Harter Holzschwam. ibid.
 n. 262. kleiner Saat-tra-
 gender Büchsen Schwam. p.
 99. n. 263.
Schwartling. p. 95. n. 247.
Schweinkraut. p. 62. n. 149.
Schweinichen. p. 86. n. 218.
 Geele Schweinichen. ibid.
 n. 221.
Schwelken / Schwelkens-
Baum vid. Wasser = Holz-
 lunder.
Schwertel/ grosse/ braune p.
 105. n. 277. kleine schmal-
 blättrige braune Wiesen-
 schwertel p. 130. n. 263.
 Cyper-Schwertel/ Binzen-
 Schwertel p. 131. n. 365.
Scorpion-Kraut p. 133. n. 371
Seckel-Kraut vid. Taschel-
 Kraut.
See-Blum/ kleine/ weisse / p.
 179. n. 496. geele p. 178.
 n. 493.
- Geekannen/** grosse/ gelbe / p.
 177. 178. n. 493. weisse p.
 178. n. 495.
See-Rosben/ p. 277. n. 719.
See-Mans-Zreu p. 69. n. 170
See-Schoten/ wilde / p. 197.
 n. 541.
Seegen/ Wasser = Seegen p.
 11. n. 21.
Seiden-Kraut p. 59. n. 141.
Seil-Kraut p. 169. n. 463.
Senff/ Bauren = Senff/ p.
 226. n. 607. p. 268. n. 698.
 wild weisser Senff p. 68.
 n. 166. kleiner und grosser
 wilder Senff mit schwar-
 zen Blättern/ so an der Er-
 de in die runde herumb lie-
 gen p. 68. n. 168. 169.
Weg-Senff/ schnöder Senff
Schütt-Senff/ Steinsenff/
 p. 69. n. 171. haarichter
Weg-Senff ibid. p. 172.
Senff-Kraut/ geib/ breitblät-
 tericht p. 68. n. 165.
Sergen-Kraut vid. Pfeffer-
 Kraut.
Sesel Äthiopischer p. 254.
 n. 603.
Seyffen-Kraut p. 244. n. 642
Siebengezeit p. 161. n. 436.
Siegwurz/ p. 105. n. 277.
Silber-Kraut p. 207. n. 569.
Simarswurz/ Sygmarswurz
 p. 7. n. 12.

Si-

INDEX GERMANICUS.

- Simonswurz / ibid.
 Sindau vid. Sonnenthau.
 Sinnau / p. 7. n. 13
 Sommerwurz / vid. Erwen-
 würger.
 Sonnen-Blum / oder Sonnen-
 Gänzel. p. 43. n. 113.
 Sennenwend / Sonnenwirbel
 Sonnen-Kraut p. 47. n. 121.
 p. 103. n. 271.
 Sonnen-Braut ibid. p. 48.
 Sonnen-Löffel / p. 231. n. 617.
 Sonnenthau / p. 231. n. 617.
 rundblättriger kleiner Son-
 nenthau.
 Sonnentau p. 7. n. 13.
 Sophien-Kraut p. 176. 177.
 n. 491.
 Spargen / Alspargen. p. 20.
 n. 51.
 Speer-Birn / wilde / Speer-
 werbaum vid. Quitschen.
 Speer-Kraut / gekerft p. 224.
 n. 604.
 Speerdiesel p. 34. n. 91.
 Speeren-Stich p. 101. n. 267
 Speichelwurz / vid. Seyffert-
 Kraut.
 Sperber-Kraut / p. 196. n. 539
 Spindel-Baum p. 188. n. 520
 p. 70. n. 173.
 Spinnen-Kraut / ohnästiges
 Erdspinnen-Kraut p. 193.
 n. 53.
 Springkraut / Springsamen-
 kraut / vid. Hirsch-Mälde.
- R r 3
- Stabwurz / wild p. 2. n. 2.
 Stachelskraut / Meerstachel-
 kraut mit Pasternack Saar-
 men p. 132. 133. n. 370. 371.
 Ständel-Wurz / Fliegenstän-
 delwurz / fleckliche / auch glat-
 te braunrothe Fliegenstän-
 delwurz p. 183. n. 508. 509.
 Stallkraut / stachlicht / p. 17.
 n. 41.
 Standhart p. 181. n. 503.
 Stärckraut p. 147. n. 407.
 S. Steffenskraut p. 256. n. 668
 Stechdorn / vid. Creutzbeer.
 Steinbart / p. 172. n. 475.
 Steinbeeren p. 234. n. 622.
 Steinbrech / p. 245. n. 644.
 gülden Steinbrech p. 246.
 n. 645. rother Steinbrech /
 p. 73. n. 181.
 Steinflechten / p. 140. n. 393.
 Steinklee p. 161. n. 436. p.
 274. n. 715.
 Stein-Kraut p. 202. n. 554.
 Steinsamen p. 143. n. 399.
 Sternkraut p. 21. n. 53.
 Sternkraut p. 164. n. 671.
 Wasser-Sternkraut p. 54.
 n. 138.
 Stern-Leberkraut p. 21. n. 52
 Stichwurz / wilde p. 50. n. 127.
 Stöbling. p. 81. n. 202.
 Stolker Heinrich p. 136. n. 381
 Storchenschnabel / blauer mit
 Eisenhutts Blättern p. 102.
 n. 269. p. 103. n. 271. mit
 Schier-

INDEX GERMANICUS.

- S**chierlings Blättern p. 104
n. 274. kleiner liegender
Storchsnabel mit Schier-
lings Blättern p. 105. n. 275
- S**traßling p. 92. n. 237.
Streel/ Bubenstreel/ Wolfs=
Streel. p. 62. n. 48.
Streichkraut/ weiden blättri-
ges. p. 147. n. 407
- S**treifswurz. p. 138. n. 379.
Stroh/ Wall-Stroh. p. 100.
n. 265. p. 166. n. 449.
- S**trömling / Holz = Ströml-
ling. p. 157. n. 429.
- S**üßfarn. p. 204. n. 559.
Süß-Holz. p. 106. n. 279.
Süßling. p. 81. n. 201.
Süßwurzel. p. 204. n. 559.
Süttgrün vid. Schüttgelb.
Susanden-Kraut. p. 43. 44.
n. 114.
- T.**
- T**arant/ blauer. p. 102. n. 268.
Täschel- oder Seckel-Kraut/
groß und klein p. 30. 31. n.
80. 81. p. 268. n. 698.
- T**aubenfuß. p. 222. n. 548.
p. 103. n. 271. Tiefzer-
schnittener Taubenfuß mit
großer Blüht p. 103. n. 271.
mit kleiner Blüht. p. 104. n.
283.
- T**auben-Kropff. p. 77. n. 192.
Tauben-Kraut vid. Eisens-
hart.
- T**aube Nessel p. 133. 134. n.
373. 374.
- T**aubkorn. p. 121. n. 331.
- T**ausend Guidentkraut. p. 41.
n. 109.
- T**ausendkorn. p. 202. n. 554.
555.
- T**euffels Abbiß. vid. Abbiß.
Teuffels-Blumen p. 39. n. 99.
Teuffels- Kirschen. vid. Kir-
schen.
- T**hanne. p. 1. n. 1.
- T**hannenwedel. p. 65. n. 158.
- T**hwalch/ Gersten Thwalch.
p. 73. n. 180.
- T**ormentill. p. 270. n. 702.
- T**räut Babbichen sieh niich
an. p. 146. n. 404.
- T**ropfenwurz. p. 204. n. 559.
- U**
- U**deramp. p. 123. n. 337.
- V**eelgutta. p. 18. n. 45.
- V**erfluchte Jungfrau. p. 47.
48. n. 121.
- V**ergiß mein nicht. p. 63. n.
151.
- V**ielsamen. p. 28. n. 70.
- V**iolen/ blaue. p. 275. n. 717.
Blaue braune Violen/
Merk- Violen. p. 285. n.
739. Hundsviolen. ibid. n.
740. weisse Violen. p. 219.
n. 593. Wasser- Violen
mit nackten Stengeln p. 166.
n. 448.
- V**o-

INDEX GERMANICUS.

Vogelkraut / vid. Meyer/
Vogelkraut mit Coriander
Saamen/ p. 13. n. 31.
Vogels-Nest p. 189. n. 522.
Untreu/ p. 133. n. 371.

W.

Wacholder/ Wacholderbaum
p. 131. n. 368.
Wald-Cypres. vid. Sade-
Baum.
Waldfar/ p. 73. n. 182.
Waldhirse vid. Hirse.
Waldtichern p. 187. n. 517.
518.
Walb-Knoblauch/ vid. Knob-
lauch.
Wald-Meister/ vid. Meeske
Wald-Mäglein/ vid. Nage-
lein
Waldrinde p. 42. n. 112.
Waldviolen p. 219. n. 191.
192.
Wald = Wolffsmilch vid.
Wolffsmilch.
Wallwurz vid. Beinwellen.
Walzenkraut p. 147. n. 408.
Wasser-Aron/ vid. Aron.
Wasserbathenig p. 248. n. 650
Wasserdost/ vid. Dost.
Wasser-Eppich/ vid. Eppich.
Wasser-Gall/ p. 75. n. 187.
Wasser-Garb/ vid. Garb.

Wasser-Kolben/ vid. Kol-
ben/
Wasser-Kress/ vid. Kress.
Wasser-Linsen/ vid. Linsen.
Wassermerck.
Wasser-Nuß/ vid. Nuß.
Wasser-Perlen/ vid. Perlen/
Wasser-Pfeffer/ vid. Pfeffer.
Wasser-Polley. vid. Polley.
Wasser-Rettich/ vid. Rettich
Wasserschlangen-Kraut/ vid.
Schlangen-Kraut.
Wassersegen/ p. 11. n. 21.
Wassersichel/ p. 11. n. 21.
Wasser-Violen/ vid. Violen.
Wasser = Wundkraut/ vid.
Wund-Kraut.
Weberkarten/ p. 62. n. 148.
Wegholderbaum / vid. Wa-
holder-Baum.
Wedendunk/ Wehdendunk/
gross und klein/ p. 48. 49.
n. 123. 124.
Weg-Blätter/ n. 198. n. 542.
Wegdiestel/ vid. Diestel.
Wegerich / breiter Wegrich/
p. 199. n. 546. breitblätte-
riger Wasser- item Frosch-
Wegerich / ibid. n. 547.
Wasser = Wegrich mit
schmalen langen Blättern/
p. 199. n. 548. grosser
Wegrich / p. 197. n. 542.
kleiner/ breiter/ kleiner spitzer
rohter

INDEX GERMANICUS.

- rohter breiter Begrich/ p.
 198. n. 543. 544. 545.
Weg-Nägelein/ vid. **Cläge-**
lein.
Weg-Senff/ vid. **Senff.**
Wegstroh / unser Frauen
 Bett- und Wegstroh p. 100
 n. 265.
Wegtritt/ p. 201. n. 552.
 grosser Wegtritt ibid. mit
 langen schmalen Blättern
 p. 202. n. 553. kleiner Weg-
 tritt ibid. n. 554. Wegtritt
 mit kleinen köpfichten und
 gar zarten Blättern/ p. 203.
 n. 557. p. 204. n. 558. klein
 fruchtbarer Wegtritt/ p.
 203. n. 556.
Wegwart/ wilde/ p 47. n. 121
Weiber-Fist/ p. 90. n. 234.
Weide/ grosse und kleine Sal-
 weyblättriche Kampweide
 p. 235. n. 626. p. 239. n.
 635. Saalweide p. 236. n.
 626. **Band-Weide/** rohte
 Weide/ p. 237. n. 627.
Gold-Weide ibid. rohte
 Sprott-Weide p. 239. n.
 634. Haar-Weide ibid. n.
 636. 637. Seilweide. p. 237
 238. n. 629. 630. 631.
Bachweide/ Dotter-Weide
Bruchweide/ ibid. n. 632.
 633.
- Weiderich/** p. 150. n. 414.
Wasser-Weiderich p. 151.
 n. 416. rauger Schotentra-
 gender Weiderich mit gros-
 ser Blüth p. 151. n. 417.
 418. grosser und kleiner
 unrauger Schotentragen-
 der Weiderich p. 151. 152
 n. 419. 420. Dito / mit weiss-
 er Blum. p. 152. n. 421.
 spitzer blauer Weiderich
 p. 155. n. 424. blauer ge-
 helmter ibid. n. 425. rauger
 gehelmter mit Purpurfar-
 ben Blumen p. 156. n. 426.
Weiderich-Rößlein/ p. 151.
 n. 418.
- Weihenfuß/** p. 221. n. 597.
Weiswurk p. 200. n. 550.
Weizen/ Zwälfeichen p. 121
 n. 331. **Kuhweizen/** p. 16.
 n. 434.
- Weizenbrand/** p. 293. n. 758.
Welck p. 280. n. 726 schwar-
 ze Welck p. 280. n. 727.
Wellsaamen p. 177. n. 491.
Wendwurzel vid. **Baldrian.**
Wermuth p. 2. n. 3.
Weyher/ klein Weyher / p.
 131. n. 366.
- Wicken/** geel Wicken p. 138.
 n. 387. grosse und kleine
 wilde Wicken p. 284. n. 733.
 738. rauge / braune und
 unrauge

INDEX GERMANICUS.

- uurauge/ weisse vielblättrige
 Wicken p. 284. n. 735. 736.
 Vogels Wicken / n. 734.
 braune Waldwicken n. 737.
 Wicken p. 260. n. 754.
 Wiederstoss roth und weiss / p.
 147. 148. n. 400. 408.
 Wiederzodt / gülden Wie-
 derzodt p. 7. n. 11.
 Wiesenblum/Goldwiesenblum
 vid. Kuhblum.
 Winde/ grosse/ glatte / weisse
 Winde p. 51. n. 131. kleine
 weisse Glattwinde / ibid. n.
 132. Weidenwinde/ Wein-
 gartwinde / Zaunwinde /
 kleine Winde mit dreyfans-
 tigen Saamen / schwarze
 Winde/ ibidem.
 Windhalm / Ackers Wind-
 halm p. 112. n. 299.
 Winterblümchen p. 65. n. 155
 Wintergrün/ groß rundblät-
 teriges p. 209. n. 577. spitz-
 blättriges Wintergrün mit
 vielen weissen Blümlein p.
 210. n. 579. klein rund-
 blätterig Wintergrün p. 210
 n. 578. Wintergrün mit ge-
 spalten und zerkerbten Blät-
 tern p. 210. n. 580. staud-
 ächiges Wintergrün mit
 zerkerbten langlechten Blät-
 tern p. 211. n. 581. Win-
 tergrün mit Hunderdarm-
 Blüth ibid. n. 582.
- Wirbelz-Dost p. 50. n. 126.
 Witscherling vid. Dunct.
 Woll/ Wiesen-Woll/ Matten-
 Woll/ p. 114. n. 307.
 Wolfferley p. 21. n. 53.
 Wolffsbeer p. 257. n. 67.
 Wolffsbast p. 139. n. 388.
 Wolffsbohnen p. 267. n. 694.
 Wolffsmilch p. 269. n. 701.
 Wald - Wolffsmilch vid.
 Hirschmalde.
 Wolgemuth p. 185. n. 512. klein
 Wolgemuth p. 50. n. 126.
 Worusken / p. 85. n. 216.
 Bull - Kraut vid. Welck.
 schwarz Bull - Kraut p.
 281. n. 727.
 Wund - Kraut p. 144. n. 401.
 vid. Wolffsbohnen/ Was-
 ser-Wund - Kraut p. 54. n.
 138. gülden Wund - Kraut
 mit breiten Blättern p. 287
 n. 744. groß Heidnisch
 Wund - Kraut mit breiten
 und schmalen Blättern p.
 286. n. 742. 743. Gotts -
 Wunden Kraut p. 128. n.
 354.
 Würffel Saamen / p. 187.
 n. 519.
 Wurmkraut/ vid. Geißbart.
 vid. Reinfarn.
 Wurmwurk/ p. 196. n. 539.
 Wurst - Sucht / eine Pferd-
 Krankheit p. 5. n. 8.
 S s Mloß

INDEX GERMANICUS.

P.	
Mloff /	p. 122. n. 336.
3.	n. 517.
Zacharias-Blum	p. 60. n. 142.
Zahnkraut / klein / kahl	p. 187.
Zäunling /	p. 42. n. 112.
Zaucken /	p. 141. n. 395.
Zeiland	p. 139. n. 388.
Zeitlosen / groß und klein	p. 24.
Zeiskraut /	vid. Gliedkraut.
Ziegenbart / gekrauster	p. 92.
n. 238. äßtiger Ziegenbart /	p. 84. n. 213.
Ziegen-Lauch	p. 186. n. 514.
Zigeuner-kraut /	vid. Bilsen-Kraut.
Zirbel-Baum /	wilder Berg-Zirbel-Baum
	p. 196. n. 540.
Zwen-Blatt /	p. 180. n. 500.
Zwick-Holz	p. 70. n. 173
Zwiebel / Acker-Zwiebel / Feld-	und wilde Zwiebel p. 186.
	n. 514.



IN-

INDEX LATINUS.

* * *

Aaron palustre, vid. Dracunculus, p. 62. n. 149.
Abies p. 1. n. 1. Abietis lacryma Cerevisiae incocta, eandem ab acore præservat sed cum infatuandi virtute, p. 1. n. 1.
Abies foribus olim applicata lugubre signum fuit. Apud Prussos Lætum & Nuptiale. *ibid.* Ex abiete olim factus est Equus Trojanus, p. 2. Nec non aliæ Deorum statuæ, p. 2. n. 1.

Abrotanum Campestre, p. 2. n. 2.
Absinthium, p. 2. n. 3. Ponticum *ibid.*

Acanthus Germanica. *vid.* Spondylium.
Acantium, *vid.* Spina alba.
Accipitrina, p. 177. n. 491.
Acer Major Cordi, p. 3. n. 4. Acer operum elegantiâ Statuvis olim inserviit, p. 3. n. 4.

Acetosa pratensis, p. 3. n. 5.
Acetosæ radix decocta cereviam formâ externâ æmulatur, p. 4. n. 5.

Acetosa arvensis lanceolata, p. 4. n. 6.

Acetosella, p. 4. n. 6.
Acetabulum, *vid.* Telephium.

Achillæ & millefolium, p. 164.
n. 442.

Acinaria palustris, p. 289. n. 751.
Acinus sive sterilis, p. 50. n. 126
Aconitum racemosum, p. 4. n. 7.
Aconitum cœruleum, p. 5. n. 8.
Aconiti Cærulei seu Napelli poculô Aristoteles interiit, p. 5. n. 8.

Aconitum salutiferum, Pardalanches, monococcum, p. 257.
n. 671.

Acorus verus, p. 5. 6. n. 10.
Acorus & Acorum. *ibid.*

Acorus adulterinus, p. 6. n. 10.
Diarrhæam sanat, p. 6. n. 10.

Aculeosa Gazæ, p. 34. n. 92.
Adianthum aureum minus, 6.
Adulterorum poena apud antiques, p. 226. n. 607.

Aëdificiis struendis quænam ligna accommodata, ne dehiscent ac rimas agant, p. 197.
n. 540.

Aëgilops Plinii, *vid.* Gramen leporinum, p. 112. n. 300.

Aëgopodium, p. 16. n. 40.
Aëgylops, *vid.* Festuca, p. 73.
n. 180. vera, *ibid.*

Agrimony, *vid.* Eupatorium Veterum, p. 71. n. 176. Agrimony officinarum, *ibid.*

S 2 Agri-

INDEX LATINUS.

- A**grioriganum f. Onitis major,
p. 185. n. 512.
Aizoon, *vide* Sedum.
Alcea vulgaris major. p. 7. n. 12.
Alceæ radix, loco altheæ ab
aliquibus substituitur, p. 7.
n. 12.
Alchimilla, p. 7. n. 13
Alectrolophos, *vid.* pedicularis
p. 190. n. 525. tertius, *ibid.*
n. 526. tertii alterum genus,
Dodonæi prima, *ibid.*
Alga marina, p. 7. n. 14.
Alisma f. Arnica, *vid.* Aster.
Alisma tenuifolium, *vid.* Helle-
borine, p. 124. n. 341. Ali-
sma, p. 180. n. 500. Ali-
sma pratorum, p. 279. n. 725
Alleluja, p. 274. n. 716.
Alliaria, p. 8. n. 15. Alliastrum,
ibid.
Allium ursinum, p. 8. n. 16. Alli-
um qui gustâisset, à delubro &
sacris olim arcebatur, p. 8.
n. 16. Allium montanum
bicine angustifolium flore
purpurascente, p. 9. n. 17.
Allium montanum capite ro-
tundo, p. 9. n. 18. Allium
medetur Calculo, p. 9. n. 16.
Allio coronatus est Andro-
nicus Imperator Oriental, p.
10. n. 19.
Alnus, p. 10. n. 19. Alni folia
calceis imposita lassitudinem
levant, *ibid.* Cortex macera-
tus coriariis atrum colorem
suppeditat, *ibid.* Aqua Alni,
cui Aqvilana dicatur, *ibid.*
Podagræ dolores tollit, *ibid.*
Flores quid? *ibid.* & ver-
rucæ? Alnus antiquitùs lin-
tribus & scaphis fabricandis
inserviit, *ibid.* Emplastrum
Loefelii ex Alno, *ibid.* Alnus
nigra baccifera f. Frangula.
p. 11. n. 20. Lac auget à
vaccis comesta, *ibid.*
Aloë palustris, p. 11. n. 21.
Alpen *vel* Alprutten quid? p.
235. n. 626. eorum usus
p. seq.
Alsinanthe mon, p. 211. n. 582.
Alsine marina foliis portulacæ,
p. 12. n. 22. Alsine major, p.
12. n. 23. minor repens, p.
12. n. 24. multicaulis, p. 12.
n. 25. Alsine triphyllos cœ-
rulea, p. 13. n. 26. Alsine Ve-
ronicae foliis, flosculis caudi-
culis adhærentibus, *ibid.* Al-
sine hederulæ folio, *ibid.* n. 28
Alsine spargula dicta major,
p. 13. n. 29. Alsine foliis
Triflaginæ, p. 13. n. 30. Al-
sine bifolia fructu Coriandri
radice geniculatâ, p. 13. n. 31.
Alsine alpina, p. 211. n. 582.
Alsine myosotis, *vid.* Echium
p. 63. n. 151. Alsine minima
vid.

INDEX LATINUS.

- vid.* Bursa Pastoris minor. *Anblatum*, *vide Orobanchie*, p. 187. n. 517. *Cordi*, *ibid.*
- Alsines minimum genus, p. 202. n. 556. *Anchusa mimima*, *vid. Buglossum vulgare minus*. *Anchusa Alcibiadion*, *vid. Buglossum vulgare*. *Anchusa sylvestris*, *vid. Echium vulgare*, p. 64. n. 154.
- Alysson, p. 13. n. 27. *Androsaces*, *vid. Cuscuta*, p. 59. n. 141.
- Alyssum Galeni, *vid. Sideritis arvensis angustifolia mera*. *Anemone montana colore luteo* p. 219. n. 592. *colore candido*, *ibid. n. 593*. *Anemone sexta*, p. 219, n. 592. *nemorosa flore majore*, *ibid. n. 593*. *quinta*, *sylvestris vulgaris flore niveo*, *montana colore candido*, *ibid. montana quædam*, p. 225. n. 605.
- Amaranthus luteus, *vid. Eichrysum*, p. 64. n. 155. *Amaranthus Galeni*, *ibid.*
- Ambrosia, *vide Abrotanum*, p. 2. n. 2.
- Amerius montanus tenuifolius minor, p. 40. n. 107. *sylvester*, p. 41. n. 108.
- Amomum falsum & Pseudamomum, *vid. Grossularia*, p. 121. n. 334.
- Ampelopraspon proliferum, p. 9. n. 17.
- Anagallis mas phœnicaea, p. 14. n. 32. *hæmorrhagiæ medetur ibid.* *Anagallis aquatica major* folio oblongo, p. 14. n. 33. *Anagallis aquatica minor* folio oblongo, p. 14. n. 34. *Anagallis aquatica folio subrotundo*, *reptante caulinco*, p. 14. n. 35. *Anagallis aquatica breviore oblongo folio semine biscutato*, p. 15. n. 36. *Anagallis aquatica longiore angusto folio*, *semine biscutato*, p. 15. n. 37.
- Androsaces*, *vid. Cuscuta*, p. 59. n. 141.
- Anemone montana colore luteo* p. 219. n. 592. *colore candido*, *ibid. n. 593*. *Anemone sexta*, p. 219, n. 592. *nemorosa flore majore*, *ibid. n. 593*. *quinta*, *sylvestris vulgaris flore niveo*, *montana colore candido*, *ibid. montana quædam*, p. 225. n. 605.
- Anemones species* p. 209. n. 575
- Angelica aquatica, p. 15. n. 38. *Angelica sylvestris major hirsuta*, p. 16. n. 39. *Angelica sylvestris minor sive erratica*, p. 16. n. 40.
- Angvillaræ Panax chironium, *vid. Helenium vulg.* p. 123. n. 338.
- Angvina aquatica, *vid. Dracunculus*, p. 62. n. 149.
- Anonis spinosa flore purpureo, p. 16. n. 41. *Anonis spinis carens purpurea*, p. 17. n. 42.
- Anserina, *vid. Potentilla*, p. 207 n. 569.

INDEX LATINUS.

- Anthemis*, *vid.* *Chamæmelum*.
Anthyllis leguminosa Belgarum
 p. 144. n. 401. *lenti similis*,
ibid.
Antoniana major hirsuta, p. 151.
 n. 417.
Aparine vulgaris p. 17. n. 43
 medetur morsibus phalangiorum & viperarum p. 17. 18.
 n. 42. *Aparine palustris lævis* p. 18. n. 44.
Aphaca Aphace *vid.* *Vicia sepium*.
Aphaco *vid.* *Dens leonis* p. 61.
 n. 165.
Apium montanum folio ampliore. p. 18. n. 45.
Apium aquaticum p. 222. n. 600
Apium palustre. p. 254. n. 667.
Apollinaris tertia *vid.* *Hyoscyamus*, p. 127. n. 353.
Aquilegia sylvestris, p. 18. n. 46
 medetur variolis, morbillis,
 Ictero. *Ophthalmica & Cosmeticæ* est, *ibid.* quæ & quando colligenda? *ibid.*
Aquilina, *ibid.*
Arachus, *vid.* *Orobus*, p. 187. n.
 518.
Aracus, Araca, p. 284. n. 734. 736.
Arbor quotidiè foliis suis aquam stillans, p. 231. n. 617.
Arbores alienas incidere capitale olim supplicium. p. 26. n. 67
Archangelica, p. 15. n. 38.
Archangelica, *vid.* *Campanula vulgatior*.
Arcion, *vid.* *Lappæ* p. 136. n. 382
Arcium Dioscoridis, *vel* *Arctium*, *vid.* *Lappa*, p. 136. n. 382
Argemone altera, p. 207. n. 569.
Argentilla major, *vid.* *Barba Capræ*. (n. 569.)
Argentina *vel* *argentilla*, p. 207
Aristolochia rotunda, p. 77. n.
 193. *rotunda vulgaris*, *ibid.* *rotunda vulgaris* radice majore solidâ, p. 78. n. 194. *rotundæ fabæ altera species solidæ*, *vid.* *Fumaria bulbosa* *rotunda* flore albô, *ibid.* *Aristolochiæ rotundæ concavæ similis herbuæ*, p. 220. n. 594.
Ameria sylvestris altera, *vid.*
Caryophyllum barbatus sylvestris, p. 39. n. 102.
Armerius sylvestris, p. 41. n. 108
Armoracia, p. 226. n. 607.
Armoraria pratensis sylvestris, p. 41. n. 108.
Arnica f. *Alisma*, *vid.* *Aster*.
Arnoglossa, p. 197. n. 542.
Artemisia vulgaris major, p. 18.
 n. 47. *latioris folii*, *ibid.* *mater herbarum*, *ibid.* *rubra & alba*, *ibid.* *uterina & emmenagogæ* existit, p. 19. n. 47.
Carbones sub radice reperibles quid, & quem usum præstent? *ibid.* *Artemisia monoclono*s *vid.* *Tanacetum vulgare*. Arte-

INDEX LATINUS.

- A**
 Artemisia polyclonos Dodonæi
vid. Jacobea, p. 129. n. 360.
 Arundo palustris, p. 19. n. 48.
 Flos ejus lanosus aures exsurdat, *ibid.* Arundo coronat, *ibid.* mortem infert, *ibid.*
 Asarum, p. 19. n. 49. pro diverso præparandi modo, emeticâ, diaphoreticâ, & diureticâ virtute pollet, p. 20. quodnam optimum, & quando colligendum? *ibid.*
 Asclepias albo flore, p. 20. n. 50
 Asparagus maritimus, p. 20. n. 51
 multis & egregiis pollet virtutibus, *ibid.* quomodo ubertas ejus ubique procuranda, *ibid.*
 Aspergula, *vid. Asperula.*
 Asperugo spuria, p. 30. n. 79.
 Asperula f. Rubeola montana odora, p. 21. n. 52.
 Asphodelus germanica, p. 193.
 n. 533.
 Aster montanus luteus salicis glabro flore, p. 21. n. 53.
 Aster Atticus, *ibid.* virtute vulnerariâ pollet, *ibid.* Aster luteus hirsuto salicis folio, p. 21. n. 54.
 Astragalus, *vid. Orobis*, p. 187.
 n. 517.
 Astragloides, *vid. Orobis*, p. 187. n. 519.
 Atramentum rebus æri incisis ex cudendis inserviens ex stramine avenaceo & hordeaceo,
- nec non aliunde quomodo pā-
 randum? p. 293. n. 761.
 Atractylis aculeata foliis maxi-
 mè laciniatis, capitulis albis,
 p. 21. 22. n. 55.
 Attractylis, *vid. Cnicus*, p. 50.
 n. 127. Attractylis sylvestris,
 medica, mitior, *vid. ibid.*
 Atriplex sylvestris, Fimetaria, p.
 22. n. 56. Atriplex sylvestris prima, p. 22. n. 57. Atriplex sylvestris latifolia acutiore fo-
 lio, p. 23. n. 58.
 Avena fatua, græca, sterilis, p.
 72. & 73. n. 180.
 Auricula muris, p. 193. n. 535.
 minor, p. 194. *n. ibid.* se-
 cunda, p. *ibid.* n. 536.
 Auricula muris, *vid. Echium*,
 p. 63. n. 151. & p. 64. n. 153
 Auricula Judæ, *vid. Fungus non*
 vescus XIV. p. 92. n. 236.
 Herba auricularis, p. 149. n. 411.
- B**
- Baccaris, *vid. Asarum.*
 Baccharis germanica. p. 179.
 n. 497.
 Bagolæ primum genus Cæsalp.
 p. 288. n. 748.
 Balsamine lutea, seu Noli me
 tangere. p. 23. n. 59. Atta-
 genes allicit & illaqueat. *ibid.*
 Baptisecula *vid. Cyanus* p. 59.
 n. 142.
 S. Bar-

INDEX LATINUS.

- S. Barbāræ herba. *vid.* Eruca lutea latifolia. p. 67. n. 165.
- Barba Capræ floribus compactis. Barbicapra. p. 23. n. 60.
- Barba hirci *vid.* Tragopogon.
- Bardana *vid.* Lappa major p. 136. n. 382.
- Barstuccæ subterranei, German. Erd-Männlein quinam olim fuerint p. 241. n. 638.
- Basilicum medium p. 179. n. 497. Basilica minor, *ibid.*
- Baucia *vid.* Pastinac. Sylv. p. 189. n. 524.
- Bechion. *vid.* Tussilago p. 276. n. 718.
- Bellis major sylvestris caule folioso p. 23. n. 61. Bellis minor sylvestris, p. 24. n. 62. Remedium singulare wieden den hastigen Trunc^o *ibid.*
- Bellis major lutea foliis profunde incisis, p. 24. n. 62.
- Benedicta *vide* Caryophyllata.
- Berula major, p. 14. n. 33.
- Beta sylvestris p. 210. n. 577.
- Betonica purpurea, p. 25. n. 64. vulgaris, *ibid.* alba *ibid.*
- Betula virgulæ erectis p. 25. n. 66. Betulæ folia præsaga sunt aliquando hyemis infecuturæ, p. 25. 26. n. 66. Betula pendulæ virgulæ, p. 26. n. 67. Aqua Betulæ cui usui inserviat? *ibid.* Betulæ virgæ accensæ succum fundunt oculorum vi-
- tiis perutilem, *ibid.* Betula Pumila, p. 27. n. 67.
- Betulæ axungia Dagget dicta, vermes & pediculos enecat intus & foris adhibita p. 27. n. 67. Cortex coriis præparandis destinata, *ibid.* Ex Betulæ Fasces Romanorum constabant, *ibid.*
- Betulus, p. 188. n. 520.
- Bidens foliis tripartitò divisis, p. 34. n. 89.
- Bifolium, p. 180. n. 500. bifolium & Satyrion decimum, *ibid.* bifolium bulbosum, *ibid.* n. 502.
- Bistorta major, radice minus intortâ, p. 27. n. 69.
- Blitum Polyspermon, p. 28. n. 70. piscibus gratissima esca, *ibid.* rubrum majus & minus p. 28. n. 71. 72.
- Boletus cervinus, *vid.* Fungus non vescus, p. 95. n. 250.
- Branca Leonina, *vid.* Pastinaca sylvestris, p. 189. n. 524.
- Branca ursina, *vid.* Spondylium.
- Brassica campestris perfoliata flore luteo, p. 29. n. 73. Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis, p. 29. n. 74.
- Bromos herba, *vid.* Festuca, p. 73. n. 180. Bromos sterilis, *ibid.*
- Brunella major, *vid.* Prunella, p. 208.

INDEX LATINUS.

- p. 208. n. 573. *Officina-
rum, ibid.*
- Bryonia alba baccis nigris, p.
29. n. 75. Bryonia nigra, ibid.*
- Bubonium luteum, vid. Aster.*
- Buglossum vulgare, p. 29. n. 75.
Buglossa vulgaris, ibid. Bu-
glossum sylvestre flore albo,
p. 30. n. 77. Buglossum syl-
vestre minus alterum & aspe-
rius, p. 30. n. 78. Buglos-
sum sylvestre caulibus pro-
cumbentibus, p. 30. n. 89.*
- Bugula, vid. Consolida.*
- Buglossum sylvestre, vid. Echi-
um vulgare, p. 64. n. 154. a-
greste, ibid.*
- Bulbus sylvestris Tragi, p. 186.
n. 514. agrestis. ibid. escu-
lentus, ibid. Bulbus sylvestris
alius bifolius, ibidem.*
- Bulegium agreste officinarum,
vid. Calamintha arvensis ver-
ticillata.*
- Bunonium adulterinum, vid. E-
ruca lutea, p. 67. n. 165.*
- Buphthalmum majus, vid. Bellis
major.*
- Buphthalmum majus, vide Cha-
mæmelon inodorum.*
- Bupleuron, p. 278. n. 723.*
- Bursa pastoris major, folio fi-
nuato, p. 30. n. 80. Hæ-
morrhogia medetur, ibidem.
minor loculo oblongo, p. 31.
n. 81.*
- Tt
- Butomus, vid. Juncus, p. 131.
n. 365.*
- C.
- Calamintha arvensis verticillata,
p. 31. n. 82. herba magnæ
virtutis est, ibid.*
- Calaminthæ primum genus, p.
162. n. 437. Calamintha
tertia s. Nepeta, ibid. mon-
tana Gattaria vulgo, ibid. Ca-
laminthæ tertium genus Dio-
scoridis, p. ibid. n. ibid.*
- Calamogrostis quorundam, vid.
Gramen arundinaceum p. 119
n. 323.*
- Calamogrostis secunda, vid. Jun-
cus p. 131. n. 365.*
- Calamus aromaticus officinarum
p. 5. n. 6.*
- Calathiana viola autumnalis vid.
Gentiana palustris p. 102. n.
268.*
- Caltha palustris flore simplici,
p. 31. n. 83. Caltha in nume-
ro plurali genere neutro à Pru-
dentio usurpata, ibid. p. 32.*
- Cameline p. 174. n. 483. Came-
lina s. Myagron, ibid. 484.*
- Camelina Dodonæi seu Myagri-
on, ibid.*
- Campanula vulgatior foliis urti-
cæ, vel major & asperior, p.
32. n. 84. Campanula vul-
garis monoclonos foliis urti-
cæ, flore candido, p. 32. n. 85.*
- Cam-

INDEX LATINUS.

- Campanula pratensis* flore glo-
merato, p. 33. n. 86. *Cam-
panula oblongifolia* flore cœ-
ruleo in summis caulinis, p.
33. n. 87. *Campanula oblon-
gifolia* flore albo in summis
caulinis, p. 33. n. 88.
- Campanula alba*, *vid.* *Convol-
vulus*, p. 51. n. 131.
- Campanula sylvestris*, *vid.* *Digi-
talis*, p. 61. n. 147.
- Campanula persicifolia nostras*,
vel *persicæ folio*, p. 229.
n. 614. *angustifolia*, *media*,
ibid. *alba & cœrulea*, p. 230.
n. 614.
- Canis Plinii*, p. 292. n. 757.
- Cannabina aquatica*, *vid.* *Eup-
atorium cann.* p. 70. n. 174.
- Cannabina aquatica*, *vid.* *Cony-
za*. p. 53. n. 137. & p. 54. n.
138.
- Cannabis erratica*, *foemella erra-
tica paludosa sylvestris sterilis*
p. 33. n. 89. *Decoctum hu-
jus cannabis cimices necat*.
ibid.
- Cannabis spuria facie urticæ*, p.
292. n. 758.
- Capnium phragmites majus*, *vid.*
Fumaria bulbosa, p. 78. n.
193. *capnium phragmites*
minus, *ibid.* n. 194.
- Capnos fumaria*, *vid.* *Fumaria*,
p. 77. n. 192. *Capnos cheli-*
dona, *vid.* *Fumaria bulbosa*.
p. 78. n. 193.
- Caput monachi*, *vid.* *Dens leonis*
p. 61. n. 165.
- Cardamine altera*, p. 176. n.
490. *simplici flore*, *ibid.*
- Carduus in avena proveniens*, p.
34. n. 90. *avenarius*, *arven-
sis*, *ibid.* *Carduus lanceolatus*
latifolius, p. 34. n. 91 *Car-
duus spinosissimus angustifo-
lius vulgaris*, *Carduus sylve-
stris tertius Dodonæi*, p. 34.
n. 92. *Carduus spinosissimus*
angustifolius pratinus, p. 35.
n. 93.
- Carduus*, *vid.* *Cnicus*, p. 50. n.
127.
- Carduus fullonum*, *vid.* *Dipsa-
cus* p. 62. *dicitur etiam car-
duus fullonius erraticus*, *ibid.*
- Carex minor*, *vid.* *Gramen jun-
ceum spic.* p. 114. n. 308.
- Carlina acavlos flore magno*, p.
35. n. 94.
- Carlina sylvestris vulgaris*, *vid.*
Cnicus, p. 50. n. 127.
- Carpinus Theophrasti*, *vid.* *Euo-
nymus*, p. 70. n. 173.
- Carthamus*, *vid.* *Cnicus*, p. 50.
n. 127.
- Carum*, *Carvi officinarum*. *Ca-
ros*, *carus*, *vulgò Carvi*, *Care-
um*, p. 36. n. 95.
- Caryophyllata vulgaris*, p. 36.
n. 96.

INDEX LATINUS.

- n. 96. aquatica nutante flore,
p. 37 n. 97. montana, palu-
stris, *ibid.* prolifera flosculis
elegantissimis, p. 37. n. 98.
Caryophyllus arvensis glaber flo-
re majore, p. 38. n. 99.
Caryophyllus arvensis hirsutus
flore *majore*, p. 39. n. 100.
holostius, *ibid.* flore *minore*,
p. 39. n. 101. *Barbatus syl-
vestris*, p. 39. n. 102. arven-
sis calyculo florum numeroso
p. 39. n. 103. minimus mu-
ralis, p. 39. n. 104. pluma-
rius albus, p. 39. n. 105. *Syl-
vestris vulgaris angustifolius*,
p. 40. n. 106. *montanus al-
bus*, *ibid.* *montanus minor*,
pratensis flore laciniato sim-
plici, p. 40. 41. n. 108.
Cassutha, *vid.* *Cuscuta*, p. 59. n.
141.
Cassytha Plinii, *vid.* *Cuscuta*, p.
59. n. 141.
*Castor delectatur elu corticum sa-
licis, alni, & consimilium ar-
borum*, p. 239. n. 637.
Catanance altera, *vid.* *Balsami-
ne lutea*.
Cattaria f. *Mentha Catti*. p. 161.
n. 437. *Herba*, *ibid.*
Cauda muris vel murina, *vide*
Holosteum affinis, p. 127. n.
352.
Ceanothus levis, *vid.* *Grossularia*
- p. 121. n. 333. & p. seq.
n. seq.
Centaurium minus, *Centaurea*,
p. 41. n. 109. *Centaurium*
minus floribus albis, *ibid.* n.
110.
Centaurois, *vid.* *Serratula*.
Centiana minor, p. 101. n. 267.
Centinervia, p. 197. n. 542.
Centummorbia, *Centmorbia*, p.
177. n. 492.
Centumnodia, p. 201. n. 552.
Centunculus, *vid.* *Alsine*.
Centunculus, *vid.* *Gnaphalium*,
p. 107. n. 281.
Centunculus hirsutior, p. 13.
n. 28.
Cerasus avium Racemosa, p. 42.
n. 111. *Cerasia racemosa ru-
bra, nigra*, *ibid.*
Cerdopatium caule nullo, p. 35.
n. 94.
Cervicaria major, *vid.* *Campa-
nula vulgatior*.
Cervicaria tertia sive *minor*, p.
33. n. 86.
Cervis spina, p. 230. n. 615.
Chamæcerasus p. 42. n. 112.
Chamæcissus sive *Chamæcissos*
terrestris, *vulgaris*, *vid.* p. 123.
n. 337.
Chamæcisi alterum genus, *vid.*
Consolida, p. 50. n. 128.
Chamæcistus vulgaris flore luteo
p. 43. n. 113.

Tt 2

Cha-

INDEX LATINUS.

- C**hamæcyparissus, p. 170. n. 464.
 Chamædaphne s. pusilla laurus,
 p. 138. n. 388.
 Chamædris spuria major altera
 seu frutescens, p. 43. n. 114.
 Chamælæa s. Mezereon, p. 138.
 n. 388. Germanica, *ibid.* no-
 stras, *ibidem*.
 Chamælema, *vid.* Hedera terre-
 stris, p. 123. n. 337.
 Chamæleon albus, p. 35. n. 94.
 Chamæmelum vulgare Leucan-
 themum, p. 44. n. 115. Cha-
 mæmelum fœtidum, *ibid.* n.
 116. inodorum, p. 45. n. 117.
 Chamæmelum cranthemon, *vid.*
 Consolida, p. 51. n. 130.
 Chamæpeuce, p. 169. n. 463.
 Chamæpeuce, *vid.* Cistus Le-
 don. p. 49. n. 125.
 Chamærubus saxatilis, p. 234.
 n. 632.
 Chamomilla, *vid.* Chamæmelum.
 Chamomilla fatua, *vid.* Cha-
 mæmelon inodorum.
 Chelidonium majus vulgare, p.
 45. n. 118. Chelidonium mi-
 nus, p. 46. n. 119.
 Chelidonia rotundifolia minor,
 p. 46. n. 119. Chelidonia
 capnitis radice nigrâ, *vid.* Fu-
 maria bulbosa, p. 78. n. 194.
 Chelidonia palustris, *vid.* Caltha
 palustris.
Xελιδονίζειν quid apud Veteres?
 p. 47. n. 119.
- Chenopodium, *vid.* Atriplex
 sylvestris latifolia.
 Chironium, Chironica, *vid.* Cha-
 mæcissus.
 Christophoriana, *vid.* Aconitum
 racemosum, 4.
 Chrysanthemum arvense, p. 25.
 n. 64. Chrysanthemum fo-
 liis Tanaceti, p. 47. n. 120.
 Chrysanthemum, *vid.* Caltha
 palustris.
 Chrysanthemum segetum, *vid.*
 Bellis lutea major.
 Chrysocome, *vid.* Elichrysum,
 p. 64. n. 155. Chrysocome
 prima vulgaris, *ibid.*
 Chrysosplenion, *vid.* Saxifraga
 aurea.
 Cicercula sylvestris, p. 138. n. 385.
 Cicutaria palustris latifolia alba,
 48. n. 123. *tenuifolia*, *ibid.*
 n. 124.
 Cichoreum sylvestre, agreste of-
 ficinarum, p. 47. n. 121. Ci-
 choreum sylvestre flore albo,
 p. 48. n. 122. Cichorea, *ibid.*
 Cicutaria, p. 175. n. 486. Ci-
 cutowia palustris latifolia alba,
 p. 48. n. 123. *tenuifolia*, p.
 48. n. 124.
 Cicutæ potus, olim pœna, p. 48.
 n. 123.
 Circæa, p. 256. n. 668. 669. 670.
 Cirsium, *vid.* Cnicus, p. 50.
 n. 127.
 Cir-

INDEX LATINUS.

- Cirsium Italicum*, *vid.* *Buglossum vulgare*.
Cistus Ledon, p. 49. n. 125.
Clinopodium vulgare, *majus*, p. 49. n. 126. *Origano simile*, *ibid.*
Climenum Matthioli, p. 138. n. 385.
Cnicus sylvestris spinosior, p. 50. n. 127.
Cnips quid, p. 260. n. 754.
Colubrina, *vid.* *Bistorta*,
Colus rusticus, *vid.* *Cnicus*, p. 50. n. 127.
Coma aurea, *vid.* *Elychrysum*, p. 64. n. 155.
Consolida major, *vid.* *Sympyrum*,
Consolida media pratensis cærulea, p. 50. n. 128. *purpurea*, *ibid.* n. seq. *regalis vel regia*, p. 51. n. 130.
Consolida minor, *minima*, p. 208. n. 573.
Convolvulus major albus, p. 51. n. 131. *minor*, p. 52. n. 132. & seq. *volubilis*, *ibid.*
Conyza cœrulea acris, p. 52. n. 134. *Conyza aquatica*, *it.* *Helenitis*, p. 53. n. 135. *major*, *minor*, *minima*, n. seq. *palustris*, n. 137. *bidens* *ibid.* & n. seq. *Conyza palustris* *foliis tripartito divisis*, p. 34. n. 89. p. 53. n. 137 *foliis ferratis*, p. 54. n. 138.
Cornus fœmina, p. 54. n. 139.
Corona graminea qualis apud Romanos. p. 215.
Corona querula quænam apud Romanos? p. 215.
Coroneola, *vid.* *Genista*, p. 101. n. 266.
Coronopus sylvestris, *vid.* *Holosteum affinis* p. 127. n. 352.
Corylus sylvestris, p. 55. n. 140. *Coryli flores falsò creduntur esse Juli*. *ibid.* p. 56. *Juli ejus pictoribus & tinctoribus inserviunt ibid.* *Corylus in Prussia valdè frugifera*, p. 55. n. 140. *Pictoribus pulverem Schüttgelb dictum suppeditat*, metallurgis virgam divinatoriam, *ibid.* p. 56. *Corylus materies est virgulæ metallorum indagatrixis, Winschel-Rut dictæ*, p. 56. n. 140. *Corylus eò fructuosior quò pejus tractatur*, p. 57. n. 140.
Cotula alba, *fœtida*, *vid.* *Chamælum fœtidum*. *Cotula inodora*, *vid.* *Chamælum inodorum*.
Cotyledon, *vid.* *Sedum*. (738).
Cracca major, p. 184. n. 737.
Crassula, *vid.* *Telephium*.
Cratægallonon, p. 161. n. 435.
Crepitus lupi, *vid.* *Fungus non vescus XII.* p. 90. n. 234.
Cru-
T t 3

INDEX LATINUS:

- C**rucialis, *vid.* Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus.
- C**ruciata, *vid.* Centiana minor p. 101. n. 267. Cruciata gentianella, *ibid.*
- C**rus Galli, *vid.* Gramen dactylon, p. 110. n. 289.
- C**uculi flos, p. 41. n. 108.
- C**uminum pratense, *vid.* Carum.
- C**uminum sylvestre, *vid.* Consolida, p. 51. n. 130.
- C**unila bubula Plinii p. 185. n. 512.
- C**unila sativa, *vid.* Satureja hortensis.
- C**upressus ac Pinus cariem ac vetustatem non sentiunt, p. 196. n. 540. causa *vid.* *ibid.* Pinus in Isthmici ludis primum coronamentum, p. 197. *ibid.*
- C**uscuta major, p. 59. n. 141. Cuscuta officinarum, *ibid.* Cuscuta Matth. *ibid.*
- C**yanus segetum, p. 59. n. 142. cœruleus *ibid.* flos, vulgaris, major, cœruleus arvensis, *ibid.* flores cyani pictoribus & aliis colorem suppeditant, *ibid.* p. 60.
- C**yanus sylvestris, montanus, integrifolius, *vid.* Jacea latifolia p. 129. n. 358.
- C**yanus sylvestris major arvensis *vid.* Scabiola major.
- C**ymbalaria, *vid.* Telephium.
- C**ynanche, p. 203. n. 556.
- C**ynocrambe foemina, *vid.* Mercurialis, p. 164. n. 440.
- C**ynoglossa minor, *vid.* Echium Scorp. p. 64. n. 153.
- C**ynoglossum majus vulgare, p. 60. n. 143. item Cynoglossus vulgaris, *ibid.* cum flore, *ibid.* minus n. seq. 144.
- C**ynorrhodos procerior, p. 232. n. 618.
- C**ynosbatos Theoph. *vid.* Mespilus, p. 163. n. 441.
- C**ynosbatus Diosc. p. 231. n. 618. Cynosbatos procerior, p. 232. n. 618.
- C**ynosorchis palustris lœvi folio & angusto, p. 181. n. 504.
- C**yperella Cordi, *vid.* Gramen exile, p. 118. n. 319. Pseudocyperi species pumila, *ibid.*
- C**yrtisus, p. 273. n. 713. lac auget, p. 273. n. 713.
- D.**
- D**amasonium tenuifolium, *vid.* Helleborine, p. 124. n. 341.
- D**amasonium callyphyllon, *vid.* Helleborine latifol. p. 124. n. 339.
- D**aphnides, p. 138. n. 388.
- D**aucus officinarum, *vid.* Pastinaca sylvestris, p. 188. n. 522 vulgaris, *ibid.*
- D**aucus Selinoides, p. 195. n. 538.

Del-

INDEX LATINUS.

- Delphinium vulgare*, *vid.* *Con-*
solida p. 51. n. 130.
Dens leonis, p. 61. n. 145. lati-
ore foilio, *ibid.* *vulgi*, *ibid.*
Dentaria heptaphylos, p. 61. n.
146. *baccifera*, *bulbifera*,
ibidem. *Dentaria major*, *vid.*
Orobanche, p. 187. n. 517.
Matthioli, *ibid.*
Diapensia, *vid.* *Sanicula*.
Digitalis flore luteo p. 61. n.
147. magnô flore, *ibid.*
Diplacus sylvestris, p. 62. n. 148
purpureus, *primus*, *ibid.*
Disphendomen, quale genus sup-
plicii fuerit, p. 290. n. 753.
Dracontium palustre, *vid.*
Dracunculus, p. 62. n. 149.
Dracunculus palustris, p. 62. n.
149. *aquaticus* vel *aquatilis*,
ibid. *palustris minor*, *ibidem*.
pratinus, p. 63. n. 150.
Dracunculus major, *vid.* *Bistor-*
ta major.
Dulcamara, p. 257. n. 670.
E.
Ebulus sive *Sambucus humilis*,
p. 243. n. 639. *Ebulus* gli-
res & mures fugat, p. 243. n.
638. *Ebuli oleum* corticum
radicum vermes expellit ex-
terne inunctum, p. 243. n.
639. *Ebuli radix* amuletum
in ulceribus sordidis, p. 243.
n. 639.
- Echium scorpioides arvense*, p.
63. n. 151. *flosculis niveis*,
n. 152. *palustre*, p. 64. n.
153. *Echium vulgare*, p.
64. n. 154. *floribus pur-*
purantibus, *ibid.* *Echium Ita-*
licum, *spinosum*, *Vide Bu-*
glossum vulgare.
Ἐλάτη, *Vid.* *Abies*.
Elatine, *Vid.* *Convolvulus mi-*
nor, p. 52. n. 133.
Elatine, *Vid.* *Cynoglossum*, p.
60. n. 144.
Elaphoboscum, *Vid.* *Pastinaca*
sylvestris, p. 189. n. 524. *Er-*
raticum. *ibid.*
Elenium, *enula*, *campana enula*,
Vide Helenium vulg. p. 123.
n. 338.
Eleoselinum, *Vid.* *Sion*.
Elichrysum, p. 64. n. 154.
Elleborine, *vid.* *Helleborine*, p.
123. n. 339.
Empetron, p. 202. n. 554.
Emplastrum Lœfelia ex Alno mi-
rabile, p. 10. 11. n. 19.
Enophyllum. p. 179. n. 499.
Epactis recentiorum, *Vid.* *Hel-*
leborine p. 123. n. 339. *lati-*
folia, *ibid.* p seq.
Epimedium, p. 275. n. 717.
Equisetum palustre, p. 65. n.
156. *sylvaticum*, *ibid.* n. 157.
palustre, n. seq. *tertium*, n.
158. *foliis nudum*, non *ra-*
moseum

INDEX LATINUS.

- p. 66. n. 159. itemque ramosum, n. seq. *Equisetum fœtidum* sub aquâ, p. 66. n. 161. pini foliis simile, *ibid.* *Equisetum* foliis bifurcis sub aquâ repens, p. 67. n. 162.
Equorum morbus, dictus **Wurst-Sucht.** p. 5.
Erica vel **Erice**. *vulgaris* glabra, p. 67. n. 163. folio myricæ, *ibid.* *vulgarior*, item prior, *ibid.* *baccifera* *tenuifolia* p. 67 n. 164.
Erica baccifera latifolia, p. 289. n. 750.
Ericoides rubrum, *Vid.* *Euphrasia pratensis* p. 72. n. 178.
Erigeron, *Vid.* *Senecio*.
Erigerum quartum, *Vid.* *Conyza* p. 52. n. 134.
Eriophoron gramen, *Vid.* *gramen pratense*, p. 14. n. 307.
Eruca lutea latifolia sive barbarea, p. 67. n. 165. *Barbarea foemina*, *ibid.* *Eruca sylvestris minor*, p. 68. n. 166. *palustris minor*, *ibid.* *maritima vulgo marina*, n. seq. *napi flore*, *ibid.* *Eruca sylvestris minor altera* foliis subasperis in orbem sparsis, p. 68. n. 167. *sylvestris major* iisdem quidem foliis ast multum luxuriantibus *ibid.* n. seq. *Eruca sentiunt sapissimè* folia *Nymphæx*, p. 178. n. 493.
Ervilium, p. 138. n. 385.
Eryngium maritimum vel mari- num, p. 69. n. 170.
Erysimum p. 69. n. 171. vul- gare, *ibid.* *Dioscoridis*, *ibid.* *nostras*, *Vid.* *hirsutum* n. seq. *Erysimum hirsutum* siliquis *Eruce*, p. 69. n. 172.
Evonymus vulgaris, p. 70. n. 173. *Theophrasti*, *ibid.*
Eupatorium cannabinum *vid.* *Co- nyza palustris*, p. 54. n. 138.
Eupatorium Cannabinum, p. 70. n. 174. *Avicennæ*, seu vul- gare, adulterinum, *Mas*, *ibid.* *Cannabinum alterum* flore candido, p. 71. n. 175. *Eupa- torium Veterum*, *ibid.* n. seq. *Dioscoridis & aliorum Græ- corum vulgare*, *ibid.*
Euphragion, *Vid.* *Euphrasia*, p. 71. n. 177. *Euphragia altera major*, *ibid.*
Euphrasia sive *Euphrasina officinarum*, p. 71. n. 177. *ocula- ris Argentinensium*, *ibidem.* *Pratensis rubra*, p. 72. n. 178. *Euphrasia altera Dodonæi*, *ibid.* *Euphrasia cœrulea*, *Vid.*
Echium Scorp. p. 64. n. 153.
Euphrasia gramen, *Vid.* *Caryophyllus arvensis* glaber.
F.
Faba inversa, *Vid.* *Telephium*.
Fagus p. 72. n. 178.
Fa-

INDEX LATINUS.

- Fagus Sepium*, *vid. Ostrya*, p. 188. n. 520.
- Farfara*, *Vid. Tussilago*.
- Farfugium*, *Vid. Caltha palustris* flore simplici.
- Favagello*, *Vid. Chelidonia rotundifolia minor*.
- Festuca avenacea* sterilis elatior, p. 72. n. 180. *lолii* primum genus, & vitium plerumque hordei est. *ibid.*
- Filago sive impia*, *Vid. Gnaphalium* p. 107. n. 281. major, *ibid.* n. 282. minor, *ibid.* n. seq.
- Filicula*, p. 204. n. 559. *Filicula petræa* fœmina, *vid. Filix ramosa*, p. 74. n. 184.
- Filipendia*, p. 73. n. 181.
- Filipendula prima* & *saxifraga rubra*, *vid. Filipendia*, p. 73. n. 181. *Filipendula vulgaris*, *ibid.*
- Filix non ramosa dentata*, p. 73. n. 183. *vulgaris*, mas secunda, fœmina, mascula, *ibid.* *Filix ramosa major*, p. 74. n. 183. fœmina sylvestris, mas major, ejus primum genus; *ibid.* *Filix ramosa pinnulis dentatis*, p. 74. n. 184. *Filix altera tenuifolia*, *ibid.* *Filix palustris maxima*, p. 74. n. 185.
- Filum marinum*, p. 74. n. 186. Uu
- Fistularia*, *vid. p. 190. n. 526.*
- Flammula*, p. 221. n. 598. folio ferrato. p. 224. n. 404.
- Flammula Ranunculus quartanæ medetur externe. Internè contra Scorbutum*. p. 224. n. 604.
- Flos ambarvalis*, p. 200. n. 539.
- Flos hepaticus*, *vid. Gramen Parnassi*, p. 108. n. 284.
- Flos regius vel sylvestris*, *vid. Consolida*, p. 51. n. 130.
- Flos tinctorius*, *vid. Genista tinctoria*, p. 101. n. 266.
- De fluminibus retandis publicè redemptis*, p. 240. n. 637.
- Fœniculum aquaticum galericulatum*, p. 164. n. 444. *fœniculum aquaticum secundum p. 166.* n. 448.
- Folliculus marinus*, p. 75. n. 187
- Forbesina Bononiensis*, *vid. Conyza palustris*, p. 53. n. 137.
- Formentone*, *vid. Convolvulus minor*, p. 52. n. 133.
- Fraga fructu rubro*, *vid. Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188.
- Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188. major, *ibid. caulinis maximè reptantibus*, *ibid. n. 189.*
- Fragula*, *vid. Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188.
- Fragum*, *vid. Fragaria vulgaris*, p. 75. n. 188. *Fraga vindimiam quomodo polliceantur*, *ibid.* Fran-

INDEX LATINUS.

- F**rangula, *vid.* Alnus nigra bâc-
cifera, p. 11. n. 20. Frangu-
læ cortex interior luteus vim
Catharticam obtinet, *ibid.*
- F**rassinella, p. 200. n. 550.
- F**raxinus, p. 76. n. 199. excel-
sior, *ibid.* Fraxini lignum
certo modô cæsum vulnera
sympatheticè curat, p. 76.
n. 190.
- F**rixago palustris, *vid.* Scordium
- F**ucus marinus, *vid.* Alga marina
Fucus marinus, p. 77. n. 191.
- F**ucus maritimus, p. 216. n. 585
- F**ucus ex anchusæ radice & ap-
paratus metricius artificiosus
lepidè describitur, p. 143.
n. 400.
- F**umaria bulbosa seu tuberosa mi-
nima, p. 220. n. 594.
- F**umaria. p. 77. n. 192. fumaria
officinarum & Dioscoridis,
ibid. bulbosa major p. 77. n.
193. fumaria altera Matth.
ibid. bulbosa radice non cavâ.
p. 78. n. 194.
- F**umus terræ, *vid.* Fumaria, p.
77. n. 192.
- F**ungi vesci 28. non vesci 42.
reperiuntur à p. 79. ad p. 99.
- F**ungus ovatus, *vid.* Fungus non
vescus XII. p. 90. n. 234.
- F**ungus foetidus penis imaginem
referens, *vid.* Fungus non
vescus XIII. n. 235.
- F**ungus Sambucinus, *vid.* Fun-
gus non vescus XIV. p. 91.
n. 236. Fungus ad Sambu-
cum, *ibid.*
- F**ungus membranaceus auricu-
lam referens sive sambucinus
vid. Fungus non vescus XIV.
p. 91. n. 236.
- F**ungus virilis penis arrrecti fa-
cie, *vid.* Fungus non vescus
XIII. p. 91. n. 235.
- F**ungus biorchis anthracinus, *vid.*
Fungus non vescus XXV. p.
95. n. 247.
- F**ungus granulosus corallinus,
vid. Fungus non vescus XXXII
p. 96. n. 254. Fungus gra-
nulosus incarnatus, p. 97.
n. 255.
- F**ungus racemosis vetustis lignis
adnatus, *vid.* Fungus non ve-
scus, p. 96. n. 253.
- F**ungus cucullatus, *vid.* Fungus
non vescus XXXV. p. 97.
n. 257.
- F**ungus farreus. *vid.* Fungus non
vescus, p. 97. n. 258.
- F**ungus pyxioides coccineus, *vid.*
Fungus non vescus XXXIV.
p. 97. n. 256. Fungus pyxi-
oides semenifer, p. 98. n. 263
- F**ungus digitatus alveariorum,
vid. Fungus non vescus XLII.
p. 99. n. 264.

INDEX LATINUS.

- Fungos circa quā diætā opus sit? p. 79. n. 195. p. 87. n. 222.
 Fusterna quid? p. 1. n. 1.
- G.
- Galega altera vel sylvestris, p. 284 n. 734.
- Galeopsis Matthioli, *vid.* Lignum, p. 133. n. 372. Dioscoreidis vera, *ibid.* & n. 373. vulgaris, fœtens, purpurea, secunda, *ibid.* flore croceo luteo p. 134. n. 374. legitima vel vera, *ibid.* n. seq.
- Galion album quorundam, p. 166. n. 449. Gallion candido flore, *ibid.* Gallion tertium, *ibid.* Gallion album, *ibid.* Gallium flore albō, *ibid.*
- Galion, *vid.* Gallium, p. 100. n. 265. Galion luteum, *ibid.*
- Galla, fructus quercūs, p. 211. n. 584. varia plebi prognostica præbet, *ibid.*
- Galli Crus, p. 221. 598.
- Gallinaceus pes, *vid.* Fumaria bulbosa, p. 78. n. 193.
- Gallion luteum, *vid.* Gallium, p. 100. n. 265.
- Gallium luteum, p. 100. n. 265. flore luteo primum. *ibid.* flore luteo, *ibid.* Gallii primum genus, *ibid.* Gallium luteum multis medicis, præfagis etiam pollet virtutibus, p. 101. n. 265.
- Gallium album latifolium, p. 166. n. 449. Gallium flore albō. *ibid.* Gallium album palustre, p. 18. n. 44.
- Gariofilata, *vid.* Caryophyllata.
- Garyofillata, *vid.* Caryophyllata
- Gattaria herba, p. 161. n. 437.
- Genista tinctoria Germ. p. 101. n. 266. vulgaris. *ibid.*
- Genistella infectoria vulgi, *vid.* Genista, p. 101. n. 266. Genistella tinctoria, *vid.* *ibid.*
- Gentiana minor, *vid.* Centiana minor, p. 101. n. 267. Gentiana cruciata, *vid.* *ibid.* cruciata recentiorum. *ibid.* Gentiana III. item III. cruciana, *ibid.* media, *ibid.* Palustris angustifolia p. 102. n. 268. quarta, *ibid.* minima, Gentianæ 4. species. *ibid.*
- Geranium batrachoides, p. 102. n. 269. Geranii species tertia *ibid.* Geranii batrach. cæruleum, it. flore albō, *ibid.* folio Aconiti, p. 102. n. 270.
- Geranium columbinum, p. 102. n. 271. folio malvæ rotundo, *ibid.* Geranii vulgaris species *ibid.* Geranium alterum, item secundum, *ibid.* alterum Dioscordis, *ibid.* Malvaceum sive Balsaminum, *vid.* Geranium columbinum, p. 103. n. 271. Geranium columbinum

INDEX LATINUS.

- num erectum, *ibid.* n. seq.
 procumbens tenuius lacinia-
 tum, p. 104. n. 273. cicutæ
 foliō moschatum & inodo-
 rum, *ibid.* n. seq. primum,
 supinum, majus, *ibid.* Gera-
 nium myrrhinum, item mu-
 scatum, $\sigma\kappa\alpha\delta\eta\pi\omega\varphi\upsilon\lambda\lambda\omega\gamma$, *vid.*
Geranium cicutæ foliō, p. 104.
 n. 274. cicutæ foliō minus
 & supinum, p. 104. n. 275.
 minus & primum, *ibid.* ar-
 vense, *ibid.* septimum sive
 gruinum, *ibid.* p. 105. n.
 276. Moscatum inodorum,
ibid. Rupertianum, *ibid.* ter-
 tium, primum, *ibid.* p. 105.
 n. 276.
- Gerhardi Herba**, p. 16. n. 40.
Geum rivale, *vid.* *Caryophyllata*
 aquatica.
- Gladiolus** floribus uno versu di-
 spositis major, p. 105. n. 277
Gladiolus verus, item *Germa-*
nicus, *sylvestris*, *vid.* *ibid.*
Narbonensis, *ibid.*
- Gladiolus palustris**, *vid.* *Juncus*,
 p. 131. n. 365. *aquatis*, *ibid.*
- Glaux aquatica**, p. 106. n. 278.
 exigua maritima, *ibid.* An-
 glaux *Dioscoridis*, *ibid.* ma-
 rina minor, *ibid.*
- Glessum quid.** p. 216.
- Glossularia multiplici acinō**, sive
 non spinosa, p. 121. n. 333.
- non spinosa fructu nigrō, *ibid.*
 n. 334. *sylvestris rubra*, p.
 122. n. 335.
- Glyzyrrhiza siliquosa**, *vid.* *Ger-*
manica, p. 106. n. 279. alte-
 ra, *vulgaris*, *ibid.*
- Gnaphalium montanum**, p. 106.
 n. 280. flore rotundō, pur-
 pureum & album, *ibid.* *svave*
rubens, p. 107. *ibid.* *vulgare*
majus, *minus*, *ibid.* *majus al-*
terum, p. 107. n. 282. *Angli-*
cum vel Belgicum, *ibid.* *me-*
dium, *ibid.* n. 283. *Gnapha-*
lion. *vid.* *Gramen pratense*
 p. 114. n. 307. *Gnaphalium*
Hieronymi Bockii, *ibid.*
- Gorcho**, quale antiquorum Pruf-
 forum *Deastrum*, p. 213. n. 584
- Graminis** 49. species à p. 107.
 ad p. 121.
- Gramen Parnassi vel Parnassum**,
 p. 107. n. 284. *hederaceum*,
 recentiorum, *ibid.* p. seq.
Gramen mannae, p. 108. n.
 285. Diversum est à gramine
 mannae *esculentō* Lob. *ibid.*
 Manna quomodo ad edendum
 præparetur, *vid.* *ibid.* *Gram-*
men officinarum p. 109. n.
 286. *caninum sive Dioscori-*
dis, item, *canarium*, *medica-*
tum officinarum, *vid.* *ibid.*
- Gramen caninum supinum mi-**
 nus p. 109. n. 287, secundum
ibid.

INDEX LATINUS.

- ibid.* geniculatum caninum
marinum vel maritimum, i-
tem spicatum, *ibid.* caninum
tertium, *ibid.* Gramen da-
ctylon, p. 109. n. 289.
- Gramen montanum**, p. 110. n.
290. arvense duplicitis gene-
ris, *ibid.* n. 291. & seq. cri-
statum, *ibid.* n. 293. monta-
num aliud p. 111. n. 294.
Pratense, *ibid.* n. seq. minus
vel secundum, *ibid.* Panicu-
latum, *ibid.* n. 296. Gramen
Mariae Borussorum, *ibid.* n.
297. paniculatum odoratum
ibid. Gramen segetum vel se-
getale, n. seq. segetale aliud,
p. 112. n. 299.
- Gramen pratense tertium**, *vid.*
Gramen segetum p. 112. n.
299. harundinaceum arven-
se, loliaceum, gramen agro-
rum, vel agrorum venti spica.
ibid. leporinum, tremulum,
tremulum majus, p. 112. n.
300. loliacei decimum ge-
nus, *ibid.* Gramen Caryophyl-
latum polycarpon, *ibid.* n.
301. montanum an spicâ
variâ. *ibid.* Gramen hirsutum
nemorosum, item pilosum,
vel latifolium majus, p. 113.
n. 302.
- Gramen thypoides maximum,
p. 113. n. 303. asperum pri-
- mum, item typhinum pri-
mum, *ibid.* n. 304. thypo-
ides spicâ angustiore, alopecu-
roides minus vel alopecuri-
num secundum, *ibid.* n. 305.
typhoides culmô reclinatô,
ibid. n. 306. alopecurinum
tertium, it, alopecuroides mi-
nus, *ibid.* Gramen pratense
tomentosum p. 114. n. 307.
tomentarium, pratense, junce-
um lanigerum, *ibid.*
- Gramen juncum spicatum p.
114. n. 308. marinum spi-
catum, *ibid.* mixtum ex jun-
co & gramine *ibid.* juncum
folio artic. sylv. *ibid.* n. 309
juncum sylvaticum, *ibid.*
juncum aquaticum, *ibid.* n.
310. juncum semine acumi-
natô, p. 115. n. 311. junc-
um sextum, nemorosum, epi-
gonatocavlon, *ibid.* n. 312.
Cyperoides palustre majus,
p. 115. n. 313. Cyperinum
minus, *ibid.* Gramen Cype-
roides palustr. spicâ pendula
p. 116. n. 314. cyperoides
minus spicâ divisâ, *ibid.* n.
315. spicis curtis divulsis, p.
117. n. 316. spicâ varian-
te, *ibid.* n. 317. exile spicis
nigris, *ibid.* n. 318. exile
hirsutum, p. 118. n. 319.
hirsutum capitulis Psyllii,
ibid.

INDEX LATINUS.

- Vid.* *Cyperinum pilosum*,
ibid. *hirsutum repens*, p. 118
n. 320.
Gramen arundinaceum enode
 majus montanum, p. 118. n.
 321. minus sylvaticum p.
 119. n. 322. *arundinaceum*
 paniculâ molli spadiceâ ma-
 jus *ibid.* n. 323. *loliacei* 8 vi
 alia species *ibid.* tomentosum
ibid. *Gramen palustre* panicu-
 latum altissimum, p. 119. n.
 324. aquaticum panic. arun-
 dinaceum, *ibid.* *Gramen a-*
rundinaceum foliis acutissimis
 paniculâ multiplici, p. 119.
 n. 325. *arundinaceum* pani-
 ceum divisâ paniculâ *ibid.* n.
 326. *paniceum* spinâ simpli
 p. 120. n. 327. *panici* effigie
 & simplici spinâ, *ibid.* *Gram-*
men panicum spicâ aristis
 longis armata, p. 120. n. 328.
paniceum secundum, *ibid.* *pa-*
nici effigie cum aristis, *ibid.*
Marinum spicâ secalinâ p. 120.
 n. 329, *latifolium* spicâ triti-
 ceâ divulsâ, *ibid.* n. 330.
Gramen loliaceum spicâ lon-
 giore,, p. 121. n. 331. mon-
 tanum avenaceum spicatum,
ibid. n. 332. sylvaticum se-
 cundum, item, montanum
 spicatum, *ibid.*
Gramen Levcanthemum flori-
 dum, *vid.* p. 38. n. 99.
- Gramen Mannæ esculentum Pru-
 tenicum, quomodo præpare-
 tur? p. 108. n. 285.
Gramen Polyanthemum minus,
vid. *Caryophyllus montanus*
 minor.
Gratia DEI, *vid.* *Geranium Ro-*
bertianum, *vid.* p. 105. p. 276
Grossularia, *vid.* *Glossularia*.
H.
Halimus, *vid.* *Chamæcerasus*,
Harundo, *vid.* *Arundo*.
Hedera helix, p. 122. n. 336.
 perfoliata sterilis *Hederæ*,
ibid. *Hederæ* species tertia,
 item arboreæ sylvestre genus,
 major sterilis, *ibid.* *Hedera*
terrestris, *ibid.* n. 337. vulga-
 ris terrestris, humilis, *hederula*
corona terræ, *ibid.* p. 123.
Hedypnois, *vid.* *Dens leonis*, p.
 61. n. 165.
Helenium vulgare, p. 123. n. 338.
 item *Helenion*, *ibid.*
Helianthemum Plinii, *vid.* *Cha-*
mæcissus.
Helichryson, *vid.* *Elichrysum*, p.
 64 n. 155.
Heliochrysos sylvestris *vid.* *Gna-*
phalium, p. 107. n. 281.
Heliotropium minus, *vid.* *Echi-*
um scorpioides, p. 63. n. 151.
Helix *vid.* *Hedera* p. 122. n.
336.
Helleborine latifolia p. 123. n.
339.

INDEX LATINUS.

339. recentiorum secunda,
ibid. montana, n. 340. angu-
 stifolia, quinta, sexta recentio-
 rum, p. 124. n. 341. angusti-
 folia pratensis, *ibid.* n. seq.
Helxine cissampelos, *vid.* Con-
 volvulus, p. 51. n. 131. & seq.
Helxine sylvestris sive fluvia-
 tilis, p. 256. n. 668.
Hemeris, p. 211. n. 584.
Hemerocallis flore rubello, p.
 140. n. 394. Herbariorum,
 p. 141. n. *ibid.*
Henricus bonus, sive tota bona,
 spinaciæ facie, Dodonæi, *vid.*
Lapathum, p. 136. n. 381.
Hepatica aiba, *vid.* Gramen
 Parnassi p. 107. n. 248.
Hepatica aurea, nobilis p. 275.
 717.
Hepatica palustris, *vid.* Saxifra-
 ga aurea.
Hepatica stellata, *vid.* Asperula.
Hepatorium aquaticum. p. 34.
 n. 89. Hepatorium aquatile,
 vid. Conyza, p. 53. n. 137.
Hepatorium vulgare, *Vid.* Eu-
 patorium cann. p. 70. n. 174.
Heptaphyllum, *Vid.* Tormen-
 tilla.
Heraclea. *vid* Lamium, p. 134.
 n. 375.
Herba Gerhardi, p. 16. n. 40.
Herbarum proventus in areis
 hortorum quomodo impedi-
 endus? p. 293. n. 759.
Herculis simulacrum ex abieto
 confectum p. 2. n. 1.
Herniaria, p. 202. n. 554. mul-
 tigrana serpilli facie, *ibid.*
Hieracium foliis & facie Chon-
 drillæ, Lobelii, folio hirsutum,
 secundum, p. 124. n. 343.
Hieracium Chondrillæ folio
 glabrum, *ibid.* Aphacoides,
ibid. p. 125. Hieracium phlo-
 moides, p. 125. n. 345. alpi-
 num latifolium Pannonicum,
 primum latifolium, *ibid.* mon-
 tanum, latifol. non sinuatum,
ibid. n. 346. montanum hir-
 sutum ramosum, *ibid.* n. 347.
Hieracium montanum latifo-
 lium glabrum minus, p. 126.
 n. 348. alterum grandius *ibid.*
 n. 349. montanum angusti-
 folium fruticosum majus, pri-
 mum, Sabaudum, tertium vel
 tertii generis, *ibid.* Hieraci-
 um dentis leonis folio mono-
 clonon, *ibid.* n. 350. inty-
 baceum, *ibid.* foliis oblongis,
 in ambitu aculeatis, monoclo-
 non, Joh. Lœf. *ibid.* n. 351.
Hieracium majus, *Vid.* Dens le-
 onis, p. 61. n. 105. minus
 vel parvum, *ibid.*
Hippia, *vid.* Alsine.
Hippolapathum minus. *vid.* La-
 pathum, p. 135. n. 378. syl-
 vestre, n. seq.
Hip-

INDEX LATINUS.

- Hippuris minor, *vid.* Equisetum sylvestre, p. 65. n. 157. major, nuda, major altera, p. 66. n. 159.
- Hirundinaria, *vid.* Asclepias & Chelidonium.
- Hirundinare, quid? apud veteres, p. 47. n. 119.
- Holosteum Dioscoridis floribus albis, *vid.* Caryophyllus arvensis glaber flore majore. Holostium Caryophyllæum, *vid.* Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore.
- Holosteum vel Holostium, *vid.* Gramen junceum sextum, p. 115. n. 312.
- Holosteо affinis, p. 127. n. 352. item, Holosteon vel Holostium Loniceri, *ibid.*
- Holostium Lacunæ, p. 194. n. 535.
- Hydrolapathum, magnum sive aquaticum sylvestre, *vid.* Lapathum p. 135. n. 377. minus, *ibid.* n. 378.
- Hydropiper, *vid.* p. 191. n. 528
- Hyoscyamus albus, candidus, alterum genus in maritimis, item, secundus, p. 127. n. 353.
- Hypericum, vulgare & herba perforata, *vid.* p. 127. &c seq. n. 354.
- Hypogenista, p. 186. n. 515.
- Hyssopus campestris, montanus, sylvestris, *vid.* Chamæcissus.
- Hyssopus agrestis, *vid.* Satureja hortensis.
- Jacea, p. 285. n. 741.
- Jacea nigra major, squamoso capite, montana prima, Austria ca prima, p. 128. n. 355. flore albō, *ibid.* n. seq. Jacea laciniiata squamata, tertia Cretica p. 129. n. 357. latifolia capite hirsutō; austriaca secunda, montana villosō capite, quarta elatior, *ibid.* n. 358. latifol. cap. hirsuto flore albō *ibid.* n. 359.
- Jacobeа vel Jacobæa vulgaris, laciniiata, item herba Jacobæa, Jacobæa senecio, p. 129. n. 360. flos Jacobæus, *ibid.*
- Jacobæa Barbareæ instar laciniiata p. 129. n. 361.
- S. Jacobi Flos sive herba, item Flos Jacobæus, *vide* Jacobea p. 129. n. 360.
- Iberis Nasturtii foliō p. 130. n. 362. item Iberis secunda.
- Icteri cura magnetica, p. 48. n. 121.
- Ilex urbe Româ vetustior, p. 213. n. 584.
- Impia Plinii, *vid.* Gnaphalium p. 107. n. 281. vel impia herba, *ibid.*
- Intybum & Intubum agreste sylvestre, *vid.* Cichoreum sylvestre. Inu-

INDEX LATINUS.

- Inula, *Vid.* Helenium p. 123.
 n. 338.
- Jovis barba, *vid.* Sedum majus.
- Ips qualis vermiculus? p. 291.
 n. 754.
- Irio, *vid.* Erysimum, p. 69. n.
 171.
- Iris pratensis angustifolia humilior, p. 130. n. 363. tenuifolia, undecimæ altera species, angustifoliæ secundæ species altera, *ibid.* Ischæmon Plinii, item vulgare, *ibid.* Gramen dactylon, p. 110. n. 289.
- Isopyron, *vid.* Trifolium palustre.
- Juncus palustris major, maximus, aquaticus maximus, holoschœnos grandis, levis aquaticus, rotundus tertius, p. 130. n. 364. floridus, major n. seq. cyperinus, cyperoides paludosus & floridus, *ibid.* p. 131. laevis paniculæ non sparsa, *ibid.* n. 366. palustris minor *ibid.*
- Juncus bombcinus, *vid.* Gramen pratense, p. 114. n. 307.
- Juncus $\lambda u \chi v \acute{a} v \vartheta e \mu \mathcal{O}$ major, *vid.* Gramen arundinaceum, p. 118. n. 321. tenuis minor, p. 119. n. 322.
- Juncellus Cyperoides capitulo simplici, p. 131. n. 367.
- Juniperus fruticosa, p. 131. n.
- n. 368. vulgaris, it. baccifera, minor, primum genus, humilis, nostras, *ibid.* vulgaris arbore, p. 132. n. 369. vulgaris celsior & arborescens, *ibid.*
- K.
- Kali foliō gramineō, p. 132.
 n. 370. spinoso affinis, p. 133.
 n. 371.
- $\kappa\delta\alpha\lambda\omega\iota$, Germ. Robold quinam olim dicti dæmones visibles, p. 241. n. 638.
- S. Kunigundis herba p. 70. n.
 174. dicta prima, *ibid.*
- L.
- Labrum Veneris *vid.* Dipsacus p. 62. ejus species *ibid.*
- Lactuca agnina, p. 278. n. 723.
- Lactucella, p. 194. n. 536.
- Lagopodium flore luteo, p. 144.
 n. 399.
- Lagopus p. 274. n. 714.
- Lagopus, *vid.* Gnaphalium, p. 106. n. 280.
- Lamium purpureum & album non fœtens p. 133. n. 372. album & purpureum, *ibid.* primum, *ibid.* purpureum fœtidum, p. 133. n. 373. luteum, foliō oblongō, p. 134. n. 374. flore luteō, *ibid.* maximum, sylvestre fœtidum, *ibid.* n. 375 minus folio caulem ambiente, n. seq.

X x

Lam-

INDEX LATINUS.

- Lampsana* p. 228. n. 610. flore
 melinō. *ibid.*
Lampsana sylvatica, p. 259. n.
 679.
Lancea Christi, p. 179. n. 499.
Lanceola, p. 198. n. 543. mi-
 nor, *ibid.* n. seq.
Laparsum, *vid.* *Acetosa*,
Lathamum aquaticum folio cu-
 bitali sive magnum, p. 135. n.
 377. sativum, palustre, *ibid.*
aquaticum minus, *ibid.* n.
 378. foliō subrotundō, n.
 379. foliō minus acutō, vel
 retusō, *ibid.* *Lathamum* foliō
 acuto, p. 135. n. 380. unctu-
 osum, p. 136. n. 381.
Lappa major, purp. personata,
 vel personatia, p. 136. n. 382.
Lappa major candida, p. 137. n.
 383. minor, *ibid.* n. 384.
Lathyris latiore folio, p. 138. n.
 385. *Lathyris Narbonensis*,
ibid.
Lathyrus latifolius p. 138. n. 385.
 minor, *ibid.*
Lathyrus Angustifolius, p. 138.
 n. 386. *Lathyrus sylvestris*,
ibid. n. 387.
Laureola folio deciduo flore pur-
 pureo p. 138. n. 388.
Laurus pusilla, p. 138. n. 388.
Ledum Silesiacum, *vid.* *Cistus*,
 Ledon. p. 49. n. 125.
Ledum temulentiam accersit, p.
49. n. 125. *Ledum* in haram
 congestum porcos à phthyriasi
 curat, *ibid.*
Legumen Leoninum, p. 186. n.
 515.
Leonina herba, p. 186. n. 515.
Leontopetalon alterum, *vid.* *Fu-*
maria bulbosa, p. 78. n. 193.
Leontopodium alterum vulgare
vid. *Gnaphalium* p. 107. n.
 282.
Lepores Chelidonii quid? p. 47.
 n. 119.
Leptophylla omnium vilissima,
 p. 181. n. 504.
Lens major repens, p. 274. n. 715:
Lenticula palustris vulgaris, p.
 139. n. 389. *Aquatica* *ibid.*
Lenticula aquatica trisulca,
ibid. n. 390. *palustris bifolia*
ibid. n. 391. *Lenticula pa-*
lustris angustifolia, p. 140.
 n. 392.
Leucas montana, *vid.* *Lamium*
 p. 134. n. 374. *quarta*, *ibid.*
 n. 376.
Libanotis alba, *Vide* *Seseli Æthi-*
 opicum.
Lichen petræus latifolius, p. 140.
 n. 393.
Lycopodium & Lycopodium, p.
 169. n. 463.
Liliago cordi, p. 193. n. 533,
Lilium floribus reflexis alterum.
lanugine hirsutum, p. 140. n.

INDEX LATINUS.

394. *Lilium montanum*, *ibid.*
Saracenicum, *ibid.* purpureum mas, *ibid.* *Lilium convallium album*, p. 141. n. 95. *Lilium convallium minus*, *ibid.* n. 396.
Limodoron, seu *Orobanche*, p. 186. n. 515.
Limnopeuce, *Vid.* *Equisetum palustre*, p. 65. n. 158.
Limonium sylvestre, p. 210. n. 577.
Limonium pratense, *Vid.* *Trifolium palustre*.
Limonium, *vid.* *Bistorta*.
Linaria vulgaris lutea flore magiore, p. 142. n. 397. *Linaria maritima floribus odoratis*, *ibid.* n. 398. *Linaria quinta*, p. 174. n. 484.
Lingva avis, *Vide* *Fraxinus*, p. 76. n. 190.
Lingva passerina, *vide* *Fraxinus* p. 76. n. 190.
Lingva serpentina, p. 179. n. 499.
Lingula vulneraria, p. 179. n. 499.
Linum pratense, *vid.* *Gramen pratense*, p. 114. n. 307.
Liquiricia, *vid.* *Glyzyrrhiza*, p. 106. n. 297.
Λιθοπώγων p. 172. n. 475.
Lithospermum majus erectum, p. 142. n. 399. *arvense*, *radice rubra*, p. 143. n. 400.
Lolium decimum, *vid.* *Gramen leporinum*, p. 112. n. 300.
Lolium 6. & Miliaria herba Plini, p. 120. n. 327. *Lolium & triticum temulentum*, p. 121. n. 331.
Loto affinis vulneraria pratensis, p. 144. n. 401. *Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra*, p. 145. n. 402. *Lotus coronata*, *ibid.* *Lotus urbana*, p. 161. n. 436. *Lotus sylvestris*, *ibid.*
Lotus palustris, *vid.* *Trifolium palustre*.
Lunaria græca nostras, p. 145. n. 403. *Lunaria racemosa*, p. 146. n. 404. *Lunaria botryitis polyphyllos*, *ibid.*
Lupulus mas, p. 146. n. 405.
Lupulus sativus & sylvestris, *ibid.* *Lupulus salictarius* *ibid.*
Lupulus fœmina, p. 147. n. 406.
Lusus Augusti nucibus ocellatis & quales hæ fuerint, p. 57. n. 140. *quomodo ludicræ præterea rei materia sit*, *ibid.*
Luteola herba salicis folio, p. 147 n. 407.
Lychnis sylvestris alba simplex, p. 147. n. 408. *Lychnis sylvestris floribus purpureorubentibus*, p. 148. n. 409.
Lychnis sylvestris rubra, *ibid.*
Lychnis sylvestris tubello flore,

INDEX LATINUS.

- re, ibid.* *Lychnis sylvestris aquatica purpurea simplex, ibid.* *Lychnis segetum major p. 148. n. 410.* *Lychnis arvensis, ibid.* *Lychnis inter triticum, ibid.* *Lychnis sylvestris Beenalbum vulgò p. 148 n. 411.* *Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia, p. 149. n. 412.* *Lychnis sylvestris purpurea, ibid.* *sylvestris quarta, ibid.* *Lychnis sylvestris flore incarnato, ibid.* *Lychnis viscosa flore muscofo, p. 149. n. 413.* *Lychnis sylvestris viscosa foliis Otidis, p. 150. n. 414.*
- Lycopsis vid.* *Buglossum sylvestre minus.*
- Lycopsis, vid.* *Echium vulgare p. 64. n. 154.*
- Lycostaphylon foemina, vid.* *Sambucus aquatica.*
- Lysimachia lutea major, p. 150. n. 415.* *Lysimachia lutea communis ibid.* *Lysimachium luteum, ibid.* *Lysimachia prima, ibid.* *Lysimachia vera, ibid.* *Lysimachia lutea salicaria, ibid.* *purpurea, p. 153. n. 415.* *Lysimachia Communis perpetua major, ibid.* *Lysimachia bifolia flore globofo luteo, p. 151. n. 416.* *Lysimachium aquatile, ibid.* *Lysimachia siliquosa hirsuta magnò flore p. ibid. n. 417.* *Lysimachia purpurea, ibid.* *Lysimachia siliquosa prima, ibid.* *Lysimachia vel salicaria prima, ibid.* *Lysimachia siliquosa hirsuta parvo flore, p. 151 n. 418.* *Lysimachia siliquosa secunda, ibid.* *Lysimachia siliquosa glabra major, ibid.* *Lysimachia siliquosa flore albo, p. 152. n. 419.* *Lysimachia glabra minor, p. 152. n. 420.* *Lysimachia siliquosa glabra minor flore albo, p. 152 n. 421.* *Lysimachia Chamænerion dicta latifolia, p. 152. n. 422.* *Lysimachia Antoniana, ibid.* *Lysimachia spicata purpurea fortè Plinii, p. 152. n. 423.* *Lysimachia purpurea ibid.* *Lysimachia spicata cœrulea, p. 153. n. 424.* *Lysimachia cœrulea hortensis, quorundam veronica recta. ib.*
- Lysimachia cœrulea galericulata p. 155. n. 425.* *Lysimachia galericata, ibid.* *Lysimachia hirsuta purpurea flore galericato, p. 156. n. 426.*
- M.
- Malva sylvestris folio sinuato, p. 156. n. 427.* *Malva sylvestris major, ibid.* *Malva agrestis major, ibid.* *Malvæ. vulgaris al-*

INDEX LATINUS.

- altera species, *ibid.* *Malva sylvestris procerior vulgaris*,
ibid. *Malva vulgaris major*,
ibid. *Malva sylvestris elatior*,
ibid. *Malva sylvestris recta*,
ibid. *Malva sylvestris rotundo folio* p. 157. n. 428. *Malva sylvestris pumila*, *ibid.* *vulgatissima*, *ibid.* *Malva minor*
ibid. *Malva vulgaris minor*,
ibid. *Malva sylvestris minor*
ibid. *sylvestris recens pumila*
ibid. *Malva agrestis minor*.
ibid. *Malva sylvestris supina*,
ibid.
- Malus sylvestris minor* p. 157.
 n. 429. *Mala sylvestria*, *ibid.*
Malus sylvestris major alba,
ibid.
- Malum cur homini os claudat*,
Mala verò aperiant? *vid.* p.
 158. n. 429,
- Manna*, *quomodo ad edendum præparetur*, *vid.* *Gramen Manna*, p. 108. n. 285.
- Maratriphyllum palustre alterum*
 p. 165. n. 446.
- Marrubium album vulgare*, p.
 158. n. 430. *Marrubium vulgare*, *ibid.* *Marrubium album*, *ibid.* *Marrubium candidum*, *ibid.* *Marrubium crassum*, *ibid.* *Marrubium album odorum*, *ibid.* *Marrubium nigrum foetidum*, p. 159.
- n. 431. *Marrubium majus*.
ibidem.
- Marrubium Cardiaca dictum* p.
 159. n. 432. *Marrubium pa- lustre glabrum* p. 160. n. 433.
Marrubium Aquaticum, *ibid.*
Marrubium Aquaticum vulgi,
ibid.
- Matrifylva*, *vid.* *Asperula*.
- Medica frutescens*, *vid.* *Trifo- lium sylvestre luteum*.
- Melampyrum luteum latifolium*
 p. 160. n. 435. *Melampyrum purpurascente comā*, p. 160.
 n. 434. *Melampyrum pri- mum* p. 161. n. 435.
- Melilotus officinarum germaniæ*
 p. 161. n. 436. *Melilotus Germanica flore luteo*, *ib.* *Me- lilotus vulgaris major*, *ibid.*
Melilotus vera, *ibid.*
- Melissa sylvestris*, p. 159. n.
 432.
- Membrum virile priscis tempori- bus Veneri & Baccho sacrum*,
variis afficiebatur honoribus,
 p. 91. n. 235.
- Mentha Cataria vulgaris & ma- jor*, p. 161. n. 437. *Mentha felina*, *ibid.* *Mentha sylvestris folio longiore*, p. 162. n. 438
Mentha sylvestris altera, *ibid.*
- Menthastrum vel mentha sylve- stris altera*, p. 162. n. 438.
Menthastrum sylvestre, *ibid.*

INDEX LATINUS.

- Mercurialis spicata seu fœmina,*
p. 162. n. 439. *Mercurialis
vulgaris & prima, ibid.*
- Mercurialis montosa spicata, p.
163. n. 440. sylvestris. fœ-
mina, ibid. *Mesphilus apii fo-
lio sylvestris spinosa, p. 163.
n. 441.**
- Mýtra vocabulum æquivocum,
p. 243. n. 638.*
- Militaris, 164. n. 442. Milita-
ris seu millefolium flore pur-
pureo, ibid. n. 443.*
- Millefolium vulgare album, p.
164. n. 442. vulgare, ibid.
terrestre vulgare Dioscoridis,
ibidem. flore albō seu mi-
litaris, ibidem. album, ibidem.
Stratiotes millefolia, ibid.
terrestre majus, ibid. millefo-
lia stratiotes ibid. Millefoli-
um & Achillæa, ibid. Mille-
folium, ibid. Achillæa, ibid.
Millefolium purpureum 164.
n. 443. purpurei floris, ibid.
vulgare purpureum minus,
ibid. Terrestre purpureis flo-
ribus, ibid. millefolium mi-
nus, ibid. *Vulgare flore diluti-
tuboris, ibid. Rubrō colore,
Millefolium aquaticum lenti-
culatum, p. 164. n. 444. Aquaticum filamenti folia-
ceis. p. 164. n. 446. Aqva-
ticum flore luteo galericulato**
- ibid. n. 444. Millefolium a-
quaticum flosculis ad foliorum
nodos, p. 165. n. 445. Mil-
lefolium aquaticum foliis fœ-
niculi, ranunculi flore & capi-
tulo, p. 165. n. 446. Mille-
folium aquaticum pennatum
spicatum, ibid. n. 447. fila-
mentis foliaceis, ibid. Mille-
folium aquaticum seu viola
aquaïca caule nudo, ibid. p.
166. n. 448. (555.)*
- Millegrana minima, p. 202. n.
Moly montanum, p. 9. n. 17. 18*
- Mollugo montana angustifolia,
Mollugo vulgatior herbario-
rum, Mollugo prima, mollu-
go montana seu secunda. p.
166. n. 449.*
- MoróΦυλλο bulbosa p. 180. n.
501.*
- Monorchis flosculis pallide viri-
dibus, p. 184. n. 510.*
- Moschatella Cordi, p. 220. n.
594.*
- Morsus Diaboli vid. Succisa,
Morsus Gallinæ vid. p. 134. n.
376.*
- Morsus Gallinæ folio hederulæ,
p. 13. n. 28.*
- Morsus Ranæ, p. 178. n. 496.*
- Mulieres olim faciem fucabant
succo mororum acidorum p.
233. n. 619.*
- Multibona seu Veelgutta, vid.
Apí-*

INDEX LATINUS.

- Apium montanum, & Oreo-selinum, p. 18. n. 45.
- Muscus terrestris vulgaris, p. 166 n. 450. palustris, *ibid.* vul-gatissimus, *ibid.* Hortensis, *ibid.* Pennatus, p. 167. n. 451. Pennatus tectis vetustis insi-dens, p. 167. n. 452. Muscus pennatus major cauliculis ra-mosis in summitate velut spi-catus p. 167. n. 453. Muscus pennatus minor cauliculis ra-mosis in summitate velut spi-catus p. 167. n. 454. Muscus filicinus minor repens, *ibid.* n. 455. Muscus bifolius procum-bens foliis subrotundis p. 167 n. 456. Muscus ramosus erec-tus oblongifolius p. 168. n. 457. Muscus erectus foliis in orbem sparsis, p. 168. n. 458. Muscus uvida amans foliis subrotundis expansis, p. 168. n. 459. Muscus Cupref-siformis ramosus p. 168. n. 460. Muscus membraneus pilosus, *ibid.* n. 461. Muscus erectus ramosus sature viridis p. 169. n. 462. Muscus ter-restris globatus p. 169. n. 463 t rrestris, *ibid.* terrestris sive Lycopodium, *ibid.* Musci ge-nus prospicā celticā, p. 169. n. 463. Muscus clavatus foliis cupressi, p. 170. n. 464 Muscus coralloides muralis,
- p. 170. n. 465. Muscus pyxi-oides terrestris, p. 171. n. 466. Muscus terrestris pyxidatos a-labastriculos imitatus, *ibid.* n. 466. Muscus terrestris co-ralloides erectus incanus, p. 171. n. 468. Muscus pyxioi-des saxatilis, *ibid.* n. 467. Mu-scus terrestris coralloides erec-tus cornibus ruffescentibus, *ibid.* n. 469. Muscus arbo-reus pyxoides pilosus, *ibid.* n. 470. Muscus capillaceus cinerei coloris è ramis ilicis dependens, *ibid.* n. 471. Mu-scus capillaceus longissimus, *ibid.* Muscus arboreus, *ibid.* n. 472. Muscus arborum, *ibid.* Muscus quernus, *ibid.* Muscus pulmonarius sive pul-monaria officinarum, p. 172. n. 473. Muscus pulmonarius corpusculis fuscis papillatus, *ibid.* n. 474. Muscus marinus λιτοπάγων dictus, *ibid.* n. 475. Muscus marinus capil-laceus *ibid.* n. 476. Muscus aquaticus ceratoides, *ibid.* n. 477. Muscus aquaticus denti-culatus, p. 173. n. 478. Mu-scus aquaticus bombycinus re-tiformis, p. 173. n. 479. Mu-scus aquaticus bombycinus tenuissimis filamentis, *ibid.* n. 480. Muscus aquaticus te-nuissimis foliis cauliculis ad-hæren-

INDEX LATINUS.

- hærentibus, *ibid.* n. 481. *Mus-*
cus aquaticus subterraneus, *ibid.* n. 482. *Muscus qui-*
dam incognitus cubitō lon-
gior ex puto egestus, vid. p.
174. n. 482.
Myagrum siliquā longā, p. 174.
n. 483. Alterum *Thlaspi effi-*
gie, ibid. *Myagrum secundum*
ibid. *Myagrum sativum, ibid.*
n. 484. *Myagrum primum,*
ibid. *Myagtron sive Camelina,*
ibid. *Myagrum mono-*
spermon hirsutum siliquis ro-
tundis, ibid. n. 485.
Myosotis hirsuta reptans, vid.
Echium p. 63. n. 151. *Myo-*
sotis scorp. p. 64. n. 153.
Myosuros vel Myosuron, vid.
Holosteum affinis. p. 127. n. 352.
Mugioφυλλον, p. 177. n. 491.
Myriophyllum aquaticum mi-
nus, p. 165. n. 445. *Myrio-*
phyllum, ibid. n. 446. *My-*
riophylli species coliculis flu-
itantibus, ibid. n. 446. *Myriophyllum alterum equiseti-*
folium fluviale, p. 166. n.
448. *Myriophyllum alte-*
rum, ibid.
Myrrhida Plinii, vid. *Geranium*
cicutæ folio moschatum, p.
104. n. 274. & n. seq.
Myrrhis sylvestris seminibus læ-
vibus, p. 175. n. 486. *Myr-*
rhis, ibid. *sylvestris, ibid.* se-
minibus asperis, ibid. n. 487.
nova Æquicolorum, ibid. in-
odora, ibid. n. 488.
Myrtillus p. 288. n. 743. *Myr-*
tillus exiguum, p. 289. n. 749.
N.
Napellus, vid. *Aconitum cœru-*
leum, p. 5. n. 8.
Napeta vulgaris, p. 161. n. 437.
Napeta fruticosa, ibid. *Na-*
peta Germanica. ibid.
Nasturtium aquaticum, p. 175.
n. 489. Et *secundum, ibid.*
supinum, ibid. *Pratense, ibid.*
n. 490. *Pratense magno flo-*
re, ibid. *Aquaticum simplici*
flore, agreste, ibid. *Sylvestre*
tenuissimè divisum, ibid. 491.
Nasturtium μυριόφυλλον, p.
177. n. 491.
Nasturtium palustre, vid. *Eruca*
lutea, p. 68. n. 165. *hyber-*
num, ibid.
Nenuphar luteum, p. 177. n.
493. *Nenuphar album, ibid.*
n. 495.
Neottia, p. 184. n. 511.
Nepeta agrestis, vid. *Calamin-*
tha arvensis verticillata.
Noli me tangere, vid. *Balsamine*
lutea.
Nummularia major lutea, p. 177
n. 492. *Nummularia, ibid.*
Nummularia sive Centmor-
bria, ibid. Nux

INDEX LATINUS

Nux *avellana*, *sylvestris agrestis*,
pontica, *vid.* *Corylus*, p. 55.
n. 140. est admodum fructi-
fera, *ibid.* quatuor earum
differentiar, *ibid.* cur nuces o-
lim in nuptiis sparserint, p. 57.
n. 140. Nuces in epulō farto-
rum amygdalarum locō appo-
sitæ, *vid.* *Historia* p. 58. Nux
miraculum præbuit *ibid.* &
seq.

Nux quadruplex in Prussiā ob-
servatur p. 55. n. 140. Nux
varios ludos antiquis submi-
nistriavit. *ibid.* p. 57. Nuces
spargere quid? *ibid.*

Nux sympatheticè melancholiam
curat, p. 57. n. 140. Nux ridi-
culam aliquando Regiomonti
præbuit historiam. *ib.* p. 58.

Nux post mortem alicujus mira-
culum præbuit, p. 58. n. 140.

Nymphæa lutea major p. 177. n.
493. Lutea *ibid.* Citeina *ibid.*
altera flore ex toto luteo *ibid.*

Nymphæa lutea minor parvo
flore *ibid.* n. 494. **Nymphæa**
parva alia *ibid.* **Nymphæa lu-**
tea minor septentrionalium *ib.*

Nymphæa alba major, *ibid.*
n. 495. alba *ibid.* candida
ibid. **Nymphæa** alba, lotus
Ægyptia Alpini, major alba,
ibid. Alba minima *ibid.* n.
496. Alba minor, *ibid.*

O.

Ocimastrum *verrucarium*, p.
256. n. 668.

Ocimastrum alterum, *vide Scro-*
phularia.

Ocimum vulgatius, p. 179. n.
497. **Medium vulgatius**, *ibid.*
Ocimum medium, *ibid.* ma-
gnum *ibid.* mediocre, *ibid.*
tertium & medium, *ibid.*

Oculus bovis, *vid.* *Bellis major.*
Ocymastrum sive *Ocimoides*, p.
147. n. 408.

Ocymoides rubrum, p. 148. n.
409. **Ocymoides purpureum**
vel roseum, *ibid.*

Odontis, **Odontitis**, p. 41. n.
108.

Odontitis Plinii, p. 41. n. 108.

Oenanthe, *vid.* *Filipendia*, p.
73. n. 181. **Oenanthe** fili-
pendula, item *vulgatis*, *vid.*
ibid.

Oleaster Germanicus, p. 231.
n. 616.

Onagra campestris hirsuta, p.
151. n. 417.

Onitis major, p. 185. n. 512.

Onobrychis floribus viciae dilu-
tè cæruleis, p. 179. n. 498
secunda, *ibid.* *Clusii secunda*,
ibid.

Ononis, *Vid.* **Anonis** spinosa,
p. 16. n. 41. **Ononidis** ra-
dix medetur calculo, Ictero,

Y y

Hy-

INDEX LATINUS.

- Hydropi omnesque viscerum infarctus expedit, p. 17.
 n. 41. Ononis in hortis colinon debet, *ibid.* quænam optima? *ibid.*
 Ophioglosson, p. 179. n. 499. vulgatum, *ibid.* *Ophioglossum* *ibid.*
Ophrys bifolia, 180. n. 500.
Ophrys μονόφυλλη bulbosa, *ibid.* n. 501. *Ophrys δύοφυλλη* bulbosa, *ibid.* n. 502
Ophrys bifolia bulbosa, *ibid.*
Orchis alba *bifolia minor calcare oblongo*, p. 181. n. 503. *Orchis bifolius*, *ibid.* *Orchis flore albo minor*, *ibid.* *Orchis serapias primus*, *ibid.* *Orchis palmata palustris tertia*, *ibid.* n. 504. *Orchis palmata pratensis maculata*, *ibid.* n. 505. *Orchis serapias Lobelii*, *ibid.* *Orchis palmata* flore galericulato dilutè viridi, p. 182. n. 506. *Orchis palmata palmaris inversis flore albo*, *ibid.* n. 507. *Orchis muscam referens major*, p. 183. n. 508. *Orchis myodes altera*, *ibid.* *Orchis muscæ corpus referens musculosa*, *ibid.* n. 509. *Orchis Coleô unicô* seu *Monorchis flosculis pallidè viridibus* p. 184. n. 510. *Orchis abortiva fusca*, *ibid.* n. 511. *Orchis abortiva*, *ibid.* *Orchis sylvestris*, *ibid.* *Orchis abortiva* *Lobelii*. *ibid.*
Oreoselinum, p. 18. n. 45.
Origanum vulgare, p. 184. n. 512. *Origanum sylvestre*, p. 185. n. 512. *Oryganum* 185 n. 512. *Oryganum Italicum*, *ibid.* *Oryganum sylvestre album*, p. 186. n. 513. *Origanum album sylvestre* flore albo, *ibid.* *Origanum minus*, *Vid.* *Clinopodium* p. 49. n. 126. item *Verticillatum*, *ibid.*
Ornithogalum luteum, p. 186. n. 514.
Ornus, *vid. Ostrya*, p. 188. n. 250.
Orobanche major garyophyllum olens, p. 188. n. 515. *Orobanche*, *ibid.* *Orobanche vera*, *ibid.* *Orobanche prima*, *ibid.* *Orobanche secunda*, *ibid.* *Orobanche seu Limodoron*, *ibid.*
Orobanche μονόκλων radice acuminata, p. 187. n. 516. radicè dentatâ major, *ibid.* n. seq. *Orobanche*, *vid.* *Convolvulus minor arvensis*, p. 52. n. 133.
Orobus sylvaticus purpureus vernus, p. 187. n. 518. *pannonicus primus* *ibid.* *viciae foliis* p. 187. n. 519. *pannonicus secundus*, *ibid.*
Orobus sylvestris, *vid.* *Vicia sepium*. *Ostrya*

INDEX LATINUS.

- Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis, p. 188. n. 520.*
- Otites Lychnidis sylvestre genus p. 149. n. 413.*
- Oxygalis, vid. Acetosa, 1.*
- Oxycantha, vid. Mespilus, p. 163. n. 441. acuta spina, ibid. Matthioli, Dioscoridis, & Plinii spina appendix, ibid.*
- Oxycoccus, Oxycoccum, p. 289 n. 751.*
- Oxytriphylon, p. 274. n. 716. P.*
- Palma Christi palustris secunda, p. 181. n. 504. Palma Christi maculata, ibid. n. 505. Palma Christi, ibid. Palma officinarum Christi, ibid. Palma Christi, p. 182. n. 504.*
- Panicastralla, vid. Gramen panicum, p. 120. n. 329.*
- Panis forma seu figura olim varia singebatur, p. 271. n. 705*
- Papaver erraticum majus, p. 188 n. 521. erraticum rubrum, ibid. Papaver Rhæas, ibid. rubrum, ibid. erraticum primum, ibid.*
- Papaver spumeum seu Ocydium alterum, p. 148. n. 411.*
- Paralysis herba, vid. Primula veris, p. 279. n. 725.*
- Parietaria sylvestris secunda, p. 161. n. 435. Parietaria Sylvestris Eystett. ibid.*
- Paris herba, p. 257. n. 671.*
- Paronychia, vid. Bursa Pastoris minor.*
- Pastinaca sylvestris tenuifolia, p. 188. n. 522. Dioscoridis, ibid. Matthioli, ibid. erratica, p. 189. genuina, ibid. altera, ibid. n. 523.*
- Pastinaca sylvestris, p. 189. n. 524. Arabum, p. 190. latifolia, ibid.*
- Pedicularia lutea, vid. Pedicularis pratensis, p. 190. n. 525. Pedicularis pratensis lutea, p. 190. n. 525. secunda, ibid. purpurea, ibid. n. 526. altera ibid. campestris prior, ibid. candida, p. 191. n. 527.*
- Pentaphyllum (lon) vulgare, p. 216. n. 586. primum & secundum, ibid. minus, ibid. majus, p. 217. ibid. minus luteum, ibid. Pentaphyllum majus vulgare, p. 216. 217. n. 586. Epilepsia medetur, ibid.*
- Percunos qualis Prussorum antiquorum Deaster? p. 214.*
- Perfoliata Mascula, p. 180. n. 500. Perfoliata napifolia siliquosa, p. 22. n. 73.*
- Periclymenum, vid. Chamæcrafus.*
- Periscaria urens, p. 191. n. 528. prima, primum genus, morax,*

Yy 2.

INDEX LATINUS.

- dax, *ibid.* mas, *ibid.* mitis,
 maculosa & non maculosa, n.
 529. altera, *ibid.* minor,
 p. 192. n. 530. pumila, pusilla
 repens, *ibid.* Persicaria sili-
 quosa, *vid.* Balsamine lutea.
Pes columbinus, *vid.* Geranium
 columbinum, p. 102. n. 271.
Pes Leonis, *vid.* Alchimilla.
 Petasites major & vulgaris, p.
 192. n. 531. florens & sine
 flore, flore punicante, mas
ibid. minor, p. 193. n. 532.
 albo flore, candido, foemi-
 na & Leucanthemos, *ibid.*
Peucedanum aquaticum, p. 165.
 n. 446.
Phalangium non ramosum, p.
 193. n. 533. parvo flore, cau-
 liculis simplicibus, *ibid.*
Phalatis pratensis minor, *vid.*
Gramen leporinum, p. 112.
 n. 300.
Phellandrium, *vid.* Cicutaria
 palustris tenui folio.
Phragmites, *vid.* Arundo.
Phu, *vid.* Valeriana.
Phyllitis lacustris p. 206. n. 564
Phyllum Thalyspon Theophrasti p. 162. n. 439.
Φύτηξ quid propriè significet?
 p. 9. 10. n. 18.
Phyteuma foliis rapunculi, p. 228
 n. 611. Matthioli, p. 229.
 n. 614.
Picea, *vid.* Abies, p. 1. n. 1,
 Pilosella, p. 193. n. 534. [major
 altera, *ibid.* repens hirsuta, n.
 535. prima, *ibid.* media, p.
 194. n. eod. minus hirsuta,
 vulgò, p. 194. n. 536.
Pilosella minor, *vid.* Gnaphali-
 um montanum, p. 107. n.
 280. Pilosella Dodonæi, *ibid.*
Pimpinella saxifraga major um-
 bellà candida, p. 194. n. 137.
 magna, p. 195. *ibid.* nostras
 communis major, vulgaris
 major, *ibid.* Saxifraga minor
 p. 195. n. 538. nostras com-
 munis minor, *ibid.* hircina,
 parva, tertia species, hircina
 minor, Germanica minor, sa-
 xifraga altera, *ibid.* Sangvi-
 sorba major, *ibid.* n. 539.
 major altera Italica, ejusque
 secundum genus, *ibid.* p. seq.
Pinus sylvestris sive pinaster, p.
 196. n. 540. sylvestris mon-
 tana, sponte proveniens, *ibid.*
Piper montanum, p. 138. n. 388
Pirola, p. 209. n. 577.
Pistochia, *vid.* Fumaria bul-
 bosa, p. 77. n. 193.
Pisum marinum, p. 197. n. 541.
Plantæ siccatae plerumque citius
 nigrescunt parte pronâ, quam
 aversâ. p. 160. n. 432.
Plantago latifolia sinuata, p.
 197. n. 542. major, latifo-
 lia lœvis, rubea, polycopos
 major, *ibid.* Angustifolia ma-
 jor,

INDEX LATINUS.

- jur, p. 198. n. 543. *Plantago* quinquenervia lanceolata, minor, *ibid.* angustifolia minor, *ibid.* n. 544. pentacopos minor, *ibid.* latifolia glabra, minor, *ibid.* n. seq. *Plantago latifolia incana*, p. 198. n. 546. major, incana, media, *Dodonæi secunda*, minor *Dioscoridis ibid.* p. seq. aquatica, latisolia, p. 199. n. 547. aquatica, foliis *Betæ aut Plantaginis*, flore albi *Gallii*, *ibid.* aquatica leptomacrophyllas, *ibid.* n. seq.
- Plantaria*, *Plantanaria*, *vid. Spar-ganium*.
- Platanus ingens*, p. 213. n. 584
- Pneumonanthe*, *vid. Gentiana*, p. 102. n. 268. *Cordi*, *ibid.*
- Podagraria*, p. 16. n. 40.
- Podagræ remedium ex verbasco* p. 280. n. 726.
- Pœna olim adulteri*, p. 227. n. 607.
- Polemonium primum Dodonæi* p. 149. n. 411.
- Polycantha Theophrasti* p. 34. n. 92.
- Polycmenum*, *vid. Clinopodi-um*, p. 40. n. 126.
- Polygala vulgaris*, p. 199. n. 549. minor, *ibid.* *Polygalon*, sive *Polygala recentio-rum rubeis & albis floribus*,
- p. 200. n. 539. flore rubro-purpurascente, & flore cœruleo, *ibid.* *Polygala Tragi*, cœrulea, purpurea, alba, *ibid.*
- Polygonaton & Rosa Mariana quinta*, p. 149 n. 411.
- Polygonatum*, latifolium, vulga-re, vel vulgatius, majus, p. 200. n. 550. baccis nigris, *ibid.* angustifolium non ra-mosum p. 201. n. 551. an-gustifolium primum, *ibid.* polygonatum quintum, alte-rum, tenuifolium, erectum, minus, rubris foliis, ambitu stellato, tenuifolium majus *ibid.* *Polygonon I.* *Polygo-num latifolium* p. 201. n. 552, mas, vulgare, masculum, ma-jus, *ibid.* oblongo, angustô folio p. 202. n. 553. tertium *ibid.* minus, *ibid.* n. seq. mi-nimum, p. 202. n. 555. mi-nus polycarpum p. 202. n. 556 fœmina, angustissimo & acu-tô vel gramineo folio, *ibid.* foliis gramineis n. 557. *ibid.* fol. gramin. alterum, p. 204. n. 556. *Polygonum sive Polyganus fœmina*, *vid. Equi-setum palustre*, p. 65. n. 158 & seq. sangvinalis fœmina, *ibid.* semine vidua, *ibid.*
- Polypodium*, p. 204. n. 559. vulgare, majus, *ibid.*

Yy 3

Poly-

INDEX LATINUS.

- Polyspermon**, *vid.* Blitum Poly-
spermon.
- Polytrichon**, *vid.* Adianthum.
- Populago**, *vid.* Caltha palustris.
- Populus nigra**, p. 204. n. 560.
alba, *ibid.* p. seq. tremula,
p. 205. n. 561. lybica, nigræ
similis in alpibus, populi ter-
tia species, *ibid.*
- Potamogeton rotundifolium**, p.
205. n. 562. rotundiore fo-
lio, λειόφυλλον *ibid.* rotun-
difolium alterum, *ibid.* n. 563
- Salicis folio. *ibid.* n. 564. Po-
tamogeton, angustifol. fonta-
lis & spicata, ἵτιόφυλλον, p.
206. *ibid.* foliis latis splendē-
tibus, *ibid.* n. 565. altera, μα-
λακόφυλλον, *ibid.* Potamo-
geton foliis crispis, p. 206. n.
566. γλάροφυλλον. seu crispum
aut fimbriatum, *ibid.* gra-
mineum latifolium, *ibid.* n.
567. gramineum tenuifoli-
um, *ibid.* n. 568.
- Potentilla** p. 206. n. 569.
repens hirsutie incanâ, p. 207.
n. 570. erecta major, *ibid.*
n. seq.
- Potentilla plantula in jus eunti-
bus à Sagis commendatissima
p. 207. n. 569.
- Potollo**, quale antiquorum Prus-
orum Deastrum? p. 213.
n. 584.
- Potrympo qualis** Prussorum De-
aster? p. 214.
- Prædium**, ejus etymologia, p.
269. n. 700.
- Primula veris**, *vid.* Bellis sylve-
stris minor. Primula veris
hortensis, p. 279. n. 725.
- Promachium Festum** apud Lace-
dæmonios, p. 19. n. 48.
- Propolis apum natales**, p. 25. n.
66. lac imminuit, *ibid.* ar-
thritidis dolores discutit, *ibid.*
- Prunella**, *vid.* Consolida, p. 50.
n. 128.
- Prunella** p. 208. n. 573. flore
purpureo, vulgaris vel sexta,
ibid. Officinarum, *ibid.* flo-
re albō, p. 209. n. 574.
- Prunus sylvestris**, p. 207. n. 572
vulgaris, *ibid.*
- Pseudocrania**, *vid.* Cornus p.
55. n. 139.
- Pseudohepatiorium**, *Vid.* Conyza
p. 53. n. 137.
- Pseudolysimachium purpureum**,
p. 152. n. 419.
- Pseudolysimachium cæruleum**,
p. 155. n. 424.
- Pseudomelanthium**, p. 148. n.
410. Pseudomelanthium flo-
re rubescente, *ibid.*
- Pseudomelus**, *vid.* Caryophyl-
lus montanus minor.
- Pseudomyagrum**, p. 174. n. 484.
- Pseudoorchis** p. 180. n. 500.
Pseu-

INDEX LATINUS.

- Pseodostruthium, p. 147. n. 407.
 Ptarmica sive Ptarmice, *vid.*
 Dracunculus Pratensis, p. 63.
 n. 156. Ptarmica Fuchsii,
 sylvestris, item vulgaris, *ibid.*
 Pteridion masculum, *vid.* Filix
 ramosa, p. 74. n. 184.
 Pulegium montanum, *vid.* Cli-
 nopodium, p. 49. n. 126.
 Pulicaria mascula, p. 91. n. 528.
 foemina, n. 528.
 Pulmonaria p. 172. n. 473. Pul-
 monaria tertia, *ibid.* Pulmo-
 naria secunda, *ibid.* Pulmo-
 naria vulgaris *ibid.* Pulmona-
 ria Lichenis quoddam genus,
 ibid. Pulmonaria latifolia,
 vid. Symphytum maculosum.
 Pulsatila vulgaris. p. 209. n.
 575. recenticrum, commu-
 nis, flore crassiore & majore
 dilutiore, *ibid.* folio Anemo-
 nes secund. n. seq.
 Pulvis argentum constanter de-
 aurans, p. 45. n. 118
 Pycnocomus, p. 16. n. 40.
 Pyra sylvestria, p. 211. n. 583.
 majora *ibid.*
 Pyrola, rotundifolia major, p.
 209. n. 577. à pyri folio, p.
 210. *ibid.* major, vulgatior,
 in campestribus alia, *ibid.* ro-
 tundifolia minor, *ibid.* n. 578
 quarta minima, *ibid.* acutifolia
 geniculata radice, *ibid.*
 p. 210. n. 579. folio mucro-
 nato serrato, *ibid.* n. 580. mi-
 nor, secunda tenerior, *ibid.*
 Pyrola frutescens arbuti folio
 p. 211. n. 571. alsines flore
 Europaea, *ibid.* n. seq.
 Pyrus sylvestris, p. 211. n. 583.
 Q.
 Quercus, p. 211. n. 584. cum
 longo pediculo, vulgaris, pan-
 nonica latifolia, *ibid.* marina
 p. 216. n. 585. maritima ve-
 siculos habens, *ibid.* Quercus
 ingens olim in Prussia Idolo-
 latrica, p. 213. n. 584. Quer-
 cus ultra ter centum annos
 durat, *ibid.* p. 213. Quercus
 fascino impotentiam creat,
 p. 214. Quercus asylum an-
 tiquis, p. 214. à quercu lo-
 qui quid? p. 214. Emplas-
 trum ex queru Lœselii, p.
 212. n. 584.
 Quinquefolium majus repens, p.
 216. n. 586. vulgare quartum.
 majus luteum, *ibid.* majus
 repens luteum, p. 217. n. 587.
 minimum genus vel primum,
 ibid. minus luteum, *ibid.* mi-
 nus repens lanuginosum lute-
 um, minus, *ibid.* n. 588. quin-
 quefolii quarti flavo flore pri-
 ma species & secunda, *ibid.*
 Quinquefolium erectum lute-
 um, p. 118. n. 589. hirsutum
 lu-

INDEX LATINUS.

*luteum, ibid. n. 590. palu-
stre rubrum, ibid. n. 591.*

R.

Radicula magna, p. 226. n. 607
Radicula sylvestris, p. 227. n.
608. *radix sylvestris*. p. 228.
n. 610.

Radix dulcis, *communis*, *vid.*
Glyzyrrhiza, p. 106. n. 279.
Radix cava, item **Radix cava**
major, *vide* *Furnaria bulbosa*
p. 77. n. 193. *radix cava her-*
bariorum, *ibid.* & p. seq.

Ranunculus nemorosus luteus,
Ranunculus phragmites, p.
219. n. 592. *sylvestris alte-*
rum genus, *ibid.* *ranunculi*
species tertia, *quarta*, *ibid.* *ra-*
nunculus nonus, *nemorosus*,
ibid. *nemorosus albus*, *ibid.*
n. 593 *candidus*, *quarta spe-*
cies, *laetea*, *sylvarum*, *ibid.* *ra-*
nunculus octavus phragmites,
flore albo, *ranunculi tertii ter-*
tium & quartum genus, *ibid.*
Ranunculus nemorosus Mu-
scatellina dictus, p. 220. n.
594. *minimus*, *Septentrio-*
nalium, *ibid.* *nemorosus hir-*
sutus foliis caryophyllatæ,
ibid. n. 595. *pratensis*, *ere-*
ctus, *acris*, *ibid.* n. 596. *pratensis*
surrectis caulinis, *syl-*
vestris & *secundus*, *hortensis*
secundus, *polyanthemus ma-*

culatus, p. 221. n. 596. *prat-*
tensis repens hirsutus, p. 221.
n. 597. **Ranunculus pratensis**
radice verticillæ modo rotun-
dâ, **Ranunculus bulbosus**, p.
221. n. 598. *radice bulbosâ*,
ibid. *tuberosus*, *exiguus* &
primus; *ranunculi tertia spe-*
cies, *ibid.* *minor*, *nona speci-*
es, *ranunculus quintus latiugi-*
nosus primus, *ibid.* *Arvensis*
echinatus, p. 222. n. 599. *ar-*
vorum, *arvensis angustifolius*
sive decimus quartus, *sylve-*
stris tertius, *sativus*, *hortensis*
simplicis prima species, *sati-*
vus, *quinta species*, *ibid.* *Ra-*
nunculus palustris Apii folio
lævis, p. 222. n. 600. *rotun-*
diore foliò, *foliò Apii tertius*,
primus. *ibid.* *primum ejus ge-*
nus, *tertius*, p. 223. *ibid.* *Pa-*
lustris apii folio lanuginosus,
ibid. n. 601. *Ranunculi se-*
cunda species, *vel secundus*,
p. 223. n. 601. *Aqvaticus fo-*
lio rotundò, &c. *ibid.* n. 602
aquaticus Hepaticæ facie, *flu-*
viatalis, *ibid.*

Ranunculus longifolius palustris
major, p. 223. n. 603. *lance-*
atus major, *πλατύφυλλο*,
ibid. *Palustris ferratus* p. 224
n. 604. *aquatalis angustifol.*
ferratus lanceatus sive decimus
nonus

INDEX LATINUS.

- nonus, *ibid.* montanus Aconiti foliò, flore globosò, p. 225. n. 605. alpinus, luteus sive undecimus, sextus, montanus, alpinus, glomeratus, globosus sive montanus, *ibid.* Aconitifolius, folio rotundo ad radicem præstolante, *ibid.* n. 606.
- Raphanis magna, p. 226. n. 607
- Raphanus sylvestris, p. 225. n. 607. major, vulgaris seu rusticanus, crassâ radice, agrestis, *ibid.* p. 226. aquaticus p. 227. n. 608. sylvestris officinarum aquaticus, *ibid.* aquaticus alter, *ibid.* n. 609. Raphanus poëna olim adulterorum, p. 226. n. 607. quomodo Raphanus vulgaris orbes stanneos vel ligneos attollat, p. 227. n. 607.
- Rapistrum aquaticum, p. 227. n. 609. flore luteò p. 228. n. 610. arvorum. *ibid.*
- Rapum divi Antonii, p. 221. n. 598.
- Rapum genistæ, p. 186. n. 515.
- Rapi sylvestris genus, *vid.* Campanula pratensis flore conglomerato, p. 33. n. 86.
- Rapunculus spicatus, p. 228. n. 611. quintus, sive nemorosus primus, sylvestris, spic. albens, flore albô spicatô, *ibid.* rapun-
- culus alopecuroides, *ibid.* Ranunculus scabiosæ capitulo cæruleo, p. 229. n. 612. scabiosæ capitulo candido, *ibid.* n. 613. Persicifolius, magnô flore, *ibid.* n. 614. campanulatus Nerii folius primus, *ibid.* Rapunculum sylvestre, p. 228. n. 611. alopecuroides. *ibid.*
- Rapuntium majus Alopecuri, p. 228. n. 611. montanum capitatum leptophyllum, p. 229. n. 612.
- Regina Prati, *vid.* Barba capræ.
- Resta bovis, p. 16. n. 41.
- Rhamnus catharticus p. 230. n. 615. alia species, Rhamnus solutivus, *ibid.* salicis folio angusto, fructu flavescente; Rhamnus secundus, *ibid.* n. 616. primus Dioscoridis creditus p. 231. n. 616. Rhamnus quorundam, *ibid.*
- Ribes officinarum. item. Arabinum, rubra, Fuchs. vulgaris, hortensis, vulgò, p. 121. n. 333. vulgaris nigrò fructu, it, sylvestris, nigra, baccis nigris, *ibid.* n. 334. sylvestris, p. 122 n. 335.
- Ribesium fructu nigrò, *vid.* Grossularia, p. 121. n. 334.
- Rickojothi quale antiquorum Prussorum Deastrum? p. 213.
- Z 2. Ro-

INDEX LATINUS.

- Robertiana & herba Roberti,
vid. Geranium Robert, p.
 105. n. 276.
 Robigo, p. 292. n. 759.
 Rorella, p. 231. n. 617. minor
 prima, *ibid.*
 Ros Solis, p. 231. n. 617. foliō
 rotundō, *ibid.* major, *ibid.*
 Rosa sylvestris vulgaris flore o-
 dorato, p. 231. n. 618. odo-
 rata incarnato flore, ejus pri-
 mum genus, *ibid.* p. 232. ca-
 nina, odorata, sylv. altior. *ib.*
 Rosmarinum sylvestre, *vid.* Ci-
 stus Ledon, p. 49. n. 125.
 Rostrum ciconiæ, *vid.* Gerani-
 um cicutæ foliō p. 104.
 n. 274. inodorum, item vul-
 gare, *ibid.* n. seq.
 Rubeola, *vid.* Asperula.
 Rubertiana vulgo, *vid.* Gera-
 nium Robertianum, p. 105.
 n. 276.
 Rubigo, p. 292. n. 759.
 Rubus vulgaris sive fructu ni-
 grō, p. 232. n. 619. primus
 arvensis, grandis & secundus,
 vulgaris. *ibid.* Batis *ibid.* re-
 pens p. 233. n. 620. minor,
 humilis Belgicus, humilis &
 primus, *ibid.* rubi alterum
 genus, reptans, *ibid.* idæus,
 spinosus, idæus Diosc. *ibid.*
 n. 621, idæus vulgaris, exili-
 bus spinis, *ibid.*
 Rubus tertius montibus proprius
 p. 234 n. 621. saxatilis alpi-
 nus, *ibid.* 622. parvus saxa-
 tilis, alpinus, alpinus humilis,
 ibid.
 Rumex palustris *vid.* Lapathum
 p. 135. n. 377. Rumicis quin-
 tum genus, *ibid.* agrestis, *ib.*
 n. 379. tertium genus, p. 136.
 n. 381.
 Russi quomodo pulvere clavo-
 rum musci terrestris ignes fu-
 os celebrent Chaldaicos, ac
 flamas Iudicas excitent, p.
 p. 170. n. 463.
 Ruta pratensis, herbariorum, p.
 267. n. 659.
 S.
 Saginæ spergula, p. 13. n. 29.
 Sagitta aquatica foliis variis p.
 234. n. 623. aquatica, mi-
 nor latifolia, sagittalis, sagit-
 taria minor, *ibid.* Sagitta a-
 quatica minor angustifolia,
 p. 235. n. 625.
 Salix prima vel procera, p. 235.
 n. 626. Salix perticalis, quar-
 tum genus, Dioscoridis, *ibid.*
 vulgaris alba arborescens, *ibid.*
 caprea rotundifolia, p. 236.
 n. 627. latō folio, latifolia,
 rotunda platiphyllos, alia *ibid.*
 vulgaris rubens, *ibid.* n. 628.
 primum item tertium genus,
 ibid. Salix Sabina seu Ame-
 rina,

INDEX LATINUS.

- tina**, minor, viminalis &
 Gallica, p. 237. n. 628.
Salix caprea latifolia, p. 237. n.
 629, folio ex rotunditate a-
 cuminatō, *ibid.* sylvestris lati-
 folia, *ibid.* n. 630. sylvestris
angustifolia p. 238. n. 631.
 alterum genus sativa lutea ter-
 tia, vitellina, *ibid.* fragilis lati-
 folia, salicis tertium genus &
 salix alba, candida, candidō
 cortice *ibid.* n. 632. fragilis
 tenuifolia, *ibid.* n. 633.
Salix rubra obtusō latiore folio,
 p. 239. n. 634. oblongō sal-
 viæ folio, *ibid.* n. 635. humi-
 lis angustiore oblongo folio,
ibid. n. 636. pumila angusti-
 folia prima, *ibid.* n. 637. al-
 tera pumila angustifolia, *ibid.*
 pumila brevi angustōque fo-
 liō incanō. *ibid.*
Salix Amerina olim erat corona-
 mentum, p. 239. n. 637.
Salsifora, p. 231. n. 617.
Sambucus, p. 240. n. 638. Ejus
 primum genus, fructu in um-
 bellā nigrō, vulgaris, campe-
 stris, *ibid.*
Sambucus olim erat domicilium
 Putschæti tutelaris numinis,
 cui rustici quondam litare soli-
 ti sunt ad propitium ipsis red-
 dendum Marcopolum Deum
 Magnatum, p. 241.
- Sambucus glires & mures fugat.
 p. 243. n. 638.
 Sambucus humilis sive Ebulus,
 p. 243. n. 639.
 Sambucus aquatica flore simplici
 p. 243. n. 640. Sambucus
 palustris, *ibid.* p. 244. Syru-
 pus ejus ex succo affectibus
 faucium salutaris, *ibid.* p. 244.
 Baccæ emeticæ sunt, *ibid.*
Sanctum derivatur à sagminibus,
 p. 282. n. 729.
Sangven *vid.* Cornus, p. 55. 2.
 n. 139.
Sangvinaria *vid.* Gramen dacty-
 lon, p. 110. n. 289.
Sangvinaria, p. 201. n. 552.
Sanicula, Officinarum, p. 244.
 n. 641.
Sapinus quid? p. 1. n. 1.
Saponaria major lævis, p. 244.
 n. 642. in luc Gallicâ utilis,
 ibid.
Sardous ranunculus, p. 223. n.
 601.
Satureja hortensis, sativa, p. 245.
 n. 643.
Satyrium octavum, *vid.* Helle-
 borine, p. 123. n. 339.
Satyrion decimum, p. 180. n.
 500. **Satyrium fœmina** foliis
 maculatis, p. 181. n. 505. Sa-
 tyrium fœmina, *ibid.* **Satyrion**
 Basilicon Græcorum, *ibid.* Sa-
 tyrium Basilicon fœmina, *ibid.*
Saty-
Z z 2

INDEX LATINUS.

- Satyrion aborriuum species*
Hypocysti, p. 184. n. 511.
Satyrium novum, *ibid.*
- Savina sylvestris*, p. 170. n. 464.
Savina sylvestris Tragi, *ibid.*
Savina Tragi sylvestris seu silaginis Plinianæ prima species
 p. 170. n. 464.
- Saxifraga rotundifolia alba*, p. 245. n. 644. *Chelidonides dicta*. *ibid.*
- Saxifraga lutea*, p. 161. n. 436.
Saxifraga Anglicæ, p. 203. n. 556. *Saxifraga rotundifolia aurea*, p. 246. n. 644.
- Saxifragia*, *vid.* *Saxifraga*.
- Saxum ingens in frusta artificia-
liter redigere*, p. 215.
- Scabiosa major squamatis capi-
tulis flore purpureo* p. 240. n. 646. *flosculis candidissi-
mis*, *ibid.* n. 647.
- Scabiosa pratensis hirsuta offici-
narum seu vulgaris*, p. 247. n. 648.
- Scabiosa multifido folio, flore
flavescente*, p. 247. n. 649.
- Scabiosa sylvestris minor coerulea* p. 229. n. 612. *media, ferrato angustifolio flore glo-
bulariae*, *ibid.*
- Scirpi primum genus*, *vid.* *Gramen arundinaceum*, p. 118. n. 321. *Scirpi alterum ge-
nus*, p. 119. n. 322.
- Scordium*, p. 247. n. 650. ma-
gnis & multis virtutibus pol-
let, *ibid.*
- Scorpioides tertium*, p. 63. n. 151. *minus, aquaticum, vid.*
- Echium*, p. 63. n. 151. *majus Dodonæi*, p. 64. n. 153.
- Scorzonera foliis nervosis, Ger-
manica*, p. 248. n. 651.
- Scrophularia aquatica major cau-
le fimbriato*, p. 248. n. 652.
- Tineis & phagedænæ mede-
tur*, *ibid.* p. 249. *Amule-
tum præstat, ibid.* p. 250,
- Scrophularia nodosa foetida*, p. 250. n. 653. *multis morbis
medetur, ibid.*
- Securidaca*, p. 250. n. 654.
- Sedum aquatile, vid.* *Aloe pa-
lustris. Sedum majus vulgare,*
 p. 251. n. 655. *Sedum mi-
nus, vid. sempervivum minus.*
- Selago tertia*, p. 169. n. 462. *Se-
laginis species altera, ibid.* n.
 463.
- Sempervivum majus*, p. 251. n.
 655 *Sempervivum minus ver-
miculatum acre*, p. 251. n.
 656. *Sempervivum caulinicu-
lis repentibus*, p. 252. n. 657.
- Senecio minor vulgaris*. p. 252.
 n. 658. *inflammationi mam-
marum, nec non iectui apis
medetur. ibid.*
- Seriphium Germanicum*, p. 177
 n. 491.

INDEX LATINUS.

- n. 491. *Seriphium absynthi-um*, *ibid.* *Seriphium ibid.*
Seris Picris, *vid.* *Cichoreum sylvestre.*
- Serpillum vulgare majus*, p. 253.
 n. 659. *Serpillum minus*, *ibid.*
 n. 660. *Serpillum minimum repens*, *flore candido*, *ibid.*
 n. 661.
- Serratula*, p. 253. n. 662.
Serretta sive *Ceretta*, *vid.* *Serratula.*
- Sesamoides magnum Salmanticum*, p. 149 n. 413.
- Sesanum*. p. 174 n. 484.
Sefeli Æthiopicum, p. 253. n. 663
- Sideritis vulgaris hirsuta erecta*,
 p. 254. n. 664. *Sideritis arvensis latifolia glabra*, p. 255.
 n. 665. *Sideritis arvensis angustifolia rubra*, p. 255 n. 666
- Sideritis prima Heraclia*, p. 160.
 n. 433. *Sideritis secunda Matthioli*, *ibid.*
- Sideritis secunda Dioscoridis*, p.
 196. n. 539. *Sideritis cærulea*, p. 156. n. 425.
- Sigillum S. Ma.iæ*. *vid.* *Helleborine*, p. 124. n. 339. *Sigillum S. Mar. tertium*, *ibid.* n.
 341.
- Sigillum Salomonis*, *latifolium*,
 p. 200. n. 550. *angustifolium* p. 201. n. 551.
- Siler Plinii*, *vid.* *Erythronium*, p.
 70. n. 173.
- Sinapis agrestis*, p. 228. n. 618.
Sion, *Sium*, sive *Apium palustre*
 foliis oblongis, p. 254. n. 667
- Sion Cratevæ Erucæfolium*. p.
 176. n. 489.
- Siser sylvestre*, *vid.* *Pastinaca sylvestris*, p. 189. n. 524.
- Sisymbrium aquaticum*, p. 176.
 n. 489. *Sisymbrium aquaticum primum*, *ibid.* *Sisymbrium Cardamine*, *ibid.* *Sisymbrium alterum*, *ibid.* *Sisymbrium alterum Dioscoridis*,
ibid. *Sisymbrium aquaticum secundum*, *ibid.* n. 490. *Sisymbrium Cardamine secundum* *ibid.* *Sisymbrium sylvestre*, p. 227. n. 608.
- Sisyrinchion* p. 186. n. 514.
- Smilax laevis*, *vid.* *Convolvulus*,
 p. 51. n. 131. & seq.
- Snips quid?* p. 260. n. 754.
- Solanifolia Circæa dicta major*,
 p. 256. n. 668.
- Solanum officinarum &c.* p. 256
 n. 669. *Solanum scandens*
 seu dulcamara, p. 256. n. 670
- Solanum quadrifolium bacciferum*, p. 257. n. 671.
- Solidago Saracenica latifolia & angustifolia ferrata*, p. 286.
 n. 742. 743.
- Sonchus asper*, p. 258. n. 674.
- Sonchus asper laciniatus latifolius*, p. 257. n. 672. *Sonchus*

INDEX LATINUS.

- chus angustifolius*, p. 258. n.
 673. *lævis lanceatus angustifolius*, *ibid.* n. 674.
- Sonchus** *lævis minor paucioribus laciniis*, p. 259. n. 676. *Sonchus laciniatus latifolius*, *ibid.* n. 677. *Sonchus laciniatus muralis parvis floribus*, *ibid.* n. 678.
- Soncho affinis**, *Lamplana sylvatica*, p. 259. n. 679.
- Sophia Chirurgorum**, p. 177. n. 491. *Sophia*, *ibid.* *Sophia latifolia*, *ibid.*
- Sorbus sylvestris domesticæ similis**, p. 260. n. 680. *contra calculum & Ischuriam facit*, *ibid.*
- Sorbus aculeata**, *vid. Mespilus*, p. 163. n. 441.
- Stœchas citrina**, *vid. Elichrysum*. p. 64. n. 155.
- Sparganium ramosum**, p. 260. n. 681.
- Spergula**, p. 13. n. 29.
- Spergula bifolia lini capitulis**, p. 261. n. 682. *Spergula perpusilla lanceatis foliolis*, p. 261. n. 683.
- Spica Celтика** p. 169. n. 463.
- Spina alba tomentosa latifolia sylvestris**, p. 261. n. 684.
- Spina cervina**, *alba, infectoria, pumila prima*, p. 230. n. 615. *cervalis*, *ibid.*
- Spondylium vulgare hirsutum**, p. 262. n. 685. *ridiculam præbet historiam*, *ibid.*
- Sponsa Solis**, p. 231. n. 617.
- Sportulæ quid?** p. 207. n. 569.
- Sputatores adversus & tussientes singularis antipathia mulieris cujusdam**, p. 282. n. 730.
- Sqmamatia**, *vid. Orobanche*, p. 187. n. 517.
- Staphylinus sylvestris**, *vid. Panzinaca sylv.* p. 188. n. 522.
- Stuppars**, *vid. Conyza*, p. 54. n. 137.
- Stelis quid?** p. 1. n. 1.
- Stellaria**, *vid. Alchimilla*, p. 7. n. 13.
- D. Stephani herba**, p. 256. n. 668.
- Straminea aut scirpea antiquorum simulachra in spectaculis adhibita, quid sint**, p. 118. 119. n. 321.
- Stratiotes**, *vid. Aloe palustris*.
- Stratiotes millefolia**, 164. n. 442

Stratiotes fluviatilis, p. 166. n. 448.
- Succisa hirsuta cœrulea**, f. *Morsus Diaboli* p. 262. 263. n. 686. *Herba polychresta est*, *ibid.*
- Succisa hirsuta candida**, *hirsuta cœrulea* p. 263. n. 687. *foliis incisis laciniatis*, p. 263. n. 688.

Su-

INDEX LATINUS.

- Superba, *Vid.* *Caryophyllus plu-*
 marius albus.
- Symphytum, *Consolida major,*
 p. 264. n. 689. *unguentum*
 hopliatricum Anshelmi, ibid.
 Symphytum *maculosum, seu*
 Pulmonaria latifolia, p. 265.
 n. 690. Symphytum *Petræ-*
 um, p. 208. n. 573.
 Symphytum *medium, vid. Con-*
 solida media, p. 50. n. 128.
 T.
- Tanacetum *vulgare luteum, p.*
 256. n. 691. Helminthago-
 gum est hydroticum & diure-
 ticum, ib p. 268. Tanacetum
 foliis crispis, p. 266. n. 692.
 Tanacetum *album seu acutum,*
 vid. Dracunculus pratensis, p.
 63. n. 150.
- Taraxacon *minus, vid. Dens le-*
 onis, p. 61. n. 165.
- Taxus, p. 266. n. 693. *scobs ta-*
 xici canibus ravidis medetur, ib.
- Telephium *vulgare, p. 266 n.*
 694. superstitione usurpatur
 à vulgo. p. 267. n. 694.
- Testiculus *vulpinus primus, cu-*
 jus flores culices exprimunt,
 p. 181. n. 503. Testiculus
 latifolius, ibid. Testiculus bi-
 folius, ibid. Testiculus mu-
 scarius quartus p. 183. n. 508
- Teucrium, *vid. Chamædris spu-*
 ria major.
- Teucrium, *Vid. Veronica.*
- Thalictrum *majus siliquâ angu-*
 losâ aut striatâ, p. 267. n. 695.
 Thalictrum *pratense angustifo-*
 lium, ibid. n. 696. Thali-
 ctrum angustissimô folio, p.
 268. n. 697.
- Thalictrum p. 177. n. 491. Do-
 donæi, *ibid. Sophiæ, ibid.*
- Thapsus *barbatus, vid. Verba-*
 scum mas, p. 279. n. 726.
- Theligono *affinis herba, p. 246.*
 n. 644.
- Thilypteris *filix fœmina, p. 74.*
 n. 183.
- Thlaspi *arvense siliquis latis, p.*
 268. n. 698. Thlaspi fruti-
 cosum incanum, ibid. n. 699.
- Thlaspi *alterum p. 225. n. 607.*
 majus vel magnum, p. 226.
 n. 607.
- Thymbra *vera & sativa, vid. Sa-*
 tureja hortensis.
- Thymelæa, p. 138. n. 388.
- Tilia *fœmina folio majore, p.*
 268. n. 700. arbor Borussiæ
 olim idololatrica fuit, p. 269
 n. 700.
- Tiliae *lignum teredinis expers.*
 p. 268. n. 700. Tiliae lignum
 materia simulachrorum fuit,
 ibid. Tiliae cortex materiam
 funibus rebusque aliis paran-
 dis præbet. ibid Ti iæ scobs
 aurum subito colliquari facit,
 p. 269. n. 700.
Ti-

INDEX LATINUS.

- Tithymalus helioscopius*, p. 269
 n. 700.
Tithymalus sylvestris vid. Bal-
samine lutea.
Tomentum seu centunculus, vid.
Gnaphalium, p. 107. n. 181.
Torrentilla sylvestris, p. 270.
 n. 702.
Trachelium vulgare, foliis urti-
cæ, vid. Campanula vulgarior.
Trachelium minus, p. 33. n. 86.
Tragopogon luteum abortivum
 p. 270. n. 703. *Tragopo-*
gon pratense luteum majus
 p. 270. n. 704.
Tragofelinum majus. p. 194.
 n. 537.
Tragofelinum petraeum, p. 195.
 n. 538.
Tragum, Tragon, vel Tragus,
Vid. Kali, p. 133, n. 371.
Tribulus aquaticus p. 271. n.
 705. *Tribulus olim Thraci-*
bis panem subministrabat, ib.
Trifolium palustre, fibrinum, Ca-
storis. &c., p. 271. n. 706.
Trifolium pratense purpure-
um, p. 272. n. 707. *Trifoli-*
um album, p. 272. n. 708.
Trifolium luteum capitulo
breviore, ibid. n. 709. *Tri-*
folium pratense luteum capi-
tulo lupuli, vel Agrarium, p.
 273. n. 710. *Trifolium mon-*
tanum album, ibid. n. 711.
Trifolium purpureum majus,
ibid. n. 712. *Trifolium spicâ*
longissimâ rubente, p. 273.
 n. 713. *lac auget p. 274.* n.
 n. 713. *Trifolium arvense*
humile spicatum, sive lago-
pus, p. 274. n. 714. *Trifoli-*
um syvestre luteum siliquâ
cornutâ, p. 274. n. 715. *Tri-*
folium acetosum vulgare, ib.
 n. 716. *hepaticum flore sim-*
plici, p. 275. n. 717.
Trifolium frugiferum, Vid. Fra-
garia vulgaris, p. 75. n. 188.
Trifolium hepaticum flore sim-
plici, p. 275. n. 717.
Trifolium odoratum f. Melilo-
tus, p. 161. n. 436. *Trifoli-*
um odoratum primum Do-
donæi, ibid.
Triglochin, Vid. Gramen junce-
um, p. 114. n. 308.
Trinitas, Trinitatis herba, p.
 275. n. 717.
Trinitatis flos, p. 285. n. 741.
Trips, qualis vermiculus, p. 291.
 n. 754.
Triticum vaccinum, p. 160. n.
 434.
Trollius flos, p. 225. n. 605.
Tunica minima, Vid. Caryo-
phyllus minimus muralis.
Turca, p. 202. n. 554.
Tussientes adversus & sputato-
res singularis antipathia, p.
 282. n. 730. *Tussi-*

INDEX LATINUS.

- Tussilago vulgaris p. 275. n. 718. lanugo ejus certo modo præparata fomitem igniarium tenerimum subministrat p. 276. *ibid.* Tussilaginatum optimum loco Tabaci præparare, *ibid.*
- Tussilago altera, p. 31. n. 83.
- Tussilago major, p. 192. n. 531.
- Typha palustris major, p. 277. n. 719.
- V.
- Vaccinia nigra, p. 288. n. 748.
- Vaccinia rubra, *ibid.* n. 749.
- Vaccinia palustris, *ibid.* n. 751.
- Valeriana sylvestris major, item vulgaris, p. 277. n. 720. Semen catharticum est *ibid.* p. 278. Radix loco amuleti oculos confortat, *ibid.*
- Valeriana Græca, coerulea, peregrina, p. 278. n. 721. palustris minor, *ibid.* n. 722. campestris inodora major, *ibid.* n. 723.
- Valeriana palustris foliis subrotundis parùm incisis, p. 279. n. 724.
- Venti herba, p. 209. n. 575.
- Verbasculum pratense odoratum p. 279. n. 725. Verbascum mas latifolium luteum, *ibid.* n. 726. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente,
- ibid.* n. 727. nigrum flore candido, *ibid.* n. 728.
- Verbasci lanugo certo modo præparata fomitem igniarium tenerimum præbet. p. 276. n. 718.
- Verbena communis cæruleo flore p. 251. n. 729. Verbena recta, *ibid.* Verbenaca *ibid.* Verbena supina, *ibid.*
- Verbena supina, p. 34. n. 89.
- Verbena supina, item recta, *vid.* Conyzza palustris, p. 53. n. 137.
- Verbena foemina, *Vid.* Senecio minor vulgaris.
- Veronica mas supina & vulgarissima, p. 182. n. 730. Veronica spicata angustifolia, recta p. 283. n. 731.
- Veronica pratensis serpillifolia, *ibid.* n. 732.
- Vetonica, *Vid.* Betonica.
- Vicia sepium folio rotundiore acuto, p. 283. n. 733. Vicia multiflora hirsuta, coerulea, p. 284. n. 734. purpurea, p. 284. n. 735. candida glabra, *ibid.* n. 736.
- Vicia semine rotundo nigro, p. 284. n. 737. Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis, p. 284. n. 738.
- Victorialis rotunda, *vid.* Gladiolus, p. 105. n. 277. Victoria-

Aaa

INDEX LATINUS.

- rialis herba, *ibid.* fœmina,
ibid.
- Vincetoxicum, *Vid.* Asclepias.
- Vicia martia, purpurea flore
 simplici odoro, p. 285. n.
 739. Viola inodora sylve-
 stris, *ibid.* n. 740. Viola tri-
 color hortensis repens, *ibid.*
 n. 741. Viola flammea, *ibid.*
- Viola aquatilis, p. 166. n. 448.
- Virga aurea, Solidago Saraceni-
 ca dicta, latifolia & angusti-
 folia serrata, p. 286. n. 742.
 743. Virga latifolia serrata,
 p. 287. n. 744. vulneraria
 est & lithontriptica, *ibid.*
- Virga pastoris major, *vid.* Dipsa-
 cus p. 62.
- Virga sangvinea, *vid.* Cornus, p.
 55. n. 139. Ossea, *ibid.*
- Virgula divinatoria quomodo
 paretur. p. 56. n. 140.
- Virgulæ metallorum indagatricis
 materies est Corylus, p. 56.
 n. 140. illa quomodo ca-
 datur & tractetur, *ibid.*
- Viscum, p. 287. n. 745. quer-
 cūs & Coryli antepilepticum
 est, pyri sylvestris contractu-
 ras sanat, *ibid.* p. 287. 288.
 Viscum fraxini baccis ex al-
 bo luteis, p. 288. n. 746.
- Vitis Idæa foliis subrotundis ex-
 albidis, p. 288. n. 747. Vi-
 tis foliis oblongis crenatis fru-
 etu nigricante; p. 288. n. 748
- Vitis Idæa foliis subrotundis
 non crenatis baccis rubris,
 p. 289. n. 749. Vitis Idæa foliis
 oblongis non crenatis baccis
 rubris. *ib.* n. 750. Vitis Idæa pa-
 lustris, *ibid.* n. 751. Vitis
 Idæa Rorismarini folio aver-
 sa parte albido & nervoso.
ibid. n. 752.
- Vitis nigra. *vid.* Bryonia alba
 p. 29. n. 75.
- Ulmaria vulgi, *vid.* Barba capræ.
- Ulmus p. 289. n. 753. vulneraria
 est. *ibid.* Ulmi præcox foliorum
 deciduum pestem jumentis
 portendit, *ibid.* p. 260 Ulmo
 affinis arbor, *ibid.* n. 754.
- Ungula Caballina, *vid.* Tussilago
- Urinæ incontinentia auditu
 Phormyngis aut Screatūs. p.
 282. 283. n. 730.
- Urinaria, *vid.* Dens leonis, p.
 61. n. 165.
- Urtica vulgaris mortua, labeo
 fœmina, iners *vid.* Lamium,
 p. 133. n. 372. non mordax
 vulgaris, fœtens, purpurea,
 iners altera, *ibid.* n. seq. iners
 tertia, sexta tabea, p. 34. n. 374.
- Herculea, undecima, fœtida
 maxima porphyranthemos,
ibid. n. seq.
- Urtica urens maxima, cui usui
 inserviat? p. 291. n. 755.
- Urtica sceptrum ministravit
 Antigono, p. 292. n. 756.
- Ur-

INDEX LATINUS.

- Urtica fatua sylvestris p. 292.
n. 758. aculeata, p. 291. n.
755. Urtica urens maxima
sive major, p. 291. n. 756.
Urtica urens minor, p. 292.
n. 757.
Urtica aculeata foliis non ferra-
tis, p. 292. n. 758.
Ustilago, p. 292. 293. Ustilago
pictoribus colorem fuscum
suppeditat, *ibid.* n. 759.
Ustilago Tritici, p. 292. n. 758.
Ustilago secalis, p. 292. n.
759. Ustilago hordei, p. 293.
n. 760. Ustilago avenæ, p.
293. n. 761.
Usnea Officinarum, p. 171.
n. 472.
- Uvularia major, *vid.* Campanu-
la vulgarior.
Uvularia exigua in pratis, p.
33. n. 86.
X.
Xanthium Dioscoridis, p. 137.
n. 384. Xanthion seu Lappa
minor, *ibid.* Xanthium seu
strumaria, *ibid.*
Xiphium seu gladiolus coeruleus
minor, *vid.* Iris pratensis,
p. 130. n. 363.
Xiphion-Spatha, *vid.* Gladio-
lus p. 105. n. 277. Xiphi-
on minus, *ibid.*
Xylosteum, *vid.* Chamæcerasus
Xyris minor, *vid.* Iris pratensis
p. 130. n. 363.

F I N I S.

Corrigenda.

Numerus prior paginam, alter lineam,
l. lege, denotat.

3. 15. tufa l. tusa. 6. 19. Anckerwurz / l. Ackerwurz.
17. 29. Kœlb Kraut / l. Kleb Kraut. 21. 30. Artractylis
l. Atractylis. 22. 20. Schweiß l. Scheiß. 23. 26. Greiß
Bart l. Geiß Bart. 24. 15. Viperibus l. visceribus. 24. 29.
Camp. l. Cam. 27. 3. addit l. additur. 27. 3. dilucior l. dilu-
cidior, 27. 4. incolo l. in colo 29. 24. Card, l. Cord. 35. 28.
Cer-

K12068
CORRIGENDA.

Cerdopatium. I. Cardopatium. 36. 23. Burnf. I. Brunsf. 37. 5. catharros l. catarrhos. 39. 25. stipatis l. stipatos, 41. I. flosculi l. flos Cuculi. 58. 6. Renano l. Re anno. 78. 26. illis l. locis 79. 6. fari l. favi. 95. 23. punulis l. punctulis. 98. 4. fossilum l. fossilam. 98. 7. Spithamum l. spithamam. 123. 14. Hippocomis l. Hippocamis. 139. 3. Traog. l. Trago. 164 12. Cod. l. Cord. 179. 13. Thab. l. Tab. 196. 24. vox Gabate deleatur. 219. I. lege ita: pag. 326. Roth Wasser- Fünff Finger Kraut. In pratis uliginosis passim. DXCII. Ranunculus Nemorosus Luteus. C. B. Pin. pag. 178. &c. 22. 24. levis l. laevis. 234. I. tertius l. tertius. 279. I. Valeriana. l. * Valeriana. 285. 10. Lond. l. Lonic.

Corrigenda in Indice Latino.

Ss, Tt 2, Vv 3 &c. folia quaternionum, literæ a, b, c, d, quatuor columnas singulorum foliorum, numeri lineam Columnarum denotant.

Ss. 3. a. 6. mera l. rubra. Ss. 4. c. 17. Belis l. Bellis. Tt. c. 17. Canis l. Cania. Tt. d. 33. Careum l. Carvum. Tt 2. b. 21. Cerdopatium l. Cardopatium. Vv. c. 16. metricus l. meretricius. Vv 2. b. 24. Geranii l. Geranium. Xx. 2. c. 31. pro 415. l. 423. Yy c. 31. musculosa l. maculosa.



INDEX LATINUS.

- Urtica fatua sylvestris p. 292.
n. 758. aculeata, p. 291. n.
755. Urtica urens maxima
sive major, p. 291. n. 756.
Urtica urens minor, p. 292.
n. 757.
Urtica aculeata foliis non serra-
tis, p. 292. n. 758.
Ustilago, p. 292. 293. Ustilago
pictoribus colorem fuscum
suppeditat, *ibid.* n. 759.
Ustilago Tritici, p. 292. n. 758.
Ustilago secalis, p. 292. n.
759. Ustilago hordei, p. 293.
n. 760. Ustilago avenæ, p.
293. n. 761.
Usnea Officinarum, p. 171.
n. 471.
- Uvularia major, *vid.* Campanu-
la vulgarior.
Uvularia exigua in pratis, p.
33. n. 86.
X.
Xanthium Dioscoridis, p. 137.
n. 384. Xanthion seu Lappa
minor, *ibid.* Xanthium seu
strumaria, *ibid.*
Xiphium seu gladiolus 'cœru-
leus minor, *vid.* Iris pratensis,
p. 130. n. 363.
Xiphion-Spatha, *vid.* Gladio-
lus p. 105. n. 277. Xiphi-
on minus, *ibid.*
Xylosteum, *vid.* Chamæcerasus
Xyris minor, *vid.* Iris pratensis
p. 130. n. 363.

F I N I S.

Corrigenda.

Numerus prior paginam, alter lineam,
l. lege, denotat.

3. 15. tufa l. tufa. 6. 19. Ackerwurz / l. Ackerwurz.
17. 29. Kœlb-Kraut / l. Kleb-Kraut. 21. 30. Artractylis
l. Atractylis. 22. 20. Schweß l. Scheiß. 23. 26. Greiß-
Bart l. Geiß-Bart. 24. 15. Viperibus l. visceribus. 24. 29.
Camp. l. Cam. 27. 3. addit l. additur. 27. 3. dilucior l. dilu-
cidior. 27. 4. incolo l. in colo 29. 24. Card. l. Cord. 35. 28.
Cer-

Biblioteka Muzeum i Inst. Zoologii PAN

K. 12068



200000000022