

831

S. 26

Steinbaum

C. Berg

Descriptio novi generis Cerambycidarum
Reipublicae Argentinae

obl. do
sep. 7353
8. 9. 99
MP

Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos Aires

1898

icm.org.pl

Col



Descriptio novi generis Cerambycidae

Reipublicae Argentinae.

A

CAROLO BERG.



CHERROCRIVS¹ BERG.

(Nov. gen. Prionidarum aberrantium.)

Corpus elongato-ovale. Caput parvulum, inerme, clypeo latiusculo, bilobato vel medio exciso. Oculi parvi, supra subtusque inter se valde distantes. Antennae longiusculae (corpore $\frac{1}{4}$ vel $\frac{1}{5}$ breviores), articulo 1° subgloboso, 2° minuto, 3° 4° longiore, 4°-10° inter se fere aequilongis, 11° ceteris multo longiore, subcylindrico vel subfusiformi, 3°-10° apice in ramum sat validum antrorsum directum productis. Mandibulae mediocres, subsecuriformes, acie longa, recta, edentata aut tantum parte basali denticulo minuto instructa. Palpi mediocres, articulo terminali obovato. Pronotum parvulum vel mediocre, muticum. Scutellum mediocre. Elytra convexiuscula, apicem versus parce angustata. Alae adsunt. Pedes longiusculi, graciles, femoribus muticis, tibiis solum apice spinis vel calcaribus minutis armatis, tarsis 5 longiusculis, 4° minuto excepto, acetabula prosterni clausa.

Genus sat insigne, inter *Sypilum* Guér. et *Anoploderma* Guér.² locandum, ab ambobus praecipue antennis valde ramosis, articulo 3° 4° longiore, oculis parvis, clypeo exciso, mandibulis haud curvatis acie longa rectilinea praeditis, femoribus

¹ Χερροκρίβος: desertum; κριός: aries.

² Genus *Anoploclerma* etiam ad divisionem *Sypilini* Cl. H. J. Kolbe (vide: Berl. Ent. Zeitschr. xxviii, p. 402, n. 2; 1884) pertinet.

W/3.

extus vix serrulatis, nec non tarsis admodum elongatis, sat diversum.

Typus generis: *Cherrocrius Bruchi* Berg.

Cherrocrius Bruchi BERG, n. sp.

♂ et ♀: *Nigri vel picei, elytris sordide ferrugineis, antennis saturate fuligineis, pedibus ex parte rubescenti-nigris; capite, pronoto pectoreque generaliter sat dense atro- aut nigro-pilosis, femoribus, tibiis abdomineque tenuiter pilosis.* — Long. corp. 18-20; lat. post. pron. 4,3-5, lat. bas. elytr. 7-8 mm.

Hab. Patagonia.

Species facie tamquam forma ipsa *Sypili Dorbignyi* Guér. Caput rugoso-punctatum, longe pilosum, fronte impressum, vertice elevatum, convexum; clypeo lobulis rotundatis; oculis sat parvis, ovalibus; antennis corpore fere $\frac{1}{4}$ brevioribus, articulo 1° subgloboso 2° rotuliformi quater aut quinques longiore et 3° dimidio brevior, 3° 4° quarta vel quinta parte longiore, sequentibus septem paulatim longitudine nonnihil accrescentibus, 11° longitudine duorum præcedentium ad unum, simplice, medio subincrassato, 3°-10° in ramum validum (ramus fere longitudine articuli ipsi) productis; mandibulis extus parum arcuatis, intus acie longa, recta, integra aut tantum in parte basali denticulo armata; palpis rufis mandibulis vix longioribus. Pronotum crebre punctatum, ante medium tuberculis discoidalibus duobus minutis, dense longeq. pilosum, medio paulo dilatatum, marginibus antico vix producto, subtrisinuato, lateralibus rotundatis, postico medio recto, utrimque modice sinuato. Scutellum dense punctatum, pilosum, apice rotundatum. Elytra grosse rugoso- vel areolato-punctata, glabra, convexa, ad latera apicem versus lenissime sinuata, paulo dehiscentia, abdomen totum bene tegentia, apice non producta. Pectus et abdomen dense punctata et tenuiter pilosa, nigra. Pedes rubescenti-nigri, punctati, graciles, ad partem parce pilosi; femoribus perparum incras-

satis; tibiis apice paulo incrassatis, calcaribus parvis armatis; tarsis elongatis, articulis tribus primis apicem versus paulo dilatatis, infra aureo-sericeis, primo longitudine secundi tertiique ad unum, quarto minuto, quinto basali subaequilongo.

Specimina compluria a Dom. Carolo Bruch in Patagonia, prope Río Collon-curá et Río Calcutú, inventa et species eidem dicta.



