

164

Odbitka z pracy zbiorowej pod red. J. Fudakowskiego p. t. „Przyczynek do znajomości fauny Czarnohory” 1935 r. — Rozprawy i Sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych w Warszawie Nr. 8



13. PTAKI. (*Aves*).

A. Dunajewski (Kraków).

Uwagi ogólne.

Podczas mojego miesięcznego pobytu w rezerwacie czarnohorskim miałem sposobność zaobserwować 48 form ptaków, co równa się mniej więcej połowie ilości gatunków, których gniazdowanie zostało stwierdzone w Tatrach. Jest to liczba wcale pokaźna, biorąc pod uwagę, że w badaniach moich, ze względu na krótki okres czasu, musiałem się ograniczyć do wąskiego pasa wzdłuż Prutu, od 900 — 2000 m wys. n. p. m. Przez cały czas mojego pobytu nie spotkałem dwu gatunków ptaków, które były już w tej okolicy stwierdzone t. j. płochacza halnego *Prunella collaris* i orzechówki *Nucifraga caryocatactes*. Dłuższe obserwacje niewątpliwie pozwoliły by znaleźć te dwa gatunki i jeszcze kilka innych, gniazdowych, nie mówiąc o przelotnych.

Pod względem ilości osobników jest tu avifauna dość uboga. Szczyty ponad kosodrzewiną zamieszkują stale siwerniak *Anthus spinoletta* oraz drapieżce, jak pustulka *Cerchneis tinnunculus*. W miarę schodzenia niżej przybywa gatunków znacznie lecz osobników niewiele. Dla zarośli kosodrzewiny (*Pinus mughus*) charakterystycznym ptakiem jest kopciuszek *Phoenicurus ochruros gibraltariensis*, obok niego zaś drozd obroźny *Turdus torquatus alpestris*. W reglu górnym znajdujemy przede wszystkim ziębę *Fringilla coelebs*, poza tem drozda obroźnego *Turdus t. alpestris* i dzięciolaka trójpalczastego *Picoides tridactylus alpinus*. Wyraźnie liczniej jest zamieszkały regiel dolny, którego zresztą tylko mały skrawek wchodzi w obręb rezerwatu. Przy obserwacji avifauny czarnohorskiej rzuca się w oczy duża stosunkowo ilość dużych ptaków drapieżnych, w stosunku do niewielkiej ilości ptaków które mogłyby im służyć za pokarm. Nie mając, odpowiedniej broni z powodu nieuzyskania pozwolenia na jej używanie w rezerwacie, mogłem zidentyfikować tylko kilka gatunków drapieżców, znajduje się ich tam jednak więcej niż poniżej podaje.

Spł do  
S-10263  
6, 9, 49  
219

## Systematyczny wykaz obserwowanych ptaków.

1. *Ciconia nigra* (L.). Ptak gniazdowy, nieliczny.
2. *Circaëtus gallicus* (Gm.). Spotkałem go dwa lub trzy razy.
3. *Accipiter nisus nisus* (L.). W reglu górnym spotkałem raz, liczniejszy jest w niżej położonych partjach.
4. *Buteo buteo buteo* (L.). Gnieździ się w reglu dolnym, w górnym widywałem go bardzo rzadko.
5. *Aquila chrysaëtos regalis* (Temm.). Widziałem orła przedniego kilkakrotnie.
6. *Cerchneis tinnunculus tinnunculus* (L.). Gnieździ się na skałach dancerskich (1600 m). Nad połoninami i koło szczytów dość liczna.
7. *Tetrao urogallus urogallus* L. Ptak gniazdowy, nierzadki.
8. *Lyrurus tetrix tetrix* (L.). Według opowiadania Hucułów i leśnych cietrzew znajduje się po południowej stronie gór i stamtąd czasem zalatuje. W literaturze podaje go dla Czarnohory Wajgel<sup>1)</sup>; niewątpliwie gnieździ się w niższych partjach.
9. *Tetrastes bonasia rupestris* (Brehm.). Niezbyt liczny ptak gniazdowy. Nie miałem sposobności zdobyć żadnego okazu, przypuszczam jednak że ptaki tamtejsze należą do tej właśnie formy, gdyż sięga ona jeszcze dalej na północ.
10. *Scolopax rusticola rusticola* (L.). Sam spotkałem słonkę raz tylko, nad połoniną Pożyżewską, późnym wieczorem. Pora roku (25 lipca) wskazuje na okaz lęgowy. Według opowiadania w roku 1931 znaleziono gniazdo słonki w lesie koło Stacji Botanicznej.
11. *Cuculus canorus canorus* L. Ptak gniazdowy, niezbyt liczny. Okaz zabity: 29 VII, ♂ juv. wys. 1940 m.
12. *Bubo bubo bubo* (L.). Jedyńm dowodem występowania pułacza jest całkiem świeże pióro (lotka), znalezione przezemnie w lesie na wys. 1300 m.
13. *Caprimulgus europaeus europaeus* L. Spotkałem go parę razy i nie mogłem zdobyć żadnego okazu, z braku odpowiedniej broni. Ponieważ wszystkie ptaki gniazdowe polskie były zaliczane do tego podgatunku, przypuszczam że i czarnohorskie do niego należą. Dokładniejsze badania wykażą czy niebawi tam czasem przelotem *C. e. meridionalis*, obserwowany już w Polsce kilkakrotnie.
14. *Micropus apus apus* (L.). Jeżyki widywałem nad połoninami w wysokości (1300 — 1400 m), zwykle w większych stadach, zawsze

<sup>1)</sup> L. Wajgel, Pogląd na rzeźbę Czarnohory. Pom. Tow. Tatr. X. 1885.

tylko po deszczu. Podobne obserwacje zrobił Kocyan<sup>2)</sup> w dolinach tatrzańskich. W obrębie rezerwatu nie znalazłem miejsca w którym by się gnieździły.

15. *Picoides tridactylus alpinus* (Brehm.). Dość liczny ptak gniazdowy w całym reglu górnym. Nie spotkałem go poniżej 900 m. Okazy zebrane: 2 VII, ♂ juv. 1330 m, 29 VII, ♀ wys. 1020 m.

16. *Dryobates maior maior* (L.). Bardzo pospolity w reglu dolnym, zdaje mi się że nie idzie ponad 1000 m. Okaz zabity: 24 VII ♀ wys. 960 m.

17. *Hirundo rustica rustica* L. Ostatnie okazy tego gatunku widziałem koło Worochty, nigdy zaś wyżej, nawet w przelocie.

18. *Delichon urbica urbica* (L.). Najwyżej położone gniazdo znalazłem w Zawojeli (900 m), wyżej zaś parokrotnie spotkałem ją nad poloninami.

19. *Troglodytes troglodytes troglodytes* (L.). Bardzo liczny ptak gniazdowy w całym reglu górnym. Okazy zabite: 15 VII, ♂ wys. 1330 m, 27 VII, — juv. wys. 1275 m.

20. *Cinclus cinclus orientalis* Stres. Liczny wzdłuż całego Prutu i drobniejszych potoków. Okazy zabite: 6 VII, ♂ wys. 980 m, 12 VII, ♂ wys. 1200 m.

21. *Prunella modularis modularis* (L.). Niezbyt liczny ptak gniazdowy w górnym reglu. Okazy zabite: 23 VII, ♂ juv. wys. 1330 m, 27 VII, — juv. wys. 1330 m.

22. *Erithacus rubecula rubecula* (L.). W całym reglu górnym pospolity ale nieliczny ptak gniazdowy. Okazy zabite: 17 VII, ♀ wys. 980 m, 27 VII, ♂ juv. wys. 1330 m.

23. *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Gm.). Pospolity ptak gniazdowy w kosodrzewinie. Okaz zabity: 8 VII, ♂ juv. wys. 1600 m.

24. *Oenanthe oenanthe oenanthe* (L.). Spotkałem ją dwukrotnie: pod Breskułem na wys. 1550 m i drugi raz koło Niesamowitego jeziora na wys. 1761 m. Nie mogłem zdobyć żadnego okazu, jest to jednak ptak tak charakterystycznie upierzony że nie może zachodzić obawa pomyłki w rozpoznaniu.

25. *Turdus torquatus alpestris* (Brehm.). Drozd obrożny jest liczny ptakiem gniazdowym w reglu górnym i kosodrzewinie. Okazy zebrane: 2 VII, ♀ wys. 1375 m, 4 VII, ♂ juv. 1375 m, 5 VII — juv. wys. 1360 m, 8 VII, ♂ wys. 1700 m.

26. *Turdus viscivorus viscivorus* L. W reglu górnym spotkałem go dopiero koło 20 lipca w dużych stadach. Okaz zabity: 20 VII, ♂ wys. 1330 m.

<sup>2)</sup> A. Kocyan, Ptaki spostrzegane po półn. stronie Tatr. Pam. Tow. Tatr. IX, 1884.

27. *Monachus atricapillus atricapillus* (L.). Nieliczna w reglu dolnym części górnego, mniej więcej do wys. 1100 m, wyżej zaś nigdy jej nie spotkałem. Okaz zabity: 6 VII, ♂ wys. 1060 m.

28. *Phylloscopus collybita subsp.*? Na podstawie jednego okazu nie mogę oznaczyć przynależności podgatunkowej. Świstunka rudawa jest wogóle w reglu górnym bardzo nieliczna, słyszałem jej głos zaledwie parę razy i zaledwie jeden okaz mogłem zdobyć. Okaz zabity: 19 VII, ♂ wys. 1100 m.

29. *Phylloscopus trochilus subsp.*? Gatunek ten na ziemiach Polskich wymaga jeszcze dokładniejszych badań, dlatego wstrzymuję się z oznaczeniem podgatunkowym ptaków czarnohorskich. Świstunka piecuszek jest niezbyt liczny ptakiem gniazdowym w reglu górnym. Okazy zebrane: 8 VII, ♂ wys. 1400 m, 23 VII, ♀ juv. wys. 1330 m, 23 VII, ♀ juv. wys. 1330 m.

30. *Enneoctonus collurio collurio* (L.). Nierzadki w niżej położonych okolicach, pojedyncze okazy można spotkać jeszcze na wys. 900 m. Okaz zabity: 24 VII, ♂ wys. 900 m.

31. *Regulus regulus regulus* (L.). Liczny ptak gniazdowy w całym reglu górnym. Okaz zabity: 10 VII, ♂ wys. 1320 m.

32. *Poecile atricapilla assimilis* (Brehm). Nieliczna w reglu górnym. Okaz zabity: 13 VII, ♂ wys. 1200 m.

33. *Lophophanes cristatus cristatus* (L.). W całym reglu pospolity ptak gniazdowy. Należało by zbadać czy nie zalatują tu z południowych stoków *L. c. mitratus*. Okaz zabity: 12 VII, ♂ wys. 1300 m.

34. *Periparus ater abietum* (Brehm). Liczny ptak gniazdowy w reglu górnym i dolnym. Okazy zabite: 3 VII, ♀ juv. wys. 1350 m, 27 VII — juv. 1350 m, 27 VII — juv. 1370 m.

35. *Sitta europaea subsp.*? Widziałem tylko jeden okaz koło Połoniny Pożyżewskiej, nie mogłem więc oznaczyć podgatunku.

36. *Certhia familiaris familiaris* L. Pospolity ale nieliczny ptak gniazdowy w reglu górnym. Okaz zabity: 28 VII, ♂ wys. 1330 m.

37. *Motacilla alba alba* L. Dość liczna nad Prutem aż do wys. 900 m.

38. *Colobates cinerea cinerea* (Tunst.). Wzdłuż Prutu i jego dopływów, oraz w lesie, nawet daleko od wody, pospolita. Spotykałem ją jeszcze na wys. 1550 m. Okazy zabite: 22 VII, ♀ wys. 1260 m, 25 VII, ♂ wys. 1330 m.

39. *Anthus pratensis* (L.). Dwie lub trzy pary świergotka tego gnieździły się na Połoninie Pożyżewskiej.

40. *Anthus trivialis trivialis* (L.). Dość pospolity ptak gniazdowy w reglu górnym. Okazy zabite: 2 VII, ♂ wys. 1330 m, 4 VII, ♂ wys. 1350 m, 19 VII, ♀ wys. 1330 m.

41. *Anthus spinoletta spinoletta* (L.). Powyżej granicy lasu, na połoninach i w kosodrzewinie, od 1300 — 2000 m, liczny ptak gniazdowy. Okazy zabite: 5 VII, ♂ wys. 1690 m, 5 VII, ♂ wys. 1720 m, 8 VII, ♂ wys. 1680 m, 11 VII, ♀ wys. 1700 m, 14 VII, ♀ wys. 1740 m, 23 VII, ♀ wys. 1350 m.

42. *Spinus spinus* (L.). Dość liczny w reglu górnym. Okaz zabity: 7 VII, ♂ wys. 1470 m.

43. *Fringilla coelebs coelebs* L. Liczny, bardzo dla regła górnego charakterystyczny, ptak gniazdowy. Okaz zabity: 15 VII, ♀ wys. 1330 m.

44. *Loxia curvirostra curvirostra* L. Spotkałem go zaledwie trzy razy. Okaz kolekcji: 21 VII, ♀ wys. 1330 m.

45. *Pyrrhula pyrrhula coccinea* (Gm.). Dość pospolity ptak gniazdowy w reglu górnym, spotykany i w kosodrzewinie. Okazy zabite: 4 VII, ♂ wys. 1330 m, 4 VII, ♀ wys. 1330 m, 22 VII, ♂ juv. wys. 1330 m, 23 VII, ♂ wys. 1330 m, 24 VII, ♀ wys. 1150 m. 23 VII, ♂ wys. 1300 m.

46. *Garrulus glandarius glandarius* (L.). Ptak gniazdowy w reglu górnym aż po granicę lasu, niezbyt liczny. Okaz zabity: 19 VII, ♀ wys. 1320 m.

46. *Pica pica pica* (L.). Oznaczenie podgatunku prowizoryczne, aż do dokładniejszego zbadania ptaków gniazdowych z innych okolic Polski. Nieliczna w niższych partjach, do 950 m. Okaz zabity: 24 VII, ♂ wys. 900 m.

47. *Corvus corax corax* L. Widziałem kilka razy pojedyncze okazy przelatujące na znacznych wysokościach. (1500 — 2000 m).

48. *Corvus cornix cornix* L. Pojedyncze okazy lub małe stadka widywałem czasem na połoninach do 1400 m.

### Résumé.

49 espèces d'oiseaux a été pris ou observés entre 900 et 2000 m d'altitude. La présence des espèces suivantes est à noter:

*Ciconia nigra* (L.) rare.

*Aquila chrysaetos regalis* (Temm), observé plusieurs fois.

*Tetrao urogallus urogallus* (L.), pas rare.

*Bubo bubo bubo* (L.). La présence du Grand Duc fut trahie par une plume trouvée.

*Picoides tridactylus alpinus* (Brehm), assez commun, se niche.

*Delichon urbica urbica* (L.), se niche à 900 m d'altitude; observé voltigeant au-dessus des prairies alpestres à la hauteur de plus de 1350 m.

*Cinclus cinclus orientalis* St r e s. Assez commun aux bords des ruisseaux jusqu'à 1200 m, d'altitude.

*Turdus torquatus alpestris* (B r e h m), commun dans les forêts d'épicéa et les broussailles de pin de montagnes jusqu' à 1700 m d'alt.

*Anthus pratensis* (L.), plusieurs exemplaires à 1350 m.

*Anthus trivialis trivialis* (L.). Assez commun à la limite supérieure, des forêts d'épicéa à ap. 1300 m.

*Anthus spinoletta spinoletta* (L.). Commun dans les prairies alpestres et broussailles de pin de montagnes.

*Fringilla coelebs coelebs* (L.). En grand nombre, espèce caractéristique aux forêts d'épicéa.

*Pyrrhula pyrrhula coccinea* (Gm.). Assez commun à la limite des forêts et parfois parmi les pins de montagnes. Le niche dans les forêts d'épicéa.





