

1838

Genebauer

ARCHIWUM
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WE LWOWIE
DZIAŁ III. — TOM I. — ZESZYT 6-8.

SPIS SYSTEMATYCZNY
GATUNKÓW I RAS
ZWIERZĄT KRĘGOWYCH
FAUNY WSCHODNIEJ SYBERYI

NAPISAŁ

BENEDYKT DYBOWSKI



WE LWOWIE
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
DRUKARNIA UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO POD ZARZĄDEM J. FILIPOWSKIEGO
1922.

Skład główny wydawnictw Towarzystwa utrzymują: we Lwowie i w Warszawie
Gubrynowicz i Syn, w Krakowie Gebellner i Sp.

*opł. ob
7850
Sep.
23.8.49
M.P.*



ARCHIWUM
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WE LWOWIE
DZIAŁ III. — TOM I. — ZESZYT 6-8.

SPIS SYSTEMATYCZNY
GATUNKÓW I RAS
ZWIERZĄT KRĘGOWYCH
FAUNY WSCHODNIEJ SYBERYI

NAPISZAŁ

BENEDYKT DYBOWSKI



WE LWOWIE
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
DRUKARNIA UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO POD ZARZĄDEM J. FILIPOWSKIEGO
1922.

Skład główny wydawnictw Towarzystwa utrzymują: we Lwowie i w Warszawie
Gubrynowicz i Syn, w Krakowie Gebethner i Sp.

24/2



S. 221.



Spis systematyczny ssawców wschodnio-syberyjskich.

Zestawił

Benedykt Dybowski.

Wstęp.

Mieliśmy zamiar wspólnie pracować ze znakomitym znawcą osteologii zwierząt ssących, ziomkiem naszym, sądzonym do batalionów syberyjskich, jako rekrut, za branie udziału w powstaniu. On jako niepełnoletni, nie ukończywszy kursu gimnazyalnego, własną pracą samouka osiągnął szczytów wiedzy w zakresie geologii i osteologii ssaków. Z tym nieporównanym badaczem Janem Czerskim projektowaliśmy opracować faunę ssawców Wschodniej Syberyi.

Motywe do tej pracy było z mojej strony przeświadczenie, nabyte na podstawie badań ornitologicznych, wykazujących dowodnie, że gatunki europejskie, spotykane na przestrzeni Syberyi wschodniej, różnią się od typowych form, żyjących w Europie. Ponieważ takie same warunki, powodujące zmianę, istnieją i dla ssawców, więc też i rezultaty powinny być takie same. Czy te różnice będą znaczne i obejmować mają wszystkie gatunki, czy tylko formy bardziej plastyczne, lub terytoryalnie rozdzielone od europejskich, czyli odosobnione, jak na przykład rozmieszczenie Cedrów albo Modrzewi, a następnie same różnice: czy one będą mogły służyć dla nadania formom wartości gatunków, albo odmian jedynie, to było rzeczą mniejszej wagi, chodziło nam tylko o wykazanie różnic,

choćby one były jak najmniejsze, albo o dowód, że one nie dają się wykazać wcale.

Obserwacje moje w czasie gromadzenia materiału, musiały być z konieczności pobieżne, tylko, zaznaczyłem jedynie, że dana forma, ma być dokładnie zbadana, tę formę nazywałem odmianą (varietas) i nadawałem prowizorycznie jakąś nazwę, tak np. Jeź europejski, *Erinaceus europaeus* L. z Zachodniej Syberyi, uznany został przez Erxlebena za nowy gatunek i nazwany Jeżem syberyjskim, *Erinaceus sibiricus* Erxl. Ten nowy gatunek jest terytorjalnie oddzielony obecnie od Jeża daurskiego, otóż nazwałem go prowizorycznie, Jeżem daurskim, *Erinaceus dahuricus*. Takim samym sposobem nazwałem Kreta irkuckiego: *Talpa europaea* var. *irkutensis*. Jelenia amurskiego, *Cervus elaphus* L. var. *Czerskii*, (zanim opis mój tej formy ogłoszony został, opisał go Bolan pod nazwą *C. Luehdorfi*). Jelenia ussuryjskiego opisanego przez Przewalskiego jako *Cervus axis* Erxl., nazwałem *Cervus Taczanowskii*, (Taczanowski na podstawie mego opisu dał mu nazwę *Cervus Dybowskii*) etc.

Otóż mieliśmy rozpocząć badania nasze od form, którym nadałem prowizoryczne nazwy. Znaczny materiał osteologiczny zdołałem przesłać na ręce Czerskiego do Irkucka. Czerski odkrył w jaskini położonej w pobliżu Niżnieudińska, niezmiernie interesującą faunę paleontologiczną, z czasów lodowcowych pochodzącą, wszystkie gatunki były w stanie mumifikacji suchej zachowane, na wielu okazach nawet sierść była utrzymana. (Fotografie większej części okazów wykonałem bawiąc w Irkucku). Gatunki z peryodu lodowcowego, okazały się odmienne od ówczesnych, z peryodu obecnego, były nawet nowe rodzaje Antylop i Jeleni.

Mieliśmy więc materiał olbrzymi do opracowania. Niestety cały ten materiał spłonął w czasie niezwykłego w swym ogromie pożaru miasta Irkucka. Wszystkie zbiory geologiczne, paleontologiczne, zoologiczne, antropologiczne zniszczone zostały a zarazem i nasze nadzieje na możliwość pracy w kierunku wyżej wskazanym. W moim ręku pozostały tylko spisy zwierząt ssących, układałem je na podstawie własnych obserwacji, a zarazem opierałem się na źródłowych pracach drukiem ogłoszonych przez rozmaitych autorów rosyjskich i japońskich.

Obecnie ten spis zwierząt ssących Wschodniej Syberyi uzupełniony według możliwości, oddaję do ogłoszenia go drukiem, on

pozwała objąć całokształt fauny a zarazem daje poznać ile to jeszcze form nie zostało ściślej zbadanych dotąd.

Zbiory moje kameczackie już po pożarze Irkucka kolekcjonowane, oddałem na własność gabinetu zoologicznego Uniwersytetu Lwowskiego, oby się one doczekały godnych pracowników.

Z nazw używanych przez miejscową ludność, podaję tu tylko: 1) Rosyjsko-syberyjskie i 2) Burjackie. Nazwy używane przez innych tubylców Syberii Wschodniej, wraz z wymiarami zwierząt, któreśmy wykonali wspólnie z Wiktorem Godlewskim, oddane do przechowania Czernickiemu w muzeum przyrodniczym irkuckim, zniszczone zostały w czasie pożaru miasta 1879 r.

Spis systematyczny ssawców ze Wschodniej Syberii.

Na przestrzeni od rzeki Jenisieja, po wody oceanu Spokojnego wraz z przybrzeżną jego częścią.

I. Chiroptera.

1. *Rhinolophus ferrum equinum*. Schreb. (Nietopyr. Riumsze Burj). Okolice Władywostoka.
2. *Plecotus auritus* L. (Nietopyr). Okolice Onona, Arguni, Amuru, Ussuri.
3. *Vesperugo serotinus*. Schreb. (Nietopyr). Okolice Onona, Arguni, Amuru, Ussuri.
4. *Vesperugo sinensis*. Nils. (Nietopyr). Okolice jeziora Chanka.
5. *Vesperugo borealis*. Nils. (Nietopyr). Na całej przestrzeni aż do Kameczatki.
6. *Vesperugo noctula*. Schreb. (Nietopyr). Okolice Strielok wschodniej Syberii (Zatoka Strielok).
7. *Vesperugo pipistrellus*. Schreb. (Nietopyr). Daurya.
8. *Vespertilio Daubentoni*. Leisler. (Nietopyr). Okolice Bajkału i Daurya.
9. *Vespertilio emarginatus*. E. Geof. (Nietopyr). Daurya.
10. *Vespertilio Nattereri*. Kuhl. (Nietopyr). Dolina Irkutu.

II. Insectivora.

11. *Erinaceus sibiricus*. Erxl. (Joź albo Jeź). Okolice Jenisieja.
 var. *dahuricus*. Dyb. in lit. (Joź albo Jeź), Daurya.
 12. *Erinaceus auritus* Pall. (Joź albo Jeź). Daurya?
 13. *Erinaceus dealbatus*. Swinh. (Joź albo Jeź). Wybrzeża morza Mandżurskiego.
 14. *Sorex araneus* L. (Ziemlarojka. Moryn Chałaganan, Burj.) wszędzie oprócz Kameczatki.
 15. *Sorex minutus* L. (Ziemlarojka. Moryn Chałaganan, Burj.) Wszędzie i na Kameczatce.
 16. *Crossopus fodiens* Pull. (Ziemlarojka). Od Bajkału po wybrzeża morza Mandżurskiego.
 17. *Crocidura murina* L. (Ziemlarojka). Południowa część kraju Ussuryjskiego.
 18. *Scaptochirus* (*Talpa*) *moschatus*. A. M. Edw. (Miedwiedka). Południowa część kraju Ussuryjskiego.
 19. *Parascaptor* (*Talpa*) *leptura*. Thomas. (Miedwiedka). Południowa część kraju Ussuryjskiego.
 20. *Mogera* (*Talpa*) *wogura* Temm. (Miedwiedka). Amur, kraj Ussuryjski.
 21. *Talpa europaea* L.
 var. *irkutensis* Dyb. in lit. (Miedwiedka). Okolice Irkucka.
 22. *Talpa altaica*. Nikolski. (Miedwiedka). Góry Altajskie, Sajańskie.

III. Carnivora.

- Ursus arctos* L. (Miedwied'. Chara-grugoon Burj.)
 23. *Ursus arctos* var. *sibiricus* Dyb. in lit. Okolice Bajkału.
 24. *Ursus arctos* var. *collaris* F. Cuv. Daurya.
 25. *Ursus arctos* var. *piscator* Pucher. Kameczatka.
 26. *Ursus arctos* var. *behringianus* Midd. Ochockie wybrzeża, Kameczatka.
 27. *Ursus arctos* var. *Middendorffii* Merriem. Kameczatka.
 28. *Ursus arctos thibetanus* F. Cuv. Kraj ussuryjski.
 29. *Thalasarctos maritimus* Desm. (Biełyj Miedwied'). Wybrzeża oceanu lodowatego.
Meles taxus Bodd. (Borsuk. Dorohun Burj.).

30. *Meles taxus* var. *sibiricus* Dyb. in lit. Okolice Bajkału, Daurya.
31. *Meles anakuma* Temm., *M. amurensis* Schrenck. Amur, Ussuri.
- Gulo luscus*, *G. borealis* Nils. (Rosomaka. Żygen. Burj).
32. *Gulo sibiricus* Pall. (Rosomaka). Okolice Bajkału.
33. *Gulo kamtschaticus* Dyb. in lit. (Rosomaka). Kameczatka.
- Mustela martes* L. (Lesnoj Charok).
34. *Mustela altaica* Pall. (Lesnoj Charok). Góry Sajańskie.
35. *Mustela flavigula* Bodd. (Amurskij Charok). Amur, Ussuri.
- Mustela zibellina* L. (Sobol. Buługu. Burj.)
36. *Mustela zibellina* var. *baicalensis* Dyb. in lit. Okolice Bajkału.
37. *Mustela zibellina* var. *amurensis* Dyb. in lit. Amur, Ussuri
38. *Mustela zibellina* var. *kamtschatica* Dyb. in lit. Kameczatka.
39. *Putorius sibiricus* Pall. (Kałanok. Uin boron arba Burj.) Okolice Bajkału, Daurya.
40. *Putorius Davidianus* A. M. Edw. (Zołtyj Charok). Południowy kraj Ussuryjski.
41. *Putorius Ewersmanni* Lesson. (Kuzun-budun Ros. i Burj.) Okolice Bajkału, Ingoda Onon.
- Putorius erminea* L. (Gornostaj. Uin, Burj).
42. *Putorius erminea* var. *sibirica* Dyb. in lit. Cała Syberya wschodnia.
43. *Putorius erminea* var. *kamtschatica* Dyb. in lit. Kameczatka.
44. *Jetis (Putorius) nivalis* L. (gale Pall.). (Łaska). Wschodnia Syberya.
45. *Jetis nivalis* var. *kamtschatica* Dyb. in lit. Kameczatka.
46. *Jetis alpina* Gebler (Żółtaja Łaska). (Gołoj Chołongoj, Burj). Daurya.
47. *Jetis altaica* Pall. (Gornaja Łaska). Góry Sajańskie.
- Lutra vulgaris* Erxl. (Wydra. Kałun. Burj).
48. *Lutra vulgaris* var. *baicalensis* Dyb. in lit. Okolice Bajkału.
49. *Lutra vulgaris* var. *amurensis* Dyb. in lit. Amur, Ussuri.
50. *Lutra vulgaris* var. *kamtschatica* Dyb. in lit. Kameczatka

Enhydra lutris L. (*Lutra marina* Steller. Morskoj Babior).

51. *Enhydra lutris*. Stelleri Less. Wyspy Komandorskie.

52. *Enhydra lutris kamtschatica* Dyb. in lit. Południowe wybrzeża Kameczatki.

Canis familiaris L. (*Sabaka*. Nochoj Burj).

53. *Canis familiaris* var. *buraetus* Dyb. in lit. Daurya.

54. *Canis familiaris* var. *tungusus* Dyb. in lit. Okolice Bajkału północno-wschodnie.

55. *Canis familiaris* var. *kamtschatica* Dyb. in lit. Kameczatka.

56. *Canis familiaris* var. *lomotensis* Dyb. in lit. Góry południowej Kameczatki.

Canis lupus L. (*Wołk Szono* Burj).

57. *Canis lupus* var. *orientalis* Auct. (*Lesnoj wołk*). Lasy Syberyi wschodniej.

58. *Canis lupus* var. *argunensis* Dyb. in lit. (*Stiepnój wołk*). Stepowe przestrzenie Dauryi.

59. *Canis lupus* var. *kamtschaticus* Dyb. in lit. (*Biełyj wołk*). Kameczatka.

60. *Canis laniger* Hodgs. (*Stiepnaja sabaka*). Kraj południowo Ussuryjski.

61. *Nyctereutes procyonoides* Gray. (*Jenotowaja sabaka*). Kraj Ussuryjski.

Vulpes alopes L. (*Canis vulpes* L.) (*Lisica Arata* Burj).

62. *Vulpes alopes* var. *sibiricus* Dyb. in lit. (*Sibirskaja lisica*). Okolice Bajkału.

63. *Vulpes alopes* var. *ussuriensis* Dyb. in lit. (*Drewiesnaja lisica*) nie kopie w ziemi lecz zakłada gniazda w dziuplach drzew, łązi po drzewach. Błotniste przestrzenie Ussuryjskiego kraju.

64. *Vulpes alopes* var. *kamtschatica* Dyb. in lit. Kameczatka.

Każda z tych 3 odmian ma pododmiany barwne: a) *crucigerus* Bris. (*Krestowka*), b) *niger* Wagn. c) *albus* Pall. etc. (*czornoburaja* i *biełaja lisica*).

Vulpes lagopus L. (*Piesiec*).

65. *Vulpes lagopus* var. *albus*, Dyb. in lit. (*Biełyj Piesiec*). Kameczatka, wyspy Komandorskie.

66. *Vulpes lagopus* var. *niger*. Dyb. in lit. (*Czornyj Piesiec*). Wyspy Komandorskie.

67. *Vulpes corsac* L. var. *dahuricus*, Dyb, in lit. (Korsak Chierse Burjat). Daurya.
68. *Cuon* (*Canis*) *alpinus* Pall. (Lesnaja sabaka). Góry Sojańskie i Bajkalskie. (Suubry Burj).
69. *Felis leopardus uncia*. Schreb. (Irbis). Amur i Ussuri.
70. *Felis leopardus pardus* L. var. *orientalis* Schleg. (Piatnistaja Tigra). Amur, Ussuri.
71. *Felis oncoides microtus* A. M. Edw. Amur.
72. *Felis tigris* L. var. *mongolica* Less. var. *orientalis* Auct. (Babr¹ Tigra). Wschodnia część kraju Amurskiego i Ussuryjskiego.
73. *Felis manul* Pall. (Manul). Daurja..
- Felis catus* L. (Koszka).
74. *Felis catus domestica* Bris.
75. *Lynx. Felis lynx* L. var. *baicalensis* Dyb. in lit. (Ryś). Góry Sajańskie i Bajkalskie. (Szaluhun Burj).

IV. Pinnipedia.

76. *Eumetopias* (*Otaria*) *Stelleri* Less. (Siwucz). Sachalin, Kameczatka, wyspy Komandorskie.
77. *Callorhinus ursinus* L. var. *Krascheninnikowii* Less. (Kotik). Sachalin. Wyspy Komandorskie.
78. *Trichechus orientalis* Dyb. in lit. Tr. Dybowski. Czerski in lit. (Mors) Kameczatka.
79. *Erignatus* (*Phoca*) *barbatus* Fabr. (Łachtak) var. *Lepechini* Less. Morze Ochockie. Ujście Amuru.
80. *Histiophoca* (*Phoca*) *fasciata* Zimm. (Krylatka. Szeksza). Morze Behringa. Morze Ochockie.
81. *Pusa* (*Phoca*) *foetida* Fabr. (*Ph. annelata* Nilss. *equestris* Pall.). (Nierpa). Morze Behringa i Ochockie.
82. *Phoca vitulina* L. var. *ochotensis* Dyb. in lit. (Nierpa). Morze Ochockie.
83. *Phoca chorisi* Less. (Piestruszka). Morze Behringa.

¹ Nazwa Babr stała się powodem następującego zdarzenia. Władze miasta Irkucka prosiły o pozwolenie ustanowienia pieczęci z godłem „Babr (Tygrys) trzymający w pysku sobola“. W Petersburgu wykonano pieczęć, lecz sądząc, że Babr jest to Bóbr, więc zamiast Tygrysa wyrzeźbiono Bobra z sobolem w pysku. Bobrów niema w gubernii Irkuckiej.

84. *Phoca baicalensis* Dyb. (*Phoca sibirica* Georgi. Nomen nudum). (Nierpa). Bajkał. (Chap. Burj.)

85. *Phoca oronensis* Dyb in lit. (*Phoca sibirica* Georgi Nomen nudum). Jezioro Oron.

86.? *Pagophilus* (*Phoca*) *groenlandicus* Fabr. (Obecność tej formy nie pewna).

V. Rodentia.

87. *Sciuropterus volans* L. var. *sibiricus* Desm. (Letiaga. Ołbo. Burj). Daurja, Amur, Ussuri.

88. *Rhinosciurus Davidianus*, A. M. Edw. (Kitajskaja Bielka). Południowy kraj Ussuryjski.

89. *Sciurus vulgaris* L. var. *varius* Pall. (Bielka. Chyrmj Burj). Od Bajkału na wschód.

90. *Tamias asiaticus* Gm. *striatus* L. Pall. (Burunduk. Gyrczy Burj). Wschodnia Syberja prawie cała.

91. *Tamias uthénsis* Pall. *ochotensis* Midd. Wybrzeża morza Ochockiego.

92. *Colobotis* (*Spermophilus*) *empetra* Pall., *phaegnatus* Richards. (Jewraszka). Kameczatka.

93. *Colobotis Ewersmanni* Brdt. (Suslik, Jewraszka). Okolice Bajkału, Daurja, Amur.

94. *Colobotis Richardsoni* Sabine, var. *kamtschatensis*. Dyb. in lit. (Kameczatka).

95. *Spermophilus leucostictus* Brdt. (Suslik). (Urchu. Burj). Okolice Irkucka, Lena. (Zumura. Burj).

96. *Spermophilus erythrognys* Brdt. Góry Sajańskie.

97. *Spermophilus dauricus* Brdt. Daurja stepowa. (Urchu Burj).

98. *Arctomys bobac* Pall. Schreb. var. *sibirica* Büchn. (Tarbagan). Góry Sajańskie i Bajkalskie.

99. *Arctomys dahurica* Dyb. in lit. Daurskie stepy.

100. *Arctomys kamtschatica* Brdt. (Tarbagan). Kameczatka.

101. *Castor canadensis* Kuhl. var. *anadyrensis* Dyb. in lit. (Anadyrskij babior). Anadyr? Czy istnieją bobry w rzece Anadyrze jest rzeczą wątpliwą; przywożą skóry pod tą nazwą, lecz one pochodzić mogą z Ameryki, Czukeze prowadzą handel z Ameryką i tą drogą dostają się one na Syberję. Parę kawałków szczęk

Bobra dostałem na Kamczatce, wydały się odmienne od europejskich. Fakt obecności Bobrów w rzece Anadyrze musi być sprawdzony.

102. *Gerbillus brevicaudatus* A. M. Edw. (Kucaja Krysa). Południowa część kraju Ussuryjskiego.

103. *Epimys (Mus) curaco*. Pall. (Kitajskaja Krysa). Południowa Daurja. (Chara-chu. Burj).

104. *Epimys (Mus) decumanus* Pall. (Krysa. Uchur Burj). Wszędzie pospolity i ogromnie szkodliwy.

105. *Epimys (Mus) plumbeus* A. M. Edw. (Czornaja Krysa). Południowa część kraju Ussuryjskiego.

106. *Mus. sylvaticus* L. (Lesnaja Mysz). Okolice Bajkału, Daurja.

107. *Mus. Wagneri*. Ewersm. Południowa część Dauryi.

108. *Mus. musculus* L. (Mysz. Myszka. Kałaganan Burj). Wszędzie obecna.

109. *Micromys (Mus) agrarius* Pall. (Kałtaraja Mysz). Okolice Bajkału, Daurya, Amur.

110. *Micromys (Mus) minutus* Pall. (Ryżaja Myszka. Uruhuly. Burj). Okolice Bajkału, Daurya, Amur.

111. *Cricetus songarus* Pall. (Stiepnój szczenok. Orok-sahan Burj). Daurya.

112. *Cricetus furunculus* Pall. (Stiepnaja Czyndantskaja Krysa). Daurya.

113. *Lemmus obensis* Brdt. (Leming). Kamczatka. Północna Syberya.

114. *Lemmus schisticolor* Lilljeb. Wybrzeża morza Ochockiego i morza Behringa.

115. *Dicrostonyx (Myodes) torquatus* Pall. Wybrzeża morza Ochockiego i morza Behringa.

116. *Evotomys (Arvicola) rutilus* Pall. (Palowka. Urgynczy Burj). Daurya, Kamczatka.

117. *Evotomys (Arvicola) amurensis* Schrenck. Amur.

118. *Evotomys (Arvicola) rufocanus* Sundevall var. *kamtschatkensis* Palakow. Kamczatka.

119. *Evotomys (Arvicola) Wozniesienskii* Palakow. Kamczatka.

120. *Evotomys (Arvicola) russatus* Radde. Góry Sajańskie.

121. *Microtus (Arvicola) oeconomus* Pall. Okolice Bajkału, Daurya, Amur.

122. *Microtus (Arvicola) kamtschaticus* Pall. Kamczatka.
 123. *Microtus (Arvicola) gregalis* Pall. Daurya, Czyndant.
 124. *Microtus (Arvicola) saxatilis* Pall. Daurya.
 125. *Microtus (Arvicola) Raddei* Palakow. Daurya.
 126. *Microtus (Arvicola) macrotis* Radde. Daurya.
 127. *Microtus (Arvicola) mongolicus* Radde. Daurya.
 128. *Microtus (Arvicola) Maximowitschi* Schrenck. Amur.
 129. *Microtus (Arvicola) Middendorffi* Palakow. Tajmyr.
 130. *Microtus (Arvicola) Nordenskiöldi* Palakow. Tajmyr.
 131. *Paludicola terrestris* L, *amphibius* Desm. Od Bajkału po Kamczatkę.
 132. *Phacomys Brandti* Radde. Daurya.
 133. *Sminthus vagus* Pall. *subtilis* Pall. (Dołgochwostaja Myszka). Góry Bajkalskie.
 134. *Siphneus (Spalax) aspalax* Pall. (Sieraja Miedwiedka). Daurya (Radde).
 135. *Siphneus (Spalax) Dybowskii*. Czerski. Dolina Onona.
 136. *Halticus brachiurus*. Blainv. Daurya.
 137. *Alactaga saliens* Gm. (Ałaktaga. Ałaktaga Burj). Daurya.
 138. *Alactaga spiculum* Licht. Daurya.
 139. *Lagomys alpinus (Ochotono alpinus* Pall.) (Piszczucha). Góry Sajnaskie, Bajkalskie i Ałchanajskie. (Szyszagone. Burj).
 140. *Lagomys kamtschatica* Dyb. in lit. (Piszczucha sienio-staw). Kamczatka.
 141. *Lagomys hyperboreus* Pall. Góry Czukockie. L. *littoralis* Peters. Kraj czukocki nadbrzeżny.
 142. *Ochotono dauricus* Pall, (Ochotono). (Ochotono Burj). Część stepowa Dauryi.
 143. *Lepus variabilis* Pall. (Biełyj Uszkan). Jeniesiejskie okolice. Daurya. (Szandagan Burjat).
 144. *Lepus borealis canescens* Auct. Północna przymorska Syberya.
 145. *Lepus kamtschaticus* Dyb. in lit. Kamczatka.
 146. *Lepus tolaj* Pall. (Tołaj. Tołaj Burjat). Daurya.
 147. *Lepus mandschuricus* Radde. (Astrawnoj Uszkan). Amur, Ussuri, na wyspach obu rzek.
 148. *Lepus cuniculus* L. var. *domesticus* Auct. (Królik). Irkuck, Daurya, Kamczatka. (Wypisałem je z Europy).

VI. Ungulata.

149. *Equus caballus* L. var. *domesticus* Auct. (Łosząd'. Morin Burj).

Subverietates:

150. Subvarietas *tomsiana* (Tomskaja łosząd'). Ogiery i klacze sprowadzone do Zabajkala z Tomska, z zachodniej Syberyi. Tabuny Pułkownika Chiłkowskiego i Timofiejowych w Balzynie hodowane na stepnych przestrzeniach doliny Ingody, Onona i Arguni).

151. Subvarietus *buraeta* (Bratskaja łosząd'). Konie hodowane na stepach Dauryi.

152. Subvarietas *jacuta*. (Jakutskaja łosząd'). Konie hodowane przez Jakutów nad Leną.

153. Subvarietas *mongolica* (Mongolskaja łosząd'). Konie hodowane przez Mongołów.

154. Subvarietas *mandschurica* (Mandżurskaja łosząd'). Konie hodowane w Mandżuryi.

155. Subvarietas *Jankowskiana* (Jankowskaja łosząd'). Konie hodowane przez Jankowskiego na łąkach fermy, nad rzeką Sidemi w pobliżu Władywostoku. Ogiery rasy półkrwi arabskiej i ogiery rasy rysaków rosyjskich, klacze z rasy tomskiej przeważnie pochodzące.

156. Subvarietas *Coreana* (Korejskaja łosząd'). Konie hodowane w Korei i na jej pograniczu północnem. Drobną rasą wielkości „Poni“ europejskich albo naszych karłowatych „kuców“ i „kucyków“.

157. *Asinus* (*Equus* L.) var. *domesticus* auct. (Asioł). (Ilżyge Burjat). Daurya.

158. *Asinus mulus* Auct. (♂ *asinus* ♀ *equus*). Daurya.

159. *Asinus hinnus* Auct. (♂ *equus* ♀ *asinus*). Daurya.

160. *Hemiasinus hemionus* Pall. (Dżegetaj. Dżegitaj Burj). Stepny Dauryi. (Dżegetaj = Długouchy).

161. *Sus scrofa* L. var. *domesticus* Auct. (Czuszka). Na całej przestrzeni Wschodniej Syberyi.

162. *Sus scrofa ferus* Gm. var. *dahurica* Dyb. in lit. (Kaban). Daurya.

163. *Sus scrofa ferus* Gm. var. *ussuriensis* Dyb. in lit. Ussuri.

164. *Sus scrofa* var. *domesticus pliciceps* Auct. Wybrzeża morza Mandżurskiego.

165. *Camelus bactrianus* Erxl. var. *domesticus* Auct. (Wielblud. Tymen. Tymen Burj, Buir, Burj). Daurya.

Hydropotes inermis Swinh. *argyropus* Heude. (Karejskaja Kabarga).

166. *Hydropotes inermis* var. *Kalinowskii* Dyb. in lit. Góry Korejskie.

Moschus moschiferus L. (Kabarga. Kuduri Burj).

167. *Moschus moschiferus* var. *sibiricus* Auct. Góry Sajańskie, Bajkalskie, Ussuryjskie, Ochockie.

168. *Pseudaxis mantschuricus* Swinh. Południowa Mandżurya.

169. *Pseudaxis Dybowskii-Taczanowski* (Piatnistyj Alen). Wybrzeża morza Mandżurskiego.

170. *Cervus maral* Ogilby, *asiaticus*, *sungaricus* Siewiercow. Okolice Bajkału. Daurya. (Iziubr. Bogo ♂, Chogon ♀ Burj). Rogi eszeze miękkie, nie okostniałe. Panty Burj. Chandagaj ♂ i ♀ Burj).

171. *Cervus Luehdorfi* Bolan. C. *Czerskii* Dyb. in lit. Dolina Amuru.

Alces alces L. (Sachatyj. Chandagan. Burj).

172. *Alces* var. *baicalicus* Dyb. in lit. Okolice Bajkału.

173. *Alces ingodensis* Dyb. in lit. Wierzchołki doliny Ingody i Ononu.

174. *Alces ussuriensis* Dyb. in lit. Dolina rzeki Ussuri.

Rangifer tarandus L. (Aleń. Zaryn. Burj).

175. *Rangifer tarandus sibiricus* Murray. Góry Sajańskie.

176. *Rangifer tarandus baicalensis* Dyb. in lit. Góry Bajkalskie.

177. *Rangifer tarandus ussuriensis* Dyb. in lit. Góry ussuryjskie.

178. *Rangifer tarandus kamtschaticus*. Dyb. in lit. Kamezatka.

179. *Rangifer tarandus* var. *domesticus*. Północna Syberya. Kamezatka.

Capreolus capreolus L. (Kazula). Gurąn ♂, Gruhun ♀, Inzagan młode ciele sarny Burj).

180. *Capreolus pygargus* Pall. Okolice Bajkału. Daurya.

181. *Capreolus ussuriensis* Dyb. in lit. Kraj ussuryjski.

182. *Capreolus coreanus* Dyb. in lit. Korea i pogranicze.

183. *Gazella* (*Saiga* Gray) *gutturosa* Pall. (Dzeren. Dzeren Burj). Daurya.
184. *Nemorrhædus* (*Antilope*) *Raddeanus* Heude. Góry Ussuryjskie.
- Capra hircus* L. (Kaza. Jeman. Burj).
185. *Capra hircus domestica*. Daurya. Kameczatka.
186. *ibex sibirica* Meyer (Dikij Jeman). Góry Sajańskie.
187. *Ovis aries* L. var. *steatopyga* Auct. (Kurdiucznyj Baran). Daurya. Ogon tłuszczowy Kurdiuk. (Irgen. Burj).
188. *Ovis aries merinos* Auct. Zabajkale, Aksza.
189. *Ovis argali* Pall. *O. ammon* L. (Argali. Argali Burj). Góry Sajańskie uprzednio i góry Dauryskie.
190. *Ovis nivicola* Eschscholtz (Dikij Baran). Kameczatka.
191. *Ovis borealis* Siewiercow. Wierchojańsk, Lena, Chatanga.
192. *Poephagus grunniens* L. var. *domesticus*. (Bujła. Sarłuk Burjat).
193. *Poephagus grunniens bastardus* Chojnak: ♂ *grunniens*, ♀ *taurus*, płodne.
194. *Poephagus grunniens bastardus* Chojlak: ♂ *taurus*, ♀ *grunniens*, płodne.

Jak *Asinus mulus* jest bardziej podobny do konia, niż do osła, ale rzy po osłemu, tak też i Chojnak, jest bardziej podobny do bydła, lecz krząka jak Bujły, również *Asinus hinnus* jest bardziej podobny do osła niż do konia, ale rzy jak koń, toż samo Chojlak jest podobny do Bujła domowego, ale wydaje głos podobny do bydła *Bos taurus*. Wogóle głos idzie po matce a nie po ojcu. Muły i Hinny mają być niekiedy płodne, toż samo i Chojłaki, a także Chojnaki, według zapewnienia Jakowa-Jakowlewicza Istomina, hodowcy Jaków w Zabajkalu. U niego widziałem olbrzymie okazy wołów bastardów. Kilka razy proponowałem aklimatyzowanie Jaków u nas w Tatrach i na Kameczatce, one wytrzymują zimę na podnóżnym karmie, nie wymagają ciepłych obór, cieleta rodzą się w zimie i wytrzymują mrozy zimowe. Jaki wygrzebują z pod śniegu pokarm, tak jak to czynią renifery i konie, a czego bydło domowe skutecznie nie umie. Bronią się skutecznie od wilków i niedźwiedzi. Używane do konnej jazdy i do noszenia wjeucznych ciężarów w górskich miejscowościach i po błotach, są one daleko lepsze od koni i mułów. To są główne zalety Jaków.

195. *Bos taurus* L. *domesticus* Auct. (Skot. Mał. Burj). U włościan wschodniej Syberyi. Damasznij Skot.

196. *Bos taurus* L. *mongolus* Dyb. in lit. Stada bydła w Dauryi.

197. *Bos taurus* L. *cholmogorskiensis* (Cholmogorskij Skot). Bydło sprowadzone z Rosyi, z archangielskiej gubernii. Rasa wielka, krowy mleczne są wyłącznie w posiadaniu bogatych kupców, ulega t. zw. mongolskiej zarazie bardzo łatwo. Stąd aklimatyzacya trudna.

198. *Bos taurus* L. *jakuto-kamtschatkensis* (Kameczackij Skot). Kameczatka.

VII. Sirenia.

199. *Rhytina Illiger. gigas*. Auct. Rh. *Stelleri*. Cuv. (Marskaja karowa). Gatunek obecnie już nieżyjący. Odkryty został i opisany w roku 1742 przez Stellera. W kilkanaście lat po odkryciu już był wytępiony. Mięso, tłuszcz, mleko, miały być o wiele lepsze niż bydłęce. W roku 1780 widziano jakoby jeszcze ostatnie żyjące okazy. Długość dorosłych okazów dochodziła do 7½ m., takie okazy ważyły 4000 klg. W dzisiejszych czasach istnieją tylko szkielety, znajduwane na wyspie Behringa.

VIII. Cetacea.

200. *Tursiops Gili* Dall. (Marskaja czuszka). Morze Kameczackie i Mandżurskie.

201. *Delphinus Bairdii* Dall. (Worwoń). Morze Kameczackie i Mandżurskie.

202. *Tursio borealis* Peale. (Biełuźka). Morze Kameczackie i Mandżurskie.

203. *Lagenorhynchus obliquidens* Gill. Morze Kameczackie.

204. *Globicephalus scammoni* Cope. Morze Kameczackie i Mandżurskie.

205. *Orca gladiator* Bonnaterre. (Kasatka). Morze Kameczackie.

206. *Delphinapterus leucas* Pall. (Bieługa). Morze Kameczackie.

207. *Monodon monocerus* L. (Adnaroh). Morze Kameczackie.

208. *Physeter macrocephalus* L. (Plewun. Pławun). Morze Kameczackie.

209. *Ziphius Grebnitzkii* Steineger (Kiłun). Morze Kameczackie.

210. *Mesoplodon Steinegeri* True (Naplewak). Morze Kameczackie.

211. *Balaenoptera velifera, borealis* Cope (Kryłatyj kit). Morze Kamczackie.
212. *Balaenoptera velifera sulphureus* Cope. Morze Kamczackie.
213. *Megaptera kuzira* Gray (Pławnik). Morze Kamczackie.
214. *Megaptera versabilis* Cope. Morze Kamczackie.
215. *Balaena mysticetus* L. (Nastajaszczyj kit. Czornousyj kit). Morze Kamczackie.
216. *Balaena Roysii* Cope (Gehowoj kit). Morze Kamczackie.



Spis systematyczny gatunków i ras, należących do Avifauny wsch. Syberyi.

Zestawił

Benedykt Dybowski.

Wstęp.

Postanowiłem przedstawić w krótkich spisach faunę Wschodniej Syberyi, obejmującą przestrzenie, sięgające od doliny Jeniesieja po wybrzeża wód oceanu, wraz z Kamezatką i Wyspami Komandorskimi. Pierwszą próbę takiego spisu podałem uprzednio, ona przedstawia dział zwierząt ssących. Obecnie przystępuję do spisu gatunków ptaków, tudzież ich odmian. Odnośnie do spisu niniejszego poprzedzam go następującymi uwagami:

1. Spis form ptaków wschodniej Syberyi, ma na celu podać treściwy rzut oka na wielką pracę Taczanowskiego, o ptakach wschodniej Syberyi, wydaną w języku francuskim, pod nagłówkiem: *Faune ornithologique de la Sibérie orientale. Mémoires de L'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. T. XXXIX, (1891—1893)*, Praca rzeczona Taczanowskiego stanowi dwa duże tomy o 1267 stronach wielkiego formatu, zawiera opisy 525 form. Przy opisach uwzględnione zostały stany młodociane gatunków, oraz gniazda ich i jaja, o ile materiał kolektorski na to pozwalał, następnie podane są szczegóły, dotyczące rozmieszczenia gatunków na przestrzeniach terytoryalnych wschodniej Syberyi.

Podając spis, opieram się na pracy Taczanowskiego, więc przyjmuję jego nomenklaturę systematyczną, jakkolwiek ona dzisiaj została zastąpiona przez nową, wiele różną od niej.

Podział na grupy, którym nadaję wyraz techniczny, mający znamionować pokrewieństwa, użyłem w celu ułatwienia przejrystości poglądu na całość avifauny. Następstwo działów większych biorę

tak, jak je podaje Taczanowski w swej pracy. Przy każdym pokrewieństwie oznaczam w parantezach stronicę dzieła Taczanowskiego.

2. Dzielę gatunki ptaków wschodniej Syberyi na 5 kategorii:

I. Ptaki azyatyckie, czyli formy, których ojczyzną jest obszar kontynentu azyatyckiego.

II. Ptaki europejskie, czyli formy, którym ornitologowie wyznaczyli za ojczyznę Europę.

III. Ptaki amerykańskie, ich ojczyzną jest Ameryka,

IV. Ptaki australijskie, mają za ojczyznę Australię.

V. Rasy, czyli odmiany gatunków europejskich i amerykańskich, które się wytworzyły na przestrzeniach wschodniej Syberyi. i obecnie mogą już być uznane za formy gatunkowo samodzielne.

Określenie ścisłe powyżej wymienionych kategorii, odnośnie do każdego gatunku, nie może być uskutecznione, mamy bowiem wiele form kosmopolitycznych, zamieszkujących wspólnie Europę i Azyę, albo Azję i Amerykę, tak np. *Carpodacus erythrinus*, *Chen hyperboreus*, *Philacte canagica* etc. W takich wypadkach mogą być zdania rozmaite, zależne od subiektywnych poglądów badacza, niezgodne pomiędzy sobą. To samo daje się powiedzieć o ścisłym rozgraniczeniu ras, czyli odmian od danego gatunku pochodzących. Przy każdym gatunku wymieniam przestrzenie terytorjalne wschodniej Syberyi, skąd były dostarczane okazy bądź tylko pewne wiadomości o danym gatunku, tak np. przy gatunkach *Emberiza citrinella*, *Philomela Hafizi* i inne gatunki, oznaczone terytorjalnie, jako pochodzące z Przedbajkala są wątpliwe, okazów ich dotąd nie dostarczono. Wymieniam je, ażeby wskazać na konieczność badań nowych, w tym kierunku prowadzonych.

3. Przedstawiając głównie rezultaty badań Taczanowskiego, wypowiedziane w wielkiej jego pracy, nie uwzględniam po większej części poglądów jego dawniejszych, tak np. nie podaję odmiany *Anser cinereus*, var. *rubrirostris* Swinh. którą Taczanowski w roku 1877 uznawał za uzasadnioną; nie wspominam także o dwóch odmianach: *Anser segetum* (*Melanonyx serrirostris* Swinh. i *Anser segetum* var. *mentalis* Oates. Taczanowski był w swej ostatniej pracy przeciwnikiem tworzenia odmian na podstawie cech mniej wydatnych, swoje poglądy w tej kwestyi wypowiedział przy opisie formy *Picus minor kamtschatkensis* (str. 810—811). Obecnie zdanie jego zostało pokonane i avifauna wschodniej Syberyi musi być na nowo opracowana, ze stanowiska nowych poglądów, dominujących w ornitologii.

Jako godny następca kustosza Taczanowskiego, w kwestyi znajomości avifauny Europy i Azji, lecz stojący już na stanowisku nowych zapatrywań naukowych, objął był posadę kustosza przy zbiorach muzealnych, p. Janusz Domaniewski. Cieszyłem się nadzieją, że dalsze prace, w kierunku gorąco upragnionym przezemnie, będą podjęte i szczęśliwie dokonane. Złe losy atoli rozwiały te nadzieje.

Pozostawiając przysłemu historykowi wszechnicy warszawskiej ocenienie sprawiedliwe warunków, zmuszających p. J. D. do usunięcia się z posady kustosza, a zarazem i poznanie jakości krzywdy przez to wyrządzonej nauce w ogólności, zaś specjalnie wiedzy naszej o avifaunie wschodniej Syberyi, wspomnę tu tylko w tem miejscu, o głębokiem uczuciu boleści, jakiego doznałem, dowiedziawszy się o fackie rzeczonym.

Miną długie lata, zanim się znajdzie odpowiednia siła do wykonania nieł twego ządania, tych chwil nie doczekam się niestety.

W spisie obecnym przedstawione są w możebnem skróceniu materiały dla przyszłych studyów nad tą niezmiernie interesującą avifauną, on dąć może jednocześnie także i ogólne wyobrażenie o tem, co pozostało jeszcze do uskutecznienia w przyszłości.

4. Rezultaty liczebne spisu niniejszego są następujące:

- a) Form azjatyckich gatunków, mamy 254.
 - b) Form europejskich gatunków, przeistoczonych w tak nazywane rasy azjatyckie, mamy 92.
 - c) Form europejskich gatunków, nie zmienionych pobylem w Azji, mamy 174.
 - d) Form amerykańskich gatunków, mamy 34.
 - e) Form australijskich gatunków, mamy 1.
- Ogółem mamy 555 form.

f) Nowych form opisanych i oznaczonych w tym spisie jest 6,6% całej avifauny wschodniej Syberyi. Taczanowski opisał 525 form, lecz przy opisie niektórych z nich wskazał na różnicę cech, mogących w przyszłości być użyte dla wyróżnienia odmiany. W spisie niniejszym podano 556 form, o 31 więcej, niż w dziele Taczanowskiego. Są to przeważnie formy kameczackie, przezemnie uznane za odmiany, tudzież formy europejskie widziane w „Przedbajkalu“, czyli w dolinie Jeniesieju i jego prawych dopływów. Te ostatnie formy są w spisie niniejszym znaczone terytoryalnie terminem „Przedbajkale“, więc łatwe do wyróżnienia od innych.

I. Gatunki azjatyckie.

Nr bież.	Nazwy systematyczne	Zalatają do			Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Europy	Ameryki	Azji	
Aquilidae (10 s.)					
1	<i>Aquila amurensis</i> Swinh.	—	—	—	Stepowe przestrzenie Daurji. Kraj amurski.
2	<i>Haliaeetus pelagicus</i> Pall.	—	×	—	Kamczatka. W. Komandorskie, kurylskie. Wybrz. M. Mandż.
3	— <i>Braconii</i> Tacz.	—	—	—	W. brzeża morza japońskiego i mandżurskiego.
4	— <i>leucoryphus</i> Pall.	—	—	—	Okolice połud. Bajkału, połud. Daurya.
Milvidae (46 s.)					
5	<i>Milvus melanotis</i> Temm. et Schleg.	—	—	—	Na całej przestrzeni, z wyjątkiem Kamczatki.
Buteonidae (56 s.) (patrz Nr 251)					
6	<i>Butastur indicus</i> Gm.	—	—	—	Wybrzeża morza mandżurskiego i japońskiego.
7	<i>Archibuteo hemilasius</i> Temm. et Schleg.	—	—	—	Połud. Bajkał. Daurya. Wybrzeża morza mandżurskiego.
Falconidae (71 s.)					
8	<i>Erythropus amurensis</i> Radde.	—	—	×	Daurya. Kraj amurski.
Asturidae (98 s.)					
9	<i>Astur candidissimus</i> Dyb.	—	—	—	Kamczatka. Wybrzeża morza ochockiego od strony lądu.
10	<i>Accipiter virgatus</i> Temm.	—	—	—	Połud. Bajkał. Daurya. Kraj amurski.
Circidae (112 s.)					
11	<i>Circus spilonotus</i> Kaup.	—	—	—	Południowy Bajkał, Daurya.
12	<i>Strigiceps melanoleucos</i> Forsk.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
Strigidae (122 s.)					
13	<i>Ninox hirsuta japonica</i> Temm. et Schleg.	—	—	—	Wybrzeża morza japońskiego.

B. DYBOWSKI

[364]

14	<i>Urrua Blakstoni</i> Seeb.	—	—	—	Dolina Sidemi, w pobliżu Władywestoka.
15	<i>Scops semitorques</i> Temm. et Schleg.	—	—	—	Wybrzeża morza japońskiego.
Caprimulgidae (161 s.)					
16	<i>Caprimulgus jotaca</i> Temm. et Schleg.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
Cypselidae (166 s.)					
17	<i>Chaetura caudacuta</i> Lath.	—	—	—	Jakuck. Irkuck. Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
18	<i>Cypselus pacificus</i> Lath.	—	—	—	Wszędzie i na Kamczatce prawdopodobnie widziane ale nie zdobyte okazy.
Hirundinidae (173 s.)					
19	<i>Hirundo gutturalis</i> Scop.	—	—	—	Kamczatka.
20	<i>Cecropis daurica</i> L.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
Coraciidae (189 s.)					
21	<i>Euristomus orientalis</i> Bodd.	—	—	—	Wybrzeża morza japońskiego.
Alcedidae (192 s.)					
22	<i>Entomobia pileata</i> Bodd.	—	—	—	Wyspa Askolda, na morzu mandżurskim.
Meliphagidae (198 s.)					
23	<i>Zosterops erythropleura</i> Swinh.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
Timelidae (296 s.)					
24	<i>Troglodytes fumigatus</i> Dyb. Tacz.	—	—	—	Wyspa Askolda.
25	— <i>dauricus</i> Dyb. Tacz.	—	—	—	Daurya. Wybrzeża morza japońskiego.
26	— <i>pallascens</i> Dyb. Tacz.	—	—	—	Wyspy Komandorskie.
Cinclidae (211 s.)					
27	<i>Cinclus Pallasi</i> Temm.	—	—	—	Południowe wybrzeża Bajkału, Daurya.
28	— <i>sordidus</i> Gould.	—	—	—	" " " "
29	— <i>leucogaster</i> Bp.	—	—	—	" " " "
Accentoridae (217 s.)					
30	<i>Accentor montanellus</i> Pall.	×	—	—	Wszędzie we wschodniej Syberji z wyjątkiem Kamczatki.

[365]

SPIS SYSTEMATYCZNY GATUNKÓW I RAS

5

Nr. bież.	Nazwy systematyczne	Zalazują do			Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Europy	Ameryki	Asyji	
31	<i>Accentor dauricus</i> . Taczan. (<i>Fulvescens</i> Se-wiertzow).	-	-	-	Daurya. Argun.
32	<i>Accentor erythropygius</i> Swinh.	-	-	-	Góry Chamardabańskie.
33	-- <i>altaicus</i> . Brandt.	-	-	-	" "
Sylvidae (224 s.)					
34	<i>Horornis squamiceps</i> Swinh.	-	-	-	Kraj ussuryjski.
35	<i>Calamoherpe</i> Maacki. Schrenk.	-	-	-	Południowa Daurya. Kraj ussuryjski.
36	<i>Calamodyta certhiola</i> . Pall.	-	-	-	Wszędzie w Syberii wschodniej, z wyjątkiem Kamczatki.
37	-- <i>ochotensis</i> . Midd.	-	-	-	Ochock. Kamczatka. Wyspy komandorskie.
38	<i>Locustella fasciolata</i> . Gr.	-	-	-	Daurya. Kraj ussuryjski.
39	-- <i>Taczanowskii</i> . Swinh.	-	-	-	Irkuck. Daurya. Ba kał.
40	-- <i>lanceolata</i> . Temm.	-	-	-	Wszędzie i na Kamczatce
41	<i>Dumeticola thoracica</i> . Blyth.	-	-	-	Południowe wybrzeża Bajkału. Daurya.
42	<i>Phyllopneuste borealis</i> . Blasius	X	-	-	Wszędzie i na Kamczatce.
43	-- <i>xanthodrias</i> . Swinh.	-	-	-	Kamczatka.
44	-- <i>plumbeitarsus</i> . Swinh.	X	-	-	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
45	-- <i>coronatus</i> . Temm et Schleg.	-	-	-	Południowa Syberya. Kraj amurski i ussuryjski.
46	-- <i>tenelipes</i> . Swinh.	-	-	-	Wyspa Sachalin, prawdopodobnie wybrzeża morza japońskiego.
47	-- <i>serciliosa</i> . Gm.	X	-	-	Od Dauryi po ocean.
48	-- <i>tristis</i> Blyth.	-	-	-	Południowe wybrzeża Bajkału. Daurya.
49	-- <i>proregulus</i> . Pall.	-	-	-	Wszędzie we wschodniej Syberii, bez Kamczatki.
50	<i>Arundinax aedon</i> . Pall.	-	-	-	Od Bajkału po Ocean, bez Kamczatki
51	<i>Luscinola fuscatus</i> . Blyth.	-	-	-	Wszędzie we wschodniej Syberii bez Kamczatki.
52	-- <i>Homayeri</i> . Dyb.	-	-	-	Kamczatka.
53	-- <i>Schwarzi</i> . Radde.	-	-	-	Wszędzie we wschodniej Syberii bez Kamczatki.
54	<i>Cettia canturiens</i> Swinh.	-	-	-	Wybrzeże morza japońskiego.
55	-- <i>minuta</i> . Swinh.	-	-	-	Wyspa Askolda.
56	<i>Philomela Hafizi</i> . Siewiertzow.	-	-	-	Uśola pod Irkuckiem nad Angara.

Turdidae (279 s.)					
57	<i>Larvivora cyane</i> . Pall.	-	-	-	Od Bajkału po ocean bez Kamczatki.
58	-- <i>sibilans</i> . Swinh.	-	-	-	Daurya. Darasuń. Ussuri. Sungacza. Sidemi.
59	<i>Nemura cyanura</i> . Pall.	-	-	-	Wszędzie we wschodniej Syberii i na Kamczatce.
60	<i>Eritacus calliope</i> . Pall. (<i>S. kamtschatkensis</i> . Gm. Kittl.)	X	-	-	Wszędzie we wschodniej Syberii i na Kamczatce.
61	<i>Ruticilla aurea</i> . Pall.	-	-	-	Od Bajkału po ocean, bez Kamczatki.
62	-- <i>erythronota</i> . Everm.	-	-	-	Południowe wybrzeża Bajkału.
63	-- <i>erythrogastra</i> . Guld.	-	-	-	Daurya.
64	<i>Monticola solitaria</i> Müll.	-	-	-	Wybrzeża morza japońskiego.
65	-- <i>gularis</i> . Swinh.	-	-	-	" " " " " "
66	<i>Merula mandarina</i> . Bp.	-	-	-	Wybrzeża około zatoki De Castries.
67	<i>Oreocincla varia</i> . Pall.	X	-	-	Wszędzie we wschodniej Syberii, bez Kamczatki.
68	-- <i>sibirica</i> . Pall.	X	-	-	" " " " " "
69	<i>Turdus fuscatus</i> . Pall.	X	-	-	" " " " " "
70	-- <i>Naumanni</i> . Serb.	X	-	-	" " " " " "
71	-- <i>ruficollis</i> . Pall.	X	-	-	" " " " " "
72	-- <i>atrogularis</i> . Pall.	X	-	-	Południowe wybrzeża Bajkału.
73	-- <i>obscurus</i> . Gm.	X	-	-	Wszędzie i na Kamczatce.
74	-- <i>pallidus</i> . Gm.	-	-	-	Kraj amurski i ussuryjski.
75	-- <i>pelios</i> Bp.	-	-	-	Kraj ussuryjski.
76	-- <i>chrysolaus</i> . Temm.	-	-	-	Na Ussuri u jego wybrzeży.
Saxicolidae (247 s.)					
77	<i>Saxicola isabellina</i> . Rüppel.	X	-	X	Południowa Daurya. Południowy Bajkał.
78	<i>Pratinca indica</i> . Blyth. (<i>saxicola rubicola</i> Pall.)	-	-	-	Bajkał, południowe brzegi Ussuri.
Motacillidae (361 s.) (patrz Nr 252)					
79	<i>Budytes taiwanus</i> . Swinh.	-	-	-	Południowa Daurya.
80	-- <i>citreolus</i> . Pall.	X	-	-	Wszędzie we wsch. Syberii, a według Pallasia na Kamczatce.
81	<i>Limnoidromus indicus</i> . Gm.	-	-	-	Kraj ussuryjski, wybrzeża morza japońskiego.
82	<i>Pipastes maculatus</i> Hodds.	-	-	-	Wschodnia Syberya bez Kamczatki.
83	<i>Anthus Gustavi</i> . (patrz Nr 252)	-	-	-	Daurya. Kamczatka.
84	-- <i>striolatus</i> . Blyth.	-	-	-	Południowa Daurya. Kiachta.
85	-- <i>pennsylvanicus</i> . Lath.	X	X	-	Wsch. Syberya cała. W Ameryce. Wypadkowo w Europie.

Nr bież.	Nazwy systematyczne	Załączają do			Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Europy	Ameryki	Afryki	
Alaudidae (411 s.)					
86	<i>Melanocorypha mongolica</i> . Pall.	—	—	—	Południowa Daurya.
87	— <i>limaculata</i> . Menetr.	—	—	—	Między Krasnojarskiem a Irkuckiem (niepewna obserwacja).
Paridae (426 s.)					
88	<i>Parus minor</i> . Temm et Schleg.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
89	<i>Aegialus consobrinus</i> . Swinh.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
Paradoxornidae (450 s.)					
90	<i>Suthora webbiana mantschurica</i> . Tacz.	—	—	—	Wybrzeża morza japońskiego.
Ampelidae (452 s.)					
91	<i>Ampelis phoenicoptera</i> . Temm. (<i>A. japonica</i> Siebold)	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski. Kraj czuchocki. (Jeden egzemplarz zdobyty ekspedycją Bar. Maydla).
Oriolidae (457 s.)					
92	<i>Oriolus diffusus</i> . Sharpe.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
Campophagidae (462 s.)					
93	<i>Pericrocotus cinereus</i> . Lafr.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
Muscicapidae (464 s.)					
94	<i>Butalis latirostris</i> . Raffl.	—	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
95	<i>Hemichelidon sibirica</i> . L.	—	—	—	" " " "
96	<i>Butalis griseosticta</i> . Swinh.	—	—	—	Sidemi.
97	<i>Erythrosterina luteola</i> . Pall.	—	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
98	<i>Xanthopygia narcessina</i> . Temm.	—	—	—	Południowy Bajkał po ocean.
99	— <i>tricolor</i> . Harth.	—	—	—	" " " "
100	<i>Cyanoptila cyanomelaena</i> . Temm.	—	—	—	" " " "

Laniidae (465 s.)					
101	<i>Lanius Seebohmi</i> . Gadow.	—	—	—	Kraj amurski.
102	— <i>major</i> . Pall.	—	—	—	Wszędzie we wschodniej Syberii i na Kamczatce.
103	— <i>sphenocercus</i> . Cab.	—	—	—	Wybrzeża morza japońskiego.
104	<i>Otomela phoenicura</i> . Pall.	—	—	—	Wszędzie we wschodniej Syberii i na Kamczatce.
105	— <i>supercilliosa</i> . Lath.	—	—	—	Wyspa Askolda.
106	— <i>lucionensis</i> . L.	—	—	—	" "
107	— <i>speculigera</i> . Tacz.	—	—	—	Południowa Daurya.
108	<i>Enneoctonus tigrinus</i> . Drapier.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
109	<i>Phoneus bucephalus</i> . Temm.	—	—	—	" "
Corvidae (506 s.)					
110	<i>Cyanopoliis cyanus</i> . Pall.	—	—	—	Od Bajkału po wybrzeża oceanu.
111	<i>Corvus macrorhynchus japonicus</i> . Bp.	—	—	—	Udski Ostrog. Stretieńsk, kraj amurski i ussuryjski.
Sturnidae (542 s.)					
112	<i>Sturnus cinereus</i> . Temm.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
113	<i>Temenuchus dauricus</i> . Pall. (<i>Heterornis</i>)	—	—	—	" " " "
Emberizidae (549 s.)					
114	<i>Emberiza spodocephala</i> . Pall.	×	—	—	Wszędzie.
115	— <i>personata</i> . Temm.	—	—	—	Wyspa Sachalin. Prawdopodobnie i wybrzeża morza japońsk.
116	— <i>elegans</i> . Temm.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
117	— <i>chrysophris</i> . Pall.	—	—	—	" "
118	— <i>rustica</i> . Pall.	×	—	—	Wszędzie i na Kamczatce.
119	— <i>Tristrami</i> . Swinh.	—	—	—	Południowa Daurya i kraj ussuryjski.
120	— <i>Jankowskii</i> . Tacz.	—	—	—	Sidemi.
121	— <i>fucata</i> . Pall.	—	—	—	Południowa Daurya. Kraj ussuryjski.
122	— <i>cioides</i> . Brandt.	—	—	—	Jeniesiej. Udski Ostrog. Bajkał po ocean.
123	— <i>castaneiceps</i> . Moore.	—	—	—	Wybrzeża Mandżuryi.
124	— <i>Godlewskii</i> . Tacz.	—	—	—	Południowe wybrzeża Bajkału.
125	— <i>leucocephala</i> . Gm. (<i>pythiornis</i> . Pall.)	×	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
126	— <i>pusilla</i> . Pall.	×	—	—	" " " "
127	<i>Euspiza aureola</i> . Pall.	×	—	—	Wszędzie i na Kamczatce.

Nr bież.	Nazwy systematyczne	Zalatyją do			Rozmieszczenie gatunków po Syberyi wschodniej
		Europy	Ameryki	Afryki	
128	<i>Euspiza rutila</i> . Pall.	—	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
129	— <i>variabilis</i> . Temm.	—	—	—	Wybrzeża morza mandżurskiego. Kamczatka.
	Fringilidae (612 s.) (Loxiinae Tacz.)				
130	<i>Leucosticte arctoa</i> . Pall.	—	—	—	Południowe wybrzeża Bajkału. Birjusa.
131	— <i>brunneinucha</i> . Braudt.	—	—	—	Bajkał. Kraj ussuryjski. Kamczatka. Wyspy Komandorskie.
132	— <i>Giglioli</i> . Salvadori.	—	—	—	Bajkał. Daurya.
133	<i>Propasser rubicilla</i> . (Sewertzowi. Sharp.)	—	—	—	Birjusa.
134	— <i>roseus</i> . Pall.	—	—	—	Wszędzie z wyjątkiem Kamczatki.
135	<i>Uragus sibiricus</i> . Pall.	—	—	—	" " " "
136	— <i>sanguinolentus</i> . Temm.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
137	<i>Carduelis orientalis</i> . Bp. (<i>caniceps</i> Vig.)	—	—	—	Południowe wybrzeża Bajkału.
138	<i>Chrysomitris Dybowskii</i> . Tacz.	—	—	—	Południowe wybrzeża morza mandżurskiego.
139	<i>Chlorospiza kawarabiba</i> . Temm.	—	—	—	Kamczatka.
140	— <i>sinica</i> . L.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
141	<i>Eophona personata</i> . Temm.	—	—	—	" "
142	— <i>melanura</i> . Gm.	—	—	—	" "
143	<i>Pusser rutilans</i> . Temm.	—	—	—	" "
144	<i>Pyrrhula griseiventris rosacea</i> . Seeb.	—	—	—	Udski Ostrog. Kraj amurski i ussuryjski.
145	— <i>cineracea</i> . Cab.	—	—	—	Bajkał. Daurya.
	Cuculidae (685 s.)				
146	<i>Cuculus striatus</i> . Drapier.	—	—	—	Wszędzie i na Kamczatce.
147	— <i>poliocephalus</i> . Lath.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
148	<i>Hierococyx sparverioideus</i> . Vig.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
	Picidae (697 s.)				
149	<i>Yungipicus Dörriesi</i> . Hargitt.	—	—	—	Kraj południowo ussuryjski.
150	— <i>kizuki</i> Seeböhm. Hargitt.	—	—	—	" " "

	Columbidae (729 s.)				
151	<i>Columba fusca</i> . Gm.	—	—	—	Wybrzeża Jeniesieja. Krasnojarsk.
152	<i>Turtur rupicola</i> . Pallas.	—	—	—	Wszędzie z wyjątkiem Kamczatki.
153	— <i>torquatus</i> . Tacz.	—	—	—	Marijńsk na Amurze. (Maksimowicz).
154	— <i>humilis</i> . Temm.	—	—	—	Nerczyńsk górniczy. Wyspa Askolda.
	Pteroclididae (740 s.)				
155	<i>Syrhaptes paradoxus</i> . Pall.	×	—	×	Stepowe przestrzenie Dauryi.
	Tetraonidae (744 s.)				
156	<i>Canace falcipennis</i> . Hartb.	—	—	—	Sachalin. Amur dolny.
157	<i>Tetrao urogalloides</i> . Midd.	—	—	—	Bajkał. Daurya. Góry Stanowe. Wybrzeża morza Ochock'ego.
158	— <i>kamtschaticus</i> . Kittl.	—	—	—	Kamczatka.
	Perdricidae (744 s.)				
159	<i>Megaloperdix altaica</i> ? Gebl.	—	—	—	Góry tunkinskie.
160	<i>Perdix barbata</i> . Verr.	—	—	—	Od Bajkału po ocean.
161	<i>Coturnix ussuriensis</i> . Bohdanów.	—	—	—	Daurya. Kraj ussuryjski.
	Turnicidae (783 s.)				
162	<i>Hemipodius maculatus</i> . Vieill.	—	—	—	Południowy kraj ussuryjski.
	Phasianidae (785 s.)				
163	<i>Phasianus torquatus</i> . Temm.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
	Otididae (791 s.)				
164	<i>Otis Dybowskii</i> Tacz.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski.
	Gruidae (796 s.)				
165	<i>Grus monachus</i> . Temm.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
166	— <i>leucauchen</i> . Temm.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski.
167	— <i>viridirostris</i> . Vieij.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
168	— <i>leucogeranus</i> . Pall.	×	—	—	Daurya. Kraj ussuryjski.
	Glareolidae (331 s.)				
169	<i>Glareola orientalis</i> . Leach.	—	—	—	Południowa Daurya. Abahajtuj. (Radde).

Nr bież.	Nazwy systematyczne	Zalatają do			Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Europy	Ameryki	Asyji	
Charadriidae (815 s.)					
170	<i>Charadrius fulvus</i> . L.	—	—	—	Wszędzie.
171	<i>Aegialitis mongolicus</i> . Pall.	×	—	—	Wybrzeża Morza ochockiego. Daurya. Amur. Kameczatka.
172	— <i>placidus</i> . Gr.	—	—	—	Wyspa Askolda. Sidemi.
173	— <i>cantianus</i> . Lath.	—	—	—	" " "
Totaniidae (855 s.)					
174	* <i>Terekia cinerea</i> . GÜLD.	×	—	—	Wybrzeża Morza ochockiego. Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
175	<i>Aetitis incanus</i> . Gm.	—	—	—	Wszędzie.
176	<i>Pseudototanus guttifer</i> . Nordm.	—	—	—	Kameczatka. Wyspy Komandorskie.
177	<i>Totanus glareola</i> . L.	×	—	—	Wszędzie i na Kameczatce.
178	<i>Heteroscelus brevipes</i> . Vieil.	—	—	—	Daurya. Kameczatka.
179	— <i>incanus</i> . Gm.	—	—	—	Wyspy Komand. (Ameryka). (Azja i Amer. wspólna ojczyzną)
Tringidae (884 s.)					
180	<i>Tringa crassirostris</i> . Temm et Schleg.	—	—	—	Wybrzeża morza ochockiego i mandżurskiego.
181	— <i>subminuta</i> Midd.	—	—	—	Wybrzeża mórz północnych i Kameczatka.
182	— <i>acuminata</i> . Horstf.	—	×	—	" " " " "
183	— <i>salina ruficollis</i> . Pall.	—	—	—	" " " " "
184	<i>Limicola sibirica</i> . Dresser.	×	×	—	Bajkał. Morze ochockie.
185	<i>Plidna subarquata</i> . GÜLD.	×	×	×	Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
186	<i>Eurynorhynchus pygmaeus</i> . L.	—	—	—	Wybrzeża oceanu lodowatego.
Lymosidae (929 s.)					
187	<i>Pseudoscolopax semipalmata</i> . Blyth. (<i>Micro-palama Taczanowskii</i> . 1 Verr.)	—	—	—	Południowa Daurya.
Numenidae (938 s.)					
188	<i>Numenius tahitiensis</i> . Swinh. (<i>cyranopus</i> Vieil.)	—	—	—	Wszędzie.
189	— <i>minutus</i> . Gould.	—	—	—	Bajkał. Daurya.

Scolopacidae.					
190	<i>Galinago bimialis</i> . Ewersm.	—	—	—	Wszędzie, pojedynczo, terytoryalnie rozdzielony.
191	— <i>megala</i> . Swinh. (<i>heterocerca</i> . Cab.)	—	—	—	Bajkał. Daurya. Amur. Ussuri.
192	— <i>stenura</i> . Cuhl.	—	×	—	Cała Syberya wschodnia.
Tantalidae (937 s.)					
193	<i>Nipponia nippon</i> . Temm.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
Plataleidae (937 s.)					
194	<i>Platalea major</i> . Temm et Schleg.	—	—	—	Step barabiński. Daurya. Kraj ussuryjski.
Ciconiidae (973 s.)					
195	<i>Ciconia boyciana</i> . Swinh.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
Ardeidae (976 s.)					
196	<i>Bubulcus coromandus</i> . Bodd.	—	—	—	Kraj ussuryjski.
197	<i>Ardea leucoptera</i> Bodd. (<i>prasinoscelis</i> Hume)	—	—	—	Kiachta. Sidemi.
198	<i>Butorides macrorhynchus</i> . Swinh. (<i>javanicus</i> amurensis. Steineger).	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
199	<i>Ardetta sinensis</i> . Gm.	—	—	—	Wyspa Askolda.
200	— <i>eurythma</i> . Swinh.	—	—	—	Południowa Daurya. Kraj ussuryjski.
Rallidae (993 s.)					
201	<i>Porzana undulata</i> . Tacz. (<i>erythrogastra</i> Dyb.)	—	—	—	Daurya. Kraj ussuryjski.
202	— <i>pusilla</i> . Pall.	×	—	—	Bajkał. Daurya.
203	<i>Rallina mandarina</i> . Swinh.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
Sternidae (1004 s.)					
204	<i>Sterna paradisea</i> Brünn. (<i>longipennis</i> Steineg.)	—	—	—	Wszędzie.
205	— <i>kamtschatica</i> . Pall.	—	—	—	" "
206	<i>Sternula sinensis</i> . Pall.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
207	<i>Hydrochelidon fissipes</i> . Pall.	×	×	×	Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
Laridae (1018 s.) (patrz Nr 253)					
208	<i>Larus glaucescens</i> . Naum.	—	×	—	Morze ochockie, kameczackie, japońskie.

Nr bież.	Nazwy systematyczne	Zalazują do			Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Europy	Ameryki	Afryki	
209	<i>Larus schistisagus</i> . Stejneger.	—	×	—	Morze kamszackie. Wyspa Behringa. Morze japońskie.
210	— <i>crassirostris</i> Vieil.	—	—	—	Morze japońskie.
211	— <i>affinis</i> Reinh.	×	—	—	Od Europy do morza japońskiego.
212	— <i>cachianans</i> . Pall.	×	—	×	Wszędzie i na Kamszacie.
213	<i>Chroicocephalus Saundersi</i> . Swinh.	—	—	—	Sidemi.
214	<i>Rissa brevirostris</i> . Brandt.	—	×	—	Kamszatka. Wyspy Komandorskie.
Stercoraridae (1056 s.)					
215	<i>Stercorarius parasiticus</i> . L.	×	×	×	Kamszatka. W. Komand. Morze ochockie. Wybrzeża m. lodow.
216	— <i>longicaudus</i> . Briss.	×	×	×	" " " " " " " "
217	— <i>pomarinus</i> . Temm.	×	×	×	" " " " " " " "
Procellaridae (1064 s.)					
218	<i>Puffinus tenuirostris</i> . Temm.	—	×	—	Wyspy Komandorskie.
Diomedeidae (1069 s.)					
219	<i>Diomedea nigripes</i> . Aud.	—	×	×	Wyspy aleuckie. Kamszatka. (Bianchi).
220	— <i>albatrus</i> . Pall.	—	×	×	Kamszatka. Wyspy Komandorskie.
Phalacrocoracidae (1079 s.)					
221	<i>Phalacrocorax capillatus</i> . Temm et Schleg.	—	—	—	Wybrzeża morza japońskiego.
222	— <i>perspicillatus</i> . Pall.	—	—	—	Gatunek wytopiony na w. Behringa. Czy żyje dotąd na w. Karadze?
223	<i>Graculus pelagicus</i> . Pall.	—	—	—	Kamszatka. Wybrzeża morza japońskiego.
224	— <i>bicristatus</i> . Pall. (urile Gm.)	—	—	—	Kamszatka.
Anseridae (1084 s.)					
225	<i>Anser grandis</i> . Pall.	—	—	—	Jezioro Chanka.
226	— <i>Middendorffi</i> Stejneger.	—	—	—	Wszędzie.
227	<i>Chen hyperboreus</i> . Pall.	×	×	—	Kamszatka. W. Komandorskie. Wybrzeża oceanu lodowatego.
228	<i>E. labeia indica</i> . Lath.	—	—	—	Południowy Bajkał. Kosogol.

229	<i>Cygnopsis cygnoides</i> . Pall.	—	—	—	Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
230	<i>Philacte canagica</i> . Sewast.	—	×	—	Wybrzeża morza Behringa, po obu stronach.
Cygnidae (1112 s.)					
231	<i>Cygnus Davidi</i> . Swinh.	—	—	—	Zatoka Possjeta. Wybrzeża morza japońskiego.
232	— <i>minor</i> . Pall. (Bewickii. Yarr.)	×	—	—	Daurya. Czyta, (Moszyński).
Anatidae (1121 s.) (Nr 254. 255)					
233	<i>Aix galericulata</i> . L.	—	—	—	Kraj amurski i ussuryjski.
234	<i>Anas zonorhyncha</i> . Swinh.	—	—	—	Daurya i kraj ussuryjski.
235	— <i>formosa</i> . Georgi. (glocitans. Pall.)	×	—	—	Wszędzie.
236	— <i>falcata</i> . Georgi.	×	—	—	"
237	<i>Fulix Baeri</i> . Rüdde.	—	—	—	Południowa Daurya. Kraj ussuryjski.
238	<i>Somateria spectabilis</i> . L.	×	×	—	Tajmyr. Ujście Leny. Kamszatka.
239	<i>Enicometta Stelleri</i> . Pall.	×	×	—	Tajmyr. Boganida. Kamszatka. Wyspy Komandorskie.
Alcidae (1211 s.)					
240	<i>Brachyramphus marmor</i> . Brandt. (perdix Pall.)	—	—	—	Kamszatka. Morze japońskie.
241	— <i>Kittlitzii</i> . Brandt.	—	×	—	" " "
242	<i>Sythliboramphus antiquus</i> . Gm.	—	×	—	" " "
243	<i>Cephus carbo</i> . Pall.	—	×	—	" " "
244	— <i>columba</i> . Pall.	—	×	—	Kamszatka.
Phalaridae (1226 s.)					
245	<i>Phalaris psittaculus</i> . Pall.	—	×	—	Kamszatka.
246	<i>Ciceronia pusilla</i> . Pall.	—	×	—	"
247	<i>Simorhynchus cr. statellus</i> . Pall.	—	×	—	"
248	— <i>pygmaeus</i> . Gm. (kamtschaticus. Lepechin)	—	×	—	"
249	<i>Ceratorhina monoceata</i> . Pall.	—	×	—	Kamszatka. Morze japońskie.
Podicipidae (1251 s.)					
250	<i>Podiceps Holboellii</i> . Reinh.	—	×	—	Daurya. Kamszatka. Wyspy Komandorskie.
251	<i>Buteo plumipes</i> . Ho gs. (64 s.)	—	×	—	Bajkał południowy. Daurya. Kraj ussuryjski.
252	<i>Anthus Richardi</i> . Vieil. (395 s.)	—	×	—	Bajkał południowy. Daurya.
253	<i>Xema Sabinei</i> . L. (1046 s.)	×	×	×	Tajmyr. (Middendorff).
254	<i>Brania brenta</i> . Bris. (1104 s.)	×	×	—	Tajmyr.
255	— <i>ruficollis</i> . L. (1110 s.)	×	×	—	Boganida.

Łość form, zaliczonych do azjatyckich wynosi 255. Nr 175 wykreślony być powinien.

II. Gatunki europejskie.

Nr bież.	Nazwy systematyczne	Zalazują do		Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Afryki	Ameryki	
Vulturidae (6 s.)				
1	<i>Vultur monachus</i> . L.	×	—	Władywostok.
2	<i>Gypaëtus barbatus</i> . L.	×	—	Góry Sajańskie i Tunkińskie.
Aquilidae (10 s.)				
3	<i>Aquila chrysaëtos</i> . Brib.	—	×	Wszędzie.
4	— <i>nobilis</i> . Pall.	—	—	"
5	— <i>beliaca</i> . Saviga.	×	—	Bajkał. Daurya.
6	— <i>clanga</i> . Pall.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
7	— <i>pennata</i> . Gm.	×	—	Bajkał. Daurya.
8	<i>Haliaëtus albicilla</i> . L.	×	—	Wszędzie.
Pandionidae (52 s.)				
9	<i>Pandion haliaëtus</i> . L.	×	×	Wszędzie.
Buteonidae (56 s.)				
10	<i>Buteo ferox</i> . Bechst.	×	×	Okolice stepowe Dauryi.
11	<i>Archibuteo lagopus</i> . Brünn.	×	×	Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski. Kameczatka. W. Komandorskie.
Falconidae (71 s.)				
12	<i>Hierofalco islandus</i> . Brünn. (Briss.)	—	×	Kameczatka. Wyspy Komandorskie.
13	<i>Falco communis</i> . Gm.	×	×	Wszędzie.
14	— <i>subbuteo</i> . L.	×	—	"
15	<i>Lithofalco aesalon</i> .	×	—	Wszędzie bez Kameczatki.
16	<i>Erythropus vespertinus</i> . L.	×	—	Bajkał, Tunka, ostatnia granica na wschód.
17	<i>Cerchneis tinnunculus</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
Asturidae (98 s.)				
18	<i>Astur palumbarius</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
19	<i>Accipiter nisus</i> . L.	×	—	Wszędzie i na Kameczatce.

Circidae (112 s.)				
20	<i>Circus spilonotus</i> . Kaup.	—	—	Irkuck. Daurya. Sungacza.
21	<i>Strigiceps cyaneus</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
Strigidae (122 s.)				
22	<i>Surnia ulula</i> . L.	—	×	Wszędzie.
23	<i>Nyctea nivea</i> . L.	—	×	"
24	<i>Syrnium lapponicum</i> . Retz.	—	×	Lena. Irkuck. Bajkał. Daurya. Góry Burejańskie. Kameczatka?
25	— <i>uralense</i> . Pall.	—	—	Przedbajkale. Daurya.
26	<i>Nyctale Tengmalmi</i> . Gm.	—	×	Od Bajkału po ocean.
27	<i>Bubo bubo</i> . L.	×	—	S. demi.
28	<i>Otus otus</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
29	— <i>accipitrinus</i> . Pall.	×	×	Wszędzie i na Kameczatce.
Caprimulgidae (161 s.)				
30	<i>Caprimulgus europaeus</i> . L.	—	×	Krasnojarsk. Kraj Jakutów. Irkuck. Południowy Bajkał.
Cypselidae (166 s.)				
31	<i>Cypselus apus</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
Hirundinidae (173 s.)				
32	<i>Hirundo rustica</i> . L.	×	—	Przedbajkale. Krasnojarsk.
33	<i>Cotyle riparia</i> . Briss.	×	×	Wszędzie i na Kameczatce.
Upopidae (196 s.)				
34	<i>Upopa epops</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
Alcedinidae (192 s.)				
35	<i>Alcedo ispida</i> . L.	×	—	Przedbajkale. Krasnojarska gubernia.
Certhiidae (199 s.)				
36	<i>Certhia familiaris</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
Cinclidae (211 s.)				
37	<i>Cinclus aquaticus</i> . Brehm.	—	—	Przedbajkale.

Nr bież	Nazwy systematyczne	Zalatuja do		Rozmieszczenie gatunków po Syberji wschodniej
		Altyki	Ameryki	
	Sylvidae (224 s.)			
38	<i>Sylvia curruca</i> . L.	—	—	Bajkał. Daurya.
39	<i>Cyanecula suecica</i> L. (<i>coerulecula</i> . Pall.)	—	—	Wszędzie.
	Turdidae (279 s.)			
40	<i>Ruticilla phoenicurus</i> . L.	—	—	Bajkał południowy. Dolina Irkutu.
41	<i>Turdus viscivorus</i> . L.	×	—	" " "
42	— <i>pilaris</i> . L.	×	—	Bajkał. Daurya.
43	— <i>iliacus</i> . L.	×	×	Jeniesiej. Usole. Angara.
44	— <i>musicus</i> L.	×	×	Bajkał południowy. Dolina Irkutu.
	Saxicolidae (347 s.)			
45	<i>Saxicola morio</i> . Hempr et Ehrenb.	×	×	Daurya.
46	— <i>oenanthe</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
	Matacillidae (361 s.)			
47	<i>Calobates melanope</i> . Pall.	×	—	Wszędzie i na Kamczatce.
48	<i>Budytes flava</i> . L.	×	×	Wszędzie.
49	<i>Anthus striolatus</i> . Blyth.	×	—	Daurya.
50	— <i>cervinus</i> . Pall.	×	×	Wszędzie.
51	— <i>pratensis</i> . L.	×	×	Bajkał południowy.
	Alaudidae (411 s.)			
52	<i>Calandrella brachydactyla</i> . Leis.	×	—	Bajkał. Daurya.
53	<i>Alauda arvensis</i> . L.	×	—	Krasnojarsk. Jakuck.
54	<i>Otocoris alpestris</i> . L.	—	—	Bajkał południowy. Daurya.
	Paridae (426 s.)			
55	<i>Parus major</i> . L.	—	—	Wszędzie.
56	— <i>ater</i> . L.	—	—	"

57	<i>Cyanistes cyanus</i> . Pall.	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
58	<i>Mecistura caudata</i> . L.	—	—	Wszędzie.
	Ampelidae (452 s.)			
59	<i>Ampelis garrulus</i> . L.	—	×	Wszędzie.
	Oriolidae (457 s.)			
60	<i>Oriolus galbula</i> . L.	×	—	Przedbajkale.
	Muscicapidae (464 s.)			
61	<i>Butalis grisola</i> . L.	×	—	Usole. Dolina Irkutu. Bajkał południowy.
	Laniidae (485 s.)			
62	<i>Enneactonus collaris</i> . L.	—	—	Przedbajkale.
	Corvidae (506 s.)			
63	<i>Perisoreus infaustus</i> . L.	—	—	Przedbajkale.
64	<i>Corvus cornix</i> . L.	×	—	Jeniesiej. Wyjątkowo Bajkał.
65	— <i>corone</i> . Pall.	—	—	Przedbajkale.
66	<i>Nucifraga caryocatactes</i> . L.	—	—	Wszędzie i na Kamczatce.
	Sturnidae (542 s.)			
67	<i>Sturnus vulgaris</i> . Pall.	—	—	Przedbajkale.
	Emberizidae (549 s.)			
68	<i>Plectrophanes nivalis</i> . L.	×	—	Daurya. Amur. Tajmyr. Kamczatka.
69	<i>Calcarius lapponicus</i> . L.	×	—	Tajmyr. Boganida. Daurya. Amur. Kamczatka.
70	<i>Emberiza citrinella</i> . L.	—	—	Krasnojarsk. Kańsk.
71	<i>Schoenicola arundinacea</i> . Bris. (<i>S. schoenic</i> . L.)	—	—	Wszędzie i na Kamczatce.
	Fringillidae (613 s.)			
72	<i>Passer domesticus</i> . L.	×	×	Daurya. Kraj amurski.
73	— <i>montanus</i> . L.	—	—	Od Jeniesieja po ocean.
74	<i>Chrysomitris spinus</i> . L.	—	—	Udski Ostrog. Góry Burejańskie.
75	<i>Fringilla montifringilla</i> . L.	—	—	Wszędzie i na Kamczatce.
76	<i>Acanthis linaria</i> . L.	×	×	" " " "

Nr bieg.	Nazwy systematyczne	Z latują do		Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Afryki	Ameryki	
77	<i>Acenthis Hornemanni</i> exil' pes. Steieger.	—	×	Wszędzie i na Kameczatce.
78	<i>Carpodacus erythrinus</i> . Pall.	—	—	Wszędzie i na Kameczatce jako odmiana: <i>Grebnitzkii</i> . Steiner Gm.
79	<i>Corythus enucleator</i> . L.	—	—	Udski Ostrog. Kraj ussuryjski.
80	<i>Pyrrhula coccinea</i> . Selys (<i>rubicilla</i> . Schäf.) Loxidae (674 s.)	—	×	Bajkał. Daurya. Kameczatka? jako odm.: <i>kameczatkensis</i> Tacz.
81	<i>Loxia curvirostra</i> . L.	—	—	Prawie wszędzie, według Pall. i Stellera i na Kameczatce.
82	— <i>bifascia</i> a. Brehm. Cuculidae (696 s.)	—	—	Wszędzie i na Kameczatce.
83	<i>Cuculus canorus</i> . L. Picidae (697 s.)	×	—	Przedbajkale.
84	<i>Jynx torquilla</i> . (Jynx) L.	×	—	Udski Ostrog. Bajkał po ocean.
85	<i>Gecinus canus</i> . Gm.	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
86	<i>Dryopicus martius</i> . L.	—	—	Wszędzie i Kameczatka? (według wskazówek niepewnych).
87	<i>Picus leucocottus</i> . Bechts.	—	—	Wszędzie, bez Kameczatki.
88	<i>Picus major</i> . L.	—	—	" " " "
89	— <i>minor</i> . L. Colymbidae (729 s.)	—	—	Daurya. Kraj ussuryjski.
90	<i>Columba livia</i> . L. Tetraonidae (744 s.)	—	—	Przedbajkale.
91	<i>Tetrao urogallus</i> . L.	—	—	Krasnojarsk:
92	<i>Lyrurus tetrix</i> . L.	—	—	" " " "
93	<i>Tetrastes bonasia</i> . L.	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kameczatki.
94	<i>Lagopus albus</i> . Gm.	—	—	Wszędzie.
95	<i>Lagopus alpinus</i> . Nils.	—	—	"

	Perdidae (775 s.)			
96	<i>Perdix cinerea</i> . Latk.	—	—	Przedbajkale.
97	<i>Coturnix communis</i> . Bonn.	×	—	Przedbajkale. Dolina Irkutu.
	Gruidae (796 s.)			
98	<i>Grus cinerea</i> . Keys. et Blasius.	×	—	Lena. Kołyma. Anadyr. Bajkał. Daurya.
99	<i>Anthropoides virgo</i> . L.	×	—	Daurya.
	Charadriidae (815 s.)			
100	<i>Endromias morinellus</i> . L.	—	—	Tajmyr. Boganida. Bajkał. Daurya. Kameczatka.
101	<i>Aegialitis hiaticula</i> . L.	×	×	" " " " "
102	— <i>minor</i> . Wolf et Meyer.	×	—	" " " " "
103	— <i>cantiana</i> Boie	×	—	Południowa Daurya. Wyspa Askolda.
104	<i>Squatarola helvetica</i> . Bris.	×	×	Wszędzie.
105	<i>Vanellus cristatus</i> . Wolf et Meyer.	×	—	Od Bajkału po ocean.
106	<i>Calidris arenaria</i> . L.	×	×	Boganida. Daurya.
	Haematopodidae (843 s.)			
107	<i>Stropsilas interpres</i> . L.	xx	—	Wszędzie.
	Phalaropidae (848 s.)			
108	<i>Phalaropus cinereus</i> . Bris.	—	—	Bajkał. Daurya. Kameczatka.
109	<i>Crymophilus fularicus</i> . Bp.	—	—	Tajmyr. Boganida.
	Recurvirostridae (453 s.)			
110	<i>Recurvirostra avocetta</i> . L.	×	—	Bajkał południowy. Daurja.
	Totaniidae (855 s.)			
111	<i>Actitis hypoleucos</i> . L.	×	×	Wszędzie.
112	<i>Totanus glottis</i> . L.	×	×	" " " " "
113	— <i>stagnalis</i> . Bechst.	×	×	Wybrzeża morza ochockiego. Arguń. Kraj ussuryjski.
114	— <i>fuscus</i> . L.	×	—	Wszędzie.
115	— <i>calidris</i> . Pall.	×	—	Wyspy Szantarskie. Daurya. J. Chanka. Sidemi.
116	— <i>ochropus</i> . L.	×	×	Bajkał. Jezioro Chanka. Kameczatka. Dolny Amur.

Nr bież.	Nazwy systematyczne	Zalazują do		Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Afryki	Ameryki	
	Tringidae (884 s.)			
117	<i>Machetes pugnax</i> . Bris.	×	×	Wszędzie.
118	<i>Tringa canutus</i> . L.	×	×	Tajmyr. Boganida. Mikołajewsk. Bajkał.
119	— <i>maritima</i> . Brün.	×	×	Tajmyr.
120	— <i>Temmincki</i> . Leislr.	×	×	Bajkał. Daurya. Jezioro Chanka.
121	<i>Pelidna subarquata</i> . Briss.	×	×	Tajmyr. Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
	Limosidae (929 s.)			
122	<i>Limosa lapponica</i> . Briss.	—	—	Jeniesiej u ujścia.
	Scolopacidae (948 s.)			
123	<i>Scolopax rusticola</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
124	<i>Gallinago scolopacina</i> . Bp.	×	×	Wszędzie.
125	<i>Limnocyptes gallinula</i> . L.	×	—	Boganida.
	Ciconidae (973 s.)			
126	<i>Ciconia nigra</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
	Ardeidae (976 s.)			
127	<i>Ardea cinerea</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
128	<i>Egretta alba</i> . L.	×	×	Daurya. Kraj ussuryjski.
129	<i>Botaurus stellaris</i> . L.	×	—	Od Leny po ocean.
	Phoenicopteridae (993 s.)			
130	<i>Phoenicopterus ruber</i> . L.	—	×	Irkuck. (Jedyny okaz zdobyty).
	Rallidae (993 s.)			
131	<i>Porzana pusilla</i> . Pall.	—	—	Od Bajkału po ocean.

22

E. DYBOWSKI

[382]

	Gallinulidae (1000 s.)			
132	<i>Gallinula chloropus</i> . L.	×	—	Nad Ononem.
133	<i>Fulica atra</i> . L.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
	Sternidae (1004 s.)			
134	<i>Gelochelidon nilotica</i> . Hasselqu.	×	—	Taraj-nor. Sidemi.
135	<i>Sylochelidon caspia</i> . Pall.	×	—	Daurya. Jezioro Chanka. Sidemi.
	Laridae (1018 s.)			
136	<i>Larus canus</i> . L.	×	×	Mikołajewsk na Amurze. Kamczatka.
137	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> . L.	×	—	Wszędzie.
138	— <i>minutus</i> . Pall.	×	—	Morze ochockie. Bajkał. Daurya.
139	<i>Rissa tridactyla</i> . L.	×	×	Tajmyr. Kraj Czukezów.
	Phalacrocoracidae (1072 s.)			
140	<i>Phalacrocorax carbo</i> . L.	×	—	Bajkał. Daurya. Wybrzeża morza mandżurskiego.
	Anseridae (1084 s.)			
141	<i>Anser cinereus</i> . Wolf et Meyer.	×	—	Od Bajkału po ocean.
142	<i>Anser segetum</i> . L.	×	×	Wszędzie.
143	<i>Branta leucopsis</i> . Pall.	—	—	Tajmyr. Boganida.
	Cygnidae (1113 s.)			
144	<i>Cygnus olor</i> . Gm.	—	—	Daurya. Kraj ussuryjski.
145	— <i>ferus</i> . Ray.	—	—	Wszędzie.
146	— <i>minor</i> . Pall.	—	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
	Anatidae (1121 s.)			
147	<i>Casarca rutila</i> . Pall.	×	—	Bajkał. Daurya.
148	<i>Vulpanser tadorna</i> . L.	×	—	Południowa Daurya.
149	<i>Anas boschas</i> . L.	×	×	Wszędzie.
150	— <i>querquedula</i> . Briss.	×	—	"
151	— <i>crecca</i> . L.	×	×	"
152	<i>Dasila acuta</i> . L.	×	×	"
153	<i>Spatula clypeata</i> . Bris.	×	×	"

[383]

SPIS SYSTEMATYCZNY GATUNKÓW I RAS

23

Nr listy	Nazwy systematyczne	Zaliczona do		Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		Afrki	Ameryki	
154	<i>Chaulelasmus streperus</i> . L.	X	X	Wszędzie.
155	<i>Mareca penelope</i> . L.	X	X	"
156	<i>Aithya ferina</i> . L.	X	X	Bajkał. Daurya.
157	<i>Fulix marila</i> . L.	X	X	Wszędzie.
158	— <i>cristata</i> . David et Ons.	X	X	"
159	<i>Glaucion clangula</i> . L.	X	X	"
160	<i>Harelda (Cosmonetta) histrionica</i> . L.	X	X	"
161	— <i>gracialis</i> . L.	X	X	"
162	<i>Oidemia fusca</i> . L.	X	X	Jenieiej. Jana. Sachalin.
163	— <i>nigra</i> . Bris.	X	X	Tajmyr. Boganida.
Mergidae (1203 s.)				
164	<i>Mergus merganser</i> . L.	X	X	Wszędzie.
165	— <i>serrator</i> . L.	X	X	"
166	— <i>albellus</i> . L.	X	X	"
Podicipidae (1251 s.)				
167	<i>Podiceps cristatus</i> . L.	X	X	Jeziro Chanka.
168	— <i>cornutus</i> . L.	X	X	Udski Ostrog. Daurya. Sidemi.
169	— <i>auritus</i> . L.	X	X	Argun. Sidemi.
Alcidae (1911 s.)				
170	<i>Cephus Mandti</i> . Licht.	X	X	Cieśnina Behringa.
Colymbidae (1250 s.)				
171	<i>Colymbus arcticus</i> . L.	X	X	Wszędzie.
172	— <i>lumme</i> . Gunn. (<i>septentrionalis</i> . L.)	X	X	"

Ilość form zaliczonych do europejskich wynosi 174. (Do 172 dodać trzeba: *Branta brenta* i *Branta ruficollis*. [Patrz w spisie form azjatyckich].)

III. Gatunki amerykańskie.

Nr listy	Nazwy systematyczne	Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
1	<i>Aguillidae</i> (10 s.) (Patrz Nr 33 spis gatunków amerykańk.)	W. Behringa. Kamczatka. (Blanchi)
2	<i>Haliaeetus leuccephalus</i> . L.	Kamczatka. W. komandorskie.
3	<i>Falco Pealei</i> . Ridgw.	Kraj Jakucki.
4	<i>Turdus Altitae</i> . Baird.	Przyładek czukocki.
5	<i>Mniotiltidae</i> (357 s.)	"
6	<i>Dendroica coronata</i> . L.	Kraj czukocki.
7	<i>Hemicochla noveboracensis</i> . Gm.	Wyspy komandorskie.
8	<i>Emberizidae</i> (549 s.)	Kraj czukocki.
9	<i>Junco hiemalis</i> . L.	Kraj czukocki.
10	<i>Fringillidae</i> (612 s.)	Wyspy komandorskie.
11	<i>Leucotitte griseinucha</i> . Diantl.	Kraj czukocki.
12	<i>Gruidae</i> (796 s.)	Kraj czukocki.
13	<i>Grus fratercula</i> . Baird.	Kraj czukocki.
14	<i>Charadriidae</i> (815 s.)	Kraj czukocki.
15	<i>Charadrius dominicus</i> . Mill.	Zatoka Ojei na morzu mandżurskiem.
16	<i>Aegialitis semipalmata</i> . Kaup.	Zatoka Koluszki na oceanu lodow.
17	<i>Tringidae</i> (834 s.)	Zatoka Bielowskiego i zatoka Plover na wybrzeżu Syberii wsch.
18	<i>Tringa minutilla</i> . Vieil.	Kraj czukocki.
19	— <i>maculata</i> . Vieil.	Kraj czukocki.
20	— Bairdi. Cones.	Kraj czukocki.
21	<i>Tringites rufescens</i> . Vieil.	Przył. Wankarem w cieśn. m. Behringa.
22	<i>Eremetes occidentalis</i> . Lavr.	Półwysp czukocki.
23	<i>Numenidae</i> (938 s.)	Przyładek Wankarem.
24	<i>Numenius borealis</i> . Forst.	Przyładek Wankarem.
25	<i>Procellariidae</i> (1064 s.)	Wyspa miedziana.
26	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> . Vieil. (<i>Procellaria pelagica</i> Pall)	Wyspa Behringa.
27	— <i>lurcata</i> . Bp. (<i>Procell. furca</i> Gm.)	Zatoka De Castries m. mandżursk
28	<i>Sulidae</i> (1033 s.)	Wyspy komandorskie.
29	<i>Disporus piscator</i> . L.	Wyspy Behringa.
30	<i>Anatidae</i> (1121 s.)	Kamczatka. Wyspy komandorskie.
31	<i>Mareca americana</i> . Gm.	Wyspy komandorskie.
32	<i>Glaucion allcocki</i> . L.	Wyspy Behringa.
33	<i>Oidemia Steingeri</i> . Ridgw.	Kamczatka. Wyspy komandorskie.
34	— <i>perspicillata</i> . L.	Wyspy Behringa.
35	— <i>americana</i> . Sw. et Richards.	Kamczatka. Wyspy komandorskie.

Nr bieg.	Nazwy systematyczne	Rozmieszczenie gatunków po Syberji wschodniej
25	<i>Somateria v. nigrum</i> . Gr.	Kamczatka. Wyspy komandorskie.
26	<i>Lampronetta Fischeri</i> . Brandt. Cygnidae (1113 s.)	Półwysep czukocki.
27	<i>Cygnus colombianus</i> . Steineger. Sternidae (1113 s.)	Wyspa Behringa.
28	<i>Sterna aleutica</i> . Baird. Laridae (1118 s.)	Zatoka św. Laurentego. Sachalin.
29	<i>Larus barrovianus</i> . Ridgw.	Północne wybrzeże oceanu lodow.
30	<i>Rhodostetia rosea</i> . Macgill.	Kraj czukocki.
31	<i>Gavia alba</i> . Gunn. Colymbidae (1259 s.)	Kamczatka. Uka.
32	<i>Colymbus Adamsi</i> . Gray.	Kamczatka. Wyspy komandorskie. Zatoka Abreka.
33	<i>Haliaetus hypoleucus</i> . Ridgw. (36 s.)	Wyspa Behringa, (Gatunek bardzo wątpliwy). Wyspy Aleuckie.
34	<i>Podiceps nigricolis</i> . Brehm. (1148 s.)	Wiluj. W. komand. Daurya. Arguń. Ameryka jako właściwa ojczyzna.

Ilość gatunków amerykańskich wynosi Nrów 34.

IV. Gatunki australijskie.

Nr bieg.	Nazwa systematyczna	Rozmieszczenie gatunków po Syberji wschodniej
1	<i>Grus australasiana</i> . Gould. (801 s.)	Okolice Jakucka. (Pawłowski).

V. Rasy gatunków europejskich i amerykańskich.

Nr bieżący	Nazwy systematyczne	Rasy		Rozmieszczenie gatunków po Syberyi wschodniej
		gatunków europejsk.	gatunków amer. k.	
1	Aquilidae (10 s.) <i>Aquila chrysaetos daphanea</i> . Hodgs.	×	—	Kamczatka.
2	Buteonidae (56 s.) <i>Buteo vulgaris, plumipes</i> . Hodgs.	×	—	Bajkał. Daurya (Darasuń). Kraj ussuryjski.
3	Pernidae (50 s.) <i>Pernis apivorus orientalis</i> . Tacz.	×	—	Bajkał. Kraj ussuryjski.
4	Falconidae (71 s.) <i>Falco gyrfalco, Grebnitzkii</i> . Sewerzow.	×	—	Wyspa Behringa.
5	Strigidae (122 s.) <i>Glauclidium passerinum, orientale</i> , Tacz.	×	—	Bajkał. Daurya Ussuri.
6	<i>Syrnium uralense, fuscescens</i> , Tacz. Tem. et Schl.	×	—	Kraj ussuryjski.
7	<i>Athene noctua, plumipes</i> . Swinh.	×	—	Daurya.
8	<i>Bubo ignavus, sibiricus</i> . Schleg.	×	—	Bajkał. Daurya Amur.
9	<i>Scops giu, japonicus</i> . Temm et Schleg. Hirundinidae (173 s.)	×	—	Kraj ussuryjski.
10	<i>Hirundo rustica, erythrogastra</i> . Gr.	×	—	Udski Ostrog. Daurya.
11	— Tytleri. Jerd.	×	—	Irkućk. Kamczatka.
12	<i>Cotyle iparia, sinensis</i> . Gr.	×	—	Sidemi.
13	<i>Chelidon urbica, lagopoda</i> . Pall.	×	—	Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
14	Alcedidae (192 s.) <i>Alcedo ispida, bengalensis</i> . Bris.	×	—	Wszędzie, bez Kamczatki.

Nr bieżący	Nazwy systematyczne	Rasy		Rozmieszczenie gatunków po Syberii wschodniej
		gatunków europejsk.	gatunków amerykańk.	
Certhidae (199 s.)				
15	<i>Sitta europaea baicalensis</i> . Temm. et Schleg.	×	—	Bajkał. Daurya.
16	— <i>amurensis</i> . Swinh.	×	—	Kraj amurski i ussuryjski.
17	— <i>albifrons</i> . Tacz.	×	—	Kamczatka.
Sylvidae (224 s.)				
18	<i>Calamoherpe turdoides, orientalis</i> . Temm. et Schl.	×	—	Daurya. Kraj amurski i ussuryjski.
19	<i>Locustella Rayi Hendersoni</i> . Stejneger.	×	—	Wszędzie.
Motacillidae (361 s.)				
20	<i>Motacilla alba baicalensis</i> . Swinh.	×	—	Bajkał. Daurya.
21	— <i>ocularis</i> . Swinh.	×	—	Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
22	— <i>personata</i> Gould.	×	—	Kraj bajkalski w przelocie.
23	— <i>leucopsis</i> Gould.	×	—	Kraj ussuryjski? (Sharpe).
24	— <i>lugens</i> . Kittl.	×	—	Kamczatka.
25	<i>Budytes flava borealis</i> . Sundev.	×	—	Bozanida. Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
26	<i>Anthus spinoletta Blakistoni</i> . Sharpe.	×	—	Bajkał. Sidemi.
27	— <i>pratensis japonicus</i> . Tacz.	×	—	Wszędzie.
Alaudidae (411 s.)				
28	<i>Alauda arvensis japonica</i> . Temm. et Schleg.	×	—	Wszędzie.
29	<i>Otocoris albigula Parvexi</i> . Tacz.	xx	—	Daurya po Szyłkę. Okolice Kosogoła. (Gat. albigula, Bradt jest azjatycki). (Azjatyckie gatunki znaczą dwoma znaczkami)
Paridae (426 s.)				
30	<i>Poecilia cinerea oblecta</i> . Cab. Ridgw. (P. sibir. ob.)	xx	—	Bajkał.
31	— <i>sibirica affinis</i> Przew.	xx	—	Amur.
32	— <i>palustris macroura</i> . Tacz.	×	—	Dolina Irkutu. Bajkał.

33	<i>Poecilia palustris crassirostris</i> . Tacz.	×	—	Kraj ussuryjski.
34	— <i>palustris kamtschaticensis</i> . Tacz.	×	—	Kamczatka.
Regulidae (447 s.)				
35	<i>Regulus cristatus himalayensis</i> . Gerd.	×	—	Kraj ussuryjski.
36	— <i>cristatus japonicus</i> Bp.	×	—	Sidemi.
Muscicapidae (464 s.)				
37	<i>Erythrosterna parva albicilla</i> . Pall.	×	—	Wiluj. Bajkał. Taraj-nor. Kraj ussuryjski. Kamczatka.
Corvidae (506 s.)				
38	<i>Perisoreus infaustus sibiricus</i> . Tacz.	×	—	Bajkał. Daurya. Amur. Omolon.
39	<i>Garrulus glandarius Brandti</i> . Ewersm.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
40	<i>Pica caudata leucoptera</i> Gould.	×	—	Bajkał. Daurya.
41	— <i>caudata sericea</i> . Gould.	×	—	Kraj ussuryjski.
42	— <i>caudata kamtschatica</i> . Dyb.	×	—	Kamczatka.
43	<i>Lycos monedula daurica</i> . Pall.	×	—	Od Bajkału po ocean.
44	— <i>monedula neglecta</i> . Schleg.	×	—	Daurya. Kraj ussuryjski.
45	<i>Corvus corax sibiricus</i> . Tacz.	×	—	Mandżurya rosyjska.
46	— <i>corax ussuriannus</i> . Tacz.	×	—	Kraj ussuryjski.
47	— <i>corax kamtschaticus</i> . Dyb.	×	—	Kamczatka.
48	— <i>corax behringianus</i> . Dyb.	×	—	Wyspy komandorskie.
49	<i>Corvus corone orientalis</i> . Ewersm.	×	—	Wszędzie, z wyjątkiem Kamczatki.
50	— <i>corone kamtschatica</i> . Dyb.	×	—	Kamczatka.
51	<i>Trypanotorax fragilegus pastinator</i> . Gould.	×	—	Irkuck. Daurya. Kraj ussuryjski.
52	<i>Fregilus graculus brachypus</i> . Swinh.	×	—	Daurya. Góry Onońskie. Przedbajkale. Góry sajańskie.
Laniidae (485 s.)				
53	<i>Otomela isabellina speculigera</i> . Tacz.	xx	—	Daurya. Odmiana formy azjatyckiej.
Sturnidae (542 s.)				
54	<i>Sturnus vulgaris Menzbieri</i> . Sharpe.	×	—	Południowy Bajkał.
Emberizidae (549 s.)				
55	<i>Plectrophanes nivalis</i> Townsendi. Sharpe.	×	—	Wyspy komandorskie.
56	<i>Petronia rupestris brevirostris</i> . Dyb.	×	—	Daurya. Argun. Durojsk.

Nr bieżący	Nazwy systematyczne	Rasy		Rozmieszczenie gatunków po Syberji wschodniej
		gatunków europejsk.	gatunków am. ryk.	
	Fringillidae (612 s.)			
57	<i>Acanthis linaria</i> Holboelli. Brehm.	×	—	Przedbajkale. Daurya. Kamczatka.
58	<i>Coccothraustes vulgaris japonicus</i> . Temm. et Schl.	×	—	Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
59	<i>Carpodacus erythrinus Grebnitzkii</i> . Steineger.	×	—	Kamczatka.
60	<i>Pyrrhula pyrrhula kamtschatica</i> . Tacz.	×	—	Kamczatka.
	Cuculidae (685 s.)			
61	<i>Cuculus canorus borealis</i> . Pall.	×	—	Wszędzie i na Kamczatce.
	Picidae (797 s.)			
62	<i>Picus major japonicus</i> . Seeb.	×	—	Sachalin. Kraj ussuryjski.
63	— <i>major kamtschatkensis</i> . Dyb.	×	—	Kamczatka.
64	— <i>minor kamtschatkensis</i> . Dyb.	×	—	
65	<i>Picoides tridactylus crissoleucus</i> . Brandt.	×	—	Bajkał. Daurya. Kraj ussuryjski.
66	— <i>tridactylus kamtschaticus</i> . Dyb.	×	—	Kamczatka.
	Columbidae (724 s.)			
67	<i>Columba livia rupestris</i> . Pall.	×	—	Od Bajkału do oceanu.
	Tetraonidae (744 s.)			
68	<i>Lagopus alpinus Rigdwayi</i> . Steineger.	×	—	Wyspy komandorskie.
69	<i>Tetrao urogallus Taczanowskii</i> . Steineger.	×	—	Przedbajkale i Bajkał.
70	<i>Lyrurus tetrix Wagae</i> . Dyb. in lit.	×	—	Przedbajkale i Bajkał. Daurya.
	Haematopodidae (843 s.)			
71	<i>Haematopus ostralegus osculans</i> . Swinh.	×	—	Sidemi. Kamczatka.
	Tringidae (884 s.)			
72	<i>Tringa alpina pacifica</i> . Coues.	×	—	Od Bajkału do oceanu. Kamczatka.

73	<i>Tringa alpina Schinzi</i> . Brehm.	×	—	Wszędzie bez Kamczatki.
74	<i>Tringa maritima Couesi</i> . Turner.	×	—	Wyspy komandorskie.
75	<i>Tringa minuta orientalis</i> . Tacz.	×	—	Bajkał. Kamczatka.
	Limosidae (929 s.)			
76	<i>Limosa melianura brevipes</i> . Schleg.	×	—	Bajkał. Daurya. Kamczatka.
	Numeniidae (938 s.)			
77	<i>Numenius arquatus lineatus</i> . Cuv.	×	—	Daurya.
78	— <i>phaeopus variegatus</i> . Scop.	×	—	Daurya. Kamczatka.
	Ardeidae (976 s.)			
79	<i>Egretta alba modesta</i> . J. E. Gr.	×	—	Kraj ussuryjski.
80	<i>Butorides javanicus amurensis</i> . Schrenck.	xx	—	Kraj amurski i ussuryjski.
	Rallidae (993 s.)			
81	<i>Rallus aquaticus indicus</i> . Blyth.	×	—	Daurya. Sidemi.
	Sternidae (1004 s.)			
82	<i>Sterna fluviatilis tibetana</i> . Saund.	×	—	Południowy Bajkał.
	Laridae (1015 s.)			
83	<i>Larus argentatus Vegae</i> . Palmen.	×	—	Ocean lodowaty od Tajmyru po cieśninę Behringa.
84	— <i>canus niveus</i> . Pall.	×	—	Bajkał. Daurya. Amur. Kamczatka.
85	<i>Rissa tridactyla pollicaris</i> . Steineger.	×	—	Ocean lodowaty. Kamczatka.
	Procellaridae (1064 s.)			
86	<i>Fulmarus glacialis glupischa</i> . Steineger.	×	—	Kamczatka. Wyspy komandorskie.
	Anseridae (1086 s.)			
87	<i>Anser albifrons Gambeli</i> . Coues (Forma asiat. Tacz.)	×	—	Tajmyr. Wyspy komandorskie.
88	— <i>segetum Middendorffi</i> . Steineger.	×	—	Wszędzie.
89	<i>Branta brenta nigricans</i> . Dall. Lawr.	×	—	Ujście Leny. Kraj Czukezów.
90	— <i>canadensis Hutchinsi</i> . Rich.	—	×	Wyspy komandorskie.
	Alcidae (1211 s.)			
91	<i>Uria lomvia arra</i> . Pall.	×	—	Ocean lodowaty. Kamczatka. Wyspy komandorskie.
92	— <i>troile californica</i> . Bryant.	×	—	Wybrzeża północne oceanu spokojnego. W. komandorskie.

Ilość Ras gatunków europejskich i amerykańskich wynosi Nrów 92.

Spis systematyczny gatunków i ras, należących do Avifauny Kamczatki i wysp komandorskich.

Zestawił

Benedykt Dybowski.

Wstęp.

Skład avifauny kameczackiej jest wielce interesujący. Teren niniejszy półwyspu nosi na sobie wszelkie cechy jeszcze niedawnego stanu wyspiarskiego. Przylotne ptactwo na czas lęgowy przybywa z czterech stron świata i byłoby niezawodnie obfite tu w gatunki, gdyby nie mnogość soboli, łasic, lisów, niedźwiedzi i kreto-myszy. Obfitość tych niszczycieli trwająca aż do niedawnych czasów jeszcze, stała się zdaniem mojem przyczyną ubóstwa ptaków na półwyspie. Obecnie gdy wyniszczone zostały prawie doszczętnie wszystkie gatunki owych zwierząt, powodujących ubóstwo avifauny, oczekiwać należy na zmianę, to też obowiązkiem koniecznym jest poznanie stanu obecnego, ażeby mózdz w przyszłości śledzić za zmianami przewidywanymi. Kamczatka jako wyspa oceaniczna musiała przez długi czas pozostawać w odosobnieniu, skoro się wytworzyły na niej odmiany dzisiaj uznane za formy samodzielne. Już zaraz na początku moich badań na półwyspie, wypowiedziałem był zdanie, że wszystkie formy stale zamieszkujące na Kameczatce, a także gnieźdzące się na niej, są odmienne od form z kontynentu. Zdanie to moje zostało potwierdzone z wielu stron przez nowszych badaczy (Bianchi, Steineger).

Ilościowo fauna ptaków na Kameczatce jest nieznaczna, stanowi ona zaledwie 37·4% całej avifauny wschodniej Syberyi, która liczy 556 form. W porównaniu z naszymi i innymi krajami, dają wyraz

następujące cyfry. 286 gatunków w Galicyi, 304 gatunków w Kongresówce, 195 na Kamczatce, 153 na wyspach komandorskich, 556 form we wschodniej Syberyi, 535 w Europie, 1400 w Peruwii. Na Kamczatce brak następujących działów, objętych w spisie ptaków wschodniej Syberyi, a mianowicie brak działów takich, jak: 1. *Milvidae*, Kanie. 2. *Pernidae*, Pszczołojady. 3. *Circidae*, Błotniaki. 4. *Caprimulgidae*, Lelki. 5. *Cypselidae*, Jerzyki. 6. *Coraciidae*, Kraski. 7. *Alcedidae*, Zimorodki. 8. *Upopidae*, Dudki. 9. *Meliphagidae*, Miodojady. 10. *Cinclidae*, Pluszcze. 11. *Accentoridae*, Płochacze. 12. *Ruticilidae*, Pleszki. 13. *Saxicolidae*, Pokląskwy. 14. *Mniotiltidae*, Amerykanki. 15. *Regulidae*, Mysiokróliki. 16. *Paradoxornidae*, Sprzeżnice. 17. *Oriolidae*, Wilgi. 18. *Campophagidae*, Perikrokotki. 19. *Garrulidae*, Sójki. 20. *Fregilidae*, Krąsnodzioby. 21. *Cyanopolidae*, Krasnosroki. 22. *Lycosidae*, Kawki. 23. *Columbidae*, Golebie. 24. *Sturnidae*, Szpaki. 25. *Pteroclididae*, Stepówki. 26. *Tantalidae*, Ibisy. 27. *Plataleidae*, Warzęchy. 28. *Ciconidae*, Bociany. 29. *Ardeidae*, Czaple. 30. *Phoenicopteridae*, Czerwonaki. 31. *Rallidae*, Wodniki. 32. *Gallinulidae*, Kokoszki. 33. *Sulacidae*, Niezgrabcy. 34. *Perdidae*, Kuropatwy. 35. *Turnicidae*, Podeszwiki. 36. *Phasianidae*, Bażanty. 37. *Otididae*, Dropie. 38. *Gruidae*, Żórawie. 39. *Glareolidae*, Żwirowce.

Brak drobnego ptactwa, brak śpiewaków, dziwną jakąś pustką w przyrodzie, jakąś martwą smutną uderza podróżnika po Kamczatce. Do śpiewaków kamczackich należą: Gil dziwoni, Poświerka złota, Świergotek Gustawa i kilka innych skromnych w swym śpiewie ptasząt. Co do samego spisu to są następujące uwagi konieczne.

1. Gatunki, których okazy zostały zdobyte przez nas albo też mamy o nich pewną osobiście sprawdzoną wiadomość, nie są żadnymi znakami oznaczone w spisie niniejszym.

2. Inne gatunki znaczony są literami: I tak Bi = Bianchi, Ka = Kamczadale. Al = Aleuty. P. = Pallas. S. = Steller. St. = Steiner. W. = Wozniesieński.

3. Przy każdym gatunku podaną jest w parantezach stronica dzieła Taczanowskiego.

4. Niektóre nazwy rodzajowe są podwójne, te co są parantezami ujęte, oznaczają przeważnie nie używane przez Taczanowskiego, a tylko zaznaczone w cytatach. Zresztą nomenklatura systematyczna nie mogła być przezemnie opracowaną należycie, a to dla braku koniecznej literatury naukowej. „Trado, quod potui“, niech mnie to zdanie tłumaczy przed czytelnikiem.

Spis gatunków i odmian awifauny kamczackiej i wysp komandorskich.

Nr bieżący	Nazwy systematyczne, według nomenklatury, użytej przez Taczanowskiego i przez nowszych badaczy: Steingera i Bianchi'ego	Imię i nazwisko badacza	Uwagi nad gatunkami awifauny kamczackiej i wysp komandorskich	Kamczatka	Wyspy komand
	Aquilidae. Orłowate.				
1	<i>Aquila chrysaëtos daphanea</i> . Hodgs. (13 s.)		Rzadki na Kamczatce.	X	—
2	— <i>nobilis</i> . Pall. (14 s.)		"	X	—
3	<i>Haliaeetus albicilla</i> . L. (29 s.)		" Pospolity odlatuje na zimę.	X	—
4	— <i>hypoleucus</i> . Ridgw. (36 s.)		Wątpliwy gatunek.	X	—
5	— <i>leucocephalus</i> . L. (34 s.)	Bi St.	Wyjątkowo na Kamczatce.	X	X
6	— (<i>Talassaeetus pelagicus</i> . Pall. (37 s.)		Orłów 6 gatunków, stanowi 54,5% gat. wsch. Syberyi.	X	X
	Pandionidae. Rybołowcy.				
7	<i>Pandion haliaëtus</i> . L. (52 s.)		Pospolity na Kamczatce.	X	—
	Buteonidae. Myszolowcy.				
8	<i>Archibuteo lagopus</i> . Brünn.		Nie rzadki na Kamczatce.	X	X
	Falconidae. Sokoły.				
9	<i>Hierofalco candicans</i> . Gm. (77 s.)		Dotąd nie spotykany na Kamczatce.	X	X
10	— <i>gyrfalco Grebnitzkii</i> Sewerzow (73 s.)			X	X
11	<i>Falco peregrinus Pealei</i> . Ridgw. (81 s.)			X	X
12	— <i>subbuteo</i> . L. (84 s.)		Sokołów 4 gatunki, stanowią 50% gat. wsch. Syberyi.	X	X
	Asturidae. Jastrzębie.				
13	<i>Astur candidissimus</i> . Dyb. (102 s.)			X	—
14	<i>Accipiter nisus</i> . L. (105 s.)		Ptaków drapieżnych dziennych na Kamczatce 14 gat. stanowią 42,3% gatunków wsch. Syberyi.	X	—
	Strigidae. Sowy.				
15	<i>Surnia ulula</i> . L. (123 s.)		Nie rzadka na Kamczatce.	X	—
16	<i>Nyctea nivea</i> . L. (125 s.)		" " " "	X	—

Nr bieżący	Nazwy systematyczne, według nomenklatury, użytej przez Taczanowskiego i przez nowszych badaczy: Steingera i Bianchi'ego	Inicjały nazw badaczy	Uwagi nad gatunkami avifauny kamszackiej i wysp komandorskich	Kamszacka	Wyspy komand.
17	Syrnium lapponicum. Retz. (136 s.)	S.	Nie widziana w ostatnich czasach. Pospolita na Kamczatce. Ptaków drapieżnych nocnych 3 tylko gat. pewne, stanowią 20% gatunków wsch. Syberyi.	?	—
18	Otus (Asio) accipitrinus. Pall. (157 s.) Hirundinidae. Jaskółki.			×	×
19	Hirundo rustica gutturalis. Scop. (173 s.)		Rzadka. Niepospolita. W ostatnich czasach nie spostrzegana. Pospolita.	×	—
20	— rustica Tittleri. Jerd. (180 s.)			×	—
21	Chelidon urbica lagopoda. Pall. (184 s.)	S.		×	×
22	Cotyle riparia. L. Certiidae. Pełzacze.			×	×
23	Sitta albifrons. Tacz. (europaea var. albifr.) (204 s.) Troglodytidae. Timelidae. Strzyżyki.		Dosyć pospolity gatunek.	×	×
24	Nannus (Troglodytes) pallescens. Dyb. Tacz. (209 s.) Sylviidae. Gajówki.		Dotąd tylko na wyspach komand. Gajówek 3 gat. czyli 20% gat. wsch. Syberyi. Wszystkie gatunki • gajówek nie są pospolite.	—	×
25	Calomodyta ochotensis. Midd. (241 s.)			×	×
26	Locustella lanceolata. Temm. (244 s.)			×	—
27	Phylopnuste (Acanthopneuste borealis. Blas.) (254 s.)			×	—
28	— xanthodrias. Swinh. (257 s.)			×	—
29	Lusciniola Homeyeri. Dyb. (275 s.) Turdidae. Drozdy.			×	—
30	Turdus fuscatus. Gm. (eunomus Temm.) (289 s.)		Drozdów tylko 2 gat. czyli 12,5% gat. wsch. Syberyi	×	×
31	— obscurus. Gm. (306 s.) Cyaneculidae. Podróżnice.			×	×
32	Cyanecula suecica. L. var. kamtschat. Dyb. in lit. (332 s.)		Pospolite na Kamczatce.	×	—

33	Erythacidae. Rudziki. Calliope calliope. Pall. (335 s.)		Pospolity gatunek na Kamczatce.	×	—
34	Janthidae. Modraczki. Janthia (Nemura) cyanura. Pall. (343 s.) Motacillidae. Pliszki.		Pospolity gatunek na Kamczatce.	×	×
35	Motacilla lugens. Kittl. (372 s.)		Pliszek 6 gat. czyli 64,5% gat. wsch. Syberyi. Wszystkie pliszki dosyć pospolite.	×	×
36	— alba var. ocutaris. Swinh. (364 s.)			×	×
37	Calobates melanope. Pall. var. kamtschatica Dyb. in lit. (375 s.)			×	×
38	Budytes flava borealis. Sundev. (382 s.)		P. Nie spotykany gatunek w ostatnich czasach. Świergotków 4 gat. czyli 50% gat. wsch. Syberyi.	×	—
39	— citreola. Pall. (387 s.) Anthidae. Świergotki.			×	—
40	Pipastes maculatus. Hodgs. (391 s.)		Jeden tylko gat. czyli 16,6% gat. wsch. Syberyi. Pospolity gatunek.	×	—
41	Anthus Gustavi. Swinh. (398 s.)			×	—
42	— cervinus. Pall. (402 s.)			×	—
43	— pensilvanicus. Lath. (408 s.) Alaudidae, Skowronki.			×	×
44	Alauda arvensis japonica. Temm. (411 s.) Paridae. Sikory.		3 gatunki, czyli 26% gat. wsch. Syberyi.	×	—
45	Parus ater. L. (var. kamtschat. Dyb. in lit.) (430 s.)			×	—
46	Poecile palustris kamtschatkensis. Bp. (442 s.)			×	—
47	Mecistura caudata. L. (var. kamtsch. Dyb. in lit.) (443 s.) Ampelidae. Jemiołuszki.			×	×
48	Ampelis garrulus L. (452 s.) Muscicapidae. Mucholówki.		3 gatunki, czyli 33,3% gat. wsch. Syberyi.	×	×
49	Hemichelidon sibirica. Gm. (475 s.)		Bi	×	×
50	— griseitincta. Swinh. (Bianchi).			×	×
51	Siphia (Erythrosterina) albicilla. Pall. (469 s.)			×	×

Nr bieżący	Nazwy systematyczne, według nomenklatury, użytej przez Taczanowskiego i przez nowszych badaczy Steinegera i Bianchi'ego	Inicjały nazw badaczy	Uwagi nad gatunkami awifauny kamszackiej i wysp komandorskich	Kamszatka	Wyspy komand.
	Laniidae. Dzierzby.		2 gatunki czyli 22.2% gat. wsch. Syberyi.		
52	<i>Lanius major</i> . Pall. (var. <i>Homeyeri</i> Dyb. in lit.) (487 s.)			X	—
53	<i>Otomela phoenicurus</i> . Pall. (var. <i>kamtsch.</i> Dyb. (498 s.)			X	—
	Picaeidae. Sroki.		Jeden gatunek czyli 33.3% gat. wsch. Syberyi.		
54	<i>Pica caudata</i> var. <i>kamtschatica</i> . Steineger. (514 s.)			X	—
	Corvidae. Wronokruki.		3 gatunki czyli 12.8% gat. wsch. Syberyi.		
55	<i>Corvus corax kamtschaticus</i> . Dyb. (528 s.)			X	—
56	— <i>behringianus</i> . Dyb. (529 s.)			X	—
57	<i>Corone corone orient.</i> Ewersm. var. <i>kamtschat.</i> Dyb.			X	X
	Nucifragidae. Orzechówki.				
58	<i>Nucifraga caryocatactes</i> . L. var. <i>kamtschat.</i> Bianchi.			X	?
	Emberizidae. Poświerki.		3 gatunki czyli 33.3% gat. wsch. Syberyi.		
59	<i>Plectrophanes (Plectrophenax) nivalis</i> . L. (550 s.)			X	—
60	— <i>nivalis</i> Townsendi Rigdw. (555 s.)			X	—
61	<i>Junco hiemalis</i> . (611 s.)	Bi.		X	X
62	<i>Calcarius lapponicus</i> . L. (557 s.)			X	X
63	<i>Emberiza variabilis</i> . Temm. (609 s.)			X	X
64	— <i>rustica</i> . Pall. (572 s.)			X	X
65	— <i>aureola</i> . Pall. (603 s.)			X	X
66	<i>Schoenicola schoeniclus</i> . L. (596 s.)			X	—
	Fringillidae. Wróblowate.		12 gatunków czyli 44.4% gat. wsch. Syberyi.		
67	<i>Coccothraustes vulgaris japonicus</i> . Temm. (625 s.)	W.		?	—
68	<i>Chlorospiza (Chloris) kawarahiba</i> . Temm. 627 s.			X	—

6

B. DYBOWSKI

[398]

69	<i>Fringilla montifringilla</i> . L. (636 s.)			X	X
70	<i>Aegiothus (Acanthis) linaria</i> . L. (639 s.)			X	X
71	<i>Aegiothus linaria</i> Holboelli. Brehm. (643 s.)			X	X
72	— <i>linaria exilipes</i> . Coues. (645 s.)			X	X
73	<i>Leucosticte brunneinucha</i> . Brdt. (653 s.)			X	X
74	— <i>griseinucha</i> . Brdt. (655 s.)			X	X
75	<i>Carpodacus erythrinus</i> . Pall. var. <i>Grebn.</i> St. (659 s.)			X	X
76	<i>Corythus enucleator</i> . L. var. <i>kamtsch.</i> Dyb. (671 s.)			X	X
77	<i>Loxia curvirostra</i> . L. (674 s.)	S. Bi.		X	X
78	— <i>bifasciata</i> . Brehm. (676 s.)			X	X
	Pyrrhulidae. Gile.		Jeden gatunek czyli 25.0% gat. wsch. Syberyi.		
79	<i>Pyrrhula kamtschatica</i> . Tacz. (680 s.)			X	—
	Cuculidae. Kukułki.		2 gatunki czyli 50% gat. wsch. Syberyi.		
80	<i>Cuculus canorus borealis</i> . Pall. (685 s.)			X	X
81	— <i>striatus</i> . Drapier. (689 s.) (<i>C. peninsulae</i> . Steineger.)			X	X
	Picidae. Dzięcioły.		4 gatunki czyli 33.3% gat. wsch. Syberyi.		
82	<i>Picus leuconotus</i> . Bechst. (701 s.)	P.		X	—
83	<i>Xylocopus minor</i> . L. var. <i>kamtschatensis</i> . Sundev. (706 s.) <i>immaculatus</i> . Steineger.			X	—
84	<i>Dendrocopus major</i> . L. var. <i>kamtschatkensis</i> . Dyb. (717 s.) <i>purus</i> . Steineger.			X	X
85	<i>Picoides tridactylus</i> . L. <i>crissoleucus</i> . Brdt. (722 s.) <i>albidior</i> . Steineger.			X	—
86	<i>Yunx torquilla</i> . L. (727 s.)	P.	Gatunek nie znaleziony w nowszych czasach.	X	—
	Tetraonidae. Głuszcocietrzewie.		4 gatunki czyli 44.4% gat. wsch. Syberyi.		
87	<i>Lagopus albus</i> . L. var. <i>kamtschat.</i> Dyb. (744 s.)			X	—
88	— <i>alpinus</i> . Nils. var. <i>kamtschaticus</i> . Dyb. (749 s.)			X	—
89	— <i>Rigdwaji</i> . Steineger. (752 s.)			X	—
90	<i>Tetrao kamtschaticus</i> . Kittl. (763 s.)			X	—
	Charadriidae. Siewki.				
91	<i>Charadrius fulvus</i> . L. (815 s.)			X	X

[399]

SPIS SYSTEMATYCZNY GATUNKÓW I RAS

7

Nr. bieżący	Nazwy systematyczne, według nomenklatury, użytej przez Taczanowskiego i przez nowszych badaczy Stejnegera i Bianchi'ego	Inicjały nazw badaczy	Uwagi nad gatunkami awifauny kamczackiej i wysp komandorskich	Kamczatka	Wyspy komand.
92	<i>Aegialitis mongola</i> (Cirrepidesmus) L. (822 s.)			×	×
93	<i>Squatarola helvetica</i> L. (835 s.)			×	×
94	<i>Calidris arenaria</i> L. (841 s.)			×	×
Haematopodidae. Krasnonogi.					
95	<i>Haematopus ostralegus osculans</i> Swinh. (843 s.)			×	×
96	<i>Streptopelia (arenaria) interpres</i> L. (845 s.)			×	×
Phalaropidae. Płaskonogie.					
97	<i>Phalaropus (cinereus) hyperboreus</i> L. (844 s.)		2 gatunki czyli 100% gat. wsch. (Syberyi) (2)	×	×
98	<i>Crymophilus fulcarius</i> L. (851 s.)			×	×
Totaniidae. Brodźce.					
99	<i>Torekia cinerea</i> G. (856 s.)			×	×
100	<i>Pseudoglossa (Pseudototanus) guttifer</i> Nordm.			×	×
101	<i>Totanus (Glottis) glottis</i> L. (nebul. Gunner) (860 s.)			×	×
102	— <i>fuscus</i> L. (869 s.)			×	×
103	<i>Helodromas ochropus</i> (872 s.)			×	×
104	<i>Rhyacophilus glareola</i> L. Gm. (874 s.)			×	×
105	<i>Heteroscelus (Heteractitis) brevipes</i> Vieil. (877 s.)			×	×
106	— <i>incanus</i> Gm. L. (877 s.)			×	×
107	<i>Actitis (Tringoides) hypoleucos</i> L. (882 s.)		9 gatunków czyli 90% gat. wsch. Syberyi (10)	×	×
Tringidae. Biegusy.					
108	<i>Machaetes (Pavonella) pugnax</i> L. (885 s.)			×	×
109	<i>Tringa (Pelidna) alpina pacifica</i> Cou. amer. C. (897 s.)			×	×
110	— (<i>Arquatella</i>) <i>maritima</i> Coues. Ridgw. (905 s.)			×	×
111	— (<i>Heteropygia</i>) <i>acuminata</i> Horstf. (908 s.)		9 gatunków czyli 52.9% gat. wsch. Syberyi (17)	×	×

112	<i>Tringa subminuta</i> Midd. (914 s.)			×	×
113	— (<i>Limonites</i>) <i>minuta orientalis</i> Tacz. (damescensis Horstf.) (918 s.)			×	×
114	— (<i>Limonites</i>) <i>Temmincki</i> Leisl. (916 s.)			×	×
115	— (<i>Limonites</i>) <i>ruficollis (salina)</i> Pall. (920 s.)			×	×
116	— <i>crassirostris</i> Temm. (894 s.)		2 gatunki czyli 50% gat. wsch. Syberyi (4)	×	×
Limosidae. Szlamniki.					
117	<i>Limosa limosa melanuroides</i> Gould. melanura Temm. brevipes. Schl. (929 s.)			×	×
118	— <i>lapponica Baueri</i> Naum. (Novae Zeelandiae Gray) (933 s.)			×	×
Numenidae. Kuligi.					
119	<i>Numenius cyanopus</i> Vieil. (940 s.)			×	×
120	— <i>phaeopus variegatus</i> Scop. (943 s.)			×	×
Scolopacidae. Bekasy.					
121	<i>Gallinago hiemalis</i> Ew. (kamtsch. Dyb. in lit. (953 s.)			×	×
122	— <i>gallinago</i> L. (scolopacina Bp.) (960 s.)		2 gatunki czyli 40% gat. wsch. Syberyi (5)	×	×
Sternidae. Rybołówki.					
123	<i>Sterna paradisea</i> Brünn. (1008 s.) (S. macrura Naum.)			×	×
124	— <i>kamtschatica</i> Pall. (1011 s.)			×	×
125	— <i>aleutica</i> Baird. (1013 s.)		3 gatunki czyli 37.8% gat. wsch. Syberyi (8)	×	×
Laridae. Mewy.					
126	<i>Larus barrovianus</i> Ridgw. (1019 s.)			×	×
127	— <i>glaucescens</i> Naum. (1019 s.)			×	×
128	— <i>schistisagus</i> Stejneger. (1024 s.)			×	×
129	— <i>affinis</i> Reinh. (1026 s.)			×	×
130	— <i>cachinaus</i> Pall. (1030 s.)			×	×
131	— <i>canus</i> L. (1033 s.)			×	×
132	— <i>canus niveus</i> Pall. (kamtschat. Stejneger.) (1034 s.)			×	×
133	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> L. (1040 s.)			×	×
134	<i>Rodostethia rosea</i> J. Sabine. (1048 s.)	St.	12 gatunków czyli 60% gat. wsch. Syberyi (20)	×	×

Nr bieżący	Nazwy systematyczne, według nomenklatury, użytej przez Taczanowskiego i przez nowszych badaczy Steingera i Bianchi'ego	Inicjały nazw badaczy	Uwagi nad gatunkami awifauny kameczackiej i wysp komandorskich	Kameczatka	Wyspy komand.
135	<i>Rissa rissa</i> . L. (<i>tridaelyla pollicaris</i> Steineg. (1052 s.)			X	X
136	— <i>brevirostris</i> . Bruch. (1053 s.)			X	X
137	<i>Gavia alba</i> . Gunn. (1055 s.)			X	X
	Stercorariidae. Wydrzyki.		3 gatunki czyli 100% gat. wsch. Syberyi (3)		
138	<i>Stercorarius parasiticus</i> . L. (1056 s.)			X	X
139	— <i>longicaudus</i> . Briss. (<i>crepidatus</i> . Brehm.) (1059 s.)			X	X
140	— <i>pomarinus</i> . Temm. (<i>pomatorhinus</i> Newp.) (1061 s.)			X	X
	Procellariidae. Burzowieszcze. Burzyki.		2 gatunki czyli 100% gat. wsch. Syberyi (2)		
141	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> . Vieil. (1067 s.)			X	X
142	— <i>furcata</i> . Gm. (1068 s.)			X	X
	Puffinidae. Pufoptaki.		2 gatunki czyli 100% gat. wsch. Syberyi.		
143	<i>Puffinus tenuirostris</i> . Temm. (1066 s.)			X	X
144	<i>Fulmarus glacialis pacificus</i> . Audub. <i>glupischa</i> Steinger. (1064 s.)			X	X
	Diomedeidae. Albatrosy.				
145	<i>Diomedea albatrus</i> . Pall. (1069 s.)			X	X
146	— <i>nigripes</i> auct. (1069 s.)	Al.	Czy ten gatunek znajdzie się w przyszłości?	?	?
	Phalacrocoracidae. Kormorany.		3 gatunki czyli 60% gat. wsch. Syberyi (5)		
147	<i>Phalacrocorax perspicillatus</i> . Pall. Steller. (1077 s.)			X	X
148	<i>Graculus urile</i> . Gm. (<i>bicristatus</i> . Pall.) (1078 s.)			X	X
149	— <i>pelagicus</i> . Pall. (1080 s.)			X	X
	Anseridae. Gęsi.		12 gatunków.		
150	<i>Chen hyperboreus</i> . Pall. (1086 s.)	Ka.		X	X

151	<i>Chen nivalis</i> . Fordt. (1087 s.)	Ka.	Prawdopodobnie obie formy białych gęsi będą zdobyte w przyszłości, widziano je w przelocie na Bajkale, Amurze, Ussuri, Kameczatce.	X	X
152	<i>Anser cinereus</i> . Pall. (1087 s.) (<i>rubrirostris</i>).			X	X
153	— <i>albifrons</i> . Scop. (<i>albifrons gambeli</i> . Hartl.) (1091 s.)			X	X
154	— <i>segetum</i> . Gm. (1095 s.)			X	X
155	— <i>segetum serrirostris</i> . Swinh. Bianchi.	Bi		X	X
156	— <i>segetum mentalis</i> . Oates. Bianchi.	Bi		X	X
157	— <i>segetum grandis</i> . Midd. (<i>Middendoffi</i> Stein.) (1098 s.)			X	X
158	<i>Branta brenta</i> . Pall. <i>nigricans</i> . Lawr. (1106 s.) <i>Leucoblepharon canadensis</i> . Pall. <i>Hutchinsi</i> . Rich. (1109 s.)			X	X
159	<i>Philactes canagica</i> . Sewast. (1112 s.)	St.		X	X
160	<i>Cygnopsis cygnoides</i> . L. (1100 s.)	Al.	Prawdopodobnie znajdzie się na Kameczatce, miałem czaszkę z wysp komandorskich.	X	X
162	<i>Cygnus ferus</i> Ray. (<i>Cygnus cygnus</i> . L.) (1115 s.)		2 gatunki czyli 40% gat. wsch. Syberyi.	X	X
163	— <i>columbianus</i> . Stein. (1120 s.)	St.		X	X
	Cygnidae. Łabędzie.				
164	<i>Anas boschas</i> (<i>boscas</i> L.) L. (1129 s.)		20 gatunków.	X	X
165	— (<i>Eunetta</i>) <i>falcata</i> . Georgi. (1135 s.)			X	X
166	— (<i>Nettion</i>) <i>formosa</i> . Georgi. (<i>glocitans</i> . Pall.) (1138 s.)			X	X
167	— (<i>Nettion</i>) <i>crecca</i> . L. (1141 s.)			X	X
168	— (<i>Querquedula</i>) <i>Pterocyanea</i> <i>querqued.</i> L. (1145 s.)			X	X
169	— (<i>Dafila</i>) <i>acuta</i> . L. (1147 s.)			X	X
170	— (<i>Spatula</i>) <i>clypeata</i> . L. (1151 s.)			X	X
171	— (<i>Chaulelasmus</i>) <i>streperus</i> . L. (1154 s.)			X	X
172	— (<i>Mareca</i>) <i>penelope</i> . L. (1156 s.)			X	X
173	— (<i>Marecella</i>) <i>americana</i> . Gm. (1160 s.)			X	X
174	— (<i>Fulis</i>) <i>Fuligula</i> <i>cristata</i> . L. (<i>fuligula</i> L.) (1167 s.)		Jeden okaz znaleziony martwy na wyspie Behringa.	X	X
175	— (<i>Fulis</i>) <i>Fuligula</i> <i>marila</i> . L. (1164 s.)			X	X
176	— (<i>Glaucion</i>) <i>Clangula</i> <i>clangula</i> . L. (1171 s.)			X	X
177	— (<i>Charitonetta</i>) <i>albeola</i> . L. (1174 s.)			X	X
178	— (<i>Cosmonetta</i>) <i>histrionica</i> . L. (1176 s.)			X	X
179	— (<i>Harelda</i>) <i>glacialis</i> . L. (1176 s.)			X	X
180	— (<i>Pelionetta</i>) <i>perspicillata</i> . L. (1188 s.)			X	X

**WYDAWNICTWA
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WE LWOWIE.**

Prace naukowe, Dział II, matematyczno-przyrodniczy.

- I. Weyberg Zygmunt. Podstawy krystalografii, z 124 rys. w tekście i 4 tabl., str. XIV i 160 500
- II. Zuber Rudolf. Flisz i nafta, z 162 ilustracjami w tekście i 3 tablicami, str. XVI i 350 1200

Archiwum naukowe, Dział II, matematyczno-przyrodniczy.

- Tom I. Bodaszewski Łukasz. Teoria ruchu wody na zasadzie ruchu falowego. Część I, z 76 fig. w tekście i 2 tabl., str. 126 (320 M.). — Łoziński Walery. Doliny rzek wschodnio-karpackich i podolskich, z 7 fig. w tekście i 5 tabl., str. 67 (240 M.). — Hirschler Jan. Spostrzeżenia nad rozwojem zarodkowym motyli, z 9 fig. w tekście i 4 tabl., str. 85 (240 M.). — Grochmalicki Jan. Badania nad regeneracją soczewki ocznej u ryb, z 1 tabl., str. 28 (80 M.). — Sawicki Ludomir. Z fizyografii zachodnich Karpat, z 27 fig. w tekście i 2 tabl., str. 108 (280 M.). — Weigl Rudolf. Studya nad aparatem Golgi-Kopscha i trofospongiami Holmgrena w komórkach nerwowych kręgowców, z 1 tabl., str. 114 (320 M.) 1480
- Tom II. Nowak Jan. Jednostki tektoniczne polskich Karpat wschodnich, z 4 ryc. w tekście i 1 tabl., str. 44 (120 M.). — Tokarski Julian. Lakkolit z Cerro Cacheuta w Argentynie, z 3 fig. w tekście i 3 tabl., str. 32 (100 M.). — Bednarski Adam. Okulistyka ziolołpisów polskich w XVI i na początku XVII wieku, str. 38 (90 M.). — Beckówna Zofia. Wpływ głodzenia na składniki plazmatyczne (mitochondria, pigment) komórek wątrobowych traszki (Amphibia: Triton) z 2 ryc. w tekście i 2 tabl., str. 31 (80 M.) 390

Archiwum Tow. Naukowego. Dział III, matemat.-przyrodn.

- Tom I. Jankowska Wanda. O bezwodnych sodalitach chromianowych, str. 16 (50 M.). — Kaubówna Anda. Syntezy pirogenetycznych sodalitów siarczanowych, str. 20 (100 M.). — Jakubowski Zygmunt. O mangostynie, str. 21 (100 M.). — Huber Maksymilian T. Teoria płyt prostokątnie-różnokierunkowych wraz z technicznymi zastosowaniami do płyt betonowych, krat belkowych i t. p. z 29 rys. w tekście, str. 240 (1500 M.). — Czekanowski Jan. Prawa Mendla i Gallona i współczynniki Pearsona, str. 44 (200 M.). — Dybowski Benedykt. Spis systematyczny ssawców wschodnio-syberyjskich, str. 15. — Dybowski Benedykt. Spis systematyczny gatunków i ras, należących do awifauny wsch. Syberyi, str. 31. — Dybowski Benedykt. Spis systematyczny gatunków i ras, należących do awifauny Kanieczki i wysp komandorskich, str. 13 (za wszystkie trzy rozprawy 400 M.). — Bolland Arnold. O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali, str. 30 (200 M.) 2550

- Balzer Oswald. Nauka uniwersytecka, a kolejność studiów w uniwersyteckiej nauce prawa, str. 43 120
- Księga Pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. Tom I. str. XXVII i 544 z 10 tabl. i 2 ryc. w tekście; Tom II. str. 661 z 3 tabl. i 1 ryc. w tekście, 1916 2400
- Sprawozdania Wydziału Towarzystwa. Roczniki 1901—1919 po 30
- Pierwsze dziesięciolecie Towarzystwa dla popierania nauki polskiej (1901—1910), napisał dr. Przemysław Dąbkowski, 1911, str. 52 120
- Bulletin de la Société pour l'avancement des sciences. Tom I (1901—1910) str. 204 240
- Toż zes. IX—XIII (1911—1913) po 30