

SÆRTRYK AF  
„FLORA OG FAUNA“  
1931

(Silkeborg)



2

*Wzrost wiewiórki*  
*do S 22687*



S. 354.  
S. 354.a  
S. 354.b  
S. 354.c

*Apr. 23. XI. 51 w. p.*

*Uwaga!*



Naar undtages ovennævnte Biller og *Chrysopa dorsalis* er alle de her omtalte Arter allerede kendt fra Bornholm, idet Dr. Esben-Petersen, der har foretaget flere Studierejser dertil, har tilvejebragt et stort Materiale til Belysning af en Række Grupper inden for Øens Insektfauna, deriblandt Vaarfluer og Guldøjer.

Jeg benytter Lejligheden til at takke Lærer Sigfred Knudsen, Dr. Hoffmeyer, Grosserer Glintholm og stud. jur. Helge Hansen for tilsendt Materiale, og tilføjer, at jeg vil være meget taknemlig for Materiale ogsaa fra andre af vore Lepidopterologer, der benytter Sukkerlokning og Lys til Fangst af Sommerfugle. Ogsaa skriftlige Meddelelser er kærkomne.

## Ny Guldøje for vor Fauna.

Af J. Kr. Findal.

Den 23. Juli i Aar tog Dr. Skat Hoffmeyer og Lærer Sigfr. Knudsen et Eksemplar af Guldøjet *Chrysopa dorsalis* Burm paa Lyng i Nærheden af en Fyrrebevoksning ved Dueodde paa Bornholm.

Hermed er vor Fauna blevet beriget med en ny og smuk Guldøjeart. Det er den 12. i Rækken af vore Guldøjer, og vi kan næppe vente at finde mere end en enkelt Art til inden for vort Faunaomraade.



*Chrysopa dorsalis* Burm  
fra Dueodde p. Bornholm.

Dr. Esben-Petersen har beskrevet Arten i „Danmarks Fauna, Netvinger og Skorpionfluer“, idet den hører til de Arter, som vi kunde vente at finde; og nu er den altsaa funden. Efter Anmodning har Dr. Esben-Petersen meddelt mig følgende om Dyrets Forekomst uden

for Danmark: „Sverige: Skaane til Uppland — sjælden. Saa vidt vides er den ikke fundet i Norge. Efter C. M. Reuter er den ikke fundet i Finland. Fundet i England, men sjælden, og i Kurland (efter Lacksentz). I Holland meget sjælden (efter Albarda: Catalogue raisonne Neuropteres 1889). I Tyskland, Bøhmen og Østrig, vistnok stadig paa Fyr. Findes ikke paa Pyrenæerhalvøen. Ved intet fra Frankrig og Belgien.“ Ifølge Dr. Stitz: Netzflügler i Die Tierwelt Mitteleuropas kendes Arten ogsaa fra Sveits.

Det har glædet mig at se, at Dr. Esben-Petersens Beskrivelse af Arten i Danmarks Fauna passer aldeles nøje paa det fundne Eksemplar. Med hans gode Bog i Hænde vil det være en Fornøjelse for Samlere at gennemgaa deres Netvingemateriale og bringe ethvert Dyr paa rigtig Plads, og enhver Entomolog vil kunne studere Netvingerne med Udbytte; disse smukke Dyr, som er saa nemme at behandle, og hvis Systematik og Biologi er meget interessant.

---

## Mindre Meddelelser.

---

**Boarmia consonaria** Hb. — Denne Maaler, som i Danmark hidtil kun er funden paa Møens Klint, første Gang af Gdjr. Erling Pedersen 16. Maj 1926, senere taget flere Gange i Antal, er beskrevet i „F. F.“ 1927 S. 4 af N. L. Wolff. Erling Pedersen har i Aar velvilligt overladt mig en Del Larver (klækkede af Æg); men da disses Udseende ikke helt stemmer med N. L. Wolffs Opgivelser efter engelske og tyske Værker, skal jeg herved give en lille Beskrivelse af den voksne Larve. — Den er 38—41 mm lang, slank og med temmelig lange Vortefødder; Bugen er noget flad, og Hovedet rundagtigt, hjerteformet indskaaret foroven. Farven er grøngraa eller lys brungraa med dobbelt, lysere Ryglinie, som er tydeligst paa de 4 forreste Ringe og mere eller mindre udvidet midt paa hver af de øvrige. Mellem Ryglinien og de sorte Aandehuller findes utydelige, bølgede lyse Længdelinier. De bageste Prikvorter paa Ring 5—8 og 11 er større og mørkere end de forreste, størst paa Ring 11, hvor de sidder paa en svag Tværforhøjning. Bugen er hvidlig graagrøn, Hovedet brunt med lys Marmorering. I Hvile sidder Larven tiltrykt til Kviste eller tynde Grene, omtrent som hos *Metrocampa margaritaria* F, medens derimod dens nære Slægtning, *Boarmia crepuscularia* Hb. sidder skraat grenformet udstrakt.

L. P. Jensen,

**Blomsterhoveder af Guldblomme (*Arnica*) og Blaa-hat (*Knautia*) ønskes fra Efteraar og tidligt Foraar.**

E. B. Hoffmeyer,  
Haslev.

**Zum Vorkommen von *Heliothis peltigera* in Mitteleuropa.** Hoffmann-Spuler schreibt zwar über das Vorkommen: „Bei Kassel, in Südbaden, der Schweiz, dem west-

lichen Mitteleuropa (ausser Holland), Ungarn, Bukowina, Rumänien, Kroatien und Südeuropa (Nordafrika, Syrien, Armenien bis Nordindien).“

Bei den von Spuler genannten deutschen Fundorten handelt es sich aber nur um einmalige (sporadische) Funde; einheimisch ist *peltigera* hier nicht. Auch Vorbrodts schreibt für die Schweiz in seiner Arbeit: Die Schmetterlinge der Schweiz, 1911, I., p. 409: „Festen Fuss dürfte sie nur in der Südschweiz, im Wallis und vielleicht im Jura gefasst haben.“ Vorbrodts bezeichnet sie als südliche wanderlustige Art.

Auch ich habe kleinen Zweifel, dass *peltigera* nördlich der Alpen nicht heimisch ist.

1928 ist *peltigera* nun plötzlich an vielen Orten Mitteleuropas, zweifellos als Einwanderer, aufgetreten. 1929 war sie wieder verschwunden. Ich zähle die Fundorte auf, welche mir aus der Literatur bekannt geworden sind (also alle aus dem Jahre 1928!).

Südschweiz: Graubünden, Rhonetal, Lötschental.

Nordschweiz: Wengen im Berner Oberland.

Baden: Im Schwarzwald.

München: Falter und Raupen.

Rheinprovinz: Eine Raupe bei Trier.

Frankfurt a. Main: Raupen an *Senecio*.

Thüringen: Arnstadt, Erfurt, Rossleben an d. Unstrut, Leipzig.

England: an der Südküste (Falter u. Raupen). Cockayne im Entom. Record etc. 42., 1930, p. 161 ff. u. Kettlewell, l. c. 1931, 43., p. 62 ff.

Keine Angaben habe ich aus Nordostdeutschland, aus der Umgegend von Berlin und auch nicht aus Schweden erhalten.

Der Fund in Dänemark („Flora og Fauna“ 1931 S. 69: L. P. Glintholm: *Heliothis peltigera* fra Møen) scheint also der nördlichste zu sein, der beobachtet ist.

Kiel, Mai 1931.

G. Warnecke.

**Bornholmske Fuglenavne.** Redaktionen af dette Tidsskrift har i tidligere Aargange efterlyst folkelige Navne fra de forskellige Landsdele paa Dyr og Planter. Jeg har derfor fra forskellige Kilder i Bøger og Tidsskrifter samt mundtlige Meddelelser opnoteret følgende Fuglenavne fra Bornholm:

Aabo — Ederfugl, Aart — Krikand, Buskehøg — Lille Tornskade, Bækkjastar — Solsort, Fjældstavn — Nattergal, Fjærepist — Ryle, Gaddis — Havlit, Habak eller Hapax —







