



**Tarentula Beckeri, Keyserling. 1878.**

Céphalothorax brun éclairci sur les bords; une bande de petits poils blancs tout alentour au-dessus de chaque bord latéral, se rejoignant en arrière au milieu, et remontant, à partir de là, en ligne médiane entourant la strie thoracique.

La partie antérieure de la tête obscure; le contour des yeux et les chélicères noirs, également recouverts de poils blancs. Les mâchoires et la lèvre brun-rouge; le sternum jaune-brun revêtu de poils noirs. Les hanches des pattes noirâtres en dessous; cuisses jaunes, presque blanches en dessous; le restant des pattes brun-rouge, clair.

Abdomen blanc sale, garni de pubescence rougeâtre; une bande ou tache longitudinale claire allongée au milieu, dentelée sur les bords; sur les côtés, quelques taches de même couleur. Le ventre présente un large champ noir, commençant en avant de l'épigyne, et n'atteignant pas tout à fait les filières.

Comme couleur et dessin, cette espèce est voisine de la *T. Baltimoriensis*, Keys.

Céphalothorax un peu plus long que patella et tibia IV; allongé; la partie antérieure un peu plus large que la moitié du milieu; très-convexe; stries rayonnantes et strie médiane bien marquées.

La première ligne des yeux, un peu courbée, équidistants; ceux du milieu, plus gros que les latéraux.

Les yeux de la seconde ligne plus rapprochés l'un de l'autre que ceux de la troisième ligne; ceux-ci écartés de plus de trois fois la grandeur de leur diamètre.

Chélicères solides, un peu recourbées en avant; elles divergent un peu du côté interne, dans leur moitié inférieure.

Pattes robustes de longueur médiocre; la quatrième paire à peu près trois fois plus longue que le céphalothorax et dépassant la première paire de toute la longueur du métatarse; une épaisse scopula s'étend aux deux paires antérieures jusque sur la plus grande partie des tibias; elle n'atteint, aux deux paires postérieures, qu'à peine le côté inférieur des métatarses.



Des épines sont disposées de la manière suivante :

Première et deuxième paire de pattes. — Fémur, en dessus, 3; en avant du sommet, 2; en arrière, 2-3. — Patella, côté interne, 1. — Tibia, en dessus, 2-2-2. — Métatarse, en dessous, 2, 2, 3.

Troisième paire de pattes. — Tibia, en dessous, 2-2-2 de chaque côté et 2 au-dessous. — Métatarse de même, mais sans épines au-dessus.

Quatrième paire de pattes. — Comme les troisièmes, sauf qu'au côté interne du fémur il n'y a qu'une épine.

L'abdomen ovale est plus large en avant et obtusément tronqué en arrière.

|   |            |
|---|------------|
| Longueur totale de l'araignée . . . .               | 15.6 mill. |
| — du céphalothorax . . . .                          | 8.3 —      |
| — de l'abdomen . . . .                              | 7.3 —      |
| Largeur de l'abdomen . . . . .                      | 4.7 —      |
| Longueur des pattes : 1 <sup>re</sup> paire . . . . | 20.5 —     |
| — 2 <sup>e</sup> id. . . . .                        | 19.4 —     |
| — 3 <sup>e</sup> id. . . . .                        | 18.3 —     |
| — 4 <sup>e</sup> id. . . . .                        | 24.9 —     |

Patrie : Antigua, Indes occidentales. (M. Purves.)

