Pikulice – S Przemyśla (naprzeciw cegielni przy drodze w Wełnybrce).

Zwierzyniec

Wzniesienie wraz z kościołem ± W-E w partii południowej objęte od strony wsi warstwicą 240 m npm – ok. ± 50 m w stronę do Sanu. Opada stromo ku dolinie potoku wrosłym głęboko ciągiem wąwozowatego zagłębienia.

Zwierzyniec przedstawia odsłonięte wzgórze z wąt zwietrzały (ok. 60 m × 50 m – nierówności), płytkawy na ok. 30–35 m. Spąg do stwierdzenia (od strony Żerii zwietrzały) ok. 10 m serią grubo ułamkowych zwietrzeń rożnej grubości, zmieszanej dowiezionką tzw. przez akcesoriów rożnej wielkości oraz głazów do rozmiarów bruzdowców. Przeważają akcesoria płaskie, otoczaki nieregularne, drobne, średnie i duże. Materiał wypełniający dobrze obtoczony. Dość dużo udziału materiału północnego, przeważa materiał lokalny, dość dużo udziału materiału karpackiego. Żerie zwietrzałe grubo ułamkowe, przeważają tarcze rzadkie, napiętrzone ze zmieszaniem – drobnym warstwowym zdarzeniem (cienkim) jasnego odcienia). Ułożenie poziome, w partii stropowej wału zwietrzałego, ścięte jest serią piaszczysto-żwirową o regularnym dość cienkim, ciągłym warstwieniu, opadającym ukośnie do doliny potoku. Jest to warstwienie wtórne – rezultat zmywów zboczowych, które miały miejsce w okresie zapełniania akumulacyjnego, prawdopodobnie późnego. Przykrywa to stromość doliny tego potoku.

Seria zwietrzała pokrywa nierównością – cienkim serię piaskowo-żwirowatą o opadającym powyższym warstwieniu, a ostatecznie o warstwieniu zniszczonego stoku. Piaski jasne, szarawe, w niektórych partiach żwirowate wyraźnie warstwione, poziomo, serią zwietrzałą zmiętą grubości – ok. 2 m. W partii wschodniej zwietrzeniu nad dnem jej zwarcia się do ok. 4 m – w tym miejscu grubość serii zwietrzałej dochodzi do ok. 10 m. W serii piaszczystej, w partii zach. zwietrzeniu, w poziomie dolnym wydzielają się soczewki-warstwy żwirowo-piaszczystego grub. do 20 cm i ciągłe. Na rozmyciu pow. w północnej partii wschodniej zalegają (tego górnej części, obecnie skłębionej) powyżej nieco skarpa piaskowa dość gruba, zawiera drobny i średniego wielkości akcesoriów; w dolnej partii, w północnej dość żwirowej i nieco powyżej – piaski drobne z kliftstratami