


Pn.

pd.



~~Hydros. lesz poci~~, Górna granica wzdłuż lesz poci; mady 2-3 mtr.

xxx produkcja


< 30-40 mtr >

M-mada

Palenie Uwe

Pu.

Pol



Palacie Nowe, przy Lochu w rejonie

P_m

P_{oh}

1.10

\wedge



płyta ciekła
deflekcja

A

V

A. Piasek biały porzeczny (właśnie nieo-
kryty, spuchnięty) warstwowy, przeważnie
drobnoziarnisty. Ciężkie pryzmy warstwy piasku
grobnoziarnistego. Do głębokości 2.10 metr. kruszono-
waty, bezładny podłożem wydany, które w tym
miejscu posiada charakter ciekły.

Na pd. od wydmowy teren Tąpudure i
obuże i w odległości około 60 m. majdego i
wyraźnie erogijne rągt ściemne wyjątkowo
mady do górnego około 1 m. powyżej
sims - niebieskawy - rdzawy piaski i biate
błoto ~~zabornione~~ zabornione białe
porowatym wadownym. Zwrócić uwagę na
~~szare~~ szare, ciemna dość spiska ścieka uprawna
Mada jest utworem dość spiskim o różnej rama-
kości drobny i gruboziarny piasek, w górnej
partii prawie jest porobionym żyznym, w dolnej
zrobi bardziej pianym. W górnej części zabornione
brązowe, w środku czarno - usiepienie,
z nieznacznie woslin.

Pochop zrobien w najniższej partii
wydmowy. m. m. na linii majdego i obuże
Mada i z chodu ceglany majdego
wadu wyprzedził mady i ci materiom
z tyłu piaski drobny i gruboziarny
podobny namet iwin (pr. kopanie nowego
studni).

27. 5. 1923 D.

poziom wody w studni
od powierzchni 1,80 m.
minim. wody $\frac{0,48}{223}$ m.

Palenie Noie

Układka poza wiatem wydmowym.
na dnie "nowy gruby" (nazwa miejsc.) - wir. fca-
sek.

Pn.

Pd.

