

J. F. h. Sarauw: Ein steinzeitlicher Wohnplatz
im Moor bei Mullerup auf Seeland
vergleichen mit verwandten Funden.

Præhistorische Zeitschrift VII, 1914 Nr. 1-28.

2. Maglemose

Charakterystyka stauowiska Maglemose

Przeważają wyrobki z kruszczenia. Między innymi b. radlice (typowy i char. eaty, potamomnych nietypowych brył.). Wielka ilość adłupków (éclats) - 15,469 szt., Liczne z nich obrabiane na krawędziach, jak skrobacze; niektóre niepravidłowy.^{*)}

Duża ilość rodzeń, jak również rodzeńi rzeźbionych: brył / Knorren, nodules). Ogółem 316 szt. Rodzeńi odmiennie smukłych b. wielkości.

Zębata (spouschaber, éclats radotes) zwykle widowane adłupki których jedna krawędź jest obrabiona jako drapacz (krabrer) lub skrobacz (schaberschneide) 136 szt., jedna też 38 rodzeńi - lub bryłowych krawędzi (Kern- oder Knerrenscheiben) z tym samym obrabianiem krawędzi, dalej kilka adłupków (späne) które wykarują tyłko na krótkiej stronie gładkie wyprostowane postacie na skutek kilku odnowień, lub wytkorowania. W pewnych wypadkach obrabianie zaczyna się na obie krawędzie, lub też wokoło

Drapacz widowe (Klingenkrabrer, lame-graboir) widowane z wygiętym, widowym z wygiętym ostrzem. 3 okazy.

Drapacz krótki (krabrer, grattoir) wytworzony z kruszczenia występuje na paludisowym siedlisku w ilości 31 okazów, 2,6-7,4 cent. dł., na potłocnym 11 ok. Najcentrum jest maty obrabiany w kształcie (grattoir discoïde). Charakter obrabiane woset w hel wypadkach gdy jest wybrany maty lub mniej nadający się kruszczenia. Kształty wydłużone występują również.

Noż (mener, couteau, pointe à dor rabattu). Typ ten występuje w liczbie trzech matych okazów 5,7 - 6,3 cent. dł. jeden posiada u dołu kant (?) do umocowania rękojści.

Wokół dwóch noży (spitre) występują również maty nożyki Federmesserchen wytworzone z widowa smukłego, lub adłupka (z p. 18)

Strzechy dłuźkowane (flèches à tran. tranco) nie występują wcale

w Maglemose.

*) Liczne stauowiska nie podrobione z grubo obrabionymi narobkami z Mar-d'Azil.

¹⁾
Groby strast (Pterospirenflöcher à tranchant longitudinal)
z maglemol 14 karnes nadaju. Gystepujz nòivovadne typy,
~~to~~ koje w istòic zjadraji i z adporieduicimi arylòadami.
W potudurimym adcinke sòe dlislu molerions dva
ostra strast w kroticic moler adcinke ksta, miedny
3.3 - 3.8 cent. dlus. w tym jeden z kroticim ry 19. Olaz
b. nadli.

W potrusenym nòedlislu molerions j ostny do strast (ry. 20-26)
Krotit lancetovaty (kawettform) kojuz blizho segmentu
(zweieck) pnedchodit ku w tojst i zbliza ry' do crenovskaty,
nie budu jednak dalej adtranonym jako krapen lub noub.
Napdlurim 3.5 cent. najpòitry 1.5 cent. dl. w drcul shardw krasodi
ostra jest nòivneri ad spodu rebanovana.

x Jaromir obròila w ten spòsob namòitit kòs' kòstic i pòchòdit
mòitòitòene