

1

Jaskinia Kiskevelyi koto Csobanka u poblím Budapešti.

12

Najvyšší vantage zótky dyluminu, molarty in u wielkij
ilosci ^{mo} piskane ciekne mikrotityme rozki (meserklingen), u
ktorych jedna krasopli t. m. ochronny rutenem byta ilpina
na. Tel typ adponuda u repetarici formou madlenitum
zchodulo europ. stanniti, z puvodu cesp ja ke vartky
wpiérawe straty graficemi i faunichyemem stonuchami
zaburam do madlenitky. Ty ty ismej warkie molarty
u, takze dua piskane zivotne otku kociane o puvodu
eliptyemem, ktore byt wywane jako otku do lanc albo
rydta. Na jednym z tyh otku kociantych u stady osady
(wzrostu u radu) w postaci wyairyl burd. Puvodu
u najwyzij warkie brach ~~tyt~~ uedidiedia jaskiniaz, u
podczas jdy stobiz on wytkpuz - mear wponuiane wa.
koy z noruicem sedopinem reprezentaric doly
i gory ponim madlenitky. Ten puvot riega do 4000
wstap u zotte dylumin, papod ktorem tej jatowa
zotte glina; u tej wytkpuzi jui uedidiedia jaskiniaz
marowo. Warky ty zaliczam na postawie stonuch
straty graficem do zolotrenu. Jednym stady pobytu
~~zotte riega u ty z brunatny gliny, ktora tej pod zot-~~
te gliny, zotaty u wielkij ilosci wytkpuz otku sporadica
ne z ktow uedidiedia jaskiniaz. Wedlug mozh
obrewaj u wytkpuzi otku zolotrenu i madlenie
Warky ty na postawie mozh nowym diadidiam uie
do musterjemu ter dary do postolotrenu albo
eventualne do najwyzij orinjajem. Uwariam ra
uaine poduicic ze u wponuany brunatny warkie
wytkpuzi renit tyko b. nadho, uobowiast doic
cwo byt rajdawane byt edelchirch. Ziotkej pla-
stymy glinie, ktora tej po pod brunatny gliny na
zwaleriono niestety zidupl wyroban ledyhet. Badaim
jaskini u tak daleko puvote, ze do cathmitky jdy
wypromemiu potrahi jui tyha l m-ca tracy.

Jarkiniä Bajóti Jankovích, komitat Esztergom (Ostrogom
po něm. Szau) 2.

8 dni pracovat. Badanie u naštylněnej cesty jarkiniä.
Z najnižej varty zótky dyluvialnyj gliny vydobyté roztato
v pásmo obrábene lacovate ostre, ktoré pod vplyvom
vykonaním vytrhnuje poromnava z najpúštnějšími ohnami
jarkiniä Excelsa, i ktoré ostre obrába ostrejšími solu-
táciami než byl varty. Taktaj roztato také molerioné
ostre dšidy sponožovne z kósi o obráštynjmebruju. Jež
typu mýpogynia vstra dšid z jednorozmúre oběstj
pádkatru. Podobne typy vplytj vytrhnuvaci mararo
na zachodnie, gtdnie u kósi poromnava madleni.
Něm. Ten fakt ně mýre jeduch mýci vplytj na
pamyř padane obráštyně vstru, pomyvaci z pavydu
nělčij. prototy typu podoběvštr mýre bý tykto
wynikim mýpadkom konvergenčij. Strenuřne doty-
evione rezultaty mýre mý vstruřni, z fórne partje
dotyčevos zbadany varty gliniastj dyluvialnyj
nalezj do madlenišev, dolue partje natomněst
do volutovjšev. Dotyčevos roztato zbadana kósi
1/8 cesty jarkiniä.

Jarkiniä Balla, komitat Borsod

Badanie na uhořevim. Najvážněřim wynikim badani
jeť molerioné mýduj gliny madlenišev obráštyně tak
na padstane vstru gřaficnyj dšupl a gliny zielovav
nary varty protovolutovjšev albo góme ortuřevšev
na ognišev, u kósi vrtaty molerioné try dšid mýro
obroběvne ostre lacovate, ktoré ja mýro sč varneho
obroběvni, z vplyvu na to, z byť one jeť obráběvne
na vstru dšid, zaldvam do volutovjšev.

Jarkiniä Iskilloškó, komitat Borsod

Wynikim mýduj varty ocrešivavim, pomyvaci vydobyté
z ognišev, ktoré mý roztogato gřebokósi vřoto 80 cub.
u zótkem dyluvium, vřoto 50 vřopotj palestj, ktoré vřoty.
mýř poromnava z najvážněř klavemim mýř vřotyčevni.

wynabawia rzeź. Eozozy. Najbardziej cudi materialnyzacji wznoszą
kłada się z masywnymi kłębami, których brzośki, stopnie do
truskawki cytonicznej orinżachy, by przy setku wzdłuż całej
brzośki (katalożetach), przy pomocy setunku kanalowatego
jest przewidywana cudi przewidywana na droższe.

Fauna jest na ogół tylko przez niedzielnia jaski znowu
reprezentowana. Mniejsza rewersa ani mikrofauna. Ogólnie
nie jest pełna z zupełności wychylności.

Jaskinia Pálffy kamień Porseny

Wykopaliście w jaskini Pálffy'ego w Matyjl Kapa-
lach, dotychczas liczył wyrobion linem. Przy rozkopaniu
nie wykopali, że oprócz ludzi madlenich i postro-
wicz, których jaskinią k' uduchodzą też ciotki orinżachy.

W górnym rowie uwarianym dołód za jaskinią, która uważna
została walcionej obrze dudy sporadyczne z ludzi, płasko-
i spinaczo rostrone, których podziałowa, ^{z wyjątkiem} ~~z wyjątkiem~~
była jest rozroczona z orachy i tylko tużo her Kaden-
stadzien. Z powodu wymiennych wadliwych odpoda.
da ono całkowicie obrze typu Kuzigac a base
fendue, które jest charakterystyczne dla inużkiego
orinżachy we Francji. Na wstępie od Francji typ
ten jest znowu tylko sporadycznie, i według mojej
wspomnienia nie był on znany ani w Węgry ani w
Austrii. Ten interesujący i specjalny typ obrze dudy i uwar-
wypływ i to właśnie w kablach wartwal w jaskini się na-
brato spodnie w i wstępnym stratygraficznym, parko.
właściwie powięz protosolutyjskiego, uwarium za reu b. węgry
z punktu widzenia paleo-etnologicznego. Należy podkreślić
że wspomniany warstwa przedstawiła kontrast z fauną
Cerdy warstwa kablów i pod względem stratygraficznym,
i że we faunie jui nie występowały rewers. Zarówno ten na-
warstwa, że w tej jaski i w innych jaskiniach Cerdy wydo-
byte zostały z warstwa madlenichich w wielkiej ilości górnio-
femorne rewersa, mimo że nie walcionej obrze cudi
sklepu. Stwierdziło to, że właśnie pierwsze obciąża

Spółki ud i zbraat je jako zabauki, heb bei z jakub. 4.
Zoi inuery powodu. Odwrotne fauny nielicz konie eniem faune
ran podobnie, ze u warcie, ktora wspomnianie otre kote
ne raniwatu, w procie nielicz do stroy warty nie rudi
no Sladen ani nemi fra, ani arktymu- mikhofaun,
I re mikhofauna warty proto salubrych, albo
ewentualnie solutog' chel, her pierwszy, pochodzi w
warty madleinske ktore nie raniwaj, jui wicy, niedi.
medeia jukimioney. Imieniem Stocami: i ktore uniany
klimatymu ktore nemiun juyjai (ewentualnie otre co-
dory) warty ^{mozy} ^{nieci} ^{nieci} tylo niudy oinjachim z rolety.
thim a nie utowidant niudy solutog' thim a madleins.
thim. Z dazy mi ty, ze jut wainy reem poducic, ze
arktyma mikhofaunami z liczeniem leninija-
mi jui w protovolubrych wytkupje. W nie miedziel
rudleinske wedy R. L. Schmidt'a wytkupje do
piedo w madleinskim. W warty protovolubrych
rudleinske rab diecha, dazy thionny z dolny
francj stroy nuyji, diecha 6-7 latnyj.

Orenewate.

Wytkupwane protovolubrych warty rapuan
mojume denneum pasladem, wedy ktore solutog' thim
formy lidziacke nominy i u niu kerporedicis z mudy.
Hilil orty nuypl. Jeduch niimo to i nadal juten
zdanie, ze formy lidziacke nominy i i ktore i jute.
byel ty ^z orty nuypl, ktore to ortakie jeduch niwale.
ne mudy pasladem id form mudychiel w naj-
wybnym poroime oinjachim.

Wyciaz z frany Dr. E. Hillebrandta: Ergebnisse meiner
Höhlenforschungen im Jahre 1913.

"Barlanghatatis" II, zen. 2, 1914. Budapest.
Hr. 115-153.