

TABELA CV

Odległość gniazd bociana białego od zamieszkałych zabudowań w byłym powiecie Sochaczew w roku 1974

Distance of White Stork nests to the nearest occupied house in the district of Sochaczew in 1974

Odległość Distance	Liczba gniazd Number of nests	Procent gniazd Per cent of nests
W obrębie zabudowań i do 100 m od nich On the buildings and up to 100 m	138	93,2
Od 100 do 500 m 100 to 500 m	10	6,8
Powyżej 500 m Over 500 m	—	—
Razem Total	148	100,0

## 34

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego na obszarze miasta stołecznego Warszawy w 1974 roku

Maciej Luniak

Inwentaryzacji dokonano w połowie lipca 1974 r. odwiedzając gniazda, o których informacje otrzymano od członków Koła Warszawskiego Sekcji Ornitologicznej PTZool., a także od czytelników, po apelach i artykułach ogłoszonych

TABELA CVI

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego na obszarze miasta Warszawy w roku 1974

Results of the White Stork nests census in Warsaw in 1974

Lokalizacja Location Ulica (dzielnica) Street (quarter)	Wyniki kontroli Census results	Umieszczenie Situation	Odległość od zabudowań Distance to buildings
ul. Chełmżyńska 141 (Kawęczyn)	HPm 2	topola <i>Populus</i>	podwórze back garden
ul. Panoramy 50 (Miedzeszyn)	HPm 2	topola <i>Populus</i>	c. 50 m
ul. Fosa, koło ul. Przy Grobli (Służew)	HPm 3	topola <i>Populus</i>	c. 70 m

w czerwcu w dwóch warszawskich dziennikach — *Życiu Warszawy* i *Ekspresie Wieczornym*. Niezależnie od zebrania informacji dokonano na rowerze przejazdu i przeprowadzono wywiady w tych peryferyjnych dzielnicach miasta, gdzie można się było spodziewać stanowisk bociana. Wyniki inwentaryzacji na obszarze Warszawy (granice i nazewnictwo według Planu Warszawy, PPWK 1970) przedstawiono w tabeli CVI.

## 35

## Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie Ryki w 1974 roku

Janusz Osiak

Powiat Ryki zajmował stosunkowo niewielką powierzchnię 670 km<sup>2</sup>. Na ukształtowanie jej decydujący wpływ wywarło zlodowacenie środkowopolskie. Gleby występujące w tym rejonie należą do niskich klas jakości. Są to głównie bielice

TABELA CVII

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w byłym powiecie Ryki w roku 1974

Results of White Stork nests census in the district of Ryki in 1974

Rodzaj danych	Liczba gniazd	Rodzaj danych	Liczba gniazd	Rodzaj danych	Wartość
Data	Number of nests	Data	Number of nests	Data	Value
H	92	HPm 5	—	JZG	190
HP	76	HPm 4	6	JZa	2,50
HB	—	HPm 3	32	JZm	2,60
HE	—	HPm 2	35	StD	11,3
HO	16	HPm 1	—	WiSt	—
Hx	—	HPm x	—		
		HPo (m)	—		
HPm	73	HPo (—)	—		
HPo	3	HPo —	—		
HPx	—	HPo x	3		

i w mniejszym stopniu gleby brunatne. Pomimo że południową i zachodnią granicę omawianego terenu stanowią rzeki (Wisła i Wieprz), jest to teren o wyraźnym deficycie wody; dotyczy to zwłaszcza części środkowej i północno-wschodniej. Jedynie w części południowo-wschodniej, w dolinie Wieprza, znajdują się niewielkie stawy. Większe obszary łąk są zlokalizowane głównie w dolinach Wisły i Wieprza, lasy