

Kolejne dane o stanowisku tygrzyka paskowanego *Argiope bruennichi* na Polesiu Lubelskim

Bardziej wnikliwa eksploracja otoczenia – podanego niedawno (Zieliński, Zielińska 1999) – nowego stanowiska tygrzyka paskowanego *Argiope bruennichi* w miejscowości Kolonia Liszna koło Sławatycz na Polesiu Lubelskim (UTM-FC73; gospodarstwo p. Franciszka Szczura) doprowadziła do poszerzenia informacji o występowaniu gatunku w tej okolicy. Obserwacje przeprowadzono na wilgotnej, częściowo wypasanej łące (owce); jej część użytkowaną (pastwisko) i nieużytkowaną rozdzielał rów melioracyjny. Stanowisko to zlokalizowane było w odległości 100–200 m od opisywanego poprzednio (Zieliński, Zielińska 1999).

W dniu 5.07.1999 r. stwierdzono na pastwisku 52 samice tygrzyka na sieciach rozpiętych w kępach situ siniego *Juncus inflexus* (do 5 samic na jednej kępie) i 1 w kępie śmiałka darniowego *Deschampsia caespitosa*. W części nie wypasanej odnotowano 1 samicę na sieci w kępie *J. inflexus*.

Obserwacje powtórzono 23.08.1999 r.; na wypasanej łące stwierdzono 14 samic tygrzyka na sieciach w kępach situ (do 2 samic na kępie) oraz 3 samice na sieciach rozpiętych na śmiałku. Nie spotkano żadnego osobnika w części nie wypasanej łąki. W sieciach pajaków odnotowano upolowane: prostoskrzydłe *Orthoptera*, muchówki *Diptera* (*Tipulidae*), chrząszcze *Coleoptera* (*Chrysomelidae*) oraz ważki *Odonata*.

Stwierdzono wyraźne preferowanie przez tygrzyki biotopu bardziej nasłonecznionego, ukształtowanego oddziaływaniami antropogennymi (wypas), a także większy udział w sierpniu niepozornych pajęczyn znajdujących się nisko nad ziemią.

Sławomir Zieliński, Iwona Zielińska

PIŚMIENNICTWO

Zieliński S., Zielińska I. 1999. Nowe stanowisko tygrzyka paskowanego *Argiope bruennichi* na Polesiu Lubelskim. *Chrońmy Przyr. Ojcz.* 55, 1: 106–107.