

Nr 26/93

Nazwisko

Wiek

Dzień śmierci

Sekcjonowany

o godzin

po śmierci
sekcja mózgu
17.03.93

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. zwoje podstawy
2. wzgórze
3. kora czołowa
4. skroń z amonem
5. ciemie
6. potylicy
7. centralna
8. most
9. fragment śród-
mózgowia z i.
czarną
10. mózdzek - 2x

Użyte metody barwienia

HE, Heidenhain

Mikrofotografie, rysunki

Rozpoznanie kliniczne

AIDS

Rozpoznanie histologiczne

Coagulatio intravascularis generalisata.
Brak zmian HIV-swoistych i zakażeń oportu-
nistycznych.

Ptof. M.J. Mossakowski

(przypadek z Wrocławia) Nabyta niewydolność immunologiczna

W całym ośrodkowym układzie nerwowym bardzo znaczne cechy przekrwienia żylnego. W niektórych naczyniach istoty białej półkul mózdzku i mózgu widoczne obrazy wykrzepiania naczyniowego.

W III warstwie kory czołowej w jednym preparacie widoczne bezodczynowe zmiany gąbczaste. W większych naczyniach gałki bladej widoczne drobnopłytkowe zwapnienia.

Rozpoznanie: Coagulatio intravascularis generalisata.

Uwagi: Brak zmian związanych z infekcją HIV lub zakażeniem oportunistycznym. Preparaty grube, źle czytelne oraz trudne w ocenie topograficznej ze względu na ich pobieranie z materiału po sekcji sposobem Virchowa.

Prof.dr hab. M.J. Mossakowski