

Nr 194/66

Nazwisko

Wiek 61 lat

Dzień śmierci
2.XI.66 r.

Sekcjonowany
w 24 godzin
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

publio 127

onygi ma

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

- 1/ rdzeń szyjny z przerzutem do opony
- 2/ rdzeń piersiowy z przerzutem
- 3/ rdzeń piersiowy w miejscu maksymalnego przewężenia
- 4/ rdzeń lędźwiowy ze zmianą w oponie
- 5/ skrawek z rdzenia szyjnego

Użyte metody barwienia
H-E, krezyl,
V.G., Heidenhain

Mikrofotografie, rysunki
K. Staszewska

Rozpoznanie kliniczne

Ca oropharyngis. Infiltratio carcinomatosa radium cervicalium, meningium et medullae bblongatae.

Rozpoznanie anatomiczne

Rozpoznanie histologiczne

Laesio medullae spinalis in regione cervicali post therapiam.

Na poziomie szyjnym rdzeń otoczony oponą twardą bocznie bardzo pogrubiłą przerosłą włóknami kolagenowymi ponadto z licznymi starszymi i świeżymi krwotokami. Bezpośrednio z nimi sąsiaduje ognisko mas bezpostaciowych barwiących się H-E ciemno-fioletowo. Jego okolica i dalsze części opony są ponadto nacieczone przez obfity naciek ropny, który uciska również sam rdzeń, a nawet brzeżnie przechodzi na tkankę

Rozpoznanie kliniczne
 Ca. oropharyngeal. Infilt. i t. c. oropharyngeal.
 at medullae oblongatae.

xx nerwową. Rdzeń jest bardzo uszkodzony na tym poziomie widoczne są jedynie poszczególne komórki nerwowe. Dalsze przekroje szynno piersiowe /bardzo uszkodzone przy opracowaniu technicznym/ wykazują również znaczne uszkodzenie, brak kk nerwowych, a dopiero rdzeń lędźwiowy przedstawia obraz prawidłowy, uszkodzenia komórkowe są w nim umiarkowane. Na żadnym poziomie nie ma zmian nowotworowych.

Doc. M. Dąbaska

Rozpoznanie histologiczne
 Lesio medullae spinalis in regione cervicali post. thesiam.
 Na poziomie szynnym rdzeń otoczony oporną twarzą, po stronie bocznej widoczne są komórki kolagenowe i komórki to a liczny starymi i świeżymi krwotokami. Bezpośrednio z nimi sąsiaduje ognisko mas beopstaciowych barwionych atę H-E o ciemno-liczono. Jego okolice i dalsze części opony są bardzo nacięte przez otęty naciek ropny, który wataś rdzenia sam rdzeń a nawet przesłania przechodzi na tkankę

Utworzony materiał:
 Alkohol
 Formalin
 1/ rdzeń szyjny z preparatem do opony
 2/ rdzeń piersiowy z preparatem
 3/ rdzeń piersiowy z miejscem makro- i mikro-
 4/ rdzeń lędźwiowy z makro- i mikro-
 5/ strzałka z rdzenia szyjnego

Użyte metody barwienia
 H-E, kryzyl, V.G., Heidenhain
 Mikrofotografie, rysunki
 K. Staszewska

Nr 194/66
 Nazwisko Bóg
 Wiek 61 lat
 Dzień śmierci 2.XI.66 r.
 Sekcjonowany w 24 godzin po śmierci
 Ogloszone lub demon- strowane przez
 J. J. J.