

26. *Colotois Hbn. pennaria L.* Wie vorige verbreitet. Flugzeit von Anfang September bis Anfang November. Raupe häufig im Juni auf Eichen und Buchen gefunden.

* 27. *Crocallis Tr. tusciaria Bkh.* Bonfeld (Heilbronn) von SCHUMANN gefunden, Möckmühl Raupen an Weißdorn (MARTIN), Weikersheim 1 Raupe an Schlehe 8. Juni 1930, Falter erzogen (SCHNEIDER). Flugzeit September, Oktober. (Cfr. FR. GUTH: »*Crocallis tusciaria Bkh.* Zucht e. o., Vorkommen in Baden und Verbreitung in Deutschland.« Ent. Ztschr. Frankfurt XXXV. Jahrgang, Nr. 5.)

28. *Cr. elinguarina L.* In Laubwäldern verbreitet und nicht selten von Anfang Juli bis Ende August. Das Ei überwintert. Raupe an Eiche, Buche und Heidelbeeren gefunden.

29. *Angerona Dup. prunaria L.* Im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten von Ende Mai bis Ende Juli. Raupe an Eiche gefunden, e. o. mit Schlehe erzogen.

f. *corylaria Thnbg. (sordata Fuessl.)* nicht selten überall.

30. *Ourapteryx Leech. sambucaria L.* Mit Ausnahme des höheren Schwarzwaldes und der oberschwäbischen Torfmoore im ganzen Gebiet verbreitet und manchmal häufig, oft in Gärten und Anlagen mitten in der Stadt. Raupe des öfteren an Efeu gefunden.

31. *Plagodis Hbn. dolabraria L.* Ähnlich wie *sambucaria* verbreitet, doch sehr einzeln. Flugzeit Mai, Juni.

32. *Opisthograptis Hbn. luteolata L.* Fehlt im Schwarzwald, sonst im ganzen Gebiet verbreitet und häufig von Ende April bis Ende Juli. Raupe im Herbst oft an Eberesche gefunden, e. o. mit Schlehen erzogen.

33. *Epione Dup. repandaria Huf. (apiciaria Schiff.)* Sehr lokal und selten. Möckmühl, e. o. mit Zitterpappel erzogen (MARTIN), Stuttgart, Tübingen (BARTH), Federseeried vereinzelt (FUNK), Oberkollbach 30. Juli 1900 (ROMETSCH), Alberweiler (HUBER), Bonfeld (SCHUMANN), Aalen (HAHNE), Kochertal 8. Oktober 1926, 18. September 1928 (RENNER).

34. *E. vespertaria F. (parallelaria Schiff.)* Im ganzen Gebiet verbreitet, nicht häufig, von Anfang Juni bis Mitte Juli.

35. *Cepphis Hbn. advenaria Hbn.* In Waldungen mit Heidelbeerunterwuchs nicht selten von Ende Mai bis Mitte Juli. Scheint dem höheren Schwarzwald zu fehlen.

36. *Hypoxistis Prout. pluviaria F. (adpersaria Hbn.)* Stuttgart, Stücke in der W. N. S. (v. ROSER), Stuttgart-Hasenberg 2 ♂♂ Juli 1898 (CALMBACH), Württbg. Allgäu (ASCHEAUER), Heudorf (TROLL), Biberach (ASCHEAUER). Aus neuerer Zeit keine Funde bekannt.

37. *Pseudopanthera Hbn. macularia L.* Charaktertier der schwäbischen Alb, fehlt im Schwarzwald, im übrigen Gebiet verbreitet, doch sehr lokal von Mitte Mai bis Mitte Juli je nach der Höhenlage. E. o. mit Wiesensalbei erzogen. (cfr. Entomol. Anzeiger, Wien, IX. Jahrgang, Nr. 20.)

