

vorkommende Art. Die Raupe war nach der letzten Häutung grünlich mit dunkleren Rückenlinien und schwarzem Kopf.

Alabonia bracteella L. ab. *mariboënsis* Strand n. ab. Der gelbe Costalfleck der Hauptform ist durch eine breite gelbe Binde, welche über das ganze Saumfeld sich erstreckt, ersetzt. Maribo in Dänemark. (Cfr.: Larsen l. c. p. 80.)

Bryotropha Larseni Strand n. sp. nenne ich die in Larsen l. c. p. 96—97 beschriebene, aber nicht benannte, mit *senectella* Z. verwandte Art. Bornholm.

Fam. *Gracilaridae*.

Lithocolletis nigrescentella Logan ab. *tisvildensis* Strand n. ab. Das erste und vierte Vorderrandsstrichelchen fehlt. Tisvilde (Dänemark).

Fam. *Elachistidae*.

Elachista Larseni Strand n. sp., eine mit *E. cerusella* Hb. verwandte, in *Digraphis arundinacea* lebende, in Jägersborg Dyrehave in Dänemark gefundene Art.

B. Apidae.

Drei neue spanische *Eucera*-Arten.

In „Mem. de la Real Soc. Españ. de Hist. Natural“ T. XIII, Mem. 2 (1926) p. 155 beschreibt Dusmet drei spanische *Eucera*-Formen, die er geneigt ist, für neu zu halten, jedoch ohne sie zu benennen. Ich schlage vor, seine Art Nr. 32, von Jerez, als *Eucera jerezensis* Strand, seine Art Nr. 33, von Ordesa, als *Eucera ordesensis* Strand, und seine Art Nr. 34, von El Pardo, als *Eucera pardonis* Strand zu bezeichnen.



