

POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE

S. 1125

BULLETIN ENTOMOLOGIQUE DE LA POLOGNE

WYDAJE
POLSKI ZWIĄZEK ENTOMOLOGICZNY
PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ POLONAISE DES ENTOMOLOGISTES

Z ZASIŁKU WYDZIAŁU NAUKI MIN. W. R. I O. P.

T. V. — ZESZYT 1 — 2. — 1926

SZYMON TENENBAUM

NOWE DLA POLSKI GATUNKI
I ODMIANY CHRZĄSZCZY. III.

(COLÉOPTÈRES NOUVEAUX POUR LA POLOGNE. III.)

LWÓW 1926

Z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich
pod zarządkiem Józefa Ziemińskiego



*Styl ob.
Sep. 13547.
24.10.49
d.p.*

2021



S. 1125.

Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. III.¹⁾

(Coléoptères nouveaux pour la Pologne. III.)

podał

SZYMON TENENBAUM.

Dyschirius similis Petri. Pieniny: Krościenko 6. VIII. 25 — jeden okaz (det. inż. J. Makólski).

Bledius frater Kr. Podawany z Francji, Włoch i Bałkanów. Dwa okazy znalazłem pod napływkami po wylewie Wisły 4. IV. 24 na Bielanach koło Warszawy.

Bledius unicornis v. *juvencus* Er. Okolice Warszawy: Pustelnik 25. III. 24 — jeden okaz pod napływkami.

Stenus maculiger W se. Podawany z Krainy, Bałkanów i z Azji Mniejszej. Pieniny: Krościenko 9. VIII. 24 — jeden okaz nad Dunajcem.

Lathrobium spadiceum Er. Pieniny: Krościenko 2. VIII. 24 — jeden okaz między napływkami po wylewie Dunajca.

Lathrobium bicolor Er. Pieniny: Krościenko 2. VIII. 24 — jeden okaz między napływkami po wylewie Dunajca.

Xantholinus angustatus a. *nitidicollis* Reitt. Okolice Warszawy: Pustelnik 13. IV. 24.

Ontholestes murinus a. *haroldi* Epp. Okolice Warszawy: Czarna Struga 16. IV. 24 — jeden okaz.

Staphylinus caesareus a. *parumtomentosus* Stein. Warszawa — park Łazienkowski 8. V. 24 — jeden okaz.

Philonihus pennatus Shp. Nierzadki, dotychczas jednak przeoczony. Wielokrotnie zbierałem go w okolicach Warszawy i w Pieninach.

Atemeles emarginatus v. *recticollis* Wasm. Pieniny: Krościenko 9. VIII. 24 — jeden okaz między opadłymi liśćmi.

Euconnus motschulskyi a. *europaeus* Csiki (a. *rufescens* Gnglb.). Sosnowiec 12. VII. 16.

Trogoderma versicolor a. *meridionale* Kr. Występuje wraz z formą typową.

¹⁾ I. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. „Polskie Pismo Entomologiczne“. T. III, zes. IV, 1924 — Lwów 1925.

II. Kilkadziesiąt nowych dla Polski chrząszczy. Ibid. T. IV, zes. 2, 1925.

Hypnoidus pulchellus a. ripicola Fried. Mam go z okolic Warszawy. Występuje zapewne wszędzie wraz z formą typową.

Idolus picipennis a. scapulatus Bach. Okolice Warszawy: Miłosna 15. VIII. 17 — jeden okaz.

P. ocræus tibialis v. subcarinatus Germ. Okolice Warszawy: Saska Kępa — kilka okazów bez daty, Młociny 12. VIII. 16 — jeden okaz; Puławy IV. 07 — dwa okazy.

Dicerca alni a. nigricans Schilsky. Okolice Warszawy: Rembertów — jeden okaz.

Poecilonota rutilans a. immaculata Schilsky. Ojców — wraz z formą typową.

Agrilus betuleti a. tristis Füg n. Okolice Warszawy: Czarna Struga 12. V. 10.

Anoncodes fulvicollis a. mollis Reitt. Pieniny: w dolinie potoka Pienińskiego dość liczny, występuje tam wraz z formą typową.

Chrysanthia viridis a. cupreomicans Westh. Mam go z okolic Warszawy; występuje napewno wszędzie wraz z formą typową.

[*Anthicus longicollis v. tenenbaumi* Pic. Opisany przez pomyłkę z Polski¹⁾). Pochodzi z Syberji].

Anaspis flava a. pectoralis Schilsky. Okolice Warszawy: Dembe Wielkie 24. VII. 18 — jeden okaz.

Xylita luprestoides a. lividipennis Reitt. Warszawa: Saska Kępa 15. V. 20.

Hypulus bifasciatus a. trifasciatus Reitt. Mam go z okolic Warszawy. Zapewne wszędzie wraz z formą typową i liczniejszy niż ona.

Omophlus rufitarsis a. frigidus Muls. Okolice Warszawy: Falenica 23. V. 24.

Grammoptera variegata a. nigrescens Wse. Okolice Warszawy: Chojnów 8. VI. 24 — jeden okaz.

Plagionotus floralis a. basicornis Reitt. Ojców — wraz z formą typową.

Donacia sparganii a. coelestis Wse. Bochothnica (Lubelskie)

¹⁾ M. Pic. Notes diverses, descriptions et diagnoses. „L'Échange“ T. 41, N. 419, Moulins 1925.

28. VI. 08 — kilkanaście okazów. Zapewne wszędzie wraz z formą typową.

Cryptocephalus bipunctatus a. 4-notatus H. Schöff. Okolice Warszawy: Drewnica 19. V. 24 — jeden okaz.

Cryptocephalus bilineatus a. armeniacus Fald. Występuje wszędzie wraz z formą typową; mniej liczny.

Chrysomela marginata a. cinctella Gyll. Mam go z okolic Warszawy (Saska Kępa) i z puszczy Niepołomickiej. Zapewne wszędzie wraz z formą typową.

[*Chrysomela carpathica a. hopfgarteni* Wse. Podałem go przez pomyłkę].

Epithrix atropae a. 4-maculata Wse. Mam go z okolic Warszawy, z Pienin i z Ojcowa. Napewno występuje wszędzie wraz z formą typową.

Chaetocnema sahlbergi a. cyanescens Wse. Pewnie liczniejsza niż forma typowa. Mam ją z okolic Warszawy, z Pienin i z Pomorza.

Hypocassida subferruginea a. sobrina Wse. Okolice Warszawy: Skolimów 24. IX. 20; Lubelskie-Zamojszczyzna: Hamernia 17. VII. 10. Zapewne wszędzie wraz z formą typową.

Cassida canalicuta a. graminis Suffr. Pieniny: dolina potoku Pienińskiego 31. V. 25 — jeden okaz.

Cassida flaveola a. littoralis Wse. Pomorze: Gdynia 18. VII. 21.

Cassida nobilis a. obscurella Wse. Okolice Warszawy: Zaczysze 12. VI. 10.

Otiorrhynchus raucus a. tristis F. Mam go z okolic Warszawy, z Lubelskiego, z Krakowa, Płocka i Wilna. Napewno wszędzie wraz z formą typową.

Phyllobius calcaratus a. fuscofumosus Reitt. Lubelskie: Zwierzyniec 3. VII. 10 — dwa okazy.

Phyllobius calcaratus a. tibialis Schilsky. Zakopane 9. VII. 24 — jeden okaz.

Dorytomus longimanus a. meridionalis Desbr. Okolice Warszawy: Droga Królewska 4. VII. 15.

Dorytomus filirostris a. tomentosus Fairm. Mam go z okolic Warszawy i z Ukrainy. Prawdopodobnie wszędzie wraz z formą typową.

Anthonomus varians a. rufipennis Gerh. Okolice Warszawy: Gocławek 17. IV. 12.

Elleschus scanicus a. pallidesignatus Gyll. Wszędzie tam, gdzie forma typowa, liczniejszy niż ona.

Apion alliariae Hbst. = *basicorne* Illig. Okolice Warszawy: Piaseczno 16. VI. 14. Gatunek samoistny a nie synonim *A. carduorum* Kirb. (Wagner).

Rhynchites aequatus a. paykulli Schilsk. Wszędzie wraz z formą typową.

Aphodius rhododactylus a. sabulicola Muls. Pieniny: Sromowce Niżne 29. V. 12 — kilkanaście okazów wraz z formą typową.

Aphodius 4-guttatus a. astaurus Fuente. Okolice Warszawy: Bielany 1. VI. 16 — jeden okaz.

Aphodius zenkeri a. maculifer Reitt. Skierniewice 1895.

Aphodius mixtus a. conjunctus Schilsk. Niemal wszystkie nasze okazy tego gatunku należą do tej aberacji.

Cetonia aurata a. purpurata Heer. Występuje wraz z formą typową.



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but appears to contain several lines of script.



