

*[Faint, illegible text from the reverse side of the page, likely bleed-through from the previous page.]*



S. 1192.

SZYMON TENENBAUM.

**SPIS GADÓW, PŁAZÓW I SSAKÓW,**  
zebranych w Ordynacji Zamojskiej w gub. Lubelskiej.

coll. z „Pamiętnika przyrodz.”

Warszawa

Spis do  
Zp. D-5207.  
8. 9. 49  
M.P.



SZYMON TENENBAUM.

## Spis gadów, płazów i ssaków,

zebranych w Ordynacji Zamojskiej w gub. Lubelskiej.

Prowadząc badania entomologiczne z ramienia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ordynacji Zamojskiej w ciągu trzech lat ubiegłych, część czasu poświęciłem kręgowcom. Wszystko co się tyczy badanego terenu podałem w pracy p. t. „Chrzyszczce (Coleoptera), zebrane w Ordynacji Zamojskiej w gub. Lubelskiej“; chcąc więc uniknąć powtarzania, odsyłam czytelnika do tamtej pracy. Gdyby nie znalezienie kilku bardzo rzadkich zwierząt, spisu tego wcale bym drukiem nie ogłaszał; nie mogąc bowiem wiele czasu poświęcać kręgowcom, wielu gatunków, które na terenie Ordynacji napewno się znajdować muszą, nie zebrałem, spis przeto jest bardzo niekompletny. Ponieważ nie zaopatrzyłem się ani w broń myśliwską, ani w żelaza do łapania drobnych ssaków, więc było zgóry do przewidzenia, że wielu gatunków napewno nie uda mi się zdobyć. Z tej właśnie przyczyny nie mam ani jednego nietoperza; szukanie bowiem w dziuplach drzew zajęłoby mi zbyt wiele czasu, a takie rodzaje, jak myszy, norniki lub sorki, przypadkiem tylko w me ręce się dostały. Łapiąc owady, przesu-kałem znaczną ilość zbiorników wodnych, w których łapałem ryby niejednokrotnie; zebrałem jednak tak znikomy procent w stosunku do całości fauny ichtjologicznej, że spisu nie ośmielałem się podać; wymienię więc tylko kilka ciekawszych gatunków. Muszę przedewszystkiem zaznaczyć, że można jeszcze spotkać w dopływie Tanwi, w rzece Szumie, w okolicy Gorecka Kościelnego w powiecie Biłgorajskim nieliczne pstrągi (*Salmo fario* L.), które są tam już rzadkie ze względu na rabunkową gospodarkę miejscowych włościan. Rzeczka Szum jest jednym z bardzo nielicznych dla Królestwa stanowisk pstrąga i jako takie dotąd nie była notowana w literaturze. Kilkanaście lat temu pstrągi były tam, jak mi opowiadano, bardzo pospolite, teraz już z trudem tylko zdobyć można ładny okaz. W mojej obecności złapali chłopcy wiejscy w 1910 roku dwa okazy, które obecnie znajdują się w zbiorach Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie. Oprócz pstrąga licznie występują w Szumie głowacza białopłetwe (*Cottus gobio* L.), rzadziej miętusy (*Lota vulgaris* L.). Interesujące jest występowanie w Wieprzu pod samym Zwierzyńcem głowacza białopłetwego, a to z tego względu, że ryba ta zamieszkuje zazwyczaj miejsca o wartkim prądzie i dnie żwirowo-piaszczystym, podczas gdy na całej prawie przestrzeni między Zwierzyńcem a Obrocą dno Wieprza pokryte jest drobnym piaskiem i trocinami, pochodzącymi z tartaku. Najczęściej znaleźć tam można głowacze pod pniami zatopionych drzew wraz ze ślizami (*Cobitis*

*barbatula* L.). W Wieprzu poławiają węgorze, zaś nieżyjący dziś Jan Brandt złowił jesiota zachodniego (*Acipenser sturio* L.). W rok czy dwa lata przed moją pierwszą bytnością w Zwierzyńcu, t. j. przed rokiem 1910-ym, pan Chlebowski, miejscowy aptekarz, złapał w parku Zwierzynieckim w Wieprzu minoga strumieniowego (*Petromyzon planeri* Bloch); drugi okaz, zdaje się, że w tym samym miejscu, złapał w 1911 roku. Tyle tylko z ciekawszych nieco gatunków ryb udało mi się zanotować, sądząc, że każdy, najmniejszy nawet przyczynek do znajomości fauny krajowej przydać się może.

Przechodząc z kolei do gadów i płazów, spis ich tylko podaję. Spis ten jeżeli nie brać pod uwagę odmian, jest jak się zdaje całkowity, chyba tylko *Tropidonotus tessellatus* dałby się jeszcze odszukać.

## AMPHIBIA

### Ecaudata

- 1) *Rana esculenta* L. Wszędzie nad wodami, przeważnie stojącymi, bardzo pospolita.
- 2) „ *arvalis* Nills. Dość rzadka.
- 3) „ *temporaria* L. Wszędzie bardzo pospolita.
- 4) „ *agilis* Thom. Rzadka, ale rozpowszechniona. Spotykałem ją tylko pojedynczo, ale w wielu miejscach.
- 5) *Bufo vulgaris* Laur. Wszędzie bardzo pospolita.
- 6) „ *viridis* Laur. Rzadsza od poprzedniej.
- 7) „ *calamita* Laur. Bardzo rzadka. Jeden tylko okaz złapałem wieczorem w ogrodzie we wsi Ulów (pow. Tomaszowski).
- 8) *Hyla arborea* L. Wszędzie znaleźć ją można; miejscami rzadka, miejscami bardzo pospolita.
- 9) *Pelobates fuscus* Laur. Bardzo rzadka. Dwa okazy złapałem późnym wieczorem nad rzeczką w Hamerni w powiecie Biłgorajskim.
- 10) *Bombinator igneus* Laur. Miejscami wcale jej znaleźć niemożna, miejscami bardzo pospolita.

### Caudata

- 11) *Salamandra maculosa* Laur. Gatunek ten, dotychczas w Królestwie nie spotykany, znalazłem po raz pierwszy w powiecie Tomaszowskim, w obrębie Dąbrowa, niedaleko wsi Rogóźno; drugi okaz znalazłem w powiecie Biłgorajskim (leśnictwo Kocudza, obręb Bukowa) pod wsią Zagrody Dąbrowicy, 4 wiorsty od Biłgoraja. Słyszałem, że ma się ona również znajdować na t. zw. Kamiennej Górze we Florjance, w powiecie Zamojskim.
- 12) *Molge cristata* Laur. Okazy dorosłe wszędzie pod pniami i korą, larwy zaś w wodzie.
- 13) „ *vulgaris* L. Wraz z poprzednim, lecz jeszcze pospolitszy.

## REPTILIA

### Chelonia

- 1) *Emys orbicularis* L. Na całym terenie Ordynacji nierzadki. W dość znacznej ilości widywałem go w stawach rybnych w Rogóźnie (pow. Tomaszowski) oraz w powiecie Biłgorajskim pod wsią Kozaki na t. zw. łąkach szopowych nad rzeczką Szumem.

## Squamata.

## Lacertina

- 2) *Anguis fragilis* L. Wszędzie bardzo pospolity.
- „ „ „ *var. incerta* Krynicki. Rzadszy niż forma typowa; pojedynczo znaleźć go można prawie wszędzie. Słyszałem, że jest bardzo pospolity na Bukowej Górze między Florjanką a Obroczą (pow. Zamojski). Pospolity również w leśnictwie Kocudza.
- 3) *Lacerta agilis* L. Miejscami dość pospolita, miejscami bardzo rzadka.
- „ „ „ *var. erythronota* Fitz. Od formy typowej znacznie rzadsza.
- 4) „ „ *vivipara* Jacq. Wszędzie pospolita, o wiele pospolitsza od *Lacerta agilis*.
- 5) „ „ *viridis* Laur. Bardzo rzadka. Duży okaz tego pięknego gatunku, na nieśćczęście bardzo już nadpsuty, znalazłem w Hamerni w powiecie Biłgorajskim.

## Ophidia.

- 6) *Tropidonotus natrix* L. Spotyka się wszędzie nad wodami lub w lasach wilgotnych. Odmian jednak żadnych nie widziałem, choć zapewne możnaby je było na terenie Ordynacji znaleźć.
- 7) *Coluber longissimus* Laur. W roku 1868 Wałęcki znalazł drugie w Królestwie stanowisko tego węża o milę ku południowi od Zwierzyńca. Udało mu się wtedy zdobyć jeden tylko okaz. Od tego czasu przeszło 40 lat minęło, a o znalezieniu węża eskulapa w kraju nigdzie wzmianki nie było. Po raz pierwszy widziałem go w lipcu 1910 r. w tym samym miejscu, skąd pochodził okaz Wałęckiego. W okolicach Zwierzyńca jest on dość pospolity: przebywa głównie na t. zw. osadach, to jest porębach, oddawanych służbie leśnej pod uprawę. Oprócz tego są one dość pospolite na gęsto porośniętych stokach wzgórz, graniczących z temi osadami. Prawie wszystkie widziane przeze mnie okazy pochodzą z obrębu Grele, przeważnie z lasu zwanego Czerkies, oraz z miejscowości pobliskiej zwanej Nartem. Trafiają się one również w powiecie Biłgorajskim i Tomaszowskim, ale już bardzo rzadko. Najłatwiej węża eskulapa złapać można na osadzie nadgajowego we wsi Lasowce (obręb Grele) oraz na polach włościan tej wsi po żniwach, podczas zwożenia snopków z pola; wtedy na pewno liczyć można na schwytanie kilku egzemplarzy dziennie. Gajowi i włościanie znają go tu doskonale, opowiadają o nim przeróżne legendy i święcie wierzą w niezwykłą jadowitość jego ukąszeń. Z tego powodu tępią go niemiłosiernie, nie wiedząc o tem, jaką sami sobie wyrządzają szkodę. Jest on bowiem niezmiernie dla rolnika pożytecznym zwierzęciem, gdyż żywi się przeważnie myszami. Wąż eskulapa jest tu powszechnie nazywany położem lub płuzem, co początkowo w błąd mnie nawet wprowadziło, myślałem bowiem, że mowa jest o prawdziwych położach (*Zamenis gemonensis* Laur). Schwytanie takiego „położa“ wszelkie rozwiąło iluzję. Jeden ze schwytanych okazów dotychczas hoduję i w zupełności potwierdzić mogę zdanie Wałęckiego i Schreibersa o tem, że łatwo się oswaja. Z początku za zbliżeniem ręki, wyrzucał on nagle głowę naprzód i dość boleśnie gryzł. — Najmniejszy ze złapanych przeze mnie okazów mierzy 60 cm., największy 132 cm. długości.
- 8) *Coronella austriaca* Laur. Należy ją zaliczyć do rzadszych gatunków.

9) *Vipera berus* L. Wszędzie pospolita, najczęściej jednak można ją znaleźć na wrzosowiskach. W niektórych miejscowościach aż nazbyt dotkliwie obecność jej daje się odczuć mieszkańcom.

Dwa okazy, złapane w okolicach Zwierzyńca, przywiozłem do Warszawy, gdzie je przez kilka miesięcy hodowałem. Oswoity się bardzo mało: ilekroć je brałem do ręki, zawsze usiłowały gryźć. Podawane im myszy zawsze zagryzały, nigdy ich jednak nie chciały zjeść. Gdy raz przez nieostrożność zostawił otwarte drzwiczki terrarium, obie wylazły i przez kilka dni ich znaleźć nie mogłem. Nie chcąc, by się to raz jeszcze mogło powtórzyć, obie zakonserwowałem.

Dwie jej ważniejsze odmiany: *var. cherssea* L. i *var. prester* L. łapałem w leśnictwie Kocudza w powiecie Biłgorajskim.

## MAMMALIA

### Carnivora.

*Canis lupus* L. Wilk w lasach Ordynacyi nie gnieździ się już zupełnie, zrzadka tylko z innych lasów zachodzi. Opowiadał mi jeden gajowy, że widział wilka 6 lat temu w powiecie Tomaszowskim; nie słyszałem, by go tu kto później widział. Dawniej były one niezmiernie pospolite.

*Canis vulpes* L. Lis wszędzie jeszcze pospolity.

*Martes abietinum* A. Magn. Kuna leśna czyli tumak Rzadka.

„ *foina* Briss. Kuna domowa czyli kamionka. Pospolita.

*Foetorius putorius* L. Tchórz nierzadki.

„ *lutreola* Keys et Blas. Łasica norka. Martwy okaz tego zwierzątka znalazłem w obrębie Dąbrowa w powiecie Tomaszowskim, pod wsią Sabaudja; był on cały przepełniony *Necrophorusami* i *Silphami*, o wypchaniu więc mowy nawet być nie mogło.

*Foetorius vulgaris* Rich. Łasica łaska — wszędzie pospolita.

„ *ermineus* L. Łasica gronostaj. Ładne to zwierzątko dość licznie się znajduje w leśnictwie Kocudza. Obręb Ossowce powiatu Biłgorajskiego.

*Lutra vulgaris* Erxl. Wydra. Trudno stanowczo odpowiedzieć, czy jest ona pospolita, czy rzadka, bardzo to bowiem ostrożne zwierzę i podejść się daje niełatwo. Skórki z bitych w Ordynacyi okazów widziałem.

*Meles taxus* Pall. Borsuk — pospolity na całej przestrzeni.

### Insectivora.

*Talpa europaea* L. Kreta oczywiście do najpospolitszych ssaków zaliczyć należy. W 1910 r. znalazłem w miejscowości Nart, kilka wiorst od Zwierzyńca, śliczną jasno-popielatą aberację.

*Sorex vulgaris* L. Ryjówkę pospolitą wszędzie spotkać można.

„ *pygmaeus* Pall. Ryjówka malutka. Trzy okazy tego ładnego zwierzątka znalazłem w r. 1911-ym w spróchniałym pniu w Panasówce. Próbowałem je hodować, ale pożywienia przyjmować nie chciały, dawane im mleko nie wystarczyło i po kilku dniach zdechły. Największy okaz mierzył 49 mm + 33 ogon, najmniejszy 43 mm + 35 ogon.

*Crossopus fodiens* Pall. Rzęsorek rzeczek. Znalazłem go w Hamerni w pow. Biłgorajskim nad rzeczką Sopot.

*Crocidura aranea* L. Ziębełek myszaty. Znalazłem go w roku 1910 w Obroczy pod Zwierzyńcem na polu.

*Erinaceus europaeus* L. Jeż. Dość rzadki.

#### Rodentia

*Mus decumanus* Pall. Szczur wędrowny. Nigdzie go niebrak.

„ *rattus* L. Sam go nie widziałem, wszyscy jednak dwa gatunki szczura rozróżniają, przypuszczam więc, że i szczur śniady na tym terenie się znajduje.

„ *musculus* L. Mysz pospolita. Wszędzie.

„ *sylvaticus* L. Mysz leśna. Pospolita.

„ *agrarius* Pall. Mysz polna. Na żadnym polu jej niebrak.

„ *minutus* Pall. Mysz badylarka. Gniazdo tej myszki znalazłem w Gorecku Kościelnym.

*Cricetus frumentarius* Pall. Chomik. Nie widziałem go ani razu, według jednak wiarygodnych zaświadczeń napewno się tu znajduje, choć nigdzie podobno w większej ilości nie występuje.

*Hypudaeus glareolus* Schreb. Nornica ruda. Złapałem ją na polu w Ulowie. Gdy jej się bacznie przyglądał, tak mocno mnie w rękę ugryzła, że odruchowo ją rzucił na ziemię. Schowała się natychmiast do jakiejś norki i nie mogłem jej później odnaleźć.

*Paludicola amphibius* L. Polnik ziemnowodny. Nad wodami, szczególnie koło młynów, bardzo pospolity.

*Arvicola arvalis* Pall. Bardziej jeszcze pospolity niż *Mus agrarius*.

„ *subterraneus* Selis. Polnik łąkowy. W 1910 r. złapałem jeden okaz pod wsią Obrocz w powiecie Zamojskim. Znajduje się on w zbiorach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

*Sciurus vulgaris* L. Wiewiórka. Pospolita i liczna.

„ „ *var. carpathica* Pietruski. Jeden okaz widział w końcu sierpnia 1912 r. p. Janusz Domaniewski w okolicach Zwierzyńca.

*Spermophilus guttatus*. Suseł perełkowany. Był notowany z okolic Zamościa, Szczepieszyna i Hrubieszowa. Widziałem go pod Biłgorajem na polach wsi Dąbrowica, gdzie licznie występuje, oraz pod Frampołem (powiat Zamojski) na polach wsi Radzięcin.

*Myoxus glis*. Popielica. Jeden piękny okaz znalazłem w dziupli spróchniałej czereśni w bukowo-grabowym lesie w Podlesiu (pow. Zamojski), gdzie znajdowało się gniazdo całej rodziny, składającej się z pięciu czy sześciu sztuk. Hodowałem ją, była bardzo łaskawa, do ręki się dawała brać, nie broniąc się. Przy przewożeniu z Podlesia uciekła z klatki i zginęła.

*Muscardinus avellanarius* Wagn. Orzesznica. Jeden okaz widziałem w Podlesiu.

*Lepus europaeus* Pall. Zając szarak pospolity.

#### Artiodactyla

*Sus scrofa*. Dzik. Pospolity.

*Dama vulgaris* Brookes Daniel. Do lat ostatnich pod osadą Zwierzyniec znajdowała się duża ogrodzona przestrzeń lasu, na której hodowane były, między innymi, i daniela. Gdy w roku 1906 czy 1907-ym ogrodzenie to rozebrano, zwierzęta rozeszły się po lesie i wkrótce większość przez chłopów została wybita; bardzo nieliczne tylko tułają się jeszcze gdzieśgdzie. Małe stadko danieli, z kilku osobników złożone, widziałem w obrębie Grele pod wsią Guciów.

*Cervus elaphus* L. Jeleń. I ten już do bardzo pospolitych zwierząt nie należy. Po rozrodzeniu zwierzyńca, zupełnie prawie oswojone jelenie podchodziły pod same chałupy. Kłusownicy trzebili je w straszny sposób. Jak mi mówiono, funt mięsa jeleniego kosztował kilka lat temu 2 kopiejki.

„ *capreolus* L. Sarna. Pospolita.

