

LES ARANÉIDES DU PÉROU

S. 1146.

par

L. Taczanowski,

Conservateur du Musée de Varsovie.

(Avec 1 planche.)



Famille des Attides.

Le Musée de Varsovie est en possession d'une riche collection d'araignées, recueillies par MM. *Jelski* et *Stolzmann* dans les différentes localités du Pérou central et septentrional, depuis 1871 jusqu'aux derniers temps.

Les espèces de la famille des *Epeirides* sont décrites et figurées depuis trois ans, et le manuscrit a été remis pour être publié par la Société Entomologique de St.-Pétersbourg. — Une partie en a été imprimée dans les *Horae* de la Société; le reste paraîtra bientôt.

Les *Thomisides* de cette collection ont été confiés aux soins de Mr. le Comte de Keyserling, qui s'occupe actuellement d'un travail sur les Latéigrades américains, et qui se propose de les insérer dans son important ouvrage.

opl. do
 49. - 1334
 7E 49. 1190

Les Attides de cet article ont été recueillis par M. Jelski dans les différentes localités de la côte péruvienne et principalement dans les environs de Lima et de Callao, ainsi qu'à Pacasmayo et Trujillo; dans les chaudes forêts de Monterico près de Huanta, et d'Amable-Maria dans la Montana de Vitoc; dans les forêts de la Sierra à Maray, et à Pattaypampa; sur les plateaux élevés des environs du lac Junin, de Tarma et de la Montana Nancho, etc. Dans les derniers temps M. Stolzmann a collectionné à Chimbote, aux bords du fleuve Tumbez et dans la forêt chaude de Palmal sur le territoire de l'Équateur, voisin du fleuve mentionné plus haut.

La faune de ces contrées est beaucoup plus riche en espèces qu'elle n'est représentée dans ce travail. Les collections de MM. Jelski et Stolzmann renferment encore beaucoup d'espèces inédites, que je garde jusqu'à ce que j'aie reçu des nouveaux matériaux, recueillis dans d'autres localités du Pérou septentrional.

Varsovie le 26 Septembre 1878.

Rhene Thor.

Rhanis Jelskii Tacz.

Horac Soc. Entomol. Rossic. VIII, p. 34. Tb. III. f. 1.

Une paire (♂ et ♀) d'Amable-Maria.

Le mâle est en tout identique avec celui de Cayenne, qui m'a servi de type pour la description citée; seulement il est plus grand (5 mill. de longueur du corps), et

ne présente que cette petite différence, que dans les pattes de la première paire les deux articles du tarse sont comme dans toutes les autres roux clair avec un anneau noir au milieu, tandis que dans l'individu de Cayenne le métatarse dans cette patte est noir.

La femelle est plus grande et plus robuste, sa forme, les proportions et la disposition des yeux sont tout à fait comme dans le mâle. Le fond du corps est brun, couvert en entier d'un duvet gris, mélangé avec un peu de noir, qui lui donne un aspect finement piqué de cette dernière couleur; des poils blancs forment sur ce fond un dessin très-élégant, fort compliqué, très-distinct et difficile à exprimer par la description; ce dessin est composé de traits fort courbes ou sinueux, disposés en trois rangées transversales au dos de l'abdomen, tandis qu'au cephalothorax la tacheture blanche est moins nette, et consiste en un chevron au milieu du front, une large raie passant à travers les yeux latéraux, et quelques traits au thorax. Le ventre est brun foncé strié de blanchâtre sur les côtés. Les pattes sont brunes rousâtres, garnies d'un duvet gris et blanc, rassemblé en grandes taches de cette dernière couleur; le tarse de toutes les pattes est tout à fait comme dans le mâle. Longueur 7, 5 mill.

Euophrys Koch.

Euophrys peruvianus n. sp.

Niger, cephalothorace abdomineque albo circumscriptis, thorace medio unimaculato, abdominis dorso trimaculato, pedibus albo annulatis. Long. ♀ 11, ♂ 8 mill.

Voisin des *Euophrys decorata* et *E. bella* Koch. du Brésil.

1*

♀ Le céphalothorax est plus long que large, à tête presque carrée, légèrement arrondie au front, et distinguée de la partie thoracique par une assez profonde impression transversale linéaire; le thorax est un peu plus long que la tête, à dos horizontal jusqu'à la moitié de sa longueur.

Le carré oculaire est presque aussi long que large; la rangée des yeux antérieurs est légèrement convexe, le sommet de tous en ligne droite; les yeux de la seconde ligne sont un peu plus rapprochés des antérieurs que des postérieurs.

L'abdomen est ovoïde, plus long et plus large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. Le céphalothorax est noir entouré d'une bordure en poils blancs, une pareille tache se trouve au milieu du devant du thorax, et une ligne sur les côtés de la tête et du devant du thorax. Le dos de l'abdomen est couvert de duvet noir, mélangé avec un peu de gris, entouré d'une large bordure blanche, mélangée avec un peu de noir, les extrémités de cette bordure n'atteignent pas les filières, et sont élargies en deux festons sur leur bord interne, dont un est terminal, et le second situé à une certaine distance de l'extrémité; trois taches blanches se trouvent sur la ligne médiane, l'antérieure est triangulaire et située dans la moitié de la longueur, la suivante cordiforme vis à vis l'extrémité de la bordure, enfin un point proche de cette dernière. Les pattes sont noirâtres annelées de roux, les derniers anneaux garnis de duvet blanc; le tarse, dans toutes, est roux avec un anneau brun au bout du métatarse. Le ventre est noirâtre parsemé de duvet blanc. Tous les yeux brunâtres.

♂ Le céphalothorax est plus large dans sa partie thoracique, à bords latéraux plus arrondis; l'abdomen fusiforme, aussi long que le céphalothorax et beaucoup moins large; les pattes plus longues, surtout les antérieures.

Coloration. Tout le dessus du corps est noir intense garni de duvet noir velouté; le céphalothorax est largement bordé de blanc, une pareille tache se trouve de chaque côté entre les yeux de la deuxième et de la troisième rangée et une grande longitudinale au milieu du thorax. L'abdomen est entouré de blanc pur de la même manière que dans la femelle, mais les taches médianes sont différentes: la première est beaucoup plus large et semblable à une couronne, les deux autres forment deux traits transversaux plus courts que la couronne, et un point blanc entre les traits postérieurs. Le ventre est noir parsemé de poils blancs, plus denses au milieu et sur les côtés. Les pattes sont comme dans la femelle, mais les anneaux en poils blancs sont plus réguliers et plus purs. Dans les pattes machoires la cuisse et la jambe sont couvertes de poils blancs.

Deux mâles et deux femelles d'Amable-Maria, quatre mâles et une femelle de Pumamarca.

Euophrys quinqucradius n. sp.

Griseus capite 5 lineis albis, abdomine area albida maculisque quatuor nigris ornato; pedibus flavis brunneo annulatis.

Long. tota. ♀ 7 mill.

♀ Le céphalothorax est robuste, médiocrement allongé, à côtés subparallèles; la tête presque aussi longue que large, a dos presque horizontal.

Le carré oculaire régulier; le sommet des yeux antérieurs en ligne droite; la distance entre les postérieurs et les antérieurs latéraux égale; les yeux de la deuxième ligne un peu plus proches des postérieurs.

L'abdomen ovalaire, un peu plus long et plus large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est brun marron, celui de l'abdomen brun, varié d'une large figure médiane blanchâtre, fort compliquée, et de taches noires. Le tout est garni d'un duvet serré changeant la couleur superficielle, de sorte que le céphalothorax est gris avec une teinte roussâtre au dos de la tête, qui est ornée d'une manière très-caractéristique de cinq lignes blanchâtres fines, dont une passe le long du milieu de la face dorsale, deux autres prenant naissance au bord supérieur de l'oeil de la première paire, bordent celui de la deuxième et passent en travers des deux autres; et une de chaque côté commençant au bord inférieur de l'oeil de la première paire, touchant celui de la seconde paire, et traversant obliquement toute la longueur des côtés de la tête, se prolonge sur le bord même du thorax entier; ce dernier est marbré de blanchâtre. Le fond du dos de l'abdomen est gris, orné d'une grande figure blanchâtre très-compliquée, composée d'une large raie antérieure, suivie d'une autre relevée par quelques chevrons plus clairs et élargie sur chacun de ses côtés par une grande tache circulaire, et terminée par une raie, composée de deux parties de forme carrée; cette figure claire est bordée de quatre taches noires, situées en carré dans les enfoncements latéraux de cette figure. Les côtés sont gris, tachetés et striés de blanchâtre; le ventre est noirâtre, parsemé de duvet blanc. Les pattes

sont d'un jaune ocreux pâle, largement annelées de brun, et garnies de duvet blanchâtre sur les anneaux clairs. Les poils qui hérissent tout le corps sont noirs. Les yeux sont blanchâtres.

Deux femelles d'Amable-Maria.—C'est une forme voisine de l'*E. floricola* Koch.

***Euophrys crux* n. sp.**

Fusco brunneus, vitta lata mediana alba lateraliter sinuata ornatus; cephalothorace albido late limbato; pedibus flavo brunneoque annulatis.

Long. tota ♂ et ♀ 5,5 mill.

♂ Le céphalothorax est allongé, assez robuste, à côtés presque parallèles; la tête plus courte que large, faiblement distinguée du thorax par un enfoncement insignifiant, à dos arrondi et peu abaissé en avant.

Le carré oculaire est plus court que large; le sommet des yeux antérieurs latéraux plus élevé de la moitié de leur diamètre que celui des médians; la distance parmi les yeux postérieurs un peu plus petite que celle entre les yeux de la deuxième paire; ceux de la troisième situés juste au milieu entre les yeux de la 2-e et de la 4-e paire.

L'abdomen est ovulaire, un peu plus long et aussi large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Les mandibules fortes, à peu près aussi longues que le devant de la tête, et verticales.

Coloration. Le tégument de tout le corps est brun foncé avec une large raie médiane compliquée blanchâ-

tre; il est couvert en entier d'un duvet serré brun foncé sur les endroits foncés du tégument; une large raie en duvet blanc passe le long de tout le corps, couvre tout le dessus de la tête, portant aux environs des yeux latéraux quelques raies rousses, et se retrécissant graduellement au dos du thorax; au dos de l'abdomen elle est deux fois élargie formant une figure compliquée. Les bords du céphalothorax sont largement entourés de blanc; les cotés de l'abdomen striés de la même couleur; le bord du front est roussâtre; les yeux entourés de blanc à leur bord inférieur; le devant du visage et les mandibules sont roussâtres clairs. Les pattes sont brunes, annelées irrégulièrement de roussâtre. Les yeux antérieurs blanchâtres, les autres olives.

♀ La femelle ressemble en tout au mâle, son céphalothorax est cependant un peu moins large, et les pattes moins fortes.

La coloration est comme celle du mâle, les endroits foncés sont un peu plus clairs, la figure médiane est blanchâtre au lieu d'être blanche pure; au dos du thorax il y a une croix blanche assez distincte; les pattes sont plus distinctement annelées de jaunâtre.

Un mâle et deux femelles d'Amable-Maria. C'est une forme voisine de l'*E. floricola* Koch.

Euophrys Keyserlingi n. sp.

Fulvo griseus, cephalothorace albo bimarginato, lineaque mediana hastiformi albida ornato; abdomine vitta sinuata fulva bipartito; pedibus rufis brunneo annulatis.

Long. tota 7, 5 mill.

♀ Le céphalothorax est robuste, allongé; la tête plus

courte que large, à dos légèrement incliné en avant; le thorax beaucoup plus long que la tête, large dans sa moitié antérieure et brusquement atténué en arrière.

Le carré oculaire plus court que large; le diamètre des yeux antérieurs latéraux deux fois plus long que celui des latéraux, ces derniers un peu plus élevés; les yeux de la troisième paire juste au milieu entre les yeux de la 2^e et 4^e paire et un peu plus rapprochés entre eux que ceux des deux lignes environnantes.

L'abdomen est ovoïde, à peu près aussi long et aussi large que le céphalothorax.

Les pattes sont médiocres, assez robustes et hérissées de poils assez longs.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est marron, rembruni à la base des yeux; il est garni d'un duvet fauve grisâtre marbré; les côtés sont bordés de deux lignes blanches déliées, dont la supérieure est fort sinueuse; au milieu du dos il y a une large ligne de la même couleur en forme de flèche; le devant du visage est couvert d'un duvet blanc et rouge à l'extérieur des yeux médiane. Le tégument de l'abdomen est brun, garni d'un duvet analogue à celui du céphalothorax et orné d'une large raie médiane rousse blanchâtre, à bords sinueux, élargie dans le tiers de sa longueur en deux branches courtes et arrondies au sommet, dirigées obliquement en arrière et renfermant au milieu un gros point brun; toute cette figure est bordée d'une ligne brune le long de ses côtés; un point blanc se trouve dans le tiers de la longueur des côtés de l'abdomen. Le ventre est gris marbré de blanchâtre. Les pattes jaunâtres annelées de brun. Les yeux antérieurs blanchâtres, ceux de la 2^e et 3^e ligne olives.

Deux femelles d'Amable-Maria; le mâle m'est inconnu. Espèce analogue à l'*A. floricola* Koch.

Euophrys maurus n. sp.

Niger, cephalothorace albo late marginato, abdomine medio albo transfasciato, antice albo, postice rufo limbato et longitudinaliter bipartito; pedibus nigris.

Long. tota ♂ 4, 5 mill.

♂ Le céphalothorax est allongé, élevé, à cotés sub-parallèles; la tête beaucoup plus courte que large, à dos abaissé en avant.

Le carré oculaire est plus court que large; le sommet des yeux antérieurs latéraux un peu plus élevé que celui des médians; la distance entre les yeux de la 2-e et de la 4-e paire égale; ceux de la 3-e paire sont situés au milieu entre les environnants.

L'abdomen est ovalaire, subaigu à l'extrémité, aussi long et aussi large que le céphalothorax.

Pattes médiocres et robustes.

Coloration. Le tégument de tout le corps et des pattes est d'un noir intense; le céphalothorax largement bordé d'un duvet blanc; le dos de l'abdomen partagé en deux par une ligne transverse blanche et entouré d'une fine bordure de la même couleur dans sa partie antérieure, et roussâtre dans la partie située derrière la ligne blanche transverse; cette dernière partie est partagée en deux par un trait longitudinal roussâtre; les espaces renfermés entre cette dernière ligne et la bordure sont revêtus d'un duvet noir intense velouté, tandis que la partie antérieure de l'abdomen est d'un éclat soyeux et paraît être moins foncée. Les espaces entre les yeux latéraux sont garnis d'un duvet blanc. Toutes les pattes sont noires à tarse jaunâtre. Tous les yeux olive.

Un mâle de Pumamarca.

Euophrys nigriceps n. sp.

Céphalothorax et pedes brunneo-castanei; capite supra nigra, lunula lata albido grisea (♀) aut alba (♂) circumscripto; abdomen fulvum pilis sordide rubricantibus albicantibusque vestitum et nigro maculatum, maris lunula lata alba basi limbatum.

Long. tota. ♀ 10, ♂ 6 mill.

♀ Le céphalothorax est médiocrement allongé, élevé, à tête un peu plus courte que large, distinctement séparée de la partie thoracique par un enfoncement transversal bien distinct; le dos du thorax est dans sa moitié antérieure presqu' aussi élevé que la tête, puis brusquement abaissé.

Le carré oculaire est beaucoup plus court que large; les yeux latéraux antérieurs deux fois plus petits que les médians et élevés au dessus de ces derniers de la moitié de leur diamètre; les deux lignes des yeux latéraux parfaitement parallèles, les yeux de la 2-e ligne situés juste au milieu entre ceux des deux lignes environnantes. L'abdomen est ovoïde, beaucoup plus long et plus large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est marron brunâtre, à dos de la tête noir; cette dernière plaque est largement entourée d'un croissant beaucoup plus clair que la couleur générale de l'abdomen, occupant le haut des cotés de la tête et la partie horizontale du thorax; un duvet gris roussâtre garnit toute la surface du céphalothorax; il est distinctement plus clair sur le croissant cité plus haut; quelques uns ont un duvet rouge brique entre les yeux latéraux. Le tégument de l'ab-

domen est fauve roussâtre avec une large raie longitudinale médiane plus claire, et bordée sur chacun de ses côtés dans sa moitié postérieure de deux grosses taches noires. Un duvet fauve plus ou moins rougeâtre brique constitue le fond superficiel, strié de fauve blanchâtre; les taches noires sont revêtues d'un duvet noir; la raie médiane est ornée dans sa moitié postérieure de quelques lignes blanchâtres, rangées en chevrons; sur le devant de l'abdomen il y a une large bordure distinctement plus claire; le ventre est parsemé de poils blanchâtres. Les pattes sont de la couleur du céphalothorax, les antérieures un peu plus foncées que les postérieures.

Les yeux olive clair.

♂ Le mâle ressemble à la femelle, son céphalothorax est un peu plus robuste, l'abdomen plus court, les pattes plus fortes.

Le mode de la coloration est le même, mais la grosse lunule thoracique ainsi que celle du devant de l'abdomen sont d'un blanc pur; le devant des pattes machoires garni abondamment de poils blancs; ils ont aussi plus de rouge entre les yeux latéraux, et souvent autour des antérieurs.

Plusieurs exemplaires des deux sexes de Pacasmago, de la Guadeloupe et de Lima. Tous les individus de Lima sont en général beaucoup plus foncés que ceux des autres localités, leur tégument est plus foncé, ainsi que toutes les couleurs superficielles.

C'est une forme voisine de l'*A. coronatus* d'Europe.

Euophrys obscurus (Tacz.).

Attus obscurus Tacz.

Horae Societ. Entomol. Rossic. T. VIII. p.

Six mâles adultes et jeunes d'Amable-Maria s'accordent

en tout avec l'exemplaire unique de Cayenne, qui m'a servi de type pour ma description.

Cinq de ces exemplaires ont une large raie en duvet blanc, prenant naissance entre les yeux de la première paire et prolongée sur toute la longueur du dos de la tête, en se rétrécissant graduellement en arrière. Cette raie manque à l'individu de Cayenne, et elle y est probablement effacée.— Dans les uns les yeux antérieurs sont entourés d'un duvet sulphureux et le bandeau est garni de poils de la même couleur; dans les autres ce duvet est blanc. Dans le sixième de ces exemplaires, adulte, de 6,5 mill. de longueur totale, la raie céphalique blanche manque, mais il y en a une autre fusiforme au milieu du thorax, et une grosse tache de chaque côté entre les yeux de la 3-e et 4-e paires; — le blanc est fort répandu sur le milieu de toutes les cuisses.

Plusieurs autres mâles de la même contrée diffèrent des précédents dans plusieurs détails de leur coloration, et principalement la bordure du céphalothorax et la raie médiane complète sont de couleur soufre claire, tandis que le bandeau est d'un blanc éclatant. Le fond superficiel du dos de l'abdomen est rouge brique sombre, traversé dans toute sa longueur par une large raie blanche; la bordure latérale blanche est interrompue dans les deux tiers de la longueur de l'abdomen, et complétée par trois points de cette couleur, dont un se trouve de chaque côté et un devant les filières. Le reste est comme dans les individus typiques.

Une femelle de la même localité, longue de 6 mill. qui appartient sans doute à cette espèce, diffère du mâle par son céphalothorax beaucoup moins robuste, à côtés presque parallèles et les pattes plus courtes. Le tégument du céphalothorax est brun foncé, les côtés garnis d'un

duvet blanc assez abondant, sans cependant couvrir complètement le fond. Trois petites taches en duvet blanc, dont une se trouve entre les yeux antérieurs médians, une vis à vis des yeux postérieurs et une au milieu du thorax indiquent le reste d'une ligne médiane analogue à celle du mâle. Parmi les yeux latéraux et au dessus des antérieurs il y a beaucoup de duvet rouge brique; le bandeau est garni d'un duvet jaunâtre. Le dos de l'abdomen est entouré d'une large bordure blanche et traversé dans toute sa longueur par une raie pareille assez large, les espaces entre ces raies blanches sont remplies d'une couleur rouge brique sale, relevée par une fine bordure noirâtre; une ligne pareille sépare aussi la raie blanche latérale de la couleur des côtés, qui est aussi blanchâtre. Toutes les pattes sont jaune rousâtre uniformes, parsemées d'un duvet blanchâtre.

Euophrys albipalpis n. sp.

Cephalothorace nigro, sulphureo trilineato; abdomine rubro, antice albo limbato, posticeque bimaculato; pedibus flavis brunneo subannulatis; palpis pilis candidissimis vestitis.

Long. tota. ♂ et ♀ 6 mill.

Espèce très-voisine de l'*A. obscurus*, elle a la même forme du céphalothorax et de l'abdomen, la même disposition des yeux et la même proportion des pattes; la coloration cependant présente plusieurs particularités qui paraissent indiquer que c'est une espèce distincte ou au moins une race constante.

♂ Le céphalothorax du mâle est noir traversé de trois raies longitudinales d'un jaune de soufre, dispo-

sées tout à fait comme dans l'espèce citée; un duvet rouge brique garnit les intervalles interoculaires et le bord frontal. Le dos de l'abdomen est d'une belle couleur rouge brique, entouré dans sa plus grande moitié antérieure d'une bordure blanche, dont les extrémités sont suivies d'un point de la même couleur. Le ventre est noirâtre avec deux lignes blanches au milieu, comme dans l'espèce précédente. Les pattes sont jaune pâle avec des anneaux brunâtres irréguliers; dans la première paire la jambe et la cuisse sont brunes. Les pattes mâchoires sont brun foncé, la cuisse et la jambe garnies d'un duvet blanc éclatant.

♀ La femelle a tout le céphalothorax et le dos de l'abdomen revêtu d'un duvet rouge brique sale; une femelle au fond un peu plus clair que l'autre présente au céphalothorax de traces de lignes blanchâtres et de la bordure claire du dos de l'abdomen, analogues à celles du mâle. Les pattes sont jaunes à anneaux beaucoup moins distincts que dans le mâle.

Quatre mâles et deux femelles d'Amable-Maria.

Trois mâles de la même localité, plus petits, à dos de l'abdomen olive avec un dessin semblable à celui des individus décrits plus haut, paraissent être des jeunes de la même forme.

Euophrys Pelzelni n. sp.

Nigerrimus, cephalothorace albo late marginato et supra unimaculato; abdomine pilis olivaceis vestito, albo limbato, medio transfasciato et postice tripunctato; pedibus albo annulatis.

Long. tota. ♂ 7 mill.

Forme très-voisine de l'*A. obscurus* Tacz. de Cayenne et du Pérou.

♂ Le tégument de tout le corps est noir très-intense; le céphalothorax est entouré d'une large bordure en duvet blanc, une pareille tache se trouve au milieu du dos du thorax, le bandeau est garni de duvet blanc, ainsi que le tour des yeux.—Le dos de l'abdomen est revêtu d'un duvet olive soyeux, entouré d'une bordure blanche, traversé au milieu de la longueur d'une raie de la même couleur et muni de trois points blancs en arrière, dont un est situé sur la ligne médiane et les deux autres aux extrémités de la bordure latérale. Les pattes sont noir brunâtre, cerclées de duvet blanc aux articulations; la jambe des pattes mâchoires est garnie abondamment de duvet blanc.

Mâle unique d'Amable-Maria.

Eaophrys vestitus n. sp.

Brunneus, griseo tectus; vitta lata mediana feminae fulvo grisea, maris albido grisea; pedibus rufis brunneo annulatis pilis griseis dense vestitis.

Long. tota. ♂ 7, ♀ 8 mill.

♀ Le céphalothorax est allongé, assez élevé, à côtés presque parallèles et verticaux; la tête presque aussi longue que large, à dos penché en avant, très-peu distinguée du thorax par un sillon à peine distinct; la partie thoracique beaucoup plus longue.

Le carré oculaire est un peu plus large que long; le sommet des yeux antérieurs situé presque en ligne droite; les lignes des yeux latéraux parfaitement parallèles; ceux de la troisième paire se trouvent juste au milieu entre les yeux des deux lignes environnantes.

L'abdomen ovoïde est à peu près aussi long que le céphalothorax et aussi large.

Les pattes médiocres.

Tout le corps, ainsi que les pattes, est revêtu d'un duvet épais et hérissé de cils assez abondants.

Coloration. Le tégument de tout le corps est brun, revêtu d'un duvet gris roussâtre mélangé avec du brun, une large bordure en bas du céphalothorax et une raie au dos du thorax sont plus claires que les parties environnantes et d'une nuance uniforme; une pareille raie à bords festonnés, entourée finement de brunâtre, occupe le milieu du dos de l'abdomen, dans toute sa longueur; les côtés de l'abdomen sont d'un fauve blanchâtre, finement piqueté de brun, le devant du visage est garni d'un duvet fauve. Les pattes sont roussâtres, annelées irrégulièrement de brunâtre et couvertes en entier d'un duvet gris. Les cils sont partout noirs. Les yeux antérieurs médians verdâtres, clairs, les autres olive.

♂ Le céphalothorax est de la même forme que dans la femelle, mais un peu plus robuste, l'abdomen plus court.

Le mode de la coloration est le même et ne diffère que par la nuance, qui est blanchâtre et non roussâtre sur toutes les parties claires du dessin du corps et des pattes, le tégument de ces dernières est plus foncé et sans anneaux.

Une paire d'Amable-Maria.

Euophrys leucodon n. sp.

Brunneus, vitta mediana albida complicata et ramificata ornatus; pedibus fulvis brunneo annulatis. Maris

caput supra et abdominis latera late albae; mandibulae pilis candidis dense vestitae.

Long. tota. ♂ 7, ♀ 9 mill.

♀ Le céphalothorax est allongé, à cotés presque parallèles; la tête carrée, légèrement bombée au milieu du dos, distinguée de la partie thoracique par un sillon transversal arqué.

La région oculaire est un peu plus large que longue; le diamètre des yeux antérieurs médians deux fois plus grand que celui des latéraux, le sommet de ces derniers un peu plus élevé que celui des premiers; la distance entre les yeux de la deuxième et de la quatrième paire égale; les yeux de la troisième paire situés juste au milieu entre ceux de la 2 et 7, et distinctement plus rapprochés entre eux.

L'abdomen est ovoïde, pointu en arrière, beaucoup plus long et plus large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. Le tégument de tout le corps est brun, avec une large raie médiane fauve; cette dernière est revêtue d'un duvet fauve blanchâtre, formant une raie claire fort compliquée, qui au thorax est en flèche dont la pointe touche à la plaque interoculaire et porte sur chacun de ses cotés deux branches dirigées obliquement en arrière; la raie abdominale est plus compliquée, elle a deux renflements au milieu et est composée dans sa partie postérieure de trois chevrons blanchâtres sur un fond fauve. La plaque interoculaire est garnie d'un duvet fauve nuancé de lignes blanchâtres; les cotés du céphalothorax sont bruns clairs, ornés en bas de carres blanchâtres. Le dos de l'abdomen à l'extérieur de la raie médiane est brun marbré de stries blanchâtres, d'une

manière très compliquée; les côtés et le ventre sont fauves striés de blanchâtre; au milieu même du ventre il y a une raie noirâtre, composée de quelques parties distinctes. Les yeux sont entourés d'un duvet blanchâtre; des poils pareils garnissent le devant des mandibules. Les pattes sont jaunes roussâtres, annelées de brun pale et parsemées d'un duvet blanchâtre. Les yeux sont blanchâtres.

♂ Le mâle diffère de la femelle par le céphalothorax un peu plus robuste, l'abdomen est de la même forme, mais aussi large que le céphalothorax; les pattes antérieures un peu plus longues.

Coloration. Le mode de la coloration est le même que dans la femelle, mais plus élégant et différent en plusieurs détails. — Le dos de la tête est garni de duvet blanc, formant une plaque uniforme, à deux profondes échancrures arrondies sur son bord postérieur, comprenant entre elles un long prolongement aigu et un autre à chacun de ses côtés; ces derniers touchent l'oeil postérieur; la partie postérieure de la plaque interoculaire renfermée dans ces échancrures et ses branches est d'une couleur brune roussâtre foncée. Le reste du céphalothorax est brun foncé, avec une large bordure blanche, touchant presque dans sa partie antérieure les yeux latéraux; une raie blanche comme celle de la femelle occupe le milieu du thorax. Les yeux sont entourés d'un duvet blanc, mélangé çà et là d'un rouge minium; le devant du bandeau et la face antérieure des mandibules sont couverts de poils d'un blanc éclatant. L'abdomen est coloré comme celui de la femelle. Les pattes des deux paires antérieures sont beaucoup plus foncées que celles de la femelle, elles sont brunes, indistinctement annelées de jaunâtre. Plusieurs femelles et un mâle du Palmal.

Euophrys andinus n. sp.

Griseo-nigricans, cephalothorace et abdomine albo limbato, lineaque mediana bipartito; pedibus amborum parium anteriorum brunneis, reliquorum rufis, brunneo annulatis.

Long. tota. ♀ 7, ♂ 5 mill.

♀ Le céphalothorax est allongé, médiocrement élevé; la tête aussi longue que large, à dos incliné légèrement en avant et fort arrondi au front même; le thorax deux fois plus long et aussi large que la tête, presque horizontal dans la plus grande longueur du dos, ensuite brusquement tronqué, sans aucune impression post-céphalique.

Le carré oculaire est régulier, la ligne des yeux antérieurs concave, de sorte que les latéraux sont plus élevés de la moitié de leur diamètre que les médians; ces derniers plus avancés; la distance entre les postérieurs est égale à celle des antérieurs latéraux; les yeux de la deuxième ligne un peu plus proches entre eux.

L'abdomen est un peu plus long et un peu plus large que le céphalothorax, ovoïde, subaigu en arrière.

Les pattes médiocres.

Coloration. Le fond général des parties supérieures du corps est composé d'un mélange de duvet fauve et noirâtre, ce qui fait une couleur grise noirâtre. Le céphalothorax est bordé en bas d'une large raie blanche, et traversé le long de son milieu d'une raie pareille; le dessin de l'abdomen est aussi composé d'une raie médiane et d'une bordure blanches, mais compliquées et plus élégantes: les blanches de la bordure s'élargissent

considérablement et donnent une forte dent, dirigée vers la ligne médiane dans la moitié de la longueur de l'organe, ensuite elles s'arrêtent et sont suivies d'un gros point, voisin du bout de l'abdomen; la raie médiane est encore plus compliquée, et composée de plusieurs parties distinctes, mais réunies entre elles: sur le devant se trouve une ligne fusiforme avec une tache foncée au milieu, suivie d'un carré plus large, ensuite il y a deux triangles, enfin derrière le dernier de ces triangles un gros point correspondant à deux autres indiqués plus haut.—Les côtés sont blanchâtres, le ventre noirâtre. La hanche de toutes les pattes est jaune roussâtre, les pattes des deux premières paires brunes foncées à tarse jaune; les deux autres jaunes roussâtres annelées de brun; toutes ont en outre des anneaux en duvet blanc. Les pattes mâchoires sont jaunes roussâtres unicolores, garnies de poils blanc jaunâtre. Les yeux blanc verdâtre.

Femelle unique de Montevico. C'est une forme proche de l'*A. encarpatus* Koch.

***Euophrys quadricolor* n. sp.**

Cephalothorace brunneo albo limbato lineaque mediana thoracali bipartito; capite supra vivide ferrugineo, antice posticeque late albo; abdomine supra nigro, lineis binis transversalibus, punctis quaternis et macula triangulari albis ornato; pedibus flavis fusco annulatis.

Long. tota. ♀ et ♂ 5 mill.

♀ Le céphalothorax est allongé, élevé, à côtés presque parallèles; la tête carrée, à dos très-peu incliné en avant et faiblement distinguée de la partie thoracique par un enfoncement transversal à peine distinct.

Le carré oculaire est aussi long que large; le sommet

des yeux antérieurs en ligne droite; la distance entre les yeux de la 2-e et 4 e paire égale; les yeux de la 3-e paire un peu plus proches des antérieurs.

L'abdomen est ovoïde pointu en arrière, aussi large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est brun avec une raie transversale jaune en arrière de la tête, une pareille ligne longitudinale au milieu du thorax et une bordure sur les côtés, sans atteindre le bord même qui reste brun; un duvet miniacé ferrugineux couvre le milieu du dessus de la tête, qui est bordé par une large bordure blanche, et une autre pareille étendue entre les yeux postérieurs; les parties brunes du thorax sont garnies d'un duvet brun foncé, tandis que sur les lignes rousses un duvet blanc pur couvre en entier la couleur du tégument et relève le dessin. Tous les yeux sont entourés d'un duvet d'une couleur analogue à celle du milieu de la tête; le bandeau est blanc. Le dos de l'abdomen est roussâtre sur le devant et noir ensuite, varié de blanc d'une manière très-élégante, c'est à dire qu' il y a un large croissant au bord antérieur, une bande transversale dans le tiers de la longueur, suivie d'une tache médiane triangulaire et quatre points disposés en carré près de l'extrémité.

Le ventre est jaunâtre, parsemé d'un duvet blanc. Les yeux antérieurs sont jaunâtres ambre, les autres olive.

♂ Le mâle ressemble en tout à la femelle et ne s'en distingue que par les pattes un peu plus longues et moins distinctement annelées, ou même jaune unicolore.

Une jeune femelle et deux jeunes mâles de Lechugal.

Euophrys Sancti Matei n. sp.

Cephalothorace brunneo pilis fulvis asperso, lineaque lata mediana fulva notato; capite supra pilis luteis tecto; oculis anticis aurantiaco circumscriptis; abdomine albido brunneo maculato; pedibus stramineis brunneo annulatis.

Long. tota. ♀ 6 mill.

♀ Le céphalothorax est médiocrement allongé, à côtés du thorax très-peu élargis; la tête est distinctement plus courte que large, à dos plat, légèrement incliné en avant.

Le carré oculaire un peu plus court que large; le sommet des yeux antérieurs latéraux un peu plus élevé que celui des médians, qui sont plus avancés; les postérieurs, un peu moins éloignés entre eux que les antérieurs latéraux; les yeux de la troisième paire un peu plus rapprochés des postérieurs.

L'abdomen est ovalaire, subaigu, un peu plus large et plus long que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est brun, avec une ligne médiane fauve et la plaque interoculaire plus ou moins rousse; il est parsemé en général d'un duvet fauve, et d'un roux plus ou moins vif au dos de la tête; le long du milieu du thorax il y a une large ligne en duvet blanchâtre, terminée par devant en fer de flèche; les yeux antérieurs sont entourés d'un cercle orangé roussâtre; le bandeau est couvert abondamment de poils sulphureux. L'abdomen est blanchâtre, varié de brun foncé d'une manière variable: le plus souvent il y a deux suites longitudinales de grosses taches irrégulières sur

les côtés de la ligne médiane, et quelques taches plus petites à l'extérieur de ces lignes; le tout est parsemé d'un duvet fauve blanchâtre. Les pattes sont d'un jaune roussâtre clair, irrégulièrement annelées de brunâtre, ce qui est moins distinct sur les antérieures que sur les postérieures. Les yeux antérieurs blanchâtres, les autres olivâtres.

Cinq femelles de San Mateo à 10000' d'altitude.

Euophrys leucopalpis n. sp.

Niger, supra pilis aurantiaco rufis vestitus, cephalothorace tenuissime albo limbato, tarsis flavis, palpis albis.

Long. tota. ♂ 6 mill. ♀ 6, 5 mill.

♀ Le céphalothorax est médiocre, peu élevé, à côtés subparallèles; la tête moins longue que large, à dos plat, et légèrement incliné en avant, peu distinguée de la partie thoracique par un léger enfoncement transversal; le thorax plus long que la tête, à dos s'abaissant insensiblement en partant de sa naissance.

Le carré oculaire est régulier, un peu plus court que large; le sommet des yeux antérieurs presque en ligne droite; la distance entre les yeux de la deuxième et de la quatrième paire égale; ceux de la troisième paire se trouvent juste au milieu entre les précédents.

L'abdomen ovoïde est un peu plus long et aussi large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

♂ Le céphalothorax est un peu plus robuste, et les pattes sont un peu plus fortes, du reste il ne diffère en rien.

Coloration. La couleur générale du tégument dans les deux sexes est noire intense; le bas des côtés du céphalothorax est bordé d'une ligne blanche fine, plus prononcée dans le mâle que dans la femelle; la surface dorsale de tout le céphalothorax et de l'abdomen est revêtue d'un duvet d'une vive couleur rousse orangée, assez dense partout, mais plus épaisse et couvrant entièrement la couleur noire du fond sur une large bordure abdominale, qui occupe aussi le haut des côtés et qui se termine devant l'extrémité en se courbant légèrement en haut. Dans le mâle cette bordure n'est pas aussi prononcée et n'est représentée que par une tache assez grande sur la moitié postérieure des côtés. Les pattes sont aussi noires que le corps, à tarse jaune. Les pattes mâchoires blanches dans les deux sexes. Les yeux blanchâtres.

Mâle et femelle de Pumamarca, et un mâle de Montevico.

Ce dernier s'accorde complètement avec les autres, et n'en diffère que par la couleur brune des pattes, et le manque de la tache intense sur les côtés de l'abdomen.

Au premier coup d'oeil cette forme péruvienne ressemble à l'*E. miniacea* de Cayenne, mais elle s'en distingue par le carré oculaire sensiblement moins long dans l'araignée péruvienne. Le tégument de tout le corps et des pattes est noir, tandis qu'il est roussâtre pâle dans l'araignée de Cayenne, et les pattes dans cette dernière sont sensiblement plus épaisses. Le duvet orangé roussâtre est à peu près de la même nuance dans les deux formes, mais dans celle de Cayenne il couvre uniformément toute le corps, tandis que dans la péruvienne il forme une bordure sur les côtés de l'abdomen, beaucoup plus intense que sur le reste de la surface.

Euophrys sinapicolor n. sp.

Fusco brunneus. Fem. supra sulphureo-virens, linea mediana thoracis, limbo laterali cephalothoracis et punctis abdominalibus quaternis albis ornata. Mas. abdomine supra sulphureo-virenti, thorace macula magna alba notato.

Long. tota ♂ 4, ♀ 4, 5 mill.

♀ Le céphalothorax est allongé à côtés presque parallèles; la tête presque carrée, à dos légèrement incliné en avant, non distincte de la partie thoracique.

Le carré oculaire presque aussi long que large; le sommet des yeux antérieurs en ligne droite; le diamètre des médians plus de deux fois plus long que celui des latéraux; ces derniers un peu plus éloignés entre eux que les postérieurs; les yeux de la 2-e ligne juste au milieu entre ceux de la 1-re et de la 3-e.

L'abdomen ovoïde, subaigu au bout, est aussi long et aussi large que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. La couleur générale du tégument est brunnâtre foncée; le dessus de la tête et de la moitié antérieure du thorax ainsi que de l'abdomen couvert d'un duvet d'une couleur de moutarde à lustre soyeux, presque uniforme; les côtés du céphalothorax bordés d'une ligne blanche, au milieu du thorax se trouve une pareille ligne longitudinale, sur la moitié postérieure de l'abdomen quatre petits points blancs rangés en carré. Les yeux antérieurs entourés d'un duvet ferrugineux. Les tarse de toutes les pattes sont d'un brun rougeâtre, beaucoup plus pâle que les articles précédents. Les yeux antérieurs médians blanchâtres, les autres olives.

♂ Le mâle a le céphalothorax beaucoup plus robuste, plus élevé et brusquement arrondi en arrière; l'abdomen moins large que le céphalothorax, mais de la même forme que celui de la femelle.

Coloration. Le dos de l'abdomen est couvert d'un duvet comme celui de la femelle, mais sans points blancs, il y a seulement un gros point blanc au milieu du thorax et une pareille bordure le long des côtés du céphalothorax. Tout le bandeau est couvert de poils d'un blanc éclatant. Le ventre est noir au milieu, et jaunâtre le long des côtés.

Quatre mâles et deux femelles de Lechugal.

Euophrys ferrum equinum n. sp.

A. waleckii simillimus; cephalothorace tenuiori, superne figura alba ferro equino simili ornato; femoribus tarsisque pallide ferrugineis, tibiis nigris.

Long. ♀ 7, ♂ 6 mill.

♂ Très-analogue au mâle du *A. waleckii* des Iles du Salut, mais différent dans plusieurs détails très-importants.

Le céphalothorax est beaucoup moins large, à tête moins renflée et le thorax moins élargi; le dos est plat, de manière que la face interoculaire est beaucoup moins inclinée en avant et la thoracique est horizontale beaucoup plus loin que dans l'espèce citée; l'impression postcéphalique est moins profonde. Le carré oculaire est beaucoup moins large; les yeux disposés comme dans l'espèce citée plus haut.

Les pattes sont moins épaisses.

La forme de l'abdomen comme dans l'*A. waleckii*.

Le duvet garnissant toutes les parties du corps est beaucoup moins serré et moins délicat, de sorte qu'il ne couvre pas aussi bien le fond, et par conséquent les couleurs ne sont pas aussi nettes, surtout la blanche.

Coloration. Le céphalothorax est noir à plaque interoculaire garnie de duvet blanc roussâtre; la bordure latérale blanche est moins large et moins pure que dans l'espèce voisine; au lieu de trois taches blanches au dos du thorax, il y a dans cette espèce péruvienne une grande figure en fer de cheval, dont les branches entourent les yeux postérieurs et touchent ceux de la deuxième ligne et la courbure s'étend jusqu'au sommet de la pente postérieure; il a aussi une tache blanche bien distincte entre les yeux de la deuxième et de la troisième ligne; les cotés du visage et les espaces entre les yeux antérieurs sont garnis d'un duvet fauve roussâtre, serré. Le dessin du dos de l'abdomen est tout à fait comme dans l'espèce citée avec un pareil trait noir au milieu de la raie blanche transversale, mais le noir du fond et le blanc de toutes les parties du dessin sont moins purs. Le ventre est jaunâtre ou noirâtre parsemé de duvet blanc. La couleur des pattes présente une grande différence en ce que la hanche, la cuisse et le cubital dans toutes est roux clair, tandis que le radial dans les trois premières paires est noir intense, à reflet bleu d'acier assez fort, celui de la quatrième paire est seulement foncé à la naissance; le sommet dans toutes les cuisses est plus ou moins rembruni; le tarse dans toutes les pattes est roussâtre, d'une nuance moins nette et moins claire que celle de la cuisse; les pattes sont également garnies de duvet blanc, mais moins serré que dans l'espèce avec laquelle nous le comparons. La cuisse et la jambe des pattes machoires sont de la même couleur que

dans les pattes garnies de duvet blanc, le tarse est brun noirâtre hérissé de poils noirs. La plaque sternale, la lèvre et les mâchoires sont de couleur rousse claire; les mandibules brunes; les yeux bruns clairs.

♂ Le céphalothorax dans la femelle est à peu près de la même forme que dans le mâle; l'abdomen ovoïde, plus long et plus large que le céphalothorax; les pattes plus courtes.

Coloration semblable à celle du mâle: la figure en fer de cheval du thorax est moins longue, la raie transversale de l'abdomen plus reculée en arrière, à trait noir médian plus gros, dans toutes les pattes la jambe est fort rembrunie, ainsi que le sommet dans les cuisses, et pas noire.

Quatre mâles et trois femelles d'Amable Maria et de Pumamarca, et un mâle de Lechugal.

Trois individus fournis par M. Stolzmann de Palmal (forêt vierge du midi de l'Equador) s'accordent en tout avec les individus décrits plus haut. Ces exemplaires du Palmal ont toute la plaque interoculaire couverte d'un duvet blanchâtre, et dans un de ces exemplaires la couleur des bandes blanches abdominales est fort imprégnée d'une teinte rousse, et au lieu d'une ligne blanche sur le milieu de la partie antérieure de l'abdomen il y a un gros point. Le trait foncé du milieu de la bande blanche manque dans ces individus. Toutes les pattes sont brunes claires en entier. La figure en fer de cheval est moins large et touche seulement le bord interne des yeux postérieurs.

Euophrys nanchonensis n. sp.

A. ferro equino similis, cephalothorace breviori, abdo-

mine latiori, squammulis sericeo-olivaceis lecto, vitta transversali tenui alba, postice maculis binis albis nigro limbatis notato; pedibus nigricantibus.

Long. tota. ♀ 6 mill.

Très-voisin de l'*A. ferrum equinum*, mais distinct dans beaucoup de détails, comme il suit: le céphalothorax est beaucoup plus court, la tête plus courte à dos moins incliné en avant, le carré oculaire plus court, les yeux antérieurs latéraux plus petits et plus dirigés sur les côtés, les yeux de la deuxième ligne beaucoup plus gros; l'abdomen considérablement plus large.

Coloration. Le tégument de tout le corps est noir; le céphalothorax entouré d'une large bordure en duvet blanc, et varié d'une raie blanche à travers l'enfoncement postcéphalique, les intervalles parmi les yeux latéraux sont aussi garnis d'un duvet pareil. Le dos de l'abdomen est revêtu d'un duvet olivâtre avec un reflet soyeux assez fort, le devant est entouré d'une large bordure en duvet blanc, la raie blanche médiane transversale est moins large que dans l'espèce citée et sans tache foncée au milieu, bordée des deux côtés d'un liseré noir; devant les filières il y a une paire de gros points blancs encadrés dans une tache noire, au dessus des filières mêmes se trouve un point blanc. Les filières, beaucoup plus courtes que dans l'espèce citée, sont foncées. Le ventre est brun roussâtre. Les pattes noires, à coxe, le premier article de la jambe et le tarse roux. Les pattes mâchoires rousses à tarse noir. Les yeux antérieurs blancs, les autres olives.

Trois femelles de la montagne Nancho à 7700' d'altitude.

Enophrys aurifrons n. sp.

Cephalothorace nigro, supra albo piloso, fronte aurato micanti; abdomine fusco brunneo, dimidio anteriori albo vestito et macula apicali candida ornato; pedibus brunneis, tarsis flavis.

Long. tota. ♂ 3, 5 mill.

♂ Le céphalothorax est robuste, légèrement atténué en arrière, à tête plus courte que large, faiblement distingué du thorax par un léger enfoncement transversal; le front est fort arrondi et descendant en avant.

Le carré oculaire plus court que large; la ligne des yeux antérieurs concave, c'est à dire que les médians sont situés beaucoup plus bas que les latéraux; le diamètre des premiers est deux fois plus long que celui des derniers; les postérieurs sensiblement plus petits que les antérieurs latéraux et un peu moins éloignés entre eux que ces derniers; les yeux de la troisième paire situés à égale distance des deux rangées environnantes. L'abdomen est ovoïde, aussi long et moins gros que le céphalothorax.

Les pattes médiocres, assez robustes.

Les mandibules courtes, épaisses et verticales.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est noir, couvert au dos de poils blancs assez denses; la plaque interoculaire brille d'un éclat métallique bronze-doré, surtout brillant au front. L'abdomen est aussi noir, couvert en entier dans sa moitié antérieure d'un duvet blanc et portant au dessus des filières une belle tache d'un blanc éclatant; le ventre est noir. Les pattes sont noires brunâtres, à tarse jaune. Les yeux antérieurs sont jaunes claires, les autres olives.

Un mâle d'Amable Maria.

Dendryphantes Koch.

Dendryphantes bisquiaquepunctatus n. sp.

Rubro brunneus, capite abdomineque supra splendide auratis, cephalothorace late albo limbato, et abdomine decempunctato.

Long. tota ♂ 7, ♀ 6, 5 mill.

♂ Le céphalothorax est presque circulaire, un peu plus long que large, fort arrondi sur les côtés, à tête plus courte que large, distinctement plus large en arrière qu'au front; le bandeau très bas.

Le carré oculaire est plus court que large; la ligne des yeux antérieurs moins longue que celle des postérieurs; les yeux de la deuxième ligne plus voisins des antérieurs et un peu plus proches entre eux que ces derniers; les latéraux antérieurs plus élevés de la moitié de leur diamètre que les médians, ces derniers un peu plus avancés. L'abdomen est un peu plus long et moins large que le céphalothorax, de la forme ovoïde allongée.

Les pattes médiocres, les antérieures beaucoup plus longues et plus épaisses que les autres.

Les mandibules assez longues, très-épaisses à la naissance, et fort atténuées à l'extrémité, écartées entre elles, un peu dirigées en avant; le crochet est long et fort courbé.

Coloration. La couleur générale du tégument est brune rougeâtre foncée. Le dessus de la tête est garni d'écaillés métalliques dorées fort brillantes, changeant en cuivreux et en violet dans certaines directions de la lumière; toute la face dorsale du céphalothorax est bordée des deux côtés d'une large raie en duvet blanc, touchant au haut des côtés les yeux latéraux et s'approchant mutuellement sur le thorax, sans se joindre en arrière.

Le dos de l'abdomen est aussi revêtu d'écaillés métalliques comme celui de la tête, et varié de deux raies longitudinales d'un brun noirâtre mat, et de dix points blancs, disposés sur le bord externe de la raie médiane métallique, et un onzième sur la base des filières; toute cette face dorsale brillante est entourée d'une bordure blanche passant sur le haut des côtés. Les pattes antérieures et les pattes mâchoires sont de la couleur du tégument du corps; les autres d'une nuance plus pâle tirant un peu sur le jaunâtre; elles sont toutes parsemées çà et là d'écaillés dorées et hérissées de poils blancs. Les mandibules sont de la couleur des pattes antérieures. Les yeux olives foncés, les médians antérieurs plus clairs.

♂ La femelle ressemble au mâle, mais elle s'en distingue par le céphalothorax moins élargi à la naissance du thorax, et par conséquent les yeux postérieurs sont moins éloignés entre eux, et le devant de la tête paraît être moins rétréci; l'abdomen est plus long et plus large; les pattes antérieures moins longues, mais robustes.

Coloration. Le mode de la coloration est le même, mais en général moins brillant: au lieu de la raie latérale blanche au céphalothorax il y a un sémis de duvet blanc, qui garnit toute la hauteur des côtés et toute la surface de la partie thoracique; il n'y a point de trace d'écaillés métalliques sur la plaque intercalaire; le dos de l'abdomen est comme dans le mâle, mais moins brillant, les côtés comme ceux du céphalothorax, dans toute leur hauteur; le bandeau est aussi couvert de poils blancs, mais plus denses; les pattes; comme dans le mâle, mais sans écaillés métalliques; les pattes mâchoires beaucoup plus claires, jaunâtres, hérissées de poils blancs.

Trois mâles et une femelle de Pumamarca.

Dendryphantès centromaculatus n. sp.

Griseus, abdomine ocellis biserialibus nigris et macula centrali albida ornato; pedibus flavidis brunneo annulatis.

Long tota. ♀ 6, 4 mill.

♀ Le céphalothorax est un peu plus long que large, à côtés fort arrondis; la tête plus courte que large, légèrement atténuée au front; et très-peu distinguée du thorax; ce dernier est aussi long que la tête, à dos abaissé brusquement depuis sa naissance.

Le carré oculaire est plus court que large; le sommet des yeux antérieurs latéraux plus élevé de la moitié de leur diamètre que celui des médians; ces derniers plus du double plus gros que les précédents; les yeux de la seconde ligne un peu plus proches des antérieurs que des postérieurs et un peu plus rapprochés entre eux; les postérieurs distinctement plus éloignés entre eux que les antérieurs latéraux.

L'abdomen est plus long et aussi large que le céphalothorax, ovalaire, un peu atténué en arrière.

Les pattes médiocres, celles de la première paire plus fortes que les autres.

Coloration. Le tégument de tout le corps est brun, garni de duvet gris marbré d'une nuance plus foncée, et orné au dos de l'abdomen de deux séries parallèles, composées chacune de cinq gros cercles noirs avec un point blanc au milieu, et une grosse tache centrale blanchâtre; les côtés de l'abdomen sont gris, piquetés de stries brunes et nuancés de blanchâtre; le bas du visage et le devant des mandibules sont garnis abondamment de poils blanchâtres; les yeux antérieurs bordés en dessus

de roussâtre; le ventre est parsemé de duvet blanchâtre. Les pattes sont jaunâtres annelées de brunâtre, les antérieures plus foncées, toutes garnies d'un duvet gris. Les yeux antérieurs médians sont blancs, les autres olives.

Deux femelles d'Amable-Maria.

Dendryphantes seriatus n. sp.

Brunneus, pilis sulphureis vestitus; abdomine vittis binis latis longitudinalibus cinnamomeis, in segmenta 5 lineolis flavidis partitis; pedibus brunneis pilis flavidis aspersis.

Long. tota 9 mill.

♀ Par ses formes générales et par le mode de la coloration cette espèce ressemble beaucoup au *Dendryphantes hastatus* (Clerck) de l'Europe, et appartient au XII groupe (*Hastatus*) de Simon. La disposition des yeux est comme dans ce groupe, les yeux cependant antérieurs médians sont au moins deux fois plus gros que les latéraux.

Coloration. La couleur générale du tégument est brune marron, revêtue sur tout le corps d'un duvet jaune de soufre clair, couvrant en entier le fond; au dos de l'abdomen il y a deux raies longitudinales d'un brun cannelle vif, qui commencent à une certaine distance de la naissance, s'amincissent et s'approchent mutuellement en arrière, sans atteindre l'extrémité même; chacune de ces raies est partagée par de fines lignes transversales jaunes en cinq parties presque carrées. Chaque oeil est situé sur une tache plus foncée. Les pattes sont de la couleur du corps, dépourvues des anneaux et également garnies de duvet. Le devant de la face est revêtu

abondamment de cils jaunes de soufre. Tous les yeux sont d'une couleur vert de bouteille. Une femelle plus jeune de 8 mill. de longueur a le tégument en général plus clair, et les pattes jaunes.

Deux femelles de Monterico.

Dendryphantes cuprinus n. sp.

Rubro-brunneus; Mas. Supra squammulis sericeis aurato micantibus vestitus, limboque albo circumscriptus; ventre nigricanti; pedibus brunneis pilis albis aspersis. Fem. abdomine fulvo tenuissime albo limbato, medio brunneo vario; pedibus rufescentibus brunneo annulatis.

Long. tota. ♂ 5, ♀ 6 mill.

♂ Le céphalothorax est robuste, élevé, peu allongé, la tête un peu plus courte que large, plus large en arrière qu'au front, à dos légèrement incliné en avant, le thorax presque aussi long que la tête; il y a une faible impression transversale en arrière de la tête.

Le carré oculaire est plus court que large; le sommet des yeux antérieurs latéraux plus élevé de la moitié de leur diamètre que celui des médians; les postérieurs plus éloignés entre eux que les yeux de la deuxième paire; ceux de la deuxième ligne un peu plus proches des antérieurs que des postérieurs, et un peu plus rapprochés entre eux que les premiers.

L'abdomen est fusiforme, un peu plus long que le céphalothorax, et beaucoup plus mince.

Les pattes médiocres, assez robustes; la jambe des antérieures armée près de son extrémité d'une rangée de trois épines courtes, mais fortes.

Les mandibules courtes, épaisses et verticales.

♀ Dans la femelle le céphalothorax est moins robuste et un peu plus allongé que dans le mâle; la tête a la même forme et les yeux sont également disposés. L'abdomen est plus long et plus large que le céphalothorax, ovoïde et pointu en arrière. Les pattes beaucoup plus courtes que dans le mâle; les antérieures beaucoup plus épaisses que les autres.

Coloration. ♂. Le tégument de tout le corps est brun rougeâtre, garni en dessus d'un duvet soyeux à un lustre métallique doré, assez fort; tout le corps est entouré d'une large bordure blanche, qui du céphalothorax passe immédiatement sous les yeux latéraux et l'entoure en entier; la bordure de l'abdomen est aussi complète; le ventre est noirâtre; les yeux antérieurs sont entourés d'un duvet roux brique. Les pattes sont brunes, à tarse roux dans les deux antérieures, tandis que dans les postérieures la moitié basale de la cuisse, la jambe et tout le tarse sont de cette dernière couleur; elles sont aussi tachetées d'un duvet blanc. Les pattes mâchoires sont brunes noirâtres. Tous les yeux blancs verdâtres.

♀ Le céphalothorax est brun, garni au dos et le long du haut des côtés d'un duvet fauve soyeux; le dos de l'abdomen est fauve jaunâtre, couvert d'un duvet comme celui du thorax, avec une grande raie longitudinale brune, élargie aux deux extrémités et au milieu; il est aussi bordé d'une fine ligne blanche, composée de quelques parties; le milieu du ventre est brunâtre. Toutes les pattes sont jaune d'ocre indistinctement annelées de brunâtre; celles de la première paire plus foncées que les autres.

Deux mâles et deux femelles de Lima.

Phyale Koch.

Phyale gratiosa Koch.

Die Arachn. XIII, p. 193 f. 1240 et 1241.

Quatre femelles d'Amable Maria, présentant entre elles des grandes différences en coloration, mais comme on ne peut rien trouver qui puisse les distinguer spécifiquement, il paraît qu'elles appartiennent à une seule espèce, sujette à de grandes variations.

Deux exemplaires s'accordent avec la figure 1240 de Koch, et ne s'en distinguent que par la plaque céphalique d'une couleur jaune, identique à celle de l'abdomen; la figure noire de ce dernier organe n'est pas concave dans le milieu de ses côtés latéraux; un duvet jaune pâle constitue sur toutes les pattes des stries et des demi-anneaux bien distincts, dont il n'y a aucune mention dans la description de Koch, mais qui sont blanches sur la figure. Une de ces femelles a quatre points blancs sur la figure noire abdominale, ce qui manque à l'autre.

Un exemplaire a le dessus de la tête et le fond du dos abdominal d'une vive couleur écarlate (cinabre); les côtés de la figure noire abdominale sont concaves, ce qui donne à cette figure une forme semblable à une cloche; le céphalothorax est entouré d'une large bordure blanche; le sternum et les pattes mâchoires sont garnis de poils blancs; les stries et les taches aux pattes sont blanches pures.

Le quatrième exemplaire diffère encore plus: la plaque céphalique et le fond du dos de l'abdomen sont

d'une belle couleur miniacée, ainsi que la bordure du céphalothorax, qui est très-fine; au lieu de la figure dorsale simple, propre aux variétés précédentes, il y a une paire de gros ovales de cette couleur, suivis d'une raie transversale dont les extrémités amincies descendent sur les côtés; l'extrémité même de l'abdomen est noire comme dans les variétés précédentes. Dans toutes les pattes à cuisses foncées tous les autres articles sont jaunes orangés uniformes, sans anneaux foncés, à stries analogues aux précédentes, mais d'une couleur orange miniacée claire; les pattes mâchoires et le sternum sont garnis de poils de cette dernière couleur.

Les yeux dans toutes ces variétés sont blancs.

Phiale ministerialis Koch.

Die Arachniden XIII. p. 199. tb. CDLXIV. f. 1247.

Quatre mâles et une femelle d'Amable Maria.

Les mâles s'accordent en tout avec la figure de Koch, et il n'y a qu'un détail qui est en contradiction avec la description du même auteur, c'est à dire nos exemplaires n'ont pas de bordure abdominale jaune comme il est dit dans le texte, mais blanche comme dans la figure; cette bordure s'étend seulement jusqu'à la moitié de la longueur de l'abdomen, et elle est suivie d'un petit trait de la même couleur, situé devant les filières; la raie au bandeau est aussi blanche pure. Les yeux antérieurs sont aussi entourés d'un duvet miniacé; sur la jambe de la patte mâchoire il y a une grosse tache en duvet blanc.

La femelle, qui n'est pas décrite par Koch, ressemble au mâle, mais sa tête est moins élargie au front; les pat-

tes antérieures sont moins longues. La différence est plus grande dans la coloration: la ligne médiane et la bordure du céphalothorax sont très-fines et blanches; la couleur du dos de l'abdomen est d'un roux orangé, la bordure est comme dans le mâle; la patte antérieure est à peine rembrunie.

Marpissa Koch.

Marpissa Raimondii n. sp.

Brunneo hepatica, arca interoculari nigra, squammulis aureis tecta; cephalothorace vitta albida limbato; abdomine supra splendide aurato, nigricanti bivittato striisque albis senis ornato; tarsis rufo aurantiacis.

Long. tota II, cephalothoracis 5, abdominis 6; Latitudo cephalothoracis 4, abdominis 3, 5 mill.

♀ Le céphalothorax est robuste, beaucoup plus long que large, à tête deux fois moins longue que le thorax; la face dorsale de ce dernier est horizontale dans les deux tiers de sa longueur, ensuite brusquement taillée en arrière; il y a un petit enfoncement au milieu du devant du thorax.

Le carré oculaire est moins long que large; les yeux de la ligne postérieure plus éloignés entre eux que ne le sont les antérieurs latéraux; ceux de la seconde ligne plus proches de ces derniers et un peu plus rapprochés entre eux.

L'abdomen est un peu plus long que le céphalothorax, presque régulièrement ovulaire, très-peu renflé sur sa face dorsale.

Les pattes sont robustes, les antérieures beaucoup plus épaisses que les autres.

Les mandibules sont courtes, robustes et verticales.

La surface de toutes les parties du corps et des pattes est garnie de poils assez longs et abondants, surtout sur les pattes mâchoires.

Coloration. La couleur générale de toutes les parties du corps est brune rougeâtre foncée, presque uniforme partout, excepté la plaque interoculaire qui est noire. Cette dernière est garnie d'écaillés dorées très-brillantes; les cotés de tout le céphalothorax sont bordés d'une raie en duvet blanc, qui commence de chaque côté derrière les yeux des deux autres lignes et traverse toute la partie thoracique, en s'élargissant et en s'approchant réciproquement. Tout le dos de l'abdomen est couvert en entier d'écaillés dorées très-brillantes à reflets verdâtre et rougeâtre, en effaçant complètement la couleur du tégument; deux grosses lignes d'un brun noirâtre velouté, parallèles entre elles, parcourent toute la longueur de l'abdomen, s'arrêtant cependant à une petite distance du bord antérieur; trois paires de stries blanches complètent cette brillante parure, les deux postérieures de ces stries sont situées transversalement sur la raie foncée, tandis que l'antérieure courbée en croissant est posée longitudinalement. Les cotés de l'abdomen et le devant du visage sont garnis d'un duvet blanchâtre; le ventre est brun grisâtre. Toutes les pattes sont parsemées de duvet blanchâtre et les articulations entourées d'un anneau blanc très-fin.

Le dernier article du tarse dans toutes les pattes est d'un rouge orangé vif, à extrémité même noire. Les yeux sont d'un olive jaunâtre.

Quatre femelles de la montagne de Nancho, recueillies entre 7700 et 9500' d'altitude.

Je dédie cette brillante araignée à Mr le Docteur Raimondi, savant explorateur du Pérou.

Marpissa Lubomirskii n. sp. Fig. 8.

Brunnea; cephalothorace limbo strigaeque dorsali flavis notato; abdomine area magna triangulari fasciisque transversalibus miniaceis ternis ornato.

Long. tota. 15, cephalothoracis 6, abdominis 9 mill.

♀ Le céphalothorax de cette grande saltice est robuste, beaucoup plus long que large, à tête beaucoup plus courte que le thorax; la face dorsale de ce dernier est horizontale jusqu'à la moitié de sa longueur, et concave au milieu, ensuite brusquement abaissée en arrière.

Le carré oculaire est beaucoup plus court que large, à côté antérieur légèrement courbé; la distance parmi les yeux postérieurs est égale à celle des antérieurs latéraux; les yeux de la deuxième ligne situés juste au milieu entre ceux de la première et de la dernière.

L'abdomen est beaucoup plus long et aussi large que le céphalothorax, ovalaire, tronqué par devant et peu atténué en arrière.

Les pattes sont médiocres, celles des deux paires antérieures distinctement plus robustes que les deux postérieures. Les mandibules sont courtes, robustes et verticales.

Coloration. La couleur générale est brune foncée; le bas du céphalothorax entouré d'une bordure blanc-jau-nâtre, très-fine; au milieu du thorax se trouve une large ligne longitudinale de la même couleur, atténuée en arrière; le dos de l'abdomen est occupé par une grande figure miniacée, composée d'un long triangle à deux dents latérales près de son extrémité, située sur la moitié antérieure, et de trois raies transversales sinueuses, dont la deuxième est la plus courte; ces raies sont con-

ondues entre elles dans les uns, tandis qu'elles sont séparées dans d'autres exemplaires. Le brun du ventre est plus pâle, avec quatre lignes blanches dans toute sa longueur et deux taches rondes près de l'extrémité. Dans toutes les pattes le dernier article du tarse est roux, toutes sont parsemées de rares poils d'une couleur jaunâtre, analogue à celle de la bordure du céphalothorax. Tous les yeux olivâtres.

Quatre femelles de Monterico.

Je dédie cette belle araignée à Mr. le Prince Ladislas Lubomirski, savant conchiliologiste, et protecteur du Musée de Varsovie.

Marpissa modesta n. sp.

Brunnea; capite nigricanti, thorace rufescenti, abdomine vitta lata mediana lateraliter ramificata ornato, apice nigro, flavo circumscripto; pedibus rufis, brunneo annulatis.

Long. ♀ 11, ♂ 8 mill.

♀ Par ses formes générales elle ressemble beaucoup à la *M. muscosa* (Cl.); son abdomen est à peu près deux fois aussi long que le céphalothorax, un peu plus large, et le plus élargi dans les deux tiers de sa longueur.

Le carré oculaire est plus court que long; la distance entre les yeux postérieurs égale à celle des antérieurs latéraux: les yeux de la deuxième ligne très-petits et un peu plus proches des antérieurs que des postérieurs. Les pattes sont courtes, celles de la première paire beaucoup plus épaisses que les autres.

Coloration. La couleur générale est brune foncée; la plaque interoculaire presque noire; le fond du thorax ti-

rant plus ou moins sur le roussâtre, et roux dans des jeunes individus; le tout couvert d'un duvet gris clair.

Le long du milieu de l'abdomen passe une large raie pale, portant sur chacun de ses cotés trois ramifications linéaires, légèrement sinueuses; l'extrémité même de l'abdomen est noire, séparée de la couleur précédente par une ligne jaune transversale; un duvet gris forme une nombreuse maculature à l'extérieur de la raie médiane claire, et moins apparente sur la raie même, sans cependant effacer les branches latérales, qui sont au contraire relevées par un duvet blanchâtre; les côtés sont aussi maculés.

Le ventre est plus pâle que le dos, traversé de quatre lignes longitudinales blanchâtres, peu distinctes. Les pattes sont rousses plus ou moins foncées annelées de brun. Les yeux brunâtres clairs.

♂ Le mâle ressemble en tout à la femelle, mais il est plus petit, à abdomen moins large, à couleurs plus foncées, qui du reste ne présentent aucune autre différence en dessin; les pattes antérieures sont plus foncées, presque uniformes dans les adultes.

Plusieurs individus des deux sexes et de différentes tailles d'Amable Maria et de Paltaypampa.

Marpissa hieroglyphica n. sp.

Fulva, abdomine supra cinnabarino, linea mediana ramificata flava ornato.

Long. tota ♀.

♀ Le céphalothorax est un peu plus long que large, assez élevé, à côtés arrondis; la tête un peu plus courte que large; le dos du thorax brusquement abaissé depuis sa naissance.

Le carré oculaire est un peu plus court que large; le sommet des yeux antérieurs situé en ligne droite; les yeux de la deuxième ligne plus proches des antérieurs latéraux et un peu plus rapprochés entre eux que ne le sont ceux des deux autres lignes.

L'abdomen est fusiforme, beaucoup plus long que le céphalothorax, et beaucoup moins large.

Les pattes médiocres.

Coloration. La couleur générale du tégument est jaune de paille, celle du céphalothorax plus foncée, tirant sur le roussâtre, et légèrement rembrunie au dos, excepté sur la ligne médiane; les yeux latéraux situés sur des taches noires, dont celles de la deuxième et troisième paires sont confondues; les yeux antérieurs entourés d'un duvet blanc, les espaces parmi les latéraux garnies d'un duvet miniacé. Le dos de l'abdomen est rouge cinabre, orné d'une belle figure jaune, composée d'une ligne médiane fine à six rameaux de chaque côté, fort courbés, mais chacun d'une manière différente; les côtés de l'abdomen sont blancs jaunâtres, variés de nombreuses stries rouges. Le ventre, la plaque sternale et toutes les pattes sont jaunes de paille unicolore. Les yeux antérieurs médians blancs; les autres noirâtres.

Une femelle d'Amable Maria.

Marpissa mystacina n. sp.

Cephalothorace obscure brunneo, maculis ochraceis postcephalicis binis notato, squammulis argenteis miniacisque tecto; abdomine fulvo, squammulis argenteis seriebusque macularum aurantiacorum ornato.

Long. ♀ 14 mill.

♀ Le céphalothorax est allongé, bas, aplati, à dos

plane jusqu'aux deux tiers de la longueur du thorax; l'enfoncement postoculaire court, transversal.

Le carré oculaire est beaucoup plus court que large; la distance entre les yeux postérieurs égale à celle des antérieurs latéraux; les yeux de la deuxième ligne très-petits, sont plus proches des antérieurs.

L'abdomen est aussi large et beaucoup plus long que le céphalothorax, fusiforme, plus mince dans sa partie postérieure.

Les pattes sont médiocres, celles de la première paire beaucoup plus robustes que les autres.

Les mandibules sont médiocres, robustes, dressées un peu en avant et garnies à leur face antérieure de longs poils assez abondants, constituant une sorte de moustaches.

Coloration. Le céphalothorax est brun, à tête noirâtre et deux grosses taches rousses presque confondues entre elles sur la partie antérieure du thorax; un duvet blanc argenté à éclat irisé forme une large bordure latérale, couvre la plaque interoculaire, une large bande derrière les yeux postérieurs, et constitue quatre taches sur le derrière du thorax; un duvet miniacé forme une raie transversale entre les yeux postérieurs et un large crois-sant étendu sur les côtés de la tête, et presque sur toute la longueur du thorax. Le fond du dos de l'abdomen est fauve jaunâtre avec une suite de taches triangulaires en duvet blanc argenté le long de la ligne médiane, et des stries de cette couleur sur le reste de la surface; ce dessin élégant est complété par cinq paires de gros points en duvet roux orangé, disposés des deux côtés de la ligne médiane; le milieu du ventre est occupé par une large bande brune. Les pattes sont jaunes ocreuses, à radial et le métatarse de la première paire fort rembrunis; l'extrémité même dans toutes est noire. Les mandibules

sont brunes foncées à crochet rougeâtre; les poils aux pattes, aux pattes mâchoires et aux mandibules sont blancs, les épines aux pattes brunes. Les yeux blanchâtres.

♂ Le mâle est complètement semblable à la femelle par la forme de toutes ses parties, et ses proportions et ce n'est que par la coloration qu'il en diffère. Les deux taches thoraciques sont parfaitement rondes et séparées. Dans sa parure écailleuse il n'a rien de rouge au céphalothorax; le blanc forme une large bordure latérale, deux grandes taches entre les yeux de la 2-e et 4-e paires, un trait longitudinal sous les yeux postérieurs, quatre taches comme dans la femelle sur le derrière du thorax, et couvrent les grandes taches thoraciques.

L'abdomen est comme dans la femelle, mais la couleur des points roux est moins nette. Les pattes antérieures sont moins rembrunies. Cet individu n'est pas adulte, il n'a que 10 mill. de longueur du corps, et l'organe copulateur non développé.

Une paire d'Amable Maria.

Marpissa plana (Tacz.)

Altus planus Tacz. Horae. Societ. Entomol. Rossic. VIII. p. 80.

Une paire (♂ et ♀) de Lima et de nombreux exemplaires de la Guadelupe.

Ces araignées s'accordent en tout avec les exemplaires typiques de Cayenne, mais leur fond est en général d'un brun plus foncé, presque noirâtre; le duvet blanchâtre sur toutes les parties du corps est sans nuance fauve, propre aux individus de Cayenne; les pattes sont plus foncées et annelées de brunâtre; les yeux olivâtres clairs. Dans les mâles les espaces interoculaires de la

rangée antérieure sont bruns au lieu d'être rouges; le bandeau garni de duvet blanc pur.

Parmi les exemplaires de la Guadalupe il y a des individus beaucoup plus grands que ceux de Cayenne; il y a des femelles qui atteignent jusqu'à 10 mill. de longueur totale, et des mâles de 8 mill.

Ces grosses femelles ont en général le tégument du céphalothorax et la bordure abdominale beaucoup plus foncés que dans les individus de Cayenne, des anneaux aux pattes un peu plus sombres. Dans les gros mâles la moitié postérieure de la raie abdominale brune est également composée de parties distinctes, mais qui sont confondues en une raie non interrompue, jusqu'au bout même de l'abdomen; la parure dorsale du céphalothorax est plus nette, c'est à dire la plaque interoculaire est garnie d'un duvet gris blanchâtre, sur le milieu de laquelle il y a une figure plus claire en forme d'une flamme d'obus, dont la pointe touche de bord du front; une autre figure de la même forme, mais plus longue et un peu plus large s'appuie sur la précédente par son gros bout et se termine en pointe près de l'extrémité du thorax.

Tous ces individus ainsi que ceux de Cayenne, ont sur le devant des mandibules une raie oblique en duvet blanc, dont l'ensemble constitue un chevron ouvert en bas, situé dans la moitié de la longueur des mandibules.

***Marpissa isabellina* n. sp.**

Isabellina; cephalothorace pedibusque primi paris rufes centibus, abdomine supra fusco sexstriato.

Long. tota. ♀ et ♂ 8 mill.

♀ Le céphalothorax est deux fois plus long que large

à côtés légèrement élargis au milieu, à dos plat jusqu'à la moitié du thorax et doucement abaissé ensuite; la tête plus large que longue, beaucoup plus courte que le thorax; le bord du front est pourvu de quelques soies aussi longues que la hauteur des yeux, et dirigées en avant.

Le carré oculaire plus haut que large; le sommet des yeux antérieurs en ligne droite; les médians très gros occupant toute la hauteur du devant de la tête, sont beaucoup plus avancés que les latéraux, ces derniers d'égale grandeur que les postérieurs et également éloignés entre eux; les yeux de la deuxième ligne plus proches des antérieurs.

L'abdomen est fusiforme, moins large et beaucoup plus long que le céphalothorax.

Les pattes assez longues et grêles; celles de la première paire les plus longues et beaucoup plus robustes que les autres, armées au bord interne de la jambe et du métatarse d'une série de fortes épines, et hérissée de poils assez abondants; il y a aussi des pareilles épines sur les pattes de la deuxième paire, mais moins fortes.

Les mandibules sont épaisses, larges, beaucoup plus longues que le devant de la hauteur de la tête, parfaitement verticales.

Coloration. La couleur générale est isabelle claire; le céphalothorax et les pattes antérieures sont rousses; tous les yeux latéraux situés sur une tache noire, dont celles de la 2-e et 3-e paire confondues entre elles; entre les yeux postérieurs et l'extrémité du thorax s'étend de chaque côté une fine ligne brunâtre beaucoup plus foncée que le fond général.—Au dos de l'abdomen se trouvent trois

paires de stries noirâtres, plus ou moins distinctes. Les poils au visage et aux pattes sont blancs, les épines des pattes antérieures et le crochet mandibulaire bruns. Les yeux antérieurs médians blancs, les autres olive.

♂ Le mâle s'en distingue par l'abdomen plus mince, les pattes antérieures plus longues et plus foncées, le devant de la cuisse brun noirâtre, le devant de l'abdomen marbré de foncé, à la place des deux paires de stries postérieures autant de points noirs.

Une paire de Monterico et trois d'Amable Maria.

Marpissa Branickii (Tacz.)

Attus Branickii Tacz. Horae Societ. Entomol. Rossic. T. VIII. p. 94.

Une femelle d'Amable Maria identique à celles de Cayenne.

Maevia Koch.

Maevia fenestrata n. sp.

Flavicans, abdomine supra maculis 9 magnis nigris flavido circumscriptis orato; pedibus cephalothoraci concoloribus. Mas. obscurior, cephalothorace supra area magna triangulari ochracea, abdomine postice fascia transversali lutea ornato.

Long. ♀ 6, ♂ 4, 5 mill.

♀ Le céphalothorax de la femelle est plus de deux fois aussi long que large, peu élevé, à tête presque carrée, parfaitement plane en dessus et sans aucune distinction de la partie thoracique; cette dernière est considérablement plus longue que la tête, doucement amincie en arrière, plane au dos jusqu'à la moitié de sa longueur.

Le carré oculaire est aussi long que large. Les yeux médians antérieurs sont gros et plus avancés que les latéraux; ceux de la deuxième ligne plus proches de ces derniers que des postérieurs et plus proches entre eux que les yeux de la deuxième et de la 4-e paire; la distance parmi les postérieurs égale à celle des antérieurs latéraux.

L'abdomen fusiforme est à peu près aussi long et très-peu plus large que le céphalothorax.

Les pattes sont courtes et peu inégales.

Coloration. La couleur générale est jaune pâle; tous les yeux situés sur une tache noirâtre; quelques-unes ont deux taches foncées, plus ou moins distinctes, au milieu de la plaque interoculaire; les cotés de la tête et du thorax plus ou moins rembrunis; un duvet rare jaunâtre garnit le dos sans y rien changer dans la couleur du tégument. Le fond de l'abdomen est d'un jaunâtre plus pâle que celui du céphalothorax avec 9 grosses taches noirâtres au dos, séparées entre elles par une fine ligne médiane et d'autres pareilles transversales, ces taches sont donc rangées par paires, excepté la dernière terminale qui est simple; un duvet blanchâtre garnit les lignes claires; dans quelques-unes les deux paires des taches postérieures sont réunies entre elles. Les pattes sont de la même couleur que le céphalothorax. Les filières jaunes pâtes. Les yeux noirâtres.

♂ Le céphalothorax du mâle est beaucoup plus large; l'abdomen un peu plus long et beaucoup moins large que le céphalothorax; les pattes antérieures considérablement plus longues que les autres.

Coloration. Le fond général est brun marron foncé avec un grand triangle roux occupant toute la plaque interoculaire et le milieu du thorax, et une fine bordure

4*

jaunâtre en bas des cotés. Au dos de l'abdomen les taches noirâtres analogues à celles de la femelle sont plus ou moins distinctes sur un fond foncé; il y a seulement une ligne jaune transversale entre la 3-e et la 4-e paire. Dans quelques-uns cependant les taches noires sont séparées par des lignes claires comme dans la femelle. Les pattes antérieures sont brunes à tarse jaune; les autres ont la cuisse plus ou moins brune; les pattes machoires sont brunes à tarse jaune; les autres ont la cuisse plus ou moins brune; les pattes machoires sont brunes à tarse jaune.

Les mâles dont l'abdomen est plus clair ont aussi les pattes plus ou moins pâles, quelque fois complètement jaunes.

Plusieurs individus des deux sexes d'Amable Maria.

Espèce voisine d'*A. tenuis* et de l'*A. Lethierryi* de Cayenne.

Maevia Stolzmanni n. sp.

M. fenestratae simillima; abdomine supra maculis 5—9 nigris, obliquis, albido-circumscriptis ornato; maris caput supra albidum.

Long. tota ♂ 5, ♀ 4, 5 mill.

Dans les individus des deux sexes le nombre des taches abdominales noires n'est pas constant, les uns n'ont que 5, tandis que les autres en ont 7 ou 9; ces taches diffèrent de celles de l'espèce citée en ce qu'elles ne sont pas carrées plus ou moins régulièrement, mais obliques et séparées entre elles par des lignes blanchâtres, également obliques. Le roux du cephalothorax et des pattes dans les femelles est plus intense, avec la plaque céphalique blanchâtre. Dans le mâle cette dernière est

aussi blanchâtre, et cette couleur se prolonge peu sur le dos du thorax, en se retréssissant en arrière, cette surface est aussi garnie d'un duvet blanchâtre. La première paire des pattes du mâle est brune avec un large anneau roux au cubital; le tarse est roux avec l'extrémité des deux articles brunâtre; dans la deuxième paire la cuisse est brune. Dans les yeux du mâle il n'y a que cette différence que les externes de la première rangée ont le sommet un peu plus élevé que celui des médians.

Deux mâles et trois femelles de la Montana de Nancho à 7700 pieds d'altitude.

Maevia Susiformis n. sp.

Cephalothorace brunneo, postice striis quaternis flavis notato, fronte rufo; abdomine maculis binis et binis fasciis quadrangularibus nigris tribusque lineis albis transversis ornato; pedum binis paribus anticis brunneis.

Long. tota ♂ 7, thoracis 2, 5, abdominis 5 mill.—
Latit. thoracis 1, 8, abdominis 1, 2 mill.

♂ Il se distingue du *M. Stolzmanni* par le céphalothorax plus court, plus large et plus arrondi en arrière, ainsi que par l'abdomen plus fusiforme, et un peu plus long que dans l'espèce citée. Le carré oculaire est un peu plus court et plus large.

Coloration. Le fond du céphalothorax est brun roussâtre et d'un brun très-foncé sur les côtés, tandis que la plaque interoculaire est rousse, d'une nuance plus claire et plus vive au front. La partie postérieure est marquée de quatre lignes jaunâtres, divergeantes entre elles et qui touchent presque le bord même du contour.

Un duvet blanc forme une large bande sur les côtés de la tête et de la moitié antérieure du thorax, passant

immédiatement sous les yeux et touchant la strie externe claire de la partie postérieure du thorax; un duvet blanc forme aussi une ligne fine sur les quatre lignes mentionnées plus haut. Le dos de l'abdomen est d'un gris brunâtre, plus clair le long de la ligne médiane; les côtés bruns foncés; une paire de taches brunes foncées, arrondies, est située au dos dans la moitié de la longueur de l'abdomen; ces taches sont suivies de deux carrés de la même couleur, situés sur le milieu du dos; parmi les deux taches rondes il y a une large ligne de duvet blanc, située dans le sens de la longueur entre les deux carrés; derrière le carré postérieur au bout même de l'abdomen il y a trois pareilles lignes transversales; une large raie de duvet blanc occupe les côtés du devant et de la moitié antérieure de l'abdomen, et deux stries obliques blanches, vis à vis de chacun des carrés foncées, situées aussi sur les côtés complètent le dessin abdominal.

Les deux paires des pattes antérieures sont brunes à tarse jaune; dans les deux autres pattes la cuisse est seulement brune, le reste est jaune, ainsi que la hanche dans toutes; la plaque sternale est de la même couleur. Le ventre est gris foncé avec une large bande claire le long du milieu. Les parties de la bouche brunes foncées. Tous les yeux noirs.

Deux mâles de Paltaypampa.

Maevia trilineata n. sp.

Cephalothorace rufo, capite supra pallidiori; abdomine supra flavido, postice maculis medianis nigris lineisque albis ornato; lateribus albo-striatis.

Long. tota ♀ 6 mill.

♀ Très voisine du *M. fenestrata*, mais elle s'en distingue par le céphalothorax un peu plus élevé, un peu plus large dans sa partie thoracique et le devant de la tête légèrement atténué. Le carré oculaire est moins large que dans l'espèce citée.

Coloration. Le céphalothorax est d'une couleur rousse vive, beaucoup plus pâle au dos de la tête, qui est garni d'un duvet blanchâtre. Les yeux sont situés sur une tache noire, fort rapprochés entre eux, et dont ceux de la deuxième et de la troisième paires sont réunis; les espèces entre les yeux sont revêtus d'un duvet blanc. L'abdomen est jaunâtre, beaucoup plus pâle que le céphalothorax, varié dans sa moitié postérieure d'une suite de taches noires, dont deux sont grandes, carrées, situées sur la ligne médiane, et suivies de deux lignes transversales noirâtres, peu distinctes; devant cette suite il y a encore une paire de taches noires, dont chacune est prolongée en une ligne, dirigée vers la naissance de l'abdomen; parmi ces taches foncées il y a trois lignes transversales de duvet blanc, très-distinctes, ainsi qu'une pareille ligne longitudinale parmi les deux lignes foncées de la moitié antérieure de l'abdomen.

Les côtés de l'abdomen sont striés abondamment de blanc.

Les pattes sont unicolores; celles des deux premières paires de la couleur du céphalothorax, celles des deux postérieures de la couleur du fond de l'abdomen. Les yeux sont olives foncés.

Deux femelles de Lima.

Macvia gracilipes n. sp.

Cephalothorace brunneo, supra fulvo, binis punctis canterioque brunneo notato; oculis primi paris pilis auran-

tiacis circumscriptis; abdomine supra griseo, linea alba mediana bipartito, lateribus albis; pedibus amborum parium anteriorum rufis, posteriorum pallide flavidis.

Longit. tota ♂ 6, thoracis 2, 5, abdominis 4 mill.

♂ Il se distingue des autres espèces précédentes par la brièveté et la largeur de la tête et, en conséquence le carré oculaire plus court; le céphalothorax est plus élevé que dans les autres.

L'abdomen est fusiforme, deux fois moins gros que le céphalothorax.

Les pattes postérieures grêles, considérablement plus longues que les antérieures.

Coloration. Le céphalothorax est brun foncé, à dos fauve roussâtre avec deux gros points bruns vis à vis des yeux de la troisième paire et un chevron pareil en arrière de la tête. La surface est parsemée de duvet fauve, sans y former de dessin; les yeux antérieurs médians sont entourés de poils orangés; il y a aussi quelques poils pareils au bord des yeux latéraux. Le tégument de l'abdomen est d'une couleur chair-pâle, marbré de brunâtre; le dos est couvert en entier d'un duvet gris et traversé dans toute sa longueur d'une ligne médiane blanche; les côtés sont garnis d'un duvet blanc, qui forme autour du gris dorsal une bordure bien distincte. Les pattes des deux paires antérieures sont rousses, celles des deux postérieures d'un blanc jaunâtre. La plaque sternale est de la couleur des pattes antérieures. Les yeux de la première paire sont blancs, les autres olives.

Un mâle de Paltaypampa.

Phidippus Koch.

Phidippus aeneidens n. sp.

Niger, cephalothorace albo-limbato et unilineato, abdo-

mine supra rubro, linea alba fusiformi bipartito, tarsis rufis fusco terminatis.

Long. tota: ♂ 10, ♀ 9 mill.

♂ Le céphalothorax est robuste, fort élevé, à tête un peu plus courte que large, sans sillon postcéphalique; les yeux situés sur des tubercules assez proéminents.

Le carré oculaire est un peu plus court que large; les yeux antérieurs latéraux plus de deux fois moins gros que les médians, à sommet plus élevé de la moitié de leur diamètre; la distance entre les yeux latéraux égale à celle des postérieurs, les yeux de la deuxième ligne plus voisins des antérieurs et plus proches entre eux que les autres.

L'abdomen est fusiforme, plus long et beaucoup moins large que le céphalothorax.

Les pattes longues, celles de la première paire beaucoup plus longues que les autres; toutes hérissées de poils assez longs, mais peu abondants; le radial de la première paire armé au bord interne de deux fortes épines.

Les mandibules fortes, un peu plus longues que la hauteur du visage, écartées entre elles et un peu dirigées en avant, armées d'un fort crochet.

Coloration. La couleur générale du tégument est noir; la plaque céphalique est glabre avec un léger éclat métallique; le bas du thorax est largement bordé d'une raie en duvet blanc, et le dos traversé d'une pareille ligne fine sur toute la ligne médiane du thorax; les yeux antérieurs entourés d'un duvet rouge-brique.

Le dos de l'abdomen est garni sur le devant d'un duvet noir, passant graduellement au rouge, d'abord foncé et devenant de plus en plus clair et intense vers l'extré-

mité qui est miniacée; une ligne blanche fusiforme, plus large sur le devant est située sur le milieu de la ligne médiane; les côtés de l'abdomen sont garnis d'un duvet blanc; le ventre est noir. Toutes les pattes sont noires avec le tarse roux, terminé de noirâtre. Les mandibules sont noires olivâtres avec un éclat métallique de bronze antique; le crochet mandibulaire rougeâtre. Les poils aux pattes et aux pattes machoires sont noirs, ceux des mandibules blancs. Les yeux blanchâtres.

♀ La femelle a la même forme générale que le mâle mais son céphalothorax est beaucoup moins robuste et moins élevé; l'abdomen également fusiforme, un peu plus gros que le céphalothorax; les pattes beaucoup plus courtes.

Coloration. Le dessus du céphalothorax est brun-foncé, les côtés et une ligne médiane au thorax jaunes roussâtres; cette dernière est couverte en entier d'un duvet blanc, les côtés du céphalothorax entier parsemés d'un duvet pareil; les intervalles entre les yeux latéraux sont garnis de duvet rouge-brique; les antérieurs entourés de blanc et de rouge en dessus. Le tégument du dos de l'abdomen est brun, varié d'une suite de taches rousses le long du milieu, composée sur le devant de deux paires de taches petites suivies d'une grosse raie transversale, élargie au milieu et atténuée à ses extrémités, en arrière de laquelle il y a trois petits chevrons; les côtés sont jaunes, le milieu du ventre noirâtre.

La parure superficielle est effacée, on voit cependant des restes d'un duvet blanc répandu partout sur le dos et sur ses côtés. Toutes les pattes sont jaunes roussâtres, de la même nuance que les côtés du céphalothorax.

Les jeunes individus sont noirs en dessus avec un dessin jaune analogue à celui de la femelle; le dessous et les pattes sont jaunes pales.

Une paire (♂ et ♀) de Hylete, — trois jeunes de Lechugal.

Hyllus Koch.

Hyllus fuscomanus n. sp.

Cephalothorace nigro, abdomine rubro-brunneo. Mas cephalothorace albo-marginato, abdomine supra squammulis aurato viridibus splendidis vestito, antice albolimbato, binisque striis geminis postice signato. Fem. supra squammulis fulvis aspersa, abdomine postice late albo-transfasciato.

Long. tota ♂ 4, ♀ 5, 5 mill.

Forme très voisine de l'*A. minutus* Tacz. de Cayenne.

♂ Par ses formes générales il ressemble beaucoup au mâle de l'espèce citée, le céphalothorax est cependant plus robuste.

Les mandibules sont également longues et également écartées, elles sont armées près de l'extrémité du bord antérieur d'une forte dent, dirigée en avant.

Coloration. Le céphalothorax est presque noir, entouré d'une bordure blanche occupant le bandeau entier, et passant sur les côtés immédiatement sous les yeux latéraux où elle est fort élargie, et après avoir dépassé les yeux postérieurs elle se rétrécit et descend vers l'extrémité du thorax, parallèlement à sa congénère.

L'abdomen est d'un brun rougeâtre foncé, revêtu au dos de squammules dorées verdâtres, d'un éclat métallique très fort; il est entouré dans sa moitié antérieure d'une fine bordure blanche, suivie de deux traits obliques de la même couleur, situés sur chacun des côtés de la moitié postérieure.— Les pattes sont jaune-de-paille,

claires, finement annelées de brun sur chacune des articulations; dans les pattes de la première paire toute la cuisse est noire et les anneaux sont plus larges. Toutes les parties de la bouche sont brunes foncées; le crochet mandibulaire brun, et rougeâtre à l'extrémité. Les yeux olives.

♀ La femelle ressemble beaucoup à celle du *Callicthera scenica* d'Europe: son céphalothorax est beaucoup moins robuste que celui du mâle, le plus large sur la ligne des yeux postérieurs; l'abdomen est beaucoup plus long et plus large que le céphalothorax; les pattes courtes.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est noir, celui de l'abdomen brun rougeâtre, plus ou moins clair ou foncé, avec une large raie médiane plus claire que le fond, portant sur sa moitié antérieure deux paires de taches blanchâtres disposées en carré, dont celles de la deuxième paire sont prolongées en lignes obliques, enfin deux grosses taches obliques près de l'extrémité. Tout le céphalothorax est revêtu en entier d'un duvet sulphureux, sans couvrir complètement le fond; le dos de l'abdomen est parsemé d'un duvet blanc, plus dense sur les taches claires du tégument; les côtés sont parsemés d'un duvet pareil. Les pattes sont comme dans le mâle, mais il y a des individus dans lesquels elles sont toutes jaunes unicolores.

Nombreux exemplaires d'Amable Maria.

Hyllus Cambridgei n. sp.

Fusco brunneus, cephalothorace supra nigro, fronte limboque laterali sulphureo; abdomine fasciis sulphureis quaternis; pedibus brunneis flavo variis.

Long. tota: ♂ et ♀ 3, 5 mill.

Forme voisine de l'*A. minutus* Tacz. de Cayenne.

♂ Le céphalothorax est de la même forme que dans l'espèce citée, mais un peu moins robuste. La disposition des yeux est semblable, mais le carré oculaire est plus court. L'abdomen est un-peu plus long et un peu plus large. Les mandibules sont semblables et également écartées, cependant dans cette espèce péruvienne elles sont armées d'une dent aigüe, placée presque verticalement dans le tiers du bord inférieur; le crochet est comme dans l'espèce citée, ainsi que les pattes.

Coloration. Le céphalothorax est noir, à front garni d'un duvet jaune-souffre; une raie pareille passe sous les yeux latéraux en se rapprochant après avoir dépassé les yeux postérieurs et descendant vers l'extrémité du thorax pour s'y joindre à la bordure du bord inférieur; une raie jaune se trouve aussi entre les yeux postérieurs.—Le dos de l'abdomen est brun rougeâtre, varié de jaune-souffre comme il suit: une courbe à la naissance, une autre parallèle et proche de la première, élargie, recourbée et prolongée sur les côtés; une raie transversale très peu fléchie près de l'extrémité et un petit chevron devant les filières. Le ventre est noirâtre avec une tache blanchâtre triangulaire au milieu, qui cependant manque dans quelquesuns. Les pattes sont brunes, avec le coxe, la moitié antérieure de la jambe et le tarse jaunes. Les yeux olives.

♀ La femelle ressemble aussi à celle de l'*A. minutus*. Sa coloration est analogue à celle du mâle, mais les raies sont en général moins larges et blanches ou d'un jaune beaucoup plus pâle.—Quelquesunes ont l'abdomen aussi foncé que le céphalothorax et les pattes toutes fon-

cées, tandis que dans les autres le fond de l'abdomen est beaucoup plus clair et les pattes sont jaunes en entier.

Nombreux exemplaires de Pacasmayo, de Lechugal et de Palmal.

Hyllus callietheriaus n. sp.

Brunneo-hepaticus, abdomine antice flavide late circumscripto, postice lunulis binis albis, medioque quatuor punctis flavidis notato; pedibus corpori concoloribus flavo-annulatis. Long. ♀ 7, ♂ 5 mill.

♀ La forme générale est semblable à celle du *Calliethera scenica* (L).

Le céphalothorax est deux fois plus long que large, à tête considérablement plus courte que le thorax, plate en dessus; une petite impression bien prononcée se trouve en arrière de la tête à une certaine distance de la ligne des yeux postérieurs.

Le carré oculaire est un peu plus court que large; la distance entre les yeux postérieurs est presque égale à celle des antérieurs latéraux; les yeux de la deuxième ligne un peu plus proches des antérieurs.

L'abdomen est ovoïde, plus long et un peu plus large que le céphalothorax.

Les pattes sont courtes et assez fortes.

Coloration. Le fond de tout le corps est d'une couleur brune-rougeâtre, cette dernière nuance est beaucoup plus prononcée sur l'animal submergé en alcool; la plaque céphalique garnie de squammules très délicates présente un éclat métallique assez fort; au dessous des yeux le long des côtés de la tête il y a une large raie en duvet blanc jaunâtre, dont l'extrémité se courbe en arrière de la tête et monte au dos sans le joindre cependant avec

son analogue. Le devant et les côtés du dos de l'abdomen sont entourés jusqu'à la moitié de la longueur d'une large bordure jaune pâle, dont le bord interne est découpé près de son extrémité en un feston creux, en arrière de cette raie il y a de chaque côté un gros croissant blanc et une paire de petits points entre les branches postérieurs de ces croissants; quatre points jaunes situés en carré au milieu de la partie antérieure complètent ce dessin. Toute cette bordure claire donne une forme caractéristique à la figure foncée médiane, qui se compose de trois parties distinctes, dont la première est la plus longue, la seconde la plus large et réunie par ses branches avec la couleur du ventre, la postérieure la plus courte et petite. La couleur du ventre est comme celle du dos. Le sternum et les hanches de toutes les pattes sont rouges, la cuisse et la jambe brunes avec un anneau roux au sommet de la cuisse et au milieu de la jambe; le tarse est roux avec un anneau brun au milieu. Les pattes-machoières sont jaunes pâles. Les yeux bruns.

Une femelle complètement semblable aux précédentes diffère par les pattes jaunes avec un anneau brun au milieu du tarse et au bout des deux articles de la jambe; les pattes antérieures sont d'une belle couleur rousse.

Une autre femelle d'Amable-Maria, à pattes comme dans la précédente, a les deux lunules postérieures réunies en une grande tache jaunâtre occupant le dos de toute la partie postérieure de l'abdomen, et qui change complètement la figure foncée médiane, réduite dans cet exemplaire aux deux parties antérieures, et qui sont plus petites que dans les individus typiques et sans points clairs au milieu.

♂ Le mâle a le céphalothorax un peu plus robuste que la femelle; le carré oculaire plus large; l'abdomen

ovalaire, aussi long que le céphalothorax et un peu moins large; les pattes plus longues et plus fortes; les mandibules longues, minces, cylindriques, fort écartées et armées aux deux bords de la rainure d'une forte dent située près de la naissance du crochet; le crochet est long et mince.

Coloration. Le fond général est beaucoup plus foncé presque noir; l'éclat métallique verdâtre de la plaque céphalique est presque aussi fort que dans les mâles des *Heliophanes*; la bordure abdominale est non interrompue et jaunâtre dans toute son étendue, avec un trait transversal près de l'extrémité, coupant en deux la figure foncée médiane. Les pattes sont noires sans anneaux, à tarse seulement creux.

Un mâle et trois femelles de Pumamarca, une femelle d'Amable-Maria.

C'est une forme très voisine de l'*Attus platycephalus* Tacz. de Cayenne.

Hyllus quadrilunatus n. sp.

Niger, cephalothorace margine tenuissimo albo et vitta suboculari ornato; abdomine limbo antico, lunulis quaternis lateralibus et tribus punctis posticis albis vario; pedibus brunneo fulvoque annulatis.

Long. tota ♂ 5,5 mill.

♂ Les formes générales, ainsi que la disposition des yeux sont comme dans les espèces précédentes.—Les mandibules sont également longues et écartées, armées près de l'extrémité du bord inférieur d'une petite dent; le crochet mandibulaire est deux fois recourbé comme dans les précédentes.

Coloration. Le céphalothorax est noir, entouré d'une bordure blanche très fine, et portant une autre bande plus large qui occupe le bandeau, passe immédiatement sous les yeux latéraux et se prolonge sur la moitié antérieure du thorax; la plaque interoculaire est d'un éclat métallique assez fort. Le tégument du dos de l'abdomen est brun rougeâtre avec une raie médiane plus claire et trois paires de taches foncées encadrées par des lignes transversales blanchâtres sur les côtés; il est garni d'écaillés vertes métalliques à éclat assez fort, et entouré dans sa moitié antérieure d'une bordure blanche, dont les bras sont suivis de chaque côté d'une paire de raies transversales courbes de la même couleur, et trois points blancs rangés en triangle renversé se trouvent près de l'extrémité même. Les pattes sont brunes annelées de jaune; les coxes et les tarses dans toutes sont jaunes. Les mandibules sont brunes foncées; le crochet brun à extrémité rougeâtre; tous les yeux olives.

♀ Le céphalothorax de la femelle est moins large, l'abdomen plus gros, les pattes plus courtes.

La coloration est la même que dans le mâle, il lui manque seulement la raie blanche sousoculaire, qui est remplacée par un semis de duvet blanc sur tout le côté. Il y a des exemplaires dont le tégument de tout le corps est noir; les pattes antérieures d'un brun très foncé, et les autres à anneaux jaunes peu distincts.

Nombreux exemplaires de *Pumamaria*.

Hyllus heliophanius n. sp.

Niger, supra viridi-micans; abdomine antice albo-limbato; pedibus flavis, brunneo-annulatis, femoribus nigris.

Long. tota. ♂ 4 mill.

♂ Le céphalothorax est à peu près de la forme de celui du mâle dans l'espèce précédente, ainsi que la disposition des yeux, la forme de l'abdomen et la proportion des pattes. Les mandibules sont également longues et également écartées, mais elles sont plus fines et cylindriques; elles sont armées comme dans le *H. fusco-manus* d'une épine dirigée en avant.

♀ La femelle a le céphalothorax assez court, et beaucoup moins large que celui du mâle; presque aussi large sur la ligne des yeux postérieurs qu'au front. Les pattes sont beaucoup plus courtes et moins inégales que dans le mâle.

Coloration. Dans les deux sexes le tégument de tout le corps est noir, entièrement couvert au dos d'écaillés vertes dorées, à éclat métallique aussi fort que dans les *Heliophanes*; le bandeau est revêtu d'un duvet blanc dans le mâle, et un peu roussâtre dans la femelle; les côtés du céphalothorax sont parsemés de duvet blanchâtre. La moitié antérieure du dos de l'abdomen est bordée d'une raie blanche; le ventre est noirâtre parsemé d'un duvet blanchâtre peu distinct. Les pattes sont jaunâtres pâles, à cuisse noire, et des lignes brunes longitudinales sur la jambe et le tarse; elles sont parsemées de duvet blanc. Tous les yeux olives.

Un mâle et une femelle d'Amable Maria.

Hyllus tumbezanus n. sp.

Fusco brunneus, capite abdomineque supra squammulis auratis dense vestitis; cephalothorace abdomineque late albo-circumscriptis; inter oculos quarti paris macula magna alba; pedes pilis albis annulati.

Long. tota. ♂ 7 mill.

♂ Le céphalothorax est robuste, élevé, presque rond, à tête un peu plus courte que large, plate au dos, presque horizontale, distinguée par une faible impression transversale; le thorax est court, à dos brusquement abaissé depuis sa naissance; les yeux montés sur des tubercules élevés.

Le carré oculaire est un peu plus court que large; les yeux antérieurs médians gros, à diamètre plus de deux fois plus long que celui des latéraux et occupant presque toute la hauteur du bandeau; les latéraux plus élevés que les médians presque de la moitié de leur diamètre; la distance entre les postérieurs égale à celle des antérieurs latéraux; les yeux de la deuxième ligne situés juste au milieu parmi les environnants, et plus proches entre eux.

L'abdomen est fusiforme, beaucoup moins gros que le céphalothorax.

Les pattes assez longues, surtout les antérieures; les pattes-machoières longues et fines.

Les mandibules beaucoup plus longues que le devant de la hauteur de la tête, subconiques, assez fortes, fort écartées et dirigées obliquement en avant; le crochet fort long, mince à courbure double.

Coloration. Le tégument de tout le corps est brun foncé; le dessus de la tête, le haut de ses côtés et le devant du visage, ainsi que le dos de l'abdomen sont revêtus d'écailles métalliques dorées à reflet verdâtre. Le céphalothorax est entouré d'une large bordure blanche, qui s'étend aussi sur le bandeau en une rangée de poils serrés; entre les yeux postérieurs il y a une grosse tache blanche et deux autres petites sur la ligne médiane du thorax. Le dos de l'abdomen est largement entouré d'une bordure blanche. Les pattes sont parsemées d'un duvet

blanc, qui prend une teinte dorée métallique dans certaines directions de la lumière. Les mandibules sont de la couleur générale du corps, avec un éclat métallique violet, assez fort; le crochet est noirâtre à la naissance et rouge à l'extrémité. Les yeux antérieurs jaunes-d'ambre, les autres noirs.

Un mâle de Lechugal.

Amycus Koch.

Amycus spectabilis Koch.

Die Arachnid. XIII. p. 184. f. 1233.

Nombreux exemplaires des deux sexes et des jeunes d'Amable-Maria, de Paltaypampa, de Pumamarca et de Monterico.

Les mâles s'accordent dans tous leurs détails avec la figure et la description de Koch, il leur manque seulement la tache jaune au front, qui est nu et hérissé seulement de quelques poils noirs; au lieu de cela ils ont au milieu du dos derrière le carré oculaire une tache rousse, composée de deux taches confondues, glabre comme toute la surface du céphalothorax; une raie bien distincte en duvet blanc se trouve au bandeau.—L'impression thoracique est assez profonde, peu volumineuse, divisée en arrière en deux embranchements assez distincts.

Les mandibules sont longues, larges, comprimées, armées au sommet du bord antérieur de la rainure d'une forte dent, dirigée en avant et d'une autre plus petite au tiers de la longueur; au bord postérieur de la rainure il y a aussi deux dents plus petites vis à vis de la première; outre cela il y a encore une petite dent près de la naissance

du crochet. Le crochet est épais, long, brusquement fléchi au tiers de sa longueur, où il est le plus gros.

La femelle a l'abdomen plus long et plus épais, surtout dans les individus adultes; les pattes moins longues, les mandibules plus courtes et sans armure. La couleur du céphalothorax est marron-rougeâtre avec une grande tache noire à la base de chaque oeil; la tache claire thoracique est pour la plupart distincte; un duvet blanchâtre forme une grande tache au milieu du thorax, une autre petite au milieu du front, entoure les yeux et garnit largement les espaces entre eux; comme dans le mâle il y a aussi au bas du bandeau une raie blanche, dont les extrémités se courbent en haut et touchent les yeux de la deuxième paire. Le milieu du dos de l'abdomen est occupé par une large raie jaunâtre, couverte de duvet blanc, bordée de chaque côté par une autre raie noire, couvrant en entier le dos, deux points blancs se trouvent sur chacune de ces raies; dans les adultes ces raies pâlisent de plus en plus. Les côtés sont blancs triés de noirâtre; le milieu du ventre noirâtre. Toutes les pattes, les parties de la bouche, et le sternum sont jaune-de-paille; dans les deux paires des pattes antérieures il y a une tache noirâtre aux articulations de la jambe, à la naissance du radial et au bout du métatarse. Le plus grand individu mesure 10 mill. de longueur totale, dont l'abdomen occupe 6 mill.; largeur de l'abdomen 4 mill.

Les jeunes femelles sont en général plus pâles, à noir plus intense sur les côtés du dos de l'abdomen; elles ont aussi trois raies noires au dos du thorax, dont une médiane aiguë en avant et de plus en plus élargie en arrière, et une commençant à chacun des yeux postérieurs et descendant jusqu'à la base du céphalothorax; ces raies

noires pâlisent avec l'âge et disparaissent presque en entier dans les individus complètement adultes. Les pattes antérieures sont sans taches foncées.

Amycus fuscomanus n. sp.

Flavicans, cephalothorace castaneo, supra rufo-aurantiaco; pedibus anticis brunneis; dorso abdominis fuscomaculato.—Feminae caput superne pallide sulphureum, lineis aurantiacis quaternis ornatum; pedes concolores.

Long. ♂ 6; ♀ 7 mill.

♂ Par ses formes générales cette espèce est très analogue à l'*A. spectabilis* Koch, les mâles surtout se ressemblent beaucoup; le céphalothorax cependant de cette espèce nouvelle est moins élevé, et moins large.

Le carré oculaire est sensiblement plus long que dans l'espèce citée, les yeux de la deuxième rangée un peu plus proches de la première, les postérieurs un peu plus proches entre eux.

L'abdomen est un peu plus large.

Les pattes sont comme dans l'*A. spectabilis*.

Les mandibules également longues et élargies ont la forme générale semblable à celles de l'espèce citée, mais elles présentent une différence importante dans les détails: la base du bord externe est élargie jusqu'à la moitié de la longueur de la mandibule, où ce renflement est terminé par une forte dent dirigée en avant; au bord interne de la rainure il y a à la hauteur de la dent précédente une rangée de petites dents, et une petite plus loin; le crochet est beaucoup plus court, légèrement fléchi à l'extrémité même.

Coloration. Le céphalothorax est brun-marron à tête rousse-orangée beaucoup plus claire; la différence cependant entre ces deux parties n'est pas également distincte il y a même des individus dont le céphalothorax entier est d'une couleur rousse presque uniforme partout; chaque oeil est situé sur une tache noire dont celles de la 1 et 2 ligne sont confondues. Un duvet roussâtre soyeux garnit le front, tous les espaces interoculaires et forme une tache plus ou moins grande au milieu du devant du thorax. L'abdomen est d'une couleur jaunâtre pâle avec quelques taches brunâtres pâles au dos, et garni d'un duvet blanc jaunâtre. Les pattes sont de la couleur de l'abdomen, uniformes, excepté les antérieures, qui sont brunes avec un large anneau à la naissance du métatarse et le tarse jaunes; dans quelques uns cependant la deuxième paire est aussi brune, tandis que dans d'autres la première est pâle comme les suivantes. La patte-mâchoire est jaune à tarse brun. Les mandibules bruns-claires. Les yeux blancs.

♀ Le céphalothorax est moins large et moins élevé, les yeux disposés comme dans le mâle; l'abdomen de la même forme, mais plus large; les pattes moins longues.

Coloration. La couleur générale est comme celle du mâle, le céphalothorax est d'un roux plus clair avec les taches oculaires noires comme dans le mâle; un duvet sulphureux pâle couvre toute la plaque interoculaire qui est traversée dans toute sa longueur de deux raies briques-orangées et de deux autres latérales, dont chacune passe par les yeux latéraux; le thorax est parsemé de poils blanchâtres. Le dos de l'abdomen est souvent marqué de quatre taches foncées, disposées en carré, qui, sur d'autres sont plus ou moins pâles et quelque fois presque effacées, et garni de duvet blanchâtre, sur lequel il y

a un dessin brïque plus pâle que celui des raies frontales, composé de deux lignes parallèles aux côtés et d'une médiane plus courte, suivie de quelques petits chevrons. Toutes les pattes sont jaunes pales uniformes.

Nombreux exemplaires d'Amable Maria et deux mâles de Paltaypampa.

Amycus guianensis (Tacz.).

Horae Societ. Entomol. Rossic. VIII. p. 61.

Trois mâles et deux femelles d'Amable Maria.

Les mandibules du mâle, plus longues que la hauteur du devant de la tête, sont larges, aplaties à la face antérieure et sans armure aux bords de la rainure ainsi qu'au bord externe. Les mâchoires sont très épaisses, renflées et élargies au sommet du bord externe en une dent fort proéminente, dirigée sur le côté; cette dent est visible du front à travers les mandibules, et à première vue paraît appartenir à ce dernier organe. Deux grandes taches rondes d'un roux clair au milieu du devant du thorax sont très caractéristiques pour cette espèce.

Amycus Steindachneri n. sp.

Mas cephalothorace rubro-castaneo albo-trimaculato; abdomine fulvoisabellino vittis binis fuscis albo-maculatis longitudinaliter notato; pedibus primi paris brunneo-castaneis, sequentibus flavo brunneoque variis.

Long. ♂ 7 mill.

♂ Le céphalothorax est robuste et fort élevé; la tête presque aussi longue que le thorax, à dos vouté, incliné en avant; un fort enfoncement se trouve entre les yeux

de la deuxième et de la troisième ligne, et une forte impression en arrière de la tête. Le thorax est brusquement abaissé en arrière, large, à côtés arrondis dans toute leur longueur.

Le carré oculaire est presque aussi long que large; les yeux médians plus de trois fois plus gros que les latéraux, les sommets de ces derniers sont un peu plus élevés; les yeux de la troisième ligne beaucoup plus rapprochés entre eux que ceux de la deuxième paire; ceux de la deuxième ligne plus proches des yeux de la première. L'abdomen est fusiforme, aussi long que le céphalothorax et beaucoup moins large.

Les pattes médiocres, assez robustes, garnies de rares poils et de quelques fortes épines.

Les pattes-mâchoires assez longues et grêles à dernier article allongé et peu grossi.

Les mandibules médiocres, fortes, écartées, presque verticales, armées d'une forte dent près de l'extrémité du bord antérieur. Coloration. Le céphalothorax est d'une couleur marron-rougeâtre claire, presque uniforme; les yeux situés sur une tache noirâtre dont celles des yeux de la deuxième et de la troisième paire réunies entre elles; il y a trois grosses taches en duvet blanc, dont deux sont situées entre les yeux de la deuxième et de la troisième ligne en se prolongeant, jusque sous les latéraux de la première, et la troisième au centre du thorax en arrière de l'impression; les yeux antérieurs sont entourés d'un duvet roux. Le tégument de l'abdomen est jaunâtre pâle, avec deux raies foncées longitudinales, à bord interne profondément festonné, et variées d'une rangée de plusieurs taches en duvet blanc, bien distinctes; la raie claire médiane est garnie d'un duvet fauve-roussâtre; les côtés de duvet blanchâtre. Les pattes antérieures sont

d'une nuance un peu plus foncée que le céphalothorax; dans les autres pattes la cuisse est jaune claire, l'extrémité même de la cuisse et les autres articles de la couleur des antérieures, mais de plus en plus clairs dans les postérieures. Les pattes-mâchoires et les mandibules sont de la couleur du thorax. Les yeux verts de bouteille.

♀ Le céphalothorax de la femelle ressemble à celui du mâle, mais il est moins élargi au milieu, et en conséquence la distance entre les yeux postérieurs n'est pas plus grande que celle des antérieurs latéraux; les côtés du thorax sont moins arrondis; l'impression entre les yeux de la troisième et de la quatrième paire moins forte. L'abdomen est plus long et un peu plus large que le céphalothorax, ovoïde, subaigu en arrière. Les pattes plus courtes que dans le mâle.

Coloration. Le céphalothorax et les pattes sont d'un jaune-roussâtre, beaucoup plus clair que celui du mâle; les taches oculaires comme dans ce dernier; toute la surface dorsale est revêtue d'un duvet blanchâtre, très délicat, changeant la couleur du tégument sans la couvrir entièrement. Les yeux antérieurs sont entourés d'un duvet blanchâtre, tandis que la tache interoculaire correspondante à la blanche du mâle est orangée. Le fond de l'abdomen est comme dans le mâle; il y a de pareilles raies foncées; un duvet blanchâtre garnit toute la surface sans effacer complètement la couleur du tégument, les raies foncées restent distinctes et présentent aussi une suite de petites taches blanches.

Deux mâles et une femelle de Monterico.

Amycus lechugalensis n. sp.

Fulvo-griseus, supra brunneo-marmoratus; abdomine

lineis transversalibus brunneis et nigris variegato; pedibus brunneo flavidoque annulatis.

Long. tota ♀ 4,5 mill.

♀ Le céphalothorax est robuste, fort élevé, un peu plus long que large; la tête beaucoup plus courte que large, non distincte de la partie thoracique, à face dorsale fort inclinée en avant; le dos du thorax aussi élevé à sa naissance que la tête, mais bientôt brusquement abaissé en arrière.

Le carré oculaire est beaucoup plus court que large; le sommet des yeux antérieurs est en ligne droite; les médians deux fois plus gros que les latéraux; les yeux de la 2 et de la 4 paires également éloignés entre eux; ceux de la 3 paire se trouvent juste au milieu entre les environnants.

L'abdomen, presque aussi long et plus gros que le céphalothorax, est en ovale très court, subaigu en arrière.

Les pattes sont médiocres.

Coloration. La couleur du tégument du céphalothorax est brune, celle de l'abdomen fauve; le tout est couvert d'un duvet fauve-grisâtre; le devant de l'abdomen est marbré et moucheté de brun, tandis que sur la moitié postérieure il y a quatre traits transversaux bruns, dont le deuxième est prolongé sur les côtés en un appendice grossi et noir, le suivant est légèrement courbe, le dernier en chevron. Le front a une légère teinte ferrugineuse, les yeux antérieurs sont entourés d'un duvet rousâtre, le bandeau garni de poils blancs. Le ventre est noirâtre au milieu, fauve-blanchâtre, strié de blanc sur les côtés. Les pattes sont jaunâtres, largement annelées de brun; les parties claires relevées par un duvet blanchâtre.

Les yeux sont d'un olive clair.

♂ Le mâle ressemble en tout à la femelle, si ce n'est que le thorax est plus robuste et plus élevé; les mandibules sont longues, fortes, dirigées en avant; les pattes plus longues que dans la femelle; les pattes-mâchoires longues et grêles.

Une paire de Léchugal.

Amyeus thoracicus n. sp.

Cephalothorace robusto, elevato, brunneo, macula mediana rufa notato; abdominis dorso olivaceo submetallico, pedibus anticis brunneis, posticis flavis. Long. ♂ 8; ♀ 10 mill.

♂ Voisin de l'*Attus porcatus* Tacz. de la Guyane française, à céphalothorax plus robuste et beaucoup plus élevé; la région des yeux antérieurs dévancant considérablement la face perpendiculaire du bandeau, mais moins que dans l'espèce citée; il y a aussi au bord antérieur de la plaque frontale quelques poils couchés horizontalement, sans former cependant une brosse aussi abondante, propre à l'espèce guyanaise.

La disposition des yeux, la forme de l'abdomen et la proportion des pattes sont comme dans l'espèce citée plus haut. Les mandibules sont tout à fait différentes: elles sont un peu plus longues que la face antérieure du visage, minces, cylindriques, légèrement dirigées en avant et armées aux deux bords de la rainure, près de la naissance du crochet d'une petite dent; le crochet est court, faible et courbé. Coloration. Le céphalothorax est brun foncé avec une grande tache rousse au milieu du thorax et une raie pâle à travers le bandeau. Le dos de l'abdomen est brun avec une large ligne médiane blanche et une bordure de la même couleur; toute la sur-

face est garnie d'un duvet olivâtre à éclat soyeux; les bordures claires latérales sont relevées par un duvet blanchâtre assez dense; quatre petites taches blanchâtres en carré se trouvent au milieu du dos. Le ventre est noirâtre parsemé de duvet blanchâtre. Les pattes antérieures sont brunes, la jambe des suivantes brunâtre plus claire, les deux autres jaunes roussâtres; le tarse dans toutes est de cette dernière couleur, avec un anneau noirâtre à la naissance de l'article terminal dont l'extrémité même est de cette dernière couleur. Les mandibules sont brunes, d'une nuance plus claire que celle du céphalothorax. Les yeux brunâtres clairs.

♀ Le céphalothorax de la femelle est moins élevé et moins robuste, à bandeau plus bas, mais il est de la même forme. L'abdomen est plus long et un peu plus large que le céphalothorax, de forme ovoïde, légèrement atténué en arrière. Les pattes sont plus courtes. Les mandibules sont beaucoup moins longues, un peu plus épaisses, armées comme celles du mâle.

Coloration. La couleur du céphalothorax est brune à plaque interoculaire d'un ocreux rougeâtre, et une grande tache rousse jaunâtre sur le devant du thorax; le sommet de la tête est garni d'un duvet roux-vif, le milieu du thorax d'un duvet fauve. Le dos de l'abdomen est brun avec une raie jaunâtre longitudinale au milieu de la naissance et quatre stries sinueuses en carré, peu distinctes sur le fond foncé; les côtés sont jaunâtres pâles, striés de brun, le ventre brun; un duvet roux et noirâtre garnit la surface dorsale, en y formant un mélange irrégulier le plus foncé au contour; la raie basale et les quatre stries sont relevées par un duvet jaunâtre clair; les côtés sont de même couverts de duvet analogue à la couleur du fond, celui des taches foncées est noir.

Les pattes sont jaunes; dans la première paire le sommet de la cuisse et les deux articles de la jambe sont noirâtres; le tarse dans toutes les pattes a un anneau sur son articulation et l'extrémité même brunâtres.

Deux paires d'Amable-Maria et un mâle de Pumamarca.

Amycus crocutus n. sp.

Mas cephalothorace antice rufo-castaneo, postice brunneo; capite supra pilis fulvis vestito, thorace medio macula fulva; abdomine antice fusco, postice flavicanti, linea fulva transversali, binis seriebus macularum brunnearum longitudinaliter notato; pedibus brunneo, flavidoque variis. Fem. fulva rubroque tenuissime variegata, vitta lata mediana flavido-albida, facie rubro albide lineata, pedibus fulvo-rufis.

Long. tota ♂ 8,5, ♀ 10 mill.

♂ Le céphalothorax est robuste, élevé, à côtés du thorax fort arrondis; la tête aussi longue que large, très peu distincte du thorax, à dos fort incliné en avant; bandeau fort élevé.

Le carré oculaire régulier; le diamètre des yeux antérieurs latéraux presque trois fois plus petit que celui des médians, le sommet des premiers un peu élevé audessus de celui des derniers; les yeux de la deuxième ligne un peu plus voisins des antérieurs, et poussés au dos, de sorte, que la distance entre ces yeux est considérablement plus petite, que celle des deux autres paires.

L'abdomen est fusiforme, bossu près de sa naissance, un peu plus long et beaucoup moins large que le céphalothorax.

Les mandibules sont verticales, très fortes, armées dans la moitié de leur longueur d'un noeud proéminent sur leur bord externe.

Les pattes sont assez longues, celles de la première paire beaucoup plus longues que les autres.

Coloration. Le devant du céphalothorax jusqu'à la moitié de la longueur du thorax est d'une couleur rousse vive, la partie postérieure brune foncée, régulièrement et parfaitement distincte de la précédente; tous les yeux montés sur une tache noire; la plaque interoculaire est revêtue d'un duvet jaunâtre claire, passant au roux au front; une grosse tache jaune claire également en duvet est située au milieu du thorax. Le devant de l'abdomen est brunâtre, plus ou moins foncé, le reste est jaunâtre pâle avec une large raie médiane plus ou moins rousâtre, bordée des deux côtés d'une série de quelques taches brunes, souvent confondues entre elles; un duvet fauve forme une raie transversale sur la partie antérieure la plus élevée du dos et un dessin irrégulier au voisinage de la série des taches foncées. Les côtés de l'abdomen sont fauves; le milieu du ventre foncé, relevé par deux lignes latérales plus obscures. Les pattes de la première paire sont brunes foncées, dans les autres la moitié inférieure de la cuisse est jaune pâle, et le brun des autres articles est moins foncé; le tarse dans toutes les pattes est jaune à extrémités des deux articles bruns; les pattes-mâchoires jaunes à tarse brun. Les yeux olives clairs. Toutes les parties de la bouche sont de la couleur du devant du céphalothorax.

Dans les jeunes individus, de la moitié de la grandeur, tout le céphalothorax et toutes les pattes sont jaunes uniformes, excepté les taches noires à la basse des yeux.

♀ Le céphalothorax est allongé, étroit, à côtés presque parallèles, et presque verticaux; la tête très peu plus

courte que large, à dos fort incliné en avant et non distinct du thorax, ce dernier deux fois plus long que la tête.

Le carré oculaire est un peu plus large que long, et un peu plus large en arrière qu'en avant.

L'abdomen est ovoïde, plus long et beaucoup plus gros que le céphalothorax.

Les pattes médiocres.

Coloration. Très variable en nuances, mais le mode est le même. Le tégument du dos du céphalothorax et de l'abdomen est brun, traversé dans toute sa longueur d'une large ligne jaunâtre; les côtés sont jaunes roussâtres; le milieu du ventre foncé.

Tout le corps est revêtu d'un duvet dense, couvrant complètement la couleur du tégument; toute la surface dorsale est finement mélangée de fauve ou de blanchâtre avec du rouge brique plus ou moins vif, ou brunâtre; le long du milieu du céphalothorax il y a une grosse ligne jaunâtre ou blanchâtre, atténuée en arrière; une pareille ligne festonnée sur ses côtés et plus ou moins bordée de brun occupe toute la longueur de la ligne médiane de l'abdomen. Le fond des côtés du thorax et de l'abdomen est jaunâtre, maculé de rouge; le milieu du ventre foncé. Dans le voisinage des yeux latéraux prédomine le rouge; le devant du visage est coloré d'une manière très caractéristique: le fond de cette partie est rouge ou brun, varié de lignes transversales jaunâtres ou blanches, dont une traverse le bas du bandeau, et deux autres parallèles à la première partent du bord externe des yeux médians et se rendent sur le côté du thorax jusqu'au niveau des yeux de la deuxième ligne; l'espace entre les yeux médians est rempli de duvet blanc ou jaunâtre. Les pattes

sont jaunes roussâtres, parsemées d'un duvet blanchâtre. Les yeux olives clairs.

Nombreux exemplaires des deux sexes de la Guadeloupe, de Pacasmayo, de Hylete et de Lechugal.

Amyeus mystacalis n. sp.

Mas. capite rufo, thorace fusco-brunneo; abdomine supra brunneo, longitudinaliter linea ramificata flava, antice lunula pilosa alba et maculis albis ornato; pedibus brunneo flavoque variis. Foem. cephalothorace rufo, postice brunnescenti, capite supra pilis fulvis adperso et linea longitudinali bipartito; abdomine fulvo, brunneo-maculato et pilis albis vario; pedibus flavis.

Long. tota ♂ 5,5. ♀ 8 mill.

Forme très voisine de l'*A. crocutus*, et ne différant qu'en ce que dans le mâle les yeux antérieurs latéraux sont plus éloignés des médians, dirigés plus en avant et à sommet en ligne droite avec ces derniers; le devant de l'abdomen est plus vertical; les pattes antérieures proportionnellement moins longues.

♀ Coloration. Le tégument du céphalothorax est brun très foncé, à dos de la tête et la moitié supérieure des côtés de cette dernière d'une couleur rousse vive, distinctement séparée de la couleur foncée de la partie environnante; un duvet blanc est parsemé entre les yeux latéraux et en arrière de la tête; les yeux antérieurs sont entourés d'un duvet roussâtre. Le dos de l'abdomen est brun avec une ligne médiane jaune, ramifiée sur les côtés; les premiers de ces rameaux sont obliques, en chevron, les seconds ronds contenant au centre un point brun, les trois derniers presque verticaux

à la ligne principale; sur le devant de l'abdomen il y a une bordure en duvet blanc, des taches pareilles se trouvent sur les côtés de l'abdomen et sur la figure médiane; le ventre est fauve, rembruni sur ses côtés. Les pattes antérieures sont brunes foncées avec un anneau jaune à la naissance du radial, du métatarse et du tarse; dans la 2^e, 3^e et 4^e paire il n'y a du brun qu'à l'articulation de la cuisse et des autres articles. La patte-mâchoire est jaune avec le tarse brun. Les yeux sont olives très clairs.

♀ Le céphalothorax est plus large que dans la femelle de l'*A. crocutus*; le carré oculaire est régulier, la distance entre les yeux postérieurs égale à celle des antérieurs latéraux; le dos de la tête bien distinct du thorax par un enfoncement transversal, bien prononcé.

Coloration. La couleur du tégument est semblable à celle de l'espèce citée mais le dessin superficiel est tout à fait autre. Une fine ligne en duvet blanchâtre passe le long du milieu de la région interoculaire; le reste de la surface est parsemé de rare duvet fauve; les yeux latéraux entourés en grande partie d'un duvet rouge brique dense; une ligne en duvet blanchâtre s'étend depuis les yeux de la deuxième paire et passe sous les yeux de la première; une autre plus courte, parallèle à la précédente se trouve au bas du bandeau. Le dos de l'abdomen est fauve, varié de deux rangées de grosses taches noirâtres, souvent confondues entre elles ou formant un dessin beaucoup plus compliqué et plus étendu sur les côtés, en laissant entre elles une figure médiane claire, semblable à celle du mâle, et parsemée de taches en duvet blanc, qui sont aussi disposées sur les côtés de l'abdomen.

Les pattes sont rousses unicolores. Les yeux antérieurs blanchâtres, les autres olives.

Les individus jeunes sont en général plus pâles, et souvent ils ont au dos de l'abdomen quatre points disposés en carré au lieu de deux suites de taches noires.

Nombreux exemplaires des deux sexes et de différents âges de Lechugal et de Palmar.

Amycus lycosiformis n. sp.

Mas cephalothorace fusco-brunneo area mediana rufa notato; abdomine fusco-griseo: pedibus primi paris brunneis, reliquis flavis. Fem. cephalothorace supra rufo, lateribus posticeque brunneo; abdomine supra brunneo rufo maculato, pedibus rufescentibus.

♂ Long. tota 8, abdominis 4, pedum 1-ae paris 14, 2-ae 9, 3-ae 11, 7,5 mill.

♀ Long. tota 10 mill.

Le céphalothorax est robuste, fort élevé, à bandeau très haut; la face dorsale de la tête plane, presque horizontale, parfaitement distinguée du thorax, qui est brusquement abaissé en arrière, à côtés presque verticaux.

Le carré oculaire est un peu plus court que large; les yeux antérieurs latéraux un peu plus élevés que les médians; les yeux de la seconde ligne situés juste au milieu entre ceux de la première et de la troisième ligne, et un peu plus proches entre eux que les autres.

L'abdomen est de la même longueur que le céphalothorax, beaucoup moins gros, fusiforme.

Les pattes longues et assez grêles, dans l'ordre 1, 3, 2, 4.

Les mandibules longues, cylindriques, dirigées un peu en avant.

Coloration. Le céphalothorax est brun foncé avec une grande tache rousse au milieu du devant de la partie

thoracique. La couleur du tégument de l'abdomen est grise foncée avec une large raie plus claire située le long du dos, garnie d'un duvet soyeux roussâtre avec un léger reflet métallique sous certaines directions de la lumière; le ventre est noirâtre. Les pattes antérieures sont brunes plus ou moins foncées; toutes les autres jaunes roussâtres claires; le tarse dans toutes est de cette dernière couleur avec un petit anneau noirâtre aux deux articulations et à l'extrémité. Les parties de la bouche sont brunes; tous les yeux blanchâtres.

♀ La forme du céphalothorax de la femelle est à peu près comme celle du mâle, mais il est moins élevé; l'abdomen est plus long que le céphalothorax, mais beaucoup plus gros, de forme ovoïde; les pattes sont beaucoup plus courtes que dans le mâle, mais présentant la même proportion sous le rapport de la longueur.

Coloration. Le céphalothorax est d'une couleur rousse vive en dessus, et brune foncée sur les côtés et en arrière; la plaque céphalique est d'un roux plus intense et garnie d'un duvet de la même couleur; tous les yeux sont situés sur une tache brune. Le tégument du dos de l'abdomen est brun grisâtre, avec une tache allongée au milieu de la naissance et quelques stries jaunes roussâtres disposées sur deux rangées, parsemé sur toute la surface d'un duvet fauve soyeux. Les côtés sont jaunes, striés de brun; le ventre noirâtre. Toutes les pattes sont rousses avec des anneaux noirs au tarse comme dans le mâle; les antérieures ont encore un anneau plus large au milieu de la jambe et un autre au sommet de la cuisse.

Trois mâles et deux femelles d'Amable-Maria.

Amycus spinipes (Tacz.)

Attus spinipes Tacz. Horae Societ. Entomol. Rossic. VIII. p. 65.

Plusieurs exemplaires de Callao, de Lima, d'Amable-Maria et de Pumamarca.

Chirothecia n. g.

Le céphalothorax bas, à dos fort aplati; la tête beaucoup plus longue que large, parfaitement plane en dessus; la partie thoracique plus courte que la céphalique, légèrement abaissée en arrière.

Les yeux postérieurs fort reculés en arrière; ceux de la seconde ligne plus proches des antérieurs que des postérieurs, et plus proches entre eux que ne le sont ces derniers et les antérieurs latéraux. Le sommet des antérieurs est en ligne parfaitement droite; les médians très gros, occupent toute la face frontale du visage; les externes de cette dernière rangée sont considérablement plus gros que les yeux des deux lignes postérieures.

Les pattes médiocres et grêles, excepté celles de la première paire qui sont plus épaisses que les autres, à radial fort renflé et creusé sur son bord interne en une gouttière assez profonde; chacun des bords de cette gouttière est garni de trois longues épines, articulées chacune sur une éminence basse mais beaucoup plus grosse que l'épine, et de quelques soies distribuées sans ordre; au fond de la gouttière se trouve un peigne serré, composé de poils larges et aplatis, disposés sur une rangée simple.

Les mandibules larges, courtes et presque verticales dans la femelle; longues, horizontales et armées d'un long crochet recourbé dans le mâle.

Taille petite.

Ce curieux genre, dont les pattes antérieures sont beaucoup plus épaisses que les autres, à deuxième article

de la jambe fort renflé, ressemblant au premier coup d'oeil aux chelycères des écrevisses, et plus encore à celles des chélifères, se caractérise aussi par l'extrême aplatissement du céphalothorax, par la longueur de la partie céphalique et par un fort reculement en arrière des yeux de la dernière rangée.

La singulière armure des pattes antérieures présente une particularité très remarquable; les appendices articulés donnent certainement à l'organe une importance physiologique, inconnue dans tous les autres aranéides.

Nous sommes redevables à M. Jelski de la découverte de la première espèce de ce genre à Cayenne, que j'ai décrite sous le nom d'*Attus clavimanus* dans les «Horae Societatis Entomologicae rossicae» T. VIII. p. 115. Les espèces suivantes, fournies aussi du Pérou par ce zélé explorateur, augmentent le nombre d'espèces connues, et m'ont procuré l'occasion de baser ce nouveau genre sur des données plus nombreuses, et sur les caractères d'un mâle d'une de ces espèces.

Chirothecia cheliferoïdes n. sp. Fig. 1 et 2.

Ochracea, cephalothorace linea argentea circumcincto, abdomine vittis binis argenteis ornato, pedibus flavis linea nigra longitudinali notatis, anticis incrassatis brunneo-castaneis. Long. 3 mill.

♀ Le céphalothorax est à peu près deux fois aussi long que large, bas et plat, à partie céphalique un peu plus longue que la thoracique. Le carré oculaire plus long que large; la distance entre les yeux de la 2 et 3 ligne est à peu près deux fois plus longue qu'entre la 2 et la 1-re.

L'abdomen régulièrement elliptique est un peu plus long que le céphalothorax, deux fois plus long que large.

Le radial de la patte antérieure est renflé dans toute sa longueur, allongé, et semblable par sa forme aux palpes des Chélifers; son bord interne est garni d'un peigne assez épais de poils bordé des deux côtés de trois paires de fortes épines; le bord interne du tibial est armé près du sommet d'une forte épine.

Coloration. Le dessus du corps est jaune ocreux, tirant sur le marron au céphalothorax et sur l'orangé à l'abdomen; le bord antérieur de la tête est rembruni, les yeux latéraux sont situés sur une tache noire, dont celles des postérieures sont les plus grandes; tout le long du dos de l'abdomen passent deux lignes brunes parallèles, qui se réunissent audessus des filières; un duvet épais couvre complètement toutes ces parties et modifie plusieurs détails: celui du fond est presque de la même nuance que celle du tégument; le bord antérieur et les bords latéraux de la région oculaire, ainsi que le bord inférieur du céphalothorax entier sont entourés d'une ligne blanc-argentée métallique fine; les deux lignes foncées au dos de l'abdomen sont de-même couvertes d'argenté métallique, plus brillant que les précédentes. Les parties de la bouche, le sternum et le ventre sont d'une couleur chair-pâle. Les grosses pattes antérieures sont d'une couleur marron à dernier article du tarse jaunâtre, et les poils de la brosse noirâtres; toutes les autres pattes sont jaunes de paille avec une ligne noire le long de la face antérieure de la cuisse et de la jambe; les pattes-mâchoires sont brunes à tarse jaune. Tous les yeux blancs.

Deux femelles de Paltaypampa.

Chirothecia crassipes n. sp. Fig. 3 et 4.

Brunnea; area oculari pilis griseis vestita, linea alba

postice marginata; abdomine squammulis perlaceo-micantibus asperso; pedibus flavis linea nigra longitudinali notatis; anticis incrassatis brunneis. Long. ♂ 3, 5; ♀ 4 mill.

♀ Le céphalothorax est beaucoup plus élevé que dans l'espèce précédente, à tête plus longue et un peu plus large en arrière qu'au devant, parfaitement plane en dessus; la face dorsale de la partie thoracique beaucoup plus oblique que dans l'espèce citée.

La disposition des yeux tout à fait comme dans le *Ch. cheliferoïdes*. L'abdomen est beaucoup plus long et plus gros que le céphalothorax, ovoïde, légèrement élargi dans la partie postérieure.

La patte antérieure plus robuste, à radial plus renflé et par conséquent plus court que dans l'espèce précédente.

Coloration. La couleur générale du corps est brune foncée; la plaque interoculaire est couverte en entier de duvet gris-olivâtre et bordée en arrière d'une ligne blanche assez prononcée; il y a aussi quelques duvets blancs près des yeux latéraux, mais sans former de ligne continue; le bas même du céphalothorax est entouré d'une bordure blanche argentée;—le dos de l'abdomen est garni d'écailles blanches perlées à reflet irrisé très splendide, qui à cause d'endommagement ne présentent aucun dessin et sont insuffisants à indiquer si le fond en était complètement couvert ou non. Le ventre est brun avec une grande tache de couleur chair près de la naissance, et une autre à la base des filières, avec des écailles comme sur la face dorsale. Les pattes sont jaunes pâles avec une ligne noire le long de la face antérieure de la cuisse et de la jambe; les antérieures sont brunes foncées, variées de duvet blanc aux articulations

et la brosse noire au radial; le dernier article du tarse est jaune. Les pattes-mâchoires sont brunes à tarse jaune. Tous les yeux noirs.

Une autre femelle est beaucoup plus pâle sur l'abdomen qui est de couleur chair, avec une grande tache brunâtre dans sa partie antérieure.

♂ Le mâle diffère principalement par l'abdomen beaucoup plus court, presque aussi long et aussi large que le céphalothorax; la patte antérieure est plus longue que dans la femelle, plus robuste, à cuisse plus épaisse, le tibial plus long, la brosse plus fournie avec des épines plus grosses, courbées vers l'extérieur au sommet même. Les mandibules sont longues, horizontales, écartées, à crochet long, mince, légèrement recourbé au milieu.

La coloration comme dans la femelle.

Deux femelles et un mâle de Paltaypampa.

Chirothecia Wrzesniowskii n. sp. Fig. 5 et 6.

Cephalothorace rufo squammulis auratis vestito alboque circumscripto, abdomine supra viridi-aurato; pedibus flavis, parte incrassata primi paris brunnea.

Long tota 3 mill.

♀ Le céphalothorax est à peu près deux fois plus long que large, bas et plat; la tête presque aussi longue que le thorax, un peu plus large en arrière que par devant; la face dorsale de la partie thoracique plane comme dans le *Ch. cheliferoïdes*.

Les yeux de la deuxième ligne plus proches des antérieurs que des postérieurs, mais moins que dans l'espèce citée.

L'abdomen est un peu plus long et aussi large que le céphalothorax, subfusiforme.

Le renflement des pattes de la première paire est moins fort que dans les espèces précédentes, ainsi que dans celle de Cayenne, et par conséquent cette partie ressemble moins aux palpes des Chelifers; le bord interne de ce renflement est également garni d'un peigne en poils courts et roides, et armé de trois paires d'épines, mais qui sont beaucoup plus courtes que dans les autres espèces, et ne dépassent pas les poils du peigne; il y a aussi des épines au tarse comme dans les autres, mais moins longues.

Coloration. Le tégument du céphalothorax est d'un marron roussâtre, couvert au dos d'écaillés dorées métalliques à éclat assez fort et entouré d'une fine bordure blanche, qui passe sous les yeux latéraux et se prolonge sur le haut des côtés du thorax. Le dos de l'abdomen est foncé et garni d'écaillés vertes à éclat métallique assez fort; les côtés sont entourés d'une bordure blanche. Les pattes sont jaunes pâles, avec des anneaux bruns très fins sur toutes les articulations; la patte antérieure est légèrement rembrunie à la cuisse, et marron-roussâtre au renflement, dont la brosse est noire. Tous les yeux noirs.

Une femelle de Palmar.

Chirothecla? formicina n. sp.

Fusco-olivacea; capite supra squammulis virescentibus tecto, abdomine squammulis perlaceo micantibus ornato, linea alba mediana interrupta transfasciato; pedibus albis nigro variis.

Long. tota 3,4 mill.

♀ Le céphalothorax est moins allongé que dans les espèces précédentes, à tête parfaitement plane en dessus, ainsi que le devant du thorax.

Le carré oculaire est moins long que dans les autres, et les yeux de la deuxième ligne sont situés juste au milieu entre ceux des deux lignes environnantes.

L'abdomen est plus long et un peu plus gros que le céphalothorax, subcylindrique, un peu plus gros en arrière que par devant, et légèrement étranglé au milieu.

Les pattes sont grêles; le radial des pattes antérieures est renflé à la manière de celui des *Chirothecia*, mais moins fort; ce renflement est également garni sur son bord interne d'un peigne en poils serrés, mais sans épines.

Coloration. La couleur générale du tégument du corps entier est olive-foncée, plus foncée sur la plaque interoculaire qu'ailleurs; tout le dessus de la tête est garni d'un duvet verdâtre, et bordé d'une ligne blanchâtre, peu distincte. Au milieu de l'abdomen il y a une fine ligne blanche transversale, interrompue au milieu; sur toute la surface il y a quelques écailles perlées à éclat très fort, qui indiquent que cette parure y est fort répandue. Les pattes sont blanches, avec la cuisse dans toutes, et la jambe dans la première paire noires; dans la troisième et la quatrième il y a une longue ligne noire sur le côté dorsal de la jambe. Tous les yeux sont noirs.

Une femelle de Luchugal.

Cette curieuse forme ressemble par l'aplatissement du céphalothorax et par le renflement des pattes antérieures aux *Chirothecia*, tandis que d'autres caractères sont en contradiction avec la diagnose générique, et présentent beaucoup d'analogie avec les *Saltices*. C'est donc provisoirement que je la place dans le genre *Chirothecia*, en espérant que quand elle sera mieux connue, on lui trouvera un emplacement plus convenable.

Salticus Latr.

Salticus melanops Tacz.?

Horae Soc. Entomol. Rossic. T. VIII. p. 117.

Une femelle fournie de Monterico me paraît appartenir à cette forme, décrite d'après une femelle de Uassa. Ces deux individus se ressemblent dans tous les détails, excepté que celui du Pérou a un sillon transversal enfoncé derrière les yeux postérieurs, tandis que celui de la Guyane ne présente rien de pareil; au dos de l'abdomen il a aussi une impression transversale.

Les détails que je viens d'indiquer peuvent être d'une valeur importante, mais comme je ne possède pour la comparaison que des individus uniques, il est difficile de décider s'ils appartiennent à la même forme, ou à deux voisines.

Salticus ruficeps n. sp.

Brunneus, capite rufo, annullo abdominali albo dorsi attenuato et interrupto; pedibus flavis lineolis nigricantibus variis.

Long. tota ♂ 4, latit. abd. 0,8 } millim.
♀ 4,2 1,3 }

Le céphalothorax est allongé, à tête plate en dessus et presque carrée; le thorax aussi large que la tête se rétrécissant doucement en arrière; immédiatement derrière les yeux postérieurs il y a un enfoncement large et assez profond.

Le carré oculaire est presque régulier; le sommet des yeux antérieurs en ligne droite; les médians un peu plus avancés; la distance entre les postérieurs égale à celle

des antérieurs latéraux; les yeux de la deuxième ligne se trouvent au milieu entre les deux autres lignes, et sont un peu plus proches entre eux que les autres.

L'abdomen est ovoïde, un peu plus long que le céphalothorax et plus gros dans la femelle; dans le mâle il est plus mince et distinctement étranglé au milieu.

Les pattes sont fines et assez longues; dans le mâle la cuisse des antérieures est beaucoup plus épaisse que les autres.

Les mandibules sont courtes, larges et verticales dans les deux sexes.

L'organe copulateur du mâle est cordiforme, peu allongé, à grosse vessie en dessous.

Coloration. La couleur générale est égale dans les deux sexes, elle est brune foncée sur tout le corps; la plaque interoculaire et les côtés de la tête rouges foncées, cette couleur se prolonge en arrière en une grosse tache d'un roux beaucoup plus clair, occupant une grande partie du dos du thorax. Au milieu de l'abdomen se trouve un anneau blanc, large en dessous et croisé au milieu d'une ligne fusiforme, l'anneau même se rétrécit brusquement sur les côtés et devient très subtil au dos en s'interrompant au milieu même. Dans le mâle au lieu de cet anneau il n'y a qu'une fine raie transversale sur chacun des côtés, tandis que le ventre est tout foncé. Les pattes sont jaunes pales à cuisse brune et une figure pareille le long de tous les autres articles; dans les pattes de la deuxième paire la cuisse est jaune et n'a qu'une ligne brune sur le côté interne. Tous les yeux sont blancs verdâtres.

Deux mâles et une femelle d'Amable-Maria.

Salticus discicollis n. sp.

Fusco brunneus, disco oculari et thoracico nigro, pilis albis asperso; abdomine antice pilis albis vestito, ventre pallido; pedibus brunneis flavido variis. Long. tot. ♂ et ♀ 4 mill.

♀ Le céphalothorax de cette saltice est allongé, à tête aussi longue que large, presque plane au dos et un peu plus élevée que le thorax, dont le dos, dans sa partie antérieure, est en disque sémicirculaire, parfaitement plane, bien distinct de sa partie postérieure, qui s'abaisse brusquement et se rétrécit considérablement en arrière; les cotés sont parfaitement verticaux.

Le carré oculaire est régulier, le sommet des yeux antérieurs est en ligne droite; les yeux de la deuxième ligne situés juste au milieu entre les deux lignes environnantes; les yeux de la 2-e, 3-e et 4-e paires également éloignés entre eux.

L'abdomen est un peu plus long et un peu plus large que le céphalothorax, ovoïde, c'est à dire un peu plus élargi dans sa partie postérieure.

Les pattes sont moins longues et plus robustes que dans les autres espèces.

Les mandibules larges, courtes et verticales.

♀ Le mâle se distingue seulement par l'abdomen un peu plus court et moins large.

L'organe copulateur est volumineux et très compliqué, placé dans la moitié de la longueur du dernier article de la patte mâchoire, et se compose d'un pédoncule lamelliforme recourbé sur le coté, partant une large coupule, munie de deux tubercules; dont l'un sert de base à une longue épine.

Coloration. La couleur générale dans les deux sexes est brune foncée; le dos de la tête et de la partie horizontale du thorax est noir garni d'un duvet blanchâtre. L'abdomen est aussi couvert en dessus jusqu'à la moitié de la longueur d'un duvet pareil; le ventre est blanchâtre. Les pattes de la femelle sont brunes, à coxe et tarse jaunes; dans le mâle la jambe des pattes antérieures est jaune, avec une longue ligne brune; la patte mâchoire est brune foncée, à partie génitale jaune et l'épine brune. Les yeux blanchâtres.

Un mâle et une femelle d'Amable-Maria.

Janus Koch.

Janus mutillaeformis n. sp.

J. obscuro simillimus, niger annulo albo abdominali ornatus; pedum duo paria antica flava tibiis obscuris, pedes postici obscuri tarsis flavis.

Long. tota 5, cephaloth. 2, 3, abdominis 2, 7 mill.

♂ Cette saltice, dont un seul mâle m'a été fourni d'Amable-Maria, est très voisine de *J. obscurus* de Cayenne, décrite aussi d'après un mâle unique. Elle diffère cependant dans plusieurs détails, et principalement dans la forme du céphalothorax, dont la face dorsale de la tête est moins élevée au dessus du dos de la partie thoracique; le thorax est un peu plus large, et même il dépasse un peu en largeur la tête; l'abdomen est beaucoup plus gros que le céphalothorax.

La disposition des yeux est semblable, et ne différant qu'en ce que le carré oculaire est un peu plus long et moins large dans cette forme péruvienne; le milieu des

côtés du carré est moins enfoncé. L'organe copulateur est comme dans le *J. obscurus*, allongé et pourvu d'une pareille brosse, et à peu près comme celui de *J. Wankowiczi*.

Coloration. Elle se distingue principalement de l'espèce citée par une teinte noire uniforme surtout le corps; il y a aussi un demi anneau au milieu de l'abdomen. Les deux paires des pattes antérieures sont jaunes pâles, à jambe brune et une pareille ligne le long du côté externe de la cuisse dans la patte de la première paire; les deux paires postérieures sont brunes à tarse jaune. Les filières sont jaunes; les pattes mâchoires et les parties de la bouche brunes. Tous les yeux sont clairs à éclat verdâtre.

Famille des Dinopoides.

JELSKIA Tacz.

Jelskia unicolor Tacz.

Horae. Societ. Entomol. Rossic. T. VIII. p 131.

Trois femelles et deux mâles d'Amable-Maria.

Un de ces mâles a les pattes variées de larges anneaux noirs, dont deux complets se trouvent sur la jambe et deux incomplets sur la cuisse; il y a 5 taches brunes au dos de l'abdomen; le duvet de la plaque interoculaire est d'un jaune moins intense que dans les individus de Cayenne et dans les autres peruvien.

Jelskia robusta n. sp.

Nigra, pedibus, mandibulis apice ventroque flavis, oculis rubro alboque circumscriptis. Long. 5 mill.

♂ Le céphalothorax est plus robuste que dans les autres espèces connues; en arrière des yeux postérieurs se trouve une impression profonde et étroite, du milieu de la quelle part une autre impression linéaire profonde, dans le sens de la longueur du thorax.

La disposition des yeux est comme dans la *J. unicolor*.

L'abdomen est fisiforme, un peu plus long que le céphalothorax, et à peu près deux fois moins large.

Les pattes sont longues, subégales; la différence entre l'épaisseur des antérieures avec les autres est très peu sensible, toutes sont garnies de longues épines très délicates.

Coloration. Tout le corps et les pattes mâchoires sont d'un noir intense poli, excepté le ventre, une grande tache au centre du sternum, les mâchoires et les extrémités des mandibules et des pattes mâchoires qui sont jaunes pales; toutes les pattes sont jaunes de paille. Les yeux antérieurs sont entourés d'un cercle en duvet miniacé, les autres en duvet blanc parmi lequel il y a aussi des taches rouges. Les yeux sont blancs jaunâtres.

Mâle unique d'Amable-Maria.



Изданіе Императорскаго Московск. Общества Испытателей Природы.

Москва. 1879. Въ Университетскоѣ типографіи (М. Катковѣ),
на Страстномъ бульварѣ.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.




Fig. 8.



Fig. 1. *Chirothecia cheliferoides*. Fig. 2. 1 re patte de la *Chirothecia cheliferoides*.
Fig. 3. *Chirothecia crassipes* ♂. Fig. 4. 1 re patte de la *Chirothecia crassipes*.
Fig. 5. *Chirothecia Wrzesniewskii* Fig. 6. *Chirothecia Wrzesniewskii*.
Fig. 7. 1 re patte de la *Chirothecia clavimana*. ♀ Fig. 8. *Marpissa Lubomirskii*.

Chromolith. W. Bachmann, Moskau.

