



Nr. inw.

~~13/A~~

Szafa:

1

Półka:

7





CAROLI A LINNE  
SPECIES PLANTARUM

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS

AD

GENERA RELATAS

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS, NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS, LOCIS NATALIBUS

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE.

DIGESTAS.

EDITIO QUARTA, POST REICHARDIANAM QUINTA  
ADJECTIS VEGETABILIBUS HUCUSQUE COGNITIS

CURANTE

CAROLO LUDOVICO WILLDENOW.

---

*Tomus III.*

---

BEROLINI.

IMPENSIS G. C. NAUK.

1800.



Aromatischen Balsam entathmen die Pflanzen der Hügel,  
Duftende Calamintha, der blaue Salbey, der Thymus  
Und die Melisse sind Bienen auf sonnigten Bergen ein Labfal,  
Wo sich der Rosmarin vermählt mit hohem Lavendel;  
Jenen Blüten entwenden sie Narbonensischen Honig  
Und den fernherathmenden Nectar Hymettòs und Hybla's.  
Doch wer kennet sie alle die Kräfte der heilsamen Pflanzen,  
Oft vergessene Kunde der sorgsamforschenden Vorzeit,  
Oder nach Säklen, Erfindung der Dioscoriden der Nachwelt?

-BARON VON DER LÜHE.



~~1314~~  
756

SPECIES PLANTARUM.

---

*Tomus III. Pars I.*

SPICER'S NATURAL



*Classis XIV.*

**D I D Y N A M I A.**

**G Y M N O S P E R M I A.**

\* *Calyces subquinquefidi.*

1103. PERILLA. *Styli duo. Stam. distantia.*  
1105. GLECHOMA. *Antherarum paria cruciata!*  
1096. HYSOPUS. *Filam. distantia, recta! Cor. ringens, labio inferiore tripartito subcrenato.*  
1098. ELSHOLTZIA. *Filam. distantia recta! Cor. ringens, labio inferiore indiviso.*  
1101. BYSTROPOGON. *Filam. distantia recta! Cor. ringens, labio inferiore trilobo.*  
1102. MENTHA. *Filam. distantia recta. Cor. subaequalis.*  
1104. HYPTIS. *Filam. declinata! Cor. ringens, labio sup. bifido, inferiore trifido, lacinia media concava.*  
1100. SIDERITIS. *Stigma alterum vaginans alterum!*  
1199. LAVANDULA. *Corolla resupinata!*  
1093. TEUCRIUM. *Cor. labium superius nullum, sed fissura loco labii.*  
1092. AJUGA. *Cor. lab. superius staminibus brevius!*  
1113. PHLOMIS. *Cor. lab. superius hirtum compressum!*  
1112. LEONURUS. *Cor. labium superius erectum indivisum planum. Stamina fauce longiora.*  
1108. BETONICA. *Cor. lab. superius planum, adscendens, tubo cylindrico. Stam. longitudine faucis.*  
1106. LAMIUM. *Cor. lab. inferius utrinque dente setaceo!*  
1107. GALEOPSIS. *Cor. lab. inferius supra bidentatum!*  
1109. STACHYS. *Cor. lab. inferius lateribus reflexum. Stam. deflorata ad latera deflexa.*  
1097. NEPETA. *Cor. lab. inferius crenatum. Faux margine reflexo.*  
1094. SATUREJA. *Corolla laciniis subaequalibus. Stam. remota.*  
1110. BALLOTA. *Cal. 10-fstriatus. Cor. labium superius fornicatum.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

A

- III. MARRUBIUM. *Cal.* 10-friatus. *Cor.* lab. superius rectum.
- III4. MOLUCCELLA. *Cal.* campanulatus, corolla amplior, dentibus spinosis.
- † *Verbenae species aliquot. Monarda didyma.*  
 \* \* *Calyces bilabiati.*
- II24. SCUTELLARIA. *Cal.* fructiferus operculatus.
- III7. THYMUS. *Cal.* fauce villis clausus!
- II22. PLECTRANTHUS. *Cor.* resupinata basi sursum calcarata! *Filamenta* subulata.
- II21. OCIMUM. *Cor.* resupinata basi nuda! *Filamenta* bina basi processu!
- II25. PRUNELLA. *Filamenta* omnia apice bifurca!
- II26. CLEONIA. *Stigmata* 4!
- II23. TRICHOSTEMA. *Filamenta* longissima!
- III9. DRACOCEPHALUM. *Corollae* faux inflato-dilatata!
- III6. ORIGANUM. *Strobilus* calyces colligens!
- III5. CLINOPODIUM. *Involucrum* calyces colligens.
- IO95. THYMBRA. *Calyx* utrinque linea ciliata carinatus. *Stylus* femibifidus. *Cor.* labia plana.
- II20. MELITTIS. *Cal.* tubo corolla amplior. *Corollae* lab. inperius planum, integrum. *Antherae* cruciatae.
- III8. MELISSA. *Cal.* angulatus scariosus, labio superiore adscendente.
- II27. PRASIMUM. *Semina* baccata!
- II28. PHRYMA. *Semen.* unicum! *Cor.* ringens.
- II29. SELAGO. *Semen* unicum! *Corollae* limbo quinquefido inaequali.

## A N G I O S P E R M I A.

\* *Calyces indivisi.*

- II85. AEGINETIA. *Caps.* multilocularis. *Cor.* campanulata. *Calyx* indivisus spathaceus.
- II61. TANAECIUM. *Bacca* corticola. *Cor.* tubulosa, subaequalis. *Calyx* tubulosus truncatus.

\* \* *Calyces bifidi.*

- II84. OBOLARIA. *Caps.* 1-locularis. *Cor.* campanulata, 4-fida. *Filam.* ex divisis corollae.

1186. OROBANCHE. *Capsf.* 1-locularis. *Cor.* subaequalis, 4-fida. *Glandula* sub basi germinis.
1172. HEBENSTREITIA. *Capsf.* 2-sperma. *Cor.* 1-labiata, 4-fida. *Stam.* margini laterali corollae inserta.
1149. TORENIA. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* perforata. *Filam.* duo, bifida.
1205. CASTILLEJA. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* bilabiata labio inferiore brevissimo. *Cal.* unilabiatus bidentatus.
1211. ACANTHUS. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* 1-labiata, 3-fida. *Antherae* villosae.
1164. PREMNA. *Drupa* 1 sperma, nuce 4-loculari. *Cor.* 4-fida inaequalis.
1160. CRESCENTIA. *Bacca* 1-locularis corticosa. *Cor.* tubo campanulata. *Germen* pedicellatum.

\* \* \* *Calyces trifidi.*

1159. HALLERIA. *Bacca* 2-locul. *Cor.* 4-fida: labio superiore longiore.

\* \* \* \* *Calyces quadrifidi.*

1189. LIPPIA. *Capsula* 2-sperma, 2-locularis. *Cor.* hypocraterif. *Cal.* compressus.
1134. LATHRAEA. *Capsf.* 1-locularis. *Cor.* perforata. *Glandula* sub germine.
1130. BARTSIA. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* perforata. *Cal.* colorator.
1132. EUPHRASIA. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* perforata. *Antherae* inferiores hinc spinosae.
1131. RHINANTHUS. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* perforata. *Capsf.* compressa.
1133. MELAMPYRUM. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* perforata. *Sem.* bina, gibbosa.
1135. SCHWALBEA. *Capsf.* 2-locularis? *Cor.* perforata. *Cal.* lacinae superiores sensim minores.
1196. BARLERIA. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* infundibul. *Sem.* bina. *Capsf.* elastica.
1168. LOESELIA. *Capsf.* 3-locular. *Cor.* laciniis secundis. *Stam.* petalo adversa.
1162. GMELINA. *Drupa* nuce 2-locul. *Cor.* bilabiata. *Antherae* binae crassiores bipartitae.
1165. LANTANA. *Drupa* nuce 2-locul. *Cor.* hypocraterif. *Stigma* uncinatum.

\* \* \* \* \* *Calyces quinquefidi.*

1209. AVICENNIA. *Capsf.* 1-locularis, coriacea. *Cor.* labio superiore quadrato. *Sem.* unicum.
1136. TOZZIA. *Capsf.* 1-locul. *Cor.* hypocraterif. *Sem.* unicum.
1179. PHAYLOPSIS. *Capsula* 1-locularis. *Cor.* ringens labio superiore minimo. *Semina* quatuor.
1178. LIMOSELLA. *Capsf.* 1-locul. *Cor.* campan. regular. *Sem.* plurima.
1175. BROWALLIA. *Capsf.* 1-locul. *Cor.* hypocraterif. *Sem.* numerosa.
1151. BRUNFELSIA. *Capsf.* 1-locul. baccata. *Cor.* infundibuliformis.
1193. HOLMSKIOLDIA. *Capsf.* 1-locul.? *Cor.* ringens. *Calyx* ampliatus.
1170. LINDERNIA. *Capsf.* 1-locular. *Cor.* ringens. *Stam.* inferiora dente terminali.
1182. CONOBEA. *Capsf.* 1-locularis. *Cor.* ringens. *Stylus* pilosus.
1210. COLUMNEA. *Capsf.* 1-locularis. *Cor.* ringens supra basin gibba. *Antherae* connexae.
1180. VANDELLIA. *Capsf.* 1-locul. *Cor.* ringens. *Stam.* inferiora disco labii enata.
1181. RUSSELLIA. *Capsf.* 1-locularis. *Cor.* bilabiata.
1213. ALECTRA. *Capsf.* 2-locularis didyma. *Cor.* infundibuliformis. *Filamenta* barbata. *Semina* solitaria.
1143. GESNERIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* supera incurva.
1141. CYRILLA. *Capsula* 2-locularis. *Cor.* supera declinata. *Rudimentum* filamenti quinti.
1152. SCROPHULARIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* refupinata *Lab.* segmento intermedio interno.
1183. STEMODIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* inaequalis. *Stam.* bifida. *Antherae* geminae.
1190. ACHIMENES. *Capsf.* 2-locularis. *Corolla* subaequalis 4-fida. *Antherae* connexae.
1153. CELSIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* rotata. *Filamenta* lanata.
1154. HEMIMERIS. *Capsf.* 2-locular. *Cor.* rotata ringens.
1177. SIBTHORPIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* rotata. *Stam.* 2 et 2 approximata.
1169. CAPRARIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* campanulata. *Stigm.* cordatum bivalve.

1155. DIGITALIS. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* campan. subtus ventricosa. *Stam.* declinata.
1157. BIGNONIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* campanulata. *Sem.* alata, imbricata. *Rudimentum* filamenti 5.
1156. INCARVILLEA. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Semina* alata. *Rudimentum* filamenti 5-nullum.
1195. RUELLIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* camp. *Stam.* per paria approximata.
1174. BUCHNERA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* hypocrate-  
rif. *Limbi* laciniis obcordatis aequalibus.
1173. ERINUS. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* bilabiata: labio superiore brevissimo reflexo.
1163. PETREA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* rotata, calyce colorato minor. *Sem.* solitaria.
1171. MANULEA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* limbus 5-partitus: lacinia infima profundiore reflexa.
1144. ANTIRRHINUM. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* perforata, subtus Nectario prominente.
1145. ANARRHINUM. *Capsf.* 2-locularis multivalvis. *Cor.* bilabiata fauce pervia!
1138. GERARDIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* hypocrat. inaequal. *Capsf.* basi dehiscens.
1137. PEDICULARIS. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* perforata. *Sem.* tunicata.
1194. MIMULUS. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* perforata. *Cal.* prismaticus.
1138. DODARTIA. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* perforata: labio superiori brevi adscendente.
1139. CHELONE. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* perforata, inflata, clausa. *Rudiment.* filamenti quinti glabrum.
1140. PENTSTEMON. *Capsf.* 2-locularis. *Cor.* bilabiata ventricosa. *Rudimentum* filamenti quinti barbatum.
1191. SESAMUM. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* campan. inaequal. *Rudim.* filam. quinti.
1142. GLOXINIA. *Capsf.* semibilocularis. *Cor.* campanulata. *Rudiment.* quinti filamentum cum reliquis receptaculo insertum.
1147. TOURRETTIA. *Capsf.* 4-locularis hamata. *Cor.* unilabiata.
1148. MARTYNIA. *Capsf.* 4-locul. *Cor.* campanulata. *Rudiment.* filam. quinti.

1204. MAURANDIA. *Capsulae* 2 coalitae apice semiquinquevalves. *Cor.* campanulata inaequalis. *Filamenta* basi callosa.
1200. MALLINGTONIA. *Siliqua?* *Corolla* regularis quadrifida. *Antherae* deformes!
1192. TORTULA. *Nuces* 2, biloculares externae rugosae. *Corollae* tubus spiralis!
1214. PEDALIUM. *Nux* bilocularis.
1176. LINNAEA. *Bacca* 3-locularis, sicca. *Cor.* campan. *Cal.* superus!
1167. CORNUTIA. *Bacca* 1-sperma. *Cor.* ringens. *Stylus* longissimus.
1199. OVIEDA. *Bacca* 4-sperma. *Cor.* longissima: limbo 3-fido. *Cal.* fructiferus campanulatus.
1207. AMASONIA. *Bacca* 4-sperma. *Corolla* subaequalis.
1150. BESLERIA. *Bacca* polysperma unilocularis. *Cor.* inaequalis.
1208. BONTIA. *Drupa* monosperma. *Corollae* labium inferius revolutum. *Sem.* plicatum,
1166. SPIELMANNIA. *Drupa* monosperma, nuce 2-loculari. *Cor.* hypocrateriformis.
1206. VITEX. *Drupa* monosperma, nuce 4-loculari. *Cor.* ringens, labio superiore 3-fido.
1198. MYOPORUM. *Drupa* disperma, nuce 2-loculari. *Cor.* campanulata subaequalis.
1158. CITHAREXYLON. *Drupa* disperma, nuce 2-loculari. *Cor.* infundibuliformis subaequalis.
1201. VOLKAMERIA. *Drupa* disperma, nuce 2-loculari. *Cor.* hypocrateriformis laciniis secundis.
1202. CLERODENDRON. *Drupa* tetrasperma, nuce uniloculari. *Cor.* bilabiata.
1197. DURANTA. *Drupa* tetrasperma, nuce 2-loculari. *Cor.* subaequalis tubo curvo.

† *Gratiola Monnieria.*

\* \* \* \* \* *Calyces multifidi.*

1187. HYOBANCHE. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* unilabiata. *Cal.* heptaphyllus.
1212. LEPIDAGATHIS. *Capsf.* 2-locul. *Cor.* bilabiata. *Cal.* 2-polyphyllus imbricatus.

1146. CYMBARIA. *Caps.* 2-locul. *Cor.* ringens. *Cal.* 10-dentatus.
1203. THUNBERGIA. *Caps.* 2-locul. *Cor.* campanulata. *Cal.* duplex, exterior diphyllus, interior 12-dentatus.

\* \* \* \* \*

*Polypetali.*

1215. MELIANTHUS. *Caps.* 4-locul. 4-loba. *Cor.* 4-petala, labium inferius constituens.

## G Y M N O S P E R M I A.

1092. A J U G A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 959.**Corolla* labium superius minimum bidentatum.*Stamina* labio superiore longiora.\* *Bugulae.*1. A J U G A *orientalis.*

A. foliis ovatis, corollis pubescentibus resupinatis. W.

A. floribus resupinatis. *Sp. pl.* 785. *Fabric. helmst.* 79.  
*Kniph. cent.* 3. n. 4. *Sabbat. hort.* 3. t. 100. *Thunb.*  
*jap.* 243.A. foliis ovatis, corollis obliquis. *Schreb. unilab.* p. 22.  
*Bugula. Mill. dict.* n. 5.*Tencrium* staminibus tubo corollae brevioribus. *Roy.*  
*lugdb.* 306.*Bugula orientalis villosa*, flore inverso candido cum oris  
purpureis. *Tournef. cor.* 14.β. *Bugula orientalis villosa*, flore inverso caeruleo: alba  
macula notato. *Tournef. cor.* 14. *Dill. elth.* 60. t.  
53. f. 61.*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 382.*Morgenländischer Ginfel.* W.*Habitat in Oriente.* 2 (v. v.)\*2. A J U G A *decumbens.*A. *decumbens villosa*, foliis ovatis dentatis. *Thunb.*  
*jap.* 243.*Liegender Ginfel.* W.*Habitat ad viarum margines et ad muros Japoniae.* 2Caulis herbaei plures simplices vel parum ramosi  
decumbentes apicibus erectis, ut tota planta, villosi  
inaequales palmares. Folia radicalia plura et majora,  
omnia petiolata obovata dentata semipollicaria. Flo-  
res verticillati minuti coerulei, corollis ringentibus  
non resupinatis. *Thunb. l. c.*3. A J U G A *pyramidalis.*A. *tetragono-pyramidalis villosa*, foliis radicalibus ma-  
ximis. *Flor. succ.* 475, 512.\* *Mat. med.* 143. *Da-*  
*lib. parif.* 169. *Oed. dan.* 185. *Gunn. norv. n.* 343.



*Retz. obs. 2. p. 19. Ludw. ect. t. 8. Hoffm. germ. 199. Roth. germ. I. 251. II. 17.*

*Bugula foliis obtuse dentatis, caule simplici. Mill. dict. n. 2.*

*Consolida media pratensis caerulea. Bauh. pin. 260. non synon.*

*Phyllochnois. Renal. spec. 125.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 383.*

*Pyramidalischer Ginfel. W.*

*Habitat in Suecia, Helvetia, Germania. ♂ (v. v.)*

#### 4. AJUGA alpina.

*A. caule simplici, foliis caulinis radicalia aequantibus.*

*Mant. 80. Gunn. norv. n. 1099. Gmel. tub. 175.*

*Hoffm. germ. 200. Roth. germ. I. 251. II. 17.*

*Bugula foliis oblongo-ovatis, caulibus decumbentibus, verticillis distantibus. Mill. dict. n. 2.*

*Bugula folio maximo, flore pallide coeruleo. Boerh. lugdb. I. p. 184.*

*Bugula alpina maxima. Tournef. inst. 209.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 384.*

*Alpen-Ginfel. W.*

*Habitat in alpibus Helveticis, Austriacis. Tubingae. 2 (v. 1.)*

*Differt a praecedente. Foliis radicalibus vix reliquis majoribus; Floribus utrinque 10; nec 3; iisque saturate coeruleis, nec albis; Bracteis viridibus nec coloratis.*

*Distinctissima ab A. pyramidali.*

#### 5. AJUGA genevensis.

*A. foliis radicalibus caulinis minoribus. W.*

*A. foliis tomentosis, lineatis, calycibus hirsutis. Sp.*

*pl. 785. Scop. carn. n. 717. Mill. dict. n. 4. sub Bugula.*

*Hoffm. germ. 200. Roth. germ. I. 251. II. 18.*

*A. pyramidalis. Pollich. pal. n. 542.*

*Bugula foliis angulosis hirsutis, calycibus villosis. Hall. helv. n. 283.*

*Teucrium (pyramidale) foliis angulose dentatis, caule simplici. Crantz. austr. p. 252. A. genevensem et pyramidalem conjungit. R.*

*Bugula montana. Riv. monop. t. 140. f. 2. R.*

*Consolida media genevensis. Bauh. hist. 3. p. 432. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 384.*

*Kleiner Ginfel. W.*

*Habitat in Europae pratis editioribus, collibus. 4*  
(v. v.)

*Creditur varietas A. pyramidalis Gerardo, A. reptantis Hallero.*

*Ajugam pyramidalem, alpinam et genevensem, tanquam varietates jungit Schreberus sub nomine:*

*A. pyramidalis caulibus simplicibus erectis, foliis oblongis dentatis. Schreb. pl. vert. unil. p. 23. Differunt tamen in eo inter se, ut A. pyramidalis sint Folia infima maxima; A. genevensis Folia infima angustiora. floralia plerumque triloba; A. alpinae Folia infima angustiora, floralia integra. Schreb. l. c. R.*

*Est forte varietas A. pyramidalis, sed in nostris regionibus faciem constanter servat. Variat corollis coeruleis, incarnatis, atque albis. W.*

#### 6. AJUGA reptans.

*A. stolonibus reptantibus. Sp. pl. 785. Crantz. austr. p. 251. sub Teucrio. Scop. cam. n. 716. Pollich. pal. n. 543. Blackw. t. 64. f. 1. Kniph. cent. 3. n. 6. Kuorr. delic. 2. t. A. 8. Hoffm. germ. 200. Roth. germ. I. 251. II. 18.*

*A. foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. Gort. gelr. 330.*

*A. caule simplici erecto stolonibus repentibus, foliis ovatis crenatis. Schreb. unilab. 22.*

*Bugula flagellifera, foliis ovatis dentatis, Hall. helv. n. 282.*

*Teucrium foliis obverse ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. Hort. cliff. 301. Roy. lugdb. 306. Dalib. parif. 170.*

*Consolida media pratensis coerulea. Bauh. pin. 260.*

*Bugula. Dod. pempt. 135. Riv. t. 75.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 385.*

*Kriechender Ginſel. W.*

*Habitat in Europa australiori. 4 (v. v.)*

\* \* *Chamaepites.*

#### 7. AJUGA Chamaepitys.

*A. foliis trifidis, floribus axillaribus solitariis folio brevioribus, caule diffusio. Schreb. unilab. 24. Roth. germ. I. 252. II. 19.*

*Teucrium (Chamaepitys) foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis caule*

diffuso. *Sp. pl.* 787. *Hort. ups.* 160. *Mat. med.* 143.  
*Crantz. austr.* p. 249. *Grimm. isen. in nov. A. N. C.*  
*tom. 3. app. p.* 334. *Pollich. palat. n.* 545. *Kniph.*  
*cent. 8. n.* 92. *Blackw. t.* 528. *Ludw. ectyp.* 130.  
*Fl. dan. t.* 733. *Hoffm. germ.* 200.

*Teucrium foliis simpliciter trifidis.* *Hort. cliff.* 301.  
*Roy. lugdb.* 306. *Guett. stamp. 2. p.* 248. *Gron.*  
*virg.* 64. *Dalib. paris.* 173. *Sauv. monsp.* 175.

*Bugula foliis imis linearibus caulinis tripartitis.* *Hall.*  
*helv. n.* 284.

*Bugula Chamaepitys.* *Scop. carn. n.* 718.

*Ajuga five Chamaepitys mas.* *Lob. ic.* 382.

*Chamaepitys vulgaris odorata, flore luteo.* *Bauh. hist.*  
*3. p.* 295.

*Chamaepitys lutea vulgaris folio trifido.* *Bauh. pin.* 249.

*Chamaepitys prima.* *Dod. pempt.* 46. *Rivin. t.* 24.

β. *Chamaepitys vulgaris folio trifido, flore roseo lusitanica.*  
*Tournef. inst.* 208. *excluso synonymo.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 388.

Acker - Ginfel. W.

*Habitat in agris arenosæ-lutosæ lapidosæ Italiae, Gal-*  
*liae, Angliae, Germaniae, Helvetiae, Hungariae,*  
*Orientis, Barbariae et Virginiae.* ☉ (v. v.)

*Calycis dentes inermes. Pedunculi non raro floribus*  
*marcescentibus elongantur.* *Gouan. illustr.* 35.

### \*8. AJUGA chia.

A. foliis trifidis, floribus axillaribus solitariis folio lon-  
 gioribus, caule diffuso. *Schreb. unilab. p.* 25.

*Chamaepitys chia, folio trifido, magno flore.* *Tournef.*  
*cor.* 14.

Griechischer Ginfel. W.

*Habitat in insula Chio.* ☉ (v. f.)

*Simillima priori est et pariter pilosa, sed tenuior*  
*strictiorque. Flos multoties major, folium sibi sub-*  
*jectum longitudine excedit. Corolla lutea, labii crena*  
*profundiore.* *Schreb. l. c.*

*Specimen meum praecedenti simile, sed magis pilo-*  
*sum, folia breviora et parum latiora et obtusiora, co-*  
*rolla triplo major.* W.

### 9. AJUGA Iva.

A. foliis linearibus antice dentatis, floribus axillaribus  
 solitariis. *Schreb. unilab. p.* 25.

*Teucrium (Iva) foliis subtricuspidatis linearibus, flori-*

bus sessilibus lateralibus solitariis. *Sp. pl.* 787. *Mill. dict. n. I.* *Allion. pedem. n.* 147. *Desfont. atl. 2. p.* 3.\* *Vahl. symb. I. p.* 40.\*

*Teucrium (Iva) foliis sublancoelatis utrinque bidentatis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. Cavan. ic. 2. p. 18. t. 120.\**

*Teucrium (Iva) villosum, foliis ligulatis bidentatis saepe etiam ferratis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. Lamarck. encycl. 2. p. 690.*

*Teucrium foliis lanceolatis obtusis dentatis, floribus solitariis sessilibus. Roy. lugdb. 306. Sauv. monsp. 141.*

*Molcharia asperifolia. Forsk. descr. 154.*

*Chamaepitys moschata foliis ferratis. Bauh. pin. 429. Tournef. inst. 108.*

*Chamaepitys live Iva moschata Monspeliensium. Bauh. hist. 3. p. 296. Moris. hist. 3. f. 11. p. 425. t. 22. f. 3.*

*Chamaepitys spuria prior. Dod. pempt. 47.*

*Anthylli altera. Clus. hist. 2. p. 186.*

*Anthyllis chamaepitys minor. Lob. ic. 384.*

β. *Ajuga (moschata) foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. Schreb. unilab. p. 26. Mill. dict. n. 13.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 391.*

*Bifam Ginfel. W.*

*Habitat in arenosis siccis Galliae australis, Hispaniae, Lusitaniae, Italiae, Siciliae et Africae borealis. ☉ (v. f.)*

10. *AJUGA salicifolia.*

α. *foliis lanceolato-ellipticis obtusiusculis integerrimis, calycibus solitariis quadrifidis. Schreb. unilab. p. 26.\**

*Teucrium salicifolium. Mant. 80. Schreb. dec. pl. I. p. 17. t. 9.*

*Chamaepitys orientalis salicis folio. Tournef. cor. 14.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 348.*

*Weidenblättriger Ginfel. W.*

*Habitat in Armenia. ♀ (v. f.)*

*Caules palmares diffusi teretiufculi, pubescentes basi fere perennantes. Folia opposita ovali-lanceolata obtusiuscula integerrima nuda, non nitida, erecta, nervosa, internodiis longiora. Flores oppositi brevissime pedunculati. Calyces tubulosi semiquadrifidi angusti. Corollae foliis triplo breviores absque labii superioris rudimento, absque dentibus lateralibus baseos.*

*Folia venosa, venis ad apicem excurrentibus. Co-*

rolla lutea, *ſtriis* quinque ſanguineis, labio ſuperiore breviffimo bidentato, inferiore tripartito, lacinia media obcordata. W.

## 1093. T E U C R I U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 960.*

*Corollae* labium ſuperius nullum ſed fiſſura ejus loco in qua *Stamina* jacent.

I. T E U C R I U M *campanulatum.*

T. foliis multifidis, floribus lateralibus ſolitariis. *Syſt. veg. 438. Mill. dict. n. 5.*

T. foliis multifidis, floribus oppoſitis. *Sp. pl. 786.*

T. foliis multifidis, floribus lateralibus ſolitariis, caule repente. *Schreb. unilab. p. 31, n. 19.\**

T. foliis cuneiformibus trifidis: laciniis diviſis, floribus ſolitariis. *Roy. lugdb. 306.*

T. calyce campanulato, laciniatum, flore parvo ſubcaeruleo. *Boerh. lugdb. I. p. 181.*

Iva moſchata flore albo. *Riv. monopet. t. 24.*

β. T. ſupinum perenne paluſtre apulum glabrum, foliis laciniatis, flore albo. *Till. piſ. 193. t. 49. f. 1. Al-lion. taur. 53.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 386.*

Glockenblütiger Gamander. W.

*Habitat in Orientis, Apuliae humentibus. 24 (v. v.)*

*Simillimum T. Botryi, ſed planta glabra. Radix perennis. Flores ſolitarii, Pedunculis flore brevioribus; Calyces campanulati, nec baſi gibbi; Corollae albo-margaritaceae, folio incumbentes. Caules ſeniores proſtrati, repentes. Folia bis trifida. Semina ſcabra.*

\*2. T E U C R I U M *laevigatum.*

T. foliis inferioribus multifidis, ſummis tripartitis, pedunculis ſolitariis longitudine foliorum. *Vahl. ſymb.*

*I. p. 40.*

Glatte Gamander. W.

*Habitat in Bonaria.*

*Herbaceum totum glaberrimum. Folia T. campanulati, ſuprema tripartita, laciniis integerrimis. Calyces campanulati quinqueſidi, laciniis lanceolatis, dorſo linea elevata. Vahl. l. c.*

3. TEUCRIUM *orientale*.

T. foliis multifidis linearibus, racemo composito, pedicellis brevioribus. *Schreb. unilab. p. 30. n. 17.*

T. foliis multifidis, floribus racemosis. *Sp. pl. 786.*

T. foliis pinnatifidis: laciniis linearibus: infimis divisis, floribus racemosis. *Hort. cliff. 301. Roy. lugdb. 307.*

T. orientale angustifolium laciniatum, flore magno subcaeruleo. *Tournef. cor. 14. Comm. rar. 25. t. 25. Riv. monop. t. 19.*

β. T. orientale angustifolium laciniatum magno flore suaverubente. *Tournef. cor. 14.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 351.*

Orientalischer Gamander. W.

*Habitat in Armeniae, Mediae glareosis. 2 (v. f.)*

\*4. TEUCRIUM *parviflorum*.

T. foliis multifidis linearibus, racemo decomposito, pedicellis elongatis divaricatis. *Schreb. unilab. 31. n. 18. cum icone.\**

T. orientale latifolium laciniatum flore parvo. *Tournef. cor. 24.*

Kleinblütiger Gamander. W.

*Habitat in Armenia. 2 (v. f.)*

*Simile praecedenti, foliis et inflorescentia, diversum vero: racemis magis elongatis, pedunculis longioribus et corollis vix calyce longioribus, quae in praecedente calyce multo majores.*

5. TEUCRIUM *Botrys*.

T. foliis multifidis, verticillis demidiatis. *Schreb. unilab. 32. n. 20. Hoffm. germ. 200.*

T. foliis multifidis, floribus axillaribus ternis pedunculatis. *Sp. pl. 786. Mill. dict. n. 6. Pollich. pal. n. 544. Scop. carn. n. 725. Kuiph. cent. 9. n. 88. Roth. germ. I. p. 250. II. 14.*

Chamaedrys foliis pinnatis, pinnis dentatis, trilobatis, verticillis paucifloris. *Hall. helv. n. 289.*

Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. *Hort. cliff. 301. Roy. lugdb. 306. Dalib. paris. 171. Sauv. monsp. 248.*

Chamaedrys laciniatis foliis. *Löb. hist. 209. ic. 385.*

*Tournef. inst. 205. Vaill. paris. 33. Mill. ic. 254.*

Iva moschata, folio multifido. *Liv. t. 14.*

*Botrys chamaedyroides.* Bauh. pin. 138.

*Chamaepitys altera.* Dod. pempt. 46.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 387.*

Halbwirtelblütiger Gamander. W.

*Habitat in Germaniae, Galliae, Helvetiae, Italiae apricis cultis.* ☉ (v. v.)

## 6. TEUCRIUM *nissolianum.*

*T. foliis trifidis quinquefidisque filiformibus, floribus pedunculatis solitariis oppositis, caule decumbente.* Sp. pl. 786. Mill. dict. n. 8.

*T. foliis quinquefidis trifidisque linearibus muticis, pedunculis solitariis brevissimis, caule decumbente.* Schreb. unilab. p. 29. n. 14.

*T. lupinum annuum lusitanicum, foliis laciniatis.* Tournef. inst. 208.

*Chamaedrys annua multiflora tenuifolia hispanica Tournefortii.* Moris. hist. 3. p. 423. f. II. t. 22. f. 19. mala.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 390.*

Nillolischer Gamander. W.

*Habitat in Hispania, Lusitania.* ☉ (v. l.)

*A. Morisone et Millero cum T. multifloro confunditur.* Schreb. l. c.

## \*7. TEUCRIUM *trifidum.*

*T. foliis lanceolatis trifidis, pedunculis axillaribus trifloris.* Retz. obs. 1. p. 21.\*

*T. (trifidum) caule quadrangulari incano hispido, foliis oppositis trifidis hispidis, pedunculis axillaribus trifloris.* Wendl. obs. 50.

Dreytheiliger Gamander. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* † (v. l.)

*Folia trifida superne hispido-scabra, subtus tenuissime tomentosa. Lacinae foliorum superiorum lineares integerrimae, inferiorum lanceolatae uno alterove dente dignatae. Pedunculi axillares triflori.* W.

## 8. TEUCRIUM *Pseudo-chamaepitys.*

*T. foliis tripartitis trifidis linearibus, floribus racemosis, caule hirsuto.* Syst. veg. 438. Ger. prov. 276. n. 3. Gou. hort. 271. illustr. 35.

*T. foliis tripartitis trifidis linearibus integerrimis, floribus pedunculatis solitariis oppositis, caule patulo.* Sp. pl. 787. Sabb. hort. 3. t. 93.

- T. foliis trifidis integrisque linearibus mucronatis, pedunculis solitariis elongatis, caule diffuso.* Schreb. *unilab.* 29. n. 15.
- T. supinum perenne, foliis laciniatis.* Tournef. *inst.* 208.
- Chamaepitys spuria, multifido folio, lamii flore.* Bauh. *pin.* 250. *Dod. pempt.* 47. *Morif. hist.* 3. f. II. p. 425. t. 21. f. 2.
- Pseudochamaepitys.* Clus. *hist.* 2. p. 185. *Lob. ic.* 385.
- Chamaepitys alia.* Cam. *epit.* 680.
- β. *T. (mauritanum) foliis pinnato-multifidis, caule simplicissimo erecto, bracteis subulato-palmatis.* Sp. *pl.* 787.
- T. (mauritanum) foliis multifidis linearibus, floralibus mucronatis, racemo simplici.* Schreb. *unilab.* 30. n. 16.\*
- Teucrium Pseudo-chamaepitys.* Desfont. *atl.* 2. p. 2.\*
- T. delphinii folio non ramosum.* Shaw. *afr.* 575. t. 575. *icon monstrofa.*
- Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 391. 392.
- Feinblättriger Gamander. W.
- Habitat in Hispaniae, Lusitaniae, Massiliae, Africae borealis locis sterilibus apricis.* 4 (v. l.)
- Calyces aristati.*
- T. mauritanum videtur sola hujus varietas. In T. Pseudo-chamaepite folia simpliciter trifida; in T. mauritano vero multifida.* W.
9. **TEUCRIUM fruticos.**
- T. foliis lanceolatis integerrimis subtus niveis, floribus solitariis,* Schreb. *unilab.* p. 26. n. 9.\*
- T. foliis integerrimis oblongo-ovatis, petiolis glabris subtus tomentosis, pedunculis unifloris.* Sp. *pl.* 787. *Desfont. atl.* 2. p. 3.\*
- T. foliis integerrimis ellipticis subtus tomentosis, floribus lateralibus solitariis pedunculatis.* *Syst. veg.* 438. *Mill. dict. n.* 3. *Kniph. cent.* I. n. 90. *Sabbat. hort.* 8. t. 96.
- T. fruticos baeticum.* *Dill. elth.* 379. t. 284. f. 366. *Clus. hist.* I. p. 348. *Barrel. rar.* 348. t. 512.
- T. foliis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, floribus solitariis pedunculatis.* *Hort. cliff.* 302. *Roy. lugdb.* 305.
- T. peregrinum, folio sinuoso.* Bauh. *pin.* 247.



β. *T. fruticans baeticum minore folio.* *Dill. elth.* 379. t. 284. f. 367.

*T. humilium et ramosius, foliis subrotundis.* *Act. angl.* n. 395. p. 127.

γ. *T. (latifolium) foliis integerrimis rhombeis acutis villosis: subtus tomentosus.* *Sp. pl.* 788. *Hort. upf.* 159.\* *Mill. dict. n.* 4.

*T. fruticans baeticum, ampliore folio.* *Dill. elth.* 379. t. 284. f. 368.

*T. baeticum humilium et ramosius, folio subrotundo.* *Hort. angl. t.* 3.

*T. baeticum flore coeruleo.* *Riv. mont. t.* 18.

*T. hispanicum latiore folio.* *Tournef. inst.* 208.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 393. 394.

Strauchartiger Gamander.

*Habitat in sterilibus siccis Hispaniae, Italiae, Siciliae, Corsicae et Africae borealis.* ♀ (v. v.)

*E seminibus T. latifolii T. fruticans obtinui; hinc praeceuntibus Clariss. Viris de Schreber et Desfontaines hoc varietatibus T. fruticantis adscripti.* W.

\* 10. TEUCRIUM *brevifolium.*

*T. foliis lanceolatis revolutis integerrimis obtusis incanis, floribus solitariis, calycibus muticis.* *Schreb. unilab.* p. 27. n. 10.\*

*T. frutescens stoechades arabicae folio et facie.* *Tournef. cor.* 14. *Rivin. t.* 20.

*Polium angustifolium creticum.* *Bauh. pin.* 221.

*Polium erectum creticum.* *Pona, bald.* 156. *Morif. hist.* 3. f. 11. p. 356. t. 2. f. 15.

Lavendelblättriger Gamander. W.

*Habitat in maritimis Cretae.* ♀ (v. f.)

*Facies fruticis est ut in Lavandula Stoechade. Folia utrinque incana margine revoluta subtus venosa. Pedunculi longi solitarii in superiorum foliorum axillis. Calyces incani obtuse dentati. Corolla magna externe pubescens.* W.

11. TEUCRIUM *creticum.*

*T. foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemosis ternis.* *Mat med.* 143.

*T. pedunculis axillaribus solitariis trifloris, calycibus tomentosis, foliis linearibus integerrimis, subtus incanis.* *Goian. monsp.* 272.

*T. (hyssopifolium) foliis linearibus integerrimis aculini.* *Linnaei Spec. Plant. T. III.* B



minatis subtus niveis, racemo floribus ternatis solitariisque, calycibus spinosis. *Schreb. unilab. p. 28. n. 11.*

T. foliis lanceolato-linearibus integerrimis subsessilibus, floribus solitariis pedunculatis. *Hort. cliff. 303. Hort. upf. 159. Roy. lugdb. 307.*

Rosmarinum stoechados facie. *Alp. exot. 103. t. 102. mala. Morif. hist. 3. f. 11. p. 410. t. 16. f. 3. mala.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 397.*

Isohlättriger Gamander. W.

*Habitat in Creta, Aegypto. †*

*Calyces spinosi.*

## 12. TEUCRIUM *Marum.*

T. foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis: subtus tomentosis, floribus racemosis secundis. *Mat. med. 144. Blackw. t. 47. Mill. dict. n. 12. Kniph. cent. 3. n. 93. Ludw. ect. t. 14. Sabbat. hort. 3. t. 90.*

T. foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, floribus solitariis utrinque digestis. *Hort. cliff. 303. Hort. upf. 159. Roy. lugdb. 305.*

T. foliis omnibus parvis integerrimis, margine revolutis, spicis fere secundis, floribus solitariis pedunculatis. *Medic. Act. Palat. Vol. 3. phys. p. 207.\**

T. foliis ovatis integerrimis subtus incanis, floribus racemosis oppositis. *Schreb. unilab. p. 36. n. 28.*

*Chamaedrys maritima incana frutescens, foliis lanceolatis. Tournef. inst. p. 205.*

*Marum cortuli. Bauh. hist. 3. p. 242. Riv. monop. t. 23.*

β. *Chamaedrys cretica saxatilis tenuifolia, foliis subtus incanis. Tournef. inst. 206.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 595.*

Katzen-Gamander. W.

*Habitat in regno Valentino. † (v. v.)*

*Caules erecti, fruticulosi, rigiduli. Folia petiolata, acuta. Flores secundi. Totum fragrantissimum, ut natura vix simile produxerit. Boerh.*

## \*13. TEUCRIUM *quadratum.*

T. foliis ovato-rhombeis dentatis subtus niveis, verticillis racemosis. *Schreb. unilab. p. 36. n. 27.\**

T. (*ramosissimum*) incanum, caule fruticuloso ramosissi-

mo, ramulis oliformibus, foliis obovatis crenatis, floribus solitariis axillaribus. *Dezf. fl. atl. 2. p. 4. t. 118.\**

Chamaedrys hispanica minima laxatilis incana. *Tournef. 205. Raj. hist. 3. p. 282.*

Kurzästiger Gamander. W.

*Habitat in rupium fissuris Hispaniae, Barbariae. §. (v. l.)*

14. **TEUCRIUM multiflorum.**

T. foliis ovalibus antice dentatis, floralibus integerrimis petiolatis, verticillis racemosis, caule ramosissimo. *Schreb. unilab. p. 36. n. 26.*

T. foliis ovatis: superne glabris ferrato-dentatis, floribus racemosis: verticillis sextifloris. *Syst. veg. 439.*

T. foliis ovatis utrinque acutis: superne ferrato dentatis, floribus racemosis. *Roy. lugdb. 307.*

T. foliis ovatis utrinque acutis utrinque bidentatis, verticillis laxis. *Hort. cliff. 303.*

T. floribus verticillatis pedunculatis senis, calycibus inferne ventricosis, foliis ovatis glabris apice ferratis. *Gouan. monsp. 272.*

T. foliis ovatis acutis denticulatis; floribus solitariis. *Zinn. goett. 291.*

Marum hispanicum nigrum, flore purpureo. *Hall. goett. 314.*

Chamaedrys multiflora tenuifolia hispanica. *Tournef. injt. 205. Boerh. lugdb. 1. p. 182.*

Marum hispanicum nigrum. *Bocc. mus. t. 117.*

β. Chamaedrys hispanica tenuifolia, latiori folio, multiflora. *H. R. P. Boerh. lugdb. 1. p. 182. n. 7.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 396.*

Vielblütiger Gamander. W.

*Habitat in Hispania. §. (v. v.)*

*Sequenti admodum simile, sed humiliter ramosius, ramis filiformibus incanis, foliis longe minoribus rhombeis (instar praecedentis, sed angulis lateralibus rotundatis) basi apiceque acutis, apicem versus utrinque tri- s. bidentatis planis, non nitidis, floralibus etiam petiolatis calycis longitudinem non attingentibus. Flores minores magnitudine T. Mari. Verticilli diffiti florum circiter 4. Corolla purpurea, auriculis lanceolatis brevibus. Schreb. l. c.*

\* 15. **TEUCRIUM regium.**

T. foliis ovatis antice dentatis, floralibus integerrimis sessilibus, verticillis racemosis, caule ramoso. *Schreb. unilab. p. 35. n. 25.\**

**T.** foliis ovatis aut integris aut superius bi-vel tridentatis glabris, bracteis sessilibus magnis cochleatis ovato-lanceolatis integerrimis. *Medic. Act. Pal. Vol. 3. physf. p. 208.*

**T.** lucidum parvo folio, flore venuste purpureo. *Pluk. alm. 367. t. 365. f. 2. Morif. hist. 3. p. 422. n. 5.*

Königlicher Gamander. W.

*Habitat in Hispania.* † (v. v.)

*Folia parva nitida subtus incana acuta, floralia sessilia integerrima longitudine calycis. Corolla purpurea auriculis linearibus elongatis. Schreb. l. c.*

### 16. TEUCRIUM *Laxmanni.*

**T.** foliis ovato-oblongis villosis subintegerrimis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. W.

**T.** foliis ovato-oblongis integerrimis sessilibus, floribus solitariis sessilibus. *Syst. veg. 439.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 397.*

Laxmannischer Gamander. W.

*Habitat in Sibiria inque siccis Hungariae, Sclavoniae.*

♂ (v. l.)

*Caulis semipedalis, villosus. Folia trinervia. Flores solitarii, laterales, secundi.*

*Folia obtusa oblongo-lanceolata vel oblongo-ovata plerumque integerrima, in varietate latifolia vero inferiora apice obtuse dentata; omnes plantae partes villosae, excepta corolla, quae striata. W.*

### 18. TEUCRIUM *sibiricum.*

**T.** foliis ovatis serratis, pedunculis solitariis trifloris: intermedio sessili, bracteis lineari-lanceolatis. *Sp. pl. 788. Schreb. unilab. 28. n. 12.*

**T.** chamaedryos folio, flore parvo purpureo. *Gmel. mss.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 397.*

Sibirischer Gamander. W.

*Habitat in Sibiria.* ‡ (v. l.)

*Folia utrinque nuda, ovata, serrata. Bractee sub bifurcatura, 2, lanceolatae, mucronatae, integerrimae, longitudine calycis, ut in *Satureja montana.**

*Caulis tetragonus ramosus, ramis oppositis divaricatis. Folia ovato-lanceolata superiora lanceolata grosse dentata. Pedunculi axillares bifidi tri-vel quinqueflori, flore intermedio subsessili. Bractee ad pedunculi dichotomiam lineari-subulatae longitudine ca-*

*lycis florum lateralium. Calycis dentes subulati. Corolla angusta, tubo calycis longitudine. Labium superius nullum; Labium inferius ut in congeneribus, auriculis obtusis subrotundis. Stamina non exserta. Planta habitu a reliquis diversa, accedit potius ad Nepetas. W.*

### 18. TEUCRIUM *asiaticum.*

T. foliis lanceolatis repando-ferratis basi rectangulis, floribus solitariis. *Mant. 80. Schreb. unilab. p. 38. n. 31. Jacq. hort. p. 24. t. 41.*

T. foliis erectis lanceolatis horizontalibus crenatis, crenis reflexis, floribus solitariis secundis. *Med. Act. Pal. Vol. 3. phys. p. 204. t. 10.*

Chamaedrys fruticosa lusitanica, melissae folio minore, flore purpureo. *Tournef. inst. 205?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 399.*

Schmalblättriger Gamander. W.

*Habitat in India orientali? h̄ (v. v.)*

Caulis erectus, rectus, pedalis, petragonus, fuscescens, brachiatus, nudus: Ramis brevioribus. Folia prima lanceolata basi angulo recto, petiolata, rugosa, obtusiuscule serrata s. acute crenata, crenaturis angulo recto intersiinctis, mollia, patentia, supra subrugosa saturate viridia; subtus tomentosa, venoso-reticulata, pallide viridia. Flores axillares, solitarii, uniflori, breviter pedunculati, secundi. Calyx Ocymii s. Scutellariae labio superiore cordato, margine recurvo, acuto; inferiore quadridentato, aequali. Corolla alba, vix incarnata; Labio superiore omnino nullo; Lab. inferiore 3-fido; intermedia majore recurva, emarginata, vix crenata. Stamina vix fauce longiora. Filamenta alba pilosa. Antherae fuscae polline croceo. Stigmata 2, acuminata, vix staminibus longiora. H. U.

### 19 TEUCRIUM *cubense.*

T. foliis cuneatis ferrato-incisis glabris in petiolum attenuatis, floribus solitariis pedunculatis. *Mant. 80.*

*Jacq. amer. 172. t. 183. f. 74.\* obs. 2. p. 5. t. 30. Schreb. unilab. p. 29. n. 13.\**

T. americanum chamaedryos folio, flore albo. *Mill. dict. n. 16.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 399.*

Cubascher Gamander. W.

*Habitat in Cubae humidiusculis. ♂ 2 (v. v.)*

*Caulis erectus, glaber, inodorus. Flores albi.*

## 20. TEUCRIUM *Arduini.*

T. foliis ovatis serratis, racemo spicato tereti sessili terminali. *Mant. 81. Schreb. unilab. p. 40. n. 37.*

T. foliis ovatis crenatis subhirsutis petiolatis, caulibus terminatis spica flavescente pilosa. *Arduin. spec. 1. p. 12. t. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 400.*

Arduinischer Gamander. W.

*Habitat - - -*

*Caules suffruticosi, ut tota planta obscure pubescentes, Spica terminalis, similis T. hircanico, at brevior, flavescens.*

## 21. TEUCRIUM *canadense.*

T. foliis ovato-lanceolatis serratis, caule erecto, racemo tereti terminali verticillis hexaphyllis. *Mill. dict. n. 18. Pall. it. 2 p. 569. Schreb. unilab. p. 41. n. 39. Walt. carol. 161.*

T. foliis lanceolatis serratis petiolatis, floribus solitariis. *Gron. virg. 64?*

*Chamaedrys canadensis, urticae folio subtus incano. Tournef. insi. 205.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 400.*

Canadischer Gamander. W.

*Habitat in Canada. 2*

*Planta e Canada Foliis gaudet angustioribus, aequaliter serratis, subtus tomentosis, planis; Spica ex verticillis aut sparsis floribus bractea minima singulis subjecta; at Hortensis Foliis majoribus rugosis, inaequaliter serratis, vix subtus pubescentibus et Floribus in Racemum subspicatum ex verticillis sexfloris, hexaphyllis: bracteis serratis.*

## 22. TEUCRIUM *virginicum.*

T. foliis ovatis inaequaliter serratis, racemis terminalibus, bracteis pedunculo brevioribus. W.

T. foliis ovatis inaequaliter serratis, racemis terminalibus. *Gron. virg. 64. Mill. dict. n. 19. Schreb. unilab. p. 41. n. 38. Walt. carol. 161.*

T. foliis cordatis, longe petiolatis, profunde et inaequaliter crenatis, racemo florum brevissimo crassissimo terminali. *Medic. in Act. palat. vol. 3. phys. p. 212.*

*T. virginianum melissophyllum floribus coeruleis.*  
*Pluk. alm. 363. t. 318. f. 1. sed male flores bilabiatos*  
*fecit pictor. R.*

*Chamaedrys canadensis urticae folio subtus incano.*  
*Tournef. inst. 205.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 401.*

Virginischer Gamander. W.

*Habitat in Virginia. 24 (v. v.)*

*Caulis rubens, pubescens.*

*Neque Gouani calycem bilabiatum, neque ejus folia*  
*duplicato - crenata deprehendere potuit Schreberus l. c.*  
*Nec exemplaria cel. Medici cum descriptione Gronovii*  
*conveniunt. R.*

\*23. *TEUCRIUM japonicum.* W.

*T. foliis ovatis duplicato - serratis, racemis terminalibus,*  
*bracteis calycis longitudine. W.*

*Teucrium virginicum. Thunb. jap. 244.\**

*Teucrium virginicum e Japonia. Houttuyn Lin. Pfl.*  
*Syst. 7. p. 401. t. 56. f. 1.*

*Scorodoniae affinis sinarum, floribus ex albo - purpura-*  
*scensibus, spica florum compactiore. Pluk. amalth.*  
*188. t. 441. f. 2.*

Japanischer Gamander. W.

*Habitat in montibus Japoniae. 24 (v. l.)*

*Affine admodum praecedenti, differt tamen: statura*  
*minori, foliis duplicato - serratis, basi rotundatis, nec sen-*  
*sim in petiolum attenuatis, floribus minoribus cernuis,*  
*racemo basi composito, bracteis linearibus calycis lon-*  
*gitudine. W.*

\*24. *TEUCRIUM inflatum.*

*T. foliis oblongis acuminatis inaequaliter serratis pube-*  
*scensibus, spicis sessilibus terminalibus, calycibus*  
*inflatis villosis. Swartz. prod. 88. Ait. Kew. 2. p.*  
*277.*

*T. inbirsutum, foliis ovatis dentato - serratis, spicis*  
*strictioribus crassis terminalibus. Brown jam. 257.*

Aufgeblasener Gamander. W.

*Habitat in Jamaica. 24 (v. l.)*

25. *TEUCRIUM villosum.*

*T. foliis elliptico - ovatis acuminatis serratis petiolatis vil-*  
*losis, racemo spicato terminali, calycibus inflatis.*  
*Forst. prod. n. 232.*

Behaarter Gamander. W.

*Habitat in insula Tongatabu. (v. f.)*

*A praecedente diversum: villositate omnium partium, foliis angustioribus utrinque valde villosis, dentibus basin versus longioribus, bracteis calycis longitudine lanceolatis acutis, nec ovatis obtusis calyce brevioribus, calycinis dentibus mucronatis. W.*

## 26 TEUCRIUM *hyrcanicum.*

T. foliis cordato-oblongis obtusis, caule brachiato dichotomo, spicis longissimis terminalibus sessilibus spiralibus. *Sp. pl. 789. Schreb. unilab. p. 40. n. 36.*

T. foliis cordatis crenatis rugosis, spicis florum longissimis, cylindricis, bracteis linearibus. *Medic. Act. Palat. Vol. 3. phys. p. 206.*

T. foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis oblongis densissimis. *Hall. comm. goett. tom. 2. p. 343. t. 13. Arduin spec. 13. t. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 401.*

Hyrkanischer Gamander. W.

*Habitat in Hyrcania. 24 (v. v.)*

*Folia Betonicae officinalis. Spicae longissimae, floribus undique spiraliter dense congestis, ex dichotomiis ultimis caulibus.*

## \*27. TEUCRIUM *Abutiloides.*

T. foliis cordatis dentatis acuminatis, racemis lateralibus nutantibus. *P'Herit. stirp. 1. p. 84.*

T. (*macrophyllum*) foliis cordatis crenatis petiolatis maximis, caule frutescente, spicis lateralibus brevissimis. *Lamarck. encycl. 2. p. 684.\**

Großblättriger Gamander. W.

*Habitat in Madera. 5 (v. v.)*

*Folia maxima Sidae. Flores lutei. P'Herit. 1. c.*

*Calycis dentes obtusissimi. Corollae structura fere ut in T. betonico. W.*

## 27. TEUCRIUM *Scorodonia.*

T. foliis cordatis subpubescentibus dentatis petiolatis, racemis axillaribus secundis, caule erecto herbaceo. W.

T. foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Spl. pl. 789. Mill. dict. n. 10. Scop. carn. n. 721. Pollich. pal. n. 546. Schreb. unilab. p. 39. n. 35. Fl. dan. t. 485. Kniph. cent. 11. n. 96. Hoffm. germ. 201. Roth. germ. I. 250. II. 14.*



T. foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis laxis secundis.  
*Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. parif.*  
 171. *Port. gelr.* 331.

T. foliis oblongis ovatis. ad basin profunde emargina-  
 tis rugosis, parum crenatis, racemis secundis. *Medic.*  
*Act. Pal. Vol. 3. physf. p.* 206.

Chamaedrys foliis cordatis productis, spicis longissimis  
 nudis, heteromellis. *Hall. helv. n.* 287.

Chamaedrys elatior salviae folio, flore ochroleuco. *Mo-*  
*rif. hist.* 3. f. 11. p. 423. t. 20. f. 15.

Scorodonia. *Riv. mon t.* 12. *Blackw. t.* 9.

Scordium alterum f. Salvia sylvestris. *Bauh. pin.* 247.

Scordium alterum Plinii. *Lob. ic.* 497.

Scordotis f. scordium folio salviae. *Bauh. hist.* 3. p. 292.  
*Raj. hist.* 1. p. 571.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 403.

Scorodoniën - Gamander. W.

*Habitat in arenosis editis Germaniae, Helvetiae, Gal-*  
*liae, Angliae, Belgii: in duris praedii Hartecampi,*  
*beati quondam mihi Paradisi.* 4 (v. v.)

Corollae albae. Filamenta purpurascens.

Corolla ochroleuca W.

\*29. TEUCRIUM *Pseudo-Scorodonia.*

T. foliis cordatis subtus incanis dentatis petiolatis, race-  
 mis axillaribus secundis, caule frutescente. W.

T. caule fruticoso, foliis cordatis dentatis petiolatis, sub-  
 tus incanis, racemis secundis. *Desfont. atl.* 2. p. 5.  
 t. 119.

Algierischer Gamander. W.

*Habitat in monte Lazar prope Mayane, Algeriae.* †

*Facies T. Scorodoniae, differt: caule fruticoso hir-*  
*sutiore, foliis inferioribus subtus tomentosis incanis.*  
*Desfont. l. c.*

\*30. TEUCRIUM *betonicum.*

T. foliis lanceolatis crenatis tomentosis subtus incanis.  
 racemis terminalibus, caule florifero brachiato. *Ait.*  
*Kew.* 2. p. 279.

T. (*betonicum*) foliis lanceolatis ferratis utrinque acutis,  
 racemis terminalibus, caule florifero brachiato. *l'He-*  
*rit. stirp.* 1. p. 83. t. 40.\*

Teucrum betonicaefolium. *Jacq. collect.* 1. p. 145. t.  
 17. f. 2.\*

T. (*canescens*) foliis petiolatis cuneiformi-ovatis incisis

crenatis, racemis terminalibus, floribus oppositis, bracteis integerrimis lanceolatis. *Forst. in Comment. goett. 9. p. 58.\**

T. (*maderense*) foliis ovato-oblongis obtusis crenatis basi latioribus, caule fruticoso, racemis terminalibus. *Lamarck. encycl. 2. p. 684.\**

Salvia major folio glauco serrato. *Sloan. hist. 1. p. 17. t. 3. f. 3.*

Betonienartiger Gamander. W.

*Habitat in Madera ad torrentes. † (v. v.)*

### \*31 TEUCRIUM *resupinatum*.

T. foliis cuneiformi-lanceolatis serratis villosis racemis axillaribus terminalibusque, corollis resupinatis. W.

T. (*resupinatum*) villosum, foliis lanceolatis profunde serratis, floribus solitariis sessilibus, corollis resupinatis. *Desfont. atl. 2. p. 4. t. 117.\**

Verkehrtblütiger Gamander. W.

*Habitat in Africa boreali prope Malcar in campis argillofis. ☉*

Caulis *spithamaeus ramosus*. Folia *villosa sessilia lanceolata aequaliter profunde serrata basi cuneiformia*. Racemi *axillares et terminales*. Flores *breve pedunculati ochroleuci magnitudine T. Chamaedryos*. Bractaeae *lanceolatae integerrimae longitudine calycis*. W.

### 32. TEUCRIUM *massiliense*.

T. foliis ovatis rugosis inciso-crenatis incanis, caulibus erectis, racemis rectis secundis. *Sp. pl. 789. Mill. dict. n. 9. Jacq. hort. t. 94. Schreb. unilab. 39. n. 34.*

T. foliis parvis cordato-ovatis, rugosis crenatis, crenis reflexis, floribus racemosis, racemis omnibus secundis. *Medic. Act. Pal. Vol. 3. phys. p. 205. 271. t. 11.*

T. foliis ovatis crenatis, floribus racemosis, staminibus corolla brevioribus. *Ger. prov. 278. t. 11.*

T. creticum. *Chuf. hist. 1. p. 348.*

Chamaedrys fruticosa, insularum Stoechadum, melissae folio minore, pomum redolens. *Tournef. inst. p. 205. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 402.*

Französischer Gamander. W.

*Habitat in Creta, Gallia australi: villa Franca. † (v. v.)*

Caulis *suffruticosus, vix pedales*. Folia *ovata s. cordato-ovata, rugosa, inaequaliter serrata, obtusiuscula, parva, margine reflexa, subtus venosa*. Racemi

*terminales, secundi. Flores oppositi, pedunculati. Calyces fere Scutellariae ut in T. hyrcanico: Labio superiore subcordato, patente, acuto. Corolla purpurascens Labio inferiore valde concavo. Odor Nepetae.*

\*33. TEUCRIUM *Salviastrum.*

T. foliis ovalibus crenulatis rugosis subtus tomentosis petiolatis, racemo secundo. *Schreb. unilab. p. 38. n. 33.\**

Chamaedrys fruticosa lusitanica melissae folio minori, flore purpureo. *Tournef. inst. 205.*

Salbeyartiger Gamander. W.

Habitat in Lusitania. 2.

Radix lignosa. Caulis erectus pubescens subviscidus. Folia inaequaliter crenulata, basi apiceque rotundata, supra sericeo cana, subtus albida, breve petiolata, Salviae foliis similia, sed minora. Racemus brevis. Calyx pilosus semiquinquefidus, dentibus lanceolatis, summo paullo latiore. Corolla externe villosa, tubo longitudine calycis. *Schreb. l. c.*

34. TEUCRIUM *Scordium.*

T. foliis oblongis sessilibus dentatis nudiusculis, floribus axillaribus pedunculatis geminis. caule diffuso pubescente. *Schreb. unilab. p. 37. n. 29.*

T. foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Sp. pl. 790. Mat. med. 144. Mill. dict. n. 11. Scop. carn. n. 719. Pollich. pal. n. 547. Hoffm. germ. 201. Flor. dan. t. 593. Roth. germ. I. 250. II. 15.*

T. foliis ovato-lanceolatis ferrulatis sessilibus, floribus saepius binatis. *Hort. cliff. 302. Fl. succ 476, 513. Roy. lugdb. 306. Dalib. paris. 171.*

Chamaedrys foliis mollibus, hirsutis, ellipticis, crenatis, verticillis paucifloris. *Hall. helv. n. 288.*

Scordium. *Bauh. pin. 247. Cam. epit. 588. Dod. pempt. 126. Riv. t. II. Blackw. t. 475.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 7. p. 404.*

Knoblauchduftiger Gamander. W.

Habitat in Europae paludosis. † (v. v.)

\*35. TEUCRIUM *Scordioides.*

T. foliis oblongis cordatis amplexicaulibus crenatis lanuginosis, floribus axillaribus pedunculatis geminis. *Schreb. unilab. 37. n. 30.*

*Chamaedrys cretica palustris canescens scordioides, betonicae folio. Tournef. cor. 14.*

*Scordium lanuginosum. Buah. pin. 247.*

Wolliger Gamander. W.

*Habitat in Creta. 24.*

*Caulis lanatus praecedente altior. Folia rugosa, minus profunde crenata, lanugine candida obducta, ramea minora. Flores majores. Schreb. l. c.*

### 36. TEUCRIUM *Chamaedrys.*

T. foliis cuneiformi-ovatis incisus crenatis petiolatis. floribus ternis, caulibus procumbentibus subpilosis. *Mat. med. 144. Crantz. austr. p. 251. n. 3. Scop. carn. n. 720. Pollich. pal. n. 548. Kniph. cent. II. n. 95. Sabb. hort. 2. t. 88. Hoffm. germ. 201. Roth. germ. I. 250. II. 15.*

*Chamaedrys foliis firmis, ovatis, crenatis, verticillis paucifloris. Hall. helv. n. 286.*

T. foliis cuneiformi-ovatis incisus crenatis petiolatis, floribus verticillatis ternis petiolatis. *Hort. cliff. 302. Roy. lugdb. 307. Dalib. paris. 170. Sauv. monsp. 145.*

T. foliis oblongis basi integerrimis profunde ferratis, verticillis dimidiatis, caulibus procumbentibus pilosis. *Schreb. unilab. 32. n. 21.*

T. caule procumbente, per totum longitudinem florente, foliis ovato-ellipticis, pilosis, inciso-crenatis, vix petiolatis. *Medic. in Act, Pal. Vol. 3. phys. p. 213.*

*Chamaedrys major repens. Bauh. pin. 248.*

*Chamaedrys. Riv. mon. 10. Lob. hist. 260. ic. 491.*

β. *Chamaedrys minor repens. Bauh. pin. 248. Tournef. inst. 205. t. 98.*

*Chamaedrys. Fuchf. 335. ic. 498. Clus. hist. I. p. 351. t. 17. Blackw. t. 80.*

γ. *Chamaedrys alpina hirsuta repens. Morif. hist. 3. p. 422. Raj. hist. 3. p. 282.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 405.*

Gemeiner Gamander. W.

*Habitat in apricis Germaniae, Helvetiae, Galliae, insularum Archipelagi et Palaestinae circa Hierosolymam, 24 (v. v.)*

*Bractae ferratae. Corolla purpurea labio plano obsolete trifido.*

\* 37. TEUCRIUM *heterophyllum*.

T. foliis ellipticis crenatis, floribus lateralibus solitariis, labio corollae extus lanato, ramis heterophyllis. *l'Herit. stirp.* 1. p. 84.

T. (*canariense*) foliis ovatis obtusis crenatis subtomentosis, caule arborecente, floribus oppositis solitariis pendulis axillaribus. *Lamarck. encycl.* 2. p. 684.\*

Melissophyllum citratum ex infulis fortunatis, lingo-veha dictum. *Pluk. alm.* 247. t. 306. f. 4?

Verschiedenblättriger Gamander. W.

*Habitat in Madera.* †

*Singulare foliis heterogenis discoloribus in diversis ramis. Flores purpurei.* *l'Herit.* 1. c.

*T. abutiloides, btonicum et heterophyllum conveniunt fere, quoad corollae structuram, cum Ajugis, tamen magis ad Teucra accedunt.* W.

\* 38. TEUCRIUM *bracteatum*.

T. foliis cordatis pubescentibus dentatis petiolatis, bracteis pedicellatis floribusque senis verticillatis. W.

T. (*bracteatum*) caule erecto villoso, foliis cordatis, bracteis subsenis ovatis acuminatis petiolatis, verticillis distinctis. *Desfont. atl.* 2. p. 7. t. 120.\*

Beblätterter Gamander. W.

*Habitat in Africae borealis collibus incultis prope Mascar et Tlemfen.* †

*Caulis ramosus villosus. Folia T. hyrcanici obtusa petiolata pubescentia. Calyx villosus quinquedentatus, dentibus ovatis acutis subaequalibus. Corolla purpurea T. Scordii magnitudine. Verticilli 4-6-flori. Bractee 6-8 verticillatae ovatae acuminatae petiolatae villosae, inferiores dentatae, superiores integerrimae.* *Desfont.* 1. c.

39. TEUCRIUM *lucidum*.

T. foliis ovatis inciso-ferratis glabris, verticillis dimidiatis, caulibus erectis laevibus. *Schreb. unilab.* p. 33. n. 22.\* *Gerar. prov.* 278. n. 9.

T. foliis ovatis acute inciso-ferratis glabris, floribus axillaribus ternis, caule erecto laevi. *Syst. veg.* 440. *Desfont. atl.* 2. p. 6.\* *Roth. germ.* II. 16.

T. foliis ovatis acute inciso-ferratis glabris, floribus axillaribus geminis, caule erecto. *Sp. pl.* 2. p. 790. *Mill. dict.* 2.

*T. foliis ellipticis, obtuse crenatis sessilibus splendentibus fragilibus, foliis floralibus dentatis, verticillis sex aut quatuor floribus. Medic. Act. Pal. Vol. 3. phys. p. 211. t. 12. f. 7. 8. 9.*

*Chamaedrys alpina major et elatior, foliis profundius dissectis. Morif. hist. 423. Raj. hist. 3. p. 282.*

*Teucrium regium flore rubro. Riv. monop. t. 80?*

*Chamaedrys alpina frutescens, folio splendente. Magn. hort. 52. t. 52.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 406.*

*Leuchtender Gamander. W.*

*Habitat in alpinis vallis Brasilionensis Sabaudiae; in monte Lachin Galloprovinciae. Gerard. 4 (v. l.)*

*Radix perennis, stolones exserens, e quibus Caules recti, glabri, nigricantes. Folia petiolata, oblonga, acute crenata, nervosa, glabra, internodiis breviora. Flores axillares, utrinque gemini, purpurei: Calyces fusci.*

*Differt a T. Chamaedry; Caule pedali, erecto, glabro, nec palmari, diffuso, piloso. Syst. veg. 440.*

#### \*40. TEUCRIUM nitidum.

*T. foliis ovatis crenatis, floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis racemosis, caule bifariam barbato.*

*Schreb. unilab. p. 35. n. 24.*

*Glänzender Gamander. W.*

*Habitat in Mauritania. †*

*Caulis fruticosus glaber, utroque quod a foliorum commissura descendit latere dense piloso. Folia breviter petiolata, basi integra, antice crenis obtusis margine reflexis incisa, glabra nitida, nervo medio basi barbato, obtusa dura, floralia fere lanceolata, pilosiora quam sequentis, sicut et calyces. Flores minores quam istius. Corolla purpurea, auriculis minoribus obtusis non vero truncatis. Schreb. l. c.*

#### 41. TEUCRIUM flavum.

*T. foliis ovatis crenatis, floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis in racemos digestis, caule fruticoso pubescente. Schreb. unilab. p. 34. n. 23.\**

*T. foliis cordatis obtuse serratis: bracteis integerrimis concavis, caule fruticoso, floribus racemosis ternis. Sp. pl. 791. Mill. dict. n. 1. Scop. carn. n. 722. Kniph. cent. 9. n. 89. Sabbat. hort. 3. t. 89. Desfont. atl. 2. p. 6\**

T. foliis subovatis crenatis, floribus laxe spicatis pedunculatis, caule frutescente. *Hort. cliff.* 302. *Hort. upf.* 160. *Roy. lugdb.* 307. *Sauv. monsp.* 145.

T. foliis cordatis obtuse crenatis crassis, foliis floralibus magnis integerrimis, verticillis sexfloris. *Medic. Act. Pal. Vol. phys.* p. 209.

Teucrium. *Bauh. pin.* 247. *hist.* 2. p. 290. *Riv. mon.* t. 10.

Chamaedrys fruticosior, flore ochroleuco. *Morif. hist.* 3. p. 421. *f.* II. t. 22. *f.* I.

Teucrium vulgare fruticans I. *Clus. hist.* I. p. 348.

β. Chamaedrys fruticosa cretica purpureo flore. *Tournef. inst.* 205. *Barrel. rar.* 318. t. 896.

Teucrium creticum. *Clus. hist.* I. p. 348.

T. atticum molli lanugine incanum. *Pluk. phyt.* t. 65. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 407.

Gelber Gamander. W.

*Habitat in collibus asperis Carnioliae, Italiae, Siciliae, Melitae, Hispaniae, Monspelii et Algeriae.* † (v. v.)  
*Flores racemosi, utrinque terni, pedunculati. Corolla albida labio integro concavo.*

#### 42. TEUCRIUM montanum.

T. corymbis terminalibus, calycinis dentibus acutis muticis, foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. W.

T. corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 791. *Crantz. austr.* p. 253. *Scop. carn. n.* 723. *Willich. illustr. n.* 60. *Hoffm. germ.* 201. *Roth. germ.* I. 251. II. 16.

T. foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, spicis laxis subrotundis. *Hort. cliff.* 302. *Roy. lugdb.* 305. *Dalib. paris.* 172. *Sauv.* 141.

T. corymbis terminalibus glabris, foliis petiolatis ellipticis margine revolutis subtus tomentosis, caule procumbente. *Schreb. unilab.* p. 50. n. 57. cum *Teucr. supino* conjungit.

Polium (montanum) foliis lanceolatis integerrimis, caulibus procumbentibus, floribus corymbosis terminalibus. *Mill. dict. n.* 1.

Chamaedrys foliis ellipticis integerrimis, contractis, subtus incanis, floribus capitatis. *Hall. helv. n.* 285.

α. foliis lanceolatis integerrimis.

*Polium lavandulae folio angustiore. Bauh. pin. 221. Tournef. inst. 207.*

*Polium VII. cum semine. Clus. hist. 1. p. 363.*

*Polium campestre. Tab. ic. 365.*

*β. foliis lanceolatis latioribus integerrimis.*

*Polium VIII. Clus. hist. 1. p. 363.*

*Polium lavandulae folio. Bauh. pin. 220.*

*Polium majus. Cord. hist. 124. b.*

*Ajuga folio integro. Riv. mon. 15.*

*γ. foliis lanceolatis latioribus obtusioribus, quibusdam apice dentatis.*

*Ajuga Rivini foliis denticulatis. Rupp. jen. 220.*

*δ. foliis lanceolatis latioribus angustioribusque acutis, plerisque dentatis.*

*Polium maritimum 3. Mich. hort. flor. 75.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 408.*

*Berg Gamander. W.*

*Habitat in siccis Germaniae, Monspeli, Genevae, Helvetiae Parisiis. † (v. v.)*

*Flores albi. Folia lanceolata: remota.*

#### 43. TEUCRIUM *supinum.*

*T. corymbo terminali, calycinis dentibus acutis mucronatis, foliis linearibus integerrimis margine revolutis subtus tomentosis. W.*

*T. corymbo terminali, foliis linearibus margine revolutis. Sp. pl. 791. Jacq. aust. 5. p. 8. t. 417. Hoffm. germ. 201.*

*Polium montanum repens. Bauh. pin. 220.*

*Polium montanum supinum minimum. Lob. ic. 488.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 458.*

*Niederiger Gamander. W.*

*Habitat in apricis mentosis Austriae † (v. f.)*

*Flores albi. Folia linearia, integerrima, acuta, conferta. Praecedenti affine.*

#### \*44. TEUCRIUM *thymifolium.*

*T. capitulis terminalibus paucifloris, foliis petiolaris ovatis obtusis subtus tomentosis, caule procumbente. Schreb. unilab. p. 50 n. 56.*

*Polium saxatile minimum thymi folio carneo flore. Barr. rar. 344. t. 1062.*

*β. Polium saxatile purpureum non serrato serpili folio pressa coma. Barr. rar. 343. t. 1087.*

*Thymianblättriger Gamander. W.*



*Habitat in regno Valentino. †*

Caulis *digitalis procumbens tomento albo obductus ramosus. Folia conferta ovata vel ex ovato-lanceolata incana subtus tomentosa alba, margine reflexa ac passim obsolete crenata obtusa parva. Petioli brevissimi. Flores 4. f. 5. terminales erecti sessiles. Calyx laevis incanus mucronatus. Corolla purpurea. Schreb. l. c.*

45. TEUCRIUM *pyrenaicum.*

T. corymbis terminalibus, foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis pilosis. *Schreb. unilab. p. 51. n. 40.\**

T. corymbo terminali, foliis cuneiformi-rotundatis crenatis. *Sp. pl. 791.*

T. foliis cuneiformibus crenatis, corymbo terminali, foliolis floralibus linearibus. *Vir. cliff. 55. Roy. lugdb. 305.*

T. foliis suborbiculatis crenatis, spica laxa orbiculata depressa. *Hort. cliff. 301.*

Polium (*pyrenaicum*) caulibus procumbentibus hirsutissimis, foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis. *Mill. dict. n. 6.*

Polium *pyrenaicum supinum, hederæ terrestris folio. Tournef. inst. 226. Raj. hist. 206. Raj. hist. 3. p. 280.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 409.*

Pyrenäischer Gamander. W.

*Habitat in Pyrenæis. 4 (v. l.)*

\*46 TEUCRIUM *rotundifolium.*

T. corymbis terminalibus, foliis subrotundis crenatis villosis. *Schreb. unilab. p. 42. n. 41.\**

T. (*saxatile*) foliis ovato-rhomboidibus crenatis petiolatis subtus tomentoso-incanis, caulibus fruticulosis floribus subracemosis. *Lamarck. encycl. 2. p. 691.*

Polium *hispanicum chamaedryos folio, purpurascente flore. Tournef. inst. 206.*

Polium *saxatile chamaedryoides rotundiore folio supinum rubrum. Barr. rar. 346. t. 1095. Boec. mus. 2. p. 76. t. 62. Moris. hist. 3. f. 11 p. 356. t. 4. f. 3.*

Rundblättriger Gamander. W.

*Habitat in rupibus altissimorum regni Valentini montium. †*

Caulis *decumbens aut e rupibus pendens. Folia minora quam praecedentis, basi in reniformium modum*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

C

*leviter excisa, reliquo ambitu fere orbiculato, profunde obtuseque crenato, margine reflexo, pagina superiori viridi, villo molli cano tecta, qualis etiam inferiorem vestit, sed densior longior, venis potissimum adhaerens, earumque intersitia replens. Corymbi subrotundi pauciflori. Folia floralia lanceolata superne nuda obtusa calyce breviora. Calyx angulatus, striis 10, villosus acuminatus. Schreb. l. c.*

\*47. **TEUCRIUM buxifolium.**

T. corymbis terminalibus, foliis ovalibus rugosis apice crenatis villosis. *Schreb. unilab. p. 42. n. 42.\**

T. (*saxatile*) fruticosum, foliis obovatis crenatis subtus incanis, floribus capitatis terminalibus. *Cavan. icon. 2. p. 19. t. 121. f. 1.\**

Polium saxatile purpureum chamaedryoides ampla coma. *Barr. rar. 345. t. 1086. Bocc. mus. 2. p. 75. t. 61.*

Buchsbaumblättriger Gamander. W.

*Habitat in montibus Sucronis, Orcellis, Saetabis, Sagunti regni Valentini. †*

\*48. **TEUCRIUM aureum.**

T. corymbis terminalibus pilosis, foliis ovatis ferratis caulibusque dense lanatis, summitatibus luteis nitidis. *Schreb. unilab. p. 43. n. 43.\**

T. (*aureum*) foliis ovatis crenatis tomentosis, limbo revolutis, florum spicis terminalibus ovatis foliosis. *Ca. van. ic. 2. p. 16. t. 117.\* optima.*

Polium majus. *Riv. t. 25.*

Polium luteum ferratis angustioribus incanis foliis. *Barr. rar. t. 1089.*

β. T. (*flavicans*) capitulis sessilibus ovatis tomentoso-flavis, foliis ovato-oblongis crenatis tomentosis, superioribus flavescentibus, caulibus diffusis. *Lamarck. encycl. 2. p. 692.\**

Teucrium tomentosum. *Villars. delph. 2. p. 352.*

Teucrium Polium α. *Spl. pl. 792.*

Polium montanum luteum. *Bauh. pin. 220. Tournef. inst. 206. Raj. hist. 1. p. 525. Barr. rar. 320. t. 1082. Morif. hist. 3. f. II. p. 455. t. 2. f. 1.*

Polium montanum III. flavo flore. *Clus. hist. p. 361. f. 3.*

Polium luteum. *Lob. ic. 488.*

Goldfarbener Gamander. W.

*Habitat in Hispania, Gallia australi, Syria. † (v. l.)*

\*49. TEUCRIUM *flavescens*.

T. capitulis subrotundis foliisque lineari-lanceolatis antice crenatis tomentosis, summitatibus flavis. Schreb. unilab. p. 44. n. 44.

Polium angustifolium. Mill. dict. n. 3?

Polium montanum tuteum dasphyllum ferratum. Barr. rar. 321. t. 1073.

Gelblicher Gamander. W.

Habitat in Gallia australi. † (v. l. l. fl.)

Cum T. aureo confundi solet, quocum statura, candore lanæ caulis foliorumque aequè delicatæ, foliis crenatis basi integrâ angustiore, in ramis floriferis latiore convenit: sed differt, foliis angustioribus lanceolatis, (novellis linearibus) capitulis parvis paucifloris, calyce breviorè, tomento denso, non pilis vestito, non angulato neque carinato, summitatibus non aureis, sed eleganter sulphureis. Capitula tantum ternâ in apice caulium conglobata vidi; Barrelierus plura pingit lateralia, non tamen aliam speciem delineare videtur. Schreb. l. c.

\*50. TEUCRIUM *gnaphalodes*.

T. floribus solitariis confertis, foliis linearibus revolutis crenatis calycibus lanatis. Vahl. symb. 1. p. 41.\*

T. floribus subcapitatis solitariisque, foliis linearibus serratis lanatis. PHerit. stirp. 1. p. 84.

Polium montanum V. purpureo flore. Clus. hist. 1. p. 362.

Polium montanum gnaphalodes incisum, flore rubro, lupinum. Barr. rar. 35. t. 1083.

Ruhrkrautartiger Gamander. W.

Habitat in Hispania. † (v. l.)

Differt a T. Polio: floribus solitariis laxiusculis vix capitellatis, nec capitulis subrotundis, foliis linearibus nec oblongis. PHerit. l. c.

Folia linearia margine revoluta dentata utrinque lanâ dense involuta. Calyces valde lanati acuti. Flores in foliorum axillis solitarii ad ramorum summitates conferti subcapitati. W.

\*51. TEUCRIUM *Achaemenis*.

T. corymbis densis, foliis inverse lanceolatis antice crenatis tomentosis incanis, floralibus flore longioribus.

Schreb. unilab. p. 44. n. 45.

Teucrium Polium ð. Sp. pl. 792.

*Polium maritimum lupinum venetum.* *Bauh. pin.* 221.  
*Bauh. hist.* 3. p. 300. *Morif. hist.* 3. f. 11. t. 2. f. 12.  
*Tournef. inft.* 206.

Venetianischer Gamander. W.

*Habitat in littore maris Adriatici.* † (v. l.)

*Caulis tomentosus albus. Folia lanceolata basi angustiore acuta, margine integerrima, ambitu apicem versus oblongo crenato, tomento tenui canescente, subtus densiori albo tecta, coriacea rugosa obtusa, floralia petiolata fere elliptica obscure crenata, superiora integerrima. Corymbi terminales, nonnumquam etiam laterales, breves, basi laxiores. Calyx angulatus tomento brevi candidus, acutus. Corolla brevis purpurea acuta.* Schreb. l. c.

## 52. TEUCRIUM *Polium.*

T. capitulis subrotundis pedunculatis, foliis lanceolatis obtusis crenatis margine revolutis tomentosis, caule decumbente. W.

T. capitulis subrotundis, foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus, caule prostrato. *Sp. pl.* 792.  
*Roy. lugdb.* 305. *Sauv. monsp.* 141.

*Polium montanum album.* *Bauh. pin.* 221.

*Polium (album) caule ramoso procumbente, foliis lineari-lanceolatis dentatis, floribus corymbosis terminalibus.* *Mill. dict. n.* 4.

*Teucrium (Teuthrion) capitulis subrotundis breviter pedunculatis, foliis lanceolatis crenatis tomentosis incanis, caule decumbente.* *Schreb. unilab. p.* 46. n. 47.\*

*Polium montanum I.* *Clus. hist. I. p.* 361. *mala. Lob. hist.* 257. *ic.* 486.

*Polium montanum album ferratifolium latifolium majus.* *Barrel. rar.* 326. t. 1074.

β. *Polium montanum lupinum alterum.* *Bauh. pin.* 221.

*Polium montanum album ferratum latifolium lupinum minus.* *Barr. rar.* 329. t. 1078.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 409.

Poley - Gamander. W.

*Habitat in Creta, Italia, Galliae - Narbonensi, Hispania.* † (v. l.)

## \*53. TEUCRIUM *trifoliatum.*

T. capitulis subrotundis laxis, foliis ternis oblongis revolutis antice crenatis tomentosis.

*Teucrium Polium trifoliatum.* Vahl. *symb.* I. p. 40.  
Dreyblättriger Gamander. W.

*Habitat in Hispania, Barbaria.* †

Caules *spithamaei adscendentes incani a casu foliorum muricati, ramis junioribus tomentosis.* Folia tantummodo in ramis junioribus terna sessilia oblonga viridia, tomento tenui, subtus densiori tecta, mollia, parum revoluta antice crenato obtusā. Pedunculi tres ex axillis supremis, gemini ex ala opposita, altitudine caulis. Capitula subrotunda laxa. Foliola terna ad basin capituli structura caulinarum. Calyces tomentosi obtuse dentati. Vahl. l. c.

\* 54. *TEUCRIUM Pseudhyssopus.*

T. capitulis rotundatis laxis, foliis oblongis antice crenatis tomentosus incanis, caule lanato corymbifero.

Schreb. *unilab.* p. 45. n. 46.\*

*Polium montanum incanum.* Mich. *hort. florent.* 75. n. 2.

*Hyssopus apulus Dioscoridis et Serapionis.* Column. *ecphr.* I. p. 59. t. 67. bona.

Ispartiger Gamander. W.

*Habitat in montibus aridis apricis Italiae, Cretae.* †  
(v. l.)

Caulis *dodrantalibus adscendens lana albicante laxa tectus.* Folia sessilia e lanceolato-oblonga basi integerrima ad apicem usque frequenter rotundeque crenata utrinque tomento brevi laxo incana, obtusa. Rami floriferi a medio caulis elongati foliosi saepius trifidi simul corymbum compositum exhibent. Capitula rotundata laxa, flores horizontales, pedicellis brevissimis. Folia floralia ovata longitudine calycis. Calyx magnitudine seminis triticei angulatus, tomento laxiore albo vestitus, quod denticulos primo aspectu obtusissimos exhibet, etsi acuti sint. Corolla alba macula lutea in fauce. Schreb. l. c.

\* 55. *TEUCRIUM valentinum.*

T. capitulis subrotundis breviter pedunculatis, foliis linearibus crenatis, caule erecto incano. Schreb. *unilab.* p. 46. n. 48.

*Polium valentinum fruticosum angustifolium, flore albo.*

Barr. *rar.* 331. t. 1048.

Spanischer Gamander. W.

*Habitat in regno Valentino. † (v. l.)*

*Simile T. Polio, a quo differt: caule tenuiore; foliis nihilo quidem brevioribus, sed perangustis, obtuso et crenatis, tomento pertenui, in adversa pagina paullo densiori, incano, tectis, obtusis; capitulis numerosis minoribus incanis, ramulis subaequalibus foliosis insidentibus, floribus minoribus. Folia floralia calycem aequant. Calyx tomento tenui albicante tectus, ore obtuso densius tomentoso. Schreb. l. c.*

### 56. TEUCRIUM capitatum.

*T. capitulis subrotundis breviter pedunculatis, foliis lanceolatis crenatis tomentosis niveis, caule erecto.*

*T. capitulis pedunculatis, foliis lanceolatis crenatis tomentosis, caule erecto. Sp. pl. 792. Cavan. ic. 2. p. 17. t. 119.\**

*Teucrium Belion. Schreb. unilab. p. 47. n. 49.\**

*Polium dasphyllum gnaphalodes flore albo. Barr. rar. 324. t. 1047.*

*Polium maritimum erectum monspeliacum. Bauh. pin. 221. Tournef. inst 206.*

*Polium (capitatum) caule erecto diffuso, foliis linearilanceolatis crenatis, corymbis terminalibus laterali-busque. Mill. dict. n. 5.*

*Polium monspeliacum. Bauh. hist. 3. p. 299.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 410.*

*Kopfförmiger Gamander. W.*

*Habitat in Hispania, Gallia, Sibiria, † (v. l.)*

*Habitus Origani Majoranae, sed tomentosum et angustifolium.*

*A. T. Polio, quocum plerumque conjungitur, propter colorem tomenti niveum, potissimum in caule atque inferiore foliorum superficie conspicuum, staturam altiore faciemque nonnihil diversam separandum esse videtur. Cultura quidem, quod Joh. Bauhinus observavit, colorem quodammodo immutare valet, quippe cujus adminiculo tomentum rarefcere videmus. Nunquam tamen plane destruitur, neque in canum seu griseum praecedentis colorem transit candor, quem prona foliorum facies, secus ac in illo, prae altera conservat. Schreb. l. c.*

### \*57. TEUCRIUM lusitanicum.

*T. capitulis laxis, foliis linearibus obtusis crenulatis in-*

canis, caule pubescente corymbifero. Schreb. unilab. p. 47. n. 59.

Polium lusitanicum supinum minus incanum, caulibus purpurascens, flore albo. Tournef. inst. 206.

Portugiesischer Gamander. W.

Habitat in Lusitania. 4 (v. l.)

Radix lignosa. Caulis adscendens tomento albido raro vestitus. Folia longa, basi angustiora, a medio marginis crenis parvis nonnihil reflexis incisa, rugosa viridia, tomento tenui canescentia, prona parte magis incana obtusa, summa reliquis breviora duploque latiora. Capitula subrotunda basi laxa pauciflora in summitate caulis, ramis vero elongatis apice trifidis insident. Folia floralia calyce longiora. Flores erecti, inferiores patuli. Calyx angulatus dense tomentosus e cano virescens, a tomento obtusus. Corolla alba. T. Pseud-hyssopo majus est, viridius floribusque majoribus, T. aurei flores aequantibus. Folia nonnumquam terna. Schreb. l. c.

\*58. TEUCRIUM pycnophyllum.

T. capitulis subrotundis, foliis linearibus revolutis antice crenatis confertis, cauleque dense tomentosus. Schreb. unilab. p. 48. n. 51.

Polium surrectum majus angustifolium serratum incanum tomentosum. Barr. rar. 322. t. 1096.

Polium montanum album angustifolium serratum supinum minus. Barr. rar. 330. t. 1091.

Dichtblättriger Gamander. W.

Habitat in Hispania. 4

Tota planta tomento albo densissimo, quasi stupa chartacea tecta. Caulis spithamaeus basi procumbens, ramis adscendentibus (ut in utraque figura Barrelieri) ramulis perbrevisibus dense foliosis, ex axillis undique erumpentibus. Folia linearia margine revoluta ad apicem crenis aliquot obsolete incisa, obtusa. Capitula terminale lateraliaque parva subrotunda pedunculis mediocribus insidentia. Folia floralia ovata obtusa. Calyx minutus tomentosus. Corolla alba. Schreb. l. c.

\*59. TEUCRIUM verticillatum.

T. capitulo subrotundo sessili, foliis lanceolatis integerimis revolutis verticillatis, cauleque erecto tomentosus. W.

*T. (verticillatum)* foliis verticillatis linearibus, limbo revoluto, caule erecto. *Cavan. ic. 2. p. 77. t. 198.\**  
Wirtelblättriger Gamander. W.  
*Habitat in regno Valentino. †*

\*60. *TEUCRIUM Libanitis.*

*T. spicis subrotundis, foliis confertis linearibus revolutis integerrimis cauleque tomentosis. Schreb. unilab. 48. n. 52.\**

*T. (Libanitis)* foliis linearibus limbo revoluto, spicis ovatis foliosis. *Cavan. ic. 2. p. 17. t. 118.\**

*Polium montanum majus erectum rosmarini folio, flore rubro. Barr. rar. 338. t. 1090.*

Rosmarinblättriger Gamander. W.

*Habitat in Hispania. †*

61. *TEUCRIUM pumilum.*

*T. capitulis terminalibus, sessilibus, foliis linearibus planis quadrifariam confertis, caule procumbente tomentoso. Amoen. acad. 4. 276.\* Schreb. unilab. p. 48. n. 53.*

*Polium hispanicum montanum pumilum, rosmarini folio, flore rubro. Tournef. inst. 207.*

*Polium montanum pumilum rubrum, viridi stoechadis folio, caule tomentoso. Barr. rar. 336. t. 1092.*

β. *Polium montanum pumilum, angusto viridique folio, caule incano. Barr. rar. 337. t. 1093.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 411.*

Zwerg-Gamander. W.

*Habitat in Hispania. †*

\*62. *TEUCRIUM angustissimum.*

*T. capitulis terminalibus pilosis, foliis linearibus integerrimis subnudis, caule erecto. Schreb. unilab. p. 49. n. 54.\**

*Polium montanum album non ferratum, longis angustisque foliis canescentibus. Barr. rar. 333. t. 1080. bona.*

Linienblättriger Gamander. W.

*Habitat in Hispania. †*

\*63. *TEUCRIUM coeleste.*

*T. capitulis terminalibus tomentosis, foliis linearibus integerrimis canis, caule erecto. Schreb. unilab. p. 49. n. 55.\**



*Polium montanum album non ferratum viride, longis angulatisque foliis, caule incano. Barr. rar. 354. t. 1081. bona.*

Gebirgs-Gamander. W.

*Habitat in altissimis montibus regni Valentini; praecipue ad carthusiam Porta Coeli dictam. † (v. l.)*

64. TEUCRIUM *spinofum.*

T. *spinofum*, calycibus labio superiore ovato, corollis resupinatis, pedunculis geminis. *Sp. pl. 793. Loeft. it. 147.*

T. ramulis spinoscentibus, corollis resupinatis, pedunculis axillaribus geminis. *Schreb. unilab. p. 38. n. 32.*

*Scordium (spinofum) caule tetragono ad nodos spinoso, foliis oppositis, radicalibus pinnatifidis, summis ovatis, reliquis crenatis. Cavan. ic. 1. p. 19. t. 31.\**

*Chamaedrys multifida spinosa odorata. Grisf. lusit. 20. Tournef. inst. 208.*

*Chamaedrys spinola. Bauh. pin. 248. prod. 1117. f. 117. Moris. hist. 3. p. 423. f. 11. t. 22. f. 17.*

β. *Teucrium mucronatum. Sp. pl. 2. p. 793. n. 31.*

*Scordium spinofum odoratum. Corn. can. 113. Barr. rar. 319. t. 202.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 411.*

Dorniger Gamander. W.

*Habitat in Lusitaniae, Hispaniae collibus, arvis. ☉ (v. l.)*  
*Corollae resupinatae, albae. Stamina brevissima.*

*Corolla resupinata in classe Didynamia nullius videtur momenti, ut in generibus Ajugae, Teucrii atque Hyssopi videre est: Calyx vero, ob formam constantem optimos praebet characteres; hinc haud absolum fore puto sequentes Teucrii species, nempe: T. asiaticum, Arduini, betonicum, massiliense, hyrcanicum et spinosum sub distincto genere enumerare. Conveniunt enim calyce bilabiato fere ut in Scutellaria, labio superiore ovato magno, inferiore quadridentato, dentibus setaceis. W.*

1094. S A T U R E J A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 961.*

*Corollae lacinae subaequales. Stamina distantia.*

1. S A T U R E J A *juliana.*

*S. verticillis fastigiatis, foliis lineari-lanceolatis. Sp. pl. 793. Mill. dict. n. 6.*

Satureja floribus verticillatis, foliis lanceolatis glabris.

Roy. lugdb. 324.

Satureja spicata. Bauh. pin. 218.

Satureja perennis, verticillis spicatis et densius dispositis. Moris. hist. 3. p. 412. f. II. t. 17. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 413.

Julianisches Pfefferkraut. W.

Habitat in Hetruria, Thyrrheni maris asperis, Florentiae. † (v. v.)

Planta culta admodum varians, foliis angustioribus et latioribus. Folia sunt plerumque lineari-lanceolata subtus obsolete venosa in varietate latifolia, in angustifolia vero videntur avenia. Utraque foliorum pagina est scabra. Verticilli pedunculati axillares pauciflori. Calyces hispidi. W.

### \*2. SATUREJA nervosa.

S. verticillis congestis, calycibus villosis, foliis ovatis acutis subtus venosis glabris. W.

S. (capitata) caule fruticoso filiformi, foliis ovatis subtus nervosis, pedunculis multifloris folio brevioribus, calycibus ciliatis. Desfont. atl. 2. p. 9. t. 121. f. 2. \*

Adriges Pfefferkraut. W.

Habitat in fissuris rupium Atlantis. †.

Caulis fruticosus ramosus pedalis. Folia subsessilia ovata acuta glabra subtus venosa. Verticilli pedunculati. Calyces valde villosi. W.

### 3. SATUREJA Thymbra.

S. verticillis subrotundis hispidis, foliis obovato-oblongis acuminatis venis punctatis hispidis. W.

S. verticillis subrotundis hispidis, foliis oblongis acutis. Sp. pl. 794. Roy. lugdb. 324. Blackw. t. 318. Sabb. hort. 3. t. 71.

S. cretica. Bauh. pin. 218.

Thymus frutescens, verticillis fere nudis globosis, foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 306.

Thymbra legitima. Clus. hist. 1. p. 358.

Thymum creticum pone verticillatum. Barr. rar. 279. t. 898.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 414.

Candisches Pfefferkraut. W.

Habitat in Creta, Tripoli. † (v. f.)

Verticilli in hac 4 f. 5 praecedenti 9 f. 20.

4. SATUREJA *graeca*.

S. pedunculis axillaribus tri- sexflorisve, bracteis calyce brevioribus, foliis ovatis hispidis subtus venosis. W.

S. pedunculis subtrifloris lateralibus, involucellis calyce brevioribus. *Sp. pl.* 794. *Mill. dict. n.* 7.

S. annua orientalis tenuior, ad singulos nodos florifera. *Morif. hist.* 3. p. 411. f. II. t. 17. f. 2.

Clinopodium minus exoticum, thymi folio majore, in-  
odorum. *Pluk. alm.* 110. t. 84. f. 8.

Clinopodium creticum. *Alp. exot.* 260. t. 264.

Clinopodium orientale origani folio, flore minimo. *Tour-  
nef. cor.* 12.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 414.

Griechisches Pfefferkraut. W.

*Habitat in Archipelagi insulis.* 4 (v. l.)

*Facie convenit cum S. montana, a qua differt foliis minus mucronatis; sed praecipue corymbis florum, qui utrinque non soli, sed bini; accedit quod bractee s. involucrum in hac minimum est, in montana vero longitudine corymbi. Folia inferiora ovata Thymi, subtus purpurascens, reliqua magis linearia: in superna foliorum pagina sunt quasi micae s. atomi splendentes, qui relucent a pilis nonnullis brevibus sparsis. Corollae extus purpurascens, intus albido-purpurascens maculis 3 purpureis ad corollae basin, quarum intermedia major.*

*Adultior insequentibus annis corymbis solitariis; primo geminis.*

\* 5. SATUREJA *filiformis*.

S. pedunculis axillaribus uni- triflorisve nudis, foliis ovato-lanceolatis villosis. W.

S. (*filiformis*) villosa, ramis erectis filiformibus, foliis inferioribus ovatis superioribus lanceolatis. *Desfont. atl.* 2. p. 8. t. 121. f. 1.\*

Fadenförmiges Pfefferkraut. W.

*Habitat in Atlantis rupium fissuris.* †

*Caulis, folia, pedunculi et calyces villosi. Simillima S. graecae sed differre videtur; foliis ovato-lanceolatis subsessilibus villosis, pedunculis paucifloris, bracteis nullis. W.*

6. SATUREJA *montana*.

S. pedunculis axillaribus cymosis subsecundis, calycinis

- segmentis acuminatis mucronatis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis. W.
- S. pedunculis lateralibus solitariis, floribus fasciculatis fastigiatis, foliis mucronatis lineari-lanceolatis. *Sp. pl.* 794. *Mill. dict. n.* 3. *Sabb. hort.* 3. t. 64. *Willd. arb.* 358.
- S. racemis lateralibus solitariis: foliis lineari-lanceolatis punctatis duris. *Scop. carn. n.* 738. t. 30. mala.
- S. pedunculis solitariis lateralibus bis-terque dichotomis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis subciliatis, subtus carinatis punctato-foveolatis. *Wulfen in Jacq. Collect.* 2. p. 132.\*
- S. pedunculis lateralibus solitariis trifloris, foliis carinatis punctatis ciliatis mucronatis. *Zinn. goett.* 313. *Willich. obs.* 109.
- S. pedunculis dichotomis, verticillis concatenatis. *Vir. cliff.* 57. *Hort. upf.* 161. *Roy. lugdb.* 324. *Sauv. monsp.* 142.
- S. montana. *Bauh pin.* 218.
- S. perennis. *Riv. mon.* 41.
- Hyllopus goritiense*, floribus verticillatim ambientibus. *Bath. hist.* 3. p. 276.
- Melissa* foliis linearibus integerrimis. *Hort. cliff.* 308.
- Saxifraga secunda*. *Camer. epit.* 717. B.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 415.
- Berg-Pfefferkraut. W.
- Habitat in* Hetruriâ, Narbona, Carniolia, Croatia, Italia. † (v. v.)

\*7. SATUREJA *rupestris*.

- S. pedunculis axillaribus cymosis secundis, calycinis segmentis obtusis muticis, foliis subrotundo-ovatis basi attenuatis dentatis obtusiusculis. W.
- S. (*rupestris*) pedunculis solitariis lateralibus bis-dichotomis secundis, foliis ovato-lanceolatis ferrulatis subtus foveolato-punctatis. *Wulfen in Jacq. Collect.* 2 p. 130.\* *Jacq. ic. rar.* 3. t. 494.
- S. pedunculis ramosis lateralibus solitariis, foliis ovato-lanceolatis ferrulatis. *Hofl. synop.* 322.
- S. (*thymifolia*) racemis lateralibus solitariis, foliis ovatis rariter dentatis. *Scop. carn. n.* 737. t. 29.\*
- Felsen-Pfefferkraut, W.
- Habitat in* Carnioliae *rupestribus*, † (v. f.)

8. SATUREJA *hortensis*.

S. pedunculis axillaribus tuberculosis, foliis lanceolatis integerrimis, caule brachiato. W.

S. pedunculis bifloris. *Vir. cliff.* 87. *Hort. upf.* 161. *Mat. med.* 145. *Roy. lugdb.* 324. *Sauv. monsp.* 142. *Mill. dict. n. 1.* *Ludw. etc. t.* 199. *Kuiph. cent.* 3. n. 80. *Sabb. hort. t.* 70. *Regn. bot.*

S. *hortensis*. *Bauh. pin.* 218. *Blackw. t.* 419.

S. *altera*. *Cam. epit.* 487.

Thymus erectus annuus, foliis lanceolato-linearibus. *Hort. cliff.* 306.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 416.

Gemeines Pfefferkraut. W.

*Habitat in G. Narbonensi et Italia.* ☉ (v. v.)

9. SATUREJA *capitata*.

S. floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Mat. med.* 145. *Gron. orient.* 71. *Mill. dict. n.* 8.

Thymus capitatus qui dioscoridis. *Bauh. pin.* 219.

Thymum legitimum. *Clus. hist.* 1. p. 357.

Thymum creticum incanum capitatum. *Barr. ic.* 897.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 417.

Kopfförmiges Pfefferkraut. W.

*Habitat in Creta, Baetica, Hispali, Graecia, Palaestina.* † (v. l.)

10. SATUREJA *spinosa*.

S. ramis spinosis, foliis hispida. *Amoen. acad.* 4. p. 317.\*

Satureja cretica frutescens spinosa. *Tournef. cor.* 13.

Satureja cretica spinosa. *Pon. ital.* 21.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 418.

Dorniges Pfefferkraut. W.

*Habitat in Creta.* † (v. l.)

Caulis fruticosus pedalis valde ramosus. Rami spinosa terminati. Folia oblonga hispida ciliata, subtus venosa punctata, utrinque attenuata, apice mucronata. Pedunculi axillares uniflori solitarii. Bracteae binae in pedunculis. Calyx striatus punctatus. W.

11. SATUREJA *viminea*.

S. floribus axillaribus ternis subsessilibus, bracteis linearibus, foliis oblongis integerrimis basi attenuatis glabris subtus hispida. W.

S. pedunculis axillaribus trifloris, involucris linearibus,

- foliis lanceolato-ovatis integerrimis. *Amoen. acad.*  
 5. p. 399.\* *Swartz. obs.* 226.\*  
*Mentha viminea*, foliis minoribus obovatis, pedunculis  
 trifloris alaribus. *Brown. jam.* 258.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 418.  
 Westindisches Pfefferkraut. W.  
*Habitat in Jamaicae montibus frigidioribus.* † (v. l.)  
*Facies Cūnilae, sed stamina 4.*  
*Duae varietates hujus plantae occurrunt: una Frut-*  
*tex minor rigidior, foliis minoribus oblongis; altera*  
*Arbusecula 12-15-pedum, ramis laxis, foliis rotundio-*  
*ribus.* *Swartz.* l. c.

## 1095. T H Y M B R A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 962.

*Cal.* subcylindricus, bilabiatus, utrinque linea  
 villosa exaratus. *Stylus* semibifidus.

1. T H Y M B R A *spicata.*

*T. floribus spicatis.* *Sp. pl.* 795. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph.*  
*cent.* 3. n. 94.

*T. spicata verior hispanica.* *Barr. rar.* 281. t. 1230.

*Thymum majus longifolium: stoechadis foliaceo capite*  
*purpurascente, pilosum.* *Pluk. alm.* 368. t. 116. f. 5.

*Hysopus capitata africana, saturejae rigido hirsuto folio.*  
*Morif. hist.* 3. p. 361.

*Satureja hirsuta purpurea olibani.* *Dodart. mem.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 419.

Aehrenblütige Thymbra. W.

*Habitat in Macedonia, Libano.* † (v. l.)

2. T H Y M B R A *verticillata.*

*T. floribus verticillatis.* *Sp. pl.* 796. *Mill. dict. n.* 2.

*Hysopus angustifolia montana aspera.* *Bauh. pin.* 218.

*Hysopus montana.* *Dalech hist.* 394.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 420.

Wirtelblütige Thymbra. W.

*Habitat in Europa australi.* †

*Caules vix pedales. Folia opposita, lineari-lanceo-*  
*lata, integra, punctata: Floralia paulo latiora, acu-*  
*tiora, sed ciliata. Haec omnino verticillata, floribus*  
*sessilibus; Praecedens obsolete spicata, spica oblonga*  
*bracteis s. foliis ciliatis imbricata. Forte prioris so-*  
*la varietas.*

\*3 THYMBRA *ciliata*.

T. floribus capitatis, foliis linearibus ciliatis. W.

T. foliis linearibus ciliatis, capitulis florum oblongis terminalibus, bracteis ovatis acutis. *Desfont. atl.*

2. p. 10. t. 122.\*

Gefranzte Thymbra. W.

*Habitat in Africae borealis collibus aridis prope Mascar.* †

Frutex elegans ramosissimus erectus pedalis. Rami juniores pubescentes teretes. Folia linearia rigidula patentia opposita sessilia, margine utrinque pilis albis ciliata poris conspersa. Flores dense capitati terminales; capitulis ovato-cylindraceutis. Bractee magnae ovatae acutae ciliatae subtus nervosae calyce longiores. *Desfont. l. c.*

## 1096. H Y S S O P U S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 963.*

Cor. labium inferius tripartitum, lacinula intermedia sub crenata. *Stam. recta, distantia.*

I. H Y S S O P U S *officinalis*.

H. floribus verticillatis racemosis secundis, lacinia corollae intermedia biloba integerrima, foliis lanceolatis. W.

H. spicis secundis, foliis lanceolatis. *Mat. med. 145. Hort. cliff. 304. Hort. ups. 152. Roy. lugdb. 323. Gort. gelr. 336. Gouan. hort. 274 illustr. 35. Mill. dict. n. 1. Pall. it. 2. p. 507. Jacq. austr. t. 254. Gmel. sib. 3. p. 244. Blackw. t. 296. Kniph cent. 6. n. 47. Ludw. ect. 40. Sabb. hort. 3. t. 79. Hoffm. germ. 202. Roth. germ. I. 242. II. 4. Willd. arb. 147.*

H. foliis linearibus punctatis, verticillis in spicam continuatis. *Hall. helv. n. 249. Riv. t. 68.*

H. officinarum caerulea f. spicata. *Bauh. pin. 217.*

H. vulgaris. *Dod. pempt. 287.*

β. *Hyssoopus rubro flore.* *Bauh. pin. 217. Mill. dict. n. 2. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 421.*

Gemeiner Hlop. W.

*Habitat in Valle angusta, Austria, Sibiria.* † (v. v.)

2. HYSSOPUS *Lophanthus*.

H. pedunculis axillaribus cymosis, corollis refupinatis, lacinia intermedia crenata, foliis oblongis cordatis dentatis. W.

H. corollis subrefupinatis, staminibus inferioribus corolla brevioribus, foliis cordatis. *Hort. upf.* 162.\*  
*Mill. dict. n. 5. Kniph. cent. 2. n. 36. Jacq. hort. t. 182.*

Cataria floribus inversis. *Hall. goett.* 344.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 422.*

Chinesischer Ifop. W.

*Habitat in China septentrionali.* 4 (v. v.)

3. HYSSOPUS *nepetoides*.

H. spicis verticillatis cylindricis, lacinia intermedia corollae crenata, stylis corolla brevioribus, foliis subcordatis ovatis acuminatis acute dentatis. W.

H. caule acuto quadrangulo. *Hort. upf.* 163.\* *Mill. dict. n. 4. Gouan. illustr. 35. Jacq. hort. I. p. 28. t. 69.*

*Nepeta caule acute quadrangulo glabro. Vir. cliff. 58. Roy. lugdb. 316. Gron. virg. 66.*

*Brunella bracteis lanceolatis. Hort. cliff. 316.*

*Sideritis canadensis altissima, scrophulariae folio, flore flavescente. Tournef. inst. 192.*

*Betonia virginiana elatior, foliis scrophulariae glabris, flore ochroleuco. Pluk. alm. 67. t. 150. f. 3. Moris. hist. 3. p. 365. f. II. t. 4. f. II.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 423.*

Weisser Ifop. W.

*Habitat in Virginia, Canada.* 4 (v. v.)

*Hanc cum praecedente ad Hyssopum ex lege tantum artis retuli, ut character generis obtineatur.*

\*4. HYSSOPUS *scrophularifolius*.

H. spicis verticillatis cylindricis, lacinia corollae intermedia crenata, stylis corolla longioribus, foliis cordato-ovatis acuminatis obtuse dentatis. W.

*Sideritis canadensis altissima scrophulariae folio, flore purpurascente. Tournef. inst. 192.*

*Betonica maxima scrophulariae folio, floribus incarnatis. Herm. parad. 106. t. 106.*

Langgrifflicher Ifop. W.

*Habitat in Canada.* ♂ (v. v.)

*Simillimus praecedenti, differt tamen: duratione,*



foliis *latioribus basi cordatis obtuse dentatis*, spica densiore, bracteis glabris nec basi subpubescentibus, corolla multo majori rubicunda, denique stylo corolla duplo longiore. In hortis constanter faciem servat et notis indicatis facillime distinguitur. W.

1097. N E P E T A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 964.*

Corollae labium inferius lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

I. NEPETA *Cataria*.

N. floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis. *Sp. pl.* 796. *Mat. med.* 146. *Scop. carn. n.* 743. *Pall. it. I. p.* 25. *Pollich. pal. n.* 549. *Kniph. cent. 4. n.* 53. *Flor. dan. t.* 580. *Blackw. t.* 455. *Sabbat. hort. 3. t.* 80. *Hoffm. germ.* 202. *Roth. germ. I.* 256. *II.* 32.

N. floribus interrupte spicatis pedunculatis. *Hort. cliff.* 310. *Hort. upf.* 163. *Fl. succ.* 486, 514. *Roy. lugdb.* 316. *Gron. virg.* 65. *Dalib. paris.* 116.

*Cataria* foliis cordatis, verticillis spicatis. *Hall. helv. n.* 246.

*Nepeta* foliis cordatis petiolatis, verticillis spicatis subpedicellatis: corollarum labio superiore papilionaceo. *Crantz. austr. p.* 271.

*Mentha cataria vulgaris et major.* *Bauh. pin.* 228.

*Cataria herba.* *Dod. pempt.* 99.

β. *Mentha cataria minor.* *Bauh. pin.* 228.

*Nepeta (minor)* floribus spicatis, spicis interruptis, verticillis pedicellatis, foliis subcordatis serratis petiolatis. *Mill. dict. n.* 2. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 434.

Gemeine Katzenmünze. W.

*Habitat in Europa.* 4 (v. v.)

Varietas β. *dimidio minor est, non ramosa.*

\* 2. NEPETA *angustifolia*.

N. corymbis pedicellatis spicatis, foliis lanceolatis rugosis tomentosis obtuse serratis. *Vahl symb. I. p.* 41.

N. (*aragonensis*) *incana*, foliis lanceolato-linearibus *Linnaei Spec. Plant. T. III.* D

ferrulatis subpetiolatis, floribus dense paniculatis, racemis obtulis. *Lamarck. encycl. 1. p. 703.\**

*N. angustifolia minor hispanica. Barr. rar. 735? Bocc. mus. 2. p. 75. t. 61?*

*Cataria tenuifolia. Clus. hist. 2. p. 33.*

Schmalblättrige Katzenmünze. W.

*Habitat in Arragonia. 4*

*Caulis erectus pedalis ramosus uti tota planta tomentoso-incanus. Rami simplicissimi. Folia petiolata lanceolata obtusiuscula rugosa obtuse ferrata semipollicaria. Flores corymbosi. Corymbi pedicellati oppositi, in spica terminali oblonga compacta conferti. Bractee parvae lineares. Calyx striatus, dentibus lanceolatis acutis. Minime est varietas N. Catariae, nec faciem in horto culta mutat. Folia basi acuta omnia apice obtuso, calyces acuti; Catariae vero folia basi subcordata sunt, suprema uti dentes calycis cuspidati. Vahl. 1. c.*

\*3. *NEPETA crispa. W.*

*N. spica verticillata interrupta, foliis cordatis dentatis rugosis undulatis petiolatis incanis. W.*

*N. (racemosa) foliis cordatis rugosis incanis, floribus verticillato racemosis laxis, bracteis minutis. Lamarck. encycl. 1. p. 703?*

Krause Katzenmünze. W.

*Habitat - - - 4 (v. v.)*

*Pulcherrima hujus generis species. Caulis ramosus adscendens pedalis et ultra. Folia opposita vix uncialia cordata obtusa grosse inaequaliter obtuse dentata rugosa undulato-crispa utrinque tomento tenui incana. Petioli longitudine fere foliorum. Flores coerulei in racemo terminali interrupto ex verticillis paucifloris composito. Pedunculi tri- s. quadriflori. Calyces incani ut tota planta, striati acuminati. Bractee setaceae villosae. W.*

\*4. *NEPETA heliotropifolia.*

*N. foliis ovato-oblongis integerrimis petiolatis subincanis, racemulis pedunculatis subquinquefloris. Lamarck. encycl. 1. p. 704.*

*Cataria orientalis minor foliis Heliotropii. Tournef. cor. 13.*

Ganzblättrige Katzenmünze. W.

*Habitat in Oriente.*

*Caulis pedalis et ultra valde ramosus, ramis ramulosis*

*trichotomis*. Folia ovato-oblonga integerrima petiolata albido-viridia. Corymbus quinque florus parvus in apice ramorum, dichotomus, flore centrali sessili. Lamarck. l. c.

5. NEPETA *pannonica*.

N. cymis pedunculatis multifloris, foliis lanceolato-oblongis cordatis nudis, corollae lobis lateralibus reflexis. *Ait. Kew. 2. p. 284.*

N. floribus paniculatis, foliis cordatis petiolatis obsolete crenatis. *Sp. pl. 797. Gmel. sib. 3. p. 239. Jacq. vind. t. 24. austr. 2. p. 18. t. 129. Hoffm. germ. 202.*

N. caule paniculato, pedunculis partialibus ramosis multifloris. *Roy. lugdb. 316.*

N. (*paniculata*) foliis cordatis petiolatis. *Crantz. austr. p. 270.*

N. *pannonica* major et elatior. *Morif. hist. 3. p. 415. f. II. t. 6. f. 6.*

*Mentha montana verticillata. Bauh. pin. 227.*

*Menthastrum montanum I. Clus. hisp. 2. p. 32.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 427.*

Ungarische Katzenmünze. W.

*Habitat in Austria, Pannonia, Sibiria. 4 (v. v.)*

*Specimen sibiricum quod possideo, differt foliis latioribus, floribusque coeruleis duplo majoribus. W.*

\*6. NEPETA *coerulea*.

N. cymis pedunculatis multifloris hirtis, foliis oblongis cordatis villosis subsessilibus, corollae lobis lateralibus reflexis. *Ait. Kew. p. 285.*

Blaue Katzenmünze. W.

*Habitat - - - 4 (v. v.)*

7. NEPETA *violacea*.

N. cymis pedunculatis multifloris pilosis, foliis cordatis subpetiolatis nudiusculis, corollae lobis lateralibus patentibus. *Ait. Kew. 2. p. 285.*

N. verticillis pedunculatis corymbosis, foliis petiolatis cordato-oblongis dentatis. *Sp. pl. 797. Mill. diet. n. 6. Scop. carn. n. 744. Pall. it. I. p. 154.*

N. foliis ovatis petiolatis glabris, verticillis dissite spicatis glabris. *Sauv. monsp. 151.*

N. *montana* purpurea major, sparsa spica. *Barr. ic. 601. Bocc. mus. 2. p. 46. t. 36.*

*Cataria hispanica, betonicae folio angustiore, flore caeruleo. Tournef. inst. 202.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 426.*

Violette Katzenmünze. W.

*Habitat in Hispania, Sibiria, Carniolia. 4 (v. v.)*

\*8. *NEPETA incana.*

*N. cymis pedunculatis multifloris, foliis petiolatis oblongis subcordatis crenatis tomentosis. Ait. Kew. 2. p. 285.*

*N. (teucroidis) canescens, foliis petiolatis cordatis crenatis tomentosis internodiis brevioribus, verticillis distinctis compactis, bracteis longitudine calycum obvallatis. Lamarck. encycl. 1. p. 704.\**

*Cataria orientalis teucree folio, lavandulae odore, verticillis florum candidissimis. Tournef. cor. 13.?*

Graue Katzenmünze. W.

*Habitat in Oriente? 4*

\*9. *NEPETA japonica. W.*

*N. florum paniculis axillaribus, foliis petiolatis ovatis, serratis tomentosis.*

*Nepeta incana. Thunb. jap. 244. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 429. t. 56. f. 2.*

Japanische Katzenmünze. W.

*Habitat in summis montibus magnae Kofido Japoniae. 4*

*Caulis herbaceus inferne teretiusculus decumbens nudus, superne obsolete tetragonus erectus tomentosus indivisus spithamaeids vel paullo ultra. Folia opposita petiolata ovata acuta serrata utrinque tomentosa, sed subtus magis albida patentia, semipollicaria, superioribus sensim minoribus. Petioli tomentosi lineam longi. Flores paniculati. Paniculae in supremis foliorum axillis oppositae trifidae fastigiatae. Pedunculus lineam longus pedicellis capillaribus. Stamina flore duplo longiora. Differt a *N. Nepetella*: floribus paniculatis, paniculis axillaribus, foliis ovato-oblongis, nec cordatis. Thunb. l. c.*

10. *NEPETA ucranica.*

*N. floribus paniculatis, foliis lanceolatis serratis sessilibus nudis. Sp. pl. 797.*

*Cataria betonicae folio angustiore, flore caerulefcente. Gerb. tan. 87.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 427.*

Ukränische Katzenmünze. W.

*Habitat in Ucraina. 4*

11. NEPETA *Nepetella*.

N. cymis pedunculatis, foliis cordatis, oblongo-lanceolatis profunde serratis tomentosis. *Ait. Kew.* 2. p. 285.

N. floribus racemosis: racemulis quinquefloris, foliis cordato-lanceolatis dentatis tomentosis. *Sp. pl.* 797.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 427.

Kleine Katzenmünze. W.

*Habitat in Europa australi.* 4 (v. v.)

Planta triplo minor *Cataria*. Folia *angustissima, acute sinuato-dentata*. Flores *laxe racemosi: racemulis sub-quinquefloris, nec ut in N. violacea floribus 30*. Calyces *nudi*. Corollae *recentes rubrae, nec albidae aut caeruleae*. Antherae *caeruleae*. Bractee *angustissimae, patentes*.

*Nepeta-Nepetella Allion. pedem. n. 134. t. 2. f. 1. ab hac videtur diversissima et est forte nova hujus generis species.* W.

12. NEPETA *nuda*.

N. florum racemis verticillatis nudis, foliis cordato-oblongis sessilibus serratis. *Syst. veg.* 442. *Iacq. austr.* 1. p. 17. t. 24. *Hoffm. germ.* 203.

*Cataria* foliis imis cordatis obtusis, superioribus ovatis, verticillis sessilibus, densissimis, spicatis. *Hall. helv.* n. 248.

*Nepeta* foliis sessilibus nudis, calycibus fructus ovatis aequalibus. *Hort. upf.* 164. \*

*Cataria hispanica* *Betonicae* folio angustiori, flore albo. *Tournef. inst.* 202.

*Mentha Cataria hispanica*, olim *Sideritis* altissima. *Bauh. hist.* 3. p. 226. *quoad descriptionem*.

*Mentha Cataria hispanica*, angustioribus foliis. *Bauh. hist.* 3. p. 236. *quoad figuram*.

*Mentha montana purpurea major*, spica sparsa. *Barr. ic.* 601. *sed folia paulo breviora*.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 428.

Nackte Katzenmünze. W.

*Habitat in Helvetia, Hispania.* 4

Caulis *bipedales, glabri, stricti, quadrifulci: seniores atropurpurascentes*. Folia (*Stachydis palustris*) *sessilia, cordata, oblonga, serrata, obtusa, venosa, nuda, utrinque scabra*. Racemi *brachiati*. Bracteis *li-*

*nearibus, Floribus distinctis. Corolla albido-rufescens. palati barba albida, fauce punctis purpureis.*

*Flores caerulei et albi. Hall.*

\* 13. *NEPETA melissaefolia.*

*N. foliis cordatis ferratis petiolatis, verticillis pedunculatis corymbosis, calycibus longis striatis. Lamarck. encycl. I. p. 703.*

*Cataria cretica melissae folio alphodeli radice. Tournef. cor. 13.*

*Melissenblättrige Katzenmünze. W.*

*Habitat in Creta. 4*

*Radix e tuberibus fusiformibus uncialibus fuscis fasciculatis composita. Caulis sesquipedalis tetragonus pubescens. Folia petiolata cordata pubescentia grosse dentata ut in Eryfimo Alliaria. Verticilli pedunculati formant racemum terminalem. Corolla coerulea, labio inferiore coeruleo rubro punctato. Calyx longus tubulosus striatus. Lamarck l. c.*

14. *NEPETA hirsuta.*

*N. floribus sessilibus verticillato-spicatis, verticillis tomento obvoluis. Hort. cliff. 311. Roy. lugdb. 316. Mill. dict. n. 8.*

*Horminum spicatum, lavendulae flore et odore. Boec. sicc. 48. t. 25. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 428.*

*Rauhe Katzenmünze. W.*

*Habitat in Sicilia.*

15. *NEPETA italica.*

*N. floribus sessilibus verticillato-spicatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiolatis. Sp. pl. 798. Mill. dict. n. 5. Jacq. hort. 2. p. 51. t. 112.*

*Mentha Cataria minor alpina. Bauh. pin. 228. prodr.*

110.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 429.*

*Italienische Katzenmünze. W.*

*Habitat in Italia. D. Rathgeb. 4 (v. v.)*

*Radix perennis. Caulis pedalis. Folia cordata, obtusa, crenata, petiolata. Spicae terminales, verticillatae: verticilli remoti, sessiles, obvallati Bracteis lanceolatis, viridibus, lateribus albidioribus, longitudine calycum, acuminatis. Calyces erecti, aequales. Corollae albae.*

\*16. NEPETA *multibracteata*.

N. floribus sessilibus verticillato-spicatis, bracteis lanceolatis calyce longioribus pubescentibus, foliis petiolatis subtus villosis. W.

N. caule simplici, foliis cordatis crenatis, floribus dense spicatis, bracteis lineari-subulatis pubescentibus.

*Desf. fl. atl. 2. p. 11. t. 123.\**

Einfache Katzenmünze. W.

*Habitat in Atlante prope Tlemsen. 24*

*Differt a praecedente cui habitu similis; caule simplici, foliis acutioribus subtus villosis, bracteis pubescentibus calyce longioribus, floribus violaceis subsessilibus nec pedunculatis. W.*

\*17. NEPETA *reticulata*.

N. spicis terminalibus, bracteis oblongis acutis venoso-reticulatis coloratis, foliis cordato-lanceolatis pubescentibus, corollae lobis lateralibus reflexis. W.

N. foliis sessilibus lanceolatis, verticillis approximatis, bracteis ovatis venoso-reticulatis. *Desfont. atl. 2. p.*

*12. t. 124.\**

Netzblättrige Katzenmünze. W.

*Habitat in Atlante prope Tlemsen.*

*Bracteae numerosae maguae ovatae pallidae venoso-reticulatae margine saepe violaceae, Corolla pallide purpurea. Desfont. l. c.*

18. NEPETA *tuberosa*.

N. spicis terminalibus, bracteis oblongis acuminatis nervoso-lineatis coloratis, foliis cordatis pubescentibus, corollae lobis lateralibus reflexis. *Ait. Kew. 2. p. 286.*

N. spicis sessilibus terminalibus, bracteis ovatis coloratis, foliis summis sessilibus, *Sp. pl. 798. Hort. cliff. 311. Roy. lugdb. 316. Mill. dict. n. 7. Gouan. illustr. 36. Kniph. cent. 9. n. 72.*

N. tuberosa violacea spicata minor hispanica. *Barr. rar. t. 602.*

*Mentha tuberosa radice. Bauh. pin. 227.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 430.*

Knollige Katzenmünze. W.

*Habitat in Hispania, Lusitania. 24 (v. v.)*

*Caules simplices. Folia cordato-oblonga, rugosa, obtusiuscula, grosse serrata, pubescentia. Spica terminalis, longa, subinterrupta; Bracteis numerosis, cre-*

*ctis, ovatis, acutis, nervosis, rubro coloratis, margine pubescentibus, calyces obtegentibus, Flores violacei.*

\*19. *NEPETA lanata.*

*N. spicis terminalibus, bracteis ovatis nervoso-rugosis subscariosis, foliis oblongis cordatis villosis, corollae lobis lateralibus patentibus. Ait. Kew. 2. p. 286.*

*N. (lanata) floribus sessilibus verticillato-spicatis, bracteis ovatis longitudine calycis, foliis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus. Jacq. obs. 3. p. 21. t. 75.\**

*N. tuberosa spicata hispanica. Bocc. musf. 2. p. 44. t. 36. Barr. rar. t. 1131.*

Wollige Katzenmünze. W.

*Habitat in Europa australi. 4*

20. *NEPETA Scordotis.*

*N. spicis sessilibus terminalibus: bracteis subcordatis villosis, foliis cordatis obtusis. Amoen. acad. 4. p. 317.\**

*Scordium alterum lanuginosius verticillatum. Bauh. pin. 248.*

*Scordotis. Alp. exot. 284. t. 283. Clus. hist. 2. p. 312.*

*Cataria cretica humilis scordioides. Tournef. cor. 13.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 431.*

Gamanderartige Katzenmünze. W.

*Habitat in Creta. 5*

21. *NEPETA virginica.*

*N. capitulis terminalibus, staminibus flore longioribus, foliis lanceolatis. Sp. pl. 799. Mill. dict. n. 9.*

*Clinopodium foliis lanceolatis, capitulis terminalibus. Hort. cliff. 305. Gron. virg. 65.*

*Clinopodium, amaraci folio, floribus albis. Pluk. alm. 210. t. 85. f. 2.*

*Clinopodium, flore albo, ramosius, angustioribus foliis glabris, virginianum. Moris. hist. 3. p. 374. f. 11. t. 8. f. ult.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 431.*

Virginische Katzenmünze. W.

*Habitat in Virginia. 4*

*Labium inferius corollae serratum, at non concavum.*



22. *NEPETA malabarica.*

N. spica verticillata, bracteis filiformibus, foliis lanceolatis inferne integerrimis. *Mant.* 566.

N. malabarica, folio latiore, flore ex-coeruleo albido. *Morif. hist.* 3. p. 415.

Carim-tumba. *Rheed. mal.* 10. p. 185. t. 93.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 431.

Malabarische Katzenmünze. W.

*Habitat in Malabar.* (v. l.)

Caules erecti, obtusanguli, tomentosi. Folia ovato-lanceolata, tomentosa, serrata, versus basin integerrima, petiolata. Verticilli plurimi, quasi spica interrupta, remoti; Bracteis filiformibus, ad apicem fere crassioribus, pubescentibus, binis sub singulo flore, longitudine calycum. Calyx villosus, quinquedentatus. Corollae pallide violaceae: Labium superius lanceolatum, integrum, concavum margine revolutum, erectum, obtusum, filamentis brevius; Lab. inferius longius, latius, tripartitum: intermedio majore crenulato, margine deflexum. Koenig.

23. *NEPETA indica.* †

N. corollarum labio superiore integerrimo brevissimo.

*Sp. pl.* 799.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 432.

Indische Katzenmünze. W.

*Habitat in India.*

Labium corollae superius brevissimum omnium, integrum stamina autem longitudine labii inferioris. Flores verticillati. Affinis praecedenti.

Planta dubia, an eadem cum sequenti? Omnia a Linnaeo adducta synonyma pertinent ad *Lavandulam carnosam*. W.

24. *NEPETA amboinica.*

N. foliis cordatis obtusis crenatis, bracteis ovatis. *Lin.*

*suppl.* 273.

Amboinische Katzenmünze. W.

*Habitat in Amboina.* ‡

Caulis suffruticosus. Rami erecti tetragoni pubescentes, inferne atro-purpurascens. Folia opposita petiolata cordata obtusa, obtuse crenata supra lineata, mollissime subtomentosa viridia subtus venosa. Petioli apice dilatati breves. Flores subverticillati.

Bracteae duae minutae ovatae integerrimae. Corollae Labium superius album breve, inferius violaceum.

\* 25. *NEPETA madagascariensis.*

N. foliis ovato-subrotundis crenatis petiolatis subvillosis, racemo terminali nudo. *Lamarck encycl. 1. p. 705.*

Kurka. *Rheed. mal. 11. p. 49. t. 25.*

Madagascarische Katzenmünze. W.

*Habitat in Madagascaria, insula Mauritii, India. 24*

Radix fibrosa tuberibus subrotundis pollicaribus instructa. Tuberi sunt saporis Rapae et eduntur ab incolis. Caulis herbaceus simplex interdum ramosus pubescens pedalis. Folia petiolata ovato-subrotunda crenata ad nervos villosa, mollia, viridia. Flores rubo-violacei in spica tripollicari verticillata terminali nuda. Lacinia intermedia labii inferioris corollae magna concava crenata. *Lamarck l. c.*

26. *NEPETA multifida.*

N. floribus spicatis, foliis pinnatifidis integerrimis. *Sp. pl. 799. Pall. it. 2. p. 653.*

N. (lavendulacea) foliis ovatis inciso-ferratis lineatis, spica compacta. *Lin. suppl. 272.\**

Lavandula foliis ovatis saepe lobatis. *Gmel. sib. 3. p. 242. t. 55.*

Lavandula montana, folio valerianellae varie secto, caerulea. *Amm. ruth. 69.*

Betonica sibirica. *Walth. hort. 122. n. 20.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 432.*

Vielspaltige Katzenmünze. W.

*Habitat in omni Sibiria extra Jeniseam. 24 (v. v.)*

Caulis erectus absque ramis; Folia inferiora petiolata; superiora sessilia, non crenata, oblonga, triloba, quadriloba, quinqueloba: lobis alternis, oblongis. Flores valde parvi; Antherae bipartitae.

27. *NEPETA botryoides.*

N. floribus spicatis, corollae lobis lateralibus subpatulis, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus subaequalibus. *Ait. Kew. 2. p. 287.*

N. (multifida) foliis bipinnatis linearibus, floribus spicatis. *Lin. suppl. (excluso synonymo.)*

Nepeta bipinnata. *Cavan. ic. p. 36. t. 49.\**

N. (annua) foliis pinnato-multifidis linearibus, spicis terminalibus aphyllis. *Pall. Act. petrop. 1779. 2. p. 263. t. 12.\**

Feinblättrige Katzenmünze. W.

*Habitat in Sibiriae rupibus cotaceis ad Jeniseam fluvium.* ☉ (v. v.)

*Caulis erectus brachiatus quadrangularis. Folia bipinnata linearia nuda cordata, laciniis obtusis. Spica terminalis hexagona alba sessilis. Flores albi parvi. Labium superius acute hispidum erectum; inferius trifidum, laciniis lateralibus emarginatis, media biloba subcrenata.*

\* 1098. ELSHOLTZIA. W.

*Willd. in Uster. Mag. XI. p. 5.*

*Cal. tubulosus 5-dentatus. Cor. bilabiata; labium superius 4-dentatum; inferius superiori longius indivisum subcrenulatum. Stamina distantia.*

\* 1. ELSHOLTZIA *cristata*. W.

*E. spica solitaria unilaterali erecta. W.*

*E. cristata. Willd. in Usteri bot. Mag. XI. p. 5. t. 1.\**

*Hyllopus (ocymifolius) foliis ovatis dentatis, spicis secundis, floribus bracteis subrotundis postice obtectis.*

*Lamarck encycl. 3. p. 179.\* Schkuhr. bot. Handb.*

*2. p. 136. t. 167.\**

*Mentha Patrini. Nov. Act. Petrop. I. p. 336. t. 8.\**

*Hahnenkammförmige Elsholtzie. W.*

*Habitat in Sibiria ad lacum Baikal.* ☉ (v. v.)

*Caulis erectus pedalis ramosus tetragonus inferne glaber superne pubescens. Folia ovata petiolata dentata opposita glabra. Spica in caule et ramis terminalis e verticillis florum nutantium dimidiatis unilateribus composita. Bractee subrotundae integerrimae mucronatae nervoso-venosae obtegunt latus spicae exterius. Inter dentes calycis sunt villi post florescentiam conniventes. W.*

\* 2. ELSHOLTZIA *paniculata*. W. †

*E. spicis unilateribus reflexis paniculatis. W.*

*Hyllopus (crislatus) foliis ovatis dentatis inaequalibus, spicis interruptis secundis crispatis, bracteis imbricatis. Lamarck encycl. 3. p. 179.\**

*Manam-podam. Rheed. mal. 10. p. 129. t. 65.*

*Rispenblütige Elsholtzie. W.*

*Habitat in Indiae orientalis humidis.*

Planta adhuc dubii generis habitu praecedenti affinis. W.

## 1099. LAVANDULA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 769.*

*Cal. ovatus, subdentatus, bractea suffultus.*

*Corolla resupinata. Stamina intra tubum.*

### 1. LAVANDULA Spica.

L. foliis sessilibus lanceolato-linearibus margine revolutis, spica interrupta nuda. *Murr. syst. ed. 14. p. 530.*

L. foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis. *Hort. cliff. 303. Hort. ups. 162. Mat. med. 146. Roy. lugdb. 322. Sauv. monsp. 143. Mill. dict. n. 1. et 2. Sabb. hort. 3. t. 72. Kniph. cent. 4. n. 39. Willd. arb. 164. Villars delph. 2. p. 363.*

L. foliis linearibus, spicis nudis. *Hall. helv. n. 232.*

α. L. angustifolia. *Bauh. pin. 216.*

L. altera. *Dod. pempt. 273. Blackw. t. 294.*

β. latifolia. *Bauh. pin. 116. Blackw. t. 295.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 41.*

Gemeiner Lavendel. W.

*Habitat in Europa australi. † (v. v.)*

Varietas α. *Fruticans foliis linearibus. β. Annua foliis lanceolatis.*

Varietas β. etiam fruticans. *Clariff. Ehrhart Beitr. 7. p. 147. L. spicam α. et β. specie distinxit, sed varietates cultura ortas esse puto; licet α. foliis lineari-lanceolatis, bracteis obverse deltoideis acuminatis, calyce tomentoso, et β. spathulatis foliis, bracteis linearibus, calycibus tredecimfulcatis gaudeant. W.*

### 2. LAVANDULA Stoechas.

L. foliis sessilibus linearibus tomentosis margine revolutis, spica coarctata comosa, bracteis subtrilobis. *Ait. Kew. 2. p. 288.*

L. foliis lanceolato-linearibus, spica comosa. *Sp. pl. 800. Hort. cliff. 303. Hort. ups. 162. Mat. med. 297. Roy. lugdb. 323. Sauv. monsp. 143. Desfont. atl. 2. p. 13.*

Stoechas (*officinarum*) foliis lanceolato-linearibus pedunculatis brevioribus. *Mill. dict. n. 1.*

Stoechas purpurea. *Bauh. pin. 216. Blackw. t. 241.*

*Stoechas arabica.* Barr. ic. 301. Lob. ic. 429.

*Stoechas brevioribus ligulis.* Clus. hist. 1. p. 344. Morif. hist. 3. f. 11. p. 353. t. 1. f. 1.

β. *Stoechas cauliculis non foliolatis.* Bauh. pin. 216. Lob. ic. 430.

*Stoechas (pedunculata)* foliis lanceolato-linearibus, pedunculis longissimis. Mill. dict. n. 2.

*Stoechas longioribus ligulis.* Clus. hist. 1. p. 344. Morif. hist. 3. f. 11. p. 353. t. 1. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 44.

Schopf-Lavendel. W.

*Habitat in Gallia australi, Hispania, Africa boreali.* † (v. v.)

\*3. *LAVANDULA viridis.*

L. foliis sessilibus linearibus rugosis villosis margine revolutis, spica comosa, bracteis indivisis. l'Herit. fert. angl. 19. Ait. Kew. 2. p. 288.

Grüner Lavendel. W.

*Habitat in Madera.* †

*Differt a Stoechade: foliis rugosis villosis viridibus nec tomentosus canis, bracteis comaque integris viridibus nec subtrilobis purpurascensibus.* l'Herit. 1. c.

4. *LAVANDULA dentata.*

L. foliis sessilibus linearibus pectinato-pinnatis, spica coarctata comosa. Lin. fil. Diff. de Lavand. n. 4.

L. foliis pinnato-dentatis. Sp. pl. 800. Hort. cliff. 303. Roy. lugdb. 323. Lepech. itin. 1. p. 240. Kniph. cent. 2. n. 38.

*Stoechas folio serrato.* Bauh. pin. 216. Morif. hist. 3. f. 11. p. 354. t. 1. f. 6.

*Stoechas crispo folio.* Clus. hist. 1. p. 345. Lob. ic. 430.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 43.

Gezähnter Lavendel. W.

*Habitat in Hispania, Africa boreali, Oriente.* † (v. v.)

5. *LAVANDULA pinnata.*

L. foliis petiolatis pinnatis, foliolis cuneiformibus, spica imbricata. Lin. fil. Diff. de Lavand. n. 4. tab. 1. \*

Iacq. ic. rar. 1. t. 106. Miscell. 2. p. 318. \* Lamarck. encycl. 3. p. 414. \*

Gefiederter Lavendel. W.

*Habitat in Madera.* † (v. v.)

6. *LAVANDULA multifida.*

L. foliis petiolatis pinnatis incanis, foliolis decussive pin-

natifidis, spica simplici tetragona spirali, bracteis ovatis nervosis villosis. W.

L. foliis petiolatis pinnatis, foliolis decussive pinnatifidis, spica quadrangulari, angulis spiralibus. *Lin. fil. Diff. de Lav. n. 5.*

L. foliis bipinnatis incano-pubescentibus, spica tetragona subtomentosa spirali. *Lamarck. encycl. 3. p. 414.\**

L. foliis duplicato-pinnatifidis. *Vir. cliff. 56. Hort. cliff. 303. Roy lugdb. 322. Hort. upf. 162. Mill. dict. n. 3. Burm. ind. t. 38. f. 1? Kniph. cent. 4. n. 38. Desfont. atl. 2. p. 14.*

L. folio dissecto. *Bauh. pin. 216. Tournef. inst. 198.*

L. multifido folio. *Clus. hist. 1. p. 345. Lob. ic. 432. Barr. ic. 798. Moris. hist. 3. f. 11. p. 352. t. 1. f. 4. Rivin. t. 54. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 43.*

Vielspaltiger Lavendel. W.

*Habitat in Hispania et Africa boreali. † (v. v.)*

*Planta indica a Burmano delineata videtur diversa. W.*

\*7 **LAVANDULÀ abrotanoides.**

L. foliis petiolatis pinnatis glabriusculis, foliolis decussive pinnatifidis, spica ramosa interrupta tetragona, bracteis ovatis acuminatis nervosis glabris. W.

L. (*abrotanoides*) foliis bipinnatis subglabris viridibus, spica ramosa, bracteis nudis nervoso-striatis. *Lamarck encycl. 3. p. 414.\**

L. (*canariensis*) foliis duplicato-pinnatifidis hirsutis, spicis fasciculatis. *Mill. dict. n. 4.*

L. folio longiore tenuius et elegantius dissecto. *Tournef. inst. 198. Commel. rar. 27. t. 27.*

L. canaria, foliis tenuiter divisis. *Moris. hist. 3. p. 353. n. 5.*

L. canariensis maritima, spica multiplici coerulea. *Pluk. amalth. 209. t. 303. f. 5.*

Stabwurzartiger Lavendel. W.

*Habitat in Canariis † (v. v.)*

*Satis distincta a praecedente, colore foliorum, foliis magis et alio modo divisis, spica ramosa interrupta non spirali, bracteis glabris acuminatis. W.*

8. **LAVANDULA carnosa.**

L. foliis petiolatis ovato-cordatis ferratis carnosis, spica tetragona, calycibus recurvatis. *Lin. fil. Diff. de Lav. n. 6. tab. 2.\**

L. foliis cordatis crenatis glaberrimis. *Lin. supp. 273.*

*Nepeta indica* rotundiore folio. *Morif. hist.* 3. p. 415. f. 11. t. 6. f. 7.

Katu-Kurka. *Rheed. mal.* 10. p. 179. t. 90.

Dickblättriger Lavendel. W.

*Habitat in India orientali intra rupes prope Sadraffam.*

♂ (v. f.)

*Planta tempore florendi aphylla.*

## 1100. S I D E R I T I S.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 969.*

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* ringens lab. sup. 2fidum; infer. tripartitum. *Stam.* intra tubum corollae. *Stigma* brevius involvens alterum.

\* *Ebracteatae.*

### I. SIDERITIS *canariensis.*

*S. fruticosa* villosa, foliis cordato-oblongis acutis petiolatis, spicis verticillatis, ante florescentiam nutantibus, ramis divaricatis. *Syst. veg.* 443. *Mill. dict. n. 9. Iacq. hort.* 3. p. 18. t. 30.

*Stachys fruticosa*, foliis cordato-oblongis crenatis petiolatis. *Hort. cliff.* 310.

*Stachys ampliflora* verbasci foliis, floribus albis parvis non galeatis, spica betonicae. *Pluk alm.* 356. t. 322. f. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 434.

Canarisches Gliedkraut, W.

*Habitat in Canariis et insula Madera.* † (v. v.)

*Frutex* foliis cordatis, acuminatis, crenatis, utrinque viridibus. Spicae pedunculatae, longae, nutantes: verticillis remotis; Floribus numerosis; Calycibus hirtis mucronatis.

### \*2. SIDERITIS *candicans.*

*S. fruticosa* tomentosa, foliis ovato-lanceolatis cordatis apice attenuatis subtus niveis, verticillis suboctofloris remotis. *Ait. Kew.* 2. p. 289.

*Stachys canariensis* frutescens verbasci folio. *Comm. hort.* 2. p. 197. t. 99.

Weißliches Gliedkraut. W.

*Habitat in Madera.* † (v. v.)

3. *SIDERITIS cretica.*

S. fruticosa tomentosa, foliis cordato-oblongis obtusis petiolatis, ramis divaricatis, spicis verticillatis. *Sp. pl.* 801.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 434.*

Candisches Gliedkraut. W.

*Habitat in Creta. †*

Frutex ramis divaricatis, densissime tomentosis, niveis. Folia cordata, crenata, utrinque tomentosa, obtusa, subtus densissime tomentosa et nivea, supra viridia. Spica e dichotomia ramorum, pedunculata, pendula, tomentosa, nivea una cum calycibus obtusis. Floribus circiter octo in singulo verticillo.

4. *SIDERITIS montana.*

S. herbacea ebracteata, calycibus corolla majoribus spinosis: labio superiore trifido. *Sp. pl.* 802. *Kuiph. cent. 7. n. 87. Jacq. aust. 5. p. 16. t. 434.*

S. herbacea ex decumbenti erecta, calycibus corolla fere majoribus spinosis: labio superiore trifido. *Crantz. aust. p. 248.*

Cunila calycum labio spinoso: superiore trifido, inferiore bipartito. *Hort. cliff. 313. Hort. upf. 169. Roy. lugd. 329.*

*Sideritis montana*, parvo varioque flore. *Bauh. pin. 233.*

*Sideritis montana*, parvo flore nigro purpureo, capite medio croceo. *Col. ecphr. I. p. 198. t. 196.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 437.*

Berg Gliedkraut. W.

*Habitat in Italia, Austria. ☉ (v. v.)*

*Corollae flavae margine ferrugineo, calyce minores. Verticillis sexfloris absque bracteis.*

*In saxosis erecta, in pratis procumbens.*

\* 5. *SIDERITIS elegans.*

S. herbacea ebracteata villosa, caule diffuso, calycum laciniis subaequalibus spinulosis. *Murray. comment. goett. 1778. p. 92. t. 4.\**

S. (*nigricans*) herbacea ebracteata villosa, foliis ovato-subrotundis crenatis, calycibus subinermibus. *Lamarck. encycl. 2. p. 167.\**

*Mappia* foliis ovatis tomentosis, corollā alba cum limbo nigro. *Fabr. Helmst. 106.*



Schönes Gliedkraut. W.

*Habitat* - - - ☉ (v. v.)

*Calyces villosissimi subpungentes, lacinia suprema longiore. Corolla calyce paullo longior alba, labiis nigris; labium superius emarginatum.* W.

### 6. SIDERITIS romana.

S. herbacea decumbens ebracteata, calycibus spinosis: labio superiore ovato. *Sp. pl.* 802. *Mill. dict. n.* 2. *Desfont. atl.* 2. p. 15. \* *Cavan. ic.* 2. p. 69. t. 187. \*

Cunila calycum lacinia superiore latiori ovata trinervi.

*Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 321.

Sideritis genus verticillis spinosis. *Bauh. hist.* 3. p. 428.

Sideritis, verticillis spinosis, minor procumbens. *Moriss.*

*hist.* 3. p. 388. f. II. t. 12. f. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 438.

Römisches Gliedkraut. W.

*Habitat in agris Europae australis.* ♂ ☉ (v. v.)

*Calycis lobus quintus f. superior ovatus reliquis duplo latior. Corollae albae Marrubii, Labio superiore tantum emarginato. Verticilli sexflori absque bracteis. Caules depressi, rigiduli.*

\*\* *Bracteatae: bracteis integerrimis.*

### 7. SIDERITIS syriaca.

S. suffruticosa tomentoso-lanata, foliis lanceolatis subintegerrimis, floribus verticillato-spicatis, bracteis cordatis acutis tomentosis. W.

S. suffruticosa tomentoso-lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis. *Sp. pl.* 801. *Mill. dict. n.* 6. *Fabric. helmst.* 88. *Sabb. hort.* 3. t. 40.

Cunila calycibus inermibus lanigeris. *Hort. cliff.* 313.

S. cretica tomentosa candidissima, flore luteo. *Tournef. cor.* 12.

β. *Stachys fruticosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus.* *Hort. cliff.* 310.

*Stachys minor italica.* *Bauh. pin.* 236.

*Stachys lychnoides incana angustifolia flore aureo.* *Barr. ic.* 1187.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 436.

Syrifches Gliedkraut. W.

*Habitat in Italia, Creta, Oriente.* † (v. f.)

*Fruticulus facie Salviae sed longior. Folia Salviae Linnæi Spec. Plant. T. III. E*

*tomentosa lanata alba, inferiora petiolata, superiora sessilia. Flores ex albo-flavescentes.*

*Tota planta tomento densissimo albo tecta. Folia radicalia videntur integerrima sed attente adspecta ostendunt crenas minutissimas. Bractee cordatae ovatae acutae tomento albo tectae, calycibus parum breviores. W.*

\*8. **SIDERITIS taurica.**

*S. suffruticosa tomentosa, foliis lanceolatis crenatis, floribus verticillato-spicatis, verticillis approximatis, bracteis cordatis acuminatis nervoso-reticulatis. W.*

*Sideritis taurica. Stephan. in litt.*

*Sideritis syriaca. Pall. Nov. Act. Petrop. 10. p. 312.*

*Taurisches Gliedkraut. W.*

*Habitat in Tauria. † (v. l.)*

*Caulis suffruticosus. Rami pedales subramosi albotomentosi. Folia radicalia petiolata caulina sessilia, omnia crenata, tomento tenui induta rugoso-venosa. Bractee cordatae subrotundo-ovatae acuminatae nervosae reticulatae calycibus breviores, durante florescentia tomento tenui tectae, postea vero fere glabrae margine tantum villosae. Corollae luteae, tubo calyce minore. Diversissima a praecedente bracteis subtomentosis reliculato-nervosis et aliis notis. W.*

\*9. **SIDERITIS distans. W. †**

*S. suffruticosa incana, foliis lanceolatis integerrimis acutis, floribus verticillato-spicatis, verticillis distantibus, bracteis cordatis acuminatis mucronatis nervoso-reticulatis. W.*

*Entferntblütiges Gliedkraut. W.*

*Habitat - - - † (v. l.)*

*Accepi hanc plantam forte orientalem ex herbario antiquo sub nomine: Sideritis foliis conjugatis amplexicaulibus rigidis. Accedit ad praecedentem sed diversa: foliis acutis minus tomentosissimis integerrimis; caule tantum villoso, verticillis remotissimis, bracteis fere glabris mucronatis, corollae tubo calyce longiore, lacinia intermedia labii inferioris obtusa nec emarginata. Folia radicalia non vidi, ceterum videtur habitu a praecedente diversissima. W.*

10. **SIDERITIS perfoliata.**

*S. herbacea piloso-hispida, foliis superioribus lanceolatis amplexicaulibus denticulatis, bracteis cordatis acuminatis reticulato-nervosis margine pilosis. W.*

S. herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus amplexicaulibus: *Sp. pl.* 802. *Mill. dict. n.* 3. *Kuiph. cent.* 8. n. 86.

S. orientalis phlomidis folio. *Tournef. cor.* 12?

Stachys foliis oblongis acutis amplexicaulibus ferratis, floralibus cordatis acutis integerrimis. *Roy, lugdb.* 318.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 437.

Durchwachsenes Gliedkraut. W.

Habitat in Oriente. 4 (v. v.)

Caulis erectus herbaceus. Folia inferiora caulis petiolata, superiora sessilia opposita amplexicaulia: Floralia cordata integerrima acuminata. Corollae albae venis aliquot rufis.

### \*11. SIDERITIS ciliata.

S. herbacea, foliis petiolatis ovatis ferratis, bracteis nervosis ciliatis. W.

S. herbacea, foliis ovatis ferratis, bracteis ciliatis. *Thunb. jap.* 245.

Gefranztes Gliedkraut. W.

Habitat in Japonia.

Caulis herbaceus tetragonus erectus, uti tota planta villosus, pedalis et ultra ramulosus. Rami et Ramuli cauli similes inflexi. Folia petiolata ovata acuta serrata subtus pallida, supra punctis impressis pertusa, vix pollicaria. Petiolus folio paullo brevior. Florum spicae terminales lanceolatae erectae digitales. Bracteeae suborbiculatae acuminatae nervosae ciliatae. Differt facile ab aliis bracteis ciliatis non spinosis. *Thunb. l. c.*

\* \* \* Bracteeatae: bracteis dentatis.

### 12. SIDERITIS incana.

S. suffruticosa tomentosa, foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, bracteis dentatis, lobis lateralibus corollae labii inferioris acutis. W.

S. suffruticosa tomentosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus bracteisque dentatis. *Sp. pl.* 802. *Gouan. illustr.* 36.

S. suffruticosa tomentosa, foliis lanceolato-linearibus, inferioribus spathulato-ovatis, bracteis dentatis. *Carvan. ic.* 2. p. 69. t. 186.\*

S. hispanica erecta, folio angustiore. *Tournef. inst.* 191.

*Hyslopus montanus verticillatus major.* Barr. ic. 239.

*Bocc. mus. 2. p. 77. t. 67. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 438.*

Graues Gliedkraut. W.

*Habitat in Hispania, Loesling, Alstroemer. 3 (v. l.)*

*Habitus Lavandulae, sed tomentoso incanus. Truncus suffruticosus, basi plerumque decumbens, e quo Caules s. rami multi, tenuissime tomentosi, albi, erecti, elongati, pedales, tetragoni. Folia minus explicata, integerrima, lineata, tomentosa, alba: inferiora lineari-lanceolata, supra nuda; superiora linearia, remotiora; summa versus verticillos interdum dentata. Bracteae cordatae, dentatae, subspinosae. Verticilli sexflori. Calyces quinquedentati, incani. Corollae flavae: labio superiore erecto, lineari, saepe bifido; inferiore trifido: intermedia quadruplo latiore.*

*Variat foliis inferioribus lineari-spathulatis, superioribus linearibus et inferioribus linearibus, superioribus oblongis seu spathulatis, porro foliis integerrimis et subcordatis. W.*

\*13. *SIDERITIS virgata.*

*S. suffruticosa tomentosa, foliis linearibus integerrimis, bracteis dentatis, lobis lateralibus corollae labii inferioris obtusis. W.*

*S. tomentosa, foliis linearibus, verticillis distinctis compactis, bracteis multifidis, calycum dentibus spinosis.*

*Desfont. atl. 2. p. 15. t. 125.\**

Ruthenförmiges Gliedkraut. W.

*Habitat in Africae borealis montibus arenosis prope Mascar. 3*

*An praecedentis varietas? W.*

\*14. *SIDERITIS glauca.*

*S. herbacea perennis, pubescens incana, foliis lineari-spathulatis integerrimis, bracteis dentatis, lobis lateralibus corollae labii inferioris acutis. W.*

*S. radice perenni, foliis ovato-lanceolatis patulis glaucis subvillosis. Cavan. ic. 2. p. 68. t. 185.\**

*Hyslopus montanus verticillatus minor. Barr. ic. 250.*

Weißgraues Gliedkraut. W.

*Habitat in regno Valentino. 4*

*Admodum affinis S. incanae sed differt caule herbaeo, et quod non tomentosa sit. W.*

15. *SIDERITIS hyssopifolia.*

S. foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus aequalibus. *Sp. pl.* 803. *Mill. dict. n. 3.*

Betonica foliis ellipticis, obiter crenatis, verticillis spicatis, bractearum dentibus aristatis. *Hall. helv. n. 260.*

Sideritis foliis lanceolato-linearibus sessilibus glabris. *Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 322.*

S. alpina hyssopifolia. *Bauh. pin. 233.*

Sideritis VII. *Clus. hist. 2. p. 41.*

S. montana hyssopifolia minor. *Barr. ic. 172.*

β. S. (alpina) caulibus prostratis, foliis ellipticis apice serratis, spicis ovatis. *Villars. delph. 2. p. 373.*

S. montana trifido folio. *Barr. ic. 171. bona.*

S. alpina hyssopi folio in summitate crenato. *Tournef. inst. 191.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 439.*

Isohlättriges Gliedkraut. W.

*Habitat in* Hetruria, Pyrenaeis, Thuri. 2 (v. v.)

*Similis sequenti, caule magis tomentoso. Hall.*

16. *SIDERITIS Scordioides.*

S. foliis lanceolatis subdentatis supra glabris, bracteis ovatis dentato-spinosis, calycibus aequalibus. *Mill. dict. n. 5.*

Betonica foliis ellipticis, acute dentatis, bracteis ferratis aristatis, verticillis spicatis. *Hall. helv. n. 261.*

Sideritis montana scordioides glabra. *Barr. ic. 343.*

S. foliis hirsutis profunde crenatis. *Bauh. pin. 233.*

Sideritis f. ferruminatrix heraclea. *Lob. ic. 528.*

β. S. (hirta) caule basi decumbente, foliis lanceolatis dentatis hirsutis, bracteis cordatis dentato-spinosis, spicis elongatis. *Roth. catal. 1. p. 67.\**

S. hirsuta procumbens. *Bauh. pin. 233.*

S. montana scordioides tomentosa. *Barr. ic. 1160.*

Tetrahit herbariorum. *Lob. ic. 523.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 440.*

Gezähntes Gliedkraut. W.

*Habitat* Monspelii inque Hispania, Helvetia. 2 (v. v.)

*Caules supra terram parum perennantes, adscendentes, simplices. Differt a S. hirsuta* Caulibus erectioribus: *Foliis supra saepe glabris; Corollis etiam labio superiore luteis; Spicis ovatis, non interruptis; Bracteis ovatis, dentato-ciliatis.*

*S. hirta Rothii*, ab ipso auctore mecum communicata, est sola *S. Scordioidis* varietas, vidi enim specimina intermedia sensim in *S. Scordioidem* transeuntia. W.

\* 17. **SIDERITIS spinosa.**

*S. hirsuta*, foliis lanceolatis bracteisque cordatis dentato-spinosis. *Vahl. symb.* 1. p. 41.\*

*S. (spinosa)* suffruticosa lanuginosa, foliis oblongis dentibus spinosis, calycibus frutescentibus fauce lanatis. *Lamarck encycl.* 2. p. 168.\*

*S. spicis interruptis*, foliis lanceolatis utrinque dentato-spinosis. *Affo synop.* p. 74. n. 518.

*S. (subspinosa)* foliis lanceolatis acutis dentatis, dentibus subspinosis, bracteis orbiculato-acutis dentato-spinosis. *Cavan. ic.* 3. p. 5. t. 209.\*

Stachliches Gliedkraut. W.

*Habitat in Hispania.* † (v. l.)

18. **SIDERITIS hirsuta.**

*S. foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato-spinosis, caulibus hirsutis decumbentibus.* *Syst. veg.* 443.

*S. foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato-spinosis, caule hirta, spicis interruptis elongatis.* *Sp. pl.* 2. p. 803. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 4. n. 81. *Sabb. hort.* 3. t. 58.

Tetrahit caulibus procumbentibus, foliis sessilibus. *Ger. prov.* 272.

*Sideritis hirsuta procumbens.* *Bauh. pin.* 432.

*Sideritis III.* *Clus. hist.* 2. p. 40.

*Houttuyn Lin. Psi. Syst.* 7. p. 441.

Haariges Gliedkraut. W.

*Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia.* † (v. l.)

*Caulis rigidus, pilosus. Folia lanceolata, obtusiuscula, rugoso-plicata, serraturis 3 s. 4 subacutis. Bractee cordatae serrato-spinosae. Verticilli remotissimi, sessiles, sexflori, caule inter verticillos hirsutiore. Corollae flavae, tubo incurvo; Labio superiore lineari, semibifido, reflexo, erecto, nivo; L. inferiore minimo. Calyces hirti, spinis 5 aequalibus. Stamina intra tubum.*

\* 19. **SIDERITIS ovata.**

*S. herbacea pubescens, foliis petiolatis ellipticis obtusis*

crenatis, spica tetragona, bracteis ovatis dentato-spinosis. W.

S. (*ovata*) foliis ovatis crenatis, bracteis ferrato-spinosis quadrifariam imbricatis. *Cavan. ic. 1. p. 36. t. 48.\**

Eyförmiges Gliedkraut. W.

*Habitat in Peru, 4*

## 20. SIDERITIS *lanata*.

S. foliis cordatis obtusis villosis, calycibus muticis lanatis, spica longa, caule erecto. *Sp. pl. 804.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 442.*

Welliges Gliedkraut. W.

*Habitat in Aegypto, Palaestina. ☉*

Planta *spithamaea, erecta, tota lanata*. Caulis simplicissimus. Folia cordata, subsessilia, obsolete crenata, obtusa. Spica longior ipso caule, sessilis, terminalis e Verticillis sexfloris, remotis, valde lanatis. Corollae atro violaceae, longitudine calycis. Bractee ovatae, obsolete ferratae, lanatae.

## \*1101. BYSTROPOGON.

*Herit. fert. angl. 19.*

Cal. 5-subulatus, fauce barbatus. Corollae labium superius bifidum, inferius trifidum.

*Stam. distantia.*

### 1. BYSTROPOGON *pectinatum*.

B. paniculis compactis, floribus secundis, foliis ovatis.

*Herit. fert. angl. 19. n. 1.*

Nepeta (*pectinata*) spicis secundis, foliis cordatis nudis, caule frutescente, corollis minutis. *Sp. pl. 799.*

*Swartz obs. 225.\**

Galeopsis procerior, foliis ovato-acuminatis ferratis, spicis majoribus compositis, spicillis geminato-secundis.

*Brown. jam. 259.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 433.*

Einseitiger Kelchbart. W.

*Habitat in aridis cretaceis Jamaicae inque Peru. 5*

(v. l.)

Caulis orgyalis tetragonus laevis brachiatus vix fragrans. Folia petiolata cordata venosa nuda serrata.

Spicae terminales secundae interruptae vix foliatae.

Verticillis pedunculatis fastigiatis secundis: Bracteis

*setaceis plurimis longitudine florum. Calyx 5-partitus setaceus. Corolla lutea vix calyce major: Limbo 5-fido: laciniis quatuor aequalibus acutis patentibus; quinta s. labium purpurascens subrotundum. Stamina 4 longitudine corollae distantia. Stylus purpurascens. Stigmata simplicia. Floret hyeme.*

\*2. **BYSTROPOGON** *sidaefolium.*

B. paniculis laxissimis, pedunculis verticillatis filiformibus, foliis cordatis. *l'Herit. fert. angl. 19. n. 2.*

Sidablättriger Kelchbart. W.

*Habitat in Peru.*

3. **BYSTROPOGON** *suaveolens.*

B. pedunculis axillaribus solitariis, calycibus truncatis aristatis, foliis cordatis. *l'Herit. fert. angl. 19. n. 3.*

Ballota (*suaveolens*) foliis cordatis spicis foliosis, calycibus truncatis, aristis linearibus. *Sp. pl. 815. Jacq. amer. 172. Swartz. obs. 225.\**

Melospaerum hirsutum, foliis cordatis ferrato-sinuatis, floribus verticilliter spicatis. *Brown. jam. 257. t. 18. f. 3.*

Melissa jamaicana odoratissima. *Pluk. almag. 247. t. 306. f. 3.*

Melissa spicata lavandulam spirans major. *Plum. sp. 6. ic. 155. t. 163. f. 1.*

Mentastrum maximum flore caeruleo nardi odore. *Sloan. jam 64. hist. 1. p. 171. t. 102. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 488.*

Wohlrüchender Kelchbart. W.

*Habitat in Americae meridionalis campis. ☉ (v. l.)*

4 **BYSTROPOGON** *plumosum.*

B. paniculis dichotomis, calycibus plumosis, foliis ovatis subserratis subtus tomentosis. *l'Herit. fert. angl. 20. n. 4.*

Mentha (*plumosa*) caule fruticoso, foliis ovatis petiolatis serratis; subtus albo-tomentosis, paniculis dichotomis terminalibus. *Lin. suppl. 273.*

Befiederter Kelchbart. W.

*Habitat in Canariis, Nivaria. † (v. l.)*

*Dubius valde sum, an haec non sola sit varietas vel eadem cum B. canariensi, quamvis plumosis paniculis diversissima esse videtur. Caule foliisque illa simillima, nisi quod folia hujus subtus tomento albidiora. Pani-*



culae terminales et axillares per totum caulum dichotomae, per plures series divisae, divaricatis ramulis rotundam conservant formam, pilosae, tandem folia obtegunt, ut vix appareant in summitatibus ramorum. Calyces plani stellati, radiis subulatis villosissimis patentibus. Corolla parva. Receptaculum villosum.

*B. plumosum et organifolium jungunt B. canariense et punctatum praecedentibus.* l'Herit. l. c.

\* 5. **BYSTROPOGON organifolium.**

B. paniculis dichotomis, calycibus plumosis, foliis ovatis integerrimis subtus candidissimis. l'Herit. fert. angl. 20. n. 5.

Dostenblättriger Kelchbart. W.

Habitat in Nivaria. †

Admodum affine praecedenti, sed folia integerrima subtus nivea. l'Herit. l. c.

6. **BYSTROPOGON canariense.**

B. pedunculis dichotomis, floribus capitatis, foliis ovatis crenatis subtus villosioribus. l'Herit. fert. angl. 20. n. 6.

*Mentha (canariensis)* floribus capitatis axillaribus dichotomis, staminibus corolla brevioribus, foliis ovatis crenatis, caule arborecente. Sp. pl. 807. Hort. cliff. 307.

*Mentha canariensis frutescens*, foliis subtus lanugine candidissima villosis, floribus glomeratis e sinu foliorum, longioribus pediculis insidentibus. Pluk. alm. 248. t. 307. f. 2.

*Heliotropium (canariense)* foliis ovatis crenatis oppositis, floribus capitatis alaribus dichotomis, caule arborecente. Mill. dict. n. 5.

*Heliotropium canariense arborecens*, scorodoniae folio.

Comm. hort. 2. p. 129. t. 65.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 452.

Canarifcher Kelchbart. W.

Habitat in Madera et Canariis. †

\* 7. **BYSTROPOGON punctatum.**

B. pedunculis dichotomis, floribus capitatis, foliis ovatis dentatis glabris punctulatis. l'Herit. fert. angl. 20. n. 7. Punktirter Kelchbart. W.

Habitat in Madera. † (v. l.)

Laciniae calycinae non subulatae ut in caeteris, nihilominus congener. l'Herit. l. c.

## 1102. M E N T H A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 967.*

*Cor. subaequalis, 4-fida: lacinia latiore emarginata. Stamina erecta distantia.*

\* *Spicatae.*

1. MENTHA *Auricularia.*

*M. spicis oblongis, foliis oblongis ferratis pilosis sessilibus, staminibus corolla longioribus. Mant. 81. Mat. med. p. 147.*

*M. foetida. Burm. ind. 126.*

*Alopecuro-Veronica. Flor. zeyl. 411.*

*Veronica hirsuta latifolia zeylanica aquatica. Burm. zeyl. 228.*

*Majorana foetida. Rumph. amb. 6. p. 41. t. 16.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 443.*

*Stinkende Münze. W.*

*Habitat in Indiae aquosis. 2.*

*Zeylonensis descriptioni addendum: Calyx 5-fidus; Cor. 4-fida; Filamenta pilosa.*

2. MENTHA *sylvestris.*

*M. spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis sessilibus argute inaequaliter ferratis, staminibus corolla longioribus. W.*

*M. spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis ferratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. Hort. cliff. 306. Hort. upf. 168. Mat. med. 147. Dalib. paris. 177. Gort. gelr. 341. Hudf. angl. 221. Hoffm. germ. 203. Roth. germ. I. 247. II. 5.\**

*M. foliis elliptico-lanceolatis, ferratis, subtus tomentosis, spicis cylindricis, staminibus flore duplo longioribus. Hall. helv. n. 227.*

*M. sylvestris, folio longiore. Bauh. pin. 227.*

*Menthastrum spicatum, folio longiore candicante. Bauh. hist. 3. p. 221.*

*Menthastrum. Dod. pempt. 96. Lob. ic. 509. Blackw. t. 292.?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 444.*

*Wald-Münze. W.*

*Habitat in Germania, Anglia, Gallia. 2. (v. f.)*

*Folia albida.*

## \*3. MENTHA nemorosa. W.

M. spicis oblongis, foliis sessilibus ovatis acutis, aequaliter ferratis tomentosis, staminibus corollae aequalibus. W.

M. (*villosa*) spica oblonga, foliis sessilibus ovato-lanceolatis ferratis acutis villosis, staminibus corolla brevioribus. *Hudf. angl. p. 250.*

Mentha sylvestris. *Fl. dan. t. 484.*

Mentha suaveolens. *Ehrh. Beitr. 7. p. 149?*

Mentha altera. *Dod. pempt. 95.*

Sifymbria Mentha agrestis. *Lob. ic. 508.*

M. foliis utrinque niveis margine crispis.

Wilde Münze. W.

*Habitat in Germania, Dania, Anglia. 4 (v. v.)*

*Haec est nostra in Marchia Electorali spontanea, abunde a praecedente diversa: foliis ovatis aequaliter dentatis, staminibus corollae aequalibus, et toto habitu. Variat foliis majoribus et minoribus, utrinque candidis, vel subtus tantum, denique foliis margine crispis. Planta ab Hudsonio descripta huc pertinere videtur, icon vero Florae danicae figuram nostrae speciei exacte repraesentat. W.*

## \*4. MENTHA gratissima.

M. spicis oblongis, foliis sessilibus ovalibus argute aequaliter ferratis subtus incanis acuminatis, staminibus corollae aequalibus. W.

M. spicis cylindricis, foliis ovalibus acuminatis subtus hirsuto-tomentosis ferratis sessilibus, staminibus corollam aequantibus. *Roth. germ. I. 247. II. 6.\* Hoffm. germ. 203.*

M. spicis oblongis, foliis ovalibus subtus hirtis ferratis sessilibus, staminibus corollam aequantibus. *Wiggers primit. p. 43. n. 454.*

M. foliis elliptico-lanceolatis subtus tomentosis, spicis cylindricis, staminibus floris tubo aequantibus. *Hall. helv. n. 228.*

Angenehmste Münze. W.

*Habitat ad fossas Holfatiae, Germaniae, et in Helvetia. 4 (v. l.)*

*affinis sequenti sed distinctissima: foliis sessilibus, staminibus corolla non longioribus, bracteisque florum verticillis brevioribus, licet serraturis foliorum conveniat. W.*

\*5. MENTHA *niliaca*.

M. spicis oblongis, foliis ovato-lanceolatis subsessilibus, subtus incanis aequaliter argute ferratis, staminibus corolla longioribus. W.

M. tomentoso-incana, spicis oblongis, foliis ovato-lanceolatis ferratis sessilibus. *Vahl. symb.* 3. p. 75.

M. spicis oblongis, foliis ovatis ferratis villosis sessilibus. *Murr. syst. veg.* 532. *Iacq. hort.* 3. t. 87.

Mentha longifolia. *Forsk. cat. pl. aeg. n.* 353.

Aegyptische Münze. W.

Habitat in Aegypto. 4 (v. l.)

Folia sunt brevissime petiolata. W.

Planta spontanea tota incana, foliis mollissimis, spicis bipollicaribus, verticillis confertis. *Vahl. l. c.*

\*6. MENTHA *glabrata*.

M. floribus racemoso-verticillatis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis ferratis glabris. *Vahl. symb.* 3. p. 75.

M. (*Kahirina*) foliis ovato-lanceolatis acutis ferratis ferraturis descendentibus. *Forsk. descr.* 213.\*

Glatte Münze. W.

Habitat in Aegypto. 4

Tota glabra herbacea. Folia semipollicaria nervosa, oculo armato subtus punctata. Pedunculus terminalis. Verticilli octodecimflori: Flores novem in singulo pedunculo oppositi umbellati. Bractae lineares longitudine verticilli. Stamina corolla breviora. Stylus corolla longior. *Vahl. l. c.*

\*7. MENTHA *viridis*.

M. spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis ferratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 804.

*Mill. dict. n.* I. *Scholl. barb. n.* 1011. *Doerr. nass.* p. 152. *Hoffm. germ.* 203. *Roth. germ. I.* 247. *II.* 6.

M. spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis ferratis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325. *Huds. angl.* 221.

M. foliis elliptico-lanceolatis glabris, spicis cylindricis. *Hall. helv. n.* 229.

M. spicata. *Crantz. austr. p.* 328.

M. spicata, folio longo acuto glabro nigriori. *Bauh. hist.* 3. p. 220.

M. angustifolia spicata. *Bauh. pin.* 227.

Mentha. IV. *Dod. pempt.* 95.

*Mentha aquatica* spicata, foliis oblongis viridibus serratis acuminatis. *Gron. virg.* 167.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 444.

Grüne Münze. W.

*Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Helvetia.* 2 (v. v.)

*Affinis nimium M. sylvestri, sed minor et glabra.*

*Folia sunt brevissime petiolata, praesertim in planta culta.* W.

### 8. MENTHA rotundifolia.

*M. spicis oblongis, foliis subrotundis rugosis crenatis sessilibus.* *Sp. pl.* 805. *Huds. angl.* 251. *Reyg. ged.* 2. p. 100. *Pollich. pal. n.* 551. *Hoffm. germ.* 204. *Roth. germ. I.* 247. *II.* 6.

*M. foliis ovatis, rugosis, spicis cylindricis.* *Hall. helv.* n. 226.

*M. spicis confertis, foliis ovatis rugosis sessilibus.* *Mill. dict. n.* 8. R.

*M. sylvestris, rotundiore folio.* *Bauh. pin.* 227.

*Menthastrum folio rugoso rotundiore, spontaneum, flore spicato odore gravi.* *Bauh. hist.* 3. p. 219.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 445.

Rundblättrige Münze. W.

*Habitat in Germaniae, Angliae aquosis.* 2 (v. v.)

*Folia elliptica utrinque rotundata apice acuta hirta.*

*Spica ex verticillis interruptis, gracilis. Stamina corollae aequalia. Variat foliis majoribus et minoribus ut et fere glabris.* W.

\* \* Capitatae.

### 9. MENTHA crispa.

*M. spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam aequantibus.* *Hort. cliff.* 306. *Hort. upf.* 168. *Mat. med.* 147. *Mill. dict. n.* 7. *Kniph. cent.* 11. n. 75. *Hoffm. germ.* 204. *Roth. germ. I.* 248. *II.* 7.

*M. foliis rugosis, brevissime petiolatis, verticillis spicatis.* *Hall. helv. n.* 230.

*M. crispa rotundifolia spicata.* *Bauh. hist. p.* 217. R.

*M. crispa danica f. germanica speciosa.* *Morif. hist.* 3. p. 367. *f. II. t.* 6. *f.* 5.

*M. crispa.* *Riv. mon. t.* 50.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 446.

Krause Münze. W.

*Habitat in Sibiria, Helvetia, Hircynia, Germania.* 2  
(v. v.)

10. MENTHA *hirsuta*.

M. floribus capitatis, foliis ovatis serratis subsessilibus pubescentibus, staminibus corolla longioribus. *Mant.* 81. *Leers. fl. herb. n.* 436. *Hoffm. germ.* 204. *Roth germ. I.* 248. *II.* 7.

M. aquatica hirsuta s. Silymbrium hirsutius. *Bauh. hist.* 3. p. 224. *Morif. hist. p.* 370.

Silymbrium hirsutum. *Raj. angl.* 3. p. 233.

β. M. Silymbrium hirsuta, glomeratis et foliis rotundioribus. *Raj. angl.* 3. p. 233. t. 10. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 446.

Haarige Münze. W.

*Habitat in aquosis Angliae, in Hollandia.* *Osbeck.* *Germania.* 2.

*Differt a M. aquatica: Foliis magis sessilibus hirsutis: convenit staminibus corolla longioribus, et tota facie. Pistillum corolla longius. Corolla profunde 4-fida, fere regularis. Calyces ciliati.*

M. aquaticae varietatem facit *Haller.* R.

*Quam sub hoc nomine accepi, licet examissim cum descriptione quadraverit, mihi tamen varietas sequentis videbatur.* W.

11. MENTHA *aquatica*.

M. floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Fl. suec.* 482, 517. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. parif.* 177. *Crantz. austr. p.* 332. *Pollich. pal. n.* 552. *Blackw. t.* 32. *Kniph. cent. II. n.* 74. *Hoffm. germ.* 204. *Roth. germ. I.* 248. *II.* 7.

M. foliis ovato-lanceolatis, serratis, verticillis paucifimis, terminante maximo. *Hall. helv. n.* 225.

M. floribus lateralibus, glomeratis; foliis ovatis, serratis; staminibus corolla longioribus. *Scop. carn. n.* 748.

M. palustris. *Mill. dict. n.* 11.

M. palustris spicata. *Riv. mon. t.* 40.

M. rotundifolia palustris s. aquatica major. *Bauh. pin.* 227.

Silymbrium sylvestre. *Dalech. hist.* 677.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 448.

Pferde-Münze. W.

*Habitat in Europa ad aquas.* 2 (v. v.)

Planta non hirta. Verticilli terminales in capitulum  
f. spicam obtusam conferti; Stamina corolla longiora.

\*12. MENTHA citrata.

M. floribus capitatis, foliis ellipticis obtusis ferratis glabris petiolatis, staminibus corolla brevioribus. W.

M. (citrata) foliis ovatis petiolatis ferratis glabris, capitulis obtusis, staminibus corolla brevioribus. Ehrh.  
*Beitr.* 7. p. 150.

M. (adsperfa) calycibus punctis resinosis adsperfis, foliis ovatis ferratis glabris, caule glaberrimo, staminibus corolla brevioribus. Moench. *method.* 379.

Citronen-Münze. W.

*Habitat in Europa, forte in Palatinatu.* 2 (v. l.)

Folia elliptica apice et basi obtusissime ferrata utrinque glabra petiolata. Diversa a M. aquatica: foliis ellipticis obtusioribus, glabritie omnium partium, staminibus corolla brevioribus, et odore suavi citri. Varietas M. aquaticae staminibus corolla brevioribus a Pollichio indicata hujus videtur loci. W.

13. MENTHA piperita.

M. spicis capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus *Mat. med.* 148. *Blackw.* t. 291.

M. spicis brevioribus et habitioribus, foliis menthae fuscae, sapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. p. 234. t. 10. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 449.

Pfeffer-Münze. W.

*Habitat in Anglia.* 2.

Similis M. viridi, diversa tamen: foliis petiolatis basi rotundatis latioribus, dentibus non acuminatis, spica brevioris solitario, denique staminibus corolla brevioribus. W.

\*\*\* Verticillatae.

14. MENTHA sativa.

M. floribus verticillatis, foliis ovatis acutiusculis ferratis, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 805. *Fl. dan.* t. 794. *Hoffm. germ.* 224. *Roth. germ.* I. 248. II. 8.

M. crispata verticillata. *Bauh. pin.* 227.

*M. crispa verticillata*, folio rotundiore. *Bauh. hist.* 3. p. 415.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 450.

Zahme Münze. W.

*Habitat in Europa australi.* 2 (v. l.)

Folia petiolata utrinque angustata superne scabra, stamina corolla longiora. W.

\*15. *MENTHA dentata.* †

*M. floribus verticillatis*, foliis sessilibus ovatis acutis dentatis undulatis, staminibus corolla brevioribus. W.

*M. (dentata)* foliis ovatis rugosis serrato-dentatis glabris acutis, staminibus corolla brevioribus. *Moenchh. method.* 380. (exclusis synonymis.)

Gezähnte Münze. W.

*Habitat in Europa?* 2 (v. l.)

A praecedente diversa (nisi varietas verticillata *Menthae crispae*): foliis brevissime petiolatis superioribus sessilibus profunde inaequaliter dentatis undulatis, staminibus corolla brevioribus. An huc *Bauhiniorum* synonyma pertineant, me fugit. Descriptio *M. sativae* a *Clariff. Roth. l. c. evulgata* ad hanc forte spectat. W.

16. *MENTHA gentilis.*

*M. floribus verticillatis*, foliis ovatis acutis ferratis, staminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 805. *Crantz. austr.* p. 329. *Sabb. hort.* 3. t. 50. *Flor. dan. t.* 736.

*Hoffm. germ.* 204. *Roth germ. I.* 248. II. 8.

*M. hortensis verticillata*, ocymi odore. *Bauh. pin.* 227.

*Mentha verticillata minor acuta non crispa*, odore ocymi.

*Bauh. hist.* 3. p. 216.

*Mentha quarta.* *Fuchf. hist.* 291.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 450.

Garten-Münze. W.

*Habitat in Europa australiore.* 2 (v. l.)

Simillima *M. arvensi*, at minus *hirta*, Caulibus rubris; Stamina Tubo corollae non longiora: Verticilli laterales. Corollae infima lacinia acuta. Calyces adspersi punctis resinosis.

Descriptio *M. gentilis* a *Clariff. Roth data*, diversam plantam indicare videtur. Specimen meum habet calycem glabrum resinosis punctis obsitum. W.

17. *MENTHA arvensis.*

*Mentha floribus verticillatis*, foliis ovatis acutis ferratis,



staminibus corollam aequantibus. *Hort. cliff.* 307.  
*Fl. suec.* 481, 516. *Roy. lugdb.* 326. *Dalib. paris.*  
 178. *Mill. dict. n.* 13. *Scop. carn. n.* 746. *Pollich.*  
*pal. n.* 553. *Flor. dan. t.* 512. *Hoffm. germ.* 204.  
*Roth. germ. I.* 249. *II.* 9.

*M. floribus verticillatis, foliis hirsutis, ovato-lanceola-*  
*tis, verticillis tomentosis. Hall. helv. n.* 223.

*Mentha arvensis verticillata procumbens. Moris. hist.*  
 3. p. 369. f. II. t. 7. f. 5.

*Calamintha arvensis verticillata. Bauh. pin.* 229.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 450.

Acker-Münze. W.

*Habitat in Europae agris, frequens post messem. 2*  
 (v. v.)

*Caules diffusi; Verticilli laterales; Planta tota*  
*hirta; Stamina corollae limbo longitudine aequalia.*  
*Corollae lacinia infima obtusa. Calyces canescentes.*

*Stamina persaepe quoque intra tubum latent, ut in-*  
*trospectanti appareant, quam M. gentilem L. esse pu-*  
*taverim, nisi Barbae media lacinia obtusa fuisset.*  
*Pollich. l. c.*

\*18. *MENTHA austriaca.*

*M. floribus verticillatis, corollae laciniis omnibus obtusis,*  
*foliis subovatis villosis, staminibus corolla brevioribus.*

*Murr. syst. veg.* 14. p. 533. *Iacq. aust.* 5. t. 430.

*Hofst. synop.* 324. *Allion. pedem. n.* 73. t. 75. f. 2.\*

*M. (palustris) caule erecto villosa ramoso, foliis ovatis*  
*hirsutis serratis, calycibus pilosis, verticillis peduncu-*  
*latis petiolo brevioribus. Moench. method.* 380.

*M. floribus verticillatis, foliis glabris ovato-lanceolatis,*  
*verticillis subhirsutis. Hall. helv. n.* 224.

Sumpf-Münze. W.

*Habitat ad fossas et fluviorum ripas Germaniae, Au-*  
*striae, Italiae, 2 (v. v.)*

*Est forte sola praecedentis varietas locis udis na-*  
*scens. Verticilli sunt pedunculati et corymbos parvos*  
*in foliorum axillis formant. Sed quid est M. verticil-*  
*lata a Clariss. Viris Grimm et Reichard descripta?*  
*qui ambo stamina corolla longiora dicunt, quae sem-*  
*per in M. austriaca breviora sunt, licet millena speci-*  
*mina attente examinaverim. Longitudo staminum non*  
*tam varians videtur, quam ab auctoribus indicatam*  
*invento. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III*

F

*Mentha exigua ex observationibus acutissimi Botanici Clariff. Smith. (Act. Soc. Lin. Lond. 3 p. 18.) est Cunila pulegioides. W.*

19. MENTHA *canadensis.*

M. floribus verticillatis, foliis lanceolatis serratis petiolatis pilosis, staminibus corollam aequantibus. *Sp. pl.* 806.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 452.*

Canadische Münze. *W.*

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Differt a M. arvensi: Caule altiore, non ramoso, multum villoso; Foliis dimidio angustioribus, acutioribus, profundius serratis, obscuribus, pilis vagis adpersis, uti etiam calyces. Calyces quinqueidentati, subaequales. Corolla 4-fida: lobo superiore oblonga, longiore, integro; reliquis aequalibus. Stamina 4, intra tubum corollae. Stylus corolla longior, apice bifidus.*

20. MENTHA *Pulegium.*

M. floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 326. *Dalib. parif.* 173. *Mat. med.* 148. *Gort. gelr.* 334. *Crantz. austr. p.* 331. *Scop. carn. n.* 747. *Ludw. ect. t.* 195. *Sabb. hort. 3. t.* 49. *Hoffm. germ.* 205. *Roth. germ. I.* 249. *II.* 12.

M. caule prostrato, foliis subrotundis, obiter dentatis, staminibus exsertis. *Hall. helv. n.* 221.

*Pulegium (vulgarē) foliis ovatis obtusis, staminibus corollam aequantibus. Mill. dict. n.* 1.

*Pulegium latifolium. Bauh. pin.* 222.

*Pulegium. Riv. mon. c.* 25. *f.* 1. *Blackw. t.* 302.

*Fuchf. hist.* 199.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p.* 453.

Poley-Münze. *W.*

*Habitat in Germaniae, Galliae, Angliae, Helvetiae inundatis. 4 (v. v.)*

21 MENTHA *cervina.*

M. floribus verticillatis, bracteis palmatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 307. *Hort. upf.* 168. *Sauv. monsp.* 143.

M. foliis lanceolatis punctatis, sub verticillo palmatis. *Hall. helv. n.* 222.

*Pulegium (cervinum)* foliis linearibus, floribus verticillatis. *Mill. dict. n.* 3.

*Pulegium angustifolium.* *Bauh. pin.* 222. *Morif. hist.* 3. p. 371 f. 11. t. 7. f. 7. *Riv. mon. t.* 23. f. 2. *Blackw.* t. 304.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 454.

Hirsch - Münze. W.

*Habitat* Monspeli et ad Rhodanum. 4 (v. v.)

## 22. MENTHA *perilloides*. †

*M. racemis secundis lateralibus.* *Syst. veg.* 445.

*Ocimum frutescens.* *Sp. pl.* 2. p. 832.

*Ocimum foliis lanceolato-ovatis, radice perenni.* *Hort. cliff.* 315. *Fl. zeyl.* 225.\* *Roy. lugdb.* 222.

*Cottam. Rheed. mal.* 10. p. 153. t. 77.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 456.

Indische Münze. W.

*Habitat in India.* ☉

Stamina corollis breviora. Similis *Perillae ocymoidi*.

Synonyma *Horti cliff.* et *Rheedi ad sequentem forsan plantam spectant.* R.

Quod ad *Rheedi figuram spectat, simillima est Perillae.* W.

## 1103. PERILLA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 968.

*Calycis lacinia suprema brevissima. Stamina diflantia. Styli duo connexi.*

### I. PERILLA *ocymoides*.

*P. ocymoides.* *Syst. veg.* 445.

*Melissa maxima, foliis ovato-oblongis ferratis utrinque acutis basibus mucronato-glandulosis spicis secundis.*

*Arduin. spec.* 2. p. 28. t. 13.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 46.

Basilicumartige Perille. W.

*Habitat in India.* ☉ (v. v.)

Caulis simplex, strictus, obtusus, quadrangulus, hirtus. Folia ovata, nudiuscula, serrata: petiolis longitudine foliorum. Racemi terminales et laterales hirti, erecti: Floribus parvis, albis, solitariis f. ternis; Calyce hirto, Bracteis flore longioribus, subsiliaceis.

## \*1104. H Y P T I S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 969.*

*Cal.* 5-dentatus. *Cor.* ringens, labium superius bifidum; inferius tripartitum, lacinia intermedia sacculiformis! *Stamina* declinata.

\*1. HYPTIS *verticillata*.

*H. floribus verticillatis, foliis lanceolatis dentatis.* W.

*H. (verticillata) floribus verticillatis.* *Jacq. ic. rar. 1. t. 113. Collect. 1. p. 101.\**

Wirtelblättrige Linksblume. W.

*Habitat in Hispaniola.* † (v. l.)

*Differt a sequentibus pedunculis unifloris axillaribus verticillatis, verticillis paucifloris. Flores admodum parvi.* W.

\*2. HYPTIS *capitata*.

*H. capitulis pedunculatis involucretis, involucretis lanceolatis longitudine florum, foliis ovatis dentatis.* W.

*H. (capitata) floribus capitatis.* *Jacq. ic. rar. 1. t. 114. Collect. 1. p. 102.\**

*Clinopodium (capitatum) foliis planis glabris, capitulis axillaribus pedunculatis.* *Swartz. prod. 88.*

*Clinopodium subhirsutum, foliis crenatis utrinque acuminatis, floribus conglobatis pedunculis longis alaribus insidentibus.* *Brown. jam. 259.*

*Melissa altissima globularia.* *Plum. spec. 6.*

*Mentha americana inodora foliis subincanis.* *Raj. suppl. 284.*

*Sideritis spicata scrophulariae folio, flore albo, spicis brevibus habitioribus rotundis, pedunculis insidentibus.*

*Sloan. jam. 65. hist. 1. p. 174. t. 109. f. 2.*

*Scabiosae affinis chrysanthemi facie lamii foliis americana.* *Pluk. alm. 335. t. 222. f. 1.*

Kopfförmige Linksblume. W.

*Habitat in Jamaicae et Hispaniolae umbrosis.* † (v. l.)

3. HYPTIS *radiata*. W.

*H. capitulis pedunculatis involucretis, involucretis lanceolatis flore longioribus, foliis oblongis dentatis basi attenuatis.* W.

*Clinopodium (rugosum) foliis rugosis, capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis.* *Sp. pl. 822. Mill. dict. n. 3.*

*Clinopodium rugosum capitulis Scabiofae. Dill. elth.*  
88. t. 75. f. 86.

*Mentha melissoides americana. Pluk. mant. 129.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 518.*

Gestrahlte Linksblume. W.

*Habitat in Carolina. 4 (v. l.)*

\*4. *HYPTIS Chamaedrys.*

*H. capitulis pedunculatis involucretis, involucretis linearibus pilosis flore brevioribus, foliis ovatis crenatis. W.*

*Clinopodium (Chamaedrys) capitulis axillaribus pedunculatis, foliis ovato-oblongis crenatis. Vahl. symb.*  
3. p. 77.

Behaarte Linksblume. W.

*Habitat in Gujana. (v. l.)*

*Caulis purpurascens villosus, uti tota planta. Folia petiolata obtusa venosa erenato-serrata pollicaria. Petiolus longitudine fere foliorum. Pedunculi folia aequantes filiformes axillares solitarii alterni. Flores in capitulo parvo globoso collecti. Involucra linearilanceolata pubescentia. Calyces quinquedentati, dentibus lanceolatis. Vahl. l. c.*

1105. *G L E C H O M A.*

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 970.*

*Antherarum singulum par in formam crucis connivens. Cal. 5-fidus.*

I. *GLECHOMA hederacea.*

*G. foliis reniformibus crenatis. Hort. cliff. 307. Fl. suec. 483, 518. Roy. lugdb. 320. Mat. med. 149. Pollich. pal. n. 554. Gort. ingr. 92. Ludw. ect. t. 62. Knorr. del. 2. t. G. I. Hoffm. germ. 205. Roth. germ. I. 246. II. 3.*

*Chamaeclema caule procumbente radicato, foliis reniformibus, rotunde crenatis. Hall. helv. n. 245.*

*Calamintha hederacea. Scop. carn. n. 730.*

*Glechoma caulibus procumbenti-erectis radicatis, foliis renum aut cordis forma, crenatis. Cranz. austr.*  
p. 247.

*Hedera terrestris vulgaris. Bauh. pin. 306. Blackw. t. 225. Riv. t. 67.*

*Chamaecissus. Fuchsf. hist. 876.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 456.*

Gemeiner Gundermann. W.

*Habitat in Europae septentrionalioris sepibus, 2 (v. v.)*

Variat flore albo; alia datur varietas flore majore.  
Vaill. par. t. 6. f. 4. Hall.

## 1106. L A M I U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 971.*

*Corollae* labium sup. integrum, fornicatum;  
lab. inf. 2-lobum; faux utrinque margine  
dentata.

### 1. LAMIUM Orvala.

L. foliis cordatis inaequaliter arguteque serratis, corollis fauce inflata, calyce colorato. *Sp. pl.* 808. *Hoffm. germ.* 206.

L. (*pannonicum*) foliis cordatis petiolatis, corollae galea ferrata, tubo longiore. *Scop. carn. n.* 699. *t.* 27.

L. maximum sylvaticum alterum. *Bauh. pin.* 231.

L. montanum laxatile ferme glabrum, flore amplo purpureo: labio inferiore crenulato. *Till. pis.* 92. *t.* 34. f. 1?

Galeopsis maxima pannonica. *Clus. hist.* 2. p. 35.

β. Orvala garganica. *Sp. pl.* 2. p. 807.

Papia garganica, foliis urticae alternis, et eleganter incilis, flore purpureo. *Michel. gen.* 20. *t.* 17.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 458.

Großblütiger Bienensaug. W.

*Habitat in Pannonia, Italia, Istria. 2 (v. f.)*

Orvala garganica mera varietas est Lamii Orvalae, ex loco umbroso rorido tecta, confirmante Horto Bononiensi literis D. Bassi.

### 2. LAMIUM laevigatum.

L. foliis cordatis rugosis, caule laevi, calycibus glabris longitudine tubi corollae. *Sp. pl.* 808. *Pall. it.* 3. p. 34. *Sabb. hort.* 3. *t.* 34.

L. purpureum foetidum, folio parvo acuminato, flore majore. *Pluk. phyt.* 198. f. 1.

L. purpureum non foetens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

L. subrotundo rugoso folio, flore rubro. *Bocc. mus.* 2. *t.* 23.

Galeopsis flore purpurascente majore, folio non maculato. *Bauh. hist.* 3. p. 321. *Raj. hist.* 559.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 460.*

Glatter Bienenfaug. W.

*Habitat in Italia, Sibiria. 2.*

Caules *purpurascens*. Folia *serrata, vix pubescentia*. Verticilli *utrinque subquinqueflori*. Calycum *dentis ventre suo duplo longiores, absque maculis fuscis ad basin*. Corollae *dentis laterales latiores, lanceolati nec setacei, antrorsum porrecti; Labio inferiore patente, nec lobis reflexis parallelis,*

Calyx *similis L. Orvalae.*

\*3. LAMIUM *rugosum*.

L. foliis *cordatis acutis rugosis caulibusque pilosis, verticillis multifloris, faucis dente unico setaceo. Ait. Kew. 2. p. 296.*

L. *subrotundo rugoso folio, flore rubro. Bocc. mus. 2. p. 35. t. 23.*

Runzlicher Bienenfaug. W.

*Habitat in Italia. 2 (v. l.)*

4. LAMIUM *garganicum*.

L. foliis *cordatis pubescentibus, corollis fauce inflata, tubo recto, dente utrinque gemino. Sp. pl. 808. Mill. dict. n. 3.*

L. *garganicum subincanum, flore purpurascens: labio superiore crenulato. Till. pis. 93. t. 34. f. 2.*

L. *catariae folio, flore purpureo. Act. paris. 1717. p. 351.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 460.*

Italienischer Bienenfaug. W.

*Habitat in Gargano monte ad castrum angeli. 2 (v. l.)*

Caules *pubescentes*. Folia *obtusiuscula, sublobato-serrata, pubescentia, non vero scabra*. Verticilli *multiflori*. Corollae *tubi recti, nec ad basin ut in reliquis curvati*. Labium *superius 4-dentatum, patens, nec compressum.*

5. LAMIUM *maculatum*.

L. foliis *cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. Sp. pl. 809. Leers. herb. n. 448. Mattusch. sil. 432. Kniph. cent. 3. n. 50. Hoffm. germ. 206. Roth. germ. I 252. II. 21.*

L. *alba linea notatum. Banh. pin. 231.*

L. *Plinii montanum campoclarensum. Col. ecphr. I. p. 190. t. 185.*

*L. maculatum.* Bauh. pin. 231.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 461.

Gefleckter Bienensaug. W.

Habitat in Italia, Germania, Silesia. 4 (v. v.)

Affine *nimum* L. albo, *diversum*: Corollis purpureis; Foliis *area longitudinali alba*; Petiolis non dilatatis: Floribus utrinque 5, nec 10. Corollae fauce utrinque dentibus 2, superiore setaceo. Macula foliorum alba aestate disparet.

Differt a *L. albo* praeter floris colorem et foliorum maculas: labio superiore obsolete denticulato acuto, quod in albo obtusissim retusume integerrimum. W.

## 6. LAMIUM album.

*L. foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris.* Hort. cliff. 314. Fl. suec. 493, 520. Mat. med. 149. Roy. lugdb. 319. Dalib. paris. 178. Oed. dan. 594. Pollich. pal. 555. Ludw. ect. t. 162. Blackw. t. 33. Knorr. del. I. t. N. 8. Hoffm. germ. 206. Roth. germ. I. 253. II. 21.

*L. foliis cordato-lanceolatis serratis, verticillis multifloris.* Hall. helv. n. 271.

*L. (foliojum) foliis cordatis acuminatis petiolatis, calycibus saepe maculatis.* Crantz. austr. 258.

*L. foliis cordatis petiolatis; corollae galea crenulata, tubi longitudine.* Scop. carn. I. p. 466. n. 2. ed. 2. n. 700.

*L. album non foetens, folio oblongo.* Bauh. pin. 231. Galeopsis. Cam. epit. 865. Riv. t. 62.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 462.

Weisser Bienensaug. W.

Habitat in Europae cultis 4 (v. v.)

Calyces macula fusca notati sunt. Variat flore carneo.

## \*7. LAMIUM molle.

*L. foliis petiolatis subdentatis, inferioribus cordatis, superioribus ovatis.* Ait. Kew. 2. p. 297.

*L. perietariae facie.* Moris. blaes. 278.

Ungezähnter Bienensaug. W.

Habitat - - - 4 (v. l.)

Facile dignoscitur foliis subintegerrimis nec serratis, nec crenatis. Flores albi. Ait. l. c.

## 8. LAMIUM purpureum.

*L. foliis cordatis obtusis aequaliter obtuse dentatis petiolatis, W.*



*L. foliis cordatis obtusis petiolatis.* Hort. cliff. 314.  
*Fl. suec.* 494, 521. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. parif.* 179. *Oed. dan.* 532. *Pollich. pal. n.* 556. *Hoffm. germ.* 206. *Knorr. del. i. t. N. 9.* Roth. germ. I. 253. II. 22.

*L. foliis cordatis obtusis, in summo ramo congestis.*  
*Hall. helv. n.* 272.

*L. (nudum) foliis cordatis obtusis, in summo caule congestis.* Crantz. austr. 259.

*L. foliis cordatis, petiolatis; corollae galea integerrima, tubo brevior.* Scop. carn. n. 701.

*Galeopsis minor.* Riv. mon. t. 62.

*Lamium rubrum.* Blackw. t. 152. f. 1.

*Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo.* Bauh. pin. 230.

*Urtica iners altera.* Dod. pempt. 153.

*Galeopsis 2.* Tabern. 545. bene.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p.* 463.

Rother Bienenfaug. W.

*Habitat in Europae cultis.* ☉ (v. v.)

\*9. *LAMIUM incisum.* W.

*L. foliis cordatis acutiusculis inciso-dentatis petiolatis, corollis calyce angustioribus.* W.

*Lamium purpureum c hybridum.* Villars delph. 2. p. 385.

*Lamium purpureum β.* Lamarck. encycl. 3. p. 396.

*L. rubrum minus, foliis profunde incis.* Tournef. inst. 184. *Vaill. parif.* 112. *Raj, angl. 2. p.* 179. *Pluk. alm.* 204. t. 41. f. 3.

*Ballote crispa major.* Dalech. hist. 1253.

Eingeschnittener Bienenfaug. W.

*Habitat in Gallia australi.* ☉ (v. l.)

*Differt a praecedente: foliis profunde cordatis, inciso-dentatis, floribus angustioribus.* W.

\*10. *LAMIUM bifidum.*

*L. foliis cordatis, corollarum galea bifida: laciniis divaricatis.* Vahl. symb. 3. p. 75.

*L. (bifidum) foliis cordatis acuminatis, corollae labio superiore bifido, laciniis divaricatis.* Cyrill. rar. fasc. I. p. 22. t. 7.

*L. parvum flore albo, cum labio superiori bifido.* Till. pif. 93.

Zweyspaltiger Bienenfaug. W.

*Habitat in regno Neapolitano.*

Caules semipedales decumbentes glabri basi ramosi. Folia duo vel trium parium inferne in caule, infima appropinquata, superne nulla, nisi sub verticillis, aequaliter profunde serrata attenuata, leviter villosa. Verticilli approximati 6-8-flori. Calyces villosi, laciniis subulatis aristatis. Corolla magnitudine L. purpurei, fauce inflata, extus villosa. Galea bifida: laciniis linearibus erectis vix semiunguicularibus. Vahl. l. c.

\* II. LAMIUM tomentosum. W.

L. foliis subrotundo-cordatis obtuse dentatis utrinque tomentosis petiolatis. W.

L. orientale incanum, flore albo cum labio superiori crenato. Tournef. cor. II.

Filziger Bienenflug. W.

*Habitat in Armenia. (v. f.)*

Tota planta albo-tomentosa mollissima. Folia subrotundo cordata petiolata, obtuse dentata acutiuscula. Verticilli multiflori. Calyces villosissimi, dentibus lanceolatis. Corolla magnitudine L. albi. Galea obtusa villosa sub lente adspecta denticulata. Dentes faucis solitarii lanceolato-subulati longi. W.

12. LAMIUM amplexicaule.

L. foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis, Hort. cliff. 314. Fl. suec. 495, 522. Roy. lugdb. 319. Gron. virg. 66. Dalib. parif. 179. Crantz. ausr. p. 257. Flor. dan. t. 752. Pollich. pal. n. 557. Kniph. cent. II. n. 61. Hoffm. germ. 207.

L. foliis radicalibus petiolatis lobatis, superioribus rotundis, amplexicaulibus, incis. Hall. helv. n. 273.

L. foliis imis petiolatis; superioribus sessilibus, amplexicaulibus. Scop. carn. n. 702.

L. folio caulem ambiente, minus. Bauh. pin. 231. Riv. t. 63.

Pollichia (amplexicaulis) calycibus inermibus, corollae labio inferiore bifido, foliis caulinis sessilibus rotundatis incis, radicalibus petiolatis cordato-lobatis. Willd. prod. n. 614. Roth. germ. I. 254 II. 27.

Morsus gallinae, folio hederulae, alterum. Lob. ic. 463.

β. Lamium, folio caulem ambiente, majus. Bauh. pin. 231.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 464.

Stengelumfallender Bienenflug. W.

*Habitat in Europae cultis.* ☉

Dentes faucis corollae revera ut in reliquis ad-  
sunt. W.

13. *LAMIUM multifidum.*

L. foliis multipartitis. *Hort. cliff.* 315. *Pall. it.* I. p.  
168.

L. orientale, foliis eleganter laciniatis. *Tournef. cor.*  
II. *Comm. rar.* 26. t. 26.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 464.

Schlitzblättriger Bienenfaug. W.

*Habitat in Oriente.* ☉

1107. *GALEOPSIS.*

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 972.

*Corollae* labium superius subcrenatum, forni-  
catum; lab. infer. supra 2-dentatum.

1. *GALEOPSIS Ladanum.*

G. internodiis caulinis aequalibus, verticillis omnibus  
remotis, calycinis dentibus subulatis aristatis patulis,  
caule subpubescente. W.

G. internodiis caulinis aequalibus: verticillis omnibus  
remotis, calycibus inertibus. *Syst. veg.* 446. *Pol-  
lich. pal. n.* 558. *Scop. carn.* 727. *Kniph. cent.* 12.

G. verticillis omnibus remotis, calycibus campanulatis  
pubescentibus, dentibus lineari-setaceis divergentibus  
longioribus. *Roth. germ.* I. 253. II. 23. *Hoffm.  
germ.* 207.

G. foliis linearibus ferratis, verticillis diffitis. *Hall.  
helv.* 266.

*Lanium (Ladanum)* internodiis caulinis aequalibus:  
verticillis omnibus remotis, foliis longe ellipticis sub-  
hirsutis. *Crantz austr.* p. 260.

*Sideritis arvensis angustifolia rubra.* *Bauh. pin.* 233.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 465.

Schmalblättriger Hohlzahn. W.

*Habitat in Europae sterilibus, arvis, agris.* ☉ (v. v.)

2. *GALEOPSIS grandiflora.*

G. internodiis caulinis superne subincrassatis, verticillis  
omnibus remotis, calycinis dentibus lanceolatis mu-  
cronatis erectis caule pubescente, pilis glandulosis. W.

*G. (grandiflora)* verticillis omnibus remotis, calycibus tubulosis hirsutis, dentibus lanceolato-acuminatis multo brevioribus rectis. *Roth. germ. I. 254. II. 24. Hoffm. germ. 207.*

*G. (Ladanum)* internodiis caulinis aequalibus verticillis omnibus remotis. *Sp. pl. 810.*

*G.* ramis summis pubescentibus. *Hort. cliff. 344. Fl. succ. 492, 524. Roy. lugdb. 319. Dalib. paris. 181.*

*Galeopsis dubia. Leers. herb. n. 453.*

*G.* foliis rhomboideis ferratis sericeis, verticillis diffitis. *Hall. helv. n. 267.*

*Ladanum* segetum folio latiore. *Riv. t. 24.*

Großblütiger Hohlzahn. *W.*

*Habitat in agris Germaniae, Galliae.* ☉ (v. f.)

*Caulis genicula vix tumescens. Calycis dentes vix spinosif. pungentes. Corollae galea crenata. Mant. 411.*

*Linnaeus hanc et praecedentem conjunxerat, et in systemate vegetabilium primam in speciebus et mantissa altera hanc intellexisse videtur. Differt enim haec: caule pubescente, pilis apice glandula instructis, foliis hirsutis pilis adpressis frequentioribus, calycibus brevioribus, dentibus lanceolatis rectis mucrone parvo instructis, corollis quadruplo majoribus, bracteis lanceolatis erectis calyce brevioribus submucronatis, nec, ut in praecedente, lineari-lanceolatis longe mucronatis recurvatis calycis longitudine. W.*

### 3. GALEOPSIS *Tetrahit.*

*G.* internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus, corollis calyce parum longioribus, caule hirto. *W.*

*G.* internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus. *Sp. pl. 810. Pollich. pal. n. 559. Scop. carn. n. 728. Gunn. norv. n. 75. Kniph. cent. 8. n. 43. Hoffm. germ. 207. Roth. germ. I. 254. II. 24.*

*G.* caule hirto, foliis ovato-lanceolatis, ferratis *Hall. helv. n. 268.*

*G.* ramis summis strigosis. *Hort. cliff. 314. Fl. succ. 491, 523. Roy. lugdb. 319. Dalib. paris. 181.*

*C.* corolla rubra aut alba. *Fl. lapp. 237.*

*Urtica aculeata, foliis ferratis. Bauh. pin. 232.*

*Cannabis spuria. Riv. mon. 44.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 466.*

Gemeiner Hohlzahn. *W.*

*Habitat inter Europae segetes et olera.* ☉ (v. v.)

*Caulis geniculis tumidis. Calycis dentes spinosi s. pungentes. Corollae galea crenata.*

\*4. **GALEOPSIS** *cannabina*.

G. internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus, corollis calyce quadruplo longioribus, caule hirto. W.

G. (*cannabina*) verticillis summis subcontiguis, calycibus tubulosis, dentibus paulo brevioribus linearibus inaequalibus, tribus majoribus. *Roth. germ. I. 254. II. 25. Hoffm. germ. 207. Fl. dan. t. 929.*

G. (*cannabina*) foliis ovato-lanceolatis serratis, caule hirsuto, flore calyce quadruplo majore. *Pollich. palat. n. 560.*

G. corolla flava, labio inferiore maculato. *Fl. lapp. 237. β.*

Galeopsis Tetrahit β. *Sp. pl. 810.*

G. caule hirto, foliis ovato-lanceolatis serratis, flore calyce quadruplo majore. *Hall. helv. n. 269.*

*Lamium cannabinum aculeatum; flore specioso luteo labiis purpureis. Pluk. alm. 204. t. 41. f. 4.*

*Cannabis spuria flore majore. Riv. t. 45.*

Schöner Hohlzahn. W.

*Habitat inter segetes Europae.* ☉ (v. v.)

*In horto sata per plures annos constanter faciem servavit. W.*

1108. **B E T O N I C A.**

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 973.*

*Cal. aristatus. Corollae lab. sup. adscendens, planiusculum; tubus cylindricus.*

1. **BETONICA** *officinalis*.

B. spica interrupta, corolla galea integra, lacinia intermedia labii inferioris emarginata, calycibus glabriusculis. *Ait. Kew. 2. p. 299.*

B. spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Roy. lugdb. 316. Fl. suec. 487, 515. Hort. upf. 164. Gort. ingr. 91. Mat. med. 149. Gmel. sib. 3. p. 239. Pall. it. 1. p. 72. Pollich. pal. n. 562. Ludw. ect. t. 2. Blackw. t. 46. Kniph. cent. 5. n. 18. et cent. 11. n. 16. Knorr. del. hort. 2.*

- t. B. 5. Sabb. hort. t. 82. Regn. bot. Flor. dan. t. 726. Hoffm. germ. 208. Roth. germ. I. 252. II. 20.*  
*B. foliis petiolatis, imis cordatis, superioribus crenatis, spica brevi, infidente foliis. Hall. helv. n. 264.*  
*B. verticillorum calycibus bracteisque spinulosis, tubo longissimo. Crantz. austr. p. 255.*  
*B. alis septemfloris; foliis imis petiolatis, rugosis, ovatis, crenatis. Scop. carn. ed. 2. q. 462. n. 2. ed. 2. n. 729.*  
*Betonica. Dod. pempt. 40. Hort. cliff. 310. Riv. t. 28.*  
*Betonica purpurea. Bauh. pin. 235.*  
*β. Betonica alba. Bauh. pin. 235.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 468.*  
 Gemeine Betonien. W.  
*Habitat in Europa. 4 (v. v.)*

\*2. *BETONICA stricta.*

- B. spica oblonga, corollarum galea integra, lacinia intermedia labii inferioris crenato-undulata, calycibus pilosis. Ait. Kew. 2. p. 299.*  
*Betonica danica. Mill. dict. n. 2.*  
 Steife Betonien. W.  
*Habitat - - - 4 (v. v.)*

\*3. *BETONICA incana.*

- B. spica interrupta corollarum galea bifida, lacinia intermedia labii inferioris crenata, tubo tomentoso incurvo. Ait. Kew. 2. p. 299.*  
*Betonica incana. Mill. dict. n. 3.*  
 Graue Betonien. W.  
*Habitat - - - 4*

4. *BETONICA orientalis.*

- B. spica integra, corollarum labii lacinia intermedia integerrima. Sp. pl 811. Roy. lugdb. 316. Mill. dict. n. 4.*  
*B. orientalis angustissimo et longissimo folio, spica florum crassiori. Tournef. cor. 13.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. p. 470.*  
 Orientalische Betonien. W.  
*Habitat in Oriente. 4 (v. v.)*

5. *BETONICA alopecuroides.*

- B. spica basi foliosa, corollis galea bifida. Jacq. vind. 251. austr. I. p. 50. t. 78. Mattusch. sil. n. 440. Hoffm. germ. 208. Villars. delph. 2. p. 381.*

- B. spicae calycibus bracteisque mollioribus, tubo brevi, galea bifida. *Crantz. austr. p. 256.*
- B. alis multifloris: foliis petiolatis, cordatis, crenatis. *Scop. carn. ed. 1. p. 462. n. 3.*
- Sideritis alopecuros. *Scop. carn. ed. 2. n. 711. t. 28.*
- Horminum minus album, betonicae facie. *Bauh. pin. 239. prodr. 114. Burf. XIII. 119.*
- Betonica montana lutea. *Barr. icon. 339? Bocc. mus. 2. p. 82. t. 7?*
- Betonicae folio, capitulo alopecuri. *Bauh. pin. 235.*
- Betonicae folio, alopecuros quorundam. *Bauh. hist. 3. p. 303.*
- Betonica albo flore. *Clus. hist. 2. p. 37.*
- Alopecuros alpina, betonicae folio, capitulo alopecuri. *Pont. anth. 253. Seg. ver. 318.*
- Horminum alpinum luteum, betonicae spica. *Raj. hist. 545.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 470.*
- Gelbweisse Betonien. W.
- Habitat in montibus Sabaudicis, Silesiae, Austriae superioris, Lessanensibus, Italicis, Galloprovinciae. 4 (v. f.)*
- Folia caulina duabus oppositionibus. Bractee integerrimae. Corollae ochroleucae.*

## 6. BETONICA hirsuta.

- B. spica basi foliosa, corollis galea integra. *Mant. 248. Murr. in Comment. goett. 1779. tom. 2. p. 13. t. 3.*
- B. foliis ovatis, rotunde crenatis, spica ovata, obesa. *Hall. helv. n. 265.*
- B. (Monieri) spica basi foliosa, corollis galea integra, foliis cordato-oblongis. *Gouan. illustr. 36.*
- B. alopecuros minor purpureo rubicundo flore, montis aurei. *Le Monier obs. 146.*
- B. alpina, incana, purpurea. *Barr. ic. 340.*
- B. foliis hirsutis, floribus purpureis amplissimis *Mentz. pug. Zanon. t. 40. p. 46.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 471.*
- Häärige Betonien. W.
- Habitat in Apenninis. D. Bassi hanc resuscitavit. In Pyrenaeis, Gouan. 4 (v. v.)*
- Similis B. alopecuroidi, sed torosior, hirsutior, robustior, spica brevior, crassior. Corollae galea integra, nec bifida; colore purpurascens, nec flavescens.*

*tes. Spica ovata, nec ut in B. alopecuroide interrupta. Bracteae inter flores oblongae; majores serratae, minores tantum subciliatae, nec ovatae. Folia in caule similiter uno alterove pari petiolato, praeter par sessile sub spica.*

\*7. **BETONICA grandiflora.**

B. spica foliosa interrupta, calycibus margine villosis, dentibus subulatis, corollis galea obcordata. W.

Betonica grandiflora. *Stephan, in litt.*

Großblütige Betonien. W.

*Habitat in Sibiria ad flumen Tereck. 4 (v. l.)*

*Folia radicalia fere Phlomidis tuberosae, petiolata cordata utrinque pubescentia, obtusa, aequaliter grosse obtuse dentata. Caulis pedalis tetragonus pubescens. Folia caulina inferiora petiolata, superiora et floralia sessilia utrinque pubescentia hirta ovata subcordata, basi integerrima grosse dentata, dentibus acutiusculis. Verticilli octo ad decemflori, distantes in apice caulis, superiores magis approximati, et omnes foliis instructi. Calyces tubulosi glabri, margine villosi, dentibus quinque subulatis. Corolla calyce quadruplo longior, labio superiore oblongo erecto plano, inferiore trilobo, lacinia intermedia maxima subrotunda indivisa. Ab omnibus Betoniciis habitu distinctissima. W.*

8. **BETONICA heraclea.**

B. spica calycibus lanatis: dentibus filiformibus, foliis lanceolatis nudis. *Mant. 83.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 471.*

Glatte Betonien. W.

*Habitat in Oriente.*

*Caulis et Folia fere glabra. Spica majuscula, lanato-tomentosa. Involucra filiformia, longitudine calycis. Calycum dentes filiformes, nites, longitudine tubi. Corollae luteae: Labio superiore vix calyce longiore; L. inferiore trifido: intermedia rotundata majore. Stamina longitudinis fere labii superioris.*



## 1109. S T A C H Y S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 974.*

Cor. lab. superius fornicatum, lab. infer. lateribus reflexum: intermedia majore emarginata. *Stam.* deflorata versus latera reflexa.

1. STACHYS *sylvatica.*

S. verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Fl. suec.* 489, 526. *Dalib. parif.* 180. *Scop. carn. n.* 706. *Gunn. norv. n.* 70. *Crantz. austr. p.* 265. *Pollich. pal. n.* 563. *Sabb. hort. rom. 3. t.* 38. *Hoffm. germ.* 208. *Roth. germ. I.* 255. *II.* 28.

S. foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxe spicatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.

*Stachys sylvatica.* *Riv. t.* 26.

Cardiaca foliis cordatis serratis, verticillis nudis, spicatis. *Hall. helv. n.* 275.

*Lamium maximum sylvaticum foetidum.* *Bauh. pin.* 231.

*Galeopsis legitima.* *Clus. hist. 2. p.* 35. *Blackw. t.* 84. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p.* 472.

Stinkender Ziest. W.

*Habitat in Europae nemoribus umbrosis.* ☉ (v. v.)

\*2. STACHYS *circinata.*

S. verticillis spicatis sexfloris, bracteis cordatis, foliis cordatis, petiolatis obtusis crenato-dentatis. *Vahl. symb.* 2. p. 64.\*

S. verticillis sexfloris, foliis cordato-rotundatis crenatis. *l'Herit. stirp. 1. p.* 51. *t.* 26.\*

S. foliis inferioribus cordato-rotundatis crenatis, verticillis sexfloris. *Desf. atl. 2. p.* 20.\*

S. (*canariensis*) verticillis sexfloris, foliis cordatis villosis crenatis, caulibus suberectis, calycibus frutescentibus campanulato-potentissimis. *Murr. Syst. veg. 14. p.* 536. *Jacq. rar. ic. 1. t.* 108. *Collect. 1. p.* 37.\*

Stumpfblättriger Ziest. W.

*Habitat in Africa boreali ut in montibus plumbeis Tuneti inque rupium Fissuris Atlantis.* 4 (v. v.)

\*3 STACHYS *coccinea.*

S. verticillis sexfloris, foliis ovatis cordatis crenatis, petiolis dilatatis. W.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

G

*S. verticillis sexfloris, foliis oblongo-ovatis basi cordatis.*  
*Jacq. hort. Schönb. 3. p. 18. t. 284.\**  
 Scharlachrother Ziest. W.

*Habitat* - - - 4

*Affinis foliorum forma et florum colore Salviae coccineae. Caulis bipedalis herbaceus tetragonus hirtus. Folia ovata basi cordata utrinque villosa subtus rugoso-venosa, margine obtuse crenata, inferiora obtusa et petiolata, superiora floralia sessilia ovata. Petioli canaliculati et dilatati. Calyx campanulatus decemfistatus quinquedentatus hirtus. Corolla coccinea magna. Tubus calyce triplo longior. Labium superius oblongum obtusum indivisum erectum; inferius trilobum, laciniis obtusis, intermedia maxima indivisa. W.*

#### 4. STACHYS palustris.

*S. verticillis subsexfloris, foliis lineari-lanceolatis semi-amplexicaulibus sessilibus. Fl. suec. 490, 528. Dalib. parif. 180. Pollich, pal. n. 564. Loesel. pruss. ic. 41. Blackw. t. 273. Hoffm. germ. 208. Roth. germ. I. 255. II. 29.*

*S. foliis lineari-lanceolatis sessilibus basi emarginatis. Hort. cliff. 309. Roy. lugdb. 317.*

*S. folis subhirsutis, elliptico-lanceolatis, breviter petiolatis, verticillis spicatis. Hall. helv. n. 257.*

*S. foliis subhirsutis ellipticis ad basin emarginatis, verticillis ad 10-floris. Crantz. austr. 266.*

*S. verticillis sexfloris, foliis lanceolatis. Scop. carn. ed. I. p. 463. n. 1. ed. 2. n. 707.*

*S. palustris foetida. Bauh. pin. 236. Riv. t. 26.*

*S. aquatica. Tabern. ic. 577. bona.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 474.*

Sumpf-Ziest. W.

*Habitat in Europa ad ripas, inque cultis humidiusculis. 4 (v. v.)*

*Verticilli 6 ad 10 floribus.*

#### 5. STACHYS alpina.

*S. verticillis multifloris, foliorum serraturis apice cartilagineis, corollis labio plano. Fl. suec. 2. n. 527. Mill. dict. n. 5. Scop. carn. n. 709. Sabb. hort. 3. t. 41. Hoffm. germ. 208. Roth. germ. I. 255. II. 30. Lapayr. pyren. I. p. 14. t. 8.\**

*S. verticillis duodecimfloris, caule villosa. Hort. ups. 170.\**

*S. foliis lanceolato-ovatis basi emarginatis, verticillis tomentosis.* Hort. cliff. 310. Roy. lugdb. 317.

*S. foliis hirsutis cordatis, verticillis subtomentosis.* Hall. helv. n. 266.

*S. latifolio major, foliis obscure virentibus, flore galeato ferrugineo.* Pluk. alm. 356. t. 317. f. 4.

*Pseudo-stachys alpina.* Bauh. pin. 236. prodr. 113.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 475.*

Gebirgs-Ziest. W.

*Habitat in Germania, Helvetia, Carniolia, etc.* 4 (v. v.)

*Plantae color obscurus, Folia flavo-virescentia serraturis apice cartilagineo fusco. Floralia superiora ovata margine plano integerrimo. Verticilli involucrati, ut in 6, 9; Corollae triste purpureae galea horizontali, nec erecta ut 6, 9; Labio non ad latera reflexo.*

## 6. STACHYS germanica.

*S. verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis, caule lanato.* Sp. pl. 812. Mill. dict. n. 1. Gmel. fib. 3. p. 239. Scop. carn. n. 710. Pollich pal. n. 565. Flor. dan. t. 684. Jacq. austr. t. 319. Hoffm. germ. 208. Roth. germ. I. 255. II. 30.

*S. tomentosa, foliis imis cordatis, superioribus elliptico-lanceolatis, verticillis densissimis.* Hall. helv. n. 255.

*S. lanata.* Crantz austr. p. 267.

*S. verticillis quadragintafloris; caule lanato.* Hort. ups. 170.

*S. foliis oblongo-cordatis, floribus verticillatis.* Hort. cliff. 309. Roy. lugdb. 317. Dalib. parif. 179.

*S. major germanica.* Bauh. pin. 236.

*Stachys.* Fuchs. hist. 766. montana. Riv. t. 27. optima, Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 476.

Teutscher Ziest. W.

*Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Sibiria.* 5 (v. v.)

*Caulis lana alba vestitus, ut tota planta albus. Folia serraturis subimbricatis: floralia lanceolata, reflexa. Antherae albo-flavescentes.*

*Variat flore albo, foliisque angustioribus.* Boerh. R.

## \*7. STACHYS intermedia.

*S. verticillis multifloris, calycibus subpungentibus, foliis oblongis subcordatis crenatis, caule sublanato.*

*Ait. Kew. 2. p. 201.*

Mittler Ziest. W.

*Habitat* - - - - 4 (v. v.)

\*8. STACHYS *lanata*.

S. verticillis multifloris, foliis lanatis, caulibus basi procumbentibus et radicanibus. *Ait. Kew. 2. p. 201.*

*Jacq. ic. rar. 1. t. 107. Misc. 2. p. 342. \**

Wolliger Ziest. W.

*Habitat in Sibiria. 2. (v. v.)*

*Omnes plantae partes sunt lana alba densa tectae. W.*

9. STACHYS *cretica*.

S. verticillis triginta-floris, calycibus pungentibus, caule hirto. *Hort. upf. 170. \* Mill. dict. n. 2.*

S. folio obscure virente, flore purpurascete. *Walth. hort. 108. t. 19.*

S. cretica. *Bauh. pin. 236. prodr. 113.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 477.*

Candischer Ziest. W.

*Habitat in Creta. 2. (v. v.)*

*Similis S. germanicae, sed planta lurida, hirta absque lana alba. Folia floralia lanceolata, serrato-undulata, non vero reflexa s. fornicata, uti 6.*

\*10. STACHYS *heraclea*.

S. verticillis decemfloris, calycibus inermibus, foliis cordatis, floralibus ovatis integerrimis sessilibus, caule hirto. W.

S. (*heraclea*) hirsuta, foliis obscure virentibus elliptico-lanceolatis, verticillis decemfloris. *Allion. ped. n. 112. t. 84. f. 1. \**

Sideritis heraclea. *Colum. ecph. 1. p. 128. t. 131.*

Nicaënsischer Ziest. W.

*Habitat in agro Nicaeensi. 2. (v. f.)*

*Flores rubri. Folia radicalia cordata dentata. W.*

\*11. STACHYS *tenuifolia*. W.

S. verticillis sexfloris, foliis lanceolatis simpliciter ferratis glaberrimis. W.

Dünnblättriger Ziest. W.

*Habitat in Pennsylvania. 2. (v. f.)*

*Similis S. palustris. Folia tenuissima quoad substantiam, iis Veronicae maritimae simillimis ut ovum ovo. W.*

12. STACHYS *glutinosa*.

S. glabra ramosissima, ramulis spinoscentibus, pedun-

dunculis axillaribus solitariis unifloris bibracteatis.

*Vahl symb.* 3. p. 76. \*

*S. ramis ramosissimis, foliis lanceolatis glabris.* *Hort. cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 318.

*Sideritis glutinosa bitumen redolens.* *Morif. hist.* 3. p. 389.

*Sideritis viscosa cretica bitumen redeolens* *Zann. hist.* 136.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 477.

Klebriger Ziest. W.

*Habitat in Creta.* † (v. l.)

### 13. STACHYS *spinosa.*

*S. canescens, ramulis brachiatis spina, terminatis floribus axillaribus ternis.* *Vahl symb.* 3. p. 76. \*

*S. ramulis spina terminatis.* *Hort. cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 318. *Mill. dict. n.* 9.

*S. spinosa cretica.* *Bauh. pin.* 236. *Morif. hist.* 3. p. 283. f. II. t. 10. f. 9.

*Gaidarothymo.* *Clus. hist.* 2. p. 311.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 478.

Dorniger Ziest. W.

*Habitat in occidentali Creta.* † (v. l.)

### 14. STACHYS *orientalis.*

*S. foliis tomentosis ovato-lanceolatis: floralibus verticillo brevioribus.* *Roy. lugdb.* 318. *Mill. dict. n.* 10.

*Vahl symb.* 2. p. 64. \*

*Stachys cretica.* *Forsk. fl. const.* p. 28. n. 264.

*S. orientalis altissima foetidissima.* *Tournef. cor.* 12.

*Boerh. lugdb.* 1. p. 154.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 478.

Orientalischer Ziest. W.

*Habitat in Oriente.*

### 15. STACHYS *palaestina.*

*S. floribus subspicatis, foliis lanceolatis sessilibus tomentosis rugosis integerrimis, calycibus muticis.* *Sp. pl.*

1674.

*S. alba, angusto salviae folio.* *Barr. ic.* 279.

*Sideritis incano oleae folio, flosculis ex incarnato-candicantibus montis libani.* *Volk. norib.* 353. *Raj.*

*suppl.* 306.

*Sideritis molli cinereo oleae folio caulem ambiente, flore*

violaceo, ex monte carmelo. *Bocc. musf. 2. p. 145. t. 109, 112.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 478.*

Jüdischer Ziest. W.

*Habitat in Palaestina. Arduini. † (v. f.)*

*Caules teretes, tomentoso-albi. Folia tomentoso-alba, rugosa, parum acuta. Calyx subdecagonus. Corollae Lab. superius concavum, integrum, purpurascens margine laterali linea purpurea: L. inferius purpurascens: media majore concava; fauce albo-maculata. Syst. Veg. 447.*

### 16. STACHYS *maritima.*

S. foliis cordatis obtusis tomentosis crenatis, bracteis oblongis integerrimis. *Mant. 82. Jacq. hort. t. 70.*

S. verticillis sexfloris: foliis radicalibus ovalibus crenatis: summis ovatis integerrimis, corollis calyce duplo longioribus. *Gouan. monsp. 91.*

*Betonica maritima, flore ex luteo pallefcente. Dillen. elth. 50. t. 42. f. 50.*

*Betonica heraclea latifolia dioscoridis. Donat. venet. 84. Bocc. musf. 2. p. 164. t. 127.*

*Sideritis salviae folio, nostras. Magnol. monsp. 203. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 479.*

Meerstrands-Ziest. W.

*Habitat in littoribus maris, Venetiis, Monspelii, Orientis. D. Jacquîn. 2 (v. v.)*

*Folia radicalia, cordata, oblonga, obtusa, venosa, crenata, tomentosa. Caulis suffruticosus, spithamaeus, erectus, pubescens. Spica e verticillis interrupta. Bracteae longitudine florum, ovaes, oblongae, integerrimae. Verticilli sexflori. Calyces lanati, quinque-dentati, acuti, vix aristati. Corollae luteae.*

*Folia radicalia rarius cordata, plerumque elliptica. W.*

### 17. STACHYS *aethiopica.*

S. verticillis bifloris. *Mant. 82. Jacq. obs. 4. p. 2. t. 77. Sideritis erecta, Tencrîi pratensis folio, aethiopica.*

*Pluk. alm. 245. t. 315. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 480.*

Capfcher Ziest. W.

*Habitat ad Cap. b. sp̄i. D. D. Royen. 2 (v. f.)*

*Caulis palmaris erectus s. diffusus; Habitus Lamii purpurei, subhispido-pilosus. Folia cordata, profun-*

de obtuseque serrata, rugosa, lucida, subvillosa, petiolis breviora. Spicae terminales, interruptae et verticillis s. floribus oppositis s. utrinque solitariis. Calyx subquinquesidus, subaequalis, subaristatus. Corollae tubus curvus, Lab. superius erectum, fornicatum, breve, villosum; L. inferius maximum, exsertum, trifidum; intermedia latissima, plana crenata: lateralibus revolutis. Stamina, vix tubo longiora. Antherae bipartitae. Roy.

### 18. STACHYS hirta.

S. verticillis sexfloris, caulibus prostratis, corollis labio superiore bifido divaricato reflexo. *Sp. pl. 2. p. 813.*

*Allion. ped. n. 113. t. 2. f. 3. Desf. atl. 2. p. 20.\**

Galeopsis caule piloso, calycibus labio corollae superiore longioribus. *Sp. pl. 1. p. 580. Allion. nicaeens. 44.*

Marrubium nigrum rotundifolium. *Bauh. pin. 230.*

Ocimum valentinum. *Clus. hist. 2. p. 42.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 7. p. 481.*

Beharter Zieft. W.

Habitat in Orientis, Hispaniae, Italiae collibus. 2 (v. l.)

Caulis prostrati, tetragoni, fistulosi, fragiles, pilis rarioribus adpersi. Folia petiolata, cordata, utrinque pilosa, venosa: inferiora obtuse serrata, obtusa, longius petiolata; Superiora acuta, acute serrata. Flores verticillati, utrinque 3, absque involucrio. Calyx aristatus. Corollae tubus calyce brevior incurvatus. Labium superius fornicatum, semibifidum: lobis divaricatis obtusis; Lab. inferius obtusissimum, planum, obsolete trilobum, ad basin utrinque lacinula acuta vix manifesta. Puncta purpurascens ad margines baseos labii superioris et in disco baseos labii inferioris.

### \* 19. STACHYS lavandulifolia.

S. verticillis sexfloris hirsutissimis, foliis lanceolatis integerrimis lineatis. *Vahl symb. 1. p. 42.*

Zietenia orientalis. *Gleditsch. Act. berol. 1766. p. 3.*

Galeopsis orientalis lavandulae folio calyce villosissimo. *Tournef. cor. 11.*

Lavendelblättriger Zieft. W.

Habitat in Oriente. 2 (v. l. f. fl.)

Caulis erectus spithamaeus simplex hirsutus. Folia inferiora basi connata, superiora distincta sessilia, omnia lanceolata integerrima obtusa, supra glabriuscula li-

*neata subtus molliter pilosa. Floralia cordato-ovata reflexa verticillis breviora latere interiori glabra. Spica verticillata longitudine caulis. Verticilli remoti sexflori. Calyces hirsutissimi, laciniis subulatis patentissimis calyce ipso triplo longioribus. Corolla purpurea. Optime dignoscitur laciniis calycinis longissimis patentibus. Vahl l. c.*

\*20. STACHYS *rugosa*.

S. verticillis sexfloris, foliis lanceolatis basi attenuatis tomentosis rugosis serratis, calycibus muticis. *Ait. Kew. 2. p. 303. Jacq. ic. rar. 3. t. 493. Collect. 5. p. 116.\**

Runzlicher Ziest. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 5 (v. l.)*

Rami teretiusculi albo-tomentosi. Folia lineari-lanceolata remote serrata utrinque tomentosa, subtus nivea, rugoso-venosa. Flores ochroleuci. W.

21. STACHYS *recta*.

S. verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis scabris, caulibus adscendentibus. *Mant. 82. Pollich. pal. n. 567. Gouan. illustr. 36. Neck. in Act. palat. 2. p. 474.\* Gmel. tub. p. 182. Jacq. ausi. t. 359. Hoffm. germ. 209. Roth. germ. I. 256. II. 31.*

Betonica foliis hirsutis, ovatis, rotunde crenatis, bracteis ovato-lanceolatis, aristatis, integerrimis. *Hall. helv. n. 262.*

S. Betonica. *Crantz ausr. p. 264. non descriptio. Jacq. R.*

Sideritis flore luteolo. *Riv. mon. t. 70.*

Sideritis vulgaris hirsuta. *Bauh. hist. 3. p. 425. Magn. bot. 240. R.*

Stachys vulgaris hirsuta erecta. *Bauh. pin. 233.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 481.*

Weißer Ziest. W.

*Habitat in Europa australi ad vias, in sterilibus. 2 (v. v.)*

Radix perennis. Caules adscendentes, rigidiusculi, pilis raris adspersti. Folia subpetiolata, cordata, elliptica, vel saepe lanceolata, profunde crenata, utrinque pilis raris scabra, subrugosa. Spicae terminales, in verticillos dispositos excrecentes, e verticillis decemfloris. Calyces subspinosi. Flores lutei.



\*22. STACHYS *arenaria*.

S. verticillis subspicatis hirsutis sexfloris, calycibus spinosis, foliis oblongis ferratis obtusis, galea bifida. *Vahl. symb. 2. p. 64.*

S. caule basi procumbente, foliis lanceolatis obtusis, verticillis subflexloris villosis, calycibus spinosis, corollarum galea emarginata. *Desf. atl. 2. p. 21. t. 126.\**

Betonica Sideritis facie, flore purpureo. *Tournef. cor. 13. Sand-Zieft. W.*

*Habitat in arenosis Tuneti et in Cappadocia. 4 (v. l.)*

Radix perennis. Caules plures rigidi adscendentes pilosi ramosi. Folia inferiora petiolata pollicaria oblonga grosse serrata, superiora sessilia basi angustata, extrorsum dilatata, omnia pilosa obtusa subrugosa. Verticilli subspicati, inferiores remotiores. Folia floralia sub infimo verticillo structura foliorum caulis, reliqua cordato-ovata acuminata, apice spinosa pungentia longitudine calycum integerrima. Calyces hirsutissimi, laciniis lanceolatis patentibus rigidis spinosis pungentibus. Corolla purpurea. Tubus longitudine calycis pilosus. Labium superius erectum subbifidum; inferius trilobum extus pilosum. Similis S. rectae, quae differt: foliis extrorsum acutis non dilatatis, calycis aristis mollibus, verticillis decemfloris, corollis flavis. *Vahl l. c.*

23 STACHYS *annua*.

S. verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis laevibus petiolatis, caule erecto. *Syst. veg. 448. Neck. in Act. Palat. Vol. 2. p. 475.\* Scholl. barb. n. 1012. Pollich. pal. n. 566. Mattusch. fil. n. 444. Jacq. austr. t. 360. Hoffm. germ. 209. Roth. germ. I. 256. II. 31.*

S. foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis. *Hort. cliff. 210. Gron. virg. 66. β. Dalib. parif. 180.*

Betonica foliis ovatis crenatis, bracteis ovato-lanceolatis. *Hall. helv. n. 263.*

Sideritis flore albo, barba luteola. *Riv. t. 69. Hall. R.*

Betonica verticillata, calycibus spinosis. *Hort. upf. 165. Sp. pl. 1. p. 573.*

Sideritis arvensis latifolia glabra. *Bauh. pin. 233.*

Alyssum majus. *Tabern. hist. 929.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 482.*

Jähriger Zieft. *W.*

*Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, ad agrorum margines.* ☉ (v. v.)

Stamina *ad latera reflexa* genus indicant. Folia inferiora ovata, rugosa, obtusissima: Media oblonga, petiolata; Suprema sessilia, lanceolata, trinervia. Corollae flavae: labium superius marginibus lateralibus ferrugineis, recurvatum, emarginatum. Calyces mucronati, non tamen spinosi.

Caulis in montosis erectus, in pratis procumbens. *Myind.*

Sub Stachide *Betonica* hanc describit *Crantz austr. p. 265. Iacq. R.*

## 24. STACHYS arvensis.

S. verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calycis, caule debili. *Syst. veg. 448.*

*Oed. dan. t. 587. Pollich pal. n. 568. Sabb. hort. rom. 3. t. 51. Hoffm. germ. 209. Roth. germ. I. 256. II. 32.*

*Trixago* foliis hirsutis, ovato-cordatis, rotunde dentatis. *Hall. helv. n. 231.*

Stachys verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis: corollarum labio superiore integerrimo. *Neck. gallob. p. 225.*

*Glechoma* foliis cordato-oblongis crenatis. *Hort. cliff. 307.*

Sideritis calycibus subinermibus hispida. *Fl. succ. 488, 519.*

Sideritis alines trixaginis folio. *Bauh. pin. 233. prod. III.*

Sideritis humilis, lato obtuso folio. *Raj. hist. 565.*

Stachys arvensis minima. *Riv. t. 27. Petiv. t. 33.*

*Marrabialtrum* vulgare. *Tournef. inst. 190.*

β. *Lamium paladofum belgicum.* *Herm. lugdb. 351. t. 353.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 483.*

Kleinblütiger Ziest. W.

*Habitat in Europae arvis.* ☉ (v. v.)

Caulis tetragonus, obtusus, brachiatus, hirtus uti Petioli et calyces. Folia cordata, obtusa, obtuse serrata, minus hirta. Calyces sessiles, semiquinquesidi, aequales, mucronati. Corolla albida, calyce fere minor: galea integerrima. Labio 3-fido: intermedio latiore purpurascente punctato, non emarginato. (Flos carneus, *Hall. R.*)

\*25. STACHYS *latifolia*.

S. verticillis multifloris subspicatis, labio superiore bifido, lacinulis acutis, foliis latis cordatis rugosis pilosis.

*Ait. Kew. 2. p. 303.*

Breitblättriger Ziest. W.

*Habitat* - - - - †

\*26. STACHYS *Artemisia*. †

S. verticillis multifloris, foliis incisis, caule simplici.

*Loureio fl. cochin. p. 443.\**

Beifulsblättriger Ziest. W.

*Habitat in Cochinchina et China.*

Caulis annuus erectus simplex tripedalis tetragonus sulcatus albicans. Folia magna, radicalia subrotunda crenata, caulina longiora pinnatifida, incisa, subtus tomentosa petiolata opposita. Flos bilabiatus albus purpureus oblongus, verticillis multifloris axillaribus. Calyx angulatus 5-fidus, laciniis erectis, binis inferioribus longioribus pungentibus. Corollae labium superius ovatum integerrimum fornicatum, inferius trifidum, lacinia media emarginata, lateralibus reflexis. *Habitus hujus plantae nondum florentis est valde similis Artemisiae.* Lour. l. c.

## IIII. BALLOTA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 975.*

*Cal.* hypocrateriformis, 5-dentatus, 10-striatus. *Corollae* lab. superius crenatum, concavum.

I. BALLOTA *nigra*.

B. foliis cordatis indivisis serratis, calycibus acuminatis.

*Fl. suec. 484, 519. Scop. carn. n. 714. Pollich. pal.*

*n. 569. Kniph. cent. 6. n. 15. Sabb. hort. rom. 3.*

*t. 35. Hoffm. germ. 209. Roth, germ. I. 257. II. 33.*

B. foliis cordatis serratis, verticillis nudis. *Hall. helv.*

*n. 259.*

*Ballota. Hort. cliff. 311. Roy. lugdb. 315.*

*Ballote. Fuchf. hist. 154. Caesalp. plant. 445.*

*Marrubium nigrum. Crantz austr. p. 272.*

*Marrubialstrum. Riv. t. 66.*

*Marrubium nigrum foetidum. Bauh. pin. 230. Blackw.*

*t. 136.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 485.*

Schwarze Ballote. W.

*Habitat in Europae ruderatis. 2 (v. v.)*

*Variat flore albo. W.*

## 2. BALLOTA alba.

B. foliis cordatis indivisis ferratis, calycibus subtruncatis. *Fl. suec. 2. n. 540.\**

Ballote flore albo. *Tournef. inst. 185. Vaill. parif. 20.*

Ballote. *Cam. epit. 220.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 485.*

Weisse Ballote. W.

*Habitat in Europa. 2.*

*Affinis nimium B. nigrae, an varietas?*

*Est omnino praecedentis varietas, quum calyx non truncatus. Hall. Hanc etiam pingit Sabbati in hort. rom. tom. 3. t. 36. R.*

## 3. BALLOTA lanata.

B. foliis palmatis dentatis, caule lanato. *Sp. pl. 315.*

*Pall. it. 2. p. 688.*

Phlomis foliis multifidis. *Gmel. sib. 3. p. 241. n. 72. t. 54.*

Ballote foliis geranii batrachioides. *Amm. ruth. 47.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 486.*

Wollige Ballote. W.

*Habitat in Sibiria, versus Chinam. 2 (v. l.)*

*Caules lana alba induti. Verticilli hirsutissimi. Folia grossulariae, semi 3-fida s. semi 5-fida, lobis obtusis tridentatis, supra glabra, subtus hirsuta. Calyces 3-dentati denticulis setaceis. Corollae hirsutissimae, ochroleucae, extus albae.*

## 4. BALLOTA disticha.

B. verticillis dimidiatis bipartitis semispicatis. *Mant. 83.*

Monarda floribus verticillatis, foliis subcordatis, calycibus pilosis involucre longioribus. *Fl. zeyl. 24?*

Stachys indica procerior, betonicae folio. *Raj. hist. 1872.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 488.*

Indische Ballote. W.

*Habitat in India. ☉ (v. l.)*

*Statura Nepetae. Caulis quadrangulus, pubescens. Folia petiolata, subcordata, serrata, tomentosa. Verticilli singulares utrinque: Singuli bipartiti s. ex spicis duabus, conjugatis, unilateralibus, adscendentibus*

more *Asperifoliarum spicarum*: Floribus alternis, sessilibus, adscendentibus, insidentibus rachi simplici flexuosa. Bractea sub singulo flore, subulata, calyce brevior. Calyx quinquesidus, subaequalis, muticus, pentagonus, obsolete decagonus. Stamina 4. Semina 4, subrotunda, nitida.

### IIII. MARRUBIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 976.

Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10-fidriatus, Corollae lab. sup. bifidum, lineare, rectum.

\* Calycibus 5-dentatis.

#### I. MARRUBIUM *Alyssum*.

M. foliis cuneiformibus quinquedentatis plicatis, verticillis involucre destitutis. *Sp. pl.* 815. *Hort. cliff.* 311.\* *Roy. lugdb.* 314. *Sauv. monsp.* 151. *Kniph. cent.* 9. n. 63. *Vahl symb.* 2. p. 65.

M. foliis cuneiformibus apice inaequaliter crenatis subplicatis, verticillis involucre destitutis. *Lamarckencycl.* 3. p. 685.

M. (*plicatum*) foliis semiorbiculatis tomentosis rugosis plicato-lobatis. *Forsk. descr.* 213.

M. album, foliis profunde incis, flore caeruleo. *Morif. hist.* 3. p. 377. f. 11. t. 10. f. 12.

*Alysson verticillatum*, foliis profunde incis. *Bauh. pin.* 232.

*Alysson Galeni*. *Clus. hist.* 2. p. 35.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 490.

Runzlicher Andorn. W.

*Habitat in Hispania.* 4 (v. v.)

Flores utrinque 3, purpurei, parvi. Calyces acuti dentibus patentibus.

#### \*2. MARRUBIUM *astracanicum*.

M. foliis ellipticis obtusis crenatis tomentosis rugosis, calycibus bracteis lanceolatis villosis. W.

M. (*astracanicum*) foliis ovatis tomentosis rugosissimis, dentibus calycinis subulatis, laciniis corollae superioribus acutis. *Jacq. ic. rar.* 1. t. 109. *Misc.* 2. p. 306.\*

M. orientale folio subrotundo, flore purpureo. *Tournef. cor.* 12.

Astracanischer Andorn. W.

*Habitat ad Astracan et in Oriente.* 2 (v. f.)

3. MARRUBIUM *peregrinum*.

M. foliis oblongis incanis rugoso-venosis dentatis, dentibus apicem versus majoribus, calycum denticulis subulatis. W.

M. foliis ovato-lanceolatis ferratis, calycum denticulis setaceis. *Hort. cliff.* 311. n. 3. *Roy. lugdb.* 314. *Gron. orient.* 83. *Mill. dict. n.* 2. *Crantz austr. p.* 274. *Jacq. austr. t.* 160. *Kniph. cent.* 7. n. 54. *Hoffm. germ.* 210.

M. caule inferne ramoso, foliis ovalibus ferratis, calycibus inferioribus decem-superioribus quinquedentatis. *Roth. germ.* 2. 34.

M. hispanicum supinum, foliis sericeis argenteis. *Tournef. inst.* 192. *Dill. elth.* 219. t. 174. f. 215.

M. album latifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 230. *Morif. hist.* 3. p. 577. f. 11. t. 9. f. 8.

M. alterum pannonicum. *Clus. hist.* 2. p. 34. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 491.

Fremder Andorn. W.

*Habitat in Siciliae, Cretae, Austriae siccis.* 2 (v. v.)

\* 4. MARRUBIUM *creticum*.

M. foliis lanceolatis incanis rugoso-venosis apice dentatis, calycinis dentibus setaceis, caule ramoso divaricato. W.

M. caule patulo ramosissimo, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, versus apicem ferratis, venis exaratis, calycibus dentibus linearibus tomentosis. *Roth. germ.* I. 257. II. 35. \* *Hoffm. germ.* 210.

Marrubium peregrinum  $\beta$ . *Sp. pl.* 816.

M. (*creticum*) foliis lanceolatis dentatis, verticillis minoribus, dentibus calycinis setaceis erectis. *Mill. dict. n.* 3.

M. album angustifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 230. *Rupp. jen.* 232.

M. creticum. *Dalech. hist.* 962. *Buxb. halens.* 209.

M. album angustiore folio. *Bauh. hist.* 3. p. 317.

Cretischer Andorn W.

*Habitat in Mansfeldia inque Oriente.* 2 (v. f.)

5. MARRUBIUM *candidissimum*.

M. foliis ovatis incanis obtuse dentatis rugoso-venosis, calycinis dentibus subulatis, caule basi subramoso. W.

M. foliis subovatis lanatis superne emarginato-crenatis, denticulis calycinis subulatis. *Hort. cliff.* 312. n. 4. *Mill. dict.* n. 6.

M. folio rotundo candidissimo. *Boerh. lugdb.* p. 156. *Dill. eltham.* 218. t. 274. f. 214. bona.

M. album hispanicum majus. *Barr. ic.* 686.

M. album candidissimum et villosum. *Tournef. cor.* 12. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 492.

Orientalischer Andorn. W.

*Habitat in Oriente.* 4 (v. l.)

Folia sericeo-tomentosa. W.

#### 6. MARRUBIUM *supinum.*

M. foliis subrotundis subcordatis crenatis rugoso-venosis, calycinis dentibus setaceis rectis villosis. W.

M. dentibus calycinis setaceis rectis villosis. *Hort. cliff.* 312. *Roy. lugdb.* 315. *Sauv. monf.* 151. *Mill. dict.* n. 5. *Scop. carn.* n. 713.

M. album, sericeo parvo et rotundo folio. *Barr. ic.* 685. *Bobc. mus.* 2. p. 78. t. 96.

M. album hispanicum majus. *Barr. ic.* 686.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 492.

Niedriger Andorn. W.

*Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Carniolia.* 4

#### \*7. MARRUBIUM *catariaefolium.*

M. foliis ovatis subviridibus profunde crenatis, dentibus calycinis subulatis glabris patentibus. *Lamarck. encycl.* 3. p. 687.

M. orientale Catariae folio flore albo. *Tournef. cor.* 12. Katzenmünzblättriger Andorn. W.

*Habitat in Oriente.*

Caulis ramosus erectus sesqui-f. bipedalis tetragonus subtomentosus. Folia iis *Nepetae Catariae* quodammodo similia, opposita petiolata ovata profunde crenata non rugosa, subpubescentia tenuia, superne viridia subtus pallidiora. Bractee subulatae apice glabrae. Verticilli multiflori, floribus albis. Calyces ferè glabri 5-dentati, dentibus subulatis patentibus. Corollae tubus calyce duplo longior; labium superius ad medium usque bifidum. *Lamarck. l. c.*

\* \* Calycibus 10-dentatis.

#### 8. MARRUBIUM *vulgare.*

M. foliis subrotundo-ovatis dentatis rugoso-venosis, calycinis dentibus setaceis uncinatis. W.

*M. dentibus calycinis setaceis uncinatis.* Hort. cliff. 342. Fl. suec. 485, 531. Mat. med. 150. Roy. lugdb. 315. Dalib. parif. 182. Hall. helv. n. 258. Pall. it. 1. p. 25. Scop. carn. n. 712. Pollich. pal. n. 570. Ludw. t. 145. Kniph. cent. 5. n. 56. Sabb. hort. 3. t. 59. Hoffm. germ. 210. Roth. germ. I. 258. II. 36.

*M. dentibus calycinis setaceis uncinatis, medio corollarum segmento orchideo.* Crantz. austr. p. 273.

*M. album vulgare.* Bauh. pin. 230. Riv. t. 67. Blackw. t. 479.

*M. vulgare.* Clus. hist. 2. p. 34.

β. *M. album villosum.* Bauh. pin. 230. prodr. 110. Burser.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 493.

Weifser Andorn. W.

Habitat in Europae borealis ruderatis. 4 (v. v.)

#### 9. MARRUBIUM africanum.

*M. foliis cordatis subrotundis emarginato-crenatis.* Hort. cliff. 311. Roy. lugdb. 314. Kniph. cent. 7. n. 53.

*M. album rotundifolium minus, crispatis foliis, aethiopicum.* Pluk. alm. 242. t. 306. f. 2.

*Pseudo-Dictamnus africanus, foliis subrotundis subtus incanis.* Comm. hort. 2. p. 179. t. 90.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 494.

Africanischer Andorn. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 4

Corollae galea emarginata pilosa a sequenti simili differt.

#### 10. MARRUBIUM crispum.

*M. foliis cordatis subrotundis crenato-subdentatis, calycibus decedentatis muticis.* Sp. pl. 1674.

*M. dictamni spurii foliis et facie.* Herm. par. 200. t. 200.

*Pseudo-dictamnium nigrum, rotundo crispo folio.* Bocc. mus. 2. p. 152. t. 129 et in titulo.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 495.

Krausblättriger Andorn. W.

Habitat in Italia, Hispania. Arduini. 4 (v. v.)

Caulis suffruticosus, erectus, hirtus. Folia petiolata, rugosissima, crenata, subtomentosa, subtus pilosa. Calyx infundibuliformis, 10-dentatus. Corolla purpurascens, non pilosa: Labio superiore subrotundo, obtuso, integro: L. inferiore trifido: utermedia bifida: lateralibus porrectis. Antherae non iultra faucem.



*Diversa species a Marrubio dictamni spurii foliis et facie. Herm. parad. t. 200, cui Lab. superius lanceolatum barbatum et stamina longitudine labii.*

\*11. MARRUBIUM *hirsutum.*

M. foliis cordatis ovatis crenatis, calycum dentibus patentibus lanceolatis, bracteis subulatis. W.

Behaarter Andorn. W.

*Habitat* - - - 2 (v. v.)

*Simillimum sequenti foliis et habitu, sed differt calycibus et bracteis. W.*

12. MARRUBIUM *hispanicum.*

M. foliis cordatis ovatis crenatis, calycum limbis patentibus, dentibus ovatis mucronatis, bracteis oblongis. W.

M. calycum limbis patentibus, denticulis acutis. *Hort. cliff. 312. Hort. upf. 169\* Roy. lugdb. 315. Mill. dict. n. 7.*

M. album rotundifolium hispanicum. *Herm. par. 201. t. 201.*

M. subrotundo folio. *Barr. ic. 767. Bocc. mus. 2. p. 167. t. 122.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 495.*

Spanischer Andorn. W.

*Habitat in Hispania, 2 (v. v.)*

*Folia subrotunda, plana, crenata. Corollae lab. sup. 3-f. 4 fidum. Calycis dentes alterni minores.*

13. MARRUBIUM *Pseudo-Dictamnus.*

M. calycum limbis planis villosis, foliis cordatis concavis, caule fruticoso. *Hort. cliff. 312.\* Hort. upf. 169. Roy. lugdb. 315. Mill. dict. n. 10. Kniph. cent. 8. n. 65. Sabb. hort. rom. 3. t. 47. Vahl. symb. 2. p. 65.*

*Moluccella fruticosa. Forsk. fl. constant. p. 28.*

*Pseudo-Dictamnus verticillatus inodorus. Bauh. pin. 222.*

*Pseudo-Dictamnus. Dod. pempt. 281.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 496.*

Dostartiger Andorn. W.

*Habitat in Creta. 3 (v. v.)*

*Planta tota tomento denso compacto vestita.*

14. MARRUBIUM *acetabulosum.*

M. calycum limbis tubo longioribus membranaceis: angulis majoribus rotundatis. *Sp. pl. 817. Mill. dict. n. 11.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III. H*

Pseudo - Dictamnus acetabulis moluccae. *Bauh. pin.*  
222.

Dictamnus falsus verticillatus, pericarpio conoide, baeticus. *Barr. ic.* 129.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 496.

Großkelchiger Andorn. W.

*Habitat in Creta.* 4

Folia cordata, profunde serrata, tenuia, villosa. Limbus calycis absoluta florescentia excrescit, sit tubo duplo longior, nudus et membranaceus, nec villosus ut in praecedentibus; limbi margo 20 angulis: minoribus scilicet acutis, latioribus obtusissimis rotundatis.

### 1112. L E O N U R U S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 977.

*Calyx* quinquedentatus. *Corollae* labium superius planum integrum; inferius tripartitum lacinia media indivisa.

#### \*1. LEONURUS *crispus.*

L. foliis trilobis quinquelobisve inciso-dentatis undulatis, corollis calyce pungente majoribus. W.

L. foliis omnibus acute ferratis rugosissimis margine inaequaliter reflexis, caulinis quinquelobis. *Murr. syst. ed.* 14. p. 538. *Nov. comment. goett.* 1777. p. 44. t. 4.\* *Ait. Kew.* 3. p. 494.

Cardiaca crispa. *Raj. hist.* 572. *Sabb. hort. rom.* 3. t. 43. Krauser Wolfstrapp. W.

*Habitat in Sibiria.* 4 (v. v.)

#### 2. LEONURUS *Cardiaca.*

L. foliis cuneiformi - ovatis trilobis dentatis, corollis calyce pungente majoribus, lacinia media labii inferioris acuta. W.

L. foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Hort. cliff.* 313. *Fl. suec.* 496, 532. *Mat. med.* 150. *It. scan.* 231. *Roy. lugdb.* 312. *Dalib. paris.* 182. *Pollich. pal.* n. 571. *Gouan. illustr.* 36. *Gmel. sib.* 3. p. 238. *Crantz. austr.* p. 245. *Ludw. ect. t.* 5. *Kniiph. cent.* 4. n. 40. *Flor. dan. t.* 727. *Hoffm. germ.* 210. *Roth. germ. I.* 246. *II.* 2.

L. foliis trilobis, lobis acutis. *Scop. carn. ed.* 1. p. 469. n. 1. ed. 2. n. 703.

Cardiaca foliis petiolatis, cordatis, verticillis foliosis.

*Hall. helv. n. 274.*

Marrubium cardiaca dictum. *Bauh. pin. 230.*

Cardiaca. *Fuchs. hist. 395. Black. t. 171.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 497.*

Gemeiner Wolfstrapp. W.

*Habitat in Europae ruderatis. 4 (v. v.)*

### 3. LEONURUS *Marrubiastrum.*

L. foliis oblongis-dentatis, corollis calyce subpungente vix longioribus, lacinia media labii inferioris subrotunda. W.

L. foliis ovatis lanceolatisque serratis, calycibus sessilibus spinosis. *Sp. pl. 817. Scop. carn. n. 704. Fabric. helmst. p. 94. Scholl. barb. n. 455. Feniph-cent. 8. n. 57. Jacq. austr. 5. p. 3. t. 405. Hoffm. germ. 211. Roth. germ. I. 246. II. 3.*

Sideritis foliis ovatis lanceolatis inciso-serratis. *Hort. cliff. 213. Sauv. monsp. 279.*

Marrubiastrum foliis cardiaca. *Bocc. mus. 2. p. 120. t. 98.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 499.*

Andornartiger Wolfstrapp. W.

*Habitat in Bohemia, Ucraina, Germania, etiam Java. 4 (v. v.)*

Calyx quinquefidus, aristatus; arisiae etiam sub verticillis. Corollae vix calyce longiores, parvae, facie *Nepetae*: galea integra: barbae intermedia non creata.

### 4. LEONURUS *Galeobdolon.*

L. foliis subcordatis ovatis dentatis, verticillis sexfloris, corollis calyce subpungenti majoribus, lacinia media labii inferioris acuta. W.

L. foliis ovatis serratis acutis. *Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 310. Fl. suec. 497, 525. Dalib. parif. 182. It. scan. 64.*

Leonurus Galeobdolon. *Scop. carn. n. 705.*

Galeopsis (*Galeobdolon*) verticillis sexfloris involucreo tetraphyllo. *Sp. pl. 810. Jacq. vindb. 105.*

Lamium (*Galeobdolon*) verticillis dimidiatis subflexfloris, ore edentulo. *Crantz. austr. 262. Hoffm. germ. 206.*

Pollichia (*Galeobdolon*) calycibus pungentibus, corollae labio inferiore trifido, foliis omnibus cordatis dentati

petiolatis. *Willd. prod.* n. 613. *Roth. germ.* I. 254.  
II. 26r

*Lamium folio oblongo luteum.* *Bauh. pin.* 231.

*Galeopsis sive Urtica iners* flore luteo. *Bauh. hist.* 3. p.  
323.

*Urticae iners* tertia s. *Lamium* flore luteo. *Dod. pempt.*  
153.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 467.

Hohlzahnartiger Wolfstrapp. W.

*Habitat in Europae nemoribus.* 4 (v. v.)

*Plantam hanc sub diversis generibus a Botanicis descriptam ad Leonurum reduxi, ob floris structuram, licet habitu differat. Flos est Leonuri, habitus vero Lamii.* W.

### \*5. LEONURUS *supinus.*

*L. foliis subquinelobis, lobis obtusis apice dentatis, calycibus sessilibus spinosis.* W.

*Leonurus supinus.* *Stephan. in litt.*

Niedriger Wolfstrapp. W.

*Habitat in Sibiria.* 4 (v. l.)

*Caules plures semipedales adscendentes ex una radice, ramosi, tetragoni pubescentes. Folia opposita semiuncialia petiolata tri-vel quinqueloba; lobis oblongis subcuneatis obtusis, apice dentibus tribus vel quinque obtusis instructis; utrinque pubescentia praesertim subtus. Petioli foliorum longitudine. Verticilli quadrisexflori sessiles. Bractee setaceae mucronatae pubescentes calyce breviores. Calyx pubescens, laciniis ovatis apice spinosis. Corolla alba calyce parum longior, Labium trilobum obtusum. Stamina corolla breviora.* W.

### 6. LEONURUS *tataricus.*

*L. foliis tripartitis, laciniis subincisis, calycibus inermibus, labio corollae superiore plano erecto reflexo.* W.

*L. foliis tripartitis laciniatis, calycibus villolis.* *Hort. upf.* 171.\* *Gmel. it.* I. p. III.

*L. foliis trifidis.* *Gmel. sib.* 3. p. 238. n. 63. R.

*Sideritis foliis tripartito-multifidis.* *Hort. cliff.* 313.  
*Hort. upf.* 169.

*Cardiaca foliis tenuius et profundius incisis, glabra s. villosa.* *Amm. ruth.* 49. 50. *Mill. ic.* 80.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 500. et 501. t. 57. f. 1.

Tatarischer Wolfstrapp. W.

*Habitat in Tataria.* ♂ (v. v.)

Corollae *incarnatae*; Labio superiore *erecto, fornicato, stamina obtegente*: Lab. infer. *trifido: laterali-bus labio superiori approximatis; medio obovato.*  
*Ex India orientali magis glabra.*

*Simillimus sequenti sed flore minore et labio superiore plana apice reflexo distinctus, foliorum forma in utraque specie variat, laciniis plus minusve incis, obtusis acutisve.* W.

## 7. LEONURUS *sibiricus.*

L. foliis tripartitis, laciniis subincis, calycibus inermibus, labio corollae superiore concavo recto. W.

L. foliis tripartitis multifidis linearibus obtusiusculis.

*Hort. upf.* 170.\* *Kniph. cent.* 4. n. 41.

Ballote inodora, foliis coronopi. *Amm. ruth.* 48. t. 8.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 500.

Sibirischer Wolfstrapp. W.

*Habitat in Sibiria, China.* ☉ (v. v.)

Varietas *praecedentis corollis majoribus.* *Gmel. sib.*

3. p. 239.

*Puncta antherarum nitida pro caractere generico nil valent. Ex observationibus enim Clariff. Schkuhr. (Bot. Handb. 2. p. 124.) patet: genera Linn. sequentia: Ajuga, Teucrium, Sideritis, Lamium, Galeopsis, Betonica, Stachys, Ballota, Marrubium, Moluccella, Melittis etc. punctis nitidis in antheris gaudere.* W.

## 1113. P H L O M I S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 978.*

*Cal. angulatus. Corollae labium superius incumbens, compressum, villosum.*

### 1. PHLOMIS *fruticosa.*

P. foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucri lanceolatis, caule fruticoso. *Sp. pl.* 818. *Mill. dict.* n. 1. *Kniph. cent.* 1. n. 61. *Sabb. hort. rom.* 3. t. 15.

P. involucri tomentosis lanceolatis, foliis cordatis villosis, caule fruticoso. *Hort. upf.* 171.

P. involucri radiis lanceolatis villosis. *Hort. cliff.* 315.

Verbascum latis salviae foliis. *Bauh. pin.* 240.

Verbascum sylvestre alterum. *Dod. pempt.* 146.

- β. *Phlomis cretica fruticosa*, folio subrotundo, flore luteo.  
*Tournef. cor.* 10. *Kniph. cent.* 3. n. 71.  
*P. (latifolia)* foliis oblongo-ovatis petiolatis tomentosis,  
 floribus capitatis, caule fruticoso. *Mill. dict.* n. 3.  
*P. latifolia capitata lutea grandiflora.* *Dill. elth.* 316. t.  
 237. f. 306.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 502.  
 Strauchartige *Phlomis.* W.  
*Habitat in Sicilia, Hispania.* † (v. v.)

## 2. PHLOMIS *purpurea*.

- P. bracteis lanceolatis acutis pungentibus, calycibus pentagonis acuminatis, foliis subtus densius lanatis.* *Smith. spicil.* 1. p. 6. t. 7.\*  
*Phlomis purpurea.* *Sp. pl. ed.* 1. p. 585.  
*P. fruticosa lusitanica*, flore purpurascete, foliis acutioribus. *Tournef. inst.* 178. *Barr. rar.* 23. t. 405.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 503.  
 Purpurfarbene *Phlomis.* W.  
*Habitat in Lusitania, Hispania.* † (v. l.)  
*Phlomis purpurea Sp. pl. ed.* 1. in altera editione cum sequente est confusa. *Smith.* l. c.

## \*3. PHLOMIS *italica*.

- P. bracteis lanceolatis obtusis inermibus calycibus truncatis muticis, foliis utrinque lanatis.* *Smith spicil.* 1. p. 6.  
*P. (purpurea)* involucris linearibus obtusis calyce brevioribus, foliis cordatis oblongis tomentosis, caule suffruticoso. *Sp. pl. ed.* 2. p. 818. *Mill. dict.* t. 202.  
*P. fruticosa*, flore purpureo, foliis rotundioribus. *Tournef. inst.* 178.  
 Verbascum subrotundo salviae folio. *Bauh. pin.* 240.  
*Salvia fruticosa cisti* folio haud incano, floribus purpureis. *Pluk. alm.* 329. t. 57. f. 6.  
 Italienische *Phlomis.* W.  
*Habitat in Italia, Lusitania.* † (v. l.)

Caulis fere suffruticosus tomentosus plerumque debilis. Folia cordata oblonga utrinque tomentosa albida. Petioli inferiores folio longiores. Verticilli floribus sex. Involuca calyce dimidio breviora linearia obtusa tomentosa. Corolla labio inferiore supra purpurascete. Folia subtus veuis minus conspicuis, quam in vera *P. purpurea*, utrinque fere aequaliter lanata, nec supra viridia, inferiora basi cordata. Bractee obtusae mi-

nime pungentes, calycibus obtusissimis dimidio breviores. Species certe distinctissima. Smith. l. c.

#### 4. PHLOMIS *Nissolii*.

P. foliis utrinque tomentosis, radicalibus cordato-sagittatis, caulinis oblongis, verticillis ebracteatis, calycinis dentibus oblongis acutis. W.

P. foliis radicalibus cordato-sagittatis utrinque tomentosis villosis. *Sp. pl.* 819. *Mill. dict. t.* 204.

P. orientalis, foliis auriculatis incanis, flore luteo *Nissol.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 504.

Nissolische Phlomis. W.

*Habitat in Oriente.*

Folia radicalia profunde cordata, oblonga, obtusiuscula; *Flordia ovata*. Calyces hirsuti. Involucra nulla.

#### \* 5. PHLOMIS *armenica*. W.

P. foliis omnibus petiolatis lanceolatis subtus tomentosis, calycinis dentibus lanceolato-subulatis, bracteis calyce multo brevioribus subulatis reflexis. W.

P. orientalis angusto et longiore folio flore luteo. *Tournef. cor.* 10.

Armenische Phlomis. W.

*Habitat in Armenia.* 2 (v. l.)

Caulis tetragonus tomentosus. Folia longe petiolata lanceolata obtusa rugoso-venosa, obsolete dentata subtus albo-tomentosa. Verticilli sextori. Bracteae brevissimae nonnullae subulatae villosae reflexae. Calyx albo-tomentosus angulatus, dentibus lanceolato-subulatis rectis. Corolla flava praecedentis. W.

#### 6. PHLOMIS *Lychnitis*.

P. foliis lanceolatis tomentosis, floralibus sessilibus ovatis, bracteis setaceis lanatis calycis obtuse dentati longitudine. W.

P. foliis lanceolatis tomentosis, floralibus ovatis, involucris setaceis lanatis. *Sp. pl.* 819. *Mill. dict. n.* 6. *ej. ic. t.* 203.

P. foliis ligulatis utrinque tomentosis, radiis involucri setaceis villosis. *Sauv. monsp.* 143.

Verbascum angustis salviae foliis. *Bauh. pin.* 240.

Verbascum sylvestre, foliis Salviae tenuifoliae. *Lob. ic.* 558.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 504.*

S. hmalblättrige Phlomis. W.

*Habitat in Europa australi. † D. Sauvages.*

*Habitus speciei 1, sed Folia angustiora. Corollae vix calyce majores. Involucra linearia, pilis longis crinita.*

### 7. PHLOMIS *laciniata.*

S. foliis alternatim pinnatis: foliolis laciniatis, calycibus lanatis. *Sp. pl. 819. Mill. dict. n. 14.*

P. orientalis, foliis laciniatis. *Tournef. cor. 10.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 505.*

Schlitzblättrige Phlomis. W.

*Habitat in Oriente. 4 ♂*

### 8. PHLOMIS *samia.*

P. caule hirsuto, foliis cordatis crenatis subtus tomentosis, bracteis tripartitis subulatis mucronatis calycem aequantibus. *Desfont. atl. 2. p. 25.\**

P. foliis ovatis subtus tomentosis, involucris subulatis strictis tripartitis. *Sp. pl. 819. Mill. dict. n. 8.*

P. radiis involucri fetaceis trifidis, foliis cordatis. *Sauv. meth. 152.*

P. involucri radiis subulatis strictis. *Hort. cliff. 315.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 506.*

Dreytheilige Phlomis. W.

*Habitat in Africa boreali. 4*

*Folia maxima petiolata superne viridantia, subtus tomentosa incana. Verticilli multiflori. Bracteae numerosae tripartitae subulatae rigidae mucronatae pungentes pubescentes. Calyx tubulosus pubescens coriaceus quinquesidus, laciniis subulatis mucronatis, decemstriatus, striis quinque alternis minoribus. Corolla violacea magnitudine et forma P. fruticosae villosotomentosa. Desf. l. c.*

*Phlomis samia herbacea folio lunariae Tournef. cor. 10. ad aliam hujus generis speciem adhuc indescriptam ex mente Clariff. Desfontaines pertinet. W.*

### \*9. PHLOMIS *crinita.*

P. foliis cordatis integerrimis tomentosis, floralibus oblongis sessilibus, calycinis dentibus subulatis erectis, involucris fetaceis villosis calyce longioribus. W.

P. foliis radicalibus cordatis utrinque dense tomentosis,



involucris setaceis piloso-tomentosis. *Cavan. ic. 3. p. 25. t. 247.\**

Borstige Phlomis. W.

*Habitat in Hispania. 4*

Verticilli octoflori. Corolla extus tomentosa coloris dilute aurantii. *Cavan. l. c.*

\*10. PHLOMIS *biloba.*

P. foliis ovatis tomentoso-canis floralibus sessilibus, calycinis dentibus lanceolatis erectis, bracteis lineari-subulatis villosis calycis longitudine. W.

P. foliis ovato-oblongis tomentosis, verticillis subflexloris, calycibus semiquinquefidis villosis-lanigeris, corollarum labio superiore bipartito. *Desfont. atl. 2. p. 25. t. 127.\**

Zweyspaltige Phlomis. W.

*Habitat in Atlante prope Mayane Algeriae. 4*

Corolla magnitudine P. *Herbae venti* purpurea extus villosis-tomentosa, labium superius arcuatum compressum, saepe profunde bipartitum. *Desf. l. c.*

\*11. PHLOMIS *pungens.* W.

P. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis apice ferratis superne scabris subtus tomentosis, calycinis dentibus subulatis patentibus, bracteis calycis longitudine, subulatis mucronatis. W.

Phlomis *Herba venti.* *Pall. itin. ed. min. 3. p. 242.*

P. *orientalis* hormini folio, flore minore, calyce glabro. *Tournef. cor. 10. Ann. ruth. 50.*

Stechende Phlomis. W.

*Habitat in Armenia; Persia et in Sibiria ad Wolgam et Kumanum fluvium. 4 (v. l.)*

Caulis tetragonus tenuissime superne tomentosus, inferne pilosus. Folia oblongo lanceolata apice serrata basi integerrima superne scabra, subtus tomento tenui tecta, petiolata. Petioli plani basi connati. Verticilli sex-vel octoflori. Calyces profunde decemsulcati angulati, dentibus subulatis pungentibus patentissimis. Bractee subulatae pungentes ut calyx sub lente adspectae levi tomento tectae, nudis vero oculis apparent glabrae. Corolla sequentis sed paullo minor. Similis sequenti, differt vero: caule pubescente, foliis angustioribus apice tantum serratis subtus tomentosis superne scabris. *Vidi varietatem* bracteis et calycibus ciliatis. W.

12. PHLOMIS *Herba venti.*

P. foliis ovato-oblongis ferratis subtus hirtis, calycinis dentibus lanceolato-subulatis erectis, bracteis subulatis cauleque hirtis. W.

P. involucris fetaceis hispidis, foliis ovato-oblongis scabris, caule herbaceo. *Hort. upf.* 171. \* *Sauv. monsp.* 152. *Mill. dict. n.* 4. *Pall. it.* 1. p. 154. *Sabb. hort.* 3. t. 17.

P. involucris radiis fetaceis hispidis. *Hort. cliff.* 315.

P. narbonensis hormini folio, flore purpurascente. *Tournef. infl.* 178.

Marrubium nigrum longifolium. *Bauh. pin.* 230.

Herba venti Monspelienfibus. *Bauh. hist.* 3. p. 854.

Herba venti. *Lob. ic.* 532.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 506.

Wind-Phlomis. W.

*Habitat in Hispania, Italia, Gallia australi ad aggeres.*

4 (v. l.)

\* 13. PHLOMIS *alpina.*

P. foliis radicalibus cordatis pubescentibus, floralibus lanceolatis, bracteis lineari-subulatis villosis, caule pubescente. W.

P. involucris fetaceis villosis, foliis radicalibus caulisque cordatis ferratis, verticillaribus lanceolatis trinerviis. *Pall. Act. petrop.* 1779. 2. p. 265. t. 13. \* *Amm. ruth.* 48.

Gebirgs-Phlomis. W.

*Habitat in summis jugis alpium Altaicarum.* 4 (v. l.)

*Simillima sequenti differt vero: caule pubescente, foliis pubescentibus, et caulinis inferioribus cordatis, summis floralibus longissimis lineari-lanceolatis, bracteis villosis.* W.

14. PHLOMIS *tuberosa.*

P. foliis radicalibus cordatis scabris, floralibus oblongo-lanceolatis, bracteis subulatis hispidis, caule glabro. W.

P. involucris hispidis subulatis, foliis cordatis scabris, caule herbaceo. *Hort. upf.* 171. *Mill. dict. n.* 5. *Gmel. it.* 2. praef. p. VI. *Pall. it.* 1. p. 319. *Kuiph. cent.* 4. n. 62.

P. involucris radiis fetaceis, foliis ex cordato lanceolatis. *Gmel. sib.* 3. p. 241. n. 73.

P. foliis cordiformibus galea lacera. *Act. goett.* 211. t. 12.

P. urticae foliis, glabra. *Amm. ruth.* 49.

*Galeopsis maxima*, foliis hormini. *Buxb. cent.* 1. p. 4. t. 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 507.

Knollige Phlomis. W.

*Habitat in Sibiriae campestribus.* 2 (v. v.)

Involucra *subulata et Calycis dentes patentes, hispidi.* Corollae *galea dentata.* Radix *tuberosa.*

### 15. PHLOMIS *zeylanica.*

P. foliis lanceolatis subferratis, capitulis terminalibus, calycibus octodentatis. *Sp. pl.* 820. *Iacq. ic. rar.* 1. t. III.

*Leonurus* foliis lanceolatis subferratis obtusiusculis, calycibus octodentatis. *Fl. zeyl.* 227.\*

*Cardiaca* f. *Leonurus*, *hyslopi* hirsutis foliis, maderaspatana, floribus dilute rubris, unico tantum verticillo in ramulorum cymis. *Pluk. alm.* 81. t. 118. f. 4.

*Clinopodium hyslopi* latioribus foliis maderaspatanum.

*Pluk. phyt.* t. 164. f. 2. aut t. 163. f. 6. aut t. 80. f. 7?

Herba admirationis. *Rumph. amb.* 6. p. 39. t. 16. f. 1.

β. *Leonurus (indicus)* foliis lanceolatis subferratis, calycibus septemdentatis. *Sp. pl.* 3. p. 817.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 507. t. 57. f. 2.

Zeylonische Phlomis. W.

*Habitat in India.* ☉ (v. v.)

Caulis *statura Phlomid. Leonuri, bipedalis, erectus, herbaceus, tetragonus, obtusus.* Folia *lanceolata, subtomentosa, lineata, petiolata, remote subserrata, internodiis longiora.* Verticilli *subterminales involuero subulato.* Calyx *oblique deorsum truncatus, obsolete septemdentatus; dente superiore longiore.* Corolla *alba: Lab. sup. hirsuto, brevissimo, fornicato, clauso, integro; Lab. inferiore magno, patente, 3-fido; intermedia ampla, subplicata: media vix triloba.* Antherae *nigrae, compressae, truncatae.* Stigma *alterum sessile supra Stylum pone apicem; alterum inferius, subulatum, acutum.* *Syst. Veget.* p. 450.

### \* 16. PHLOMIS *martinicensis.*

P. foliis oblongis dentatis subtus pubescentibus, verticillis multifloris globosis, calycibus incurvis octodentatis dente supremo longissimo.

P. (*martinicensis*) involucris setaceis, verticillis subglobosis, calycibus recurvis, lacinia suprema subulata longissima, foliis ovato-oblongis villosis. *Swartz. prod.* 88.

*P. (caribaea)* foliis ovato-lanceolatis villosis, verticillis subrotundis densissimis, involucris fetaceis hirsutis, caule herbaceo. *Jacq. ic. rar. I. t. 110. Collect. I. p. 154.\**

*Clinopodium (martinicense)* foliis ovato-oblongis basi attenuatis, verticillis globosis, bracteis fetaceis. *Jacq. amer. 173. t. 177. f. 75.\**

Westindische Phlomis. W.

*Habitat in Martinicae herbidis.* ☉ (v. v.)

\* 17. PHLOMIS *urticifolia*.

*P. foliis ovatis serratis canescentibus, involucris subulatis, calycibus oblique truncatis membranaceis novemdentatis.* *Vahl. symb. 3. p. 76.\**

Nesselblättrige Phlomis. W.

*Habitat in Arabia felici et India orientali.* ☉ (v. l.)

*Similis P. indicae at caulis uti folia pilis minutissimis canescens nec tomentosus; folia utrinque concoloria, serraturis profundis, plana nec rugosa et subtus tomentosa, calycibus minoribus.* *Vahl l. c.*

\* 18. PHLOMIS *decemdentata*. W.

*P. foliis oblongis basi angustatis serratis, verticillis ebracteatis, calycibus decemdentatis.* W.

*Stachys decemdentata.* *Först. prod. n. 526.*

Zehnzählige Phlomis. W.

*Habitat in Societatis insulis.* (v. l.)

*Caulis herbaceus tetragonus pubescens. Folia petiolata uncialia oblonga basi in petiolum attenuata acutiuscula serrata pubescentia. Verticilli multiflori subpedunculati absque bracteis. Calyx pubescens campanulatus decemstriatus et decemdentatus, dentibus subulatis alternis minoribus. Corollae tubus calyce parum longior, labium superius erectum indivisum valde villosum; inferius tripartitum glabrum.* W.

\* 19. PHLOMIS *biflora*.

*P. foliis ovatis serratis, calycibus solitariis oppositis decemdentatis.* *Vahl symb. 3. p. 77.\**

*Leucas foliis rotundis serratis, flore albo.* *Burm. zeyl. t. 140. t. 63. f. 1.*

*Lamium indicum, foliis oblongis, flore albo, graveolens.* *Herm. zeyl. 65.*

*Ghaetha tumbus.* *Herm. zeyl. 65.*

Zweyblütige Phlomis. W.

*Habitat in India orientali.*

\*20. PHLOMIS *chinenfis*.

P. foliis ovatis serratis tomentoso-sericeis, calycibus verticillatis decemdentatis. *Retz. obs. 2. p. 19.*

Chinesische Phlomis. W.

Habitat in China. †

Caulis fruticosus, ramis tetragonis hispida. Folia opposita ovata et subcordata petiolata serrata tomentoso-sericea. Verticilli 5-6-flori axillares, floribus pedicellatis. Calyx infundibuliformis decemstriatus, dentibus decem aristatis. Flos albus, labio superiore compresso extus hirsuto, imprimis margine: inferiore trilobo nudiusculo. Stamina et Pistillum generis. *Retz. l. c.*

21. PHLOMIS *indica*.

P. involucris linearibus, calycibus unilabiatis obliquis, foliis ovatis pilosis. *Sp. pl. 820.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. p. 509.*

Indische Phlomis. W.

Habitat in India. ☉

Folia ovata, serrata, basi attenuata, petiolata, pilis mollibus vestita, viridia. Verticilli versus apicem duo vel tres crassi, cincti involucris erectis, linearibus, carinatis, villosis. Calyces tubulosi, oblongi, decagoni, exteriori margine oris producti in labium 3-dentatum; a tergo, ubi margo brevissimus, dentes duo minutissimi. Corolla Leonuri Cardiacae: galea hirsutissima pilis albis, longior, incana. Labium inferius 3 fidum: media duplo longiore. Nimis affinis *L. zeylanico*.

\*22. PHLOMIS *moluccoides*.

P. foliis ovatis, involucris setaceis, calycis labio inferiore rotundato membranaceo. *Vahl symb. 1. p. 42. t. 14.\**

Clinopodium (fruticosum) caule arborecente, foliis ovalibus crenatis, calycis labio inferiore subrotundo. *Forsk. descr. 107.\**

Trichterkelchartige Phlomis. W.

Habitat in Arabia felici. †

Verticilli remoti 14-flori. Involucra 4-vel 7-partita setacea longitudine tubi calycis villosa. Calyx tubulosus 10-sulcatus villosus bilabiatus; labium superius breve oblongum acutum; inferius subrotundum trilobum; lobi laterales breves; intermedius reliquis qua-

*druplo latior rotundatus membranaceus venoso-reticulatus.* Vahl. l. c.

\*23. PHLOMIS *glabrata.*

P. foliis ovatis ferratis, calycibus labio inferiore producto tridentato, ramis reverse pilosis. *Vahl. symb. I. p. 42.\**

Glatte Phlomis. W.

*Habitat in Arabia felici.*

Verticilli remoti 6-8-flori. Involucra minuta quadripartita setacea subpungentia glabra apicē flavescencia, calyce quadruplo breviora. Calyx decemstriatus glaber subcampanulatus obliquus, inferne in labium tridentatum prōductus, dentibus aequalibus setaceis, superne septemdentatus. Vahl. l. c.

\*24. PHLOMIS *alba.*

P. foliis ovatis ferratis villosis, calycibus quinquedentatis obliquis. *Vahl symb. I. p. 43.\**

P. (*alba*) involucris palmato-filiformibus, foliis ovatis ferratis. *Forsk. descr. 107.\**

Weisse Phlomis. W.

*Habitat in Arabia felici.*

Flores verticillati, verticillis remotis 10-12-floris. Involucra quadrifida, laciniis setaceis longitudine calycis. Calyx campanulatus pubescens, fauce obliqua, quinquedentatus, dentibus subulatis inermibus, binis superioribus majoribus. Vahl l. c.

25. PHLOMIS *nepetifolia.*

P. foliis cordatis acutis ferratis subtomentosis, calycibus sex-*f.* octodentatis, dente supremo et infimo majori, caule herbaceo. *Lin. suppl. 274.*

P. foliis cordatis acutis ferratis subtomentosis, calycibus septemdentatis aristatis: suprema majore, caule herbaceo. *Syst. veg. 451.*

P. foliis ovatis, calycibus decagonis septemdentatis inaequalibus. *Sp. pl. 2. p. 320. Hort. cliff. 312. sub Leonuro.*

Cardiaca americana annua, nepetae folio, floribus brevibus phoeniceis villosis. *Herm. lugdb. 115. t. 117.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 510.*

Katzenmünzblättrige Phlomis. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. v.)

Caulis simplex, erectus, quadrangulus, obtusus. Folia cordata, obtusiuscule profundeque serrata, sub-

*tomentosa, viridia. Petioli longitudine foliorum. Verticilli aliquot versus apices globosi, multiflori. Calyx subpilosus, cylindricus limbo spinoso, acutissimo: dente superiore duplo majore; praeterea dentes 4-6 parvi. Corolla villosa, facie et colore Ph. Leonuri, sed triplo minor: Lab. super. teretiusculo, longo, emarginato; Lab. inf. brevi, trifido, laevi. Involucrum subulatum, reflexum. Stamina per varia cohaerentia. Stigmata 2, filiformia, superiore dimidio breviora.*

*Caulis tetragonus quadrifurcatus erectus sexpedalis laevis, sulcis inter folia isthmo interceptis. Folia opposita petiolata cordata grosse serrata venosa, vix villosa aut glabra Lamii albi. Verticilli globosi ad apicem duo s. tres. Bractae verticillorum foliaceae diphyllae longiores dependentes binae. Calycis tubus villosus; limbus dentibus vix pungentibus 6. s. 8. supremo et infimo majore, reliquis inter se aequalibus acutis. Corolla P. Leonuri fulva holosericea. Labium inferius nudum trifidum obtusum parvum mox marcescens. Suppl. 1. c.*

## 26. PHLOMIS *Leonurus.*

*P. foliis lanceolatis ferratis, calycibus decagonis decemdentatis muticis, caule fruticoso. Mant. 412. Berg. cap. 151. Knorr. del. hort. 2. t. L. Sabb. hort. 3. t. 44. Kniph. cent. 2. n. 54.*

*L. africana. Mill. dict. n. 1.*

*Leonurus foliis lanceolatis obtuse ferratis. Hort. cliff. 312.*

*Sideritis africana, flore aureo oblongo. Barrth. act. 2. p. 57. fig.*

*Leonurus capitis bonae spei. Breyn. cent. 171. t. 86. Seb. mus. 1. p. 22. t. 14. f. 1.*

*Stachys africana frutescens angustifolia, flore longissimo phoenico, Leonurus dicta. Moris. hist. 3. p. 383. f. 11. t. 10. f. 17.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 510.*

*Goldfarbige Phlomis. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. h̄ (v. v.)*

*Planta spectatissima, dum floret. Calyx muticus. Involucrum calyce longius, polyphyllum, subulatum, reflexum. Corolla fulva, holosericea: Lab. super. longo, tomentoso, ciliato, integerrimo: Lab. infer. brevi, nudo, membranaceo; lateralibus reflexis, aridis: inter-*

*media trifida: media emarginata. Filamenta nivea. Antherae bilobae, flavae, basi tantum adspersae farina globulari. Stigma superius brevius.*

27. PHLOMIS *Leonitis.*

P. foliis ovatis obtusis subtomentosis crenatis, calycibus septemdentatis aristatis, caule fruticoso. *Mant.* 83.

*Leonurus minor* Cap. b. spei. *Boerh. lugd.* 1. p. 180. *Mill. dict.* t. 162.

*Stachys atricana* frutescens. *Melissae* foliis, floribus brevioribus phoeniceis. *Morif. hist.* 3. p. 383.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 512.

Melissenblättrige *Phlomis.* W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. †

*Simillima Ph. Leonuro, sed Folia ovata, nec lanceolata; magis tomentosa; Calycibus aristatis a Leonuro differt maxime; cum Phl. nepetifolia convenit, sed ab hac differt: Caule fruticoso, foliis parvis, obtusis, consistentibus, calycisque collo hirto. Corollae conveniunt in omnibus tribus.*

IIII4. M O L U C C E L L A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 979.

*Calyx campanulatus, ampliatus, corolla latior, spinosus.*

I. MOLUCCELLA *spinosa.*

M. calycibus bilabiatis, labio superiore lanceolato mucronato longiore, inferiore rotundato septemdentato, dentibus spinosis, foliis petiolatis ovatis profunde dentatis. W.

M, calycibus ringentibus octodentatis. *Sp. pl.* 821. *Roy. lugdb.* 314. *Hort. upf.* 172. *Mill. dict.* n. 2. *Sabb. hort.* 3. t. 46.

*Molucca spinosa.* *Dod. pempt.* 92.

*Melissa moluccana foetida.* *Bauh. pin.* 229.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 514.

Dorniger Trichterkelch. W.

*Habitat in* Moluccis. ☉ (v. v.)

*Verticilli sextori, sessiles. Involucrum Spinis 4-terminatis, linearibus, patentibus spinosis. Calycis Lab. superius majus, acuminato-spinosum; L. infe-*



*rius rotundatum, integrum, spinis septem. Corolla calyce longior.*

2. **MOLUCCELLA laevis.**

M. calycibus campanularis quinquedentatis, dentibus aequalibus muticis, foliis petiolatis subrotundo-ovatis dentatis. W.

M. calycibus campanularis subquinquedentatis: denticulis aequalibus. *Sp. pl.* 821. *Roy. lugdb.* 314. *Hort. upf.* 172. *Gron. orient.* 75. *Mill. dict. n. 1. Kniph. cent.* II. n. 77. *Sabb. hort.* 3. t. 45. *Regn. bot.*

Molucca laevis. *Dod. pempt.* 92.

Melissa moluccana odorata. *Bauh. pin.* 229.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 513.

Glatter Trichterkelch. W.

*Habitat in Syria.* ☉ (v. v.)

*Calyx corollis longior.*

\*3. **MOLUCCELLA tuberosa.**

M. calycibus infundibuliformibus quinquedentatis, dentibus aequalibus mucronatis, foliis sessilibus cuneiformi-oblongis dentatis. W.

Moluccella tuberosa. *Pall itin.* 3. *app. n.* 101. t. T.\*

Knolliger Trichterkelch. W.

*Habitat in limosis deserti Tatarici australis in collibus ad Wolgam ex adverso Jenataëvenis fortalitii.* 24 (v. l.)

*Radix magnitudine pugni e tuberibus binis tribusve composita. Folia radicalia petiolata oblonga rugoso-venosa, inciso-dentata superne glabra, inferne ad venas villosa, iis Salviae Aethiopsis similia sed minor et glabra. Petioli ad radicem valde villosi canaliculati. Caulis ramosus divaricatus tetragonus glaber. Folia caulina opposita sessilia cuneiformi-oblonga profunde duplicato-dentata, margine ad venas subtus et inferne ad basin villosa ceterum glabra. Calyces infundibuliformes mihi semper quinquedentati visi, dentibus aequalibus mucronatis. Corolla calyce longior, labium superius integrum fornicatum pilosum, inferius trilobum, lobis rotundatis. Stamina et Pistillum labio superiore longiora. W.*

\*4. **MOLUCCELLA persica.**

M. calycibus infundibuliformibus quinquedentatis, foliis sessilibus cuneiformibus spinoso-dentatis. W.

M. calycibus quinquefidis obtulis, laciniis obovatis membranaceis, foliis cuneiformibus apice serratis, serraturis spinosis. *Burm. ind.* 128. t. 38. f. 2.

*Linnaei Spec. Plant. T. III*

1

Persischer Trichterkelch. W.

*Habitat in Persia.* †

Frutex similis *M. frutescenti*, ramis simplicibus erectis glaberrimis albicantibus. Spinae ad singula genicula inaequales simplicissimae patentes, basi saepe cohaerentes, numero 5 ad 12. Folia cuneiformia, basi integerrima, apice serrata; serraturis spinulosis tomentosis, quae in *M. frutescenti* mucicae. Calyx regularis quinquesidus, laciniis obovatis scariosis obtusis cum tribus mucronibus, quae in *M. frutescente* ovatae acuminatae. Corolla planiuscula glabra. Burm. l. c.

Hanc perperam cum sequente conjunxerat Linnaeus, quocum nullo modo convenit. W.

5. MOLUCCELLA *frutescens*.

*M. calycibus infundibuliformibus quinquedentatis. dentibus spinosis, foliis petiolatis ellipticis obtusis subquinquedentatis.* W.

*M. calycibus infundibuliformibus quinquesidis, corollis calyce longioribus.* *Sp. pl.* 821. *Allion. nicaeensis.* 51. *Allion. ped. n.* 122. *t.* 2. *f.* 2.\*

Scordium spinosum, floris labio superiore s. galea lanuginosa s. villosa. *Raj. suppl.* 311.

*Houttuyn Lin. Pl. Syst.* 7. *p.* 515.

Strauchartiger Trichterkelch. W.

*Habitat in Italia.* † (v. l.)

Fruticulus *Ramulis dichotomis. Folia ovata, pollicaria, pilis raris pubescentia, utrinque 2 s. 3. profundis serraturis notata, petiolata. Spinae axillares, utrinque solitariae, ternatae ut in Berberide, sed tantum ad florum verticillos. Calyces infundibuliformes, parvi, decagoni, regulares limbo quinquesido, spinis terminalibus 10. Corolla Cardiacae, galea lanata. Media inter Ballotam, Leonurum et Moluccellam.*

\*6. MOLUCCELLA *grandiflora*.

*M. calycibus infundibuliformibus quinquesidis, laciniis mucronatis, foliis sessilibus tripartitis, laciniis incisis.* W.

*M. (diacanthophylla) foliis tripartitis, laciniis linearibus incisis mucronatis, spinis geminis axillaribus setaceis.* *Pall. Nov. Act. Petrop.* 10. *p.* 380. *t.* II.\*

*Moluccella grandiflora. Stephan. in litt.*

Großblütiger Trichterkelch. W.

*Habitat in altissimo jugo Tartagatai Songariae finitimo.*

4 (v. l.)

Corolla calyce longior, labio superiore villoso bifido, inferiore trifido, lacinia media biloba. Ab omnibus foliis abunde distincta. W.

### 1115. CLINOPODIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 98c.

Involucrum multifetum, verticillo subjectum  
Cal. bilabiatus. Corollae labium superius  
planum obcordatum rectum.

#### I. CLINOPODIUM vulgare.

C. capitulis verticillatis, bracteis setaceis hispidis, foliis superne pilosis remote dentatis, caule subsimplici. W.

C. capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. Sp. pl. 821. Mill. dict. n. 1. Crantz. austr. p. 283. Pollich. pal. n. 572. Scop. carn. n. 731. Kniph. cent.

II. n. 31. Sabb. hort. 3. t. 65. flore albo t. 66. Fl. dan. t. 930. Hoffm. germ. 211. Roth. germ. I. 261. II. 45.

C. foliis ovatis, capitulis verticillatis. Hort. cliff. 305. Fl. suec. 479, 533. Roy. lugdb. 313.

C. foliis ovatis lanceolatis obiter dentatis, stipulis setaceis. Hall. helv. n. 239.

C. origano simile. Bauh. pin. 224.

Clinopodium. Cam. epit. 563. Riv. t. 43.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 516.

Gemeine Wirbelborste. W.

Habitat in rupestribus Europae, Canadae. 4 (v. v.)

Canadense ex seminibus duplo minores gerit corollas, caeterum idem.

Occurrit in hortis nostris varietas pygmaea digitalis, foliis triplo minoribus albo variegatis, capitulo terminali, floribus magnitudine spontanei. W.

#### \*2. CLINOPODIUM aegyptiacum.

C. capitulis terminalibus, bracteis setaceis hispidis, foliis superne glabris subintegerrimis, caule ramoso. W.

C. (aegyptiacum) verticillis axillaribus et distantibus, foliis subintegris superficie glabris. Lamarck. encycl. 2. p. 50.\*

C. foliis ovatis rugosis verticillatis omnibus distantibus. Mill. ic. 63. t. 95.

Clinopodium vulgare β. Sp. pl. 822.

Aegyptische Wirbelborste. W.

*Habitat in Aegypto.* 2 (v. v.)

*Simillimum praecedenti, sed cultura non mutatur, differt enim: caule ramoso, foliis superne nunquam pilosis, plerumque integerrimis uno alterove dente obscure notatis, capitulis in apice caulium ramorum ramulorumque sed nunquam verticillatis, corollis carneis.* W.

### 3. CLINOPODIUM *incanum*.

C. capitulis verticillatis, bracteis lanceolatis, foliis subdentatis incanis subtus tomentoso-pubescentibus. W.

C. foliis subtus tomentosis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis. *Sp. pl.* 822. *Mill. dict. n.* 2.

C. foliis lanceolatis serratis, verticillis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 313.

C. menthae folio, incanum et odoratum. *Dill. elth.* 87. t. 74. f. 85.

C. majus virginianum non ramosum, verticillis majoribus, floribus brevioribus carneis. *Morif. hist.* 3. p. 374. f. 11. t. 8. f. 4.

C. *Serpentaria* dictum, latiori folio, capitulis grandioribus. *Pluk. mant.* 51. t. 344. f. 7. *Raj. suppl.* 298.

*Origanum* foliis ad summitatem caulium canis. *Raj. hist.* 1229.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 517.

Graue Wirbelborste. W.

*Habitat in America boreali.* 2 (v. v.)

## III6. O R I G A N U M.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 981.

*Strobilus* tetragonus, spicatus, calyces colligens. *Corollae* labium superius erectum planum, inferius tripartitum, laciniis aequalibus.

### I. ORIGANUM *aegyptiacum*.

O. foliis carnosis tomentosis, spicis nudis. *Sp. pl.* 822. *Hasselq. it.* 479. *Mill. dict. n.* 8.

*Majorana rotundifolia scutellata* exotica. *Tournef. inst.* 199.

*Origano cognata Zatarhendi.* *Bauh. pin.* 223. *Morif. hist.* 3. p. 360 f. 11. t. 3. f. ult.

*Zatarhendi.* *Alp. Aegypt.* 94. t. 95.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 520.

Aegyptischer Dosten. W.

*Habitat in Aegypto.* 4

2. **ORIGANUM** *Dictamnus.*

C. foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus.

*Hort. cliff.* 304. *Mat. med.* 150. *Roy. lugdb.* 323.

*Kniph. cent.* 4. n. 58. *Ludw. ect. t.* 134. *Blackw. t.* 462. *Sabb. hort.* 3. t. 76. *Regn. bot.*

*Origanum hybridum et Dictamnus.* *Mill. dict. n.* 10. et 12. R.

*Dictamnus creticus.* *Bauh. pin.* 222.

*Dictamnus cretense.* *Cam. epit.* 472.

*Dictamnus.* *Lob. ic.* 502.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 521.

Diptam-Dosten. W.

*Habitat in Cretae monte Ida.* † (v. v.)

*Folia orbiculata tomentosa.* W.

3. **ORIGANUM** *sipyleum.*

O. foliis omnibus glabris, spicis nutantibus. *Hort. cliff.*

304. *Roy. lugdb.* 323. *Mill. dict. n.* 11.

*Origanum montis sipyli.* *Herm. lugdb.* 462. t. 463.

*Dictamnus sipyleus, majoranae foliis.* *Morif. hist.* 3. p. 457. f. 11. t. 4. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 522.

Sipyliſcher Dosten. W.

*Habitat in Phrygiae monte Sipylo.* † (v. l.)

*Folia ovata glabra.* W.

\*4. **ORIGANUM** *Tournefortii.*

O. spicis tetragonis, bracteis subrotundis maximis. *Ait.*

*Kew.* 2. p. 311.

O. *Dictamni cretici* facie, folio crasso nunc villoſo nunc glabro. *Tournef. it.* 1. p. 240. fig.

Tournefortiſcher Dosten. W.

*Habitat in insula Amorgos.* † (v. l.)

*Folia orbiculata subcordata subsessilia margine villosa. Spicae terminales tres vel plures erectae oblongae sesquiunciales tetragonae. Bractee subrotundae acutiusculae nervosae glabrae.* W.

\*5. **ORIGANUM** *ciliatum.* W. †

O. spicis ovatis oppositis sessilibus erectis, bracteis setaceo-ciliatis. W.

Gefranzter Dosten. W.

*Habitat in Guinea.* (v. l.)

Caulis videtur adscendens herbaceus, obsolete tetragonus inferne glaber superne pubescens. Folia petiolata ovata obtusa glabra subintegerrima. Petioli hirti. Spicae in foliorum axillis sessiles magnitudine et facie strobilorum maturorum Humuli Lupuli ovatae. Bractae magnae orbiculato-cordatae reticulato-nervosae, margine setis ciliatae. Flores non vidi. W.

\*6. **ORIGANUM benghalense.** †

O. foliis ovatis dentatis, spicis imbricatis lanuginosis, bracteis ovatis. *Burm. ind.* 128. t. 38. f. 3.

Bengälischer Dosten. W.

*Habitat in Bengalia,*

Caulis quadrangularis purpurascens glaber. Folia ovata ad basin integerrima coarctata, lateribus inaequaliter dentata, glabra acuminata. Spicae oppositae pedunculatae. Bractae imbricatae ovatae, pilis albicantibus lanuginosae. Flores minimi. *Burm. l.c.*

*Habitu accedit ad praecedentem speciem.* W.

7. **ORIGANUM creticum.**

O. spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *Mat. med.* 151. *Mill. dict. n.* 6. *Fabric. helmst. p.* 110. *Hall. helv. n.* 234.

O. foliis ovatis acutis glabris: venis scabris, spicis tetragonis. *Gron. orient.* 75.

O. foliis ovatis obtusis scabris integerrimis; spicis confertis compactis glabris. *Amoen. acad.* I. p. 160.

O. creticum. *Bauh. pin.* 223.

β. O. folio subrotundo. *Bauh. pin.* 223.

O. monspeliense pulchrum. *Cam. epit.* 468.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 523.

Candischer Dosten. W.

*Habitat in Europa australi, Palaestina, Bafileae.* 24

8. **ORIGANUM Smyrnaeum.**

O. foliis ovatis acutis serratis, spicis congestis umbellatim fastigiatis. *Hort. cliff.* 304. *Roy. lugdb.* 324. *Mill. dict. n.* 9.

O. Smyrnaeum. *Wheel. itin.* - - *Ray. hist.* 450.

Majorana cretica, origani foliis, villosa, satureiae odore, corymbis majoribus albis. *Tournef. cor.* 13.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 524.

Smyrnascher Dosten. W.

*Habitat in Creta et Smyrnae in monte cui arx inaedificata.* 4 (v. f.)

9. **ORIGANUM heracleoticum.**

Origanum spicis longis pedunculatis aggregatis, bracteis longitudine calycum. *Sp. pl.* 823. *Mill. dict. n.* 2.

O. heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii. *Bauh. pin.* 223.

Orega, Origanum heracleoticum, Cunila. *Lob. ic.* 492.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 524.

Griechischer Doften. W.

*Habitat in Europa australi, Graecia.* 4.

Habitus O. vulgaris, sed spicae digitales, laxe imbricatae; at differt ab O. cretico, quod bractee vix calycibus longiores et demum quod spicae pedunculatae.

10. **ORIGANUM vulgare.**

O. spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Mat. med.* 151. *Gmel. fib.* 3. p. 244. *Mill. dict. n.* 1. *Reyg. ged.* 1. p. 154.

*Neck. gallob.* p. 259. *Crantz austr.* p. 282. *Pall.*

*it.* 1. p. 64. 72. *Scop. carn.* n. 740. *Pollich.*

*pal.* n. 573. *Mattusch. sil.* n. 449. *Doerr. naff.* p.

166. *Flor. dan. t.* 638. *Ludw. ect. t.* 90. *Kniph.*

*cent.* 4. n. 59. *Sabb. hort.* 3. t. 56. *Regn. bot.*

O. foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatis.

*Hort. cliff.* 305. *Fl. juec.* 480, 534. *Roy. lugdb.* 323.

*Gron. virg.* 65.

O. foliis ovatis, umbellis coloratis staminibus exsertis.

*Hall. helv.* n. 233.

O. sylvestre. *Bauh. pin.* 243. *Blackw. t.* 280.

O. sylvestre s. vulgare. *Fuchf. hist.* 522. *Riv. t.* 60.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 525.

Gemeine Doften. W.

*Habitat in Europae, Canadae rupestribus.* 4 (v. v.)

Americanum bracteis coloratissimis gaudet.

Datur varietas umbellis decoloribus, floribus albis.

*Crantz austr. l. c.*

\* 11. **ORIGANUM glandulosum.**

O. hirsutum, glomerulis florum subrotundis paniculatis, corollis calycibusque glandulosis, bracteis calyce brevioribus. *Desfont. atl.* 2. p. 27.

Drüfiger Doften. W.

*Habitat in Atlante prope Mascar.* 4

*Facies omnino O. vulgaris. Caulis pedalis vel bipedalis erectus ramosus, hispidus pilis albidis. Folia hirta ovata obtusa integerrima aut vix dentata, subtus nervosa, brevissime petiolata punctata glandulosa. Flores parvi numerosi paniculati glomerati, glomerulis rubicundis. Bracteae parvae ovatae obtusae calyce breviores: non coloratae. Calyx teres striatus; sursum latior quinquedentatus, dentibus minimis. Faux villis candidis clausa. Corolla O. vulgaris paullo minor. Labium superius obtusum breve emarginatum, inferius trilobum, lobis rotundatis integris. Bracteae, Calyces, Corollae punctis aureis glandulosis innumeris conspersi. Desf. l. c.*

## 12. ORIGANUM *Onites.*

*O. spicis oblongis aggregatis hirsutis, foliis cordatis tomentosis. Sp. pl. 824. Hudf. angl. 262. Mill. dict. n. 13.*

*D. lignosum Syracusanum perenne, umbella amplissima brevi, lato et nervoso folio. Bocc. mus. 2. p. 45. t. 38.*

*O. onites. Bauh. pin. 222. an?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 526.*

*Syraculser Dosten. W.*

*Habitat Syracusae. †*

*Habitus Majoranae, sed lignosus. Caules pilis longis patulis. Folia parva, cordata, subsessilia, acuta, rarius serrata, utrinque tomentosa, ex alis ramorum rudimenta. Spicae congestae, ut in Majorana, sed oblongae, in singulo pedunculo terne intermedio sessili, villosae; Flores albi.*

## 13. ORIGANUM *syriacum.*

*O. spicis longis ternatis pedunculatis villosis, foliis ovatis villosis. Sp. pl. 824.*

*Majorana syriaca vel cretica. Bauh. pin. 224.*

*Marum syriacum. Lob. ic. 499. \**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 527.*

*Syrifcher Dosten. W.*

*Habitat in Syria?*

*Habitus Majoranae. Folia subrotundo-ovata, acuta, pilis vagis adspersa. Racemi ex axillis. Corymbus terminalis, ex ramis longioribus brachiatus. Spicae saepius ubique 3, terminales, longae, erectae, tetragonae, villosae.*



14. *ORIGANUM Maru.*

O. spicis hirsutis, foliis ovatis tomentosis sessilibus. *Sp. pl.* 825.

Majorana cretica, organi folio, villosa satyriae odore flore purpurascens. *Tournef. cor.* 13.

Maru creticum. *Alp. exot.* 289. t. 288.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 527.

Pfefferkrautduftiger Dosten. *W.*

*Habitat in Creta.* 4 (v. f.)

*Facies O. Majoranae, sed rigidior. Folia absque manifestis petiolis, valde crassa, tomentosa, ovata, nec obovata, albida. Caulis purpurascens, adpersus villis raris. Capitula valde hirsuta, triternata; ultima sessilia, caulem ramosque terminantia.*

15. *ORIGANUM Majorana.*

O. spicis subrotundis ternis compactis pedunculatis, foliis petiolatis ellipticis obtusis glabriusculis, radice annua. *W.*

O. foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Hort. cliff.* 304. *Hort. upf.* 161. *Mat. med.* 151. *Roy. lugdb.* 324. *Mill. dict. n.* 7. *Blackw. t.* 319. *Regn. bot.*

Majorana vulgaris. *Bauh. pin.* 224.

Majorana vulgaris annua. *Morif. hist.* 3. f. II. t. 3. f. 1.

Amaracus vulgarior. *Lob. ic.* 498.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 528.

Majoran-Dosten. *W.*

*Habitat in Lusitania, Palaestina.* ☉ (v. v.)

\* 16. *ORIGANUM Majoranoides.* *W.*

O. spicis subrotundis pluribus glomeratis pedunculatis, foliis petiolatis ellipticis obtusis tomentosis, caule suffruticoso. *W.*

Majorana hortensis odorata perennis. *Morif. hist.* 3. p. 359.

Winter-Dosten. *W.*

*Habitat* - - - ☽ (v. v.)

*Species a praecedente distinctissima: caule perenni, foliis incanis, spicis in pedunculo communi pluribus glomeratis. Habitus exacte praecedentis, sed O. Majorana est planta constanter annua, nec in olla educata et frigidario asservata perennat. O. syriacum differre videtur: foliis acutis, spicisque ternis longis. A Botanicis omnis aevi ob similitudinem cum Majorana*

*confusa planta, hinc synonyma diffieillime extricanda. O. Majorana Clariff. Desfontaines in Africa boreali observatum ob signum 4 huc pertinere videtur. W.*

## 1117. THYMUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 982.*

*Calycis bilabiati faux villis clausa.*

1. THYMUS *Serpyllum.*

T. floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Flor. suec. 477, 535. Mat. med. 152. Mill. dict. n. 5. Crantz austr. p. 277. Scop. carn. n. 736. Pollich. pal. n. 574. Ludw. ect. t. 121. Kniph. cent. 6. n. 91. Hoffm. germ. 211. Roth. germ. I. 259. II. 38.*

T. foliis ovatis, basi ciliatis. *Hall. helv. n. 235.*

T. repens, foliis planis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff. 306. Roy. lugdb. 325.*

*Serpyllum vulgare minus. Bauh. pin. 220.*

*Serpyllum vulgare. Dod. pempt. 277. Blackw. t. 418.*

β. *Serpyllum vulgare majus. Bauh. pin. 220. Sabb. hort. 3. t. 69.*

γ. *Serpyllum vulgare minus, capitulis lanuginosis. Tournef. inst. 197. It. gotl. 219.*

δ. *Serpyllum foliis citri odore. Bauh. pin. 220.*

ε. *Serpyllum angustifolium glabrum. Bauh. pin. 220.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 529.*

*Feld-Thymian. W.*

*Habitat in Europae aridis apricis. † (v. v.)*

*Calycis dentes ciliati. Stamina longitudine corollae.*

*Variat staminibus corolla minoribus, flore minore et staminibus corolla longioribus, flore majore. Pollich. l. c.*

\*2. THYMUS *lanuginosus.*

T. floribus capitatis, caulibus repentibus hirsutis, foliis obtusis villosis. W.

*Thymus lanuginosus. Schkuhr Bot. Hand. 2. p. 164. t. 164.\**

*Thymus Serpyllum δ. Sp. pl. 825.*

*Serpyllum angustifolium hirsutum. Bauh. pin. 220.*

*Kniph. cent. 6. n. 92.*

*Serpyllum angusto lanuginosoque folio. Bauh. hist. 3. p. 270.*

Wolliger Thymian. W.

*Habitat in Germaniae, Galliae rupibus.* †

*Non est varietas praecedentis cultura enim non in T. Serpyllum mutatur. W.*

\*3. **THYMUS laevigatus.**

T. floribus capitatis, caulibus procumbentibus, foliis linearibus obtusis sessilibus basi angustatis. *Vahl symb.*

2. p. 65.

Thymus Serpyllum. *Forsk. desc.* 107.

Glatier Thymian. W.

*Habitat in monte Chadra Arabiae felicis.* †

Caules fruticulosi filiformes procumbentes inferne glabri, apice villosi cinerei ramosi: Rami articulati, annulati post casum foliorum. Folia sessilia linearia semiunguicularia obtusissima, inferne versus angustata, glaberrima enervia, utrinque punctata, punctis excavatis, basi ciliata. Capitulum terminale sessile hemisphaericum, cinctum foliis plurimis structura caulium at majora. Calyces lineis elevatis, pilosis, dentibus ciliatis subulatis. Corolla pilosiuscula. Stamina corolla longiora. *Vahl l. c.*

4. **THYMUS vulgaris.**

T. erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff.* 305. *Hort. ups.* 160. *Mat. med.* 152. *Roy. lugdb.* 325. *Sauv. monsp.* 148. *Gmel. sib.* 3. p. 247. *Pall. it.* p. 72. *Kniph. cent.* 5. n. 89. *Blackw. t.* 211. *Ludw. ect.* 123. *Regn. bot.*

T. vulgaris, folio tenuiore. *Bauh. pin.* 219. *Mill. dict. n.* 2.

β. T. vulgaris, folio latiore. *Bauh. pin.* 219. *Mill. dict. n.* 1. *Sabb. hort.* 3. t. 68.

Thymum durius. *Dod. pempt.* 276.

γ. Thymus lupinus candicans odoratus. *Tournef. inst.* 196.

δ. Thymus capitulis minoribus, massiliensis. *Tournef. ibid.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 531.

Gemeiner Thymian. W.

*Habitat in Hispaniae montosis saxosis, in Gallia Narbonensi nulla alia planta frequentior; in Sibiria.* †  
(v. v.)

## \* 5. THYMUS lanceolatus.

T. floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso erecto, foliis oblongis planis pubescentibus. W.

T. caule fruticoso villoso, foliis lanceolatis obtusis integerrimis, floribus dense spicatis. *Desfont. atl. 2. p. 30. t. 128.\**

Lanzettblättriger Thymian. W.

*Habitat in Atlante circa Tlemsen. †*

Caules suffruticosi erecti ramosi semipedales numerosi ex eodem caespite pubescentes. Folia lanceolata obtusa conferta pubescentia integerrima petiolata internodiis longiora, subtus venosa punctato-glandulosa. Bracteae lanceolatae flore longiores integerrimae. Flores verticillati, verticillis in spicam biuncialem obtusam teretem confertis. Calyx pubescens striatus porosus, dentibus setaceis ciliatis, duobus majoribus. Corolla purpurea glandulosa calyce longior magnitudine *T. vulgaris*. Stamina corolla longiora. *Desf. l. c.*

## \* 6. THYMUS numidicus.

T. fruticulosus erectus, foliis linearibus patulis glabris, subtus nervosis, floribus capitatis, bracteis ovato-lanceolatis ciliatis, calycibus hirsutis. *Desf. atl. 2. p. 29.*

T. floribus capitatis hirsutis, foliis linearibus glabris integerrimis, bracteis basi latiusculis. *Poiret. itin. 2. p. 187.\**

Numidischer Thymian. W.

*Habitat in Barbaria prope La Calle. †*

Frutex quadruncialis ramosus. Rami graciles erecti superne pubescentes. Folia integerrima linearia patentia subtus nervosa et punctata glabra vix lineam lata. Fasciculi axillares. Flores conferti terminales in capitulum oblongum dispositi. Bracteae ovato lanceolatae acutae nervosae ciliatae longitudine florum. Calyx villosus striatus quinquedentatus, dentibus setaceis. Corolla parva rosea. *Affinis T. Zygis*, differt: foliis glaberrimis nec ciliatis, bracteis basi latioribus. *Desfont. l. c.*

## 7. THYMUS Zygis.

T. floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso erecto, foliis linearibus obtusissimis enerviis margine revolutis, basi ciliatis. W.

T. floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso erecto,

foliis linearibus basi ciliatis. *Sp. pl.* 826. *Kuiph. cent.* 8. n. 94.

Thymo vulgariori rigidiori simile. *Bauh. hist.* 2. p. 371.

Thymum angusto longioreque folio. *Barr. ic.* 777.

Serpyllum sylvestre Zygis Dioscoridis. *Clus. hist.* 1. p. 358.

Serpyllum folio Thymi. *Bauh. pin.* 220?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 531.

Spanischer Thymian. W.

*Habitat in Hispania.* † (v. l.)

Facie *T. vulgaris*. Caulis suffruticosus, erectus, palmaris; Rami multi, recurvi ante florescentiam. Folia linearia, longitudinaliter revoluta, supra pubescentia, subtus rubra. Petioli ciliati. Calyces bilabiati. Corollae albae cum staminibus. *Mant.* 413.

Folia scabra crassiuscula punctata. Variat foliis pilosis. W.

\*8. THYMUS *Marschallianus*. W.

*T.* floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso erecto, foliis lineari-lanceolatis obtusiusculis planis subtriplinerviis basi ciliatis. W.

Thymus Zygis. *Pall. Nov. Act. Petrop.* 10. p. 313.

Marschallscher Thymian. W.

*Habitat in Tauria.* † (v. l.)

Caulis semipedales basi ramosi plures e radice, erecti, teretes superne pubescentes. Folia opposita lineas 8 longa, sesqui lineas lata, brevissime petiolata, lineari-lanceolata, utrinque attenuata obtusiuscula plana, utraque pagina glabra, subtus obscure triplinervia punctata, margine basin versus ciliata. Flores verticillati, verticillis ad apicem caulis congestis et in spicam confertis. Folia floralia superiora verticillorum ut caulina sed breviora et trinervia. Calyces hirti striati. Corollae calyce longiores. Variat foliis duplo angustioribus. Abunde a praecedente distinctus nec habitu similis. Hanc plantam in Tauria detexit L. B. Marschall ab Biberstein, plantarum scrutator sagacissimus et indefessus. W.

\*9. THYMUS *inodorus*.

*T.* caule fruticoso ramosissimo, foliis aciformibus fasciculatis confertis flore brevioribus. *Desfont. atl.* 2. p. 30. t. 129.\*

Gernchlofer Thymian. W.

*Habitat in collibus aridis et incultis Algeriae. †*

Frutex ramosissimus erectus pedalis. Rami approximati. Cortex in vetustioribus ramis rimosus. Folia minima perennantia densissima fasciculata rigidula aciformia inferne nervosa, margine subtus reflexo ciliato. Flores verticillati axillares pedicellati folio longiores numerosi. Calyx gracilis striatus, dentibus ciliatis. Corolla purpurea calyce longior. Stamina corolla breviora. Desfont. l. c.

10. THYMUS *Acinos*.

T. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis oblongis acutis serratis. W.

T. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis. *Fl. succ.* 478. *Pollich. pal. n.* 575. *Crantz. austr. p.* 577. *Scop. carn. n.* 735. *Kniph. cent. 8. n.* 93.

T. caulibus vix ramosis, foliis ovatis acutis, pedunculis plurimis unifloris. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325. *Clinopodium* foliis ovatis dentatis, flore folio breviora. *Hall. herb. n.* 237.

*Clinopodium arvense*, ocymi facie. *Bauh. pin.* 225.

*Clinopodium vulgare*. *Lob. ic.* 506.

*Acinos*. *Riv. t.* 43.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 552.

Acker-Thymian. W.

*Habitat in Europae glareosis, cretaceis, siccis.* ☉ (v. v.)

\* 11. THYMUS *patavinus*.

T. floribus verticillatis, fauce inflata calyce longiore foliis ovatis serratis, caulibus suffruticosis. *Ait. Kew.* 2. p. 314.

T. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus ramosis adscendentibus, foliis subferratis. *Jacq. obs.* 4. p. 7. t. 87.\*

*Clinopodium perenne pulegii* odore, Majoranae folio, patavinum. *Bocc. mus. 60. t.* 45. f. B.

Melissenartiger Thymian. W.

*Habitat in Europa australi, Hungaria.* ☉ ♂.

*Admodum affinis sequenti.* W.

12. THYMUS *alpinus*.

T. verticillis sexfloris, foliis subrotundis obtusiusculis concavis serratis, corollis inflatis. W.

T. verticillis sexfloris, foliis obtusiusculis concavis subferratis. *Sp. pl.* 826. *Jacq. austr. I. p.* 60. t. 97. *Scop. carn. n.* 734.

*T. montanus*. *Crantz. austr. p.* 278.

*Clinopodium foliis ovatis acutis ferratis, flore folio majori*. *Hall. helv. n.* 238.

*Clinopodium austriacum*. *Riv. pann. p.* 622. 623. *Hall. R.*

*Clinopodium montanum*. *Bauh. pin.* 225. *Bocc. mus.* 2. *p.* 50. *t.* 45.

*Acini pulchra species*. *Bauh. hist.* 3. *p.* 620.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. *p.* 533.

Alpen-Thymian. W.

*Habitat in alpibus Helveticis, Austriacis, Montpelii.*

*D. Rathgeb. ☉ (v. l.)*

*Affinis nimium T. Acino, sed major et Flores triplo majores, pedunculati, utrinque quaterni.*

\*13. THYMUS *montanus*.

*T. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caule erecto ramoso, foliis ovatis integerrimis, calycibus glabris*. W.

*Thymus montanus*. *Waldst. et Kitaib. pl. rar. Hung. ined.*

*Thymus pannonicus*. *Allion. ped. n.* 77.

*T. foliis ellipticis hirsutis*. *Hall. helv. n.* 236.

*Serpyllum angusto et lanuginoso folio*. *Clus. pan.* 628. *Bauh. hist.* 3. *p.* 267.

*Serpyllum pannonicum III*. *Clus. hist.* 235.

Berg-Thymian. W.

*Habitat in alpibus Carpathicis, Vallefiacis, Pedemontanis. (v. l.)*

*Caulis semipedalis erectus ramosus tetragonus, angulis pubescentibus. Folia petiolata ovata obtusa integerrima glabra utrinque punctata, subtus venosa. Verticilli multiflori, pedunculis unifloris. Calyces striati glabri, dentibus tribus superioribus oblongis cuspidatis glabris, binis inferioribus lanceolato-subulatis longioribus ciliatis*. W.

14. THYMUS *Piperella*.

*T. pedunculis multifloris lateralibus, foliis ovatis obtusis glabris nervosis integerrimis*. *Syst. veg. p.* 453. *Al. ped. n.* 81. *t.* 37. *f.* 3. *Vahl. symb.* 2. *p.* 65.\*

*T. (imbricatus) caulibus decumbentibus imbricatis, foliis ovatis acutis, floribus axillaribus solitariis sessilibus*. *Forsk. descr.* 108.\*

*Marum hispanicum nigrum*. *Bocc. mus.* 2. *p.* 166. *t.*

117. *Barr. rar.* 354. *t.* 694.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. *p.* 534.

Kleinblättriger Thymian. W.

*Habitat in Hispania.* (v. l.)

Similis *Melissae Nepetae*, sed *glabra*, Foliis minutis. *Dav. Royen.*

\*15. THYMUS *Brownei.*

T. foliis orbiculatis crenatis, floribus pedunculatis axillaribus. *Swartz. prod.* 89.

T. minimus herbaceus, foliis orbiculatis crenatis, floribus singularibus acutis. *Brown. jam.* 259.

Westindischer Thymian. W.

*Habitat in Jamaica.* ☉ 4 (v. l.)

\*16. THYMUS *filiformis.*

T. floribus axillaribus solitariis pedunculatis, foliis cordatis acutis integerrimis petiolatis, caulibus filiformibus decumbentibus. *Ait. Kew.* 2. p. 313.

Fadenförmiger Thymian. W.

*Habitat in insulis Balearicis.* †

17. THYMUS *cephalotos.*

T. capitulis laxe imbricatis, bracteis late ovatis coloratis impunctatis, foliis linearibus integerrimis. *Vahl. symp.* 3. p. 77.\*

T. capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 826. *Mill. dict. n.* 3.

T. lusitanicus cephalotos, squamis capitulorum amplioribus. *Tournef. inst.* 196.

Tragoriganum, dictamni capite, hispanicum. *Barr. ic.* 788. *Bocc. mus.* 2. p. 50. t. 43.

β- Thymus lusitanicus cephalotos, capitulo majori. *Tournef. inst.* 196.

δ Thymus lusitanicus cephalotos, capitulo minori. *Tournef. inst.* 196.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 534.

Kopfförmiger Thymian. W.

*Habitat in Hispania, Lusitania.* † (v. l.)

\*18. THYMUS *striatus.*

T. capitulis arcte imbricatis, bracteis ovatis foliisque lineari-lanceolatis striatis margine punctatis. *Vahl. symb.* p. 78.\*

Gestreifter Thymian. W.

*Habitat in regno Neapolitano.* †

*Differt a praecedente:* caulibus brevioribus strictioribus superne non ramosis, foliis latioribus erectis subtus striatis serratis, margine tantum punctatis, capi-



tulis minoribus arcte imbricatis, bracteis striatis minoribus punctatis. Vahl. l. c.

19. THYMUS villosus.

T. capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, foliis fetaceis pilosis. *Sp. pl.* 827. *Mill. dict. n.* 4.

T. lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascente oblongo. *Tournef. inst.* 196.

β. T. lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascente rotundo. *Tournef. inst.* 196.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 534.

Haariger Thymian. W.

*Habitat in Lusitania.* † (v. f.)

20. THYMUS Mastichina.

T. floribus verticillatis, calycibus lanuginosis: dentibus calycinis fetaceis villosis. *Mant.* 413. *Sp. pl.* 2. p.

827. *Hort. cliff.* 306. *Hort. upf.* 160. *Gron. orient.* 73.

Samfucus f. Marum mastichen redolens. *Bauh. pin.* 224.

Marum vulgare f. Clinopodium. *Dod. pempt.* 271.

*Blackw. t.* 134.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 535.

Mastix - Thymian. W.

*Habitat in Hispaniae petrosis.* † (v. v.)

*Ambigit media inter Saturejam et Thymum, sed cum Stamina delitescant in fundo corollae, et stylus corolla longior ad Thymum refero. Verticilli plures diffiti.*

*Corollae albae, longitudine calycis.*

21. THYMUS Tragoriganum.

T. floribus verticillatis, caule suffruticoso erecto, foliis hispidis acuminatis. *Mant.* 84. *Turr. farset.* II.

Tragoriganum creticum. *Bauh. pin.* 223. *Raj. hist.*

I. p. 523.\*

Tragoriganum magnum, *Alp. exot.* 79. t. 78.

Tragoriganum 2 altera species. *Clus. hist.* I. p. 355.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 535.

Bocks - Thymian. W.

*Habitat in Creta.* † (v. f.)

*Planta suaveolens. Caules hirsuti, pedales. Folia utrinque acuminata, rigidiuscula.*

22. THYMUS virginicus.

T. capitulis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis. *Syst. veg.* p. 453.

Satureja virginiana. *Sp. pl.* 2. p. 793. *Herm. nar.*

218. t. 218. *Mill. dict. n.* 4.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

K

*Pulegium erectum virginianum angustifolium*, floribus in cymis oppositis. *Morif. hist.* 3. p. 371. f. 11. t. 7. f. 8.

*Clinopodium foliis lanceolatis acuminatis, capitulis terminalibus.* *Hort. cliff.* 304. *Gron. virg.* 65. *Roy. lugdb.* 314.

*Clinopodium, pulegii angusto rigidoque folio, virginianum, flosculis in cymis dispositis.* *Pluk. alm.* 110. t. 54. f. 2.

*Serpentaria virginiana.* *Bocc. mus.* 2. p. 161. t. 115. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 536.

Virginilcher Thymian. W.

*Habitat in Virginia.* 4 (v. v.)

### 1118. M E L I S S A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 983.

*Calyx aridus, supra planiusculus: labio superiore subfastigiato. Corollae lab. super. subfornicatum, 2-fidum; lab. inf. lobo medio cordato.*

#### 1. MELISSA officinalis.

*M. verticillis dimidiatis, bracteis oblongis pedicellatis, foliis ovatis acutis serratis.* W.

*M. racemis axillaribus verticillatis: pedicellis simplicibus.* *Sp. pl.* 827. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 739. *Kniph. cent.* 4. n. 48. *Sabb. hort.* 3. t. 61. *Blackw. t.* 27. *Hoffm. germ.* 212. *Roth. germ. I.* 261. II. 47.

*M. floribus ex alis inferioribus subscissilibus.* *Hort. cliff.* 307. *Hort. upf.* 163. *Mat. med.* 152. *Roy. lugdb.* 320. *Sauv. monsp.* 149.

*M. foliis cordatis serratis, petiolis foliis brevioribus.* *Hall. helv. n.* 242.

*M. hortensis.* *Bauh. pin.* 229. *Riv. t.* 45.

*Apiastrum f. Melissophyllum.* *Lob. ic.* 227.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 537.

Citronen-Melisse. W.

*Habitat in montibus Genevensibus, Allcbrogicis, Italicis.* 4 (v. v.)

#### 2. MELISSA grandiflora.

*M. pedunculis axillaribus tri-quadriflorisve, bracteis*

lanceolatis sessilibus, foliis ovatis acutis argute serratis. W.

M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. *Sp. pl.* 827. *Mill. dict. n.* 3. *Kniph. cent.* 7. n. 56. *Hoffm. germ.* 212.

Thymus racemis lateralibus, sparsis: corollis calyce triplo longioribus. *Scop. carn. ed. I. p.* 457. n. 3. *ed. 2. n.* 732.

Calamintha magno flore. *Bauh. pin.* 229. *Riv. mon.* 43.

Calamintha montana praestantior. *Besl. exst. aest.* 7. t. 7. f. 1.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 538.

Großblütige Melisse. W.

Habitat in Heururiae, Carnioliae, Carinthiae montosis. 4 (v. v.)

### 3. MELISSA *Calamintha.*

M. pedunculis axillaribus multifloris dichotomis, foliis ovatis obtusis argute serratis, utrinque hirsutis, caule hirto. W.

M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Mat. med.* 153. *Crantz. austr. p.* 285. *Mill. dict. n.* 4. *Neck. in Act. palat.* 2. p. 473.\* *Kniph. cent.* 4. n. 47. *Ludw. ect. t.* 33. *Hoffm. germ.* 212. *Roth. germ. II.* 47.

M. floribus ex alis superioribus, pedunculo communi confertis. *Hort. cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 320. *Sauv. monsp.* 149.

M. foliis subhirsutis, ovato-lanceolatis, acute serratis, petiolis florigeris ramosis, folia superantibus. *Hall. helv. n.* 241.

Thymus racemis lateralibus secundis, foliis ovatis serratis. *Scop. carn. ed. I. p.* 457. n. 4. non synonyma.

Thymus Calamintha. *Ej. carn. ed. 2. n.* 733.

Calamintha vulgaris et officinarum germaniae. *Bauh. pin.* 228.

Calamintha montana. *Pod. pempt.* 98. *Riv. t.* 46. *Blackw. t.* 166.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 539.

Berg-Melisse. W.

Habitat in Italiae, Hispaniae, Galliae, Helvetiae, Austriae clivis, saxosis. 4 (v. l.)

Caulis erectus.

### 4. MELISSA *Nepeta.*

M. pedunculis axillaribus multifloris dichotomo-corym-

- bofis, foliis ovatis obtusis subferratis glabriusculis, caule subhirsuto. W.
- M. pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule ascendente hirsuto. *Sp. pl.* 828. *Mill. dict.* n. 5. *Gisecke icon. fasc. I. n. 14.* *Blackw. t.* 167. *Hoffm. germ.* 212. *Roth. germ.* II. 47.
- M. foliis hirsutis, ovato-lanceolatis, ferratis, petiolis florigeris ramosis, folia superantibus. *Hall. helv.* n. 240.
- M. floribus ex alis superioribus, pedunculo dichotomo, caule procumbente. *Hort. cliff.* 308. *Gron. virg.* 65. *Roy, lugdb.* 321. *Sauv. monsp.* 149. *Gort. gelr.* 337.
- Calamintha pulegii odore f. *Nepeta.* *Bauh. pin.* 228.
- β. Calamintha montana praealta, pulegii odore. *Bocc. mus.* 2. p. 45. t. 40. et 38. *Riv. t.* 47. *Kniph. cent.* 7. n. 57.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 539.
- Poleyartige Melisse. W.
- Habitat in Italiae, Galliae, Angliae, Helvetiae aggeribus glareosis.* 4 (v. v.)
- Caules duriusculi, uti tota planta hirsuti. Folia subcordata, supra glabra. Bractee subulatae. Corolla subcoerulea, palato albo coeruleoque marginato.

### 5. MELISSA pyrenaica.

- M. caule nudo, floribus verticillatis, foliis oblongis obtuse dentatis. W.
- Melissa pyrenaica. *Iacq. hort.* 2. p. 86. t. 183. *Scop. ann.* 2. p. 55.
- Horminum pyrenaicum. *Sp. pl.* 831. *Hofst. synop.* 335.
- Horminum foliis ovatis obtusis caule nudo. *Hall. helv.* n. 243.
- Horminum. *Hort. cliff.* 309.
- Melissa pyrenaica, caule brevi, plantaginis folio. *Tournef. inst.* 193. *Magn. hort.* 133. t. 133.
- Gallitrichum folio rotundo, floro magno violaceo. *Bauh. hist.* 3. p. 313. *Morif. hist.* 3. p. 395. *Raj. hist.* 546.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 552.
- Pyrenäische Melisse. W.
- Habitat in summis alpibus Pyrenaicis, Tyrolensibus, Carniolicis.* 4 (v. l.)
- Bractee ovatae acuminatae integerrimae. Calyx 10-striatus, striis alternis crassioribus: Labio supe-

*riore tridentato, inferiore bifido: segmentis cuneiformiter incumbentibus. Corolla grandis rubro-coerulea: Labio superiore bifido: Labio inferiore trifido, segmentis subrotundis. Syst. veg. p. 455.*

### 6. MELISSA cretica.

*M. racemis terminalibus, pedunculis solitariis brevissimis. Sp. pl. 828. Mill. dict. n. 6.*

*Calamintha incana, ocymi foliis. Bauh. pin. 228.*

*Calamintha, pulegii odore minor. Barr. ic. 1166.*

*Calamintha clinopodii austriaci foliis, odore pulegii.*

*Pluk. alm. 75. t. 163. f. 4?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 540.*

*Candische Melisse. W.*

*Habitat Monspelii, in Hispania. † (v. l.)*

*Similis M. Nepetae. Caulis palmaris, humilis, rectus, atropurpureus. Folia ovata, parce obtuseque serrata. Verticilli plurimi, e pedunculis unifloris, aphyllis, instar racemi ramos terminantes: Bracteis lanceolatis. Calyces fuscii. Corollae albo-purpureascentes.*

### 7. MELISSA fruticosa.

*M. ramis attenuatis virgatis, foliis subtus tomentosis caule fruticoso. Sp. pl. 828. Mill. dict. n. 8.*

*M. caule fruticoso, racemis verticillatis. Roy. lugdb.*

*321.*

*Calamintha hispanica frutescens, mari folio. Tournef. inst. 194.*

*Calamintha montana incana minor. Moris. hist. 3. p.*

*413. n. 6.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 541.*

*Strauchartige Melisse. W.*

*Habitat in Hispania. † (v. v.)*

## 1119. DRACOCEPHALUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 984.*

*Corollae faux inflata, lab. super. concavum.*

*\* Spicata.*

### I. DRACOCEPHALUM virginianum.

*D. floribus spicatis confertis, foliis lineari-lanceolatis serratis. Ait. Kew. 2. p. 317.*

*D. floribus spicatis, foliis lanceolatis serratis. Mill. dict. n. 1. Kniph. cent. 2. n. 22. Sabb. hort. 3. t. 26.*

*D. foliis simplicibus, floribus spicatis. Hort. cliff. 308. Roy. lugdb. 311.*

*Dracocephalum. Breyn. ic. 33. t. 27. Hir. act. 1712. p. 276. t. 11. Riv. monop.*

*Dracocephalus angustifolius; folio glabro serrato. Morif. hist. 3. p. 407. f. 11. t. 4. f. 1.*

*Pseudigitalis perlicae foliis. Bocc sic. 12. t. 5. f. 3.*

*Digitalis americana purpurea, foliis serratis. Dodart. mem. 272.*

*Lyfimachia galericulata spicata purpurea canadensis. Barr. ic. 1152.*

*Houttuyn Lin Pfl. Syst. 4. p. 542.*

*Virginischer Drachenkopf. W.*

*Habitat in Canada, Virginia. 4 (v. v.)*

## \*2. DRACOCEPHALUM denticulatum.

*D. floribus spicatis remotis, foliis obovato-lanceolatis superne denticulatis. Ait. Kew. 2. p. 317.*

*Gezähnter Drachenkopf. W.*

*Habitat in Carolina. 4*

## 3. DRACOCEPHALUM canariense.

*D. floribus spicatis, foliis ternatis, foliolis lateralibus subbilobis. W.*

*D. floribus spicatis, foliis compositis. Hort. cliff. 308. Mat. med. 153. Mill. dict. n. 2. Kniph. cent. 6. n. 38.*

*Dracocephalo affinis americana trifoliata, terebinthinae odore. Volk. norib. 145. t. 145.*

*Camphorosma. Morif. hist. 3. p. 366. f. 11. t. 11. f. ult.*

*Melissa forte canariana triphyllis, odorem camphorae spirans penetrantissimum. Pluk. alm. 401. t. 315. f. 5.*

*Sabb. hort. 3. t. 27.*

*Cedronella canariensis viscosa, foliis plerumque ex eodem pedicello ternis. Comm. hort. 2. p. 81. t. 41.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 543.*

*Canarischer Drachenkopf. W.*

*Habitat in Canariis. 4 (v. v.)*

*Morison descripsit 1690.*

## 4. DRACOCEPHALUM pinnatum.

*D. floribus spicatis, bracteis calycibusque ciliatis, corollae tubo calyce brevioris, foliis cordatis sinuatis. W.*

D. floribus spicatis foliis cordatis pinnato-sinuatis. *Sp. pl.* 829.

D. floribus ex verticillato spicatis, foliis cordatis sinuato-pinnatifidis. *Gmel. sib.* 3. p. 235. n. 58. tab. 52.

D. foliis pinnato-sinuatis obtusis, floralibus spicatis villosis coloratis. *Hort. upf.* 165.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 544.

Eichenblättriger Drachenkopf. W.

*Habitat ad lacum Baical in Sibiria.* † (v. l.)

Caules fruticosi, decumbentes. Folia cordata, transversim pinnatifida, obtusa lobis remotis, longe petiolata. Spica *Melampyri arvensis*: bracteis lanceolatis, dentato-setaceis, rubris saepe. Corollae parvae; Styli floribus duplo longiores.

Planta rarissima quinque tantum a *Clariff.* *Pallas lecta.* W.

#### \* 5. DRACOCEPHALUM *Origanoides.*

D. floribus spicato-capitatis, bracteis cuneiformibus dentatis coloratis, foliis subrotundo-cordatis sinuato-dentatis subtus tomentosis. W.

*Dracocephalum origanoides.* *Stephan. in litt.*

Dostenartiger Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria.* † (v. l.)

Planta pusilla fruticulosa caespitosa more *Thymi Serpylli*. Caules plures biunciales ramosi ascendentes teretiusculi incani e radice calami columbini crassitie. Folia opposita petiolata parva unguicularia canescentia praesertim subtus, subrotundo-cordata, utrinque dentibus binis vel tribus obtusis profundis instructa. Petioli plani foliorum longitudine villosi. Flores in capitulo semiunciali subrotundo terminali fere ut in *Origano*, spicati. Bractee cuneiformes tri-vel quinque-dentatae, dentibus acutis, nervosae coloratae pilosae. Calyx bilabiatus generis, laciniis acutis mucronatis margine piloso-ciliatis. Corolla parva *Dracocephali* bracteis brevior, tubo calyce longiore. W.

#### \* 6. DRACOCEPHALUM *palmatum.*

D. floribus subspicatis, foliis subrotundo-cuneiformibus sinuato-dentatis, calycis labio superiore indiviso mucronato. W.

D. (*palmatum*) floribus solitariis subspicatis, foliis subrotundis profunde sinuatis, caule ramoso repente vel flexuoso. *Stephan. in litt.*

Handförmiger Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria* 2 (v. l.)

*Caulis repens ramosus. Rami digitales adscendentes. Folia petiolata, inferiora subrotunda, superiora oblonga vix semiuncialia, basi cuneiformia apice profunde et obtuse quinque vel septemdentata pubescentia, trinervia, nervis apice subdivisis. Flores in apice ramorum subspicati coerulei. Calyx tubulosus bilabiatus, labium superius obovatum reticulatum indivisum apice mucronatum, quandoque mucronibus binis vel tribus instructum; labium inferius, quadripartitum, laciniis lanceolatis mucronatis. Ab affinibus calyce diversum. W.*

### 7. DRACOCEPHALUM peregrinum.

D. floribus subspicatis, foliis lanceolatis remote mucronato-dentatis, bracteis lineari-lanceolatis subdenticulato-spinosis. W.

D. floribus subspicatis, foliis caulinis ovato-oblongis incisis; bracteis lineari-lanceolatis denticulato-spinosis. *Sp. pl.* 829. *Gmel. sib.* 3. p. 237.

D. floribus oppositis, bracteis lanceolatis integerrimis, foliis lanceolatis mucronatis dentatis. *Amoen. acad.* 4. p. 319.\*

D. foliis ex lanceolato-linearibus rarius dentatis. *Act. goett.* 3. p. 456.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 545.

Fremder Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria.* 2 (v. v.)

### \*8. DRACOCEPHALUM fruticosum.

D. floribus subspicatis, foliis ellipticis integerrimis mucronatis, bracteis ellipticis denticulato-spinosis. W.

*Dracocephalum fruticosum. Stephan. in litt.*

Strauchartiger Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria.* 3 (v. l.)

*Caulis suffruticosus subtetragonus ramosus glaber. Folia quatuor lineas longa, vix semiuncialia, elliptica, petiolata, plerumque integerrima, interdum basi dente solitario instructa, utrinque scabriuscula, apice mucronata. Flores in apice caulis subspicati. Bractee forma foliorum, sed basin versus dentibus utrinque tribus vel quatuor apice aristatis instructae. Calyx coloratus quinquesidus aristatus. Differt a D. peregrino: foliis multo minoribus integerrimis ellipticis*



*mucronatis*, calycibus quinquefidis nec bilabiatis, corollis duplo minoribus. W.

### 9. DRACOCEPHALUM *austriacum*.

D. floribus spicatis, foliis sessilibus linearibus mucronatis, caulinis basi tri-vel quinquepartitis, rameis simplicibus, bracteis tripartitis. W.

D. floribus spicatis, foliis bracteisque linearibus partitis spinosis. *Sp. pl.* 829. *Iacq. ic. rar.* I. 112. *Collect.*

I. p. 119.\* *Hofst. synop.* 335.

Ruyschiana laciniata. *Mill. dict. n.* 2.

Hyslopus spicis interruptis. *Hort. cliff.* 364.

Hyslopus austriacus, magno flore, folio chamaepityos. *Herm. lugdb.* 330.

Ruyschiana hirsuta, foliis laciniatis. *Amm. ruth.* 50.

Chamaepitys caerulea austriaca. *Bauh. pin.* 250.

Chamaepitys austriaca. *Clus. hist.* 2. p. 185.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 545.

Oestreichischer Drachenkopf. W.

*Habitat in Austriae, Hungariae, Transylvaniae, Lusitaniae montibus.* 4 (v. v.)

### 10. DRACOCEPHALUM *Ruyschiana*.

D. floribus spicatis, foliis bracteisque lanceolatis indivisis muticis. *Fl. suec.* 2. n. 537. *Flor. dan. t.* 121. *Kniph. cent.* 9. n. 33.

D. foliis linearibus indivisis integerrimis, floribus spicatis. *Hort. ups.* 165.\*

D. floribus verticillato-spicatis, foliis linearibus confer-tis. *Gmel. fib.* 3. p. 236. n. 59.

Dracocephalus foliis ellipticis, fasciculatis, verticillis spicatis: bracteis ovato-lanceolatis. *Hall. helv. n.* 254.

Ruyschiana (*spicata*) floribus spicatis, foliis bracteisque linearibus glabris indivisis. *Mill. dict. n.* 1.

Ruyschiana glabra, foliis integris. *Amm. ruth.* 50.

Ruyschiana flore coeruleo magno. *Boerh. lugdb.* 1. p. 172. *Zanon. nov. t.* 146.

Pseudo Chamaepitys austriaca. *Riv. mon.* 146.

Prunella hyslopi folio viridi, amplo flore caeruleo. *Mor-ris. hist.* 3. p. 364. f. II. t. 5. f. 9.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 546.

Schwedischer Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria, Suecia, Helvetia, Dania.* 4 (v. v.)

\* \* *Verticillata.*II. DRACOCEPHALUM *grandiflorum.*

D. floribus verticillatis, foliis oblongis obtusis dentatis petiolatis, bracteis lanceolatis integerrimis, calycis labio superiore elliptico obtuso indiviso. W.

D. floribus verticillatis, foliis ovatis inciso-crenatis, bracteis lanceolatis integerrimis. *Sp. pl.* 830. *Mill. dict. n. 9. Kniph. cent. 9. n. 32.*

D. floribus verticillatis, foliis oblongis obtusis sinuato-crenatis, bracteis oblongis. *Gmel. sib. 3. p. 233. n. 56. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 547.*

Großblütiger Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria.* ☉ (v. l.)

*Folia ovata s. ovalia, profunde et obtuse serrata, nuda: caulina trinervia; floralia integerrima. Bractea lanceolata, integerrima, parva, pilis adspersae. Corolla maxima, coerulea.*

*A sequente distinctissimum, quo cum Linnaeus filius in Supplemento conjunxerat. Differt a D. altaiensis: foliis petiolatis oblongis obtusis et obtuse dentatis, floribus minoribus, calycis labio superiore elliptico rotundato-obtuso reticulato mucronato, labio inferiore quadrupartito, laciniis lanceolatis acuminatis, stylo corolla longiore. A D. palmato diversum foliis multo majoribus obtuse dentatis nec incisus et toto habitu. W.*

12. DRACOCEPHALUM *altaiensis.*

D. floribus verticillatis, foliis radicalibus cordato-ovatis, caulinis sessilibus subrotundo-cuneiformibus acute dentatis, calycinis dentibus aequalibus. W.

D. (*altaiensis*) foliis crenatis, radicalibus cordatis, caulinis orbiculatis sessilibus, bracteis laciniatis oblongis. *Syst. veg.* 454. *Laxmann Nov. Comment. Petrop.* 15. (1770) p. 556. t. 29. f. 3.\*

*Dracocephalum grandiflorum.* *Lin. suppl.* 274.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 550.*

Altaiſcher Drachenkopf. W.

*Habitat in summis alpinum Altaicarum jugis.* ☉ (v. l.)

*Caules semipedales tetragoni simplicissimi subpubescentes. Folia radicalia Betonicae petiolata cordata obtusa, obtuse serrata rugosa pubescentia. Folia caulina s. superiora fere cuneata rotundata obtusissima crenato-dentata. Bractea utrinque binae obtusissimae longitudine calycis acuminato-dentatae, praeter Bra-*

*cteolas florum lateralium duas minutas lanceolatas. Verticilli floribus utrinque ternis. Calyces subpedunculati tubulosi quinquefidi, dentibus tribus superioribus minus divisis. Corollae magnae coeruleae. Faux valde inflata, dorso utrinque stria elevata. Labium superius bifidum obtusum, inferius trifidum, lacinia media majore atro coerulea reflexa apice barbata. Stamina quatuor sub labio superiore. Antherae oblongae. Stigmata duo acuta.*

### 13. DRACOCEPHALUM *sibiricum.*

D. floribus verticillatis, verticillis pedunculatis bifidis secundis, foliis lanceolatis cordatis acuminatis ferratis glabris. W.

D. floribus subverticillatis, pedunculis bifidis secundis, foliis cordato oblongis acuminatis nudis. *Sp. pl.* 830.

D. verticillis pedunculo communi elevatis secundis. *Gmel. sib.* 3. p. 234. t. 51.

Nepeta corymbis geminis pedunculatis axillaribus, foliis cordato-oblongis acuminatis ferratis. *Hort. upf.* 164.

Cataria montana, foliis veronicae pratensis. *Buxb. cent.* 3. p. 27. t. 50. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 547.

Sibirischer Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria.* 4 (v. v.)

*Corollae faux lata et fere inflata: Labio superiore compresso, bifido; L. inferiore denticulato, antice villoso. Stamina duo superiora basi hirsuta.*

*Planta foetida odore olei rancidi. Folia saepius apice integerrima. Bracteae lineari-setaceae.* W.

### 14. DRACOCEPHALUM *Moldavica.*

D. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis ciliato-dentatis, foliis lanceolatis profunde dentatis, subtus punctatis, ferraturis infimis subciliatis. W.

D. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ferraturis capillaceis. *Hort. upf.* 166. \* *Mat. med.* 153. *Mill. dict. n.* 3. *Kniph. cent.* 4. n. 38. *Ludw. ect. t.* 15. *Blackw. t.* 551.

D. floribus verticillatis, foliis ex ovato-lanceolatis, bracteis longe ciliatis. *Gmel. sib.* 3. p. 230. R.

D. floribus verticillatis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 303. *Roy. lugdb.* 312.

*Melilla peregrina, folio oblongo. Bauh. pin.* 229.

*Melilla moldavica. Cam. epit.* 576.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 548.*

Türkischer Drachenkopf. W.

*Habitat in Moldavia, Sibiria. ☉ (v. v.)*

*Planta sibirica gaudet floribus multo majoribus, calycibus latioribus coloratis.*

**15. DRACOCEPHALUM canescens.**

D. floribus verticillatis, bracteis oblongis ciliatis, calycibus striatis pubescentibus, tubo corollae calyce longiore. W.

D. floribus verticillatis, bracteis oblongis: ferraturis spinosis, foliis subtomentosis. *Hort. upf. 66.\* Mill. dict. n. 5. et ic. t. 129. Kniph. cent. 9. n. 31.*

D. floribus verticillatis, foliis lanceolatis, floribus oblongis. *Hort. cliff. 308. Roy. lugdb. 312.*

Moldavica orientalis, betonicae folio, flore magno violaceo. *Tournef. cor. II. Comm. rar. 28. t. 28.*

Sideritis incana, oleae folio, flosculis ex incarnato candidantibus, montis libani. *Volk. norib. 353. t. 353.*

Sideritis annua, flore luteo utriculis et foliis longioribus.

*Morif. hist. 3. p. 389. f. II. t. 8. f. 18.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 549.*

Grauer Drachenkopf. W.

*Habitat in Oriente. ☉ (v. v.)*

*Folia oblonga obtusa dentata, summa integerrima. W.*

**16. DRACOCEPHALUM peltatum.**

D. floribus verticillatis, bracteis orbiculatis ciliatis, calycibus striatis glabris, segmentis oblongis reticulatis, tubo corollae calyce brevior. W.

D. floribus verticillatis, bracteis orbiculatis ferrato-ciliatis. *Hort. upf. 166. Mill. dict. n. 8. Kniph. cent. 8. n. 38.*

D. floribus verticillatis, foliis floralibus orbiculatis. *Hort. cliff. 309.\* Roy. lugdb. 312.*

Moldavica orientalis, salicis folio, parvo flore coeruleo. *Tournef. cor. II.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 549.*

Schildförmiger Drachenkopf. W.

*Habitat in Oriente. ☉ (v. v.)*

*Folia oblonga obtusa dentata, summa basi dentata. W.*

**17. DRACOCEPHALUM nutans.**

D. floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integer-

gerrimis, corollis calyce duplo longioribus nutantibus. W.

D. floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majusculis nutantibus. *Hort. upf.* 167. n. 2.\* *Mill. dict. n. 6.*

D. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis integerrimis foliis oblongis, superioribus integris, floribus nutantibus. *Gmel. fib. 3. p. 231. t. 49.*

Moldavica betonicae folio flore coeruleo. *I. R. H.* 184.

Moldavica betoniae folio, floribus minoribus caeruleis pendulis. *Amm. ruth.* 44. n. 57.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 550.

Hängender Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria.* 2 (v. v.)

*In planta spontanea sunt corollae calyce duplo, in culta vero triplo longiores.* W

### 18. DRACOCEPHALUM *thymiflorum.*

D. floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus. *Hort. upf.* 167.\* *Mill. dict. n. 7. Kniph. cent. 9. n. 34.*

D. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis integerrimis, foliis ovatis, superioribus integris, floribus vix e calyce eminentibus. *Gmel. fib. 3. p. 233. t. 50.*

Cedronella tatarica perennis, urticae foliis, flosculis minoribus, ex coeruleo rubentibus. *Roy. lugdb.* 537.

Moldavica orientalis minima, ocymi folio. *Comm. rar.* 29. t. 29?

Moldavica betonicae folio, floribus minimis pallide coeruleis. *Amm. ruth.* 46. n. 48.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 551.

Thymianblütiger Drachenkopf. W.

*Habitat in Sibiria.* ☉ (v. v.)

### 1120. MELITTIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 985.*

*Calyx tubo corollae amplior. Corollae labium superius planum; lab. inf. crenatum. Antherae cruciatae.*

### 1. MELITTIS *Melissophyllum.*

M. foliis oppositis ovatis aequaliter dentatis, calyce glabro. W.

Melittis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 309. *Sauv. monsp.* 150. *Mill. dict. n. I. et illustr.* *Crantz austr.* p. 284. *Scop. carn.* n. 76. *Iacq. austr.* t. 26. *Kuiph. cent.* 6. n. 60. *Hoffm. germ.* 213. *Roth. germ. I.* 261. *II.* 46.

Melissophyllum. *Hall. helv. n.* 244. *Riv. mon. t.* 21.

Melissa Fuchsi. *Cam. epit.* 99. 30.

Lamium montanum, melissae folio. *Bauh. pin.* 231.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 553.

Melissenblättrige Melittis. W.

*Habitat in dumetis subalpinis Germaniae, Helvetiae, Austriae, Angliae, Monspelii.* 4 (v. v.)

Calyx campanulatus, erectus, corolla latior, trifidus: lacinia suprema saepe utrinque dente parvo notata. Corolla alba; Tubo duplo longiore calyce: Limbo quadripartito, patente, ex Labio superiore subrotundo, recto, integro; Labio inferiore trifido: intermedia majore, plana, integra, purpurea. Antherae flavae, corolla breviores.

Variat floribus totis niveis. Non est Lamium montanum melissae folio *Miller t.* 158. *Hall.*

\*2. MELITTIS japonica.

M. foliis alternis ovatis obtusis inaequaliter serratis, calyce villosa. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. p. 338.

Melittis Melyssophyllum. *Thunb. jap.* 248.

Japanische Melittis. W.

*Habitat in Japonia.* ☉

Caulis erectus villosus simplex spithamaeus. Folia alterna petiolata ovata obtusa inaequaliter et duplicato-serrata villosa patula digitalia. Petioli unguiculares. Flores pedunculati, in axillis foliorum solitarii. Pedunculus hirtus pollicaris. Calyces strigoso-hirsuti cernui. *Thunb. l. c.*

1121. OCIMUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 986.

Calyx labio superiore orbiculato; inferiore quadrifido. Corollae resupinatae alterum labium 4-fidum; alterum indivisum. Filamenta exteriora basi processum emittentia.

1. OCIMUM thyrsiflorum.

O. floribus paniculato-fasciculatis, caule ramosissimo.

*Mant.* 84. *Murray. in Nov. Comm. Goett. tom.*  
8. p. 47. t. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 555.*

Strausblütiges Basilienkraut. W.

*Habitat in India, diutius virens.*

Caulis erectus, lignosus, sesquipedalis, totus Ramis subdivisus, brachiatus s. paniculatus ramulis teretibus, utrinque canaliculatis. Folia petiolata, elliptico-lanceolata utrinque viridia, nuda, leviter serrata, basi integerrima, vix carina scabra, acuminata. Paniculae ramorum terminales, brachiatae, densae s. confertae, foliis vix longiores, e ramulis verticillatis, purpurascens. Bractee lanceolatae, purpurascens. Corollae purpurascens, extus pallidae, labio superiore ovato, labio inferiore albo. Stamina alba. Pistilla purpurascens. Odor foliorum Rutae.

Differt a reliquis Statura ramosiore fruticis; Foliis magis virentibus diuturnioribus, odore Rutae; Floribus in thyrsum fasciculatis. H. U.

\*2. OCIMUM inflexum.

O. panicula terminali racemosa, caule ramisque flexuosis. *Thunb. jap. 249.*

Gebogenes Basilienkraut. W.

*Habitat in Japonia.*

Caulis herbaceus et rami flexuoso-erecti, apice inflexi, tenuissime tomentosi tetragoni pedales. Folia unguicularia. Panicula racemoso-coarctata. *Thunb. jap.*

\*3. OCIMUM virgatum.

O. racemis verticillatis virgatis, foliis oblongis serratis. *Thunb. jap. 250.*

Ruthenförmiges Basilienkraut. W.

*Habitat in Japonia prope Nagasaki.*

Caulis tetragonus profunde sulcatus tenuissime tomentosus flexuoso-erectus ramosus. Rami cauli similes, inferiores remotiores superiores virgati. Folia obovato-oblonga serrata tenuissime tomentosa pollicaria et ultra. Racemi florum in ramis terminales ex verticillis sexfloris frequentibus, digitales erecti. *Thunb. l. c.*

4. OCIMUM monachorum.

O. staminibus edentulis: alternis basi barbatis. *Mant. 58.*

O. caryophyllum monachorum. *Bauh. hist. 3. p. 260.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 556.*

Zimmtduftiges Basilienkraut. W.

*Habitat in India.* ☉ (v. v.)

*Caulis erectus, pedalis, teretiusculus, subpilosus: Ramis fere supra-axillaribus. Folia petiolata, ovata, obtusiuscula, nuda, ferrata, vix ciliata. Racemi verticillis, sexfloris. Calycis labium superius cordatum striis tribus. Bracteae cordatae, caducae. Corollae minores, albae, labio inferiore purpurascente. Filamenta purpurea, longitudine corollae, absque dentibus ad basin, at horum loco alterna ad basin villosa. H. U.*

5. OCIMUM gratissimum.

O. caule suffruticolo, foliis lanceolato-ovatis, racemis teretibus. *Mant.* 414. *Iacq. ic. rar.* 3. t. 495. *Collect.* 4. p. 208.\*

O. zeylanicum perenne odoratissimum latifolium. *Burm. zeyl.* 174. t. 80. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 557.

Angenehmes Basilienkraut. W.

*Habitat in India orientali.* ☿ (v. v.)

*Caulis basi perennans, strictus. Folia costa supra tomentoso-canefcente. Spicae ante anthesin tetragonae, bracteis subulato-prominentibus. Bracteae cordatae, acutae. Flores parvi. Corollae albae antheris luteis.*

6. OCIMUM album.

O. foliis ovatis obtusis: verticillis racemorum approximatis: nubilibus tetragonis, corollis crenatis. *Mant.* 85.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 557.

Weißes Basilienkraut. W.

*Habitat in India, Iava.* ☉

*Caulis pedalis, albo-virens, basi lignosus. Racemi pauci. Folia congeneribus latiora crassioraque, ovata, concava, obtuse ferrata. Racemi Bracteae lanceolatae, cordatae f. ovatae, acutae, ante anthesin flore longiores spicam tetragonam formantes. Verticilli approximati. Corollae magnae, albae, crenatae: labio superiore quadrifido, sed laciniis lateralibus magis divaricatis. Stamina alba. H. U.*

\*7. OCIMUM tomentosum.

O. foliis ovatis dentatis tomentoso-incanis, caule basi fruticoso. *Lamarck. encycl.* 1. p. 382.

*Habitat ad Cap. b. spei.* ☿



Planta valde villosa alba, vix pedalis. Caulis basi lignosus, ramis erectis rubicundis albo-villosis. Folia minuta ovata dentata utrinque albo-tomentosa. Petioli longitudine foliorum valde villosi. Verticilli florum parum distantes in racemo parvo terminali. Calyx exacte ut in Ocimis. Lamarck l. c.

\*8. OCIMUM grandiflorum.

O. caule fruticoso, foliis ovatis serratis, genitalibus longissimis. *l'Herit. stirp. I. p. 89. t. 43.\**

O. (filamentosum) foliis ovato-oblongis, filamentis corolla duplo longioribus. *Forsk. descr. 108.\**

Großblütiges Basilienkraut. W.

Habitat in Arabia felici prope montem Melhan. †

Frutex bicubitalis, ramis subtetragonis nodosis. Folia oblonga serrata basi in petiolum attenuata, papillosa subviscosa. Racemus terminalis e verticillis distantibus superne approximatis sexfloris. Bractee oppositae ovatae acuminatae crenatae. Calyx bilabiatus, labium superius subrotundum, inferius oblongum apice biaristatum. Corolla alba magna; labium superius erectum crenatum trilobum, lacinia intermedia longiore profunde obcordata; Labium inferius subrotundum acutum. Filamenta corolla duplo longiora adscendentia. W.

9. OCIMUM Basilicum.

O. foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.*

315. *Hort. ups. 168. Roy. lugdb. 322. Mat. med.*

154. *Mill. dict. n. I. Kniph. cent. 4. n. 56. Regn. bot.*

O. caryophyllum majus. *Bauh. pin. 226.*

Ocimum. *Cam. epit. 308. Sabb. hort. 3. t. 84.*

*Blackw. t. 104.*

β. O. caryophyllum maximum. *Bauh. pin. 226.*

γ. O. latifolium maculatum s. crispum. *Bauh. pin. 226.*

δ. O. viride, foliis bullatis. *Bauh. pin. 225.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 558.*

Gemeines Basilienkraut. W.

Habitat in India, Persia. ☉ (v. v.)

10. OCIMUM minimum.

O. foliis ovatis integerrimis. *Hort. ups. 169.*

O. foliis ovatis incanis. *Hort. cliff. 315. Roy. lugdb.*

312.

O. minimum. *Bauh. pin. 226. Moris. hist. 3. p. 407.*

*f. II. t. 10. f. 17. Sabb. hort. 3. t. 85.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III. L*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 560.*

Kleines Basilienkraut. W.

*Habitat in Zeylona.* ☉ (v. v.)

\*11. OCIMUM *integerrimum.* W.

O. foliis oblongis acuminatis integerrimis, bracteis ciliatis. W.

Ganzblättriges Basilienkraut. W.

*Habitat in India orientali.* (v. l.)

Caulis erectus ramosus tetragonus glaber, videtur herbaceus, ramis patulis. Folia longe petiolata sesquuncialia oblonga utrinque attenuata acuminata integerrima, subtus punctata, glabra. Racemi terminales tri- seu sexunciales in ramorum apice et dichotomiis caulis. Verticilli sexflori distantes. Bractee oppositae petiolatae oblongae acutae obsolete dentatae ciliatae. Calyx bilabiatus; labium superius trifidum, lacinia media obtusa, lateralibus acuminatis: Labium inferius bipartitum, laciniis lanceolatis acuminatis. Corollae Labium superius tripartitum, lacinia intermedia obcordata; Labium inferius lanceolatum. Vidi varietatem foliis lanceolatis. W.

12. OCIMUM *sanctum.*

O. foliis oblongiusculis obtusis ferratis undulatis, caule hirtio, bracteis cordatis. *Mant. 85.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 560.*

Heiliges Basilienkraut. W.

*Habitat in India.* ☉

Caulis sesquipedalis, erectus, brachiatus, teretiusculus, utrinque subcanaliculatus, atropurpureus, muricatus, tuberculis pilo albo. Folia ovata s. oblongiuscula, obtusiuscula, ferrata, nuda; margine nervisque subtus pilosa, venis purpureis subtus; superiora obscuriora. Petioli hirti, atropurpurei. Racemi terminales, solitarii, erecti, atropurpurei. Bracteis petiolatis, cordatis, concavis, reflexis, deciduis, longitudine calycis. Calyx supra basin gibbosam hirtus. Corolla laete purpurea, vix calyce major. Filamenta albida. Antherae flavescens. Odor vix ulus. H. U.

\*13. OCIMUM *rugosum.*

O. racemis terminalibus, foliis ovatis acutis ferratis subtus rugosis. *Thumb. jap. 249.*

Runzliches Basilienkraut. W.

*Habitat in Japonia.*

Caulis tetragonus sulcatus tenuissime tomentosus bipedalis et ultra. Rami oppositi cauli similes patuli. Folia ovata acuminata serrata, subtus rugosa et pal-lida, superioribus sensim minoribus. Florum racemi terminales contracti. Thunb. l. c.

\*14. OCIMUM crispum.

O. racemis terminalibus, foliis ovatis serratis crispis, caly-lycibus hispidis. Thunb. jap. 248.

Silo. Kaempf. amoen. 784.

Krauses Basilienkraut. W.

*Habitat in Japonia.*

Caulis tetragonus erectus villosus ramosus. Rami decussati cauli similes. Folia petiolata ovata acuminata serrata, inferne integerrima, glabra purpurascencia crispata pollicaria. Petiolus longitudine folii, laxis villosus. Racemi terminales laxi digitales et spithamaei. Bractee oblongae acuminatae breves glabrae. Calyces hispidi. Thunb. l. c.

\*15. OCIMUM scabrum.

O. racemis simplicibus erectis, foliis ovatis subtus punctatis. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 338.

Ocimum punctatum. Thunb. jap. 249.

Scharfes Basilienkraut. W.

*Habitat in Japonia.*

Caulis erectus paniculatus tetragonus, uti tota planta, piloso-scabridus, pedalis et ultra. Folia oblonga acuta serrata, subtus minutis poris punctata. Racemi terminales simplices, floribus oppositis, digitales. Bractee flores distinguentes setaceae. Thunb. jap. l. c.

16. OCIMUM americanum.

O. foliis sublaevolatis acuminatis subserratis, racemis teretibus, caule subherbaceo. Amoen. acad. 4. p. 276.\*

Mill. dict. n. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 561.

Americanisches Basilienkraut. W.

*Habitat in America.* ☉ (v. l.)

17. OCIMUM verticillatum.

O. racemo elongato nudo, floribus verticillatis quaternis pedunculatis, foliis obtusis. Lin. suppl. 276. Retz. obs. 5. p. 5.

Wirtelblütiges Basilienkraut. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. D. Montin.*

Caulis pedalis totus laevis racemo brevior adscendens. Folia opposita, oppositionibus 5 f. 6, petiolata ovata obtusa laevia, serraturis utrinque duabus. Petioli longitudine foliorum. Racemus erectus herba longior nudus filiformis. Flores verticillati ut *Hottoniae*, quaterni. Pedicelli capillares longitudine fere florum. Bractee ad pedicellos binae ovatae minutae laeves. Calyx campanulatus acutus quinquedentatus subaequalis, absque ullo dente latiore incumbente. Corollae resupinatae curvatae, labio latiore reflexo. Stamina duo longitudine corollae, duo breviora.

\*18. OCIMUM acutum.

O. racemis filiformibus, foliis ovatis acuminatis serratis, bracteis hirtis. *Thunb. jap. 248.*

Spitziges Basilienkraut. W.

*Habitat in Japonia.*

Caulis tetragonus erectus glaber laevis. Folia petiolata ovata acuminata serrata, inferne integra glabra, subtus pallide venosa, duos pollices lata, tripollicaria. Petiolus folio paullo brevior, carina subtus hirtus. Racemi filiformes digitales et ultra. Bractee ovatae acutae hispidae. *Thunb. l. c.*

19. OCIMUM tenuiflorum.

O. foliis ovato-oblongis serratis, bracteis cordatis reflexis concavis, spicis filiformibus. *Sp. pl. 833.*

O. maderaspatanum frutescens, gratissimi odoris, flore parvo, caulibus villosis. *Pluk. alm. 268. 208. f. 4.*

Basilicum agreste. *Rumph. amb. 5. t. 92. f. 2.*

Mentha zeylanica spicata pusilla, angustissimo folio dentato. *Burm. zeyl. 158. t. 70. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 561.*

Dünnblütiges Basilienkraut. W.

*Habitat in Malabar. ☉ †*

Caulis pedalis f. bipedalis, teretiusculus, purpurascens, brachiatus, pilis adpersus patulis; Rami breviores. Folia ovato-oblonga, obtuse serrata, mollia, longe petiolata. Spicae terminales, ternae, longae, angustae, pedunculatae: Bracteis oppositis, glabris, cordatis, concavis, arcte reflexis. Flores tres ex singula bractea, subsessiles. Calyces glabri, 5-fidi: labio superiore plano majore, reniformi, acuto. Corolla parva, purpurascens: Labio superiore 4-fido; Labio

*inferiore simplici. Stamina 4, quorum 2 basi appendiculata. Stylus flore longior, bifidus. Flores tam parvi, ut vix nudis oculis conspiciantur, qui incipiunt florere ab apice spicarum.*

## 20. OCIMUM *polystachyon.*

O. corollis quadrifidis, racemis aphyllis apice nutantibus. *Mant. 2. p. 567. Murray. Comm. Gott. nov. T. 3. p. 71. t. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 562.*

Vieljähriges Basilienkraut. W.

*Habitat in India orientali. ☉ (v. v.)*

*Caulis erectus, bipedalis, brachiatus, tetragonus: angulis acutis scabris: Rami oppositi, copiosissimi, erecti. Folia opposita, petiolata, ovata, obtusa, grosse serrata, acuta, lineata. Petioli longitudine foliorum, tetragoni, subtus scabriusculi. Racemi axillares, secundi, longi, aphylli, erecti, apice nutantes praesertim noctu: Floribus verticillatis, quinis. Calyx quinquesfidus: lacinia superiore cordata: reliquis subsubulatis. Corollae vix calyce duplo longiores, minutae, albae, quadrifidae, Menthae facie: Limbo purpurascens: lacinia superiore vix emarginata. Stamina declinata, corolla non longiora.*

*Obs. Nepeta nequit esse, ob labium inferius non crenatum.*

*Mentha neque ob stamina declinata.*

*Ocimum absque dentibus staminum ob stamina declinata.*

## 21. OCIMUM *serpyllifolium.*

O. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, genitalibus longissimis. *Vahl symb. 1. p. 43.*

O. (*serpyllifolium*) foliis oblongo-cuneatis acutiusculis complicatis subtus scabris. *Forsk. descr. 110.\**

Quendelblättriges Basilienkraut. W.

*Habitat in Arabiae felicitis monte Chadra. †*

*Frutex ramosissimus. Rami divaricati cani. Folia lanceolata basi parum angustiora vix petiolata integerrima, tenuissime villosa, cana parva, facie Thymi Serpylli. Rudimenta ramulorum foliosorum ex omnibus axillis, hinc folia fasciculata apparent. Racemus terminalis erectus sesquipollicaris, verticillis sexfloris. Pedicelli breves callo insidentes. Bractee minutae ovatae acutae deciduae. Flores deflexi. Calyx*

*corolla duplo brevior tenuissime villosus, dentibus binis inferioribus setaceis, superioribus ovatis. Filamenta basi villosa corolla triplo longiora. Vahl l. c.*

22. *OCIMUM menthoides.*

*O. foliis lineari-lanceolatis ferratis. Fl. zeyl. 229.*

*Mentha zeylanica, angustissimo folio dentato. Raj. suppl. 284.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 563.*

*Mü zenartiges Basilienkraut. W.*

*Habitat in Zeylona. (v. l.)*

23. *OCIMUM molle.*

*O. foliis ovatis cordatis acutis ferratis rugosis, sinibus clavis, bracteis subrotundo-cuneiformibus. Ait.*

*Kew. 2 p. 322.*

*Weiches Basilienkraut. W.*

*Habitat in India orientali, ☉*

*Tota planta pubescens suaveolens. Caulis crassus obtuse tetragonus. Folia late ovata acuta serrata, serraturis obtusis inaequalibus, rugosa mollia profunda cordata, lobis approximatis inflexis. Petioli foliis vix breviores. Corollae violaceo albidae. Tubus longitudine calycis. Labium superius orbiculatum fornicatum, inferius quadrilobum, seu potius trilobum, lobo intermedio bifido. Filamenta simplicia. Ait. l. c.*

\*24. *OCIMUM adscendens. W. †*

*O. foliis ovatis subdentatis, verticillis paucifloris, calycibus pubescentibus. W.*

*Aufwärtssteigendes Basilienkraut. W.*

*Habitat in India orientali. † (v. l.)*

*Caulis suffruticosus basi ramosus lignosus adscendens semipedalis. Folia longe petiolata semiuncialia oblonga, utrinque acuta, levissime serrata, superne glabra, inferne scabriuscula. Racemi terminales e verticillis quatuor quadrifloris compositi, inferiores remotissimi, superiores conferti. Calyx pubescens bilobus; Labium superius oblongum obtusum; inferius oblongum apicem versus denticulatum et aristis binis instructum. Bractae oblongae pubescentes. Corollam non vidi. W.*

25. *OCIMUM scutellarioides.*

*O. corollis falcatis, pedicellis ramosis. Mant. 84.*

*O. foliis lanceolato-ovatis ferratis, racemis verticillatis.*

*Sp. pl. 2. p. 834.*

Majorana rubra. *Rumph. amb. 5. p. 291. t. 101.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 564.*

Helmkrautartiges Basilienkraut. W.

*Habitat in India. (v. l.)*

Caulis pubescens. Folia ovata, petiolata, obtuse serrata: Petiolis adhuc tenellis valde tomentosis. Racemus erectus, longus: Bracteis cordatis, sessilibus, acuminatis, laevibus. Pedicelli utrinque gemini, ramosi, multiflori. Calyx minutus: Lab. super. cordato; L. infer. 4-fido, acuto, tenui: intermediis 2 longioribus. Corollae tubus erectus: Limbus reflexus, fauce dilatata; Labio super. erecto, brevissimo; Lab. inferiore elongato, falcato, stamina et pistillum obvolvante. Difert a congeneribus in flore, ut fere distincti generis.

## 26. OCIMUM prostratum.

O. caulibus prostratis, foliis ellipticis lineatis. *Mant. 566.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 565.*

Liegendes Basilienkraut. W.

*Habitat in India orientali. ☉*

Caulis spithamaeus, erectus, octosulcatus: pilis nutantibus. Rami divaricatissimi, ad radicem longiores, prostrati, similes. Folia opposita, petiolata, elliptica, lineata, subpilosa, argute serrata, pollicaria. Spicae terminales, solitariae, e verticillis oblongae. Calycis lacinia superior latior, obtusior; infimae duae minores, acutiores. Corolla minima, caeruleascens. Labium superius quadrisidum, aequale, secundum sinus villosum. Lab. inferius paulo longius, concavum. Stamina didyma, declinata, (vix dente notata) longitudine Corollae. Stigmata duo, erectiuscula.

## 27. OCIMUM capitellatum. †

O. herbaceum, foliis ovatis, floribus aggregatis, petiolis lateralibus. *Lin. suppl. 276. (excluso synonymo.)*

Kopfförmiges Basilienkraut. W.

*Habitat in China.*

H. U.

Caulis oleraceus, obtuse tetragonus, bisulcatus, parce ramosus, pedalis. Folia opposita petiolata ovata obtuse serrata costata rugosa Lamii, laevia, non nitida. Petiolus sensim desinens in folium. Pedunculi axillares solitarii, capitulo floribus aggregatis magnitudine nucis Coryli. Calyx communis penta-ad decaphyllus, longitudine floris. Perianthia propria tubulosa quinquesida, raro quadrisida aequalia. Corollae albae minimae,

*oculo nudo vix discernendae. Tubus tenuis longitudine calycis. Limbus quadrifidus: lacinia superiore vix concava, bifida; inde totus quinquesidus reflexus.*

\* 1122. PLECTRANTHUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 987.*

*Calyx lacinia summa majore. Corolla resupinata ringens, tubo sursum gibbo vel calcarato.*

\* 1. PLECTRANTHUS *fruticosus.*

*P. nectario calcarato, racemis compositis, pedunculis tripartitis, caule fruticoso laevigato. VHerit. stirp. 1. p. 83. t. 41.\* Ait. Kew. 2. p. 322. Thunb. Diff. Nov. pl. gen. 9. p. 134.\**

*Germania urticifolia. Lamæck encycl. 2. p. 682.\**

*Strauchartiger Hahnenstern. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei in sylvis Hautniquas et prope Kabeljans rivior. † (v. v.)*

*Folia ovata acuminata dentata. Racemi terminales erecti, floribus coeruleis. W.*

\* 2. PLECTRANTHUS *galeatus.*

*P. nectario gibbo, pedicellis ramosis, foliis cordato-ovatis acuminatis ferratis. Vahl symb. 1. p. 43.*

*Helmförmiger Hahnenstern. W.*

*Habitat in Java.*

*Caulis villosus sulcatus. Folia petiolata late ovata villosa praesertim in venis subtus. Pedunculus terminalis, pedicellis oppositis ramosis. Bractea nullae. Corollae pubescentes, labio inferiore galeato. Reliqua ut in congeneribus. Accedit ad Ocimum scutellarioidem, cui folia ovato-lanceolata, flores minores, bractea cordatae et pedunculi utrinque gemini. Vahl l. c.*

\* 3. PLECTRANTHUS *nudiflorus. W.*

*P. nectario gibbo, panicula racemosa nuda, foliis cordatis rugosis, superioribus amplexicaulibus. W.*

*Nacktblütiger Hahnenstern. W.*

*Habitat in China? ‡ (v. v.)*

*Sub nomine Ocini chinensis in hortis vidi. Caulis brevis vix semipedalis quadrangularis erectus pubescens. Folia inferiora petiolata bi-f. triuncialia cordata acuminata grosse dentata rugosa glabra, subtus*



*ad venas pubescentia. Petioli unciales a basi folii decrescentis superne alati. Folia superiora minora cordata dentata rugosa amplexicaulia. Panicula terminalis pedalis et ultra ex verticillis confertis composita, qui e quatuor racemis secundis brevibus uncialibus formantur. Bractee ad quemlibet verticillum binae parvae cordatae integerrimae sessiles. Calyx bilabiatus, Labium superius trilobum obtusum, Labium inferius bipartitum, laciniis lineari-subulatis. Corolla parva clausa pubescens, tubo refracto, superne gibboso. W.*

\* 4. PLECTRANTHUS *Forskolaei.*

P. nectario gibboso, racemis aphyllis, caule aequali.

*Vahl symb. I. p. 44.*

Ocimum (*hadiense*) foliis ovatis obtusis crenatis villosis flexilibus, floribus retrofractis. *Forsk. descr. 109.\**

Forskolischer Hahnesporn. W.

*Habitat in montibus Arabiae felicis, Madagascariae.*

Caulis hirsutus aequalis impunctatus. Folia petiolata ovata, versus apicem ramorum approximata, pilosa obtusissima grosse crenata, basi transversa integerrima. Petiolus folio duplo brevior, basi parum dilatatus. Racemi semipedales erecti, verticillis 8-10-floris. Pedicelli filiformes. Calyces fructiferi sulcati basi inferne gibbosi; Laciniae inferiores setaceae adscendentes. Corolla calyce quadruplo longior; tubus parum supra calycem refractus, sursum gibbosus. *Vahl l. c.*

\* 5. PLECTRANTHUS *crassifolius.*

P. nectario gibboso, racemis bracteatis, foliis ovatis carnis. *Vahl. symb. I. p. 44.*

Ocimum  $\alpha$  (*zatarhendi*) foliis carnosis rigidis, late ovatis acutis, crenatis villosis, basi truncatis. *Forsk. descr. 109.\**

Dickblättriger Hahnesporn. W.

*Habitat in Aegypto.*

*Differt a praecedente: foliis carnosis, bracteis membranaceis ovatis. Vahl l. c.*

6. PLECTRANTHUS *punctatus.*

P. nectario gibboso, floribus spicatis, caule herbaceo hirto. *L'Hérit. stirp. I. p. 87. t. 41.\* Ait. Kew. 2. p. 322.*

*Ocimum (punctatum)* caule tereti, foliis ovatis rugosis  
floribus spicatis. *Lin. suppl.* 275.

Punctirter Hahnenstirn. W.

*Habitat in Africa.* ♂ (v. v.)

Caulis herbaceus omnino teres pedalis, inferne divaricate-ramosus subhispidus rufo-punctatus punctis, oblongis. Folia opposita petiolata ovata serrata rugoso-lineata pilosa. Stipulae nullae. Spicae terminales pedunculatae. Bractee ovatae. Flores cernui. Corollae coeruleo-rosae Thymi, resupinatae. Labium superius quadrifidum albidum, inferius compressum.

Flores parvi in racemo terminali cylindraco ex verticillis approximatis composito. Calyx campanulatus glandulis aurantiis conspersus, bilabiatus; labium superius ovatum erectum, inferius quadrifidum, segmentis oblongis acutis rectis. Corollae tubus superne gibbosus; Labium superius trilobum, lacinia media majore emarginata; Labium inferius oblongum obtusum concavum. W.

## 1123. TRICHOSTEMA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 988.*

Corollae labium superius falcatum. Stamina longissima.

### 1. TRICHOSTEMA *dichotoma.*

T. staminibus longissimis exsertis. *Sp. pl.* 834. *Mill. dict. n. 1.*

Trichostema. *Hort. cliff.* 493. *Gron. virg.* 90. *Roy. lugdb.* 310.

Scutellaria caerulea, majoranae folio, americana. *Raj. suppl.* 311.

Callida mariana, majoranae folio. *Pet. succ.* 243.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 566.

Gabelästiger Haarfaden. W.

*Habitat in Virginia, Pennsylvania.* ☉

### 2. TRICHOSTEMA *brachiata.*

T. staminibus brevibus inclusis. *Sp. pl.* 834. *Mill. dict.* 2.

Teucrium virginianum, origani folio. *Dill. elth.* 380. t. 285. f. 369.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 567.

Weitästiger Haarfaden.

*Habitat in America septentrionali.*

## 1124. SCUTELLARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 989.*

*Calyx ore integro: post florescentiam clauso, operculato.*

### 1. SCUTELLARIA *orientalis.*

S. foliis incisifis subtus tomentosis, spicis rotundato-tetragonis. *Hort. upf. 173. Mill. dict. n. 3. Kuiph. cent. 5. n. 82.*

S. foliis pinnatifidis. *Hort. cliff. 316.\* Roy. lugdb. 310.*

*Callida orientalis, folio chamaedryos, flore luteo. Tournef. cor. 11. itin. 3. p. 306. t. 306. Comm. rar. 30. t. 30. Mart. cent. 18. t. 18.*

### β. Scutellaria *orientalis incana, foliis laciniatis, flore luteo. Tournef. car. 11.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 568.*

*Orientalisches Helmkraut. W.*

*Habitat in Armenia circa Tephlin; Mauritania. 4 (v. l.)*

*Corollae purpureae labio albo.*

*Corollae flavae. Folia varietatis β. duplo minora et fere pinnatifido-dentata. W.*

### 2. SCUTELLARIA *albida.*

S. foliis subcordatis ferratis rugosis opacis, spicis secundis, bracteis ovatis. *Mant. 248. Sabbati hort. rom. 3. t. 29.*

S. teucrii facie flore albo. *Bauh. hist. 3. p. 291.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 569.*

*Weißliches Helmkraut. W.*

*Habitat in Oriente. 4 (v. v.)*

*Nimis affinis S. orientali; sed Corollae albae (nec purpureae labio albo.) majores.*

*Affinitatem cum praecedente non video. Variat floribus albidis et violaceis.*

### 3. SCUTELLARIA *alpina.*

S. foliis cordatis inciso-ferratis crenatis, spicis imbricatis rotundato-tetragonis, bracteis flore duplo brevioribus. W.

S. foliis cordatis inciso-ferratis crenatis, spicis imbrica-

tis rotundato-tetragonis, *Sp. pl.* 839. *Kniph. cent.* 9. n. 87. *Allion pedem.* n. 142. t. 26. f. 3.

S. foliis ovatis, spicis imbricatis. *Hort. cliff.* 317. *Hort. upf.* 173. *Roy. lugdb.* 311.

*Callida procumbens*, foliis ovatis crenatis, spicis raris foliosis. *Hall helv.* n. 281.

*Teucrium alpinum inodorum*, magno flore. *Bauh. pin.* 247. *prodr.* 116. *Burf.* XV. 35.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 569.

Alpen-Helmkraut. W.

*Habitat in alpibus Helvetiae, Vallis angustae.* 4 (v. v.)

*Simillimo S. lupulinae, sed Corollae violaceae labio albido nec flavae; Bractee ovatae, acutae, nec acuminatae, tubo corollis breviores, nec aequales; Folia minus oblonga.*

#### 4. SCUTELLARIA *lupulina*.

S. foliis cordatis inciso-ferratis acutis glabris, spicis imbricatis rotundato-tetragonis, bracteis florum longitudine. W.

S. foliis cordatis inciso-ferratis acutis glabris, spicis imbricatis rotundato-tetragonis. *Hort. upf.* 173. \* *Mill. dict.* n. 6. *Pall. it.* 2. p. 29. *Willich. in Nov. Act. A. N. C. vol.* 4. p. 117.

*Callida alpina supina*, magno flore albido. *Tournef. inst.* 182.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 570.

Hopfenartiges Helmkraut. W.

*Habitat in Sibiria, Tataria.* 4 (v. v.)

#### 5. SCUTELLARIA *lateriflora*.

S. foliis laevibus carina scabris, racemis lateralibus foliosis. *Sp. pl.* 853.

S. foliis cordato-lanceolatis ferratis, pedunculis multifloris. *Roy. lugdb.* 311.

S. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, racemis foliosis. *Gron. virg.* 91.

S. palustris repens virginiana major, flore minore. *Morif. hist.* 3. p. 416.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 570.

Seitenblütiges Helmkraut. W.

*Habitat in Canada, Virginia.* 4 (v. v.)

*Racemi laterales; Foliis minoribus, lanceolatis, serratis; in super singuli pedicelli seta utrinque notati sunt, ut in S. galericulata et peregrina.*

6. SCUTELLARIA *galericulata*.

S. foliis cordata lanceolatis crenatis, floribus axillaribus.

*Fl. lapp.* 239. *Fl. suec.* 499, 538. *Hort. cliff.* 316.

*Roy. lugdb.* 310. *Gmel. sib.* 3. p. 227. *Crantz. austr.*

p. 275. *Pollich. pal. n.* 576. *Flor. dan. t.* 637. *Blackw.*

t. 516. *Kniph. cent.* 8. n. 83. *Sabb. hort.* 3. t. 30.

*Hoffm. germ.* 213. *Roth. germ. I.* 258. *II.* 36.

*Callida* foliis oblonge cordatis, crenatis, verticillis nudis, bifloris. *Hall. helv. n.* 280.

*Callida galericulata.* *Scop. carn.* 2. n. 741.

*Scutellaria,* *Riv. t.* 77. R.

*Lysimachia caerulea galericulata* f. *Gratiola caerulea.*

*Bauh. pin.* 246.

*Lysimachia galericulata.* *Dalech. hist.* 1060.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 571.

Gemeines Helmkraut. W.

*Habitat in Europae litoribus.* 4 (v. v.)

\*7. SCUTELLARIA *hastifolia*.

S. foliis integerrimis: inferioribus hastatis, superioribus sagittatis. *It. gotl.* 212. *Fl. suec.* 500., 539.

\* *Crantz. austr. p.* 276. *Scholl. barb. n.* 483. *Scop.*

*carn. n.* 742. *Hoffm. germ.* 213. *Roth. germ. I.* 258.

*II.* 37.

*Scutellaria folio non serrato.* *Riv. mon.* 77.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 572.

Spontonblättriges Helmkraut. W.

*Habitat ad litora Succiae varius; in Austria, Germania.* 4 (v. f.)

*An varietas praecedentis? certe maxime affinis.*

8. SCUTELLARIA *minor*.

S. foliis cordato-ovatis subintegerrimis, floribus axillaribus. *Sp. pl.* 835. *Huds.* 265. *Hoffm. germ.* 213.

*Roth. germ. I.* 258. *II.* 38.

*Callida palustris minima, flore purpurascente.* *T. Raj. angl.* 3. p. 244.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 572.

Kleines Helmkraut. W.

*Habitat in Angliae, Germaniae paludibus.* 4 (v. f.)

*Affinis nimium praecedentibus duabus.*

9. SCUTELLARIA *integrifolia*.

S. foliis sessilibus ovatis: inferioribus obsolete serratis;

superioribus integerrimis. *Sp. pl.* 836. *Mill. dict.*

n. 4.

*S. foliis integerrimis. Gron. virg.* 91.

*S. caerulea virginiana, lamii aut potius teucris folio, minor. Pluk alm.* 338. t. 313. f. 4.

*S. teucris folio, marilandica. Raj. suppl.* 310.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 573.

Ganzblättriges Helmkraut. W.

*Habitat in Virginia, Canada.*

#### 10. SCUTELLARIA *havanensis.*

*S. foliis cordato-ovatis crenatis, floribus solitariis axillaribus, corollae labio utroque trifido. Syst. veg.* p. 457.

*Iacq. obs.* 2. p. 5. t. 29. *Iacq. amer.* 172.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 573.

Hayannalches Helmkraut. W.

*Habitat Havannae in rupesribus maritimis.*

Planta procumbens, herbacea, tenella. Pedunculi axillares, uniflori. Corollae galea trifida.

#### \*11. SCUTELLARIA *purpurascens.*

*S. foliis petiolatis cordato-ovatis dentatis, racemis nudis terminalibus, corollis labio utrinque trifido.*

*Swartz prod.* 89. *Vahl. symb.* 2. p. 66.

Röhliches Helmkraut. W.

*Habitat in Caribaeis. (v. l.)*

Caules herbacei prostrati spithamaei simplices, obscure tetragoni, glabri. Folia petiolata pollicaria utrinque glabra, subtus pallidiora subavenia, remote obtuse dentata. Racemus terminalis flexuosus sesquipollicaris. Pedunculus communis pubescens. Flores distantes alterni. Bractea minuta in pedicello, nulla in pedunculo communi. Calyx oblique truncatus integerrimus. Corolla pubescens calyce duplo longior. *Vahl. l. c.*

#### 12. SCUTELLARIA *hyssopifolia.*

*S. foliis lanceolatis. Sp. pl.* 836. *Gron. virg.* 91.

Cassida marina hyssopifolia. *Pet. act. angl.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 573.

Iloplättriges Helmkraut. W.

*Habitat in Virginia.*

Caulis erectus. Folia lanceolata, sessilia, integerrima, scabra. Corollae labium superius corina pilosa. *Mant.* 414.

13. SCUTELLARIA *peregrina*.

S. foliis cordatis ferratis glabris, spicis elongatis secundis, bracteis petiolatis ovatis calyce longioribus. W.

S. foliis subcordatis ferratis, spicis elongatis secundis. *Hort. cliff.* 317. *Hort. upf.* 172. *Roy. lugdb.* 311. *Mill. dict. n. 1.* *Kniph. cent. 5. n. 83.*

S. foliis cordatis obtusis, obtuse ferratis, spica foliosa in summo caule. *Gmel. sib. 3. p. 228.* R.

Callida latifolia, menthae facie, semine flavicante. *Amm. ruth. n. 52.* *Gmel.* R.

Lamium peregrinum f. Scutellaria. *Bauh. pin. 231.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 574.*

Fremdes Helmkraut. W.

*Habitat in nemoribus Florentiae, Liburni, in Sibiria, Hungaria. 4 (v. l.)*

\*14. SCUTELLARIA *Columnae*.

S. foliis oblongis cordatis ferratis pubescentibus, spicis elongatis secundis, bracteis petiolatis ovatis calyce brevioribus. W.

S. villosa, caule erecto brachiato, foliis cordatis, floribus racemosis internodiis longioribus. *All. pedem n 145. t. 84. f. 2.\**

Callida. *Colum. ecphr. 1. p. 187. t. 189.*

Columnasches Helmkraut. W.

*Habitat in Italia. 4 (v. l.)*

*Accedit ad praecedentem, differt vero praeter characteres indicatos: foliis circumscriptione oblongis, nec ovatis, minoribus floribus triplo majoribus et habitu W.*

15. SCUTELLARIA *indica*.

S. foliis subovatis obtusis crenatis petiolatis, racemis nudiusculis. *Sp. pl. 836. Osb. it. 244.*

Serratula amara. *Rumph. amb. 5. p. 459. t. 170. f. 1. 2.*

Scutellaria finica, betonicae folio, floribus albis. *Pluk. amalth. 190. t. 441. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 7. p. 575.*

Indisches Helmkraut. W.

*Habitat in China.*

Planta minor; Folia suborbiculata, subovata, obsolete serrata, petiolata. Racemus terminalis: Bracteis linearibus, brevissimis. Calyces brevissimi absque tubo oris. Corollae angustae, longiusculae.

16. SCUTELLARIA *altissima*.

S. foliis cordato-oblongis acuminatis ferratis, spicis subnudis. *Sp. pl.* 836. *Mill. dict. n.* 2.

S. orientalis altissima, urticae folio. *Tournef. cor.* II. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 575.

Höchstes Helmkraut. W.

*Habitat in Oriente.* 4 (v. f.)

17. SCUTELLARIA *cretica*.

S. villosa, foliis cordatis obtusis obtuseque ferratis, spicis imbricatis: bracteis setaceis. *Sp. pl.* 836. *Roy. lugdb.* 311.

Callida cretica fruticosa, folio catariae, flore albo. *Tournef. cor.* II.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 576.

Candisches Helmkraut. W.

*Habitat in Creta.* 5

*Statura Nepeta, tota hirsuta. Calyces Scutellariae. Corollae fere Teucree, minutae, extus hirtae: Labium superius videtur minimum, emarginatum: an itaque Scutellariae vera species an Teucree?*

## 1125. PRUNELLA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 990.

*Filamenta bifurca: altero apice antherifera. Stigma bifidum.*

I. PRUNELLA *vulgaris*.

P. foliis petiolatis oblongo-ovatis basi dentatis, calycis labio superiore truncato triaristato, caule ascendente. W.

P. foliis omnibus ovato-oblongis ferratis petiolatis. *Mat. med. p.* 154. *Mill. dict. n.* I. *Scop. carn. n.* 715. *Pollich. pal. n.* 577. *Ludw. ect. t.* 19. *Kniph. cent. 5. n.* 72. *Sabb. hort. 3. t.* 32. *Hoffm. germ.* 214. *Roth. germ. I.* 259. II. 42.

P. bracteis cordatis. *Hort. cliff.* 316. *Fl. suec.* 498, 540. *Roy. lugdb.* 314.

Brunella foliis ovatis oblongis, calycibus superne truncatis. *Hall. helv. n.* 277.

Brunella officinalis. *Crantz. austr. p.* 279.

Brunella major, folio non dissecto. *Bauh. pin.* 260.

Brunella. *Dod. pempt.* 136. *Blackw. t.* 24. *Biv. t.* 29.



β. floribus albis.

P. major folio non dissecto, flore albo. *Bergen francof.* 96.

γ. P. (*intermedia*) foliis inferioribus sinuato-dentatis, superioribus dentatis, calycibus summis coloratis. *Linck. Annal.* I. *Roth. germ.* II. 43.

Brunella minor alba laciniata. *Bauh. pin.* 261.

δ. P. (*parviflora*) foliis petiolatis ovato-lanceolatis subdentatis, spica sessili, floribus vix bracteas superantibus. *Poiret. itin.* 2. p. 188.

ε. P. foliis cauleque pubescentibus, flore albo. W.

*Prunella alba.* *Pall. Nov. Act. petrop.* 10. p. 313.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 577.

Gemeine Brunelle. W.

*Habitat in Europae pascuis.* 4 (v. v.)

*In apricis procumbens, pollicaris, in nemoribus erecta pedalis. In varietate ε. folia sunt integerrima, superiora tantum basi dentata, caulis et folia pilis albis articulatis sunt tecta, flores albi: ceterum nullo modo diversa.* W.

## 2. PRUNELLA *grandiflora.*

P. foliis petiolatis oblongo-ovatis basi dentatis, calycis labio superiore trifido, caule ascendente. W.

P. foliis subintegris ex subrotundo-ovatis, calycibus superne profundius tridentatis. *Pollich. pal.* 578. *Iacq. austr.* 4. p. 40. t. 377. *Kuiph. cent.* 6. n. 74. *Hoffm. germ.* 214. *Roth. germ.* I. 260. II. 42.

Brunella foliis ovatis oblongis, calycibus superne tridentatis. *Hall. helv.* n. 278.

Brunella flore majore. *Riv. t.* 29.

Brunella coerulea magno flore. *Bauh. pin.* 261. *It. gotl.* 219. 228.

Brunella I. non vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 42.

β. P. (*laciniata*) foliis ovato-oblongis petiolatis: supremis quatuor lanceolatis dentatis. *Sp. pl.* 837. *Mill. dict.* n. 2. *Crantz. austr.* p. 280. *Scholl. barb.* n. 488. *Leers herb.* n. 470. *Doer. nass.* p. 190. *Iacq. austr.* 4. p. 41. t. 378. *Sabb. hort.* 3. t. 31. *Hoffm. germ.* 214. *Roth. germ.* I. 260. II. 43.

Brunella foliis imis ovatis oblongis, caulinis dentatis et semipinnatis. *Hall. helv.* n. 279.

Brunella folio laciniato. *Bauh. pin.* 261. *Riv. t.* 30.

Brunella II. non vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 43.

*Linnaei Spec. Plant.* T. III,

M

γ. *Brunella verbenulae* folio, flore caeruleo. *Vaill. parif.* 22. t. 5. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 579.

Grofsblütige Brunelle. W.

*Habitat in Europae rupibus.* 4 (v. v.)

*P. laciniata est sola varietas. Folia superiora varietatis indivisae sunt saepius sessilia.* W.

\*<sub>3</sub> PRUNELLA *hyssofolia*.

*P. foliis sessilibus lanceolatis integerrimis scabris, caule erecto.* W.

*P. foliis lanceolatis integerrimis sessilibus, caule erecto.*  
*Syst. veg.* 458.

*P. foliis lanceolato-linearibus ciliatis subsessilibus.* *Sp. pl.* 2. p. 837. *Sauv. monsp.* 141. *Mill. dict. n.* 3.  
*Brunella hyssofolia.* *Bauh. pin.* 261.

*Brunella angustifolia integra hirsutior.* *Morif. hist.* 3. p. 364. f. II. t. 5. f. 7.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 579.

Iloplättrige Brunelle. W.

*Habitat Monspeli.* 4 (v. v.)

*Differt a P. vulgari: Caule erecto, nec adscendente; Foliis lanceolatis sessilibus integerrimis scabris, nec ovatis petiolatis serratis laevibus; Corollis quadruplo majoribus, labii superioris carina pilosa.*

## 1126. C L E O N I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 991.

*Filamenta bifurca: apice altero antherifera.*

*Stigma quadrifidum.*

### I. CLEONIA *lusitanica*.

*C. lusitanica.* *Sp. pl.* 837. *Desf. atl.* 2. p. 32.\*

*Brunella bracteis pinnato-dentatis ciliatis.* *Loefl. it.* 148.\* *Mill. ic.* 47. t. 70.

*Prunella odorata lusitanica, flore violaceo.* *Barr. ic.* 561.

*Clinopodium lusitanicum spicatum et verticillatum.*  
*Tournef. inst.* 195.

*Bugula odorata lusitanica.* *Corn. canad.* 46. *Morif. hist.* 3. p. 391. f. II. t. 5. f. 4.

*Prunella lusitanica, capite reticulato, folio pedicularis*  
*Tournefortii.* *Morif. hist.* 3. p. 363.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 581.

Portugiesische Cleonie, W.

*Habitat in Lusitania, Hispania.* ☉ (v. f.)

*Caulis erectum: brachiatus, inferne pilosus. Corollae labium superius erectum: laciniis apice reflexis; Lab. inferius obcordatum, complicato-patens, basi superiori gibba. Filamenta omnia spinosa. Antherae a tergo cristatae.*

## 1127. P R A S I U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 992.*

*Baccae quatuor, monospermae.*

### 1. PRASIUM majus.

*P. foliis ovato-oblongis serratis. Hort. cliff. 309. Hort. upf. 173. Mill. dict. n. 1. Kniph. cent. 4. n. 66. Sabb. hort. 3. t. 37.*

*Lamium arboreum perenne creticum. Zan. hist. 112. t. 46. Raj. hist. 561.*

*Melissa fruticosa cretica sempervirens, teucryi facie, flore albo. Moris. hist. 3. p. 408. f. 11. t. 21. f. 3.*

*Teucrium fruticans, amplo et albo flore, italicum. Barr. ic. 895.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 47.*

*Große Niccoline. W.*

*Habitat in Sicilia, Romae et in agro Tingitano.* † (v. v.)

### 2. PRASIUM minus.

*P. foliis ovatis crena utrinque duplici. Hort. cliff. 309. \*Mill. dict. n. 2.*

*Lamium fruticans, teucryi folio lucido, calyce et flore magno candido: tantilla purpura varie notato. Cup. cathol. 106.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 48.*

*Kleine Niccoline. W.*

*Habitat in Sicilia.* †

*An haec sufficienter specie a priori distincta, ulterius indagandum.*

## 1128. P H R Y M A.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 994.*

*Cal. bilabiatus 5-dentatus. Semen unicum.*

### 1. PHRYMA Leptostachia.

*P. foliis ovatis serratis petiolatis, calyce monophyllo quinquefido. Lin. suppl. 277.*

M 2

Phryma. *Amoen. acad.* 3. p. 19.

Leptostachia. *Mitch. gen.* 9.

Amaranthi ficuli bocconis spica, floribus parvis purpureis propendentibus, herba floridana. *Pluk. amalth.* 59. t. 380. f. 5.

Verbenaca mariana, rosae chinensis folio, feminibus deorsum tendentibus. *Pet. mus.* 694.

Verbena racemo simplicissimo, floribus sessilibus, calycibus fructus reflexis racemoque appressis. *Gron. virg.* 92. *Roy. lugdb.* 536.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 7. p. 583.

Kleinblumige Phryma. W.

*Habitat in America septentrionali.* 4

Caulis pedalis, obtuse tetragonus, laeviusculus. brachiatus. Folia opposita, petiolata, ovata, acuta, scabriuscula, grosse serrata. Spicae terminales, solitariae. Flores oppositi, remoti. Bractee ternae, subulatae: inferior longitudine calycis; laterales erectae, breves. Flores horizontales, destorati mox cernui. Calyx cylindricus, striatus, basi supra gibbus, durus, ore bilabiatus: Lab. superiore angusto, purpurascente, tridentato; inferiore bifido. Corolla albida, figura *Dodartiae*, sed parva: Labio superiore extus purpurascente.

*Verbenis affinis.*

## 2. PHRYMA dehiscens.

P. calycibus tandem longitudinaliter dehiscentibus. *Lin. suppl.* 277.

Auffspringende Phryma. W.

*Habitat ad Cap. b. Ipei.* 4 *Thunberg.*

Caules basi suffruticosi. Rami oppositi pauci erecti. Folia opposita subpetiolata cuneata, superne rotundata, latitudine et longitudine aequalia novem-dentata crassiuscula. Racemi terminales solitarii simplicissimi erecti brevissime pedicellati. Bractee minutae subulatae solitariae. Calyx monophyllus teres quinesulcatus truncatus quinque-dentatus, maturescens latere exteriore longitudinaliter dehiscens. Corolla *Verbenae* monopetala. Tubus longitudine calycis. Limbus 5-fidus parvus subaequalis, laciniis rotundatis. Stamina 4 didynama. Germen oblongum. Stylus filiformis. Stigma obtusiusculum. Semen unicum calycem replens rumpeus compressiusculum teretiusculum, basi com-

*presso-cuneiforme biloculare.* Seminulum lineare solitarium. Semen unicum ut in *P. Leptostachia* sed biloculare. Calyx et Corolla regulares sunt. Maturescente fructu calyx longitudinaliter rumpitur, ut semen nudum jaceat fere modo *Cuphae*. Evitaturus multiplicationem Generum hanc *Phrymae* associavi, usque certiora innotescant, quamvis facies aliena.

Est proprii generis planta ad ordinem Angiospermium pertinens, quae nuce disperma gaudet, ut ex descriptione patet, in qua semen biloculare, quod nonens, dicitur. Ceterum haec planta calyce, corolla et fructu a *Phryma* est diversa, sed quum mihi plane esset ignota, novum genus condere nolui. W.

## 1129. SELAGO.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 995.*

*Cal. 4-fidus. Cor. tubus capillaris limbus subaequalis. Semen 1. f. 2.*

## 1. SELAGO corymbosa.

S. corymbo multiplici, floribus disjunctis, foliis filiformibus fasciculatis. *Sp. pl. 876. Fab. helmst. 48. Berg. cap. 156. Kniph. cent. 8. n. 84.*

S. caule erecto, corymbo terminali. *Hort. cliff. 321. Roy. lugdb. 300.*

Camphorata africana umbellata frutescens. *Comm. hort. 2. p. 79. t. 40. Raj. suppl. 130.*

Millefolio affinis maderaspatana camphoratae foliis radiatim nascentibus. *Morif. hist. 3. p. 39. Raj. suppl. 219.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 82.*

Doldentraubige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. § (v. v.)*

Fructus dispermus dicitur.

## 2. SELAGO cinerea.

S. corymbo composito, foliis linearibus fasciculatis glabris margine reflexo. *Linn. suppl. 285.*

Graue Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. Thunberg.*

Simillima *S. corymbosae*, forte illius varietas.

## 3. SELAGO polystachya.

S. corymbo spicis fasciculatis, foliis filiformibus aggregatis. *Mant. 250.*

*Valeriana africana fruticans, foliis ericae. Comm. hort.*  
2. p. 221 t. 111?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 83.*

Vielährige Selago. W.

*Habitat in Cap. b. Spei campis arenosis. †*

Caulis fruticosus, erectus, laevis, ramosus, semipedalis. Folia fasciculata ad singulas gemmas plura linearia, rigidula, nuda (Sel. corymbosa duplo crassiora et dimidio breviora). Corymbus terminalis, ut in priore: Spicis Calyce parvo, hispido; Corollis similibus albis; Fructibus ovatis, bipartilibus in Semina duo.

#### 4. SELAGO verbenacea.

S. spicis fasciculatis, foliis oblongis glabris, caule tetragono rectangulo. *Lin. suppl. 285.*

Eisenhartartige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. Thunberg.*

#### 5. SELAGO Rapunculoides.

S. spicis corymbosis, foliis dentatis. *Amoen. acad. 4. p. 319. et 6. afr. 20.\**

Rapunculus foliis angustissimis dentatis, floribus umbellatis. *Burm. afr. 113. t. 42. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 84.*

Rapwurzeltartige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. Burmannus. 4*

Corollae limbus 4-partitus: laciniis 2 exterioribus majoribus.

#### 6. SELAGO spuria.

S. spicis corymbosis, foliis linearibus denticulatis. *Sp. pl. 877.*

Melampyrum africanum spicatum, foliis angustissimis. *Burm. afric. 115. t. 42. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 84.*

Bastard-Selago, W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ♂ (v. f.)*

Caulis suffrutex. Folia (*Hebenstreitiae dentatae*) linearia, alterna, conferta. Spica ovato-oblonga, obtusa, arcte imbricata; bracteis oblongis, membranaceis. Corollae quinquefidae, violaceae: tubo filiformi longo. Stamina didyma: duobus eminentibus. Stylus capitatus. Capsula 6-valvis.

7. SELAGO *hirta*.

*S. hirta*, spicis longissimis, foliis obovatis. *Lin. suppl.*

285.

Rauhe Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

8. SELAGO *rotundifolia*.

*S. corymbo* composito, foliis ovatis glabris obtusis. *Lin.*

*suppl.* 285.

Rundblättrige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

9. SELAGO *fasciculata*.

*S. corymbo* multiplici, foliis obovatis glabris ferratis.

*Mant.* 256. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 496. *Collect.* 3. p.

246.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 85.

Büschelblütige Selago. W.

*Habitat in Cap. b. spei montibus. ♂*

Caulis simplicissimus, erectus, laevis, bipedalis. Folia alterna, obovata, oblonga, laevia, acute ferrata, basi integerrima, levissime decurrentia. Corymbus terminalis, multiplex, densus: Calyce dentibus 5, subulatis, longitudine dimidii tubi corollae. Corolla purpurea, statura *S. corymbosae*. Stigma obtusum.

10. SELAGO *Polygaloides*.

*S. spicis* terminalibus, bracteis calycibusque carinatis, laminibus scabris, foliis linearibus glabris margine reflexis. *Lin. suppl.* 284.

Polygalaartige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

*Habitus Polygalae longis et linearibus foliis et spicis pendulis.*

11. SELAGO *ovata*.

*S. spicis* strobilinis ovatis terminalibus, foliis sparsis linearibus, caule fruticoso. *Ait. Kew.* 2. p. 355.

*Lippia (ovata)* capitulis ovatis, foliis linearibus integerrimis. *Mant.* 89. *Burm. prod.* 17.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 90.

Eyförmige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ♀*

Frutex pedalis prostratus, adpersus passim nodulis filiformibus: Ramis teretibus. Folia sparsa linearia subsucculenta laevia, ex singulis alis foliola plura mi-

*nora, interdum ternata. Strobili terminales ovati imbricati: Bracteis scariosis ovatis glabris, calyce suo longioribus, apice reflexis, intra singulos. Calyx tubulosus quinque-dentatus. Corolla infundibuliformis quinquefida atro violacea. Stamina didyma intra tubum. Germen unicum. Stylus filiformis. Stigma simplex.*

12. SELAGO *coccinea.*

S. spicis corymbosis, foliis inferioribus linearibus integerrimis; superioribus lanceolato-subulatis subdentatis. *Amoen. acad. 6. afr. 21.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 85.*

Scharlachrothe Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

13. SELAGO *canescens.*

S. spicis terminalibus, foliis filiformibus fasciculatis glabris. *Lin. suppl. 284.*

Blasgraue Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

14. SELAGO *geniculata.*

S. spicis terminalibus, foliis linearibus fasciculatis glabris, margine reflexis. *Lin. suppl. 284.*

Gegliederte Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

*Rami in hac magis patuli et divaricati.*

15. SELAGO *divaricata.*

S. capitulis terminalibus, foliis filiformi-linearibus fasciculatis glabris. *Lin. suppl. 284.*

Ausgebreitete Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

16. SELAGO *capitata.*

S. capitulo terminali, foliis fasciculatis linearibus carnosis glabris. *Mant. 568. Berg. cap. 157.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 86.*

Kopfförmige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5*

*Caulis suffruticosus, erectus, pubescens. Folia fasciculata, obtusa, glabra (S. corymbosae, sed crassiora). Spica subovata, densa, solitaria, imbricata bracteis floribusque. Bractee rhombae, scariosae, longitudine florum.*

17 SELAGO *triquetra.*

S. spicis terminalibus, foliis triquetris imbricatis recurvato-reflexis glabris. *Lin. suppl. 284.*



Dreyseitige Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg. (v. f.)*

18. SELAGO *fruticosa*.

S. capitulis subrotundis terminalibus, foliis sparsis linearibus obtusis integerrimis, caule fruticoso. *Mant. 87.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 87.*

Strauchartige Selago.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

Fruex altus: ramis inaequalibus. Folia linearia, obtusa, parva, inaequalia, integerrima, sparsa, conferta nuda. Capitula subrotunda terminalia sessilia.

19. SELAGO *hispida*.

S. spicis terminalibus, foliis linearibus sparsis reflexis hispidis. *Lin. suppl. 284.*

Scharfe Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

20. SELAGO *ciliata*.

S. floribus spicatis, foliis ovatis ciliatis acutis. *Lin. suppl. 285.*

Gefranzte Selago. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

## A N G I O S P E R M I A.

### 1130. B A R T S I A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 996.*

*Cal.* 2-lobus, emarginatus, coloratus. *Corolla* minus ipso calyce colorata: labio superiore longiore. *Capsula* 2-locularis.

1. BARTSIA *coccinea*.

B. foliis alternis linearibus utrinque bidentatis. *Sp. pl. 839.*

B. foliis alternis. *Hort. cliff. 235. Gron. virg. 92. Amoen. acad. I. p. 160. Kalm. it. 3. p. 100.*

Pedicularis f. cristae galli affinis virginiana, ajugae multifido folio; apicibus coccineo, floribus pallidis in spicam congestis. *Pluk. alm. 283. t. 102. f. 5. Raj. suppl. 400.*

Horminum, tenui coronopi folio, virginianum. *Morif. hist. 3. p. 395. f. 11. t. 13. f. 28.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 1.*

Scharlachrothe Bartfie. W.

*Habitat in Virginia, Noveboraco. 2*

*Calyces margine coccinei bracteis trifidis. Capsula elastica. Fructificatio nondum rite examinata.*

## 2. BARTSIA pallida.

*B. foliis alternis lanceolatis integerrimis, floralibus ovatis dentatis. Sp. pl. 839.*

*B. foliis lanceolatis indivisis, floralibus incis. Gmel. fib. 3. p. 201. n. 11. t. 42.*

*B. foliis alternis bidentatis. Amoen. acad. 2. p. 356.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 2.*

Bleiche Bartfie. W.

*Habitat in Sibiria et in sinu Hudsonis. 2 (v. l.)*

## 3. BARTSIA viscosa.

*B. foliis superioribus alternis serratis, floribus distantibus lateralibus. Sp. pl. 839. Hudf. angl. 267. Ger. prov. 283. Lightf. scot. 1. p. 321. t. 14.*

*Euphrasia latifolia viscata ferrata. Morif. blaesf. 364.*

*Euphrasia major lutea latifolia palustris. Raj. hist. 772. angl. 2. p. 285.*

*Euphrasia lutea palustris. Pluk. alm. 142. t. 27. f. 5.*

*Euphrasia lutea latifolia palustris. Morif. hist. 3. p. 432.*

*Alectorolophos italica luteo-pallida. Barr. rar. 209. t. 665.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 2.*

Klebrige Bartfie. W.

*Habitat in Angliae, Galliae, Italiae paludibus ad rivulos. ☉ (v. l.)*

## 4. BARTSIA Gymnandra.

*B. diandra, foliis radicalibus binis petiolatis, caule subdiphylo unispicato, spica lineari obtusa, verticillis bracteatis coarctatis. Lin. suppl. 278.*

*Gymnandra borealis. Pall. itin. 3. p. 710. t. A. f. 1.\**

*Lagotis glauca. Gaert. Act. Petrop. 14. p. 533. t. 18.\**

*Veronica foliis inferioribus ovatis crenatis, superioribus rotundis mucronatis, caule spica terminato. Gmel. fib. 3. p. 219. n. 13.*

Gerberia. *Steller manuscr.*

Kamtschatfche Bartfie. W.

*Habitat in terris arcticis circa Obum, in alpibus Dauuriae summis, in Kamtschatcae rupibus calvis frigidissimis, earumque latus boreale, ubi nulla alia planta crescit, amans. 2 (v. l.)*

Radix *subhorizontalis crassiuscula, sapore dulci fatuo. Folia radicalia bina petiolata crassiuscula succulenta ovalia integra s. serrata glaberrima. Caulis palmaris teres erectus glaber simplicissimus diphyllus. Folia in medio caulis alterna ovata sessilia. Spica constat ex verticillis coarctatis. Bractvae ovatae coeruleo-tes. Calyx coloratus compressus tridentatus: laciniis lateralibus emarginatis. Corolla dilute coerulea. Labium inferius bi-s. trifidum. Capsula compressa apice quadridentata. Variat magni udine et figura foliorum a climate et solo, etiam foliis connatis duplicato-serratis. Ob solum numerum staminum hanc a Bartsiae genere, quocum in ceteris convenit, separare nolui, cum tamen facilitas methodi inde non laederetur.*

### 5. BARTSIA alpina.

- B. foliis oppositis cordatis obtuse ferratis. *Hort. cliff. 325. Fl. suec. 515. 541. Roy. lugdb. 298. Scop. carn. n. 750. Fl. dan. t. 43. Hoffm. germ. 214.*
- Stachelinia foliis cordatis, amplexicaulibus ferratis, floralibus coloratis. *Hall. helv. n. 312.*
- Stachelinia alpina. *Crantz austr. p. 294.*
- Euphrasia caule simplici, foliis cordatis sessilibus obtuse ferratis. *Fl. lapp. 246.*
- Euphrasia rubra Westmorlandica, foliis brevibus obtusis. *Raj. angl. 4. p. 312.*
- Chamaedrys vulgari fallae aliquatenus adfinis alpina. *Bauh. hist. 3. p. 289.*
- Clinopodium alpinum hirsutum. *Bauh. pin. 225. Pluk. alm. 110. t. 163. f. 5.*
- Clinopodium alpinum. *Pon. bald. 343.*
- Teucrium alpinum, coma purpureo-caerulea. *Bauh. pin. 247.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 3.*
- Alpen-Bartlie. W.
- Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis, Allobrogicis, Baldo, Vallicis. 2 (v. l.)*

## 1131. RHINANTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 997.*

*Cal.* 4-fidus, ventricosus. *Capsf.* bilocularis, obtusa, compressa.

1. RHINANTHUS *orientalis.*

*R.* corollis labio superiore subulato incurvo. *Mill. dict. n. 2.*

*Elephas orientalis*, flore magno proboscide incurva. *Tournef. cor. 48. itin. 2. p. 299. t. 299.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 4.*

Orientalischer Klappertopf. *W.*

*Habitat in Oriente.* (v. f.)

*Calyx quadrifidus: lacinia prima (sub rostro corollae) ovata; lateralibus utrinque reflexis; quarta recta, obtusa.*

2. RHINANTHUS *Elephas.*

*R.* corollis labio superiore subulato recto. *Roy. lugdb. 298. Lerche in Nov. Act. A. N. C. 85. app. 183.*

*Elephas italica*; flore magno proboscide surrecta. *Tournef. cor. 48.*

*Elephas campoclarenum.* *Col. ecphr. 1. p. 186. t. 188.*

*Euphrasia lutea*, floribus elephantis caput cum proboscide referentibus. *Morif. hist. 3. p. 432. f. 11. t. 24. f. 14.*

*Scordio affinis Elephas* ob florem. *Bauh. pin. 248.*

β. *Elephas orientalis*, flore parvo, proboscide surrecta.

*Tournef. cor. 48. itin. 3. p. 54.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 5.*

Rüffelartiger Klappertopf. *W.*

*Habitat in umbrosis Italiae, Sibiriae.* ☉ (v. f.)

*Habitus praecedentis, at Flos diversus Calyce trifido: laciniis duabus reflexis: tertia majore erecta, plicata, acuta.*

3. RHINANTHUS *Crista galli.*

*R.* corollarum labio superiore emarginato bidentato, lacinia media labii inferioris brevissima. *W.*

*R.* corollarum labio superiore compresso brevior. *Fl. lapp. 248. Fl. suec. 503, 542. Hort. cliff. 325.*

*Roy. lugdb. 298. Pollich. pal. n. 579. Crantz.*

*austr. p. 296. Hoffm. germ. 215. Roth. germ. 1.*

*264. II. 52.*

*Alectorolophus calycibus glabris.* *Hall. helv. n. 313.*

*Mimulus Crista galli.* *Scop. carn. n. 751.*

Crista galli. *Dod. cer.* 219. 220. *Riv. t.* 92.

Crista galli femina. *Bauh. hist.* 3. p. 436. *Dill. giff. app.* p. 44.

Pedicularis pratensis lutea f. Crista galli. *Bauh. pin.* 163.

β. Crista galli angustifolia montana. *Bauh. pin.* 163. *prod.* 86.

γ. Crista galli mas. *Bauh. hist.* 3. p. 436. *Dill. giff.* p. 80.

Rhinanthus (*Alectorolophus*) corollarum labio superiore compresso brevior, calycibus villosis. *Pollich. pal.* n. 580. *Hoffm. germ.* 215. *Roth. germ.* I. 264. II. 53.

*Alectorolophus* calycibus hirsutis. *Hall. helv.* n. 314.

*Mimulus Alectorolophus*. *Scop. carn.* n. 752.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 6.

Gemeiner Klappertopf. W.

*Habitat in Europae pratis.* ☉ (v. v.)

*R. Alectorolophus Auctorum, est sola varietas, hirsuto tantum calyce differens. Vidi etiam aliam varietatem in alpibus obviam, cujus folia ovata scabra et caules simplices.* W.

#### 4. RHINANTHUS *Trixago*.

R. labio corollae inferiore superiore longiore, lacinia intermedia obtusa lateralibus longiore, calycibus villosis, foliis oppositis profunde obtuse dentatis, caule simplicissimo. W.

R. calycibus hirsuto-tomentosis, foliis oppositis obtuse ferratis, caule simplicissimo.

*Bartia* foliis oppositis lanceolatis obtuse ferratis. *Sp. pl.* I. p. 602.

*Trixago* apula unicaulis. *Column. ecphr.* I. p. 199. t. 197. *Morif. hist.* 3. p. 427. f. II. t. 24. f. 8.

Crista galli spicata, flore luteo magno, mellanensis. *Raj. hist.* 769.

*Chamaedrys* unicaulis spicata. *Bauh. pin.* 248.

*Antirrhinum* folio dillecto. *Bauh. pin.* 211.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 8.

Apulischer Klappertopf. W.

*Habitat in Palaestinae, Italiae, Monspelii maritimis humilibus, inter juncos.* ☉ (v. l.)

#### \*5. RHINANTHUS *maximus*. W.

R. labio corollae inferiore superiore longiore, lacinii obtusis aequalibus, calycibus villosis, foliis superiori-

bus alternis oblongis obtuse dentatis, caule ramo-  
so. W.

R. *vericolor* α. — *Lamarck. encycl. 2. p. 62.*

*Pedicularis cretica maxima amplioribus foliis et floribus.*  
*Tournef. cor. 9.*

Größter Klappertopf. W.

*Habitat in Creta.* ☉ (v. l.)

*Caulis sesqui-vel bipedalis superne ramosus pubescens. Folia infima opposita, superiora alterna oblongo-lanceolata obtusissima remote grosse et obtuse serrata. Flores spicati in apice caulis et ramorum. Specimen meum, quod cum synonymo Tournefortii accepi, differt a *Bartsia viscosa*: caule altiore ramoso, foliis triplo longioribus obtusissimis, remotissime serratis, serraturis erectis grossis obtusis, subtus vix manifeste trinerviis, (nec uti in *Bartsia viscosa*: foliis acutis dense serratis subtus rugoso-venosis) foliis floralibus obtusis flore brevioribus basi dente uno alterove instructis. In *Bartsia viscosa* folia floralia sunt acuminata florum longitudine. Differt porro R. *maximus*, calycinis dentibus brevibus obtusiusculis, corollis duplo majoribus et latioribus, floribus in apice ramorum et caulis spicatis nec in axillis foliorum sparsis. W.*

*R. maximus Lamarck secundum Clariff. Desfontaines est varietas *Bartsiae viscosae*. W.*

#### \*6. RHINANTHUS *vericolor*.

R. corollis hiantibus, labio inferiore superiore longiore, laciniis obtusis intermedia angustiore, calycibus villosis, foliis suboppositis lanceolatis superioribus basi dentatis, caule simplici. W.

R. (*vericolor*) caule simplici, foliis oppositis alternisque lanceolatis serratis, spica tetragona bracteis corolla longioribus. *Desfont. atl. 2. p. 33.\**

R. (*vericolor*) foliis suboppositis lanceolato-linearibus serratis, serraturis distantibus, calycibus brevibus obtusis. *Lamarck. encycl. 2. p. 62. β.*

*Pedicularis vericolor spicata. Tournef. inst. 172.*

*Alectorolophos italica vericolor spicata. Barr. ic. 666.*

Bunter Klappertopf. W.

*Habitat in Italia et Africa boreali.* ☉ (v. l.)

*Differt a praecedente: caule simplici, foliis lineari-lanceolatis oppositis vel superioribus alternis, superioribus basi tantum dentatis, bracteis ovatis acuminatis,*

corollis duplo minoribus hiantibus, lacinia labii inferioris intermedia reliquis angustiore. W.

7. RHINANTHUS *capensis*.

R. labiis corollae aequalibus, lacinia media labii inferioris reliquis brevior, calycibus villosis, bracteis obtusis integerrimis, foliis lanceolatis remote dentatis, caule simplici. W.

R. calycibus tomentosis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis dentatis. *Syst. veg. p. 459.*

Buchnera (*africana*), foliis lanceolatis subdentatis, calycibus tomentosis fructu longioribus. *Amoen. acad. 6. afr. 18. Sp. pl. 879.*

Pedicularis aethiopica, rutae caninae aspero et fragilii folio. *Pluk. alm. 283. t. 310. f. 3.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 8.*

Capischer Klappertopf. W.

Habitat ad Cap. b. Spei. (v. l.)

Planta facie *Trixaginis*, exsiccatione tota nigra evadens. Folia lanceolata utrinque dentibus 4. f. 3. Spica oblonga Bracteis tomentosis, ovatis, parum acuminatis. Calyces tomentosi, quadrifidi, obtusi, uti *Cristae galli*.

Folia superiora interdum alterna. W.

8. RHINANTHUS *indicus*.

R. foliis sublanceolatis pilosis integerrimis. *Fl. zeyl. 238. Burm. ind. 131. t. 39. f. 1.*

Hyllopus zeylanicus tenellus pratensis. *Burm. zeyl. 122.*

β. Veronicae affinis indica tenuifolia, floribus e calycibus barbatis, summo ferè caule umbellatis. *Pluk. alm. 384. t. 114. f. 2. Burm.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 9.*

Indischer Klappertopf. W.

Habitat in Zeylona. (v. l.)

9. RHINANTHUS *virginicus*.

R. corollis fauce patentibus, foliis sinuato-dentatis.

*Sp. pl. 841. Gron. virg. 192. †*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 10.*

Virginischer Klappertopf.

Habitat in Virginia. (v. l.)

Affinis *Gerardiae flavae*? Antherae hirtae.

\*10. RHINANTHUS *trifidus*.

R. corollis fauce patentibus, foliis trifidis. *Vahl. Symb.*

I. p. 44.

*Pedicularis orientalis supina*, folio trifido, flore magno  
 haescente. *Tournef. cor.* 9.

*Pedicularis annua chamaepityos facie*. *Buxb. cent.* I.  
*p.* 5. *t.* 8.

Dreitheiliger Klappertopf. W.

*Habitat in collibus apricis Armeniae, Galatiae.* ☉ (v. l.)

*Caulis herbaceus adscendens simplicissimus subtomentosus teres spithamaeus. Folia opposita sessilia approximata pubescentia nervosa, profunde trifida, laciniis linearibus divaricatis integerrimis acutis pollicaribus. Flores ex omnibus axillis a basi usque ad apicem solitarii oppositi sessiles. Bractea linearis villosa, utrinque ad basin singuli floris, figura et longitudine laciniarum foliorum. Calyx ovatus pubescens inflatus membranaeus, lineis 8 elevatis, quadrifidus; laciniis linearilanceolatis longitudine foliorum. Corolla calyce parum brevior extus subvillosa; Labium superius integrum acutum porrectum; inferius longius trilobum, lobis lanceolatis. Faux aperta. Capsula Bartisiae fere at Calyx Rhinanthi. Vahl. l. c.*

## 1132. EUPHRASIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 998.

*Cal.* 4-fidus, cylindricus. *Caps.* 2-ocularis, ovato-oblonga. *Antherae* inferiores altero lobo basi spinosae.

### I. EUPHRASIA *latifolia*.

*E. foliis ovatis dentato-palmatis, floribus spicatis. corollis tubulosis, laciniis labii inferioris obtusis.* W.

*E. foliis dentato-palmatis, floribus subcapitatis.* *Sp. pl.* 841. *Sabb. hort.* 3. *t.* 7. *Desfont.* 2. *p.* 35.\*

*E. foliis ovatis, floribus spicatis.* *Sauv. monsp.* 139.

*E. purpurea minor.* *Bauh. pin.* III. *Magn. monsp.* 95. *t.* 94.

*E. purpurea minor.* *Bauh. prodr.* III. *Raj. hist.* 774.

*E. pratensis latifolia italica.* *Bauh. pin.* 234. *Morif. hist.* 3. *p.* 430. *f.* II. *t.* 24. *f.* 8. *Raj. hist.* 773.

*E. tertia latifolia pratensis.* *Col. ecphr.* 200. *t.* 202. *f.* 2.

*Odontites foliis circa radicem ovatis ferratis, ceteris lanceolatis extremitate trifidis.* *Segu. ver.* I. *p.* 270.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* II.



Breitblättriger Augentrost. W.

*Habitat in Apulia, Italia, Monspelii et Africa boreali.*

☉ (v. l.)

Braceae palmatae, subhirsutae.

Flores sunt spicati minores et angustiores quam in sequente. W.

## 2. EUPHRASIA officinalis.

E. foliis ovatis obtuse dentatis, laciniis labii corollae inferioris emarginatis. W.

E. foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Fl. lapp.* 247. *Fl. suec.* 516; 543. *Mat. med.* 155. *Roy. lugdb.* 299. *Gmel. sib.* 3. p. 212. *Hall. helv. n.* 303. *Crantz. austr.* p. 300. *Scop. carn. n.* 753. *Pollich. pal. n.* 581. *Blackw. t.* 427. *Ludw. ect. t.* 135. *Kniph. cent.* 8. n. 40. *Sabb. hort.* 3. t. 9. *Hoffm. germ.* 215. *Roth. germ.* I. 263. II. 51.

E. caule ramoso, foliis ovatis acute dentatis. *Hort. cliff.* 325.

E. officinarum. *Bauh. pin.* 233.

E. minor. *Dill. app.* 53.

Euphrasia. *Cam. epit.* 767. *Tabern.* 362. *Riv. t.* 90. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 11.

Gemeiner Augentrost. W.

*Habitat in Europae pascuis aridis.* ☉ (v. v.)

Variat flore albo; flore flavo. R.

## \*3. EUPHRASIA salisburgensis.

E. foliis lanceolatis setaceo-dentatis, laciniis labii corollae inferioris emarginatis. W.

Euphrasia salisburgensis. *Funk in Roemer Archiv* I. p. 43. *Hoppe Taschenb.* 1794. p. 190.

Salzburger Augentrost. W.

*Habitat in alpibus Salisburgensibus et Helvetiae* ☉ (v. l.)

Caulis semipedalis et ultra ramosus. Folia alterna sessilia oblongo-lanceolata argute dentata, dentibus in utroque latere 3 ad 6 acuminatis apice setaceis. Flores axillares E. officinalis. Accedit ad E. tricuspidadam cujus forte varietas solo pinguiore orta, differt vero: caule majore ramosiore, foliis lanceolatis in utroque latere non dente solitario sed pluribus instructis. Ab E. officinali, cui florum structura ac colore similis, diversa: foliis sessilibus lanceolatis et dentium figura. W.

*Linnaei Spec. Plant. T. III*

N

4. EUPHRASIA *tricuspidata*.

E. foliis cuneiformi-linearibus tricuspidatis, laciniis labii corollae inferioris emarginatis. W.

E. foliis linearibus tricuspidatis. *Sp. pl.* 841.

E. angustis et tricuspidatis foliis, floribus ex albo purpureis. *Pluk. alm.* 142. t. 177. f. 1. *Zan. hist.* 110. t. 76.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 12.

Dreyspitziger Augentrost. W.

*Habitat in Italia Carniola.* ☉ (v. f.)

Folia linearia dente utrinque unico. Corolla similis *E. officinali*.

\*5. EUPHRASIA *cuneata*.

E. foliis cuneiformi-ovatis apice dentatis, laciniis labii corollae inferioris subemarginatis. W.

E. foliis subcuneiformibus incis. *Forst. prod. n.* 234. Keilblättriger Augentrost. W.

*Habitat in Nova Zeelandia.* (v. f.)

*In specimine male siccato, quod possideo, videntur lacinae corollae labii inferioris emarginatae.* W.

6. EUPHRASIA *Odontites*.

E. foliis lineari-lanceolatis ferratis, laciniis labii corollae inferioris obtusis. W.

E. foliis linearibus, omnibus ferratis. *Hort. cliff.* 146. *Fl. succ.* 517; *Roy. lugdb.* 299. *Gmel. sib.* 3. p. 213. *Fabric. helmst.* p. 214. *Crantz. austr.* p. 209. *Pall. it.* 1. p. 31. *Pollich. pal.* n. 582. *Flor. dan.* t. 625. *Kniph. cent.* 12. n. 44. *Hoffm. germ.* 215. *Roth. germ.* 1. 263. II. 51.

E. foliis lineari-lanceolatis, ferratis. *Scop. carn. ed.* 1. p. 483. n. 2. ed. 2. n. 754.

*Odontites bracteis ferratis hirsutis.* *Hall. helv.* n. 304.

*Euphrasia pratensis rubra.* *Bauh. pin.* 234.

E. altera. *Dod. pempt.* 55. *Riv. t.* 89.

β. *Euphrasia sylvestris major purpurea latifolia.* *Cel. ephr.* 1. p. 201. t. 202. f. 1.

E. (*verna*) foliis ovato-lanceolatis dentatis, bracteis flore longioribus. *Bellard. appl. fl. pedem.* p. 33.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 13.

Rother Augentrost.

*Habitat in Europae arvis pascuisque sterilibus.* ☉ (v. v.)  
Variat floribus albis. R.

*E. verna est sola hujus speciei varietas, ut ex speciminibus a Clariff. Viro mecum communicatis video. Differt tantum: foliis minus dentatis, floralibus longioribus et latioribus.* W.

### 7. EUPHRASIA *lutea*.

*E. foliis linearibus ferratis, superioribus integerrimis, laciniis lateralibus labii corollae inferioris denticulatis.* W.

*E. foliis linearibus ferratis: superioribus integerrimis. Sp. pl. 842. Leyff. hal. 614. Scop. carn. n. 755. Pollich. pal. n. 583. Jacq. austr. t. 398. Hoffm. germ. 215. Roth. germ. I. 263. II. 52. Desfont. atl. 2. p. 35.*

*C. (Coris) foliis inter flores ferratis. Crantz. austr. p. 298.*

*Odontites bracteis glabris integerrimis. Hall. helv. n. 305.*

*Odontites flore luteo. Riv. t. 91.*

*Euphrasia pratensis lutea. Bauh. pin. 234. Morif. hist. 3. p. 432. f. II. t. 24. f. 16.*

*Euphrasia lutea montana angustifolia major altera. Col. ecphr. 1. p. 204. t. 203.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 14.*

*Gelber Augentrost. W.*

*Habitat in Europae australis montosis aridis.* ☉ (v. v.)

### 8. EUPHRASIA *linifolia*.

*E. foliis linearibus, omnibus integerrimis, calycibus glabris. Sp. pl. 842. Ger. prov. 285.*

*E. foliis linearibus. Sauv. monsp. 138.*

*E. foliis lini angustioribus. Bauh. pin. 234.*

*E. linifolia. Col. ecphr. 2. p. 68. t. 69.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 14.*

*Flachsblättriger Augentrost. W.*

*Habitat in Italia, Gallia.* ☉ (v. f.)

### 9. EUPHRASIA *viscosa*.

*E. foliis lineari-lanceolatis trinerviis subintegerrimis, calycibus viscosis, lobis lateralibus labii corollae inferioris emarginatis.* W.

*E. foliis linearibus, calycibus glutinoso-hispidis. Mant. 86. Ger. prov. 285. Gouan. illustr. 37. Desfont. atl. 2. p. 36.*

*Odontites foliis viscidis, rariter ferratis. Hall. helv. n. 306.*  
*Pedicularis annua lutea tenuifolia viscosa, pomum redolens. Garid. aix. 351. t. 78.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 15.*

*Klebriger Angentrost. W.*

*Habitat in Galloprovinciae glareosis, sterilibus, Helvetia. ☉ (v. l.)*

*Differt ab E. lutea: foliis lineari-lanceolatis, nec stricte linearibus; Calycibus villosis viscidis, nec glabris: Corollis clausis, nec stamine brevioribus. Distinguenda ab E. linifolia.*

\*10. *EUPHRASIA purpurea. †.*

*E. foliis linearibus integerrimis glabris, racemis secundis, staminibus corollam aequantibus, capsulis villosis. Desfont. atl. 2. p. 36.*

*Purpurfarbener Augentrost. W.*

*Habitat in arenosis Barbariae. ☉*

*Caulis atropurpureus rigidulus erectus pedalis et ultra obtuse tetragonus. Rami teretes paniculati numerosi oppositi erecti patentis. Folia E. luteae opposita patentia linearia glabra rigidula. Flores racemosi secundi subpedicellati solitarii axillares. Racemi breves. Calyx quinquedentatus, dentibus ovatis. Corolla intense violacea magnitudine E. viscosae. Labium superius obtusum convexum emarginatum; inferius trilobum, lobis rotundatis saepe denticulatis. Tubus calyce longior. Stamina corollam non superant. Antherae didymae hinc bimucronatae. Capsula oblonga superne hirsuta. Differt ab E. lutea: caule et ramis atropurpureis, corollis intense violaceis, staminibus corollam non superantibus. Diversa ab E. viscosa: foliis non viscidis glabris, corollis atro-violaceis. Desf. l. c.*

\*11. *EUPHRASIA longiflora.*

*E. pubescenti-viscosa, foliis linearibus integerrimis, corollarum tubo filiformi calyce triplo longiore. Vahl. symb. 3. p. 78.\**

*E. foliis sublinearibus, integerrimis subimbricatis glutinosis, corollarum tubo gracili longissimo. Cavan. ic. 1. p. 45. t. 62.\**

*E. foliis linearibus integerrimis, corollarum tubo tenui calyce multoties longiore. Lamarch. encycl. 2. p. 398.\**

*E. vermiculato folio hispanica. Barr. ic. 1204. Bocc. mus. 2. p. 76. t. 63.*

Langblütiger Augentrost. W.

*Habitat in collibus aridis gypsosis Hispaniae.* ☉ (v. l.)

*Folia linearia obtusa, ramea imbricata. Corollae tubus filiformis calyce triplo longior. Labium superius indivisum, inferius trilobum, lobis rotundatis.* W.

\*12. EUPHRASIA *aspera*. W. †

*E. foliis linearibus hispidis integerrimis, corollarum tubo superne inflato calyce triplo longiore.* W.

Scharfblättriger Augentrost. W.

*Habitat in Guinea.* (v. l.)

*Caulis sesqui-vel bipedalis. Folia inferiora opposita, superiora alterna linearia punctis albis callosis pilo terminatis aspera. Flores alterni sessiles. Calyx tubulosus quadridentatus, dentibus subulatis hispidis post florescentiam contortis. Corollae tubus calyce triplo longior subincurvatus superne dilatatus. Labium superius indivisum, inferius tripartitum, laciniis obtusis. Exsiccatione nigrescit. Convenit habitu cum Buchnera elongata, differt vero: Calyce quadridentato, dentibus subulatis, Corolla ringente, Stylo staminibus longiore.* W.

1133. MELAMPYRUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 999.*

*Cal. 4-fidus. Cor. lab. sup. compressum, margine replicato. Capsf. 2-ocularis, obliqua, hinc dehiscens. Sem. 2, gibba.*

I. MELAMPYRUM *cristatum*.

*M. spicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. Fl. succ. 510; 545. Crantz austr. p. 300. Scop. carn. n. 757. Fl. dan. t. 1104. Pall. it. 1. p. 20. Pollich. pal. n. 584. Rivin. t. 80. Kniph. cent. II. n. 71. Hoffm. germ. 216. Roth. germ. I. 264. II. 54.*

*M. foliis integerrimis, floribus spicatis, bracteis duplicatis, cristatis. Hall. helv. n. 311.*

*M. luteum angustifolium. Bauh. pin. 234.*

*M. luteum, linariae folio. Bauh. prodr. 112.*

*M. angustifolium cristatum. Pluk. alm. 249. t. 99. f. 2. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 16.*

Kammförmiger Wachtelweizen. W.

*Habitat in Europae borealis pratis asperis.* ☉ (v. v.)  
*Variat floribus albis.*

2. MELAMPYRUM *arvense*.

M. spicis conicis laxis, bracteis dentato-fetaceis coloratis, calycum dentibus scabris, corollis clausis. W.

M. spicis conicis laxis: bracteis dentato-fetaceis coloratis. *Fl. suec.* 511; 546. *Crantz. austr. p.* 301. *Pollich. pal. n.* 585. *Fl. dan. t.* 911. *Kniph. cent. I. n.* 58. *Riv. t.* 79. *Sabb. hort. 3. t.* 8. *Hoffm. germ.* 216. *Roth. germ. I.* 264. *II.* 54.

M. foliis integerrimis, bracteis semipinnatis. *Hall. helv. n.* 310.

M. foliis laciniatis laxè spicatis. *Roy. lugdb.* 298.

M. purpurascente coma. *Bauh. pin.* 234.

Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.

Melampyrum lanuginosum baeticum. *Bauh. pin.* 234.

*Houtt. Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 17.

Acker Wachtelweizen. W.

*Habitat in Europae agris.* ☉ (v. v.)

\*3. MELAMPYRUM *barbatum*.

M. spicis conicis laxis, bracteis dentato-fetaceis non coloratis, calycum dentibus barbatis, corollis hiantibus. W.

Melampyrum barbatum. *Waldstein et Kitaibel pl. rar. hung.*

Bärtiger Wachtelweizen. W.

*Habitat in agris Hungariae australis.* ☉ (v. f.)

*Differt a Melampyro arvensi, cui simillimum: bracteis non coloratis viridibus, calycum dentibus margine pilis longis diaphanis scariosis instructis, corollis hiantibus, labio superiore margine magis villoso, denique colore corollae, qui ex toto flavus est.*

4. MELAMPYRUM *nemorosum*.

M. floribus secundis lateralibus: bracteis dentatis cordato-lanceolatis: summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. *Fl. suec.* 512, 547. *Gort. ingr.* 97. *Crantz. austr. p.* 302. *Flor. dan. t.* 305. *Kniph. cent. II. n.* 72. *Hoffm. germ.* 216. *Roth. germ. I.* 264. *II.* 55.

M. foliis ovato-lanceolatis, floralibus hamatis, acute dentatis, patulis, calycibus hirsutis. *Hall. helv. n.* 309.

M. bracteis unifloris coloratis, cordatis; calycibus hirsutis. *Scop. carn. ed. I. p.* 481. *ed. 2. n.* 756.

*M. sylvaticum.* Riv. t. 81.

*M. coma coerulea.* Bauh. pin. 234.

*M. luteum, coma coerulea.* Barr. ic. 769. f. 1.

*Parietaria sylvestris* I. Clus. hist. 2. p. 44.

β. *M. luteum, coma alba.* Barr. ic. 769. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 18.*

Blauer Wachtelweizen. W.

*Habitat in Europae borealis nemoribus.* ☉ (v. v.)

### 5. MELAMPYRUM *pratense.*

*M. floribus axillaribus secundis, corollis clausis, foliis lanceolatis, floralibus hastatis.* W.

*M. floribus secundis lateralibus, conjugationibus remotis, corollis clausis.* Fl. suec. 513; 533. *Crantz austr. p. 304.* Scop. carn. n. 758. *Pollich. pal. n. 586.* Kniph. cent. II. n. 73. Hoffm. germ. 216. Roth. germ. I. 265. II. 55.

*M. foliis imis integerrimis, mediis dentatis, floralibus hastatis.* Hall. helv. n. 308.

*M. foliis lanceolatis, florum paribus remotis.* Fl. lapp. 240.

*M. luteum latifolium.* Bauh. 243.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 19.*

Wiesen-Wachtelweizen. W.

*Habitat in Europae borealis pratis siccis.* ☉ (v. v.)

### 6. MELAMPYRUM *sylvaticum.*

*M. floribus axillaribus secundis, corollis hiantibus, foliis omnibus lanceolatis.* W.

*M. floribus secundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis hiantibus.* Fl. suec. 514; 549. *Crantz austr. p. 303.* Scop. carn. n. 759. Hoffm. germ. 216. Roth. germ. I. 265. II. 56. Flor. dan. t. 145. Kniph. cent. 9. n. 65.

*M. foliis integerrimis, floribus hiantibus.* Hall. helv. n. 307.

*M. latifolium; floribus parvis luteis.* Cels. upf. 32. Fl. lapp. 240. Hall. it. herc. n. 9.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 20.*

Gebirgs-Wachtelweizen. W.

*Habitat in Europae borealis sylvis et in montibus australioris* ☉ (v. l.)

*Differt a praecedente corollis dimidio brevioribus, limbo hiantibus: iisque totis flavis, nec tubo albis.*

\*7. MELAMPYRUM *lineare*. †

M. foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus.

*Lamarck ency l. 4. p. 23.\**

Linienblättriger Wachtelweizen. W.

*Habitat in Carolina.* ☉

Omnes plantae partes minores quam in reliquis, et habitu a credit ad *Euphrasiam linifoliam*. Caulis quinque uncialis teres erectus, ramis oppositis subtetragonis. Folia sessilia opposita uncialia, lineam et parum ultra lata, linearia acuta. Flores subpedunculati in axillis foliorum superiorum tres lineas longi. Calyx corolla duplo brevior. Corolla hians, labiis aequalibus, superiore obtuso margine villoso. *Lamarck. l. c.*

## 1134. LATHRAEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1000.*

Cal. 4-fidus. Glandula depressa, ad basin suturae germinis. Caps. 1-ocularis.

1. LATHRAEA *Clandestina*.

L. caule ramoso subterrestri, floribus erectis solitariis.

*Sp. pl. 843.*

L. foliis cordatis, floribus fasciculatis. *Guett. stamp. 454.*

*(Dalib. parif. 191.)*

*Clandestina* flore subcaeruleo. *Tournef. insti. 952.*

*Dentaria aphyllis* purpurea, cespite denso. *Rai. extr. 116.*

*Dentaria aphyllis*, flore purpureo. *Rai. hist. 1230.*

*Orobanche montana.* *Rudb. elyf. 2. p. 233. f. 14.*

*Orobanche* flore majore ex caeruleo purpurascente. *Bauh.*

*pin. 87, prodr. 31. Bursf. III. 155. Rudb. elyf. 2. p.*

*229. f. 2. Rai. hist. 1227. Morif. hist. 3. p. 502.*

*Orobanche* f. *Dentaria aphyllis* purpurea, cespite denso.

*Morif. hist. 3. p. 503. f. 12. t. 16. f. 15.*

Planta clandestina, f. *Madrona*. *Dalech. hist. 960.*

β. *Clandestina*, *Madronna*, *Occulta*. *Barell. obsf. 33.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 21.*

Niedrige Schuppenwurz. W.

*Habitat in umbrosis Galliae, Pyrenaeorum, Italiae.* 2.

Caulis infra terram corymbosus, ut fructificationes

solae supra terram emineant solitariae in singulo ramo.

2. LATHRAEA *Anblatum*.

L. corollarum labiis indivisis. *Sp. pl. 844.*

*Anblatum orientale*, flore purpurascente *Tournef. cor. 48.*



*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 23.*

Orientalische Schuppenwurz. W.

*Habitat in Oriente. 2*

### 3. LATHRAEA Squamaria.

L. caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore triido. *Fl. suec. 518, 550.\* Dalib. parif. 191. Flor. dan. t. 136. Blackw. t. 430. Hoffm germ. 217. Roth. germ. I. 262. II. 50.*

L. caule subterrestri simplicissimo, floribus unilateralibus in series digestis. *Crantz austr. p. 293.*

Squamaria caule simplicissimo, floribus nutantibus, labello trifido. *Ha!l. helv. n. 297.*

Squamaria Orobanche. *Scop. carn. ed. 2. n. 760.*

Squamaria. *Riv. t. 89.*

Dentaria. *Matthiol. 964.*

Orobanche, radice dentata, major. *Bauh. pin. 88.*

Orobanche radice squamata, foliis rotundis, flore pendente et suave rubente, fundboensis. *Rudb. clyf. 2. p. 234. f. 17.*

Orobanche radice dentata altius radicata, foliis et floribus albo-purpureis. *Mentz. pug. t. 3. f. 3. Morif. hist. 3. p. 503. f. 12. t. 16. f. 14.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 23.*

Gemeine Schuppenwurz. W.

*Habitat in Europae frigidioris umbrosissimis. 2 (v. v.)*

## 1135. S C H W A L B E A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1001.*

*Cal. 4-fidus; lobo superiore minimo; infimo maximo emarginato.*

### I. SCHWALBEA americana.

*S. americana. Sp. pl. 844. Walt. carol. 167.\**

Schwalbea. *Gron. virg. 92.*

Euphrasia major mariana; floribus spicatis amplis: tubis longioribus; summis oris profunde incisus. *Pluk. mant. 73. t. 348. f. 2?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 25.*

Americanische Schwalbie. W.

*Habitat in America septentrionali.*

Caulis simplicissimus, tetragonus, pubescens. Folia lanceolata, pubescentia. Flores alterni, sessiles. Calyx pubescens. Corolla atrorubens, inclinata.

Fructificatio rite adhuc examinanda, dum specimen Gronovianum non sufficiebat.

## 1136. T O Z Z I A.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1002.

Calyx 5-dentatus. Capsula unilocularis, globosa, monosperma.

## I. TOZZIA alpina.

T. alpina. Sp. pl. 844. Hall. helv. n. 298. Crantz. austr. p. 305. Jacq. austr. t. 165.

T. alpina lutea, alfine folio, radice squamata. Mich. gen. 20. t. 16.

Euphrasia lutea alfinefolia, radice squamata. Bauh. pin. 234. prodr. III.

Dentaria buguloides, radice globosa: squamulis myon-  
toideis, alpina. Mentz. pug. t. 9. f. 3. 4.

Orobanche buglossoides, radice rotunda, squamulis myon-  
toideis, alpina. Moris. hist. 3. f. 12. t. 16. f. au-  
tepenult.

Anonyma l. gregorii, radice dentariae. Col. ecyth. 2.  
p. 49. t. 50.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 25.

Alpen-Tozzie. W.

Habitat in alpebus Helveticis, Austriacis, Italicis, Py-  
renaeis, locis asperis, humidis. 4 (v. l.)

## 1137. P E D I C U L A R I S.

Gen. plan. edit. Schreb. n. 1003.

Calyx 5-fidus. Capsula bilocularis, mucro-  
nata, obliqua. Semina tunicata.

\* Caule ramoso.

## I. PEDICULARIS palustris.

P. caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis pinnatifido-den-  
tatis, calycibus ovatis inflatis bipartitis cristatis, corol-  
lae galea obtusa truncata. W.

P. caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, co-

rollis labio obliquis. *It. w. goth.* 40. *Mat. med.* 155. *Pollich. pal.* n. 587. *Gunn. norv.* n. 87. *Scop. carn.* n. 762. *Rivin. t.* 92. *Hoffm. germ.* 217. *Roth. germ. I.* 269. *II.* 66. *Schkuhr bot. Handb.* 2. p. 184. t. 171.

*P.* caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis pinnatis, dentatis, calyce bifido. *Hall. helv.* n. 320.

*P.* caule ramoso erecto; calycibus bifidis, 4-fidisque, laciniis fimbriatis. *Crantz. austr.* p. 324.

*P.* caule ramoso erecto, calycibus bifidis crenatis. *Fl. suec.* 505; 551.

*P.* pratensis rubra elatior. *Rai. hist.* 700.

*P.* danica maxima. *Lob. illust.* 147.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 27.

Sumpf-Laufekraut. W.

*Habitat in Europae septentrionalis paludibus.* ☉ (v. v.)  
Corollae purpureae.

Calyx inflatus ovatus bipartitus, laciniis apice brevissime quinquepartitis dentatis crispis. Corollae labium superius obtuse truncatum sub apice utrinque denticulo brevi instructum, basi faucem versus utrinque dente brevissimo instructum; Labium inferius oblique flexum tripartitum, labio superiore longius, laciniis aequalibus obtusis. Variat etiam floribus albis. W.

Varietatem hujus speciei ex Cūmſchatca habeo, quae forte species diversa, sed quum unicum specimen siccum tantum viderim, sub varietatis nomine interim describam. Caulis et folia exacte *P. palustris*, exceptis summis foliis, quae tantum pinnatifida. Calyx vix inflatus tubulosus bipartitus, laciniis obtuse tridentatis. Corollae labium superius magis arcuatum apice emarginatum, dens sub apice nullus, dens vero ad faucem lanceolatus elongatus; labium inferius superiore brevius vel saltem ejusdem magnitudinis tripartitum, laciniis aequalibus obtusis, intermedia levissime retusa. Ceterum adeo similis *P. palustri* ut primo intuitu nulla differentia appareat. W.

## 2. PEDICULARIS *sylvatica.*

*P.* caule basi ramoso, foliis pinnatis, pinnis acute dentatis, calycibus oblongis inflatis inaequaliter quinquefidis cristatis, corollae galea obtusa truncata acute bidentata. W.

*P.* caule ramoso, calycibus oblongis angulatis laevibus, corollis labio cordato. *It. w. goth.* 40. *Pollich. pal.*

n. 588. *Flor. dan. t. 225? Hoffm. germ. 217. Roth. germ. I. 269. II. 67. Schkuhr bot. Handb. 2. p. 185. t. 171.*

P. caule ramoso, procumbente, foliis pinnatis, pinnis dentatis. *Hall. helv. n. 321.*

P. caule ramoso, floribus solitariis, calycibus quinquefidis. *Fl. suec. 504; 552.*

P. caule ramoso, floribus solitariis remotis. *Fl. lapp. 241. Hort. cliff. 326.*

P. pratensis purpurea. *Bauh. pin. 173. Lob. ic. 748.*

P. minor. *Riv. t. 92. Dill. giff. app. p. 40.*

Fistularia. *Dod. pempt. 556.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 28.*

Wald-Laufkraut. W.

*Habitat in Europae sylvis paludosis. ☉*

Corollae purpureae. (Variat et floribus albis. R.)

Calyx inflatus oblongus, uno latere saepius rumpens, inaequaliter quinque-dentatus, dente superiore lanceolato acuto; reliquis oblongis obtusis apice acute dentatis. Corolla praecedentis sed dens sub apice labii superioris magis elongatus. Simillima praecedenti sed differt praeter characteres indicatos: caule humiliore saepius simplici, interdum basi ramoso. Pro varietate haberem nisi calyx differret, quem optime depinxit *Clariff. Schkuhr. l. c. W.*

### \*3. PEDICULARIS *euphrasioides*.

P. caule ramoso, foliis pinnatifidis dentatis, calycibus tubulosis bipartitis truncatis, corollae galea bidentata. W.

P. (*euphrasioides*) caule ramosissimo, calycibus truncatis obtusiusculis, foliis linearibus subpinnatifidis. *Stephan. in litt.*

P. caule ramoso, calycibus oblongis quinquefidis crenatis, floribus laxo spicatis. *Gmel. fib. 3. p. 203. t. 43.*

β. P. (*labradorica*) caule ramoso, calycibus ore obliquo integro emarginato. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 39. t. 57. C.*

Argentrostartiges Laufkraut. W.

*Habitat in Sibiria ad Lenam fluvium β. in America septentrionali. ♀ (v. l.)*

Caulis semipedalis et ultra ramosissimus diffusus. Folia alterna, infima sessilia pinnatifida, laciniis ob-

*tusis dentatis, reliqua caulina petiolata lineari-lanceolata pinnatifido-dentata, dentibus subrotundis binis seu tribus cartilagineis denticulis instructis. Flores in ramorum apicibus racemosi pedunculati, flavi secundum Gmelinum, videntur tamen rubicundi, quantum licet conjicere e specimine sicco. Calyx tubulosus superne emarginatus, utrinque denticulo instructus ceterum truncatus, inferne vero fissus, hinc bipartitus evadit. Corollae labium superius arcuatum apice truncato-denticulatum, infra basi utrinque dente acuto parvo donatum; Labium inferius tripartitum labio superiore brevius. Capsula lanceolata acuta calyce duplo longior absque stylo persistenti. Vidi varietatem, foliis omnibus pinnatifidis, minorem. P. labradorica vix nisi foliis majoribus differre videtur. IV.*

\*4. **PEDICULARIS myriophylla.**

P. caule subramoso, foliis pinnatis, pinnis acute pinnatifidis quaternis, calycibus quinquefidis, corollae galea acuta bidentata. W.

*Pedicularis myriophylla. Pall. itin. 3. app. n. 99. t. S. f. 1.\**

Feinblättriges Laufkraut. W.

*Habitat in alpidibus Danuricis et Altaicis. 4 (v. l.)*

*Caulis erectus pedalis saepius a basi ramis simplicibus et in superiore parte ramis brevibus quaternis instructus. Folia caulina plerumque quaterna pinnata, pinnis profunde pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis acutis. Calyx tubulosus hirsutus quinquefidus, laciniis lineari-lanceolatis integerrimis, binis inferioribus brevioribus. Corolla flava; labium superius arcuatum acutum bifidum; labium inferius tripartitum superiore multo brevius obtusum. W.*

\*5. **PEDICULARIS spicata.**

P. caule subramoso, foliis lanceolatis repandis crenatis quaternis, calycibus bifidis subtruncatis, corollae galea obtusa. W.

*P. spicata. Pall. itin. 3. app. n. 100. t. S. f. 2.\**

Achrentragendes Laufkraut. W.

*Habitat in frigidissimis paludibus alpium Dauriae. 4*

*Folia lanceolata profunde repanda laciniis rotunda-*

*tis crenatis, quaterna. Flores purpurei in spica densa terminali. Bracteae integerrimae. W.*

\* \* *Caule simplicissimo.*

6. *PEDICULARIS resupinata.*

*P. caule subsimplici, foliis lanceolatis dentatis crenatis, calycibus bifidis truncatis, corollae galea acuta. W.*

*P. caule simplici, foliis lanceolatis serratis crenulatis, floribus resupinatis. Sp. pl. 846. Gmel. sib. 3. p. 204. t. 44.\**

*P. elatior latifolias, floribus purpureis. Amm. ruth. 42. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 32.*

*Verkehrtes Lauskrout. W.*

*Habitat in omni Sibiria frequentissime. 4 (v. l.)*

*Caulis pedalis laevis simplicissimus. Folia lanceolata indivisa profunde serrata, serraturis crenulatis, alterna. Flores ex alis superioribus solitarii sessiles. Calyx laevis obtusus bifidus integer. Corolla saturatissime purpurea resupinata: Galea adunca compressa: Vexillum amplum rotundatum.*

*Variat floribus carneis et lacteis. Gmel. l. c.*

*Caulis profert interdum ramos alternos breves solummodo floriferos. Corolla re vera non resupinata sed labium inferius est oblique flexum. Differt a *P. spicata*, foliis alternis nec quaternis, laciniis acutis nec rotundatis, floribus majoribus et corollae galea acuta. W.*

7. *PEDICULARIS Sceptum Carolinum.*

*P. caule simplici, foliis pinnatifidis, pinnis repandis crenulatis, calycibus quinquefidis cristatis, corollis clausis. W.*

*P. caule simplici, floribus terno-verticillatis, corollis clausis, calycibus cristatis, capsulis regularibus. Fl. suec. 506; 553. Gort. ingr. p. 98. Gunn. norv. n. 33. Oed. dan. t. 26. Kniph. cent. 9. n. 75.*

*P. capsulis subrotundis regularibus. Roy. lugdb. 299. Gmel. sib. 3. p. 206. n. 17.*

*Sceptum carolinum. Rudb. ir. I. t. I. Fl. lapp. 243. t. 4. f. 4. Hort. cliff. 326.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 30.*

*Scepterförmiges Lauskrout. W.*

*Habitat in Sueciae, Borussiae, Ducatus Megapolitani, Rutheni spongiosifi sylvaticis riguis inque alpinis Salisburgenlibus, Hungaricis. 4 (v. l.)*

*Caulis tripedalis speciosissimus. Corollae clausae luteae ore sanguineo.*

*Folia caulina sunt sparsa sessilia oblonga obtusa concava crenulata parva. Galea corollae est obtusa. W.*

### 8. PEDICULARIS *triflris.*

*P. caule simplici, foliis pinnatifidis, pinnis argute dentatis, calycibus quinquefidis, corollae galea obtusa margine villosa. W.*

*P. caule simplici, corollarum galeis margine villosis. Sp. pl. 846.*

*P. caule simplici, foliis semipinnatis, pinnulis obtusis acute serratis. Gmel. sib. 3. p. 212. n. 23.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 33.*

*Trauriges Laulekraut. W.*

*Habitat in Sibiria inter Jacutiam et Ochotium. ☉ (v. l.)*

*Caulis simplicissimus spithamaeus. Folia alterna pinnatifida serrulata. Flores in spicam seu capitulum collecti. Corollae obtusae flavae: galea parum incurva margine villosa.*

*Planta hirsutissima. Rostrum sat obtusum floris ochroleuci in spicam arctam congesti. Gmel. l. c.*

### 9. PEDICULARIS *lapponica.*

*P. caule simplici, foliis pinnatifidis, pinnis serratis, calycibus bifidis oblongis, corollae galea uncinata truncata W.*

*P. caule simplici, foliis pinnatifidis serratis calycibus bifidis obtusis. Sp. pl. 847. Fl. dan. t. 2. Pall. itin. 3. p. 34.*

*P. caule simplici, foliis lanceolatis semipinnatis serratis acutis. Fl. lapp. 242. t. 4. f. 1. Fl. suec. 507; 554. Hort. cliff. 326. Roy. lugdb. 299.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 36.*

*Lappländisches Laulekraut. W.*

*Habitat in alpium Lapponiae, Norvegiae locis lapidosis. ☿ (v. l.)*

*Corollae flavae.*

*Folia summa sunt saepius linearia simpliciter dentata. Calyx membranaceus quinquesulcatus bifidus, laciniis saepius obtusis, interdum vero suprema obsolete tridentata, infima obsolete bidentata. Galea corollae uncinata apice truncata subdenticulata. Stylus galea longior. Stigma capitatum. W.*

\*10. PEDICULARIS *asplenifolia*.

P. caule simplici, foliis pinnatifidis, pinnis oblongis inferne dentatis, calycibus quinquefidis subcristatis, corollae galea uncinata acuminata, truncato-emarginata. W.

Pedicularis asplenifolia. *Floerke spicil. fl. salisb. ined.* Streifenfarrenblättriges Laufekraut. W.

*Habitat in alpibus Salisburgenfibus. 4 (v. l.)*

Radix ramosa flava. Caulis tri- f. quadriuncialis erectus. Folia sesqui f. biuncialia pinnatifida, pinnis oblongis obtusis latere inferiore dente unico vel tribus obtusis obsoletis instructis. Flores 3 vel 7 in apice caulis purpurei. Calyx tubulosus pubescens quinquesulcatus quinquefidus, laciniis lanceolatis apice incurvatis et dentibus brevibus plerumque binis donatis. Corollae tubus calycis longitudine; Labium superius uncinatum acuminatum apice truncatum emarginatum et obsolete crenatum; Labium inferius trilobum obtusum, lacinia intermedia angustiore et longiore. Accedit habitu ad *P. hirsutam* Linnaei, sed abunde indicatis notis diversa. W.

\*11. PEDICULARIS *flava*.

P. caule simplici, foliis profunde pinnatifidis, pinnis acutis lanceolatis, dentatis, calycibus quinquefidis cristatis, corollae galea obtusa. W.

Pedicularis flava. *Pall. itin. 3. app. n. 97. t. R. f. 1.\** Gelbes Laufekraut. W.

*Habitat in glareosis Sibiriae ad fluvium Onon-Borsa dictum. 4*

Planta semipedalis caule simplicissimo. Folia succulenta profunde pinnatifida, pinnis distantibus lanceolatis acutis remote grosse dentatis. Spica pollicaris subfoliosa. Calyx quinque-dentatus inaequalis, dentibus lanceolatis serratis. Corolla flava, labio superiore obtuso, inferiore trilobo. W.

\*12. PEDICULARIS *striata*.

P. caule simplici, foliis profunde pinnatifidis, pinnis linearibus serrulatis, calycibus bilabiatis, corollae galea obtusa bidentata. W.

Pedicularis striata. *Pall. itin. 3. app. n. 98. t. R. f. 2.\** Gestreiftes Laufekraut. W.



*Habitat in rupestribus apricis excelsis Dauriae. 4*  
(v. l.)

Caulis fere pedalis erectus simplicissimus, saepe plures ex una radice. Folia profunde pinnatifida pinnis linearibus acutiusculis margine argute serrulatis. Flores in spica bipollicari terminali. Bractae lineares subintegerrimae calyce longiores. Calyx subventricosus bilabiatus, labio superiore tridendato, inferiore bipartito. Corolla flava venis atro-sanguineis; Labium superius obtusissimum sub apice dente unico acuminato utrinque instructum. W.

\*13. PEDICULARIS *Sudetica*. W.

P. caule simplici, foliis profunde pinnatifidis, pinnis lineari-lanceolatis inaequaliter dentatis, calycibus quinquefidis hirsutis, corollae galea obtusa emarginata bidentata. W.

*Pedicularis (an hirsuta?)* caule simplici, foliis pinnatis, pinnis lineari-oblongis dentatis subpinnatifidis, calycibus hirsutis quinquefidis, corollis galea acute emarginata, spica foliosa. *Haenke Sudet. p. 86.\**

*Pedicularis incarnata. Krock. Siles. n. 984.*

*Pedicularis comosa. Mattuschk. Siles. n. 600.*

Riesengebirgs Laulekraut W.

*Habitat in montibus Sudetis inque Sibiria. 4 (v. l.)*

Caulis simplicissimus quadri- seu quinquepollicaris erectus. Folia glabra profunde pinnatifida, pinnis distantibus suboppositis lanceolatis profunde inaequaliter dentatis. Spica terminalis uncialis vel sesquiuncialis. Calyx hirsutus quinquefidus, laciniis lanceolatis inaequalibus tenuissime serrulatis. Corolla purpurea; Labium superius obtusum emarginatum in utroque latere sub apice dente unico instructum; Labium inferius trilobum obtusum, lobis lateralibus serrulatis. *Accedit ad P. recutitam, differt vero: caule minori, foliis non bipinnatifidis minoribus, spica non foliosa, floribus majoribus calycibus hirsutis, dentibus serrulatis, corollae galea sub apice bidentata, lobis lateralibus labii inferioris serrulatis. A. P. incarnata habitu et corollae galea obtusa nec uncinata diversa. A. P. hirsuta foliis pinnatifidis, et corollae galea sub apice bidentata distincta. Cum P. rosea nil commune habet, quae foliis pinnatis, pinnulis tenuissimis et aliis notis abunde discrepat. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

O

14. PEDICULARIS *recutita*.

P. caule simplici, foliis profunde pinnatifidis, pinnis lanceolatis pinnatifidis dentatis, spica compacta foliolosa, calycibus glabris quinquedentatis, corollae galea obtusissima. W.

P. caule simplici, foliis pinnatifidis serratis, spica foliolosa, calycibus coloratis, corollis obtusis. *Syst. Veg.* 461. *Jacq. austr. t.* 258. *Allion. ped. n.* 225.

P. caule simplici, staminibus floris galea longioribus. *Sp. pl.* 2. p. 846.

P. caule simplici, foliis pinnatis, floribus spicatis, staminibus eminentibus. *Hall. helv. n.* 316. *t.* 8. *f.* 2.

P. (*obsoleta*) radice tuberosa; staminibus floribus minoribus obsoletis majoribus. *Crantz. austr. p.* 316. *sec. Jacq. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 32.

Befchnittenes Laufekraut. W.

*Habitat in summis* Helvetiae, Italiae, Austriae, Salisburgi alpibus. 4 (v. l.)

Caulis simplex. Folia pinnatifida, serrata. Spica subfoliolosa. Calyces colorati. Corolla purpurea: galea obtusa, nec rostrata.

Galea corollae obtusissima absque dente sub apice. Calyx campanulatus glaber inaequaliter quinquedentatus. W.

\*15. PEDICULARIS *elata*.

P. caule simplici, foliis profunde pinnatifidis, pinnis lineari-lanceolatis crenatis, spica laxa subfoliolosa, calycibus glabris quinquedentatis, corollae galea obtusa truncata. W.

P. caule simplici, foliis pinnatifidis, pinnulis crenulatis, florum rostris obtulis. *Gmel. sib.* 3. p. 211.\*

Hohes Laufekraut. W.

*Habitat in Sibiriae agris ad fluvium* Catsham. 4 (v. l.)

Caulis simplicissimus sesqui- vel bipedalis erectus. Folia alterna profunde pinnatifida, pinnis distantibus lineari-lanceolatis obtuse crenatis, crenis mucrone parvo, sub lente tantum visibili, cartilagineo donatis. Spica terminalis semipedalis subfoliolosa elongata, floribus inferioribus distantibus superioribus confertis. Folia floralia inferiora calyce duplo longiora uti folia caulina sed minora, summa calycis longitudine plerumque

*tripartita subcrenulata. Calyx tubulosus glaber inaequaliter quinquedentatus. Corollae purpurea tubus calyce triplo fere longior. Labium superius erectum obtusum apice emarginato truncato nec bidentato; inferius tripartitum crenulato-dentatum, laciniis latera- libus obtusis intermedia longiore mucronata. A prae- cedente diversa: foliis, spica elongata sextuplo longiore, corollis multo majoribus, labio superiore magis elonga- to, inferiore crenato. A. P. sudetica, cui foliis quo- dammodo similis, diversa: altitudine caulis, foliorum pinnulis crenatis, spica longiore, floribus majoribus, calyce quinquedentato dentibus integerrimis, corollae galea sub apice non bidentata et lacinia intermedia labii inferioris longiore. W.*

### 16. PEDICULARIS foliosa.

P. caule simplici, foliis caulinis profunde pinnatifidis, pinnis lanceolatis acuminatis pinnatifidis dentatis, spi- ca foliosa, calycibus quinquedentatis, dente superiore maximo, corollae galea obtusissima. W.

P. caule simplici, spica foliosa, corollis galea obtusissima integra, calycibus quinquedentatis. *Mant.* 86. *Jacq. vind.* 250.\* *Gouan. illustr.* 37. *Jacq. austr.* 2. t. 139. *Crantz. austr. p.* 313. *Allion. ped. n.* 230. *Vill. delph.* 2. p. 433.

*Pedicularis comosa. Scop. earn. n.* 765.

P. spica foliosa. *Hall. helv. n.* 317. t. 9. f. 3.

P. alpina filicis folio major. *Bauh. pin.* 163.

P. alpina flore luteo, radice nigra. *Bauh. hist.* 3. p. 43. 438.

*Alectorolophus alpina prima. Clus. hist.* 2. p. 210.

*Alectorolophus montanus albo flore. Barr. ic.* 469?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 37.

Beblättertes Lauskraut. W.

*Habitat in alpibus Helvetiae, Sabaudiae, Delphinatus, Hungariae, inque monte Cenisio. ♂ (v. l.)*

*Folia bipinnatifida. Calyces angulis orisque pilosis. Corolla ochroleuca; Galea non rosstrata obtusissima adunca. Caulis saepe pedalis.*

*Folia radicalia sunt saepius pinnata, pinnis pinnati- fidis. Variat foliis angustioribus et latioribus. Calyx est quinquedentatus, dente supremo reliquis majore. W.*

### 17. PEDICULARIS canadensis.

P. caule simplici, spica subfoliosa, corollis galea setaceo- bidentata, calycibus deorsum truncatis. *Mant.* 86.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 37.*

Canadilches Laufekraut. W.

*Habitat in America septentrionali. Kalm. 2*

Caulis erectus spithamaeus simplex superne pubescens. Folia alterna pinnatifida incisa crenata obtusa laevia. Spica terminalis sessilis ovata foliosa, foliolis calyce paullo longioribus. Calyces pubescentes, oblique deorsum truncati. Corollae albae: Galea subfalcata vix rostrata, sed apice fere truncata, margine superiore vix dente manifesto; inferiore autem utrinque dente setaceo, longe magis elongato, quam in *P. sylvatica* aut *tuberosa*. Labium inferius trifidum obtusum.

\*18. PEDICULARIS *groenlandica*.

*P.* caule simplici, foliis profunde pinnatifidis, pinnis lanceolatis acuminatis serratis, calycibus glabris quinque-dentatis, corollis clausis, galea uncinato-subulata. W.

*P.* (*groenlandica*) caule simplici, foliis pinnatis serratis-calycibus oblongis glabris, corollis galea subulata arcuata longiore. *Retz. prod. fl. scand. ed. 2. n. 760. Fl. dan. t. 1166.*

*Pedicularis incarnata* e Groenlandia. *Retz. obs. 4. p. 27. t. 1. Grönländisches Laufekraut. W.*

*Habitat in Groenlandia. 2*

*A P. incarnata et uncinata corollis clausis et galea subulata distincta. A P. incarnata diversa: foliis profunde pinnatifidis fere pinnatis, serraturis pinnarum multo brevioribus, calyce glabro. A P. uncinata distincta: foliis multo minoribus, calyce oblongo nec campanulato, colore floris. W.*

\*19. PEDICULARIS *incarnata*.

*P.* caule simplici, foliis profunde pinnatifidis, pinnis inaequaliter dentatis lineari-lanceolatis, calycibus villosis quinquefidis, corollae galea uncinata acuminata. W.

*Pedicularis incarnata, Jacq. austr. t. 140. Allion. ped. n. 128. t. 3. f. 2. et t. 4. f. 2. Villars delph. 2. p. 424.\**

*P.* (*rostrato-spicata*) caule strigoso erecto, spica oblonga canescente, floribus rostrato-acuminatis. *Crantz. austr. p. 317.*

*P.* foliis pinnatis, pinnis dentatis, floribus rostratis spicatis, calycibus tomentosis. *Hall. helv. n. 319.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 35.*

*Blaserothes Laufekraut.* W.

*Habitat in summis alpibus Helvetiae, Delphinatus, Sabaudiae, Salisburgi, Carinthiae, Austriae.* ☉ (v. f.)

*Folia radicalia bi-f. triuncialia profunde pinnatifida, pinnis pinnatifidis dentatis. Folia caulina profunde pinnatifida, pinnis lineari-lanceolatis dentatis, dentibus inaequalibus. Flores purpurei in spica bi-vel triunciali terminali, floribus alternis, inferioribus distantibus, summis approximatis. Calyx tubulosus quinquesidus villosus, laciniis lanceolatis. Corollae labium superius uncinatum acuminatum emarginatum. Haec a plerisque Botanicis pro *P. incarnata* Linnaei habetur, quae diversissima; servavi tamen nomen triviale, quum *P. incarnata* Linnaei corollis flavis gaudeat. Certus sum *P. incarnatam* a Linnaeo descriptam non in alpibus Europae australioris provenire. A Clariss. Viris enim Bellardi, Jacquin, Villars, Hoppe et Schleicher hanc speciem obtinui. W.*

## 20. PEDICULARIS uncinata.

*P. caule simplici, foliis caulinis profunde pinnatifidis, pinnis lineari-lanceolatis duplicato-dentatis, calycibus rotundatis glabris quinquedentatis, corollae galea uncinata acuminata.* W.

*Pedicularis uncinata.* *Stephan. in litt.*

*P. (incarnata) caule simplici, foliis pinnatis ferratis, calycibus rotundatis glabris, corollis galea uncinata acuta.* *Sp. pl.* 847. *Pall. it.* 2. p. 404.

*P. caule simplici, foliis pinnatifidis, pinnulis arctis, spica florum longissima.* *Gmel. sib.* 3. p. 209. t. 45.\*

*F. filicis folio lutea, spica florum praelonga.* *Gmel. Irc.* 504.

*Hakenförmiges Laufekraut.* W.

*Habitat in Sibiria ad Angaram fluvium.* 24 (v. f.)

*Folia radicalia pinnata pedalia, pinnis pinnatifidis ferratis: caulina pinnatifida fere ad basin, serrata. Caulis laevis plusquam pedalis, foliis alterius, Spica nuda, Calycibus semiglabris quinquedentatis glabris. Corolla incarnata (est flava W.): Galea falcata et uncinata acuta valde adunca.*

*Praecedens descriptio Specierum plantarum convenit exacte cum planta nostra praeter colorem floris, qui non incarnatus sed flavus. Calyx glaber hemisphaericus quinquedentatus. Corollae galea uncinata acuminata*

*emarginata. Spica semipedalis. Caulis bi seu tripedalis. Folia radicalia pedalia, caulina tri vel quadripollicaria. W.*

*Variat labio inferiore corollae glabro et villoso Steph.*

\*21. **PEDICULARIS** *interrupta.*

*P. caule simplici, foliis quaternis profunde pinnatifidis, pinnis lanceolatis inaequaliter dentatis, spica verticillata elongata, calycibus villosis quinquedentatis, corollae galea obtusa. W.*

*Pedicularis interrupta. Stephan in litt.*

*Wirbelblütiges Laufekraut. W.*

*Habitat in Sibiria. 4 (v. l.)*

*Planta speciosa bipedalis. Folia terna vel quaterna, verticillata fere ejusdem formae ut in P. flava. profunde pinnatifida, pinnis distantibus lanceolatis inaequaliter acute dentatis, Spica semipedalis vel pedalis floribus verticillatis ternis vel quaternis. Bractee ovatae concavae acuminatae integerrimae. Calyx villosus, orificio obliquo, inaequaliter quinquedentatus. Corollae galea falcata obtusa. Color florum mihi ignotus. W.*

22. **PEDICULARIS** *verticillata.*

*P. caule simplici, foliis caulinis pinnatifidis quaternis, pinnis oblongis obtusis dentatis, spica capitata, calycibus hirsutis quinquedentatis, corollae galea obtusissima. W.*

*P. caule simplici, foliis quaternis. Sp. pl. 846. Kram. aust. 183. n. 4. Gmel. sib. 3. p. 206. n. 18. Crantz. austr. p. 312. Scop. caru. n. 766. Jacq. austr. t. 206. Villars delph. 2. p. 422. All. pedem. n. 224.*

*P. foliis pinnatis quaternis, floribus spicatis. Hall. helv. ed. 2. n. 318. t. 9. f. 1.*

*P. alpina, floribus purpureis spicatis, foliis pinnatis verticillatis. Hall. helv. ed. 1. 623. t. 17. f. 1.*

*P. alpina folio ceterach. Tournef. inst. 173.*

*β. P. foliis profunde pinnatifidis, pinnis linearibus acute dentatis, calycibus villosis quinquefidis.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 31.*

*Vierblättriges Laufekraut. W.*

*Habitat in pratis alpinis Austriae, Salisburgi, Helvetiae, Sabaudiae, Delphinatus, β in Sibiria. 4 (v. l.)*

*Folia radicalia pinnata, pinnis suboppositis oblongis obtusis dentatis; caulina pinnatifida. Calyx mem-*

*branaeus hirsutus quinquedentatus*, dentibus brevissimis. Corollae galea obtusissima. Varietas  $\beta$  sibirica differt: foliorum pinnis tenuissimis fere ut in *P. myriophylla*, et calycum dentibus lanceolatis longioribus, reliqua conveniunt cum vulgari. Pro varietate habeo, quum differentia nimis levis videatur. W.

\*23. *PEDICULARIS acaulis*.

*P. aculis*, foliis pinnatis, pinnis ovatis obtusis dentatis, pedunculis unifloris, calycibus quinquedentatis cristatis, corollae galea elongata obtusa. W.

*P. pedunculis radicalibus monofloris flore brevioribus*, labii tripartiti lobo intermedio basi bicarinato. *Wulf. fen in Jacq. Collect. I. p. 207. t. 14.\**

*P. pedunculis radicalibus longitudine calycis*. *Scop. carn. n. 761. t. 31.*

*P. alpina acaulis flore magno*. *Segu. veron. suppl. p. 127.* Stielloses Lauskraut. W.

*Habitat in Carnioliae, Carinthiae alpinis*. 4

Planta acaulis. Pedunculi plures ex una radice uniflori calyce breviores. Calyx quinquefidus, laciniis lanceolatis, dentatis. Corolla albida, labio superiore elongato obtuso. W.

24. *PEDICULARIS flammea*.

*P. caule simplici*, foliis pinnatis, pinnis imbricatis ovatis obtusis duplicato dentatis, calycibus quinquedentatis, corollae galea obtusa. W.

*P. caule simplici*, foliis pinnatis retro-imbricatis. *Sp. pl. 846. Gmel. sib. 3. 212. Fl. dan. 30? Jacq. collect. 2. p. 70. Allion. ped. n. 226.*

*P. caule simplici*, foliis semipinnatis obtusis: laciniis imbricatis crenatis. *Fl. lapp. 244. t. 4. f. 2. Fl. suec. 509. 556.*

*P. caule simplici*, foliis pinnatis, pinnis dentatis, denticulis retroversis. *Hall. helv. n. 315. t. 8. f. 3.*

*Pedicularis alpina folio ceterach*. *Bauh. pin. 163.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 33.*

Feuerfarbenes Lauskraut. W.

*Habitat in alpinis Lapponiae, Norvegiae, Groenlandiae, Helvetiae, Austriae, in monte Cenisio, inque alpinis Dauriae et ad lacum Baical*. 4 (v. l.)

Radix tuberosa pendula. Folia recentia splendent nitore sericeo. Calyces pallidi rubro maculati. Corollae

*flavae, galea utrinque macula coccinea. Icon Florae danicae bona, sed corollae color male expressus. W.*

25. *PEDICULARIS hirsuta.*

P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis lanceolatis obtuse dentatis, calycibus hirsutis quinquefidis, corollae galea obtusissima. W.

P. caule simplici, foliis dentato-pinnatis linearibus, calycibus hirsutis. *Sp. pl.* 848. *Pall. it.* 3. p. 34.

P. caule simplici, calycibus villosis, foliis linearibus dentatis crenatis. *El. lapp* 245. t. 4. f. 3. *Fl. suec.* 508; 555.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 34.

Haariges Laufekraut. W.

*Habitat in Lapponiae alpibus.* 4 (v. l.)

Corollae incarnatae.

*A sequente distinctissima foliorum forma ut et calyce tubuloso nec ventricoso, totoque habitu. Galea corollae obtusissima et dentes in foliorum pinnis breves obtusi. W.*

\* 26. *PEDICULARIS rosea.*

P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis linearibus acutis, calycibus hirsutis quinquefidis, corollae galea obtusa. W.

P. (*rosea*) caule simplici, foliis pinnatis, pinnis acute incisis, calycibus hirsutis. *Iacq. ic. rar.* 1. t. 115. *Misc.* 2 p. 57.\*

*Pedicularis hirsuta. Allion. pedem. n.* 227. t. 3. f. 1. *Villars delph.* 2. p. 423.\*

P. pinnis foliorum acute pinnatis, floribus obtusis purpureis spicatis. *Allion spec. ped.* 52. t. 11. f. 1.

Rosenfarbiges Laufekraut. W.

*Habitat in summis alpibus Carinthiae, Italiae, Galliae inque monte Cenisio.* 4 (v. l.)

*Caulis digitalis simplicissimus. Folia pinnata, pinnis pinnatifidis, saepius tantum tripartitis, laciniis linearibus angustissimis acutis. Spica uncialis vel biuncialis. Calyces quinquefidi inaequales villosi. Corollae galea obtusa. W.*

27. *PEDICULARIS rostrata.*

P. caule simplici ascendente, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis dentatis, calycibus quinquefidis cristatis, corollae galea uncinato-acuminata truncata. W.



- P. caule declinato subramoso, corollis galea rostrato-acuminata, calycibus cristatis subhirsutis. *Sp. pl.* 845. *Kram. austr.* 183. n. 3. *Iacq. austr. t.* 205. *Scop. carn.* n. 764. *Allion ped.* n. 223. *Villars delph.* 2. p. 426.\*
- P. caule procumbente ramoso, floribus rostratis sparsis. *Hall. helv.* n. 322. t. 8. f. 1. (*figura non optima*).
- P. (*rostrato-capitata*) foliis in utramque paginam versus crispatis, spica capitata foliosa, floribus rostrato-acuminatis. *Crantz austr.* p. 320.
- P. caulibus reflexis, spica laxa purpurea. *Segu. veron.* 3. p. 125.
- P. alpina filicis folio minor. *Bauh. pin.* 163.
- Alectorolophus alpina 3. minor. *Clus. hist.* 2. p. 210. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 30.
- Schnabelförmiges Lauskrout. W.
- Habitat in alpebus summis Galliae, Italiae, Sabaudiae, Helvetiae, Salisburgi, Austriae.* 4 (v. f.)
- Caulis e radice plures decumbentes vel adscendentes bi-vel triunciales simplices nec ramosi. Calyx hirsutus quinquefidus, laciniis dentatis. Corolla purpurea, galea uncinata acuminata, apice truncata. W.

28. PEDICULARIS *tuberosa*.

- P. caule simplici erecto, foliis pinnatis, pinnis profunde pinnatifidis dentatis, calycibus quinquefidis subcristatis, corollae galea uncinata acuminata emarginata. W.
- P. caule simplici, calycibus cristatis, corollae galea rostrato-adunca. *Sp. pl.* 847. *Villars delph.* 2. p. 430.
- P. caule simplici, floribus spicatis rostratis, calycibus glabris. *Hall. helv.* n. 323. t. 10.
- P. alpina lutea. *Segu. veron.* 3. p. 126.
- β. P. (*gyroflexa*) varietas B. foliis tenuioribus, pinnis distinctis, floribus flavis, pistillo corolla multo longiore. *Villars delph.* 2. p. 427.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 38.
- Dickwurzliches Lauskrout. W.
- Habitat in alpebus Galliae, Helvetiae, Italiae.* 4 (v. f.)
- Radix crassa divisa. Caulis simplicissimus. Folia pinnata, pinnis profunde pinnatifidis, laciniis linearibus majoribus dentatis. Spica elongata foliosa, floribus inferioribus distantibus. Calyx tubulosus glaber vel parum hirsutus quinquefidus, laciniis lanceolatis apice dentatis, in floribus superioribus saepe obsolete dentatis

*vel integerrimis. Corolla flava, Labium superius uncinatum aduncum apice attenuatum emarginatum. W.*

\* 29. *PEDICULARIS gyroflexa.*

*P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis profunde pinnatifidis obtusis, calycibus quinquefidis cristatis, corollae galea uncinata obtusa emarginata bidentata. W.*

*P. (gyroflexa) foliis bipinnatis, foliolis subdentatis crispis et obtusis, floribus sinistrorsum gyratis capitato-aduncis. Villars delph. 2. p. 426. t. 9.\**

*P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnulis obtuse dentatis, galea rostrata. Hall. helv. n. 324. t. II.*

*Pedicularis tuberosa. Allion ped. n. 131.*

*P. alpina filicis folio minor. Tournef. inst. 173.*

*Gedrehtes Laufkraut. W.*

*Habitat in alpibus Galliae, Italiae, Helvetiae. 4 (v. l.)*

*Praecedenti simillima ut aegre distinguenda, convenit enim, foliis et habitu, differt vero: spica magis foliosa, floribus purpureis, calycinis segmentis profunde dentatis, corollae galea non acuminata, licet uncinata sit, sed apice obtusa emarginata, fissura subdenticulata et in utroque latere sub apice in dentem obtusum desinens. W.*

\* 30. *PEDICULARIS fasciculata.*

*P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis profunde pinnatifidis dentatis, calycibus quinquefidis cristatis, corollae galea adunca apice tridentata. W.*

*Pedicularis fasciculata. Bellardi. app. altera fl. pedem. inedita.*

*P. alpina asphodeli radice purpurascente flore. Tournef. inst. 173.*

*Filipendula montana flore pediculariae. Bauh. piu. 163. Büscheltragendes Laufkraut. W.*

*Habitat in Italiae alpibus. 4 (v. l.)*

*Binis praecedentibus valde affinis, distinguitur tamen a praecedente, qua cum colore floris convenit: radice tuberosa fasciculata more Spiraeae Filipendulae nec simpliciter ramosa, laciniis omnibus pinnarum dentatis, corollae galea revera non uncinata sed ad uncinatam formam accedens, apice tridentata, dente intermedio brevissimo, lateralibus oblongis acutiusculis. Distinxi has affines species ad specimina sicca, forte in plantis recentibus plures notae, in siccis*

*haud observabiles, occurrunt, quas alii, quibus occasio suppetit, investigabunt. W.*

\*31. *PEDICULARIS rubens.*

*P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis linearibus acutis, spica foliosa, calycibus glabris inaequaliter quinquefidis, corollae galea obtusa bidentata. W.*

*Pedicularis rubens. Stephan in litt.*

*Röhhliches Laufekraut. W.*

*Habitat in Sibiria media. 2 (v. l.)*

*Caulis erectus octopollicaris simplicissimus. Folia Millefolii vel Umbellae tenuissime divisa, radicalia quadripollicaria. Spica foliosa. Calyx tubulosus ruberrimus glaber quinqueidentatus, dentibus inaequalibus, binis longioribus apice saepius bifidis. Corolla purpurea. Labium superius emarginatum crenulatum sub apice utrinque dente setaceo instructum. Habitus plantae fere ut in *P. palustri*, sed pinnae longiores fere tenuiores, calycisque forma diversissima. W.*

\*32. *PEDICULARIS compacta.*

*P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis lanceolatis pinnatifidis apice confluentibus, spica capitata nuda, calycibus glabris quinquefidis, corollae galea uncinata emarginato-crenulata. W.*

*Pedicularis compacta. Stephan in litt.*

*Dichtähriges Laufekraut. W.*

*Habitat in Sibiriae pratis. 2 (v. l.)*

*Radix *P. comosae*. Caulis simplicissimus quadripollicaris, Folia caulina uncialia pinnata, pinnis lanceolatis pinnatifidis superioribus confluentibus. Spica terminalis nuda non foliosa uncialis compacta capitata. Calyx glaber quinquefidus, laciniis obtusis subaequalibus margine ciliatis. Corolla flava, Labium superius uncinatum emarginatum, levissime in fissura crenulatum. W.*

\*33. *PEDICULARIS achilleifolia.*

*P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis linearibus dentatis, spica nuda elongata, calycibus inaequaliter quinquefidis acutis, corollae galea bidentata. W.*

*Pedicularis achilleaefolia. Stephan in litt.*

*Garbenblättriges Laufekraut. W.*

*Habitat in Sibiria. 2 (v. l.)*

Caulis simplicissimus pedalis. Folia Achilleae nobilis pinnata, pinnis pubescentibus profunde pinnatifidis, laciniis distantibus subdentatis linearibus obtusiusculis. Spica semipedalis absque foliis, densa elongata. Bractee tripartitae calyce breviores. Calyx pubescens ventricosus quinquesulcatus, quinquesidus, laciniis quatuor aequalibus linearibus acutis, unica brevior oblonga obtusa. Corolla flava, galea arcuata emarginata sub apice utrinque dente subulato instructa. W.

34. PEDICULARIS comosa.

P. caule simplici, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis subdentatis, spica foliosa, calycibus quinquesidis, corollae galea bidentata. W.

P. caule simplici, spica foliosa, corollae galea acuta emarginata, calycibus quinquentatis. *Sp. pl.* 847. *Gouan. illustr.* 37. *Villars delph.* 431. *Pall. itin.* 1. p. 148. *Allion. ped. n.* 229. t. 4. f. 1. *Stephan ic. mosq.* t. 5.

P. foliis bipinnatis, calyce non cristato, floribus ochroleucis in spicam nudam congestis. *Allion spec. ped.* 50. t. 11. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 36.

Schopfbütiges Lauskraut. W.

*Habitat in alpibus Galliae australis; Italiae, in pratis Russiae, Sibiriae* 4 (v. f.)

Calyx 5-dentatus tubulosus integerrimus, parum pilosus. Corolla lutea labio superiore acuto, sed emarginato, dentibus duobus acutis nutantibus.

Planta admodum varians ratione loci natalis et faciem interdum induens prorsus alienam. Accepi a *Clarriff. Viris Bellardi et Villars ex Europa australi, a Clarriff. Stephan e diversis Sibiriae locis specimina varia, quae attente comparavi, sed discrimina inter haec eruere haud potui. Conveniunt omnes a me visae varietates; Calyce subpubescente quinquesido, laciniis subaequalibus. Corolla ochroleuca, galea emarginato-bifida, laciniis acuminatis, Spica foliosa, Radice Filipendulae; seu differunt magnitudine et forma foliorum, et altitudine caulis. Varietates sequentes vidi: 1) Foliis pinnatis, foliolis sessilibus aequaliter pinnatifidis, laciniis subdentatis, caule semipedali et ultra, spica oblonga, cujus iconem dedit Allioni; 2) Foliis praecedentis sed laciniis dentatis, caule humiliore, spica ovata, e Sibiria. 3) Foliis pinnatis, pinnis sessilibus decurrentibus lanceolatis inaequaliter pinnatifidis, laci-*

niis non dentatis, caule semipedali et ultra, spica oblonga, hujus iconem dedit Stephan l. c. 4) Tota glaberrima, foliis pinnatis, pinnis distantibus linearibus inaequaliter argute pinnatifidis, foliis inferioribus semipedalibus, caule bipedali, spica oblonga. 5) Tota pubescens, foliis iis Chrysanthemi corymbosi similibus, pinnatis, pinnis approximatis lanceolatis, inaequaliter pinnatifidis, laciniis ferrulatis, foliis inferioribus semipedalibus, caule bipedali, spica oblonga. W.

## 1138. GERARDIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1004.

Cal. 5-fidus. Corolla 2-labiata: lab. inf. 3-partito: lobis emarginatis: medio bipartito. Caps. 3-locularis, dehiscens.

## 1. GERARDIA tuberosa.

G. foliis subovatis tomentosis repandis longitudine caulis. Sp. pl. 848. †

G. foliis ovatis petiolatis repandis subvillosis longitudine caulis, floribus spicatis. Lamarck. encycl. 2. p. 681.\*

G. humilis, bugulae foliis, asphodeli radice. Plum. gen. 31. ic. 75. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 41.

Knollige Gerardie, W.

Habitat in America calidiore.

Fructificatio erit examinanda.

## 2. GERARDIA delphinifolia.

G. foliis linearibus pinnatifidis, caule subramoso. Sp. pl. 848. Amoen. acad. 4. p. 318.\* Wendl. obs. 25.\*

Roxb. corom. 1. p. 62. t. 90.\*

Antirrhino affinis medraspatana, capillaceo folio triphyllos flore purpureo. Pluck. alm. 17. t. 358. f. 3.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syst. 8. p. 42.

Ritterspornblättrige Gerardie, W.

Habitat in India orientali. ☉ (v. l.)

Caulis ramosus. Folia filiformia tripartita vel pinnata, in ramulis saepius simplicia. Pedunculi axillares uniflori solitarii. Calyces quinquesidi. Corolla uncialis rosea, limbo quinquesido obtuso, W.

## 3. GERARDIA purpurea.

G. foliis linearibus. Sp. pl. 848.

*Digitalis foliis linearibus, floribus remotis. Gron. virg.*  
193.

*Digitalis rubra minor, labiis florum patulis, foliis parvis angustis. Baunisl. virg. 1926. Gron. virg. I. p. 72.\**

*Digitalis virginiana rubra, foliis et facie antirrhini vulgaris. Pluk. mant. 65. t. 388. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 42.*

Ro he Gerardie. W.

*Habitat in Virginia. Canada. ☉*

*Caules pedales, filiformes, simplicissimi aut brachiati, laeves. Folia linearia, integerrima, opposita, saepe et alterna. Flores oppositi: Pedunculis unifloris, filiformibus, aut sessiles. Calyces laeves, parvi, campanulati, quinqueidentati. Corollae saturatissime purpureae aut rotatae aut campanulatae aut tubulosae; Sic variat corollae figura.*

*Conf. Pluk. phyt. 12. f. 2.*

\*4. GERARDIA. *tenuifolia.*

*G. foliis linearibus, floralibus filiformibus inflexis, pedunculis oppositis. Vahl. symb. 3. p. 79.*

*Antirrhinum purpureum multicaule, foliis tenuissimis sursum inflexis floribus sparsis, calyce spinulis asperato. Pluk. alm. 34. t. 12. f. 4.*

*Dünnbättrige Gerardie. W.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Caulis erectus tenuis glaber obscure tetragonus superne ramosus. Rami simplicissimi oppositi. Folia sessilia linearia integerrima pollicaria, floralia angustiora inflexa pedunculo longiore. Pedunculi solitarii filiformes uniflori. Calyx campanulatus quinqueidentatus glaber, dentibus parvis acutis. Valde affinis G. purpureae, an satis distincta? Vahl. l. c.*

5 GERARDIA *tubulosa.*

*G. laevis, foliis linearibus integerrimis acutis, tubo calyce longiore. Lin. suppl. 279.*

*Röhrenförmige Gerardie W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. Thunberg.*

6. GERARDIA *Nigrina.*

*G. scabra, foliis lanceolatis inferne serratis, caule tetragono. Lin. suppl. 278.*

*Nigrina vilcosa. Mant. 42.*

*Melasma scabrum. Berg. cap. 162. t. 3. f. 4.\**

Vasculifera viscosa calyce majore. *Vetiv. musf.* 496 an?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 5. p. 510.

Schwarzwerdende Gerardie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

Caules herbacei erecti sesquipediales teretes (tetragoni Suppl.) scabri non articulati. Folia opposita sessilia lanceolata scabra, dente utrinque unico validiore versus basin, superiora sensim minora. Flores axillares solitarii penduli pedunculati, pedunculo longitudine floris. Bractee in medio pedunculi duae oppositae lanceolatae flore breviores. *Mant.* 1. c.

## 7. GERARDIA flava.

G. foliis lanceolatis pinnato-dentatis, caule simplicissimo. *Sp. pl.* 848.

Anonymus floribus flavis speciosis digitali aequalibus.

*Gron. virg.* 94.

*Digitalis lutea elatior, iaceae nigrae foliis. Banist. virg.*

1926. *Pluk. mant.* 64. t. 368.

*Digitalis procerior floridana, iaceae nigrae dissectis foliis, floribus albis amplioribus. Pluk. amalth.* 71.

t. 389. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 43.

Gelbe Gerardie. W.

*Habitat in Virginia, Canada. (v. l.)*

Caulis pedalis f. altior. Folia opposita, lanceolata, subpetiolata (*Lycopi aut Iaceae*), basi incisa pinnatisinubus patulis. Spica terminalis, laxa, ex Floribus oppositis, magnis, flavis. Antherae in duas spinas deorsum tendentes. Stamen quintum deest.

## 8. GERARDIA scabra.

G. hispida scabra, foliis oblongis pinnatifidis. *Lin. suppl.* 279.

Scharfe Gerardie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. Thunberg.*

## 9. GERARDIA Pedicularia.

G. foliis oblongis duplicato-ferratis, caule paniculato, calycibus crenatis. *Sp. pl.* 849.

*Pedicularis foliis lanceolatis pinnatifidis ferratis, floribus pedunculatis. Gron. virg.* 68.

*Digitalis, verbescinae foliis e regione binis, americana,*

capsularum apicibus longissimis filamentis donata.  
*Pluk. mant. 64.*

*Digitalis mariana*, filipendulae folio. *Raj. suppl. 397.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 44.*

Laufekrautartige Gerardie. W.

*Habitat in Virginia, Canada.*

Corollae extus pubescentes, oblongae. Calycis dentes crenati; exsiccatione nigra evadit, ut *Pedicularis*; folia opposita et corollae patulae. *Pediculari tristi affinis.*

\*10. *GERARDIA japonica.*

*G. foliis petiolaris ovatis inciso-pinnatifidis, caule simplicis. Thunb. jap. 251.*

Japanische Gerardie. W.

*Habitat in Japonia.*

Caulis simplex villosus. Folia basi pinnata, superne inciso-pinnatifida villosa, pinnis acutis serratis. Flores axillares solitarii, Pedunculus foliis multoties brevior. Corolla purpurascens. Differt a *G. Pedicularia*: Caule simplici, Pedunculis folio brevioribus, et Foliis inciso-pinnatifidis, pinnis serratis. *Thunb. l. c.*

11. *GERARDIA glutinosa.*

*G. foliis ovatis serratis, bracteis linearibus hispida.*

*Sp. pl. 849. Osb. it. p. 229. t. 9.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 44.*

Klebrige Gerardie. W.

*Habitat in China.*

Caulis teretiusculus, erectus; ramis brevioribus. Folia opposita, petiolata, ovata, acuta, pollice latiora, profunde serrata, subvillosa. Racemi terminales, solitarii ex floribus oppositis brevissime pedunculatis. Calyces acuti, 5partiti, lacinia superiore majore. Bractea filiformis una alterave calyci adiacet ejusdem longitudinis, pilis glutinosis, ut calyx hispida.

\* 12. *GERARDIA sessiliflora.*

*G. foliis caulinis floralibusque cordatis sessilibus basi serratis. Vahl. symb. 3. p. 79.*

Stiellosblütige Gerardie. W.

*Habitat ad Cap. b. Ipei.*



*Caulis erectus palmaris vel parum ultra striatus, pilis exstantibus adpersus scabriusculus simplex, interdum rami duo versus medium caulis oppositi floriferi, caule breviores. Folia opposita sessilia 4 vel 5 parium in caule, cordata obtusa quinquenervia, basi utriusque dentibus tribus, in infimis saepe obscuris, semipollicaria, inferiora minora, supra scabriuscula, subtus laeviora, margine subciliato scabro. Floralia cordata attenuata acuta calyce longiora, basi serrata, margine ciliata, scabra. Flores axillares sessiles solitarii oppositi. Calyx glaber. Laciniae lanceolatae attenuatae, remote denticulatae. Vahl. l. c.*

## 1139. CHELONE.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1005.*

*Cal. 5-phyllus. Cor. ringens ventricosa. Rudimentum filamenti quinti inter suprema stamina glabrum. Caps. 2-ocularis.*

1. CHELONE *glabra.*

*C. foliis petiolatis lanceolatis ferratis: summis oppositis.*

*Hort. cliff. 493. Gron. virg. 70.*

*Chelone acadienensis, flore albo. Tournef. act. 1706.*

*C. foliis lanceolatis acuminatis sessilibus, obsolete ferratis, radice reptatrice. Mill. dict. n. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 46.*

*Glatte Schildblume. W.*

*Habitat in Virginia, Canada. 4*

2. CHELONE *obliqua.*

*C. foliis petiolatis lanceolatis ferratis oppositis. Syst. veg. 463. Mill. ic. 62. t. 93.*

*C. (purpurea) foliis lanceolatis, obliquis petiolatis oppositis, marginibus acute ferratis. Mill. dict. n. 2.*

*C. floribus speciosis pulcherrimis, colore rosae damascenae. Gron. virg. 71.*

*Digitalis mariana, persicae folio. Raj. suppl. 397.*

*Digitalis mariana, ferratis densioribus rigidis et angustis foliis, semine fagopyri triquetro. Pluk. mant. 64. t. 348. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 47.*

*Schiefe Schildblume. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

P

*Habitat in Virginia, Canada.* 2 (v. v.)

Millerus *distinguit hanc a praecedente: Radice minus repente; Foliis latioribus, profundius serratis: Floribus purpureis.*

### 3. CHELONE *Ruellioides.*

C. foliis radicalibus petiolatis ovatis serratis, caulinis oppositis amplexicaulibus, pedunculis elongatis, calycibus ciliatis. *Lin. Suppl. 279. Forst. Comment. goett.*

9. p. 35.\*

Ourisia. *Juss. gen. ed. Ust. p. 112.*

Ruellienartige Schildblume. W.

*Habitat in fissuris rupium Freti Magellanici.* 2

Folia radicalia bina alterna longe petiolata, subtus cinerea, subnervosa. Caulis decumbens vix folio altior, foliis remotis oppositis. Pedunculi axillares oppositi elongati uniflori. Calycis laciniae obtusae ciliatae. Corolla curva purpurea.

*Suadente Forstero ad hoc genus mandavi.*

Rudimentum staminis quinti inter stamina minora, mucronis obtusi instar, in pariete superiore corollae. Forst. l. c.

Rudimentum staminis quinti in sicco specimine a Commersonio collectum haud invenit Clariff. *Jussieu l. c. W.*

### \*4. CHELONE *barbata.*

C. foliis radicalibus petiolatis spathulato-lanceolatis integerrimis, caulinis lanceolatis sessilibus, pedunculis elongatis, labio corollae inferiore barbato. W.

C. (*barbata*) foliis oppositis connatis lineari-acutis integerrimis, corollis barbatis. *Cavan. ic. 3. p. 22. t. 242.\**

C. (*formosa*) foliis radicalibus cuneiformibus oppositis glabris, caulinis lanceolatis glabris, floribus paniculatis pendulis formosis. *Wendl. obs. 51.*

C. (*Ruellioides*) foliis inferioribus spathulatis glabris, superioribus lanceolatis oppositis, corollis cernuis coccineis, labiis inferioribus barbatis. *Andrews. Reposit.*

34 t. 34.\*

Bärtige Schildblume. W.

*Habitat in imperio Mexicano.* 2 (v. v.)

Folia integerrima, radicalia spathulato-lanceolata in petiolum attenuata, caulina lanceolata sessilia opposita, leviter connata. Flores coccinei speciosi nutan-

*tes in panicula terminali. Pedunculi partiales bi-tri-vel quadriflori elongati. Calycis foliola glabra obtusa. Corollae labium superius rectum emarginatum; labium inferius tripartitum, laciniis acutis reflexis, interne ad faucem lana densa flava obsitum. W.*

\*1140. PENTSTEMON.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1758.*

*Cal. 5-phyllus. Cor. bilabiata ventricosa. Rudimentum filamenti quinti superne barbatur. Caps. bilocularis.*

1. PENTSTEMON *hirsuta. W.*

*P. caule foliisque hirsutis.*

*Chelone (hirsuta) caule foliisque hirsutis. Mill. dict. n. 3. Anonymos flore pallide caeruleo digitalis instar in summis caulibus disposito, foliis villosis acuminatis. Gron. virg. 71.*

*Digitalis virginiana, panacis colonii foliis flore amplo pallecente. Pluk. mant. 64.*

*Digitalis flore pallido transparente, foliis et caule molli hirsutiae imbutis. Banisi. virg. 1928.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 47.*

*Zottiger Bartfaden. W.*

*Habitat in Virginia.*

*Huic stamen quintum longum cum Anthera villosissima. D. Jussieu. An varietas sequentis?*

2. PENTSTEMON *pubescens.*

*P. caule pubescente, filamento sterili ab apice infra medium barbato. Ait. Kew. 2. p. 360.*

*Chelone (Pentstemon) foliis amplexicaulibus, panicula dichotoma. Mant. 415.*

*α. latifolia foliis ovata-oblongis. Ait. l. c.*

*Dracocephalus latifolius glaber, lysimachiae luteae foliis. Moris. hist. 3. p. 417. f. 11. t. 21. f. 2.*

*Cynorchium non-anglicanum digitali accedens herba quadricapsularis, floribus albis rictum caninum referentibus. Pluk. mant. 62.*

*Pentstemon. Milch. gen. 14.*

*β. angustifolia foliis lanceolatis. Ait. l. c.*

*Dracocephalus hirsutus, lysimachiae foliis latioribus hir-*

futis. *Morif. hist. 3. p. 407. f. II. t. 21. f. 3. (descriptio mala ex specimine sicco Ait.)*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 47.*

Behaarter Bartfaden. W.

*Habitat in Virginia. 4 (v. v.)*

*Caulis teres, pubescens. Calyx 5-partitus, erecto patulus, subaequalis. Corolla personata, albido-purpurea. Tubus longitudine calycis. Faux oblonga, ventricosa. Rictus albus. Labium superius brevius, obtuse bipartitum, reflexum. Lab. inferius trifidum, rectum, obtusum lateribus reflexis. Filamenta 4, didyma, declinata, rictu breviora; quintum filamentum f. superius castratum, versus apicem barbatur labio inferiori ori incumbens, versus apicem latius. Stigma obtusum.*

\*3. **PENTSTEMON** *laevigata.*

P. caule glabro, filamento sterili superne barbato, foliis inferioribus integerrimis. W.

P. caule glabro, filamento sterili superne barbato. *Ait.*

*Kew. 2. p. 361.*

*Chelone Pentstemon. I. F. Miller. ic. 4.*

*Chelone foliis inferioribus ovato-acuminatis petiolatis integerrimis, superioribus amplexicaulibus lanceolatis dentatis, corollis patentibus bilabiatis. Arduin. spec.*

*14. t. 5.*

*Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore. Morif. hist. 2. p. 479. f. 5. t. 8. f. 6.*

Glatter Bartfaden. W.

*Habitat in America boreali. 4*

\*4. **PENTSTEMON** *campanulata.* W.

P. caule glabro, filamento sterili superne barbato, foliis lanceolatis acuminatis omnibus argute ferratis. W.

*Chelone (campanulata) foliis oppositis sessilibus ovato-lanceolatis longissime acuminatis, profunde ferratis.*

*Cavan. ic. 1. p. 18. t. 29.\**

*Chelone (campanuloides) foliis oppositis sessilibus acuminatis profunde ferratis, corollis campanulatis purpureis. Andrews reposit. p. 40. t. 40.\**

Glockenförmiger Bartfaden. W.

*Habitat in imperio Mexicano. 4 (v. v.)*

*Folia lanceolata acuminata, superiora basi latiora omnia argute serrata. Flores violacei secundi in panícula terminali. W.*

## \*1141. CYRILLA.

*l'Herit stirp. nov. I. n. 147.*

*Cal.* superius 5-phyllus. *Cor.* declinata infundibuliformis. *Limbus* planus 5-partitus subaequalis. *Rudimentum* filamenti quinti. *Caps.* semibilocularis.

\*I. CYRILLA *pulchella.*

*C. pulchella.* *l'Herit. stirp. nov. I. p. 147. t. 71.\* Ait. Kew. 2. p. 330.*

*Gesneria (pulchella)* herbacea, foliis ternatis ovatis acutis serratis villosis, pedunculis axillaribus unifloris. *Swartz-prod. 90.*

*Columnnea (erecta)* caule erecto ramoso, foliis ovatis crenatis petiolatis, corollis glabris, limbo subaequali quinquelobo. *Lamarck. encycl. 2. p. 66.\**

*Buchnera (coccinea)* foliis oblongis crenatis villosis. *Scop. del. insubr. 2. p. 10. t. 5.\**

*Achimenes minor erecta simplex,* foliis crenatis ovatis oppositis vel ternatis, floribus petiolatis singularibus ad alas. *Brown. jam. 271. t. 30. f. 1.*

Schöne Cyrille. W.

*Habitat in Jamaicae montosis. 2 (v. v.)*

*Caulis sesquipedalis erectus basi ramosus in axillis ramorum et foliorum inferiorum stolones amentiformes proferens, squamis imbricatis obsiti, quibus planta regeneratur. Folia petiolata ternata ovata dentata pilosa. Pedunculi uniflori axillares. Flores coccinei. W.*

## \*1142. GLOXINIA.

*l'Herit. stirp. nov. I. p. 149.*

*Cal.* superus 5-phyllus. *Cor.* campanulata limbo obliquo. *Filamenta* cum rudimento quinti receptaculo inserta.

\*I. GLOXINIA *maculata.*

*G. maculata.* *l'Herit. stirp. nov. I. p. 149.\* Ait. Kew. 2. p. 331.*

*Martynia (perennis)* caule simplici, foliis serratis. *Sp. pl. 862. Mill. dict. n. 2. Medic. bot. beob. 1783. p. 238.*

- Martynia foliis ferratis. *Hort. cliff.* 322. t. 18.\*  
 Martynia perennis folio subrotundo rugoso, flore coeruleo, radice dentariae. *Ehret, pict.* t. 9. f. 2.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 51.  
 Gefleckte Gloxinie. W.  
*Habitat in Americae Carthagensis.* 4 (v. v.)  
 Radix *Dentariae moniliformis.*  
 Folia radicalia cordata obtusa duplicato-dentata superne nitida, inferne rubicunda. Caulis simplex maculatus. Folia caulina opposita petiolata subrotundo-ovata simpliciter dentata. Pedunculi axillares uniflori. Calycis foliola oblonga obtusa glabra. Corolla externe pubescens. W.

## 1143. GESNERIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1006.*

*Cal.* 5-fidus, germine insidens. *Corolla* incurva recurvaque. *Caps.* infera, 2-locularis.

## 1. GESNERIA humilis.

G. foliis lanceolatis ferratis sessilibus, pedunculis ramosis multifloris. *Sp. pl.* 850. *Mill. dict. n. 2.* Swartz. *obs.* 227.

G. humilis, flore flavescente. *Plum. gen.* 27. ic. 133. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 49.

Niedrige Gesnerie. W.

*Habitat in America australi.* †

## \*2. GESNERIA corymbosa.

G. foliis ovatis acutis ferratis scariosis asperis, pedunculis multipartitis, floribus corymbosis. Swartz. *prod.* 89. Doldentraubige Gesnerie. W.

*Habitat in Jamaica.* †

## 3. GESNERIA acaulis.

G. foliis lanceolato-ovatis ferratis subpetiolatis terminali-confertis, pedunculis trifloris folio brevioribus. *Sp. pl.* 850. *Amoen. acad.* 5. p. 400.\* Swartz. *obs.* 227.\*

G. rupestris indivisa, foliis oblongis rugosis, summo caule dispositis, floribus singularibus ad alas. *Bromm. jam.* 262.

Rapunculo affinis anomala vasculifera, folio oblongo ferrato, flore coccineo tubuloso. *Sloan. jam. 59. hist.*

*I. p. 159. t. 102. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 50.*

Kurzstielige Gefnerie. W.

*Habitat in Jamaicae cretaceis aridissimis. † (v. l.)*

\*4. *GESNERIA pumila.*

*G. acaulis, foliis ovato-cuneiformibus crenatis subsessilibus pedunculis subbifloris foliis brevioribus. Swartz prod. 90.*

Zwerg-Gefnerie. W.

*Habitat in Jamaica. † (v. l.)*

5. *GESNERIA Craniolaria.*

*G. foliis cuneatis oblongis dentato-laciniatis, pedunculis terminalibus corollis campanulatis. Swartz. prod. 89.*

*G. (fimbriata) foliis lanceolatis rariter dentatis, corollarum limbo fimbriato. Lamarck. encycl. 2. p. 695.\**

*Craniolaria (fruticosa) foliis lanceolatis dentatis. Sp. pl. 861. Mill. dict. n. 2.*

*G. arborescens, amplo flore fimbriato et maculato. Plum. gen. 27. t. 137.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 49.*

Gefranzte Gefnerie.

*Habitat in Hispanolia. †*

\*6. *GESNERIA grandis.*

*G. foliis lato-lanceolatis longissimis denticulatis superne hirtis infra scabris, pedunculis terminalibus, caule arborecente. Swartz. prod. 89.*

*G. amplo digitalis folio tomentoso. Plum. gen. 27. t. 134.*

Große Gefnerie. W.

*Habitat in Jamaica. †*

7. *GESNERIA tomentosa.*

*G. foliis ovato-lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. Sp. pl. 851. Hort. cliff. 318. Mill. dict. n. 1. Jacq. amer. 179. t. 175. f. 64. Swartz obs. 228.\**

*G. erecta, foliis lanceolatis rugosis hirsutis, pedunculis longissimis ramosis, ex alis superioribus. Brown. jam. 261.*

*Digitalis folio oblongo ferrato ad foliorum alas florida. Sloan. jam. 60. hist. 1. p. 162. t. 104. f. 2. Raj. suppl. 396.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 50.*

Filzige Gefnerie. W.

*Habitat ad Americae meridionalis ripas, † (v. v.)*

\* 8. *GESNERIA scabra.*

G. foliis ovato-lanceolatis ferratis scabris, pedunculis axillaribus, corollis cylindricis recurvis. *Swartz. prod. 89.*

Scharfblättrige Gefnerie. W.

*Habitat in Jamaica. † (v. f.)*

*Folia obtusa cum mucrone remote denticulata scabra.*  
W.

\* 9. *GESNERIA exserta.*

G. foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla duplo longioribus, capsulis ovatis. *Swartz. prod. 89.*

Langfädige Gefnerie. W.

*Habitat in Jamaica. †*

\* 10. *GESNERIA calycina.*

G. foliis lanceolato-ovatis acuminatis ferratis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla longioribus, calycibus campanulatis, capsulis cylindricis. *Swartz. prod. 90.*

Großkelchige Gefnerie. W.

*Habitat in Jamaica. †*

\* 11. *GESNERIA ventricosa.*

G. foliis ellipticis acuminatis crenatis glabris, pedunculis subquadrifloris, laciniis calycis subulatis elongatis, corollis ventricosis. *Swartz. prod. 90.*

Bauchige Gefnerie. W.

*Habitat in insulis Jamaica, Montferrat, Dominica. †*

1144. *ANTIRRHINUM.*

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1007.*

*Cal. 5-phyllus. Corollae basis deorsum prominens, nectarifera, faux palato bipartito convexo clausa. Caps. bilocularis.*

\* *Foliis angulatis, capsulis multivalvibus.*

I. *ANTIRRHINUM Cymbalaria.*

A. foliis cordatis quinquelobis alternis, caulibus procum-



bentibus. *Hort. cliff.* 32. *Hort. upf.* 175. *Roy. lugdb.* 295. *Guett. stamp.* 2. p. 210. *Gort. gelr.* p. 358. *Groß. orient.* 75. *Gort. ingr. app.* p. 201. *Pollich. pal. n.* 589. *Mill. dict. n.* 17. *Hoffm. germ.* 218. *Roth. germ.* 1. 267. II. 61.

A. caule repente, foliis reniformibus quinquelobatis. *Hall. helv. n.* 339.

A. floribus solitariis, foliis quinquelobis, alternis, cordatis. *Scop. carn. ed. 1. p.* 476. *n. 4. ed. 2. n.* 770.

Cymbalaria. *Bauh. pin.* 306. *Cam. epit.* 860. *Dalech. hist.* 1322. *Riv. t.* 86.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 52.

Eckiges Löwenmaul. W.

*Habitat in rupibus et muris antiquis Germaniae, Helvetiae, Galliae, Harlemi etc.* 2 (v. v.)

Semina rugosa, et nuclei in glandis. Flore albo variat.

## 2. ANTIRRHINUM pilosum.

A. foliis reniformibus repandis pilosissimis alternis caulibus procumbentibus. W.

A. foliis reniformibus pilosissimis alternis, caulibus procumbentibus. *Mant.* 29. *Iacq. obs.* 2. p. 29. t. 48.\*

*Linaria hederæ folio villoso f. Cymbalaria alpina. Tourn. inst.* 169.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 53.

Haariges Löwenmaul. W.

*Habitat in Pyrenæis?*

*Statura et filia A. Cymbalariae, sed tota pilosissima. Folia reniformi-subrotunda, margine in 9 s. 10. lobos obtusos crenulatos divisa. Iacq.*

## \*3. ANTIRRHINUM lanigerum.

A. foliis cordato-ovatis integerrimis villosis subsessilibus alternis, caulibus prostratis. W.

*Linaria (lanigera) caule prostrato villoso, ramosissimo, ramis flagelliformibus, foliis alternis cordatis subsessilibus lanatis, floribus axillaribus solitariis pedicellatis.*

*Desf. atl.* 2. p. 38. t. 130.\*

Wolliges Löwenmaul. W.

*Habitat in Africa boreali versus veterem Carthaginem.* ☉

*Folia alterna parva cordata aut cordato-rotunda brevissime mucronata villosa lanigera, inferiora bre-*

*viter petiolata integerrima aut parce dentata, alia integerrima sessilia. Flores solitarii axillares breviter pedicellati. Calyx villosissimus, laciniis acutis. Corolla A. spurii duplo minor villosa. Calcar longitudine corollae incurvum. Desf. l. c.*

\*4. ANTIRRHINUM *dentatum*.

A. foliis oblongis, inferioribus basi dentato-angulatis, floralibus integerrimis, caulibus prostratis pilosissimis. *Vahl symb. 2. p. 66. t. 38.\**

*Linaria (scariosa) caule prostrato lanato, foliis oblongis, imis oppositis basi dentatis petiolatis, floribus sessilibus, calyce scarioso, calcare corolla brevior. Desf. atl. 2 p. 38. t. 131.\**

A. (*scariosum*) caule procumbente lanuginoso, calycibus scariolis. *Lamarck encycl. 4. p. 324.\**

Gezähntes Löwenmaul. W.

*Habitat in collibus aridis Tuncti. ☉*

*Folia subvillosa pallide viridia semipollicaria. Pedunculi axillares solitarii uniflori. Calycis foliola du. superiora ovato-lanceolata, inferiora 3 oblonga omnia mucronata membranacea, linea dorsali viridia, villosa. Corolla magna A. Linariae duplo latior pubescens flava. Vahl. l. c.*

\*5. ANTIRRHINUM *heterophyllum*.

A. foliis alternis superioribus lanceolatis, inferioribus oblongis hastatis, caule prostrato glabro. W.

*Antirrhinum heterophyllum Schousboë.*

*Verschiedenblättriges Löwenmaul. W.*

*Habitat in imperio Maroccano. ☉ (v. f.)*

*Caulis prostratus ramosus glaber. Folia inferiora oblonga integerrima apice mucronata basi hastata, superne glabra, inferne subpubescentia; superiora lineari-lanceolata non hastata integerrima mucronata, mucrone reflexo. Petioli filiformes. Pedunculi uniflori solitarii axillares filiformes folio longiores. Calycis lacinae lanceolatae acutae. Corolla magnitudine fere praecedentis glabra. Palatum lana flava densa tectum. Calcar lanceolato-subulatum rectum. W.*

6. ANTIRRHINUM *Elatine*.

A. foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus. *Hort. cliff. 323. Hort. upf. 175. Gron. virg. 68. Roy.*

*lagdb.* 295. *Mill. dict. n.* 16. *sub Linaria. Scop. carn.* n. 772. *Pollich. pal. n.* 590. *Fl. dan. t.* 426. *Hoffm. germ.* 218. *Roth. germ. I.* 267. *II.* 61.

A. caule procumbente, foliis hastatis, imis conjugatis, superioribus alternis. *Hall. helv. n.* 340.

Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo. *Bauh. pin.* 253.

Elatine. *Cam. epit.* 754. *Blackw. t.* 170.

β. Elatine folio acuminato, flore coeruleo. *Bauh. pin.* 253. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 53.

Liegendes Löwenmaul. W.

*Habitat in Germaniae, Angliae, Galliae, Italiae arvis.* ☉ (v. v.)

Floribus coeruleis variat. R.

### \*7. ANTIRRHINUM *Elatinoides.*

A. foliis glabris oblongis alternis, inferioribus subsessilibus repandis, dentatis, superioribus sessilibus integerrimis, caule procumbente, calycibus margine membranaceis. W.

*Linaria (Elatinoides)* glabra, caule prostrato ramoso, foliis ovatis obtusis subsessilibus, infimis basi dentatis, floribus pedicellatis axillaribus. *Desf. atl. 2. p.* 39. t. 132.\*

Atlantisches Löwenmaul. W.

*Habitat in Africa boreali prope Mascari.* ☉

Corolla lutea magnitudine fere *A. Linariae*. *Desf. l. c.*  
*Simile sequenti, sed differt: glabritie omnium partium, foliis inferioribus fere sessilibus repando-dentatis, calycibus margine membranaceis, corolla majore.* W.

### 8. ANTIRRHINUM *spurium.*

A. foliis pilosis alternis subrotundo-ovatis, inferioribus obsolete dentatis, superioribus subsessilibus integerrimis, caule procumbente. W.

A. foliis ovatis alterius, caulibus procumbentibus. *Hort. upf.* 175. *Hort. cliff.* 323. *Roy. lagdb.* 295. *Mill. dict. n.* 15. *sub Linaria. Crantz. austr. p.* 311. *Scop. carn. n.* 771. *Pollich. n.* 591. *Fl. dan. t.* 913. *Hoffm. germ.* 218. *Roth. germ. I.* 267. *II.* 62.

A. caule procumbente, foliis villosis ovatis, imis conjugatis, superioribus alternis. *Hall. helv. n.* 341.

Elatine. *Riv. t.* 86.

Elatine folio subrotundo. *Bauh. pin.* 253.

*Veronica femina.* *Dod. pempt.* 42.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 54.

Bastard-Löwenmaul. W.

*Habitat in* Germaniae, Angliae, Galliae, Italiae arvis, ☉ (v. v.)

*Peloriam et in hac videre Ramspeck. (comm. goett. 1. p. 351. t. 15. f. 4.) et Stehelin. (Act. helv. 2. p. 25. t. 4.) R.*

### 9. ANTIRRHINUM *cirrhosum.*

A. foliis hastatis alternis, caulibus patulis, petiolis passim cirrhescentibus. *Mant.* 249. *Jacq. hort. t.* 82.

*Linaria lupina villosa, folio sagittato. Till. pis. t.* 32. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 55.

Rankendes Löwenmaul. W.

*Habitat in* Aegypto. ☉ (v. v.)

Caules filiformes, diffusi, ramosissimi, prostrati, virgati, purpurascens, rarius pubescentes, strictiusculi. Folia alterna, petiolata, sagittata, subnitida, laete viridia: Radicalia majora, hastata, dentata. Petioli passim cirrhi instar proximos ramos amplectuntur. Pedunculi laterales, axillares, capillares, stricti, foliis longiores, purpurascens, sub caule exsiantes, uniflori. Corolla pallide coerulea: palato albido, purpureis punctis notato. Capsula globosa. Calyx capsulis minor, angustior.

A. *Elatines filia, paucis et imprimis sequentibus differt. Corollae sextuplo minores, nec luteae labio superiore violaceo. Folia quadruplo minora, nec pilis canescentia.*

*Calyces parvi; nec totam capsulam cingentes.*

*Calcar corollae rectum, nec recurvum ut in A. aegyptiaco.*

### 10. ANTIRRHINUM *aegyptiacum.*

A. foliis hastatis alternis, caule erecto ramosissimo, pedunculis rigescentibus. *Syst. Veg. pag.* 464.

*Linaria memphitica pumila, hastato folio tricuspidi, flore luteo. Lipp.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 56.

Aegyptisches Löwenmaul. W.

*Habitat in* Aegypto. ☉ (v. f.)

*Simillimum A. Elatines. Caules erecti, virgati, vix pubescentes. Folia cordata, angulis inferiorum duobus*

utrinque, superiorum deute unico. Corollae similes *Elatines*, luteae, sed absque nigra macula, at palato purpurascente punctato: Lab. superius emarginatum pallidum. Calcar coerulescens, recurvum, longitudine floris. Pedunculi reiectis floribus rigent tantum spinæ.

\*11. ANTIRRINUM fruticosum.

A. foliis hastatis alternis, caule erecto fruticoso, pedunculis folio brevioribus. W.

*Linaria (fruticosa)* caule fruticoso erecto villosa, foliis ovato-oblongis basi dentatis breviter petiolatis, floribus axillaribus, pedicello folio brevioribus. *Desf. atl. 2. p. 39. t. 135.\**

Strauchartiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Africae borealis montibus calcareis prope Caffam. †*

Frutex pedalis erectus inferne ramosus. Rami villosi. Folia breviter petiolata ovata seu ovato-oblonga, utrinque basi uni-vel bidentata, superiore integerrima. Flores axillares solitarii. Corolla flava magnitudine *A. lupini*. *Desf. l. c.*

\*12. ANTIRRHINUM hexandrum.

A. foliis cordato-ovatis serratis oppositis, caule prostrato, pedunculis folio duplo longioribus. W.

A. (*hexandrum*) foliis oppositis cordato-ovatis serratis, pedunculis axillaribus unifloris. *Forst. prod. n. 235.*

Sechsfädiges Löwenmaul. W.

*Habitat in insula Tahiti. (v. l.)*

*Posideo tantum specimen imperfectum fructiferum. W.*

\* \* Foliis oppositis, capsulis multivalvibus.

13. ANTIRRHINUM triphyllum.

A. foliis ternis ovatis obtusis trinerviis margine scabris, spica terminali, floribus pedunculatis. W.

A. foliis ternis ovatis. *Hort. cliff. 324. Hort. ups. 174. Roy. lugdb. 295. Sauv. monsp. 165. Mill. dict. n. 2. sub Linaria. Murray. prodr. p. 163. Cavan. ic. 2. p. 61. t. 179.\**

*Linaria triphylla minor lutea. Bauh. pin. 212.*

*Linaria hispanica. Clus. hist. 1. p. 320.*

*Linaria scula latifolia triphylla. Bocc. sic. 44. t. 22.*

β. *Linaria triphylla coerulea. Bauh. pin. 312.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 56.*

Dreyblättriges Löwenmaul. W.

*Habitat in umbrosis montibus* Valentinis et Hyblaeis circa Syracusas. ☉ (v. v.)

\*14. ANTIRRHINUM *latifolium*.

A. foliis ternis ovato lanceolatis trinerviis, spica terminali, floribus sessilibus. W

*Linaria (latifolia)* glabra erecta, foliis lato-lanceolatis, infirmis ternis, floribus longe spicatis sessilibus. *Desf. atl. 2. p. 40. t. 134.\**

Breitblättriges Löwenmaul. W.

*Habitat in Africa boreali prope* Mascar et Tlemsen inter segetes. ☉

Bracteae lineari-lanceolatae longitudine calycis, inferiores longiores. Calycis laciniis lineari-lanceolatis acutis. Corolla lutea magnitudine *A. Linariae*. *Desf. l. c.*

\*15. ANTIRRHINUM *virgatum*.

A. foliis ternis oblongis acutis, spica terminali floribus subsessilibus, calcare recto corolla longiore, caule simplicissimo. W.

A. (*virgatum*) foliis ovato-lanceolatis sparsis, inferioribus ternis, caule simplicissimo. *Poiret. itin. 2. p. 192.*

A. (*virgatum*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, corollis coeruleis, galea gracili recta, labio reflexo. *Lamark. encycl. 4. p. 331.\**

*Linaria (virgata)* caule simplici, foliis inferioribus ternis ovatis, superioribus lanceolatis, floribus spicatis subsessilibus, bracteis deflexis, calcare recto corolla longiore. *Desf. atl. 2. p. 41. t. 135.\**

Ruthenförmiges Löwenmaul. W.

*Habitat inter segetes* Algeriae. ☉

Caules simplices plures ex una radice. Folia glauca. Corolla azurea magnitudine *A. purpurei*. *Desf. l. c.*

16. ANTIRRHINUM *triornithophorum*.

A. foliis quaternis lanceolatis, caule erecto ramoso, floribus pedunculatis. *Hort. cliff. 324. Roy. lugdb. 296.*

*Linaria americana* maxima, purpureo flore. *Herm. lugdb. 376 t. 377. Raj. hist. 1884.*

*Linaria*, flore purpureo, americana. *Riv. mon. 81.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 57.*

Höchstes Löwenmaul. W.

*Habitat in* Lusitania, America.

Corollae labium superius fornicatum est. Plantā humanae altitudinis.

17. ANTIRRHINUM *purpureum*.

A. foliis quaternis linearibus, caule florifero erecto spicato. *Hort. ups.* 174. *Mill. dict. n. 5. sub Linaria.*

A. foliis linearibus sparsis, nectariis subulatis recurvis, floribus laxe spicatis. *Hort. cliff.* 498. *Roy. lugdb.* 296.

L. flore purpureo minore. *Riv. mon.* 82.

*Linaria purpurea magna.* *Bauh. hist.* 3. p. 460.

*Linaria purpurea major odorata.* *Bauh. pin.* 213.

*Linaria altera purpurea.* *Dod. pempt.* 183.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 58.

Purpurfarbiges Löwenmaul. W.

*Habitat ad radices Vesuvii.* 4 (v. v.)

Caulis (*radice perenni*) *bipedalis, erectus, teres, laevis.* Rami *seriores ex alis superioribus minores, florentes.* Folia *lanceolato-linearia, laevia, subtus trinervia, patentia, alterna: inferiora verticillata.* Racemi *terminales simplices, erecti, longi: pedicellis flore longioribus.* Calyx *minutus.* Corolla *violacea tota, extus pallidior, palato margine pubescente.* Calcar *longitudine corollae, extrorsum curvatum.* Antherae *luteae.*

\*18. ANTIRRHINUM *versicolor*.

A. foliis lineari-lanceolatis, inferioribus ternis, caule erecto spicato. *Ait. Kew.* 2. p. 333. *Jacq. ic. rar.* 1, t. 116. *Misc.* 2. p. 336.\*

A. (*versicolor*) caule erecto, foliis lanceolatis carnosis, calycibus piloso-vilcidis capsulam superantibus. *Lamarck encycl.* 4. p. 127.\*

Buntes Löwenmaul. W.

*Habitat in Gallia australi.* ☉ (v. v.)

Caulis *erectus teres glaber pedalis bipedalisque simplex vel ramosus.* Folia *linearia glabra, inferiora terna, summa alterna.* Calyces et *Pedunculi pilis glanduliferis obsiti.* Corolla *pallide flava palato obscuriore.* Calcar *rectum subulatum violaceum pedunculo longius.* W.

\*19. ANTIRRHINUM *Linarioides*.

A. foliis lineari-lanceolatis ternis caule erecto racemoso. *Sp. pl.* 852.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 85.

Frauenlachsartiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Europa australi.*

*Simillimum A. Linariæ, sed Caules angustiores. Folia terna. Flores racemosi simillimi, verum labium corollæ superius albidum nec flavum. Reliqua conveniunt.*

20. ANTIRRHINUM *repens.*

A. foliis linearibus confertis; inferne quaternis, calycibus capsulae aequalibus. *Sp. pl. 854. Neck. gallob. p. 268.*

A. foliis linearibus alternis saepius oppositis acuminatis, floribus laxè spicatis. *Roy. lugdb. 296.*

A. foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycinis laciniis capsulae aequalibus. *Guett. stamp. 2. p. 204. Dalib. parif. 186.*

*Linaria angustifolia, flore cinereo striato. Dill. elth. 198. t. 163. f. 197.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 59.*

*Kriechendes Löwenmaul. W.*

*Habitat in Anglia, Gallia, Italia. 4 (v. v.)*

*Flares inodori.*

21. ANTIRRHINUM *monspessulanum.*

A. foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Sp. pl. 854. Roy. lugdb. 297. Sauv. monsp. 47.*

*Linaria, capillaceo folio, odora. Bauh. pin. 213. prodr. 106. n. 4. Dill. elth. 199.*

*Linaria odorata monspessulana. Bauh. hist. 3. p. 459.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 59.*

*Wohlrriechendes Löwenmaul. W.*

*Habitat in Gallia. 4 (v. f.)*

*Calcar corollae rectum brevissimum, ut ipso calyce brevius. Flores odorati. Simillimum A. sparteo, cui calcar longitudine floris. Maxime etiam affine A. repenti.*

22. ANTIRRHINUM *sparteum.*

A. foliis subulatis canaliculatis carnofis: inferioribus ternis, caule paniculato, corollisque glaberrimis. *Amoen. acad. 4. p. 277. Cavan. ic. 1. p. 19. t. 32.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 60.*

*Pfriemblättriges Löwenmaul. W.*

*Habitat in Hispania. Loefl. ♂ (v. v.)*

*Radix altero anno florida. Caulis pedalis, glaberrimus, paniculatus, erectus, minus strictus: ramis virgatis. Folia primordialia, antequam eanlem erigit,*



*terna, oblonga, reliqua alterna, subulata, canaliculata, glabra, carnosae, recta. Flores racemosi. Calyces glabri. Corollae flavae, palato glabro cum tinctura rubicunda in retuso gibbo palati. Differt ab A. bipunctato floribus pedunculatis, triplo majoribus, ut tota planta multoties majore.*

### 23. ANTIRRHINUM *bipunctatum.*

A. foliis linearibus glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato-capitatis. *Sp. pl.* 853.

A. foliis lanceolato-linearibus, floribus in summitate caulis confertis parvis. *Guett. stamp. p.* 205?

A. erectum, foliis linearibus: imis verticillatis, pauciflorum. *Sauv. monsp.* 165.

*Linaria lutea parva annua. Bauh. hist.* 3. p. 357.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 60.

Zweyfleckiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispaniae, Italiae arvis.* ☉

*Caulis spithameus, Ramis strictis, ad angulum rectum exeuntibus. - Folia lanceolata, sessilia, plana, patentia, vix carnosae, fere laevia: inferiora quaterna. Flores subspicati, pauci, sessiles. Corollae flavae, punctis duobus fulvis in palato glabro versus labium superius; Labium superius bipartitum, replicatum, lanceolatum, erectum.*

### \*24. ANTIRRHINUM *amethystinum.*

A. foliis linearibus glabris, inferioribus quaternis, caule simplici, racemo subquadrifloro, calcare corolla duplo longiore. W.

A. (*amethystinum*) caulibus simplicibus, foliis imis verticillatis, corolla amethystina labio punctato. *Lamarck. encycl.* 4. p. 328.\*

A. (*bipunctatum*) caule erecto, foliis linearibus, inferioribus quaternis, floribus in summitate confertis. *Caavan. ic.* 1. p. 20. t. 33. f. 1.\*

Amethystfarbiges Löwenmaul. W.

*Habitat in vineis Hispaniae, Lusitaniae.* ☉ (v. l.)

*Caules bi- vel triunciales simplices erecti vel adscendentes plures e radice. Folia linearia glauca inferiora quaterna superiora alterna. Racemus e floribus tribus vel quatuor breve pedunculatis compositus. Pedunculihirti. Corolla alba, palato flavo punctato. Calcar subulatum rectum corolla duplo longius violaceum. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

Q

\*25. ANTIRRHINUM *laxiflorum*.

A. foliis linearibus glabris, inferioribus quaternis, caule simplici adscendente, floribus racemosis, pedunculis calcaris longitudine, calcare corolla duplo longiore. W. *Linaria (laxiflora)* caule simplici, foliis linearibus glaucis, imis quaternis floribus longe pedicellatis, calyce glabro, calcare recto corolla duplo longiore. *Desf. atl.* 2. p. 45. t. 138.\*

Langstieliges Löwenmaul. W.

*Habitat in Algeria inter segetes.* ☉

Caules pures simplices ex radice nunc erecti nunc decumbentes vel adscendentes. Calyx glaber. Corollae pallide coeruleae aut albae. *Desfont. l. c.*

26. ANTIRRHINUM *triste*.

A. foliis linearibus sparsis: inferioribus oppositis, nectariis subulatis, floribus subsessilibus. *Syst. veg. p. 465. Hort. cliff. 498. Fol. lanceolatis. Roy. lugdb. 296. Mill. dict. n. 8. sub Linaria. Curt. mag. 74.*

*Linaria hispanica procumbens. Mart. dec. 35. f. 2.*

*Linaria tristis hispanica. Dill. elth. 201. t. 264. f. 199. Mill. ic t. 166.*

*Houttuyn Lin, Pfl. Syst. 8. p. 61.*

Dunkelfarbiges Löwenmaul. W.

*Habitat Gibraltariae.* ♀ (v. v.)

Caules radicales plures, glabri, saepius decumbentes. Folia linearia, subcarnea, convexa, rore glauca. Capitulum ante anthesin simile *A. aruensi*, calyce et bracteis foliis pubescentibus. Corolla colore *Loti jacobaei*, calcare striato, saepe variat colore cinereo s. luteo, s. purpureo. Capsula craniolaris.

\*27. ANTIRRHINUM *Haelava*.

A. foliis lineari-lanceolatis, inferioribus subquaternis glabris, floribus capitatis, calycibus pilosis, caulibus subsimplicibus. *Vahl. symb. 2. p. 66.*

A. (*Haelava*) foliis linearibus, alternis infimis ternis, floribus racemoso-capitatis, galea bifida, labio tridentato. *Forsk. descr. III.\**

Kopfförmiges Löwenmaul. W.

*Habitat in desertis Aegypti.* ☉

Caules plures digitales vel palmares adscendentes glaberrimi. Folia sessilia unguiculata glabra crassiuscula, inferiora ternaria rarius quaternaria, superiora alterna.

Flores in capitulum collecti subsessiles. Bractee et calyces piloso - ciliatae. Calcar rectum corolla longius. Vahl. l. c.

\*28. ANTIRRHINUM *thymifolium*.

A. foliis ternatis oppositisque ovalibus glabris, floribus capitatis, caulibus procumbentibus. Vahl. *symb.* 2. p. 67.

Thymianblättriges Löwenmaul. W.

Habitat in arenosis maritimis Bajonnae copiose.

Caules plures filiformes palmares glabri, uti tota planta procumbentes, subsimplices, e linea decurrente utrinque angulati. Folia sessilia a basi ad apicem usque fere terna, summa opposita oblonga crassiuscula rore glauco adpersa, inferiora rotundiora parva obtusiuscula basi acutiora. Flores terminales pauci pedicellati in capitulo, Bractee binae oblongae ad basin pedicellorum. Calycis foliola oblonga glabra utibractee. Corolla lutea. Calcar parum recurvum. Affine *A. supino*. Vahl. l. c.

29. ANTIRRHINUM *supinum*.

A. foliis subquaternis linearibus, caule diffuso, floribus racemosis, calcar recto. *Syst. Veg. ed. Murray.* p. 556.

A. foliis subquaternis linearibus, caule diffuso, floribus subspicatis nectario recurvato. *Spec. pl. 2. p. 856. Roy. lugdb. 296. Dalib. paris. 186. Sauv. monsp. 48. Pall. it. 2. p. 522.*

*Linaria pomila supina lutea. Bauh. pin. 213.*

*Linaria hispanica. 5 Clus. hist. hist. I. p. 321.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 61.*

Niedriges Löwenmaul. W.

Habitat in Galliae, Hispaniae, Italiae arenosis. ☉ (v. f.)

Calcar reflexum est. Folia fere filiformia ut in *A. spar-teo*, at racemi stricti, Corollae calcar recurvatum et Calycis folium superius reliquis longius.

Simile *A. tristii*, sed Caulis non glaber. *Syst. Veg. l. c.*

\*30. ANTIRRHINUM *simplex*. W.

A. foliis sublinearibus, inferioribus quaternis, calycibus piloso - viscosis, floribus racemosis, calcar recto, caule erecto. W.

A. (*parviflorum*) foliis linearibus glabris, inferioribus quinis vel quaternis, superioribus alternis, floribus racemosis, calycibus capitato - villosis, caulibus erectis. *Jacq. ic. rar. 3. t. 499. Collect. 4. p. 204.\**

*Antirrhinum arvense.* *β.* *Sp. pl.* 855.

*Linaria pumila*, foliolis carnosis, flosculis minimis flavis.

*Bauh. pin.* 213. *Dill. elth.* 200.

Eintaches Löwenmaul. W.

*Habitat in Europa australi.* ☉ (v. v.)

*Non est sequentis varietas ut multorum annorum cultura sum expertus. Differt praecipue caule altiore strictiore, flore minore flavo, calcare recto nec recurvo. Variat calycibus valde viscoso-glandulosis et fere glabris.* W.

### 31. ANTIRRHINUM *arvense.*

A. foliis sublinearibus inferioribus quaternis, calycibus piloso-viscosis, floribus racemosis, calcare recurvo, caule erecto. W.

A. foliis sublinearibus, inferioribus quaternis, calycibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. *Hort. ups.* 174. *Neck. gallob. p.* 268. *Pollich. pal. n.* 593. *Leers. herb. n.* 490. *Doerr. nass. p.* 45. *Sabb. hort.* 3. t. 5. *Hoffm. germ.* 219. *Roth. germ. I.* 268. *II.* 62.

A. foliis linearibus alternis recurvis, ramis caule brevioribus. *Roy. lugdb.* 297.

*Linaria arvensis coerulea.* *Bauh. pin.* 213. *prodr.* 107. *Dill. elth.* 199. t. 163. f. 198.

β. *Linaria quadrifolia lutea.* *Bauh. pin.* 213.

*Linaria tetraphylla lutea.* *Col. ecphr. I. p.* 299. t. 300. f. 1. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 62.

Acker-Löwenmaul. W.

*Habitat in Angliae, Galliae, Italiae, Germaniae arvis.*

☉ (v. l.)

*Flores spicati Bractea reflexa, minuti: Calcare recurvo. Folia glabra.*

### 32. ANTIRRHINUM *pelisserianum.*

A. foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis, floribus corymbosis. *Sp. pl.* 855. *Guett. stamp.* 2. p. 204. *Dalib. parif.* 186. *Sabb. hort. rom.* 3. t. 4.

A. foliis ad caulem linearibus, ad radicem ovatis saepe ternis. *Sauv. monsp.* 166.

*Linaria foliis caulinis linearibus sparsis, radicalibus rotundis.* *Mill. dict. n. II.* R.

*Linaria annua purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus,* *Vaill. parif.* 118. *Magn. monsp.* 159. *Barrel. ic.* 1162.

*Linaria caerulea minor.* Lob. *illustr.* 103.

*Linaria caerulea calcaribus longis.* Bauh. *hist.* 3. p. 461.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 63.

Langgelpornes Löwenmaul. W.

*Habitat in Gallia, Italia.* ☉ (v. l.)

Caulis *spithameus, erectus, teres, glaberrimus, subramosus.* Folia *alterna, remotissima, sublinearia, subcarnosa, glabra: radicalia s. infima terna s. quaterna.* Flores *parvi in capitulo subcorymbofo.* Calyx *erectus, non appressus, sed laciniis distantibus.* Corolla *violacea palato albo, venis violaceis obsoletis: labio superiore longiore.* Calcar *rectum, corolla fere longius.*

### \*33. ANTIRRHINUM *parviflorum.*

A. foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus ternis, floribus racemosis sessilibus, calcare corolla brevior, caule erecto ramis strictis. W.

*Linaria (parviflora) glabra, caule erecto ramoso, foliis lanceolatis, imis ternatis, floribus sessilibus spicatis, bracteis calyce longioribus.* Desf. *atl.* 2. p. 44. t. 137.\*

*Linaria orientalis erecta angusto oblongo folio, flore aureo.* Tournef. *cor.* 9.

Kleinblütiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Oriente inque Algeria.* ☉ (v. l.)

Caulis *erectus superne ramosus, ramis simplicibus strictis.* Folia *lanceolata acuminata.* Flores *admodum parvi fere sessiles.* Bractea *lanceolata sub quolibet flore calyce longior.* W.

### \*34. ANTIRRHINUM *flavum.*

A. foliis lanceolatis alternis, inferioribus ternis obovatis, floribus capitatis, calycibus glabris, caule simplici erecto. W.

A. (*flavum*) foliis inferioribus ternis subovatis, superioribus sparsis linearibus, floribus intense flavis. Poiret *itin.* 2. p. 191.

*Linaria (flava) caulibus erectis virgatis, foliis glabris, inferioribus ternatis ovatis obtusis, superioribus alternis lanceolatis, floribus capitatis sessilibus.* Desf. *atl.* 2. p. 42. t. 136.\*

Gelbes Löwenmaul. W.

*Habitat in arvis Barbariae.* ☉

*Valde affine A. Haelavac quoad descriptionem, dis-*

*ferre tamen videtur: foliis inferioribus obovatis, flore saturate flavo, calcare brevior, et calyce glabro. W.*

**35. ANTIRRHINUM saxatile.**

A. foliis lanceolato-linearibus spartis villosis: inferioribus quaternis, caule decumbente, floribus spicatis. *Amoen. acad. 4. p. 277. Mant. 416.*

*Linaria minor viscosa, flore luteo. Morif. blesf. 280. Linaria maritima minima viscosa, foliis hirsutis, floribus luteis. Morif. hist. 2. p. 499.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 64.*

Felsen-Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispania. 4 (v. l.)*

*Caules ascendentes. Folia sparsa, linearia, acuta, pubescenti-viscida, apice patula. Flores spicati. Calyces lanati. Corolla flavissima: punctis 2 fulvis in palato et 2. in fauce.*

**\*36. ANTIRRHINUM micranthum.**

A. foliis oblongo-lanceolatis obtusis quaternis ternisve summis subalternis, floribus subcapitatis, calcare brevissimo erecto. W.

A. (*micranthum*) caule herbaceo erecto, foliis inferioribus quaternis superioribus alternis, floribus minimis, calcare brevi antico. *Cavan. ic. 1. p. 51. t. 69. f. 3.\** Zarblütiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispaniae locis incultis. ☉ (v. l.)*

*Planta digitalis et ultra, A. simplici similis; sed abunde, foliis crassioribus ovato-lanceolatis, floribus coeruleis, calcare brevissimo crassiore diversa. In plantis minoribus folia superiora alterna saepius desunt et omnia quaterna vel terna superiora interdum opposita sunt et flores plerumque capitati observantur. In specimenibus majoribus floribus inferiores sunt alterni remoti. W.*

**\*37. ANTIRRHINUM viscosum.**

A. foliis caulinis linearibus alternis, radicalibus lanceolatis quaternis, calycibus villosis cauli approximatis. *Amoen. acad. 4. p. 319.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 64.*

Klebriges Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispania. ☉*

*Planta erecta, siatura A. pelisseriani, at flores magnitudine Linariae.*

Caulis pedalis erectus luevis, ramis remotis raris. Caules steriles diffusi, foliis quaternis lanceolatis. Folia caulina vix decem remota linearia s. subulata. Rami versus flores nudi. Racemus simplex longus erectus piloso-viscidus, pedicellis cauli approximatis. Calycis foliola lanceolata membranacea, carina viridi piloso-viscida. Corollae fulvae magnitudine *Linariae*. Amoen l. c.

\*38. ANTIRRHINUM *aparinoides*. W.

A. foliis linearibus sparsis, caulis sterilis semis verticillatis, caule simplici, racemo ovato, calycibus villosis. W. *Linaria (heterophylla)* caule erecto virgato simplici, foliis glabris linearibus, furculorum verticillatis semis, caulinis sparsis, floribus dense spicatis, rachi calycibusque villosissimis. *Desf. atl. 2. p. 48. t. 140.\**

Labkrautartiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Atlante.* 2.

Caules plures e radice simplices, fertiles pedales, steriles quadriunciales, inferne pubescentes. Folia caulis fertilis sparsa conferta linearia glabra, caulinis sterilis vero sena verticillata breviora lanceolata acuta. Racemus aënsus ovatus terminalis. Pedunculi et Calyces villosi. Corolla flava magnitudine *A. Linariae*. W.

\*39. ANTIRRHINUM *multicaule*.

A. foliis quinis linearibus carnosis, floribus capitatis. *Hort. cliff. 324. Roy. lugdb. 296.*

*Linaria sicula multicaulis, molluginis folio. Bocc. sic. 38. t. 19. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 65.*

Vieftämmiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Sicilia, Oriente.* ☉ (v. l.)

Caules juncei, laxi. Folia linearia, obtusa.

\*40. ANTIRRHINUM *reticulatum*.

A. foliis linearibus canaliculatis sparsis, furculorum radicalium subquinis, calycibus hirsutis, pedunculis bracteis brevioribus. *Smith. ic. pict. t. 2.\**

A. (*pinifolium*) foliis filiformibus sparsis, floribus spicatis, pedunculis calycibusque hirsutis. *Poiret. itin. 2. p. 193.*

*Linaria (reticulata)* glauca, foliis linearibus sparsis, infimis subquinis verticillatis, floribus racemosis, rachi calycibusque pubescentibus, bracteis pedicellis longioribus. *Desf. atl. 2. p. 48.\**

Netzförmiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Africae borealis maritimis.* 4

\* 41. ANTIRRHINUM *marginatum*.

A. foliis lanceolatis acutis alternis, inferioribus senis, caule decumbente paniculato, floribus capitatis, calcare ascendente corolla longiore. W.

A. foliis glaucis lineari-lanceolatis, imis verticillatis, superioribus sparsis, floribus aggregatis terminalibus, semine marginato. *Desf. Act. Soc. Paris. I. p. 36. t. 7.\**

*Linaria (marginata)* caule decumbente ramoso, foliis glaucis lanceolato-linearibus, imis subsenis verticillatis, floribus capitato-racemosis. *Desf. atl. 2. p. 43.\**

Gerandetes Löwenmaul. W.

*Habitat in fissuris rupium Atlantis prope Tlemfén.* 4

Corolla pallide flava maculis duabus atro-sanguineis notata, magnitudine *A. Linariae*. W.

42. ANTIRRHINUM *glaucum*.

A. foliis quaternis subulatis carnosis, caulibus erectis, floribus spicatis. *Amoen. acad. 4. p. 277.\**

*Linaria* foliis confertis linearibus carnosis. *Hall. Goett. 306.*

*Linaria* maritima foliis succulentis. *Buxb. cent. 4. p. 23. t. 37.*

*Linaria* foliis carnosis cinereis. *Bauh. pin. 213?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 65.*

Graues Löwenmaul. W.

*Habitat in Europa australi, Oriente.* ☉

*Calcar coeruleis siriis. Nimis affine A. multicauli.*

*A. glaucum Cavan. ic. I. p. 20. t. 33. f. 2. videtur A. multicaulis varietas esse.* W.

43. ANTIRRHINUM *alpinum*.

A. foliis quaternis lineari-lanceolatis glaucis, caule diffuso, floribus racemosis calcare recto. *Roy. lugdb. 297. Sauv. monsp. 165. Crantz. austr. p. 306. Jacq. austr. t. 58.*

A. caule procumbente, rariter spicato, foliis verticillatis. *Hall. helv. n. 338.*

A. racemis terminalibus; foliis verticillatis; caule diffuso. *Scop. carn. ed. I. p. 475. n. 1. ed. 2. n. 767.*

*Linaria* quadrifolia supina. *Bauh. pin. 213.*



*Linaria* 3 *stiriaca*. *Clus. hist.* 1. p. 322.

β. *Linaria caerulea repens*. *Bauh. pin.* 213.

γ. *Linaria foliis carnosis cinereis*. *Bauh. pin.* 213. *ex Hall. Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 66.

Alpen Löwenmaul. W.

*Habitat in* Helvetia, Austria, Baldo, Styria, Pyrenaeis. ♂ (v. f.)

*Folia lanceolata verticillis remotissimis; calycum una lacinia longior.*

Varietas flore purpureo. rictu non aureo est *Linaria parva purpurea*, foliis sine ordine dispositis. *Bauh. hist.* 3. p. 460. *Hall. R.*

\* 44. ANTIRRHINUM *aphyllum*.

A. scapo aphylo capillari. *Lin. suppl.* 280.

Blattloses Löwenmaul. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. *Thunberg.*

*Singularis quam maxime haec est planta, et non herbam crederes. Refert Splachnum, aphylla, nec folia radicalia invenies. Vix Splachno major.*

45. ANTIRRHINUM *bicorne*.

A. foliis oppositis ovato-oblongis ferratis, caule erecto floribus racemosis, capsulis bicornibus. *Amoen. acad.* 6. afr. 17.\*

A. foliis copiosis oblongis dentatis, capsula corniculata reflexa. *Burm. afr.* 211. t. 75. f. 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 68.

Zweyspitziges Löwenmaul. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. ☉ (v. f.)

\* 46. ANTIRRHINUM *macrocarpum*.

A. foliis oppositis ovatis ferratis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris, capsulis compressis carinatis truncatis. *Ait. Kew.* 2. p. 335. *Vahl. symb.* 2. p. 66.

Großfrüchtiges Löwenmaul. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. ♃ (v. v.)

*Caulis herbaceus tetragonus glaber uti tota planta, Folia opposita pollicaria obtuse serrata basi integerrima quinquenervia. Petiolus brevissimus. Pedunculi axillares solitarii uniflori folio breviores. Calycis laciniae acutae subaequales, Corollae calcar vix bilineare corolla dimidio brevius rectum obtusum. Capsulae oblongae calyce longiores, valvulis extrorsum mucronatis. Vahl l. c.*

47. ANTIRRHINUM *villosum*.

A. foliis omnibus oppositis ovatis villosis, caulibus simplicibus, floribus oppositis lateralibus. *Sp. pl.* 852.

A. laxatile minus, organi folio viscoso et villoso, flore albo amplo. *Barr. ic.* 597.

*Linaria hispanica*, nummulariae folio villoso. *Tournef. inst.* 169.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 68.

Zottiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispania. Cl. Alstroemer.* 24 (v. l.)

*Folia minuta, pedunculis breviora. Tota planta densissime pilosa.*

*Flores non sunt oppositi et Folia interdum glabriuscula.* W.

48. ANTIRRHINUM *origanifolium*.

A. foliis obovatis oppositis, floralibus alternis, caule ascendente pubescente, calcare recto. W.

A. foliis pterisque oppositis oblongis, floribus alternis. *Sp. pl.* 852. *Villars delph.* 2. p. 435.

A. foliis oppositis lanceolatis, floribus laxe racemosis. *Boy. lugdb.* 297.

A. laxatile, foliis serpilli. *Bauh. pin.* 212. *prodr.* 106. *Burf.* XII. 8; 9.

A. laxatile villosum, organi folio glutinoso. *Barr. ic.* 598.

A. laxatile, alfine folio unctoso et villoso. *Barr. ic.* 1102; 1103.

*Orontium laxatile thymi folio, flore rubello.* *Barr. ic.* 1313.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 69.

Destenblättriges Löwenmaul. W.

*Habitat in Pyrenaeis, Monte aureo, Massiliae.* ☉ (v. l.)

*Planta polymorpha, varians foliis ovatis et lanceolatis, forte filia A. minoris, a quo distinguitur ramis lignosis; Foliis caulinis omnibus oppositis, floriferis tamen alternis; Floribus duplo majus.*

\* 49. ANTIRRHINUM *flexuosum*.

A. foliis obovatis oppositis, floralibus alternis, caule prostrato flexuoso glabro, calcare recurvo. W.

*Linaria (flexuosa)* caulibus procumbentibus filiformibus, foliis petiolatis oblongis, imis oppositis, floribus

laxe racemosis, pedicellis folio longioribus, calcare re-  
curvo. *Desf. atl. 2. p. 47. t. 139.\**

Gebognes Löwenmaul. W.

*Habitat in rupium fissuris montis Hamamelif. prope Tu-  
netum. 4*

*Affine praecedenti, ut praeter durationem, parvita-  
tem floris et notas indicatas nulla differentia. W.*

## 50. ANTIRRHINUM minus.

A foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramo-  
sissimo diffuso. *Hort. cliff. 324. Fl. suec. 502; 558.  
Mill. dict. n. 1. Crantz. austr. p. 309. Pollich pal.  
592. Flor. dan. t. 502. Hoffm. germ. 219. Roth. germ.  
I. 268 II. 63.*

A. viscidum, foliis inferioribus conjugatis, ellipticis, ob-  
tusis, calcare dimidii floris longitudine. *Hall. helv.  
n. 335.*

A. floribus solitariis; foliis sublinearibus alternis obtusis.  
*Scop. carn. ed. 1. p. 479. n. 3. ed. 2. n. 769.*

A. arvense minus. *Bauh. pin. 212.*

A. tertium. *Cam. epit. 922.*

*Linaria arvensis minima. Riv. mon. t. 85.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 69.*

Kleines Löwenmaul. W.

*Habitat in Europae cultis, ruderatis, glareosis. ☉ (v. v.)  
Folia infima, per tria paria, tantum opposita.*

*\* \* \* Foliis alternis, capsulis multivalvibus.*

## 51. ANTIRRHINUM dalmaticum.

A. foliis alternis cordatis amplexicaulibus. *Sp. pl. 857.  
Pall. it. 3. p. 590.*

*Linaria foliis lanceolatis alternis, caule suffruticoso. Mill.  
dict. n. 13.*

*Linaria latifolia dalmatica, magno flore. Bauh. pin. 212.  
prodr. 106.*

*Linaria maxima, folio lauri. Bauh. hist. 3. p. 458.  
Buxb. cent. 1. p. 95. t. 24.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 71.*

Dalmatisches Löwenmaul. W.

*Habitat in Creta, Armenia unde innotuit 1594. C.*

*B. ☉*

*Flores ex alis foliorum, solitarii, pedunculati.*

52. ANTIRRHINUM *hirtum*.

A. foliis lanceolatis hirtis alternis, floribus spicatis: foliolo calycino supremo maximo. *Sp. pl.* 857. *Loesl. Mill. dict.* 10. *Jacq. ic. rar.* 1. t. 117. *Misc.* 2. p. 334.\*

*Antirrhinum viscosum.* *Curt. mag.* 368.

A. foliis hirtis, radicalibus quaternis ovatis, caulinis lanceolatis alternis, floribus spicatis. *Gouan illustr.* 38. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 72.

Feinhaariges Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispania.* ☉ (v. v.)

Caules aliquot simplices, spithamaei, non ramosi. Folia lanceolata (*Lavandulae*), alterna. Flores dense spicati, colore et magnitudine *A. Linariae*. Calycis foliolum superius duplo majus quam reliqua. Capsulae subrotundae.

53. ANTIRRHINUM *genistifolium*.

A. foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata flexuosa. *Sp. pl.* 858. *Mill. dict. n.* 14. sub *Linaria*. *Gmel. it.* 2. p. 196. *Jacq. austr. t.* 244. *Roth. germ.* II. 63.

A. foliis linearibus adscendentibus, floribus spicatis, confertis, calcare flore longiore. *Hall. helv. n.* 337. *sec. De la Chenal in Act. helv.* 8. p. 142. R.

A. corollarum labio superiore maxilla destituto, panicula virgata flexuosa. *Crantz. austr. p.* 307. R.

*Linaria genistae* folio glauco, flore luteo. *Herm. par. app.* 9. *Dill. elth.* 202. *Raj. suppl.* 391.

*Linaria* flore pallido: rictu aureo. *Bauh. pin.* 213.

*Linaria panonica* 1. *Clus. hist.* 1. p. 321.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 73.

Ginsterblättriges Löwenmaul. W.

*Habitat in Sibiria.* D. *Gmelin.* Austria inferiori. Helvetia, circa Dresdam. 4 (v. v.)

Caules paniculati, subdecumbentes vel erectiusculi. Folia alterna, lanceolata, glabra, acuminata, omnino *Genistae tinctoriae*. Racemi longi, in paniculam dispositi, a calyce ad calycem flexuosi: Floribus alternis, distantibus, pedicellis longitudine calycis. Calyx quinquepartitus, glaber, acutus, longitudine capsulae. Corollae luteae, magnitudine *A. Linariae*.

54. ANTIRRHINUM *junceum*.

A. foliis linearibus alternis, caule paniculato virgato, floribus racemosis. *Amoen. acad.* 4. p. 277.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 73.

Binfenartiges Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispania. Loefling.* ☉ (v. l.)

Caulis sesquipedalis subangulatus, ramis teretibus ramosissimis. Folia linearia longa subcarnosa supra plana, subtus rotunda. Pedicelli setacei. Calyces racemosi glabri quinquefidi aequales acuti, margine membranacei erecti. Corollae flavae, palato fulvo glabro. Calcar longum acutum flavum.

*Specimen quod possideo, convenit habitu cum A. sparteo, differt vero: floribus duplo minoribus, calycinis laciniis non linearibus sed ovatis acutis margine submembranaceis.* W.

55. ANTIRRHINUM *Linaria*.

A. foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Fl. suec.* 501; 557. *Mat med.* 155. *Roy. lugdb.* 297. *Mill. dict. n. 1. sub Linaria. Gmel. sib.* 3. p. 196. *Crantz. austr.* p. 308. *Pollich. pal. n.* 594. *Kniph. cent.* 6. n. 9. *Hoffm. germ.* 219. *Roth. germ. I.* 268. *II.* 64.

A. foliis linearibus ascendentibus congestis, caule erecto spicato. *Hall. helv. n.* 336.

A. racemis terminalibus; floribus imbricatis, foliis linearibus confertis. *Scop. carn. ed. I.* p. 475. n. 2. ed. 2. n. 768.

A. foliis linearibus. *Hort cliff.* 325.

A. foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycis laciniis capsula dimidio brevioribus. *Guett. stamp.* 2. p. 203.

*Linaria vulgaris lutea, flore majore. Bauh. pin.* 212. *Riv. t.* 83. *Blackw. t.* 115. *Knorr. del. hort.* 2. t. L. 6.

*Olyris. Fuchf. hist.* 543. *Camp. epit.* 390.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 73.

Gemeines Löwenmaul. W.

*Habitat in Europae ruderatis.* 4 (v. v.)

*Palatum villosum fulvum.*

*Conf. Linaria lutea montana, genistae tinctoriae folio. Bauh. pin.* 213. a *Bursero lecta in monte S. Bernhardi, qua parte angustam vallem spectat, videtur hujus varietas Floribus tantum dimidio minoribus.*

*Peloria*, *Amoen. acad.* I. p. 55. t. 3. *Linariae proles hybrida ejusdemque qualitatis et constans, radicibus infinite se multiplicans, caractere fructificationis diversissima: Corolla regulari, quinquesida, quinquecorniata, pentandra, ut genus proprium constitueret et distinctissimum, nisi fructus semper abortiret; naturae prodigium.*

*Peloriam hanc in Germania etiam legerunt Leers fl. herb. n. 492. et Scholl. barb. n. 507. Iconem dedit Kuiph cent. 9. n. 9. R.*

*Peloria est singularis progenies A. Linariae, radices enim ejus solo sterili plantatae, degenerant in Linariam, sed semina Peloriae solo pingui sata, faciem plantae conservant. Ex his patet, culturam non semper identitatem speciei, nisi saepius sit iterata, probare. W.*

### 56. ANTIRRHINUM *linifolium.*

A. foliis lanceolatis alternis trinerviis, floribus racemosis, pedunculis distantibus bractea brevioribus. *Sp. pl.* 858. *Linaria americana, parvo flore luteo. Bauh. pin. 212. prodr. 106.*

*Linaria constantinopolitana, lini sativi folio, flore luteo. Tournef. cor. 9. Buxb. cent. 1. p. 16. t. 25. f. 2. mala.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 77.*

*Flachsbältriges Löwenmaul. W.*

*Habitat in Italiae maritimis. 4 (v. f.)*

*Caules teretes, erecti, laeves, Ramis alternis. Folia lanceolata s. angusto-lanceolata, alterna, remota, laevia, obsolete trinervia, exquisite acuminata. Racemus rectus, longus. Bractae lanceolatae, saepe flore longiores. Pedunculi longitudine calcaris. Calyce acuti, breves. Corollae luteae palato interius villoso; calcari recto, longitudine floris.*

### \*57. ANTIRRHINUM *Lagopodioides.*

A. foliis spartis mollibus apice recurvis, spicis ovatis villosis. *Lin suppl. 279.*

*Linaria maritima minima viscosa, foliis hirsutis, floribus luteis. Moris. hist. 2. p. 499. Raj. hist. p. 755? Dichtähriges Löwenmaul.*

*Habitat in Sibiria.*

*Caules herbacei vix pedales erecti pubescenti-molles, superne ramulis alternis. Folia sparsa lanceolato-*

*linearia erecta, apice parum recurva, margine reflexa mollia, fere tomentosa pallida. Spicae ramos terminantes solitariae ovatae s. oblongae, dense villosae. Calyces conferti aequales Lagopi. Corollae respectu reliquarum specierum parvae luteae. Labium superius pallide flavum. Palatum intus punctis duobus fulvis.*

\*58. ANTIRRHINUM *canadense*.

A. foliis alternis linearibus remotis glabris, floribus racemosis, caule simplicissimo, stolonibus procumbentibus. W.

A. foliis linearibus alternis, corollis caudatis hiantibus, labio inferiore explanato. *Sp. pl.* 861.

A. caule simplicissimo longissimo, foliis caulinis linearibus, stolonum procumbentium lanceolatis minimis. *Gron. virg.* 67.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 85.

Canadisches Löwenmaul. W.

*Habitat in Virginia, Canada.* ☉

Radix fibrosa. Caulis erectus filiformis pedalis vix ramosus. Folia alterna remota linearia glabra. Racemus terminalis rarior, floribus alternis pedicellatis. Calyx quinquepartitus acutus. Corollae labium superius breve reflexum. Labium inferius magnum patens dependens. Calcar subulatum.

Corolla non est hians ut Linnaeus perhibet, ergo a genere *Anarrhino* diversa planta. W.

59. ANTIRRHINUM *chalepense*.

A. foliis lineari-lanceolatis alternis, floribus racemosis, calycibus corolla longioribus, caule erecto. *Roy. lugdb.* 296. *Hort. upf.* 174. *Mill. dict. n.* 12. sub *Linaria*.

A. foliis inferioribus quaternis, caeteris alternis, floribus racemosis, calycibus corolla duplo longioribus. *Gouan. illustr.* 38. R.

*Linaria* flore albo. *Riv. mon. t.* 80. f. 2.

*Linaria* *chalepensis* minor erecta, flore albo lineis violaceis. *Morif. hist.* 3. p. 502. f. 5. t. 35. f. 9.

*Linaria* annua angustifolia, flosculis albis longis caudatis. *Triumph. obs.* 87. t. 87. f. 2. *Raj. hist.* 1884.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 77.

Aleppisches Löwenmaul. W.

*Habitat in Italia, Mospelii.* ☉ (v. v.)

60. ANTIRRHINUM *reflexum*.

A. foliis oblongis glabris, infimis ternis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus, caule ascendente. *Vahl. symb. 2. p. 67.\**

A. foliis ovatis alternis glabris, pedunculis axillaribus: fructiferis recurvatis elongatis, caule procumbente. *Sp. pl. 857. Desfont. atl. 2. p. 42.\**

A. procumbens ramosum. foliis alternis ovatis acuminatis integerrimis, flor. cordatis axillaribus. *Allion. Misc. taur. 2. p. 205. t. I.*

Linaria pusilla procumbens latifolia, flore pallido: rictu luteo. *Raj. hist. 755.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 78.*

Zurückgebogenes Löwenmaul. W.

*Habitat in Barbaria, Brander. ☉*

Caules filiformes, *spithamaei*. Folia alterna, ovata, subpetiolata, remota. Pedunculi axillares solitarii, uniflori, longitudine foliorum; absoluta florescentia duplo longiores reflexi versus terram. Calyx acuminatus. Corollae calcar longitudine floris. Capsula globosa.

*Est potius praecedentis subdivisionis ob folia inferiora terna. W.*

61. ANTIRRHINUM *pedunculatum*.

A. foliis alternis linearibus remotis, floribus paniculatis, pedunculis folio longioribus strictis. *Sp. pl. 857.*

Linaria lusitanica maritima, polygalae folio. *Tournef. inst. 169?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 79.*

Gestieltes Löwenmaul. W.

*Habitat in Hispania. C. Alstroemer.*

Caules *spithamaei*, lignosi, ramosissimi. Folia lanceolata, laevia, facie *Polygoni avicularis*. Pedunculi stricti, foliis triplo longiores. Calyx laevis. Corollae luteae extus caeruleo striatae.

\*\*\* Corollis ecaudatis, capsulis tribus poris dehiscentibus.

62. ANTIRRHINUM *majus*.

A. corollis ecaudatis, foliis lanceolatis oppositis, floribus racemosis, calycinis segmentis glanduloso-pilosis ovatis obtusis. W.

A. corollis ecaudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis. *Hort. upf. 175. Mat. med. 156. Reyg. ged. 2.*



p. 105. Scop. carn. 2. n. 773. Neck. gallob. 269.  
 Kniph cent. 1. t. 7. et cent. 3. n. 12. Riv. t. 82.  
 Knorr. del. 1. t. L. 12. Ludw. ect. t. 51. Hoffm.  
 germ. 219. Roth. germ. I. 269. II. 65.

A. foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. Vir. cliff. 61. Hort. cliff. 324. n. 4. Roy. lugdb. 294.

A. foliis ellipticis obtusis, floralibus spicatis, calycibus obtusis, calcare brevissimo. Hall. helv. n. 333.

α. A. majus rotundiore folio. Bauh. pin. 211.

A. luteo flore. Bauh. pin. 211.

A. latifolium, pallido amplo flore. Bocc. mus. 2. p. 49. t. 41.

A. (latifolium) foliis lanceolatis glabris, calycibus hirsutis, racemo longissimo. Mill. dict. n. 4. R.

β. A. majus alterum, folio longiore. Bauh. pin. 211.

A. foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis racemo terminali. Mill. dict. n. 3.

Antirrhinum. Dod. pempt. 182. Lob. ic. 404.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 79.

Garten-Löwenmaul. W.

Habitat in Europae australis maceris, sepibus. ♂  
 (v. v.)

Variat α Caule recto. Foliis ovatis.

β. Caule diffuso virgato: Foliis lanceolatis.

### \*63. ANTIRRHINUM *ficulum*.

A. corollis ecaudatis, foliis lineari-lanceolatis ternis floribus racemosis, calycinis segmentis glanduloso-pilosis lanceolatis acutiusculis. W.

A. (*ficulum*) corollis ecaudatis, floribus spicatis pedunculatis, foliis lineari-lanceolatis ternis, caule divaricato.

Ucria apud. Roem. Arch. 1. p. 69.

Sicilianisches Löwenmaul. W.

Habitat in Sicilia. ♀ (v. v.)

Simile praecedenti, sed Caulis ramosus divaricatus, ramis adscendentibus, Folia lineari-lanceolata semper fere terna, Calyces pilis glanduliferis sparsis nec confertis tecti, laciniis lanceolatis acutiusculis, Corolla pallide flava palato saturatiore, Pedunculi saepius terni. W.

### \*64. ANTIRRHINUM *sempervirens*.

A. corollis ecaudatis, foliis ellipticis sempervirentibus op-

Limaei Spec. Plant. T. III.

R

positis, pedunculis axillaribus, caule divaricato frutescente. W.

- A. (*sempervirens*) corollis ecaudatis, foliis oppositis ovatis sempervirentibus, caule fruticoso. *Lapeyr. pyr.* I. p. 7. t. 4.\*

Immergrünes Löwenmaul. W.

*Habitat in Pyrenaeis.* †

*Affine A. molli, differt vero: Foliis tantum pubescentibus, nec sericeo-tomentosis, sempervirentibus, caule frutescente, Corollis albedo-rubicundis.* W.

### 65. ANTIRRHINUM *Orontium.*

A. corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus digitatis corolla longioribus. *Hort. upf.* 176. *Mill. dict. n. 2, Crantz. austr. p. 310. Scop. carn. ed. 2. n. 774. Neck. gallob. p. 269. Pollich pal. n. 595. Mattusch. sil. n. 468. Doerr. nass. p. 46. Kniph. cent. 12. n. 13. Hoffm. germ. 219. Koth. germ. I. 269. II. 65.*

A. foliis lanceolatis petiolatis, calycibus flores superantibus. *Hort. cliff.* 324. *Fl. suec.* 520; 559.

A. foliis ellipticis obtusis, floribus sparsis, calycibus subulatis longissimis, calcare brevissimo. *Hall. helv. n. 334.*

A. arvense majus. *Riv. t.* 82. *Bauh. pin.* 212.

A. sylvestre, *Phyteuma.* *Dod. pempt.* 212.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 81.

Wildes Löwenmaul. W.

*Habitat in Europae agris et arvis.* ☉ (v. v.)

*Capsula dehiscens refert cranium Simiae venenata planta. Datur varietas albo flore.*

### 66. ANTIRRHINUM *papilionaceum.*

A. corollis ecaudatis, floribus axillaribus, calycibus papilionaceis, foliis carnosis. *Mant.* 86. *Burm. ind.* 131. t. 39. f. 2.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 82.

Pertisches Löwenmaul. W.

*Habitat in Persia, D. Burmannus.*

*Folia alterna, breviter petiolata, ovata aut obovata, carnosa, integerrima, magnitudine Origani. Flores axillares foliorum, solitarii, breviter pedunculati, magnitudine foliorum. Calyx 5-phyllus, folio supremo majori, cordato, longitudine fere floris; reliquis*

*sublanceolatis. corolla dimidio brevioribus. Corolla ecaudata: labio superiore bifido, lateralibus marginibus reflexis; L. inferiori latiori, trifido, subaequali.*

67. ANTIRRHINUM *Asarina*

A. corollis ecaudatis, foliis oppositis cordatis crenatis, caulibus procumbentibus. *Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 295. Kniph. cent. 1. t. 6.*

*Asarina (procumbens) caule decumbente, foliis oppositis reniformibus crenatis. Mill dict. n. 1.*

*Asarina S. Hederula saxatilis. Lob. ic. 601.*

*Hedera saxatilis, magno flore. Bauh. pin. 306.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 82.*

*Gundermannblättriges Löwenmaul. W.*

*Habitat in rupibus Veganio conterminis, Genevae. 4 (v. v.)*

*Caules prostrati, dependentes. Folia obtuse lobata s. profunde crenata, pilosa. Corollae absque calcari.*

68. ANTIRRHINUM *molle.*

A. corollis ecaudatis, foliis oppositis ovatis tomentosis, caulibus procumbentibus. *Schreb. in nov. Act. A. N. C. vol. 3. p. 473.\* Kniph. cent. 10. n. 9.*

A. hispanicum villosum, organi folio glutinoso. *Tournef. inst. 168.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 83.*

*Weichblättriges Löwenmaul. W.*

*Habitat in Hispania. 4*

*Caules prostrati, fragiles. Folia caulina opposita, mollissima. Pedunculi calyce longiores. Corolla Asarinae villosa, alba palato flavo, Labio superiore rubro-striato. Calcar nullum.*

*\* \* \* Foliis pinnatifidis.*

69. ANTIRRHINUM *pinnatum.*

A. foliis oppositis pinnatifidis, caule erecto, floribus racemosis. *Lin. suppl. 280.*

*Gefiedertes Löwenmaul. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. Thunberg.*

7. ANTIRRHINUM *unilabiatum.*

A. ecaudatum, callis duobus, foliis alternis pinnatifidis, caule paniculato. *Lin. suppl. 279.*

*Einspitziges Löwenmaul.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. Thunberg.*

## 1145. ANARRHINUM.

*Desf. atl. 2. p. 51.*

*Cal.* 5-phyllus. *Corollae* basis deorsum prominens nectarifera, labium inferius planum palato destitutum, faux pervia. *Caps.* 2-locul. multivalvis.

I. ANARRHINUM *bellidifolium*. W.

A. foliis radicalibus obovato-lanceolatis obtusis ferratis, caulinis partitis integerrimis. W.

*Antirrhinum (bellidifolium)* foliis radicalibus lingulatis dentatis lineatis; caulinis partitis integerrimis. *Mant.* 417. *Vahl. symb. 2. p. 67.*

*Antirrhinum* foliis imis elliptico-lanceolatis, acute dentatis, caulinis capillaribus trifidis. *Hall. helv. n. 342.*

*Antirrhinum* foliis radicalibus spathulatis, duplicato-fer-ratis, caulinis digitatis, laciniis lanceolato-linearibus integerrimis, intermedia longiore. *Gouan. illustr. p.*

39.

*Antirrhinum* foliis radicalibus oblongis ferratis, corollis calcaratis patulis. *Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 295. Spec. pl. 2. p. 860.*

*Antirrhinum* foliis imis spathulatis, summis digitatis. *Sauv. monsp. 67.*

*Timbuleta.* *Forsk. descr. 115?*

*Linaria bellidis folio.* *Bauh. pin. 212. prodr. 106. t. 106.*

*Linaria odorata.* *Dod. pempt. 184.*

*Dodartia* foliis radicalibus oblongo-ovatis ferratis, caulinis linearibus integerrimis, floribus spicatis terminalibus. *Mill. dict. n. 2.*

β. *Linaria lusitanica*, *bellidis folio* ampliore et villoso. *Tournef. 169. ex Gouan. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 84.*

*Malsliebblättriger Lochschlund.* W.

*Habitat* Monspeli; in agris inter Lugdunum et Vien-nam, interque Lugdunum et Gratianopolin. ♂

*Caulis erectus, ringens: Rami e summitate plures, simplices. Caules plures, breviores e radice. Folia Rad-icalia lingulata, obtusa, dentata, lineata, glabra; Caulina 3, 5, 7-partita, linearia integerrima. Spi-cae terminales, rectae. Bractee uniflorae, lineares, longiores. Flores caeruleascentes, nutantes, minuti, 5-*

*fidi: lacinae 2. erectae; 3. nutantes. Palatum obsole-  
tum, faucem non claudens. Calcar reflexum, minutum.  
Antherae reflexae, atrocoeruleae.*

\*2. ANARRHINUM *pedatum*.

A. foliis radicalibus lanceolatis acutiusculis, grosse den-  
tatis, caulinis sessilibus pedatis integerrimis. W.

A. (*pedatum*) foliis radicalibus oblongis serratis nerve-  
sis, caulinis pedatis, foliolis angusto lanceolatis, flo-  
ribus hirsutis racemosis sessilibus. *Desf. atl. 2. p. 51.  
t. 141.\**

Handblättriger Lochschlund. W.

*Habitat in collibus Algeriae.*

*Folia radicalia oblongo-lanceolata acuta vel obtusa  
remote grosse dentata, caulina sessilia pedata, foliolis  
lineari-lanceolatis integerrimis. Flores brevissime pe-  
dunculati bractea lineari-subulata breviores in race-  
mis elongatis. Corolla alba hirsuta. Calcar subulatum  
breve ascendens. Affine praecedenti. W.*

\*3. ANARRHINUM *fruticosum*.

A. foliis inferioribus cuneiformibus tridentatis, superio-  
ribus lineari lanceolatis integerrimis, racemis filifor-  
mibus, caule frutescente. W.

A. (*fruticosum*) frutescens ramis virgatis filiformibus,  
foliis perennantibus, imis spathulatis, racemis inter-  
ruptis, corollis ecaudatis. *Desf. atl. 2. p. 52. t. 142.\**

Strauchartiger Lochschlund. W.

*Habitat in Atlante prope Tlemsen, Mascar et Cafsam. †*

*Frutex pedalis vel bipedalis. Rami virgati simplices.  
Folia sempervirentia inferiora cuneiformia sessilia apice  
tridentata, superiora sparsa lineari-lanceolata inte-  
gerrima. Flores parvi albi subsessiles in racemo longo  
filiformi interrupto. Corolla ecaudata. W.*

\*4. ANARRHINUM *crassifolium*. W.

A. foliis oppositis ovatis acutis glabris, caule ascendente,  
racemis corymbosis. W.

Antirrhinum (*crassifolium*) foliis oppositis ovatis crassius-  
culis, limbo reflexo, floribus laxo spicatis, fauce  
pervia. *Cavan. ic. 2. p. II. t. 114.\**

*Linaria pumila lusitanica, floribus palato carentibus.  
Tournef. inst. 170?*

*Orentium saxatile thymifolio flore rubello. Barr. ic. 1315.*

*Antirrhinum saxatile* foliis serpylli. *Bauh. pin.* 212.  
Dickblättriger Lochschlund. W.

*Habitat in rupium fissuris Valentiae.* ☉

Caulis ramosus ascendens superne pubescens. Folia opposita ovata acuta crassiuscula glabra margine revoluta. Racemi plures corymbosi in apice caulis. Pedunculi longitudine floris. Corolla albo-purpurea calcarata. W.

\*5. *ANARRHINUM tenellum.* W.

A. foliis oppositis cordato-ovatis acutis cauleque procumbente villosis, pedunculis axillaribus. W.

*Antirrhinum (tenellum)* caulibus procumbentibus tenuissimis, floribus axillaribus solitariis, pedunculis folio longioribus. *Cavan. ic.* 2. p. 61. 61. t. 180. f. 1.\*  
Zarter Lochschlund. W.

*Habitat in Valentia in cacumine montis Ayorae.* ☉

Tota planta villosissima. Caulis basi ramosus procumbens. Folia opposita subrotundo-ovata basi leviter cordata acuta. Pedunculi uniflori axillares foliis multo longiores. Corolla alba calcarata. W.

1146. *CYMBARIA.*

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1008.

*Calyx* decedentatus. *Capfula* cordata, bilobularis.

I. *CYMBARIA daurica.*

*Cymbaria.* *Mant.* 417. *Gmel. sib.* 3. p. 198. n. 8.

*C. daurica* pumila incana, linariae folio, magno flore luteo guttato. *Amm. ruth.* 47. t. 1. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 86.

Sibirisches Nachenkraut. W.

*Habitat in Dauriae montanis, aprici, saxosis.* 4 (v. l.)

Planta tota incana, proxima *Antirrhino*. Rami oppositi, steriles. Flores laterales, paucissimi, subsessiles, magni. *Calyx* decedentatus, quo a ringentibus omnibus differt. Corolla ringens: Lab. superiori fornicato, apice bifido; Lab. inf. aequali, trifido; palato gibbo.

## \* 1147. T O U R R E T T I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1009.*

*Cal.* bilabiatus. *Cor.* labium inferius nullum, cujus loco denticuli 1. *Caps.* echinata 4-locul. bivalvis.

\* I. T O U R R E T T I A *lappacea.*

*Dombeja lappacea. l'Herit stirp. nov. 1. p. 33. t. 17.\**  
Klettenartige Tourrette. W.

*Habitat in Peru.* ☉

*Caulis bicubitalis scandens tetragonus fistulosus, ramosus. Folia opposita primordialia ternata, foliolis lateralibus bipartitis, ad sequentem nodum duplicato-ternata absque cirrho, ad nodos caulis superiores ternato-decomposita vel pedata, petiolo communi in cirrhum ramosum convolutum excrescente. Flores in racemo nudo terminali, violaceo-fuscescentes. Bractea fetacea ad pedunculorum alternorum brevissimorum basin.* W.

## 1148. M A R T Y N I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1010.*

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* ringens. *Caps.* lignosa, corticata, rostro hamato, 4-ocularis, bivalvis.

\* I. M A R T Y N I A *diandra.*

M. caule ramoso, foliis oppositis cordatis dentatis, floribus diandris, W.

M. (*diandra*) ramis dichotomis, foliis cordato-orbiculatis dentatis, floribus diandris. *Gloxin. obs. p. 14. t. 1. Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 21. t. 289.\**

M. (*angulosa*) calyce simplici pentaphyllo, foliis oppositis cordatis angulatis villoso-viscosis. *Lamarck. encycl. 2. p. 112.\**

*Martynia. Reliq. houst. p. 5. t. 10.*

M. annua villosa et viscosa, folio subrotundo, flore magno rubro. *Mart. cent. 42. t. 42. Ehart. pict. t. 1. f. 5. Act. angl. 38. n. 427. p. 3.*

Zweyfädige Martynie. W.

*Habitat ad Veram Crucem in Mexico.* ☉

2. MARTYNIA *Carniolaria*.

M. caule ramoso, foliis oppositis quinquelobis dentatis. W.

M. (*Carniolaria*) caule ramoso, foliis cordatis semiquinquelobis, fructu ovato. *Swartz. obs.* 230.\*

M. (*spathacea*) calyce duplici, inferiore monophyllo spathaceo, foliis oppositis cordato-palmatis angulatis. *Lamarck. encycl.* 2. p. 112.\*

M. (*Carniolaria*) ramis dichotomis, foliis semi quinquelobis, calyce spatha monophylla. *Gloxin. obs.* p. 14.

*Carniolaria* (*annua*) foliis cordatis angulatis, calyce exteriore diphylo. *Mant.* 417. *Syst. veg.* 417. *Jacq. amer.* 173. t. 110.\* *Mill. dict. n.* 1.

M. *annua* villosa et viscosa aceris folio, flore albo tubo longissimo. *Ehret. pict.* t. 1. f. 2.

*Houttuyn-Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 49.

Ab unblättrige Martynie. W.

*Habitat in Carthagera Americae.* ☉

Calyx ovatus supra longitudinaliter dissectus, basi bracteis duabus.

3. MARTYNIA *Proboscidea*.

M. caule ramoso, foliis alternis cordatis integerrimis. W.

M. (*Proboscidea*) caule ramoso, foliis integerrimis, sinibus dilatatis. *Ait. Kew.* 2. p. 339.

M. (*Proboscidea*) ramis sparsis, foliis cordato-ovatis integerrimis, capsulae rostro longissimo. *Gloxin. obs.* p. 14.

M. (*alternifolia*) calyce duplici, interiore monophyllo, foliis cordato-subrotundis integerrimis, capsulae rostro longissimo incurvo. *Lamarck. encycl.* 2. p. 112.\*

M. (*annua*) caule ramoso, foliis integerrimis angulatis. *Sp. pl.* 862. *Fabr. helmst.* 240. *Kniph. cent.* 8. n. 66. *Sabb. hort.* 2. t. 91. *Swartz. obs.* 230.

M. caule ramoso, foliis cordato-ovatis pilosis. *Mill. dict. n.* 3. et *ic.* t. 286.

M. caule petiolisque fistulosis, floribus bibracteatis. *Gouan. hort.* 303.

M. foliis dentatis. *Hort. cliff.* 322.

*Proboscidea* *Jussieu.* *Schmid. ic.* 49. t. 12. 13. *Medic. bot. beob.* 1783. p. 20.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 52.

Langschnablige Martynie. W.

*Habitat ad flumen Mississippi.* ☉ (v. v.)

Calyx exterior diphyllus, lanceolatus. Perianthium



*monophyllum, ovatum, subquinquelobum, latere inferiore usque ad basin dehiscens. Fructus rostro incurvo, longo, uncinato. Stigma tactu clauditur. Turra.*

#### 4. MARTYNIA *longiflora.*

M. caule simplici, foliis subrotundis repandis, tubo corollae basi gibbofo-complanato. *Ait. Kew. 2. p. 339.*

M. caule simplici, foliis orbiculatis, repandis. *Syst.*

*Veg. p. 467. Meerb. ic. 7.*

*Martynia capensis. Gloxin. obs. p. 13.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 54.*

*Langblumige Martynie. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. ☉*

*Caulis erectus, scabriusculus, bipedalis. Folia opposita, petiolata, trinervia. Flores axillares, solitarii, breviter pedunculati. Loco stipularum ad basin pedunculi, Glandula s. Cupula exicipiens globum, quasi stylo brevi et stigmate donatum. Perianthium minimum, 5-dentatum. Corollae tubus praelongus, medio contractior, basi dorsali gibbus. Germen superum. Stylum longitudine tubi. Stigmata linearia, 2, revoluta. Pericarpium vix rostratum, basi utrinque denticulo crasso. Semina parva. D. Dav. Royen.*

### 1149. T O R E N I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1011.*

*Cal. 2-labiatus: superiore tricuspide. Filamenta inferiora ramulo sterili. Caps. 2-locularis.*

#### I. T O R E N I A *asiatica.*

T. glabra, caule repente. W.

T. asiatica. *Sp. pl. 862. Amoen. acad. 3. p. 25. Obs. it. 210. Lamarck. illust. gen. t. 523. f. 1.*

Euphrasiae affinis pusilla planta. *Pluk. amalth. 85. t. 373. f. 2.*

Asarinae foliis et facie capsula bivalvi lignosa. *Pluk. amalth. 40.*

Hederae terrestris species. *Comm. mal. 35.*

Kaka-pu. *Rheed. mal. 9. p. 103. t. 53.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 88.*

Asiatische Torenne. W.

*Habitat in India, China. 2*

Tota glabra. Folia longe petiolata. Flores majores quam in sequente. W.

\* 2. TORENIA *hirsuta*. W. †

T. *hirsuta*, caule erecto. W.

Torenia. *Lamarck. illust. gen. t. 523. f. 1.*

Haarige Torenie. W.

*Habitat in India orientali.*

Tota *hirsuta*. Folia *brevissima petiolata*. Flores minores in pedunculis unifloris axillaribus et terminalibus, quum plerumque flores pedunculati solitarii terminales observentur in praecedente. W.

1150. B E S L E R I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1012.*

Cal. 5-partitus. Bacca subglobosa, polysperma.

1. BESLERIA *melittifolia*.

B. pedunculis ramosis, foliis ovatis. *Sp. pl. 862. Mill. dict. n. 1. Aubl. guj. 2. p. 636.*

B. *melissae tragi folio*. *Plum. gen. 29. ic. 48.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 55.*

Melittisblättrige Beslerie. W.

*Habitat in Martinicae, Gujanae humidis. †*

2. BESLERIA *lutea*.

B. pedunculis simplicibus confertis, foliis ovato-lanceolatis serratis. *Swartz. obs. 231.\**

B. pedunculis simplicibus confertis foliis lanceolatis. *Sp. pl. 863. Mill. dict. n. 2. Jacq. amer. 187. Aubl. guj. 2. p. 636.*

B. *virgae aureae foliis, flore luteo, minor*. *Plum. gen. 29. ic. 49. f. 1.*

*Eriphia foliis ovatis serratis oppositis, venis oblique arcuatis, floribus confertis ad alas*. *Brown. jam. 271.*

β. B. *virgae aureae foliis, flore luteo, major*. *Plum. gen. 29. ic. 49. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 55.*

Gelbe Beslerie. W.

*Habitat in fruticetis montosis humidis Jamaicae et ad ripas Gujanae. † (v. f.)*

\* 3. BESLERIA *violacea*.

B. pedunculis racemoso-paniculatis terminalibus, foliis ovatis integerrimis. W.

B. (*violacea*) caule scandente, foliis ovatis acutis integerrimis, floribus spicatis. *Aubl. guj. 2. p. 630. t. 254.\**

β. B. (*coerulea*) caule scandente, foliis ovatis acutis integerrimis, floribus spicatis. *Aubl. guj. 2. p. 631.*

Violette Beslerie. W.

*Habitat in sylvis Gujanae. ‡*

Frutex scandens Folia integerrima glabra rigida. Flores magnitudine Syringae vulgaris. Bacca purpurea edulis. W.

\* 4. *BESLERIA incarnata.*

B. pedunculis simplicibus solitariis, foliis oblongis crenatis utrinque tomentosis. W.

B. foliis ovatis crenatis utrinque tomentosis. *Aubl. guj. 2. p. 635. t. 256.\**

Fleischfarbene Beslerie. W.

*Habitat ad originem amnis. Galibienfis in Gujana. †*

Pianta herbacea erecta bipedalis, tota tomentosa. Caulis tetragonus. Pedunculi uniflori solitarii axillares. W.

\* 5. *BESLERIA ferrulata.*

B. pedunculis simplicibus solitariis, calycibus ferratis, corollae glabrae limbo serrulato, foliis oblongis utrinque acuminatis. W.

B. pedunculis simplicibus solitariis, calycibus ferratis, foliis ellipticis utrinque acuminatis. *Jacq. hort. Schönb. 3. p. 21. t. 290.\**

Gezähnelte Beslerie. W.

*Habitat in India occidentali. ‡*

Frutex scandens sarmentosus. Folia utrinque hirsuta oblonga basi apiceque attenuata, dentata, superne saturate viridia, subtus fusco-purpurea. Pedunculi axillares uniflori solitarii oppositi. Calyx magnus serrulatus viridis. Corolla ochroleuca limbo argute serrulato, tubo ventricoso basi gibbo. W.

6. *BESLERIA cristata.*

B. pedunculis simplicibus solitariis, calycibus coloratis ferratis, corollae hirsutae limbo integerrimo, foliis ovatis. W.

B. pedunculis simplicibus solitariis, calycibus ferrato-cristatis. *Syst. Veg. 468. Aubl. guj. 2. p. 637. Swartz. öf. 232.*

B. pedunculis simplicibus solitariis, involucris pentaphyllis propriis. *Jacq. amer.* 188. t. 119. \* *Mill. dict.* n. 3.

B. scandens cristata, fructu nigro. *Plum. gen.* 29. ic. 50. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 56.

Hahnenkammförmige Beslerie. W.

*Habitat in sylvis humidis* Martinicae, Gujanae. †

Radix repens. Caulis radicans scandens. Folia ovata, serrata, petiolata. Pedunculi laterales, uniflori, terminati Involucro pentaphyllo: foliolis cordatis, dentatis, sessilibus. Calyx coccineus. Corolla solitaria, flavescens, externe hirsuta. Stamina et Pistilla mire implexa, forte aut *Martyniae* aut distincti generis planta.

Calyx serratus coccineus faciem involucri uti in praecedente et sequente mentiens. Fructus est Capsula nec Bacca. W.

\*7. *BESLERIA coccinea.*

B. umbella pedunculata axillari, calycibus coloratis ferratis, corollae glabrae limbo subserrulato, foliis ovatis glabris. W.

B. caulescendente, foliis carnosis ovato-acuminatis, involucro communi bifolio, calyce proprio coccineo, flore et fructu luteo. *Aubl. guj.* 2. p. 632. t. 255. \*

Scharlachrothe Beslerie. W.

*Habitat in sylvis paludosis* Gujanae. †

Frutex scandens. Folia ovata glabra rigida subdentata. Pedunculus communis solitarius axillaris 3-6 florus. Pedunculi proprii in apice pedunculi communis. Involucrum diphyllum orbiculato-cordatum dentatum coloratum ad divisionem pedunculi communis. Calyx coccineus. Corolla flava. W.

8. *BESLERIA bivalvis.* †

B. calycibus bivalvibus laceris. *Lin. suppl.* 280.

Zweyklappige Beslerie. W.

*Habitat in Surinamo.* C. G. Dalberg.

Caulis herbaceus longissimus debilis repens pilosus teres. Folia opposita petiolata venosa pilosa nervosa palmaria. Pedunculi laterales oppositi folio breviores, ex singula ala bina uniflori. Bacca ovalis: Nucleo osseo biloculari. Simillima foliis ut et calyce *B. cristatae*, sed fructu et defectu perianthii pentaphylli diversissima.

Planta haec ad aliud genus pertinere videtur. W.

## 1151. BRUNFELSIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1013.*

*Cal.* 5 dentatus angustus. *Corollae* tubus longissimus. *Capsula* baccata unilocularis polysperma, conceptaculo maximo.

1. BRUNFELSIA *americana.*

B. foliis ellipticis acuminatis, petiolis longioribus, corollis tubo erecto, limbo integro. *Swartz. prod.* 90.

B. americana. *Sp. pl.* 276. *Swartz. obs.* 90. t. 4. f. 2.\*

B. flore albo, fructu croceo molli. *Plum. gen.* 12. ic. 65.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 78.

Americanische Brunfelle. W.

*Habitat in* India occidentali, Jamaica. † (v. v.)

Folia oblonga obtusa integerrima petiolata. Flores in apice ramorum plures. Antherae extra corollae tubum prominentes.

2. BRUNFELSIA *undulata.*

B. foliis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis, petiolis brevissimis, corollis tubo curvo, limbo undulato. *Swartz. prod.* 60.

Wellenförmige Brunfelle. W.

*Habitat in* Jamaica. †.

## 1152. SCROPHULARIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1014.*

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* subglobosa, refupinata. *Capsf.* 2-locularis.

1. SCROPHULARIA *marilandica.*

S. foliis cordatis serratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. *Hort. upf.* 177. *Mill. dict. n.* 16. *Kniph. cent.* 2. n. 80.

S. foliis cordatis oppositis, racemo terminali. *Gron. virg.* 71.

S. marilandica, longo profunde serrato urticae folio. *Raj. suppl.* 396.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 90.

Marilandische Braunwurz. W.

*Habitat in* Virginia. † (v. v.)

Simillima sequenti; duplo altior. Folia basi cordata, sed non trinervata seu ad nervos usque excisa. Petioli utrinque connexi barba minima.

2. SCROPHULARIA *nodosa*.

S. foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Mat. med.* 256. *Gmel. sib.* 3. p. 193. *Gunn. norv.* n. 732. t. 4. f. 1-3. *Scop. carn.* n. 775. *Pollich. pal.* n. 596. *Ludw. ect.* t. 72. *Kniph. cent.* 2. n. 81. *Hoffm. germ.* 220. *Roth. germ.* I. 266. II. 58.

S. foliis cordatis, racemo terminali. *Hort. cliff.* 322. *Fl. suec.* 520; 560. *Roy. lugdb.* 293. *Gron. virg.* 71. *Dalib. parif.* 191.

S. caule quadrangulo, paniculato, foliis cordatis oblongis. *Hall. helv.* n. 326.

S. foliis cordatis basi transversis; caule et ramis spica nuda paniculata terminatis. *Crantz. austr.* p. 325.

S. *nodosa foetida*. *Bauh. pin.* 235.

*Scrophularia*. *Cam. epit.* 866. *Riv. t.* 106. *Blackw.* t. 87.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 91.

Gemeine Braunwurz. W.

*Habitat in Europæ succulentis.* 4. (v. v.)

*Folia trinervata ut in Lappa, Petasitide.*

*Variat foliis ternis; floribus viridibus.* *Hall. l. c.* R.

3. SCROPHULARIA *aquatica*.

S. foliis cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upf.* 177. *Mat. med.* 156. *Crantz. austr.* p. 326. *Scop. carn.* n. 776. *Pollich. pal.* n. 597. *Flor. dan.* t. 507. *Blackw. t.* 86. *Kniph. cent.* 11. n. 92. *Sabb hort.* 2. t. 89. *Hoffm. germ.* 220. *Roth. germ.* I. 266. II. 59.

S. caule quadrangulo, alato, paniculato, foliis ovato-lanceolatis. *Hall. helv.* n. 325.

S. foliis cordatis, petiolorum alis in caulem decurrentibus. *Guett. siamp.* 2. p. 201.

S. *aquatica major*. *Bauh. pin.* 235. caule fimbriato. *Loef. pruff.* 248. t. 75.

*Scrophularia femina*. *Cam. epit.* 867.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 92.

Waller-Braunwurz. W.

*Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ humidis.* ♂ (v. v.)

4. SCROPHULARIA *auriculata*.

S. foliis oblongis cordatis subtus hirsutis duplicato-dentatis, basi appendiculatis, petiolis aequalibus, racemis terminalibus. W.

S. foliis cordatis subtus tomentosis basi appendiculatis,

racemis terminalibus. *Sp. pl.* 864. *Allion. ped. n.* 250. *Desf. atl.* 2. p. 56.\*

*Betonica aquatica septentrionalium.* *Lob. ic.* 533.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 94.

Geöhrte Braunwurz. W.

*Habitat in Hispania in comitatu Nicaeensi atque in Algeria.* 4 (v. l.)

Statura *S. nodosae*. *Caulis tetragonus, minime pilosus, brachiatus. Folia cordata, duplicato-serrata, obtusa ubique, opaca, nuda, ad basin foliolis 2. ovatis accessoriis, fere ternata; in minoribus ramis folia simplicia. Corollae purpureae tristiores: labio revoluto livido-virescente.*

*Planta sub hoc nomine a Clariff. Scopolio, (fl. carn. n. 777. t. 32.) descripta est mihi ignota et ab hac diversa. Specima mea quae, a Clariff. Bellardi accepi, cum figura Lobelii et descriptione Linnaei conveniunt, praeter tomentum in diagnosi sub foliis notatum. Folia sunt oblonga basi levissime cordata obtuse duplicato-dentata superne glabra, inferne hirsuta; infima sunt ternata, foliolis lateralibus lanceolatis; superiora vero basi trilobata; summa absque appendicibus. Racemus terminalis erectus, pedunculis oppositis trifloris. Petioli teretes aequales canaliculati hirsuti. W.*

### \*5. SCROPHULARIA *appendiculata.*

*S. foliis ovatis cordatis glabris inciso-serratis basi appendiculatis, petiolis dilatatis, racemis terminalibus compositis. W.*

*S. (appendiculata) foliis cordatis inciso-serratis glabris, infimis varie appendiculatis racemis terminalibus compositis. Jacq. hort. Schönb. 3. p. 19. t. 286.\**

Beblätterte Braunwurz. W.

*Habitat in regno Tunetano.* 4 (v. v.)

*Tota planta glaberrima. Folia ovata cordata argute duplicato-serrata vel inciso-serrata; radicalia, foliola bina alterna vel rarius quatuor lanceolata serrata in petiolo versus basin folii gerunt; caulina vero, foliola bina angusto-lanceolata subpetiolata serrata, basi folii inserta habent. Petioli glabri dilatati versus basin folii latiores. Flores ut in *S. nodosa*, sed majores atropurpurei vel flavescentes. W.*

### 6. SCROPHULARIA *Scorodonia.*

*S. foliis cordatis duplicato-serratis pubescentibus, pani-*

culis terminalibus trichotomis foliis interstinctis. *Ait. Kew. 2, p. 341.*

S. foliis cordatis duplicato-ferratis, racemo composito foliis interstincto. *Sp. pl. 864. Roy. lugdb. 296. Hudf. angl. 240. Gmel. fib. 3. p. 195. n. 5? Mill. dict. n. 5. All. ped. n. 251.*

S. melissae folio. *Tournef. inst. 166.*

S. scorodoniae folio. *Pluk. alm. 338. t. 59. f. 5. Raj. hist. 766. Moris. hist. 2. p. 482. f. 5. t. 35. f. 6.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 95.*

Melissenblättrige Braunwurz. W.

*Habitat in Lusitania et Jersea insula Angliae; inque Italia. 2 (v. f.)*

Similis *S. nodosae*. Caulis valde pilosus. Folia obtuse ferrata. Racemus foliis interstinctus; quod non in prioribus. *Syst. Nat. 413.*

Folia cordata sinu hiant, duplicato ferrata, angulis seu ferraturis acutis (nec obtusis *S. auriculatae*). Caule valde piloso et defectu auricularum foliorum differt a simili *S. auriculata*. *Mant 418.*

#### \*7. SCROPHULARIA glabrata.

S. foliis oblongo lanceolatis cordatis duplicato-ferratis glabris, paniculis racemosis terminalibus trichotomis, caule suffruticoso. *Ait. Kew. 2. p. 341. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 44. t. 209.\**

S. (*laevigata*) glabra, foliis cordatis obtuse dentatis incisis, racemo terminali composito aphylo. *Vahl. symb. 2. p. 67?*

Glatte Braunwurz. W.

*Habitat in Canariis. ♂*

*Planta a Clariff. Vahl descripta non videtur differre. W.*

#### 8. SCROPHULARIA betonicifolia.

S. foliis cordatis oblongis dentatis: dentibus integerrimis; bases profundioribus. *Mant. 87.*

S. betonicae folio. *Tournef. inst. 166.*

S. aquatica mentana mollior. *Barrel. ic. 274. mala.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 96.*

Betonienblättrige Braunwurz. W.

*Habitat in Lusitania. 2 (v. v.)*

Caulis bipedalis, erectus, tetragonus, subpubescens, basi purpurascens. Folia opposita, petiolata, subcordata, oblonga s. triplo longiora, quam lata; rugosa, subtus subpubescentia, argute dentata, dentibus acumi-



*natis, integerrimis (adeoque Ebuli simillimis) ad basin profundioribus. Petioli foliis brevioribus. Panicula terminalis, subfoliosa. Corollae trisite purpurascens labelle virecente. Antherae flavissimae. H. U.*

### 9. SCROPHULARIA orientalis.

S. foliis lanceolatis ferratis petiolatis: caulinis ternis, rameis oppositis. *Mill. dict. n. 12. Pall. it. 3. p. 655. Kniph. cent. 5. n. 80.*

S. foliis lanceolato-linearibus acute ferratis: inferne incisis, racemo composito. *Roy. lugdb. 249.*

S. orientalis, foliis cannabinis. *Tournef. cor. 9.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 97.*

Orientalische Braunwurz. W.

*Habitat in Oriente. 4 (v. v)*

*Racemus compositus e pedunculis 3 f. 4 dichotomis. Folia caulina variant terna aut quaterna.*

### 10. SCROPHULARIA frutescens.

S. foliis subcarnosis superioribus sessilibus dentatis glabris apice recurvis panicula racemosa, pedunculis bifidis multifloris. W.

S. foliis subcarnosis sessilibus laevibus apice recurvis. *Mant. 418. Desf. atl. 2. p. 56.*

S. foliis lanceolatis obtusis serrato-dentatis, pedunculis bifidis. *Roy. lugdb. 294.*

S. lusitanica frutescens, verbenacae foliis. *Tournef. inst. 167. Raj. suppl. 396.*

S. peregrina frutescens, foliis Teucris crassiusculis. *Herm. lugdb. 545. t. 547.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 97.*

Strauchartige Braunwurz. W.

*Habitat in Lusitania inque regno Tunetano. 5 (v. l.)*

*Caulis perennans, tetragonus, acutangulus, inferne brachiatus. Folia sessilia, ovata, dentata, subcarnosa, lucida, glabra, parva, opposita: inferiora obovata: superiora oblonga, apice recurva. Racemus terminalis, foliatus: bracteis integerrimis: Pedunculis oppositis, trifidis, longitudine bractearum. Corollae parvae, atropurpureae: laciniis lateralibus albis; lacinia infima minuta.*

*Folia inferiora petiolata. Panicula simplex e pedunculis bifidis multifloris vel potius e racemis binis parvis conjugatis composita. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

S

\*11. SCROPHULARIA *rupestris*.

S. foliis oblongis petiolatis dentatis glabriusculis, racemo terminali, pedunculis trifloris. W.

*Scrophularia rupestris*. *Marschall ab Bieberstein*.  
Felsen-Braunwurz. W.

*Habitat in Tauriae rupibus*. 4 (v. l.)

*Admodum affinis praecedenti et forte sola varietas; sed differt: caule humiliore semipedali tenuissime pubescente, foliis omnibus petiolatis rigidioribus minoribus, racemo terminali e pedunculis trifidis trifloris composito, bracteis parvis obtusis nec acutis*. W.

\*12. SCROPHULARIA *heterophylla*. W.

S. foliis subcarnosis ternatis, trilobis simplicibusque, panicula racemosa, caule frutescente. W.

S. cretica frutescens, folio vario crassiori. *Tournef. cor.* 9.  
Verschiedenblättrige Braunwurz. W.

*Habitat in Creta*. 5 (v. l.)

*Caulis fruticosus, ramulis obtuse tetragonis. Folia opposita carnosae glabra, inferiora ternata, foliolis lateralibus oblongis obtusis sextuplo minoribus, terminali maximo profunde trilobo inaequaliter remote inciso-dentato obtuso, superiora vel triloba vel elliptica basi attenuata remote inciso-dentata. Panicula terminalis nuda e racemis longissimis conjugatis composita. Foliorum simplicium figura accedit ad S. frutescentem; sed omnia folia sunt longe petiolata*. W.

\*13. SCROPHULARIA *altaica*.

S. foliis cordatis duplicato-dentatis dentibus inferioribus basin respicientibus, racemo terminali composito, pedunculis bi-triflorisque alternis. W.

S. (*altaica*) foliis cordatis ovatis duplicate dentato-serratis, dentibus basin respicientibus, racemo composito, aphylo. *Murr. Comment. goett.* 1781. p. 35. t. 2.\*

Altaische Braunwurz. W.

*Habitat in Sibiriae alpibus Altaicis*. 4 (v. v.)

*Corollae pallidae flavescentes. Racemi terminales in apice ramorum et in dichotomia caulis*. W.

14. SCROPHULARIA *vernalis*.

S. foliis cordatis pubescentibus duplicato-serratis, paniculis axillaribus dichotomis. *Ait. Kew.* 2. p. 342.

S. foliis cordatis, caulinis ternis, pedunculis axillari-

bus folitariis bifidis. *Syst. veg.* 469. *Mill. dict. n.* 13.  
*Hoffm. germ.* 220. *Roth. germ. l.* 266. *ll.* 59.

S. foliis longe petiolatis, cordatis, subhirsutis, petiolis  
in alis ramolis. *Hall. helv. n.* 327.

S. foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichoto-  
mis. *Hort. cliff.* 322. *Hort. upf.* 177. *Roy lugdb.* 293.

S. flore luteo. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 112. *t.* 112. *Riv.*  
*t.* 107.

S. montana maxima latifolia. *Barre! ic.* 273. *bene.*

Lamium pannonicum 2 exoticum. *Clus. hist.* 2. *p.* 38.

β. S. bracteis ad pedunculi divisionem ovatis dentatis flo-  
rum longitudine. W.

Scrophularia vernalis. *Fl. dan. t.* 411.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 98.

Frühlings-Braunwurz W.

*Habitat in Italia, Helvetia, Austria.* ♂ (v. v.)

Folia hirta ut caulis. Corollae ovatae flavae.

*In nostra sunt Folia argute dentata, et Bracteae lineari-lanceolatae subintegerrimae; in varietate β vero, quam ex Hungaria habeo, et quae depicta exstat in Flora danica, Folia sunt obtuse dentata, et Bracteae inferiores ad pedunculi divisionum maximae ovatae dentatae.* W.

#### \*15. SCROPHULARIA arguta.

S. foliis cordatis glabris duplicato-ferratis, paniculis  
axillaribus dichotomis, capsulis acuminatis. *Ait. Kew.*  
*2. p.* 342.

Scharfzähnige Braunwurz. W.

*Habitat in insulis Madera et Teneriffa.* ☉

*Differt a S. vernali: caule foliisque glabris et floribus minoribus rubris.* *Ait. l. c.*

#### 16. SCROPHULARIA trifoliata.

S. foliis glabris: inferioribus ternato-pinnatis obtusis;  
superioribus simplicibus, pedunculis subtrifloris axilla-  
ribus. *Sp. pl.* 865. *Mill. dict. n.* 7.

S. sambucifolia, flore rubro luteo vario pulchro. *Pluk.*  
*alm.* 338. *t.* 313. *f.* 6.

S. subrotundo crallo nigricante folio, flore luteo palli-  
do, capsula turgida. *Bocc. mus.* 2. *p.* 65. *t.* 60.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 99.

Dreyblättrige Braunwurz. W.

*Habitat in Africa, Corfica.* † (v. l.)

17. SCROPHULARIA *sambucifolia*.

S. foliis interrupte pinnatis cordatis inaequalibus, racemo terminali: pedunculis axillaribus geminis dichotomis. *Sp. pl.* 865. *Kniph. cent.* 7. n. 84.

S. foliis difformibus, pedunculis axillaribus aggregatis. *Roy. lugdb.* 202.

S. *sambucifolia*. *Alp. exot.* 203, t. 202. *Mill. dict.* t. 231.

S. foliis laciniatis. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 112.

S. *sambuci* foliis, capsulis maximis. *Morif. hist.* 2. p. 483. f. 5. t. 8. f. 6.

β. S. *lusitanica*, maximo flore, foliis dissectis. *Raj. suppl.* 396.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 99.

Hollunderblättrige Braunwurz. W.

*Habitat in Hispania, Lusitania, Oriente.* 4

Caulis erectus, tetragonus e petiolis in angulos decurrentibus. Folia pinnata: foliolis 5 f. 7, praeter alternas oppositiones minutas, cordatis rugosis, supra glabris, serratis, impari majore. Racemus terminalis ex Pedunculis axillaribus, geminis, brevissimis, subdichotomis: Floribus magnis, purpurascens labio inferiore virescente.

\*18. SCROPHULARIA *mellifera*.

S. foliis glabris, inferioribus interrupte pinnatis, superioribus ternatis, foliolis oblongis, floribus axillaribus. *Vahl. symb.* 2. p. 88.\*

S. foliis pinnatis subinterruptis, foliolis subquinis oblongis, floribus axillaribus, corollae fundo mellifero. *Ait. Kew.* 2. p. 343.

S. glabra, foliis inferioribus pinnatis, foliolis ovatis dentato-serratis, floribus axillaribus, fundo corollae nectarifero. *Desf. atl.* 2. p. 53. t. 143.\*

Honigbringende Braunwurz. W.

*Habitat in Barbaria ad maris littora et ad agrorum limites.* 4 (v. v.)

\*19. SCROPHULARIA *hispida*.

S. foliis pinnatis villosis, foliolo terminali maximo cordato, racemo terminali, caule hispido. W.

S. caule tetragono erecto hispido, foliis pinnatis duplicato-crenatis, lobo terminali cordato maximo, racemo composito aphylo. *Desf. atl.* 2. p. 35.\*

Scharfftielige Braunwurz. W.

*Habitat in fissuris rupium Atlantis prope Tlemfen. 2.*

Caulis erectus simplex vel parce ramosus firmus bipedalis hispidus. Folia opposita breviter petiolata villosa mollia cinerea duplicato-crenata pinnata, pinnulis ovatis paucis, saepe antice excisis subpetiolatis lobo terminali maximo cordato quandoque sublobato. Racemus terminalis aphyllus interruptus octo uncialis et ultra. Racemuli oppositi et alterni hirsuti ramosi. Flores magnitudine S. nodosae. Desf. l. c.

## 20. SCROPHULARIA canina.

S. foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis. *Vir. cliff. 6. Hort. cliff. 322. Roy. lugdb. 294. Sawv. monsp. 247. Kniph. cent. 4. n. 75. Sabb. hort. 2. t. 90.*

S. foliis inferioribus pinnatis, summis integris duplicato-ferratis, racemis axillaribus. *Mill. dict. n. 9.*

S. foliis pinnatis, pinnis lobatis, circumferratis, caule paniculato. *Hall. helv. n. 328.*

S. foliis pinnatis, caule paniculato. *Scop. carn. ed. 1. p. 478. n. 4. ed. 2. n. 778.*

Scrophularia Ruta canina dicta. *Bauh. pin. 236.*

Ruta canina. *Clus. hist. 2. p. 209. Lob. ic. 2. p. 55.*

β. Scrophularia lucida? *Pall. Nov. Act. Petrop. 10. p. 313.*

S. orientalis chrysanthemifolia, flore minimo atropurpureo. *Tournef. cor. 9.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 100.*

Hunds Braunwurz. W.

*Habitat in Helvetia, Narbona, Italia; β in Tauria, Oriente. (v. v.)*

*Pedunculi bifidi: Flores sessiles, primo axillari: reliquis alternis.*

*Varietas β differt foliis minoribus acute profunde dentatis, inferioribus bipinnatifidis, racemulis dichotomis. Forte species distincta. W.*

## 21. SCROPHULARIA lucida.

S. foliis inferioribus bipinnatis subcarnosis glaberrimis, racemis bipartitis. *Syst. Nat. XIII. 414.*

S. foliis bipinnatis glaberrimis lucidis, racemis bipartitis terminalibus. *Sp. pl. 865. Mill. dict. n. 11.*

S. foliis filicis modo laciniatis f. Ruta canina latifolia. *Bauh. pin. 236.*

*S. saxatilis lucida, laserpitii massiliensis folio.* *Bocc. mus.* 2. p. 166. t. 117.

*S. glauco folio in amplas lacinias diviso.* *Tournef. cor.* 9. it. 1. p. 84. t. 85.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 101.

Glänzende Braunwurz. W.

*Habitat in Oriente, Creta, Neapoli, in ipsiis muris Hydrunti.* 4 (v. v.)

*Caulis teres rectus viridis. Folia simillima S. caninae, sed subcarnosa. Racemus rigidus, erectus. Corollae pallidae labio superiore rubro.*

*Scrophulariam foliis filicis modo laciniatis. Bauh. distinctam speciem esse monet Millerus eamque dicit: Scroph. (filicifoliam) foliis pinnatis, foliolis acute dentatis, racemis terminalibus. Mill. dict. n. 10. R.*

\*22. *SCROPHULARIA variegata.* †

*S. caulibus basi lignescentibus, foliis bipinnatifidis pubescentibus, racemis elongatis, pedicellis brevibus villis glochidibus hirtis.* *Marschall ab Biberstein casp.* p. 116. n. 20.

Bunte Braunwurz. W.

*Habitat in collibus sterilibus lapidosis versus mare Caspium.* ‡ 4

23. *SCROPHULARIA chinensis.*

*S. foliis ovato-oblongis serratis pubescentibus.* *Mant.* p. 250.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 102.

Chinesische Braunwurz. W.

*Habitat in China.*

*Caulis erectus, quadrifurcatus, obtusus, subpubescens, brachiatus, bipedalis. Folia opposita, petiolata ovato-oblonga s. lanceolato-oblonga, obtuse serrata, subpubescentia, mollia; figura Tanacetii Balsamitae. Racemi terminales, longissimi, simplices: Bractea sub singulo pedicello, cordata, brevis; argute serrata. Flores solitarii. Capsulae compressae.*

24. *SCROPHULARIA meridionalis.*

*S. foliis oblongo-ovatis serratis glabris, pedunculis unifloris.* *Lin. suppl.* 280.

Mittägige Braunwurz. W.

*Habitat in Nova Granada. D. Mutis.*

Caulis quadrangulus herbaceus, ramis oppositis. Folia opposita petiolata ovata s. parum oblongiora laevia aequaliter serrata petiolis longiora. Racemi terminales solitarii. Bractae foliaceae sed minores, saepius integerrimae remotae, inferiores oppositae, superiores alternae. Pedunculi uniflori aphylli flore longiores. Corollae ovatae magnitudine S. sambucinae.

## 25. SCROPHULARIA coccinea.

S. foliis quaternis ovatis, floribus verticillatis spicatis. Sp. pl. 866. Roy. lugdb. 294. Mill. dict. n. 18.

S. flore coccineo, foliis urticae quaternis caulem ambientibus. Houtt. ms.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 102.

Scharlachrothe Braunwurz. W.

Habitat in Vera Cruce.

## 26. SCROPHULARIA peregrina.

S. foliis cordatis lineatis lucidis, pedunculis axillaribus bifloris, caule sexangulari. Mant. 418.

S. foliis cordatis: superioribus alternis, pedunculis axillaribus bifloris. Spec. pl. 2. p. 866. Hort. cliff. 322. Roy. lugdb. 293. Gouan. monsp. 304. Mill. dict. n. 14.

S. urticae folio. Bauh. pin. 236.

S. peregrina. Cam. hort. 157. t. 43.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 103.

Fremde Braunwurz. W.

Habitat in Italia. ☉ (v. v.)

Caulis atropurpureus, acutangulus: angulis 4, 5 f.

6. Pedunculi 2-5-flori. Corolla purpurea.

Folia superiora sunt saepius integerrima. W.

## 1153. C E L S I A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1015.

Cal. 5-partitus. Cor. rotata. Filamenta barbata. Caps. 2-locularis.

## I. CELSIA orientalis.

C. foliis bipinnatis. Hort. cliff. 321. Hort. upf. 179. t. 1. Roy. lugdb. 301. Mill. dict.

Verbascum orientale, sophiae folio. Tournef. cor. 8. Buxb. cent. 5. p. 17.

- Blattaria orientalis*, agrimoniae folio. *Buxb. cent.* 1.  
*p.* 4. *t.* 20.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 104.  
 Orientalische Cellie. W.  
*Habitat in Cappadocia, Armenia.* ☉ (v. v.)

## 2. CELSIA *Arcturus*.

- C. foliis radicalibus lyratis, superioribus oblongis, pedicellis bracteis longioribus, foliolis calycinis linearibus integerrimis.* *Vahl. symb.* 3. *p.* 79.  
*C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, pedunculis flore longioribus.* *Syst. Veg.* *p.* 469.  
*Verbascum (Arcturus,) foliis lyrato-pinnatis.* *Sp. pl.* 2.  
*p.* 254.  
*Verbascum humile creticum laciniatum.* *Bauh. pin.* 240.  
*Verbascum brassicae folio.* *Colum. ecphr.* 2. *p.* 81. *t.* 82.  
*Verbascum sylvestre creticum.* *Alp. exot.* 123. *t.* 122.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 104.  
 G-stielte Cellie. W.  
*Habitat in Creta.* ♂ (v. v.)

*Folia opposita in mea (Auctorum vero alterna); infima pinnata s. sublyrata: foliolis lateralibus minutis; superiora simplicia. Floralia sessilia, cordata, serrato-dentata. Racemus terminalis, longus. Pedunculi solitarii, uniflori, foliis floralibus longiores. Corollae flavae. Filamenta 4 barba purpurea.*

*Folia superiora petiolata dentata. Bractee subrotundae.* *Vahl. l. c.*

## \* 3. CELSIA *coromandelina*.

- C. foliis radicalibus lyratis, superioribus ovatis, bracteis pedicellis longioribus, calycibus lineari-oblongis integerrimis.* *Vahl. symb.* 3. *p.* 79. \*  
 Coromandelische Cellie. W.  
*Habitat in India orientali.* ☉ (v. v.)

*Planta a C. cretica diversa: pedunculis bracteis duplo longioribus, floribus distantibus magnitudine C. Arcturi, foliolis calycinis linearibus integerrimis.* *Vahl l. c.*

## 4. CELSIA *cretica*.

- C. foliis radicalibus lyratis, superioribus oblongis, floribus subsessilibus longitudine bractearum, calycibus ovatis serratis.* *Vahl. symb.* 3. *p.* 80.



*C. foliis radicalibus lyratis, caulinis subcordatis amplexicaulibus, floribus subsessilibus. Lin. suppl. 281. \* Mill. ic. 182. t. 273.*

*C. foliis inferioribus lyratis; superioribus ovatis amplexicaulibus. Syst. Veg. p. 469.*

*Blattaria perennis cretica incana, foliis binis conjugatis.*

*Morif. hist. 2. p. 488.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 105.*

*Crétifche Cellie. W.*

*Habitat in Creta et Africa boreali. ♂ (v. v.)*

*Folia pinnato-lyrata, alterna: superiora simplicia cordato-amplexicaulia. Flores sessiles. Calyces serrati. Filamenta 4: duobus superioribus pilosis, inferioribus laevibus antherisque majoribus. Corollae flavae fundo superiore maculis 2 ferrugineis.*

*Folia radicalia et inferiora lyrato-pinnata, superiora oblonga petiolata erosa, suprema cordata amplexicaulis. Bractee cordatae attenuatae serratae. Flores breviter pedicellati. Corolla magna. Vahl. l. c.*

#### \*5. CELSIA betonicifolia.

*C. foliis ovato-oblongis rugosis crenatis, bracteis lanceolatis pedicello brevioribus. Desf. atl. 2. p. 58.*

*Blattaria hispanica maximo flore. Dodart. ic. Shaw. afr. n. 78.*

*Betonienblättrige Cellie. W.*

*Habitat in arvis incultis Algeriae. ♂*

*Caulis erectus bi-f. tripedalis subhirsutus ramosus, quandoque simplex. Rami virgati floriferi. Folia alterna glabra aut vix hirsuta ovato-oblonga seu lato-lanceolata obtusa crenata, basi saepe pinnata, foliolis parvis subrotundis vel ovatis, caulina media et superiora sessilia, caulem amplectentia lanceolata dentata acuta. Flores in racemum dispositi pedicellati. Bractee lanceolatae, inferne dentatae, apice subulatae, pedicello duplo triplove breviores. Calyx persistens quinquepartitus, laciniis ovatis subaequalibus acutis, margine serratis aut integris. Corolla lutea rotata, lobis rotundatis, duobus superioribus minoribus, basi macula atropurpurea pictis. Filamenta duo superiora breviora hirsuta; inferiora glabra declinata sursum incurva. Stylus persistens filiformis. Capsula subrotunda bivalvis calyce tecta. Folia inferiora nonnunquam margine sinuata observavi. Desf. l. c.*

## 1154. H E M I M E R I S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1016.*

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata, lacinia una major obcordata. *Fossula* laciniarum nectarifera. *Filamenta* glabra. *Capsula* 2-locularis, loculo altero gibbiflore.

1. HEMIMERIS *montana*.

*H. diandra*, foliis oppositis ovatis serratis, caule erecto.  
*Lin. suppl.* 280.

*Paederota racemosa.* *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 5. p. 89. t. 38. f. 1.

*Alline chamaedrios* foliis bijugis *Spergulae* floribus aethiopica. *Pluk. almag.* 9. t. 331. f. 3.

Berg-Halbblume. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* (v. f.)

2. HEMIMERIS *fabulosa*.

*H. diandra*, foliis oppositis pinnatifidis, caule prostrato.  
*Lin. suppl.* 280.

Sand-Halbblume. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

3. HEMIMERIS *diffusa*.

*H. didynama*, foliis alternis oppositisque pinnatifidis, caule patulo. *Lin. suppl.* 280.

*Paederota (bonae spei)* foliis pinnatifidis. *Sp. pl.* 20. *Amoen. acad.* 6. afr. 1. \*

*Veronica africana*, floribus ad genicula pedicellis biuncialibus. *Herm. afr.* 783. *Pluk. phytog.* 320. f. 5.

*Anagallis* foliis sinuatis. *Roy. lugdb.* 416.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 5. p. 87.

Ausgebreitete Halbblume. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Forte varietas prioris.*

\*4. HEMIMERIS *urticifolia*. W.

*H. didynama*, foliis ovatis dentatis oppositis, floralibus alternis, caule frutescente. W.

*Celia (urticaefolia)* caule frutescente, foliis ovato-lanceolatis serratis. *Curt. mag.* t. 417.

Nesselblättrige Halbblume. W.

*Habitat in America australi.* † (v. v)

Folia *petiolata ovata dentata*. Flores *coccinei frequentis in racemo terminali*. Pedunculi *longi alterni*. W.

\* 5. HEMIMERIS *coccinea*.

H. *didynama*, foliis *ternis linearibus remote denticulatis*, caule *frutescente*. W.

*Celsia (linearis)* foliis *lineari-lanceolatis*. *Jacq. ic. 3. t. 497. Collect. 2. p. 270.\* Wendl. obs. 26.\**

Scharlachfarbene Halbblume. W.

*Habitat in America australi.* ♀ (v. v.)

Folia *terna linearia vel lineari-lanceolata glabra, remotissime denticulata*. Pedunculi *terui longi filiformes axillares*. Corolla *coccinea fundo atro*. Variat foliis et pedunculis *oppositis*. W.

1155. DIGITALIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1017.*

*Cal. 5-partitus. Cor. campanulata, 5-fida, ventricosa. Caps. ovata, 2-locularis.*

I. DIGITALIS *purpurea*.

D. *calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro*. *Hort. upf. 178. Mill. dict. n. 1. Pollich. pal. n. 598. Flor. dan. t. 74. Kniph. cent. 3. n. 37. Blackw. t. 16. Hoffm. germ. 220. Roth. germ. I. 266. II. 59.*

D. *foliolis calycinis ovatis*. *Hort. cliff. 318. Dalib. parif. 192. acuminatis. Roy. lugdb. 292. Gort. gelr. 371.*

D. *foliis calycinis ovatis, galea integra*. *Hall. helv. n. 330.*

D. *purpurea, folio aspero*. *Bauh. pin. 243. Knorr. del. 1. t. F. 10.*

D. *purpurea. Dod. pempt 168. Riv. t. 104.*

β. *Digitalis albo, folio aspero*. *Bauh. pin. 229. Vaill. p. 80. Knorr. del. 1. t. F. 9.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 106.*

Rother Fingerhut. W.

*Habitat in Europae australioris montibus.* ♂ (v. v.)

Corollae *venter intus adpersus maculis ocellaribus*.  
Folia *rugosa*.

## 2. DIGITALIS minor.

D. corollis obtusis: labio superiore subbilobo, foliis laevibus. *Mant.* 567.

D. hispanica purpurea minor. *Tournef. inst.* 165.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 107.

Niedriger Fingerhut. W.

*Habitat in Hispania.* 4 (v. l.)

Caulis laevis, praecedente dimidio brevior. Pedunculi villosi. Folia sessilia, lanceolata, non rugosa, laevia, subintegerrima. Flores simillimi *D. purpureae* figura, magnitudine, colore, sed puncta copiosiora palati absque iride pallido. Labium superius profundius bilobum; Lab. inferius obtusissimum; lateralia reflexa. Antherae punctis ferrugineis.

## 3. DIGITALIS Thapsi.

D. foliis decurrentibus. *Sp. pl.* 867. *Mill. dict. n.* 2.

D. hispanica purpurea minor. *Tournef. inst.* 165.

D. verbasci folio, purpurea minor perennis hispanica. *Barr. ic.* 1185.

D. angusto verbasci folio, montana. *Bocc. mus.* 2. p. 107. t. 85.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 108.

Geflügelter Fingerhut. W.

*Habitat in Hispania.* 4 (v. l.)

Facies *D. purpureae*. Folia tomentosa, venosa, ferrata: inferiora lanceolato-ovata; superiora lato-lanceolata; omnia decurrentia et lateribus decurrentibus reflexa. Racemus et Flores *D. purpureae*. Corolla purpurea fauce pallida punctis sanguineis sparsis; Limbus quadrifidus: lobo superiore indiviso; inferiore longiore ciliato. *Anne Filia Digitalis purpureae e Verbasco Thapso?*

## \*4. DIGITALIS parviflora.

D. calycinis foliolis lanceolatis obtusis, corollis obtusis, lacinia infima villosa, foliis linearibus integerrimis margine lanatis. W.

*Digitalis parviflora.* *Jacq hort. t.* 17.

Kleinblütiger Fingerhut. W.

*Habitat* - - - - ♂ (v. v.)

Caulis simplex. Folia linearia integerrima margine alba lanato. Flores omnium minimi ferrugineo-flavescentes, foliis floralibus breviores. W.

5. *DIGITALIS lutea.*

*D. calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis; labio superiore bifido.* Hort. upf. 178. Mill. dict. n. 3. Gmel. fib. 3. p. 193. Crantz. austr. 354. Scop. carn. n. 779. Jacq. hort. t. 105. Hoffm. germ. 220. Roth, germ. II. 60.

*D. foliis calycinis subulatis, floribus imbricatis.* Hort. cliff. 318. Roy. lugdb. 293. Dalib. paris. 192.

*D. foliis calycinis lanceolatis, galea bifida, floribus immaculatis.* Hall. helv. n. 332.

*D. flore minore subluteo, angustiore folio.* Bauh. hist. 2. p. 814.

*D. major lutea f. pallida, parvo flore.* Bauh. pin. 224. Sabb. hort. 2. t. 88.

*D. lutea, minore flore.* Moris. hist. 2. p. 479. f. 5. t. 8. f. 5. Riv. t. 105.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 109.

Gelber Fingerhut. W.

Habitat in Galliae, Italiae sabulosis. 4 (v. v.)

Spica apice ab initio nutat.

6. *DIGITALIS ambigua.*

*D. calycinis foliolis lanceolatis, corollis galea emarginatis, foliis subtus pubescentibus.* Linn. suppl. 280.

*D. corollarum labio emarginato, foliis subtus pubescentibus.* Murray. prodr. 62.\* Leers. herb. n. 487.\* Mill. dict. n. 4. Hoffm. germ. 221. Roth. germ. I. 267. II. 60.

*D. foliis calycinis lanceolatis, galea incisa, faucibus maculosis.* Hall. helv. n. 331.

*D. ochroleuca.* Jacq. I. p. 36. t. 57.

*D. lutea.* Pollich. pal. n. 599. Mattusch. sil. n. 471. Kniph. cent. 6. n. 36. Crantz. austr. p. 356. obs. 3.

Reyg. flor. ged. tom. 2. p. 106. R.

*D. purpurea.* Gmel. tub. p. 194. R.

*D. lutea magno flore.* Bauh. pin. 224. Riv. monop. 104. Besl. exst. aest. I. f. 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 109.

Blasgelber Fingerhut. W.

Habitat in Austriae, Helvetiae, Germaniae umbrosis. 4 (v. v.)

A praecedente diversa: magnitudine omnium partium, corollis quadruplo majoribus, magnitudine *D. purpureae*, inflatis. W.

7. DIGITALIS *ferruginea*.

D. calycinis foliolis oblongis obtusissimis glabris, corollae lobis lateralibus labii inferioris acutis, intermedio oblongo hirsuto concavo, floribus distantibus, bracteis lanceolatis glabris calycis longitudine. W.

D. calycinis foliolis ovatis obtusis patentibus, corollae labio inferiore barbato *Syst. Veg. p. 470. Mill. dict. n. 5. Sabb. hort. 2. t. 86.*

D. foliolis calycinis ovatis obtusis, corollis villosis; labio longissimo. *Buttn. cunon. 226.*

D. foliolis calycinis ovatis obtusis. *Roy. lugdb. 292.*

D. angustifolia, flore ferrugineo. *Bauh. pin. 244. Riv. mon. 98.*

D. latifolia, flore ferrugineo. *Morif. hist. 2. p. 478. f. 5. t. 8. f. 2. n. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 110.*

Rostfarbener Fingerhut. W.

*Habitat in Italia. 4 (v. f.)*

Caulis strictus, laevis, sexpedalis. Folia sessilia lanceolata, laevia, lineata, integerrima. Racemus e singulis alis supremis, erectus. Bracteae lineari lanceolatae, reflexae. Pedicelli brevissimi, solitarii. Calycis folia superiora 3 approximata. Corolla ventricosa, inferne gibba, calyce paulo longior, pubescens, intus lutescens: laciniis 2 superioribus obsoletis; lateralibus acutis; infima longiore, barbata. Stamina flexuosa, absque rudimento quinti. Stylus longitudine floris.

*Digitalis angustifolia flore ferrugineo. Morif. hist. 2. f. 5. t. 8. f. 3. pertinent forte ad sequentem. W.*

\*8. DIGITALIS *orientalis*.

D. calycinis foliolis oblongis acutis pubescentibus, corollae lobis lateralibus labii inferioris obtusissimis, intermedio spathulato ciliato plano, floribus distantibus, bracteis oblongis pubescentibus calyce brevioribus. W.

D. (*orientalis*) foliolis calycinis lanceolatis pubescentibus, corollae labio inferiore maximo spathulato. *Lamarek. encycl. 2. p. 278.\**

D. *orientalis* tragopogi folio, flore albido. *Tournef. cor. 9.* Orientalischer Fingerhut. W.

*Habitat in Armenia, Galatia. (v. f.)*

Caulis bipedalis et ultra superne ramosus. Folia linearia lanceolata integerrima tri- vel quinquenervia glabra. Flores racemosi alterni distantes. Bracteae ob-

*longo-lanceolatae acutae pubescentes calyce breviores reflexae. Calycis foliola pubescentia oblonga acuta, superius reliquis brevius et angustius. Corolla facie praecedentis externe pubescens, ventricosa, inferne gibba; laciniis binis superioribus brevissimis acutis, binis lateralibus rotundatis obtusissimis, infima spathulata obtusa, margine tenuissime ciliata, elongata. Capsula oblonga rostrata pubescens. W.*

\*9. **DIGITALIS lanata.**

D. calycinis foliolis lanceolatis lanatis, corollae lobis lateralibus labii inferioris acutis, intermedio oblongo glabro plano, floribus dense spicatis confertis, bracteis lanceolatis calyce longioribus lanatis. W.

D. (*lanata*) foliis fere integerrimis, caula herbaceo subangulato glabro, racemis et bracteis lanatis, floribus astitichis, calycibus lanatis patentibus, laciniis lanceolatis distantibus, corollae labio superiore acutiusculo, inferiore subreflexo, pistillo lanato. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 152.

*Digitalis (ferruginea γ)* floribus sessilibus dense spicatis, calycibus margine tomentosis. *Lamarck. encycl.* 2. p. 277.\*

D. lutea non ramosa scorzonerae folio. *Buxb. cent.* 5. p. 25. t. 49.

Wolliger Fingerhut. W.

*Habitat in collibus apricis Hungariae, Graeciae.* 4 (v. v.)

*Differt a binis praecedentibus et praecipue a D. ferruginea exceptis notis indicatis: caule simplici, floribus congestis spicatis, rachi spicae, bracteis et calycibus lanatis. Ceterum Folia sunt lanceolata integerrima et uti caulis glabris. W.*

10. **DIGITALIS obscura.**

D. foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris basi adnatis. *Mant.* 418. *Jacq. hort* 1. p. 40. t. 91.

D. hispanica angustifolia, flore nigricante. *Tournef. inst.* 166.

D. angustifolia hispanica. *Bocc. mus.* 2. p. 136. t. 98. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. III.

Dunkler Fingerhut. W.

*Habitat in Hispania.* 4 (v. l.)

*Caulis suffruticosus lignosus; Rami oppositi, pauci.*

Folia angusto-lanceolata, basi quasi adnata, glabra, ubi non floret conferta, alias alterna. Racemi terminales. Bracteae lanceolatae. Calyx foliolis ovatis, acutiusculis, patulis. Corollae cernuae, obtusae, intus flavescens fundo reticulato-rufo; extus pallide rufae, praesertim dorso. Labium superius semibifidum recurvum; inferius tripartitum media paulo longiore.

## II. DIGITALIS canariensis.

D. calycinis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso. *Sp. pl.* 868. *Mill. dict. n.* 6. et *ic. t.* 120. *Fabric. helmst. p.* 208.

Gesneria foliis lanceolatis ferratis, pedunculo terminali laxe spicato. *Hort. cliff.* 318.

Digitalis acanthoides canariensis frutescens, flore aureo. *Comm. hort.* 2. *p.* 105. *t.* 53.

Digitali affinis canariensis, solidaginis acutis foliis leviter pilosis, flore aureo cucullato. *Pluk. alm.* 40. *t.* 325. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 112.

Canariſcher Fingerhut. W.

Habitat in Canariis. † (v. f.)

## 12. DIGITALIS Sceptrum.

D. calycinis foliolis subulatis, bracteis linearibus floribus longioribus, corollis obtusis, foliis ellipticis ferratis, caule fruticoso. *Ait. Kew.* 2. *p.* 346.

D. fruticosa, foliis oblongis spathulatis ferratis, spicis terminalibus ovatis pedunculatis, coma bractearum terminatis, calycinis foliolis subulatis, corollis quadrifidis. *Lin. suppl.* 282.

Schopfftragender Fingerhut. W.

Habitat in sylvis umbrosis Maderae. † (v. v.)

Planta speciosissima. Rami hirti. Folia approximata subpedalia sessilia, a basi sensim dilatata oblonga, in medio serrata acuminata, supra glabra, subtus hirta et albicantia. Pedunculus ramum terminans solitarius teres erectus palmaris vel ultra, intus porosus, terminatus in spicam ovatam floribus dependentibus. Bracteae lineares flore longiores et ante explicationem florum comam spicae formantes. Laciniae calycinae subulatae hirsutae. Corollae fere magnitudine D. ferrugineae, infra gibba. Limbus quadrifidus, labio obtuso.



## \*1156. INCARVILLEA.

*Juss. gen. ed. Ust. p. 154.*

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* tubulosa, fauce ventricosa 5-fida, inaequalis. *Antherae* 2 biaristatae 2 muticae. *Siliqua* 2-locularis. *Semina* membranaceo-alata.

\*I. INCARVILLEA *finensis.*

*I. finensis.* *Lamarck encyc. t. 3. p. 233. Juss. gen. ed. Ust. p. 154.\**

Chinesische Incarvillea. W.

*Habitat in China.*

*Caulis herbaceus pedalis ramosus striatus. Folia Chelidonii hybridi, pinnato-lacera, alterna petiolata glabra. Flores Digitalis, laxe spicati, terminales purpurei.* W.

## 1157. BIGNONIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1018.*

*Cal.* 5-fidus, cyathiformis. *Cor.* fauce campanulata, 5-fida, subtus ventricosa. *Siliqua* 2-locularis. *Sem.* membranaceo-alata.

\* *Foliis simplicibus.*I. BIGNONIA *Catalpa.*

B. foliis simplicibus cordatis ternis, caule erecto, floribus diandris. *Sp. pl. 868. Mill. dict. n. 2. Du Roi. herb. I. p. 114. Wangenh. amer. p. 58. t. 20. f. 45. Willd. arb. 46. Thunb. jap. 251.*

B. foliis simplicibus cordatis. *Hort. cliff. 317. Roy. lugdb. 289.*

B. foliis simplicibus cordatis, caudice erecto, feminibus membranaceo-alatis. *Ait. Kew. 2. p. 346.*

B. americana, arbor syringae caeruleae folio, flore purpureo. *Duham. arb. I. p. 104. t. 41.*

B. urucu foliis, flore sordide albo intus maculis purpureis et luteis adsperso, siliqua longissima et angustissima. *Catesb. car. I. p. 49. t. 29.*

*Catalpa bignonioides. Walt. carol. p. 64.*

*Kawara Filagi. Kaempfer amoen. 841. t. 842.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III. T*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 109.*

Gemeine Trompetenblume. W.

*Habitat in Japonia, Carolina. ‡ (v. v)*

*Arbor erecta. Folia ternata. Cirrhi nulli. Flores dian-*  
*dri: staminibus duobus antheriferis; reliquis duobus*  
*castratis. Variat foliis cordatis et ovatis.*

\*2. *BIGNONIA longissima.*

B. arborea, foliis simplicibus oblongis acuminatis ternis,  
floribus diandris, filiquis filiformibus, seminibus lana-  
tis. *Swartz. prod. 91.*

B. foliis simplicibus oblongis acuminatis, caudice erecto,  
seminibus lanatis. *Ait. Kew. 2. p. 347.*

B. foliis simplicibus ovatis, caule erecto, floribus dian-  
dri. *Jacq. amer. 182. t. 176. f. 78.\**

B. (*Quercus*) foliis simplicibus ovato-lanceolatis undu-  
latis ternis, caule erecto, floribus diandris. *Lamarck*  
*encycl. 1. p. 412.\**

B. arborea, foliis ovatis verticillato-ternatis, filiqua gra-  
cili longissima. *Brown. jam. 264.*

B. arbor, folio singulari undulato, filiquis longissimis et  
angustissimis. *Plum. spec. 5. ic. 57.*

Langfrüchtige Trompetenblume. W.

*Habitat in India occidentali. ‡*

\*3. *BIGNONIA tomentosa.*

B. foliis simplicibus cordatis tomentosis, floribus axilla-  
ribus paniculatis. *Thunb. jap. 252.\**

Too vulgo Kiri. *Kaempf. amoen. p. 859. t. 860.\**

Filzige Trompetenblume. W.

*Habitat in Japonia. ‡*

*Caulis arboreus. Folia opposita petiolata, inferiora*  
*cordata superiora ovata acuta quinquenervia integer-*  
*rima, supra pubescentia subtus tomentosa, palmaria*  
*et ultra, superioribus minoribus. Petiolus digitalis et*  
*ultra. Panicula primum trichotoma dein dichotoma.*  
*Pedunculi Pedicelli et Calyces tomentosi. Thunb. l. c.*

\*4. *BIGNONIA linearis. †*

B. foliis simplicibus linearibus acuminatis, floribus ter-  
minalibus subumbellatis, caule erecto. W.

B. (*linearis*) caule fruticoso, foliis sparsis subternis li-  
nearibus acutissimis. *Cavan. ic. 3. p. 35. t. 269.\**

Linienblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat . . . . ‡.*

*Caulis quadripedalis fruticosus erectus. Folia linearia utrinque attenuata triuncialia angustissima glabra. Flores rosei terminales subumbellati plerumque quatuor nutantes. Calyx bi-tri f. quadripartitus. Corollae limbus undulatus. Rudimentum filamenti quinti intra breviora. Fructus ignotus. W.*

\*5. *BIGNONIA sempervirens.*

B. foliis simplicibus lanceolatis, pedunculis unifloris axillaribus, caule volubili. W.

B. foliis simplicibus lanceolatis, caule volubili. *Sp. pl.* 869. *Mill. dict. n.* 7.

B. foliis ovato-lanceolatis conjugatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 291.

Gelseminum f. lasminum luteum odoratum virginianum scandens sempervirens. *Catesb. car.* 1. p. 53. t. 53. *Raj. hist.* 1769. *Seligm. av.* 3. t. 6.

*Syringa volubilis virginiana, myrti majoris folio, alato semine, floribus odoratis luteis. Pluk. alm.* 359. t. 112. f. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 57.

Immergrüne Trompetenblume. W.

*Habitat in Virginia, †*

*Folia opposita. Siliquae cordatae, simplices.*

\*6. *BIGNONIA tenuifiliqua.*

B. foliis simplicibus lanceolatis glabris integerrimis, paniculis terminalibus. *Vahl. eclog.* 2. p. 43.

Dünnschotige Trompetenblume. W.

*Habitat in America meridionali. †*

*Caulis scandens. Rami teretes tenues fusci albido-punctati glabri. Folia petiolata opposita bi-sive tripollicaria, pollicem lata lanceolata, saepe acumine semiunguiculari terminata, acuta utrinque glabra obscure venosa. Petioli filiformes sesquipollicares glabri. Panicula terminalis ramorum. Pedunculi filiformes teretes 4-f. 5. pollicares, partiales sesquipollicares, infimi saepe terni, superiores oppositi, semel vel bis dichotomi. Pedicelli uniflori. Calyx glaber deciduus. Corolla sesquipollicaris glabra. Legumina sesquipedalia linearia vix semiunguem lata glabra, extus striata. Vahl. l. c.*

\*7. *BIGNONIA cassinoides.*

B. foliis simplicibus ellipticis coriaceis, racemo terminali. *Vahl. symb.* 2. p. 68.

B. foliis simplicibus ovatis integerrimis coriaceis, racemis terminalibus brevissimis paucifloris. *Lamarck, encycl.*

I. p. 413.\*

Callineartige Trompetenblume. W.

Habitat in Brasilia prope Rio de Janeiro. †

*Facies Echitidis.* Rami cortice cinereo, superne alternatim compressi, sub foliis dilatati. Folia opposita petiolata bipollicaria glaberrima nitida multinervia, margine parum reflexa, acumine parvo terminata integerrima. Petiolus brevissimus. Racemus terminalis erectus pollicares 5-vel 6-florus. Calyx bifidus, laciniis oblongis glabris. Corolla magna bipollicaris glabra. Vahl. l. c.

\*8 *BIGNONIA obtusifolia.*

B. foliis alternis simplicibus ovato-oblongis obtusis integerrimis, corymbo parvo terminali. *Lamarck, encycl.* I. p. 413.

Stumpfblättrige Trompetenblume. W.

Habitat in Brasilia. †

*A reliquis ob folia alterna diversa.* Rami cortice cinerei. Folia alterna conferta ovato-oblonga obtusa integerrima, basi in petiolum attenuata. Flores magni in corymbo parvo terminali. Calyx brevis quadrilobus inaequalis. Corolla tubulosa, limbo quadrilobo inaequali reflexo. *Lamarck.* l. c.

\*9. *BIGNONIA microphylla.*

B. foliis simplicibus obovatis obtusis, pedunculo subtrifloro terminali. W.

B. (*microphylla*) foliis simplicibus obovatis obtusis integris minimis, floribus subracemosis. *Lamarck, encycl.*

I. p. 413.\*

B. arbor buxi folio tenuiore. *Plum. spec.* 5. ic. 55. f. 2. Kleinblättrige Trompetenblume. W.

Habitat in Hispaniola. †

Frutex magnitudine *Pruni spinosae*. Folia sessilia obovata obtusa unguicularia. Flores magni albi limbo undulato f. 3 in pedunculo terminali. W.

\* \* Foliis conjugatis.

10. *BIGNONIA Unguis.*

B. foliis conjugatis cirrhois, foliolis ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus unifloris. W.

B. foliis conjugatis: cirrho brevissimo arcuato tripartito.  
*Sp. pl.* 869. *Mill dict.* n. 5.

B. americana, capreolis aduncis donata, filiqua longissima. *Tournef. inst.* 164.

Gelsemium indicum hederaceum tetraphyllum, folio subrotundo acuminato. *Sloan. jam.* 90. *hist.* I. p. 208.

Clematis quadrifolia, flore digitalis luteo, claviculis aduncis. *Plum. amer.* 80. t. 94.

Clematis myrsinites, amplioribus foliis, americana tetraphyllos. *Pluk. alm.* 109. t. 163. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 58.

Klaunenförmige Trompetenblume. W.

*Habitat in Barbados, Domingo.* † (v. l.)

\*11. BIGNONIA *flaminea*.

B. foliis conjugatis cirrhosis, foliolis oblongis, pedunculis axillaribus unifloris, staminibus stylisque corolla longioribus. W.

B. foliis conjugatis cirrhosis, foliolis ovatis, staminibus corolla longioribus. *Lamarck. encycl.* I. p. 416.\*

B. bifolia scandens, flore ex luteo purpurascente inodoro, fructu ovato duro. *Plum. spec.* 5. ic. 56. f. 2.

Langfädige Trompetenblume. W.

*Habitat in Hispaniola.* †

*Cirrus longus simplex convolutus. Differt a reliquis staminibus corolla longioribus, styloque longissimo clavato.* W.

12. BIGNONIA *aequinoctialis*.

B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris, filiquis linearibus. *Sp. pl.* 869. *Mill. dict.* n. 6. *Sebb. hort.* 2. t. 85.

B. bifolia scandens, filiquis latis et longioribus, semine lato. *Plum. spec.* 5. ic. 55. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 59.

Cajennische Trompetenblume. W.

*Habitat in Cajenna.* †.

\*13. BIGNONIA *alliacea*.

B. foliis conjugatis, foliolis ellipticis integris coriaceis, pedunculis quinquefloris axillaribus, calycibus integris. *Swartz. prod.* 91.

B. (*alliacea*) foliis geminatis cirrhosis, foliolis amplis ovatis integris utrinque acutis. *Lamarck. encycl.* I. p. 416.\*

B. scandens foliis citrei, Allium redolens. *Barr. aequin.*  
23. *Aubl. guj.* 2. p. 654.  
Knoblauchduftende Trompetenblume. W.  
*Habitat in sylvis Gujanae, Cajennae.* †

\*14. *BIGNONIA spectabilis.*

B. foliis conjugatis cirrhosis, foliis ovato-oblongis acuminatis obtusis, floribus racemosis glabris, calyce integerrimo. *Vahl. symb.* 3. p. 80.\*

Ansehnliche Trompetenblume. W.

*Habitat in insula St. Crucis.* † (v. f.)

*Cirrus inter folia simplex. Racemus terminalis brevis, cum ramulis binis oppositis, bipollicaris. Pedicelli duo infimi triflori, reliqui uniflori. Bractea setacea ad basin singuli pedicelli. Calyx parvus campanulatus glaber, margine integro. Corolla tripollicaris subcoriacea glabra purpurea, laciniis obovatis. Antherae glabrae. Sigma oblongum. In B. aequinoctiali Antherae hirsutae et Pedunculi quini.* *Vahl.* l. c.

\*15. *BIGNONIA laurifolia.*

B. foliis conjugatis oblongis glabris, racemis terminalibus, ramis dichotomis, corollis extus tomentosis mollissimis. *Vahl. eclog.* 2. p. 44.\*

Lorbeerblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in Cajenna.* †

*Cirri nulli, saltem in speciminibus, quae coram habeo.* *Vahl.* l. c.

\*16. *BIGNONIA rigescens.*

B. foliis conjugatis cirrhosis, foliolis ellipticis retusis, floribus racemosis, pedunculis trifloris, calycibus dentatis. W.

B. foliis conjugatis cirrhosis, foliolis ovatis rigescentibus, floribus racemosis, pedunculis trifloris. *Jacq. hort.*

*Schönb.* 2. p. 44. t. 210.\*

Steifblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat ad Caracas.* †

*Foliola uncialia. Cirrus simplex brevissimus. Calyx campanulatus brevissime quinque-dentatus. Corolla alba subincarnata, interne flava, tubo incurvato, laciniis limbi obcordatis.* W.

\*17. *BIGNONIA lactiflora.*

B. foliis conjugatis cordato-ovatis glabris, racemis infer-

ne foliosis, calycibus limbo simplici integerrimo. *Vahl symb. 3. p. 80. t. 66.\**

Milchfarbene Trompetenblume. W.

*Habitat in insula St. Crucis. ʒ (v. l.)*

*Caulis scandens. Rami glabri striati. Folia petiolata. Foliola bipollicaria et ultra petiolata acuminata venoso-reticulata, utrinque glabra, integerrima. Cirrhus trifidus. Racemus terminalis, interdum gemini. Pedicelli oppositi, inferiores triflori. Folium petiolatum utrinque ad basin pedicellorum inferiorum oblongum. Calyx campanulatus integer brevis glaber. Corolla sesquipollicaris lactea, junior extus tenuissime villosotomentosa. Siliqua lanceolata bipollicaris glabra, utrinque acuta. Vahl l. c.*

*Folia superiora sunt absque cirrhis. W.*

18. *BIGNONIA paniculata.*

B. foliis conjugatis cordato-ovatis, floribus racemosis, calycibus limbo duplici. *Vahl symb. 3. p. 80.*

B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-ovatis, floribus racemosis, pedunculis trifloris. *Sp. pl. 869. Jacq. amer. 183. t. 116. Mill. dict. n. 10.*

B. bifolia scandens, flore violaceo odoro, fructu ovato duro. *Plum. spec. 5. ic. 56. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 60.*

Rispenblütige Trompetenblume. W.

*Habitat in America calidiore. ʒ*

*Calyx duplici limbo: exteriore plano, albo, subquinquesido; interiore erecto, angusto. Corolla purpurea.*

*Planta Plumieri est cirrhis instructa; Jacquini vero planta cirrhis caret et folia inferiora sunt ternata. W.*

\*19. *BIGNONIA elongata.*

B. foliis conjugatis cirrhosis, foliolis ovalibus subtus tomentosis, racemo longissimo terminali, pedunculis dichotomis. *Vahl eclog. 2. p. 45. t. 16.\**

Verlängerte Trompetenblume. W.

*Habitat in America meridionali. ʒ*

*Foliola tripollicaria membranacea, supra glabra, subtus tomento tenuissimo flavescente vestita integerrima parum acuminata obtusa. Cirrhus validus rigidus ex apice petioli communis. Calyx oblongus ungui-*

*ularis coriaceus truncatus integerrimus. Corolla sesquipollicaris uti calyx tomento tenui tecta. W.*

\*20. *BIGNONIA corymbifera.*

B. foliis conjugatis subcordatis ovatis acuminatis utrinque glabris, corymbis axillaribus terminalibusque.

*Vahl eclog. 2. p. 45. t. 17.\**

Doldentraubige Trompetenblume. W.

*Habitat in America meridionali. †*

*Folia conjugata absque cirrho. Foliola ovato-cordata acuminata. Corymbi trichotomi axillares et terminales. Calyx truncatus integerrimus. Corolla pollicaris pubescens. W.*

21. *BIGNONIA crucigera.*

B. foliis conjugatis cirrholis, inferioribus ternatis, foliolis ovato-cordatis acuminatis, racemis axillaribus, caule muricato. W.

B. foliis conjugatis cirrhosis: foliis cordatis, caule muricato. *Vir. cliff. 60. Hort. cliff. 317. Roy. lugdb. 289. Mill. dict. n. 12.*

B. scandens, flore atro-flavo minori subtus albicante. *Gron. virg. 73.*

B. scandens bifolia et trifolia, ligno cruce signato. *Plum. ic. 48. t. 58.*

Pseudo-Apocynum folliculis maximis obtusis, seminibus amplissimis alis membranaceis. *Morif. hist. 3. p. 672. f. 15. t. 3. f. 16.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 61.*

Kreuzfaserige Trompetenblume. W.

*Habitat in Virginia et australiori America. †*

*Caulis volubilis, scaber, transversim dissectus crucem repraesentat.*

\*22. *BIGNONIA grandifolia.*

B. foliis conjugatis cirrhosis, foliolis oblongis, utrinque acutis, corymbo trifido terminali, pedunculis, petiolis ramulisque scabris. W.

B. (*grandifolia*) foliis conjugatis cirrhosis, foliolis ovatis, pedunculis ternis terminalibus trifloris. *Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 19. t. 287.\**

Großblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat ad Caracas. †*

*Folia oblonga ampla pedalia fere utrinque acuta venosa glabra. Petiolus communis uti ramuli et pedunculi*



*punctis exasperati. Calyx tubuloso-campanulatus obtuse quinquedentatus. Corolla bipollicaris flava. W.*

23. *BIGNONIA capreolata.*

*B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-lanceolatis; foliis imis simplicibus. Vir. cliff. 59. Hort. cliff.*

*317. Roy. lugdb 289. Mill. dict. n. 13.*

*B. americana capreolis donata, siliqua brevior. T. Breyn. ic. 33. t. 25. Duham. arb. 1. p. 104. t. 40.*

*Clematis americana siliquola tetraphyllos. Dod. act. 71.*

*Clematis tetraphylla americana. Bocc. sic. 31. t. 15. f. 31.*

*Zan. hist. 74. t. 2. Rai. hist. 1329,*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 62.*

*Rankende Trompetenblume. W.*

*Habitat in America boreali. † (v. v.)*

*Pedunculi uniflori, congesti. Calyces campanulati, integri.*

24. *BIGNONIA pubescens.*

*B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-ovatis subtus pubescentibus. Sp. pl. 870. Mill. dict. n. 4. †*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 62.*

*Behaart Trompetenblume. W.*

*Habitat in Campechia. †*

*Flores lutei.*

\*25. *BIGNONIA villosa.*

*B. foliis conjugatis cirrhosis, foliolis ovatis subtus villosis mollissimis. Vahl eclog. 2. p. 44.\**

*Haarige Trompetenblume. W.*

*Habitat ad St. Martham Americæ. †*

*Foliola ovata membranacea venosa, supra fere glabra, nisi in costa, subtus e villis minutis griseis mollissima, bipollicaria acuminata. Cirrhus in apice petioli filiformis villosus. Calyx campanulatus glaber truncatus integerrimus. Corolla magna fere tripollicaris glabra purpurea. An *B. pubescens* Lin.? at folia in illa cordata et flores lutei, inflorescentia mihi ignota. Vahl l. c.*

*\*\*\* Foliis ternatis.*

\*26. *BIGNONIA echinata.*

*B. foliis inferioribus ternatis, superioribus conjugatis, petiolis dichotomis cirrhosis, fructibus echinatis.*

*Swartz prod. 91.*

B. scandens, fructibus echinatis. *Jacq. amer.* 183. t. 176. f. 52. *Aubl. guj.* 2. p. 648. t. 264.\*

B. scandens, foliis cirrholis, inferioribus hexaphyllis, superioribus trifoliatis seu geminatis, fructu echinato. *Lamarck. encycl.* 1. p. 415.\*

Stachelfrüchtige Trompetenblume. W.

*Habitat in sylvis densis Carthagenae et locis arenosis Gujanae.* †

Frutex scandens. Folia inferiora conjugato-ternata, superiora ternata et simpliciter conjugata. Foliola ovato-acuminata. Corymbi pedunculati axillares. Corollae unciales incarnatae. Siliqua quinqueuncialis elliptica muricata. W.

\* 27. BIGNONIA heterophylla. W.

B. foliis ternatis, summis conjugatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, cymis axillaribus. W.

B. (*Kerere*) scandens trifolia et bifolia, flore luteo, fructu ovato duro compresso. *Aubl. guj.* 2. p. 644. t. 260.\* *Lamarck encycl.* 1. p. 415.

Verschiedenblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in sylvis Gujanae ad fluviorum ripas.* †

Frutex scandens, ramis angulatis. Folia ternata, superiora binata. Foliola ovata acuminata quandoque subcordata glabra. Corolla biuncialis. W.

28. BIGNONIA triphylla.

B. foliis ternatis glabris: foliolis ovatis acuminatis, caule fruticoso erecto. *Sp. pl.* 870. *Mill. dict. n.* 14.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 63.

Dreyblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in Vera Cruce.* †

*Flores albi.*

\* 29. BIGNONIA mollis.

B. foliis ternatis, foliolis subcordato-oblongis utrinque pubescentibus, panícula terminali. *Vahl eclog.* 2. p. 46.\* *Icones plant. amer.* t. 10.

B. (*tomentosa*) scandens trifoliata rufo-hirsuta, foliolis amplis subcordato-ovatis utrinque tomentosis, panícula terminali multiflora, floribus parvis. *Act. Soc. Hist. Nat. Paris.* 1. p. III.

Weiche Trompetenblume. W.

*Habitat in Cajenna.* †

Folia opposita ternata. Foliola lateralia brevius pe-

*tiolata, petiolo unguiculari, ovato-oblonga, altero latere angustiora more Phaseoli, intermedium petiolo sesquipollicari, basi sinu parvo subcordata lato-oblonga, omnia utrinque venoso-reticulata subrugosa, e pube flavescenti mollissima, quinquenervia integerrima obtusa cum acumine brevi, quinquepollicaria. Calyx campanulatus fusca-pubescentis quinquedentatus, denticulis minutis. Corolla subpubescens unguicularis. Vahl l. c.*

\* \* \* Foliis digitatis.

\*30. **BIGNONIA** *hirsuta*.

B. foliis digitatis, foliolis obovatis integerrimis emarginatis subtus pubescentibus, panicula terminali, corollis hirsutis. W.

B. (*hirsuta*) foliis digitatis, foliolis oblongis cuneatis apice emarginatis, corollis externe hirsutis. *Lamarck. encycl. I. p. 417.\**

Rauhblumige Trompetenblume. W.

*Habitat in India orientali. †*

Foliola quinque, fere triuncialia. Flores in apice ramorum paniculati parvi. Calyx brevis fere truncatus dentibus quatuor brevissimis instructus. Corolla curva pube flavo-rufescente tecta. Stamina corolla longiora. *Lamarck l. c.*

31. **BIGNONIA** *pentaphylla*.

B. foliis digitatis: foliolis integerrimis obovatis. *Hort. cliff. 497. Mill. dict. n. 8. Swartz obs. 233.*

Guari pariba. *Marcgr. bras. 108. t. 118.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 110.*

Fünfblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in Jamaica, Caribaeis, agris humidioribus, et ad ripas. † (v. l.)*

\*32. **BIGNONIA** *orbiculata*.

B. foliis digitatis, foliolis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus. W.

B. (*orbiculata*) foliis digitatis, caule scandente. *Jacq. amer. 184. t. 180. f. 79.\**

Rundschotige Trompetenblume. W.

*Habitat in sylvaticis Carthagenae. †*

Frutex scandens. Foliola quinque longe petiolata oblonga acuminata glabra. In foliis supremis loco folioli terminalis est cirrus. Flores inodori mediocres fla-

*vescent, limbo magis pallente. Siliquae maximae orbiculatae compresso-planae nitidae, accedentes ad siliquas B. coeruleae. Jacq. l. c.*

\*33 **BIGNONIA chrysantha.**

B. foliis digitatis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis tomentosis, floribus terminalibus congestis. W.

B. (*chrysantha*) foliis digitatis foliolis integerrimis acuminatis tomentosis. *Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 45. t. 211.\**

Goldfarbige Trompetenblume. W.

*Habitat ad Caracas. †*

Caulis erectus arboreus duodecimpedalis. Foliola longe petiolata quinquepollicaria ovata acuminata tomentosa scabra. Calyx tubuloso-campanulatus quinquedentatus. Corolla bipollicaris flava. Flores in ramorum apice copiosi, pedunculis uni-vel bifloris brevibus insidentes. W.

\*34 **BIGNONIA fluviatilis.**

B. foliis digitatis, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, glabris, pedunculis multifloris terminalibus. W.

B. (*fluviatilis*) arborecens pentaphylla, flore albo, fructu viridi oblongo leviter compresso. *Aubl. guj. 2. p. 655. t. 267.\**

Fluss-Trompetenblume. W.

*Habitat ad ripas fluviorum aqua marina submersas Gujanae. †*

Caulis erectus arboreus. Foliola quinque longe petiolata oblonga acuminata glabra. Pedunculi tri-vel sexflori brevissimi in ramorum apice. Calyx campanulatus quadri-vel quinquedentatus. Corolla sesquiuncialis alba. Siliqua oblonga compressa obtusa. W.

35. **BIGNONIA Leucoxydon.**

B. foliis digitatis, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, floribus terminalibus solitariis. W.

B. foliis digitatis: foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Sp. pl. 870. Andrews reposit. p. 43. t. 43. Swartz obs. 233.*

B. foliis imis digitatis, superioribus simplicibus s. ternatis, caule erecto arboreo. *Mill. dict. n. 10.*

B. pentaphylla arborea, flore subrubello. *Brown. jam. 263.*

Leucoxydon arbor siliquosa, quinque foliis, floribus neri, alato semine. *Pluk. alm. 215. t. 200. f. 4.*

Nerio affinis arbor siliquosa, folio palmato seu digitato, flore albo. *Sloan. jam. 154. Hist. 2. p. 62. Raj. dendr. 114.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 114.*

Weißholzige Trompetenblume. W.

*Habitat in Jamaica ad fluviorum ripas. †*

\*36. **BIGNONIA** *ferratifolia.*

B. foliis subquinato-digitatis, foliolis ovatis attenuatis ferratis glabris, pedunculis terminalibus confertis subunifloris. *Vahl. eclog. 2. p. 46.\**

Sägeblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in insula Trinitatis Hispanis Pouy dicta. †*

Foliola quaterna vel quina petiolata, intermedium 3-vel 4-pollicare, lateralia minora, omnia ovata attenuata venosa, utrinque glaberrima, inaequaliter serrata, basin versus integerrima. Petioli fusco-virides glaberrimi compressi. Pedunculi in apice ramorum plures aggregati unguiculares plerumque uniflori, interdum biflori, farinaceo-subtomentosi. Calyx bilabiatus. Corolla lutea tripollicaris bilabiata. Filamentum quintum sterile. *Vahl. 1. c.*

37. **BIGNONIA** *radiata.*

B. foliis digitatis: foliolis pinnatifidis. *Sp. pl. 871.*

B. flore luteo, foliis radiatis et elegantissime dissectis.

*Feuill. peruv. 1. p. 731. t. 22. Roy. lugdb. 289.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 63.*

Strahlenförmige Trompetenblume. W.

*Habitat in Peru. †*

\* \* \* \* \* Foliis pinnatis.

38. **BIGNONIA** *radicans.*

B. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis dentatis, corymbo terminali, tubo corollae calyce triplo longiore. W.

B. foliis pinnatis: foliolis incisif, caule geniculis radicans. *Hort. cliff. 217. Hort. upf. 178. Gron. virg.*

73. *Mitl. ic. 43. t. 65. Duham. arb. 1. Sabb. hort. 2. t.*

84. *Du Roi herb. 1. p. 116. Wangenh. amer. 68. t. 26. f. 53. Willd. arb. 47.*

Pseudo-Gelsemium siliquosum. *Riv. mon. 101.*

Pseudo-Apocynum hederaceum americanum, tubuloso flore phoeniceo, fraxini folio. *Morif. hist. 3. p. 612. f. 15. t. 3. f. 1.*

Gelseminum hederaceum indicum. *Corn. can.* 102. t. 103.  
 β. Bignonia fraxini foliis, coccineo flore minore. *Catesb.*  
*car.* 1. p. 65. t. 65.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 64.

Wurzelnde Trompetenblume. W.

*Habitat in* Carolina, Florida, Virginia † (v. v.)

\*39. BIGNONIA *grandiflora*.

B. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis dentatis, panicula terminali, tubo corollae calycis longitudine. W.

B. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis ferratis, caule volubili, calyce semiquinquefido. *Thunb. jap.* 253.\*  
*Banks Ic. Kaempf. t.* 21.

B. (*chinensis*) foliis pinnatis, foliolis ferratis, caule geniculis radicatis, campanulato flore. *Lamarck. encycl.*  
 1. p. 418.\*

Rjotljo. *Kaempf. amoen.* 856.

Großblütige Trompetenblume. W.

*Habitat in* China, Japonia. †

Caule radicante scandente fruticoso et Foliorum forma similis praecedenti, at differt: panicula terminali vel potius racemo e pedunculis trifloris oppositis composito, denique calyce profunde quinquepartito, et corolla campanulata, tubo calycis longitudine. W.

40. BIGNONIA *stans*.

B. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis ferratis, racemo simplici terminali, caule erecto. W.

B. foliis pinnatis: foliolis ferratis, caule erecto firmo, floribus racemosis. *Sp. pl.* 871. *Mill. dict. n.* 3.

B. fruticosa, foliis pinnatis ovatis, floribus luteis. *Brown. jam.* 264.

B. arbor, flore luteo, fraxini folio. *Plum. spec.* 5. ic. 54.

Apocyno affine Gelseminum indicum hederaceum fruticosum minus. *Sloan. jam.* 216. *hist.* 2. p. 63.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 65.

Eschenblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in* America calidiore. † (v. l.)

\*41. BIGNONIA *africana*.

B. foliis pinnatis, foliolis obovatis dentatis rugosis subquinis, floribus racemosis. *Lamarck. encycl.* 1. p. 418.

Africanische Trompetenblume. W.

*Habitat in* Senegal. †

Arbor procera. Folia pinnata. Foliola quina obovata lata grosse dentata, nitida laete viridia superne scabra.

*subtus nervis prominentibus instructa, terminale petiolatum, lateralia subsessilia. Flores 6 vel 7 in racemo. Calyx cyathiformis inaequaliter quadrifidus. Corolla biuncialis quadrifida. Lamarck l. c.*

\*42. **BIGNONIA** *bijuga*.

B. foliis abrupte pinnatis bijugis, foliolis ellipticis integerrimis. *Vahl. symb. 2. p. 68.*

Vierblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in Madagascar. †*

Rami superne alternatim compressi glabri. Folia petiolata palmaria vel parum ultra, cui pari pinnata rarissime conjugata. Foliola petiolata sesqui pollicaria, interiora minora, parum acuminata, obtusa venosa subcoriacea, utrinque glabra nitida. Petiolus communis canaliculatus, partialis semiungicularis, e folii basi decurrente marginatus. Racemus terminalis. Pedunculus articulatus compressus superne latior. Pedicelli filiformes semiungiculares. Calyx campanulatus, margine subintegro, tubo corollae latior. Corolla unguicularis. *Vahl l. c.*

\*43. **BIGNONIA** *racemosa*.

B. foliis pinnatis, foliolis ovatis acutis integerrimis, petiolo communi marginato, floribus racemosis. *Lamarck. encycl. 1. p. 419.\**

β. foliolis ovato-lanceolatis numerosioribus, *Lamarck l. c.*  
Traubenblättrige Trompetenblume. W.

*Habitat in Madagascar. †*

Folia impari pinnata. Foliola 5 f. 7. ovata acuta nitida glabra uncialia. Petiolus communis alatus. Flores parvi in racemo simplici laxo foliis longiore. Calyx brevis fere truncatus. Corolla tubulosa, limbo brevissimo subaequali. In varietate β Foliola sunt 9 f. 11 acutiora. Flores minores in racemis vix longitudine foliorum. *Lamarck l. c.*

\*44. **BIGNONIA** *compressa*.

B. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis obtusis integerrimis coriaceis, petiolo communi marginato, ramulis ultimis compressis. *Lamarck encycl. 1. p. 419.\**

Flachstäige Trompetenblume. W.

*Habitat in Italia orientali. †*

Rami ultimi sunt more singulari nodosi et compressi. Folia opposita plerumque impari-pinnata, exceptis iis

quae in ramis compressis observantur, quae sunt minutissima simplicia ac sessilia. Folia pinnata habent foliola 3 usque 7 ovato-oblonga obtusa coriacea integerrima glabra, laete viridia, interdum farinaceo-albida, subtus nervosa. Flores parvi pauci fere sessiles in ramorum apice. Calyx fere truncatus, dentibus 5 minutis. Lamarck. l. c.

#### 45. BIGNONIA *spathacea*.

B. foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis hirtis, calyce monophyllo spathaceo, corolla hypocrateriformi. *Lin. suppl.* 283. *Retz. obs.* 5. p. 5.

Niir Pongelion. *Rheed. mal.* 6. p. 53. t. 29.

Will-Padri. *Tamul.*

Baux horn. *Belg.*

Scheidenartige Trompetenblume. W.

*Habitat in Javae, Malabaricae, Zeylonae sylvis prope aquas.* †

Arbor inter majores. Folia sparsa, saepe opposita, pinnata cum impari trijuga. Foliola ovata subcordata, interiora saepe cordata, integerrima hirta. Flores in summitate caulis axillares pedunculati. Calyx monophyllus, latere superiori longitudinaliter dehiscens oblongus subcoriaceus glaber caducus. Corolla hypocrateriformis alba. Limbus planus quinqueplicatus repandus et inaequaliter dentatus. Stamina 4 cum rudimento quinti. Siliqua linearis plana striata curvata et parum torulosa. Semina linearia undulata, apicibus alata. Arbor didynama cum siliqua seminibus alatis farcta denotat Bignoniam, quamvis structura floris in reliquis diversissima sit. Lignum cinereum s. rubens laeve et ad utensilia varia utilissimum in Indiis.

#### 46. BIGNONIA *Chelonoides*.

B. foliis pinnatis cum impari, foliolis ovatis integerrimis pubescentibus, corollis barbatis semipentandris.

*Lin. suppl.* 282.

Padri. *Rheed. mal.* 6. p. 47. t. 26.\*

Padre-Pu-Maran *Tamul.*

Schildblumenartige Trompetenblume. W.

*Habitat in India orientali.* †

Arbor magna, cortice cinereo-albicante. Folia patentia, pinnata cum impari, petiolata subquinquejuga. Foliola opposita ovato-oblonga acuminata integerrima,



*utrinque pubescentia petiolata. Panicula terminalis, pedicellis oppositis dichotomis. Flores ex dichotomis solitarii. Calyx pubescenti-canus. Corollae Limbus subfornicatus hirtus ruber quinquesfidus. Laciniae duae superiores reflexae bipartitae denticulato-crispae flavae, punctis sanguineis. Laciniae inferiores margine crispatae, disco undulato albo, venis rubris hirtae. Faux hirta. Filamenta quatuor didynama, cum Rudimento filamenti quinti, tubo floris inserto, decurrente sterili. Antherae bipartitae. Siliqua linearis plana curvata striata. Flores recentes aqua immersi, aquam grate olentem reddunt, qua templa matutino tempore consperguntur, ut a mucido quieto aëre purgentur.*

\* \* \* \* \* *Foliis decompositis.*

\*47. **BIGNONIA** *variabilis.*

B. foliis inferioribus biternatis, superioribus conjugato-ternatis cirrhosis, racemo terminali. W.

B. (*variabilis*) foliis inferioribus biternatis, ramis tetragonis. *Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 45. t. 212.\**

Veränderliche Trompetenblume. W.

*Habitat ad Caracas. †*

*Frutex scandens ramis tetragonis. Folia inferiora biternata; superiora conjugato-ternata cirrho trifido instructa. Foliola ovata acuminata integerrima glabra. Racemus simplex brevis multiflorus terminalis. Calyx campanulatus obsolete dentatus. Corolla triuncialis, tubo flavo virescente, limbo primum concolore, deinde albo. W.*

\*48. **BIGNONIA** *alba.*

B. foliis decomposito-pinnatis, petiolis nodosis, corymbis axillaribus. W.

B. frutescens, ramis sarmentosis, foliis subbipinnatis, petiolo communi tripartito, petiolis foliorum nodosis. *Lamarch. encycl. I. p. 420.\**

B. scandens, fructu lignoso rugoso oblongo. *Aubl. guj. 2. p. 653. t. 266.\**

Weisse Trompetenblume. W.

*Habitat ad ripas fluvii Sinemariensis Gujanae. †*

*Folium est e tribus foliis pinnatis compositum. Foliola in quolibet folio pinnato sunt, quia ovata acuminata integerrima petiolata. Petioli communes et partiales*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

U

*nodosi.* Flores albi in pedunculo multifloro dichotomo axillari. Siliqua ovato-oblonga. W.

49. *BIGNONIA peruviana.*

B. foliis d. compositis, foliolis incisis, geniculis cirrhosis, Hort. cliff. 317. Roy. lugdb. 290.

Clematis peruana, digitalis flore, folio fraxini. Pluk. alm. 108. t. 162. f. 4?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 66.

Peruvianische Trompetenblume. W.

Habitat in Peru. †

\*\*\*\*\* Foliis bipinnatis.

50. *BIGNONIA indica.*

B. foliis bipinnatis, foliolis subrotundo-ovatis cordatis acuminatis, flore pentandro, calyce tubuloso, corolla quinquefida. W.

B. foliis bipinnatis: foliolis integerrimis ovatis acuminatis. Syst. Veg. p. 472.

B. foliis bipinnatis: foliolis integris subcordatis acutis. Fl. zeyl. 236. Spec. pl. 2. p. 871.

*Bignonia pentandra.* Loureiro cochin. 460?

Arbor siliquosa malabarica, cordato folio, fructu maximo oblongo plano. Raj. hist. 1741.

Palega pajanelli. Rheed. mal. 1. p. 77. t. 43.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 116.

Indische Trompetenblume. W.

Habitat in India orientali. †

\*51. *BIGNONIA longifolia.* W.

B. foliis bipinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis subcordatis acuminatis, calyce hemisphaerico, corolla quadrifida. W.

Arbor siliquosa malabarica, folio majore mucronato, fructu maximo oblongo plano. Raj. hist. 1741.

Pajanelli. Rheed. mal. 1. p. 79. t. 44.

Langblättrige Trompetenblume W.

Habitat in Indiae orientalis arenosis. †

Similis praecedenti uti *B. radicans*, *B. grandiflorae*, differt: Foliolis oblongo-lanceolatis multo majoribus, calycibus ventricosus hemisphaericis obtuse quadridentatis, Corollae limbo quadrifido, lacinia superiore emarginata; Staminibus quatuor. W.

\*52. *BIGNONIA procera*. W.

B. foliis bipinnatis, foliolis oblongis obtusis, panicula terminali, pedunculis bracteatis, siliquis oblongis obtusis. W.

B. (*Copaia*) foliis bipinnatis, foliolis ovatis, fructu subrotundo compresso. *Aubl. guj.* 2. p. 650. t. 265.\*

B. arbor amplo buxi folio, fructu ovato latiori depresso. *Barr. aequ.* 22.

Hone Trompetenblume. W.

*Habitat in sylvis Gujanae.* ‡

Arbor 80-pedalis. Folia amplissima opposita bipinnata. Foliola sesqui-vel biuncialia oblonga obtusa mucronata glabra petiolata. Panicula vasta terminalis. Flores coerulei. Bractee parvae deciduae in pedunculis. Similis sequenti differt, vero exceptis notis jam indicatis: foliis multo majoribus, Floribus minoribus subaequalibus nec bilabiatis. W.

53. *BIGNONIA coerulea*.

B. foliis bipinnatis, foliolis lanceolatis acutis, panicula terminali, pedunculis nudis, siliquis oblongis emarginatis. W.

B. foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis integris. *Sp. pl.* 872. *Mill. dict. n.* 11.

Arbor guajaci latiore folio, bignoniae flore caeruleo, fructu duro in duas partes dissiliente, seminibus alatis imbricatim positis. *Catesb. car.* 1. p. 42. t. 42.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 119.

Bläue Trompetenblume. W.

*Habitat in Carolina.* ‡

\*54. *BIGNONIA brasiliana*. †

B. foliis bipinnatis, foliolis oblongis acutis, panicula axillari, siliquis repandis. W.

B. (*brasiliana*) foliis bipinnatis, foliolis integris acutis, floribus luteis, fructu brevi, margine sinuato. *Lamarck. encycl.* 1. p. 420.\*

Iacaranda II *Pis. bras.* 165.

Brazilianische Trompetenblume. W.

*Habitat in Brasilia.* ‡

Species adhuc dubia. W.

## 1158. CITHAREXYLUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1019.*

*Cal.* 5-dentatus, campanulatus. *Cor.* infundibuliformi-rotata: laciniis supra villosis, aequalibus. *Drupa* 2-sperma. *Nuces* 2-loculares.

## 1. CITHAREXYLUM cinereum.

*C.* ramis teretibus, foliis oblongis acuminatis integerrimis, racemis pendulis, calycibus dentatis. *W.*

*C.* ramis teretibus, calycibus dentatis. *Sp. pl.* 872. *Swartz. obs.* 234.

*C.* (*teres*) caule arboreo tereti. *Jacq. amer.* 185. t. 118.\*

*Citharexylon* fruticosum, cortice cinereo, foliis oblongo-ovatis oppositis, petiolis marginatis pedatis, floribus spicatis. *Brown. jam.* 264.

*Citharexylon* arbor laurifolia americana, foliorum venis late candicantibus. *Pluk. alm.* 108. t. 162. f. 1.

*Iasminum* arboreescens racemosum foliis lauri. *Plum. ic.* 157. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 119.

Graues Geigenholz. *W.*

*Habitat in America meridionali.* †

Arbor 15-20 pedalis. *Swartz l. c.*

## 2. CITHAREXYLUM caudatum.

*C.* ramis teretibus, foliis ellipticis emarginatis obtusis integerrimis, racemis erectis, calycibus subdentatis. *W.*

*C.* ramis teretibus, calycibus truncatis. *Sp. pl.* 872.

*C.* (*erectum*) ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calycibus dentatis. *Swartz. prod.* 91. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 501. *Collect.* 3. p. 231.\*

*C.* fruticosum, foliis subellipticis, petiolis pedatis, calycibus truncatis, spicis terminalibus longioribus. *Brown. jam.* 265. t. 28. f. 2.

*Berberis* fructu arbor maxima racemosa, foliis integris obtusis, flore albo pentapetalo odoratissimo, fructu nigro monopolyreno. *Sloan. jam.* 99. t. 206. f. 3-4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 120.

Ausgerandetes Geigenholz. *W.*

*Habitat in Jamaica.* †

Folia obovata sunt.

\*3. CITHAREXYLUM *villosum*.

C. ramis tetragonis, foliis obovatis subtus pubescentibus, apice subdentatis, racemis nutantibus. W.

C. (*villosum*) foliis villosis. *Jacq. ic. rar. I. t. 118. Collect. I. p. 72.\**

Haariges Geigenholz. W.

Habitat in Domingo. ‡

Racemi vel simplices terminales vel plures in apice caulis. Calyx obsoleto dentatus fere truncatus. W.

\*4. CITHAREXYLUM *subferratum*.

C. ramis tetragonis, foliis oblongis rigidis lucidis apice subferratis, racemis erectiusculis, calycibus dentatis. W.

C. ramis tetragonis, racemis paniculatis terminalibus, calycibus dentatis, foliis subferratis venosis. *Swartz. fl. ind. occ. 2. p. 1043.\* prod. 91.*

Halbgefägtes Geigenholz. W.

Habitat in campis sterilibus Hispaniolae. ‡

5. CITHAREXYLUM *quadrangulare*. †

C. ramis tetragonis, foliis ovatis acuminatis integerrimis, racemis nutantibus. W.

C. ramis tetragonis. *Syst. Veg. 472. Jacq. amer. 186. hort. t. 22.*

C. (*caudatum*) ramis teretiusculis, racemis nutantibus, calycibus truncatis. *Swartz. prod. 234.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 123.*

Vierkantiges Geigenholz. W.

Habitat in Martinica. ‡ (v. v. f. fl.)

\*6. CITHAREXYLUM *Melanocardium*.

C. ramis tetragonis, floribus paniculatis tetrandris, foliis subrugosis, subtus venosis scabriusculis. *Swartz. fl. ind. occ. 2. p. 1046.\**

C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compositis, floribus tetrandris. *Swartz. prod. 91.*

*Citharexylum paniculatum. Gaert. sem. I. p. 270. t. 56.*

C. foliis rugosis ovatis oppositis, petiolis geniculatis, racemis terminalibus, calycibus quadrifidis. *Brown. jam. 265.*

Schwarzbeeriges Geigenholz. W.

Habitat in Jamaica. ‡ (v. f.)

Folia subtus tomentoso-scabriuscula, ferrugineo-cinerea. *Petitiae domingensi valde affinis. Swartz. l. c.*

## 1159. HALLERIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1020.**Cal. 3-f. 5-phyllus Cor. 4-fida. Bacca supera bilocularis polysperma.*1. HALLERIA *lucida*.*H. foliis ovatis acuminatis ferratis, corollis bilabiatis, calyce triphylo, staminibus exsertis. W.**H. (lucida) foliis ovatis, corollis bilabiatis, calyce triphylo. Thunb. Nov. Act. upf. 6. p. 39.\***Halleria. Sp. pl. 872. Hort. cliff. 323. Mill. dict. Fabric. helmfi. 389.**H. foliis ovatis longitudinaliter ferratis. Roy. lugdb. 289.**Lonicera foliis lucidis acuminatis dentatis, fructu rotundo. Burm. afr. 244. t. 89. f. 2.**Solanum flore periclymeni. Amm. herb. 591.**Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 124.**Glänzende Hallerie. W.**Habitat in sylvis Cap. b. spei. h̄ (v. v.)*\*2. HALLERIA *elliptica*.*H. foliis oblongis acutis dentatis, basi cuneiformibus integerrimis, corollis aequalibus, calyce tetraphyllo, staminibus inclusis. W.**H. (elliptica) foliis ellipticis, corollis truncatis, calyce pentaphyllo. Thunb. Nov. Act. Upf. 6. p. 39.\***Halleria lucida β. Sp. pl. 872.**H. foliis lanceolato-ovatis superne ferratis. Roy, lugdb. 289.**Lonicera folio acuto ferrato, flore pendulo, fructu oblongo. Burm. afr. 243. t. 89. f. 1.**Elliptische Hallerie. W.**Habitat ad Cap. b. spei juxta rivos ad montem Tabularem h̄ (v. l.)*

*Distinctissima species a praecedente, et notis indicatis facillime distinguenda. Calyx in omnibus a me examinatis floribus est tetraphyllus. Germen in hoc genere est superum, minime inferum ut perhibent Clarissimi Viri Linnaeus et Thunberg. Posterior l. c. in caractere generico germen inferum, in specierum vero descriptione baccas superas esse dixit. W.*

## 1160. CRESCENTIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1021.*

*Cal.* 2-partitus, aequalis. *Cor.* gibba. *Bacca* pedicellata, 1-locularis, polysperma. *Sem.* nidulantia.

1. CRESCENTIA *Cujete.*

- C.* foliis cuneato-lanceolatis confertis. *Swartz. obs.* 234.  
*C.* foliis cuneato-lanceolatis. *Sp. pl.* 872. *Loefl. it.* 225.  
*Jacq. amer.* 175. t. III.\*  
*C.* foliis lanceolatis utrinque attenuatis. *Hort. cliff.* 327.  
*Mill. dict. n.* 1.  
*C.* arborecens, foliis confertis obovato-oblongis basi angustioribus, fructu sphaerico maximo. *Brown. jam.* 265.  
*Cujete* foliis oblongis et angustis, magno fructu ovato.  
*Plum. gen.* 23. *ic.* 109.  
 Arbor americana cucurbitifera, folio longo mucronato, fructu oblongo. *Comm. hort.* 1. p. 137. t. 71.  
 $\beta$ . *Cujete* angustifolia, fructu minori globofo aut ovato.  
*Plum. gen.* 23.  
 $\gamma$ . *Cujete* minima, fructu duro. *Plum. gen.* 23.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 126.  
 Großfrüchtiger Kürbisbaum. W.  
*Habitat in America calidiore.*  $\frac{1}{2}$  (v. f. f. fl.)  
 Arbor ramis simplicibus, longissimis, horizontalibus.  
 Fructus figura variat in distinctis individuis et magnitudine a pollicari ad pedalem.

2. CRESCENTIA *cucurbitina.*

- C.* foliis ovatis subcoriaceis distinctis, fructibus ovatis acuminatis. *Swartz. obs.* 234.\*  
*C.* foliis lanceolato-ovatis. *Mant.* 250.  
*C.* (*latifolia*) foliis oblongo-ovatis, fructu rotundo, cortice fragili. *Mill. dict. n.* 2.  
*C.* arborecens, foliis singularibus ovatis nitidis, fructu minori. *Brown. jam.* 266.  
*Cujete latifolia*, fructu putamine fragili. *Plum. gen.* 23. *ic.* 109.  
 Cucurbitifera arbor, subrotundis foliis confertis, fructu ovali. *Pluk alm.* 124. t. 171. f. 2.  
 Arbor cucurbitifera americana, folio subrotundo. *Sloan. jam.* 206. *hist.* 2. p. 172. *Raj. hist.* 1667.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 126.*

Kleinfrüchtiger Kürbisbaum. W.

*Habitat in America calidiorē. † (v. l.)*

\* 1161. TANAECIUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1022.*

*Cal. cylindræus truncatus. Cor. tubulosa subæqualis quinquefida. Rudimentum filamenti quinti. Bacca corticosa maxima.*

\* 1. TANAECIUM *parasiticum.*

T. foliis ovatis coriaceis, caule scandente fruticoso radicante. *Swartz prod. 92. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 61. t. 115.\**

Crescentia scandens sarmentis crassioribus, foliis majoribus ovatis nitidis oppositis. *Brown. jam. 262. Schmarotzer Tanaecium. W.*

*Habitat in montosis Jamaicae et ad Caracas. †*

\* 2. TANAECIUM *Jaroba.*

T. foliis inferioribus ternatis, superioribus geminatis, cirrhis interpetiolaribus terminalibus, caule scandente. *Swartz prod. 92.*

Crescentia scandens, foliis inferioribus pinnato-ternatis, superioribus geminatis clavicula interpositis. *Brown. jam. 267.*

Cucurbifera fruticosa triphylla scandens. *Sloan. jam. 207. Hist. 2. p. 175.*

Jaroba. *Marcg. bras. 25. Pis. bras. 173.*

Kletterndes Tanaecium. W.

*Habitat in Jamaica, Brasilia. †*

\* 3. TANAECIUM *pinnatum. W. †*

T. foliis pinnatis, floribus pentandris, caule arboreo. W. Crescentia pinnata. *Jacq. Collect. 3. p. 203. t. 18. Gefiedertes Tanaecium. W.*

*Habitat in Mozambique. †*

*Arbor vasta. Folia alterna impari-pinnata, foliolis oblongis serratis. Calyx campanulatus inaequaliter quinquefidus. Corolla infundibuliformis tubo superne dilatato, limbi laciniis ovatis acutis. Stamina quinque, quatuor didynama, et unicum brevissimum. Stigma bilamellatum. Bacca capitis magnitudine pulpa repleta in qua semina nidulantur. W.*



## 1162. G M E L I N A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1023.*

*Calyx* sub 4-dentatus. *Cor.* 4-fida, campanulata.  
*Antherae* 2 bipartitae; 2 simplices. *Drupa*  
nuce 2-loculari.

1. G M E L I N A *asiatica.*

Gmelina. *Fl. zeyl.* 230.\* *Syst. Veg.* 473.

*Michelia spinosa*, floribus luteis. *Amm. act. petrop.* 8.  
*p.* 218. *t.* 18.

*Lycium maderaspatanum* indici Alpino putati aemulum,  
foliis minoribus et majoribus bijugis et grandioribus,  
aculeis horridum. *Pluk. alm.* 234. *t.* 305. *f.* 3. *et*  
*t.* 97. *f.* 2.

*Jambusa sylvestris parvifolia.* *Rumph. amb.* 1. *p.* 129.  
*t.* 40.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. *p.* 132.

Ostindische Gmeline. W.

*Habitat in India.* † (v. l.)

Arbor ramis teretibus, strictis. Folia opposita, pe-  
tiolata, ovata, subtus tomentosa, saepe utrinque lobo  
laterali acutiore brevi. Spinae axillares, oppositae,  
horizontales, apice pubescentes, longitudine petiolorum.  
Flores ex apice ramulorum tenellorum, pedunculati.

## 1163. P E T R E A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1024.*

*Cal.* 5-partitus, maximus, coloratus. *Cor.* ro-  
tata. *Caps.* 2-locularis, in fundo calycis.  
*Sem.* solitaria.

1. P E T R E A *volubilis.*

*Petrea.* *Hort. cliff.* 319.\* *Mill. dict. Jacq. amer.* 180.  
*t.* 114.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. *p.* 68.

Windende Petrea. W.

*Habitat in America calidiore.* † (v. l.)

Periit egregius Petreus 1742 aetatis 32 variolis cor-  
reptus, longiori vita dignissimus, utpote qui Florae in-  
dicæ domicilia exstruxit in Europa omnium splendi-  
dissima.

*Capsula obovata, bilocularis, apice plano, recondita in tubo calycis. Semina solitaria. Calyces violacei. Corollae coeruleae. Scandit arbores.*

## 1164. P R E M N A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1025.*

*Cal. bilobus. Cor. 4-fida. Bacca 4-ocularis. Sem. solitaria.*

1. PREMNA *integrifolia.*

*P. foliis ellipticis integerrimis glabris. W.*

*P. foliis integerrimis. Mant. 253.*

*Cornutia corymbosa. Burm. ind. 133. t. 41. f. 1.*

*Folium hirci. Rumph. amb. 3. p. 28. t. 134.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 113.*

*Ganzblättrige Premna. W.*

*Habitat in India orientali. † (v. l.)*

*Arbuscula ferratifoliae simillima, an mera varietas? Folia ovata f. cordato-ovata, obtusa, integerrima.*

*Folia elliptica brevissime acuminata, utrinque glabra, integerrima. Panicula corymbosa terminalis. Fructus hujus speciei est drupa parva quadrilocularis, putamine fragili. W.*

\*2. PREMNA *tomentosa. W.*

*P. foliis ovatis acuminatis integerrimis subtus tomentosis. W.*

*Cornutia corymbosa. Lamarck. encycl. I. p. 54.*

*Filzige Premna. W.*

*Habitat in India orientali. † (v. l.)*

*Rami teretiusculi cortice flavescente, juniores tomentosi. Folia opposita petiolata ovata valde acuminata, integerrima venosa, superne glabra, subtus tomentosa. Cyma multiflora terminalis coarctata dichotoma. Pedunculi tomentosi. Bractee minutissimae subulatae ad pedunculorum ramificationes. Flores magnitudine praecedentis. Calyx floris bilobus valde tomentosus laciniis obtusis obscure dentatis, Calyx fructus vero est bilabiatus, altera lacinia tridentata, altera bidentata. Fructus est drupa parva putamine duro. W.*

3. PREMNA *ferratifolia.*

*P. foliis ferratis. Mant. 253.*

Cornutioides. *Fl. zeyl.* 416.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 114.

Gefägte Premne. W.

*Habitat in India orientali.* †

Rami teretes, purpurascens. Cicatrices a casu foliorum truncatae, marginatae. Folia opposita, petiolata, ovata, obtusa, laevia, serrata, versus basin integerrima. Stipulae sublancoolatae, deciduae. Cymae terminales, primum brachiatae, dein dichotomae. Bractae ad ramificationes oppositae, lineares, minutae. Flores magnitudine Viburni.

### 1165. LANTANA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 1026.

*Cal.* obsolete 4-dentatus. *Cor.* limbus 4-fidus, fauce pervia. *Stigma* uncinnato-refractum. *Drupa* nuce biloculari laevi.

#### 1. LANTANA *mista.*

L. foliis oppositis ovatis acutis pilosis, caule inferne aculeato, floribus capitatis, capitulis subrotundis, bracteis lanceolatis. *Swartz. obs.* 236.

L. foliis oppositis acuminatis, floribus capitatis: involucris longitudine florum. *Syst. Veg.* 473.

L. foliis ovato-acuminatis, rugosis, asperis, colore florum a croceo in purpureum sese mutante. *Medic. Act. Palat. Vol. 3. phys.* p. 227. R.

Camara lamii albi folio, flore misto. *Dill. elth.* 64. t. 56. f. 64.

Viburnum americanum urticae foliis. *Comm. hort.* 1. p. 51. t. 78.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 70.

Bunte Lantane. W.

*Habitat in America.* † (v. l.)

#### 2. LANTANA *trifolia.*

L. foliis ternis quaternisve ellipticis supra rugosis subtus villosis, caule inermi, spicis oblongis imbricatis. *Ait. Kew.* 2. p. 350. *Swartz obs.* 236.

L. foliis ternis, caule inermi, spicis oblongis imbricatis. *Sp. pl.* 873. *Mill. dict. n.* 4.

L. erecta minor subaeruginosa, foliis verticillato-ternatis, pedunculis longis, spicis ovatis. *Brown. jam.* 268.

Periclymenum rectum humiliter salviae folio rugosiore, flore purpureo, fructu oblongo esculento purpureo. *Sloan. jam. 164. hist. 2. p. 82. t. 195. f. 3. mala Raj. dendr. 30.*

Camara trifolia, purpurascens flore. *Plum. gen. 32. ic. 70.*

Myrobatindum spicatum, viburni foliis ex adverso ternis. *Vaill. act. 1722. p. 277.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 70.*

Dreyblättrige Lantane. W.

*Habitat in America calidiore. ♀ (v. v.)*

*An L. annuae sola varietas?*

### \* 3. LANTANA *Viburnoides*.

L. foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule inermi, floribus capitato-spicatis, involucris lanceolatis. *Vahl symb. 1. p. 45.*

Charachera viburnoides. *Forsk. descr. 116.\**

Schneeballartige Lantane. W.

*Habitat in monte Barah Arabiae felicis. ♀*

*Fruticosa. Rami pilosi scabri. Folia ovato-lanceolata acuta serrata, supra rugosa scaberrima, subtus molliter villosa sesquipollicaria. Petiolus superne dilatatus. Pedunculi oppositi longitudine foliorum. Foliola involucri lanceolata capitulo parum breviora. Corolla pubescens. Vahl 1. c.*

### 4. LANTANA *annua*.

L. foliis oppositis, caule inermi, spicis oblongis. *Hort. ups. 180. Mant. 419. Mill. dict. n. 9.*

L. (*trifolia*) foliis ternis, spicis oblongis imbricatis, floribus carneo-violaceis, fauce flava. *Med. in Act. palat. vol. 3. phys. p. 222? R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 71.*

Jährige Lantane. W.

*Habitat in America calidiore. ♂ (v. v.)*

*Caulis hispidus, tetragonus, striatus, quasi lignosus. Folia opposita, cordata, scabra, petiolata, variant etiam ternata. Spicae hemisphaericae, oppositae, interstinctae bracteis lanceolatis, brevioribus, sensim elongandae. Corollae incarnatae, fauce flava, non mutabiles. Baccae purpurascens.*

*Stirps ab ill. Medico l. c. descripta hujus loci esse videtur, quum corollae color incarnatus; faux aurea non mutabilis. R.*

\*5. LANTANA *stricta*.

L. foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis, caule iner-  
mi, capitulis subrotundis, bracteis ovato-lanceolatis  
squarrosis. Swartz prod. 92. Fl. ind. occid. 2. p.  
1055.\*

L. (*angustifolia*) caule inermi, foliis ovato-lanceolatis  
oppositis, floribus capitatis, pedunculis longissimis.  
Mill dict.

Periclymenum rectum salviae folio rugoso longo et an-  
gustissimo. Sloan. jam. 164. hist. 2. p. 84. t. 195. f. 4.  
Steife Lantane. W.

Habitat in fruticetis siccis Jamaicae. †

Folia opposita petiolata oblongo-lanceolata acumi-  
nata crenata plana rugosa pilis brevibus rigidis aspe-  
ra, viridia, subtus albido-villosa venosa, vix bipol-  
licaria rigidiuscula. Pedunculi axillares solitarii lon-  
gitudine foliorum vel subinde longiores subteretes nudi,  
terminati. Capitulo florum subrotundo multifloro. Flores  
pallide purpurei, L. annuae floribus feremiores. Bra-  
ctee e lata basi ovatae acuminatae integrae, floribus  
parum breviores pubescentes. Drupae subrotundae san-  
guineae. Swartz. l. c.

\*6. LANTANA *Radula*.

L. foliis oppositis ovatis acutis serratis rugosis asperis sub-  
tus hirsutis, caule subinermi aspero, capitulis oblon-  
gis, bracteis ovatis acutis. Swartz prod. 92. Fl. ind.  
occid. 2. p. 1057.

Raspelblättrige Lantane. W.

Habitat in insulis St. Vincentii et Dominica. †

Suffrutex. Caulis subdivisus tetragonus sulcatus  
asperrimus setoso-pilosus fucus rubescens. Folia petio-  
lata opposita rhombeo-ovata acuminata grosse et acute  
serrata, bullato-rugosa, setis albidis sparsis aspera,  
subtus hirsutissima. Petioli longiusculi hirsuti. Pedun-  
culi axillares oppositi solitarii tetraquetri asperi tripol-  
licares. Capitula oblonga subsquarrosa saepe pollica-  
ria; Bracteis ovatis acuminatis laxis hirsutis. Flores  
purpurei L. trifoliae subsimiles, sed illa folia ternis  
longiora, minus scabrosa. Swartz l. c.

7. LANTANA *Camara*.

L. foliis oppositis, caule inermi ramoso, floribus capita-  
to-umbellatis aphyllis. Sp. pl. 874. Kniph. cent. 4.  
n. 35. Mill. dict. n. 6.

- L. foliis oppositis, petiolatis, floribus capitatis. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 290.
- L. (*Camara*) foliis ellipticis, non multum rugosis, parumque asperis, ramis junioribus aculeatis, colore floris e citrino in rosaceum mutabili. *Medic. Act. pal.* vol. 3. *phys.* p. 228.
- Camara melillae folio, flore variabili. *Dill. elth.* 64. t. 56 f. 65.
- Camara alia, flore variegato, non spinosa. *Plum. gen.* 32. ic. 71. f. 1.
- Viburnum americanum non spinosum, melissae foliis, floribus coccineis. *Pluk. alm.* 385. t. 114. f. 4.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 72.
- Veränderliche Lantane. W.
- Habitat in America calidiore.* † (v. v.)  
Flores flavi, sensim fulvi evadunt.

### 8. LANTANA *involucrata.*

- L. foliis oppositis ternisque rhombeo-ovatis obtusis rugosis tomentosis, caule inermi, capitulis squarrosis, bracteis ovatis. *Ait. Kew.* 2. p. 351. *Swartz obs.* 238.
- L. foliis oppositis ternisque cuneato-obovatis obtusis lineatis tomentosis, capitulis squarrosis. *Syst. Veg.* p. 474.
- L. foliis oppositis, caule inermi, floribus capitato-umbellatis involucrato-foliosis. *Amoen. acad.* 4. p. 319. *Sp. pl.* 2. p. 874.
- L. caule inermi lignoso, foliis oppositis orbiculatis, leviter crenatis, spicis foliosis, floribus carneis mutabilibus. *Medic. in Act. palat.* vol. 3. *phys.* p. 223. 273. t. 16.
- Lantana lanuginosa. *Mill. dict.*
- Periclymenum rectum salviae folio rugoso minore subrotundo. *Sloan. jam.* 164. *hist.* 2. p. 39. *Raj. dend.* 31.
- Viburnum americanum odoratum, folio parvo orbiculato, floribus et baccis folio interceptis. *Pluk. alm.* 386. t. 114. f. 5. *Herm. parad.* 384.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 72.
- Andornblättrige Lantane. W.
- Habitat in America meridionali.* † (v. l.)  
Bractee inter flosculos ovatae. Folia rugosissima, tomentosa.  
Faucis color flavus mox in album mutatur. *Medic.* l. c. R.

\*9. LANTANA *recta*. †

L. foliis oppositis ovalibus rugosis, caule inermi, capitulis squarrosis, bracteis oblongis, pedunculis folio longioribus. *Ait. Kew. 2. p. 351.*

Lantana parvifolia. *Salisb. prod. chapel allerton. p. 107.*

Kleinblättrige Lantane. W.

Habitat in Jamaica. † (v. v.)

10. LANTANA *odorata*.

L. foliis oppositis ternisque ellipticis rugosis, caule inermi, capitulis squarrosis bracteis lanceolatis, pedunculis folio brevioribus. *Ait. Kew. 2. p. 351. Swartz obsf. 239.*

L. foliis oppositis ternisque lanceolato-ellipticis, caule inermi. *Syst. Veg. p. 474.*

L. aromatica, foliis ternis oppositisque subsessilibus, capitulis conicis in umbellam coactis. *Roy. mss.*

Viburnum salviae folio, floribus albis. *Herm. prodr. 384.*

Camara arborefcens salviae folio. *Plum. gen. 32. ic. 71. f. 2.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 4. p. 73.*

Wohlrichende Lantane. W.

Habitat in India occidentali. † (v. l.)

Bractea lanceolatae. Folia rugosissima, subtomentosa.

\*11. LANTANA *lavandulacea*. W.

L. foliis oppositis lanceolatis obtusis superne scabris, capitulis cylindræis, bracteis imbricatis subrotundis acutis. W.

Lavendelartige Lantane. W.

Habitat - - - † (v. v.)

In hortis nostris sub nomine *L. odoratae* obvia, sed abunde distincta. Caulis teretiusculus scaber. Folia opposita, nunquam terna, petiolata, lanceolata obtusa, basi attenuata integerrima, obtuse dentata superne scabra, subtus hirta. Pedunculi foliis breviores. Capitula cylindræa. Bractea villosae subrotundae acutae enerviae imbricatae. Flores admodum parvi albi. W.

\*12. LANTANA *salvifolia*.

L. foliis oppositis ovatis supra scabris, subtus incanis, capitulis conicis, bracteis squarrosis ovatis acutis nervosis. W.

L. foliis oppositis ovatis rugosis, supra asperis, subtus tomentosis, capitulis oblongis squarrosis, bracteis ex subrotundo acuminatis, caule inermi. *Jacq. hort. Schoenb.* 3. p. 18. t. 285.\*

Salbeyblättrige Lantane. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. ‡

Rami juniores scabri. Folia ovata crenata acuta, supra scaberrima subtus tomentosa canescentia. Pedunculi longitudine fere foliorum, in summo caule foliis longiores. Capitula conica uncialia. Bractee laxae ovatae acuminatae virides pubescentes nervosae. Corollae rubrae. Drupae violaceae. L. *salvifolia* *Limaei* est *Buddlejae* species. W.

\*13. LANTANA *melissaefolia*.

L. foliis oppositis ovato-oblongis villosis mollibus, caule aculeato, spicis hemisphaericis, bracteis tubo dimidio brevioribus. *Ait. Kew.* 2. p. 352.

Lantana flava. *Medic. Act. palat.* 3. *phys.* p. 225.

Camara Melissae folio, flore flavo. *Dill. elth.* 66. t. 57. f. 66.

Melissenblättrige Lantane. W.

*Habitat in* India occidentali. ‡

\*14. LANTANA *scabrida*. †

L. foliis oppositis ovato-ellipticis scabris, caule aculeato, spicis haemisphaericis, bracteis tubo dimidio brevioribus lanceolatis acutis. *Ait. Kew.* 2. p. 352.

Scharfblättrige Lantane. W.

*Habitat in* India occidentali. ‡

15. LANTANA *aculeata*.

L. foliis oppositis ovatis subcordatis subtus molliusculis, caule aculeato, capitulorum bracteis lineari-cuneiformibus. *Ait. Kew.* 2. p. 352. *Swartz obs.* 239.

L. foliis oppositis, caule aculeato ramoso, spicis hemisphaericis. *Mill. dict. n. 1. Fabric. helmst.* p. 391.

L. foliis oppositis petiolatis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 498. *Hort. upf.* 380. *Roy. lugdb.* 290.

L. caule quadrato et aculeato, floribus e colore citrino in croceum sese mutantibus. *Medic. Act. Palat. Vol.* 3. *phys.* p. 231.

L. frutescens spinosa, foliis amplioribus subrotundo-ovatis, pedunculis longissimis, floribus Kermesinis. *Brown. jam.* 269.



*Myrobatindum viburnifolium spinosum*, floribus coccineis. *Vaill. act.* 1822. p. 276.

*Viburnum americanum odoratum*, urticae foliis latioribus, spinosum, floribus miniatis. *Pluk. alm.* 385. t. 233. f. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 73.

Stachlige Lantane. W.

*Habitat in America calidiore.* † (v. v.)

Caulis frutex altus, hispidus: angulis aculeis brevissimis, reflexis, vagis. Folia ovata, basi acuta, petiolata, acuminata, scabra. Spicae binae, hemisphaericae, oppositae, interflinctae bracteis parvis deciduis. Flores flavi, adultioribus coccineis.

### \*1166. SPIELMANNIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1027.

*Cal.* quinquefidus. *Cor.* limbus 5-fidus, fauce villis clausa. *Stigma* uncinatum. *Dupra* nuce biloculari tuberculata.

#### I. SPIELMANNIA africana.

*S.* (*Jasminum*) foliis alternis sessilibus decurrentibus, floribus sessilibus. *Medic. in Act. palat. vol.* 3. *phys.* p. 198.

*Lantana (africana)* foliis alternis sessilibus, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 320. *Roy. lugdb.* 290. *Mill. dict.* n. 11.

*Lantana* floribus solitariis. *Gen. plant.* 632.

*Jasminum africanum*, ilicis folio, flore solitario ex alis foliorum proveniente. *Comm. rar.* 6. t. 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 75.

Africanische Spielmanne. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* † (v. v.)

Fructum perfecit Lipsiae in Horto Ludwigiano, cui Calyx 5-partitus, subulatis laciniis, persistens. Drupa insipida, globosa, subacuminata, sulco bipartita. Nucleus globosus, bilocularis, observante D. D. Schreber. *Syst. Veg.* 474.

Corolla Jasmini; antherae tetrandrae; nucis figura totusque florescentiae habitus hanc separat a Lantanis, cum quibus stigmatis uncinati structura solum convenit. Novi hujus generis essentiam Antherae 4, non didymae; faux villis clausa; stigma uncinatum; nuxque dissepi-  
*Linnaei Spec. Plant. T. III.* X

mento in duo hemisphaeria aequalia divisa constituunt.  
Medic. l. c.

## 1167. CORNUTIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1028.*

*Cal. 5-dentatus. Stamina corolla longiora. Stylus longissimus. Bacca 1-sperma.*

## I. CORNUTIA pyramidata.

*C. panicula terminali nuda elongata. W.*

*Cornutia. Hort. cliff. 319. Mill. dict.*

*C. flore pyramidato, foliis incanis. Plum gen. 32. ic. 106. f. 1.*

*Agnanthus viburni folio. Vaill. act. 1722. p. 273.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 76.*

*Rispenblütige Cornutie. W.*

*Habitat in Caribaeis, Campechia. †*

*Rami 4-quetri: angulis acutis. Folia elliptico-ovata, integerrima.*

## \*2. CORNUTIA punctata. W.

*C. corymbis axillaribus trichotomis. W.*

*Cornutia pyramidata. Ait. Kew. 2. p. 353.*

*Hosta coerulea. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 60. t. 114.\**

*Punctirte Cornutie. W.*

*Habitat in America calidiore? †*

*Frutex quadripedalis ramis tetragonis. Folia opposita petiolata ovata acuminata basi attenuata subdentata glabriuscula. Corymbi axillares foliis breviores trichotomi. Flores coerulei sub lente punctis albis glandulosis conspersi. Drupa globosa nuce quadriloculari. Ob fructus structuram a Plumieri descriptione Cornutiae discrepantem Clariff. Jacquin novum formavit genus. Sed praeter Plumierum nullus hujus plantae fructum observavit, hinc conjicio gaudere et primam speciem drupa; quum a Botanicis nostri aevi et praeteriti Drupa parva interdum pro bacca habeatur monosperma. W.*

## 1168. LOESELIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1029.*

*Cal.* 4-fidus. *Cor.* laciniis omnibus secundis.  
*Stam.* petalo adversa. *Capsf.* 3-locularis.

I. LOESELIA *ciliata*.

*L. ciliata. Sp. pl. 875. Gaert. sem. 1. p. 295. t. 62. f. 3.*

*Loeselia. Roy. lugdb. 299.*

*Royena foliis acute dentatis et veluti spinosis, flore luteo. Houst. mss.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 115.*

*Gefranzte Löselie. W.*

*Habitat in Vera Cruce.*

*Folia petiolata ovata acuta basi attenuata serrata venosa. Racemus axillaris folio longior. Bracteae subrotundo-ovatae ciliato-dentatae magnae flores tegunt. W.*

*Stamina quinque in omnibus speciminis mei floribus reperio, quorum unum reliquis brevius, ad dimidium fere longitudinis suae, proximae lacinae corollae adnatum est, reliqua filamenta tubo inserta sunt. Gaert. l. c.*

## 1169. CAPRARIA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 1030.*

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata, 5-fida, acuta.  
*Capsf.* 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

I. CAPRARIA *biflora*.

*C. foliis alternis, floribus geminis. Sp. pl. 875. Jacq. amer. 182. t. 115. Mill. dict. Swartz obs. 239.\**

*C. foliis alternis, corollis quinquefidis. Hort. cliff. 320. Roy. lugdb. 301. Brown jam. 268.*

*C. curassavica. Herm. parad. 110. t. 110.*

*C. peruviana agerati foliis absque pediculis. Feuill. peruv. 1. p. 764. t. 48.*

*Gratiolae affinis frutescens americana, foliis agerati s. veronicae erectae majoris. Comm. hort. 1. p. 79. t. 40.*

*Lysimachiae peruviana affinis americana procumbens, ononidis verna frutescentis folio singulari glabro.*

*Pluk. alm. 237. t. 98. f. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 79.*

*Zweyblumige Herzblume. W.*

*Habitat in Curassao, Peru et India occidentali locis udis.* 4 (v. v.)

\*2. *CAPRARIA lucida.*

C. foliis oppositis ob ongis acutis argute ferrulatis laevibus, petiolis alatis, pedunculis trifloris. *Ait. Kew. 2. p. 353.*

Glänzende Herzblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* ♂ (v. v.)

Planta glabra. Caules tetragoni. Folia sesquiuncialia. Petioli foliis ter breviores. Pedunculi axillares oppositi, paulo longiores tetragoni triflori. Pedicelli exteriores interdum triflori. Bractee subulatae longitudine pedicellorum. Calycis lacinae subulatae trilineares. Corolla hypocrateriformis, tubus cylindricus pallide purpurascens calyce paulo longior, basi extus gibbus, supra gibbum parum recurvus, tandem erectus, latere exteriori parum elongatus, unde limbus omnino horizontalis; lacinae ovatae obtusae aequales e rubro purpurascens, macula atropurpurea prope faucem: faux pilosa. Antherae oblongae compressae. Germen subrotundum. Stylus staminibus brevior. Stigma magnum convexum obliquum. *Ait. l. c.*

*Huic est bacca bilocularis, an etiam reliquis speciebus Capitis bonae spei? Conveniunt enim habitu floris et forte non immerito genus forment distinctum.* W.

3. *CAPRARIA lanceolata.*

C. foliis oppositis lineari-lanceolatis integerrimis, racemis compositis terminalibus. *Ait. Kew. 2. p. 354.*

C. foliis oppositis lanceolatis, corymbo terminali composito. *Lin. suppl. 284.*

Lanzenblättrige Herzblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* ♀ (v. l.)

Folia biuncialia et ultra, angusta linearia acuta striata. Flores in panicula terminali e racemis brevibus composita. W.

\*4. *CAPRARIA semiserrata.*

C. foliis lanceolatis extrorsum serratis, pedunculis submultifloris. *Vahl eclog. 2. p. 47.\**

Halbgefägte Herzblume.

*Habitat ad St. Martham Americae.*

Caulis herbaceus erectus inferne teres superne angulatus aspersus pilis brevibus inferne rarioribus. Folia

*alterna frequentia bi-f. tripollicaria patentia lanceolata basi in petiolum attenuata acuta utrinque glabra, ope lentis margine ciliata, ab apice versus medium serrata, dein integerrima. Pedunculi axillares vel terminales ramulorum vix unguiculares pubescentes 1-4-flori; pedicelli alterni approximati brevissimi. Bractea lineari-lanceolata pedicello parum longior ad basin singuli pedicelli. Calycis lacinae subulatae. Corolla calyce longior, fundo villoso, laciniis 5 lineari-oblongis. Stigma capitatum. Capsula oblonga calyce parum longior bifurca bivalvis bipartibilis. Semina copiosa minutissima, receptaculo lineari libero affixa. Vahl l. c.*

### 5. CAPRARIA undulata.

C. foliis oppositis, ovato-oblongis integerrimis undulatis, supremis subcordatis verticillatis, racemis spiciformibus. *Ait. Kew. 2. p. 354.*

C. foliis alternis ovatis undulatis, racemis secundis. *Lin. suppl. 284.*

C. foliis sparsis inaequaliter approximatis ovatis integris subundulatis, racemo terminali subsimplici. *l'Herit. fert. angl. p. 21.*

Wellenblättrige Herzblume. W.

*Habitat in collibus Cap. b. Spei ad Swellendam. †*

### \*6. CAPRARIA humilis.

C. pubescens, foliis oppositis ternisve ovatis serratis petiolatis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus. *Ait. Kew. 2. p. 354.*

Niedrige Herzblume. W.

*Habitat in India orientali. ☉*

## 1170. L I N D E R N I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1031.*

*Cal. 5-partitus. Cor. ringens labio superiore brevissimo. Stam. 2 inferiora dente terminali antheraque sublaterali. Caps. 1-locularis.*

### 1. LINDERNIA Pyxidaria.

L. foliis oblongo-ovatis integerrimis trinerviis sessilibus, pedunculis axillaribus unifloris caule procumbente. W.

L. foliis sessilibus integerrimis, pedunculis solitariis.  
*Syst. Veg. p. 475. All. pedem. n. 203. Hoffm. germ. 221.*  
*Roth. germ. II. 57.*

L. foliis oppositis sessilibus oblongo-ovatis, floribus axillaribus, pedunculis simplicibus. *Jacq. Collect. I. p. 271.\**

Lindernia. *Allion. stirp. aliq. 178. t. 5.*

Pyxidaria repens annua, flosculis monopetalis unilabiatibus. *Lindern. alsat I. p. 152. t. I. et 2. p. 267.*

Capraria gratioloides. *Spec. pb. 2. p. 876.*

Anagalloides procumbens. *Krock. silesf. 2. n. 1001. t. 26.*

Gratiola floribus pedunculatis, foliis ovatis crenatis.  
*Gron. virg. 129.*

Ruellia pedunculis solitariis unifloris longitudine foliorum. *Gron. virg. 73.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 117.*

Europäische Lindernie. W.

*Habitat in Virginiae, Aethiopiae, Silesiae, Germaniae, Carinthiae, Pedemontii paludibus spongiosis inundatis. ☉ (v. v.)*

Flores dilute purpurei.

Pedunculi foliis breviores, sed in apice caulis saepius longiores. W.

### \*2. LINDERNIA dianthera.

L. foliis subrotundo-ovatis serratis venosis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris, caule repente. W.

L. foliis petiolatis ovato-subrotundis subserratis, caule repente. *Swartz. prod. 92. Fl. ind. occid. 2. p. 1058.\**

Erinus procumbens. *Mill. dict.*

Ageratum americanum procumbens glabrum, floribus luteis longis pedunculis infidentibus. *Houft. mscr.*

Westindische Lindernie. W.

*Habitat in arenosis subhumidis et argillaceis Hispaniolae. (v. f.)*

Folia crassiuscula leviter venosa. Pedunculi foliis duplo longiores. W.

### \*3. LINDERNIA japonica.

L. foliis obovatis serratis sessilibus, racemo terminali. W.

L. foliis obovatis dentatis, infimis petiolatis. *Thunb. jap. 253.*

Japanische Lindernie. W.

*Habitat in Japonia rimis murorum. ☉*

*Radix fibrillosa. Caulis herbaceus ramosus debilis, ramis alternis patulis erectiusculis, parum villosis pollicaribus usque spithamaeis. Folia radicalia plurima petiolata, caulina pauca sessilia; omnia obovata obtusa vix manifeste villosa unguicularia. Petioli longitudine foliorum, sensim in folium abeuntes. Flores in ramis terminales racemosi aphylli. Bractea sub pedunculis minutissima. Corolla ringens, labio inferiori majori, rufescens. Capsula ovata obtusa didyma bivalvis unilocularis glabra. Thunb. l. c.*

## 1171. M A N U L E A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1032.*

*Cal. 5-partitus. Cor. limbo 5-partito, subulato: laciniis superioribus 4 magis connexis. Caps. bilocularis, polysperma.*

1. MANULEA *Cheiranthus.*

*M. foliis nudis, caulibus subaphyllis, pedicellis alternis unifloris. Mant. 88.*

*Nemia (Cheiranthus) calycibus scabris, corollis acutis. Berg. cap. 160.\**

*Lobelia Cheiranthus. Spec. p. 1319.*

*Cheiranthus africana, flore luteo. Comm. hort. 2. p. 83. t. 42.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 118.*

*Leukoienartige Handblume. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. ☉*

*Herba statura Euphrasiae. Caulis palmaris, a basi ad medium ramosus in plures Cauliculoa, erectos, teretes, scabros. Folia alterna, obovato-oblonga, sessilia, serrata, in ramis superioribus parva. Racemi terminales, erecti, planta longiores. Bractea lineares, calyce breviores. Pedunculi calyce etiam breviores. Corollae saturate luteae.*

2. MANULEA *corymbosa.*

*M. foliis oblongis dentatis glabris, corymbo fastigiato.*

*Lin. suppl. 286.*

*Doldentraubige Handblume. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Caulis nudus.*

3. MANULEA *altissima*.

M. foliis lanceolatis subdentatis villosis, spica ovata.  
*Lin. suppl.* 286.

Höchste Handblume.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

*Nudicaulis et folia solummodo radicalia.*

4. MANULEA *pinnatifida*.

M. foliis ovatis inciso-pinnatifidis, pinnis dentatis. *Lin. suppl.* 286.

Getheilte Handblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

5. MANULEA *Plantaginis*.

M. foliis ovatis subdentatis inægrisque glabris, capitulis ovatis, ramis diffusis. *Lin. suppl.* 286.

Wegetriartige Handblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

*Refert Plantaginem.*

6. MANULEA *capitata*.

M. foliis ovatis ferratis villosis, capitulis globosis, ramis diffusis. *Lin. suppl.* 286.

Kopfförmige Handblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

7. MANULEA *Antirrhinoides*.

M. foliis ovatis dentatis glabris, floribus alternis. *Lin. suppl.* 286.

Löwenmaulartige Handblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

*Refert Antirrhinum.*

8. MANULEA *thyrsiflora*.

M. foliis obovatis tomentosis dentatis, corymbo terminali elongato composito. *Lin. suppl.* 286.

Straufsblütige Handblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

9. MANULEA *argentea*.

M. foliis obovatis cuneiformibus ferratis argenteo-punctatis, floribus axillaribus. *Lin. suppl.* 286.

Silberfarbige Handblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.



10. MANULEA *tomentosa*.

M. foliis tomentosis, caulibus foliosis, pedunculis multifloris. *Mant.* 420. *Jacq. ic.* 3. t. 498. *collect.* 4. p. 114.\*

Selago (*tomentosa*) racemis ramosis, foliis obovatis cre-  
natis tomentosis, caule prostrato. *Spec. pl.* 2. p. 877.  
*Amoen. acad.* 6. *afric.* 22.\*

Planta. *Pluk. phyt.* 319. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 119.

Filzige Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* ♂ *Dav. Royen et I. Burmann.*  
(v. l.)

Caules plures, adscendentes, teretes, ramosi, foliati, albido-tomentosi s. villosi: Ramis alternis. Folia opposita, subpetiolata. obovata s. lanceolata, dense utrinque tomentosa, obtuse ferrata. Thyrsus oblongus, terminalis, coarctatus in ovatum, denuum oblongum: Pedunculis axillaribus terminalibusque, bracteatis, aphyllis; Bracteae lineares inter flores sessiles simul. Corollae flavissimae. Tubus filiformis; Limbus horizontalis, 5-partitus, fere regularis, laciniis lateraliter revolutis. Capsula oblongiuscula, compressa, acuta, bisulca, 2-ocularis, 2-valvis, polysperma.

Tota planta, excepta corolla, valde tomentosa. Generis *Manuleae*, licet corolla minus irregularis.

11. MANULEA *rubra*.

M. foliis lanceolatis villosis, floribus racemosis remotis.  
*Lin. suppl.* 286.

*Nemia (rubra)* calycibus ciliatis, corollis obtusis. *Berg.*  
*cap.* 161.\*

Rothe Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* (v. l.)

12. MANULEA *capillaris*.

M. foliis caulinis obovatis glabris dentatis, rameis linearibus, spicis ovatis. *Lin. suppl.* 285.

Haarblättrige Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

13. MANULEA *cuneifolia*.

M. foliis elliptice-ovatis glabris dentatis, spicis oblongis. *Lin. suppl.* 285.

Keilblättrige Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

14. MANULEA *coerulea*.

M. foliis linearibus oppositis tomentosis dentatis, floribus racemosis. *Lin. suppl.* 285.

Blaue Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

15. MANULEA *heterophylla*.

M. foliis linearibus sparsis villosis integris dentatisve.

*Lin. suppl.* 285.

Verschiedenblättrige Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

16. MANULEA *integrifolia*.

M. foliis ovatis sparsis glabris integris. *Lin. suppl.* 285.

Ganzblättrige Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

17. MANULEA *microphylla*.

M. foliis ovatis fasciculatis glabris integris. *Lin. suppl.* 285.

Kleinblättrige Handblume. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

## 1172. HEBENSTREITIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1033.*

*Cal.* 2-emarginatus, subtus fissus. *Cor.* 1-labiata: lab. ascendente, 4-fido. *Capsf.* dispersa. *Stamina* margini limbi corollae inserta.

I. HEBENSTREITIA *dentata*.

H. foliis linearibus dentatis, spicis laevibus. *Syst. Veg.* p. 476. *Burm. afr.* 109. t. 41. f. 1.

H. foliis lineari-subulatis rare dentatis, calycibus bivalvibus glabris. *Berg. cap.* 153.

H. foliis dentatis. *Hort. cliff.* 497. 326. *Roy. lugdb.* 300.

Valerianella africana, foliis angustis, flore macula rubicante notato. *Comm. hort.* 2. p. 247. t. 109.

Valerianoides flore monopetalo, semine unico oblongo. *Rai. suppl.* 245.

Pedicularis foliis angustissimis dentatis, floribus spicatis. *Burm. afr.* 114. t. 42. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 121.

Gezähnte Hebenstreitie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. l.)*

Caulis erectus, pedalis, ad radicem et sub spica Ramis simplicibus, adjecte dentibus. Folia alternato sparsa, linearia, subhispida, subdentata, erecta, ex singulis alis copiosis foliolis subramescens. Spica terminalis, sessilis, oblonga, inferne sterilis; bracteis laevibus, subulatis, in ordines 10 longitudinales imbricatis, unifloris; Spica enim constructa est ex verticillis 5-floris, sed alternis. Corolla alba, fauce dorsali rubra, singularis staminibus ipso margine fissurae impositis; inferioribus recurvatis. Flores Maie inodori, Meridie foetidi nauseosi; Vesperis ambrosiaci, uti Flores tristes dicti s. Hyacinthi orientalis. H. V.

## 2. HEBENSTREITIA ciliata.

H. foliis linearibus dentatis, calycibus trivalvibus ciliatis. *Berg. cap. 154. Mant. 420.*

Rapunculus foliis inferioribus multifidis, superioribus simplicibus, dentatis, floribus spicatis. *Burm. afr. 109. t. 41. f. 1. bona. Berg. R.*

Melampyrum africanum spicatum, foliis angustissimis, dentatis. *Herm. afr. 16. Berg.*

Gefranzte Hebenstreitie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ☉ (v. l.)*

## 3. HEBENSTREITIA integrifolia.

H. foliis lineariibus integerrimis. *Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 300.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 122.*

Ganzblättrige Hebenstreitie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. (v. l.)*

Videtur varietas *H. ciliatae*, utraque *H. dentatae* valde affinis.

## 4. HEBENSTREITIA Erinoides.

H. foliis oblongis serratis pilosis, bracteis integris hispida. *Lin. suppl. 286.*

Leberbalfamartige Hebenstreitie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

## 5. HEBENSTREITIA fruticosa.

H. foliis lanceolatis dentatis glabris, bracteis integris, caule fruticoso. *Lin. suppl. 287.*

Strauchartige Hebenstreitie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

6. *HEBENSTREITIA cordata*.

*H. foliis subcarnosis cordatis sessilibus.* Mant. 420.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 122.*

Herzblättrige Hebenstreitie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

*Caulis suffrutex; erectus, albidus, laevis parce superneque ramosus. Folia alterna s. opposita, sessilia s. subamplexicaulia, cordata, obtusa, vix crenata, carnosa, subtus gibba. Spica terminalis, sessilis. Corollae albae, fauce incarnata. Antherae compressae, luteae, ut H. dentatae.*

1173. *ERINUS*.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1034.*

*Cal. 5-phyllus. Cor. limbus 5-fidus, aequalis; lobis emarginatis; Labio super. brevissimo reflexo. Caps. 2-locularis.*

1. *ERINUS alpinus*.

*E. floribus racemosis, foliis spathulatis. Syst. Veg. p. 477. Mill. dict. n. 1. Hall. helv. n. 302.*

*Erinus. Sauv. monsp. 116.*

*Ageratum serratum alpinum. Bauh. pin. 221.*

*Ageratum purpureum. Dalech. hist. 1184.*

*β. Ageratum minus saxatile, flore albo. Barr. rar. 23. t. 1192.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 123.*

Alpen-Leberbalsam. W.

*Habitat in alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Monspeli.*

24 (v. l.)

*Folia radicalia in caespitem congesta, omnia lineari-spathulata, pubescentia, apice utrinque serraturis aliquot. Caules plures, simplicissimi, palmares, teretes, pubescentes, erecti, foliis alternis remotis; laterales caules steriles, decumbentes. Racemus terminalis, simplex, erectus, longitudine caulis. Flores alterni, distincti foliis similibus minoribus. Calyx campanulatus, 5-partitus, persistens laciniis oblongis, erectis. Corolla infundibulif. Tubus reflexus. Limbus aequalis, (aestivatione irregularis) laciniis obcordatis, oblongis, aequalibus. Stamina 4 intra tubum. Germen subrotundum. Stylus brevissimus. Stigma capitatum auriculis 2 subrotundis oppositis.*

2. ERINUS *maritimus*.

E. foliis lanceolatis integerrimis glabris, limbi laciniis semibifidis. *Lin. suppl.* 287.

Meerstrands Leberballam. W.

*Habitat in Cap. b. spei maritimis.*

3. ERINUS *africanus*.

E. floribus lateralibus sessilibus, foliis lanceolatis subdentatis. *Sp. pl.* 878.

Buchnera foliis obtusis ferratis. *Hort. cliff.* 501.\* *Roy. lugdb.* 300.

Lychnidea villosa, foliis ex alis floriferis, florum petalis cordatis. *Burm. afric.* 138. t. 50. f. 1.

Euphrasia aethiopica, drabae foliis, summis oris flosculorum altius divisis. *Pluk. mant.* 83. *Raj. suppl.* 401.

β. Buchnera foliis acutis dentatis. *Hort. cliff.* 501.\*

*Roy. lugdb.* 300. *Gron. virg.* 95.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 124.

Africanischer Leberballam. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

4. ERINUS *Lychnidea*.

E. foliis lanceolatis ferratis, limbi laciniis semibifidis. *Lin. suppl.* 287. (*excluso synonymo.*)

E. (*capensis*) floribus spicatis, foliis linearibus dentatis. *Mant.* 252.

Lychnisartiger Leberballam. W.

*Habitat in Cap. b. spei arenosis.* 24

Caulis erectus, teres, pubescens, bipedalis. Folia alterna (*inferioribus oppositis*), sessilia, linearia, dentata, remota, pubescentia. Spica terminalis, oblonga, imbricata Bracteis latioribus, ovato-lanceolatis, dentatis. Calyx sessilis, longitudine bractearum, quinque-dentatus, bipartitus, erectus, obtusus, inferne latior. Corolla flava, odoratissima. Tubus filiformis, calyce triplo longior. Limbus quinquepartitus; Lobis semibifidis, obovatis, aequalibus. Stamina didyma: Antherae 2 in ore tubi; 2 infra faucem. Germen superum. Stylus filiformis, longitudine tubi.

5. ERINUS *fragrans*.

E. foliis lanceolato-oblongis dentatis, limbi laciniis integris. *Ait. Kew.* 2. p. 357.

Selago (*Lychnidea*) *spica terminali, foliis subpetiolatis lanceolatis obtusiusculis ferratis subtomentosis. Sp. pl. 877. Amoen. acad. 6. afr. 19.\* Berg. cap. 158.\**

*Lychnidea villosa, foliis oblongis dentatis, floribus spicatis. Burm. afr. 13. t. 49. f. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 86.*

Wahlriechender Leberbalsam. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Variat corollae limbo sordide purpurascente, et sordide flavescente. Ait. 1. c.*

#### 6. ERINUS *peruvianus.*

*E. foliis oblongis dentatis, limbi laciniis emarginatis. W.*

*E. foliis lanceolato-ovatis ferratis. Sp. pl. 879.*

*Lychnidea veronicae folio, flore coccineo. Feuill. peruv. 3. p. 25. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 125.*

Peruvianischer Leberbalsam. W.

*Habitat in Peru.*

#### 7. ERINUS *tristis.*

*E. foliis oblongis incisus dentatis, limbi laciniis emarginatis. Lin. suppl. 287.*

Trauriger Leberbalsam. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Flores colore tristi suaveolentes.*

*Erinus laciniatus est Verbenae species, quam in appendice describam. W.*

### 1174. B Ü C H N E R A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1035.*

*Cal. 5 - dentatus obsolete. Cor. limbus quinquefidus, aequalis: lobis cordatis. Caps. 2-locularis.*

#### 1. BÜCHNERA *americana.*

*B. foliis dentatis lanceolatis trinerviis. Syst. Veg. p. 477.*

*B. foliis dentatis oppositis, florum tubo laevi. Spec. 2. p. 879.*

*Cortulae f. Verbasci species, caule non ramoso, floribus violaceis. Gron. virg. 74.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 128.*

Americanische Büchnere, W.

*Habitat in Virginia, Canada.*

*Spica floribus remotis. Caulis vix ramosus. Stamina 2 in fauce; in medio tubi. Herba exsiccatione atra evadit.*

\*2. *BÜCHNERA elongata.*

B. foliis sublineari-lanceolatis integris, calycibus pilosiusculis capsula longioribus. *Swartz prod. 92. Fl. ind. occid. 2. p. 1061.\**

*Eriopus americanus. Mill. dict.*

*Peripea palustris. Aubl. guj. 2. p. 628. t. 253.\**

*Ageratum folio et facie rapunculi. Plum. ic. 19. t. 17.*

*Langstielige Büchnere. W.*

*Habitat in arenosis depressis Jamaicae, ad Veram Crucem et Gujanae. ☉*

3. *BÜCHNERA cernua.*

B. foliis cuneatis quinquedentatis glabris, floribus spicatis, caule fruticoso. *Mant. 251.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 129. t. 58. f. 2.*

*Hängende Büchnere. W.*

*Habitat in Cap. b. spei montibus. †*

*Caulis fruticosus, semipedalis, determinate ramosus, cicatricibus foliorum subarticulatus, purpurascens. Folia opposita, saepe terna, sessilia, cuneata, quinquedentata (apice utrinque serraturis 2 acutis), laevia, articulis non breviora. Spicae terminales, solitariae, oblongae: Flores sessiles, erecti; Bractea lineari, acuta, calyce breviora, setisque 2 lateralibus brevioribus. Calyx tubulosus, oblongus, semi 5-fidus, aequabilis; laciniis membrana connexis. Corolla alba: Tubo filiformi, calycibus duplo longiore, recurvato. Limbo plano, 5-partito: laciniis subovatis. Antherae infra faucem: duabus inferioribus. Stigma inclusum, reflexum, crassiusculum.*

4. *BÜCHNERA cuneifolia.*

B. foliis cuneiformibus glabris, apice septemdentatis.

*Lin suppl. 288.*

*Keilblättrige Büchnere. W*

*Habitat ad Cap. b. spei.*

5. *BÜCHNERA cordifolia. †*

B. caule tetragono, foliis oppositis cordatis trinerviis serratis, racemis terminalibus subspicatis. *Lin. suppl. 287.*

Herzblättrige Büchnere. W.

*Habitat prope Tanschaur ad margines hortorum raro.*

*Fide Cl. Koenig plantam, habitu longe alienam potius Verbenis similem, ad hoc retuli genus.*

6. BÜCHNERA grandiflora. †

B. scabra, foliis oppositis sessilibus oblongis integris, pedunculis axillaribus unifloris diphyllis, calyce infundibuliformi. *Lin. suppl.* 287.

Großblütige Büchnere. W.

*Habitat in America meridionali. Mutis.*

Planta pulcherrima. Caulis erectus glaber simplicissimus. Folia sessilia oblonga quinquenervia integra utriusque scabra. Pedunculi in summitate caulis axillares solitarii, foliis breviores uniflori, medio bracteati. Bracteae binae oppositae lineari-subulatae. Calyx cylindricus infundibuliformis longus quinquedentatus, tubo corollae dimidio brevior. Corollae Tubus palmaris, sensim dilatatus in Limbum planum magnum quinquelobum, lobis rotundatis. Fructum non vidi, ideo an planta hujus generis sit non persuasus sum. Gerardii non adeo dissimilis etiam siccata tota nigrescit ut Gerardia Nigrina.

7. BÜCHNERA aethiopica.

B. foliis tridentatis, floribus pedunculatis, caule fruticuloso. *Mant.* 251.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 130.

Aethiopische Büchnere. W.

*Habitat in Cap. b. spei campis arenosis. †*

Caulis fruticulosus, semipedalis, ramosissimus: Ramis vix manifeste pubescentibus. Folia opposita, sessilia, lanceolata (magnitudine Polygoni avicularis), laeviuscula, plerumque infra apicem utrinque dente notata. Flores versus apices ramorum, laterales, oppositi, pedunculati: Pedunculi uniflori, foliis longiores, erecti. Calyx monophyllus, quinquedentatus, subhispidus. Corolla lutea, tubo calycibus duplo longiore. Capsula bilocularis, ovato-oblonga, calyce vix longior.

*Obs.* B. capensis differt Caule pubescente viscido superne tantum ramofo; Foliis utrinque dentibus 2 remotis; Radice annua.

\*8. BÜCHNERA viscosa.

B. foliis lineari-lanceolatis laxe dentatis subglutinosis, floribus pedunculatis, caule fruticoso. *Ait. Kew.* 2. p. 357.



Klebrige Büchnere. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

9. BÜCHNERA *capensis*.

B. foliis dentatis linearibus alternis, calycibus pubescentibus. *Mant.* 88.

Lychnidea villosa, foliis angustis dentibus, floribus umbellatis. *Burm. afr.* 191. t. 50. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 132.

Capische Büchnere. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ☉*

Planta palmaris, superne ramosa. Flores in spicis terminalibus. Affinis *Rhinantho capensi*.

\*10. BÜCHNERA *humifusa*.

B. foliis obovatis squamulosis, caule prostrato. *Vahl. symb.* 3. p. 81.\*

*Browallia (humifusa)* hispida prostrata, floribus axillaribus sessilibus albis. *Forsk. descr.* 112.

Liegende Büchnere. W.

*Habitat in montibus altioribus Hadenibus Arabiae felicis.*

Caules plures filiformes ramosi prostrati, pilis adpressis scabri. Folia opposita parva *Thymi vulgaris* subpetiolata obovata, utrinque scaberrima e squamis minutis albidis, quibus pili solitarii brevissimi adpressi insident, ad marginem confluentibus. Pedunculi axillares solitarii uniflori brevissimi. Flores ratione plantae magni. Capsula fere *B. asiaticae* oblonga compressa, subtruncata longitudine calycis bilocularis, dissepimento contrario. Totus habitus *B. asiaticae* diversa modo, caule prostrato et foliis obovatis. *Vahl. l.c.*

11. BÜCHNERA *asiatica*.

B. scaberrima, foliis linearibus integerrimis squamosis, laciniis corollae oblongis. *Vahl. symb.* 3. p. 81.

B. foliis integerrimis linearibus, calycibus scabris. *Syst. Veg.* 478.

*Euphrasia pratensis Saturejae* foliis scabris e *Madera-spatana*. *Pluk. alm.* 142. t. 177. f. 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 132.

Capische Büchnere. W.

*Habitat in Zeylona, China. ☉ (v. l.)*

Corolla limbo bifido: lacinia altera erectiuscula trifida; altera patente late cordata.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

Y

Folia supra, subtus costa et margine, tecta squamis copiosis albis e quibus pili solitarii minimi. Calyces axillares solitarii subsessiles folio breviores remoti striati, siriæ pilis minutis rigidis plurimis denticulatae. Vahl l. c.

\*12. BÜCHNERA *euphrasioides*.

B. foliis linearibus integerrimis piloso-scabris laciniis corollae linearibus obtusis. Vahl. symb. 3. p. 81.  
Augentrostartige Büchnere. W.  
Habitat in India orientali.

Primo intuitu similis est *Euphrasiae longiflorae*. Caulis acute tetragonus ramosus, ramis oppositis, caule altioribus. Folia brevia, inferne opposita remota, superne alterna conferta, ramis adpresse subimbricata. Calyx longitudine fere scilicet sessilis axillaris. Corollae tubus villosus. A. B. asiatica diversa: foliis multo brevioribus superne confertis erectis, non e squamis scabris, sed e pilis; corollis extus villoso-cinerascentibus, laciniis limbi linearibus. Vahl l. c.

\*13. BÜCHNERA *gesnerioides*. W. †

B. foliis oblongis ciliatis adpressis squamiformibus, corollae tubo incurvo. W.  
Lathraea gesnerioides König.  
Gesnerienartige Büchnere. W.

Habitat in India orientali prope Pondepillj. 24 (v. l.)  
Caulis semipedalis basi ramosus, ramis caule altioribus simplicibus tetragonis, primo intuitu nudus apparet. Folia minutissima valde remota squamiformia oblonga adpressa margine ciliata. Flores sessiles inferne alterni remoti superne oppositi conferti, sub quolibet flore est folium calyce brevius, et ad utrinque calycis latus bractea linearis obtusa margine ciliata. Calyx quinquesidus, laciniis lanceolatis margine ciliatis. Corolla fere *Euphrasiae longiflorae*, tubo glabro incurvato, laciniis limbi oblongis. Capsula oblonga obtusa bilocularis. W.

14 BÜCHNERA *pinnatifida*.

B. foliis pinnatifidis glabris. Lin. suppl. 288. Lamarck encycl. 1. p. 495.  
Schlitzblättrige Büchnere. W.  
Habitat ad Cap. b. Spei.

## 1175. BROWALLIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1036.*

*Cal.* 5-dentatus. *Cor.* limbus 5-fidus, aequalis, patens: umbilico clauso. *Autheris* duabus majoribus. *Capsf.* 1-locularis.

1. BROWALLIA *demissa*.

*B.* pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 318. *t.* 17. *Hort. upf.* 179.\* *Mill dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 8. *n.* 17. *Sabb. hort.* 2. *t.* 100.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. *p.* 133.

Niedrige Browallie. W.

*Habitat in America australi, Panama.* ☉ (v. v.)

2. BROWALLIA *elata*.

*B.* pedunculis unifloris multiflorisque. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 10. *n.* 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 134.

Hohe Browallie. W.

*Habitat in Peru.* ☉ (v. v.)

Simillima *B. demissae* sed *Caulis* duplo major, rigidus, crassitie dimidii digiti. quasi fruticosus; *Rami inferiores* longitudine fere ipsius caulis, quod non in *demissa*. *Folia floralia* huic fere glabra. *Pedunculi alii* uniflori, alii triflori, quinquiflori et ultra. *Corolla saturate coeruleo-violacea. nec dilute violacea.*

3. BROWALLIA *alienata*?

*B.* foliis superioribus oppositis staminibus duobus longitudine corollae *Syst. Veg.* 478. †

*B.* foliis lanceolatis petiolatis longis, caule ramoso, radice annua. *Mill. ic.* 68.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. *p.* 134.

Fremde Browallie. W.

*Habitat* - - - ☉

*Hanc non vidi, tantum ex figura Milleri assumi. ideoque in speciebus omisi, et Millerus ipse in Dictionario ultimo,*

## 1176. LINNAEA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1037.*

*Cal.* duplex: fructus 1-phyllus; floris 5-partitus, superus. *Corolla* campanulata. *Bacca* ficca, trilocularis.

## I. LINNAEA borealis.

*L. floribus geminatis.* *Fl. lapp.* 250. *t.* 12. *f.* 4. *Hort. cliff.* 320. *Fl. suec.* 522; 562. *t.* 1.\* *Mat. med.* 57. *Hall. helv.* n. 299. *Segu. veron.* 1. *p.* 183. *Sauv. meth.* 137. *Kalm. it.* 2. *p.* 263. *Gort. ingr.* 100. *Oed. dan. t.* 3. *Blackw. t.* 597. *Ludw. ect. t.* 142. *Act. Nidrosf.* 4. *t.* 4. *f.* 6. *Gmel. sib.* 3. *p.* 128. *n.* 4. *Willd. arb.* 171. *Hoffm. germ.* 221. *Roth. germ.* II. 69.

*Valerianella nemorosa repens.* *Amm. ruth.* n. 27.

*Obolacia.* *Siegesb. prim.* 79.

*Serpillifolia.* *Buxb. act.* 2. *p.* 346. *t.* 21.

*Campanulata serpillifolia.* *Bauh. pin.* 93. *prodr.* 35. *act. upf.* 1720. *p.* 96. *t.* 1.

*Nummularia norvegica, flore purpureo.* *Kyll. act. dan.* 2. *p.* 346. *f.* C.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 135.

*Nordische Linnea.* W.

*Habitat in Sueciae, Germaniae, Sibiriae, Russiae, Canadac sylvis antiquis, muscosis, acerosis, sterilibus, umbrosis, inque alpibus Helvetiae.* † (v. v.)

*Sempervirens. Bacca ficca, trilocularis. Semina gemina. Aestivatio eadem cum Lonicera. Florescit mense Florescentiae cum Poenia flore pleno.*

## 1177. SIBTHORPIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1038.*

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-partita, aequalis. *Stam.* paribus remotis. *Capsf.* compressa, orbicularis, 2-locularis: dissepimento transverso.

## I. SIBTHORPIA europaea.

*S. foliis reniformi-subpeltatis crenatis.* *Amoen. acad.* 3. *p.* 22.\* *Loefl. it.* 150.\* *Mill dict.*

*Chrysolplenium cornubiense.* *Pet. herb. t.* 6. *f.* II.

*Alpine spuria pusilla repens, foliis saxifragiae aureae,* *Raj. angl.* 3. *p.* 352. *Pluk. alm.* 23. *t.* 7. *f.* 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 139. t. 57. f. 3.*

Europäische Sibthorpie. W.

*Habitat in Cornubiae, Devicniae, Lusitaniae udis aggeribus, ad margines rivulorum. 4 (v. l.)*

Radix annua, interdum cum tota planta perennans. Caules numerosi, pedales, filiformes, laxi, decumbentes, saepe radicanes juxta petiolos, pilosi. Folia alterna, petiolata (*Chrysofplenii*), cordato-orbiculata, horizontalia, 7-loba, lobis lateralibus minoribus, obtusa, diametro pisi, adspersa setulis simplicibus hyalinis. Petioli breves, ascendentes. Pedunculi axillares, erecti, solitarii, longitudine floris; deflorati veronutantes. Calyx 5-fidus, hirsutus. Corolla saepius 5-fida, parva, purpurascens; fundo purpureo. Stamina semper 4, aequalia, vacante unica incisura corollae, unde inaequaliter et didynamiae classis.

## 1178. LIMOSELLA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1039.*

*Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida, aequalis. Stam. per paria approximata. Caps. 1-locularis, 2-valvis, polysperma.*

### I. LIMOSELLA aquatica.

L. foliis lanceolato-spathulatis, scapis foliis brevioribus. W.

L. foliis lanceolatis. *Syst. veg. 572. Hoffm. germ. 222. Roth. germ. I. 265. II. 57.*

*Limosella. Fl. lapp. 249. Fl. suec. 521; 565. Hall. helv. n. 300. Dalib. paris. 193. Gmel. fib. 4. p. 72. n. 5. Doerr. nass. p. 143. Fl. dan. t. 69.*

L. foliis longe petiolatis sine spathulatis. *Crantz austr. p. 353.*

L. annua. *Lind. alf. 156. t. 5.*

Plantaginella. *Hall. jen. 23. t. 6. f. 2.*

Plantaginella palustris. *Bauh. pin. 190. Moris. hist. 3. p. 605. f. 15. t. 2. f. 1.*

Spergula perpulilla, lanceolatis foliis. *Loef. pruss. 261. t. 81.*

Alfina palustris repens, foliis lanceolatis. *Pluk. alm. 20. t. 74. f. 4.*

Alfina palustris exigua, foliolis lanceolatis. *Mentz pug. 2. t. 7. f. 6.*

β. *Limosella diandra*. *Krock. filif. 2. n. 1006. t. 27. f. B.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 141.*

Waller-Limoselle. W.

*Habitat in Europae septentrionalis inundatis. 4 (v. v.)*

*Limosella diandra a Cl. Krocker descripta est modo*  
*L. aquaticae varietas. W.*

## 2. LIMOSELLA diandra.

L. foliis lineari-spathulatis, scapis foliorum longitudine. W.

L. foliis sublinearibus. *Mant. 252. Koenig.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 142.*

Zweifädige Limoselle. W.

*Habitat in Cap. b. spei littoribus. (v. l.)*

Habitus *L. aquaticae* totus, sed quadruplo minor, inter minimas plantas numeranda. Stolonnes repentes (ut in priori), breves. Folia radicalia, linearia, vix minimum in medio dilatata, obtusa. Flores (ex sicco specimine minimisque omnium nequeunt extricari, at acutissimus inventor staminibus 2 tantum instructos docuit) diandri. Scapi capillares, uniflori, longitudine foliorum.

*Specimina mea habeo ex India orientali ab amicissimo D. Klein. Conveniunt habitu cum L. aquatica, sed sunt minora, foliis angustissimis et scapo longitudine foliorum vel longiore, quod nunquam in L. aquatica vidi. Flores recentes examinavit amicus supra nominatus. Calyx est tridentatus, Corolla quadripartita, Stamina bina, Stylus incurvatus, Stigma pelatum. W.*

## \* 1179. PHAYLOPSIS. W.

*Micranthus Wendl. obs. 38.*

Cal. 5-fidus lacinia suprema majore. Cor. ringens, labio superiore minimo bifido. Caps. 1-ocularis tetrasperma filiquaeformis!

## \*1. PHAYLOPSIS parviflora. W.

*Micranthus oppositifolius. Wendl. obs. p. 39.\**

Kleinblütige Prachtlose. W.

*Habitat in India? ☉ (v. l.)*

Caulis erectus tetragonus hirsutus superne pilis albis longis, apice grandula rubicanda parva instructus. Rami oppositi. Folia opposita longe petiolata ovata acu-

*minata obsolete dentata basi in petiolum decurrentia venosa hirsuta. Pedunculi triflori axillares. Calyx glanduloso-pilosus, lacina suprema oblongo lanceolata venosa, quatuor inferiores setaceae. Corolla angusta, labio superiore bifido obtuso duplo inferiore brevior, labio inferiore tripartito. Capsula calyce minor siliquaeformis tetrasperma. W.*

## 1180. VANDELLIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1040.*

*Cal. sub 4-fidus. Cor. ringens. Filamenta 2 exteriora e disco labii corollae. Antherae per paria connexae. Caps. 1-ocularis, polysperma.*

1. VANDELLIA *diffusa*.

*V. foliis subrotundis sublesilibus. Vahl eclog. 2. p. 47.*

*Vandellia diffusa. Mant. 89.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 143.*

*Ausgebreitete Vandellie. W.*

*Habitat in insula Montserrat et St. Crucis.*

*Caulis herbaceus, tetragonus, brachiatus. Folia ovata, sessilia, crenata, obtusiuscula. Flores axillares, oppositi, solitarii. Habitus Veronicae serpillifoliae. Mant.*

*Caulis herbaceus ramosus tetragonus filiformis pubescens. Folia breviter petiolata opposita vix unguicularia subrotunda supra glabra, juniora subtus pilis rarioribus, serrata avenia. Pedunculi axillares solitarii uniflore alterni breves. Vahl l. c.*

2. VANDELLIA *pratensis*.

*V. foliis petiolatis oblongis acutis crenatis. Vahl eclog.*

*2. p. 48.\**

*Matourea pratensis. Aubl. guj. 2. p. 642. t. 259,*

*Tupeicava. Pis. bras. 246.*

*Wiesen-Vandellie. W.*

*Habitat in America australi ab insula Trinitatis ad Brasiliam usque frequentissima ad vias. 4*

## \* 1181. RUSSELLIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1041.*

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* bilabiata tubo elongato.  
*Stigma* globosum. *Caps.* unilocularis bi-  
valvis polysperma.

\* I. RUSSELLIA *farmentosa*.

*R. farmentosa. Jacq. amer. 178. t. 113.\**

Kletternde Ruffelie. W.

*Habitat circa Havanam in sylvaticis densis. †*

*Frutex scandens, ramis tetragonis. Folia opposita  
breve petiolata ovata acuta dentata superne hirsuta  
inferne glabra, Pedunculi axillares triflori rubri. W.*

## \* 1182. CONOBEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1042.*

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* bilabiata. *Caps.* unilocularis  
quadri-valvis polysperma.

\* I. CONOBEA *aquatica*.

*Conobea aquatica. Aubl. guj. 2. p. 639. t. 257.\**

Wasser-Conobea. W.

*Habitat ad ripas Gujanae. (v. f.)*

*Planta herbacea procumbens. Caulis tetragonus nodo-  
sus. Folia opposita reniformia acuta dentata amplexi-  
caulia. Pedunculi axillares uniflori foliis longiores.  
Flores coerulei. W.*

## \* 1183. STEMODIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1043.*

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* bilabiata. *Stam.* 4: fila-  
mentis singulis bifidis diantheris. *Caps.*  
bilocularis.

I. STEMODIA *maritima*.

*S. foliis oppositis semiamplexicaulibus, floribus sessili-  
bus solitariis. Swartz obs. 242.\**

*S. foliis lanceolatis sessilibus. Vahl symb. 2. p. 69.*

*Stemodia. Moen. acad. 5. p. 399.\* Jacq. amer. 181.  
t. 174. f. 66.*



*Stemodiaca maritima odorata*, foliis minoribus sessilibus denticulatis hastatis, floribus solitariis alaribus.  
*Brown. jam. 261. t. 22. f. 2.*

*Scordium maritimum fruticosum procumbens.* *Sloan. jam. 66. hist. 1. p. 175. t. 110. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 144.*

Meerstrands-Stemodie. W.

*Habitat in Jamaicae inundatis maritimis. 4 (v. f.)*

## 2. STEMODIA *durantifolia*.

S. foliis ternis connatisque, floribus subternis subsessilibus. *Swartz obs. 240.\**

*Capraria (durantifolia)* foliis ternis dentatis, floribus solitariis, ramis alternis. *Sp. pl. 876. Amoen. acad. 5. p. 399.\**

*Phaelypea erecta*, foliis sessilibus angustis auritis ad apicem ferratis oppositis s. verticillatis, floribus singularibus alaribus. *Brown. jam. 269.*

*Veronica caule hexangulari*, foliis saturajae ternis ferratis. *Sloan. jam. 81. hist. 1. p. 196. t. 124. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 81.*

Dreyblättrige Stemodie. W.

*Habitat in Jamaicae paludosis maritimis argillaceis.*

## \*3. STEMODIA *runderalis*.

S. foliis oblongis petiolatis, floribus axillaribus oppositis. *Vahl symb. 2. p. 69.*

S. foliis ovatis ferratis petiolatis. *Retz obs. 5. p. 25.\**  
*Gaert. sem. 1. p. 243. t. 32. f. 5.*

Schutt-Stemodie. W.

*Habitat in Indiae orientalis ruderatis.*

Caulis herbaceus erectus spithamaceus obscure tetragonus pubescens, inferne ramosus, rami simplicissimi patentissimi caule breviores. Folia opposita petiolata, pollicaria vel minora obtuse ferrata, dentata venosa nuda obtusa, basi acuta integerrima. Petiolus filiformis folio brevior. Pedunculi axillares solitarii uniflori lineares pubescentes. Calyx pubescens. *Vahl l. c.*

## \*4. STEMODIA *camphorata*. †

S. foliis ovatis petiolatis, floribus racemosis. *Vahl symb. 2. p. 69.\**

Ghonacola. *Herm. mus. zeyl. 1.*

Campherartige Stemodie. W.

*Habitat in Zeylona.*

Folia *opposita sesquipollicaria acuta argute inaequaliter serrata, basi attenuata, supra vix pilosa. Racemus terminalis erectus spithamaeus. Corollae citrino-subvirescentes. Varietas datur foliis angustioribus basi integerrimis utrinque attenuatis. Dodartia orientalis forte eadem planta. Vahl l. c.*

\*5. *STEMODIA aquatica. W. †*

S. foliis ternis, submersis bipinnatis capillaceis, emeris indivisis lanceolatis sessilibus, spicis axillaribus. W. Wajel-Kuttu pagandei Tamul.

Waller-Stemodie. W.

*Habitat in aquis Indiae orientalis prope Tranquebariam. (v. l.)*

Caulis *semipedalis usque bipedalis teres. Folia inferiora submersa ut in plerisque plantis aquaticis bipinnato-supradecomposita capillacea; superiora emersa terna sessilia lanceolata trinervia glabra, ab apice ad medium usque argute serrata, ceterum integerrima. Spica in apice caulis et ex omnibus foliorum axillis longe pedunculata uncialis. Flores alterni sessiles bractea lanceolata calycis longitudine suffulti. Calyx quinquepartitus. Corolla bilabiata, tubo brevi medio coarctato, labio superiore obcordato majore, inferiore tripartito, fauce pilosa. Stamina quatuor per paria approximata. Antherae parvae non geminatae. Germen ovatum. Stylus filiformis curvatus. Stigma dilatatum concavum. Capsula bilocularis polysperma. W.*

*Ex hac floris descriptione, quam mecum amicissimus D. Klein communicavit, patet plantam modo antheris simplicibus a Stemodia differre. W.*

1184. *O B O L A R I A.*

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1044.*

*Cal. 2-fidus. Cor. 4-fida, campanulata. Caps. 1-locularis, 2-valvis, polysperma. Stamina ex divisuris corollae.*

I. *O B O L A R I A virginica.*

*Obolaria. Hort. cliff. 323. Gron. virg. 74.*

*Orobanche virginiana, radice coralloide, summo caule foliis subrotundis. Moris. hist. 3. p. 504. f. 12. t. 16. f. 23. Pluk. alm. 273. t. 209. f. 6. Raj. suppl. 595.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 145.

Virginiſches H. llerkraut. W.

*Habitat in Virginia.* (v. l.)

Folia *suprema extus purpurea.* Flores *pallide rubentes.* *Orobanchis affinis.*

\* 1185. A E G I N E T I A.

*Roxb. corom. I. p. 63.*

*Cal.* 1-phyllus *spathaceus.* *Cor.* campanulata bilabiata. *Capsula* multilocularis.

I. A E G I N E T I A *indica.*

*Aeginea indica.* *Roxb. corom. I. p. 63. t. 91.\**

*Orobanche (Aeginetia)* caule unifloro, flore subspathaceo.

*Sp. pl. 2. p. 883.*

*Aeginetia.* *Sp. pl. I. p. 632.*

*Them Cumulu.* *Rheed, mal. II. p. 97. t. 47.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 156.

Indiſche Aegineie. W.

*Habitat in collibus Malabariae.* 2.

Folia *nulla.* *Caules simplicissimi stricti, teretes lineis rubris, uniflori.* *Spatha obvestit florem.*

*Scapi plures ex una radice fibrosa, basi squama flavescente lanceolata muniti.* *Spatha flavescens latere dehiscens.* *Corolla curvata purpurea.* W.

1186. O R O B A N C H E.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1045.*

*Cal.* 2-4-f. 5-fidus. *Cor.* ringens. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma. *Glandula* sub basi germinis.

\* *Corollis quadrifidis.*

I. O R O B A N C H E *major.*

O. caule simplicissimo, corollis quadrifidis inflatis, staminibus inferne nudis, stigmate bilobo, lobis distantibus, stylo superne pubescente. *Sutton. in Act. Soc. Lin. Lond. 4. p. 175.\* Smith bot. angl. t. 421. Curt. lond. 4. t. 44.*

O. caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *Sp. pl. 882. Scop. carn. n. 782. Gmel. it. 2.*

p. 197. *Mattusch. fil. n. 472. Doerr. nass. p. 167. Kniph. cent. 1. n. 67. Sabb. hort. 3. t. 11. Hoffm. germ. 222. Roth. germ. I. 262. II. 49.*

O. caule simplicissimo. *Hort. cliff. 321. Fl. suec. 519; 562. Roy. lugdb. 299. Dalib. 190. Gort. gelr. 368.*

O. caule simplici, bracteis longioribus. *Sauv. monsp. 5. Orobanche 4. Lob. ic. 2. p. 269.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 147.*

Große Sommerwurz. W.

*Habitat in Europae locis incultis, nemoribus siccis, parasitica imprimis radicum Diadelphiac. 2 (v. v.) Michel. monograph. de Orobanche.*

\*2. OROBANCHE *foetida*. †

O. caule simplicissimo, corollis quadrifidis inflatis argute dentatis, staminibus inferne pubescentibus, stigmate bilobo, lobis distantibus, stylo superne pubescente. W.

O. (*foetida*) scapo simplici, bracteis angusto-lanceolatis corolla longioribus, calyce diphylo, laciniis bifidis, lanceolato-subulatis. *Desf. atl. 2. p. 59. t. 144.*

O. (*foetida*) caule simplicissimo pubescente, antheris exsertis mucronato-spinosis. *Poiret. itin. 2. p. 195.*

Orobanche major. β *Vahl symb. 2. p. 70.\**

O. flore specioso fimbriato ruberrimo. *Shaw. afr. n. 452.*

Stinkende Sommerwurz. W.

*Habitat in agris Barbariae. 2.*

*Caulis simplex erectus hirsutus striatus fistulosus pedalis et sesquipedalis, squamis foliaceis lanceolatis erectis tectus. Racemus teres semipedalis et ultra. Flores sessiles. Bractee angusto-lanceolatae hirsutae corolla longiores. Calyx diphyllus, foliolis profunde bifidis, laciniis longis lanceolato-subulatis inaequalibus. Corolla atropurpurea magnitudine O. majoris. Limbus patens bilabiatus. Labium superius bilobum, inferius trilobum, lobis rotundatis denticulatis. Stamina didynama corolla breviora. Filamenta incurva. Antherae didymae glabrae basi mucronatae. Stylus 1. Stigma crassum bilobum. Capsula ovato-oblonga. Desf. l. c.*

*Valde affinis O. majori. W.*

\*3. OROBANCHE *caryophyllacea*.

O. caule simplici, corolla inflata fimbriato-crispa, labio inferiore laciniis obtusis aequalibus, staminibus intus basi hirsutis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond. 4. p. 169.\**

Oróbanche major. *Pollich. palat. n. 600.\**

O. caule simplici, stipula unica calyce quadrifido. *Hall. helv. n. 295.*

O. major garyophyllum olens. *Bauh. pin. 87.*

Nelkenduftende Sommerwurz. W.

*Habitat in agris et nemoribus Germaniae, Italiae, Sibiriae. 2.*

Habitu et magnitudine similis O. majori, differt vero: laciniis tribus labii inferioris obtusis et magis fimbriatis ac crispis, germine glabro, quod superne pubescens in O. majori, stylo minus pubescente, filamentis basi intus valde villosis, quae glabra in O. majori. Stigmate fusco vel purpureo, nec flavo ut in O. majori. *Smith. l. c.*

\*4. OROBANCHE *coerulescens.*

O. caule simplici, corolla quadrifida, bracteis longitudine floris calycibusque albo-villosis, staminibus styloque glabris. W.

O. (*coerulescens*) albo-villosa, bracteis solitariis acuminatis flores aequantibus, calyce diphylo, foliolis lanceolatis acumine duplici. *Steph. in litt.*

Blauliche Sommerwurz. W.

*Habitat in Sibiria versus Mare Caspium. 2 (v. l.)*

Caulis simplicissimus fere pedalis striatus pubescens superne albo-villosus. Folia sparsa lanceolata inferiora adpressa pubescentia superiora subpatentia albo-villosa. Spica densa, triuncialis, floribus coerulescensibus a pilis longis niveis bracteis et calyces tegentes alba. Bracteae ovatae longe acuminatae florum longitudine. Calyx bifidus laciniis bipartitis subulatis inaequalibus longitudine fere tubi corollae. Corolla non inflata ut in O. elatiore. Stamina et Pistillum glabra. W.

\*5. OROBANCHE *elator.*

O. caule simplicissimo, corollis quadrifidis, staminibus inferne pilosis, stigmate obcordato, stylo superne glabro. *Sutton Act. Soc. Lin. Lond. 4. p. 178. t. 17.\**

Hohe Sommerwurz. W.

*Habitat in Angliae et Germaniae agris et ad agrorum margines. 2 (v. l.)*

Simile O. majori at Spica densior, planta altior, corolla non inflata, stamina inferne pilosa, stylus superne glaber, germen glabrum. Lacinae tres labii inferioris sunt inaequales. W.

6. OROBANCHE *purpurea*. †

O. caule simplici ramosoque, corollis quadrifidis, staminibus calcaratis. *Lin. suppl.* 288.

Purpuffarbene Sommerwurz. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Purpureo-rubra floribus magnis. Siccata nigrescit.*

\*7. OROBANCHE *minor*.

O. caule simplicissimo, corollis quadrifidis, staminibus inferne pilosis, stigmate retuso, stylo superne glabro, *Sutton Act. Soc. Lin. Lond.* 4. p. 178.\* *Smith bot. angl. t.* 422.

O. (*major*) caule simplici, bracteis lanceolatis flore majoribus. *Loefl. itin.* 151. n. 35.\*

O. flore minore. *Raj. synop.* 288.

Kleine Sommerwurz. W.

*Habitat in agris et pascuis Hispaniae, Angliae.* 2 (v. f.)

*Ab O. elatiore, distincta, caule humiliore, flore minore, calyce diphylo laciniis vel integris vel bifidis, corollae labio inferiore trifido laciniis aequalibus nec inaequalibus. Differt ab O. majore praeter magnitudinem et notas indicatas, corolla cylindracea. Flores luteo-albi venis purpureis, vel luteis.* W.

\*8. OROBANCHE *alba*.

O. caule simplicissimo, corollis quadrifidis, staminibus glabris, stylo superne piloso-glanduloso, calyce bifido indiviso. W.

Orobanche alba. *Stephan. in litt.*

Weisse Sommerwurz. W.

*Habitat in Sibiria versus Mare Caspium.* 2 (v. f.)

*Cautis semipedalis fulvo-villosus, a pilis brevissimis apice glandulosus. Folia remota adpressalanceolata. Spica bipollicaris et ultra, floribus inferioribus remotis. Bractea ovata acuta pilis glanduliferis tecta, calycis longitudine vel parum longior. Calyx bifidus laciniis oblongis acutis indivisis. Corolla cylindracea magnitudine praecedentis alba, pilis glanduliferis tecta. Labium superius obcordatum denticulatum; inferius tripartitum subaequale rotundatum denticulatum. Filamenta glabra basi dilatata, inferne ad marginem pilis aliquot raris glanduliferis obsita. Germen glabrum. Stylus glaber, superne pilis glandulosus tectus. Stigma magnum bilobum.* W.

\*9. OROBANCHE *gracilis*.

O. caule simplici, corolla inflata, labio inferiore brevissimo, laciniis obcordatis inaequalibus fimbriato-crispis, staminibus styloque pilosis exsertis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond. 4. p. 172.\**

Schlanke Sommerwurz.

*Habitat in pratis montosis ad St. Orlese prope Genuam. 4.*

*Affine O. minori, at differt: corolla majore inflata, labio inferiore minore, staminibus longioribus, et Stylo piloso. Smith 1, c.*

10. OROBANCHE *americana*.

O. caule simplicissimo foliis imbricato, corollis recurvatis, staminibus exsertis. *Mant. 88. Walt. carol. 166.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 150.*

Amerikanische Sommerwurz. W.

*Habitat in Carolina ad radices arborum et fruticum. D. Garden. 4.*

Caules simplicissimi, crassitie vix digiti, spithamei, teretes, colorati, succulenti, toti imbricati foliis ovato-lanceolatis, sessilibus, acuminatis, erectis, coloratis, marcescentibus. Spica sessilis, terminalis, longitudine caulis: imbricata fructificationibus. Bractee solitariae, lanceolatae, longitudine fere corollae. Flores subsessiles. Calyx monophyllus, ventricosus, margine integro. Corolla tubulosa, incurva; Limbo angustiore ringente: Labio superiore longiore; inferiore bipartito, erecto. Tota planta cum fructificatione lutea. Simillimum e Sibiria obtinui, vix aliter, quam foliis obtusis distinguenda.

11. OROBANCHE *virginiana*.

O. caule ramoso, corollis quadridentatis. *Sp. pl. 882.*

O. caule ramoso, floribus purpureis bracteatis racemosis, radice coralloide. *Walt. carol. 167.*

O. caule ramoso, floribus distantibus. *Gron. virg. 168.*

O. minor virginiana lignosior, per totum caulem floribus minoribus onusta. *Morif. hist. 3. p. 502. f. 12. t. 16. f. 9. Raj. suppl. 595.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 152.*

Virginische Sommerwurz. W.

*Habitat in Virginia. 4.*

12. OROBANCHE *uniflora*.

O. caule unifloro, calyce nudo. *Sp. pl.* 882. *Walt. carol.* 166.

Orobanche aut Helleborine affinis marilandica, caule nudo, unico in summitate flore. *Raj. suppl.* 595.

Dentariae f. Anblato cordi affinis, flore pallide caeruleo. *Gron. virg.* 70.

Gentiana minor aurea, flore simplici amplo deflexo pallide flavescente. *Pluk. mant.* 89. t. 348. f. 3.

Aphyllon. *Mitch.* 25.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 152.

Einblumige Sommerwurz. W.

*Habitat in Virginia.* 24

Vagina *spathacea*. Flos *pallide coeruleus, cernuus.*

\* \* *Corollis quinquefidis.*

13. OROBANCHE *coerulea*.

O caule subsimplici, corollis quinquefidis, bracteis ternis, calycibus tubulatis semiquadrifidis. *Sutton. Act. Soc. Lin. Lond.* 4. p. 184. *Smith. bot. angl. t.* 423.

O. (*coerulea*) caule simplici basi bulboso, floribus numerosis incurvis, *Vill. delph.* 2. p. 406.

O. (*purpurea*) caule simplicissimo pubescente, staminibus inclusis. *Jacq. vindb. obs.* 50. *austr. t.* 276.

O. (*laevis*) caule simplicissimo laevi, staminibus exsertis. *Sp. pl.* 881. *Hoffm. germ.* 222. *Roth. germ. I.* 262. II. 48.

O. caule simplici, stipulis ternatis, calyce quinquefido. *Hall. helv. n.* 294.

O. floribus coeruleis laxè spicatis. *Gmel. sib.* 3. p. 215. t. 46. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 146.

Blaue Sommerwurz. W.

*Habitat in Germaniae, Galliae, Angliae, Sibiriae passicuis agrorum marginibus et collibus graminosis.* 24 (v.v.)

Calyx *quadrifidus cum rudimento dentis quinti, interdum et quinquefidus cum sexti dentis rudimento.*

Flores *violacei venis saturatioribus leviter pilosi.* W.

\*14. OROBANCHE *Phelypaea*.

O. caule simplici, corollis quinquefidis cylindraceis, bracteis ternis, calycibus quinquepartitis. W.

*Phelypaea (violacea)* lcapo carnoso, bracteis ternatis, corollis arcuatis. *Desf. atl.* 2. p. 60. t. 145.\*



Violette Sommerwurz. W.

*Habitat in arenis deserti Barbariae.* 2

15. OROBANCHE *tinctoria*.

O. caule simplici, corollis quinquefidis incurvis inflatis, bracteis ternis, calycibus quinquepartitis. W.

O. (*tinctoria*) caule simplicissimo imbricato, calycibus quinquefidis obtusis, corollis quinquefidis, lobis integerrimis. *Vahl. symb. 2. p. 70.\**

Orobanche tinctoria. *Forsk. descr. 112.\**

Lathraea (*Phelypaea*) corollis campanulato-patentibus. *Sp. pl. 844.*

Phelypaea (*tutea*) scapo carnosio fulcato, bracteis ternis, corollis arcuatis inferne angustatis. *Desf. atl. 2. p. 61. t. 146.\**

Phelypaea lusitana flore luteo. *Tournef. cor. 47.*

Orobanche elegantissima verna flore luteo. *Grist. lusit. Morif. hist. 3. p. 502.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 22.*

Färber Sommerwurz. W.

*Habitat in Lusitania, Barbaria, Arabia.* 2

*Simile praecedenti, sed: corolla flavu inflata magis incurva diversissima.* W.

16. OROBANCHE *cernua*.

O. caule simplicissimo, corollis recurvatis, bracteis ovatis corolla brevioribus, caule nudiusculo. *Sp. pl. 882.*

O. caule simplici, corolla incurva bracteis deltoidibus longiore. *Loest. itin. 152. n. 36.\**

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 151.*

Hängende Sommerwurz. W.

*Habitat in Hispaniae campis sterilissimis supra radices Artemisiae campestris.* 2

17. OROBANCHE *ramosa*.

O. caule ramoso, corollis quinquefidis, bracteis ternis, calycibus brevibus profunde quadrifidis. *Sutton Act. Soc. Lin. Lond. 4. p. 185.\* Smith bot. angl. t. 184.*

O. caule ramoso, corollis quinquefidis. *Sp. pl. 882. Pollich. pal. n. 601. Hoffm. germ. 222. Roth. germ. I. 262. II. 49.*

O. caule ramoso. *Hort. cliff. 321. Roy. lugdb. 299. Dalib. paris. 191. Gort. getr. 369. Osb. it. 58.*

O. caule ramoso, flore quinquepartito. *Hall. helv. n. 296.*

O. ramosa. *Bauh. pin. 88.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

Z

Orobanche. *Cam. epit.* 311. *Guett. mem. de 1746. t. 9.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 152.

Aestige Sommerwurz. W.

*Habitat in pascuis Europae.* 2 (v. v.)

*Variat caule ramofo, subramofo, atque simplici, ut et florum colore.* W.

\*18. OROBANCHE *coccinea.*

O. caule unifloro, corolla quinquefida inflata, calyce quinquepartito nudo. W.

Orobanche *coccinea.* *Marschall ab Bieberstein casp.*  
 p. 58.

*Phelypaea orientalis flore coccineo.* *Tournef. cor.* 47?  
 Scharlachfarbene Sommerwurz. W.

*Habitat in Sibiria versus Mare Caspium.* 2 (v. f.)

*Caulis erectus digitalis et ultra crassitie pennae columbinae. Folia alterna tria vel quatuor remota oblonga obtusa vaginantia. Bractae nullae. Flos solitarius durante anthesi nutans, postea erectus. Calyx campanulatus profunde quinquepartitus, laciniis lanceolatis tribus longioribus et latioribus. Corolla inflata coccinea quinquefida bilabiata, lobis oblongis obtusis. An synonymum Tournefortii huc pertineat ignoro: saltem convenit figura floris Phelypaea in Institutionibus rei herbariae t. 479. exacte cum planta nostra.* W.

1187. HYOBANCHE.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1046.

*Cal.* 7-phyllus. *Cor.* ringens labio inferiore nullo.  
*Capf.* 2-ocularis, polysperma.

I. HYOBANCHE *sanguinea.*

Hyobanche *coccinea.* *Mant.* 253.

Orobanche *mauritanica, flore purpureo.* *Pet. gaz. t.*  
 37. f. 4.

Orobanches *species aethiopica.* *Pluk. mant.* 142.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 154.

Blurothe Hyobanche. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei, parasitica radicum.*

*Planta tota statura refert Orobanchen, sed sanguinea. Caulis semipedalis, simplicissimus, lignosus, imbricatus foliis. Folia: Squamae ovatae, dense imbricatae, extus convexae, glabrae, obtusae. Spica termina-*

lis, villosa, longitudine caulis, at triplo latior, imbricata bracteis et floribus. Bracteae ovato-oblongae, extus hirsutae, longitudine tubi florum. Flores solitarii, sessiles.

Obs. Calyx 7-phyllus et Corolla absque labio inferiore hanc plantam ab Orobanthes genere exulare jubent.

## 1188. D O D A R T I A.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1047.

Cal. 5-dentatus. Cor. labium inf. duplo longius.  
Caps. 2-ocularis, globosa.

## 1. DODARTIA orientalis. †

D. foliis linearibus integerrimis glabris. Sp. pl. 883.

Mill dict. n. 1. et ic. t. 27. Gmel. sib. 3. p. 200. n. 9.

Pall. it. 2. p. 472.

Dodartia. Hort. cliff. 326. Roy. lugdb. 297.

D. orientalis, flore purpurascens. Tournef. cor. 47.  
itin. 3. p. 208. t. 208.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 155.

Orientalische Dodartie. W.

Habitat in monte Ararat, Tataria. 4 (v. f.)

Radix repens. Flores alterni, racemosi, subsessiles, atropurpurei.

An eadem ac Stemodia camphorata? W.

## 2. DODARTIA indica.

D. foliis ovatis serratis villosis. Sp. pl. 883.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 156.

Indische Dodartie. W.

Habitat in India.

Caules teretiusculi, villosi, subramosi. Folia ovata, petiolata, obtuse serrata, villosa, pollicis extimo latiora. Racemus terminalis Foliis minoribus. Flores oppositi, secundi, subsessiles. Calyx obtusus, villosus. Corolla flava, labio exteriori recto brevi.

## 1189. L I P P I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 993.*

*Cal.* 4-dentatus, subrotundus, erectus compresso-membranaceus. *Capsf.* 2-locularis, 2-sperma, recta.

## 1. LIPPIA americana.

*L.* capitulis solitariis tetragonis pedunculatis axillaribus, foliis lanceolato ovatis extra medium ferratis. *W.*

*L.* capitulis pyramidatis. *Sp. pl.* 883. *Banks reliq. Houst. t.* 12.

*L.* arborefcens, foliis conjugatis oblongis. *Mill. dict. n. 1. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 88.

Americanische Lippie. *W.*

*Habitat in Vera Cruce.* †

*Frutex* caulibus teretibus, pallidis, ad genicula compressis. Folia lanceolato-ovata, extra medium serrata, petiolata, scabra, opposita. Pedunculi axillares, oppositi, brevissimi, capitati. Capitula retrorsum imbricata squamis innumeris, tetragona, ovata, magnitudine pisti, flosculo inter singulam squamam.

## 2. LIPPIA hemisphaerica.

*L.* capitulis solitariis conico-hemisphaericis pedunculatis axillaribus, foliis oblongis integerrimis acuminatis. *W.*

*L.* capitulis hemisphaericis. *Sp. pl.* 883. *Jacq. amer. 176. t.* 179. f. 100. *Mill. dict. n. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 89.

Halbkugliche Lippie. *W.*

*Habitat in America meridionali.* †

## 3. LIPPIA hirsuta.

*L.* capitulis ovatis paniculatis axillaribus, foliis oblongis rugosis ferratis subtus tomentosis. *W.*

*L.* hirsuta, foliis oblongis latis rugosis ferratis subtus tomentosis, paniculis axillaribus, capitulis ovatis. *Lin. suppl.* 288.

Rauhe Lippie. *W.*

*Habitat in America. Mutis.*

*Caulis tetragonus hirsutiae canus. Folia opposita petiolata oblonga, longa, serrata rugosa, supra pilosa subtus tomento cana. Pedunculi axillares plures et non*

*gati in paniculam ramificantes. Pedicelli terminantes in Capitula ovata, bracteis binis suffulta. Flores minuti albi.*

\*4. LIPPIA *umbellata*.

L. capitulis hemisphaericis umbellatis axillaribus, foliis oblongis rugosis serratis subtus canis. W.

L. caule fruticoso tetragono, foliis ovatis serratis rugosis, floribus umbellatis Cavan. *ic.* 2. p. 75. t. 194.\*

Doldenblütige Lippie. W.

Habitat in Mexico. †

Valde affinis videtur praecedenti, differt capitulis bracteis pluribus cordatis involucreatis, et umbellatis, corollisque saturate luteis. W.

\*5. LIPPIA *cymosa*.

L. cyma subcapitata axillari solitaria, foliis ellipticis subintegerrimis. W.

L. floribus cymosis, foliis ovatis acutis subintegris, Swartz *prod.* 93. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1066.\*

Spiraeae congener spinosa, folio subrotundo acuminato integro. Sloan. *hist.* 2. p. 30. t. 174. f. 3. 4.

Afterdoldige Lippie. W.

Habitat in fruticetis Jamaicae australis. † (v. l.)

Rami spinosi. Differt a congeneribus floribus non capitatis. W.

\*1190. ACHIMENES.

Vahl. *symb.* 2. p. 71.

Cal. 5-partitus. Cor. subaequalis, limbo plano quadrifido. Antherae connexae. Caps. 2-ocularis.

I. ACHIMENES *sesamoides*.

Achimenes sesamoides. Vahl. *symb.* 2. p. 71.\*

Columnnea (*longifolia*) foliis lanceolatis longissimis subferratis glabris. Mant. 90.

Sesamum (*javanicum*) foliis lanceolatis dentatis sessilibus. Burm. *ind.* 133. Retz *obs.* 4. p. 28.

Bahel Tsjulli. Rhced. *mal.* 9. p. 169. t. 87.

Houttuyn Lin. *Pfl. Syst.* 8. p. 180.

Sesamartiger Achimenes. W.

Habitat in India orientali.

Caulis herbaceus. Folia opposita sessilia lanceolata longissima subserrata utrinque laevia. Racemi termina-

*les elongati recti floribus oppositis. Calyx 5-phyllus ovatus erectus persistens. Corolla monopetala irregularis; Labio superiore magno: Labio superiore trifido. Stamina didyma. Antherae basi bipartitae lobis divaricatis adnexae oppositae in crucem. Germen ovatum. Stylus longitudine staminum. Stigma crassiusculum bifidum. Capsula subovata bilocularis bivalvis. Receptaculum seminum globosum, cui immersa Semina plurima.*

## 1191. S E S A M U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1048.*

*Cal. 5-partitus. Cor. campanulata, 5-fida: lobo infimo majore. Rudimentum Filamenti quinti. Stigma lanceolatum. Caps. 4-locularis.*

## 1- S E S A M U M orientale.

*S. foliis ovato oblongis integris. Hort. cliff. 318. Fl. zeyl. 318. Mat. med. 157. Mill. dict. n. 1.*

*S. pedunculo inter duas glandulas. Vir. cliff. 60. Roy. lugdb. 262. Gron. orient. 76.*

*S. veterum. Bauh. pin. 27.*

*Digitalis orientalis Sesamum dicta. T. Burm. zeyl. 87. t. 38. f. 1.*

*Schit elu. Rheed. mal. 9. p. 105. t. 54.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 157.*

*Orientalischer Sesam. W.*

*Habitat in Zeylona, Malabar. ☉ (v. v.)*

*Caulis erectus, teres, pilosus: Ramis paucis, inferne locatis. Folia opposita petiolata, oblongo-ovata, integerrima, venosa, pilis parvis adspersa. Flores axillares, solitarii. Pedunculo brevissimo, ad cujus basim Bractee duae, lineares, breves et intra singulam Glandula lutea, perforata. Calyx 5-partitus, dehiscens, subaequalis. Corolla Digitalis, abba, obsolete 5-loba, obtusa: infima productiore rotundata: Stamina 4. duobus superioribus, inter quae filamenti quinti rudimentum castratum.*

## \*2. S E S A M U M luteum.

*S. foliis lanceolatis longe petiolatis, corollis extus hispidis. Retz obs. 6. p. 31.*

*Gelber Sesam. W.*

*Habitat in nemorosis Nidrapur Indiae orientalis.*

Caulis erectus foliosus parum flexuosus. Folia alterna longe petiolata lanceolata acuta, pilis brevissimis margine et nervis subtus adspersa. Flores axillares solitarii breviter pedunculati, pedunculo ex ipsa basi petioli quasi prodeunte. Calyx et Capsula hispida. Corolla saturate lutea extus hispida. Retz l. c.

3. **SESAMUM indicum.**

S. foliis ovato-lanceolatis, inferioribus trilobis, superioribus indivisis, caule erecto. W.

S. foliis inferioribus trifidis. Roy. lugdb. 292. Mill. dict. n. 2. Forskoehl aegypt. cent. 4. p. 113.

S. foliis inferioribus trifidis dentatis, superioribus oblongis serratis. Brown. jam. 270.

S. indicum. Rumph. amb. 5. p. 204. t. 76. f. 1.

S. alterum foliis trifidis, orientale, semine obscuro.

Pluk. alm. 344. t. 109. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 160.

Indischer Sesam. W.

Habitat in India. ☉

\* 4. **SESAMUM laciniatum.**

S. foliis omnibus tripartitis laciniatis, caule prostrato hispido. W.

Sesamum laciniatum. Klein.

Schlitzblättriger Sesam. W.

Habitat in India orientali prope Hydrabad. (v. l.)

Caulis ramosus prostratus hispidus, ramis apice adscendentibus. Folia opposita breve petiolata utrinque scabra subtus albida, profunde tripartita, laciniis profunde dentatis obtusis. Flores axillares solitarii brevissime pedunculati. Calyx quinquepartitus laciniis lanceolatis acutis margine hispidis. Capsula oblonga utrinque obtusa, stylo lato persistenti terminata quadrilocularis. W.

Sesamum prostratum Retz obs. 4. p. 28. est planta mihi valde dubia, convenit enim pluribus notis cum *Torenia asiatica*. W.

\* 1192. **TORTULA.**

*Tortula* Roxb.

Cal. 5-partitus. Corollae tubus spiralis. Nucēs 2, biloculares externe rugosae.

\* 1. **TORTULA aspera.** †

*Tortula aspera*. Roxb.

Scharfblättrige Drehling. W.

*Habitat in India orientali.* (v. l.)

Habitus *Verbenae lappulaceae*. *Caulis erectus tetragonus ramosus, geniculis inferioribus tumidiusculis. Folia opposita petiolata triuncialia subcordata ovata obtusiuscula grosse dentata venosa utrinque scabra. Spicae filiformes longissimae, floribus alternis et oppositis apicem versus confertis, inferioribus remotis brevissime pedunculatis, bractea subulata suffultis. Calyx hispidus in flore erectus in fructu reflexus et inflatus. Corolla bilabiata.* W.

*Sub nomine Tortulae asperae Roxb. sicca misit specimina amicus D. Klein absque ullo caractere.* W.

\*1193. H O L M S K I O L D I A.

*Retz obs. 6. p. 31.*

*Cal. 5 - dentatus amplius patentissimus. Cor. ringens. Caps. 1 - locularis? polysperma.*

\*I. HOLMSKIOLDIA *sanguinea.*

*Holmskioldia sanguinea. Retz obs. 6. p. 31.*

*Blutrothe Holmskioldie.* W.

*Habitat in vallibus Bengaliae.* ‡

*Frutex ramis tetragonis, cortice cinereo laevi. Folia opposita cordata vel ovata acuta serrata petiolata punctata, nervis tomentosis, subtus pallidiora; floralia subrotunda vel ovata saepius integerrima. Pedunculi axillares oppositi multiflori foliosi. Calyces et Corollae sanguineae.* Retz l. c.

1194. M I M U L U S.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1049.*

*Cal. 5 - dentatus, prismaticus. Cor. ringens: labio superiore lateribus replicato. Caps. 2 - locularis, polysperma.*

I. MIMULUS *ringens.*

*M. foliis lanceolatis acuminatis glabris sessilibus, pedunculis flore longioribus.* W.

*M. erectus, foliis oblongis linearibus sessilibus. Sp. pl. 884. Hort. upf. 176. t. 2. \* Act. upf. 1741. p. 82. Mill. dict. n. I.*



*Euphrasia floridana*, *lysimachiae glabrae filiquosae foliis, quadrato caule, ramolior.* *Pluk. amalth.* 83. t. 393. f. 3.

*Lysimachia galericulata* f. *Gratiola elatior non ramosa.* *Gron. virg.* 69.

*Gratiola canadensis latifolia, flore magno caeruleo.* *Boerh. lugdb.* 2. p. 265.

*Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore.* *Morif. hist.* 2. p. 479. f. 5. t. 8 f. 6. *Raj. hist.* 769.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 161.

Rachenförmige Gauklerblume. W.

*Habitat in Virginia, Canada.* 4 (v. v.)

\*2. *MIMULUS glutinosus.*

*M. foliis oblongis obtusiusculis viscosis sessilibus, pedunculis flore brevioribus.* W.

*M. (glutinosus) frutex caule erecto hispido glutinoso, foliis oppolitis conjunctis lanceolatis dentatis glutinosis nitidis, floribus terminalibus axillaribus unitoris.* *Wendl. obs.* 51.

*M. (aurantiacus) caule erecto fruticoso tereti, foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis.* *Curt. mag.* 354.\*

Klebrige Gauklerblume. W.

*Habitat* - - - - - 5 (v. v.)

*Tota planta viscosa. Flores aurantii coloris.* W.

\*3. *MIMULUS alatus.*

*M. erectus, foliis ovatis petiolatis, caule tetragono alato.* *Ait. Kew.* 2. p. 361. *Vahl symb.* 2. p. 72.

Getügelte Gauklerblume. W.

*Habitat in America boreali.* 4

*Facies M. ringentis. Caulis e membranis quatuor e basi petiolorum decurrentibus alatus simplex, uti tota planta glaber, superne ramulo uno alterove. Folia petiolata bipollicaria ovato-lanceolata venosa inaequaliter ferrata. Pedunculi axillares solitarii oppositi unguiculares tetragoni superne incrassati. Calyx longitudine pedunculi, laciniis rotundatis mucronatis. Corolla calyce parum longior.* *Vahl i. c.*

4. *MIMULUS luteus.* †

*M. foliis subrotundo-ovatis nervosis inferioribus petiolatis, caule repente.* W.

*M. repens, foliis ovatis.* *Sp. pl.* 884.

*Gratiola foliis subrotundis nervosis, floribus luteis. Feuill. peruv. 2. p. 745. t. 34.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 162.*  
 Gelbe Gauklerblume. W.  
*Habitat in Peru.*

## 1195. R U E L L I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1050.*

*Cal. 2-partitus. Cor. subcampanulata, Stamina per paria approximata. Caps. dentibus elasticis diffiliens.*

1. R U E L L I A *Blechnum.*

R. foliis ovatis ferrato-dentatis hirsutiufculis, spicis ovatis, bracteis interioribus geminis, floribus ternis sessilibus. *Swartz obs. 243.\**

R. foliis ovatis integerrimis, spicis ovatis: bracteis interioribus geminis, floribus binis sessilibus. *Amoen. acad. 5. p. 400.*

*Barteria pyramidata, flore coeruleo. Plum. gen. 31. ic. 42. f. 3.*

*Blechnum foliis oblongo-ovatis, spicis crassis foliatis conico-quadratis subhirsutis. Brown. jam. 261.*

*Brunella elatior, flore albo. Sloan. jam. 65. hist. 1. p. 173. t. 109. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 163.*

Pyramidenförmige Ruellie. W.

*Habitat in pascuis fruticetis Jamaicae. ☉ (v. l.)*

*Caulis herbaceus pedalis erectus ramosus tetragonus striatus laevis. Folia petiolata opposita ovato-lanceolata acuminata ferrato-dentata hirsutiufcula. Flores spicati. Spicae terminales tetragonae conicae unciales. Bractee imbricatae cordatae, ad quorum basin bracteolae geminae inter quas Flores tres subsessiles axalbidocoerulei. Swartz l. c.*

*Descriptio in Amoen. acad. potius est R. Blechioidis a Linnaeo, ut videtur, cum R. Blecho confusa. Swartz l. c.*

\*2. R U E L L I A *Blechioides.*

R. foliis oblongis subdentatis glabris, spicis ovatis, floribus bracteis longioribus. *Swartz prod. 94. Fl. ind. eccid. 2. p. 1068.\**

Schattenliebende Ruellie. W.

*Habitat in sylvis montium umbrosis Jamaicae occidentalis.* †

*Differt a praecedenti: Foliis integerrimis. Spicis non tetragonis hirsutis, corollis albidis.* Swartz l. c.

\*3. *RUELLIA angustifolia.*

R. foliis lineari-lanceolatis, spicis oblongis, bracteis ovatis hirsutis. Swartz prod. 93. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1070. Schmalblättrige Ruellie. W.

*Habitat in Caribaeis.*

Planta herbacea. Caulis pedalis et ultra ramosus tetragonus subgeniculatus glaber. Rami tetragoni ad petiolos ubique subgeniculati. Genicula tumida. Folia brevissime petiolata opposita lineari-lanceolata integra erecta utrinque glabra. Spicae terminales oblongae. Bractee sessiles alternae remotiusculae nec approximatae ovatae acuminatae, margine subtusque hirtae. Flores intra bractee subsolitarii sessiles parvi coerulei. Capsulae oblongae acuminatae glabrae. Swartz l. c.

\*4. *RUELLIA ovata.*

R. foliis sessilibus oblongis integerrimis utrinque acutis villosis, floribus ternis subsessilibus, caule adscendente. W.

R. foliis ovatis villosis ciliatis, floribus axillaribus ternis subsessilibus, bracteis linearibus acutis. *Cavan. ic.* 3. p. 28. t. 254.\*

Eyförmige Ruellie. W.

*Habitat in Mexico.* †

Flores brevissimi pedunculati. Calycis lacinae lanceolatae acuminatae. Corolla magna saturate coerulea. Capsula oblongo-lanceolata obtusa calyce brevior. Bractee binae lanceolatae acuminatae ad basin cujusque pedunculi. W.

5. *RUELLIA strepens.*

R. foliis petiolatis ovatis integerrimis, pedunculis trifloris brevissimis, caule erecto. W.

R. foliis petiolatis, pedunculis trifloris brevibus. *Mant.* 422.

R. foliis petiolatis, floribus verticillatis subsessilibus. *Hort. ups.* 178. *Mill. dict. n.* 2.

R. foliis petiolatis, fructu sessili conferto. *Hort. cliff.* 218. *Gron. virg.* 73. *Roy. lugdb.* 291.

R. strepens, capitulis comosis. *Dill. elth.* 300. t. 249. f. 321. *Sabb. hort.* 2. t. 92.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 164.

Rauschende Ruellie. W.

*Habitat in Virginia, Carolina.* 4 (v. v.)

Caules tetragoni angulis viridibus. Folia petiolata, lanceolato-ovata, obtusissime serrata, venosissima, basi remota, levissimeque ciliata. Pedunculi oppositi. laterales, breves, triflori. Bractee 2 oppositae, etiam 2 sub singulo flore laterali. Calyx 5-partitus, lanceolatus. Corolla pallida palato coerulescente. Filamenta, singuli lateris, connexa basi mediante membrana,

\*6. RUELLIA patula.

R. foliis petiolatis ovatis obtusissimis integerrimis pubescentibus, floribus ternis subsessilibus, caule erecto divaricato. W.

R. fruticosa villosa viscosa, foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus aggregatis. *Jacq. ic. rar.* 1. t. 119. *Misc.* 2. p. 358.\*

Ausgebreitete Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.* 5 (v. v.)

Tota planta pube tenui tecta. Folia obtusissima. Corollae pallide violaceae. Capsulae obovatae calyce multo majores. W.

\*7. RUELLIA pallida.

R. foliis petiolatis ovatis undulato-crenatis margine scabris, floribus axillaribus solitariis sessilibus. *Vahl symb.* 2. p. 72.\*

R. (*strepens*) flore magno violaceo, foliis obtusis. *Forsk. descr.* 114.

Bleiche Ruellie. W.

*Habitat in Arabia felici.*

Caulis obscure tetragonus, sulco in singulo latere exaratus. Folia petiolata pollicaria ovato-oblonga obtusiuscula pallide viridia glabra. Pedunculi axillares brevissimi oppositi solitarii uniflori. Folium lanceolatum utrinque ad basin calycis ciliatum calyce longius. Corollae tubus calyce tripla longior, superne ampliatus pollicaris. *Vahl l. c.*

\*8. RUELLIA fragrans.

R. foliis sessilibus oblongis obtuse serratis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. *Forsk. prod.* n. 243.

Wohlriechende Ruellie. W.

*Habitat in insula Taheiti.*

\*9. **RUELLIA lactea.**

R. foliis petiolatis oblongo-ovatis ciliatis subdentatis, pedunculis brevissimis subtrifloris, caule villosissimo erecto. W.

R. caule herbaceo tomentoso-lanato, foliis ovatis subcuneatis ciliatis, floribus axillaribus nudis. *Cavan. ic. 3. p. 28. t. 255.\**

Milchfarbene Ruellie. W.

*Habitat in Mexico. 4 (v. v.)*

*Caulis superne pilis rectis albis articulatis densissime tectus. Folia oblongo-ovata obtusiuscula in petiolum attenuata obsolete dentata, margine tenuissime ciliata. Pedunculi triflori axillares, flore intermedio ebracteato, binis lateralibus sub calyce bracteis binis lanceolatis infiructis. Corolla magna dilute violacea demum alba. Capsula calyce longior linearis acuta. W.*

10. **RUELLIE clandestina.**

R. foliis petiolatis oblongis obtusis basi attenuatis subdentatis, pedunculis trifloris foliis brevioribus. W.

R. foliis petiolatis, pedunculis longis subdivisis nudis. *Hort. upf. 179.\* Mill. dict. n. 3. Gouan. illustr. 39.*

R. foliis sessilibus, pedunculis trifloris. *Hort. cliff. 308. Roy. lugdb. 291.*

R. capsulis terebibus. *Dill. elth. 328. t. 248. f. 320. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 165.*

Heimliche Ruellie. W.

*Habitat in Barbados et in insula St. Crucis. 4 (v. l.)*

*In Horto Mouspeliensi primo jam anno floruit, corollis in floribus primordialis calyce minoribus, in reliquis floribus eodem longioribus. Gov.*

\*11. **RUELLIA violacea.**

R. foliis petiolatis oblongis acutis dentatis tomentosis, pedunculis unifloris elongatis foliis brevioribus. W.

R. floribus solitariis alternatim axillaribus longo pedunculo infidentibus, foliis tomentosis ovato-oblongis.

*Aubl. guj. 2. p. 668. t. 271.\**

Violette Ruellie. W.

*Habitat in pratis Gujanae. 4*

*Radix fibrosa radiculis tuberosis. Corollae laciniæ*

*acutae. Bracteae lineares longae ad basin calycis. Capsula acuminata utroque latere sinu excisa. W.*

\*12. *RUELLIA rubra.*

R. foliis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis multifloris subcorymbosis, corollae limbo fimbriato. W.

R. foliis ovato-oblongis acutis, pedunculis axillaribus longis multifloris. *Aubl. guj. 2. p. 666. t. 270.\**

Rothe Ruellie. W.

*Habitat ad ripas Gujanae. 4*

\*13. *RUELLIA macrophylla.*

R. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, pedunculis elongatis bifloris. *Vahl. symb. 2. p. 72. t. 39.* Großblättrige Ruellie. W.

*Habitat ad St. Martham Americes. (v. l.)*

Caulis tetragonus pubescens. Folia petiolata subspithamaea, basi per petiolum decurrentia, utrinque pilis minutis rarioribus adspersa, subtus pallidiora. Petioli pubescentes sesquipollicares. Pedunculi axillares oppositi, longitudine foliorum teretes pubescentes bifidi. Pedicelli gemini semipollicares uniflori, basi utrinque bractea lanceolata ciliata pedicello longiore, duae aliae ad basin singuli calycis, ejusdem longitudinis. Calyx quinquefidus glaber, laciniis lanceolatis subaequalibus. Corolla sesquipollicaris glabra, basin angustata, sursum versus ampliata, laciniis integerrimis, duabus superioribus rotundatis, inferioribus tribus parum brevioribus ovatis. Filamenta longitudine corollae. Stylus corolla longior. *Vahl l. c.*

\*14. *RUELLIA guttata.*

R. foliis ovato-lanceolatis margine scabris undulatis, spicis terminalibus imbricatis. *Vahl symb. 2. p. 72.\**

R. foliis ovato-lanceolatis, flore albo guttato. *Foršk. descr. 114.\**

Geleckte Ruellie. W.

*Habitat in monte Chadra Arabiae felicis. 5*

\*15. *RUELLIA imbricata.*

R. foliis petiolatis ovatis undulato-crenatis opposito minore, spicis imbricatis secundis. *Vahl symb. 2. p. 73.\**

R. (*imbricata*) floribus in axillis supremis congestis secundis sessilibus, bractea obliqua subrotunda. *Foršk. descr.*

*113.\**

R. (*dorsiflora*) decumbens, foliis oppositis, bracteis late cordatis ciliatis. *Retz. obs. 6 p. 31.*

Dachziegelährige Ruellie. W.

*Habitat in Arabia felici, India orientali, et in insula Borboniae. †*

Folia opposita, altero minore, ovata acute denticulata obliqua. Flores albi nocturni. *Retz l. c.*

\*16. *RUELLIA aristata.*

R. foliis ovatis subrus canescentibus, capitulo terminali, calycibus bracteisque nervosis aristatis, caule fruticoso.

*Vahl symb. 2. p. 73.\**

Gebrannte Ruellie. W.

*Habitat in Arabia felici. †*

Folia petiolata unguicularia ovata obtusa integerrima crassiuscula avenia. Capitulum terminale hemisphaericum, basi cinctum foliolis nonnullis oblongis. Bracteeae 3 lanceolatae membranaceae nervosae in arisiam desinentes piloso - ciliatae. Corolla extus pilosa. *Vahl l. c.*

\*17. *RUELLIA intrusa.*

R. foliis petiolatis ovatis pilosis, floribus spicatis secundis. *Vahl symb. 1. p. 45.*

R. corollae lacinia intrusa fornicata. *Forsk. descr. 113.\**  
Berg Ruellie. W.

*Habitat in Arabiae felicis montibus altioribus.*

Caulis herbaceus. Rami obtuse tetragoni pilosi articulati, articulis bipollicaribus basi incrassatis. Folia petiolata ovata integerrima acuta pilosa pollicaria. Petiolus brevis. Spica terminalis bipollicaris. Flores secundi solitarii alterni, rarissime oppositi. Bracteeae binnae setaceae ad basin floris. Calyx quinquepartitus, laciniis lanceolato-subulatis pilosis. Corolla violacea extus pubescens. *Vahl l. c.*

18. *RUELLIA paniculata.*

R. foliis integerrimis, pedunculis dichotomis, lateralibus calycibus sessilibus: lacinia suprema majore. *Sp. pl. 885. Mill. dict. n. 5. Swartz obs. 244.\**

R. pedunculis multifloris dichotomis folio longioribus. *Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 292.*

Speelum veneris majus impatiens. *Sloan jam. 59. hist. 1. p. 158. t. 100. f. 2. Raj. suppl. 389.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 166.*

Rilpenblütige Ruellie. W.

*Habitat in Jamaicae australis collibus aridis. 4 (v. l.)*

Planta tripedalis: Ramis erectis; nec patulis. Folia scabriuscula; caulina, quae decidunt dum floret, majora: rameis relinquunt basin petioli truncatam spinescentem. Pedunculi oppositi, dichotomi, longitudine petiolorum. Bractee lanceolatae, longitudine pedunculorum. Corollae purpurascens, non campanulatae, sed bilabiatae: Labio superiore bifido; inferiore trifido aequali.

19. RUELLIA *tuberosa*.

R. foliis cuneato-ovatis crenatis, pedunculis tripartitis, caule simplici. *Swartz obs. 245.\**

R. foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris. *Sp. pl. 885. Mill. dict. n. 1.*

R. capsulis angulosis. *Dill. elth. 328.*

R. humilis, flore coeruleo, asphodeli radice. *Plum. gen. 12.*

Geniaella flore coeruleo, integro vasculo feminali ex humidi contactu impatiente. *Sloan. jam. 52. hist. 1.*

*p. 149. t. 95. f. 1. Raj. suppl. 370.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 166.*

Knollige Ruellie. W.

*Habitat in Jamaicae nemorosus cultis. 4 (v. l.)*

20. RUELLIA *tentaculata*.

R. foliis obovatis verticillis obvallatis spinis inermibus bifurcatis. *Sp. pl. 886. Amoen. acad. 4. p. 320.\**

Euphrasia acinos. *Pluk phyt. 279. f. 7.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 167.*

Weichstächtige Ruellie. W.

*Habitat in India.*

21. RUELLIA *biflora*.

R. floribus geminis sessilibus. *Sp. pl. 886.*

R. minore folio, floribus gemellis. *Dill. elth. 331.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 168.*

Zweyblütige Ruellie. W.

*Habitat in Carolina. 4*

22. RUELLIA *crispa*.

R. foliis subcrenatis lanceolato-ovatis, capitulis ovatis foliosis hispidis, caule repente. *Sp. pl. 886. Osb. it.*

*240. Mill. dict. n. 4.*



*Adhatoda luzanensis*, spica plana. *Pet. gaz. t. 73. f. 6?*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 168.*  
 Krause Ruellie. W.

*Habitat in India. Osbeck. 2*

Radix lignosa, repens. Caules repentes, digitales, simplicissimi, articulati, teretiufculi. Folia lanceolato-ovata, subpetiolata, pilis adspersa, margine reflexo undulato crispa s. crenata. Capitula ad genicula, lateralia, solitaria, ovata, imbricata. Foliis ovatis, acuminatis, piloso-scabris, intra quae flores Calyce 5-partito hirsuto lineari. Corolla flava. Stamina 4.

\*23. *RUELLIA fasciculata.*

R. foliis petiolatis oblongis dentatis, petioliis alatis, floribus aggregatis terminalibus lateralibusque. *Vahl symb. 3. p. 82.\**

R. decumbens, foliis lanceolatis petiolatis dentatis oppositis altero minore, floribus fasciculatis. *Retz obs. 4. p. 28.*

Büschelblütige Ruellie. W.

*Habitat in nemorosis prope thermas Trinquemallenses Zylonae.*

Caulis decumbens tetragonus tenuis. Folia opposita altero minore, petiolata lanceolata dentata nuda. Fasciculi florum terminales. Bractee ovatae integrae trinerviae pilosae. *Retz l. c.*

\*24. *RUELLIA mollissima.*

R. foliis petiolatis lato-lanceolatis integerrimis mollissimis, floribus fasciculatis. *Vahl. symb. 3. p. 82.\**

Weichblättrige Ruellie. W.

*Habitat in Madagascar.*

Tota villosa mollis. Folia opposita remota pendula palmaria et ultra, pollicem lata apice attenuata viridia. Petioli cinerei. Flores in fasciculo pedunculato collecti. *Vahl l. c.*

\*25. *RUELLIA undulata.*

R. foliis petiolatis oblongis undulatis, capitulis axillaribus sessilibus, caule erecto. *Vahl. symb. 3. p. 82.\**

Weilenblättrige Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.*

Caulis erectus herbaceus tetragonus glaber, geniculis crassioribus piloso-ciliatis. Folia obtusa basi attenuata glabra. Flores conferti in capitulis alternis  
*Linnaei Spec. Plant. T. III. A a*

*unguicularibus. Corolla calyce parum longior glabra. Vahl l. c.*

\*26. *RUELLIA involucrata.*

*R. foliis lanceolatis integerrimis glabris, capitulis terminalibus involucrentis pilosis. Vahl symb. 3. p. 83.\**

Eingewickelte Ruellie. W.

*Habitat in India orientali. 2.*

*Folia subsessilia opposita dodrantalia, pollicem lata utrinque attenuata obtusiuscula plana subtus pallidiora utrinque glabra. Flores in capitulo terminali imbricati, breve pedunculato, magnitudine nucis Coryli. Bracteae quatuor sub singulo capitulo ovatae acutae pilosae ciliatae. Vahl l. c.*

27. *RUELLIA repanda.*

*R. foliis lanceolatis obtuse dentatis petiolatis, caule repente. Sp. pl. 886. Burm. ind. t. 40. f. 2.*

*Prunella molucca. Rumph. amb. 6. p. 30. t. 13. f. B.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 169. (exclusa icone.)*

Ausgeschweifte Ruellie. W.

*Habitat in Java.*

*Herba repens. Caules herbacei, filiformes, articulati, laeves. Folia opposita, petiolata, lanceolata, obtusa, glabra, obtuse inaequaliter dentata. Spicae axillares, pedunculatae: Floribus oppositis: Bracteis linearibus brevioribus: Calycibus ariflato-pilosis.*

28. *RUELLIA ringens.*

*R. foliis oblongis integerrimis, floribus solitariis sessilibus, caule procumbente. Fl. zeyl. 234.\* Osb. it. 229.*

*Upudali. Rheed. mal. 9. p. 125. t. 64.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 171. (exclusa icone.)*

Rachenförmige Ruellie.

*Habitat in India orientali. (v. l.)*

*Folia lanceolata obtusiuscula. Bracteae 2, sessiles, calyce breviores.*

29. *RUELLIA coccinea.*

*R. floribus axillaribus terminalibusque subsolitariis sessilibus, foliis ovatis dentatis. Vahl symb. 3. p. 83.*

*Barleria (coccinea) inermis, foliis ovatis denticulatis petiolatis, Sp. pl. 888. Mill. dict. n. 4.*

*Barleria solani folio, flore coccineo. Plum. gen. 31. ic. 43. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 178.*

Scharlachrothe Ruellie. W.

*Habitat in America meridionali. (v. l.)*

30. **RUELLIA repens.**

R. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, floribus sessilibus, bracteis petiolatis calyce ongioribus, caule repente. *Mant. 89. Burm. ind. 135. t. 41. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 173. nec icon.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. t. 59. f. 2.*

Kriechende Ruellie. W.

*Habitat in India.*

Caules palmares, herbacei, repentes. Folia lanceolata, acuminata, integerrima. Flores laterales, sessiles, solitarii. Bractee binae, ellipticae, petiolatae, calyce longiores.

31. **RUELLIA uliginosa.**

R. diffusa hirsuta, foliis sessilibus oblongis integris, spicis terminalibus tetragonis. *Lin. suppl. 290.*

Sumpf-Ruellie. W.

*Habitat in Tranquebar et prope Allam - parvam in agris oryzaceis vulgarissima. ☉ (v. l.)*

*Planta parva Januario et Februario florens.*

32. **RUELLIA pilosa.**

R. foliis oppositis ovatis integris ciliatis, floribus terminalibus solitariis. *Lin. suppl. 290.*

Behaarte Ruellie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

\*33. **RUELLIA hirta.**

R. foliis oblongis petiolatis serratis, spicis terminalibus imbricatis, caule repente. *Vahl. symb. 3. p. 84. t. 67.*

Haarige Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.*

Caulis herbaceus inferne repens, uti tota planta e pilis albis hirtus, vix spithamaeus ramosus tetragonus. Rami oppositi simplicissimi caule breviores. Folia petiolata opposita unguicularia extrorsum serrata basin versus integerrima obtusa. Spicae terminales ramorum solitariae ex axillis ultimis oppositae, imbricatae bracteis et floribus, pollicares, breve pedunculatae. Bractee oblongae longitudine calycis. Calycis lacinae lineares. *Vahl. l. c.*

34. *RUELLIA depressa.*

R. foliis oppositis petiolatis obovatis integris, caule arcte depresso. *Lin. suppl.* 290.

Niedergedrückte Ruellie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

*Singularis caule arcte terrae adpresso.*

\*35. *RUELLIA cordifolia.*

R. foliis cordato ovatis sessilibus subtus tomentoso-incanis, floribus subspicatis. *Vahl symb.* 3. p. 84.

Herzblättrige Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.* †

Caulis fruticosus. Rami articulati, superne subdichotomo ramosi obscure tetragoni. Folia sessilia opposita, majora ramorum vix unguicularia integerrima acuta, supra viridiora nervosa, ad lentem lineis albidioribus piliformibus, subtus incana. Flores in spica brevi terminali quadri-vel sexflora, oppositi distantes, rarius gemini, interdum oppositus deest. Bractea linearis longitudine calycis. Corollae tubus filiformis calyce longior. *Vahl l. c.*

\*36. *RUELLIA secunda.*

R. foliis subcordato-ovatis integerrimis villosis, racemis axillaribus secundis. *Vahl symb.* 3. p. 84.

Einseitige Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.* (v. l.)

Caulis, Rami, Folia et Petioli pubescentes. Folia petiolata pollicaria subcordato-ovata obtusa, juniora canascentia, parum acuminata. Petioli patentissimi folio parum breviores. Racemi axillares fere spithamaei, pedicelli breves remoti. Bractea setacea pedicello breviores. Calyces hirti. Corollae glabrae pollicares flavae. Germen villosum incanum. A. R. intrusa diversa: corollis majoribus racemosis flavis, laciniisque limbi subrotundis. *Vahl l. c.*

\*37. *RUELLIA reptans.*

R. foliis petiolatis ovatis obtusis, obtuse serratis, pedunculis terminalibus subspicatis. *Forst. prod.* n. 242.

Tanna'sche Ruellie. W.

*Habitat in insula Tanna.*

\*38. *RUELLIA japonica.*

R. foliis ellipticis, floribus spicatis, bracteis oblongis obtulis. *Thunb. jap.* 254.

Ruellia repanda e Japonia. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8.*  
*p. 171. t. 59. f. 1.*

Japanische Ruellie. W.

*Habitat in Japonia.*

Caulis herbaceus tetragonus fuscus erectus. Folia opposita subpetiolata elliptica obtusiuscula integerrima venosa glabra patula unguicularia, superioribus sensim minoribus. Spicae florum plures terminales alternae bracteatae glabrae digitales. Bracteae oblongae obtusae integrae imbricato-patulae longitudine tubi corollae. Corolla campanulata, limbo aequali lutea. Thunb. l. c.

\*39. RUELLIA alopecuroidea.

R. foliis ovatis glabris obscure repandis, spicis terminalibus pilosis, caule repente. *Vahl. eclog. 2. p. 49.*

Fuchschwanzartige Ruellie. W.

*Habitat in Montserrat.*

Caulis herbaceus subtetragonus glabriusculus ramosus. Folia petiolata pollicaria vel parum ultra, basi parum attenuata acutiuscula nervosa subavenia. Spicae ex apice ramorum pedunculatae vix pollicares oblongae imbricatae crassitie pennae cygnae. Bracteae duae ad basin calycis subulatae. Calyx pentaphyllus, foliolis quatuor subulatis, quinto parum longiore, lineari-lanceolato aristato subvenoso, omnibus membranaceis pallidis, lineis tribus coloratioribus ciliatis. *Vahl. l. c.*

\*40. RUELLIA barbata.

R. foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis, calycibus acutis, bracteis oblongis, caule erecto. *Vahl symb. 3. p. 83.*

Bärtige Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.*

Caulis herbaceus erectus tetragonus articulatus, articulis superne crassioribus. Rami pauci breves alterni. Folia sessilia bipollicaria et minora obtusiuscula, basi parum angustata, juniora pilosa praesertim ad marginem. Flores axillares sessiles, utrinque 3. Calyx extus pubescens. Corollae labium superius indivisum compressum lanceolatum obtusum; inferius supra pilis longis adpersum trifidum, laciniis linearibus obtusis. Antherae basi biaristatae. *Vahl. l. c.*

41. RUELLIA balsamea.

R. erecta glabra, foliis petiolatis lanceolatis serratis, verticillis sessilibus. *Linn. suppl. 289.*

Terpentinduftige Ruellie. W.

*Habitat in agris oryzaceis Indiae vulgarissima, imprimis messe finita.* ☉ (v. l.)

Caules erecti tetragoni glabri articulati carnosiflorati. Folia patula lanceolato-oblonga tenuissime serrata glabra glutinosa. Bracteae integerrimae saepe ciliatae. Calycis lacinae quatuor lanceolatae, quinta superior latior. Corolla ringens lutea. Antherae coeruleascentes. Stylus hirtus. Planta in India odorem fortem terebinthinaceum spirat.

\*42. *RUELLIA salicifolia.*

R. foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis, calycibus aristatis, bracteis lanceolatis, caule erecto.

*Vahl. symb. 3. p. 84.*

Weidenblättrige Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.*

*Similis R. barbatae, differre videtur sequentibus: Caule subsimplici, Foliis longioribus utrinque magis attenuatis, nec tantum apice, utrinque lineis piliformibus adpersis, subtus pallide viridibus, undique ejusdem fere longitudinis, nec minoribus oblongis obtusis in ramis. Bracteis non foliaceis obtusis, sed linearilanceolatis acutis, basi non attenuatis, calycibus minoribus in setam desinentibus, margine tantum pilis subciliatis, nec ubique, fructu deciduo persistentibus.* Vahl l. c.

\*43. *RUELLIA longiflora.*

R. foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis longissimis, caule fruticoso. *Vahl symb. 1. p. 45. t. 15.\**

*Camellia (grandiflora) foliis petiolatis cordatis obtusis integris, tubo corollae quadrilobis. Forsk. descr. 126.\** Langblütige Ruellie. W.

*Habitat in Arabia felici ad Taaes in montibus.* †

*Planta a Barleria longiflora toto coelo diversa, illa enim gaudet foliis mollissimis absque pilis stellatis, bracteis glabris reticulatis sessilibus scariosis.* Vahl l. c.

44. *RUELLIA difformis.*

R. diffusa hirsuta, foliis linearibus dentato-sinuatis integris, floribus verticillatis axillaribus. *Lin. suppl. 289. Nir-Schulli. Rheed. mal. p. 89. t. 46. forte varietas.*

Ungestaltete Ruellie. W.

*Habitat in India orientali.*

Folia lanceolata angusta integra, alia serrata, alia profundis quasi dentata, dentibus acutis.

\*45. *RUELLIA rupestris.* †

R. acaulis, foliis oblongis crenatis repandis, petioliis longissimis, scapis multifloris. Swartz prod. 93. Fl. ind. occid. 2. p. 1071.\*

Felsen-Ruellie. W.

*Habitat in fissuris rupium juxta fluvios in desertis Hispaniolae.* 2 (v. l.)

Corolla inaequalis hypocrateriformis. Swartz l. c.

An *Gerardia tuberosa* Lin.? W.

\*46. *RUELLIA scabrosa.* †

R. acaulis, foliis ovatis subrepandis coriaceis glabris, subtus scabris, scapis multifloris. Swartz fl. ind. occid. 2. p. 1074.\*

Scharfblättrige Ruellie. W.

*Habitat in petrosis umbrosis Hispaniolae.* 2

Haec cum antecedente, habitu ipsius plantae et forma corollae a Ruelliis diversissimae, genus distinctum forte efficiunt. Swartz l. c.

*Ruellia littoralis* Lin. suppl. 289 est *Justicia madurensis*. W.

## 1196. BARLERIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1051.

Cal. 4-partitus. Stamina 2 longe minora. Caps. 4-angularis, 2-locularis? 2-valvis, elastica absque unguibus. Sem. 2.

### 1. *BARLERIA longifolia.*

B. spinis verticillorum lenis, foliis ensiformibus longissimis scabris. Amoen. acad. 4. p. 320.\*

*Anchusa angustifolia*, verticillis longis aculeis armatis.

Pluk. alm. 30. t. 133. f. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 175.

Langblättrige Barlerie. W.

*Habitat in India.* ♂ (v. l.)

Spinae caulis utrinque 3, longitudine verticillorum.

2. BARLERIA *solanifolia*.

B. spinis axillaribus, foliis lanceolatis denticulatis. *Sp. pl.* 887. †

B. spinis axillaribus, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis sessilibus. *Mill. dict.* 3.

B. aculeata, solani folio angustiore, flore coeruleo. *Plum. gen.* 31. *ic.* 43. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 175.

Nachschattenblättrige Barlerie. W.

*Habitat in America australi.*

3. BARLERIA *Hystrix*.

B. spinis axillaribus geminis simplicibus, foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Mant.* 89.

Melampyro cognata maderaspatana spinis horrida. *Pluk. alm.* 243. *t.* 119. *f.* 5.

Hystrix frutex. *Rumph. amb.* 7. p. 22. *t.* 13.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 176.

Starkdornige Barlerie. W.

*Habitat in India. D. Dav. Royen.* ‡

*Cautius separanda a B. Prionite, observante Dav. Royen: Caule virgato; nec firmo. Ramis subtetragonis; nec teretibus. Foliis utrinque glabris; nec subtus pubescentibus. Spinis axillaribus geminis, simplicibus, sessilibus, horizontalibus; nec erectis, composito-quaternatis, pedatis.*

4. BARLERIA *Prionitis*.

B. spinis axillaribus pedatis quaternis, foliis integerrimis, lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 887. *Mill. dict.* n. 2. *Vahl symb.* 1. p. 46.

B. foliis integerrimis spinis lateralibus. *Roy. lugdb.* 231. *Fl. zeyl.* 231.\*

Justicia (*appressa*) spinis axillaribus compositis, flore fulvo, labio superiore brevior. *Forsk. descr.* 6.

Prionitis. *Hort. cliff.* 486.

Coletta-Veelta. *Rheed. mal.* 9. p. 77. *t.* 41.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 176.

Fulsangelförmige Barlerie. W.

*Habitat in India.* † (v. l.)

*Spinae pedatae, quaternae. Caulis teres. Folia subtus pubescentia.*

\* 5. BARLERIA *trispinosa*.

B. spinis axillaribus compositis triradiatis, spicis terminalibus imbricatis. *Vahl symb.* 1. p. 46.\*



*Justicia (trispinosa)* foliis lanceolato-ovatis, spicis terminalibus imbricatis, labio corollae superiore brevi.

*Forsk. descr. 6.\**

Dreydornige Barlerie. W.

*Habitat in Arabia felici in sylvis montis Melhan et Hadie. †*

Spinae axillares alternae triradiatae unguiculares albae. Spica terminalis imbricata. Bractee structura foliorum caulis sessiles, duae aliae minores lanceolato-subulatae ad basin floris. Flores solitarii oppositi. Calyx ut in *B. Prionite*, villosus. Corolla tenuissime villosa figura *B. buxifoliae*. Vahl l. c.

\*6. BARLERIA *bispinosa*.

*B. spinis axillaribus biradiatis floriferis, foliis ovatis subtus pilosis. Vahl symb. I. p. 46.*

*Justicia (bispinosa)* spinis axillaribus bifidis, corollae labiis aequalibus. *Forsk. descr. 6.\**

Zweydornige Barlerie. W.

*Habitat in Arabia felici. †*

Frutex ramis pilosis. Folia petiolo brevi ovata integerrima mucronata, venis subtus, margineque villosa. Spinae ex alis superioribus oppositae plerumque biradiatae, interdum bis bifidae folio longiores divaricatae. Pedunculi in divisura spinarum breves solitarii uniflori. Calyx longitudine spinarum villosus, ceterum ut in congeneribus. Corolla magna bipollicaris violacea. Tubus sensim ampliatus. Vahl l. c.

7. BARLERIA *buxifolia*.

*B. spinis axillaribus oppositis solitariis, foliis subrotundis integerrimis. Sp. pl. 887.*

*B. americana spinosissima frutescens, buxi folio parvo. Amm. herb. 104.*

Caraschulli. *Rheed. mal. 2. p. 91. t. 47.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 177.*

Buchsbaumblättrige Barlerie. W.

*Habitat in Indiis.*

8. BARLERIA *noctiflora*.

*B. spinis axillaribus ramosis, foliis lanceolatis integerrimis cuspidatis, bracteis ovatis scariolis, tubo elongato. Lin. suppl. 290. Vahl symb. I. p. 46.\**

*β. Justicia (lanceata)* foliis inermibus, spinis stipularibus bracteisque foliaceis margine spinosis. *Forsk. descr. 6.\**

Nächtliche Barlerie. W.

*Habitat in aridis Indiae orientalis prope Tanfchaur, et in Arabia felici. † (v. l.)*

*Spinae ramosae. Folia lanceolata in apicem mucronatum terminata. Bractee glabrae nec hirsutae. Flores coerulei, similes iis B. buxifoliae sed longiores Floret nocte.*

*Planta arabica differt ab indica, foliis subtus, praesertim versus marginem pilosis. Vahl l. c.*

\*9. BARLERIA *acanthoides.*

B. spinis geminis axillaribus foliaceis, spicis axillaribus secundis. *Vahl symb. 1. p. 47.\**

Bärenklauartige Barlerie. W.

*Habitat in Arabia felici.*

*Folia oblonga petiolata opposita integerrima cuspidata pilosa. Spinae geminae ex altera axilla tantummodo rigidae lanceolatae margine foliaceae spinosae, raro pilosae folio duplo longiores. Vahl l. c.*

10. BARLERIA *cristata.*

B. foliis oblongis integerrimis, calycis foliolis duobus latioribus ciliatis, duobusque linearibus acutis. *Sp. pl. 887. Osb. it. 225. t. 8.*

Melampyro cognata maderaspatensis, quam ipse habuit.

*Morif. hist. 3. p. 429. f. II. t. 23. f. 7.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 177.*

Kammförmige Barlerie. W.

*Habitat in India. † (v. l.)*

*Caulis teres. Folia oblongo-ovata, utrinque acuta, integerrima. Flores axillares, sessiles. Calyx quadripartitus foliolis 2 ovatis, acuminatis, serrato-spinosis; 2 alternis brevioribus, linearibus, acutis, integerrimis, patentibus. Corolla caerulea, monopetala, erecta, infundibuliformis, patens, quinquesida: lobis ovatis subaequalibus: quinto profundius diviso. Stam. filamenta 4, quorum 2 tubo corollae longiora, filiformia: Antheris oblongis; 2 brevissima in fundo corollae: Antheris emarcidis. Pistilli Germen ovatum. Stylus filiformis, longitudine majorum staminum. Stigma obtusum. Capsula longitudine calycis, compressa, acuta, bilocularis, bivalvis; valvulis cymbiformibus dissepimento longitudinali, margine altero spina elastica. Semina in singulo loculo 2, compressa.*

\* 11. *BARLERIA strigosa*. W.

*B. inermis*, foliis oblongis subtus petiolis ramisque strigosis, bracteis ciliatis. W.

Borstige Barlerie. W.

*Habitat in India orientali.* † (v. l.)

Rami teretes fusci glabri, juniores setis adpressis tecti. Folia subcoriacea petiolata, ad ramorum apices conferta opposita, oblonga tripollicaria, basi attenuata, apice acuminata, superne glabra subtus imprimis in venis a pilis adpressis strigosa. Spicae terminales ovatae. Bractee ovatae obtusae reticulatae venosae, margine ciliatae. Corollae coeruleae magnitudine *B. cristatae*, sed tubus angustior. Differt a *B. cristata*: foliis longius petiolatis latioribus subtus ad venas strigosis, et in ramorum apice confertis, spicis terminalibus, bracteis latioribus non mucronatis et ciliis bractearum brevioribus tenuioribus densioribusque. W.

12. *BARLERIA pungens*.

*B. foliis ovatis acutis pungentibus*, bracteis ciliatis, spina nulla. *Lin. suppl.* 290.

Stechende Barlerie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

13. *BARLERIA longiflora*.

*B. inermis*, foliis ovatis sericeis, bracteis cordatis scariosis, corollis longissimis. *Lin. suppl.* 290. *Vahl symb.* 1. p. 46. t. 16.

Langblütige Barlerie. W.

*Habitat ad montem St. Thomae Malabariae.* † (v. l.)

Caulis suffruticosus, ramis saepius oppositis sericeis teretibus. Folia opposita petiolata ovata sericeo-mollissima integerrima. Flores terminales. Bractee binae s. bivalves cordatae parallelae reticulatae scariosae obtusiusculae sessiles, magnitudine fere foliorum sub quibus bractee aliae quatuor cruciatim positae, lineares longitudine foliorum patentis sericeae. Corollae longae. Tubus filiformis. Limbus patens quinquefidus.

## 1197. DURANTA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1052.*

*Cal. 5-fidus, superus. Drupa 4-sperma. Nux. 2-ocularis.*

## 1. DURANTA Plumieri.

*D. calycibus frutescentibus contortis. Sp. pl. 888. Jacq. amer. 186. t. 176. f. 76. Mill. dict. n. 1. Jacq. Collect. suppl. 119. \* ic. rar. 3. t. 502.*

*Duranta spinosa. Sp. pl. 1. p. 637.*

*Castorea repens spinosa. Plum. gen. 30. ic. 79.*

*β. Duranta inermis. Sp. pl. 1. p. 637. Mill. dict. n. 2.*

*Castorea racemosa, flore caeruleo, fructu erceo. Plum. gen. 30. ic. 79.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 91.*

*Plumiersche Durante. W.*

*Habitat in America meridionali. † (v. l.)*

## 2. DURANTA Ellisia.

*D. calycibus frutescentibus erectis. Sp. pl. 888. Jacq. amer. 187. t. 176. f. 77. Jacq. hort. 3. t. 99. Swartz obs. 247.\**

*Ellisia acuta. Amoen. acad. 5. p. 400.\* Loesl. it. 194.\**

*Ellisia frutescens quandoque spinosa, foliis ovatis utrinque acutis ad apicem serratis, spicis alaribus. Brown. jam. 262. t. 29. f. 1.*

*Jalmini folio integro, flore coeruleo racemoso, fructu flavo. Sloan. cut. 169. hist. 2. p. 97.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 93.*

*Ellisische Durante. W.*

*Habitat in Jamaica. † (v. l.)*

*Calycis laciniis fructus erectas et contortas in una eademque arbore vidit Swartz l. c. Jacquinus vero characteres a calycis laciniis desumptos, esse constantes et D. Plumieri et Ellisiam diversas formare species contendit. In D. Plumieri rami sunt reclinati, in D. Ellisia erecti. Ambae variant caule spinoso et inermi, foliis serratis et integerrimis, quomodo tamen species sequens sit distinguenda, me fugit. W.*

## 3. DURANTA Mutisii.

*D. foliis ellipticis integerrimis. Lin. suppl. 291.*

*Mutisische Durante. W.*

*Habitat in America meridionali. Mutis. †*  
*In nullis aliis a D. Plumieri et D. Ellisia differt,*  
*quam foliis.*

## \*1198. MYOPORUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1053.*

*Cal. 5-partitus. Cor. campanulata, limbo pa-*  
*tente subaequali quinquepartito. Drupa 1-f.*  
*2-sperma, nucibus 2-ocularibus.*

\*1. MYOPORUM *laetum.*

*M. foliis oblongis apice subserratis laevibus, glabris ni-*  
*tidis, corollis hirsutis. Forst. prod. n. 238.*

*Angenehmes Myoporum. W.*

*Habitat in Nova Zeelandia. †*

\*2. MYOPORUM *pubescens.*

*M. foliis oblongo-ellipticis serratis pubescentibus. Forst.*  
*prod. n. 239.*

*Behaartes Myoporum. W.*

*Habitat in Nova Zeelandia. †*

\*3. MYOPORUM *crassifolium.*

*M. foliis oblongis subserratis carnosis. Forst. prod. n. 240.*

*Dickblättriges Myoporum, W.*

*Habitat in Botanices insula. †*

\*4. MYOPORUM *tenuifolium.*

*M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corollis lae-*  
*vibus. Forst. prod. n. 241.*

*Dünnblättriges Myoporum. W.*

*Habitat in Nova Caledonia. †*

*Myopora a Citharexylis vix genere differre viden-*  
*tur. W.*

## 1199. OVIEDA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1054.*

*Cal. 5-fidus. Cor. tubus cylindricus, superus,*  
*longissimus. Bacca globosa. 4-sperma.*

I. OVIEDA *spinosa.*

*O. foliis ovalibus dentatis. Sp. pl. 888. Swartz obs. 248.*

*Valdia cardui folio, fructu subcaeruleo. Plum. gen. 14. ic. 256.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 93.*

*Dornige Oviede. W.*

*Habitat in montibus Hispaniolae. †*

*Folia opposita, petiolata, oblonga, dentata. Flores corymbosi.*

*Folia rigida dentata, dentibus spinis terminatis. Flores terminales corymbosi subsessiles inter folia terminalia. Baccae nigrae. Swartz l. c.*

## 2. OVIEDA mitis.

*O. foliis lanceolatis subrepandis. Sp. pl. 889. Burm. ind. t. 43. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 93.*

*Dornlose Oviede. W.*

*Habitat in Java. † (v. f.)*

*Frutex. Folia opposita, petiolata, lanceolata, subrepanda, glabra, longissima. Corymbi dichotomi. Corollae tubus longissimus.*

## 1200. MALLINGTONIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1055.*

*Calycis margo 5-dentatus reflexus. Cor. tubo longissimo, limbo 4-fido. Antherae bipartitae vaginantes. Siliqua?*

### I. MALLINGTONIA hortensis.

*Mallingtonia hortensis. Lin. suppl. 291.*

*Garten Mallingtonie. W.*

*Habitat - - - † (v. f.)*

*Colitur in hortis Tanschaur, ubi Koenig eam observavit, sed semper sine fructu. Arbor grandis et speciosissima. Folia composita bipinnata. Pinnae inferiores oblongae cum impari pinnatae. Foliola ovato acuminata integerrima venosa utrinque glabra. Panicula terminalis magna glabra, floribus oppositis. Corollae longissimae albae odoratissimae. Antherae singulares cum dente curvo e latere exteriori antherae enato. Figura corollae Oviedam refert.*

## 1201. VOLKAMERIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1056.*

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* laciniis secundis. *Drupa* 2-sperma. *Nuces* 2-loculares.

1. VOLKAMERIA *aculeata*.

V. foliis oblongis acutis integerrimis, spinis e petiolorum rudimentis. W.

V. spinis petiolorum rudimentis. *Sp. pl.* 889. *Jacq. amer.* 185. t. 117.\*

*Clerodendrum fruticosum spinosum*, foliis inferioribus confertis; superioribus oppositis, pedunculis tripartitis trifloris alaribus. *Brown. jam.* 262. t. 20. f. 2.

*Ligustroides*. *Hort. cliff.* 489.

*Duglattia spinosa*, ligustri folio. *Amm. herb.* 576.

*Ligustrum aculeatum*, fructu testiculato. *Plum. spec.* 17. ic. 164. f. 1.

*Paliuro* affinis *ligustrifolia spinosa*, flore monopetalo difformi. *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2. p. 137. t. 166. f. 2. 3. *Raj. dendr.* 95. *Pluk. phyt.* 352. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 94.

Stachliche Volkamerie. W.

*Habitat in* Jamaica, Barbados. † (v. l.)

\*2. VOLKAMERIA *ligustrina*.

V. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, petiolis, pedunculis calycibusque hirsutis. W.

*Volkameria ligustrina*. *Jacq. Collect. suppl.* 118. t. 5. f. 1.\*

V. (*inermis* β) foliis lanceolato-oblongis. *Ait. Kew.* 2. p. 364.

Ligusterartige Volkamerie. W.

*Habitat in* insula Mauritii. †

*Differt a sequenti cui simillima: foliis oblongo-lanceolatis, ramis, petiolis, pedunculis calycibusque hirsutis, corollae tubo triplo calyce longiore, nec sextuplo longiore; filamentis albis, nec purpureis, antheris fuscis, nec violaceis.* W.

3. VOLKAMERIA *inermis*.

V. foliis ovatis integerrimis nitidis, petiolis, pedunculis calycibusque glabris. W.

V. ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 231.\* *Jacq. collect. suppl.* 117. t. 4. f. 1.\*

- Jasminum litoreum.* Rumph. amb. 5. p. 86. t. 46.  
*Periclymeni similis myrtifolia arbor maderaspatensis.*  
*Pluk. alm. 287. t. 211. f. 4. mala.*  
*Jasmini flore, frutex philippenlis, foliis floribusque fere ternis.* Pet. gaz. t. 42. f. 7.  
*Nir-notsijit.* Rheed. mal. 5. p. 97. t. 49.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 95.*  
 Wehrlose Volkamerie. W.  
*Habitat in India orientali.* † (v. v.)  
*Vidi varietatem foliis minoribus obtusissimis.* W.

- \*4. **VOLKAMERIA capitata.** W. †  
 V. foliis ovatis integerrimis scabris, floribus terminalibus capitatis, calyce foliaceo. W.  
 Kopfförmige Volkamerie. W.  
*Habitat in Guinea.* † (v. l.)

Rami obtuse tetragoni canescentes glabri, a petiolorum rudimentis obtusis prominentibus tuberculati. Folia opposita remota oblongo-ovata acuminata, acumine obtuso mucronato integerrima venosa, utrinque a pilis diffusis scabriuscula. Flores albi in capitulo terminali breve pedunculato quinquefloro. Calyx campanulatus, limbo tripartito, laciniis maximis oblongis foliaceis mucronatis reticulato venosis ciliatis. Corollae tubus filiformis longissimus bipollicaris et ultra, limbo quinquepartito inaequali, laciniis oblongis obtusis, Stamina longissime exserta. Fructus ignotus. W.

5. **VOLKAMERIA ferrata.**  
 V. foliis lato lanceolatis ferratis subsessilibus. Mant. 90.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 95.*  
 Gefägte Volkamerie. W.  
*Habitat in India.* †

Rami teretiusculi. Folia fere petiolata, lato-lanceolata, utrinque nuda, ferrata. Panicula brachiata. Baccae e quatuor compositae. Calyces campanulati, indivisi, vix dentati.

6. **VOLKAMERIA scandens.**  
 V. foliis petiolaris cordatis ovatis integerrimis panicula corymbosa terminali, ramulis dichotomis. Lin. suppl. 292.  
 Kletternde Volkamerie. W.  
*Habitat in sylvis vastis Zeylonae circa flumen magnum Monefi-Moti-Kandel.* Koenig. †



Arbor scandens, ramis longioribus flexuosis tetragonis summitate tomentosis. Folia magna glaberrima opposita cordato-ovata obtusa. Panicula corymbosa terminalis tomentosa. Flores non longi ut in *V. inermi*. Calyces obtusi tomentosi. Capsula oblonga conica. Super altissimas arbores scandit, easque coronat floribus suis niveis.

7. VOLKAMERIA japonica. †

*V. inermis*, foliis cordatis ovatis acutis dentatis, racemis secundis. Thunb. jap. 255. \*

Go-Too. Kaempf. amoen. 861.

Japanische Volkamerie. W.

Habitat in Japonia. †

Arbor vasta excelsa tota glabra ramosa. Rami compressi apice paniculati. Folia alterna petiolata valde cordata acuminata venosa, subtus pallidiora glabra, inferiora spithamam lata pedalia, superiora sensim minor et obtusiora. Petiolus in majoribus foliis longior spithamaeus, in minoribus unguicularis. Flores in ramulis terminales racemosi. Bractea sub singulo pedunculo subulatae solitariae pedunculo breviores. Pedunculi simplices secundi uniflori erecti unguiculares. Calyx rufescens 5-partitus, laciniis basi divaricatis concavis lanceolatis aristatis. Corolla ringens. Tubus cylindraceus calyce duplo longior purpureus. Limbus 5-partitus subaequalis tubo brevior. Capsula ovata quadrifurcata magnitudine pruni quadrivalvis bilocularis transversim dehiscens. Thunb. l. c.

Sub titulo *Volkameriae japonicae* occurrit in hortis nostris arbuscula floribus plenis, plantae similis cujus figura exstat apud Banks icon. Kaempf t. 57; sed ob flores plenos ad genus certum reducere haud valeo: ceterum a *Volkameria japonica* multis characteribus discrepat. W.

\*8. VOLKAMERIA Kaempferi.

*V. foliis cordatis pubescentibus denticulatis, panicula terminali divaricata pedunculis coloratis.* W.

*V. foliis cordatis subrotundis villosulis, floribus paniculatis, caule erecto.* Jacq. ic. rar. 3 t. 500. Collect. 3. p. 207. Banks icon. Kaempf. t. 58.

Kämpfersche Volkamerie. W.

Habitat in China, Japonia. † (v. l.)

Folia opposita profunde cordata subrotunda breve acuminata tenuissime remote denticulata. Panicula ter-

Linnaei Spec. Plant. T. III.

B b

*minalis ampla e racemis oppositis bipartitis composita. Pedunculi totius paniculae, Folia floralia, Calyces et Corollae coccineae. Drupa nigra Ribesii magnitudine calyce brevior bilocularis. Noces biloculares. W.*

## 1202. CLERODENDRUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1057.*

*Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Cor.* tubo filiformi; limbo 5-partito, aequali. *Stamina* longissima intra lacinias maxime hiantes. *Drupa* 4-sperma, nuce uniloculari.

1. CLERODENDRUM *infortunatum.*

*C.* foliis cordatis tomentosis. *Fl. zeyl.* 232.\* *Burm. ind.* 137.

*Petalites* agrestis. *Rumph. amb.* 4. p. 108. t. 49.

*Peragu.* *Rheed. mal.* 2. p. 41. t. 25. *Raj.* 1571.

*β.* *Clerodendrum* folio lato et acuminato. *Burm. zeyl.* 66. t. 29.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 97.

Unglücklicher Loosbaum. *W.*

*Habitat* in India. † (v. f.)

2. CLERODENDRUM *fortunatum.*

*C.* foliis lanceolatis integerrimis. *Amen. acad.* 4. p. 320.\* *Osborn. it.* 228. t. 11. *Burm. ind.* 137.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 98.

Glücklicher Loosbaum. *W.*

*Habitat* in India. †

3. CLERODENDRUM *calamitosum.*

*C.* foliis ovalibus subdentatis nudis. *Mant.* 90.

*Volkameria alternifolia.* *Burm. ind.* 137. t. 44.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 99.

Elender Loosbaum. *W.*

*Habitat* in Java. *D. Baster.* †

*Folia opposita, petiolata, ovata s. ovalia, serrato-subdentata, utrinque nuda. Panicula brachiata. Flores congeneribus paulo minores.*

4. CLERODENDRUM *phlomoides.*

*C.* foliis ovatis integris dentatis angulatisque, pedunculis axillaribus subtrifloris. *Vahl. symb.* 2. p. 74.

*C. foliis ovatis serratis canis.* *Lin. suppl.* 292.

*Volkameria (multiflora)* ramis inermibus, foliis oppositis cordatis subdentatis acuminatis, pedunculis axillaribus multifloris *Burm. ind.* 137. t. 45. f. 1.

*Phlomisartiger Loosbaum.* W.

*Habitat in India orientali.* † (v. l.)

*Frutex canus. Folia petiolata opposita parva exacte ovata media serrata, serraturis paucioribus pubescentia cana. Paniculae in summitate ramorum axillares solitariae oppositae pauciflorae dichotomae, quae conjunctim magnam paniculam constituunt. Bractee ad omnem dichotomiam binae ovatae integrae. Calyx ad medium fissus. laciniis subulatis campanulatis patulis. Tubus gracilis albus.*

\*5. *CLERODENDRUM squamatum.*

*C. foliis cordatis obscure angulatis, paniculae ramis dichotomis glabris.* *Vahl symb.* 2. p. 74.\*

*Schoppiger Loosbaum.* W.

*Habitat in India orientali.* †

*Differt a C. infortunato: foliis basi sinu profunde excisis minoribus glabris, panicula calyce et corolla glabra, ramis tetragonis linea exaratis. A. C. trichotomo: foliis sinu basi profundo, subtus squamosis, omnibus integris, nec aliis lobatis, aliis integris, convenit vero calyce.* *Vahl l. c.*

\*6. *CLERODENDRUM trichotomum.*

*C. foliis lobatis indivisisque lato-ovatis integerrimis, panicula trichotoma.* *Thunb. jap.* 256.\*

*Seo Kusits vulgo Kusaggi. Kaempf. amoen.* 827. *Banks ic. Kaempf. t.* 22.

*Dreytheiliger Loosbaum.* W.

*Habitat in Japonia.* †

\*7. *CLERODENDRUM diversifolium.*

*C. foliis integris trilobisque ovatis, panicula ramis dichotomis villosis, pedicellis racemosis.* *Vahl symb.* 2. p. 75.\*

*Verschiedenblättriger Loosbaum.* W.

*Habitat in India orientali.* †

*A. C. trichotomo differt: ramis superne villosis, foliis angustioribus, panicula villosa dichotoma tandem racemosa, laciniis calycis oblongis. Lobi corollae vix aequales.* *Vahl. l. c.*

8. CLERODENDRUM *paniculatum*.

C. foliis quinquelobis denticulatis glabris, panicula brachiata, axillis lanatis. *Vahl symb. 2. p. 74.\**

C. foliis lobatis ferratis, panicula amplissima. *Mant. 90. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 99.*

Rispenblütiger Loosbaum. W.

*Habitat in India.* † (v. l.)

Caulis *quadrifariam sulcatus*. Folia *opposita, cordata, 5-f. 3-loba, ferrata*. Panicula *vastissima ramis bis dichotomis, dein ramosis*.

## 1203. THUNBERGIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1058.*

*Cal. duplex: exterior diphyllus, interior 12-dentatus. Cor. campanulata. Caps. rostrata 2-locularis.*

1. THUNBERGIA *capensis*.

T. foliis ovatis obtusis, caule diffuso. W.

*Thunbergia capensis. Lin. suppl. 292. Retz Act. lund.*

*I. p. 163. c. icone. Thunb. Nov. Gen. pl. 1. p. 21.*

Capische Thunbergie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.*

*Planta singularis, quam nullus crederet a Barleriis diversam, nisi ad calycem duplicem attenderet. Caulis tetragonus hirsutus diffusus. Folia opposita brevissime petiolata ovata integerrima obtusa quinquenervia, venosa, supra glabra, infra hirsuta erecta. Pedunculi longitudine foliorum s. longiores solitarii uniflori. Bractee binae ovatae hirtae longitudine tubi. Calyx in fructum grandescens, Corolla lutea. Capsula glabra subulata bipartita.*

\*2. THUNBERGIA *fragrans*.

T. foliis cordatis acuminatis basi subangulato-dentatis, caule scandente. W.

*Thunbergia fragrans. Roxb. corom. 1. p. 47. t. 67.\**

Wohlriechende Thunbergie. W.

*Habitat in fruticetis ad fluviorum ripas prope Samulcotah in India orientali.* † (v. l.)

*Planta facie Convolvuli sepium.* W.

## \*1204. MAURANDIA.

*Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 20.*

*Cal. 5-partitus. Cor. campanulata inaequalis. Filamenta basi callosa. Capsulae 2 coalitae apice semiquinquevalves.*

\*1. MAURANDIA *semperflorens.*

*Maurandia semperflorens. Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 20. t. 288.\* Curt. mag. 460.*

*Ustera scandens. Cavan. ic. 2. p. 15. t. 116.\* Andrews bot. reposit. 63. t. 63.*

*Immerblütige Maurandie. W.*

*Habitat in Mexico. 2. (v. v.)*

*Caulis volubilis herbaceus bipedalis et ultra. Folia alterna longe petiolata hastata integerrima nervosa glabra. Pedunculi uniflori axillares elongati. Flores nutantes violacei. W.*

## 1205. CASTILLEJA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1059.*

*Cal. tubulosus compressus, labium superius bifidum, inferius nullum. Cor. bilabiata, labio inferiore brevissimo trifido, glandulis duabus inter lacinias. Caps. bilocularis.*

1. CASTILLEJA *integrifolia.*

*C. foliis lineari-lanceolatis integris. Smith inedit. 39. t. 39.\**

*C. foliis lineari-subulatis integerrimis, bracteisque indivisis. Lin. suppl. 293.*

*Ganzblättrige Castilleje. W.*

*Habitat in Nova Granada. 2. Mutis.*

*Simillima sequenti, at minor racemo magis elongato.*

2. CASTILLEJA *fissifolia.*

*C. foliis apice pinnato-incisis. Smith inedit. 40. t. 40.\**

*C. foliis linearibus integris, apice trifidis, floribus racemosis interspersis bracteisque trifidis. Lin. suppl. 293.*

*Spaltblättrige Castilleje. W.*

*Habitat in Nova Granada. 2. Mutis.*

*Caulis herbaceus s. suffruticosus tripedalis erectus teretiusculus subramosus. Folia alterna sessilia paten-*

*tia linearia trinervia pollicaria, apice tri-f. septemfidi. Rudimenta ramulorum foliis fasciculatis ex alis. Stipulae nullae. Racemus terminalis, pedicellis solitariis unifloris. Calyx auritus fere modo Ari, corollae galearum quasi carina suffulciens.*

## 1206. V I T E X.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1060.*

*Cal. 5-dentatus. Cor. limbus 6-fidus. Drupa 1-sperma, nuce 4-loculari.*

## 1. VITEX ovata. †

*V. foliis simplicibus ovatis. Thunb. jap. 257.\**

*V. (rotundifolia) foliis simplicibus obovatis integerrimis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris brevissimis. Lin. suppl. 294.*

*Euförmige Müllen. W.*

*Habitat in Japonia, China. ‡*

*Arbor facie et colore similis V. Agno casto, foliis exceptis. Folia fere subrotunda bipollicaria. Pedunculi axillares breves uniflori.*

*Caulis repens. Folia decussata petiolata ovata obtusa integerrima supra viridia, subtus mollia albotomentosa. Flores in summitate ramulorum, primum axillares, tandem terminales paniculati. Panicula subtrichotoma brevissime pedunculata. Bacca globosa didyma quadrivalvis quadrilocularis. Semina minuta. Thunb. l. c.*

## \*2. VITEX triflora.

*V. foliis ternatis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque trifloris. Vahl eclog. 2. p. 49.\**

*Dreyblumige Müllen. W.*

*Habitat in Cajenna. ‡*

## \*3. VITEX divaricata.

*V. foliis ternatis integerrimis utrinque glabris, terminali maximo panicula dichotoma divaricata. Swartz prod. 93. Fl. ind. occid. 2. p. 1078.\* Vahl symb. 2. p. 76.\**

*Ausgebreitete Müllen. W.*

*Habitat in insula St. Luciae, Martinica, St. Crucis. ‡*

## \*4 VITEX pubescens.

V. foliis ternatis pubescentibus, paniculis trichotomis, bracteis longitudine calycis. *Vahl symb.* 3. p. 85.\*

Pistacia-Vitex. *Lin. zeyl.* 415.

Behaarte Müllen. W.

*Habitat in India orientali.* †

*Differt a V. trifoliata: foliis subtus non canescentibus, pedicellis non dichotomis, sed floribus longitudinaliter sessilibus alternis, habitu paniculae squaroso e bracteis patenti-subreflexis majoribus, quam in reliquis speciebus hujus generis.* Vahl l. c.

## 5. VITEX altissima.

V. foliis ternatis integerrimis, panicula verticillata, spicis verticillatis, bacca trisperma. *Lin. suppl.* 294.

Höchste Müllen. W.

*Habitat in vastis sylvis Zeylonae.* † *Koenig.* (v. l.)

*Folia ovata atrinque acuminata, supra glabra, subtus pubescentia.*

## 6. VITEX Agnus castus.

V. foliis digitatis septenatis quinatisve lanceolatis subintegerrimis, spicis verticillatis paniculatis. W.

V. foliis digitatis ferratis, spicis verticillatis. *Sp. pl.* 890.

V. foliis digitato-septenatis, spicis verticillatis, floribus subbilabiato-quinquefidis resupinatis. *Jacq. collect.* 3. p. 64.\*

*Vitex. Cam. epit.* 105. *Hort. cliff.* 327. *Roy. lugdb.* 291.

*Gron. virg.* 169. *Mat. med.* 157. *Gron. orient.* 77.

*Mill. dict. n. 1. Medic. in Obs. Soc. oecon. Lutr.* 1774.

p. 283. *Forskaehl aegypt. cent.* 8. p. 213. *Scop. carn.*

n. 783. *Ludw. ect. t.* 28. *Regn. bot.*

V. foliis angustioribus cannabis modo dispositis. *Bauh. pin.* 475. *Blackw. t.* 139.

β. Vitex latiore folio. *Bauh. pin.* 475. *Kuiph. cent.* 2. n. 99.

V. (*latifolia*) foliis digitatis ferratis, spicis paniculatis. *Mill. dict. n.* 2.

V. folio serrato. *Bauh. hist.* 1. p. 205.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 100.

Gemeine Müllen. W.

*Habitat in Siciliae et Neapolis paludosis.* † (v. v.)

\*7. *VITEX incisa*.

V. foliis digitatis quinatis, foliolis inciso-pinnatifidis, spicis subverticillatis. *Lamarck encycl.* 2. p. 605.\*

V. foliis ternatis quinatisque pinnato-incisis, spicis verticillatis terminalibus, floribus coeruleis et albis. *Mill. ic. t.* 275. f. 1. 2.

Schlitzblättrige Müllen. W.

*Habitat in China.* † (v. v.)

*Statura praecedentis sed omnibus partibus minor, foliolis quinatis acuminatis pinnatifidis subtus pubescentibus. V. Negundo, sub quo nomine haec in hortis occurrit, est longe alia planta, quae differt: magnitudine omnium partium, et inflorescentia racemoso-paniculata nec verticillata.* W.

8. *VITEX Leucoxylon*.

V. foliis digitatis quinatis, foliolis petiolatis oblongis integerrimis, paniculis dichotomis, bacca monosperma. *Lin. suppl.* 293.

Weißholzige Müllen. W.

*Habitat in vastis sylvis Zeylonae.* † *Koenig.*

*Simillima V. trifoliae, sed differt: foliis utrinque glaberrimis, panicula dichotoma a prima divisione.*

9. *VITEX trifolia*.

V. foliis ternatis quinatisque, foliolis ovatis acutis integerrimis subtus canescentibus, panicula rachi recta, pedicellis dichotomis. *Lin. suppl.* 293.

V. foliis ternatis quinatisque integerrimis, paniculis dichotomis. *Sp. pl.* 890.

V. integerrima. *Mill. dict. n.* 3.

V. trifolia minor indica. *Pluk. alm.* 390. t. 206. f. 5. *Fl. zeyl.* 413. *Burm. zeyl.* 229. t. 109. *ind.* 137.

Piperi similis, fructus striatus, femina. *Bauh. pin.* 412.

Logondium vulgare. *Rumph. amb.* 4. p. 48. t. 18.

Caranofi. *Rheed. mal.* 2. p. 13. t. 10. *Raj. hist.* 1575.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 103.

Dreyblättrige Müllen. W.

*Habitat in India orientali.* † (v. l.)

Foliola ovata, acuta, integerrima, subtus tomentosa.

Foliola duo petiolo proxima minora. W.

\*10. *VITEX umbrosa*.

V. foliis quinatis integerrimis utrinque glabris, racemis



compositis axillaribus. *Swartz prod.* 93. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1076.\*

*Nephrandra. Coth. disposit.* 8.

Schattenliebende Müllen. W.

*Habitat in Jamaicae umbrosis.* † (v. f.)

\* 11. *VITEX capitata.*

V. foliis quinato-digitatis, foliolis lanceolatis glabris integerrimis, floribus capitato-subumbellatis. *Vahl. eclog. amer.* 2. p. 50. t. 18.\*

Kopfförmige Müllen. W.

*Habitat in insula Trinitatis.* † (v. f.)

12. *VITEX Negundo.*

V. foliis quinatis ternatisque serratis, floribus racemoso-paniculatis. *Sp. pl.* 890. *Osborn. it.* 92. *Burm. ind.* 138.

V. (*paniculata*) foliis digitatis quinatis, foliolis lanceolatis integerrimis, tribus petiolatis majoribus, duobus minoribus et sessilibus, floribus racemoso-paniculatis. *Lamarek encycl.* 2. p. 606.\*

V. trifolia minor indica serrata. *Pluk. alm.* 390. *Fl. zeyl.* 414.

*Negundo arbor mas. Bauh. hist.* 1. p. 189.

*Logondium litoreum. Rumph. amb.* 4. p. 50. t. 19.

*Bemnos. Rheed. mal.* 2. p. 15. t. 11. *Raj. hist.* 1575.

*Vitex trifolia sylvestris indica cordata. Burm. zeyl.* p. 229. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 104?

*Negundo-Müllen. W.*

*Habitat in India.* †

Foliola 3 f. 5, ovato-lanceolata, sinuato-serrata, subtus nuda venosa.

*Variat forte ut V. Agnus castus foliis integerrimis et serratis.* W.

13. *VITEX pinnata.* †

V. foliis pinnatis integerrimis, paniculis trichotomis.

*Sp. pl.* 890. *Burm. ind.* 138. t. 43. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 105.

Gefiederte Müllen. W.

*Habitat in Zeylona.* † (v. f.)

*An hujus generis.* W.

## 1207. AMASONIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1061.*

*Cal.* 5-fidus. *Corolla* tubulosa, limbus parvus quinquefidus. *Bacca* 4-sperma.

1. AMASONIA *erecta*.

A. foliis lanceolato-ovatis subserratis scabris, bracteis sessilibus flore longioribus. *Vahl eclog. 2. p. 51.*

Amasonia erecta. *Lin. suppl. 294.*

Taligalea campestris. *Aubl. guj. 2. p. 625. t. 252?*

Aufrechte Amasonie. W.

*Habitat in Surinamo.*

*Caulis herbaceus tripedalis simplicissimus teres. Folia alterna petiolata remota elliptico-lanceolata subserrata scabra. Racemus terminalis simplex pedalis, pedicellis subtrifloris. Bractee ovatae floribus paullo longiores sessiles. Flores secundi nutantes lutei.*

\* 2. AMASONIA *punicea*.

A. foliis lanceolato-ovatis serratis laevibus, bracteis sessilibus flore longioribus. *Vahl eclog. 2. p. 51.\**

Rothe Amasonie. W.

*Habitat in insula Trinitatis. †*

## 1208. BONTIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1062.*

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* bilabiata: labio inferiore 3-partito, revoluto. *Drupa* ovata, 1-sperma, apice obliquo. *Semen* unicum.

1. BONTIA *daphnoides*.

B. foliis alternis, pedunculis unifloris. *Sp. pl. 890. Mill. dict. n. 1.*

B. arborescens, thymelaeae facie. *Plum. gen. 32.*

B. laureolae facie. *Dill. clth. 57. t. 49. f. 57.*

Olea sylvestris barbadensis, folio angusto pingui leviter crenato. *Pluk alm. 269. 209. f. 2. Raj. dendr. 47.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 140.*

Seidelbastartige Bontie. W.

*Habitat in Antillis. † (v. l.)*

## 1209. A V I C E N N I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1063.*

*Cal.* 5-partitus, *Cor.* bilabiata: lab. superiore quadrato. *Capsf.* coriacea, rhomboidea, 1-sperma.

1. AVICENNIA *tomentosa*.

A. foliis oblongis obtulis subtus tomentosis. W.

A. foliis cordato-ovatis, subtus tomentosis. *Syst. veg.*

484. *Jacq. amer.* 178. t. 112. f. 2.\* *Mat. med.* 158. *Fl.*

*zeyl.* 57. *Vahl. symb.* 1. p. 47. *Swartz obs.* 248.

*Bontia germinans.* *Sp. pl. ed.* 2. p. 891. *Mill. dict. n.* 2.

*Donatia.* *Loefl. it.* 133.

*Secura (marina)* foliis lanceolatis integris subtus fulvis.

*Forfk. descr.* 37.\*

*Bontia* foliis integris oblongis oppositis, petiolis crassis brevissimis subamplexantibus, floribus racemosis.

*Brown. jam.* 263.

*Mangle laurocerasi* foliis, flore albo tetrapetalo. *Sloan.*

*jam.* 156. *hist.* 2. p. 66. *Raj. dendr.* 115.

*Anacardium.* *Bauh. pin.* 511.

*Oepata.* *Rheed. mal.* 4. p. 95. t. 45.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 135.

Filzige Avicennie. W.

*Habitat in Indiis.* † (v. l.)

\*2. AVICENNIA *resinifera*. †

A. foliis ovato-lanceolatis subtus tomentosis. *Forst. prod.*

n. 246. *Ejusd. pl. esc.* p. 72. n. 94.\*

Herzbringende Avicennie. W.

*Habitat in Nova Zeelandia.* †

Folia opposita petiolata lanceolata coriacea integra acuta, superius nitida, subtus tomento brevissimo flavicante incano, bipollicaria. Pedunculi terminales subtrifidi, capitulo florum ovulsi. *Forst. l. c.*

3. AVICENNIA *nitida*.

A. foliis lanceolatis utrinque nitidis. *Syst. veg.* 484.

*Jacq. amer.* 177. t. 112. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 138.

Glänzende Avicennie. W.

*Habitat in Martinicæ litoribus maritimis.* †

Mirabilis in foco flamma et colore. Cotyledones duplicatae interioribus pilosis. Flos albus. Diss. alt. de pl. Surinam. 1776. p. 18.

## 1210. C O L U M N E A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1064.

Cal. 5-partitus. Cor. ringens labio superiore tripartito, intermedia fornicata, supra basin gibba. Caps. unilocularis. Semina nidulantia.

## I. C O L U M N E A scandens.

C. foliis ovatis acutis integerrimis subvillosis, laciniis calycis integris corollisque pubescentibus, labio superiore indiviso. Swartz *obs.* 249.\*

C. corollis hirsutissimis. Mill. *dict.*

C. scandens, phoeniceo flore, fructu albo. Plum. *gen.* 28. *ic.* 89. *f.* 1.

β. Columnea scandens, flore lutescente, fructu albo, Plum. *gen.* 28.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 179.

Kletternde Columnea. W.

Habitat in sylvis humidis umbrosis Caribaeorum et Gujanae. †

Caulis, Folia, Corollae villosa, Folia ovata, serrata, petiolata.

## \*2. C O L U M N E A hirsuta.

C. foliis ovatis acuminatis ferratis superne hirtis, laciniis calycinis denticulatis lanceolatis corollisque hirsutis. Swartz *prod.* 94. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1080.\* *Ait. Kew.* 2. p. 366.

Achimenes major herbacea hirsuta oblique assurgens, foliis ovatis crenatis oppositis, alternis minoribus, floribus geminatis ad alas alternas. Brown. *jam.* 270. t. 30. *f.* 3.

Rapunculus fruticosus, foliis oblongis integris villosis ex adverso litis, flore purpureo villoso. Sloan. *jam.* 58. *hist.* 1. p. 157. t. 100. *f.* 1. mala.

Rauhe Columnea. W.

Habitat in sylvis umbrosis montium Jamaicae juxta radices arborum. †

3. COLUMNEA *rutilans*.

C. foliis ovato-lanceolatis denticulatis scabriusculis subtus hirsutis coloratis, foliolis calycis laciniatis, corollisque villosis. *Swartz prod. 94. Fl. ind. occid. 2. p. 1083.\**

Gelbroche Columnea. W.

*Habitat in sylvis umbrosis Jamaicae interioris borealis ad truncos arborum. †*

4. COLUMNEA *hispida*.

C. foliis ovatis obtusis denticulatis hirsutis, foliolis calycinis lanceolatis integris pilosis, caule piloso scabro. *Swartz prod. 94. Fl. ind. occid. 2. p. 1085.\**

Scharfblättrige Columnea. W.

*Habitat in montibus altis Jamaicae occidentalis ad rupes umbrosas. †*

## 1211. ACANTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1065.*

*Cal. bifol. bifidus. Cor. 1-labiata, deflexa, 3-fida Caps. 2-locularis.*

1. ACANTHUS *mollis*.

A. foliis sinuatis inermibus. *Hort. cliff. 326. Hort. upf. 181. Mat. med. 158. Roy. lugdb. 304. Sauv. monsp. 278. Mill. dict. n. 1. Ludw. ect. t. 126. Kniph. cent. 9. n. 1. Sabb. hort. 3. t. 13. Regn. bot.*

A. sativus f. mollis Virgilii. *Bauh. pin. 383.*

Cardus Acanthus f. Branca urli. *Bauh. hist. 3. p. 75. Blackw. t. 89.*

β. A. (*nigra*) foliis sinuatis inermibus glabris, lucide vi-rens. *Mill. dict. n. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 181.*

Aechte Bärenklaue. W.

*Habitat in Italiae, Siciliae humentibus, duris. 4 (v. v.)*

2. ACANTHUS *carduifolius*.

A. foliis dentato-sinuatis spinosis, spica florum radicali. *Lin. suppl. 294.*

Distelblättrige Bärenklaue. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei*

*Planta palmaris. Caulis brevissimus, ut fere nullus. Folia plurima subradicalia sinuata more Cardui, laci-*

*niiis terminatis spina tomentosa aut nuda. Spicae radicales oblongae longitudine foliorum aut paullo longiores imbricatae. Bracteis nervosis rigidis sexspinosis. Calyces mutici membranacei.*

### 3. ACANTHUS spinosus.

A. foliis pinnatis spinosis. *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 304. *Mill. dict. n. 4.* *Sabb. hort.* 3. t. 14.

A. aculeatus. *Bauh. pin.* 383.

A. sylvestris. *Dod. pempt.* 719.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 182.

Stachelige Bärenklaue.

*Habitat in Italiae humentibus.* 4 (v. l.)

### \*4. ACANTHUS arboreus.

A. foliis sinuato-dentatis spinosis glabris, caule fruticoso. *Vahl symb.* 1. p. 47.\*

A. caule arboreo, foliis sinuato-dentatis spinosis. *Forst. descr.* 115.\*

Baumartige Bärenklaue. W.

*Habitat frequens Hadiae et Kurmae in Arabia felici.* †

### 5. ACANTHUS Dioscoridis.

A. foliis lanceolatis integerrimis margine spinosis. *Sp. pl.* 891. *Gron. orient.* 192. † *Mill. dict.* 3.

A. dioscoridis vel sativus. *Rauv. itin.* 285. *Morif. hist.* 3. p. 604. *Raj. suppl.* 636.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 183.

Dioscorides Bärenklaue. W.

*Habitat in Libano.*

### 6. ACANTHUS ilicifolius.

A. foliis repandis dentato-spinosis, caule fruticoso aculeato. *Sp. pl.* 892. *Obf. it.* 92. *Mill. dict. n.* 5.

A. malabaricus, agrifolii folio. *Pet. succ.* 10. *gaz. t.* 94. f. 15.

Frutex indicus spinosus, foliis agrifolii, filiqua geminata brevi. *Raj. hist.* 1766. *Pluk. phyt.* 261. f. 4.

Carduus aquaticus l. indorum Dilivaria. *Cammel luz.* 6. n. 16.

Paina schylli. *Rheed. mal.* 2. p. 93. t. 48.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 183.

Hülsenblättrige Bärenklaue. W.

*Habitat in Indiae caenosis salsis maritimis.* †

*Calyx ex foliolis 6 imbricatis, sed corolla praecedentium.*

\*7. *ACANTHUS ebracteatus.*

A. foliis lanceolato-ellipticis dentatis, spica terminali, caule fruticoso inermi, calycibus tetraphyllis. *Vahl symb. 2. p. 75. t. 40.*

*Acanthus ilicifolius. Loureiro coch. 455.\**

*Aquifolium indicum. Rumph. amb. 6. p. 163. t. 71. f. 1.*

Nacktblütige Bärenklaue. W.

*Habitat in India orientali et Cochinchina. †*

8. *ACANTHUS capensis.*

A. foliis oblongis dentatis spinosis, caule fruticoso erecto, bracteis spina simplici terminatis. *Lin. suppl. 295.*  
Capische Bärenklaue. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

Rami fruticosi teretes oppositi cinerascetes. Folia opposita sublanceolata sessilia rigida semipollicaria, spinis duabus utrinque lateralibus praeter terminalem. Folia axillaria molliora longiora petiolata etiam spinosa. Spicae terminales solitariae sessiles. Bracteaefolio sumiles, sed pluribus utrinque spinis. Calyx bivalvis laevis, valvula superiore longiore. Corolla labio unico trifido.

9. *ACANTHUS furcatus,*

A. foliis oblongis dentato-spinosis caule fruticoso, bracteis spina trifurcata terminatis. *Lin. suppl. 295.*  
Gabelförmige Bärenklaue. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

10. *ACANTHUS procumbens.*

A. foliis oblongis ferrato-ciliatis, caule procumbente fruticoso. *Lin. suppl. 294.*  
Liegende Bärenklaue. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. † (v. l.)*

11. *ACANTHUS integrifolius.*

A. foliis oblongis integris caule herbaceo procumbente. *Lin. suppl. 294.*

Ganzblättrige Bärenklaue. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

\*12. *ACANTHUS repens.*

A. caule repente hispido, foliis quaternis linearibus in-

tigris subciliatis, floribus axillaribus solitariis. *Vahl. symb. 2. p. 76.\**

Kriechende Bärenklaue. W.

*Habitat in India orientali. 2 (v. f.)*

*Facies A. integrifolii, at caulis repens, folia angustiora longiora et glabra. Vahl l. c.*

13. ACANTHUS *edulis*.

A. foliis quaternis lineari-lanceolatis dentato-spinosis, caule fruticuloso. *Vahl symb. 1. p. 48.\**

A. (*edulis*) foliis lanceolatis subdentatis, spicis bracteisque spinosis. *Forsk. descr. 114.\**

Ruellia (*ciliaris*) foliis dentatis ciliatis, floribus oppositis. *Mant. 89.*

Ruellia (*persica*) foliis lanceolatis dentatis spinulosis, floribus oppositis. *Burm ind. 135. t. 42. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 168.*

Efsbare Bärenklaue. W.

*Habitat in Arabia felici, Persia. 5*

14. ACANTHUS *maderaspatensis*.

A. foliis quaternis, floribus axillaribus, calycibus ciliatis. *Syst. Veg. 485.*

A. *ciliaris*. *Burm. ind. 130. t. 42. f. 2.*

Melampyro affinis tetraphylla gangetica, floribus interfolia sparsis. *Pluk. phyt. t. 99. f. 3.*

Adhatoda maderaspatensis, calyce barbato, foliis subtus villosis. *Pet. mus. 23.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 184.*

Tranquebarische Bärenklaue. W.

*Habitat in India. 2 (v. f.)*

*Caulis herbaceus, dichotomus. Folia quaterna, elliptica, mutica. Calyx exterior imbricatus; foliolis obovato-cuneatis, ciliatis, 4 parium; Interior 4-phyllus; foliolis 2 exterioribus lanceolatis, reliquis longioribus; interioribus 2 minoribus linearibus. Capsula rubra.*

\*1212. LEPIDAGATHIS. W.

*Cal. polyphyllus imbricatus. Cor. bilabiata, labio superiore minimo, inferiore tripartito. Caps. 2-locularis.*

\*1. LEPIDAGATHIS *cristata*. W.

Kammförmiges Schuppenknäuel. W.



*Habitat in India orientali.* † (v. l.)

*Radix lignosa torta penna anserina crassior. Caules sesqui-vel bipedales lignosi diffusi ramosi. Folia opposita sessilia linearia obtusa integerrima rigida glabra margine scabra, uncialia vel sesquiuncialia. Flores in capitulo glomerati, Capitula majora pugni magnitudine et facie capitulorum Astragali compacti; minor in ramis sparsa magnitudine nucis Avellanae. Squamae calycinae mucronatae interiores pubescentes. Corolla bilabiata. Capsula Acanthi. Differt ab Acantho ut Ajuga a Teucris. Male siccatum specimen tantum examinavi.* W.

\*1213. A L E C T R A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1066.*

*Cal. bilabiatus, labio superiore 2-fido, inferiore trifido. Cor. infundibuliformis Filamenta barbata. Caps. 2-locularis didyma. Sem. solitaria.*

\*I. ALECTRA capensis.

*Alectra capensis. Thunb. N. G. pl. 3. p. 82.\**

*Capische Alectra. W.*

*Habitat in graminosis Cap. b. Spei ad fluviorum ripas. ☉*

*Caulis simplex teres siriatus erectus villosus inanis spithamaeus et pedalis. Folia sparsa sessilia ovata obtusa erecta villosa, inferiora minora, superiora sensim majora unguicularia. Flores terminales spicati lutei purpureo-sirati. Spica foliata sensim florens. Planta siccatione nigrescit. Habitus Orobanchis. Thunb. l. c.*

1214. P E D A L I U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1067.*

*Cal. 5-partitus. Cor. subringens; limbo 5-fido. Nux suberosa. tetragona, angulis spinosa, 2-locularis. Sem. bina.*

I. PEDALIUM Murex.

*Murex. Fl. zeyl. 440.\* Burm. ind. 139. t. 45. f. 2.*

*Hyoisycamus maritimus, fructu tribuli aculeato, monospermus s. dispermus. Herm. zeyl. 42.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

C c

Caca-Mullu. *Rheed. mal.* 10. p. 143. t. 72.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 186.

Ostindische Fulsangel. W.

*Habitat in Zeylona, Malabaria. Dav. Royen.* ☉

Caulis *simplex*. Folia *opposita, obovata, obtusa, dentata, truncata, nuda, petiolis utrinque glandulosis*. Flores *axillares, solitarii, parvi*. Fructus *nutans*.

Odor *Moschi, dum floret, fortissimus*. *Rottboell. collect. Societ. med. Havn.* 2. p. 256. R.

## 1179. MELIANTHUS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1068.

*Cal.* 5-phyllus: foliolo inferiore gibbo. *Petala* 4; nectario infra infima. *Capf.* 4-locularis.

### 1. MELIANTHUS major.

*M. stipulis solitariis petiolo adnatis. Hort. cliff.* 492.

*Hort. upf.* 181. *Roy. lugdb.* 402. *Mill. dict. n. 1. et illustr. Kniph. cent.* 12. n. 70.

*M. africanus. Herm. lugdb.* 414. t. 415.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 106.

Große Honigblume. W.

*Habitat in Cap. b. spei succulentis. † (v. v.)*

*Succussa stillat pluviam nectariferam florens. Venit in Europam 1672 ad Thom. Bartholinum ab Hermano missa.*

### 2. MELIANTHUS minor.

*M. stipulis distinctis, racemis axillaribus elongatis, floribus verticillatis, bracteis linearibus attenuatis. Vahl symb.* 3. p. 85.

*M. stipulis geminis distinctis. Hort. cliff.* 492. *Roy.*

*lugdb.* 402. *Mill. dict. n. 2. Kniph. cent.* 8. n. 68.

*Fabric. helmst. p.* 420.

*M. hyäquanentis minor foetidus. Raj. dendr.* 120.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 108.

Kleine Honigblume. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Folia supra glabra, subtus incana. Racemus pedalis erectus. Flores remoti verticillato-quinterni pen-*

*duli.* Bracteae longitudine calycis. Calycis lacinae lanceolatae attenuatae. Vahl l. c.

\*3. MELIANTHUS *comosus*.

M. stipulis distinctis, racemis infra foliaceis, floribus alternis, bracteis cordatis, foliis supra villosis. Vahl *symb.* 3. p. 86.\*

M. africanus minor foetidus. *Com. rar.* 4. t. 4.

Schopffartige Honigblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. † (v. v.)

Racemi *infra foliis in ramis, supremi interdum axillares tripollicares nutantes. Flores alterni approximati.* Bracteae cordatae villosae pedicello parum longiores. Calycis lacinae duae latae ovatae acutae villosae, tertia linearis inferior. Vahl l. c.

## Classis XV.

TETRADYNAMIA.  
SILICULOSA E.\* *Silicula integra, nec apice emarginata.*

1225. DRABA. *Sil.* valvulis planiusculis. *Stylus* nullus.  
 1234. LUNARIA. *Silic.* valvulis planis pedicellata.  
*Stylus* exsertus.  
 1224. SUBULARIA. *Silic.* valvulis semiovatis. *Stylus*  
 brevior filicula.  
 1216. MYAGRUM. *Silic.* valvulis concavis. *Stylus*  
 persistens.  
 1222. VELLA. *Silic.* valvulis dissepimento dimidio bre-  
 vioribus.  
 1219. CAKILE. *Silic.* lanceolata biarticulata, articulis  
 monospermis, articulo supremo secedente.  
 1218. PUGIONIUM. *Silic.* transversalis utrinque rostra-  
 ta evalvis monosperma.  
 1217. BUNIAS. *Silic.* tetraëdra evalvis bi-f. quadrilocu-  
 laris rugosa.  
 1220. CRAMBE. *Silic.* globosa unilocularis monosper-  
 ma evalvis.

\* \* *Silicula emarginata apice.*

1229. IBERIS. *Petala* duo exteriora majora.  
 1230. ALYSSUM. *Filamenta* quaedam latere inferiore  
 den e notata. *Siliqua* bilocularis.  
 1231. CLYPEOLA. *Silic.* orbiculata: valvulis planis,  
 decidua.  
 1232. PELTARIA. *Silic.* orbiculata, compresso-pla-  
 na, non dehiscens.  
 1228. COCHLEARIA. *Silic.* cordata: valvulis obtu-  
 sis, gibbis.  
 1226. LEPIDIUM. *Silic.* cordata: valvulis acute cari-  
 natis.  
 1227. THLASPI. *Silic.* obcordata: valvulis marginato-  
 carinatis.

1221. ISATIS. *Silic.* obcordata valvulis carinatis, bipartibilis 1-sperma, dissepimento fenestrato.  
 1233. BISCUTELLA. *Silic.* biloba supra infraque, margine carinato.  
 1223. ANASTATICA. *Silic.* retusa: valvulis dissepimento mucronato longioribus.

## SILIQUOSAE.

\* *Calyx clausus foliolis longitudinaliter conniventibus.*

1247. RAPHANUS. *Siliq.* articulata.  
 1239. ERYSIMUM. *Siliq.* tetragona.  
 1240. CHEIRANTHUS. *Siliq.* germine utrinque glandula notato.  
 1242. HESPERIS. *Glandula* intra stamina breviora. *Petala* obliqua  
 1243. ARABIS. *Glandulae* 4 intra foliola calycina. *Stigma* simplex.  
 1245. BRASSICA. *Glandulae* 2 intra stamina breviora; 2 extra stamina longiora.  
 1248. CORDYLOCARPUS. *Siliq.* torulosa semine supremo in articulo discreto!  
 1244. TURRITIS. *Petala* erecta.  
 1236. DENTARIA. *Siliq.* valvis revoluto dehiscentibus.  
 1235. RICO TIA. *Siliq.* unilocularis.

\*\* *Calyx hians foliolis superne distantibus.*

1249. CLEOME. *Siliq.* dehiscens, unilocularis.  
 1237. CARDAMINE. *Siliq.* dehiscens, valvulis revolutis.  
 1246. SINAPIS. *Siliq.* dehiscens. *Cal.* horizontaliter patens.  
 1238. SISYMBRIUM. *Siliq.* dehiscens: valvis rectiusculis. *Cal.* patulus.  
 1241. HELIOPHILA. *Siliq.* dehiscens. *Nectaria* 2, recurvata.

## SILICULOSA E.

## 1216. MYAGRUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1069.*

*Silicula stylo conico terminata, loculo submonospermo.*

1. MYAGRUM *perenne.*

M. siliculi biarticulatis monospermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis. *Syst. veg.* 487. *Hoffm. germ.* 223. *Ro h. germ. I.* 275. *II.* 80.

M. siliquae articulo primo stricto, altero globoso striato. *Hall. herb. n.* 525.

M. siliculis articulatis binatis monospermis, foliis sinuatis subdentatis. *Ger. prov.* 342.

M. siliculis biarticulatis dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis. *Spec. pl. 2. p.* 893. *Hort. ups.* 182.\*  
*Mill. dict. n.* 4. *Scop. carn. n.* 795.

M. biarticulatum. *Crantz. austr. p.* 6.

Crambe foliis lanceolatis dentato-sinuatis. *Hort. cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 329. *Gort. gelr.* 404.

Rapistrum monospermum. *Bauh. pin.* 95. *prodr.* 37. *t.* 37. *Mapp. alfat.* 266. *t.* 266.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 188.

Ausdauernder Leindotter. W.

*Habitat in Germania.* 2 (v. v.)

*Siliculae articulus inferior strictus abortit; superior globosus, striatus, monospermus.*

2. MYAGRUM *orientale.*

M. siliculis sulcatis laevibus, foliis oblongis dentato-sinuatis. *Hort. ups.* 182.\*

Rapistrum orientale, folio raphani, capsulis rugosis. *Boerh. lugdb. 2. p.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 189.

Orientalischer Leindotter.

*Habitat in Oriente.* ☉ (v. v.)

*Siliculae articulis 2, sulcis 3 elevatis; stylo longitudine siliculae.*

3. MYAGRUM *rugosum.*

M. siliculis sulcatis pilosis rugosis, foliis oblongis obtu-

sis dentatis. *Hort. upf.* 183. \* *Mill. dict. n. 3. Hoffm. germ.* 223. *Roth germ. I. 275. II. 80.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 190.*  
 Runzlicher Leindotter.  
*Habitat in Europa australi.* ☉ (v. v.)

#### 4. MYAGRUM *hispanicum.*

M. siliculis laevibus subtorosis, foliis lyratis. *Sp. pl.* 893.  
 Sinapi hispanicum minus, raphani folio. *Tournef. inst.* 227?  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 190.*  
 Spanischer Leindotter. W.  
*Habitat in Hispania.* ♂

*Caulis pilis raris reflexis scaber. Racemi virgati, longi. Folia lyrata, dentata, petiolata, oblonga. Siliculae cylindricae, laeves, nec sulcatae rugosae aut striatae; constantes Corpore oblongo, pedicellato, cylindrico, sterili, cui Silicula ovata insidet collo angustiore: articulo inferiore biloculari inani, superiore monospermo. Corollae luteae.*

#### 5. MYAGRUM *perfoliatum.*

M. siliculis obcordatis subsessilibus, foliis amplexicaulibus, siliculis obcordatis. *Hort. upf.* 182. \* *Hort. cliff.* 328. *Roy. lugdb.* 330. *Sauv. monsp.* 77. *Mill. dict. n. 5. Doerr. nass.* p. 156. *Kniph. cent.* 10. n. 64. *Hoffm. germ.* 223.

M. loculo secundo conico, sterili biloculari. *Hall. helv.* n. 524.

M. monospermum latifolium. *Bauh. pin.* 109. *prodr.* 52. t. 51. *Morif. hist.* 2. p. 267. *f. 3. t. 21. f. antepenult.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 191.*

Durchwachsener Leindotter. W.

*Habitat inter Helvetiae, Galliae segetes.* ☉ (v. v.)  
*Siliculae loculamenta lateralia sunt inania.*

#### \*6. MYAGRUM *chloraefolium.* W.

M. siliculis oblongis marginatis crispatis, foliis subrotundo-cordatis amplexicaulibus. W.

Thlaspi orientale fruticosum Scamonii monspeliensis folio. *Tournef. cor.* 15.

Chlorablättriger Leindotter. W.

*Habitat in Oriente.* † (v. l.)

*Folia alterna sessilia amplexicaulia subrotundo-ova-*

*ta profunde cordata acuta crassiuscula venosa glabra. Racemus terminalis. Silicula elliptica compressa obtusa stylo persistenti infiructa, margine membranaceo dentato, Dillepimentum contrarium. Loculamenta monosperma. Ad Thaspi non pertinet ob loculamenta monosperma et siliculam non emarginatam. A Myagris forte separanda, sed proprium genus exstruere nolui. W.*

### 7. MYAGRUM fativum.

M. siliculis obovatis pedunculatis polyspermis, foliis amplexicaulibus pilosis integerrimis. *Willd. phytog.*

*I. p. 9. n. 29. Cavan. ic. I. p. 47. t. 66.\**

M. siliculis obovatis pedunculatis polyspermis. *Hort. cliff. 328. Fl. suec. 541; 464. Roy. lugdb. 330. Dalib. parif. 193. Mill. dict. n. I. Pollich pal. n. 602. Gmel. sib. 3. p. 249. Kniph. cent. II. n. 79. Hoffm. germ. 223.*

*Alyssum foliis sagittatis, siliquis cordiformibus. Hall. helv. n. 489.*

*Alyssum fativum. Scop. carn. n. 794.*

*Moenchia fativa. Roth germ. I. 274. II. 75.*

*Camelina fativa. Crantz aust. p. 10.*

*Myagrum sylvestre. Bauh. pin. 109. Dill. giff. p. 134.*

*Myagrum fativum. Bauh. pin. 109. Pollich. l. c.*

*Camelino f. Myagrion. Dod. pempt. 532.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 191.*

*Gemeiner Leindotter. W.*

*Habitat in Europa inter linum. ☉ (v. v.)*

*Haec et sequens species forte ob siliculas polyspermas ad Alyssum amandandae. W.*

### \*8. MYAGRUM dentatum. W.

M. siliculis obovatis pedunculatis polyspermis, foliis amplexicaulibus glabris dentatis. *Willd. phytog. I. p. 9. n. 30.\**

*Alysson foliis auriculatis glabris profunde dentatis. Hall. helv. ed. I. n. 537. ed. 2. n. 489. γ. Pollich pal. n. 602. γ. Sp. pl. 894. γ*

*Myagrum foetidum. Bauh. pin. 109. Lind. alfat. 49. t. I.*

*Gezähnter Leindotter. W.*

*Habitat inter segetes Europae australioris. ☉ (v. v.)*

### \*9 MYAGRUM austriacum.

M. siliculis subrotundis glabris, foliis obovato-lanceolatis dentatis basi integerrimis amplexicaulibus. W.



M. filiculis subrotundis glabris, foliis oblongis amplexicaulibus, radice repente. *Murr. Syst. veg.* 584. *Jacq. austr.* 2. t. III. *Hofl. synop.* 351.

Oestreichscher Leindotter. W.

*Habitat in Austriae, Pannoniae uliginosis fossis.* 2 (v. l.)

Folia inferiora obovata, superiora oblonga, omnia ab apice ad medium inaequaliter dentata, basi integerrima attenuata amplexicaulia. W.

## 10. MYAGRUM paniculatum.

M. filiculis subrotundo-globosis reticulato-rugosis, foliis lanceolatis subdentatis sagittatis amplexicaulibus. W.

M. filiculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis. *Hort. cliff.* 328. *Fl. suec.* 542; 565. *Roy. lugdb.* 330. *Dalib. paris.* 193. *Gmel. sib.* 3. p. 249. *Pollich. pal. n.* 603. *Flor. dan. t.* 204. *Scop. carn. n.* 798. *Hoffm. germ.* 223. *Roth. germ. I.* 275. *II.* 81.

Rapistrum foliis amplexicaulibus auriculatis acutis. *Hall. helv. n.* 522.

Nasturtium paniculatum. *Crantz austr. p.* 15.

Myagrum monospermum hirsutum, siliquis rotundis. *Loef. pruss.* 174. t. 56.

Myagro similis siliqua rotunda. *Bauh. pin.* 109. *prodr.* 52. t. 52.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 193.

Rispenblütiger Leindotter. W.

*Habitat in Europa, juxta agros.* ☉ (v. v.)

## 11. MYAGRUM saxatile.

M. filiculis lentiformibus obovatis glabris: foliis petiolatis oblongis ferratis scabris, caule paniculato. *Sp. pl.* 894. *Jacq. vind.* 257.\* *austr. t.* 128.

Alyssum foliis scabris, radicalibus petiolatis, ovatis dentatis, caule subnudo flexuoso. *Hall. helv. n.* 490.

Alyssum alpinum. *Scop. carn. ed.* 2. n. 793.

Cochlearia filiculis sphaericis, polyspermis, glabris; foliis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus. *Scop. carn. ed.* I. p. 511. n. 2.

Nasturtium saxatile. *Crantz austr. p.* 14. t. I. f. 2. *Hall.*

Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis ferratis, caulinis linearibus. *Sauv. monsp.* 122.

Cochlearia perennis saxatilis minima. *Magn. hort.* 59.

*Alysson alpinum*, foliis circa radicem subovatis ferratis in orbem circumactis. *Segu. ver. 1. p. 378.*

*Thlaspi petraeum myagroides*. *Pou. bald. 336. t. 338.*

*Thlaspi 3. saxatile*. *Cam. epit 338.*

*Thlaspi saxatile rotundifolium*. *Bauh. pin. 106. prodr. 48.*

*Thlaspi alpinum minus*, capitulo rotundo. *Bauh. pin. 107. prodr. 48. n. 6. Raj extr. 297.*

*Thlaspi alpinum majus*. *Bauh. pin. 106. n. 6. capitulis rotundis. Bauh. prodr. 49. t. 49.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 194.*

Felsen-Leindotter. W.

*Habitat in alpibus Helvetiae, Baldi, Carniolae, Montpelii, 2 (v. l.)*

*Filamenta longiora sunt approximata, ad latus alterum alterius posita, apice bifurco, cujus ramus interior truncatus, exterior extrorsum arcuatus. Jacq. unde affinitas Alyssi.*

*Plantae tres nobis allatae fuere, an specie diversae vix dixerō.*

- α. *Foliis Radicalibus spatulatis scabris, obtusiusculis, integerrimis; Caulinis lingulatis, laeviusculis; Caulis simplici. Allion.*
- β. *Foliis Radicalibus ut in α; caulinis lingulatis, sed basi sagittatis. Caulis aliquot racemis. Seguiet.*
- γ. *Foliis Radicalibus lanceolatis, subdentatis, scabris; Caulinis lanceolatis, subdentatis, subpetiolatis. Caulis aliquot racemis. Seguiet.*

## 12. MYAGRUM aegyptium.

*M. siliculis angulatis, foliis tripartitis. Sp. pl. 895.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 195.*

Aegyptischer Leindotter. W.

*Habitat in Aegypto. Hasselquist.*

*Caulis divaricatus Racemis virgatis. Folia petiolata, tripartita vel quinquepartita, dentata. Capsulae duobus articulis tetragonis. Flores lutei. Stylus brevissimus. Facies Buniae Kakiles.*

## 1217. B U N I A S.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 1070.*

*Silicula subtetraëdra evalvis 2-f. 4-ocularis rugosa.*

### 1. BUNIAS spinosa.

*B. racemis spinulentibus, Mant. 90.*

B. filiculis ovatis acutis, ramis spinosis floriferis. *Turr. farset. II.*

Zilla myagroides. *Forsk. aegypt. 121. n. 74. ej. ic. t. 17. f. 2.*

Braffica spinosa. *Alp. exot. 201. t. 200. Bauh. pin. III. prodr. 54.*

Crambe spinosissima arabica, foliis longis angustis, floribus in foliorum alis. *Shaw. afr. 179.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 366.*

Dornige Zackenschote. W.

Habitat in Oriente. ☉

Caules pedales, erecti, ramosi, subdivisi, teretes, juncei, laevissimi, virides. Folia ovato-oblonga, obtusa subangulata, laevia, petiolata. Racemi erecti, stricti, rigidique ramulos terminantes, in Spinis compositas desinentes, ad quorum latera Flores sessiles, rari. Calyx oblongus, clausus. Petala lanceolata, exalbido violacea. Stamina tetradynama. Germen cordatum. Stylus cylindricus, longitudine germinis, persistens. Stigma crassiusculum. Silicula cordata, didyma, s. potius Drupa juberosa, laevis, acuta. Nux bilocularis, sexangularis: angulis duobus oppositis latioribus. Semina solitaria, subrotunda. H. U.

## 2. BUNIAS *Erucago.*

B. filiculis tetragonis subdentatis, foliis radicalibus runcinatis, caulinis lanceolatis. W.

B. filiculis tetragonis: angulis bicristatis. *Sp. pl. 935. Jacq. austr. t. 340.*

B. filiqua tetragonia, quatuor alis emarginatis. *Hall. n. 526.*

B. foliis antrorsum sinuatis. *Hort. upf. 182. Sauv. monsp. 285.*

Bunias. *Hort. cliff. 340. Roy. lugdb. 344.*

Sinapi echinatum. *Bauh. hist. 2. p. 856. R.*

Eruca monspeliaca, filiqua quadrangula echinata. *Bauh. pin. 99. prodr. 41. t. 41.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 363.*

Senfbäitrige Zackenschote. W.

Habitat Monspeli in agris humidiusculis. ☉ (v. v.)

## \*3. BUNIAS *aspera.*

B. filiculis tetragonis dentatis, foliis omnibus lanceolatis. W.

B. filiculis muricatis quadrangulis, foliis lanceolatis subdentatis, pilis furcatis. *Retz obs. 2. p. 21.*

Stachelfrüchtige Zackenschote. W.

*Habitat* - - - - ⊙ (v. v.)

Radix annua subramoso-fibrosa. Caulis palmaris-pedalis subramosus, aculeolis minutis asper. Folia inferiora oblanceolata, superiora lanceolata, parcius dentata, pilis albis furcatis trifidisque hinc inde asperja. Flores racemosi flavi generis; Calycibus nonnihil ventricosus conniventibus. Siliquae brevissimae fusco-muricatae, angulis quatuor oppositis serratis cristatae, stylo pyramidato capitato longitudine siliquae terminatae. *Retz l. c.*

#### 4. BUNIAS orientalis.

B. filiculis ovatis gibbis verrucosis, foliis inferioribus runcinato-lyratis, superioribus lanceolatis. W.

B. filiculis ovatis gibbis verrucosis. *Sp. pl. 936. Lepech it. p. 201. Kniph. cent. 9. n. 18.*

B. filiculis obtuse triangulis, foliis inferioribus ex sinuato-dentatis, superioribus lanceolatis dentatis. *Gmel. fib. 3. p. 256. n. 16. t. 57.*

B. foliis retrorsum sinuatis. *Hort. upf. 186.*

Crambe foliis pinnato-hastatis. *Roy. lugdb. 330.*

Crambe orientalis, dentis leonis folia, erucaginis facie. *Tournef. cor. 41.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 368. t. 60. f. 2.*

Orientalische Zackenschote.

*Habitat in Russia. 4 (v. v.)*

#### \* 5. BUNIAS cochlearioides.

B. filiculis ovatis obtusiusculis subrugosis, foliis radicalibus oblongis caulinis sagittatis amplexicaulibus. W.

B. (cochlearioides) filiculis cordato-ovatis laevibus inflexis. *Murr. Nov. Comment. goett. 8. 1777. p. 42. t. 3?*

Crambe Corvini. *Allion. pedem. n. 937.*

Myagrum erucaefolium. *Vill. delph. 3. p. 279.*

Myagrum monospermum minus. *Bauh. pin. 109. prod. 52.*

Myagrum lupinum album erucae foliis. *Barr. ic. 1252.*

Myagro similis flore albo. *Bauh. hist. 2. p. 895.*

Thlaspi anglicum flore albido Corvini. *Barr. ic. 894. f. 2.*

Rapistrum arvense album lupinum, erysimi aut dentis leonis folio, fructu oblongo caduco. *Till. pisf.* 145. Löffelkrautartige Zackenschote. W.

*Habitat in Gallia, Italia, Hungaria, Sclavonia.* ☉ (v. l.)

*Planta a Clariss. Murray descripta cum nostra convenire videtur, differt tamen, secundum iconem, foliis minus sagittatis et pedunculis rectangule patentibus, filiculis inflexis, cum in nostra pedunculi erecto-patentes et siliculae erectae sunt.* W.

*An Myagrum littorale Scopoli carn. n. 799. t. 36. eadem planta?* W.

#### \*6. BUNIAS tatarica.

B. filiculis globosis subhexagonis longe rostratis, foliis lanceolatis obtusis petiolatis. W.

Vella tenuissima. *Pall. itin. 3. app. n. 103. t. U. f. 2.\**

Tatarische Zackenschote. W.

*Habitat in collibus Sibiriae ad Jaikum australem.*

☉ (v. l.)

*Caulis erectus ramosus semipedalis. Folia lanceolata integerrima hispida obtusa basi in petiolum attenuata. Flores albi in racemis filiformibus. Silicula globosa sexsulcata stylo persistenti crasso cylindraco coronata, bilocularis, non dehiscens.* W.

#### 7. BUNIAS syriaca.

B. filiculis globosis subtrigonis scabris uncinato-rostratis, foliis lanceolatis acutis petiolatis. W.

Bunias syriaca. *Gaert. sem. 2. p. 290. t. 141. f. II.*

Anastatica (syriaca) foliis acutis, spicis folio longioribus, filiculis ovatis rostratis. *Sp. pl. 895. Jacq. austr.*

*I. p. 7. t. 6.*

Anastatica hierochuntica. *Crantz. austr. p. 7.*

Myagrum rostratum. *Scop. carn. n. 797. t. 35.*

Myagrum rigidum. *Pall. itin. 3. app. n. 104. tab. Ll. f. 1. et tab. Mm. f. 2.\**

Myagrum e Sumatra et Syria, semine spinoso simili capiti aviculae. *Zan. hist. 142.*

Thlaspi hiericho sylvestri affine. *Bocc. mus. 135. t. 98.*

Thlaspi fruticosum moravicum. *Bocc. ibid.*

Anastatica quae Myagrum e Sumatra. *Gron. orient. 78.*

Rosa hiericonthea sylvestris. *Bauh. pin. 484.*

Rosa hierochuntia alia. *Cam. hort. t. 42.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 200.*

Syrische Zackenschote. W.

*Habitat in Austria, Hungaria, Banatu, Sibiria, Syria, Sumatra.* ☉ (v. l.)

8. *BUNIAS myagroides.*

B. filiculis biarticulatis ancipitibus superne torulosis, foliis pinnatis sinibus reflexis. *Mant.* 96.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 370.

Leindotterartige Zakenfchote. W.

*Habitat in Sibiria.* ☉ I. Falk.

Caulis rectus, bipedalis, laevis, paniculato-ramosus. Folia inferiora pinnata s. bipinnata, latiora, non carnosa, saturate viridia, laevia: laciniis s. pinnis oblongis dentatis; Summa simillima, sed angusta, linearia; omnia habent sinus ad egressum pinnarum deorsum reflexos. Racemi terminales, longi, recti. Flores subsessiles. Calyx oblongus, clausus. Petala 4, obovata, integerrima, dilute purpurascens. Stamina 4 didynamia: antheris flavescens. Stylus ensiformis. Stigma capitatum, purpurascens. Siliqua subcylindrica brevior. Siliqua pedunculata Pedunculo brevi, rigida, rachi approximata, Myagri facie: haec siliqua consistat articulis duobus: inferiore cylindrico, bivalvi, monospermo, vix 2-spermo: valvulis unica stria exaratis: Superior articulis compressus, subanceps, monospermus, vix dispersus, obtusus, utrinque auricula protuberante notatus.

9. *BUNIAS aegyptiaca.*

B. filiculis tetragonis undique verrucoso-muricatis, foliis runcinatis. *Syst. nat.* 3. p. 231. *Act. Petrop.* 12. p. 509. t. 9. *Jacq. hort.* t. 145.

B. filiquis subglobosis tetragonis undique verrucoso-muricatis, foliis runcinatis. *Gouan. illustr.* 45.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 371.

Aegyptische Zakenfchote. W.

*Habitat in Aegypto.* ☉ Zoega.

Caulis pedalis, ramosus, inferne hispidus, superne laevior. Folia runcinata, subdentata, laevia: petiolis subtus pilis raris. Racemi solitarii, terminales, longi. Flores pedicellati. Calyx flavescens, patens. Petala lutea, obovata, obtusa, patentia, unguibus erectis. Stamina lutea, distantia. Germen ovatum, tetragonum, viride. Stylus nullus. Stigma capitatum, luteum. Siliculae ovatae, tetragonae, undique obtuse

*muricatae, praesertim angulis, diversae a siliquis*  
 Bnn. balearicae, quod neque subulato-rostratae; neque  
*pilosae. Syst. Nat. t. 3. p. 231.*

10. *BUNIAS balearica.*

B. siliculis hispida, foliis pinnatis: foliolis subdentatis.  
*Mant. 429. Jacq. hort. t. 144.*

B. foliis lyrato-pinnatis, foliolis eroso-pinnatifidis, fili-  
 culis hispida, rostro subulato brevioribus. *Gouan.*  
*illustr. 45. t. 20.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 371.*

Balearische Zackenschote. W.

*Habitat in Balearibus. ☉ Dav. Royen. (v. v.)*

Caulis pedalis, ramosissimus, patulus, angulatus,  
 laevis. Folia petiolata, pinnata: pinnis lanceolatis,  
 sinuatis, obtusis, laevibus. Pedunculi racemosi, longis-  
 simi, erecti. Pedicelli floribus breviores. Calyx clau-  
 sus, laevis, lanceolatus, concavus, testaceus. Corolla  
 lutea laminis oblongis, obtusis, longitudine calycis.  
 Siliculae globosae, undique echinatae spinis inermibus  
 confertissimis: rostro subulato, stricto, silicula longi-  
 ore. Cotyledones magnae, subbipartitae (Convulvuli)  
 lobis subrotundis.

Similis *B. myagroidi*, sed Siliculae statura *B. eru-*  
*caginis*, verum omnino, excepto rostro, echinatae.

\*11. *BUNIAS prostrata.*

B. siliculis monospermis dentatis, foliis pinnatifidis, la-  
 ciniis sinuatis. W.

B. foliis pinnatifidis, foliolis dentato-ferratis obtusis, fi-  
 liculis subrotundis muricato-tuberculatis. *Desf. atl.*  
*2. p. 76. t. 150.\**

*Habitat in arenis Cassae in Africa boreali.*

Caules plures prostrati e radice pubescentes. Folia  
 pubescentia profunde pinnatifida, laciniis obtusis sinu-  
 atis dentatis. Flores albi. Siliculae subrotundo-cam-  
 pressae dentatae stylo persistenti instructae, pubescentes  
 monospermae. W.

## \*1218. PUGIONIUM.

Gaert. *Sem.* 2. p. 291.

*Silicula* transversalis utrinque rostrata evalvis  
monosperma. Semen arillatum!

I. PUGIONIUM *cornutum*.

*Pugionium cornutum*. Gaert. *Sem.* 2. p. 291. t. 142.  
f. 3.

*Bunias* (*cornuta*) filiculis divaricato-bicornibus basi spinosis. *Sp. pl.* 935.

*Bursa pastoris orientalis drabrae foliis, filiquis cornutis*.  
*Tournef. cor.* 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 366.

Gehörnte Säbelschote. W.

*Habitat in Sibiriae Calmuccorum deserto ad mare, Caspium.* (v. f. c. fr.)

*Planta maxime singularis. Silicula transversim ovalis, utrinque desinens in cornu s. spinam longissimam validissimam, ut referat silicula duo cornua; in medio siliculae; spinae parvae 4 undique directae.*

*Non fructu solo Pugionium, sed et flore abunde a Buniade differt. Flos ei parvulus, Drabae vernalis haud major. Petala angusta integerrima acuminata alba, calyce aliquantulum longiora. Stamina tetradynamia. Germen hispidum biloculare. Stylus brevis. Folia linguiformia integerrima glauca avenia semiamplexicaulia. Racemi terminales, per maturitatem laxissimi, pedunculis divaricatissimis. Mirum, quod tam parvulum strobilum, tam grandis sequatur fructus.*  
Gaert. l. c.

## \*1219. CAKILE.

Gaert. *Sem.* 2. p. 287.

*Silicula* lanceolata subtetragona medio utrinque dente instructa biarticulata, ad articulos secedens, articulis monospermis evalvibus.

I. CAKILE *maritima*.

*C. foliis pinnatis, pinnis linearibus subdentatis.* W.

*Cakile maritima.* Scop. *carn. n.* 844. *Roth. germ.* I. 287.

II. 117. *Desf. atl.* 2. p. 77.



*Cakile Serapionis.* *Gert. sem. 2. p. 287. t. 141. f. 12.*  
*Lob. ic. 223*

*Bunias (Cakile) siliculis ovatis laevibus ancipitibus.* *Sp. pl. 936. Gunn. norv. n. 21. Kniph. cent. 8. n. 18. Hoffm. germ. 223. Fl. dan. t. 1168.*

*Crambe foliis succulentis linearibus pinnato-dentatis.*  
*Sauv. monsp. 280.*

*Raphanus siliquis ovatis angulatis monospermis.* *Hort. cliff. 340. Fl. suec. 569: 613. Roy. lugdb. 344. Gron. virg. 98.*

*Ifatis pinnata.* *Forsk. descr. 121.*

*Eruca maritima italica, siliqua hastae cuspidi simili.*  
*Bauh. pin. 99.*

*Cakile quibusdam.* *Bauh. hist. 2. p. 867.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 369.*

*Gemeiner Meerseuf. W.*

*Habitat in Europae, Asiae, Africae, Americae maritimis* ☉ (v. l.)

## 2. CAKILE *aegyptiaca.* W. †

*C. foliis obovatis inciso-dentatis.* W.

*C. (maritima A) foliis carnosis lanceolatis dentatis, siliculis laevibus cuspidatis.* *Desf. atl. 2. p. 77.*

*Bunias Cakile. β Vahl symb. 2. p. 78.*

*Ifatis (aegyptica) foliis omnibus dentatis.* *Sp. pl. 937?*  
*Mill. dict. n. 4? Forsk. descr. 121.*

*Cakile maritima ampliore folio.* *Tournef. cor. 49.*

*Cakile f. Eruca maritima latifolia.* *Bauh. hist. 2. p. 868.*

*Aegyptischer Meerseuf. W.*

*Habitat in maritimis Italiae, Barbariae, Aegypti.* ☉

*Caulis herbaceus varie flexus teres crassitie pennae anserinae, glaber uti tota planta. Folia alterna plicaria vel ultra oblonga obtusa carnosae inaequaliter crenato-sinuata undulata aequaliter basi in petiolum deficientia. Petiolus interdum longitudine folii. Silicula biarticulata; articulus infimus obovatus, versus apicem utrinque dente obtuso, ultimus ovato-acuminatus, apice compresso ancipiti, inferiore longior. Semen unicum in singulo loculo.* *Vahl. l. c.*

*Ifatis aegyptica Linnaei est forte ab hac planta non diversa; deest enim specimen hujus in herbario suo W.*

## 1220. C R A M B E.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1071.*

*Filamenta 4 longiora apice bifurca: altero antherifero. Silicula globosa, monosperma evalvis.*

1. CRAMBE *maritima.*

*C. foliis pinnatifidis inciso-dentatis cauleque glabris. W.*

*C. foliis cauleque glabris. Fl. succ. 570; 615. Flor. dan. 316. Mill. dict. n. 1. Kniph. cent. 10. n. 30. Hoffm. germ. 224. Roth. germ. 1. 275. II. 79.*

*C. foliis cordatis crispis carulis. Hort. cliff. 340. Roy. lugdb. 329.*

*Brassica maritima monospermos. Bauh. pin. 112.*

*Brassica marina sylvestris multiflora monospermos. Lob. ic. 245.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 378.*

*Gemeiner Meerkohl W.*

*Habitat ad litora Oceani septentrionalis. 2 (v. v.)*

*Crambe orientalis Jacq. ic. rar. 1. t. 128. Misc. 2. p. 337. hujus videtur varietas vel species distincta; nam a C orientali defectu scabritiei, et foliorum forma diversa. W.*

\*2. CRAMBE *tatarica.*

*C. foliis supradecompositis inciso-dentatis cauleque glabris. W.*

*C. foliis decomposito-multifidis. Jacq. ic. rar. 1. t. 129. Misc. 2. p. 274. Host. synop. 353.*

*Tatarica ungarica. Clus. hist. 2. p. 191.*

*Tatarica Ungarica edulis, Panacis Heraclei folio, semine Libanotidis cachryoserae. Bauh. hist. 3. p. 2 p. 163.*

*Panaci Heracleo similis ungarica. Bauh. pin. 153.*

*Tatarischer Meerkohl. W.*

*Habitat in Hungaria, Moravia, Sibiria. 2 (v. l.)*

*Folia supradecomposita, foliolis pinnatifidis inciso-dentatis, terminalibus confluentibus, glabra, ad costam pilis raris obsita. W.*

3. CRAMBE *orientalis.*

*C. foliis oblongis pinnatifido-runcinatis scaberrimis, caule glabriusculo. W.*

*C. foliis scabris, caule glabro. Mill. dict. n. 3. Pall. it. 3. p. 584.*

C. foliis et foliolis alternatim pinnatifidis. *Roy. lugdb.*

330.

*Rapistrum orientale*, acanthi folio. *Tournef. cor.* 14.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 378.

Orientalischer Meerkohl. W.

*Habitat in Oriente.* 2 (v. l.)

Flores albi.

4. CRAMBE *hispanica*.

C. foliis pinnato-lyratis scabris, foliolo terminali reniformi obtuso, caule scabrifusculo. W.

C. foliis cauleque scabris. *Hort. ups.* 193. *Mill. dict.* n. 4. *Kniph. cent.* 10. n. 29.

C. foliis subcordatis crenatis scabris. *Hort. cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 329.

*Myagrum sphaerocarpum.* *Jacq. obs.* 2. p. 20. t. 41.

*Rapistrum maximum rotundifolium monospermum.*

*Corn. canad.* 147. t. 148. *Morif. hist.* 2. p. 266. f. 3. t. 13. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 379.

Spanischer Meerkohl. W.

*Habitat in Hispania.* ☉ (v. v.)

Folia *pinnata*, foliolo terminali maximo obtuso reniformi inaequaliter obtuse dentato. In foliis caulinis praesertim superioribus foliolum terminale est acute dentatum. Caulis ramosus paniculatus inferne scaber, superne saepius glaber. W.

\*5. CRAMBE *reniformis*.

C. foliis pinnato-lyratis hirtis, foliolo terminali reniformi acuto profunde dentato, caule glabro filiformi ramoso. W.

C. caule inferne scabro, ramis laevibus laxè paniculatis, foliis pilosis pinnatis inaequaliter dentatis, lobo terminali maximo reniformi. *Desf. atl.* 2. p. 78. t. 151.\*

Nieenblättriger Meerkohl. W.

*Habitat in rupium fissuris Atlantis prope Tlemfen.*

Caulis inferne sulcatus scaber, superne glaber filiformis ramosus paniculatus. Folia pinnata pilis brevibus conspersa, foliola terminalia maxima reniformia inaequaliter profunde dentata. Flores albi. *Affinis sequenti.* W.

\*6. CRAMBE *filiformis*.

C. foliis interrupte pinnatis lyratis hirtis, foliolo termi-

nali subrotundo dentato, caule glabro filiformi ramofo fastigiato. W.

C. suffruticosa, foliis inferioribus pinnatis scabris, pinnâ extima subrotunda magna. *Jacq. ic. rar. 3. t. 504. Collect. suppl. 120.\**

Fadenförmiger Meerkohl. W.

*Habitat ad Champion River in Patagonia. 24. (v. v.)*

*Canis inferne hirtus superne glaber, ramis filiformibus paniculatis fastigiatis. Folia interrupte pinnata pilis albis rigidis tecta, foliolo terminali subrotundo, basi attenuato, dentato. W.*

7. CRAMBE fruticosa.

C. fruticosa, foliis ovatis pinnatifidis ferratis canis, racemis in panicula effusa dichotoma. *Lin. suppl. 299. Strachartiger Meerkohl. W.*

*Habitat Maderae in rupibus altissimis juxta Pico de Ranxo † Fr. Masson.*

*Frutex ligneus rigidus. Rami foliosi. Folia alterna petiolata ovata profunde dentata s. pinnatifida s. pinnata: laciniis ferratis; cana. Ramuli terminantur in paniculam magnam diffusam, ramulis alternis divaricatis racemosis, racemis brevibus.*

\*8. CRAMBE strigosa.

C. frutescens, foliis ovatis cordatis dentatis hispida basi inaequalibus auriculatis, panicula filiformi diffusa. W.

C. (strigosa) frutescens, foliis basi inaequalibus biauritis strigosis. *l'Herit. stirp. 1. p. 151. t. 72.\**

*Myagrum (arborescens) caule arborecente. Jacq. ic. rar. 1. t. 120. Collect. 1. p. 39.\**

Strieglicher Meerkohl. W.

*Habitat in Canariis. † (v. v.)*

*C. fruticosa gaudet foliis canis, undique obtectis strigis minutis, dum in C. strigosa folia quadruplo majora utrinque viridia, strigae fortiores sed laxiores. l'Herit. 1. c.*

## 1221. I S A T I S.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1072.*

*Silicula obcordata bipartibilis monosperma, valvulis carinatis, dissepimento fenestrato. W.*

1. ISATIS tinctoria.

1. foliis radicalibus crenatis: caulinis sagittatis, siliculis

oblongis. *Fl. Suec.* 543; 614. *Dalib. parif.* 205.  
*Gmel. fib.* 3. p. 250. n. 64. *Crantz austr.* 5. *Pollich*  
*pal.* n. 645. *Gmel. tub.* p. 207. *Kuiph. cent.* 12. n. 64.  
*Regn. bot. Hoffm. germ.* 224. *Roth. germ.* I 274. II. 78.

I. foliis radicalibus petiolatis, ovatis, caulinis amplexi-  
 caulibus. *Hall. helv.* n. 523.

Isatis. *Hort. cliff.* 341. *Roy. lugdb.* 330.

I. sylvestris f. angustifolia. *Bauh. pin.* 113.

I. sylvestris. *Fuchf.* 330.

β. Isatis fativa f. latifolia. *Bauh. pin.* 113. *Blackw. t.* 246.

I. (tinctoria) foliis radicalibus oblongo-ovatis obtusis in-  
 tegerrimis, caulinis sagittatis, filiculis oblongis. *Mill.*  
*dict.* n. 1. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 373.

Färber-Waid. W.

*Habitat ad litora maris Baltici et oceani Europae ad*  
*vias Helvetiae etc.* ♂ (v. v.)

## 2. ISATIS lusitanica.

I. foliis radicalibus crenatis: caulinis sagittatis, pedun-  
 culis subtomentosis. *Sp. pl.* 936. *Mill. dict.* n. 3.  
*Gmel. it.* 3. p. 308.

I. sylvestris minor lusitanica. *Herm. lugdb.* 678.

I. orientalis maritima canescens. *Tournef. cor.* 14. *Buxb.*  
*cent.* 1. p. 4. t. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 376.

Portugiesischer Waid. W.

*Habitat in Hispania et Oriente.* ☉ (v. v.)

*Vix a praecedente sufficienter distincta, sed annua*  
*et minor.* (Flores albi. *Gmel. l. c.* R.)

## 3. ISATIS armena.

I. foliis integerrimis cordatis postice obtusis, filiculis  
 cordatis. *Sp. pl.* 936.

I. armena foliis brallicae perfoliatae, fructu cordiformi  
 canescente. *Tournef. cor.* 14. *Buxb. cent.* 1. p. 3.  
 t. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 377.

Armenischer Waid. W.

*Habitat in Armeniae pratis siccioribus ad rivulos.*

## \*4. ISATIS alpina. †

I. foliis integerrimis cordatis, filiculis ellipticis. W.

I. (alpina) pumila dense foliosa subhirsuta, filiculis lu-

tescentibus. *Vill. delph.* 3. p. 308.\* *Allion. ped.* n. 944.  
t. 86. f. 2.\*

Alpen Waid. W.

*Habitat in monte Vesulo.* 4

*Peltariae alliaceae affinis videtur.* W.

## 1222. V E L L A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1073.

*Silicula* dissepimento valvulis duplo majore, ex-  
tus ovato.

### I. V E L L A *annua.*

V. foliis pinnatifidis, siculis pendulis. *Sp. pl.* 895.  
*Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 10. n. 93. *Trew. ic.* 10.  
t. 8.

Vella. *Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 186. *Roy. lugdb.* 331.

Nasturtium sylvestre, erucæ facie. *Bauh. pin.* 105.

Nasturtium sylvestre valentinum. *Clus. hist.* 2. p. 130.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 196.

Jährige Vella. W.

*Habitat in Hispania.* ☉ (v. v.)

### 2. V E L L A *Pseudo-Cytifus.*

V. foliis integris obovatis ciliatis, siculis erectis. *Sp.*  
*pl.* 895. *Mill. dict. n.* 2. *Cavan. ic.* 1. p. 32. t. 42.\*

*Pseudo-Cytifus* flore leucii luteo. *Bauh. pin.* 390.

*Cytifi* facie *Alysson fruticans* quorundam. *Lob. ic.* 2.  
p. 49. *Bauh. hist.* 1. p. 374.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 197.

Stranchartige Vella. W.

*Habitat in Hispania circa oppidum Aranjuez.* D, Mi-  
nuart. † (v. v.)

Planta frutescens, Foliis integris, sessilibus, hirtis,  
obverse ovatis. Filamentorum paria connata, ca-  
sistrata.

## 1223. A N A S T A T I C A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1074.*

*Silicula* retusa, margine coronata valvulis dissepimento duplo longioribus. *Stylo* intermedio mucronato, obliquo, loculis 2-spermis.

I. ANASTATICA *hierochuntica.*

A. foliis obtusis, spicis axillaribus brevissimis, siliculis unguulatis spinosis. *Sp. pl.* 895. *Jacq. hort. t.* 58.

Anastatica. *Hort. cliff.* 328. *Hort. upf.* 183. *Roy. lugdb.* 331. *Gron. orient.* 78.

Thlaspi Rosa de Hiericho dictum. *Morif. hist.* 2. p. 228. f. 5. t. 25. f. 2. 3.

Rosa hierochuntea vulgo dicta. *Bauh. pin.* 484.

Rosa hierochuntea. *Comm. hort. t.* 41. *Besl. exst. aut.* 4. t. 1. f. 2. 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 198.

Gemeine Jerichorose. W.

*Habitat in litoribus Maris rubri, arenosis Palaestinae, Barbariae, Cairi.* ☉ (v. v.)

## 1224. S U B U L A R I A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1075.*

*Silicula* integra, ovata: valvis ovatis, concavis, dissepimento contrariis. *Stylis* filicula brevior.

I. SUBULARIA *aquatica.*

S. acaulis, foliis subulatis. W.

Subularia. *Fl. lapp.* 253. *Fl. suec.* 527; 566. *Gort. ingr.* 101. *Fl. dan. t.* 35. *Pall. it.* 2. p. 100. *Hoffm. germ.* 224. *Roth germ. I.* 275. *II.* 79.

Alyllum palustre, folio junci. *Buxb. act.* 2. p. 369. t. 23. f. 1.

Graminifolia aquatica, thlaspeos capitulis rotundis: seppimento siliculam dirimente. *Pluk. alm.* 180. t. 188. f. 5.

Gramen junceum hybernum, thlaspeos capitulis. *Morif. hist.* 3. f. 8. t. 10. f. ult.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 201.

Waller-Pfriemenkresse. W.

*Habitat in Europae borealis inundatis, lacustribus, fluviis.* ☉ (v. f.)

*Dissepimentum est contrarium nec valvulis parallelum, ut perhibet Clariff. Jussieu. W.*

\* 2. **SUBULARIA alpina.** W. †

*S. caule ramoso, foliis obovatis.* W.

*Draba (mollis) foliis subcarnosis glabris, radicalibus petiolatis ovatis denticulatis, caulinis sessilibus lanceolatis integerrimis, siliculis oblongis rectis.* *Hofl. synop.*

355 *Scop. carn. n. 789. t. 34.\**

*Berg-Pfriemenkresse.* W.

*Habitat in Carnioliae alpibus.* 2

*Dissepimentum siliculae contrarium secundum Cl. Scopoli descriptionem, ergo Subularia nec Draba.* W.

1225. **D R A B A.**

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1076.*

*Silicula integra, ovali-oblonga, valvis planiusculis dissepimento parallelis. Stylus nullus.*

\* *Caule nudo.*

1. **DRABA aizoides.**

*D. foliis lanceolatis rigidis carinatis, margine ciliatis, petalis calyce duplo longioribus.* W.

*D. scapo nudo simplici, foliis ensiformibus carinatis ciliatis.* *Mant. 91. Gouan. illustr. 39. Jacq. austr. 2. t. 192. Hoffm. germ. 224. Vill. delph. 3. p. 280. Curt mag. 170.*

*D. cauliculis nudis, foliis linearibus ciliatis.* *Hall helv. n. 498.*

*Draba alpina.* *Jacq. 254. Scop. carn. n. 786. Crantz austr. p. 14.*

*Moenchia aizoides.* *Roth germ. I. p. 273. II. 72.*

*Alyssum alpinum hirsutum luteum.* *T. Mill. dict. t. 20. f. 2.*

*Sedum alpinum hirsutum luteum.* *Bauh. pin. 284.*

*Leucoium luteum aizoides montanum.* *Col. ecphr. 2. p. 62.*

*Bursa pastoris alpina rosea lutea.* *Morif. hist. 2. p. 306. f. 3. t. 20. f. 6.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 202.*

*Immergrünes Hungerblümchen.* W.



*Habitat in alpidis Austriae, Helvetiae, Galliae, inque montibus Baruthinis.* 2 (v. l.)

*Simillima D. alpinae, a qua differt: Foliis laevibus, linearibus, carinatis, ciliatis; nec ovali-oblongis hirtis absque carina. Differt a D. ciliari Foliis in caespitem congestis radicalibus, carina laevi; nec Foliis alternis in ramis expansis, carinaque ciliata, Floribus ut in D. alpina flavis, nec albis.*

## \*2. DRABA rigida. W.

*D. foliis lanceolatis rigidis carinatis, margine subciliatis, petalis longitudine calycis.* W.

*Alyssum orientale minimum, foliis rigidis et lucidis.*

*Tournef. cor. 15.*

*Steifes Hungerblümchen.* W.

*Habitat in Armenia.* 2 (v. l.)

*Simillima praecedenti sed Folia breviora obtusiora, ciliis marginalibus parciorebus; Petala subrotunda longitudine calycis. Scapi breviores.* W.

## 3. DRABA ciliaris.

*D. caule subnudo, foliis linearibus margine carinaque ciliatis, petalis integris.* *Mant. 91. Ger. prov. 344. t. 13. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 203.*

*Gefranztes Hungerblümchen.* W.

*Habitat in alpidis Barcinonenfibus.* 2

*Folia radicalia in caespitem congesta, imbricata, conferta, laevia, carinata, distincte ciliata. Petala obovata, integra, alba. Stylus flaminibus longior.*

*Differt a D. aizoidae foliis angustioribus glabris, petalis minime emarginatis. Cultra ramos exserit foliis remotis.*

*Hanc cum D. aizoidae conjunxit Cl. Liljeblad Nov. Act. upf. 6. p. 50, sed diversa mihi videtur.* W.

## 4. DRABA alpina.

*D. scapo nudo simplici, foliis lanceolatis integerrimis.* *Fl. lapp. 255; 570. Gouan. illustr. 39. not. Fl. suec. 524. Hort. cliff. 333. Fl. dan. t. 56.*

*D. caule simplici nudo, foliis ovato-lanceolatis planis integerrimis, silicula oblonga stylo subexserto.* *Liljeblad Nov. Act. upf. 6. p. 53.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 204.*

Alpen-Hungerblümchen. W.

*Habitat in alpibus Europae borealis. 4*

Folia radicalia omnia, patentia, lanceolata, supra pilis adpersa, more *Androsaces* disposita; minime imbricata s. linearia s. ciliata, aut supra laevia. Caulis aphyllus, adpersus raris pilis: nec monophyllus s. laevis. Petala laeviter emarginata, nec integra.

Folia persaepe apice dentata. Gouan l. c.

\* 5. DRABA hispida. W.

D. foliis obovatis subdentatis hispidis sessilibus, pilis bifurcatis, scapo nudo, stylo brevissimo. W.

Alyssum orientale polygوني folio, flore luteo. Tournef. cor. 15.

Scharfblättriges Hungerblümchen. W.

*Habitat in Cappadocia. 4 (v. l.)*

Folia obovata in caespites congesta uno alterove dente notata hispida. Pili subulati rigidi bifurcati divaricati. Petala calyce duplo longiora flava. Simillima sequenti, at diversa: foliis obovatis caespitosi dense pilis bifurcatis tectis, Floribus parum majoribus flavis, Petalis indivisis. Stigmate non sessili, sed stylo brevissimo stipitato. W.

6. DRABA verna.

D. foliis oblongis acutiusculis subserratis subhirtis, scapo nudo, petalis bifidis, stigmate sessili. W.

D. scapis nudis, foliis subserratis. Syst. veg. 489. Hoffm. germ. 225. Roth germ. I. 273. II. 71.

D. scapis nudis, foliis lanceolatis subincisis. Hort. cliff. 333. Fl. succ. 523; 567. Roy. lugdb. 333. Gron. virg. 76. Crantz. austr. p. II. Gunn. norv. n. 2. Pollich. pal. n. 604. Kniph. cent. I. n. 26. Scop. carn. n. 792.

D. cauliculis nudis, foliis subhirsutis, tridentatis. Hall. helv. n. 496.

Cochlearia siliculis lanceolatis, polyspermis, caule paniculato nudo. Scop. carn. ed. I. p. 511. n. 3.

Bursa pastoris minor, loculo oblongo. Bauh. pin. 108.

Alysson vulgare, polygوني folio, caule nudo T. Segu. veron. I. p. 575. t. 4. f. 3.

Pilosella minor. Thal. hanc. 84. t. 7. f. E.

Alfina minima. Tabern. 708. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 204.*

Gemeines Hungerblümchen. W.

*Habitat in Europae aridis et America septentrionali.*

⊙ (v. v.)

\*7. DRABA *caroliniana*. †

D. scapo nudo simplici laevi, foliis hirsutis ovatis. *Walt. carol. 174. Liljeblad Nov. Act. Ups. 6. p. 55.*

Carolinisches Hungerblümchen. W.

*Habitat in Carolina.* ⊙

*Simillima est D. verna, siliculae tantum longiores et folia obtusiora. Annon ejus varietas? Liljeblad l. c.*

\*8. DRABA *nivalis*.

D. foliis lanceolatis integerrimis subpubescentibus ciliatis, scapo unifolio decumbente, petalis retusis. W.

D. (*nivalis*) caule decumbente, pedunculis sabnudis, foliis oblongo-ovatis integerrimis, siliculis erectis. *Liljeblad Nov. Act. Ups. 6. p. 47. t. 2. f. 2.\* (excluso synonymo Wulfeni.)*

*Draba stellata. Fl. dan. t. 142.*

Schnee-Hungerblümchen. W.

*Habitat in alpibus Lapponiae, Norvegiae, Helvetiae et in monte Cenisio. 4 (v. l.)*

*Folia lanceolata integerrima subpubescentia, pilis minutis stellatis obsita. Scapus folio uno alterove instructus vel etiam nudus decumbens, vel ascendens, Silicula lanceolata. Hanc plantam etiam a Clariff. Villars sub nomine Drabae cenisiae habeo. Simillima sequenti, cujus forte varietas. W.*

\*9. DRABA *stellata*.

D. foliis oblongis obtusiusculis canis pubescentibus integerrimis dentatisve, scapo subunifolio erecto. W.

D. (*stellata*) foliis hirtis integerrimis dentatisque, scapo subunifolio, siliculis oblongis erectis. *Jacq. vindb. 113. obs. n. 54. t. 4. f. 3.*

*Draba hirta. Villars delph. 3. p. 282.\* Jacq. austr. t. 432.*

D. cauliculis subnudis, foliis ovatis tomentosis. *Hall. helv. n. 497.*

D. (*ausiriaca*) rosulis hirsutis incanis raro dentatis, folio ad caulem ampliori semper dentato. *Crantz austr. p. 12. t. 1. f. 4.*

Bursa pastoris alpina hirsuta. *Bauh. pin.* 108. *prod.* 51.  
Sternhaariges Hungerblümchen. W.

*Habitat in alpinis* Austriae, Helvetiae, Galliae, Scotiae. 2 (v. l.)

*Differt a praecedente* Foliis dentatis incanis et pilis stellatis densissime tectis, scapis erectis, Siliculis latioribus. W.

\* 10. DRABA androsacea. W.

D. foliis oblongis obtusis rigidis crenatis, margine ciliato-dentatis, scapis triphyllis. W.

*Draba ciliaris.* *Hofst. synop.* 354.\*

D. (*ciliata*) foliis imis multis duris, denticulatis, denticulis pilo albo rigido sursum verso terminatis, scapis foliosis. *Scop. carn. n.* 787. *t.* 33.\*

*Draba fladnizensis.* *Wulfen in Jacq. Misc.* I. p. 147. *t.* 17. *f.* 1.

Mannschildartiges Hungerblümchen. W.

*Habitat in montibus* Carnioliae, Croatiae, Carinthiae.

2 (v. l.)

*A D. ciliari* foliis non linearibus et scapo polyphylo distincta. *Differt a praecedentibus* foliis rigidis glaberrimis, et scapo magis folioso. Folia obtusa rigida carinata, carina subtus pilis 2 vel 3 longis instructa, margine dentata, dentibus pilo terminatis, ceterum glaberrima. Petala alba calyce duplo longiora. Scapus foliis binis vel tribus instructus. Siliculae oblongae acutae. W.

\* 11. DRABA pyrenaica.

D. scapo nudo, foliis cuneiformibus palmatis trilobis.

*Loest. it.* 61. *Jacq. vind.* 255.\* *Ger. prov.* 344.

*Crantz austr. p.* 13. *t.* 1. *f.* 5. *Jacq. austr. t.* 228.

*Mill. dict. n.* 3. *Allion ped. n.* 894. *t.* 8. *f.* 1.

Ayllon pyrenaicum perenne minimum, foliis trifidis.

*Tournef. inst.* 217. *Allion. pedem. t.* 6. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 206.

Pyrenäisches Hungerblümchen. W.

*Habitat in Pyrenaeis, et in alpinis* Helvetiae, Italiae,

Austriae. 2 (v. l.)

Folia inferiora 5-fida, superiora 3-fida. Flores purpurei.

\* \* *Caule folioso.*

12. DRABA *muralis*.

D. caule ramoso, foliis ovatis amplexicaulibus dentatis, filiculis patentibus glabris. W.

D. radice annua, caule ramoso, foliis caulinis cordatis sessilibus amplexicaulibus dentatis pubescentibus, racemo subpubescente, pedicellis filicula vix longioribus, filiculis nudis seminibus 12-16. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 153.

D. caule ramoso, foliis ovatis sessilibus dentatis. *Syst. Veg.* p. 489. *Hoffm. germ.* 225. *Roth. germ.* I. 273. II. 71. *Desf. atl.* 2. p. 65. *All. pedem* n. 897.

D. caule ramoso, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. *Roy. lugdb.* 33. *It. gotl.* 192.\* *Fl. suec.* 525: 569. *Mill. dict.* n. 3. *Neck. gallob.* p. 273. *Pollich pal.* n. 605. *Hall. helv.* n. 499.

Myagroides subrotundis serratisque foliis, flore albo. *Barrel. ic.* 816.

Bursa pastoris major loculo oblongo. *Bauh. pin.* 108. *prodr.* 50. t. 50.

Bursa pastoris sublongo loculo affinis pulchra planta. *Bauh. hist.* 2. p. 938.

D. minima muralis discoidea. *Colum. ecphr.* I. p. 274. t. 272. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 206.

Mauer Hungerblümchen. W.

*Habitat in Europae australioris nemoribus.* ☉ (v. v.)

Pedunculi fructiferi horizontales filiculis longiores. Flores albi.

\*13. DRABA *nemoralis*.

D. caule ramoso, foliis ovatis amplexicaulibus dentatis, filiculis patentibus pubescentibus. W.

D. radice annua, caule ramoso, foliis caulinis ovatis sessilibus dentatis pubescentibus, racemis glaberrimis, pedicellis filicula duplo longioribus, filicula pubescente, seminibus 30-36. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 154.

Draba nemorosa. *Sp. pl.* I. p. 643. *Gmel. j. b.* 3. p. 253.

Draba muralis.  $\beta$  *Fl. suec.* 569.

Draba muralis. *Thunb. jap.* 259.

Alysson folio Veronicæ, floribus luteis. *Buxb. act. pe-trop.* 3. p. 273.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. t. 60. f. 1.

Wald-Hungerblümchen. W.

*Habitat in nemoribus Sueciæ, Rossia, Japonia.* ☉ ♂ (v. v.)

Caulis jam a basi ramosus diffusus. Corolla flava. Rachis racemi glabra nec pubescens ut in praecedente, Siliquae pubescentes. Notae haec sunt constantissimae, nec unquam variant, ut cultura me docuit. W.

#### 14. DRABA hirta.

D. scapo unifolio, foliis oblongis acutis dentatis subhirsutis, filiculis obliquis pedicellatis. W.

D. scapo unifolio, foliis subhirsutis, filiculis obliquis pedicellatis Sp. pl. 897.

Draba norvegica. Flor. dan. t. 143. Gunn. norv. n. 846.

D. caule subnudo, foliis lanceolatis subdentatis, filiculis obliquatis, stylo brevissimo. Liljeblad Nov. Act. Ups. 6. p. 15. (exclusa varietate.  $\beta$ )

Behaertes Hungerblümchen. W.

Habitat in alpibus Lapponicis. D. C. Solander.

Simillima D. incanae, sed Caulis nudus in medio folio unico lanceolato. Petala alba, emarginata. Siliculæ magis glabrae et ovatae: pedunculo filiqua dimidio brevior; nec subsessiles.

#### 15. DRABA incana.

D. foliis caulinis numerosis incanis, filiculis oblongis obliquis, subsessilibus. Fl. suec. 526: 568. It. gotl. 192.\* Hudsf. angl. 244. Mill. dict. n. 6. Gunn. norv. n. 3.\* Pall. it. 2. p. 28. Flor. dan. t. 130. Hoffm germ. 225. Röth. germ. I. 273. II. 72.

D. caule ramoso folioso, foliis dentatis. Fl. lapp. 254. Hort. cliff. 334.

Leucoium l. Lunaria vasculo oblongo intorto. Pluk. alm. 215. t. 42. f. 1.

D. (confusa) foliis caulinis numerosis lanceolatis dentatis incanis, pedicellis erectis pubescentibus filicula brevioribus, filiculis pubescentibus. Ehrh. Beitr. 7. p. 155.

$\beta$ . D. (contorta) foliis caulinis numerosis lanceolatis dentatis hirsutis, pedicellis erectis hirsutis filicula brevioribus, filiculis contortis glabris. Ehrh. Beitr. 7. p. 155.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 208.

Græs Hungerblümchen. W.

Habitat in alpibus et alpinis Europae borealis.  $\sigma$

( $\beta$ . v. v.)

Varietatem  $\alpha$  nunquam vidi: sed  $\beta$  in hortis cultura non mutatur. W.

\*16. DRABA *magellanica*.

D. caulibus foliosis villosis, foliis lanceolatis integris subincanis distantibus, siliculis oblongis non intortis. *Lamarck encycl. 2. p. 325.*

Magellanisches Hungerblümchen. W.

*Habitat ad fretum Magellanicum.*

*Folia radicalia linearilanceolata albicantia et in caespitem expansa. E medio caespitis surgunt caules 5 vel 6 semipedales et ultra, graciles teretes purpurei et pilis brevibus tecti. Folia distantia parva lanceolata integerrima sessilia. Flores albi ut in praecedente dispositi. Siliculae oblongae utrinque acutae compressae, non tortae, in pedunculis brevibus. Lam. l. c.*

## 1226. LEPIDIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1077.*

*Silicula emarginata, cordata, polysperma: valvulis carinatis, dissepimento contrariis.*

1. LEPIDIUM *perfoliatum*.

L. foliis caulinis pinnato-multifidis, ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Hort. cliff. 331. Hort. upf. 173. Roy. lugdb. 335. Gron. orient. 79. Mill. dict. n. 5. Pall. it. 2. p. 329. Jacq. austr. t. 346. Kniph. cent. 10. n. 54.*

*Nasturtium spicatum persicum perfoliatum maximum Morif. hist. 2. p. 294. f. 3. t. 25. f. 17.*

*Thlaspi alexandrinum. Bauh. pin. 108. prodr. 50. Bauh. hist. 2. p. 933. Raj hist. 834.*

*Thlaspi verum dioscoridis L. Zann. hist. 193. t. 129. Raj. hist. 930.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 209.*

*Durchwachsene Krelle. W.*

*Habitat in Austria, Persia, Syria ☉ (v. l.)*

2. LEPIDIUM *vesicarium*.

L. foliis pinnatis, foliolis linearibus, geniculis caulinis inflatis. W.

L. caulium geniculis inflatis. *Sp. pl. 898.*

L. orientale, nasturtii folio, caule vesicario. *Tournef. cor. 15. Buxb. cent. 1. p. 17. t. 26.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 210.*

Blafen-Kresse. W.

*Habitat in Iberiae, Mediae aridis.* ☉

### 3. LEPIDIUM nudicaule.

L. scapo nudo simplicissimo, floribus tetrandris, foliis pinnatifidis. *Sp. pl. 898. Loeft. it 155.\* Mill. dict. n. 8. Gouan. illustr. p. 40.*

L. foliis filiformibus apice pinnatifidis, caule nudo. *Sauv. monsp. 228; 281.*

Thlaspi (*nudicaule*) scapo nudo, foliis radicalibus lanceolatis, apice sinuato-ferratis. *Desf. atl. 2. p. 67.\**

Nasturtium minimum vernalis, foliis tantum circa radicem. *Magn. monsp. 187. t. 186.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 210.*

Stiellose Kresse. W.

*Habitat Monspeli, inque Hispania et Algeria.* ☉

Folia radicalia multa, linearia, apice pinnatifida vel dentata. Siliculae emarginatae. Petala aequalia.

Stamina 4.

*Distincta planta ab Iberide nudicauli.*

Variat foliis omnibus cordato-ovatis longe petiolatis. Stamina saepe 6. *Gouan. R.*

### 4. LEPIDIUM procumbens.

L. caule basi ramoso ramis adscendentibus, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus lanceolatis indivisis, petalis longitudine calycis. W.

L. foliis sinuato-pinnatifidis: impari majore, scapo nudo, caulibus prostratis racemiferis. *Sp. pl. 898.*

L. foliis pinnatis: impari majore, caule procumbente. *Sauv. monsp. 228.*

Nasturtium foliis omnibus alternatim pinnatis. *Dalib. parif. 194.*

Nasturtium pumilum supinum vernalis. *Magn. monsp. 185. t. 184.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 211.*

Liegende Kresse. W.

*Habitat in Arragonia, Valentia, et ad Caucasum in Sibiria.* ☉ (v. f.)

Folia alia ovata integra; alia triloba, quinqueloba, lyrata. Scapi radicales; etiam pedunculi aliquot e caule, folio longiores. Calyx foliolis concavis. Petala cuneata, alba, calyce non longiora. Stamina 6. Stylus vix ullus. Silicula *Drabae vernalis*.



Caulis *aphyllus tantum in parvis loco sterili natis speciminibus, alias est semipedalis basi in ramos simplices adscendentes divisus. Folia radicalia pinnatifida, caulina inferiora, basi utrinque lacinia unica vel binis instructa; superiora lanceolata indivisa. Silicula elliptica obtusa. A. L. petraeo diversissimum foliis pinnatifidis et nunquam pinnatis, filiculis obtusis. L. procumbens Gouan illustr. p. 40. est L. petraei varietas. W.*

### 5. LEPIDIUM *alpinum.*

L. foliis pinnatis integerrimis glabris, caule florifero nudo adscendente, petalis calyce majoribus, filiculis lanceolatis mucronatis. W.

L. foliis pinnatis integerrimis, scapo subradicato, filiculis lanceolatis mucronatis. *Amoen. acad. 4. p. 321. \*Jacq. vind. 258. \*aust. t. 137. Flor. dan. t. 569? Hoffm. germ. 225.*

L. foliis pinnatis, pinnis ovatis aequalibus. *Hall. helv. n. 316.*

L. (*Halleri*) petalis calyce longe majoribus, silicula tricuspidi mucronata. *Crantz. austr. p. 5. t. 1. f. 3.*

*Draba Nasturtium. Scop. carn. n. 791.*

*Nasturtium alpinum tenuissime divisum. Bauh. pin. 105. Bauh. hist. 2. p. 918. Raj. hist. 826.*

*Thlaspi montanum minimum. Dalech. hist. 1180.*

*Cardamine alpina 3. minima. Clus. hist. 2. p. 128.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 212.*

*Alpen-Kresse. W.*

*Habitat in alpinis Schneeberg, Salisburgenfibus, Tyrolenfibus, Helveticis, Baldo. 4 (v. l.)*

*Petala calyce majora. Stamina 4. Jacq.*

*Folia glabra pinnata, vel potius profunde pinnatifida, laciniis integerrimis plerumque linearibus obtusis, interdum obovatis. Haec sunt in caulibus procumbentibus uncialibus disposita, ex quorum apice surgit caulis floriferus absque ullis foliis biuncialis et ultra. Siliquae lanceolatae mucronatae. W.*

### \*6. LEPIDIUM *calycinum.*

L. foliis pinnatis integerrimis villosis, caule florifero folioso erecto, petalis calyce persistenti majoribus, filiculis mucronatis. W.

*Linnaei Spec. Plant. T. III*

*E. e*

*Lepidium calycinum.* *Stephan. in litt.*  
Altaische Kresse. W.

*Habitat in alpinis Altaicis Sibiriae.* 2. (v. f.)

Folia radicalia numerosa uncialia vel biuncialia pinnata vel potius profunde pinnatifida; pilis albican-  
tibus tecta, laciniis lineari-lanceolatis obtusis inte-  
gerrimis. Caulis quadriuncialis vel ultra foliis mino-  
ribus alternis ad basin usque pedunculi inferioris rami  
obtusus. Pedunculi valde villosi. Calyx in fructu  
persistens, foliolis nervosis coloratis. Corolla calyce  
duplo longior. Siliculae ut in *Draba aizoides lanceo-*  
*latae stylo persistenti mucronatae.* Affine praecedentis  
sed foliis villosis, caule florifero erecto folioso,  
calycibus persistentibus, et magnitudine diversum. W.

### 7. LEPIDIUM *petraeum.*

L. foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis ca-  
lyce minoribus. *It. oel. 52. Fl. suec. 535; 573. Jacq.*  
*virid. 115. Mill. dict. n. 9. Jacq. austr. t. 131.*  
*Hoffm. germ. 226. Roth. germ. II. 89.*

*Nasturtium foliis pinnatis, radicalibus ovato-lanceola-*  
*tis, caulinis linearibus.* *Hall. helv. n. 515.*

*Lepidium (Linnaei) petalis calyce vix majoribus; fili-*  
*culo stylo carente.* *Crantz austr. p. 7. t. 2. f. 4. 5.*

*Cardamine pusilla saxatilis montana discoides.* *Col. ephr.*  
*I. p. 274. t. 273. bon.*

*Nasturtium pumilum vernalis.* *Bauh. pin. 105.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 213.*

Stein-Kresse. W.

*Habitat in lapidosis Oelandiae, Angliae, Austriae.* ☉  
(v. f.)

### 8. LEPIDIUM *Cardamines.*

L. foliis radicalibus pinnatis; caulinis lyratis. *Loefl. it.*  
*37.\* Amoen. acad. 4. p. 278.\* Act. stockh. 1755. p.*  
*273. t. 8; 9.*

L. foliis inferioribus alterno-pinnatis carnosis glaucis,  
superioribus sessilibus dentatis apice ovatis. *Arduin.*  
*spec. I. p. 19. t. 13.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 213.*

Spanische Kresse. W.

*Habitat in Hispaniae argillosis.* ♂

### 9. LEPIDIUM *spinosum.*

L. foliis pinnatis: foliolis lunatis: exterioribus elonga-  
tis, ramis mucronatis. *Mant. 253.*

L. spinosum foliis pinnatifidis sursum cristatis, spicis subulatis. *Ard. specim. 2. p. 34. t. 16.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 214.*

Spitztheilige Kresse. W.

*Habitat in Oriente. ☉ H. U. (v. f.)*

Folia radicalia pinnata, petiolata, palmaria, decurrentia: Foliola inferiora subrotunda; lunata, antice palmata; exteriora multo majora, extrorsum semipinnatifida laciniis linearibus, impari foliolo integro. Fol. Caulina pauca, linearia, erecta, vix divisa. Caulis spithameus, rigidulus, crassiusculus, subulatus, inferne ramosus. Rami subulati, simplicissimi, rigentes, apice spinosi. Flores sparsi, albi, Pedunculo brevissimo rigido. Calyx parvus, ovatus, erectus, hians, pallidus, deciduus. Petala obovata, calyce duplo longiora, inter calycis lacinias patentia. Stamina alba, simplicia, longitudine calycis. Silicula cuneiformis, bifida, rigens, apice compressa, subsessilis.

#### 10. LEPIDIUM sativum.

L. floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Vir. cliff. 63. Hort. ups. 183. Fl. suec. 2. n. 571. Mat. med. 159. Roy. lugdb. 335. Mill. dict. n. 10. Hoffm. germ. 226. Ludw. ect. t. 166. Roth. germ. I. 278. II. 89.*

L. foliis varie divisis incisisque. *Hort. cliff. 331.*

Nasturtium sativum. *Crantz. austr. p. 21.*

Nasturtium hortense vulgatum. *Bauh. pin. 103.*

Nasturtium hortense. *Dod. pempt. 771. Blackw. t. 23.*

β. Nasturtium hortense crispum. *Bauh. pin. 104. prodr. 44. t. 43.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 215.*

Garten-Kresse. W.

*Habitat - - - - ☉ (v. v.)*

#### 11. LEPIDIUM lyratum.

L. foliis lyratis crispis. *Sp. plant. 899. Mill. dict. n. 7.*

L. orientale, nasturtii crispifolio. *Tournef. cor. 15. itin. 339. t. 339.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 216.*

Leyerblättrige Kresse. W.

*Habitat in Oriente. ☉ (v. v.)*

#### \*12. LEPIDIUM crassifolium.

L. foliis indivisis integerrimis, radicalibus petiolatis ova-

tis, caulinis sessilibus lanceolatis sagittatisque. *Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. I. p. 4. t. 4.\**

Dickblättrige Kresse. W.

*Habitat in locis salsis siccis sterilissimis Hungariae, inque Sibiria ad Volgam et Kumam fluvium. 4 (v. l.)*

Radix crassitie digiti. Folia crassa glabra indivisa, radicalia longe petiolata ovata acutiuscula integerrima, caulina lanceolata sagittata amplexicaulia integerrima. Flores magnitudine sequentis albi tetradynami. Siliculae ovatae acutae dispermae. W.

### 13. LEPIDIUM latifolium.

L. foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *Hort. cliff. 330. Fl. suec. 533. Roy. lugdb. 334. Dalib. paris. 194. Hall. helv. n. 505. sub Nasturtio. Mill. dict. n. I. Crantz. austr. p. 11. Pall. it. I. p. 238. Flor. dan. t. 557. Blackw. t. 448. Kniph. cent. 3. n. 53. Hoffm. germ 226. Roth. germ. I, 278. II. 89.*

L. latifolium. *Bauh. pin. 97.*

L. Plinii. *Dod. pempt. 716.*

L. Aeginetae. *Tabernaem. 456. Camer. epit. 378. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 217.*

Breitblättrige Kresse. W.

*Habitat in Galliae, Angliae umbrosis, succulentis. 4 (v. v.)*

Folia radicalia ovata serrata, caulina oblonga sessilia integerrima utrinque attenuata. Specimina e Sibiria accepta habent, folia radicalia ovata serrata, caulina oblonga sessilia ab apice ad medium dentata, ceterum floribus, siliculis et toto habitu conveniunt. W.

### \*14. LEPIDIUM amplexicaule. W.

L. foliis indivisis oblongo-lanceolatis sagittatis sessilibus, apice dentatis, siliculis subrotundis stylo terminatis. W.

Stengelumfassende Kresse. W.

*Habitat in Sibiria. 4 (v. l.)*

Caulis pedalis teres laevis e basi ramis altitudine caulis instructus. Folia radicalia ignota; caulina ovato lanceolata uncialia acuta glabra, apice utrinque dentibus 2, 3 vel 4 remotis acutis, basi obtuse et brevissime sagittata, sessilia. Flores et Siliculae ut in praecedente. Cum praecedente in multis convenit,

*tamen foliis ovato-lanceolatis basi sagittatis diversa. A sequenti cui similis foliis apice dentatis, et siliculis subrotundis stylo persistenti mucronatis distincta. W.*

\*15. **LEPIDIUM** *glastifolium*.

L. foliis indivisis basi obsolete dentatis, radicalibus oblongis petiolatis, caulinis sagittatis sessilibus, siliculis obovatis stylo terminatis. W.

L. foliis glabris, radicalibus ellipticis petiolatis, caulinis hastato-lanceolatis amplexicaulibus basi dentatis, siliculis oblongis. *Desf. atl. 2. p. 66. t. 147.\**

Thurmkrautblättrige Kresse. W.

*Habitat in Algeriae montibus umbrosis.*

Caulis pedalis sesquipedalisque inferne glaber, ramis vero pubescentibus. Folia radicalia petiolata oblonga obtusa glabra basi quandoque obsolete dentata. Folia caulina glabra sessilia obtusiuscula sagittata basi obtuse dentata. Flores albi tetradynami. Petala calyce duplo longiora. Siliculae obovatae stylo tenui coronatae. W.

\*16. **LEPIDIUM** *oleraceum*.

L. foliis elliptico-oblongis acutis serratis floribus tetrandris. *Forst. prod. n. 248. Ejusd. pl. escul. p. 69. n. 38.\* Ait. Kew. 2. p. 374.*

*Lepidium bidentatum. Montium in Nov. Act. A. N. C. 6. p. 324. tab. 5. a.*

Tiefzähnige Kresse. W.

*Habitat in Novae Zeelandiae littoribus arenosis. ☉*

Caulis herbaceus teres laevis erecto-ascendens ramosus, ramis paniculatis, a pedali saepe in semiorgyalem altitudinem excrefcens. Folia elliptico-oblonga utrinque attenuata profunde serrata patentia glabra palmaria, superiora minora apice tantum serrata. Flores albi bilineares. Petala subrotunda integra concava calyce duplo majora, ungue lineari lamina dimidio breviora. Stamina quatuor. Siliculae ovato-cordatae dispermae. *Forst. l. c.*

\*17. **LEPIDIUM** *piscidium*.

L. foliis elliptico-oblongis acutis integerrimis, floribus tetradynamis. *Forst. prod. n. 249. Ejusd. pl. esc. p. 70. n. 39.\**

Fischfangs-Kresse. W.

*Habitat in insula Botanices, Teautea, Huaheine. ☉*

*Caulis bipedalis herbaceus, ramis patenti-adscendentibus teretibus laevibus. Folia alterna elliptico-oblonga integerrima patentia laxa bipollicaria, inferiora caulis basi attenuata elongata fere petiolata. Racemi terminales solitarii simplices. Flores parvi. Petala alba spathulata calyce longiora angustiora. Glandulae 6 minutae staminibus interjectae. Silicula ovalis compressa apice emarginata. Semina in loculis subsolitaria. Forst. l. c.*

### 18. LEPIDIUM subulatum.

*L. foliis subulatis indivisis sparsis, caule suffruticoso.*

*Sp. pl. 899. Mill. dict. n. 11.*

*Nasturtium fruticosum, foliis glaucis, linearibus, subhirsutis. Hall. helv. n. 506.*

*Lepidium, capillaceo folio, fruticosum hispanicum.*

*Tournef. inst. 216.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 217.*

*Pfaffenblättrige Kresse. W.*

*Habitat in Hispania. Loeft. 4 (v. l.)*

*Radix perennis, caespitem promens foliorum et ramulorum persistentium. Caules vix spithamaei, simplices, subtomentosi, plures. Folia sparsa, subulata, linearia, acuta, supra plana, subtus semiteretia. Racemi terminales et ex alis supremis foliorum simplices. Petala alba. Siliculae omnino L. ruderalis. Stamina sex.*

### 19. LEPIDIUM graminifolium.

*L. foliis linearibus: superioribus integerrimis, caule paniculato virgato, floribus hexandris. Sp. pl. 900.*

*Hoffm. germ. 226. Roth. germ. II. 90.*

*Thalpi lusitanicum umbellatum, gramineo folio, flore albo. Tournef. inst. 213.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 218.*

*Grasblättrige Kresse. W.*

*Habitat in Europa australi. 4 (v. l.)*

*Statura L. sativi: Caulibus paniculatis, virgatis, teretibus, laevibus. Folia Radicalia prima pinnatolobata; Caulina inferiora serrata; superiora linearia integerrima. Flores hexandri, parvi, albi. Calyces purpurascetes.*

*Similis, diversa tamen ab Iberide linifolia. Adulta deicit folia.*

*Siliculae ovatae emarginatae. W.*

\*20. LEPIDIUM *apetalum*, W. †

L. foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus apetalis, caule procumbente. W.

Grünblütige Kresse. W.

Habitat in Sibiria. ☉ (v. l.)

Caulis *semipedalis ramo uno alterove instructus procumbens apice adscendens*. Folia *alterna remota lanceolato-linearia integerrima sessilia glabra*. Flores *apetali*. Siliculae *parvae compressae emarginatae, valvulis carinatis, loculis monospermis*. Unicum tantum *mancum specimen vidi*. W.

21. LEPIDIUM *suffruticosum*.

L. foliis lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, caulibus suffruticosis. Mant. 91.

Lepidium graminifolium. Cav. ic. 2. p. 41. t. 151, f. 2.\*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 219.

Staudige Kresse. W.

Habitat in Hispania. ‡

Caulis *suffruticosus, palmares, erecti, filiformes, virentes*. Folia *angusto-lanceolata, integerrima, laevia, tenuia, nec carnosae, viridia, patentia, ad gemmas saepe plura*. Corymbi *parvi, albi*. Petala *vix calyce longiora, distantia*. Stamina *6 antheris flavis*. Fructus *Nasturtii*.

Differt a L. graminifolio, quod est *bipedale, foliis planis: inferioribus serratis, calycibus rubris, petalis latioribus, obovatis*.

22. LEPIDIUM *didymum*.

L. floribus diandris, foliis pinnatifidis, fructibus didymis. Ait. Kew. 2. p. 374.

L. foliis pinnatifidis, caule erecto, fructibus didymis. Mant. 92.

L. (*anglicum*) floribus diandris tetrapetalis, foliis pinnatifidis, caule procumbente piloso. Hudf. angl. 280.\*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 219.

Englische Kresse. W.

Habitat in Anglia. ☉ (v. v.)

Caulis *pedales, laeves*. Folia *pinnata, pinnis sessilibus, alternis, lanceolatis, antice dentatis*. Racemi *axillares, longitudine foliorum*. Flores, *ut in Lepidiis quibusdam, minutissimi*. Capsulae *subrotundae,*

*didymae, subrugosae. Media inter Cochlearias et Lepidia.*

### 23. LEPIDIUM *runderale.*

L. floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentatopinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Fl. suec.* 534; 572. *Hort. cliff.* 331. *Roy. lugdb.* 335. *Mill. dict. n.* 12. *Gort. ingr. p.* 102. *Reyg. ged. I. p.* 164. *Pall. it. I. p.* 213. *Pollich. pal. n.* 606. *Flor. dan. t.* 184. *Hoffm. germ.* 226. *Roth germ. I.* 279. II. 91.

*Nasturtium apetalum, foliis pinnatis, radicalium pinnis semipinnatis, caulinis simplicibus. Hall. herb.* 508.

*Iberis (runderalis) floribus vix conspicuis, foliis imis multifidis, superioribus linearibus integerrimis. Crantz austr.* 21.

*Nasturtium runderale. Scop. carn. 2. n.* 801.

*Nasturtium sylvestre, osyridis folio. Bauh. pin.* 105.

*Nasturtium angustifolium. Fuchf. hist.* 307.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 220.

*Stink Kresse. W.*

*Habitat in Europae runderatis et ad vias. ☉ (v. v.)*

L. *runderale* floribus tetrandris et petalis instructum non semel vidit Gouan. *illustr. p.* 40. R.

Planta apud nos nec diandra, nec apetala. Scop. *Petala etiam vidit Hallerus.* R.

Folia radicalia nostrae plantae pinnata, pinnis acute dentatis, caulina pinnatifida, superiora linearia integerrima. Specimina e Sibiria habent folia radicalia lata pinnatifida integerrima, caulina linearia vel pinnatifida vel potius lanceolata profunde dentata, intermixta. W.

### 24. LEPIDIUM *virginicum.*

L. floribus subtriandris tetrapetalis, foliis linearibus pinnatis. *Sp. pl.* 900. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 10. n. 55.

L. foliis lanceolato-linearibus serratis. *Gron. virg.* 76.

L. foliis omnibus lineari-lanceolatis serratis. *Roy. lugdb.* 334.

*Iberis humilior annua virginiana ramosior. Morif. hist.* 2. p. 311. f. 3. t. 21. f. 2. *Sloan. jam.* 80. *hist.* 1. p. 195. t. 123. f. 3. *Raj. hist.* 827.

*Iberis virginiana latifolia ramosa. Morif. prael.* 277.



*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 221.*

Virginische Kresse. W.

*Habitat in Virginia, Jamaicae glareosis.* ☉ (v. l.)

\*25. *LEPIDIUM divaricatum.*

L. foliis pinnatifidis, caule ramosissimo, siliculis ovatis subemarginatis. *Ait. Kew. 2. p. 375.*

Ansgebreitete Kresse. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* †

26. *LEPIDIUM Iberis.*

L. floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis; superioribus linearibus integerrimis.

*Sp. pl. 900. Roy. lugdb. 334. Mill. dict. n. 4. Gmel.*

*fib. 3. p. 254. Hoffm. germ. 226. Roth. germ. I. 279.*

*II. 95. Allion. ped. n. 930.*

L. foliis lanceolato-linearibus serratis. *Hort. cliff. 331.*

*Iberis latiore folio. Bauh. pin. 97.*

*Iberis. Dod. pempt. 714. Blackw. t. 312.*

*Iberis II. Tabern. 457.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 222.*

Schmalblättrige Kresse.

*Habitat in Germania, Gallia, Italia, Sicilia secus vias.*

‡ (v. v.)

*Siliculae ovatae acutae.* W.

\*27. *LEPIDIUM Pollichii.*

L. foliis inferioribus lato-lanceolatis serratis, superioribus linearibus subintegerrimis, siliculis orbiculatis emarginatis. *Roth. germ. II. 91.\**

*Lepidium Iberis. Pollich. pal. n. 607.\**

*Iberis Nasturtii folio. Bauh. pin. 91. Morif. hist. 2. f. 3. t. 21. f. 3.*

Pollichische Kresse. W.

*Habitat in Germania.* ☉ (v. v.)

28. *LEPIDIUM bonariense.*

L. floribus diandris tetrapetalis, foliis omnibus pinnato-multifidis. *Sp. pl. 901. Mill. dict. n. 13. Murray. prodr. 165. Pall. it. 2. p. 329.*

L. foliis pinnatifidis incisis. *Roy. lugdb. 335.*

*Thlaspi bonariense multifidum, flore invisibili. Dill. elth. 281. t. 286. f. 370.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 222.*

Brasilianische Kresse. W.

*Habitat in Bonaria.* ☉

Stamina *sex habet Murray l. c. R.*

29. **LEPIDIUM chalepense.**

L. foliis sagittatis sessilibus dentatis. *Amoen. acad. 4. p. 321. \* cent. 169. Mill. dict. n. 3.*

*Draba chalepensis repens humilior, foliis minus cinereis et quasi viridibus. Morif. hist. 2. p. 314.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 223.*

*Aleppische Kresse. W.*

*Habitat in Oriente.*

1227. **THLASPI**

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1078.*

*Silicula emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato-carinatis.*

1. **THLASPI peregrinum.**

T. siliculis suborbiculatis, foliis lanceolatis integerrimis.

*Hort. cliff. 330. \* Roy. lugdb. 334. Mill. dict. n. 5. Scop. carn. n. 809.*

T. capsula cordata, peregrinum. *Bauh. hist. 2. p. 927.*

*Morif. hist. 2. p. 297. f. 3. t. 18. f. 30.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 224.*

*Fremdes Täfelkraut. W.*

*Habitat in aridis collibus Carnioliae. Scop.*

2. **THLASPI arabicum.**

T. siliculis ovalibus stylatis, foliis inferioribus cuneatis, superioribus cordatis oblongis amplexicaulibus. *Vahl symb. 2. p. 76.\**

*Iberis (arabica) herbacea, foliis ovatis glabris aveniis integerrimis, siliculis basi apiceque bilobis. Sp. pl. 906. Amoen. acad. 4. p. 278.\**

*Subularia (purpurea) foliis cordato-oblongis subdentatis. Forsk. descr. 117.*

*Thlaspi humile spica purpurea. Buxb. cent. 1. p. 2. t. 2. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 245.*

*Arabisches Täfelkraut. W.*

*Habitat in Arabia, Cappadocia.* ☉

3. **THLASPI arvense.**

T. siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris.

*Fl. lapp.* 251. *Fl. suec.* 530; 574. *Hort. cliff.* 330.  
*Mat. med.* 159. *Roy. lugdb.* 333. *Pollich. pal. n.* 608.  
*Ludw. ect. t.* 173. *Hoffm. germ.* 227. *Roth germ. I.*  
 279. *II.* 92.

*Nasturtium* siliquis orbiculatis, planis, foliis oblongis,  
 dentatis, glabris. *Hall. helv. n.* 511.

*Thlaspi* siliculis orbiculatis compressis emarginatis. *Scop.*  
*caru. ed. I. p.* 512. *n. I. ed. 2. n.* 810.

*T. majus.* *Tabern.* 458. *Hall. R.*

*T. arvense,* siliquis latis. *Bauh. pin.* 105.

*T. latius.* *Dod. penpt.* 712. *Blackw. t.* 68.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 224.

Acker-Täschelkraut. W.

*Habitat in Europae agris.* ☉ (v. v.)

#### 4. THLASPI *alliaceum.*

*T. siliculis* subovatis ventricosis, foliis oblongis obtusis  
 dentatis glabris. *Sp. pl.* 901. *Roy. lugdb.* 334. *Mill.*  
*dict. n. 6.* *Crantz. austr. p.* 23. *n. 3.* *Jacq. ic. rar. I.*  
*t.* 121. *Misc. 2. p.* 330. \* *Hoffm. germ.* 227. *Roth.*  
*germ. I.* 280. *II.* 93.

*T. allium* redolens. *Morif. hist. 2. p.* 297. *f. 3. t.* 18.  
*f.* 23.

Scorodo-Thlaspi Ulyssis Aldrovandi. *Bauh. hist. 2.*  
*p.* 932.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 225.

Knoblauchduftiges Täschelkraut. W.

*Habitat in Europa australi.* ☉ (v. l.)

*Antecedenti similis, sed Siliculae ovato-ventricosae,*  
*marginē minore.*

#### \*5. THLASPI *Psychine.* W.

*T. siliculis* obovato-deltoides stylatis, foliis lanceolatis  
 cordatis dentatis amplexicaulibus pubescentibus. W.

*Psychine* stylosa. *Desf. atl. 2. p.* 69. *t.* 148. \*

Bursa pastoris hirsuta Erucae folio, stylo prominente.  
*Shaw. n. 91. ic. mala.*

Langgriffliches Täschelkraut. W.

*Habitat in Barbaria prope Mayane ad limites agro-*  
*rum.* ☉

*Caulis ramosus pilis albis tectus. Folia pubescen-*  
*tia lanceolata cordata amplexicaulia acuta dentata.*  
*Flores magnitudine Sinapis arvensis pallide flavi. Pe-*  
*tala obovata indivisa. Siliculae obovato-deltoides*

*alis transversim striatis, stylo persistenti minoribus. Characteres nullos invenio, quibus apte a Thlaspi sit separandum. W.*

### 6. THLASPI saxatile.

T. filiculis subrotundis, foliis lanceolato-linearibus obtusis carnosiss. *Sp. pl.* 901. *Sauv. monsp.* 53. 71. *Gouan monsp.* 316. *Crantz. austr. p.* 24. *Jacq. austr. t.* 236. *Kniph. cent. I. n.* 92. *Hoffm. germ.* 227. *Roth germ. I.* 280. *II.* 93.

Nasturtium foliis pulposis, ellipticis, filiculis alatis emarginatis. *Hall. helv. n.* 512. *goett.* 245.

Thlaspi filiculis subrotundis, foliis integris glabris lanceolato-linearibus, radicalibus ovatis. *Ger. prov.* 348.

T. filiquis ellipticis, foliis lanceolato-linearibus integerrimis. *Hebenstr. in Act. Petrop.* 5. p. 330. fig. 6.

T. montanum, pingui folio, carneo flore, plano et cordata filiqua. *Barr. ic.* 845.

T. parvum saxatile, flore rubente. *Bauh. pin.* 107.

Lithonthlaspi parvum, carnosio rotundo folio. *Col. ecphr.*

*I. p.* 279. *t.* 277. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 226.

Stein-Täfelkraut. W.

*Habitat in Italiae, Narbonensis, Provinciae, Austriae saxosis.* ☉ (v. v.)

*Similis Iberidi saxatili.*

### 7. THLASPI hirtum.

T. filiculis subrotundis pilosis, foliis caulinis sagittatis villosis. *Sp. pl.* 901. *Roy. lugdb.* 333. *Sauv. monsp.* 120. *Mill. dict. n.* 7. *Gouan illustr.* 40. *Crantz. austr. p.* 22.

T. capsulis hirsutis. *Bauh. hist.* 2. p. 922.

T. villosum, capsulis hirsutis. *Bauh. pin.* 106. *prodr.* 47. *t.* 47.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 226.

Haariges Täfelkraut. W.

*Habitat in Italia, Narbona, Austria, Monspeli.* ♂ (v. v.)

*Folia radicalia ovalia, nudiuscula, subciliata. Caulis pubescens. Folia Caulina semiamplexicaulia, villosa, mollissima. Calyces albi. Petala alba, obovata, integra.*

### 8. THLASPI campestre.

T. filiculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis.

*Hort. cliff.* 330. *Fl. suec.* 531; 575. *Roy. lugdb.* 333.  
*Dalib. parif.* 196. *Crantz. austr.* p. 23. *Scop. carn.*  
*ed. 2. n.* 807. *Scholl. barb. n.* 523. *Gmel. tub. p.* 197.  
*Pollich. pal. n.* 609. *Mattusch. sil. n.* 478. *Gouan.*  
*illustr. p.* 40. *Doerr. nass. p.* 232. *Hoffm. germ.* 227.  
*Roth. germ. I.* 280. *II.* 94.

*Nasturtium foliis imis petiolatis ovatis, reliquis amplexicaulibus cordatis.* *Hall. helv. n.* 509.

*Thlaspi arvense, vaccariae incano folio, majus.* *Bauh. pin.* 106.

*T. latifolium.* *Fuchf. hist.* 306.

*T. secundum.* *Tabernaem.* 458. *Hall. R.*

β. *Thlaspi arvense vaccariae incano folio minus.* *Bauh. pin.* 106. *prodr.* 47. *Gouan. R.*

γ. *T. arvense acetosae folio.* *Bauh. pin.* 105. *Blackw. t.* 407. *Haec varietas est folio glabro, vix serrato.* *R.*

*T. primum.* *Math.* 566.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 227.

*Feld-Täschelkraut.* *W.*

*Habitat in Europae arvis, viis argillofis, apricis. ♂ (v. v.)*  
*Folia radicalia sinuato-lyrata.*

#### 9. *THLASPI montanum.*

*T. filiculis obcordatis, foliis glabris, radicalibus subcarnosis obovatis integerrimis, caulinis oblongis amplexicaulibus subfagittatis, corollis calyce majoribus.* *W.*

*T. filiculis obcordatis, foliis glabris, radicalibus subcarnosis obovatis integerrimis, caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus.* *Sp. pl.* 902. *Crantz. austr.* p. 23. n. 7. *Pollich. pal. n.* 620. *Hoffm. germ.* 227. *Jacq. austr. t.* 237. *Roth. germ. I.* 280. *II.* 94.

*T. montanum, glasti folio, minus.* *Bauh. pin.* 106.

*T. montanum 2.* *Clus. hist.* 2. p. 131.

β. *T. (praecox) filiculis obcordatis, foliis carnosis glabris glaucis subcrenulatis in petiolum decurrentibus, caulinis sessilibus semiamplexicaulibus obuse cordato-fagittatis, petalis calyce longioribus.* *Wulffen in Jacq. Collect.* 2. p. 124. t. 9.\*

*Thlaspi montanum.* *Scop. carn. n.* 811.

*T. filiculis obverse cordatis, foliis imis spathulatis, summis amplexicaulibus sagittatis.* *Sauv. monsp.* 121. *Gouan. monsp.* 317.

*Lepidium caule erecto, foliis radicalibus ovatis, caulinis amplexicaulibus sagittatis.* *Hall. hist. n.* 518.

*T. montanum* bursae pastoris fructu. *Col. ecphr.* 1. p. 275. t. 276.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 228.

Berg-Täschelkraut. W.

*Habitat in* Helvetiae, Austriae, Italiae, Monspeli petrosifis, sylvaticis. 4 (v. l.)

Corollae subaequales. Fructus Faciesque *Thlaspeos ab Iberide hanc distinguunt.*

*In varietate α folia sunt oblonga sessilia fixa manifeste sagittata, in β vero profunde sagittata et glauca. Siliculae in α obtuse cordatae in β profunde cordatae; sed revera limites nullos certos video; folia enim interdum in α profundius sunt sagittata auriculis obtusis, quod in una eademque radice evenit.* W.

\***IO. THLASPI alpinum.**

*T. filiculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris integerrimis, petalis calyce duplo longioribus, caule simplici.* W.

*T. (alpinum) filiculis obcordatis, foliis glabris, radicalibus subcarnosis obovatis integerrimis, caulinis sessilibus, corollis calyce majoribus.* *Murr. Syst. veg.* 587. *Jacq. austr.* 3. t. 238.

Alpen Täschelkraut. W.

*Habitat in* Austriae, Helvetiae alpibus. 4 (v. l.)

**II. THLASPI perfoliatum.**

*T. filiculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris subdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoso.* *Sp. pl.* 902. *Jacq. vind.* 259. *austr.* t. 237. *Crantz. austr.* p. 22. *Roth. germ.* 1. 280. II. 95. *Pollich. pal.* n. 611. *Hoffm. germ.* 228.

*Nasturtium foliis imis ovatis, reliquis amplexicaulibus cordatis.* *Hall. helv.* n. 510.

*Thlaspi foliis radicalibus ovatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis.* *Guett. stamp.* 142. *Dalib. paris.* 196.

*T. arvense perfoliatum majus.* *Bauh. pin.* 106. *Barr. ic.* 815.

*T. alternum minus, bursae pastoris fructu.* *Col. ecphr.* 278. t. 276. f. 2.

*T. oleraceum.* *Tabern. ic.* 462. *hist.* 851.

*Pilosella siliqua.* *Cam. hort.* t. 7. f. C.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 229.

Durchwachsenes Täschelkraut. W.

*Habitat in Helvetiae, Germaniae, Galliae, agris apri-*  
*cis. ♂ (v. v.)*

*Caules laeves, oleracei. Corollae albae, vix calyce*  
*maiores. Stamina flore longiora, alba, Antheris lute-*  
*scantibus. Silicula Bursae pastoris.*

## 12. THLASPI *alpestre.*

T. filiculis obcordatis, foliis subdentatis: caulinis amplexicaulibus, petalis longitudine calycis, caule simplici.  
*Sp. pl. 902. Mill. dict. n. 4. Hoffm. germ. 228. Roth. germ. I. 280. II. 96.*

T. filiculis obcordatis, foliis dentatis, radicalibus lanceolatis petiolatis, caulinis sagittatis, staminibus exsertis.  
*Gouan. monsp. 470. illustr. 40. R.*

Lepidium caule erecto, foliis radicalibus petiolatis, caulinis ovatis amplexicaulibus. *Hall. helv. n. 519.*

Thlaspi minimum. *Arduin. 2. p. 33. t. 15. f. 2. Hall. R.*

T. vaccariae folio, bursae pastoris siliquis. *Bauh. pin. 105. prodr. 47?*

T. perfoliatum minus. *Bauh. pin. 106.*

T. pumilum 3. *Clus. hist. 2. p. 31.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 230.*

Felsen-Täfelkraut. W.

*Habitat in Austria, Helvetia. ☉*

*Cum T. perfoliato jungitur a Gerardo, et Jacquino, at separatur ab Hallero. Corolla perexigua, alba. Stamina flore longiora.*

*Caulis simplicissimus, rectus. In horto culta multo minor evasit, sed perennis sempervirens et caules ex eadem radice protulit plures, alios erectos, alios diffusos. Gouan. l. c. R.*

*Plantae a me visae differunt a praecedente caule simplici et sunt forte varietates ejusdem. W.*

## 13. THLASPI *Bursa pastoris.*

T. filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. lapp. 252. Fl. suec. 532; 576. Hort. cliff. 330. Mat. med. 159. Roy. lugdb. 334. Dalib. paris. 196. n. 2. Scop. carn. n. 808. Pollich. pal. n. 612. Blackw. t. 5. Ludw. ect. t. 186. Flor. dan. t. 729. Hoffm. germ. 228.*

*Nasturtium Bursa pastoris. Roth. germ. I. 281. II. 96.*

*Nasturtium siliquis triangularibus. Hall. helv. n. 514.*

*Iberis bursa pastoris. Crantz. austr. p. 20.*

*Bursa pastoris major, folio sinuato. Bauh. pin. 108.*

Bursa pastoris. *Fuchs. hist.* 611.

β. Bursa pastoris media. *Bauh. pin.* 106.

γ. Bursa pastoris major, folio non sinuato. *Bauh. pin.* 108.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 231.

Gemeines Täfchelkraut. W.

*Habitat in Europae cultis, ruderatis.* ☉ (v. v.)

#### 14. THLASPI *Ceratocarpon.*

T. glaberrimum, caule sulcato, foliis sagittatis lanceolatis subferratis, filiculis bilobatis. *Lin. suppl.* 295.

T. (*Ceratocarpon*) filiculis oblongis sursum utrinque membranaceo-cornutis, foliis superioribus oblongis sagittatis amplexicaulibus, inferioribus ovalibus petiolatis. *Murr. Comment. goett.* 1774. p. 26. t. I.\*

*Lepidium ceratocarpon.* *Pall. 2. p.* 740. tab. U.\*

Gehörntes Täfchelkraut. W.

*Habitat in campis sulfuginosis Sibiriae.* ☉ (v. v.)

Planta spithamaca. Caulis erectus teres sulcatus, apice ramificatus in corymbos. Folia sessilia sagittata lanceolata laevissime serrata venosa glaberrima. Corymbi elongati in racemos. Flores parvi albi. Siliculae ovatae apice emarginatae, emarginatione rotundata, lobis divaricatis productis acutis, semina *Ceratocarpi* referentes.

### 1228. COCHLEARIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1079.

*Silicula emarginata, turgida, scabra: valvulis gibbis, obtusis.*

#### 1. COCHLEARIA *officinalis.*

C. foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. *Fl. lapp.* 256. *Fl. juec.* 537. 578.

*Hort. cliff.* 332. *Mat. med.* 160. *Roy. lugdb.* 335.

*Mill. dict. n.* 1. *Gmel. sib.* 3. p. 256. *Crantz. austr. p.*

19. *Flor. dan. t.* 135. *Ludw. ect. t.* 133. *Kniph. cent.*

3. n. 30. *Hall. helv. n.* 503. jub *Nasturtio.* *Hoffm.*

*germ.* 229. *Roth germ. I.* 277. *II.* 86.

C. batava. *Blackw. t.* 227.

C. folio subrotundo. *Bauh. pin.* 110.

*Cochlearia.* *Dod. pempt.* 494.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 232.

Aechtes Löffelkraut. W.



*Habitat in Europae borealis littoribus marinis.* ☉ ♂  
(v. v.)

Folia radicalia cordata, obtusa, integra crenulis 7, collofis, obsoletis. Caulina amplexicaulia, dente utrinque circa caulis latus. Caulis ramosus.

## 2. COCHLEARIA danica.

C. foliis hastato-angulatis: omnibus deltoideis. *Fl. Suec.* 538; 579. *Oed. dan. t.* 100. *Mill. dict. n.* 4. *Hoffm. germ.* 229. *Roth. germ. I.* 277. *II.* 86.

C. aremorica. *Tournef. inst.* 215.

*Thlaspi hederaceum.* *Lob. ic.* 615.

β. *Cochlearia danica repens.* *Bauh. pin.* 110. *prodr.* 53.

γ. C. minor erecta. *Bauh. pin.* 110. *prod.* 53.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 234.

Dänisches Löffelkraut. W.

*Habitat in Daniae, Sueciae littoribus marinis.* ☉ ♂  
(v. l.)

Caulis non ramosus. Stolones procumbentes. Folia et radicalia et caulina hastata s. ovata angulo utrinque baseos. Petiolus basi non dentatus s. amplexicaulis. Capsulae ovatae.

## 3. COCHLEARIA anglica.

C. foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Syst. veg.* 491. *Oed. dan.* 329. *Hoffm. germ.* 229. *Roth. germ. I.* 277. *II.* 87.

C. foliis ovato-lanceolatis sinuatis. *Sp. pl.* 903. *Hudf. angl.* 284. *Mill. dict. n.* 2.

C. foliis radicalibus lanceolatis integerrimis, caulinis sub-sinuatis. *Mill. dict.*

C. folio sinuato. *Bauh. pin.* 110. *Raj. hist.* 833.

C. britannica s. anglica. *Lob. ic.* 294. *Blackw. t.* 218.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 235.

Englisches Löffelkraut. W.

*Habitat in Angliae littoribus marinis.* ♂ (v. v.)

Folia radicalia lanceolata; caulina sessilia.

## 4. COCHLEARIA groenlandica.

C. foliis reniformibus carnosissimis integerrimis. *Hort. cliff.* 498.\* *Roy. lugdb.* 335. *Mill. dict. n.* 3. *Pall. it.* 3. p. 34.

C. minima repens insulae alholmiae. *Barth. act.* 3. p. 143. t. 144.

C. minima. *Boerh. lugdb.* 2. p. 10.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

F f

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 236.*

Grönländisches Löffelkraut. W.

*Habitat in Norvegia, Islandia, Groenlandia. ☉ (v. l.)*

*Folia radicalia minima, subtus admodum convexa et carnosae, avenia, integerrima, longius petiolata.*

\*5. **COCHLEARIA sibirica.** W. †

*C. foliis cordatis inciso-dentatis.* W.

Sibirisches Löffelkraut.

*Habitat in Sibiria. (v. l.)*

*Caulis erectus pedalis glaber striatus simplex. Folia alterna longe petiolata cordata vel cordato reniformia obtusa, longitudine 4 linearum ejusdemque latitudinis, profunde dentata, dentibus obtusis. Petioli superiores longitudine foliorum, inferiores quadrupla longiores. Flores racemosi albi. Siliculae parvae lanceolatae mono-vel dispermae. Siliculas adhuc immaturas vidi, hinc de genere dubius haero, sed habitus suadet Cochleariam esse.* W.

\*6. **COCHLEARIA acaulis.**

*C. foliis cordato-reniformibus, scapis filiformibus unifloris simplicissimis.* Desf. atl. 2. p. 69.

Stielloses Löffelkraut. W.

*Habitat in regno Maroccoano et in Lusitania. ♀ (v. l.)*

*Pianta acaulis pumila caespitosa glabra. Folia parva petiolata subcarnosa cordato-rotundata glabra. Scapi radicales filiformes uniflori longitudine foliorum, quandoque longiores aut breviores. Petala coerulea aut alba magnitudine C. officinalis. Limbus petalorum integerrimus obovatus. Silicula inflata crassa oblonga polysperma Stylus brevissimus.* Desf. l. c.

*Tota planta vix semiuncialis.* W.

7. **COCHLEARIA Coronopus.**

*C. foliis pinnatifidis, caule depresso.* Hort. cliff. 331.

*Fl. suec. 539; 579. Roy. lugdb. 335. Dalib. parif.*

*195. Sauv. monsp. 254. Scop. carn. n. 860. Pollich.*

*pal. n. 613. Vahl. symb. I. p. 48. Flor. dan. t. 202.*

*Hoffm. germ. 229. Roth. germ. I. 278. II. 87.*

*Lepidium (squamatum) foliis pinnato-multifidis, floribus hexandris, siliculis fasciculatis late cordatis, margine bifariam squamis imbricatis.* Forsk. descr. 117.

*Coronopus. Hall. helv. n. 502. Blackw. t. 120. Ruell. p. 373.*

*Ambrosia campestris repens.* Bauh. pin. 138.

Pseudo *Ambrosia.* Cam. epit 596.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 236.

Schlitzblättriges Löffelkraut. W.

*Habitat in Europae apricis, nudis.* ☉ (v. v.)

### 8. COCHLEARIA *Armoracia.*

*C. foliis radicalibus: lanceolatis crenatis, caulinis incisifis.* Hort. cliff. 332. Fl. suec. 540; 580. Mat. med. 160. Roy. lugdb. 336. Mill. dict. n. 5. Crantz. austr. p. 19. Gmel. it. 2. p. 197. Roth. germ. I. 278. II. 97. Blackw. t. 415. Hoffm. germ. 229.

*Nasturtium foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisifis.* Hall. helv. n. 504.

*Raphanus rusticanus.* Bauh. pin. 96.

*Raphanus magna.* Dod. pempt. 678.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 237.

Meerrettigs Löffelkraut. W.

*Habitat in Europae fossis et ad rivulos.* ♀ (v. v.)

### \*9. COCHLEARIA *macrocarpa.*

*C. foliis radicalibus cordato-ovatis crenatis, caulinis lanceolatis cartilagineo-dentatis, siliculis ellipticis inflatis.* W.

*Cochlearia macrocarpa.* Waldstein et Kitaibel pl. hung. Großfrüchtiges Löffelkraut. W.

*Habitat in Hungariae pratis humidis.* ♀ (v. f.)

*Simillima praecedenti, differt vero: foliis radicalibus basi cordatis, caulinis obtuse inciso-dentatis, dentibus apice cartilagineis, siliculis majoribus inflatis.* W.

### 10. COCHLEARIA *glastifolia.*

*C. foliis caulibus obcordato-ligittatis amplexicaulibus.* Hort. cliff. 332. Hort. upf. 184. Roy. lugdb. 335. Mill. dict. n. 6. Hall. goett. 242. Hoffm. germ. 229.

*Lepidium glastifolium.* Bauh. pin. 97. Morif. hist. 2. p. 312. f. 3. t. 21. f. 3.

*Lepidium annuum.* Dalech. hist. 1297.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 238.

Thermkrautblättriges Löffelkraut. W.

*Habitat in Ratisbonae agris.* ♂ (v. v.)

*Statura Turritidis.*

### 11. COCHLEARIA *Draba.*

*C. foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis.* Syst. Veg.

492. *Crantz, austr. p. 10. n. 3. sub. Lepidiö. Jacq. austr. t. 315. Hoffm. germ. 229.*  
*Lepidium foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis. Hort. cliff. 331.*  
*Lepidium Draba. Roth. germ. I. 278. II. 88.*  
*Draba umbellata f. major, capitulis donata. Bauh. pin. 109. Morif. hist. 2. p. 313. f. 3. t. 21. f. 1.*  
*Draba I. vulgaris. Clus. hist. 2. p. 123.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 239.*  
*Stielumfallendes Löffelkraut. W.*  
*Habitat in Austria, Gallia, Italia ad versuras. 4 (v. f.)*  
*Caules prostrati, parum ramosi. Folia hastata, lato-lanceolata, incana.*  
*Silicula apice integra, acuta. Crantz l. c. R.*

## 1229. IBERIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1080.*

*Cor. irregularis: petalis 2 exterioribus majoribus.*  
*Silicula polysperma, emarginata.*

I. IBERIS *semperflorens.*

- I. frutescens, foliis spathulatis glabris integerrimis obtusis W.  
 I. frutescens, foliis cuneiformibus integerrimis obtusis.  
*Hort. cliff. 330. Hort. upf. 184. Roy. lugdb. 336. Mill. dict. n. 1. Kniph. cent. 12. n. 59.*  
*Leuconium fruticosum umbellatum persicum, foliis leucoii instar sempervirentibus. Morif. hist. 2. p. 296.*  
*Thlaspi latifolium polycarpon, leucoii foliis. Bocc. sic. 55. t. 22. f. a. 1.*  
*Thlaspi fruticosum, folio leucoii, semperflorens. Seb. thes. 1. p. 2. t. 13. f. 4.*  
*Thlaspi persicum. Riv. tetrap. 224. f. 2.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 240.*  
*Immerblüher Bauernsenf. W.*  
*Habitat in Sicilia, Persica. † (v. v.)*

\*2. IBERIS *cappadocica.* W.

- I. frutescens, foliis strigosis, inferioribus spathulatis, superioribus linearibus acutis. W.  
*Thlaspi orientale tenuifolium canescens, flore albo. Tournef. cor. 15.*  
*Cappadocischer Bauernsenf. W.*

*Habitat in Cappadocia.* † (v. l.)

Planta parva caule fruticoso ramoso, cicatrifato. Folia inferiora linearispathulata, ramorum floriferorum linearia acuta angusta, omnia uti caulis, tecta pilis longis adpressis. Florum corymbi albi minores quam in praecedente. W.

### 3. *IBERIS sempervirens.*

I. frutescens, foliis linearibus integerrimis acutiusculis, corymbis racemosis. W.

I. frutescens, foliis linearibus acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 336. *Mill. dict. n.* 2.

*Thlaspi montanum sempervirens.* *Bauh. pin.* 106. *Riv. tetr.* 224. f. 1.

*Thlaspi montanum candidum.* *Dalech. hist.* 1180.

*Thlaspi fruticosum sempervirens albo Cretici flore.* *Barr. ic.* 734.

β. *Iberis garretiana.* *Allion. ped. n.* 920. t. 40. f. 3. et tab. 54. f. 2.\*

γ. *Thlaspi creticum perenne flore albo.* *Barr. ic.* 214. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 240.

Immergrüner Bauernsenf. W.

*Habitat in Cretae, Italiae, rupestribus.* † (v. v.)

Varietas β differt: foliis multo longioribus et obtusiusculis. ramisque magis elongatis, et est omnino glabra. Varietas γ gaudet caule herbaceo, ac foliis longioribus et latioribus. W.

### 4. *IBERIS gibraltarica.*

I. frutescens foliis cuneiformibus obtusis apice dentatis glabris. W.

I. frutescens, foliis apice dentatis. *Sp. pl.* 905.

*Thlaspidium hispanicum*, ampliore flore folio crasso dentato. *Dill. elth.* 382. t. 287. f. 37.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 241.

Gibraltarischer Bauernsenf. W.

*Habitat ad Gibraltariam Hispaniae.* † (v. v.)

### 5. *IBERIS saxatilis.*

I. frutescens, foliis pubescentibus acutis integerrimis, inferioribus linearibus, superioribus lanceolatis. W.

I. suffruticosa, foliis lanceolato linearibus carnosius acutis integerrimis ciliatis. *Amoen. acad.* 4. p. 321.\* *Ger. prov.* 354. *Gouan. illustr.* 41.

*Thlaspi fruticosum thymbrae folio hirsutum.* *Bauh. pin.* 107.

*Thlaspi faxatile polygalae foliis.* Bauh. pin. 107. Gou. R.  
*Thlaspi faxatile, vermiculato folio.* Bauh. pin. 107. Ga-  
 rid. aix. 466. t. 101.

*Lithonthlaspi 3 fruticosus, vermiculato acuto folio.* Col.  
 ephr. 1. p. 278. t. 277. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 241.*

Stein-Bauernsens. W.

*Habitat in Italia, Galliae australis aridis sabulosis.* †(v. l.)

Caulis fruticosus, Folia inferiora linearia subcar-  
 nosa viridia acuta utrinque pilis minutissimis dense tecta,  
 superiora in ramis floriferis lanceolato subcar-  
 nosa pubescentia ut in inferioribus; seniores folia sunt saepius re-  
 flexa. Flores purpurascens interdum albi, in racemo  
 primum corymboso, deinde elongato. W.

\*6. *IBERIS vermiculata.*

1. herbacea, caule adscendente, foliis linearibus acutis  
 subcarnosis glabris margine ciliato-dentatis. W.

*Iberis faxatilis.* Pall. ind. taur. Nov. Act. Petrop. 10. p. 314.

Dichtblättriger Bauernsens. W.

*Habitat in Tauriae orientalis montibus.* † (v. l.)

Radix crassitie pennae columbinae multiceps. Caules  
 herbacei sesquiunciales adscendentes dense foliis tecti.

Folia subcarnosa glaberrima linearia acuta submucro-  
 nata subtus convexa, margine denticulis diaphanis  
 subreflexis subulatis ciliata. Flores corymbosi rubicun-  
 di ratione plantae magni. A. praecedente diversissima  
 foliis glabris ciliato-dentatis, caule herbaceo brevissi-  
 mo adscendente. In praecedente quidem folia ciliata  
 dicuntur, sed sunt omnino pubescentia. W.

7. *IBERIS rotundifolia.*

1. herbacea, foliis subcarnosis obtusis inferioribus petiola-  
 tis subrotundo-ovatis, caulinis oblongis amplexicaulibus. W.

1. herbacea, foliis ovatis: caulinis amplexicaulibus lae-  
 vibus succosis. Mill. dict. n. 7. Scop. carn. n. 805. t.  
 37. Hoffm. germ. 230. Roth. germ. I. 276. II. 82.

*Thlaspi minimum, siculis obcordatis, foliis inferiori-  
 bus ovatis petiolatis, superioribus lanceolatis amplexi-  
 caulibus.* Ard. spec. 2. p. 33. t. 15. f. 1.

*Lepidium rotundifolium.* Allion. ped. n. 925. t. 55. f. 2.

*Thlaspi subrotundo folio uriculo geminali.* Barr. ic. 1305.

*Thlaspi alpinum, folio rotundiore carnoso, flore purpu-  
 rascente.* Tournef. inst. 212. Scheuch. alp. 50. 143.

*Lepidium caule repente foliis ovatis amplexicaulibus.*

*Hall. helv. n. 517. Allion. spec. pedem. 27. t. 4. f. 1. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 242.*

Rundblättriger Bauernsenf. W.

*Habitat in Helvetia, Bavaria, Italia. 2 (v. l.)*

*Caulis repens. Folia glabra, mollia: Radicalia petiolata, ovata, integerrima; caulina amplexicaulia, ovata, glabra, integra. Flores fere regulares. Silicula subquadrangularis. Similes Thlaspi saxatili.*

\*8. *IBERIS cepeaeifolia.*

I. herbacea, foliis subcarnosis cuneiformibus acutis, apice dentatis. W.

*Iberis cepeaeifolia. Wulfen in Jacq. misc. 2. p. 28. t. 1.\**

*Thlaspi montanum ferrato Cepeae folio, flore purpurascente umbellato. Barr. ic. 848.*

Sedumblättriger Bauernsenf. W.

*Habitat in Carinthia. 2*

*Affinis praecedenti, convenit enim flore fere regulari, sed differt: foliis acutis apice dentatis, et basi cuneiformibus. W.*

\*9. *IBERIS carnosa.*

I. herbacea, foliis spathulatis integerrimis obtusis subcarnosis. W.

Fleischiger Bauernsenf. W.

*Habitat in Pyrenaeis. 2 (v. l.)*

*Caules adscendentes bipollicares ut tota planta glabri. Folia spathulata subcarnosa obtusa integerrima. Flores corymbosi albi. W.*

\*10. *IBERIS ciliata. W.*

I. herbacea, foliis subcarnosis ciliatis, radicalibus spathulatis, caulinis linearibus. W.

Gefranzter Bauernsenf. W.

*Habitat in regione Caucali ad thermas Constantino-montanas. ☉ ♂ (v. l.)*

*Radix annua vel biennis simplicissima triuncialis dura. Canes plures simplices bi- vel triunciales erecto-adscendentes. Folia integerrima ciliata, radicalia spathulata, caulina linearia obtusa. Flores purpurascetes corymbosi. Iberis ciliata Allion. auct. fl. ped. p. 15. differre videtur, cui caulis pedalis et ramosus. W.*

\*11. *IBERIS parviflora.*

I. herbacea, caule humili paniculato diffuso, foliis sub-

lanceolatis obtusis rariter dentatis. *Lamarck encycl.*  
3. p. 212.

Kleinblütiger Bauernsenf. W.

*Habitat in Oriente.*

Planta parva pulcherrima ob florum copiam et colorem. Caulis quadri s. quinqueuncialis ramosissimus paniculatus diffusus, ramis angulatis glabris uti tota planta. Folia alterna oblonga fere lanceolata obtusa nitida dentibus nonnullis raris inaequalibus instructa, uncialia vel sesquiuncialia et quatuor lineas lata. Flores parvi numerosi purpureo-violacei colore *Hesperidis matronalis*, apice caulis in corymbis parvis compositis vel ramosis aggregati. Siliculae orbiculatae compressae emarginatae stylo persiflenti coronatae. *Lamarck. l. c.*

\* 12. *IBERIS nana.*

I. herbacea foliis subrotundo-spathulatis apice subdentatis glabris. W.

I. (*nana*) herbacea, foliis petiolatis subrotundis dentatis, floribus umbellatis. *Allion. auct. fl. pedem. p. 15. n. 920. t. 2. f. 1.\**

Kleiner Bauernsenf. W.

*Habitat in alpibus Pedemontanis. ☉*

13. *IBERIS umbellata.*

I. herbacea, foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus serratis; superioribus integerrimis. *Hort. cliff. 330. Hort. upf. 184. Roy. lugdb. 336. Mill. dict. n. 3. Hoffm. germ. 230.*

*Thlaspi umbellatum. Crantz. austr. p. 25.*

*Iberis cretica. Riv. tetr. 225.*

*Thlaspi umbellatum creticum, iberidis folio. Bauh. pin. 106.*

*Draba s. Arabis s. Thlaspi candiae. Dod. pempt. 713.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 242.*

Doldentragender Bauernsenf. W.

*Habitat in Hetruria, Hispania, Creta. ☉ (v. v.)*

Fructus hujus corymbosus hemisphaericus persiflitt, I. amarae vero racemosus evadit.

14. *IBERIS amara.*

I. herbacea, foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis. *Hort. upf. 184. Mill. dict. n. 6. Pollich. pal. n. 614. Kuiph. cent. 9. n. 52. Scop. carn. n. 806. Hoffm. germ. 230. Roth. germ. I. 276. II. 82.*



I. foliis obverse lanceolatis, floribus umbellatis. *Guett. flam. 2. p. 146.*

I. foliis dilatatis, dentatis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n. 520.*

*Thlaspi siliculis orbiculatis, bidentatis; floribus racemosis; petalis exterioribus majoribus. Scop. carn. ed. 1. p. 513.*

*Thlaspi amarum. Crantz. austr. p. 25.*

*Thlaspi umbellatum arvense, iberidis folio. Bauh. pin. 106.*

*Thlaspidium folio iberidis. Riv. tetr. 112.*

*Thlaspi umbellatum arvense amarum. Bauh. hist. 2. p. 925.*

*Thlaspi amarum. Tabern. ic. 462.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 443.*

*Bittre Bauernsenf. W.*

*Habitat in Helvetia, Germania. ☉ (v. v.)*

### 15. *IBERIS linifolia.*

I. herbacea, foliis linearibus integerrimis, caulinis serratis; caule paniculato, corymbis hemisphaericis. *Sp. pl. 905. Gouan. illustr. 41.*

I. umbellata var.  $\beta$ . *Gouan. hort. 178. Flor. monsp. 178. ex Gouan. R.*

*Thlaspi umbellatum arvense iberidis folio. Magnol. bot. 305. Gou. R.*

*Thlaspi IV. odorato flore. Clus. hist. 2. p. 132. R.*

*Thlaspi creticum foliis indivisis s. lini amarum. Bauh. hist. 2. p. 212. Gouan. R.*

*Thlaspi lusitanicum umbellatum, gramineo folio, flore purpurascete. Tournef. inst. 213. Garid. aix. 459. t. 105.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 244.*

*Leinblättriger Bauernsenf. W.*

*Habitat in Hispania, Lusitania, Monspeli. ♂ (v. l.)*

*Simillima Lepidio graminifolio. Folio Radicalia subdentata, glabra; Caulina linearia, integerrima. Caulis paniculatus. Corymbi hemisphaerici. Siliculae ovatae, apice truncato bidentatae, cum in Lepidio graminifolio sint ovatae acuminatae. Planta adultior saepe omnia folia dejecit.*

### 16. *IBERIS odorata.*

I. herbacea, foliis linearibus superne dilatatis serratis. *Roy. lugdb. 336. Hort. cliff. 330. Mill. dict. 4.*

*Thlaspi umbellatum creticum*, flore albo odoro, minus.  
*Bauh. pin.* 106.

*Thlaspi parvum* 4, odorato flore. *Clus. hist.* 2. p. 132.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 245.

Wohlriechender Bauernsenf. W.

*Habitat in alpebus Allobrogicis.* ☉

### 17. *IBERIS nudicaulis.*

1. herbacea, foliis sinuatis, caule nudo simplici. *Hort. cliff.* 328. *Fl suec.* 536; 581. *It. oel.* 139. *Roy. lugdb.* 336. *Mill. dirt. n.* 5. *Reyg. ged.* 2. p. 108. *Pollich. pal. n.* 615. *Mattusch. sil. n.* 480. *Doerr. nass. p.* 133. *Flor. dan.* 323. *Hoffm. germ.* 230. *Roth. germ. I.* 276. *II.* 82.

1. foliis pinnatis, pinnis ovatis acutis. *Hall. helv. n.* 521.

*Bursa pastoris minor*, foliis incisis. *Bauh. pin.* 108.

*Bursa pastoris minor.* *Dod. pempt.* 103.

*Bursa pastoris minima.* *Lob. ic.* 221. R.

*Bursa pastoris parva*, folio glabro spillo. *Bauh. hist.* 2. p. 937. R.

*Nasturtium petraeum.* *Tabern. ic.* 451.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 245.

Nacktfüeliger Bauernsenf. W.

*Habitat in Europae arenosis, sylvaticis, nudis, sterilissimis.* ☉ (v. v.)

### 18. *IBERIS pinnata.*

1. herbacea, foliis pinnatifidis. *Amoen. acad.* 4. p. 278.\*  
*Gouan monsp.* 319.

*Thlaspi umbellatum*, nasturtii folio, monspeliacum.  
*Bauh. pin.* 106.

*Thlaspi alterum minus umbellatum*, nasturtii hortensis folio narbonense. *Lob. ic.* 218.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 246.

Gefiedertèr Bauernsenf. W.

*Habitat in Europae australis maritimis.* ☉ (v. v.)

*Corymbus non mutatur. Calyx rubicundus. Petala alba.*

## 1230. A L Y S S U M.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1081.*

Filamenta quaedam introrsum denticulo notata.  
*Silicula emarginata.*

\* *Suffruticosa.*1. A LY S S U M *spinofum.*

A. ramis floriferis spinosis persistentibus, foliis lineari-lanceolatis obtusis sericeis. W.

A. racemis senilibus spiniformibus nudis. *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 331. *Mill. dict. n. 3.*

*Thlaspi fruticosum spinofum.* *Bauh. pin.* 108. *Lob. ic.* 217.

*Leucoium* f. *Thlaspi spinofum.* *Bauh. hist.* 2. p. 931.

*Thlaspi spinofum hispanicum.* *Barr. ic.* 808.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 247.

*Dorniges Steinkraut.* W.

*Habitat in Hispaniae, Galliae caetibus.* † (v. l.)

*Spinae e ramis olim foliosis floridisque, etiamnum persistentibus induratis. Petala alba, integra. Stamina edentula.*

2. A LY S S U M *maritimum.*

A. caulibus suffruticosis procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis acutis subincanis, staminibus simplicibus, filiculis subrotundis integris. W.

A. (*halimifolium*) caulibus suffruticosis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis villosiusculis, staminibus simplicibus, filiculis subrotundis integris. *Ait. Kew.* 2. p. 381. *Curt. mag.* 101.

*Clypeola (maritima)* perennis, filiculis bilocularibus ovatis dispermis. *Mant.* 426. *Sauv. monsp.* 51. *Mill. dict.* 2. *Desf. atl.* 2. p. 72.\*

A. caulibus diffusis, foliis linearibus. *Ger. prov.* 350. *Lepidium (fragrans)* foliis lineari-lanceolatis integerrimis carinatis, petalis calyce longioribus, caule suffruticoso. *Willd. in Ust. bot. Mag.* 11. p. 37.\*

*Thlaspi montanum* perenne flore albo. *Barr. ic.* 844.

*Thlaspi Alysson dictum maritimum.* *Bauh. pin.* 107.

*Thlaspi narbonense centunculi angusto folio.* *Tabern. ic.* 461.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 258.

*Meerstrands - Steinkraut.* W.

*Habitat in Galliae, Hispaniae et Africae borealis maritimis.* † 4 (v. v.)

*Caules ramosissimi diffusi sempervirentes. Folia lineari-lanceolata albida non rigida. Racemi stricti. Calyx deciduus. Petala alba obovata integra, unguibus et Filamentis atropurpureis. Antherae luteae. Silicula in singulis loculis semen unicum. Filamenta edentula.*

*Variat foliis viridibus et canis, ut et filamentorum colore. W.*

### 3. ALYSSUM halimifolium.

A. caulibus suffruticosis procumbentibus, foliis cuneiformi-lanceolatis obtusis subtus canis, staminibus simplicibus, siliculis obovatis. W.

A. caulibus procumbentibus perennantibus, foliis lanceolato-linearibus acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 331. *Mill. dict. n. 2.*

*Lunaria halimifolia. Allion. pedem. n. 900. t. 54. f. 1. et tab. 87. f. 1.\**

*Thlaspi, halimi folio, sempervirens. Herm. lugdb. 594. t. 595.*

*Thlaspi parvum halimi angusto incano folio. Bocc. mus. 45. t. 39.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 248.*

*Immergrünes Steinkraut. W.*

*Habitat in Europae australis aridis.* † (v. l.)

*Folia lanceolata vel linearia apice latiora obtusa, basi attenuata superne viridia albescencia pilis sparsis stellatis obsita, inferne alba densissimis pilis stellatis tecta. Flores albi, Siliculae obovatae marginatae stylo persistenti instructae. W.*

### \* 4. ALYSSUM tenuifolium.

A. caulibus erectis herbaceis, foliis linearibus acuminatis villolis, staminibus simplicibus. W.

*Alyssum tenuifolium. Steph. in litt.*

*Dünnblättriges Steinkraut. W.*

*Habitat in Sibiria. (v. l.)*

*Caules plures ex una radice erecti herbacei semipedales villosi. Folia linearia acuminata utrinque villosa conferta sessilia. Flores albi. Fructum non vidi. Foliis linearibus sessilibus acuminatis villosis diversissima. W.*

### 5. ALYSSUM saxatile.

A. caulibus frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis

mollissimis repandis. *Roy. lugdb.* 331. *Mill. dict. t.*  
 20. f. 1. *Ard. spec.* 1. p. 18. t. 7. *Crantz. austr.* p. 16.  
*Kniph. cent.* 5. n. 11. *Curt. mag.* 159.

*Thlaspi luteum, leucii folio.* *Bocc. musf.* 79. t. 93.

*Alysson folio leucii incano, flore luteo.* *Boerh. lugdb.*  
 2. p. 3.

*Alyssum creticum saxatile, foliis undulatis incanis.* *Tour-*  
*nef. cor.* 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 248.

Gebirgs-Steinkraut. W.

*Habitat in Creta.* † (v. l.)

*Petala lutea, integra.*

\*6. *ALYSSUM lunarioides.*

A. caulibus adscendentibus suffruticosis lanceolato-spa-  
 thulatis petiolatis tomentosis, siliculis ellipticis com-  
 pressis. W.

*Lunaria fruticosa perennis incana Leucii foliis.* *Tour-*  
*nef. cor.* 16. *itin. ed. germ.* 1. p. 373. t. 30.

Mondveilartiges Steinkraut. W.

*Habitat in Archipelagi insulis Stenosa, Philocandro et*  
*Anapho.* † (v. l. c. fr.)

*Folia valde tomentosa. Flores flavi. Siliculae magnae*  
*ellipticae compressae marginatae. Semina margine*  
*membranacea.* W.

\*7. *ALYSSUM argenteum.*

A. caulibus erectis suffruticosis, foliis spathulato-oblon-  
 gis subtus canis, racemis paniculatis, siliculis ovatis  
 incanis. W.

*Lunaria argentea.* *Allion. ped. n.* 901. t. 54. f. 3. *bona.\**  
 Weisblättriges Steinkraut. W.

*Habitat in montibus Pedemontanis.* † (v. l.)

*Tota planta pilis stellatis tecta, imprimis caulis.*  
*pagina foliorum inferior et siliculae. Folia oblonga spa-*  
*thulata obtusa superne viridia inferne cana. Racemi*  
*simplices ex omnibus foliorum axillis in apice caulis.*  
*hinc panicula oritur. Simile varietati majori A. alpe-*  
*stris sed diversum: foliis latioribus et potissimum rac-*  
*emis paniculatis nec ramosis corymbosis.* W.

8. *ALYSSUM alpestre.*

A. caulibus adscendentibus suffruticosis, foliis subrotun-  
 do-spathulatis incanis, racemis corymbosis. W.

A. caulibus suffruticosis diffusis, foliis subrotundis in-

canis, calycibus coloratis. *Mant.* 92. *Ger. prov.* 352. t. 13. f. 2.

β. A. (*murale*) punctatum echinatum, caulibus suffruticosis suberectis, foliis obovato cuneiformibus integerrimis, floribus corymbosis. *Waldst. et Kitaibel pl. rar. hung.* 1. p. 5. t. 6.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 249.

A pen-Steinkraut. W.

*Habitat in alpinis Galliae, Italiae, Helvetiae β in muris Hungariae.* † (v. v.)

Folia *spathulata, obtusissima.* Calyces *flavescentes, decidui.* Petala *lutea, integra.* Stamina *basi appendiculata membranula.* Stylus *deciduus.* Siliqua *ovata, incana.* *Mant.* 92.

Planta *admodum varians.* In *alpinis caules sunt decumbentes.* Folia *fere subrotunda incana et parva, in vallibus et extra alpes nata caulis fere erectus pedalis, folia lanceolata spathulata supra viridia infra alba et facies excepta inflorescentia fere praecedentis.* *Hujus majoris varietatis semina mecum communicaverat Cl. Kitaibel, e quibus plantas varietatis α obtinui.* W.

### \*9. ALYSSUM *serpyllifolium.*

A. caulibus suffruticosis erectis, foliis incanis inferioribus obovatis, superioribus lanceolatis, racemis corymbosis confertis. W.

A. (*serpyllifolium*) caule fruticoso erecto ramoso, foliis spathulatis subtus incanis, calycibus coloratis deciduis. *Desf. atl.* 2. p. 70.\*

A. orientale Serpylli folio Elichrysi capitulo. *Tournef. cor.* 15.

Quendelblättriges Steinkraut. W.

*Habitat in Atlante prope Tlemsen inque Armenia.* † (v. l.)

Caulis *erecti fruticosi, juniores steriles diffusi.* Folia *inferiora praecipue ramorum sterilium obovata, ramorum erectorum vero lanceolata.* Racemi *terminales breves conferti.* Corollae *calyce parum majores.* Siliulae *obovatae canae compressae.* W.

### \*10. ALYSSUM *atlanticum.*

A. caulibus suffruticosis erectis, foliis incanis lanceolatis, racemis simplicibus, siliculis convexis. W.

A. (*atlanticum*) caule fruticoso erecto, foliis lanceolatis incanis, rameis superioribus ciliatis, calyce deciduo, filiculis lentiformibus stylum aequantibus. *Desf. atl.* 2. p. 71. t. 149.\*

A. creticum saxatile Serpylli folio candidissimo, capsulis orbiculatis. *Tournef. cor.* 15.

Atlantisches Steinkraut. W.

*Habitat in cacumine Atlantis prope Tlemsen et in Creta.* †

*Ab affinis Siliculis non compressis sed valvulis convexis distinctum ut et aliis notis.* W.

## II. ALYSSUM orientale.

A. caulibus frutescentibus paniculatis, filiculis obcordatis compressis dispermis. *Ard. spec.* 2. p. 32. t. 15. f. 1. *Lamarck. encycl.* 1. p. 97.\*

Clypeola (*tomentosa*) filiculis orbiculatis bilocularibus, foliis subtomentosis. *Mant.* 92.

A. creticum saxatile serpylli folio candidissimo, capsulis orbiculatis. *Tournef. cor.* 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 258.

Orientalisches Steinkraut. W.

*Habitat in Oriente.* †

\* \* Herbacea.

## 12. ALYSSUM hyperboreum.

A. caulibus herbaceis, foliis incanis dentatis, staminibus quatuor bifurcatis. *Sp. pl.* 910.

Lunaria foliis ellipticis incondite dentatis. *Kraschen. act. petr.* 1747. p. 381. t. 15. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 249.

Nordisches Steinkraut. W.

*Habitat in America septentrionali. D. Krascheninnikof.*  
Stamina 2 breviora ungue acuto notata, reliqua 4 ad basin squama emarginata.

## 13. ALYSSUM incanum.

Alyssum caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymposis, petalis bifidis. *Hort. cliff.*

323. *Fl. suec.* 528; 582. *Roy. lugdb.* 331. *Crantz.*

*ausir.* p. 15. *Pollich. pal. n.* 616. *Mill. dict. n.* 5. *Gmel.*

*fib.* 3. p. 252. *Dalib. paris.* 197. *Hoffm. germ.* 230.

Moenchia incana. *Roth. germ. I.* 273. *II.* 73.

Thlaspi fruticosum incanum. *Bauh. pin.* 108.

*Thlaspi incanum machliniense.* *Clus. hist.* 2. p. 132.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 249.  
 Graues Steinkraut. W.

*Habitat in Europae septentrionalioribus arenosis, apricis.* 4 ♂ (v. v.)

*Petala alba. Silicula integra.*

14. **ALYSSUM** *minimum.*

A. caulibus diffusis herbaceis, foliis lineari-lanceolatis tomentosis, staminibus omnibus dentatis, siliculis glaberrimis orbiculatis. W.

A. caulibus herbaceis diffusis, foliis linearibus tomentosis, siliculis compressis. *Sp. pl.* 908. *Hoffm. germ.* 231.

A. procumbens annuum, foliis lineari-lanceolatis subtomentosis. *Sauv. meth.* 70.

*Lunaria annua minima hispanica, folio leucii maritimi.*  
*Boerh. lugdb.* 2. p. 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 250.

Kleinste Steinkraut. W.

*Habitat in Hispania; Sibiria.* *Georgi it.* 1. p. 224. ☉  
 (v. v.)

*Petala lutea, submarginata.*

*Siliculis glaberrimis ab affinibus puta A. calycinum et campestris distinctum.* W.

\*15. **ALYSSUM** *strictum.*

A. caulibus herbaceis ascendentibus, foliis lineari-lanceolatis tomentosis, siliculis tomentosis ovatis adpressis. W.

A. orientale serpillifolio capitulis in spicam longissimam dense congestis. *Tournef. cor.* 15.

Steifes Steinkraut. W.

*Habitat in Armenia.* (v. l.)

*Simile praecedenti, sed abunde diversum: Racemo terminali longiore stricto, Siliculis ovatis duplo minoribus ovatis villosis racemo adpressis, stylo persistenti terminatis. Siliculae non sunt emarginatae. Flores minutissimi.* W.

16. **ALYSSUM** *calycinum.*

A. caulibus herbaceis, staminibus omnibus dentatis, calycibus persistentibus. *Sp. pl.* 908. *Pollich pal. n.* 617.

*Mill. dict. n.* 11. *Jacq. austr. t.* 338. *Kniph. cent.* 11.

*n.* 7. *Hoff. germ.* 231. *Roth. germ. I.* 277. *II.* 84.



A. staminibus quatuor dentatis: duobus squamula longitudinali, calycibus persistentibus. *Jacq. vind.* 114.

A. foliis ellipticis scabris, calycibus persistentibus. *Hall. helv. n.* 494.

Adyleton calycinum. *Scop. carn. n.* 802.

Clypeola alyssoides. *Crantz. austr. p.* 19.

Clypeola siliculis bilocularibus tetraspermis. *Hort. cliff.* 329.

Thlalspi Alysson dictum campestre majus. *Bauh. pin.* 107.

Alysson minimum. *Clus. hist.* 2. p. 133.

Alysson. *Cam. epit.* 558. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 251.

Kelchfrüchtiges Steinkraut. W.

*Habitat in Austria, Gallia, Germania, ☉ (v. v.)*

Stamina 4, in medio interius dentata, at 2 e basi exserunt squamam lanceolatam longitudine germinis. Petala minima, vix manifeste emarginata, lutea, sed antiquata alba evadunt. Silicula emarginata. Calyx persistens.

Stamina non dentata Scholler? R.

\*17. ALYSSUM sibiricum. W.

A. caulibus herbaceis adscendentibus superne ramosis, foliis obovatis, siliculis suborbiculatis integris canis. W.  
Sibirisches Steinkraut. W.

*Habitat in Sibiria. (v. l.)*

Caules herbacei adscendentes erecti tri- vel quadri-  
pollicares, apice ramosi. Folia obovata canescentia a  
pilis stellatis utrinque dispersis. Racemi simplices in  
omnium ramorum apicibus. Flores ochroleuci, petalis  
apice integris calyce parum longioribus. Siliculae sub-  
rotundae basi parum angustiores non emarginatae a pi-  
lis stellatis canae. Stylus persistens longitudine sili-  
culae. A. montano affine sed caule superne ramoso ad-  
scendente, petalis ochroleucis et aliis notis potissimum  
habitu valde distinctum. W.

\*18. ALYSSUM spathulatum.

A. caulibus herbaceis erectis, foliis tomentosiss radicali-  
bus orbiculato-spathulatis, caulinis lanceolatis. W.

Alyssum spathulatum. *Stephan in litt.*

Spathelförmiges Steinkraut. W.

*Habitat in montibus Altaicis Sibiriae. 24 (v. l.)*

Caules plures simplices erecti quadriunciales. Folia  
tomentosa alba, radicalia petiolata orbiculato-spa-  
*Linnaei Spec. Plant. T. III.* G g

*thulata, caulina lanceolata obtusa. Racemus simplex terminalis. Corollae pallidae, flavae, petalis obtusis calyce duplo longioribus. Siliculae orbiculatae glaberrimae non emarginatae, Stylo persistenti coronatae. W.*

19. **ALYSSUM montanum.**

A. caulibus herbaceis diffusis, foliis incanis, inferioribus ellipticis acutis, superioribus sublanceolatis, racemo simplici. W.

A. caulibus herbaceis diffusis, foliis lanceolatis punctato-echinatis. *Hort. upf.* 195. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. fib.* 3. p. 250. *Pall. it.* 1. p. 252. *Jacq. austr. t.* 37. *Kniph. cent.* 5. n. 10. *Hoffm. germ.* 231. *Roth. germ. I.* 277. *II.* 83.

A. foliis lanceolatis obtusis incanis, caulibus procumbentibus, radice perenni. *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 331.

A. caulibus herbaceis, foliis punctatis scabris; siliculis orbiculatis emarginatis nudis. *Ger. prov.* 352.

A. ramulis suffruticosis diffusis, foliis obverse lanceolatis tomentosis. *Jacq. vind.* 258.\*

A. suffruticosum foliis ellipticis scabris. *Hall. helv. n.* 492. *Clypeola montana. Crantz. austr.* 19.

*Adyseton montanum. Scop. carn. n.* 803.

*Thlaspi luteo flore incanum, discoides, umbellatum, montanum. Colum. cephr.* 280. 281. *Hall. R.*

*Thlaspi thymi folio, utriculo sabrotundo mucronato, hispanicum. Barrel. ic.* 807. *Bocc. mus.* 72. t. 67. *Hall. R.*

*Thlaspi montanum luteum. Bauh. hist.* 2. p. 928. t. 929. *prodr.* 49.

*Thlaspi alpinum repens. Bauh. pin.* 107.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 251.

Berg - Steinkraut. W.

*Habitat in Helvetiae, Germaniae apricis siccis. 2*  
(v. v.)

*Petala lutea. Stamina 4 apice bifida; 2 basi denticulo.*

\*20. **ALYSSUM tortuosum.**

A. caulibus herbaceis tortuoso-diffusis, foliis incanis sublanceolatis, racemis terminalibus corymbosis. W.

*Alyssum tortuosum. Waldstein et Kitaibel pl. rar. hung.*

Gedrehtes Steinkraut. W.

*Habitat in arenosis sterilissimis Hungariae inque Sibiria.* 2. (v. l.)

*Simillimum A. montano, foliis florumque colore, at diversum: racemis in apice caulis corymbosis nec simplicibus, petalis subintegris, staminibusque edentulis.* W.

## 21. ALYSSUM *campestre.*

A. caule herbaceo, staminibus stipatis pari setarum, calycibus deciduis. *Sp. pl.* 909. *Pollich pal. n.* 618.

*Hoffm. germ.* 231.

*Moenchia campestris.* *Roth. germ. I.* 274. *II.* 84.

A. caulibus herbaceis, foliis punctatis scabris, siliculis orbiculatis nudis. *Ger. prov.* 351.

*Clypeola annua, siliculis bilocularibus dispermis, calycibus caducis.* *Sauv. monsp.* 71.

*Alysson incanum, serpylli folio, fructu nudo.* *Tournef. inst.* 217. *Hall. helv. n.* 495.

*Thlaspi Alysson dictum minus, capsulis majoribus rotundis non foliatis.* *Magn. monsp.* 251.

*Thlaspi montanum incanum luteum, serpylli folio, majus.* *Bauh. pin.* 107. *prodr.* 49?

β. A. (*simplex*) caule simplici subramoso, foliis lato-lanceolatis, stylo siliculae brevissimo. *Rudolphi in Schrad. jour.* 2. p. 291.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 252.

Feld-Steinkraut. W.

*Habitat in Gallia, Germania, Helvetia.* ☉ (v. v.)

*Simillimum A. calycino petalis caule foliis, sed magis decumbens foliis lanceolato-ovatis. Filamenta absque dentibus, sed 2 solitaria habent utrinque setam filamentum non adnatam, at receptaculo insertam. Siliculae ovatae, vix compressae, magis tomentosae.*

*Alyssum simplex, quod mecum benevole communicavit Clariss. Rudolphi, videtur hujus sola varietas. Possideo enim plura specimina intermedia ex Hispania, quae transitum demonstrant.* W.

## \*22. ALYSSUM *linifolium.*

A. caule herbaceo erecto ramoso divaricato, foliis linearibus incanis, siliculis obovatis integris glabris. W.

*Alyssum linifolium.* *Stephan. in litt.*

A. orientale angustissimo folio, fructu ovato. *Tournef. cor.* 15.

Flachsblättriges Steinkraut. W.

*Habitat in Tauria et Armenia.* ☉ (v. l.)

Caulis herbaceus quadri vel quinque-uncialis ramosus, ramis divaricatis. Folia fere uncialia linearia angustissima basi parum angustiora incana. Petala lanceolata albida calyce parum longiora. Filamenta quatuor medio dente unico instructa, bina squamula setacea a germine separata. Siliculæ glaberrimæ obovatae non emarginatae planae. Stylus brevissimus. W.

23. *ALYSSUM clypeatum.*

A. caule erecto herbaceo, foliis oblongis tomentosis subdentatis, siliculis oblongis compresso-planis, stigmate capitato, petalis acuminatis linearibus. W.

A. caule erecto herbaceo, siliculis sessilibus ovalibus compresso-planis, petalis acuminatis linearibus. *Sp. pl.* 909. *Mill. dict. n.* 6.

*Lunaria* siliculis subsessilibus incanis lateralibus. *Roy. lugdb.* 333. *Gron. virg.* 80.

*Lunaria leucoii* folio, siliqua oblonga majori. *Tournef. inst.* 218.

*Leucoium alyssoides clypeatum majus.* *Bauh. pin.* 201.

*Alysson dioscoridis.* *Dod. pempt.* 89.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 253.

Schildförmiges Steinkraut. W.

*Habitat in Europa australi, Libano, Tauria.* ☉ (v. v.)

*Denticulus in medio filamentorum.*

Folia inferiora saepius dentata, omnia incana, ut tota planta, a pilis densis stellatis. Siliculæ pedunculo brevi sunt suffultae. W.

\*24. *ALYSSUM cheiranthifolium.* W.

A. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis hirtis integerrimis, siliculis oblongis compresso-planis, stigmate bifido, petalis spathulato-linearibus. W.

A. orientale *Leucoii* folio candidissimo caule sesquipedali. *Tournef. cor.* 15?

Leucojenblättriges Steinkraut. W.

*Habitat in Oriente.* (v. l.)

*Simillimum praecedenti, sed folia minus incana, tamen dense pilis longioribus obsita, stigma non capitatum sed furcatum, denique petala duplo calyce longiora. An varietas tantum?* W.

\*\*\* *Siliculis inflatis, s. calycibus oblongis clausis.*

25. *ALYSSUM sinuatum.*

A. caule herbaceo, foliis lanceolato-deltoidibus, siliculis inflatis. *Syst. Veg.* 439.

- A. caule herbaceo, foliis lanceolatis dentatis, siliculis inflatis. *Spec. pl. 2. p. 909. Mill. dict. n. 7.*
- A. foliis lanceolatis repando-dentatis. *Hort. cliff. 333. Roy. lugdb. 332.*
- Alyssoides incanum, foliis sinuatis. *Tournef. infl. 218.*
- Leucoium incanum, siliculis rotundis. *Bauh. pin. 201.*
- Eruca peregrina. *Clus. hist. 2. p. 134.*
- Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 254.*
- Buchtigblättriges Steinkraut. W.
- Habitat in Hispaniae incultis, ad vias. ☉ ♂ (v. v.)
- Petala bifida. Filamenta lateralia obsolete dentata.
26. ALYSSUM creticum.
- A. caule fruticoso, foliis lanceolatis subdentatis tomentosis, siliculis inflatis globosis. *Sp. pl. 910.*
- Alyssoides fruticosum creticum, leucii folio incano. *Tournef. cor. 15.*
- Leucoium luteum, utriculato semine. *Alp. exot. 117. t. 118.*
- Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 255.*
- Candisches Steinkraut. W.
- Habitat in Hispania, Creta. †
27. ALYSSUM gemonense.
- A. caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis radicalibus obovatis subtomentosis, siliculis inflatis. *Mant. 92. Ard. spec. 2. p. - - t. 10. Roth. germ. II. 85. Jacq. ic. rar. 3. t. 503.*
- A. caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis radicalibus oblongo-obovatis integris repando-subdenticulatis tomentoso-canescens, siliculis inflatis. *Wulfen in Jacq. Collect. 2. p. 159.\**
- A. (petraeum) caulibus superne ramosis, ramis divaricatis flexuosis, siliculis subinflatis tetraspermis. *Ard. spec. 2. p. 30. t. 14.*
- Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 255.*
- Glemaunisches Steinkraut. W.
- Habitat in montosis Baruthinis, Carinthiae. † (v. v.)
- Differt ab A. cretico ramis divaricatis, floribus minoribus, saturate luteis.
- \*28. ALYSSUM dasycarpum.
- A. caule erecto ramoso, foliis oblongis utrinque acutis, siliculis globosis villosis calyce persistenti. W.

*Alyssum dasycarpum*, Steph in litt.

Rauhfrüchtiges Steinkraut. W.

*Habitat in Sibiria ad Kamam et Volgam fluvium.* (v. l.)

*Caules digitales plures e radice, erecti ramosi. Folia canescentia oblonga integerrima utrinque acuta. Flores admodum parvi, petalis flavescensibus vix calyce longioribus. Calyx persistens. Siliculae parvae globosae villosae.* W.

29. *ALYSSUM utriculatum.*

A. caule herbaceo erecto, foliis laevibus lanceolatis integerrimis, filiculis inflatis. *Mant. 92. Curt. mag. 130.*

*Alyssoides fruticosum, leucoii folio viridi.* Tournef. *inst. 218.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 255.*

Schlauchfrüchtiges Steinkraut. W.

*Habitat in Oriente.* † (v. v.)

*Flos Lunariae. Folia radicalia pilosa.*

30. *ALYSSUM Vesicaria.*

A. foliis linearibus dentatis, filiculis inflatis angulatis acutis. *Sp. pl. 910. Mill. dict. n. 9.*

*Vesicaria orientalis, foliis dentatis.* Tournef. *cor. 49. itin. 2. p. 97. t. 14. mala.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 255.*

Blasenfrüchtiges Steinkraut. W.

*Habitat in Oriente.* † (v. l.)

31. *ALYSSUM deltoideum.*

A. caulibus suffrutescensibus prostratis: foliis lanceolato-deltoidibus, filiculis hirtis inflatis. *Sp. pl. 908. Mill. dict. n. 10. Curt. mag. 126.*

*Alysson creticum, foliis angulatis, flore violaceo.* Tournef. *cor. 15.*

*Leucoium saxatile, thymi folio, hirsutum caeruleo-purpureum.* Bauh. *pin. 201.*

*Lithoreo-laucioion minimum supinum.* Col. *ecphr. 1. p. 282. t. 284.?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 256.*

Rothblühendes Steinkraut. W.

*Habitat in Oriente.* † (v. v.)

*Caules lignosi, filiformes, diffusi, pilosi, antiquiores petiolorum basibus denticulati, flexuosi. Folia lanceolata, utrinque uno alterove valido angulo quasi del-*

*toidea, viridia, raris pilis adspersa. Racemi simplices, pauciflori. Flores Cheiranthi, violacei. Calyx oblongus, clausus, basi opposita gibbosus.*

## 1231. C L Y P E O L A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1082.*

*Silicula emarginata, orbiculata, compresso-plana, decidua, bipartibilis, unilocularis, monosperma.*

I. C L Y P E O L A *Jonthlaspi.*

C. siliculis orbiculatis unilocularibus monospermis. *Hort. cliff. 329. Hort. upf. 185. Roy. lugdb. 332. Mill. dict. n. 1. Cavan. ic. 1. p. 22. t. 34. f. 2.\**

*Thlaspi clypeatum, serpilli folio. Bauh. pin. 107.*

*Jonthlaspi minimum spicatum lunatum. Col. ecphr. 1. p. 281. t. 284.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 257.*

*Liegendes Schildkraut. W.*

*Habitat in Italiae, Narbonae fabulosis. ☉ (v. v.)*

*Flores minuti. Siliculae orbiculatae, emarginatae, uniloculares, dispermae. Mant. 426.*

*Stamina omnia habent dentem supra basin, ut si quis velit Alyssi speciem, non repugnabo.*

## 1232. P E L T A R I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1083.*

*Silicula integra, suborbiculata, compresso-plana, non dehiscens, mono-f. trisperma.*

I. P E L T A R I A *alliacea.*

P. foliis amplexicaulibus oblongis indivisis. *Lin. suppl. 295.*

*Peltaria. Jacq. vind. 260.\* Mill. dict. Jacq. austr. t. 123. Scop. carn. n. 784.*

*Bohadtschia foliis radicalibus cordatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis. Crantz austr. p. 5. t. 1. f. 1.*

*Clypeola perennis, foliis inferioribus petiolatis cordato-angulatis; superioribus amplexicaulibus lanceolatis, siliculis unilocularibus. Ard. spec. 26. t. 6.*

*Thlaspi montanum, glasti folio, majus. Bauh. pin. 106.*

*Thlaspi montanum* I. *Clus. hist.* 2. p. 130.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 259.

Knoblauchduftiges Scheibenkraut. W.

*Habitat in alpibus Istriam inter et Croatiam, ad arcem Stichenstein versus Schneeberg Austriae. Jacq.* 4 (v. v.)

\*2. *PELTARIA* *Garcini.*

*P. foliis petiolatis ellipticis, siliculis unilocularibus compressis. Burm. ind.* 139. t. 46. f. 1.

Perfisches Scheibenkraut. W.

*Habitat in Persia.*

*Caules glaberrimi albicantes. Folia alterna elliptica integerrima glabra. Siliculae obcordatae pedunculatae compressae glaberrimae monospermae, seminibus oblongis. Burm. l. c.*

3. *PELTARIA* *capensis.* †

*P. foliis caulinis quinato-pinnatis linearibus subcarnosis. Lin. suppl.* 296.

Capisches Scheibenkraut. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. H. U.*

*Caulis erectus ramosus teres laevis pedalis foliatus. Folia alterna pinnata, laciniis quinis, linearia subcarnosa glabra acuta. Racemi longi, pedunculis et calycibus vix pubescentibus. Petala alba subemarginata calyce quadruplo majora patentia sessilia. Antherae flavae. Stylus brevissimus. Stigma capitatum. Silicula plana subrotunda ovata compressa integra: dissepimento parallelo. Semina in centro, ut in Clypeola, solitaria in quovis loculo, compressa.*

*Dissepimentum siliculae dissuadet esse Peltariam. W.*

1233. *BISCUTELLA*.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1084.*

*Silicula compresso-plana, rotundata, supra infraque biloba. Cal. foliola basi gibba.*

I. *BISCUTELLA* *auriculata.*

*B. calycibus nectario utrinque gibbis, siliculis in stylum coeuntibus. Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 185. *Roy. lugdb.* 336. *Mill. dict. n. I. Kniph. cent.* 12. n. 16.

*Thlaspidium biscutatatum villosum, flore calcari donato. Bauh. pin.* 107. *prodr.* 49.



*Leucoium montanum*, flore pedato. *Col. ecphr.* 2. p. 59. t. 61.

Jon *Draba alyssoides lutea angustifolia*. *Barr. ic.* 230.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 261.

Geöhrte Brillenschote. W.

*Habitat in Italia, Galloprovincia.* ☉ (v. v.)

*Haec sola siliculae lobis in stylum coit.*

## 2. BISCUTELLA *apula*.

*B. filiculis scabris, foliis lanceolatis sessilibus ferratis.*  
*Mant.* 254.

*B. (didyma) filiculis orbiculato-didymis a stylo divergentibus.* *Spec. pl.* 3. p. 911. *Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 185. *Roy. lugdb.* 337. *Sauv. monsp.* 72. 282.

*Thlaspidium apulom spicatum.* *Tournef. inst.* 214.

*Thlaspi biscutatatum asperum hieracifolium majus.* *Bauh. pin.* 107.

*Thlaspi clypeatum.* *Clus. hist.* 2. p. 133.

*Jondraba alyssoides apula spicata.* *Col. ecphr.* 1. p. 283. t. 284. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 262.

Apulische Brillenschote. W.

*Habitat in Italia.* ☉ H. U. (v. v.)

*Planta tota Caule foliisque hirta, pilis sparsis. Caulis erectus, pedalis, ramis duobus tribusve. Folia lanceolata s. oblonga, sessilia, remotissime serrata. Siliculae orbiculato didymae, scabrae.*

*Conf Bisc. (didyma) filiculis orbiculatis didymis, stylo interius longitudinaliter adhaerentibus. Gouan illustr.* 41. *Confundit B. apulam, lyratam et coronopifoliam.* R.

## 3. BISCUTELLA *lyrata*.

*B. filiculis margine scabris, caule subnudo, foliis lyratis.* W.

*B. caule subnudo, foliis obovatis sinuato-lyratis, filiculis margine scabris.* *Desrouff. encycl.* 3. p. 592.

*Poiret. itin.* 2. p. 197.

*B. filiculis scabris, foliis lyratis.* *Mant.* 254.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 262.

Leyerblättrige Brillenschote. W.

*Habitat in Hispania, Africa boreali.* ☉

*Folia Radicalia, lyrata (Cardamines), parva, pilosa. Caulis ramosus, subaphyllus, nudus, basi hispida. Pedicelli divaricatissimi, capillares. Siliculae*

*parvae* (*B. apulae paulo minores*), *scabriusculae*, *orbiculatae*.

*Linnaeus hanc cum sequente confudisse videtur. W.*

\*4. **BISCUTELLA raphanifolia.**

*B. filiculis glabris, foliis lyratis. W.*

*B. (raphanifolia) filiculis didymis laevibus, foliis lyratis. Desfrouff. encycl. 3. p. 592.\* Poiret itin. 2. p. 198. Desf. atl. 2. p. 74.\**

*Thlaspidium raphani folio. Tournef. inst. 214.*

*Thlaspi biscutatatum raphani f. irionis folio. Bocc. sic. 45. t. 23.*

*Rettigblättrige Brillenschote. W.*

*Habitat in Sicilia et Africa boreali. ☉ (v. v.)*

5. **BISCUTELLA coronopifolia.**

*B. filiculis glabris margine ciliatis, foliis dentatis hirtis. W.*

*B. filiculis glabris, foliis dentatis hirtis. Mant. p. 255. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 263.*

*Gefranzte Brillenschote. W.*

*Habitat in Hispania, Italia. ☉ (v. v.)*

*Folia Radicalia lanceolata (Coronopi), ad medium usque profunde dentata dentibus utrinque 3. f. 4, supra infraque pilis distinctis hirta; Caulina amplexicaulia, cordato-lanceolata, minus dentata, pauca. Siliculae omnino laeves.*

6. **BISCUTELLA laevigata.**

*B. filiculis glabris, foliis lanceolatis serratis. Mant. 255. Jacq. austr. 4. t. 339. Hoffm. germ. 232. Roth germ. I. 281. II. 98.*

*B. didyma. Scop. carn. n. 804.*

*B. silicula laevi, foliis dentatis asperis. Hall. helv. n. 501.*

*Clypeola didyma. Crantz austr. p. 20. R.*

*Leucobium alyssoides umbellatum montanum. Col. ecphr. I. p. 283. t. 285. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 263.*

*Glatte Brillenschote. W.*

*Habitat in Italia, Helvetia, Austria, Germania. ♀ (v. v.)*

*Folia radicalia, lanceolata, petiolata, acuminata, remote serrata ferraturis parvis acutis erectis, nuda f. subscabra, margine scabra. Caulis pedalis, fere totus aphyllus, laevis, superne corymbofo-ramosus. Siliculae laeves, magnitudine B. auriculatae.*

Columnae planta differt caule foliisque magis pilosis et Caule folioso.

\*7. BISCUTELLA *subspathulata*. †

B. filiculis glabris, foliis lineari-spathulatis integerrimis. W.

B. (*subspathulata*) foliis lineari-spathulatis integerrimis subglabris, caule folioso. *Desfrouff. encycl.* 3. p. 593.\*

*Thlaspidium montanum angustifolium glabrum. Tournef. inst.* 215.

*Jonthlasi alylloides angustifolium luteum. Barr. ic.* 254.

Ganzblättrige Brillenschote. W.

*Habitat in Italiae montibus.* 4.

*Ab omnibus diversissima foliis spathulatis integerrimis.* W.

\*8. BISCUTELLA *montana*.

B. filiculis glabris, foliis ovatis dentatis tomentosis. *Cavan. ic.* 2. p. 59. t. 177.\*

Berg-Brillenschote. W.

*Habitat in altioribus montibus regni Valentini.* 4

*Folia valde tomentosa, radicalia obovata grosse dentata, caulina oblonga amplexicaulia subdentata.* W.

9. BISCUTELLA *sempervirens*.

B. filiculis scabriusculis, foliis lanceolatis tomentosis. *Mant.* 255.

*Thlaspidium fruticosum, leucoii folio, semperflorens. Tournef. inst.* 214?

*Thlaspi biscutellatum luteum, anchusae folio. Barr. ic.* 39. t. 841. *Bocc. mus.* 267. t. 122.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 264.

Immergrüne Brillenschote. W.

*Habitat in Oriente, inque Hispania. Cl. Alstroemer.* ‡

*Caules suffruticosi, palmares, prostrati, simplices, crassitie pennae anserinae, apice foliosi. Folia conferta, lanceolata, dense tomentosa (Cheiranthi incani), canescentia, dentato-serrata margine reflexo. Caulis floriferus inter folia evatus, simplex, subaphyllus. Racemus terminalis, compositus, minus elongatus. Siliulae magnitudine et figura B. apulae.*

\*10. BISCUTELLA *peruviana*.

B. filiculis glabris alatis, foliis coriaceis ovatis serratis caule fruticoso. W.

B. frutescens glabra, foliis ovatis serratis coriaceis siliculis laevibus, margine membranaceo alatis. *Desrouff. encycl. 3. p. 593.\**

Peruvianische Brillenschote. W.

*Habitat in Peru. †*

*Distinctissima caule frutescente, foliis coriaceis breve petiolatis tenuissime serratis, panicula thyrsoidaea foliacea terminali, et siliculis margine membranaceo alatis. W.*

### 1234. L U N A R I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1085.*

*Silicula integra, elliptica, compresso-plana, pedicellata; valvis dissepimento aequalibus parallelis, planis. Cal. foliolis faccatis.*

#### I. LUNARIA *rediviva*,

L. foliis mucronato-dentatis, siliculis oblongis utrinque attenuatis. W.

L. siliculis lanceolatis, radice perenni. *Retz. obs. 1. p. 22.*

L. foliis alternis. *Sp. pl. 911. Mill. dict. n. 1. et illustr. Gort. ingr. 103. Reyg. ged. 2. n. 109. Crantz. austr. p. 18. Scop. carn. n. 786. Kniph. cent. 7. n. 46. Matthesch. fil. n. 482. Hoffm. germ. 232. Roth. germ. 1. 274. II. 77.*

L. foliis cordatis. *Hort. cliff. 333. Roy. lugdb. 332. Besl. syst. ver. 7. f. 2.*

L. perennis, siliquis ovato-lanceolatis. *Hall. helv. n. 500.*

*Viola lunaria major, siliqua oblonga. Bauh. pin. 203.*

*Viola latifolia. Lunaria odorata. Clus. hist. 1. p. 297.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 265.*

Spitzfrüchtige Mondviole. W.

*Habitat in Europa septentrionaliore, in Germania.*

*Weber. spicil. 18. 4 (v. l.)*

*Radix perennis. Flores odori. Folia alterna exceptis infimis et magis hirta;*

*Differt a sequenti: Radice perenni nec bienni, Foliis profunde cordatis, omnibus acuminatis, quum in sequenti superiora tantum acuminata, dentibus angustioribus apice mucronatis numerosioribus, Siliculis oblongis utrinque attenuatis. W.*

2. LUNARIA *annua*.

L. foliis obtuse dentatis, filiculis ellipticis utrinque obtusis. W.

L. filiculis ellipticis, radice bienni. *Retz. obs. I. p. 22.*

L. foliis oppositis. *Sp. pl. 911. Fl. suec. 2. n. 583. Mill. dict. n. 2. Besl. exst. vern. 7. f. 1. Hoffm. germ. 232. Roth. germ. I. 274. II. 77.*

L. major, filiqua rotundiore. *Bauh. hist. 2. p. 881.*

*Viola latifolia. Dod. pempt. 161. Dalech. hist. 805.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 266.*

Stumpfrüchtige Mondviole. W.

*Habitat in Germania, Suecia. ♂ (v. v.)*

Radix biennis. Flores inodori. Caulis hirsutus.

Planta culta habuit folia opposita; an semper? praestantior nota inquirenda.

*Ambae habent folia inferiora opposita et superiora alterna. W.*

## S I L I Q U O S A.

## 1235. R I C O T I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1086.*

*Siliqua unilocularis, oblonga, compressa; valvulis planis.*

1. R I C O T I A *aegyptiaca*.

*Ricotia aegyptiaca. Sp. pl. 2. p. 912.*

*Cardamine foliis supradecompositis, filiquis unilocularibus pendulis. Sp. pl. I. p. 656.*

*Lunaria foliis supradecompositis: foliolis trifidis, filiquis oblongis pendulis. Mill. icon. 169.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 267.*

Aegyptische Ricotie. W.

*Habitat in Aegypto. ☉ (v. v.)*

*Siliqua est revera unilocularis nec bilocularis ut Cl. Gaertner perhibet qui fructum Lunariae redivivae pro Ricotia depinxit. W.*

## 1236. DENTARIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1087.*

*Siliqua* elastice dissiliens valvulis revolutis. *Stigma* emarginatum. *Cal.* longitudinaliter connivens.

1. DENTARIA *enneaphylla*.

*D.* foliis ternis ternatis dentatis, foliolorum axillis nudis, staminibus longitudine corollae. W.

*D.* foliis ternis ternatis. *Sp. pl.* 912. *Mill. dict. n.* 3. *Jacq. vind.* 119. *austr. t.* 316. *Crantz. austr. p.* 26. *Mat. tusch. fil. n.* 483. *Scop. carn. n.* 812. *Hoffm. germ.* 232. *Roth. germ. II.* 116.

*D.* foliis omnibus ternatis. *Roy. lugdb.* 340.

*D.* triphyllos. *Bauh. pin.* 322. *Clus. hist. 2. p.* 121. *n.* 5.

Turritis foliis verticillatis, ternis. *Scop. carn. 1. p.* 517. *n.* 3.

Coralloides triphyllos. *Gesn. fasc. 4. t. 2. f.* 4.

*Ceratia plinii. Col. ephr. 1. p.* 308. *t.* 307.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p.* 268.

Neunblättrige Zahnwurz. W.

*Habitat in Austriae, Italiae montanis umbrosis sterilibus.* ☉ (v. v.)

\*2. DENTARIA *glandulosa*.

*D.* foliis ternis ternatis profunde dentatis, glandula subulata in foliolorum axillis, staminibus corolla duplo brevioribus. W.

*Dentaria glandulosa. Waldst. et Kitaib. pl. hung.*

Drüfliche Zahnwurz. W.

*Habitat in Hungariae sylvis subalpinis.* ♀ (v. f.)

Radix obliqua carnosae remote dentata. Caulis semipedalis nudus glaber apice. Foliis tribus ternatis instructus. Foliola uncialia vel ultra angustolanceolata acuminata profunde inaequaliter dentata venosa glabra, margine tenuissime ciliata, bina lateralia sessilia, intermedium brevissime petiolatum. Glandulae parvae subulatae solitariae in utroque latere petioli folioli intermedii. Flores tres pedunculati in apice caulis, purpurei magnitudine *D. pentaphyllae*. Calycis foliola colorata obtusa. Petala levissime emarginata oblongo-ovata. Stamina petalis dimidio breviora. Affinis

*D. enneaphyllae* sed foliis angustioribus profunde dentatis, glandulis subulatis inter foliola, floribus purpureis, nec flavescentibus, majoribus magis erectis, et staminibus petalis duplo brevioribus distincta. W.

\*3. *DENTARIA laciniata.*

*D. foliis ternis ternatis, foliolis tripartitis linearibus dentatis, staminibus longitudine corollae.* W.

*Dentaria laciniata.* *Mühlenberg in litt.*

Schlitzblättrige Zahnwurz. W.

*Habitat in Pennsylvania.* 2 (v. f.)

Caulis quadri- vel quinqueuncialis glaber. Folia tria ternata. Foliola lateralia bipartita, intermedium tripartitum, laciniis linearibus obtusis medio dentatis. Racemus terminalis erectus multiflorus, floribus nutantibus. Corolla magnitudine *D. enneaphylloae*. Stamina longitudine fere corollae. W.

4. *DENTARIA bulbifera.*

*D. foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus.*

*Hort. cliff.* 335. *Fl. suec.* 565; 584. *Roy. lugdb.* 340.

*Hall. helv. n.* 470. *Mill. dict. n.* 2. *Crantz. austr.*

*p.* 26. *Scop. carn. ed. 2. n.* 813. *Mattusch. sil. n.* 484.

*Doerr. nass. p.* 94. *Flor. dan. t.* 361. *Hoffm. germ.* 232.

*Roth. germ. I.* 286. *II.* 115.

*D. heptaphyllos baccifera.* *Bauh. pin.* 322.

*Barbarea.* *Scop. carn. I. p.* 522.

*Dentaria IV. baccifera.* *Clus. hist. 2. p.* 121.

β. *Dentaria baccifera, foliis ptarmicae.* *Bauh. pin.* 322.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p.* 269.

Zwiebeltragende Zahnwurz. W.

*Habitat in Europa australi ad radices montium umbrosas.* 2 (v. v.)

\*5. *DENTARIA microphylla.* W.

*D. foliis omnibus pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis inaequaliter dentatis.* W.

Kleinblättrige Zahnwurz. W.

*Habitat in Sibiria.* 2 (v. f.)

Caulis semipedalis erectus glaber inferne nudus. Folia alterna omnia pinnata maxima uncialia. Foliola lineari-lanceolata utrinque dentibus binis vel tribus inaequalibus instructa, inferiora septena superiora quina. Racemus terminalis pauciflorus. Corolla magnitudine sequentis purpurea sed petala angustiora. An varietas

*sequentis?* Gmel. *fib.* 3. t. 65. *huic simillima quoad parvitatem foliorum, tamen diversa.* W.

\*6. DENTARIA *pinnata.*

D. foliis omnibus pinnatis, foliolis oblongis acuminatis aequaliter dentatis. W.

D. foliolis omnibus pinnatis, foliolis quinis septenisque oblongis ferratis. *Lamarck. encycl.* 2. p. 265.\* *Ait. Kew.* 2. p. 386.

*Dentaria heptaphyllos.* *Vill. delph.* 3. p. 364.

D. foliis inferioribus septenis, superioribus quinis. *Hall. helv. n.* 469. β

D. foliis pinnatis et digitatis. *Ger. prov.* 356.

D. heptaphyllos. *Bauh. pin.* 322. *Tournef. inst.* 225. *Raj. hist.* 785.

D. 8. heptaphyllos. *Clus. hist.* 2. p. 123.

*Viola dentaria altera.* *Dod. pempt.* 162.

*Gefiederte Zahnwurz.* W.

*Habitat in alpihus Galliae, Helvetiae.* 4 (v. l.)

7. DENTARIA *pentaphyllos.*

D. foliis digitatis. *Ait. Kew.* 2. p. 387.

D. foliis summis digitatis. *Sp. pl.* 912. *Mill. dict. n. I.* *Crantz austr.* p. 26. *Gouan. hort.* 323. *illustr.* 42. *Mattusch. fil. n.* 485.

D. foliis omnibus quinato-digitatis. *Ger. prov.* 356.

D. foliis quinis digitatis. *Hall. helv. n.* 469.

*Saxifraga montana, radice squamis denticulatis.* *Gesn. fasc. I. t. I. f. I.*

D. pentaphyllos, foliis mollibus. *Garid. prov.* 152. t. 29.

D. pentaphyllos. *Bauh. pin.* 322.

β D. pentaphyllos, foliis asperis. *Tournef. inst.* 225.

*Dentaria 6. pentaphyllos I.* *Clus. hist.* 2. p. 122.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 270.

*Fünfblättrige Zahnwurz.* W.

*Habitat in alpihus Helveticis, Allobrogicis, aliisque.*

4 (v. l.)



## 1237. C A R D A M I N E.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1088.*

*Siliqua* elastice diffiliens valvulis revolutis. *Stigma* integrum. *Cal.* subhians.

\* *Foliis simplicibus.*

I. C A R D A M I N E *bellidifolia.*

C. foliis simplicibus subrotundo-ovatis integerrimis, petiolis longissimis, caule florifero foliorum longitudine. W.

C. foliis simplicibus ovatis integerrimis: petiolis longis. *Fl. lapp. 206. t. 9. f. 2. Fl. suec. 564; 590. Fl. dan. t. 20.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 272.*

Malsliebblättriges Schaumkraut. W.

*Habitat in alpibus Lapponiae, Norvegiae. 4 (v. l.)*

Planta pusilla. Folia longissime petiolata subrotundo-ovata acutiuscula, Scapus floriferus vix foliis altior nudus vel uno alterove folio longissime petiolato subrotundo-ovato instructus. Scapus fructiferus foliis altior evadit. Caute distinguenda a sequenti. W.

\*2. C A R D A M I N E *alpina.* W.

C. foliis simplicibus oblongo-ovatis integerrimis, caule florifero foliis altiore. W.

*Cardamine bellidifolia. Wulf. in Jacq. Misc. 1. p. 148. t. 17. f. 2.\* Allion. pedem. n. 949. t. 18. f. 3. Vill. delph. 3. p. 357. Hoffm. germ. 233.*

*Cardamine heterophylla. Host. synop. 366. (exclusis synonymis.)*

C. foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis ovatis obtusis. *Hall. helv. n. 476. a.*

*Nasturtium alpinum bellidis folio minus. Bauh. pin. 105. Alpen-Schaumkraut. W.*

*Habitat in alpibus Helvetiae, Sabaudiae, Delphinatus, Carinthiae. 4 (v. l.)*

Folia radicalia oblongo-ovata longe petiolata obtusissima, caulina plerumque bina breve petiolata, supremum interdum subsessile. Scapi foliis longiores. Affinis praecedenti, sed multo major, folia brevius petiolata oblongo-ovata et obtusissima, caulina petiolo brevi instructa. *Clariff. Host praeeunte Hallero varietatem latifoliam C. resedifoliae, quae foliis radicalibus simplicibus gaudet, cum hac confudit. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

H h

3. **CARDAMINE asarifolia.**

*C. foliis simplicibus subcordatis. Sp. pl. 913.*

*Nasturtium montanum, asari folio. Bocc. ficc. 5. t. 3.*

*Herm. par. 203. t. 203. Raj. hist. 816.*

*Nasturtium alpinum, palustre rotundifolium, radice repente. Morif. hist. 2. p. 224.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 273.*

*Hasselwurzblättriges Schaumkraut. W.*

*Habitat in alpibus Italicis. 4 (v. l.)*

4. **CARDAMINE nudicaulis.**

*C. foliis simplicibus lanceolatis sinuato-dentatis, caulibus nudis. Sp. pl. 913.*

*C. foliis ex lineari-lanceolatis sinuato-dentatis, caulibus nudis, siliquis compressis, inter semina strictis.*

*Gmel. sib. 3. p. 273. n. 43. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 273.*

*Nacktsieliges Schaumkraut. W.*

*Habitat in Sibiria. D Gmelin.*

*Siliquae lanceolatae Lunariae. Flores non vidi.*

\*5. **CARDAMINE nivalis.**

*C. foliis caulinis radicalibusque simplicibus oblongis dentatis. W.*

*Cardamine nivalis. Pall. itin. 2. app. n. 113. t. U.\**

*Schnee Schaumkraut. W.*

*Habitat in summis alpibus Altaicis. 4*

*Totâ glaberrima et pallide virens. Folia oblonga dentata, radicalia basi in petiolum attenuata, caulina sessilia. Flores albi parvi. Siliquae reflexae. W.*

\* \* *Foliis ternatis.*

6. **CARDAMINE resedifolia.**

*C. foliis inferioribus indivisis, superioribus trilobis pinatisque. Syst. veg. 496. Gmel. tub. p. 200. Allion.*

*ped. n. 950. t. 57. f. 2. Hoffm. germ. 233. Roth. germ.*

*I. 287. II. 118.*

*C. foliis inferioribus indivisis, superioribus trilobis. Sp. pl. 913.*

*Nasturtium alpinum minus; resedae folio. Bauh. pin.*

*104. prod. 45. t. 45. Bocc. mus. 2. p. 41. t. 46.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 274.*

*Resedablättriges Schaumkraut. W.*

*Habitat in alpibus Helveticis, Pyrenaeis, in Germania.*

*4 (v. l.)*

*Folia inferiora ovata, indivisa; superiora trilobohastata, s. subternata lobis lateralibus minoribus. Statura C. bellidifoliae.*

*Cum C. bellidifolia conjungit b. Hallerus.*

7. **CARDAMINE trifolia.**

*C. foliis ternatis obtusis, caule subnudo. Sp. pl. 913. Jacq. vind. 654. aufir. t. 27. Mill. dict. n. 7. Georgi it. I. p. 224. Scop. carn. n. 815. Crantz. aufir. p. 43. Hall. helv. n. 475.*

*C. foliis ternatis. Fl. suec. 563; 589.*

*C. foliis ternatis crenatis, caule simplici. Fl. lapp. 257. Hort. cliff. 336. Roy. lugdb. 346.*

*C. alpina trifolia. Clus. hist. 2. p. 127.*

*Nasturtium alpinum trifolium. Bauh. pin. 104.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 275.*

*Dreyblättriges Schaumkraut. W.*

*Habitat in alpibus Helveticis, Lapponicis etc. locis umbrosis sylvaticis. 4 (v. l.)*

\*8. **CARDAMINE scutata.**

*C. foliis ternatis scutatis crispis, caule subnudo. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 399.*

*Cardamine trifolia. Thunb. jap. 260.\**

*Schildförmiges Schaumkraut. W.*

*Habitat in Japonia. 4*

*An foliola peltata? W.*

9. **CARDAMINE africana.**

*C. foliis ternatis acuminatis, caule ramosissimo. Sp. pl. 9. 4. Vahl symb. 2. p. 77.*

*Nasturtium africanum, foliis ternis, facie christophoriana. Herm. par. 202. t. 202.*

*Nasturtium africanum, floribus albis spicatis, foliis ternis christophoriana facie. Pluk. alm. 152. t. 101. f. 3.*

*Raj. suppl. 414.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 275.*

*Africanisches Schaumkraut. W.*

*Habitat in Africa, Arabia et insula Borbonia.*

*Caulis pedalis erectus angulatus villosus. Folia ternata longe petiolata. Foliola petiolata pollicaria, lateralia parum minoria, altero latere breviora, omnia ovata, secundum venas utrinque pilis adspersa, acuminata mucronata obtuse serrata, basi et acumine integerrima.*

*ferraturis mucronatis.* Pedunculus ex apice caulis et ramulorum. Flores corymbofi, demum racemofi parvi pauci. Siliqua sesquipollicaris compressa. Vahl l. c.  
\* \* \* Foliis pinnatis.

10. **CARDAMINE** *chelidonia.*

C. foliis pinnatis, foliolis obtusis quinis inciso-dentatis. W.

C. foliis pinnatis, foliolis quinis incisis. *Sp. pl.* 914.

C. glabra, chelidonii folio. *Tournef. inst.* 224. *Barr. ic.* 156. *Mill. dict. n.* 10.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 276.

Schöllkrautblättriges Schaumkraut. W.

*Habitat in Italia.* (v. l.)

\*11. **CARDAMINE** *thalictroides.*

C. foliis simplicibus, ternatis, pinnatisque, foliolis obtusis quinis trilobis. W.

*Cardamine thalictroides.* *Allion. ped. n.* 951. t. 57. f. 1.\*

C. (*Plumieri*) foliis ternatis et pinnatis simplicibusque, foliolis oblique lobatis subrotundis, petalis calyce triplo longioribus. *Vill. delph.* 3. p. 359. t. 38.\*

C. annua exiguo flore. *Tournef. inst.* 224.

*Nasturtium montanum nanum, rotundo thalictri folio pyrenaicum.* *Bocc. mus.* 171. t. 116.

Thalictrumartiges Schaumkraut. W.

*Habitat in alpebus Italiae, Galliae.* ♂ (v. l.)

*Admodum affinis praecedenti, sed diversa videtur, foliis simplicibus et ternatis, atque foliolis in pinnato folio trilobis non dentatis.* W.

\*12. **CARDAMINE** *macrophylla.* W.

C. foliis pinnatis, foliolis quinis septenisve ovatis acuminatis inaequaliter dentatis. W.

*Cardamine chelidonia.* *Pall. it.* 3. p. 34. *Lepich. it.* 1. p. 243.

*Silybrium foliis pinnatis, pinnis ovatis ferratis.* *Gmel. sib.* 3. p. 269. t. 62. bona.

Großblättriges Schaumkraut. W.

*Habitat in Sibiria.* ♀ (v. l.)

*Caulis erectus pedalis vel sesquipedalis. Folia pinnata magna, fere ut in Potentilla pensylvanica, e foliolis quinis, vel septenis composita. Foliola ovata acuminata subsessilia inaequaliter dentata. Flores videntur*

*purei. Icon. Gmelini optima; sed flores sunt fere duplo majores. W.*

### 13. CARDAMINE *impatiens*.

*C. foliis pinnatis incisis stipulatis, floribus apetalis. It. IV. goth. 26. Mill. dict. n. 4. Crantz. austr. p. 44. Scop. carn. n. 816. Vill. delph. 3. p. 359.\* Leers. herb. n. 522. Pollich. pal. n. 619 Flor. dan. t. 735. Hoffm. germ. 233. Roth. germ. 1. 287. Il. 118.*

*C. foliis pinnatis, imis obtuse lobatis, caulinis acute dentatis, floribus apetalis. Hall. helv. n. 471.*

*C. foliis pinnatis, pinnis laciniatis. Hort. cliff. 336. Fl. suec. 561; 588. Roy. lugdb. 345. Sauv. monsp. 255.*

*C. foliis pinnatis: foliolis laciniatis, petalis fugacissimis. Hudf. angl. 294.*

*Sifymbrii cardamines species quaedam insipida. Bauh. hist. 2. p. 886. Barr. ic. 153.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 276.*

*Spring-Schaumkraut. W.*

*Habitat in Europae nemoribus ad radices montium, ♂ (v. l.)*

*Florum unicum cum Corolla petalis albis, majoribus quam in parviflora reperi 1764; diversa tamen a C. parviflora.*

*Nulla petala vidit Pollich. l. c. et Leers. Adesse petala, sed fugacia alii mecum asserunt. R.*

### 14. CARDAMINE *parviflora*.

*C. foliis pinnatis exstipulatis, foliolis linearibus integerrimis obtusis, floribus corollatis. W.*

*C. foliis pinnatis exstipulatis, foliolis lauceolatis, obtusis, floribus corollatis. Sp. pl. 919. Mill. dict. n. 2. Vill. delph. 3. p. 360.*

*Sifymbrium pinnis foliorum pinnatis, pinnulis linearibus glaberrimis. Gmel. sib. 3. p. 270. t. 64.*

*C. foliis pinnatis foliolis linearibus. Ger. prov. 357.*

*Nasturtium pratense, parvo flore. Bauh. prod. 44.*

*Nasturtium pratense, flosculis minimis. Moris. prael. 290. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 277.*

*Kleinblütiges Schaumkraut. W.*

*Habitat in Europa australi, Sibiria. ☉ (v. l.)*

*Simillima C. impatienti, a qua differt: Canle brevior, minus acutangulo. Foliis non stipulatis: foliolis*

*lanceolatis obtusis vix dentatis, nec infimis palmatis, sed ovatis glabris. Stamina corolla breviora. Siliquae dimidio minores, erectae in pedicellis horizontalibus.*

*Quae in Germania ab auctoribus indicatur, est ut bene monuit Hallerus varietas C. hirsutae. Folia in foliis superioribus linearia in inferioribus lanceolata, omnia obtusa integerrima. W.*

\*15. **CARDAMINE pensylvanica.**

*C. foliis pinnatis, foliolis angulato-dentatis obtusis. W.*

*Cardamine pensylvanica. Mühlenberg in litt.*

*Pensylvanisches Schaumkraut. W.*

*Habitat in Pensylvania. (v. l.)*

*Caulis erectus ut tota planta glaber, ramosus. Folia pinnata e foliolis quinque vel septem composita. Foliola subrotundo-oblonga obtusa dentibus magnis binis in utroque latere instructa, unde quasi angulata, terminale duplo majus basi attenuatum. Foliola in summis foliis lanceolata obtusa integerrima, terminale cuneiforme plerumque trifidum. Flores non vidi. Siliquae angustae erectae. W.*

16. **CARDAMINE graeca.**

*C. foliis pinnatis: foliolis palmatis aequalibus petiolatis.*

*Sp. pl. 915. Roy. lugdb. 345. Hort. ups. 188. Mill. dict. n. 5.*

*Sic minimo Prosperi Alpini affinis, siliculis latis. Bocc. sicc. 84. t. 44. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 278.*

*Griechisches Schaumkraut. W.*

*Habitat in Sicilia, Corsica, insulis Graeciae. ☉ (v. v.)*

*Caulis brevis. Folia foliolis 9, ovatis, semipalmatis obtusis. Calyx erectus. Corolla alba.*

17. **CARDAMINE hirsuta.**

*C. foliis pinnatis; floribus tetrandris. Hort. cliff. 336.*

*Fl. suec. 562; 587. Roy. lugdb. 345. Gron. virg.*

*99. Mill. dict. n. 3. Gunn. norv. 195. Hoffm. germ.*

*233. Pollich. pal. n. 620. Weber spicil. p. 18. Flor.*

*dan. t. 148. Roth. germ. I. 288. II. 119.*

*C. caule foliisque pinnatis, hirsutis, pinnis subrotundis.*

*Hall. helv. n. 472.*

*Nasturtium aquaticum minus. Bauh. pin. 104.*

*Sisymbrium aquaticum alterum. Cam. epit. 270.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 279.*

Behaartes Schaumkraut. W.

*Habitat in Europae arvis, hortis, arvis. ☉ (v. v.)*

Flores tetrandri Hallero et Linnæo; semper tetradynami Oedero et Webero. R.

\* 18. **CARDAMINE latifolia.**

C. foliis quinato-pinnatis, foliolis dentato-subangulatis glabris. *Vahl. symb. 2. p. 77.*

Nasturtium pyrenaicum aquaticum latifolium purpurascente flore. *Herm. par. 203. t. 204.*

Breitblättriges Schaumkraut. W.

*Habitat in Hispania.*

Planta tota glabra. Caulis ascendens simplex pedalis. Folia petiolata remota pinnata cum impari bijuga. Foliola oblonga pollicaria, terminale subrotundum duplo majus, margine inaequalia, denticulo uno alterove. Flores corymbosi plures. Pedunculi pollicares. Calycis foliola oblonga margine membranaceo, corolla triplo breviora. Petala purpurea unguicularia, leviter emarginata. *Vahl l. c.*

19. **CARDAMINE pratensis.**

C. foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lanceolatis. *Mill. dict. n. 1. Gort. ingr. 104. Crantz austr. p. 44. Gunn. norv. n. 10. Pollich pal. n. 621. Hoffm. germ. 234. Kniph. cent. 12. n. 20. Blackw. t. 223. Roth germ. I. 288, II. 120. Scop. carn. n. 819.*

C. foliis pinnatis: foliolis subrotundis integris. *Fl. succ. 559; 585. Dalib. parif. 198.*

C. foliis pinnatis, caule erecto. *Fl. lapp. 158. Hort. cliff. 336. Roy. lugdb. 345.*

C. foliis pinnatis, radicalibus subrotundis, caulinis linearibus. *Hall. helv. n. 473.*

Turritis foliis pinnatis; caule terete. *Scop. carn. ed. I. p. 518.*

Nasturtium pratense, magno flore. *Bauh. pin. 104.*

Flos cuculi. *Dod. pempt. 592.*

β. Nasturtium pratense, folio rotundiore, flore majore. *Bauh. pin. 104.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 279.*

Wiesen-Schaumkraut. W.

*Habitat in Europae pascuis aquosis. ♀ (v. v.)*

20. **CARDAMINE** *amara*.

*C. foliis pinnatis, foliolis omnibus subrotundis, caule basi stolonifero.* W.

*C. foliis pinnatis, axillis stoloniferis.* *It. Westgoth.* 76.\*  
*Mill. dict. n. 6. Gort. ingr. 104. Gunn. norv. n. 43.*  
*Pollich pal. n. 622. Hoffm. germ. 234. Roth germ.*  
*I. 288. II. 121.*

*C. foliolis pinnatis uniformibus, caule hirsuto basi stolonifero.* *Vill. delph. 3. p. 362. t. 39.*

*C. foliis pinnatis, foliolis subrotundis angulosis.* *Hall. helv. n. 474. Fl. suec. 560; 586. Dalib. parif. 199.*

*Nasturtium aquaticum majus et amarum.* *Bauh. pin. 204. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 281.*

*Bitteres Schaumkraut.* W.

*Habitat in Europae septentrionalioris nemoribus.* 4  
(v. l.)

*Stolones non videt Hallerus l. c. R.*

\* 21. **CARDAMINE** *granulosa*.

*C. foliis radicalibus simplicibus subrotundis longissime petiolatis, caulinis pinnatis, foliolis lanceolatis, radice granulata.* W.

*C. (granulosa) foliis radicalibus subrotundis integris, caulinis pinnatis.* *Allion. auct. fl. pedem. p. 16. n. 953.\**

*Nasturtium pratense odoratum radice granulis tuberosa.*  
*Bauh. pin. 104.*

*Körniges Schaumkraut.* W.

*Habitat in pratis collium Taurinesium.* 4 (v. l.)

*Radix squamoso-granulata fibrosa. Caulis fere semipedalis erectus simplicissimus. Folia radicalia simplicia subrotunda basi in petiolum decurrentia integerrima quadrilinearia. Petioli filiformes biunciales. Folia caulina pinnata, foliolis lanceolatis obtusis integerrimis. Flores albi. Petala obtusa non emarginata calyce triplo longiora. Similis C. pratensi.* W.

22. **CARDAMINE** *virginica*.

*C. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis basi unidentatis,*  
*Gron. virg. 99. Pet. gaz. t. 105. f. 18.*

*Alyssum foliis radicalibus pinnatis in orbem positis; caulinis lanceolatis, siliculis compressis.* *Gron. virg. I. p. 170.*



Nasturtium, bursae pastoris folio, virginianum, flore albo, siliqua compressa. *Pluk. alm.* 251. t. 101. f. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 282.

Virginisches Schaumkraut. W.

*Habitat in Virginia.*

Folia radicalia in orbem digesta, pinnata: foliolis numerosis, fere imbricatis, sub lanceolatis, a latere postico denticulo uno brevi juxta basin. Caulis minus foliosus: foliis raris, saepius linearibus, integris. Habitat Bursae pastoris.

Cardamine petraea est planta valde dubia, synonyma enim omnia ad Arabim hispidam spectant. W.

## 1238. SISYMBRIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1089.

Siliqua dehiscens valvulis rectiusculis. Calyx patens. Corolla patens.

\* Siliquis declinatis brevibus.

### 1. SISYMBRIUM Nasturtium.

S. siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Hort. cliff.* 336. *Fl. suec.* 552: 592. *It. scan.* 278. \* *Mat. med.* 161. *Roy. lugdb.* 340. *Gron. virg.* 170. *Dalib. paris.* 203. *Pollich. pal. n.* 623. *Scop. carn. n.* 820. *Flor. dan. t.* 690. *Hoffm. germ.* 234. *Roth. germ. I.* 289. *II.* 124.

S. foliis pinnatis, pinnis subrotundis, spicis sessilibus. *Hall. helv. n.* 482.

Turritis foliis pinnatis, caule angulato. *Scop. carn. ed.* 1. p. 518. n. 5.

Sisymbria Cardamine. *Fuchf. hist.* 723.

Nasturtium aquaticum supinum. *Bauh. pin.* 104. *Tabernaem.* 455. *Blackw. t.* 260.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 283.

Quellen-Rauke. W.

*Habitat in Europa et America septentrionali ad fontes, inque Oriente.* 2 (v. v.)

### 2. SISYMBRIUM sylvestre.

S. siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. *Sp. pl.* 916. *Hort. cliff.* 336. *Fl. suec.* 2. n.

594. *Roy. lugdb.* 341. *Dalib. parif.* 204. *Sauv. monsp.* 228. *Fl. dan. t.* 931. *Gort. gelr.* 399. *Gmel. fib.* 3. p. 268. *Crantz austr. p.* 47. *Scop. carn. n.* 822. *Kniph. cent.* 12. n. 93. *Hoffm. germ.* 234. *Roth germ. I.* 290. *II.* 125.

*S. foliis pinnatis, pinnis dentatis dissitis. Hall. helv.* 485.

*Brachiolobus sylvestris. All. ped. n.* 1012. *t.* 56. *f.* 2. *bona.*

*Eruca palustris, nasturtii folio, siliqua oblonga. Bauh. pin.* 98.

*Eruca quibusdam sylvestris repens, flosculo luteo. Bauh. hist. 2. p.* 866.

*Eruca sylvestris minor, luteo parvoque flore. Bauh. pin.* 98.

*Eruca palustris minor. Tabernaem.* 447. *R.*

*Eruca sylvestris. Fuchsf. hist.* 263.

β. *S. (lippizense) siliquis declinatis brevibus, foliis inferioribus pinnatis, summis inferiorumque foliolis integerrimis. Wulfen in Jacq. Collect. 2. p.* 161. \* *Jacq. ic. rar. 3. t.* 505.

*Erysimum verum. Dalech. hist.* 653.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 285.

*Wald-Rauke. W.*

*Habitat in Helvetiae, Germaniae, Galliae ruderatis. 4 (v. v.)*

*Sisymbrium lippizense est forte varietas hujus foliolis integerrimis. W.*

### \*3. SISYMBRIUM *palustre.*

*S. siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ferratis, petalis calyce brevioribus. Leyff. hal. n.* 679. *Hoffm. germ.* 234. *Roth. germ. I.* 290. *II.* 127.

*S. (terrestre) siliquis declinatis turgidis, foliis pinnatifidis inaequaliter dentatis, radice simplici, petalis calyce brevioribus. Smith fl. britt. 2. p.* 701.

*Sisymbrium islandicum. Fl. dan. t.* 409.

*Radicula foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calyce brevioribus. Hall. helv. n.* 487.\*

*S. foliis pinnatifidis ferratis. Fl. suec.* 551.

*S. aquaticum foliis in profundas lacinias divisis. Tournef. inst.* 226. *Fl. lapp.* 262.

*S. palustre repens parvo flore. Vaill. parif.* 186.

*Radicula sylvestris live palustris. Bauh. hist. 2. p.* 866.

*Raphanus aquaticus*, foliis in profundas lacinias divisis.  
*Bauh. pin. 97. prod. 38.*

Sumpf-Rauke. W.

*Habitat in Germaniae, Hungariae, Galliae, Lapponiae, Islandiae locis udis.* ☉ (v. v.)

#### 4. *SISYMBRIUM amphibium.*

S. siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis oblongo-lanceolatis pinnatifidisve ferratis, petalis calyce longioribus. W.

S. siliquis declinatis oblongo-ovatis: foliis pinnatifidis ferratis. *Sp. pl. 917. Fl. suec. 593. Mill. dict. n. 3. Roth germ. I. 290. II. 126. Hoffm. germ. 234.*

##### α. *Sisymbrium palustre.*

S. foliis infimis capillaceis, summis pinnatifidis. *Hort. cliff. 337. Roy. lugdb. 341. Dalib. parif. 203.*

Radicula foliis integris et pinnatifidis, petalis calyce longioribus. *Hall helv. n. 486.*

*Sisymbrium Roripa. Scop. carn. n. 823.*

##### β. *Sisymbrium aquaticum.*

S. foliis simplicibus dentatis ferratis. *Hort. cliff. 336.*

*Fl. suec. 550. Roy. lugdb. 341. Fl. dan. t. 984.*

*Raphanus aquaticus, rapistri folio. Bauh. pin. 97.*

*Raphanus aquaticus alter. Bauh. prodr. 38. t. 38.*

##### γ. *Sisymbrium terrestre.*

S. aquaticum, foliis variis. *Vaill. parif. 185.*

*Rapistrum aquaticum. Tabernaem. 408. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 286.*

Waller-Rauke. W.

*Habitat in Europae septentrionalioris aquosis.* ♀ (v. v.)

*Variat foliorum forma, in α folia submersa sunt capillacea emersa pinnatifida; in β folia uniformia oblongo-lanceolata, in γ folia uniformia pinnatifida.* W.

#### 5. *SISYMBRIUM pyrenaicum.*

S. siliquis subovatis, foliis inferioribus lyratis; superioribus bipinnatifidis amplexicaulibus, styli filiformibus. *Sp. pl. 916. Vill. delph. 3. p. 341. t. 38. mala.*

S. foliis pinnatis: imorum pinnis oblongis, superiorum linearibus integris, siliquis ovalibus oligospermis. *De la Chenal. Act. helv. 4. p. 288. t. 15. bona.*

*Brachiolobus pyrenaicus. All. ped. n. 1013. t. 18. f. 1.*

*Alyssum foliis imis subrotundis, caulinis pinnatis, filiformibus, amplexicaulibus. Hall. helv. n. 488.*

*Raphanus minimus repens luteus, foliis tenuiter divisis.*

*Morif. hist. 2. p. 236. f. 3. t. 7. f. 1. Raj. hist. 809.*

*Alyssum foliis pinnatis multiformibus, floribus racemosis luteis. Allion. spec. pedem. 40. t. 7.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 287.*

*Pyrenäische Rauke. W.*

*Habitat in Pyrenaeis, Helvetici alpibus. 2 (v. v.)*

*Stylus capillaris. Silicula ovalis. Petioli amplexicaules.*

#### 6. SISYMBRIUM *tanacetifolium.*

*S. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis inciso-ferratis: extimis confluentibus. Sp. pl. 916. Roy. lugdb. 659.*

*Vill. delph. 3. p. 348.\**

*Eruca foliis pinnatis, pinnis acutissime ferratis. Hall. helv. n. 460. R.*

*Eruca tanacetifolia. Morif. hist. 2. p. 231. f. 2. t. 6. f. 19.*

*Eruca fruticosa, foliis tanacetifoliae, indica. Zan. hist. 86. t. 33.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 288.*

*Wurmkrautblättrige Rauke. W.*

*Habitat in Sabaudia, Helvetia. 2 (v. f.)*

#### \*7. SISYMBRIUM *ceratophyllum.*

*S. filiquis ellipticis, foliis lineari-subulatis pinnatifido-dentatis, caule adscendente. W.*

*S. foliis lineari-subulatis, dentibus remotis inaequalibus longiusculis, filiquis patentibus pedicello brevioribus. Desf. atl. 2. p. 82. t. 155.\**

*Hirschhornblättrige Rauke. W.*

*Habitat in arenis prope Cassam Africae borealis. ☉*

*Caulis basi ramosus, ramis adscendentibus. Folia lineari-subulata remote pinnatifido-dentata. Racemi longi. Flores flavi. Siliquae lanceolato-ellipticae stylo brevi terminatae, pedunculo breviores, erecto-patentes. W.*

#### \*8. SISYMBRIUM *coronopifolium.*

*S. filiquis linearibus incurvatis, foliis lanceolatis pinnatifido-dentatis pubescentibus, caule adscendente. W.*

*S. foliis pubescentibus pinnatifido-dentatis, laciniis distinctis, linearibus obtusiusculis, filiquis patentibus pedicellatis. Desf. atl. 2. p. 82. t. 154.\**

*Halbgefiederte Rauke. W.*

*Habitat in desertis arenosis ad Cassam in Africa boreali.*

*Caulis basi ramosus adscendens. Folia lanceolata pin-*

*natifido-dentata, pubescentia, dentibus subaequalibus linearibus obtusissimis. Flores flavi. Siliquae lineares incurvatae longitudine pedunculi reflexo-patentes. W.*

9. **SISYMBRIUM tenuifolium.**

S. filiquis erectis, foliis glabris subintegerrimis pinnatifidis bipinnatifidisque, supremis integris. *Smith brit. 2. p. 703.\**

S. foliis integerrimis, infimis tripinnatifidis, supremis integris. *Sp. pl. 917. Guett. stamp. 150. Dalib. par. 204. † Pollich. pal. n. 627. Hoffm. germ. 235. Roth. germ. I. 290. II. 128.*

*Brassica muralis. Hudf. angl. 290. Curt. lond.*

*Eruca foliis glabris pinnatis, pinnis linearibus difformibus. Hall. helv. n. 461.*

*Eruca foliis sinuato-dentatis, caule nudiusculo, radice perenni. Ger. prov. 369.*

*Sinapi erucae folio. Bauh. pin. 99.*

*Eruca tenuifolia perennis. Bauh. hist. 2. p. 861. Vaill. parif. 50.*

*Eruca sativa. Fuchf. 262.*

*Sinapi sylvestre. Dodon. 707.*

*Eruca sylvestris. Blackw. t. 266.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 289.*

*Dünnblättrige Rauke. W.*

*Habitat in Germania, Gallia, Helvetia. 4 (v. l.)*

\*10. **SISYMBRIUM sagittatum.**

S. pubescens, filiqua cylindraccis declinatis, foliis obovato-oblongis dentatis, radicalibus hastatis, caulinis sagittatis amplexicanlibus. W.

S. (*sagittatum*) pubescens, filiquis declinatis subcylindraccis recurvis, foliis obovato-oblongis sagittatis dentatis. *Ait. Kew. 2. p. 390.*

S. (*molle*) filiquis declinatis brevibus subcylindraccis, foliis mollibus denticulatis, caulinis hastatis oblongis. *Jacq. ic. rar. I. t. 122. Collect. I. p. 68.\**

*Pfeilblättrige Rauke. W.*

*Habitat in Sibiria. 4*

*Folia radicalia petiolata hastata vel subruncinata. W.*

\*11. **SISYMBRIUM amplexicaule.**

S. glabrum, filiquis compressis erectis, foliis dentatis, radicalibus obovatis, caulinis oblongis cordatis amplexicaulibus. W.

S. foliis glabris subdentatis amplexicaulibus, radicalibus obovatis, filiculis patentibus mucronatis pedicello brevioribus. *Desf. atl. 2. p. 81. t. 153.\**

Stielumfassende Rauke. W.

*Habitat in collibus Algeriae.* ☉

*Simillimum praecedenti, sed differt: glabritie omnium partium, radice annua, foliis radicalibus obovatis breve petiolatis, foliis caulinis oblongis cordatis. Flores sunt flavi ut in praecedente.* W.

\* \* *Siliquis sessilibus axillaribus.*

## 12. SISYMBRIUM *supinum.*

S. siliquis axillaribus subsessilibus solitariis, foliis dentato sinuatis. *Hort upf. 192.*

Erysimum caule decumbente, siliqua laterali subsessili. *Roy. lugdb. 343. Dalib. parif. 201.*

Eruca supina alba. siliqua singulari e foliorum alis erumpente. *Isnard. act. 1724. p. 295. t. 18. bona.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 290.*

Niedrige Rauke. W.

*Habitat Parisiis ad agrorum margines, inque Hispania, Gotlandia, Lugduni ad Rhodanum.* ☉ (v. v.)

*Sisymbrium supinum Gouan. illustr. 43 est diversa planta.* W.

## 13. SISYMBRIUM *polyceratium.*

S. siliquis axillaribus sessilibus subulatis aggregatis, foliis repando-dentatis. *Hort. upf. 193. Sauv. monsp. 283. Mill. dict. n. 5. Jacq. hort. t. 79.*

S. siliquis sessilibus extrorsum recurvis. *Hall. helv. n. 483. R.*

Erysimum siliquis in alis foliorum sessilibus. *Hort. cliff. 337.*

Erysimum polyceratium f. corniculatum. *Bauh. pin. 101.*

Erysimum alterum Mathioli siliquis parvis, quibusdam Dentaria. *Bauh. hist. 2. p. 864. R.*

Irio altera. *Dalech. hist. 653.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 291.*

Vielschotige Rauke. W.

*Habitat in Helvetiae, Italiae ruderatis.* ☉ (v. v.)

*Differt a praecedenti dentibus foliorum acutioribus, et siliquis non solitariis in foliorum axillis.* W.

\*14. SISYMBRIUM *filifolium*. W.

S. siliquis axillaribus subsessilibus compressis, foliis linearibus. W.

Fadenblättrige Rauke. W.

*Habitat in Sibiria ad Kumam fluvium.* ☉ (v. f.)

Planta admodum parva sesqui vel biuncialis. Folia subsessilia pollicaria glabriuscula linearia angustissima acutiuscula, summa quandoque bifida. Flores parvi. Petala alba linearia obtusa calyce parum longiora. Siliquae lineares compressae subsessiles obtusae scabriusculae. W.

15. SISYMBRIUM *burisfolium*.

S. racemo flexuoso, foliis lyratis, caule erecto folioso.

*Amoen. acad. 4. p. 323.\* Gouan. illustr. 42.*

S. foliis radicalibus ovatis, dentatis, caulinis pinnatis, pinnis linearibus, extrema maxima. *Hall. helv. n. 481.*

*Sisymbrium dentatum. Allion. ped. n. 1001. t. 57. f. 3.\**

Hesperis flore albo minimo, siliqua longa, folio profunde dentato. *Boerh. lugdb. 2. p. 20. Dill. elth. 179. t. 148. f. 177.*

*Draba palustris siliquosa major alpina, bursae pastoris folio. Cup. sic. 3.*

Hesperis (*dentata*) foliis dentato-pinnatifidis, caule laevi. *Sp. pl. 2. p. 928.*

Hesperis foliis multifidis. *Roy. lugdb. 338.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 291.*

Täfelhelkrautblättrige Rauke. W.

*Habitat in Sicilia, Italia, Helvetia, Pyrenaeis.* ☉ (v. v.)

\*16. SISYMBRIUM *torulosum*.

S. racemo erecto, siliquis sessilibus pubescentibus, foliis lanceolatis dentatis. W.

S. ramis patulis, caule hirsuto, foliis lanceolatis dentatis, siliquis erectis sessilibus subulatis torulosis pubescentibus. *Desf. atl. 2. p. 84. t. 159.\**

Behaartschotige Rauke. W.

*Habitat in arvis incultis prope Sbibam in regno Tunetano.*

Caules ramosi hispidi pilis brevibus patulis; Rami patentes hirsuti rigidi. Folia lanceolata pubescentia denticulata in petiolum brevem decurrentia. Flores parvi. Calyx hirsutus coloratus. Petala alba calyce paulo

*longiora. Siliquae graciles subulatae teretes torulosae erectae villosae. Desf. l. c.*

\* \* \* *Caule nudo.*

17. **SISYMBRIUM murale.**

S. subacaule, foliis lanceolatis sinuato-ferratis laeviusculis, scapis subscabris adscendentibus. *Sp. pl. 918. Vill. delph. 3. p. 351.\**

S. foliis lanceolatis sinuato-ferratis, caule subnudo erectiusculo. *Hort. cliff. 337. Boy lugdb. 341. Dalib. parif. 204.*

*Eruca viminea, iberidis folio, flore luteo. Barr. rar. 421. t. 131.*

β. S. (*Erucastrum*) subacaule, foliis lyrato-runcinatis laevibus, caule hispido. *Gouan. illustr. 42. t. 20.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 292.*

*Mauer-Rauke. W.*

*Habitat in Gallia, Italia. ☉ (v. v.)*

*Caules subscabri adpersi pilis raris rigidis, supra basin ramosi foliosique. Folia petiolata, lanceolata, oleracea, laevia, subtus pilis aliquot vagis adpersa, dentato ferrata. Scapi longi, primum decumbentes, dein adscendentes. Calyces semipatentes raris pilis, apice fornicati. Corollae luteae, obtusissimae, magnae diametro foliorum. Siliquae crassiusculae, compressiusculae, valvulis obsolete carinatis.*

*Paucissimis differt a S. monensi. Folia obsolete s. obiter remotissimeque ferrata.*

18. **SISYMBRIUM monense.**

S. acaule, foliis pinnato-dentatis subpilosis, scapis laevibus. *Sp. pl. 918. Lightf. scot. 1. p. 352. t. 15. f. 1. bona.*

*Eruca monensis laciniata, flore luteo majore. Dill. elth. 135. t. III. f. 135.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 293.*

*Monache Rauke. W.*

*Habitat in insula Mona Angliae, inque Hungaria. ♀ (v. l.)*

*Simillimum praecedenti magnitudine plantae, foliorum, florum, fructuum. Radix perennis. Folia fere pinnatifida, linearia, raris pilis adpersa: pinnis remotis, obtusiusculis, saepius septenis. Scapi erecti, laeves. Calyces clausi. Petala lutea, integra.*



\*19. SISYMBRIUM *repandum*. W.

S. acaule, foliis oblongis repando-sinuatis scapisque glabris, siliquis compresso-tetragonis. W.

Sisymbrium monense. *Vill. delph.* 3. p. 350. t. 39.\*

*Allion. ped.* n. 1003.

S. foliis sinuato-pinnatis, caulibus nudis simplicibus.

*Ger. prov.* 360.

Eruca perennis et saxatilis, radice crassa e rupe victoriae.

*Tournef. schol. bot.* 81. *Garid. aix* 162.

Ausgeschweifte Rauke. W.

*Habitat in rupe Victoriae Galloprovinciae et in agro Pedemontano.* 4 (v. l.)

*A. praecedente distinctissimum quacum antea conjunctum fuit. Differt foliis nunquam pinnatis, sed tantum sinuatis quandoque fere integerrimis, omnino glabris, siliquis longissimis biuncialibus compressis et valvulis medio sutura longitudinali elevata instructis; quae siliquis adsectum dat ac si tetragonae essent.* W.

\*20. SISYMBRIUM *Tillieri*.

S. caule subnudo paniculato, foliis glabris, radicalibus runcinato-sublyratis, caulinis basi pinnatifidis. W.

Sisymbrium Tillieri. *Bellard. app. alt. ad fl. pedem.*

Tillierische Rauke. W.

*Habitat in Valle Augusta.* ♂ (v. l.)

*Folia radicalia ut tota planta glabra uncialia petiolata runcinato-pinnatifida, lobo terminali subrotundo-quinqueangulo, reliquis laciniis parum majore. Caulis subfoliosus erectus apice e tribus vel quatuor racemis paniculatus. Folia caulina oblonga, inferiora runcinata basi pinnata, superiora oblonga obtusa dentata basi tenuissime pinnatifida. Flores flavi.* W.

21. SISYMBRIUM *vimineum*.

S. acaule, foliis lyratis laevibus, scapis adscendentibus, floribus minutis. *Sp. pl.* 919.

Eruca pumila sicula, burfae pastoris folio. *Bocc. sicc.* 19. t. 10.

Eruca, minimo flore, monspeliensis. *Bauh. hist.* 2. p. 862. *f. mala.*

Eruca vinealis, parvis luteis floribus. *Morif. blaef.* 263.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 294.

Schlanke Rauke. W.

*Habitat in Sicilia, Monspelii,*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

Facies *S. muralis et monensis*, sed Folia, licet parva et digiti longitudine, lyrata omnino *Barbareae*, obtusa, laevia. Scapi filiformes, erectiusculi. Flores lutei, *Sophiae* floribus non majores. Petala erecta, obtusa, vix calyce duplo longiora.

## 22. SISYMBRIUM *Barrelieri*.

*S.* caule subnudo, ramoso, foliis radicalibus runcinatis dentatis hispida. *Sp. pl.* 919.

*Eruca sylvestris minor lutea*, burfæ pastoris folio italica.

*Barr. ic.* 1016. *bona.* *Bauh. pin.* 98. *prodr.* 39.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 295.

*Barrelierfche* Rauke. W.

*Habitat in Hispania, Italia.* *Loesling.* ☉

Folia radicalia, plurima, lyrata, dentata ut in *Taraxaco*, licet vix pollicaria, hispida undique setis pelucidis. Caulis erectus, rarius hispidus, ramis paucis, sub quibus folium subulatum. Calyces laeves. Petala lutea, oblonga, majuscula, integra. Siliquae oblongae, ad semina torulosae.

*Affine sequenti sed Flores flavi.* W.

## 23. SISYMBRIUM *arenosum*.

*S.* caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulodentatis hispida pilis ramosis. *Fl. jucc.* 2. n. 597.

*Crantz. austr.* 47. *Hoffm. germ.* 235.

*Eruca foliis scabris, semipinnatis, pinnis rectangulis, rareriter dentatis.* *Hall. helv.* n. 462.

*Arabis arenosa.* *Scop. carn.* n. 837. t. 40. *Roth. germ.* I. 285. II. III.

*Eruca caerulea in arenosis proveniens.* *Bauh. pin.* 99. *prodr.* 40. f. mala. *Barr. ic.* 196.

*Eruca sylvestris major minorque, foliis subasperis in orbem sparsis.* *Loef. pruss.* 68. t. 13. *bona.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 295.

*Sand-Rauke.* W.

*Habitat in Germania, Helvetia.* ☉ (v. v.)

Folia Radicalia plurima, lanceolato-lyrata, hispida utrinque pilis ramosis bifidis f. trifidis; Caulina lanceolata, dentata, similiter hispida. Caulis hirtus pilis raris simplicibus. Calyces glabri. Corollae subviolaceae.

## 24. SISYMBRIUM *valentinum*.

*S.* caule simplici erecto superne glabro, foliis lanceolatis hispida antrorsum dentatis. *Sp. pl.* 920.

*Erucula hirsuta*, floribus albis. *Barr. rar.* 423. *t.* 195.

*f.* 1. *Bocc. mus.* 2. *p.* 84. 180.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 295.

Valentinische Rauke. W.

*Habitat in Regno Valentino, Madriti. Loesling.* ☉

Caulis erectus, teres, pedalis, tenuior, vix ramosus, inferne raris pilis adpersus, superne laevis. Folia Radicalia angusto-lanceolata, dentibus quatuor validis antrorsum extantibus, hispida pilis albis simplicibus longioribus et brevioribus. Caulina rariora, lanceolato-linearia, non dentata. Pedunculi filiformes, flore longiores.

\* \* \* *Foliis pinnatis.*

## 25. SISYMBRIUM Parra.

*S. caulescens*, foliis runcinatis muricatis. *Mant.* 255.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 296.

Brasilische Rauke. W.

*Habitat in Parra. D. Vandelli.* ☉ ♂ H. U.

Folia radicalia in orbem expansa, copiosa; interioribus minoribus, spithamaea, runcinata (Bursae pastoris,) pagina superiore, praesertim margine muricata verrucis s. tuberculis sparsis, mucronatis, mucrone apice hyalino (tubercula plurimum evanescent in adultioribus;) pagina inferiore etiam scabra. Pinnae oppositae, basi latiores, dentatae, per paria basi superiori adpressae. Caulis altero anno prodit; primo acaulis est; utroque floret. Scapi erecti, laeves sirigis remotis sparsis, paniculati, pedales. Pedicelli remoti, patentes, stricti, flore longiores, uno alterove die ante anthesin (quod singulare) recurvati; erecti. Calyx tetraphyllus, clausus laevis, pallidus, basi tumidiore hians. Petala 4, obovata, obtusa, integerrima, distantia, calyce duplo longiora, flava. Nectarium Glandulis receptaculi 4: horum 2 oppositae, inter stamina longiora et calycis foliola interiora, subulatae, longiores quam in reliquis hujus classis, expellunt bases foliorum calycis, ut hient. Stamina tetradynama: 4 longitudine tubi corollae; 2 longitudine calycis. Germen cylindricum. Stylus subulatus. Stigma subcapitatum, longitudine Staminum. Siliqua teres, cylindrica, laevis, ad semina torulosa.

## 26. SISYMBRIUM asperum.

*S. siliquis scabris, foliis pinnatifidis: pinnis lineari-lan-*

ceolatis subdentatis, corollis calyce longioribus. *Sp. pl.* 920. *Sauv. monsp.* 283. †

*S.* foliis pinnatifidis: foliolis inaequaliter laciniatis, filiquis scabris. *Ger. prov.* 360.

*S.* foliis pinnatifidis subdentatis angustissimis. *Sauv. monsp.* 255.

Sinapi parvum, filiqua aspera. *Bauh. pin.* 499. *prodr.* 41.

Sinapi monspellanum, filiqua aspera hirsuta. *Bauh. hist.* 2. p. 858. *bona.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 297.

Scharfrüchtige Rauke. *W.*

*Habitat in Monspeli et Estremaduræ palustribus.* ☉ (v. l.)

*Planta palmaris.*

\*27. *SISYMBRIUM laevigatum.* *W.*

*S.* filiquis laevibus, foliis pinnatis, pinnulis inferiorum dentatis, superiorum foliorum linearibus integerrimis. *W.*

Glattfrüchtige Rauke. *W.*

*Habitat* - - - - ☉ (v. l.)

*Folia radicalia et infima pinnata, pinnis linearibus grosse dentatis; caulina pinnata, pinnis linearibus acutis integerrimis. Flores flavi. Siliquae sesquiuales glabrae. Simile praecedenti.* *W.*

\*28. *SISYMBRIUM millefolium.*

*S.* foliis supradecompositis tomentosis, petalis calyce majoribus. *Ait. Kew.* 2. p. 391.

*Sinapis (millefolia)* foliis bipinnatis, pinnulis ovatis serratis. *Jacq. ic. rar.* 1. t. 127. *Collect.* 1. p. 41.\*

Schaafgarbenblättrige Rauke. *W.*

*Habitat in rupestribus Teneriffae.* † (v. v.)

*Simile sequenti, sed: caulis fruticosus, folia incana, foliola oblonga, et petala calyce majora.* *W.*

29. *SISYMBRIUM Sophia.*

*S.* petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis.

*Fl. suec.* 553; 595. *Dalib. parif.* 204. *Mat. med.* 161.

*Crantz. austr.* p. 53. *Scop. carn. n.* 821. *Pollich.*

*pal. n.* 629. *Flor. dan. t.* 528. *Ludw. ect. t.* 73.

*Blackw. t.* 440. *Kniph. cent.* 6. n. 86. *Hoffm. germ.*

235. *Roth. germ. I.* 291. *II.* 130.

*S.* pinnis et pinnulis pinnatis, laciniis linearibus subhirsutis. *Hall, helv. n.* 484.

*S. corolla calyce minore, foliis multifidis linearibus. Fl. lapp. 261. Roy. lugdb. 341.*

*Descurea. Guett. stamp. 2. p. 164.*

*Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. Bauh. pin. 105.*

*Sophia chirurgorum. Lob. ic. 378.*

*Seriphium Absinthium. Fuchf. hist. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 298.*

*Feinblättrige Rauke. W.*

*Habitat in Europae maceriis, muris, tectis. ☉ (v. v.)*

### \*30. SISYMBRIUM album.

*S. foliis albido-pubescentibus pinnatis, foliolis obtusis basi attenuatis. W.*

*Sisymbrium album. Pall. it. 3. app. n. 102. t. U.\**

*S. foliis pinnatis, pinnis integerrimis confluentibus, siliquis brevioribus. Gmel. sib. 3. p. 269.*

*Weisse Rauke. W.*

*Habitat ad lacum Baikal in Sibiria. 4*

*Caules spithamaci erecti tenuissime tomentosi, plures e radice subliguosa. Flores canescentia, radicalia pinnata, pinnis obovatis saepius bipartitis, summis confluentibus; caulina pinnata, pinnis lanceolatis integerrimis obtusis, basi attenuatis, summis confluentibus. Petala calyce majora alba. Siliquae lineares teretes laeves erectae. W.*

### 31. SISYMBRIUM cinereum.

*S. foliis pubescentibus subcarnosis, pinnatis, pinnis lineari-filiformibus. W.*

*S. foliis angustis pubescentibus inaequaliter pinnatis, foliolis distinctis crassiusculis, siliquis compressis laxis linearibus pedicello longioribus. Desf. atl. 2. p. 83. t. 157.\**

*Graue Rauke. W.*

*Habitat in arenosis Africae borealis prope Causam. ☉*

*Planta spithamaea. Caulis erectus ramosus. Folia pubescentia subcarnosa; inferiora subbipinnata; superiora simpliciter pinnata, pinnis distinctis lineari-filiformibus obtusis. Flores dilute violacei. W.*

### 32. SISYMBRIUM altissimum.

*S. foliis runcinatis flaccidis: foliolis sublinearibus integerrimis, pedunculis laxis. Hort. ups. 193.\* Sawv. monsp. 229. Mill. dict. n. 7. Pall. it. 3. p. 556.*

*S. (Waltheri,) foliis hastato-pinnatis, subasperis; siliquis*

longissimis, striato, subquadrangulis; caule glabro.  
*Crantz. austr. p. 51. n. 6.*

*Erysimum* siliquis laxis, foliis hastato-pinnatis. *Hort. cliff. 338. Sauv. monsp. 284.*

*Erysimum* foliis sinapi, siliquis longissimis et strictissimis.  
*Buxb. cent. 5. p. 26. t. 51.*

*Erysimum* monspellanum, sinapios folio. *Walt. hort. 135. t. 22.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 299.*

Höchste Rauke. W.

*Habitat in Armenia, Sibiria, Austria.* ☉ (v. l.)

Calyx patentissimus, unde *Sinapios affinis.*

\*33. *SISYMBRIUM eckartsbergense.*

S. foliis runcinatis flaccidis margine scabris integerrimis, siliquis filiformibus inflexo patulis. W.

*Sisymbrium* austriacum. *Jacq. austr. t. 262?*

Eckartsbergische Rauke. W.

*Habitat in Thuringia?* ☉ (v. v.)

*Sub hoc nomine semina hujus saepius accepi. Simillimum praecedenti at differt: foliis margine scabris et potissimum siliquis multo angustioribus et brevioribus filiformibus inflexo-patulis nec divaricato-patentibus.* W.

\*34. *SISYMBRIUM pannonicum.*

S. foliis inferioribus runcinatis dentatis superioribus, pinnatis, pinnis linearibus integerrimis, siliquis rectangule patentibus. W.

S. (*pannonicum*) foliis caulinis superioribus pinnatis, pinnis linearibus integerrimis, extima elongata. *Ait. Kew. 2. p. 392. Jacq. ic. rar. 1. t. 123. Collect. p. 70.\**

S. (*Sinapios*) foliis radicalibus runcinatis dentatis, caulinis incis linearibus glabris, siliquis patentibus. *Retz. obs. 3. p. 37.\**

Ungarische Rauke. W.

*Habitat in Hungaria.* ☉ (v. v.)

\*35. *SISYMBRIUM erysimoides.*

S. foliis runcinato-lyratis dentatis glabris, siliquis rectangule patentibus subpedunculatis. W.

S. erectum, foliis glabris pinnatifidis inaequaliter denta-

tis, lobo terminali majore, filiquis subulatis sessilibus horizontalibus. *Desf. atl. 2. p. 84. t. 158.*  
Hederichartige Rauke. W.

*Habitat in arenosis regni Tunetani prope Kerwan.*

Folia glabra pinnatifida, laciniis oblongis apice dentatis, terminali maxima rhombea inciso-dentata. Racemi longi. Flores exigui albi. Siliquae lineares unciales et ultra horizontaliter patentes fere sessiles. W.

### 36. SISYMBRIUM Irio.

S. foliis runcinatis dentatis nudis, caule laevi, filiquis erectis. *Fl. suec. 2. n. 596. Amoen. 4. p. 279.\* Mill. dict. n. 8. Pall. it. 3. p. 681. Jacq. austr. t. 322. Vahl symb. 2. p. 77. Hoffm. germ. 236. Roth germ. I. 291. II. 132.*

S. (pinnatifidum) filiquis glabris, foliis lyrato-pinnatifidis. *Forsk. descr. 118.*

Erysimum foliis lyrato-pinnatis: extimo hastato. *Fl. suec. 556. Dalib. parif. 201. Sauv. monsp. 284.*

Erysimum latifolium majus glabrum. *Bauh. pin. 101.*

Erysimum II. *Tabern. hist. 840.*

Irio laevis apulus, erucae folio. *Col. ecphr. I. p. 264. t. 265.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 300.*

Langblättrige Rauke. W.

*Habitat in Europae cultis. ☉ (v. v.)*

*Differt a S. altissimo Foliis summis non in pinnas lineares longissimas sectis; Foliis omnibus magis dentatis; Caule brevior, minus glabro; Siliquis magis erectis, nec laxis subpendulis confer. Raj. extr. 123.*

### \*37. SISYMBRIUM Columnae.

S. foliis runcinatis dentatis et caule villosis subincanis, filiquis erectis. *Murr. Syst. veg. ed. 14. p. 596. Jacq. austr. 4. t. 323. Hoffm. germ. 236. Roth. germ. II. 133.*

Sisymbrium Irio. *Crantz. austr. 49.*

Rapistrum montanum Irionis folio. *Colum. ecphr. I. p. 266. t. 268.*

Columnasche Rauke. W.

*Habitat in Germaniae, Austriae, Italiae siccis. ☉ (v. l.)*

*Simile praecedenti at totum pubescens subincanum et flores pallidiores. W.*

### 38. SISYMBRIUM Loeseli.

S. foliis runcinatis acutis hirtis, caule retrorsum hispido.

*Amoen. acad.* 4. p. 322.\* *Reyg. ged.* 1. p. 167. n. 6.  
*Gouan. illustr.* p. 42. *Pollich. pal.* n. 630. *Jacq. austr.*  
 t. 324. *Kniph. cent.* 12. n. 92. *Hoffm. germ.* 236. *Roth*  
*germ.* I. 291. II. 133.

S. foliis hastato-pinnatis saepe hirtis, caule ramisque  
 pilis albis splendentibus, hispidis. *Crantz austr.* p.  
 48. n. 4.

Sinapi erysimo Tragi cognatum. *Bauh. hist.* 2. p. 857.

Erysimum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 107.

Erysimum hirsutum, filiqua erucae. *Loef. pruff.* 69.  
 t. 14.

Erysimum foliis pinnatis, extima pinna triangula, petio-  
 lis longis hirsutis. *Hall. goett.* 248.

Rapistrum montanum, irionis folio, macroleptoceratum.

*Colum. ecphr.* 1. p. 266. t. 268.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 300.

Löfelfche Rauke. W.

*Habitat in* Borussia, Gallia, Germania, etc. ☉ (v. l.)

\*39. SISYMBRIUM obtusangulum.

S. foliis pinnatifidis obtusis dentatis amplexicaulibus,  
 caule retrorsum hispido. W.

Sisymbrium obtusangulum. *Schleicher cat.* p. 48.

Eruca caule hirto, foliis semipinnatis, pinnis subrotun-  
 do-dentatis. *Hall. helv.* n. 459. (exclusis synonymis.)

Eruca inodora. *Bauh. hist.* 2. p. 862. bona.

Stumpfleckige Rauke. W.

*Habitat in* Helvetia. ☉ (v. l.)

*A Brassica Erucastro distincta planta.* Caulis ere-  
 ctus sulcatus pilis raris reflexis praesertim basin ver-  
 sus obsitus. Folia fere Pedicularidis Sceptri, pinna-  
 tifida, pinnis obtusis obtuse grosse dentatis, inferiori-  
 bus sensim minoribus, ultimum par pinnarum stipula-  
 rum instar caulem amplectitur. Flores flavi. Siliquae  
 obtuse tetragonae glabrae. W.

40. SISYMBRIUM orientale.

S. foliis runcinatis tomentosis, caule laevi. *Amoen.*  
*acad.* 4. p. 322.\*

Erysimum orientale, folio sonchi, flore sulphureo, fili-  
 quis longissimis. *Boerh. lugdb.* 1. p. 14. *Hall. goett.*  
 248.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 301.

Orientalische Rauke. W.

*Habitat in* Oriente. ☉ (v. l.)



41. *SISYMBRIUM barbareae.*

S. foliis simplicibus spathulato-ovatis dentatis amplexicaulibus nudis. *Sp. pl.* 921.

Sisymbrium orientale, barbareae facie, plantaginis folio.

*Tournef. cor.* 16.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 301.

Stumpfblättrige Rauke. W.

*Habitat in Oriente. Burmannus* 24 (v. v.)

Simillimum *Eryfimo Barbareae. Planta insipida.*

Caulis angulatus. Folia radicalia integerrima, cordato-ovata.

\*42. *SISYMBRIUM lyratum.*

S. foliis inferioribus lyrato-runcinatis dentatis, superioribus lineari-lanceolatis remote dentatis. W.

S. (*lyratum*) foliis inferioribus sublyratis, superioribus inciso-laciniatis, siliquis linearibus obtusiusculis.

*Burm. ind. fl. cap.* 17.

Leyerblättrige Rauke. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* 24 (v. l.)

Folia caulina lineari-lanceolata remote grosse dentata. W.

43. *SISYMBRIUM catholicum.*

S. siliquis filiformibus laevibus, foliis pinnatis denticulatis caulinis. *Mant.* 93.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 301.

Portugiesische Rauke. W.

*Habitat in Hispania, Lusitania.*

Caules palmares s. pedales, laeves. Folia radicalia et caulina pinnata, laevia, fragilia: foliolis oblongis, serratis s. dentatis, ad apicem petioli saepe confluentibus. Racemus oblongus. Flores longius pedunculati. Petala flava, obovata, integra, magna. Calyx laevis. Siliquae remotae.

\*44. *SISYMBRIUM heterophyllum.*

S. foliis pinnatis, foliolis reniformibus subtrilobis, infimis pinnatifidis pilosis. *Forst. prod. n.* 250.

Verschiedenblättrige Rauke. W.

*Habitat in Nova Zeelandia.*

\*45. *SISYMBRIUM glaciale.*

S. siliquis filiformibus laevibus, foliis pinnatis, foliolis

reniformibus ciliatis. *Forst. in Comment. goett. 9. p. 36.\**

Eis-Rauke. W.

*Habitat in locis udis Terrae del Fuego fere sub ipsa nive. 24 (v. l.)*

*Caulis herbaceus palmaris teres laeviusculus simplex versus apicem dichotomus, ramulis floriferis erectis. Folia radicalia caespitosa, caulina alterna, omnia pinnata, foliolorum paria 3 s. 4 cum impari, impar reliquis majus reniforme subcrenatum rarius incisum, lateralibus sensim minora subrotunda obliqua, omnia ciliata subsessilia remotiuscula. Folia floralia pinnatifida. Flores albi pro mole plantulae majusculi. Affine S. heterophyllo tamen diversum. Forst. l. c.*

\* \* \* \* \* *Foliis lanceolatis integris.*

#### 46. SISYMBRIUM strictissimum.

S. foliis oblongo-lanceolatis dentatis pubescentibus petiolatis, siliquis patentibus. W.

S. foliis lanceolatis dentato-ferratis caulinis. *Hort. cliff. 337. Hort. upf. 192. Roy. lugdb. 341. Jacq. vind. 122. austr. t. 194. Crantz austr. p. 54. Hoffm. germ. 236. Roth germ. I. 291. II. 134.*

*Eruca caule paniculato, foliis nervosis, ovato-lanceolatis, integerrimis. Hall. helv. n. 458. R.*

*Draba lutea, siliquis strictissimis. Bauh. pin. 110.*

*Arabis quibusdam dicta planta. Cam. epit. 342.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 302.*

Steiffstielige Rauke. W.

*Habitat in Helvetiae, Italiae, Germaniae, Austriae, montibus asperis apricis. 24 (v. v.)*

*Folia utrinque pubescentia valdeque venosa. Antherae defloratae violaceae.*

*Siliquae patentissimae. Variat interdum foliis integerrimis. W.*

#### \*47. SISYMBRIUM pendulum.

S. foliis lanceolatis inciso-dentatis hispidis, siliquis pendulis. W.

S. caule erecto inferne piloso, foliis lanceolatis hirtis dentatis, siliquis planis linearibus glabris pendulis truncatis. *Desf. atl. 2. p. 82. t. 156.\**

Hängende Rauke. W.

*Habitat in Africae borealis arenosis prope Cassam.*

Caulis *subramosus erectus*. Folia *hispida lanceolata inciso-dentata*, basi in petiolum attenuata. Flores *flavi*. Siliquae *lineares longe pedunculatae pendulae*. W.

\*48. SISYMBRIUM *hispanicum*.

S. foliis lanceolatis dentatis sessilibus glabris, siliquis adpressis, caule ramoso divaricato. W.

S. siliquis cylindricis breviusculis erectis, foliis lanceolatis serratis sessilibus. *Jacq. ic. rar. I. t. 124. Collect.*

I. p. 69. \*

Spanische Rauke. W.

*Habitat in Hispania.* ♂

Caulis *erectus ramosus divaricatus*. Folia *alterna sessilia lanceolata obtuse dentata praesertim apicem versus, quandoque integerrima*. Racemi *longi*. Flores *flavi*, Siliquae *filiformes breves arcuatae adpressae*. W.

\*49. SISYMBRIUM *pumilum*.

S. foliis lanceolatis dentatis sagittatis amplexicaulibus pubescentibus, siliquis erecto-patentibus. W.

S. (*pumilum*) villosulo-subincanum, foliis radicalibus subruncinatis, caulinis sagittatis repando-dentatis, pedicellis fructus elongatis, siliquis tenuibus sursum arcuatis. *Stephan in litt.*

Zwerg-Rauke. W.

*Habitat in Persia boreali.* ☉ (v. l.)

Planta *digitatis vel spithamaea, tota incano-pubescentis*. Caulis *basi ramosus*. Folia *radicalia quadrilnearia obtusa runcinata; caulina semiuncialia amplexicaulia sagittata dentata*. Racemi *longissimi*. Flores *flavi*. Siliquae *lineares semiunciales erectae vel parum patentis*. W.

\*50. SISYMBRIUM *salsuginosum*.

S. foliis lanceolatis integerrimis cordatis amplexicaulibus glabris, siliquis patentibus. W.

Sisymbrium *salsuginosum*. *Pall. itin. 2. app. n. 114. t. V.*

Salz-Rauke. W.

*Habitat locis salis in Sibiria.* ☉

Planta *glaberrima glauca*. Folia *lanceolata integerrima acutiuscula cordata amplexicaulia*. Flores *parvi albi*. Siliquae *crassae erecto-patentes*. W.

51. *SISYMBRIUM integrifolium*.

S. foliis linearibus integerrimis, pedunculis glutinosis hispidis. *Sp. pl.* 922. *Gmel. sib.* 3. p. 270. t. 63. Hesperis caule ramosissimo, foliis linearibus, pedunculis hispidis. *Gmel.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 302.

Ganzblättrige Rauke. W.

*Habitat in Sibiria.* ☉ (v. l.)

Caulis *digiti longitudine*, Folia *linearia, glabra, obtusiuscula*. Racemi *terminales, pubescentes, viscidi*. Flores *majusculi, albi*. Siliquae *lineares*.

Variat *floribus luteis*. *Gmel. l. c. R.*

52. *SISYMBRIUM indicum*.

S. foliis lanceolato-ovatis ferratis petiolatis laevibus, siliquis subarcuatis. *Mant.* 93. *Burm. ind.* 140.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 303.

Indische Rauke. W.

*Habitat in India.* ☉

Caulis *subpedalis, erectiusculus, flexuosus, angulatus, laevis, inferius subramosus*. Folia *lato-lanceolata s. lanceolato-ovata, nuda, multum acuminata, petiolata exceptis supremis*. Racemi *terminales et axillares, foliis longiores*. Flores *minuti, albi: Petalis vix calyce longioribus*. Siliquae *teretes, levissime arcuatae*.]

\* 53. *SISYMBRIUM hispidum*.

S. caulescens, foliis petiolatis oblongis dentatis cauleque hispido. *Vahl symb.* 2. p. 77.

Sinapis (*Harra*) foliis ovalibus sinuatis hispidis, caule glabro, calycibus hispidis. *Forsk. descr.* 118.\*

Egyptische Rauke. W.

*Habitat in Aegypto.* W.

Planta *palmaris rarius vix spithamaea ramosa erecta tota hispida, pedunculis et siliquis exceptis*. Folia *pollicaria crassiuscula inaequaliter dentata avenia in petiolum desinentia*. Pedicelli *declinati unguiculares*. Siliquae *longitudine pedicelli lineares remotae*. *Vahl. l. c.*

## 1239. E R Y S I M U M.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1090.**Siliqua columnaris, exacte tetraëdra. Cal. clausus.*1. ERYSIMUM *officinale.*

E. siliquis spicae adpressis, foliis runcinatis. *Hort. cliff.* 337. *Fl. suec.* 554; 598. *Mat. med. ed. 2. n. 824.* *Pollich pal. n. 631.* *Flor. dan. t. 560.* *Ludw. ect. t. 187.* *Blackw. t. 28.* *Hoffm. germ. 237.*

Erysimum, foliis pinnatis, pinnis rectangulis acutis, extrema triangulari maxima, siliquis adpressis. *Hall. helv. n. 478.*

Silymbrium officinale. *Roth germ. I. 291. II. 131.*

Silymbrium (*officinarum Erysimum*) siliquis conicis, multangulis, spicae adpressis. *Crantz. austr. p. 54. n. 10.*

Erysimum vulgare. *Bauh. pin. 100.*

Verbena mas. *Fuchf. hist. 592.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 304.*

Arzeney - Hederich. W.

*Habitat in Europae ruderatis. ☉ (v. v.)*

2. ERYSIMUM *Barbarea.*

E. foliis inferioribus lyratis, lobo terminali rotundato, superioribus obovatis dentatis. *Smith fl. brit. 2. p. 706.\**

E. foliis lyratis extimo subrotundo. *Fl. suec. 557; 559.* *Gort. ingr. 106.* *Crantz. austr. p. 54. n. 11. sub Silymbrio.* *Scop. carn. n. 826.* *Pollich pal. n. 632.* *Hoffm. germ. 237.* *Roth. germ. I. 283. II. 106.*

E. foliis basi pinnato-dentatis apice subrotundis. *Fl. lapp. 264.* *Hort. cliff. 338.* *Roy. lugdb. 342.* *Dalib. paris. 202.*

E. foliis pinnatis, pinna extrema maxima, subrotunda. *Hall. helv. n. 479. R.*

Barbarea femina. *Tabernaem. 452. R.*

Eruca lutea latifolia f. Barbarea. *Bauh. pin. 98.*

β. Silymbrium orientale, barbareae facie, folio rotundo. *Tournef. cor. 16.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 304.*

Stumpfblättriger Hederich. W.

*Habitat in Europa. ♀ (v. v.)*

*Herba amara mucilaginofo nauseoso. Smith. l. c.*

\*3. ERYSIMUM *praecox*.

E. foliis inferioribus lyratis, superioribus pinnatifidis, laciniis lineari-oblongis integerrimis. *Smith. fl. brit.* 2. p. 707.

Erysimum Barbarea. *β. Sp. pl.* 922?

Silymbrium Erucae folio glabro minus et praecocius. *Tournef. inst.* 226.

Barbarea foliis minoribus et frequentius sinuatis. *Raj. synop.* 297.

Früher Hederich. W.

*Habitat in Angliae, Galliae herbidis ad fossas. ♂*

*A praecedente satis discrepat: foliis superioribus pinnatifidis, laciniis oppositis integerrimis, floribus pallidioribus, foliolis calycinis latioribus, siliquis triplo longioribus. Herba in acetariis grata, gustu omnino Silymbrii Nasturtii. Smith l. c.*

4. ERYSIMUM *Alliaria*.

E. foliis cordatis. *Hort. cliff.* 328. *Fl. suec.* 558; 600. *Mat. med.* 162. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib. parif.* 201. *Crantz. austr.* p. 27. *Hall. helv.* n. 480. *Scop. carn.* n. 825. *Pollich pal.* n. 633. *Ludw. ect. t.* 77. *Blackw. t.* 372. *Kniph. cent.* 3. n. 37. *Hoffm. germ.* 237.

Silymbrium Alliaria. *Roth. germ.* I. 291. II. 131.

Alliaria. *Bauh. pin.* 110. *Fuchs. hist.* 104. *Cam. epit.* 589. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 307.

Knoblauchduftiger Hederich. W.

*Habitat in Europae sepibus, cultis, umbrosis. ♂ f.*  
4 (v. v.)

5. ERYSIMUM *repandum*.

E. foliis lanceolatis repando-dentatis, racemis oppositifoliis, siliquis subsessilibus horizontalibus. W.

E. foliis lanceolatis dentatis, racemis oppositifoliis, siliquis racemosis subsessilibus, corollis minutis. *Amoen. acad.* 3. p. 415.\* *Jacq. austr. t.* 22. *Hoffm. germ.* 237. *Roth. germ.* II. 105.

E. (*ramosissimum*) ramosissimum, patens, diffusum. *Crantz austr.* p. 29. n. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 308.

Ausgeschweiffter Hederich. W.

*Habitat in Hispaniae, Bohemiae, Austriae, Thuringiae arvis. ☉ (v. v.)*

*Statura Silymbrii polyceratii, sed racemi oppositi-*

*folii longi. Siliquae filiformes. Caulis angulatus. Folia argute dentata.*

6. **ERYSIMUM cheiranthoides.**

E. foliis lanceolatis integerrimis, siliquis patulis. *Fl. lapp.* 263. *Hort. cliff.* 337. *Fl. suec.* 555; 601. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib parif.* 202. *Scop. carn. n.* 831. *Hall. helv. n.* 477. *Pollich. pal. n.* 634. *Jacq. anfir. t.* 23. *Flor. dan.* 731. *Hoffm. germ.* 237. *Roth. germ. I.* 282. *II.* 100.

Turritis foliis integris lanceolatis. *Guett. stamp.* 2. p. 165.

Myagrurn siliqua longa. *Bauh. pin.* 109.

Myagro similis planta siliquis longis. *Bauh. hist.* 2. p. 894. R.

Erysimum III. *Tabernaem. p.* 449. R.

Camelina, Myagrurn alterum thalpi effigie. *Lob. ic.* 225.

β. Cheiranthus scapigerus. *Willd. prod. n.* 663. t. 5. f. 10. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 308.

Leucojenartiger Hederich. W.

*Habitat ubique in Europae arvis.* ☉ (v. v.)

*Habitus simillimus Cheirantho Erysimoidi praeter flores minores et siliquas patulos. Stigmata in hac parva vix divisa, in sequenti quasi ex nodis duobus divaricatis confiructa.*

7. **ERYSIMUM hieracifolium.**

E. foliis lanceolatis remote dentatis, siliquis erectis. W.

E. foliis lanceolatis ferratis. *Sp. pl.* 923. *Roy. lugdb.* 342. *Fl. suec.* 2. n. 602. *Pollich pal. n.* 635. *Gunn. norv. n.* 513. *Fl. dan. t.* 923. *Hoffm. germ.* 237. *Roth. germ. I.* 283. *II.* 104.

E. (*hieracifolium*) radice bienni, ramis erectis, foliis lanceolatis denticulatis patentibus, siliquis subadpressis, valvulis fere longitudine dissepimenti. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 156.

Keiri sylvestre, foliis hieracii. *Rupp. jen. ed. Hall.* p. 77. a.

Leucoium luteum sylvestre hieracifolium. *Bauh. pin.* 201. *prodr.* 102.

Leucoium sylvestre inodorum, flore parvo pallidior. *Raj. hist.* 781.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 309.

Habichtskrautblättriger Hederich. W.

*Habitat in Germania, Suecia, Dania.* ♂ (v. v.)

\*8. *ERYSIMUM odoratum.*

*E. foliis lanceolatis remote argute dentatis, petalis subrotundis, siliquis erectis strictis, caule sulcato. W.*

*E. (odoratum) radice bienni, ramis patentibus, foliis lanceolato-linearibus repandis dentatis recurviusculis, siliquis patentibus, valvulis longitudine dissepimenti. Ehrh. Beitr. 7. p. 157.*

*Erysimum hieracifolium. Jacq. austr. t. 73. Hoff. synop. 372.*

*E. (pannonicum) foliis lanceolatis dentatis, flore specioso cheiranthi. Crantz. austr. 28.*

*Wohlriechender Hederich. W.*

*Habitat in Austriae et Hungariae agris atque vineis.*

♂ (v. v.)

*Ab E. hieracifolio foliis argute dentatis, siliquisque strictis diversum. Folia sunt glabra tamen pilis raris tri-vel quadripartitis stellatis passim obsita. W.*

\*9. *ERYSIMUM virgatum.*

*E. foliis lanceolatis subdentatis petalis lanceolato-obovatis, siliquis erectis strictis, caule ramossissimo virgato stricto. W.*

*E. (virgatum) foliis lanceolatis denticulatis glabris, caule erecto ramossissimo virgato, siliquis strictis stylo capitato emarginato terminatis. Roth. catal. bot. 1. p. 75.\**

*Ruthenförmiger Hederich. W.*

*Habitat - - - - - ♂ (v. v.)*

*Caulis erectus ramosus, ramis strictis virgatis. Folia fere triuncialia lanceolata integerrima glabra, ramae et juniora quandoque dentata. Siliquae erectae strictae. Differt e praecedente: caule jam a basi ramoso virgato, nec apice tantum ramis instructus, foliis longioribus saepissime integerrimis, floribus minoribus, petalis lanceolato-obovatis nec subrotundis. Caulis hujus speciei superne tantum sulcatus. W.*

\*10. *ERYSMIUM diffusum.*

*E. foliis linearibus planis subdentatis recurvatis, canescentibus scabris, siliquis erectis patentibus. W.*

*E. (diffusum) radice annua, ramis patentissimis, foliis linearibus subdentatis recurvis, floribus pedunculatis, siliquis patentibus, valvulis longitudine dissepimenti. Ehrh. Beitr. 7. p. 157.*



**E.** (*canescens*) foliis linearibus conduplicatis revolutis dentatis, caule fastigiato, siliquis patulis incanis. *Roth. catal. bot. I. p. 76.\**

**Cheiranthus alpinus.** *Jacq. austr. t. 75. Host. synop. 373.*

*Eruca angustifolia. Bauh. pin. 99.*

*Eruca sylvestris angustifolia. Lob. ic. 205.*

Ausgebreiteter Hederich. W.

*Habitat in Austriae, Helvetiae, Italiae, Hungariae agreribus et apricis asperis. ♂ (v. v.)*

**\*II. ERYSIMUM angustifolium.**

**E.** foliis linearibus canaliculatis integerrimis recurvatis canescentibus, siliquis erectis stylo longo terminatis. W.

**E.** (*angustifolium*) foliis linearibus canaliculatis subintegerrimis, floribus subsessilibus, siliquis pubescentibus, dissepimento valvulis multo longiore. *Ehrh. Beitr. 7. p. 155.*

**Cheiranthus canus.** *Piller et Mitterpacher iter per Pofegánam. p. 146. t. 15.*

Schmalblättriger Hederich. W.

*Habitat in arenosis Hungariae. ☉ (v. f.)*

*Tota planta canescens. Caulis erectus ramosus, ramis patulis erectis. Folia angustissima linearia canaliculata vix dentata recurvata. Flores flavi brevissime pedunculati. Siliquae erectae angulo acutissimo patentibus tetragonae crassae, stylo longissimo persistenti instructae. W.*

**\*I2. ERYSIMUM junceum.**

**E.** foliis linearibus glabris strictis, siliquis erecto-patulis, caule simplici apice ramosa. W.

**Cheiranthus junceus.** *Waldstein et Kitaibel.*

Binsenartiger Hederich. W.

*Habitat in pratis subsalsis Hungariae. ☉ ♂ (v. f.)*

*Caulis simplex erectus teres laevis et glaber, apice ramis simplicibus floriferis tribus vel quinque erectis subpatulis instructus. Folia linearia angustissima acutiuscula viridia glabra, nervo medio inferne prominente, erecta stricta, remota; inferiora quandoque utrinque dentibus binis vel tribus acutis donata. Flores flavi minores quam in praecedente. Siliquae angustae tetragonae glabrae erectae siigmate fere sessili coronatae. Pedunculi angulo acuto fere recto patuli. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

k k

\*13. ERYSIMUM *bicorne*.

E. foliis lanceolatis pilosis, siliquis apice bicornibus.

*Ait. Kew. 2. p. 394.*

Zweygehörnter Hederich. W.

*Habitat in Canariis.* ☉

Flores *parvi flavi*. Calyx *flavescens extus pilosus*. Siliquae *approximatae adpressae ex ancipiti tetragonae pilosae, tri- vel quadrilineares, apice bicornes*. Stylus *persistens capillaris longitudine cornuum*. Stigma *capitatum integrum*. *Ait. l. c.*

\*14. ERYSIMUM *quadricorne*.

E. foliis lanceolatis subdentatis pubescentibus, floribus apetalis, siliquis apice quadricornibus. W.

Silymbrium quadricorne *Stephan. in litt.*

Viergehörnter Hederich. W.

*Habitat in Sibiria igter Volgam et Kumam fluvium.*

☉ (v. l.)

Radix *simplicissime filiformis*. Caulis *biuncialis canus pubescens teres erectus, ramis aliquot brevibus instructus*. Folia *oblongo lanceolata-obtusiuscula basi attenuata utrinque interdum dente unico vel binis obtusis brevibus instructa, viridia pubescentia*. Flores *parvi pubescentes apetalii in racemo brevissimo vel axillares solitarii*. Siliquae *villosae lineares apice quadricornes, cornubus binis longioribus*. Stylus *crassus persistens cornubus duplo brevior*. Stigma *crassum emarginatum*. W.

## 1240. CHEIRANTHUS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1091.*

*Germen* utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus: foliolis duobus basi gibbis. *Semina* plana.

I. CHEIRANTUS *erysimoides*.

C. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule recto simplicissimo, siliquis tetragonis. *Fl. suec. 2. n. 693.\**

*Fl. dan. t. 229? Jacq. austr. t. 74. optima.*

*Erysimum cheiranthoides. Crantz austr. p. 28. R.*

*Erysimum foliis integris lanceolatis margine repando-dentatus.* Hort. upf. 192.

*Leucoium luteum sylvestre angustifolium.* Bauh. pin. 202.

*Leucoium sylvestre.* Clus. hist. 1. p. 299. Bauh. hist. 2. p. 873.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 310.*

*Hederichartige Leucoje.* W.

*Habitat in Germania, Helvetia, Hungaria, Gallia.* ♂ (v. l.)

*Radix biennis.*

*Caulis simplicissimus. Petala magnitudine C. Cheiri emarginata.* W.

\*2. CHEIRANTHUS *helveticus.*

*C. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto, siliqua tetragona stylo acuminata.* Murr. Syst. veg. ed. 14. p. 597. Jacq. hort. t. 9.

*Cheiranthus Boccone.* All. ped. n. 988. t. 58. f. 2.

*Hesperis foliis linearibus lanceolatis rariter dentatis, siliquis erectis tetragonis.* Hall. helv. n. 450.

*Leucoium minus angustifolium luteum.* Bocc. mus. 148. t. III.

*Schweizer-Leucoje.* W.

*Habitat in alpibus Helvetiae, Italiae.* ♂ (v. l.)

*Flores minores quam in praecedente. Petala non emarginata. Siliquae acutae.* W.

3. CHEIRANTHUS *alpinus.*

*C. foliis linearibus integris subtomentosis.* Mant. 93. Fl. lapp. ed. Smith p. 224.

*Gebirgs-Leucoje.* W.

*Habitat in alpibus Lapponiae, Sibiriae.* ♀ (v. l.)

*Simillimus C. erysimoidi, distinctus foliis incanis.* Mant.

*Caulis simplex nec ramosus. Folia radicalia ovalia petiolata. Flores sulphurei majusculi.* Smith l. c.

\*4. CHEIRANTHUS *lanceolatus.* W.

*C. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, petalis lanceolatis, caule villoso.* W.

*Lanzettenblättrige Leucoje.* W.

*Habitat in Tauria.* (v. l.)

*Caulis fere pedalis erectus simplicissimus laevis villosus, pilis patentissimis. Folia inferiora oblonga obtusain-*

*tegerrima petiolata, superiora oblongo-lanceolata obtusa integerrima in petiolum brevem attenuata, summa sessilia lanceolata angustiora obtusa sessilia. Racemus pauciflorus. Flores facis et magnitudine sequentis sed petala lanceolata. Siliquas non vidi. Possideo tantum unicum specimen. W.*

### 5. CHEIRANTHUS *Cheiri.*

*C. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. Hort. cliff. 334. Hort. upf. 187. Mat. 162. Roy. lugdb. 337. Guett. stamp. 2. p. 156. Dalib. parif. 197. Gort. gelr. 382. Mill. dict. n. 3. Ludw. ect. t. 157. Blackw. t. 179. Knorr. del. 1. t. V. 1. Kniph. cent. 2. n. 13. Hoffm. germ. 238. Roth. germ. I. 283. II. 106.*

*Leucoium foliis glabris, lanceolatis integerrimis. Hall. helv. n. 443.*

*Leucoium luteum vulgare. Bauh. pin. 202.*

*Leucoium luteum. Dod. pempt. 160.*

*β. Leucoium luteum, magno flore. Bauh. pin. 202.*

*γ. Leucoium luteum, serrato folio, flore grandiore. Bauh. pin. 202. prodr. 102.*

*δ. Leucoium luteum, pleno flore, majus. Bauh. pin. 202.*

*Leucoium, pleno flore, minus. Bauh. pin. 202.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 311.*

*Lack-Leucoje. W.*

*Habitat in Angliae, Helvetiae, Galliae, Hispaniae muris, tectis. ♂ 4 ♀ (v. v.)*

### 6. CHEIRANTHUS *fruticulosus.*

*C. foliis lanceolatis acutis subtus canescentibus, pubescentia simplicissima adpressa, caule fruticoso, ramis angulatis. Smith. brit. 2. p. 709.*

*C. foliis lanceolatis acutis glabris subferratis, caule fruticoso. Mant. 94.*

*Leucoium luteum minus fruticans. Barr. ic. 1228.*

*Leucoium luteum, vulgo Cheiri, flore simplici. Raj. synop. 291.*

*Viola petraea lutea. Tabern. ic. 688.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 312.*

*Strauchartige Leucoje. W.*

*Habitat in Hispania, Anglia. Cl. Alstroemer. ♀ (v. v.)*

*Simillimus C. Cheiri, sed palmaris. Rami angulati Folia lanceolata, subpetiolata, acuminata, laevia, du-*

*riuscula, ferraturis inferiorum paucis argutis. Flores octies minores, lutei, minus fragrantis: Petalis subrotundis, obsolete emarginatis. Antherae subcaeruleascentes. H. U.*

Caulis fruticulosus ramosissimus, ramis erectis foliosis angulatis subincanis apice floriferis. Folia conferta petiolata lanceolata acuta plerumque integerrima viridia, subtus praecipue setis simplicissimis adpressis tecta, et fere canescentia, inferiora subserrata. Flores lutei odori, calyce purpurascens, petalis emarginatis. Siliquae erectae teretiussculae canescentes. Stylus brevis. Stigma emarginatum. Semina non alata. *A. C. Cheira hortorum differt: foliis acutioribus subtus canescentibus, floribus minoribus luteis nec ferrugineo-sanguineis, modo haec sufficiant. Smith. l. c.*

### 7. CHEIRANTHUS callosus.

C. foliis lanceolatis integris callosis, caule angulato fruticoso. *Lin. suppl. 296.*

Dickblättrige Leucoje. W.

Habitat ad Cap. b. Spei. Thunberg. †

### 8. CHEIRANTHUS strictus.

C. foliis linearibus acutis glabris, caule fruticoso erecto. *Lin. suppl. 296.*

Steife Leucoje. W.

Habitat ad Cap. b. Spei. Thunberg. †

### \*9. CHEIRANTHUS tenuifolius.

C. foliis filiformibus integerrimis subsericeis, caule frutescente ramoso. *Ait. Kew. 2. p. 395.*

C. frutescens foliis linearibus integerrimis. *l'Herit. stirp. 1. p. 92.*

Feinblättrige Leucoje. W.

Habitat in Madera. † (v. l.)

Folia linearia angustissima patentia acuta, juniora canescentia. Petala flava obtusa. Siliquae lineares erectae stylo crasso terminatae. Stigma obtusum capitatum. W.

### \*10. CHEIRANTHUS mutabilis.

C. foliis lanceolatis acuminatis argute ferratis, caule frutescente, siliquis pedunculatis. *Ait. Kew. 2. p. 395. Curt. mag. 195. Hoffm. Comment. goett.\**

*C. frutescens*, foliis lanceolatis laxè ferratis. *VHerit. stirp.* I. p. 92.

Veränderliche Leucoje. W.

*Habitat in Madera.* † (v. v.)

Folia lanceolata angustia utrinque valde attenuata, cuspidato-ferrata. Flores primum flavescentes dein purpurei. Siliquae patentes angustissimae. Stigma sessile capitatum emarginatum. W.

\*II. CHEIRANTHUS *apricus*.

*C. hispidus* foliis lanceolatis basi subdentatis, siliquis erectis. W.

*Cheiranthus apricus.* *Stephan. in litt.*

Sonnliebende Leucoje. W.

*Habitat in Sibiria ulteriori.* ‡ (v. f.)

Tota planta more *Asperifoliarum hispida*. Caules *spithamaei simplicissimi*, plures ex una radice sublignosa. Folia lanceolata obtusiuscula integerrima vel dentibus remotis basin versus instructa, vel etiam a basi ad medium profunde dentata. Flores magnitudine et colore *C. annui*. Pedunculi patentes. Siliquae erectae strictae glabrae lineares stylo crasso et stigmate piloso terminatae. W.

12. CHEIRANTHUS *Chius*.

*C. foliis obovatis aveniis emarginatis*, siliquis apice subulatis. *Hort. upf.* 187. *Mill. dict. n.* 13. *Murray prodr.* 166.

*Hesperis caule ramosissimo*, foliis lanceolatis dentatis. *Hort. cliff.* 335. n. 3. *Roy. lugdb.* 337. n. 3.

*Hesperis siliquis hirsutis*, flore parvo rubello. *Dill. elth.* 180. t. 147 f. 178.

*Leucoium thlaspeos facie.* *Herm. par.* 192. t. 193.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 313.

Pfriemenschotige Leucoje. W.

*Habitat in Chio, in Russia.* *Lepechin. it.* I. p. 208. ☉

13. CHEIRANTHUS *maritimus*.

*C. foliis ellipticis obtusis nudis scabriusculis caule diffuso scabro.* *Mant.* 568. *Curt. mag.* 166.

*C. foliis lanceolatis acutiusculis*, caule diffuso, antheris eminentibus. *Amoen. acad.* 4. p. 280.\* *Spec. pl.* 2. p. 429. *Mill. dict. n.* 12.

*Hesperis maritima supina exigua.* *Tournef. inst.* 224.

*Leucoium maritimum parvum, folio crassiusculo. Bauh.*

*hist. 2. p. 877. Pluk. phyt. 432. f. 2.*

*Leucoium minus, flore violaceo. Barr. ic. 1127.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 313.*

Meerstrands-Leucoje. W.

*Habitat ad littora Maris mediterranei. ☉ (v. v.)*

*Caules ramosissimi, divaricati, diffusi, rigiduli, pedales, scabri pilis geminis adpressis. Folia ovali-lanceolata, obtusa, apice subreflexa, viridia, longius petiolata, rigidula, scabriuscula: superioribus obscure subdentatis. Racemus terminalis. Calyx clausus, laevis. Petala obcordata, rubra, mox-violacea. Antherae in fauce floris.*

\* 14. CHEIRANTHUS *parviflorus.*

*C. foliis lanceolatis repando-dentatis, siliquis sessilibus horizontalibus distantibus apice furcatis, W.*

*Cheiranthus parviflorus. Schousboe.*

Kleinblütige Leucoje. W.

*Habitat in Marocco. ☉ (v. v.)*

*Caulis erectus ramosus spithamaeus. Folia lanceolata repando-dentata viridia pilis stellatis pubescentia in petiolum brevem attenuata. Flores admodum parvi pallide violacei. Racemus fructiferus valde elongatus. Siliquae distantes sessiles biunciales teretes horizontales apice longe bifurcatae cum stigmatibus intermedio oblongo obtuso corniculis brevioribus. W.*

15. CHEIRANTHUS *salinus.*

*C. foliis lanceolatis obtusis integerrimis, caule erecto, antheris inclusis. Mant. 93.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 314.*

Salz-Leucoje. W.

*Habitat ad Sibiriae, Tatariae salinas, D. D. Lerche.*

‡ (v. v.)

*Simillimus C. incano, sed octies minor, totus laevissime tomentosus. Caules erecti, durant aliquot annos. Folia minime dentata. Corollae purpureae fauce flavescente. Stigma obtusum, crassiusculum, bifidum, minime tenue. Odor Ch. incani. H. U.*

\* 16. CHEIRANTHUS *bicuspidatus. W.*

*C. foliis lanceolatis acutis subdentatis pubescentibus, siliquis adpressis bicuspidatis. W.*

*Hesperis orientalis* glastifolio flore magno violaceo. *Tournef. cor.* 16.

Zweyspitzige Leucoje. W.

*Habitat in Armenia.* (v. l.)

*Tota planta pubescens. Caulis sesquipedalis erectus. Folia caulina (radicalia non vidi) lanceolata acuta sessilia basi dente uno alterove obsoleto. Flores colore et magnitudine sequentis sed petala magis lanceolata obtusa et parum longiora. Siliquae teretes adpressae stigmate bilamellato persistenti erecto coronatae.* W.

### 17. CHEIRANTHUS *incanus.*

C. foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, filiquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Hort. ups.* 187. *Hort. cliff.* 334. *Mill. dict. n.* 6. *et illustr.*

Leucoium, incano folio, hortense. *Bauh. pin.* 200. n. 1. 2. 4. 5. 6. 7.

*Viola alba et purpurea.* *Lob. ic.* 329.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 314.

Winter-Leucoje. W.

*Habitat in Hispaniae maritimis.* 4 ♀ (v. v.)

*Petala integra. Varietas flore albo foliis minus tomentosis et viridibus, sed non, ut Cheiri, rigidulis.*

### 18. CHEIRANTHUS *fenestralis.*

C. foliis conferto capitatis recurvatis undatis, caule indiviso. *Linn. dec.* 31. t. 16. *Mill. dict. n.* 10. *Jacq. hort. t.* 179.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 315.

Zwerg-Leucoje. W.

*Habitat - - - ♂ (v. v.)*

*Radix fibrosa. Caulis semipedalis, crassitie digiti, erectus, nudus. Folia in apice caulis, conferta in capitulum more brassicae, lanceolata, recurvata, sessilia, obtusa, undata, incana. Racemi floriferi stricti, erecti, altitudine caulis. Flores et Fructus Ch. incani, cui nimis affinis, vix tamen varietatem dicerem.*

### 19. CHEIRANTHUS *annuus.*

C. foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, filiquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. *Sp. pl.* 925. *Mill. dict. n.* 5. *Kniph. cent.* 12. n. 26.

Leucoium incanum minus. *Bauh. pin.* 200.



*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 316.*

Sommer-Leucoje. W.

*Habitat in Europae australis maritimis. ☉ (v. v.)*

*Petala emarginata.*

20. CHEIRANTHUS *littoreus.*

C. foliis lanceolatis subdentatis subtomentosis subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis tomentosis. *Sp. pl. 925. Mill. dict. n. II.*

*Leucoium maritimum angustifolium. Bauh. pin. 201.*

*Lencoium maritimum minus. Clus. hist. I, p. 298.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 316.*

Ufer Leucoje. W.

*Habitat in Maris mediterranei litoribus. ☉*

*Caulis pedalis, alterne ramosus, incanus. Folia alternata, lanceolata, carnosa, canaliculata, obtusa, obtuse dentata, incana.\* Racemi terminales. Petala obcordata, purpurascens, basi albida. Stamina longitudine tubi. Siliquae subulatae, angustae, aequales, folio non longiores, tomentosae.*

\* 21. CHEIRANTHUS *contortuplicatus.*

C. foliis radicalibus sinuato-dentatis, caulinis lanceolatis subdentatis, siliquis hispida revolutis. W.

*Cheiranthus contortuplicatus. Stephan. in litt.*

Aufgerollte Leucoje. W.

*Habitat in Sibiria versus Caucasum. (v. l.)*

*Caulis ramosus divaricatus spithameus tenuissime pubescens. Folia radicalia et infima caulina lanceolata sinuato-dentata fere pinnatifida; caulina lanceolata glabriuscula acuta utrinque dentibus 2 f. 3. remotis brevissimi obsoletis instructa. Flores magnitudine Erysimi cheiranthoidis violacei. Siliquae teretes obtusifusculae torulosae revolutae contortuplicatae hispidae. W.*

\* 22. CHEIRANTHUS *leucanthemus.*

C. foliis pubescentibus, radicalibus runcinatis, caulinis linearibus subdentatis siliquis erectis. W.

C. (*leucanthemus*) foliis linearibus hirtis, inferioribus runcinato-pinnatifidis, caule erecto, ramis paniculatis, siliquis tereinsculis rectis. *Stephan. in litt.*

Weisse Leucoje. W.

*Habitat in Persia boreali. (v. l.)*

*Planta pedalis erecta tota canescens. Caulis superne*

*paniculatus, ramis erectis. Folia radicalia semuncialia angusta runcinata; caulina fere uncialia angusta linearia, inferiora dente uno alterove instructa, superiora integerrima. Flores albi duplo minores quam in sequente. Siliquae teretes erectae stylo brevi persistenti. Stigma capitatum emarginatum. Hanc plantam detexit Celeb. Marschall ab Bieberstein. W.*

### 23. CHEIRANTHUS *tristis*.

*C. foliis linearibus sublinuatis, floribus sessilibus: petalis undatis, caule fruticoso. Sp. pl. 925. Gouan. illustr. 44.*

*C. foliis lanceolato-linearibus acutis glabris, filiquis teretibus. Hort. cliff. 332. Hort. upf. 188.*

*Leucoium minus; breviori folio, obsoleto flore. Barr. ic. 999. n. 2.*

*Leucoium minus, lavendulae folio, obsoleto flore. Bocc. mus. 148. t. III. Barr. ic. 302.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 318.*

*Traurende Leucoje. W.*

*Habitat in Hispania, Italia, Monspeli. † (v. l.)*

*Flores tristes colore et odore.*

### 24. CHEIRANTHUS *trilobus*.

*C. foliis linearibus obtusis profunde dentatis canescentibus, calycibus filiquisque laevibus teretibus patentibus, stylo subulato mucronatis. W.*

*C. foliis dentatis obtusis, calycibus laevibus, filiquis nodosis mucronatis filiformibus laevibus. Sp. pl. 925.*

*Leucoium maritimum minimum hispanicum vernum, foliis erucae. Tournef. inst. 221?*

*Leucoium maritimum minimum. Bauh. pin. 201. prodr. 103. Burf. XI. 28.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 318.*

*Tiefzähnlige Leucoje. W.*

*Habitat in Hispania et prope insulas Stoechadum. ☉ (v. l.)*

*Caule ramosi, patuli, spithamaei, incani. Folia lanceolata, obtusa, unico vel duobus utrinque dentibus profundioribus. Calyces non pilosi. Corolla purpurea, majuscula. Siliquae lineares, teretiusculae, futuris carinatae, lateribus torulis nodosae, apice longo subulato acuminatae, glabrae.*

\*25. CHEIRANTHUS *pulchellus*. W. †

C. foliis lanceolatis glabris ciliato-dentatis, caule simplicissimo. W.

Turritis orientalis foliis cichoraceis dentatis, flore luteo magno. *Tournef. cor.* 16.

Nette Leucoje. W.

*Habitat in Cappadocia.* 4 (v. f.)

Radix filiformis repens fibrillata. Caules plures biunciales et ultra simplicissimi. Folia alterna subsessilia quadrilineariter lanceolata utrinque attenuata glabra, margine utrinque denticibus 3, 4, 5. Jubulatis. Flores flavi magnitudine et facie *C. tristis*. Siliquas non vidi. W.

\*26 CHEIRANTHUS *pinnatifidus*. W. †

C. foliis pinnatifidis pilosis, laciniis linearibus integerrimis. W.

Halbgesiederte Leucoje. W.

*Habitat in Sibiria.* (v. f.)

Caulis erectus semipedalis et ultra superne ramis aliquot instructus. Folia Coronopi pinnatifida, laciniis linearibus integerrimis indivisisque, pilis albis longis sparsis potissimum ad marginem et punctis elevatis uti caulis tecta. Flores rubicundi magnitudine *Erysimi cheiranthoidis*. Siliquas non vidi. W.

27. CHEIRANTHUS *tricuspidatus*.

C. foliis lyratis, siliquis apice tridentatis. *Syst. veg.* 500.

C. siliquarum apicibus tridentatis; foliis lyratis. *Hort. cliff.* 335. *Roy. lugdb.* 338. *Gron. orient.* 80. *Mill. dict. n.* 14. *Kniph. cent.* 6. n. 26.

Leucoium marinum. *Cam. hort.* 87. t. 24. *Morif. hist.* 2. p. 242. f. 3. t. 8. f. 13.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 319.

Dreyspitzige Leucoje. W.

*Habitat in Tripoli maritima.* ☉ (v. v.)

\*28. CHEIRANTHUS *tomentosus*. W.

C. foliis tomentosis pinnatifidis obtusis, siliquis teretibus tomentosis laevibus. W.

Cheiranthus an littoreus. *Pall. it.* 2. app. n. 115. tab. K. fig. 2.\*

Filzige Leucoje. W.

*Habitat in campis limosis ad mare Caspium et circa Irtim.* ♂ (v. f.)

*Tota planta incana et tomento denso tecta. Caules digitales plures plerumque simplices ex una radice. Folia pinnatifida obtusa, laciniis in margine superiore saepe dente obsoleto notatis. Calyces tomentosi. Petala flava obtusa. Siliquae teretes tomentosae laeves, id est non muricatae, apice stigmate persistente bidentato acuto coronatae. W.*

\* 29. CHEIRANTHUS odoratissimus.

C. foliis tomentosis lyrato-sinuatis, siliquis compressis tomentosis laevibus. W.

C. (*odoratissimus*) foliis lyrato-sinuatis tomentosis, siliquis longissimis ancipitibus, stigmate bilobo terminatis, caule suffruticoso. *Marschall ab Bieberst. casp. 116. n. 22.*

*Cheiranthus odoratissimus. Pall. ind. taur. in Nov. Act. Petrop. 10. p. 314.*

Wohlriechendste Leucoje. W.

*Habitat in Tauriae et Persiae borealis collibus nudis.*

⚓ (v. l.)

*Caulis suffruticosus basi ramosus ut tota planta incanus tomentosus. Folia oblonga admodum varia, plerumque sinuato-pinnatifida, laciniis obtusis integerrimis, interdum profunde pinnatifida, interdum inaequaliter dentata, quandoque ad radicem indivisa et integerrima. Flores colore et magnitudine Hesperidis tristis vespertino tempore odoratissimi, sed calyx tomentosus. Siliquae biunciales compressae tomentosae stigmate crasso oblongo bilamellato terminatae. W.*

30. CHEIRANTHUS sinuatus.

C. foliis tomentosis inferioribus sinuatis, rameis indivisis, siliquis tomentosis compressis muricatis. W.

C. foliis tomentosis obtusis subsinuatis: ramis integris; siliquis muricatis. *Sp. pl. 926. Mill. dict. 15. Smith. brit. 2. p. 710.\**

*Leucoium maritimum, sinuato folio. Bauh. pin. 200.*

*Leucoium maritimum magnum latifolium. Bauh. hist. 2. p. 875.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 320.*

Ausgebogene Leucoje. W.

*Habitat in Hispaniae, Angliae, Monspeliis maritimis.*

⊙ (v. v.)

*Caulis rectus, ut tota planta, tomentoso-incanus.*

Folia Radicalia lato-lanceolata, alternatim dentata, obtusa; Caulina lanceolata, obtusa; canaliculata dentium paribus duobus obtusis, in medio positis; Ramea integra nec dentata. Petala incarnata, obtusa, basi exalbida. Siliquae longissimae, muricatae, tomentosae.

\*31. CHEIRANTHUS toraxacifolius.

C. foliis pubescentibus, inferioribus runcinato-pinnatifidis, superioribus argute dentatis. W.

Cheiranthus taraxacifolius. Stephan in litt.

Cheiranthus an chius. Pall. itin. 1. app. n. 116.\*.

Hesperis (laxa) foliis ovatis acutis dentato-angulosis laevibus, caule laxo, petalis integerrimis. Lamarch. encycl. 3. p. 312?

Löwenzahnblättrige Leucoje. W.

Habitat in Sibiria ad Volgae ripas inundatas. (v. l.)

Caulis digitalis simplicissimus erectus pubescens. Folia radicalia et caulina inferiora runcinato-pinnatifida, laciniis cuspidatis suprema obtusa majore, superiora caulina sessilia lanceolata remote argute dentata, omnia viridia pilis brevibus sparsis adpressis stellatis tecta. Flores violacei. Siliquas non vidi. W.

\*32. CHEIRANTHUS cuspidatus.

C. foliis lanceolatis, dentatis, caule recto simplici, siliquis strictis late ancipitibus stylo persistente duplo longioribus. Marschall ab Bieberstein casp. p. 116. n. 21.

Turritis montana siliquis latis. Buxb. cent. 2. p. 23. t. 33. f. 1.

Zugespitzte Leucoje. W.

Habitat in Tauriae collibus graminosis et ad mare Caspium. ♂ (v. l.)

Caulis spithamaeus ut tota planta canescens simplicissimus. Folia lanceolata inferiora petiolata superiora sessilia, dentata. Flores pallide flavi. Siliquae incanae oblongae compressae tetragonae stylo persistenti filiformi longissimo terminatae. Similis sequenti quoad fructuum formam, sed differt fructibus pedicellatis, foliis lanceolatis dentatis et flore minore. W.

\*33. CHEIRANTHUS quadrangulus.

C. foliis linearibus integerrimis, siliquis sessilibus oblongis quadrangularibus. l'Herit. stirp. 1. p. 91. t. 44.\*

C. (cornutus) foliis linearibus integerrimis canaliculatis

recurvis, floribus subsessilibus, siliquis brevibus longo stylo terminatis. *Lamarck. encycl. 2. p. 709.\**

*Cheiranthus montanus. Pall. itin. 1. app. u. 115.\**

Vierkantige Leucoje. W.

*Habitat in Sibiria. 4 (v. l.)*

Folia *linearia integerrima reflexa. Flores sessiles. Siliquae oblongae compressae tetragonae stylo longissimo filiformi terminatae. W.*

### 34. CHEIRANTHUS *Farfetia.*

C. siliquis ovalibus compressis, foliis lineari-lanceolatis, caule fruticoso erecto. *Mant. 94. Vahl symb. 1. p. 48. Desf. atl. 2. p. 89. t. 160.\**

*Farfetia aegyptiaca. Turra. Farfet. Venet. 1765. quart. p. 1. t. 1.*

*Lunaria scabra. Forsk. descr. 117. et ic. t. 16.*

*Thlaspi fruticosum ramosum, leucocii acutis foliis argenteum. Pluk. alm. 365.*

β. C. (*linearis*) foliis linearibus tomentosis, caule ramoso diffuso. *Forsk. descr. 120.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 320.*

Breischotige Leucoje. W.

*Habitat in Aegypto, Barbaria, Arabia. † Forskoehl. (v. l.)*

*Cualis pedalis, erectus, fruticulofus. incanus, strictus, ramosus. Folia alterna, sessilia, linearia, acuminata, integerrima, incana s. subargentea. Racemi sublaterales, oppositifolii, stricti. Calyx oblongus, viridis: foliolis 2 oppositis gibbosis. Petala 4, tristia, linearia, rotundata, integerrima, obliqua, purpurascenti-alba, obsolete saturatius reticulata. Stamina tetradynama, unguibus breviora. Antherae luteae. Pistillum staminibus brevius. Siliquae ovalis, compresso plana.*

*Herba tota Convolvuli Dorycnii. Flos Cheiranthi tristis. Fructus fere Lunariae. Flores tristis, noctu tantum suaveolentes. Habitu proxime accedit ad Lunariam fruticosam perennem incanam Leucocii folio. Tournef. it. 1. p. 92. t. 92. sed Folia linearia, acuminata, laevia, stricta. H. U.*

## 1241. HELIOPHILA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1092.*

*Nectaria 2 recurvata* versus calycis basin vesicularem.

1. HELIOPHILA *integrifolia*.

*H. foliis lanceolatis indivisis. Sp. pl. 926. Mill. dict. 1.*

*Jacq. ic. rar. 3. t. 506. Collect. 3. p. 219.\**

*Cheiranthus foliis lanceolatis integerrimis subhirsutis acutis, siliquis teretibus torulosis, caule herbaceo.*

*Amoen. acad. 6. afr. 23.\**

*Leucoium africanum, caeruleo flore, latifolium. Herm.*

*lugdb. 364. t. 365. Seba mus. 1. t. 17. f. 5.*

*Nasturtium petraeum aethiopicum, siliqua in plurimos loculos. Pluk. phyt. 432. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 322.*

*Ganzblättriger Sonnenfreund. W.*

*Habitat in Cap. b. Spei, locis saxosis incultis. ☉*

*Folia supra hirta s. pilosa, subtus glabra. Calyces gibbi baseos sunt diaphani. Corollae (Lini s. Anagallid. Monelli) caeruleae, noctu clausae.*

\*2. HELIOPHILA *incana*.

*H. foliis spathulatis integerrimis pubescentibus, siliquis villosis. Ait. Kew. 2. p. 397.*

*H. (frutescens) caule fruticolo, foliis spathulatis carnis pubescentibus, siliquis subteretibus erectis. Lamarck. encycl. 3. p. 87.\**

*Heliophila. Burmann in Nov. Act. Ups. 1. p. 94. t. 7.*

*Grauer Sonnenfreund. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. ☿*

*Corolla violacea. Lam. 1. c.*

3. HELIOPHILA *Circaeoides*.

*H. foliis cordatis. Lin. suppl. 298.*

*Chamira cornuta. Thunb. Nov. pl. Gen. 2. p. 48.\**

*Hexenkrautartiger Sonnenfreund. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei in fissuris rupis Vitteklipp dictae. ☉*

*Caulis fragilis ramosus herbaceus. Folia cordata subangulata. Calyx foliolis clausis linearibus basi dehiscentibus, duobus oppositis basi subcalcaratis; gibbo foliolis suis dimidio brevioribus, deciduis. Corolla te-*

*trapetala, petalis obliquis, paribus magis conniventibus. Stamina tetradynama. Filamenta subulata. Antherae apice reflexae. Germen ovato-oblongum. Stylus brevis. Stigma capitatum. Siliqua bilocularis bivalvis. Valvulae convexae gibbae succosae. Dissepimentum exsertum carnosum globosum. Semina tria s. quatuor subrotunda.*

4. *HELIOPHILA amplexicaulis.*

H. foliis amplexicaulibus integris glabris, siliquis moniliformibus. *Lin. suppl. 296*

Stielumfallender Sonnenfreund. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

5. *HELIOPHILA flava.*

H. foliis linearibus, caulibus fruticosis junceis. *Lin. suppl. 297.*

Gelber Sonnenfreund. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

Planta *Genistae facie erecta parce ramosa stricta suffrutescens. Folia alterna remota lineari-lanceolata laevia. Racemi terminales longi simplices, floribus distantibus. Calyx brevissimus ovatus clausus obtusus, margine subscariofo. Petala obovata magnitudine Brassicae flava venosa, unguibus calyce longioribus. Stamina longitudine calycis. Germen ovatum. Siliqua longitudine petalorum cylindraceo-tetragona. Variat corollis rubris. An hujus generis species naturalis?*

\*6. *HELIOPHILA canescens.*

H. caule flexuoso, foliis linearibus subfalcatis obtusis.

*Burm. ind. 140. t. 46. f. 2 (sub nomine H. incanae.)*

Weißlicher Sonnenfreund. W.

*Habitat in India orientali.*

Caules a ramo ad ramum flexuosi glaberrimi albicantes. Folia sessilia saepe falcata linearia obtusa. Flores in summo caule saepius tres pedunculati. Siliquae lineares compressae dissepimento distinctae. *Burm. l. c.*

7. *HELIOPHILA pusilla.*

H. foliis linearibus, siliquis moniliformibus erectis. *Lin.*

*suppl. 297.*

Kleiner Sonnenfreund. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ☉*



Planta *spithamaca erecta ramosa, statura Arabis thalianae*. Folia caulina linearia laevia. Siliquae patulae pedunculatae moniliformes, articulis discretis orbiculatis compressis.

8. HELIOPHILA *filiformis*.

H. foliis subulatis filiformibus glabris, siliquis pendulis, ramis divaricatis. *Lin. suppl. 296.*

Fadenförmiger Sonnenfreund. W.

Habitat ad Cap. b. spei, ☉ (v. f.) H. U.

Caulis semipedalis herbaceus junceus, ramis erectis brevioribus. Folia in tota planta omnino subulata. Racemi horizontales pedicellis horizontalibus, fructibus pendulis. Calyx patentissimus, alternans cum petalis, foliolis linearibus canaliculatis obtusis. Petala patentia omnino ut calyx, sed triplo fere majora pallida striata. Stamina tetradynama. Germe cylindricum. Stigma capitatum. Siliqua subulata stricta laevissima.

\*9. HELIOPHILA *pendula*. W.

H. foliis pinnatis, foliolis filiformibus glabris, siliquis moniliformibus pendulis. W.

Hängender Sonnenfreund. W.

Habitat ad Cap. b. spei? ☉ (v. v.)

Caulis bipedalis erectus ramosus, ramis patentibus divaricatis. Folia pinnata subcarnosa glabra, foliolis 7 filiformibus uncialibus. Calycis foliola flavo-rubicunda obtusa. Petala pallide flava. Siliquae unciales moniliformes pendulae. W.

10. HELIOPHILA *pinnata*.

H. foliis trifidis pinnatisque, foliolis linearibus, siliquis moniliformibus pendulis. *Lin. suppl. 297.*

Gefiederter Sonnenfreund. W.

Habitat ad Cap. b. spei. (v. f.)

Simillima *H. pusillae*, sed foliis ramosis f. pinnatis linearibus.

11. HELIOPHILA *coronopifolia*.

H. foliis linearibus pinnatifidis. *Sp. pl. 927. Mill. dict. 2.*

*Leucoium africanum*, caeruleo flore, angusto coronopi folio, majus. *Herm. lugdb. 364. t. 367. Seb. mus. 1. t. 17. f. 5.*

*Leucoium africanum*, flore lini caerulei, molluginis folio. *Pluk. alm. 213. t. 200. f. 3. mala.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III*

L 1

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 322.*  
 Schlitzblättriger Sonnenfreund. W.  
*Habitat ad Cap. b. Spei. ♂*  
*Planta glabra est.*

12. HELIOPHILA *digitata.*

H. foliis palmato-pinnatifidis villosis, pinnis linearibus.  
*Lin. suppl. 296.*  
 Gefingertes Sonnenfreund. W.  
*Habitat ad Cap. b. Spei. (v. f.)*  
*Caulis valde incrassatus, unde facies singularis.*

1242. H E S P E R I S.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1093.*

*Petala* oblique flexa. *Glandula* intra stamina breviora. *Siliqua* stricta. *Stigma* basi bifurca apice connivente. *Cal.* clausus.

1. HESPERIS *tristis.*

H. caule hispido ramoso patente. *Hort. upf. 187. Jacq. vind. 118. austr. t. 202. Mill. dict. n. 4. Crantz. austr. p. 31. Pall. it. 3. p. 687. Hoffm. germ. 238.*  
 Hesperis caule hispido procumbente. *Hort. cliff, 335. Roy. lugdb. 338.*

Hesperis montana pallida odoratissima. *Bauh. pin. 202.*

Hesperis pannonica. *Cam. hort. t. 18.*

Leucoium melancholicum. *Best. exst.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 323.*

Eigentliche Nachtviole. W.

*Habitat in Hungariae, Austriae arvis. ♂ (v. v.)*

*Obs.* Leucoium incano folio, hortense. C. B. Hesperis siliqua articulata. Ej. Hesp. peregrina, siliquis articulatis. Ej. H. sylvestr. hirsuta, folio hieracii Ej. Haec omnes a Rajo et Pluknetio creduntur synonymae.

\*2. HESPERIS *laciniata.*

H. caule ramoso hispido, foliis obovatis dentatis, radicalibus basi subincisfis. W.

H. (*laciniata*) caule ramoso, foliis inaequaliter laciniatis, flore sulphureo. *All. ped. n. 985. t. 82. f. 1.\**

Eingeschnittene Nachtviole. W.

*Habitat in rupibus apricis Pedemontanis. ♂ (v. v.)*

*Simillima H. trifli sed differt: foliis radicalibus ba-*

*sin versus profunde dentatis, flore minore flavo, et petalis obtusis latioribus. Siliquae longissimae quadri- vel quinquepollicares recurvae. W.*

### 3. HESPERIS *matronalis*.

H. caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Hort. cliff.* 335. *Hort. upf.* 188. *Roy. lugdb.* 338. *Dalib. parif.* 197. *Mill. dict. n. 1. Gmel. sib. 2. p. 259. n. 18. t. 58. Doerr. nass. p. 125. Kniph. cent. 7. n. 32. Hoffm. germ. 238. Roth. germ. I. 284. II. 107.*

H. hortensis. *Bauh. pin.* 202.

*Viola matronalis. Dod. pempt. 161.*

β. *Hesperis (sibirica)* caule simplici, foliis lanceolatis dentato-ferratis, petalis obtusissimis integris. *Sp. pl. ed. 2. p. 927. Gmel. sib. 3. p. 260. n. 19. Amm. ruth. n. 73. et 74.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 324.*

*Rothe Nachtviole. W.*

*Habitat in Germania, Helvetia, Sibiria. ♂ (v. v.)*

### 4. HESPERIS *inodora*.

H. caule simplici erecto, foliis subhastatis dentatis, petalis obtusis. *Sp. pl. 927. Mill. dict. n. 3. Gmel. tub. p. 205. Jacq. austr. t. 347. Hoffm. germ. 239. Roth. germ. I. 284. II. 108.*

H. caule hirsuto, foliis ovato-lanceolatis, ferratis, petiolatis, subasperis. *Hall. helv. n. 448.*

H. (*sylvestris*) caule subhispido erecto, valvis latitudine siliquae. *Crantz austr. 32. n. 2.*

H. *sylvestris inodora. Bauh. pin. 202. Rupp. jen. ed. Hall. p. 78. t. 1.*

*Hesperis 3. Clus. hist. 1. p. 297.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 325.*

*Geruchlose Nachtviole. W.*

*Habitat Viennae, Monspelia. ♂ (v. l.)*

*Simillima H. matronali, ut vix nisi a gnaro distinguatur, sed Folia fere hastata basi transversali, argute dentata praesertim ad basin, magis mollia, nec ita scabra. Calyces non colorati. Petala obtusa absque mucrone. Stamina non extra tubum floris prominentia.*

*Odor suavis. Annuam pronuntiat Crantz.*

### \*5. HESPERIS *tatarica*.

H. caule simplici nudo decumbente, foliis tomentosis inciso-dentatis. W.

*Hesperis tatarica.* *Pall. itin. 1. app. 117. t. O.\**  
Tatarische Nachtviole. W.

*Habitat in Sibiriae montibus saxosis glareosis circa Ideriensem lacum.* 24

*Folia tantum radicalia tomentosa ut in Verbasco oblonga obtusa inciso-ferrata. Caules aphylli decumbentes simplices. Flores livido-flavi, calycibus tomentosis. Siliquae lineares strictae.* W.

6. *HESPERIS africana.*

*H. caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis petiolatis acute dentatis scabris, siliquis sessilibus.* *Sp. pl. 928. Mill. dict n. 8.*

*H. africana, hieracii folio hirsuto, flore minimo purpurascente.* *Niss. act.*

*H. (hispida) caule erecto hispido subramoso, foliis ovalibus subintegerrimis, siliquis hispidis strictis.* *Roth. catal. bot. 1. p. 78.\**

*Leucoium gallicum, folio halimi.* *Bocc. sicc. 77. t. 42. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 326.*

Africanische Nachtviole. W.

*Habitat in Africa, Gallia, Hungaria.* ☉ (v. v.)

*Planta caule foliis siliquis aspera pilis triglochidibus s. ternis. Flores incarnati: Petalis angustis, sub lanceolatis, obtusiusculis. Siliquae sessiles, strictae, teretes, subdepressae, obtusae mucrone acuto.*

\*7. *HESPERIS ramosissima.*

*H. pubescens incana, caule ramosissimo, foliis lanceolatis obtusis dentatis subsessilibus, siliquis pedunculatis.* W.

*H. (ramosissima) pubescens, foliis lanceolatis dentatis, siliquis subsessilibus torulosis filiformibus bimucronatis.* *Desf. atl. 2. p. 91. t. 161.\**

*H. orientalis maritima leucoii folio incano, flore minimo.* *Tournef. cor. 16.*

Vielästige Nachtviole. W.

*Habitat in arenosis maritimis Algeriae et in Galatia.* ☉ (v. l.)

*Tota planta canescens digitalis et ultra. Caulis a basi ramosissimus paniculatus. Folia lanceolata sessilia vel vix manifeste petiolata, obtusa parce et obtuse dentata; ramea integerrima. Flores parvi violacei. Siliquae lineares teretes torulosae pubescentes.* W.

\*8. HESPERIS *arenaria*.

H. pubescens, caule ramoso, foliis lanceolatis acutis, inferioribus dentatis, sessilibus, siliquis torulosis subulatis sessilibus. W.

H. foliis lanceolatis utrinque attenuatis pubescentibus, inferioribus dentatis, siliquis subulatis rigidis sessilibus torulosis. *Desf. atl. 2. p. 91. t. 162.\**

Sand Nachtviole. W.

*Habitat in arenosis maritimis ad Arzean in Algeria.*

Caulis digitalis et ultra ramosus pubescens ut tota planta. Folia inferiora lanceolata acuminata repandodentata, superiora lanceolata acuta integerrima. Flores violacei. Siliquae sessiles torulosae apice subulatae. Similis Raphano arcuato. W.

9. HESPERIS *verna*.

H. caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus serratis villosis. *Sp. pl. 928. Mill. dict. n. 9.*

Turritis annua verna, flore purpurascente. *Tournef. inst. 224.*

Leucoium minus rotundifolium, flore purpureo. *Barr. ic. 876.*

Leucoium maritimum latifolium. *Bauh. pin. 201. Morif. hist. 2. p. 231. f. 3. t. 8. f. 5.*

Leucoium marinum alterum latifolium purpureo-vioaceum. *Lob. ic. 333.*

Rapistrum floribus leucii marini. *Bauh. pin. 95. prodr. 37. Burf. IV. 47.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 326.*

Frühlings-Nachtviole. W.

*Habitat in Galloprovinciae maritimis. ☉ (v. l.)*

10. HESPERIS *lacera*.

H. foliis runcinatis, siliquis tricuspидatis. *Syst. Veg. p. 501.*

Cheiranthus (*lacerus*) foliis lanceolatis runcinatis, calycibus pilosis, siliquis nodosis tridentatis. *Syst. veg. 500.*

Cheiranthus (*lacerus*) foliis lacero-dentatis acuminatis, calycibus pilosis, siliquis nodosis mucronatis. *Spec. p. 926.*

Leucoium lusitanicum purpureum, foliis eleganter dentatis. *Herm. parad. 193. t. 193.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 327.*

Schlitzblättrige Nachtviole. W.

*Habitat in Lusitania, Gallia. ☉ (v. l.)*

*Folia nuda, angustia. Calyces pilosi. Flores tristes colore et odore. Siliquae nodosae tricuspidae.*

## 1243. A R A B I S.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1049.*

*Glandulae nectariferae 4, singulae intra calycis foliola, squamae inlar reflexae.*

1. ARABIS *alpina*.

A. foliis oblongis - lanceolatis amplexicaulibus acute dentatis. W.

A. foliis amplexicaulibus dentatis. *Hort. cliff.* 335. *Mill. dict. n. 2. Crantz austr. p. 40. Pall. it. 3. p. 34. Scop. carn. n. 833. Fl. dan. t. 62. Hoffm. germ. 239. Roth. germ. I. 284. II. 109.*

A. caule ramoso, folioso, diffuso, foliis amplexicaulibus dentatis incanis. *Hall. helv. n. 451.*

A. foliis radicalibus subovatis denticulatis: caulinis alternis amplexicaulibus erectis. *Neck. gallob. p. 284. R.*

α. A. foliis amplexicaulibus dentatis, caule erecto simplici. *Roy. lugdb. 338.*

A. caule simplici, foliis ovatis utrinque dentatis. *Fl. lapp. 257. Fl. suec. 566; 604.*

*Draba alba siliquosa repens. Bauh. pin. 109.*

*Draba 3. succulento folio. Clus. hist. 2. p. 125.*

β. Arabis foliis amplexicaulibus dentatis, caule diffuso ramoso. *Roy. lugdb. 339.*

*Draba alba siliquosa. Bauh. pin. 109.*

*Draba 2. Clus. hist. 2. p. 24.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 328.*

*Alpen-Gänsekraut. W.*

*Habitat in alpibus Helveticis, Austriacis, Lapponicis. 4 (v. v.)*

*Mire varians ex loco planta α. brevis erecta alpina;*

*β. inferne procumbens magna; hinc facie diversissima.*

2. ARABIS *grandiflora*.

A. caule nudo. *Amoen. acad. 358. t. 4. f. 20.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 329.*

*Großblütiges Gänsekraut. W.*

*Habitat in Sibiria. 4*

Radix fibrosa perennis lignosa. Folia radicalia plurima duos pollices longa lanceolata, pinnatim ultra medium secta, laciniis acuminatis, scabra, desinentia in Petiolos oblongos basi dilatatos membranaceos. Caulis erectus longitudine digiti teres nudus. Corymbus terminalis depressus floribus alternis, Pedunculis brevissimis inferioribus paullo brevioribus. Calyx erectus, foliolis purpurascens oblongis obtusis deciduis exterioribus duobus basi gibbis. Petala purpurea patentia obversa ovata. Dantur varietates foliis lanceolatis integerrimis. Variat etiam flore albo.

### 3. ARABIS thaliana.

A. foliis radicalibus oblongis petiolatis, caulinis lanceolatis sessilibus, caule erecto basi hirsuto, petalis calyce duplo longioribus. W.

A. foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Vir. cliff.* 64. *Fl. suec.* 567; 605. *Roy. lugdb.* 339. *Dalib. paris.* 200. *Gumm. norv. n.* 495. *Willich. in nov. Act. A. C. IV. p.* 114. *Pollich. pal. n.* 636. cum fig. *Wulfen in Jacq. Collect. 2. p.* 115. \**Retz. obs. I. p.* 22. *Hoffm. germ.* 239. *Roth germ. I. 284. II. 109.*

A. foliis radicalibus petiolatis ovatis dentatis, caule subnudo ramoso. *Hall. helv. n.* 452.

Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis, ad exorsum ramorum solitariis. *Hort. cliff.* 339.

Bursae pastoris similis siliquosa major. *Bauh. pin.* 108.

Bursa pastoris f. Pilofella siliquosa. *Bauh. hist. 2. p.* 870.

Draba angustifolia minima et media. *Barr. ic.* 269.

Pilofella siliquosa minor. *Thal. hanc. 84. t. 7. f. D.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p.* 329.

Thalifches Gänsekraut. W.

Habitat in Europae septentrionalioris sabulosis. ☉

(v. v.)

Nectarium intra foliola calycina non vidit *Pollich. R.*

### \*4. ARABIS crantziana.

A. foliis lanceolatis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, caule decumbente glabro, petalis calyce triplo longioribus. W.

A. foliis radicalibus petiolatis lanceolatis partim integris partim dentatis. *Crantz austr. p.* 39. t. 3. f. 2.

Arabis crantziana. *Ehrh. herb.* 78. *Hoffm. germ.* 239.

Crantzisches Gänsekraut. W.

*Habitat in rupestribus* Austriae, Hircyniae, et Franconiae prope Muggendorf. (v. l.)

*Similis A. thalianae at differt caule decumbente vel adscendente glabro, (qui in omnibus varietatibus A. thalianae erectus et basi hirtus observatur,) et floribus multo majoribus.* W.

\* 5. *ARABIS recta.*

A. foliis lanceolatis cordatis amplexicaulibus, obtuse dentatis, caule erecto pubescente. W.

A. (*recta*) caule recto, foliis rectangulo dentatis sessilibus, siliquis erecto-patentibus. *Vill. delph. 3. p. 319. t. 37.\**

Aufrechtes Gänsekraut. W.

*Habitat in Galliae australis et Hispaniae muris rupibusque.* ☉ (v. l.)

*Diversissima ab A. alpina, radice annua vel bienni, foliis obtuse dentatis multo brevioribus et remotioribus, floribus minoribus et habitu tenuiore. Tota planta est pilis furcatis tecta.* W.

*Similis Sisymbrio pumilo at in hoc folia sunt sagittata et flores flavi, quod non in A. recta.* W.

\* 6. *ARABIS serpillifolia.*

A. foliis ellipticis integerrimis sessilibus, caule flexuoso decumbente. W.

A. (*serpillifolia*) foliis omnibus ellipticis integerrimis, caule flexuoso. *Vill. delph. 3. p. 318. t. 37.\**

Quendelblättriges Gänsekraut. W.

*Habitat in rupibus et muris Delphinatus.* ♂ (v. l.)

*Tota planta pilis stellatis tecta. Caulis debilis decumbens flexuosus. Folia radicalia oblonga petiolata, quandoque dente uno alterove notata, caulina elliptica obtusa integerrima sessilia. Siliquae angustae ancipites glabrae.* W.

\* 7. *ARABIS reptans.* †

A. foliis subrotundis integerrimis hirsutis, furculis reptantibus. *Lamarck encycl. 1. p. 220.\**

*Paronychia myosotis virginiana foliis subrotundis.* *Pluk. alm. 281. t. 51. f. 5.*

Kriechendes Gänsekraut. W.

*Habitat in Virginia.* †



\*8. ARABIS *coerulea*.

A. foliis obovatis apice dentatis, caule subdiphylo, racemo cernuo. W.

A. (*caerulea*) foliis radicalibus obovato-cuneiformibus acutis glabris, margine superiore dentatis, racemo paucifloro nutante. *Wulfen in Jacq. Collect. 2. p. 56.\**

Turritis *coerulea*. *All. ped. n. 981. t. 40. f. 2.*

Leucoium foliis oblongis dentatis spica nutante. *Hall. helv. n. 445.*

Blaues Gänsekrout. W.

*Habitat in Helveticis, Salisburgensibus, Carinthiacis et Pedemontanis summis alpibus glacialibus. 4 (v. f.)*

Folia *crassiuscula apice dentata, Caulis brevis uncialis usque digitatis foliis 2 f.-3 instructus. Racemus cernuus. Corollae coerulefcentes. W.*

9. ARABIS *bellidifolia*.

A. foliis subdentatis, radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis, caule folioso, racemo erecto. W.

A. foliis subdentatis: radicalibus obovatis; caulinis lanceolatis. *Mant. 94. Jacq. obs. 1. p. 22. t. 12. Giesecke ic. fasc. 1. t. 15. Jacq. austr. 3. t. 280.*

A. radice multicauli, foliis subdentatis glaberrimis radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis, calycibus basi aequalibus, racemo seminifero erecto, siliquis erectis. *Moench. disp. 258.*

Turritis *bellidifolia*. *All. ped. n. 980. t. 40. f. 1.*

Leucoium foliis laevissimis, rariter dentatis, imis petiolatis ovatis, caulinis amplexicaulibus. *Hall. helv. n. 446.*

Nasturtium alpinum, bellidis folio, majus. *Bauh. pin. 105. prodr. 46. Bauh. hist. 2. p. 870.*

Plantula Cardamines aemula. *Clus. hist. 2. p. 129.*

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst. 8. p. 330.*

Tausendschönblättriges Gänsekrout. W.

*Habitat in alpibus Italicis, Austriacis, Helveticis. 4 (v. v.)*

*Simillima Arabi alpinae, sed petala erecta angustia. Siliquae approximatae.*

\*10. ARABIS *nutans*.

A. foliis subdentatis, radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis, caule folioso, racemo fructifero nutante, siliquis secundis. W.

A. (*nutans*) racemo seminifero erecto apice nutante, fo-

liis subdentatis ciliatis, radicalibus obovatis, caulinis oblongis glabris amplexicaulibus, siliquis erectis subsecundis. *Moench. disp.* 258.

A. (*pumila*) foliis radicalibus obovatis subdentatis obtusis utrinque scabris, caulinis sessilibus oblongis subhirsutis, racemo subnutante. *Wulfen in Jacq. Collect.* 2. p. 59.\* *Jacq. austr. t.* 281.

Arabis scabra. *Allion. ped. n.* 974.

Leucoium foliis radicalibus subrotundis scabris dentatis, caulinis amplexicaulibus hirsutis. *Hall. helv. n.* 447.

Cardamine *pumila bellidis folio alpina*. *Segu. veron.* 387.

Hängendes Gänsekraut, W.

*Habitat in Helvetiae, Austriae, Italiae alpibus asperis.*

4 (v. v.)

*Planta spontanea scabra culta fere glabra. Differt a praecedente cui similis, racemo fructifero nutante, siliquis subsecundis, et statura minori.* W.

## 11. ARABIS *lyrata*.

A. foliis glabris: radicalibus lyratis, caulinis linearibus.

*Sp. pl.* 929. *Gron. virg.* 99. *Mill. dict. n.* 5.

Cheiranthus caule filiformi laevi, foliis lanceolatis: infimis incis. *Gron. virg.* 1. p. 76.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 331.

Leyerblättriges Gänsekraut, W.

*Habitat in Canada.* *D. Kalm.* ☉

*Statura et habitus A. thalianae, praeter quod folia radicalia lyrata, glabra, et flores majores.*

## 12. ARABIS *hispida*.

A. foliis radicalibus runcinato-lyratis hispidis, caulinis lanceolatis, pilis furcatis, caulibus glabris ramosis.

*Smith brit.* 2. p. 713.\*

A. foliis hispidis, radicalibus runcinatis, caulinis lanceolatis. *Lin. suppl.* 298.

A. foliis hispidis: radicalibus sublyratis; caulinis lanceolatis. *Syst. Veg.* 501.

*Silymbrium arenosum.* *Fl. suec.* 233?

Cardamine *petraea*. *Huds. angl.* 293. *Fl. dan.* 386.

Cardamine (*petraea*) foliis simplicibus oblongis dentatis. *Sp. pl.* 913?

Cardamine *cambrica Nasturtii facie.* *Dill. elth.* 70. t. 61. f. 71.

*Nasturtium petraeum Johnsoni.* *Raj. synop.* 300. *Pluk. phyt. t.* 101. f. 3.

β. *Cardamine hastulata*. *Smith bot. angl. t. 469.*

*Cardamine petraea*. *Lightf. scot. I. p. 347. t. 15. f. 2.*  
Scharfblättriges Gänsekrant. W.

*Habitat in alpibus Austriae, Scotiae, Norvegiae.* 4  
(v. l.)

*Statura A. thalianae, simillima A. lyratae sed diversa. Radix perennis. Caulis palmaris erectus. Folia radicalia copiosissima sublyrata runcinata hispida; caulina sub ramis solitaria parva lanceolata. Calyx subclausus. Corolla alba petalis erectis.*

\* 13. *ARABIS stricta*.

A. foliis dentatis obtusis hispidis, radicalibus sublyratis, caulibus hispidis, petalis erectis. *Smith brit. 2. p. 712.\**

A. (*stricta*) foliis dentatis hispidis, radicalibus spatulatis, caulinis semiamplexicaulibus oblongis, siliquis ancipitibus erectis. *Huds. angl. 292.*

A. (*hispida*) foliis cuneiformibus sublyratis hispidis, caulibus semiamplexicaulibus lanceolatis, siliquis strictis ancipitibus. *Ait. Kew. 2. p. 400. (excluso synonymo Linnaei.)*

A. multicaulis, foliis radicalibus scabris dentatis dentibus ciliatis. *Hall. helv. n. 453.*

*Turritis (Raj)* foliis runcinato-dentatis hirtis, caulinis perpancis integris, caule ramoso subnudo. *Vill. delph. 3. p. 326. t. 38.\* All. ped. n. 979.*

*Hesperis alpina minor* flore albo siliquis longis. *Raj. syll. 296.*

Steifschotiges Gänsekrant. W.

*Habitat in Italiae, Helvetiae, Galliae, Angliae rupibus.*  
4 (v. l.)

14. *ARABIS Halleri*.

A. foliis caulinis sublyratis, rameis lanceolatis incis. *Sp. pl. 929. Hoffm. germ. 239. Roth germ. I. 285. II. 110.*

*Cardamine stolonifera*. *Scop. carn. n. 818. t. 39?*

*Silymbrium* foliis imis barbareae, superioribus integris dentatis. *Hall. opusc. 101. t. I. f. I.\**

*Nasturtium barbareae* foliis. *Bauh. pin. 105. prodr. 46. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 331.*

Hallersches Gänsekrant.

*Habitat in Harcynia ad Clausthal, locis humectis; in Carniolia.* ♂ (v. v.)

Caulis erectus, angustus. Folia lyrata, glabra. Flores albi.

Nullas glandulas nectariferas habere Haller; eas tamen vidit Scopoli. R.

\*15. ARABIS ovirensis.

A. foliis radicalibus orbiculatis, caulinis subovatis petiolatis repando-dentatis, radice repente. Jacq. ic. rar. I. t. 125.

A. foliis simplicibus integris repando-denticulatis petiolatis, caulinis oblongis subovatis, radicalibus orbiculatis. Wulfen in Jacq. Collect. I. p. 196.\*

Rothes Gänsekraut. W.

Habitat in Carinthiae alpibus Ovirensibus. 4

Similis praecedenti sed folia radicalia non lyrata, flores duplo majores rosei coloris, radixque repens. W.

16. ARABIS canadensis.

A. foliis caulinis lanceolatis dentatis glabris. Sp. pl. 929. Gron. virg. 100.

Eruca virginiana, bellidis majoris folio. Pluk. alm. 136. t. 86. f. 8.

Turritis foliis lanceolatis dentatis: radicalibus maximis, siliquis compressis sulcatis. Gron. virg. I. p. 77?

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 332.

Canadisches Gänsekraut. W.

Habitat in Canada.

Planta erecta, pedalis s. bipedalis, laevis. Folia lato-lanceolata, 4 vel 5 denticulis crassis remotis serrata utrinque. Racemus terminalis nudus, et ex summis alis duo vel tres laterales racemi.

17. ARABIS lucida.

A. foliis amplexicaulibus lucidis. Lin. suppl. 298.

Glänzendes Gänsekraut. W.

Habitat in Pannonia. 4

Caulis palmaris simplicissimus teres laevis. Folia lucida integerrima consistentia, radicalia obovata petiolata obtusa, caulina alterna sessilia amplexicaulia cordata s. cordato-oblonga. Corymbus terminalis racemosus evadens. Calyx glaber hians. Petala erectiuscula alba linearia integra calyce duplo longiora, basi angustiora. Stamina longitudine petalorum. Antherae flavae. Stigma obtusum.

18. ARABIS *pendula*.

A. foliis amplexicaulibus acuminatis, siliquis ancipitibus linearibus pendulis. W.

A. foliis amplexicaulibus, siliquis ancipitibus linearibus, calycibus subpilosis. *Hort. upf.* 191.\* *Mill. dict.* 3. *Flor. dan. t.* 62. *Retz obs.* 3. p. 36.\*

A. foliis amplexicaulibus dentatis, caule erecto, simplicissimo, siliquis pendulis. *Gmel. sib.* 3. p. 264. t. 60. R.

Turritis latifolia hirsuta, siliquis pendulis. *Amm. ruth.* 58. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 332.

Hängendfrüchtiges Gänsekraut. W.

*Habitat in* Sibiria, Dania. ☉ (v. v.)

Folia *scabra*: *Caulina minus, quam sequentis, amplexicaulia, serrata. Caulis scaber pilis raris rigidis. Pedunculi longi, filiformes, laxi. Calyces apicibus hirti. Siliquae laeves, nutantes, laxae. Flores albi.*

19. ARABIS *Turrita*.

A. foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis planis linearibus margine incrassatis. *Smith brit.* 2. p. 714.\*

A. foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis planis linearibus, calycibus subrugosis. *Hort. upf.* 192. *Jacq. vind.* 18. *aust. t.* 11. *Mill. dict. n.* 4. *Scop. carn. n.* 834. *Hoffm. germ.* 239. *Retz. obs.* 3. p. 36.\*

Leucoium foliis acute dentatis, amplexicaulibus, siliquis nutantibus incanis. *Hall. helv. n.* 444. R.

Arabis (*umbrosa*) siliquis compressis latis, uno versu pendulis. *Crantz. austr. p.* 39. t. 3. f. 2. *Jacq.*

Turritis caule simplici, foliis lanceolatis subdentatis glabris. *Sauv. monsp.* 73.

Turritis perraro ramifera, foliis lanceolatis obscure dentatis. *Guett. stamp.* 2. p. 162. *Dalib. paris.* 202.

Leucoium hesperidis folio. *Tournef. inst.* 221.

Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliqua. *Bocc. mus.* 2. p. 81. t. 72. *Barr. ic.* 353.

Turrita major, Plateau. *Clus. hist.* 2. p. 126.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 333.

Thurmkrautartiges Gänsekraut. W.

*Habitat in* Helvetiae, Hungariae, Galliae, Siciliae, sepibus montosis. ☉

Folia *Radicalia ovali-oblonga, crassa, incana, margine undata. Caules pedales, vix ramosi. Folia amplexicaulia, dentata: suprema serrata: minus incana.*

Siliquae lineares, compressae, subsessiles, laeves, rigidae, alternae, ad latus inferius flexae. Flores ochroleuci.

\*20. ARABIS *saxatilis*.

A. foliis amplexicaulibus obtusis scabris, siliquis erectis strictis planis subtetragonis striatis. W.

A. (*saxatilis*) caule erecto, foliis amplexicaulibus lanceolaris dentatis, siliquis longitudine racemi. *All. ped.* n. 973.

A. (*nova*) caule erecto, foliis amplexicaulibus dentato-ferratis caulinis, siliquis erectis. *Vill. delph.* 3. p. 319. t. 37.\*

Stein-Gänsekraut. W.

*Habitat in Galliae australis, Italiae sterilibus saxosis.*  
♂ (v. l.)

\*21. ARABIS *aspera*.

A. foliis amplexicaulibus obtusis scaberrimis, siliquis erectis strictis teretiusculis. W.

A. (*aspera*) caule erecto flexuoso ramoso, foliis ovatis asperis semiamplexicaulibus, siliquis teretibus. *All. auct. fl. ped.* p. 18. n. 973. t. 2. f. 2.\*

Rauhblättriges Gänsekraut. W.

*Habitat in agro Pedemontano ad sylvarum margines.*  
♀ (v. l.)

*Haec et praecedens species Arabi rectae sunt similes.* W.

1244. TURRITIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1095.*

*Siliqua longissima, angulata. Cal. connivens erectus. Cor. erecta.*

I. TURRITIS *glabra*.

T. foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerimis amplexicaulibus glabris. *Hort. cliff.* 239. *Fl. suec.* 344; 606. *Roy. lugdb.* 338. *Hall. helv.* n. 455. *Dalib. parif.* 203. *Crantz. austr.* p. 36. *Pollich. pal.* n. 637. *Scop. carn.* n. 839. *Hoffm. germ.* 240. *Roth. germ.* I. 286. II. 114.

T. *perfoliata*. *Neck. gallob.* p. 283.

Dentaria foliis simplicibus, imis petiolatis; superioribus amplexicaulibus. *Scop. carn. ed.* I. p. 516. n. 2. R.

*Brassica sylvestris*, foliis circa radicem cichoraceis. *Bauh. pin.* 112.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 334.

Glattes Thurmkraut. W.

*Habitat in Europae pascuis siccis apricis.* ♂ (v. v.)  
Monstrum florum viridium habet *Boehmer. Fl. lipf.*  
p. 120. R.

## \*2. TURRITIS *laevigata*.

T. foliis glabris, radicalibus obovatis serratis, caulinis lanceolato-linearibus integerrimis amplexicaulibus. W.

*Turritis laevigata. Mühlenberg in litt.*

Americanisches Thurmkraut. W.

*Habitat in Pennsylvania.* ♂ (v. f.)

Caulis simplicissimus pedalis. Folia radicalia glabra obovata obtusa levissime serrata petiolata; caulina glabra sagittata amplexicaulia, inferiora uncialia lanceolata obtusa apice serrata, reliqua sesquiuncialia angusta lanceolato-linearibus integerrima. Flores praecedentis at paullo minores. Siliquae erectae. A praecedente cui similis diversissima: foliis radicalibus glabris obovatis serratis, nec runcinato-dentatis, caulinis angustioribus lanceolato-linearibus. W.

## \*3. TURRITIS *stricta*

T. foliis glabris lucidis radicatis ovatis subdentatis, caulinis lanceolatis argute dentatis sessilibus. W.

T. (*stricta*) glabra lucens, caule simplicissimo erecto, siliquis planis margine attenuatis. *All. auct. ped. p.* 18. n. 978.\*

Steifes Thurmkraut. W.

*Habitat Pedemontii in pratis et pascuis humidis* (v. f.)

Caulis simplicissimus bipedalis erectus. Folia radicalia ovata vix dentata, caulina lanceolata lucida sessilia basi angustata remote argute dentata. Affinis sequentis et glabritie duntaxat diversa. W.

## 4. TURRITIS *hirsuta*.

T. foliis omnibus hispida, caulinis amplexicaulibus medio dentatis, ramis erectis strictis. W.

T. foliis omnibus hispida, caulinis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 339. *Fl. suec.* 545; 607. *Boy. lugdb.* 339. *Dalib. parif.* 63. *Hall. helv. n.* 456. *Gmel. fib.* 3. p. 263. *Crantz. austr.* p. 35. *Pollich. pal. n.*

638. *Hoffm. germ.* 240. *Jacq. Collect.* I. p. 70.  *Ic. rar.* I. t. 126.

*T. foliis lanceolatis, alternis, hispidis. Scop. carn.* I. p. 516. n. I.

*Arabis hirsuta. Scop. carn.* 835. *Roth. germ.* I. 285. II. 112.

*Erythimo similis hirsuta, non laciniata, alba. Bauh. pin.* 101. *prodr.* 42. t. 42.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 335.

Haariges Thurmkraut. W.

*Habitat in Sueciae, Germaniae, Angliae pascuis sylvaticis. ♂ (v. v.)*

\*5. *TURRITIS patula.*

*T. foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus apice dentatis, ramis patulis. W.*

*T. (patula) radice annua, caule hirsuto, ramis patentibus, foliis ovatis subcordatis amplexicaulibus serrato-dentatis hirsutis, calyce glabro. Ehrh. Beitr.* 7. p. 259.

Ausgebreitetes Thurmkraut. W.

*Habitat in Hungariae collibus apricis. ☉ (v. v.)*

*Simillima T. hirsutae at diversa: radice annua, statura minori, caule magis flexuoso, ramis patulis nec erectis strictis, foliis apicem versus dentatis, nec ut in T. hirsuta medio vel basin versus. Ceterum convenit hirsutie, pilis furcatis, foliis basi cordatis et calyce glabro. W.*

\*6. *TURRITIS pubescens.*

*T. foliis omnibus hispidis, caulinis sessilibus apice obtuse dentatis, ramis patulis. W.*

*T. caule simplici erecto, foliis dentatis inferioribus spatulato-lanceolatis, superioribus lanceolatis sessilibus, siliquis strictis pubescentibus. Desf. atl.* 2. p. 92. t. 163.\*

Behaartes Thurmkraut. W.

*Habitat in Algeriae montibus.*

*Similis T. hirsutae sed rami patentes, folia obtuse apicem versus dentata, caulina sessilia basi attenuata nec cordata. W.*

\*7. *TURRITIS ciliata.*

*T. foliis glabris, caulinis sessilibus basi dentatis, basi et apice pilis furcatis ciliatis. W.*



*Turritis ciliata.* Schleicher cat. 59.

Gefranztes Thurmkraut. W.

*Habitat in Helvetia.* (v. l.)

*Tota glabra, Caulis simplicissimus erectus. Folia radicalia oblonga basi in petiolum attenuata apice dentata, margine basi et apice pilis furcatis ciliata; caulina sessilia basi attenuata et dentata, apice et basi pilis furcatis longis ciliata.* W.

### 8. TURRITIS alpina.

*T. foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis semiamplexicaulibus.* Syst. Veg. 502. Hoffm. germ. 240.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 336.

Gebirgs-Thurmkraut. W.

*Habitat in Austria.* Jacq. Gotlandia. ♂ 4 (v. l.)

*Statura omnino T. hirsutae, sed Caulis laevis et Folia caulina omnino glabra, integerrima, sessilia vel basi parum cordata et obtusa, vixque semiamplexicaulia.*

*Flores majores sunt: Petala alba, obtusissima, obovato-oblonga, calyce duplo longiora. Calyx compressifuscus, erectus.*

*Flores diversam a T. hirsuta dictitant.*

## 1245. BRASSICA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1096.*

*Cal. erectus, connivens. Sem. globosa. Glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem.*

\* *Stylo obtusiusculo.*

### I. BRASSICA orientalis.

*B. foliis cordatis amplexicaulibus glabris: radicalibus scabris integerrimis, siliquis tetragonis.* Hort. upf. 190. Pollich. pal. n. 639. Jacq. austr. t. 282. Hoffm. germ. 240.

*B. campestris.* Mattusch. sil. n. 500.

*B. (Turrita) foliis oblongis cordato-sagittatis amplexicaulibus, siliquis tetragonis caulem superantibus strictissimis.* Weig. obs. bot. p. 32.

*Eruca foliis ovatis integerrimis amplexicaulibus.* Hall. helv. n. 457. R.

*Erysimum perfoliatum.* Crantz. austr. p. 27. R.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

M m

*Brassica campestris* I. *Clus. hist.* 2. p. 127.

*B. campestris perfoliata*, flore albo. *Bauh. pin.* 112.

*Segu. ver.* I. p. 380.

*B. orientalis perfoliata*, flore albo, filiqua quadrangula.

*Tournef. cor.* 16.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 337.

Orientalischer Kohl. W.

*Habitat in Oriente, Montpelii, Germania etc.* ☉ (v. v.)

*Petala alba. Folia omnia glabra. Syst. Veget.* 502.

\*2. *BRASSICA austriaca.*

*B. foliis cordatis amplexicaulibus integerrimis glabris, filiquis tetragonis elevato-sulcatis.* W.

*B. foliis cordatis amplexicaulibus glabris, omnibus integerrimis, filiquis tetragonis striatis erectis.* *Murr.*

*syst. veg. ed.* 14. p. 601. *Jacq. austr. t.* 283.

Österreichischer Kohl. W.

*Habitat in Austria, Thuringia inter segetes.* ☉

*Synonyma extricatu difficillima. Similis praecedenti differt vero: filiquis elevato-striatis. Flores sunt ochroleuci vel flavi.* W.

3. *BRASSICA campestris.*

*B. radice cauleque tenui, foliis cordato-acuminatis amplexicaulibus, inferioribus lyratis dentatis subhispidis.* *Smith bot.* 2. p. 718.\*

*B. radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus.* *Hort. cliff.* 339. *Fl. suec.* 546; 608. *Roy. lugdb.* 344. *Flor. dan. t.* 550. *Hoffm. germ.* 241. *Roth. germ. I.* 285. *II.* 113.

*B. foliis oblongis cordato-sagittatis amplexicaulibus, filiquis caule brevioribus patentibus.* *Weig. obj.* p. 32. R.

*B. campestris perfoliata, flore luteo.* *Loes. pruss.* 29. *Fl. lapp.* 265.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 338.

Feld Kohl. W.

*Habitat in agris, non argillofis, Europae.* ☉

*Radix annua. Corolla lutea. Folia radicalia lyrata, subhispida; caulina laevia. Syst. Veg.* p. 502.

4. *BRASSICA arvensis.*

*B. foliis amplexicaulibus spathulatis repandis: summis cordatis integerrimis.* *Mant.* 95. *Hoffm. germ.* 241.

*B. campestris.* *Kniph. cent. 5. n. 21. R.*

*B. campestris, purpureo flore.* *Bauh. pin. 112. Clus. hist. 2. p. 127.*

*B. sylvestris, fabariae foliis.* *Bocc. sicc. 49. t. 25. f. 3. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 339.*

Acker-Kohl. W.

*Habitat in Europae australis arvis humentibus. 4*

Caulis pedalis, laevis, flexuosus, ramosus, inferne perennans. Folia glabra, amplexicaulia, spathulata, obtusissima, margine exteriori repanda, subcarnoso-oleracea: superiora amplexicaulia, cordata, obtusa. Calyx clausus laevis, basi bifariam gibbus. Petala laminis patentia, obovata, emarginata, violacea venis sanguineis. Antherae flavae, eminentes.

## 5. BRASSICA alpina.

*B. foliis caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus, radicalibus ovatis, petalis erectis.* *Mant. 95. Poilich pal. n. 640. Hoffm. germ. 241. Jacq. Collect. 4. p. 299. Vill. delph. 3. p. 330. t. 36.*

*Turritis foliis glaberrimis, radicalibus petiolatis, rotundis, incurvis, caulinis amplexicaulibus, sagittatis, obtusis.* *Hall. helv. n. 454.*

*Turritis Brassica.* *Leers fl. herb. n. 518. \*R.*

*Turritis foliis radicalibus ovatis, caulinis cordato-oblongis integerrimis nitidis.* *Grim. Nov. Act. A. N. C. 3. p. 77. R.*

*Brassica alpina perennis.* *Rupp. ed. Hall. 75. \*Mapp. alf. p. 42.*

*Turritis pauciflora.* *Grim. isen. in Nov. Act. A. N. C. III. app. p. 348. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 339.*

Alpen-Kohl. W.

*Habitat in Germania, Helvetia. 4 D. Schreber. (v. l.)*

*Differt a B. arvensi caule angustiore, foliis tenerioribus, longioribus, radicalibus longe petiolatis; in primis Petalis erectiusculis, albis, et flore parvo Turritidis. Figuram misit D. Grimm.*

## 6. BRASSICA Napus.

*B. radice caulescente fusiformi, foliis laevibus, superioribus cordato-lanceolatis amplexicaulibus, inferioribus lyratis dentatis.* *Smith. brit. 2. p. 719.\**

M m. 2

B. radice caulescente fusiformi. *Hort. cliff.* 339. *Fl. suec.* 547; 609. *Mat. med.* 162. *Roy. lugdb.* 344. *Dalib. parif.* 199. *Gmel. sib.* 3. p. 267. *Crantz austr.* p. 38. *Ludw. ect. t.* 165. *Blackw. t.* 224. *Hoffm. germ.* 241. *Roth. germ. I.* 285. *II.* 113.

*Napus sylvestris*, *Bauh. pin.* 95.

*Napus*. *Dod. pempt.* 674.

β. *Napis sativa*. *Bauh. pin.* 95.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 340.

Rübsen-Kohl. W.

*Habitat in arenosis maritimis Gotlandiae, Belgii, Angliae.* ♂ (v. v.)

*Folia Radicalia lyrata, glabra. Caulina amplexicaulia, cordato-oblonga, obsolete denticulata. Calyx patens, proximus Sinapios.*

## 7. BRASSICA Rapa.

B. radice caulescente orbiculari depressa carnosa, foliis radicalibus lyratis scabris, caulinis integerrimis laevibus. *Smith brit.* 2. p. 719.

B. radice caulescente orbiculari depressa carnosa. *Hort. cliff.* 339. *Hort. upf.* 190. *Mat. med.* 163. *Roy. lugdb.* 344. *Blackw. t.* 226. *Hoffm. germ.* 241. *Roth. germ. I.* 285. *II.* 114.

*Rapa rotunda et oblonga. Mill. dict. n. I. et 2. Regn. bot.*

*Rapa sylvestris. Raj. hist.* 800.

*Rapa sativa rotunda. Bauh. pin.* 89.

*Rapum. Cam. epit.* 218.

β. *Rapa sativa oblonga s. femina. Bauh. pin.* 89.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 343.

Rüben-Kohl. W.

*Habitat in arvis Angliae, Belgiae.* ♂ (v. v.)

*Praecedenti foliis flore et et siliquis simillima.* W.

## 8. BRASSICA oleracea.

B. radice caulescente tereti carnosa, foliis omnibus glabris glaucis repandis lobatisve. *Smith brit.* 2. p. 720.\*

B. radice caulescente tereti carnosa. *Hort. cliff.* 338. *Hort. upf.* 189. *Mat. med.* 163. *Roy. lugdb.* 343. *Mill. dict. n. I.* *Pall. it. I.* p. 78.

B. (*oleracea sylvestris*) *maritima arborea s. procerior ramosa. Moris. hist.* 2. p. 208. *Raj. hist.* 796. *Mill. dict. n. 4.*

β. *Brassica (olerac. viridis) alba vel viridis. Bauh. pin.* 111.

- γ. *Brassica (oleracea rubra) capitata rubra.* Bauh. pin. III.  
 δ. *Brassica (oleracea capitata) capitata alba.* Bauh. pin. III. *Regn. bot.*  
 ε. *Brassica (oleracea sabauda) alba crispa.* Bauh. pin. III.  
*Brassica undulata.* Renealm. spec. 113.  
 ζ. *Brassica (oleracea laciniata) laciniata rubra.* Bauh. hist 2. p. 832.  
 η. *Brassica (oleracea selenisia) angusto apii folio.* Bauh. pin. 112.  
 θ. *Brassica (oleracea labellica) fimbriata.* Bauh. pin. 112.  
*Brassica labellica.* Renealm. spec. 134. t. 133.  
 ι. *Brassica (oleracea botrytis) cauliflora.* Bauh. pin. III.  
*Renealm. spec. 131. t. 133. Cam. epit. 252. Mill. dict. n. 3. Kniph. cent. 12. n. 18.*  
 κ. *Brassica (oleracea Napobrassica) radice napiformi.* Tournef. inst. 219. *Mill. dict. n. 2.*  
*Napo brassica.* Bauh. pin. III. prodr. 54.  
 λ. *Brassica (olerac. gongylodes) gongylodes.* Bauh. pin. III. *Mill. dict. n. 8.*  
*Brassica caulo-Rapa.* Bauh. hist. 2. p. 829.  
*Caulo-Rapum.* Cam. epit. 251.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 343.*  
*Garten-Kohl.* W.  
*Habitat in maritimis Angliae. ♂ (v. v.)*

\*9. BRASSICA *Richerii*.

- B. foliis petiolatis oblongis subdentatis, radice caulescente.* W.  
*B. (Richerii) radice caulescente, foliis subdentatis petiolatis, caule subnudo.* Vill. delph. 3. p. 331. t. 36.\*  
*All. ped. n. 967. t. 58. f. 1. et t. 76. f. 2.*  
*B. foliis inferioribus petiolatis subserratis, summis lineari-lanceolatis integris.* Ger. prov. 367.\*  
*B. alpina perennis.* Tournef. inst. 220.  
*Richerscher Kohl.* W.  
*Habitat in alpibus Delphinatus et Pedemontanis. ♀*  
 (v. l.)

*Folia inferiora oblonga subdentata, caulina petiolata integerrima obovata vel oblonga integerrima, omnia obtusa.* W.

\*10. BRASSICA *cretica*.

- B. caule fruticoso, foliis ovato-subrotundis crenatis petiolatis laevibus.* Lamark. encycl. 1. p. 739.\*

*B. cretica fruticosa*, folio subrotundo. *Tournef. cor.* 16.  
Candischer Kohl. W.  
*Habitat in Creta.* †

\*II. *BRASSICA suffruticosa.*

*B. caule suffruticolo, foliis glaucis subcarnosis integerrimis ovato-oblongis basi attenuatis.* *Desf. atl.* 2.  
p. 94.

Strauchartiger Kohl. W.

*Habitat in Africae borealis montibus aridis prope Casam.* †

*Caules suffruticosi ramosi erecti glabri teretes pedales. Folia glauca glabra petiolata integerrima obtusa. Corolla B. arvensis violacea venoso-reticulata. Siliquae graciles longissimae erectae glabrae teretes. Differt a B. arvensi cui affinis: caule fruticuloso, foliis petiolatis basi attenuatis.* *Desf. l. c.*

12. *BRASSICA chinensis.*

*B. foliis ovalibus subintegerrimis, floralibus amplexicaulibus lanceolatis, calycibus ungue petalorum longioribus.* *Amoen. acad.* 4. p. 281. \* *Act. petropol.* 1761. p. 331. *Osb. it.* 195.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 345.

Chinesischer Kohl. W.

*Habitat in China.* ♂

13. *BRASSICA violacea.*

*B. foliis lanceolato-ovatis glabris indivisis dentatis.* *Hort. ups.* 191. *Mill. dict. n.* 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 346.

Violetter Kohl. W.

*Habitat in China.* ♂

\*14. *BRASSICA subhastata.* W.

*B. foliis glabris radicalibus runcinatis, caulinis lanceolatis integerrimis subhastatis.* W.

Halbspontonblättriger Kohl.

*Habitat in insulis Archipelagi.* ☉ (v. v.)

*Caulis spithameus vel pedalis erectus ramosus. Folia radicalia runcinata, caulina lanceolata integerrima basi uno latere hastata, summa basi attenuata indivisa. Racemi pauciflori. Flores flavi. Siliquae tenues teretes biunciales erectae.* W.

\*15. BRASSICA *polymorpha*.

B. foliis inferioribus angusto-lanceolatis pinnatifido-dentatis, superioribus linearibus integerrimis, calyce patenti, W.

B. (*polymorpha*) foliis inferioribus lineari-lanceolatis pinnatifido-dentatis, superioribus subulatis integris.

*Murr. Comm. goett. 1776. p. 35. t. 6?*

Veränderlicher Kohl. W.

*Habitat in Hungaria, Sibiria. 2 (v. f.)*

*Nostra planta exacte convenit cum figura Clarif. Murray sed differt calyce patenti, et radice perenni, tamen diversam non credo. W.*

\*16. BRASSICA *teretifolia*.

B. foliis carnolis teretibus glabris pinnatis, pinnulis distinctis. *Desf. atl. 2. p. 94. t. 164.*

Rundblättriger Kohl. W.

*Habitat in Africae borealis arenosis humidis prope Cafsam.*

*Radices longae ramosae tortuosae. Caulis glaber ramosus pedalis. Folia glauca glabra teretia mollia pinnata, pinnulis inaequalibus distinctis teretibus obtusis inaequalibus. Flores racemosi pedicellati. Calyx coloratus, foliolis adpressis linearibus. Corolia violacea magnitudine B. oleraceae. Limbus petalorum obovatus integer. Siliqua tenuis glabra biuncialis polysperma. Desf. l. c.*

\* \* *Erucae siliquis stylo ensiformi.*

17. BRASSICA *Erucastrum*.

B. foliis runcinatis, caule hispido, siliquis laevibus. *Syst. Veg. 503. Pollich pal. n. 641. Crantz austr. p. 38. n. 4. Scop. carn. 2. n. 828. Doerr. nass. p. 60. Kniph. cent. 12. n. 17.*

*Silymbrium foliis pinnato-dentatis. Hort. cliff. 337. Roy. lugdb. 341. Dalib. parif. 205. sub Silym. 110.*

*Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. Bauh. pin. 98.*

*Eruca sativa. Fusch. hist. 262.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 347.*

Raukenartiger Kohl. W.

*Habitat in Europae australioris ruderatis. ☉ (v. v.)*

18. BRASSICA *Eruca*.

B. foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris. *Hort.*

*upf.* 190. *Mat. med.* 163. *Blackw. t.* 242. *Kniph. cent.* 9. n. 17. *Crantz. austr. p.* 38. *Regn. bot.*

*Silymbrium* foliis pinnatifidis: laciniis exterioribus majoribus, caule hirsuto. *Hort. cliff.* 337.

*Sinapi* foliis tetragonis hirsutis, floribus venosis. *Hall. helv. n.* 464. R.

*Eruca latifolia alba.* *Bauh. pin.* 98.

*Sinapi* alterum genus. *Fuchf. hist.* 539.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 347.

Rauhstieliger Kohl. W.

*Habitat in* Helvetia, Austria. ☉ (v. v.)

*Differt a praecedente: caule tenuiore minore hirsuto, foliorum laciniis lineari-lanceolatis subintegerrimis.* W.

\* 19. *BRASSICA pinnatifida.*

B. foliis pinnatifidis, laciniis serratis, siliquis cuspidatis tetragonis. *Desf. atl.* 2. p. 95. t. 165.\*

Schlitzblättriger Kohl. W.

*Habitat in* Africa boreali prope Gafsam.

Caulis sesquipedalis glaber quandoque basi hispidus.

Folia pinnatifida, laciniis lineari-lanceolatis dentatis.

Flores pallide flavi nervosi. Siliquae glabrae subtetragonae acuminatae. Variat valde foliorum forma et

magnitudine, quae interdum glabra interdum hispida. W.

\* 20. *BRASSICA elongata.*

B. foliis petiolatis inferioribus sinuato-pinnatifidis hispidis, superioribus glabris dentatis, siliquis torulosis tetragonis cuspidatis. W.

B. (*elongata*) caule glabro, foliis petiolatis oblongis, inferioribus pinnatifidis hispidis, superioribus dentatis glabris, racemis longissimis laxis, siliquis torulosis pedunculo vix longioribus, valvulis dissepimento dimidio brevioribus. *Waldstein et Kitaibel pl. rar. hung.*

*i. p.* 26. t. 28.\* *Ehrh. Beitr.* 7. p. 159.

Langrispiger Kohl. W.

*Habitat in* Hungariae aggeribus sterilibus. ♂ (v. v.)

\* 21. *BRASSICA Cheiranthus.*

B. foliis petiolatis pinnatifidis dentatis hispidis, siliquis torulosis plano-rostratis. W.

B. (*Cheiranthus*) foliis sinuato-laciniatis subhirsutis, calyce connivente. *Vill. delph.* 3. p. 332. t. 36.\*



*Sinapis Tournefortii.* *All. ped. n. 912.\**

*Raphanus (Erucoides) siliquis ovatis gibbis rostro longitudine siliquae.* *Linn. Suppl. 299?*

*Eruca sylvestris lutea durlae pastoris folio italica.* *Barr. ic. 1016.*

Leucojenartiger Kohl. W.

*Habitat in Delphinatus et Pedemontii arenosis ad fluviorum ripas.* ♂ (v. l.)

*Siliqua ut in Sinapi rostro plano et quod singulare, rostrum est monospermum. Differt vero a Sinapi calyce clauso.* W.

*Raphanus Erucoides Linnæi filii ab hac non diversus videtur.* W.

## 22. BRASSICA vesicaria.

B. foliis runcinatis, siliquis hispidis tectis calyce tumido.  
*Sp. pl. 933.*

B. foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis retrorsum hispidis.  
*Hort. upf. 191.*

*Eruca chalepensis, caulibus et siliquis hirsutis.* *Morif. hist. 2. p. 228.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 349.*

Dickkelchiger Kohl. W.

*Habitat in Hispania.* *Loefling. ☉ (v. v.)*

*Radix fusiformis. Folia lanceolata, pinnatifido-dentata, supra glabra. Caulis pilosus, ramosus. Racemi erecti, terminales. Corollae flavae venis saturatioribus. Calyx floris cylindricus, in fructu vero ventricosus inflatus persistens evadit. Siliquae venter calyce non longior pistillo remanente lanceolato. Differt itaque ab Eruca calyce, sub fructu, inflato vesicario; Foliis non lyratis, sed lanceolatis; Siliquis hispidis retrorsum nec glabris; Calycibus persistentibus ad maturitatem fructus, nec deciduis.*

## \*23. BRASSICA lyrata.

B. foliis hispidis radicalibus lyratis, caulinis inciso-dentatis, caule adscendente, siliquis oblongis compressis. W.

B. hirsuta, caule adscendente, foliis lyratis, siliquis compressis hispidis mucronatis. *Desf. atl. 2. p. 96. t. 166.\**  
Leyerblättriger Kohl. W.

*Habitat in Africae borealis desertis arenosis.*

*Folia radicalia lyrata dentata magna. Caules semipedales simplices vel ramosae plures e radice adscen-*

*dentes, foliis perpaucis instructi. Folia caulina parva oblonga petiolata inciso-dentata. Flores violacei nervosi. Siliquae oblongae compressae breves hispidae stylo terminatae. W.*

\*24. BRASSICA *crassifolia*.

B. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus. *Vahl symb. 2. p. 78.*

B. (*crassifolia*) foliis crassis pinnatifidis. *Forsk. descr. 118. Dickblättriger Kohl. W.*

*Habitat in Aegypto ad pyramides Januario florens.*

*Tota planta glabra ramosa. Folia palmaria laciniis suboppositis pollicaribus obtusis integerrimis. Siliquae teretes torulosae pollicares stylo subulato terminatae. Vahl l. c.*

1246. SINAPIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1097.*

*Cal. patens. Cor. ungues recti. Glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem.*

1. SINAPIS *arvensis*.

S. siliquis multangulis toroso-turgidis rostro ancipite longioribus. *Hort. cliff. 338. Fl. suec. 548; 610. Roy. lugdb. 343. Hall. helv. 467. Dalib. paris. 200. Mill. dict. n. 3. Crantz austr. p. 46. Scop. carn. n. 842. Pollich pal. n. 642. Flor. dan. t. 753. Hoffm. germ. 242. Roth germ. I. 288. II. 122.*

*Rapistrum flore luteo. Bauh. pin. 95.*

*Irion. Fuchs. hist. 257.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 350.*

*Acker-Senf. W.*

*Habitat in agris Europae. ☉ (v. v.)*

*Siliquae laeves.*

2. SINAPIS *orientalis*.

S. siliquis retrorsum hispidis apice subtetragonis compressis. *Amoen. acad. 4. p. 280.\* Murray prodr. 167.*

*S. orientale maximum, rapi folio. Tournef. cor. 17.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 351.*

*Orientalischer Senf. W.*

*Habitat in Oriente.* ☉ (v. f.)

*Similis praecedenti.* Siliquae rostrum tantum laeve.

### 3. SINAPIS *brassicata.*

S. foliis obovatis denticulatis laevibus. *Syst. Nat.* 3. p. 231.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 352.

Kohlartiger Senf. W.

*Habitat in China.* ☉ (v. f.)

Statura *Brassicae* aut *Lactucae*, sed Calyx *sinapios*. Caulis *sesquipedalis*, *laevissimus*. Folia Radicalia *oleracea*, *obovata*, *obtusata*, *dentata*, *glabra*, *albido-venosa*, *petiolis canaliculatis*; Caulina *media oblonga*, *ad basin petioli subauriculata*; Summa *lanceolata*, *sessilia*, *amplexicaulia*. Flos *simillimus Brassicae oleraceae*. Calyx *flavus*, *sed patens*. Petala *flava*, *vix emarginata*. Siliqua *similis Brassicae oleraceae*.

### 4. SINAPIS *alba.*

S. siliquis hispida: rostro obliquo longissimo ensiformi.

*Hort. cliff.* 338. *Hort. upf.* 191. *Roy. lugdb.* 343.

*Dalib. parif.* 200. *Hall. helv. n.* 466. *Mill. dict.*

*n.* 1. *Blackw. t.* 29. *Hoffm. germ. I.* 289. *II.* 123.

Sinapi album siliqua hirsuta, semine albo et rufo. *Bauh. hist.* 2. p. 858. R.

Sinapi apii folio. *Bauh. pin.* 99.

Sinapi sativum alterum. *Dod. pempt.* 707.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 352.

Weisser Senf. W.

*Habitat in agris Belgii, Angliae, Galliae.* ☉ (v. v.)

Racemi et Pedunculi *striati*. Siliquae *nodis 3*, *subcarinatis*, *pilis patentibus*; Rostrium *ensiforme*, *carinatum*, *etiam per ultimum articulum*.

### 5. SINAPIS *nigra.*

S. siliquis glabris racemo adpressis. *Syst. veg.* 503.

S. siliquis glabris apice tetragonis. *Hort. cliff.* 338. *Fl.*

*suec.* 549; 611. *Mat. med.* 164. *Roy. lugdb.* 343.

*Dalib. parif.* 199. *Mill. dict. n.* 2. *Pollich. pal. n.*

643. *Blackw. t.* 446. *Hoffm. germ.* 242. *Roth germ.*

*I.* 289. *II.* 123.

Sinapi siliqua latiuscula glabra, semine rufo s. vulgare.

*Bauh. hist.* 2. p. 856.

Sinapi rapii folio. *Bauh. pin.* 99.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 353.*

Schwarzer Senf. W.

*Habitat in aggeribus ruderatis Europae septentrionalioris. ☉ (v. v.)*

### 6. SINAPIS *pyrenaica*.

S. filiquis striatis scabris, foliis runcinatis laevibus. *Sp. pl. 934. Allion. ped. n. 960. t. 55. f. 1.*

Erysimum, dentis leonis folio, perenne pyrenaicum. *Tournef. inst. 228.*

β. *Sinapis maritima. Allion. ped. n. 961.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 354.*

Pyrenäischer Senf. W.

*Habitat in Pyrenaeis. D. Monnier. ♂ (v. f.)*

*Folia runcinata; laevia, costa albida, radicalium laciniis triangulis denticulatis: caulinarum lanceolatis. Caulis laeviusculus. Flores racemosi, parvi, lutei. Siliquae rectiusculae, striatae, scabrae, pilis sursum spectantibus obsoletis.*

### 7. SINAPIS *pubescens*.

S. filiquis pubescentibus erectis: rostro compresso, foliis lyratis villosis. *Mant. 95.*

S. hirsuta, caulibus frutescentibus, foliis inferioribus lyrato-pinnatis: superioribus sessilibus. *Ard. spec. 1. p. 21. t. 9.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 355.*

Behaarter Senf. W.

*Habitat in Siciliae monte Buffambarenfi. †. Arduin. (v. f.)*

*Caulis perennans. Folia lyrata, obtusa, villosa, ut tota planta. Flores lutei Petalis integris. Siliquae erectae, villosae.*

### \*8. SINAPIS *hispida*.

S. filiquis hispidis erectis, foliis lyratis scaberrimis, caule hispido. W.

*Sinapis hispida. Schousboe.*

Scharfblättriger Senf. W.

*Habitat in imperio Marocco. ☉ (v. f.)*

*Caulis hispido-muricatus. Folia pinnatifida obtusa dentata, lobo terminali oblongo maximo, utrinque pilis rigidis brevibus scaberrima. Petioli hispidi. Flores flavi. Siliquae hispidae erectae, rostro longo obtuso plano terminatae. W.*

9. SINAPIS *chinesis*.

S. filiquis laevibus subarticulatis patulis, foliis lyrato-runcinatis subhirsutis. *Mant.* 95.

S. filiquis glabris subarticulatis divaricatis, foliis inferioribus lyrato-pinnatis auriculatis, superioribus lineari-lanceolatis. *Ard. spec.* 1. p. 23. t. 10.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 355.

Chinesischer Senf. W.

*Habitat in China?* Arduini. ☉ (v. f.)

Caulis inferne hispida. Folia lyrato-runcinata, dentata, margine costisque scabra. Flores albi, parvi.

10. SINAPIS *juncea*.

S. ramis fasciculatis, foliis summis lanceolatis integerrimis. *Hort. ups.* 191.\* *Mill. dict. n.* 5. *Jacq. hort.* t. 171.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 356.

Binfenartiger Senf. W.

*Habitat in Asia, China.* ☉ (v. v.)

\*11. SINAPIS *Allioni*.

S. filiquis ovato-oblongis patulis, foliis pinnatifidis, laciniis incis. *Murr. Syst. veg. ed.* 14. p. 602. *Jacq. hort.* 2. t. 168.

Allionischer Senf. W.

*Habitat* - - - ☉ (v. v.)

12. SINAPIS *erucoides*.

S. filiquis laevibus aequalibus, foliis lyratis oblongis glabris, caule scabro. *Amoen. acad.* 4. p. 322.\* *Mill. dict. n.* 4. *Jacq. hort.* t. 170.

Sinapi hispanicum pumilum album. *Tournef. inst.* 227.

Eruca sylvestris, flore albo, italica. *Barr. ic.* 132.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 356.

Rankenartiger Senf. W.

*Habitat in Italia, Hispania ad vias, vineas.* ☉ (v. f.)

Caulis purpurascens, subangulatus, scaber. Folia lyrato-runcinata, acutiuscula, serrulata. Racemi corymbosi. Calyx semipatulus, pubescens. Petala alba, obtusa, vix emarginata. Filamenta purpurascens.

\*13. SINAPIS *cernua*.

S. filiquis laevibus patulis, folio radicali lyrato, lobo terminali maximo ovato inciso-dentato. *Thunb. jap.* 261.

Hängender Senf. W.

*Habitat in Japonia, China.* ☉

*Tota planta glabra. Folium radicale lyratum, Lobi oppositi oblongi integri semipollicares internodiorum longitudine, Lobus terminalis ovatus obtusus incisus dentatus, dentibus latis, parum crispus nervosus magnitudine fere folii Brassicae. Folia caulina subsessilia oblonga fere integra, superne dentata nervosa, digitalia, superioribus sensim minoribus. Caulis striatus glaber superne ramosus. Rami florentes cernui. Flores terminales racemosi albi. Pedunculi capillares patentes. Siliquae lineares apice attenuatae laeves glabrae. Thunb. l. c.*

14. *SINAPIS hispanica.*

*S. foliis duplicato-pinnatis, laciniis linearibus. Hort. cliff. 338. Roy. lugdb. 343. Mill. dict. n. 6.*

*Sinapi hispanicum, nasturtii folio. Tournef. inst. 227. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 357.*

*Spanischer Senf. W.*

*Habitat in Hispania.*

\*15. *SINAPIS japonica.*

*S. siliquis laevibus erectis, foliis inciso-pinnatifidis glabris. Thunb. jap. 262.*

*Japanischer Senf. W.*

*Habitat in Japonia.*

*Tota planta glabra herbacea. Caulis erectus striatus laevis ramosus. Rami patentes cauli similes ramulosi. Folia petiolata inciso-pinnatifida, angulis rotundatis, acuta digitalia, summa folia minus profunde pinnatifida, apice saepe dentata. Florum racemus longissimus. Pedunculi capillares patenti-erecti. Corollae lutescentes. Siliquae erectae subangulares laeves glabrae, apice attenuatae. Thunb. l. c.*

16. *SINAPIS incana.*

*S. siliquis racemo appressis laevibus, foliis inferioribus lyratis scabris; summis lanceolatis, caule scabro. Amoen. acad. 4. p. 281.\* Gouan. illustr. p. 45. Jacq. hort. t. 169.*

*Sinapi foliis radicalibus pinnatis, hirsutis, incanis, cornu sua siliqua breviori. Hall. helv. n. 463. R.*

*Erysimum foliis subincanis, siliquis brevissimis. Herm. parad. 115. t. 115. Vaill. parif. 51.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 357.*

Grauer Senf. W.

*Habitat in Gallia, Lusitania, Hispania, Helvetia. ♂*  
(v. v.)

\*17. *SINAPIS frutescens.*

S. filiquis linearibus laevibus, foliis inferioribus oblongis dentatis, superioribus lanceolatis integris, caule glabro frutescente. *Ait. Kew. 2. p. 404.*

Strauchartiger Senf. W.

*Habitat in Madera. †*

\*18. *SINAPIS radicata.*

S. foliis radicalibus profunde lyratis hispidis, caulinis pinnatis, ramis virgatis glabris, filiquis subulatis torulosis patentibus. *Desf. atl. 2. p. 98. t. 167.\**

Langwurzlicher Senf. W.

*Habitat in collibus incultis Algeriae. †*

Radices longissimae tortuosae ramosae filiformes. Caulis basi hispidus superne glaber erectus ramosus, ramis virgatis. Folia radicalia et caulina inferiora petiolata hispida profunde lyrata, pinnulis alternis remotis obtusis inaequaliter dentatis, minoribus interjectis, lobo terminali majore rotundato vel oblongo. Folia caulina remota pauca glabra, pinnata, pinnulis lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis, integerrimis aut dentatis. Flores pallide flavi. Siliquae glabrae patentibus mucronatae, mucrone subulato. *Desf. l. c.*

19 *SINAPIS laevigata.*

S. filiquis laevibus patulis, foliis lyratis glabris; summis lanceolatis, caule laevi. *Amoen. acad. 4. p. 281.\**

Erysimi varietas. *Herm. par. 155.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 357.*

Glatte Senf. W.

*Habitat in Lusitania, Hispania. ♂ (v. l.).*

## 1247. R A P H A N U S.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1098.*

*Cal.* clausus. *Siliqua* torosa, subarticulata, teres. *Glandulae* melliferae 2 inter stamina breviora et pistillum, totidem inter stamina longiora et calycem.

1. RAPHANUS *fativus*.

R. foliis lyratis, siliquis teretibus torosis bilocularibus. W.

R. siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *Hort. upf.* 188. *Mat. med.* 164. *Roy. lugdb.* 344. *Mill. dict. n. 1.*

R. minor oblongus. *Bauh. pin.* 96. *Blackw. t.* 81.

R. major orbicularis s. rotundus. *Bauh. pin.* 96.

β. R. niger. *Bauh. pin.* 96.

γ. R. chinensis annuus oleiferus.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 358.

Rüben-Rettig. W.

*Habitat in China.* ☉ ♂ (v. v.)

2. RAPHANUS *caudatus*.

R. foliis lyrato-runcinatis siliquis unilocularibus depressis planta longioribus. W.

R. siliquis decumbentibus tota planta longioribus. *Mant.* 95. *Linn. dec.* 3. t. 10.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 360.

Langschotiger Rettig. W.

*Habitat in Final.* ☉ *Braad.* 1764.

*Statura et Facies Raphani fativi, sed Folia acutiora et Caulis brevior, diffusus, nec nisi junior erectus, at laevis, purpurascens rore glauco. Flores albid.* Siliquae bi-f. tripedales, curvae, uniloculares, futuris quatuor obsoletis; basi gibbis duobus; dissepimento recipiente semen unum post alterum. Longitudo siliquarum negat caulem crescere erectum, cum decumbant supra terram, instar serpentis. H. U.

3. RAPHANUS *Raphanistrum*.

R. foliis lyratis, siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus. W.

R. siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *Fl. suec.* 568; 612. *Roy. lugdb.* 344.



*Hall. helv. n. 468. Dalib. paris. 198. Sauv. monsp. 285. Linn. diff. de Raphania. Fl. dan. t. 678. Crantz austr. p. 37. Pollich. pal. n. 644. Hoffm. germ. 242. Roth. germ. I. 282. II. 99.*

Rapistrum flore albo, siliqua articulata. *Bauh. pin. 95.*

Rapistrum flore albo striato. *Bauh. hist. 2. p. 851.*

Rapistrum flore albo lineis nigris depicto. *Bauh. pin. 95.*

Rapistrum purpureum. *Tabern. 407.*

β. *Lampfana* flore melino. *Tabern. p. 408.*

Rapistrum flore luteo. *Bauh. pin. 95.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 361.*

Hederich - Rettig. W.

*Habitat inter segetes Europae. ☉ (v. v.)*

#### 4. RAPHANUS *sibiricus.*

R. siliquis teretibus torulosis villosis, foliis linearibus pinnatifidis. *Sp. pl. 935. Murr. Nov. Comment. goett. 1775. p. 48. t. II.*

R. foliis pinnatis, pinnis confluentibus, siliquis teretibus articulatis unilocularibus. *Gmel. sib. 3. p. 266. n. 28.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 365.*

Sibirischer Rettig. W.

*Habitat in Sibiria. ☉ (v. l.)*

*Habitus Erucae, planta pygmaea. Caules maxima ex parte nudi. Folia radicalia et caulina pinnatifida linearia. Corollae magnae flavae. Siliquae teretes pedicellatae moniliformes uti caulis villosae, rostro oblongo: Figura Cardamines alpinae insipidae Col. ecphr. 2. p. 69. hanc refert.*

#### \*5. RAPHANUS *tenellus.*

R. siliquis subulatis articulatis bilocularibus foliisque glabris lanceolatis dentatis, infimis pinnatifidis. *Ait. Kew. 2. p. 405.*

*Raphanus tenellus. Pall. itin. 3. app. n. 105. t. L. f. 3.\* Zarter Rettig. W.*

*Habitat in desertis ad mare Caspium. ☉ (v. v.)*

*Planta pygmaea digitalis. Caulis erectus laeviusculus. Folia radicalia runcinato-pinnatifida, laciniis oblongis obtusiusculis integerrimis; Folia caulina lanceolata petiolata remote dentata. Flores parvi purpurei. Siliquae torulosae articulatae scabrae longe rostratae. W.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

N n

\*6. RAPHANUS *arcuatus*. W.

R. siliquis subulatis arcuatis bilocularibus laevibus, foliis oblongo-lanceolatis dentatis. W.

G krummter Rettig. W.

Habitat - - - - - ☉ (v. v.)

Caulis brevis spithamaeus vel brevior erectus ramosus. Folia petiolata oblongo-lanceolata glaberrima repando-dentata. Flores parvi violacei. Siliquae teretes biloculares articulatae arcuatae laeves striatae, rostro subulato. Figura Hesperidis arenariae a Clariff. Desfontaines t. 162 data, cum planta nostra, excepta siliqua, exacte convenit. W.

\*7. RAPHANUS *lanceolatus*. W.

R. siliquis bilocularibus ventricosus laevibus, rostro subtetragono, foliis oblongo-lanceolatis apice subdentatis. W.

Sinapis (*integrifolia*) foliis inferioribus oblongis inaequaliter serratis, supremis lineari-lanceolatis integerrimis. West. fl. cruc. p. 222?

Lanzettblättriger Rettig. W.

Habitat in Antillis. (v. l.)

Caulis sesquipedalis erectus flexuosus glaber ut tota planta; ramis brevibus. Folia oblongo-lanceolata, suprema angustolanceolata integerrima, inferiora apice obtuse dentata, omnia petiolata. Racemus longus semipedalis terminalis. Flores mediocres flavi. Siliquae semunciales laeves ventricosae biloculares rostro longo obtuso obsolete tetragono. W.

\*8. RAPHANUS *pilosus*. W.

R. siliquis teretibus laevibus articulatis unilocularibus, foliis lanceolato-linearibus basi pinnatifidis, caule piloso-hispido. W.

Haariger Rettig. W.

Habitat in Guinea. (v. l.)

Caulis bipedalis (an altior?) ramosus divaricatus, piloso-hispidus. Folia tripollicaria angusta lanceolato-linearia acuminata basi pinnatifida, medio dentata, apice integerrima glabra. Racemi pauciflori ex omnibus foliorum axillis. Flores non vidi. Siliquae sesquipollicares teretes articulatae uniloculares secundae, rostro brevi terminatae. W.

## \*1248. CORDYLOCARPUS.

*Desf. atl. 2. p. 79.**Cal. clausus. Siliqua torosa articulata teres, articulo supremo discreto.*\*1. CORDYLOCARPUS *muricatus.**C. siliquis laevibus unilocularibus patentibus articulo terminali muricato, foliis sublyratis. W.**C. caule inferne hispido scabro, foliis glabris oblongis, siliquis patentibus apice echinatis. Desf. atl. 2. p. 79. t. 152.\***Stachlicher Keulenrettig. W.**Habitat ad agrorum limites prope Mayanę Algeriae. ☉**Folia oblonga inaequaliter dentata vel etiam lyrata.**Caulis erectus ramosus. Flores flavi magnitudine Sinapis arvensis. Siliqua unilocularis tetra- vel pentasperma laevis torosa teres, articulo terminali globoso rostrato muricato. W.*\*2. CORDYLOCARPUS *laevigatus. W.**C. siliquis laevibus bilocularibus adpressis, articulo terminali glabro, foliis pinnatifidis. W.**Erucaria aleppica. Gaert. sem. 2. p. 298. t. 143. f. 9.**Sinapi graecum maritimum tenuissime laciniatum, flore purpurascete. Tournef. cor. 17. itin. ed. germ. 1. p. 398. t. 35.**Glatte Keulenrettig.**Habitat in Archipelagi insulis. (v. f. c. fr.)**Caulis ramosus pedalis divaricatus, ut tota planta glaber. Folia pinnata Coronopi subcarnosa, vel potius pinnatifida, laciniis linearibus integerrimis canaliculatis. Flores rubri in racemis terminalibus. Racemi fructiferi magis elongati longissimi. Siliquae arcte adpressae, brevissime pedunculatae cylindratae glabrae biloculares articulatae, articulo supremo discreto ovato glabro monospermo. W.*

## 1249. C L E O M E.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1099.*

*Glandulae nectariferæ 3, ad singulum finum calycis singulae, excepto infimo. Petala omnia adscendentia. Siliqua unilocularis, bivalvis.*

1. CLEOME *juncea.*

*C. fruticosa aphylla, corymbis lateralibus, genitalibus elongatis gynandris octandris, siliqua lineari tomentosa. Lin. suppl. 300.*

*Cleome juncea. Sparrmann Act. upf. 3. p. 192.*

*Binsenartige Cleome. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. † (v. l.)*

*Sui generis distinctissima. Rami rigidi apice obtuse pungentes aphylli. Folia vix ullanisi parvae squamulae.*

2. CLEOME *heptaphylla.*

*C. floribus gynandris, foliis subseptenatis, caule aculeato. Sp. pl. 937. Swartz obs. 252.\**

*C. foliis hexandris, foliis septenis, caule spinoso, filiquis pendulis. Mill. dict.*

*Sinapisrum indicum spinosum, foliis 5, 6, 7 numero incertis. Burm. zeyl. 215.*

*Sinapisrum aegyptium heptaphyllum, flore carneo, majus spinosum. Herm. lugdb. 564. Sloan. jam. 80. hist. 1. p. 194.*

*Pentaphyllum peregrinum filiquosum bivalve majus. Morif. hist. 2. p. 288.*

*β. Sinapisrum indicum majus quinquefolium asperum. Raj. suppl. 418.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 380.*

*Siebenblättrige Cleome.*

*Habitat in Indis. ☉*

*Bractee lunares.*

3. CLEOME *pentaphylla.*

*C. floribus gynandris, foliis quinatis, caule inermi. Sp. pl. 938. Jacq. hort. t. 24.*

*C. floribus gynandris, foliis digitatis. Hort. cliff. 341. Hort. upf. 193. Fl. zeyl. 239. \* Roy. lugdb. 339.*

*Sinapisrum indicum pentaphyllum, flore carneo, mi-*

- nus non spinosum. *Herm. lugdb.* 564. *Sloan. jam.* 80. *hist.* 1. p. 294. *Raj. hist.* 859.
- Papaver corniculatum* acre quinquefolium aegyptiacum minus. *Pluk. alm.* 280.
- Pentaphyllum peregrinum* siliquosum bivalve minus. *Morif, hist.* 2. p. 289.
- Quinquefolium lupini folio. *Bauh, pin.* 326.
- Capa veela. *Rheed. mal.* 9. p. 43. t. 24. *Raj. suppl.* 420.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 381.
- Fünfblättrige Cleome. W.
- Habitat in Indiis.* ☉

## 4. CLEOME triphylla.

- C. floribus gynandris, foliis ternatis, caule inermi. *Sp. pl.* 938.
- C. floribus hexandris, foliis ternatis, foliolo intermedio majori. *Mill. dict. n.* 5. R.
- Sinapis trum indicum* triphyllum, flore carneo, non spinosum. *Herm. lugdb.* 564. t. 565. *Raj. suppl.* 421.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 382.
- Dreyblättrige Cleome. W.
- Habitat in Indiis.* ☉ (v. l.)

*Tres praecedentes (2, 3, 4.) ex eadem planta olim prognatos evincunt Folia imprimis floralia sessilia; Flores gynandri, hexandri; Petala adscendentia; Siliquae pedicellatae et Habitus, vix itaque specie sufficienter diversae.*

## 5. CLEOME polygama.

- C. floribus superioribus masculis tetrandris, foliis ternatis, foliolis sessilibus margine subaculeatis. *Sp. pl.* 939.
- C. erectum triphyllum, floribus solitariis alaribus. *Brown. jam.* 272.
- Sinapis trum indicum* triphyllum, flore carneo, non spinosum. *Sloan. jam.* 80. *hist.* 1. p. 194. t. 124. f. 1. bona.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 382.
- Vierfädige Cleome. W.
- Habitat in Jamaica.* ☉ (v. l.)

*Planta (sicca mihi visa, unica) Caule erecto, laeviusculo, parum ramoso. Folia longius petiolata: foliolis ovato-lanceolatis, margine aculeis vix conspicuis scabris, sessilibus. Racemi longi: Flore infimo fertili,*

*reliquis minutis tetrandris masculis. Siliqua intra calycem sessilis.*

### 6. CLEOME *icosandra*.

*C. floribus icosi-tetrandris, foliis quinatis. Fl. zeyl.*

240 \*

Sinapistrum zeylanicum pentaphyllum viscosum, flore flavo. *Burm. zeyl. 215. t. 99.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 383.*

Zwanzigfädige Cleome. W.

*Habitat in Zeylona, ☉*

### 7. CLEOME *viscosa*.

*C. floribus dodecandris, foliis quinatis ternatisque. Fl.*

*zeyl. 241. \* Mill. dict. n. 4. Willich. obs. 114.*

Sinapistrum zeylanicum triphyllum et pentaphyllum viscosum, flore flavo. *Mart. cent 25. t. 25.*

*Aria-veela. Rheed. mal. 9. p. 41. t. 23.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 383.*

Klebrige Cleome. W.

*Habitat in Zeylona, Malabaria. ☉ (v. v.)*

*Folia omnia quinata, summa ternata, caeterum minor C. icosandrae et Flores minores. Petala inferiora magis divaricata. Stamina 10 ad 15 (mih.)*

### 8. CLEOME *dodecandra*.

*C. floribus dodecandris, foliis ternatis. Fl. zeyl. 242.\**

*Hall. goett. 257.*

Sinapistrum triphyllum pumilum glabrum, flosculo purpureo, siliqua membranacea. *Burm. zeyl. 216. t. 100. f. 1.*

Sinapistrum indicum triphyllum, flore carneo, non spinosum. *Sloan. jam. 80. hist. 1. p. 149. t. 124. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 384. t. 60. f. 3.*

Zwölfädige Cleome. W.

*Habitat in Indiis. ☉ (v. v.)*

*Caulis viscoso-pubescent, uti siliquae. Folia omnia ternata, elliptica, laevia: intermedio majore. Flores superiores fere masculi. Calyx purpurascens. Petala alba, emarginata. Stamina 10-14. Siliquae sessiles, erectae, fusiformes, subinflatae.*

### 9. CLEOME *felina*.

*C. polyandra hispida, foliis ternatis cuneiformibus strigo-*

lis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis, siliquis linearibus compressis. *Linn. suppl.* 300.

Katzen-Cleome. W.

*Habitat in Zeylona. Koenig.*

*Tota herba una cum calyce valde strigosa. Folia cuneiformia subretusa. Corolla angularis parva rubra. Siliquae breves lineares compressae glabrae. Singularis est haec parvula foliis hispidis, pilis basi valde dilatatis rigidissimis, foliis adpressis, ad apicem versis, ut exacte his linguam referant felinam.*

## 10. CLEOME *Chelidonii*.

*C. polyandra hirsuta, foliolis quinque s. septenis cuneiformibus scabris, racemis terminalibus, siliquis iniformibus. Lin. suppl.* 300.

Schöllkrautblütige Cleome. W.

*Habitat prope Transchaur. Koenig.*

*Folia longe petiolata digitata, foliolis quinque s. septem cuneiformibus acutis scabris. Calyx tri-s. quinquepartitus strigis hispidus. Corolla rubra et figura Chelidonii hybridi. Stamina lutea. Siliqua filiformis glaberrima. Semina hispida. Certe affinitas Chelidonii summa, nisi folia digitata Cleomes, calyx plusquam diphyllus et petala quinque.*

## 11. CLEOME *gigantea*.

*C. floribus hexandris, foliis septenatis, caule inermi.*

*Mant.* 430. *Jacq. obs.* 4. p. 1. t. 76.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 384.

Riefenartige Cleome. W.

*Habitat in Guinea. † (v. v. f. fl.)*

*Caulis orgyalis, teres, pubescens, erectus, sempervirens. Rami ex alis ultimis prodientes sub florescentia, simplices. Folia alterna, petiolata, septenata: foliolis lanceolatis, integerrimis, pubescentibus, supra sericeis. Petioli foliis longiores. Racemus terminalis, erectus, strictus, bipedalis. Pedicelli remoti, exstantes, glutinosi, flore longiores, absque bracteis. Calyx foliolis 4, linearibus, erectiusculo-patulis, deciduis. Petala oblonga, nodulosa, viridia, arte cohaerentia excepto latere antico pro genitalibus. Ungues distincti, longitudine petali. Stamina filamentis 6, receptaculo infertis, petalo longioribus, declinatis. Antherae erectae, oblongae, flavescens. Germen oblongum, stipitatum,*

*stipite longitudine staminum, declinato, ut stamina. Stigma sessile, obtusum. Receptaculum fructificationis globosum, exsudans nectar in ungues petalorum.*

*Qualitas saporis urentissima, odoris virosissima.*

12. **CLEOME aculeata.**

C. floribus hexandris, foliis ternatis integerrimis, stipulis spinulentibus. *Syst. Nat.* 3. p. 232.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 385.

Stachliche Cleome. W.

*Habitat in America. D. Zoega.*

*Caulis herbaceus. Stipulae binae, brevissimae, spinulosae, recurvae. Folia ternata, elliptico-lanceolata, integerrima, longius petiolata. Floralia folia, ad basin pedunculi, simplicia. Flores solitarii, pedunculati, parvi. Siliquae teretes.*

13. **CLEOME spinosa.**

C. floribus hexandris, foliis septenatis quinatisque, caule spinoso. *Sp. pl.* 939. *Jacq. amer.* 190. *Swartz obs.* 252.\*

C. floribus hexandris, foliis quinatis ternatisque, caule spinoso. *Mill. dict.* n. 7.

C. affurgens ramosum et spinosum heptaphyllum, spica multiplici foliato. *Brown. jam.* 273.

*Tarenaya. Marcgr. bras.* 33. t. 34.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 386.

Dornige Cleome. W.

*Habitat in America meridionali. ☉ (v. v.)*

*Folia digitata, glabriuscula. Rami divaricati. Spinnae ex stipulis binis foliorum, post eorum casum persistentes induratae. Stamina flore longiora, sed non gynandra.*

14. **CLEOME ferrata.**

C. floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis lineari-lanceolatis ferratis. *Sp. pl.* 939. *Jacq. amer.* 190. t. 190. f. 43.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 387.

Gefägte Cleome. W.

*Habitat in America meridionali. ☉*

15. **CLEOME ornithopodioides.**

C. floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis ovali-lanceolatis. *Mill. dict.* n. 2.

C. floribus hexandris, genitalibus declinatis, siliquis te-



retibus torosis. *Hort. cliff.* 341.\* *Hort. ups.* 194.  
*Roy. lugdb.* 340.

*Sinapis* orientale triphyllum, ornithopodii filiquis.  
*T. Dill. elth.* 359. *t.* 266. *f.* 345. *Buxb. cent.* 1. *p.* 6.  
*t.* 9. *f.* 24.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 387.

Vogelfußartige Cleome. W.

*Habitat circa Peram in agris.* ☉

## 16. CLEOME violacea.

*C.* floribus hexandris, foliis ternatis solitariisque: foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Syst. Veg.* 506.

*C.* floribus hexandris, genitalibus declinatis, filiquis fubulatis. *Hort. cliff.* 341. *Roy. lugdb.* 340. *Hall. goet.* 258.

*Trifolium* siliquosum; flore violaceo, lusitanicum. *Barr. ic.* 866.

β. *Sinapis* peregrinum alterum, flore luteo. *Barr. ic.* 865. *melior.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 387.

Violette Cleome. W.

*Habitat in Lusitania.* ☉ (v. v.)

*Planta viscoso-pubescentis. Folia subaequalia: Floralia simplicia. Pedunculi laeves. Calyx luteus apicibus purpurascens. Petala 2 superiora atropurpurascens, atomis flavis; Lateralia 2 cordata, unguiculata, crenata, concoloria. Antherae purpurascens. Receptaculum supra stamina glandulis 3, flavis, globosis. Stamina declinata. Pistillum declinatum.*

## 17. CLEOME arabica.

*C.* floribus hexandris, foliis ternatis lanceolatis obtusis, filiquis fusiformibus viscoso-scabris. *Linn. dec.* 3. *t.* 8.

*Sinapis* trifoliatum angustifolium, filiqua latiore. *Shaw. afr.* 558. *f.* 558.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 388.

Arabische Cleome. W.

*Habitat in Arabia.* ☉ (v. v.)

*Planta viscoso-scabra, bipedalis, annua. Petioli longitudine foliorum. Foliola sessilia, subtus scabra; floralia simplicia. Petala lutea, apice purpurea. Siliquae nutantes, subdiaphanae. Semina hirsuta.*

18. *CLEOME tenella.*

*C. floribus hexandris, foliis ternatis lineari-filiformibus. W.*

*C. foliis ternatis filiformibus linearibus. Lin. suppl. 300. Retz obs. 4. p. 28.*

*Sinapis trum indicum triphyllum tenuissimis foliis e Madagascariata. Pluk. phyt. t. 224. f. 3. bona.*

Zarte Cleome. W.

*Habitat in aridis arenosis Indiae orientalis. ☉*

*Planta spithamaea ramosa erecta. Folia ternata, foliolis sessilibus longitudine petalorum. Siliquae lineares.*

*Foliola petiolis longiora, impar lateralibus longius. Pedicelli solitarii in matura siliqua longitudine petiolos aequant. Corolla lutea. Stamina sex. Retz l. c.*

\* 19. *CLEOME filifolia.*

*C. floribus hexandris, foliis septenatis ternatisque filiformibus. Vahl symb. I. p. 48.*

*C. (angustifolia) floribus hexandris, corolla ad latus superius posita, staminibus surgentibus, foliis digitatis linearibus. Forsk. descr. 120.\**

Fadenblättrige Cleome. W.

*Habitat in Arabia felici circa Taaes ad agrorum margines. ☉*

*Caulis erectus debilis herbaceus pedalis ramosus striatus versus summitatem punctatus, punctis elevatis minutis sparsis. Folia petiolata inferne septena, superne ternata filiformia pollicaria. Petiolus foliis brevior. Siliquae digitales pedicellatae, versus apicem parum incurvatae angustiores. Convenit cum *C. tenella* figura foliorum; differt vere numero horum, altitudine, debilitate, siliqua pedicellata, apice attenuata pendula, caule punctato. Vahl l. c.*

\* 20. *CLEOME gujanensis.*

*C. floribus hexandris, foliis lineari-filiformibus sessilibus. W.*

*C. foliis simplicibus linearibus, flore luteo solitario. Aubl. guj. 2. p. 675. t. 273.\**

Gujanische Cleome. W.

*Habitat in arenosis maritimis Gujanae. ☉*

*Caulis pedalis ramosissimus erectus. Folia linearia angustissima acuminata glabra sessilia. Flores axillares flavi. W.*

21. **CLEOME** *monophylla*.

**C.** floribus hexandris, foliis simplicibus ovato-lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 243.\* *Mill. dict. n.* 8.  
 Sinapisfrum zeylanicum viscosum, folio solitario, flore flavo, siliqua tenui. *Burm. zeyl.* 217. t. 100. f. 2.  
 Thieru-veela. *Rheed. mal.* 9. p. 63. t. 34.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 389.  
 Einblättrige Cleome. W.  
*Habitat in India.* ☉

22. **CLEOME** *capensis*.

**C.** floribus hexandris, foliis simplicibus sessilibus lineari-lanceolatis, caule angulato. *Sp. pl.* 440.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 389.  
 Capische Cleome. W.  
*Habitat ad Cap. b. Spei et in India.*  
 Caulis simplex, strictus, facie *Epilobii*. Folia *Genistae*, lineari-lanceolata, stricta, glabra. Corymbus ut in *Epilobio*.

23. **CLEOME** *procumbens*.

**C.** floribus hexandris, foliis simplicibus lanceolatis petiolatis, caulibus procumbentibus. *Sp. pl.* 940. *Jacq. amer.* 189. t. 120. *Swartz obs.* 253.  
 Sinapis erecta, foliis oblongis, floribus solitariis. *Brown. jam.* 273.  
 Leucojum sylvestre luteum f. keiri minimum. *Sloan. cat.* 79. *hist.* 1. t. 123.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 390.  
 Liegende Cleome. W.  
*Habitat in Jamaicae et Hispaniolae aridis sabulosis.* 2  
 (v. l.)

## Classis XVI.

## MONADELPHIA.

## TRIANDRIA.

1253. GALAXIA. Monogyna. *Spatha* 1-f. 2-phylla.  
*Cor.* 1-petala sexfida.
1251. SISYRINCHIUM Monogyna. *Spatha* 2-phylla.  
*Petala* 6 subaequalia.
1252. FERRARIA. Monogyna. *Spatha* 2-phylla. *Petala* 6, tribus exterioribus latioribus.
1254. APHYTEJA. Monogyna. *Cal.* 3-fidus. *Petala* 3.  
*Bacca* polysperma.
1250. TAMARINDUS. Monogyna. *Cal.* 4-partitus.  
*Petala* 3. *Legumen*.

## PENTANDRIA.

1263. ERODIUM. Monogyna. *Arilli* 5, monospermi ad basin receptaculi rostrati. *Cal.* 5-phyll. *Cor.* 5-petala. *Nect.* squamae 5.
1256. SYMPHONIA. Monogyna. *Bacca* 5-locularis 5-sperma. *Cal.* 5-phyll. *Cor.* 5-petala.
1255. OZOPHYLLUM. Monogyna. *Capsf.*? 5-locularis. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala infundibuliformis.
1261. OCHROMA. Monogyna. *Capsf.* 5-locularis. *Cal.* duplex. *Cor.* 5-petala. *Antherae* anfractuosae.
1257. LERCHEA. Monogyna. *Capsf.* 3-locularis, polysperma. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala.
1258. WALTHERIA. Monogyna. *Capsf.* 1-locularis, 1-sperma. *Cal.* duplex. *Cor.* 5-petala.
1262. PASSIFLORA. Trigyna. *Pepo* pedicellata. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala calyci inserta. *Nectar.* filamentosum.
1259. HERMANNIA. Pentagyna. *Capsf.* 5-locularis. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, cucullata, obliqua. *Filamenta* dilatata.

1260. MELOCHIA. Pentagyna. *Capsf.* 5-locularis, 1-sperma. *Cal.* subduplex. *Petala* 5 patentia. *Filamenta* subulata.  
 \* *Linum, Anagallis, Lyfimachia, Pelargonium betonicum etc. Geranium pusillum, Mahernia, Leea, Azenia, Büttneria.*

## H E P T A N D R I A.

1264. PELARGONIUM. Monogyna. *Arilli* 5 monospermi ad basin receptaculi rostrati. *Cal.* 5-partitus nectariferus. *Cor.* 5-petala inaequalis.

## O C T A N D R I A.

1266. AITONIA. Monogyna. *Bacca* sicca unilocularis. *Cal.* 4-partitus. *Petala* 4.  
 1265. PISTIA. Monogyna. *Capsf.* 1-locul. *Cal.* spathaceus 1-phyllus. *Cor.* 0.  
 \* *Erica monadelphia, Guarea, Perjoonia.*

## D E C A N D R I A.

1271. GERANIUM. Monogyna. *Arilli* 5 monospermi ad basin receptaculi rostrati. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.  
 1270. SENRAEA. Monogyna. *Capsf.* 5-locularis. *Cal.* duplex. *Cor.* 5-petala.  
 1267. CRINODENDRUM. Monogyna. *Capsf.* unilocularis trisperma. *Cal.* 0. *Cor.* 6 petala.  
 1268. CONNARUS. Monogyna. *Capsf.* 1-sperma. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala.  
 1269. HUGONIA. Pentagyna. *Drupa* 1-sperma. *Cal.* 5-part. inaequalis. *Cor.* 5-petala.  
 \* *Oxalis et nonnullae Papilionaceae, Gaertneria, Trichilia, Turraea, Sandoricum, Swietenia, Strigilia, Melia, Samyda, Casearia, Erythroxylon, Malpighia, Banisteria, Hiraea, Triopteris, Averrhoa.*

## E N D E C A N D R I A.

1272. BROWNEA. Monogyna. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* exterior 5-fida; interior 5-petala. *Legumen.*

## D O D E C A N D R I A.

1274. MONSONIA. Monogyna. *Cal.* simplex 5-phyll.  
*Cor.* 5-petala dentata. *Arilli* 5 monospermi ad ba-  
sin receptaculi rostrati.
1276. HELICTERIS. Monogyna. *Cal.* simplex 5-fi-  
dus. *Cor.* 5-petala f. O. *Capsf.* 5 spirales.
1275. PLAGIANTHUS. Monogyna. *Cal.* simplex 5-  
fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca.*
1273. ACIA. Monogyna. *Cal.* simplex 5-partitus. *Cor.*  
5-petala. *Drupa.*
1281. PTEROSPERMUM. Monogyna. *Cal.* simplex.  
*Cor.* 5-petala. *Capsf.* 5-locul. *Semina* alata.
1277. CIENFUEGIA. Monogyna. *Cal.* duplex. *Cor.*  
5-petala. *Capsf.* 3-locularis 3-sperma.
1280. PENTAPETES. Monogyna. *Cal.* duplex. *Cor.*  
5-petala. *Capsf.* 5-locul. dissepimentis contrariis!
1279. DOMBEJA. Monogyna. *Cal.* duplex. *Cor.*  
5-petala. *Capsf.* 5 bivalves coalitae.
1278. ASSONIA. Pentagyna. *Cal.* duplex. *Cor.* 5-pe-  
tala. *Capsf.* 5, bivalves coalitae.

\* *Halesia, Styra, Sterculia, Fieinhofia.*

## P O L Y A N D R I A.

1282. CAROLINEA. Monogyna. *Cal.* simplex sub-  
truncatus. *Capsf.* lignosa 1-locul. polysperma.
1301. GORDONIA. Monogyna. *Cal.* simplex, 5-  
phyllous. *Capsf.* 5-loculares. *Sem.* bina, alata.
1305. MORISONIA. Monogyna. *Cal.* simplex, 2-fi-  
dus. *Bacca* capsularis, pedicellata. *Petala* 4.
1307. CROSSOSTYLIS. Monogyna. *Cal.* simplex  
4-partitus. *Bacca* unilocul. polysperma.
1309. GUSTAVIA. Monogyna. *Cal.* simplex 4-f. 6-fi-  
dus. *Bacca* sicca 4-f. 5-locul. polysperma. *Petala*  
4 f. 6.
1304. MYRODIA. Monogyna. *Cal.* simplex rumpens.  
*Drupa* 2-f. 3-locularis. *Petala* 5.
1308. BARRINGTONIA. Monogyna. *Cal.* simplex,  
2-phyllus. *Drupa* nuce tetragona. *Petala* 4.

1303. MESUA. Monogyna. *Cal.* simplex, 4-phyllus.  
*Nux* tetragona, 1-sperma. *Petala* 4.
1306. POURRETIA. Monogyna. *Cal.* simplex 5-partitus. *Drupa* sicca 1-alata. *Petala* 5.
1300. STUARTIA. Pentagyna. *Cal.* simplex, patens.  
*Capsf.* 5-locularis. *Sem.* solitaria.
1287. PALAVIA. Monogyna. *Cal.* simplex 5-fidus.  
*Capsulae* monospermae conglomeratae absque ordine.
1285. LAGUNAEA. Monogyna. *Cal.* simplex 5-fidus. *Capsf.* 5-locularis dissepimentis contrariis!
1286. SIDA. Submonogyna. *Cal.* simplex, angulatus.  
*Capsf.* multilocularis, 1-sperma.
1284. BOMBAX. Monogyna. *Cal.* simplex. *Capsf.* 5-locularis, polysperma. *Stylus* indivisus. *Semina* lanata.
1283. ADANSONIA. Monogyna. *Cal.* simplex. *Capsf.* 10-locularis, polysperma: pulpa farinacea.
1296. GOSSYPIUM. Monogyna. *Cal.* exterior 3-fidus. *Capsf.* 3-f. 4-locularis, polysperma, coadunata.
1292. RUIZIA. Decagyna. *Cal.* exterior 3-phyllus.  
*Capsf.* 10 biloculares globofo-verticillatae.
1291. LAVATERA. Polygyna. *Cal.* exterior 3-fidus.  
*Capsf.* 1-spermae verticillatae.
1288. MALACHRA. Polygyna. *Cal.* exter. 3-phyllus.  
*Capsf.* 5, monospermae.
1290. MALVA. Polygyna. *Cal.* exterior 3-phyllus.  
*Capsf.* 1-spermae verticillatae plures.
1293. MALOPE. Polygyna. *Cal.* exterior 3-phyllus.  
*Capsf.* 1-spermae conglomeratae absque ordine.
1295. URENA. Monogyna. *Cal.* exterior 5-fidus.  
*Capsf.* 5-locul. 5-partibilis, loculamentis clausis.
1298. PAVONIA. Monogyna. *Cal.* exterior 8-phyllus. *Capsf.* 5-locul. 5-partibilis, loculamentis 2-valvibus.
1297. HIBISCUS. Monogyna. *Cal.* exterior 8-phyllus. *Capsf.* 5-locularis polysperma.
1299. ACHANIA. Monogyna. *Cal.* exterior 8-phyllus. *Bacca* 5-locularis.

1294. KITAIBELIA. Polygyna. *Cal.* exterior 7-f. 9. fidus. *Capfulae* monospermae in capitulum quinquelobum glomeratae.
1289. ALTHAEA. Polygyna. *Cal.* exterior 6 - 9 - fidus. *Capfulae* 1-spermae verticillatae.
1302. CAMELLIA. Monogyna. *Cal.* exterior imbricatus. *Capf.* loculis polyspermis. *Stylus* indivisus.
- \* *Hypericum Brathys, Mimosae nonnullae.*
-



## T R I A N D R I A.

## 1250. T A M A R I N D U S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1100.*

*Cal.* 4-partitus. *Petala* 3. *Nec. fetis* 2 brevibus sub filamentis. *Stylus* 1. *Legumen* pulpa repletum.

I. TAMARINDUS *indica*.

*Tamarindus.* *Hort. cliff.* 18. *Mat. med.* 43. *Hort. upf.* 15. *Fl. zeyl.* 14. *Roy. lugdb.* 467. *Rumph. amb.* 2. p. 90. t. 23. *Loeßl. it.* 210. *Brown. jam.* 125. *Jacq. amer.* 10. t. 10. et 179. f. 98. *Burm. ind.* 15. *Tournef. act. gall.* 1699. p. 69. *Raj. hist.* 1748. *Blackw. t.* 201. et 221. *Mill. dict.* *Swartz obs.* 24.\*

*Siliqua arabica*, quae *Tamarindus*. *Bauh. pin.* 403.

*Balam-pulli.* *Rheed. mal.* 1. p. 39. t. 23.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. p. 213. t. 5. B.

*Indische Tamarinden.* W.

*Habitat in India, Arabia, Aegypto, America.* † (v. f.)

## 1251. S I S Y R I N C H I U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1101.*

*Spatha* diphylla. *Cal.* 0. *Petala* 6 subaequalia.

*Styl.* 1. *Capsf.* trilocularis infera.

\*I. SISYRINCHIUM *elegans*.

*S.* scapo tereti unifloro simplici folio radicali lineari acuminato brevioris, petalis oblongis acutis. W.

*Moraea (elegans)* scapo tereti, folio unico lineari-ensiformi procumbente scapum superante, petalis omnibus eglandulosis, stigmatibus bifidis. *Jacq. hort.*

*Schoenb.* 1. p. 6. t. 12.\*

*Schöner Schweinerüssel.* W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* 4

*Scapus spathis oblongis acuminatis alternis vestitus. Folium unicum procumbens lineare acuminatum scapo duplo longius. Flos unicus terminalis magnus. Corolla externe flava, interne in medio petalorum trium exteriorum macula magna viridi notata, petalis lineari-oblongis acutis.* W.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

O o

\*2. SISYRINCHIUM *collinum*.

S. scapo tereti subramoso folio caulino lineari-acuminato brevioris, petalis oblongis acutis. W.

Sisyrrinchium collinum. *Cav. diff.* 6. p. 346.

Moraea (*collina*) scapo tereti, folio dependente, laciniis corollae subaequalibus. *Thunb. diff. de Moraea.* p. II. n. 13.\* *Ejusd. pro.* II. *Jacq. ic.* 2. t. 226.

Hügel-Schweinerüssel. W.

*Habitat in collibus* Cap. b. *Spei copiosissime.* 2 (v. f.)

*Simile praecedenti differt: scapo multo altiore subtrifloro, ramis nempe unifloris, folio non procumbente sed dependente, corolla majore immaculata rubicunda vel ochroleuca.* W.

\*3. SISYRINCHIUM *grandiflorum*.

S. scapo tereti simplici, spatha subtriflora, petalis obovatis obtusis, foliis lanceolatis plicatis. W.

S. (*grandiflorum*) radice bulbosa, caule tereti, foliis striatis, flore magno. *Cavan. diff.* 6. p. 346. t. 192. f. 2.\*

Großblütiger Schweinerüssel. W.

*Habitat in Peru.* 2

*Radix bulbosa. Folia radicalia et scapi lanceolata utrinque attenuata, plicato-striata. Spatha terminalis triflora. Corolla sesquipollicaris lutea, petalis obovatis obtusissimis.* W.

4. SISYRINCHIUM *Bermudiana*.

S. scapo ancipiti ramoso folioso, spatha subquadriflora floribus brevioris, petalis mucronatis, foliis ensiformibus. W.

S. foliis ensiformibus enerviis. *Syst. Veg.* 682.

S. caule ancipiti ramoso folioso, spathis subaequalibus flore brevioribus. *Lamark encycl.* I. p. 403.\* *Cavan. diff.* 6. p. 346. t. 192. f. 1.\*

S. caule foliisque ancipitibus. *Hort. cliff.* 431. *Hort. upf.* 278. *Sp. pl.* 2. p. 1353. *Gron. virg.* 140 *Roy. lugdb.* 10. *Schreb. in Nov. Act. A. N. C.* 3. p. 341. t. 6. b. et tom. 4. p. 145. *Mill. illustr.*

S. (*bermudianum*) foliis gladiolatis amplexicaulibus, pedunculis brevioribus. *Mill. dict. n.* I.

S. bermudense, floribus parvis ex coeruleo et aureo mixtis. *Pluk. alm.* 348. t. 61. f. 2.

*Bermudiana* iridis folio radice fibrosa. *Tournef. inst.* 388. *Dill. elth.* 48. t. 41. f. 48.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. II. p. 653.*

Bermudischer Schweinerüssel. W.

*Habitat in Bermudis. 2 (v. v.)*

\*5. **SISYRINCHIUM** *anceps.*

S. scapo ancipiti alato simplici subaphyllo, spatha subquadriflora inaequali floribus longiore, petalis macronatis, foliis ensiformibus. W.

S. caule simplici alato, spathis inaequalibus flores superantibus. *Lamarck encycl. I. p. 403.\* Cavan. diff. 6. p. 345. t. 190. f. 2.\**

*Sisyrrinchium Bermudiana. α. Lin. Syst. veg. 682.*

S. (*gramineum*) caule ancipiti lato, germinibus glabris. *Curt. mag. 464.*

S. (*angustifolium*) foliis lineari-gladiolatis, pedunculis longioribus. *Mill. dict. n. 2.*

S. coeruleum parvum, gladiato caule, virginianum. *Pluk. alm. 368. t. 61. f. 1.*

Bermudiana graminea, flore minore coeruleo. *Dill. elth. 49. t. 41. f. 49.*

Flügelstenglicher Schweinerüssel. W.

*Habitat in Virginia, Canada. 2*

*Species a praecedente distinctissima, licet valde affinis. Haec sub diu laete crescit, praecedens vero hyeme in frigidario asservatur. W.*

\*6. **SISYRINCHIUM** *micranthum.*

S. scapo ancipiti ramoso folioso, spatha subtriflora inaequali floribus subaequali, petalis linearibus acuminatis, foliis gramineis canaliculatis. W.

S. radice fibrosa, caule ancipiti bipollicari, foliis alternis canaliculatis, floribus minimis. *Cavan. diff. 6. p. 345. t. 191. f. 2.\**

Kleinblütiger Schweinerüssel. W.

*Habitat in Peru. 2*

*Planta parva bipollicaris. Scapus ramosus foliosus. Folia lineari-acuminata graminea canaliculata. Spatha bivalvis inaequalis bi- seu triflora longitudine florum vel paulo brevior. Flores admodum parvi, petalis linearibus acuminatis. W.*

7. **SISYRINCHIUM** *palmifolium.*

S. scapo ancipiti, floribus spicatis, foliis ensiformibus nervoso-plicatis. W.

S. foliis ensiformibus nervosis. *Mant.* 122. (exclusis synonymis)

Moraea (*palmifolia*) scapo ancipiti, foliis ensiformibus nervosis, floribus spicatis. *Thunb. diff. de Moraea* p. 8. n. 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. p. 654.

Palmenblättriger Schweinerüssel. W.

*Habitat in Brasilia.* 4 *D. Arduini.*

*Simillimum S. Bermudianae, sed Caulis bipedalis etiam anceps. Folia duplo latiora nervis 5 ad 6. existantibus complicata. Glumae Floresque numerosi in fasciculum terminalem, vix majores Bermudianae. Stylus ultra medium trifidus.*

*A Moraea plicata, quacum mixtum erat, diversissimum.* W.

\*8. SISYRINCHIUM *striatum.*

S. scapo ancipiti folioso, floribus spicatis, petalis subrotundo-ovatis acutis, foliis lineari-ensiformibus. W.

S. (*striatum*) foliis ensiformibus, caule ancipiti ramosissimo multifloro, floribus spatham excedentibus. *Smith ic. pict.* 1. p. 9. t. 9.\*

S. (*spicatum*) caule compresso, spathis multifloris alternis in spicam adproximatis. *Cavan. ic.* 2. p. 2. t. 104.\*

Moraea (*sertata*) scapo tereti, foliis ensiformibus, racemo erecto, floribus aggregatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. p. 6. t. 11.\*

Gestreifter Schweinerüssel. W.

*Habitat in Mexico.* 4 (v. v.)

Scapus simplex et ramosus. Spathae in apice caulis sunt aggregatae et spicam formant. Quaelibet spatha bivalvis continet flores 3, 4, s. 5. Moraea sertata Jacq. est sine dubio planta nostra, saltem varietas, nam floris color plus minusque flavescens est, et scapus compressus hujus speciei in superiore parte ad figuram vergit teretem. W.

1252. FERRARIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1102.

Spatha 2-phyll. Cal. 0. Petala 6, tribus externis latioribus. Styl. 1. Caps. 3-locularis infera.

1. FERRARIA *undulata.*

F. caule ramoso, foliis equitantibus ensiformibus, petala-

- lis aequalibus undulato-crispis, interioribus duplo angustioribus. W.
- F. petalis margine crispis aequalibus, interioribus angustioribus, stigmatibus ciliatis. *Cavan. diff. 6. p. 343. t. 190. f. 1.\**
- F. petalis margine crispis, stigmatibus bifidis cucullatis. *Lamarck encycl. 2. p. 449.\**
- Ferraria undulata. *Sp. pl. 1353. Mill. ic. 280. Jacq. hort. 63.*
- F. foliis nervosis ensiformibus vaginantibus, petalis fimbriatis. *Burm. in Nov. Act. A. N. C. II. 1761. p. 109. t. 3. f. 1.*
- Moraea (*undulata*) scapo ramosissimo, foliis vaginantibus carnosis, corolla crispa. *Thunb. diff. de Moraea p. 14. 21.\**
- Iris stellata cyclaminis radice, pullo flore. *Barr. ic. 1216.*
- Narcissus indicus, flore saturate purpureo. *Rudb. clyf. 2. p. 49. f. 9.*
- Gladiolus indicus e violaceo-fuscus radice tuberosa. *Morif. hist. 2. p. 344. f. 4. t. 4. f. 7.*
- Flos indicus e violaceo fuscus, radice tuberosa. *Ferr. cult. 168. t. 171.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 655.*
- Wellenförmige Ferrarie. W.
- Habitat ad Cap. b. spei prope Leuwenstaart et Berg-rivier 2*

## \*2. FERRARIA *Ferrariola*.

- F. caule simplici, foliis equitantibus ensiformibus inferioribus angustioribus, petalis aequalibus undulatis, interioribus duplo angustioribus. W.
- Moraea *Ferrariola*. *Jacq. Collect. 4. p. 141.\**
- Punctirte Ferrarie. W.
- Habitat ad Cap. b. spei. 2*
- Petalorum unguis foris virescunt, intus striis atro-violaceis variegantur. Laminae petalorum latiorum flavent cum mixto virore cumque striis punctisque violaceis, in oris et cuspide toto sordide violaceae, Laminae angustiorum flavedine punctisque carent. Spathae univalves. *Jacq. l. c.*

## 3. FERRARIA *pavonia*.

- F. caule simplici flexuoso, foliis equitantibus ensiformibus nervosis, petalis plani, interioribus duplo brevioribus panduriformibus. W.

F. petalis planis, interioribus hastatis brevioribus, stigmatibus bipartitis subulatis. *Cavan. diff.* 6. p. 342. t. 189. f. 1. \* *Lamarck. encycl.* 2. p. 449.\*

F. petalis interioribus minoribus hastatis. *Lin. suppl.* 407. *Moraea (pavonia)* scapo tereti, foliis distichis, flore solitario, corollae laciniis alternis hastatis. *Thunb. diff. de Moraea* p. 14. n. 20.

*Tigridis* flos. *Bauh. pin.* 48. *Dod. pempt.* 693. *Lob. ic.* III. I. *Bauh.* 2. p. 684. *Raj. hist.* 1165. *Swert. floril.* 2. t. 31. f. 2.

*Ocoloxochia* vel flos *tigridis*. *Hern. mex.* 276.

Pfauenartige Ferrarie. W.

*Habitat in Mexico, Peru.* 4

Radix bulbosa. Scapus spithamaeus uniflorus. Folia vaginantia, unum alterumve, inferiora longiora angustiora. Spatha diphylla compressa. Corolla campanulata. Petala tria exteriora majora ovata apice parum truncata cum mucronulo. Petala tria interiora triplo minora alterna hastata subsessilia *tigridis* instar maculata. Filamenta stylum vaginantia. Antherae tres lineares longitudine fere stigmatum. Germen inferum pedicellatum. Stylus terminatus stigmatibus tribus bipartitis, filiformibus. Capsula linearis trigona. Semina plurima. Color corollae, petalis exterioribus et baseos area exteriorum maculatus.

#### \*4. FERRIA *ixioides*. W.

F. caule superne paniculo, foliis ensiformibus nervosis, petalis planis exterioribus duplo minoribus. W.

*Silyrinchium (ixioides)* foliis ensiformibus conduplicatis longissimis, panicula trichotoma, petalis exterioribus dimidio brevioribus. *Forst. prod.* n. 325.

*Moraea (ixioides)* scapo compresso, foliis distichis nervosis, florum umbellis pedunculatis. *Thunb. diff. de Moraea.* p. 8. n. 7.

Ixiartenartige Ferrarie. W.

*Habitat in Nova Zeelandia,* 4

Radix fibrosa. Scapus compressus apice ramosus striatus glaber erectus bipedalis et ultra. Folia radicalia plurima disticha linearia, apice attenuato, striata glabra erecta longitudine fere scapi; in scapo unum vel pauca similia. Flores in ramulis terminales umbellati minuti albi, circiter tres vel quatuor. Spathae lance-

*olatae pedunculis breviores. Pedunculi capillares pollicares. Thunb. l. c.*

\*1253. GALAXIA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 1103.*

*Spatha* 1. f. 2-phylla. *Cal.* 0. *Cor.* 1-petala 6-fida. tubo longo. *Styl.* 1. *Capf.* 3-locularis infera.

1. GALAXIA *ovata.*

*G.* subcaulis, foliis oblongis, *spatha* univalvi uniflora. *W.*  
*G.* foliis ovatis. *Thunb. diff. Nov. pl. gen. 2. p. 50. c. icone.\* Ejusd. prod. 10. Cavan. diff. 6. p. 341. t. 189. f. 2.\* Jacq. collect. 4. p. 137.\* Icon. rar. 2. t. 291.*  
*Ixia (Galaxia) monadelpha, spatha radicali, foliis ovatis planis nervosis. Lin. suppl. 93.*

*Breitblättrige Galaxie. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei in collibus infra montes. 24*

*Bulbus striatus tunicatus transversaliter reticulatus. Folia radicalia ovalia f. ovato-oblonga obtusiuscula nervosa glabra, plana, plura, basi amplexente dilatata. Spatha radicalis. Scapus filiformis uniflorus nudus, foliis brevior. Corolla fugacissima triandra monadelpha. Stigma multipartitum.*

*Variat corolla violacea, lilacina et flava. W.*

2. GALAXIA *graminea.*

*G.* subcaulis, foliis lineari-filiformibus basi dilatatis, *spatha* univalvi uniflora. *W.*

*G.* foliis lineari-filiformibus. *Thunb. Diff. Nov. pl. gen. 2. p. 51. c. icone.\* Ejusd. prod. 10. Jacq. Collect. 2. p. 366. t. 18. f. 2.\**

*G.* foliis lineari-filiformibus, tubo longissimo. *Cavan. diff. 6. p. 341. t. 189. f. 3.\**

*Ixia (fugacissima) monadelpha, spatha radicali, foliis subulatis canaliculatis recurvatis. Lin. suppl. 94.*

*Grasartige Galaxie. W.*

*Habitat in collibus Cap. b. spei inter urbem et montem tabularem. 24*

*Variat corollis totis flavis et tubo flavo limbo violaceo. Thunb. l. c.*

\*3. GALAXIA *narcissoides. W.*

*G.* caule erecto, foliis lineari-ensiformibus, *spatha* bivalvi subquadriflora, floribus cernuis. *W.*

*Sisyrinchium (narcissoides)* caule tereti, radice fibrosa, foliorum vaginis inflatis, corollis infundibuliformibus nutantibus. *Cavan. diff. 6. p. 347. t. 191. f. 3.\**

Narcissenartige Galaxie. W.

*Habitat in freto Magellanico. 4*

Habitus *Narcissi*, floris structura est *Galaxiae*, dif- fert modo *spatha bivalvi*, cum *Sisyrinchiis* nil commune habet, praeter *spatham et stamina cohaerentia*. W.

Corolla alba, datur varietas egregia floribus intus et extus purpura intensa longitudinaliter striatis. *Ca- van. l. c.*

## 1254. A P H Y T E J A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1104.*

*Cal.* magnus infundibuliformis trifidus. *Petala 3*, calyci inferta illoque breviora. *Germen in- ferum. Bacca 1-locul. polysperma. Sem. nidulantia.*

### I. APHYTEJA *Hydnora.*

*Aphyteja Hydnora. Lin. suppl. 301. Lin. diff. de Aphy- téja 1775 edita c. icone.*

*Hydnora Africana. Thunb. Nov. pl. Gen. 1. p. 23. Act. holm. 1775. p. 69. t. 2. et 1777. p. 144. t. 4. f. 1. 2.*

Africanische Pilzmalve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. in radicibus Euphorbiae mau- ritanicae parasitica.*

Vegetabile absque foliis et caule et radice parasiti- cum terrestre, sola fructificatione constans, uti *La- thraea clandestina*, quae tamen floribus plurimis do- nata, hoc vero solitarium florem habet. Flos palma- ris sessilis coriaceus succulentus. Calyx magnus limbo trifido erecto, quasi ex laciniis duplicatis, interiore latere picto figura scutiformi alba. Odor floris et fru- ctus maturi non ingratus.

*In deliciis vulpium et viverrarum est. Cruda et cine- riis affata editur ab Hottentottis.*



## P E N T A N D R I A.

## \* 1255. O Z O P H Y L L U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1105.*

*Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala infundibuliformis. *Styl.* 1. *Capf.*? 5-locularis.

## \* I. OZOPHYLLUM trifoliatum. W.

*Ticorea foetida.* *Aubl. guj. 2. p. 689. t. 277.\* Cavan. diff. 7. p. 362. t. 206.*

*Dreyblättriges Stinkblatt.* W.

*Habitat in sylvis Gujanae.* †

*Frutex decempedalis subramosus. Folia alterna longe petiolata ternata, foliolis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis glabris. Flores albi in corymbo terminali longissime peduncalato.* W.

## 1256. S Y M P H O N I A.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 1106.*

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala globosa contorta. *Styl.* 1. *Bacca* 5-locularis, loculis 1-spermis.

## I. SYMPHONIA globulifera.

*Symphonia globulifera.* *Lin. suppl. 302.*

*Moronobea coccinea.* *Aubl. guj. 2. p. 789. t. 313.\**

*Mani resinifera folio mucronato introrsum incurvo.* *Barr. aequin. 76.*

*Kugeltragende Drehblume.* W.

*Habitat in sylvis udis et montibus Gujanae.* †

*Arbor truncata crassa et alto. Ramuli breviores glabri, cicatricibus foliorum notati. Folia in apice ramulorum approximata, petiolata oblonga lanceolata integerrima glaberrima glauca, subtus rachide obtusa carinata, venis subtilissimis transversalibus, consistencia foliorum Lauri, palmaria. Petioli brevissimi semiteretes. Umbella terminalis simplex pauciflora sessilis. Pedunculi erecti uniflori. Flos magnitudine floris Theae, ruber. Calyx brevis, squamis obtusis. Petala quinque conniventia (omnino more Trollii) in globum rotundum depressiusculum clausum, singula margine laterali dex-*

*tro incumbentia proximo. Stamina vagina indivisa, arcte pistillum vestiens, eminet extra florem, tanquam calyx superus in fructu. Haec indivisa vagina apice terminatur Antheris quinque sessilibus, cum Stigmatibus quinque alternantibus, quasi in stellam.*

*Cortex fructus coriaceus vestit Semina picta, interjecta substantia mucosa flavissima. Semina Psittacis gratissima sunt.*

## 1257. L E R C H E A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1107.*

*Cal. 5-dentatus. Cor. infundibulif. 5-fida. Anth. germinis Tubo infidentes 5. Stylus 1. Caps. 3-locularis, polysperma.*

## 1. LERCHEA longicauda.

*Lerchea longicauda. Mant. 256.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 109.*

*Langährige Lerchea. W.*

*Habitat in India orientali. †*

*Frutex inconditus: Ramulis sordidis, subarticulatis. Folia opposita, petiolata, lanceolata, laevia, integerrima, pedalia. Stipulae ensiformes, petiolis breviores. Spica terminalis, filiformis, longissima: Floribus remotis, sparsis, minutis.*

## 1258. W A L T H E R I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1108.*

*Cal. duplex: exterior lateralis triphyllus deciduus. Petala 5. Stylus 1. Caps. 1-locularis, 2-valvis, monosperma.*

## 1. WALTHERIA americana.

*W. foliis ovalibus plicatis acute inaequaliter dentatis tomentosis, capitulis pedunculatis. W.*

*W. foliis ovalibus plicatis serrato-dentatis tomentosis, capitulis pedunculatis. Sp. pl. 941. Mill. dict. n. 1. Swartz obs. 254.\**

*W. foliis cordato-ovatis serratis. Hort. cliff. 342. Roy. lugdb. 348.*

*W. (arborefcens) caule arborefcente, foliis ovatis sub-*

- cordatis serrato-dentatis crassis tomentosis. *Cavan. diff. 6. p. 316. t. 170. f. 1.\**
- Waltheria indica. Jacq. ic. rar. 1. t. 130. Misc. 2. p. 323.\**
- W. fruticosa subhirsuta, foliis oblongo-ovatis serratis, floribus capitatis, pedunculis communibus longiusculis, singulis folio singulari ornatis. Brown. jam. 276.*
- Malva americana abutili folio, flore luteo spicato, foliis hirsutioribus. Sloon. cat. 97. hist. 2. p. 218. Raj. hist. 3. p. 320.*
- Monosperm-Althaea arborefcens villosa, folio majore. Isnard. act. 1721. p. 562. t. 14.*
- Althaeae similis americana, flore luteo. Herm. lugdb. 2. p. 267.\**
- Betonica arborefcens, foliis amplioribus. Pluk. alm. 67. t. 150. f. 6.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 110.*
- Americanische Waltherie. W.
- Habitat in Bahama, Barbiches, Surinamo. † (v. v.)*
- Simillima W. indicae sed differt dentibus foliorum acutis inaequalibus, et capitulis pedunculatis. Capitula in hac et sequenti sunt axillaria vel in pedunculo longo communi aggregata, sed in W. americana axillaria sunt semper pedunculata, et in W. indica absque ullo pedunculo sessilia. W.*

## 2. WALTHERIA *indica*.

- W. foliis ovalibus plicatis obtuse dentatis tomentosis, capitulis sessilibus. W.*
- W. foliis ovatis serratis plicatis, capitulis sessilibus. Roy. lugdb. 348. n. 1. Mill. dict. n. 2.*
- Malvinda ulmifolia, flosculis pusillis muscosis. Burm. zeyl. 149. t. 68. ind. p. 142.*
- Melochia foliis oblongis obtusis serratis tomentosis, floribus confertis. Hort. cliff. 343.*
- Betonica arborefcens, villosis foliis profunde venosis, floribus ex alis foliorum glomeratis. Pluk. mant. 31.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 112.*
- Indische Waltherie. W.
- Habitat in India. † (v. f.)*

## \*3. WALTHERIA *Lophanthus*.

- W. foliis subrotundo-cordatis serratis sericeo-tomento-*

lis petiolatis, capitulis pedunculatis imbricato-bracteatis. *Forst. prod. n. 252.*

*Lophanthus tomentosus. Forst. Charact. gen. 14.*

Kammförmige Waltherie. W.

*Habitat in Marchionis insulis.*

\*4. *WALTHERIA ovata.*

W. foliis subrotundo-ovatis inaequaliter dentatis tomentosus, capitulis sessilibus. W.

W. foliis lato-ovatis acuminatis ferrato-dentatis tomentosus crassis, floribus racemosis congestis. *Cavan. diff.*

6. p. 317. t. 171. f. I.\*

Eyförmige Waltherie. W.

*Habitat in Peru. †*

*Distinctissima a reliquis foliis subrotundo-ovatis acuminata figura fere Coryli Avellanae. Capitula sessilia pauciflora absque bracteis. Praecedenti forte similis. W.*

5. *WALTHERIA angustifolia.*

W. foliis oblongis obtusis plicatis dentatis canis, capitulis subsessilibus. W.

W. foliis lanceolatis ferratis nudis. *Syst. veg. 509.*

W. foliis lanceolatis ferratis, capitulis pedunculatis. *Sp. pl. 941. Fl. zeyl. 244.\* Roy. lugdb. 348. Mill. dict. n. 3.*

W. (*microphylla*) foliis ovatis minimis ferratis plicatis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavan. diff. 6. p. 317. t. 170. f. 2.\**

Monolperm-Althaea arborescens villosa, folio minore. *Isn. Act. 1721. p. 278.*

Betonica arborescens maderaspatana villosa, foliis profunde venosis. *Pluk. alm. 67. t. 150. f. 5. Raj. hist. 3. p. 297.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. III.*

Kleinblättrige Waltherie. W.

*Habitat in India orientali. † (v. l.)*

*Tota planta tomento tenui induta. Folia parva semiuncialia oblonga utrinque obtusa. Capitula pedunculo brevissimo suffulta. W.*

\*6. *WALTHERIA elliptica.*

W. foliis lanceolato-oblongis obtusis plicatis dentatis tomentosus, capitulis sessilibus. W.

W. caule fruticoso, foliis ellipticis oblongis serratis plicatis tomentosis. *Cavan. diff.* 6. p. 316. t. 171. f. 2.\*

Langblättrige Waltherie. W.

*Habitat in India orientali.* †

*Affinis praecedenti, sed magis tomentosa, folia triplo longiora, tamen latitudine praecedentis speciei, et petala obtusa nec retusa.* W.

## 1259. HERMANNIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1109.*

*Cal.* simplex 5-fidus. *Petala* 5 spiralter cucullata. *Filamenta* lanceolata. *Styli* 5. *Capf.* 5-locularis, polysperma.

### I. HERMANNIA *althaeifolia.*

H. foliis ovatis tomentosis plicatis crenatis, stipulis inferioribus ovatis superioribus lato-lanceolatis, calycibus angulatis. W.

H. foliis ovatis crenatis plicatis tomentosis, calycibus florentibus campanulatis angulatis stipulis oblongis foliaceis. *Ait. Kew.* 2. p. 411. *Curt. mag.* 307.

H. foliis ovatis plicatis crenatis tomentosis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347. *Mill. dict. n. 3.* *Kuiph. cent.* 2. n. 30.

H. foliis ovatis serrato-dentatis tomentosis, stipulis foliaceis, floribus geminis. *Cavan. diff.* 6. p. 327. t. 179. f. 2.\*

H. (*aurea*) foliis cum basi angustata oblongis crenatis tomentosis planis, pedunculis subbifloris. *Jacq. hort. Schönb.* 2. p. 46. t. 214.\*

H. capentis, althaeae folio. *Pet. gaz.* 53. t. 43. f. 2.  
Ketmia africana frutescens, foliis mollibus et incanis.  
*Comm. hort.* 2. p. 151. t. 79.

*Houttuyi* Lin. *Pfl. Syst.* 4. p. 113.

Eibischblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. v.)

*Pedunculi ex axillis foliorum, saepius terni, apice flores in singulo duos, sub foliolis tribus lanceolatis. proferentes.*

### \*2. HERMANNIA *plicata.*

H. foliis ovatis tomentoso-hirtis plicatis rugosis denti-

culatis, stipulis ovatis acutis, calycibus oblongo-ovatis. W.

H. foliis cordato-ovatis denticulatis plicatis tomentosis, calycibus florentibus oblongo-ovatis subcylindraceis. *Ait. Kew. 2. p. 411.*

Hermannia althaeifolia. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 46. t. 213. \* (exclusis synonymis.)*

Gefaltete Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Similis praecedenti, sed folia multo latiora basi subcordata, valde plicata. subtus rugoso-venosa, superne viridia. Stipulae omnes ovatae acutae trinerviae, interdum apice tridentatae. Calyces minus angulati. W.*

\*3. HERMANNIA *candicans.*

H. foliis subrotundo-ovatis obtusis tomentosis albidis crenatis, stipulis lanceolato-subulatis, calycibus campanulatis patulis. W.

H. (*candicans*) foliis ovatis subcordatis obtusis tomentosis, calycibus florentibus patulis subangulatis, stipulis subulatis. *Ait. Kew. 2. p. 412. Jacq. hort. Schönb. 1. p. 63. t. 117. \**

H. (*praemorsa*) caule tomentoso, foliis alternis ovatis praemorsis crenatis repandis tomentosis albis, floribus bifloris subternis cernuis. *Wendl. obs. 51.*

Weißblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. l.)*

*Rami tomentosi albi flexuosi. Folia subrotundo-ovata obtusa crenata utrinque alba tomentosa basi integerrima. Stipulae lanceolato-subulatae. Peduncali subbiflori. Calycis tomentosi subangulati campanulati apice patuli. W.*

\*4. HERMANNIA *disticha.*

H. folis subrotundo-ovatis obtusis hispido-villosis dentatis, stipulis ovatis acuminatis, calycibus angulatis. W.

H. (*disticha*) villoso, ramis flexuosis, ramulis distichis, foliis obovatis inaequaliter dentato-crenatis, floribus paniculatis. *Schrad. et Wendl. fert. hanov. p. 26. t. 16. \**

H. (*rotundifolia*) foliis ex ovato-subrotundis rugosis hirsutis, pedunculis unifloris. *Jacq. hort. Schönb. 1. p. 63. t. 118. \**

Zweyzeilige Hermannie.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. † (v. v.)

Folia in ramulis disticha, subrotundo-obovata obtusa inaequaliter dentata utrinque viridia, a pilis stellatis hispida et villosa, subtus rugosa, breve petiolata. Stipulae parva. Pedunculi uniflori in axillis foliorum, etiam biflori in racemo terminali. Calyces angulati ovati, laciniis ovatis acuminatis. W.

5. HERMANNIA *salvifolia*.

H. foliis oblongis obtusiusculis integerrimis subsessilibus tomentoso-hispidis rugosis, stipulis lanceolato-subulatis, floribus nudis. W.

H. foliis ovatis integris rugosis tomentoso-hispidis, floribus cernuis. *Lin. suppl.* 302. *Cavan. diff.* 6. p. 328. t. 180. f. 2.\*

Salbeyblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. †

A sequenti, cui simillima diversa: foliis fere sessilibus integerrimis apice parum attenuatis, stipulis longioribus, floribus non involucreatis, calycibus brevioribus non angulatis, laciniis lineari-lanceolatis. W.

\*6. HERMANNIA *micans*.

H. foliis oblongis obtusissimis truncatis apice dentatis petiolatis tomentoso-hispidis rugosis, stipulis lanceolato-subulatis, floribus involucreatis. W.

H. (*micans*) foliis ovato-truncatis apicem versus crenatis pubescentibus, floribus fastigiatis involucreatis. *Schrad. et Wendl. sert. hannov.* p. II. t. 5.

H. (*latifolia*) foliis late oblongis truncato-crenatis rugosis, utrinque et ad oras per pilos stellato-fasciculatos tomentosis, pedunculis multifloris. *Jacq. hort. Schönb.*

I. p. 64. t. 119.\*

Glänzende Hermannie. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. † (v. v.)

Folia pilis stellatis fasciculatis splendide flavescensibus dense tomentosa, oblonga basi rotundata apice valde obtusa truncata et dentata, subtus rugosa. Pedunculi multiflori nutantes foliis involucreati. Calyces inflati angulati brevissime dentati, dentibus ovatis acutis. W.

\*7. HERMANNIA *involucreata*.

H. foliis oblongis acutiusculis integerrimis subsessilibus

tomentoso-hispidis, stipulis lanceolato-subulatis, calycibus campanulatis bracteis lanceolatis obvullatis. W. H. foliis ovatis acutis tomentosis, floribus solitaris involucratis, corollis revolutis. *Cavan. diff. 6. p. 328. t. 177. f. 1.\**

Eingehüllte Hermannie.

*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

*Ab H. salvifolia diversa, foliis acutiusculis, pedunculis unifloris bracteis lineari-lanceolatis calyce longioribus obvullatis. W.*

\*8. HERMANNIA *scordifolia*.

H. foliis oblongis obtusis crenatis petiolatis subtus tomentosis, stipulis subulatis, calycibus patulis. W.

H. foliis oblongis obtusis minutissime stellato-pilosis, pedunculis subbifloris, calycibus foris ad basin inter lacinias gibbosis. *Jacq. hort. Schönb. I. p. 64. t. 120.\**

Gamanderblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. † (v. l.)*

*Folia ablonga obtusa obtusissime crenata, aliquando apice tantum crenata, superne viridia scabriuscula a pilis raris stellatis, inferne vero albida et tomento tenui a pilis stellatis composito, tecta. Petioli longi. Stipulae brevissimae. Pedunculi longi biflori. Calyces profunde partiti, laciniis ovatis acutis patulis, inter lacinias est gibbositas aliqua. W.*

\*9. HERMANNIA *denudata*.

H. foliis lanceolatis glabris triplinerviis apice ferratis acutis, stipulis ovatis acuminatis. W.

H. foliis lanceolatis acutis laevibus superne ferratis. *Lin. suppl. 301. Cavan. diff. 6. p. 329. t. 181. f. 1.\* Jacq. hort. Schönb. I. p. 65. t. 122.\**

Glatte Hermannie. W.

*Haabitat ad Cap. b. Spei. † (v. v.)*

*Caules erecti teretes laeviusculi stricti suffruticosi. Folia petiolata alterna remota laevia, subtus trinervia acuta, superne dentato-ferrata. Folia floralia integerrima. Stipulae lanceolatae petiolis vix longiores nervosae. Flores e summitate ex alternis oppositionibus stipularum s. pedunculo bifloro, pedunculati. Calyx laevis semiquinquefidus. Corolla lutea.*

\*10. HERMANNIA *difermaefolia*.

H. foliis lanceolatis tomentosis ferratis obtusiusculis margine undulatis, stipulis subulatis. W.



*H. foliis oblongo-lanceolatis tomentosis rugosis erosus ad oras plicatulis, pedunculis unifloris. Jacq. hort. Schönb. I. p. 65. t. 121.\**

Wellenblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 5 (v. l.)*

*Folia albida tomentosa oblongo-lanceolata margine plicato-undulata acutiuscula inaequaliter serrata petiolata. Stipulae parvae subulatae. Pedunculi uniflori, Calyx brevis campanulatus inflatus profunde dentatus, dentibus ovatis. W*

## 11. HERMANNIA *alnifolia.*

*H. foliis obovatis cuneiformibus truncatis emarginatis apice crenatis, racemis terminalibus, pedunculis subtrifloris. W.*

*H. foliis cuneiformibus lineatis plicatis crenato-emarginatis. Hort. cliff. 342. Roy. lugdb. 347. Mill. dict. n. I. et illustr. Berg. cap. 166. Kniph. cent. I. Curt. mag. 299.*

*H. foliis latissime cuneiformibus crenatis, lineatis subplicatis, racemis multifloris. Jacq. hort. Schönb. 3. p. 22. t. 291.\**

*H. caule fruticoso, ramis diffusis, foliis cuneiformibus crenatis emarginatis, floribus racemosis. Cavan. diff. 6. p. 330. t. 179. f. 1.\**

*Ketmia africana vesicaria fruticans et erecta, alni foliis latioribus et majoribus. Comm. hort. 2. p. 155. t. 78.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 114.*

Elfenblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 5 (v. l.)*

*Folia lineata. Calyx parvus. Corollae albae, dein flavescens.*

*Flores parvi minores quam in H. lavandulifolia, pallide flavi nec albi. Racemi terminales, pedunculi inferiores triflori quandoque quadriflori, superiores biflori. Stipulae lanceolato-subulatae in ramis junioribus ovato-lanceolatae. Bractae lineari-subulatae. Calyces campanulati patuli, dentibus ovato-lanceolatis. W.*

## \*12. HERMANNIA *cuneifolia.*

*H. foliis obovatis cuneiformibus truncatis emarginatis dentatis, racemis terminalibus, pedunculis unifloris. W.*

*H. foliis cuneiformibus truncatis ad apicem dentatis, r. Linnæi Spec. Plant. T. III, P p*

cemis terminalibus secundis, stipulis bracteisque subcordatis. *Jacq. hort. Schönb. 1. p. 66. t. 124.\**

Kejlblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. f.)*

*Simillima praecedenti at abunde distincta: foliis minoribus stipulis et bracteis ovatis acuminatis, pedunculis racemi unifloris, floribus triplo majoribus, calycibus campanulato-ovatis adpressis, dentibus ovatis acutis. W.*

\*13. HERMANNIA *holosericea*.

H. foliis oblongis cuneiformibus tomentosis apice rotundatis dentatis, stipulis lanceolatis, racemis terminalibus paniculatis. W.

H. foliis oblongis superne ferratis holosericeis, ramulis florentibus subdistichis. *Jacq. hort. Schönb. 3. p. 23. t. 292.\**

Sammetartige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. f.)*

*Folia molissime tomentosa albida oblonga basi cuneiformia, apice rotundata acute dentata. Stipulae lanceolatae. Flores magnitudine H. alnifoliae. Racemi terminales e pedunculis multifloris saepius racemosis interdum et bifloris compositi. Calyx campanulatus subangulatus brevissime quinquedentatus: dentibus ovatis acutis. W.*

\*14. HERMANNIA *hirsuta*.

H. foliis cuneiformibus oblongo-obovatis apice inaequaliter dentatis, stipulis semicordatis acuminatis racemis lateralibus, pedunculis elongatis bifloris. W.

H. caule ramisque flexuosis hirsutis, foliis obovatis incifo-ferratis plicatis subtus pubescentibus, calycibus urceolatis. *Schrad. et Wendl. fert. angl. p. 10. t. 4.\**

Behaarte Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. v.)*

*Rami divaricati flexuosi hirsuti. Folia superne viridia, subtus albida a pilis densis fasciculatis et rugosa. Racemi laterales longi hirsuti, pedunculi biflori valde elongati. Calyx campanulatus, dentibus brevibus ovatis patentibus acuminatis. Distinctissima stipulis magnis semicordatis acuminatis. W.*

\*15. HERMANNIA *scabra*.

H. foliis cuneiformibus oblongis inaequaliter dentatis

basi integerrimis superne scabris, inferne tomentosis, stipulis semicordatis acuminatis. W.

H. (*scabra*) caule tuberculis fasciculate hirtis scabro, foliis cuneiformibus ferrulatis ad oras revolutis scabris, pedunculis subbifloris. *Jacq. hort. Schönb. I. p. 126. t. 127.\** (excluso synonymo *Schrad. et Wendl. fert.*)

H. (*scabra*) caule scabro, foliis lanceolato-ovatis dentatis scabris, pedunculis bifloris, calycibus brevibus. *Cavan. diff. 6. p. 331. t. 182. f. 2.\**

H. (*aspera*) caule erecto aspero ramosissimo, foliis alternis cuneiformibus duplicato-dentatis rugosis subplicatis asperis tomentosis, floribus terminalibus subracemosis cernuis. *Wendl. obs. 52.*

*Althaea africana* frutescens floribus aureis cochleatis pendulis minoribus. *Volk. norimb. p. 24. t. 24.*

Scharfblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. †* (v. v.)

*Valde affinis praecedenti, differt vero: caule scabro a pilis fasciculatis nec hirtis a pilis longis rectis, foliis ultra medium dentatis superne scaberrimis, inferne tomentosis, margine revolutis, stipulis brevioribus, racemo brevioris.* W.

\*16. *HERMANNIA multiflora.*

H. foliis cuneiformibus oblongis truncatis apice dentatis glabriusculis, stipulis oblongis acutis, calyce campanulato. W.

H. foliis cuneiformibus superne denticulatis rugosis hirtulis. *Jacq. hort. Schönb. I. p. 69. t. 128.\**

Vielblumige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

*Folia utrinque viridia marginem versus pilosiuscula, quadrilineariter oblonga cuneiformia truncata apice acute dentata, Stipulae parvae oblongae acuminatae. Calyx campanulatus adpressus brevissime quinquedentatus, dentibus ovatis acuminatis. Racemi pauciflori, e pedunculis unifloris compositi, in omnibus apicibus.* W.

\*17. *HERMANNIA flammea.*

H. foliis cuneiformibus lanceolatis truncatis apice dentatis glabris, racemis terminalibus, pedunculis bifloris, calycibus subreflexis. W.

H. foliis cuneiformibus apice truncato-denticulatis planis, calycibus patentissimis. *Jacq. hort. Schönb. 1. p. 69. t. 129.\**

Feuerfarbene Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ♀ (v. c.)*

*A binis sequentibus cui simillima distincta: canle foliisque glabris, racemis florum terminalibus longis, calycibus profunde partitis, laciniis ovatis acutis patenti-reflexis, corollis aurantii coloris. W.*

\*18. HERMANNIA *angularis.*

H. foliis cuneiformibus lanceolatis truncatis apice dentatis subtus hirtis, calycibus quinquangularibus. W.

H. foliis cuneiformibus rotundatis superne serratis, supra glabris subtus hirtis, calycibus alato-quinquangularibus. *Jacq. hort. Schönb. 1. p. 68. t. 126.\**

Eckige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ♀*

*Caulis a pilis fascicularis scaber. Folia fasciculata superne glabra inferne hirta. Pedunculi biflori in apice caulis. Calyx alato-quinquangularis. W.*

19. HERMANNIA *hyssopifolia.*

H. foliis cuneiformibus lanceolatis obtusis apice dentatis pubescentibus, calycibus globosis inflatis reticulatis. W.

H. foliis lanceolatis obtusis serratis. *Hort. cliff. 342. Hort. upf. 195. Roy. lugdb. 347. Mill. dict. n. 4. Giseck. icon. fasc. 1. t. 16. Cavan. diff. 6. p. 330. t. 181. f. 3.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 115.*

Isopblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ♀ (v. v.)*

*Folia Lavandulae latiora, obtusa, superne serrata. Calyces inflati. Corollae umbone brevissimo sulphureo, reflexo. Caulis erectus strictus.*

20. HERMANNIA *trifurcata.*

H. foliis cuneiformibus linearibus obtusis apice tridentatis integrisve tomentosis, calycibus patentibus. W.

H. foliis lanceolatis integris tridentatisque, racemis secundis. *Sp. pl. 942. Amoen. acad. 6. afr. 24.\* Cavan. diff. 6. p. 332. t. 178. f. 2.\**

H. foliis cuneiformibus apice tridentatis integrisque, flo-

ribus axillaribus racemosis secundis. *Jacq. hort. Schönb. 1. p. 67. t. 125.\**

*H. coerulea*, foliis lanceolatis, racemis secundis. *Burm. ind. fl. cap. 18.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 114.*

Dreyzählige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. l.)*

Folia utrinque albida tomentosa. Pedunculi uniflori ex omnibus foliorum axillis in apice caulis formant racemum secundum. Calyx profunde quinquesidus patens. Corollâ violacea. W.

\*21. *HERMANNIA odorata.*

*H. foliis cuneiformibus lanceolatis obtusis acutis inferioribus apice subtridentatis superioribus integris, tomentosis, calycibus campanulatis patulis. W.*

*H. foliis oblongo-lanceolatis tomentosis subtus rugosis, inferioribus truncato-denticulatis, calycibus urceolatis angulosis. Ait. Kew. 2. p. 412.*

W hlriechende Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. l.)*

Simillima *H. lavandulaefoliae* at diversa: foliis basi magis attenuatis et inferioribus apice acute tridentatis. W.

22. *HERMANNIA lavandulifolia.*

*H. foliis lanceolatis obtusis integerrimis tomentosis, calycibus angulosis. W.*

*H. foliis lanceolatis obtusis integerrimis. Hort. cliff. 342. Roy. lugdb. 347. Mill. dict. n. 7. Kniph. cent. 1. n. 39. Cavan. diff. 6. p. 331. t. 180. f. 1.\* Jacq. hort. Schönb. 2. p. 46. t. 215.\**

*H. frutescens, folio lavendulae latiore et obtuso, flore parvo aureo. Boerh. lugdb. 1. p. 273. Dill. elth. 179. t. 147. f. 176.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 115.*

Lavendelblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. v.)*

23. *HERMANNIA linifolia.*

*H. foliis linearibus, pedunculis unifloris. Mant. 256. † Burm. prodr. 18.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 116.*

Flächsbättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5*

24. HERMANNIA *filifolia*.

H. foliis lineari-triquetris integerrimis. *Lin. suppl.* 302.

H. foliis lineari-triquetris glomeratis stipulis magnis lanceolatis. *Cavan. diff.* 6. p. 332. t. 180. f. 3.\*

H. foliis lanceolato-linearibus carinatis glabris margine scabris. *Jacq. hort. Schönb.* 1. p. 66. t. 123.\*

Fadenblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. f.)

25. HERMANNIA *trifoliata*.

H. foliis sessilibus tomentosis, cuneiformi-obcordatis apice crenatis, stipulis oblongis obtusis integerrimis foliorum longitudine, calycibus inflatis. W.

H. foliis ternatis sessilibus plicatis retulis tomentosis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.

H. foliis alternis tomentosis plicatis cuneiformibus, stipulis maximis foliosis ovatis. *Cavan. diff.* 6. p. 333. t. 182. f. 2.\*

H. frutescens, folio oblongo molli cordato hirsuto. *Boerh. lugdb.* 1. p. 273.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 116.

Dreyblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. f.)

*Caulis fruticosus, repens: Ramis angustis. Folia sessilia, ternata; intermedium cuneatum, conduplicatum, subserratum, tridentatum apice recurvo. Flores penduli. Calyx campanulatus tomentosus, semiquinquefidus: laciniis dilatatis, rotundatis. Corolla calyce angustior.*

*Flores terminales aggregati. Calyx H. hyssopifoliae. W.*

\*26. HERMANNIA *triphylla*.

H. foliis ternatis cuneiformibus apice truncatis dentatis, foliolo intermedio petiolato, stipulis lanceolato-subulatis. W.

H. foliis ternatis planis obovatis medio petiolato majore. *Cavan. diff.* 6. p. 333. t. 178. f. 3. (excluso synonymo.)

Kleeblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* †

*In hac folia revera sunt ternata, in praecedente vero stipulae formam hujus mentiuntur. Hermannia triphylla Linnaei est longe alia planta et ad Connari genus pertinet. W.*

\*27. HERMANNIA *procumbens*.

H. foliis oblongis pinnatifido-dentatis, caule procumbente. W.

H. foliis inciso-pinnatifidis, inferioribus ovatis, superioribus elongatis, floribus racemosis. *Bavan. diff.* 6. p. 329. t. 177. f. 2.\*

Liegende Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* †

Folia inferiora oblonga basi rotundata supra medium pinnatifido-dentata; superiora duplo longiora linearia pinnatifido-dentata. Racemi pauciflori in apice omnium ramorum, pedunculis unifloris. Calyx campanulatus angularis, dentibus ovatis acutis. W.

\*28. HERMANNIA *vesicaria*. †

H. foliis pinnatifidis basi attenuatis, subtus hirtis, fructibus inflatis. W.

H. caule tomentoso, foliis confertis pinnatifidis subtus piloso-stellatis, fructibus magnis inflatis terminalibus.

*Cavan. diff.* 6. p. 331. t. 181. f. 2.

Blasenfrüchtige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* †

Flores hujus non vidit *Clariff. Cavanilles.* W.

29. HERMANNIA *grossularifolia*. †

H. foliis lanceolatis pinnatifidis. *Sp. pl.* 943.

H. foliis obovatis acute incisifidis, pedunculis bifloris. *Roy. lugdb.* 347. *Mill. dict. n.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 117.

Stachelbeerblättrige Hermannie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* †

\*30. HERMANNIA *incisa*. W. †

H. foliis pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis integerrimis, petalis unguiculatis inciso-dentatis. W.

Eingefchnittne Hermannie. W.

*Habitat* - - - † (v. l.)

Caulis hirtus pilis rectis patulis. Folia profunde pinnatifida basi attenuata, pilis sparsis patentibus praesertim margine obsita; laciniis lineari-lanceolatis integerrimis. Racemus subterminalis secundus. Petala non convoluta, unguiculata, unguem versus inciso-dentata. Filamenta cuneiformia. An potius *Maherniae* species? *dissuadent vero stamina.* W.

## 1260. M E L O C H I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1110.*

*Cal.* subduplex. *Petala* 5 patentia. *Filamenta* subulata. *Styli* 5. *Capsf.* 5-locularis, 1-sperma.

1. MELOCHIA *pyramidata.*

*M. floribus* umbellatis, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, foliis nudis. *Syst. Veg.* 510. *Swartz obsf.* 255. \* *Jacq. hort.* 1. p. 11. t. 30.

*M. foliis* ovato-lanceolatis ferratis glabris, floribus umbellatis oppositifoliis. *Cav. diff.* 6. p. 319. t. 172. f. 1. \*

*M. floribus* umbellatis oppositifoliis, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis acutis, foliis nudis. *Hort. cliff.* 343. *Fl. zeyl.* 245. *Loefl. it.* 255. \* *Mill. dict.* n. 1.

*M. herbacea* tenuissima ramosa, foliis oblongo-ovatis, umbellulis lateralibus foliis approximatis. *Brown. jam.* 276.

*Althaea brasiliensis* frutescens, incarnato flore, fagopyri semine. *Pluk. alm.* 25. t. 131. f. 3.

*Abutilon herbaceum* procumbens betonicae folio, flore purpureo. *Sloan. jam.* 97. *hist.* 1. p. 220. t. 139. f. 1. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 118.

Pyramiden-Melochie. W.

*Habitat in Brasilia et insulis Caribacis.* † (v. v.)

2. MELOCHIA *tomentosa.*

*M. floribus* umbellatis axillaribus, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, foliis tomentosis. *Sp. pl.* 932. *Mill. dict.* n. 2. *Swartz obsf.* 256. \*

*M. foliis* ovatis ferratis tomentosis, floribus umbellatis axillaribus, stylo quinquefido. *Cavan. diff.* 6. p. 319. t. 172. f. 2. \*

*M. frutescens*, foliis subincanis villosis oblongo-ovatis crenato ferratis, floribus racemosis, cortice fulco. *Brown. jam.* 276.

7 *Abutilon arboreum* spicatum betonicae folio incano, flore minore purpureo. *Sloan. cat.* 97. *hist.* p. 219. t. 138. f. 2. 3.

8. *M. (frutescens)* floribus subumbellatis axillaribus, capsulis pyramidatis pentagonis, angulis acutis, foliis to-



mentosis, caule fruticoso erecto. *Jacq. obs. 2. p. 22. t. 44.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 119.*

Filzige Melochie. W.

*Habitat in campestribus siccis Jamaicae, St. Dominici. †*  
 Caules *virgati*. Folia *ovato-lanceolata, crenata, tomentosa, plicata*. Pedunculi *umbellati, oppositifolii*: Flores *purpurei, majusculi*.

\*3. MELOCHIA *crenata*.

M. foliis subrotundis crenatis tomentosis lineatis, umbellis axillaribus terminalibusque pedunculatis. *Vahl symb. 3. p. 86. t. 68.\**

Gekerbte Melochie. W.

*Habitat in America meridionali. †*

Rami *villosa-tomentosi canescentes*. Folia *petiolata distantia, vix pollicaria minora, juniora utrinque tomentosa mollia incana plicata, adultiora supra glabrora lineata*. Stipulae *ovatae*. Flores *axillares umbellati*. *Vahl l. c.*

4. MELOCHIA *depressa*.

M. floribus solitariis, capsulis depressis pentagonis: angulis obtusis ciliatis. *Sp. pl. 913. Roy. lugdb. 348. Mill. dict. n. 3.*

M. caule fruticoso humili, foliis ovatis serratis tomentosis, floribus axillaribus solitariis. *Cavan. diff. 6. p. 320. t. 173. f. 1?*

M. erecta minor, foliis ovatis serratis: petiolis geniculatis. *Brown. jam. 276.*

*Abutilon americanum*, ribesii foliis, flore carneo, fructu pentagono aspero. *Houft. mss. Mill. dict. t. 3. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 120.*

Niedrige Melochie. W.

*Habitat Havanae.*

\*5. MELOCHIA *truncata*. W.

M. floribus solitariis, capsulis depressis, foliis cuneiformibus apice dentatis. W.

Keilblättrige Melochie. W.

*Habitat in India orientali. † (v. f.)*

Caulis *fruticosus erectus, ramis divaricatis tomentosis*. Folia *parva bilinearia petiolata cuneiformia obcordata mucronata, apice quadridentata vel integerrima, superne glabra, inferne e pilis stellata*.

*latis canescentia. Flores pedunculati parvi solitarii in axillis foliorum ad ramorum apicem. Partium fructificationis descriptionem sequentem mecum communicavit amicissimus D. Klein: Calyx quinquesidus. Corolla monopetala 5-partita basin tubulosa. Stamina decem monadelphica. Germen depresso. Styli quinque longi flexuosi. Capsula depresso quinquelocularis pentasperma. Semina reticulata trigona. W.*

\*6. MELOCHIA *venosa.*

M. pedunculis distinctis terminalibus multifloris, foliis ovatis ferratis venosis subtus tomentosis, caule piloso.

*Swartz prod. 97. Fl. ind. occid. 2. p. 1137.\**

Sida pilosa. *Mill. dict. n. 17.*

Adrige Melochie. W.

*Habitat in aridissimis arenosis Jamaicae australis. †*

Frutex bi-tripedalis ramosus. Rami simplices erecti teretes hirsuti. Folia alternapetiolata ovata acuminata serrata venosa hirsutiuscula subtus tomentosa. Pedunculi terminales brevissimi multiflori, floribus pedicellatis, pedicellis pedunculis fere longioribus. Corolla lutea inter majores hujus generis. Swartz l. c.

\*7. MELOCHIA *hirsuta.*

M. spicis terminalibus coarctatis, foliis ovatis acutis villosis. W.

M. foliis ovatis inaequaliter ferratis, spicis florum terminalibus densis hirsutis. *Cavan. diff. 6. p. 323. t. 175. f. 1.\**

Haarige Melochie. W.

*Habitat - - -*

*A praecedente differre videtur spicis coarctatis, foliis villosis non acuminatis et calyce exteriori longissimo. W.*

8. MELOCHIA *concatenata.*

M. racemis terminalibus confertis, capsulis globosis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis dentatis glabris. W.

M. racemis confertis terminalibus, capsulis globosis sessilibus. *Fl. zeyl. 247.\* Mill. dict. n. 4.*

M. foliis sublancoelatis ferratis, racemis florum terminalibus numerosis. *Cavan. diff. 6. p. 322. t. 175. f. 2.\**

Alcea indica, flosculis parvis, fasciculatim ramulis adfixis. *Pluk. alm. 26. t. 9. f. 5.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 120.*

Kettenfrüchtige Melochie. W.

*Habitat in India utraque. 2*

9. MELOCHIA *odorata.*

*M. corymbis pedunculatis axillaribus, foliis ovatis subcordatis duplicato-ferratis acuminatis glabris. W.*

*M. foliis ovatis subcordatis sublobatis biserratis glabris, paniculis pedunculatis compositis. Lin. suppl. 302.*

*Cavan. diff. 6. p. 320. t. 173. f. 2.\**

*M. cymis corymbosis axillaribus, foliis cordatis acuminatis ferratis. Forst. prod. n. 253.*

Wohlriechende Melochie. W.

*Habitat in insula Tanna et Ea-uwa. (v. l.)*

*Glabra at pedunculi cinerei ex tenuissimo tomento.*

*Folia simillina M. corchorifoliae at longe majora. Paniculae longe pedunculatae ramosae. Flores magni.*

\*10. MELOCHIA *lupulina.*

*M. racemis confertis axillaribus, calycibus inflatis membranaceis, foliis ovato-cordatis inciso-ferratis subtus tomentosis. Swartz prod. 97. Fl. ind. occid. 2. p. 1141.\**

Hopfenartige Melochie. W.

*Habitat in fruticetis Jamaicae. †*

*Racemi axillares 2-3 conferti, petioles fere breviores, floribus pedunculatis, pedunculis umbellatis filiformibus unifloris. Corolla alba. Swartz l. c.*

\*11. MELOCHIA *caracasana.*

*M. floribus capitatis subsessilibus axillaribus terminalibusque foliis cordatis crenatis subtus tomentosis. W.*

*M. floribus capitatis, capsulis subrotundis, foliis cordatis crenatis, caule arborecente. Jacq. ic. rar. 3. t. 507. Collect. 2. p. 369.\**

Caracasche Melochie. W.

*Habitat ad Caracas. †*

*Folia cordata subtus incana. Capitula magna floribus albis. W.*

\*12. MELOCHIA *nodiflora.*

*M. floribus conglomeratis axillaribus, capsulis globosis, foliis ovatis acuminatis glabris. Swartz prod. 97.*

*Fl. ind. occid. 2. 2. 1139.\* Vahl. symb. 2. p. 78.\**

*M. (carpinifolia) caule erecto piloso, foliis inferioribus*

cordatis, superioribus acuminatis duplicato-dentatis multinerviis pilosis, floribus axillaribus glomeratis. *Wendl. obs.* 52.\*

*Abutilon fruticosum* foliis subrotundis serratis, floribus albis quinquepetalis ad alas foliorum conglobatis. *Sloan. hist.* 1 p. 219. t. 135. f. 2.

β. *M. (borbonica)* foliis ovato-lanceolatis acumine producto, dentatis, floribus axillaribus glomeratis, fructu quinquecapsulari. *Cav. diff.* 6. p. 321. t. 174. f. 1.\*  
Knotenblütige Melochie. W.

*Habitat in sepibus Jamaicae β in insula Borboniae et Mauritii.* ♀ (v. l.)

### 13. MELOCHIA *corchorifolia.*

*M. floribus capitatis sessilibus, capsulis subrotundis, foliis subcordatis sublobatis.* *Fl. zeyl.* 246. *Kniph. cent.* 9. n. 66.

*M. corchori folio.* *Dill. elth.* 221. t. 176. f. 217.

*Althaea peregrina*, longiore *betonicae* folio, floribus albis perexiguis, capitulis arcte conglomeratis. *Pluk. alm.* 25. t. 44. f. 5.

*Tlieru ureu.* *Rheed. mal.* 9. p. 143. t. 73.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 121.

Corchorusblättrige Melochie. W.

*Habitat in India.* ☉ (v. l.)

*Pl. duriuscula, diffusa, Ramis scabris, virgatis. Folia subcordata, obtusiuscula, nuda, plicata, sublobata, serrata. Flores capitati, sessiles, terminales. Corollae dilute purpurascens fundo flavo.*

### 14. MELOCHIA *supina.*

*M. floribus capitatis, foliis ovatis serratis, caulibus procumbentibus.* *Mill. dict.* n. 5.

*Alcea supina* pusilla, *geranii exigui maritimi* folio et facie, *maderaspatensis* fructu in summo caute glomerato, pericarpio duro. *Pluk. alm.* 14. t. 132. f. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 121.

Kleine Melochia. W.

*Habitat in India.*

## \*1261. O C H R O M A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. IIII.*

*Cal.* duplex: exterior triphyllus. *Petala* 5. *Antherae* anfractuosae! *Caps.* 5-locularis polysperma. *Sem.* lana involuta.

## \*1. OCHROMA Lagopus.

*Ochroma Lagopus.* Swartz *prod.* 98. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1144.\* *Act. holm.* 1792. p. 148. t. 6.\*

*Bombax (pyramidale)* caule inermi, foliis cordatis angulatis, floribus pentandris, antheris coadunatis, fructu longissimo pyramidalis. *Cavan. diff.* 5. p. 294. t. 153\*

*Hibiscus arborescens trichotomus,* foliis amplissimis cordatis angulatis, seminibus lana obvolutis. *Brown. jam.* 286.

*Gossypium* vel *Xylon arboreum dasypus* dictum e Monteferrato americanum, fructu capsulari cylindroide, leucophaea lanugine farcto. *Pluk. alm. t.* 189. f. 2.

Hafensfußförmige Bleichwolke. W

*Habitat in Jamaicae et Hispaniolae montibus.* †

Arbor trunco 20-40 pedali, ramis di-trichotomis patulis laevibus fragilibus. Folia magna pedalia et ultra sparsa petiolata cordato-rotundata 5-angulata, angulis baseos rotundatis margine subdenticulata, laevia, subtus tomentosa. Pedunculi terminales solitarii, ramulis crassiores teretes glabri unistori 3-4-pollicares. Flores erecti 3-4-pollicares pallide rufi. Capsula pedalis et ultra subcylindracea quinquesulcata decemangulata. Lana pallide rufa. Swartz l. c.

## 1262. PASSIFLORA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 509.*

*Cal.* 5-partitus coloratus. *Cor.* 5-petala calyci inserta. *Nectar.* corona filamentosa. *Pepo* pedicellata.

\* *Foliis indivisis.*

1. PASSIFLORA *ferratifolia.*

*P.* foliis ovatis venosis subferrulatis, petiolis biglandulosis, involucreo triphylo. *W.*

*P.* foliis indivisis ovatis ferratis. *Amoen. acad.* 1. p. 217. f. 1.\* *Mill. dict.* n. 18. *Jacq. hort.* t. 10.

*P.* foliis ovato-oblongis ferrulatis, corolla calycem superante. *Cavan. diff.* 10. p. 452. t. 279.\*

*P.* foliis ovato-lanceolatis integris ferratis. *Hort. cliff.* 431. *Roy. lugdb.* 260.

*Granadilla americana*, folio oblongo leviter ferrato, petalis ex viridi rubescentibus. *Mart. cent.* 36. t. 36.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 447.

Sägeblättrige Passionsblume. *W.*

*Habitat* Surinami. † (v. v.)

2. PASSIFLORA *pallida.*

*P.* foliis ovatis integerrimis triplinerviis venosis, petiolis biglandulosis, floribus apetalis, involucreo nullo. *W.*

*P.* foliis indivisis ovatis integerrimis: petiolis biglandulosis. *Amoen. acad.* 1. p. 218. f. 2.\*

*Clematis indica* alia, flore minore pallido. *Plum. amer.* 74. t. 89.

*Clematis Murucua* pyriformis minor. *Morif. hist.* 3. p. 7. f. 1. t. 2. f. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 448.

Bleiche Passionsblume. *W.*

*Habitat* in Dominica, Brasilia. †

*Passiflorae flos male a plerisque est descriptus. Ea pars quae calyx audit est involucreum. Calyx est quinquepartitus, laciniis sub apice plerumque mucronatis. Petala quinque calyci inserta. In nonnullis e g. Passiflora suberosa, minima etc. est flos apetalus. W.*

3. PASSIFLORA *adulterina*.

P. foliis oblongis subdenticulatis venosis subtus tomentosis, petiolis eglandulosis, calyce tubuloso, involucrio triphylo. W.

P. foliis oblongo-ovalibus integris, floribus tubulosis. *Lin. suppl.* 408. *Smith. ined.* 1. p. 24 t. 24.\* *Cav. diff.* 10. p. 451. t. 278.

Langröhrige Passionsblume. W.

Habitat in Nova Granada. †

Caulis angulatus. Folia oblonga, superne glabra subtus tomentosa venosa, margine integerrima vel obsolete denticulata revoluta. Flores penduli longissimi. Involucrum triphyllum, foliolis oblongo-lanceolatis acutis. Calyx hypocrateriformis, tubo longissimo, limbo quinquepartito. Petala quinque. Nectarium in fauce calycis brevissimum. W.

4. PASSIFLORA *cuprea*.

P. foliis ellipticis integerrimis obtusis trinerviis, petiolis eglandulosis, involucrio nullo. W.

P. foliis indivisis ovatis integerrimis: petiolis aequalibus *Amen. acad.* 1. p. 219. f. 3.\* *Mill. dict. n.* 17. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 606. *Collect.* 3. p. 168.\*

P. foliis ovatis ciliatis, corolla decemfida, corona simplici brevi rigida. *Cavan. diff.* 10. p. 448.\*

Granadilla flore cupreo, flore oliviformi. *Dill. elth.* 163. t. 138. f. 165.

Granadilla americana, fructu subrotundo, corolla floris erecta, petalis amoene fulvis, foliis integris. *Mart. cent.* 37. t. 37.

Granadilla foliis sarsaparillae trinerviis: flore purpureo fructu olivaeformi caeruleo. *Catesb. car.* 2. p. 93. t. 93.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 448.

Kupferfarbene Passionsblume. W.

Habitat in Providentia, Bahama. †

Folia ovata, adultiora subcordata, tenella vix manifeste ferrata. Petioli glandulis vix conspicuis.

Folia mucronata. Puncta 4-6 ad utrumque latus nervi medii et unum ad latus exterius in basi nervorum exteriorum. W.

5. PASSIFLORĀ *tiliaefolia*.

P. foliis cordatis integerrimis venosis, petiolis eglandulosis, involucrio triphylo. W.

P. foliis indivisis cordatis integerrimis: petiolis aequalibus. *Amoen. acad.* 1. p. 219. f. 4.

P. foliis indivisis cordatis acutis integerrimis, petiolis nudis, stipulis ovato-acutis. *Cavan. diff.* 10. p. 455. t. 285.

Granadilla pomifera, tiliae folio. *Feuill. peruv.* 1. p. 720. t. 12.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 429.

Lindenblättrige Passionsblume. W.

*Habitat in Peru, Lima.* †

#### 6. PASSIFLORA maliformis.

P. foliis oblongo-ovatis cordatis triplinerviis venosis integerrimis, petiolis biglandulosis, involucro tripyllo flore majore. W.

P. foliis indivisis cordato-oblongis integerrimis: petiolis biglandulosis, involucris integerrimis. *Amoen. acad.* 1. p. 220. f. 5.\* *Mill. dict. n.* 15. *Jacq. hort. Schönb.* 2. p. 27. t. 180.\*

P. foliis cordato-oblongis integerrimis, floribus solitariis, involucro tripartito integerrimo. *Roy. lugdb.* 261.

Clematis indica latifolia, flore clavato, fructu maliformi.

*Plum. amer.* 67. t. 82. *Raj. suppl.* 340.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 450.

Aepfeltragende Passionsblume. W.

*Habitat in Dominica, Martinica, Jamaica et Cajenna.* †

#### 7. PASSIFLORA quadrangularis.

P. foliis oblongo-ovatis subcordatis integerrimis venosis, petiolis sexglandulosis, stipulis subrotundo-ovatis, involucro triphylo, caule membranaceo tetragono. W.

P. foliis indivisis ovalibus subcordatis glabris multinerviis, petiolis glandulosis, caule membranaceo tetragono, stipulis ovali-oblongis. *Ait. Kew.* 3. p. 306.

P. foliis indivisis subcordatis integerrimis, petiolis sexglandulosis, caule membranaceo tetragono. *Sp. pl.* 1356. *Mill. dict. n.* 20. *Jacq. amer.* 231. t. 143.\* *Swartz obs.* 332.\* *Cavan. diff.* 10. p. 453. t. 283.

P. foliis amplioribus cordatis, petiolis glandulis sex, caule quadrangulo alato. *Brown. jam.* 327.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 451.

Viereckige Passionsblume.

*Habitat in Jamaicae sylvis.* †



\*8. PASSIFLORA *alata*.

P. foliis oblongo-ovatis subcordatis integerrimis venosis, petiolis quadriglandulosis, stipulis lanceolato-falcatis subferratis, involucre triphylo, caule membranaceo-tetragono. W.

P. foliis indivisis ovatis subcordatis laevibus paucinerviis, petiolis glandulosis, caule membranaceo-tetragono, stipulis lanceolatis ferratis. *Ait. Kew.* 3. p. 306.

Geflügelte Passionsblume. W.

*Habitat in India occidentali.* † (v. v.)

*Simillima praecedenti at diversa:* petiolis quadriglandulosis, stipulis quadruplo minoribus lanceolatis falcatis longe mucronatis dente uno alterove vel pluribus notatis, floribus minoribus. W.

9. PASSIFLORA *laurifolia*.

P. foliis oblongis integerrimis venosis, petiolis biglandulosis, involucre triphylo apice dentato. W.

P. foliis indivisis ovatis integerrimis, petiolis biglandulosis, involucris dentatis. *Amoen. acad.* 1. p. 220. f. 6.\* *Mill. dict. n.* 16. *Jacq. obs.* 1. p. 35. *hort.* 2. p. 76. t. 162. *Swartz. obs.* 333.\* *Cavan. diff.* 10. p. 454. t. 284.\*

P. foliis ovatis, petiolis biglandulosis, bacca molli ovata. *Brown. jam.* 327.

P. foliis folitariis oblongis integerrimis, floribus solitariis, involucre tripartito dentato. *Roy. lugdb.* 532.

P. arborea, laurinis foliis, americana. *Pluk. alm.* 282. t. 211. f. 3.

*Clematis indica*, fructu citriformi, foliis oblongis. *Plum. amer.* 64. t. 80. *Raj. suppl.* 341.

*Marquiaas.* *Mer. surin.* 21. t. 21.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 453.

Lorbeerblättrige Passionsblume. W.

*Habitat in Surinamo.* † (v. l.)

*Bacca ovata sapidissima.*

\*10. PASSIFLORA *coccinea*.

P. foliis ovatis ferratis subtus incanis subtriplinerviis venosis, petiolis quadriglandulosis, involucre triphylo ferrato flore majore. W.

P. foliis ovatis ferratis subcordatis, calyce corollam superante. *Cavan. diff.* 10. p. 452. t. 280.\*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

Q q

P. foliis cordatis ferratis petiolatis glandulosis, floribus coccineis, fructu flavo. *Aubl. guj. 2. p. 828. t. 324.\**  
 Scharlachfarbene Passionsblume. W.  
*Habitat in Gujana.* †

\*11. PASSIFLORA *mucronata*.

P. foliis oblongo-ovatis subcordatis integerrimis obtusis triplinerviis venosis, petiolis biglandulosis, stipulis subrotundo-ovatis mucronatis, involucrio triphylllo dentato. W.

P. foliis indivisis cordatis obtusis integerrimis, stipulis ovatis aristato-mucronatis. *Lamark encycl. 3. p. 31.\**  
*Cavan. diff. 10. p. 453. t. 282.\**

Weichstachelige Passionsblume. W.

*Habitat in Brasilia.* †

*Stipulae subrotundo-ovatae magnaе integerrimae venosae mucronatae. Involucrum triphyllum foliolis oblongis obtuse et profunde dentatis venosis. Calycis laciniæ et Petala lanceolata. W.*

\*12. PASSIFLORA *glandulosa*.

P. foliis oblongis acuminatis integerrimis venosis, petiolis biglandulosis, involucrio triphylllo, foliolis lanceolatis basi biglandulosis, calyce tubuloso. W.

P. foliis ovatis oblongis utrinque glabris integerrimis, corollis tubulosis. *Vahl. eclog. 2. p. 52.\**

P. foliis ovatis integerrimis coriaceis calycinis foliolis biglandulosis, corona omnium brevissima. *Cavan. diff. 10. p. 453. t. 281.\**

Drüsig Passionsblume. W.

*Habitat in Cajenna.* †

*Involucri foliola brevissima lanceolato-subulata, vel lanceolata, basi biglandulosa. Calyx tubulosus, tubo brevissimo campanulato. Corona e dentibus brevissimis subulatis composita. W.*

13. PASSIFLORA *multiflora*.

P. foliis oblongis integerrimis acutis triplinerviis venosis, petiolis biglandulosis, pedunculis aggregatis axillaribus, floribus apetalis, involucrio nullo. W.

P. foliis indivisis oblongis integerrimis, floribus confertis. *Amoen. acad. 1. p. 221. f. 7.\** *Mill. dict. n. 19.*  
*Cavan. diff. 10. p. 448. t. 272.\**

P. laurinis foliis, polyanthos americana. *Pluk. alm. 282.*  
 Granadilla, flore minore corymboso. *Plum. spec. 7.*

*Clematis indica polyanthos odoratissima. Plum. amer.*

75. t. 90. *Raj. suppl.* 343.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 455.

Vielblütige Passionsblume. W.

*Habitat in Dominica.* †

\* \* *Foliis bilobis.*

#### 14. PASSIFLORA *perfoliata.*

P. foliis cordatis bilobis obtusis mucronatis, summis sub-  
amplexicaulibus, petiolis eglandulosis, calyce campanu-  
lato, petalis calycis laciniis duplo longioribus. W.

P. foliis bilobis oblongis transversis amplexicaulibus pe-  
tiolatis subtus punctatis. *Amoen. acad.* 1. p. 222.

f. 8. \* *Swartz. obs.* 334. \* *Jacq. hort. Schönb.* 2. p.  
28. t. 182. \*

P. normalis. *Willd. phytog.* 1. p. 9. \*

P. Murucua. *Mill. dict. n.* 14?

P. foliis trilobis: cruribus oblongis obtusis: intermedio  
obsoleto setula terminato. *Brown. jam.* 328.

Flos passionis perfoliatus s. periclymeni perfoliati folio.

*Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. p. 230. t. 142. f. 3. 4. *Raj.*

*suppl.* 342.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 456.

Durchstochene Passionsblume. W.

*Habitat in Jamaicae australis sepibus aridis maritimis.*

† (v. v.)

Folia petiolata, summa fere sessilia. Superficies in-  
ferior foliorum punctis ad latus interius laborum est in-  
structa. Flores punicei. Calyx campanulatus laciniis  
subulatis. Petala lanceolata. Gemmae florum abini-  
tio sunt apertae, quod non in reliquis. W.

#### 15. PASSIFLORA *rubra.*

P. foliis cordatis bilobis acutis mucronatis subtus pube-  
scentibus, petiolis eglandulosis, fructu obovato. W.

P. foliis bilobis cordatis acuminatis, subtus subtomen-  
tosis. *Amoen. acad.* 1. p. 222. f. 9. *Swartz obs.* 336. \*

*Jacq. ic. rar.* 1. t. 186. *Collect.* 1. p. 136. \* *Cavan. diff.*  
10. p. 445. t. 268. \*

P. foliis tenuioribus trinerviis bicornibus lunatis: sinu  
antere obtuso. *Brown. jam.* 328.

*Clematis indica*, flore clavato suaverubente, fructu hexa-  
gono coccineo, folio bicorni. *Plum. amer.* 68. t. 83.

*Raj. suppl.* 341.

Q q 2

Flos passionis folii media lacinia quasi abscissa, flore minore carneo. *Sloan. jam. 104. hist. 1. p. 229.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 456.*

Rothe Passionsblume. W.

*Habitat in Jamaica, Dominica, Martinica, Cajenna.*

‡ (v. v.)

Petioli eglandulosi.

16. PASSIFLORA *normalis*. †

P. foliis bilobis basi emarginatis: lobis linearibus obtusis divaricatis: intermedio obsoleto mucronato. *Amoen. acad. 5. p. 408. Mill. dict. n. 12.*

P. foliis trilobis: cruribus angustis oblongis: intermedio fere obsoleto. *Brown. jam. 328.*

Coanenepilli f. Contraierva. *Hern. mex. 301.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 457.*

Geradwinkliche Passionsblume. W.

*Habitat in America meridionali.*

Folia lobis angulo recto divaricatis. Petioli eglandulosi.

\*17. PASSIFLORA *lunata*.

P. foliis cordatis bilobis obtusis glabris, petiolis eglandulosis, pedunculis axillaribus geminis, filis coronae clavatis. W.

P. (*lunata*) foliis bilobis punctatis basi subcordatis biglandulosis, nectarii radiis exterioribus compresso-clavatis obtusis. *Smith. ic. pict. 1. p. 1. t. 1. \**

P. (*biflora*) foliis bilobis semilunatis obtusis glabris subtus punctatis, caule quadrangulo axillis bitoris. *Lamarck. encycl. 3. p. 34. \* Cavan. diff. 10. p. 457. t. 288. \**

Granadilla folio lunato, flore parvo albo, fructu succulento ovato Houstoni. *Mart. cent. 52. t. 52.*

Mondförmige Passionsblume. W.

*Habitat in Jamaica, Mexico. ‡ (v. v.)*

Folia basi biglandulosa subtus punctatis, punctis in interiori loborum latere. Differt a *P. punctata*: foliis bilobis nec obtuse trilobis, involucrio triphylo subulato remoto persistenti, pedunculis geminis. W.

18. PASSIFLORA *Murucuja*.

P. foliis bilobis obtusis emarginatis, petiolis eglandulosis, corona campanulata truncata integerrima. W.

P. foliis bilobis obtusis basi indivisis, nectariis monophyllis. *Amoen. acad. 1. p. 223. f. 10. \* Cavan. diff. 10. p. 456. t. 282. \* Swartz obs. 336. \**

P. foliis bilobis obtusis, nectariis indivisis. *Roy. lugdb. 261.*

P. foliis tenuioribus trinerviis bicornibus lunatis, sinu anteriori obtuso. *Brown. jam. 328.*

Clematis indica, flore puniceo: folio lunato. *Plum. amer. 72. t. 87. Raj. suppl. 342.*

Murucuja folio lunato. *Tournef. inst. 241.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 457.*

Glockenförmige Passionsblume. W.

*Habitat in Dominica. †*

Folia subtus punctata, setula inter lobos. Petioli eglandulosi.

### 19. PASSIFLORA *Vespertilio.*

P. foliis cuneiformibus bilobis acuminatis divaricatis basi biglandulosis, petiolis eglandulosis, involucreo nullo. W.

P. foliis bilobis basi rotundatis glandulosisque: lobis acutis divaricatis subtus punctatis. *Amoen. acad. 1. p. 223. f. 11. \* Mill. dict. n. 11. Cavan. diff. 10. p. 447. t. 271.*

P. foliis obverse lunatis: punctis duobus melliferis sub basi. *Virid. cliff. 91. Hort. cliff. 431. Roy. lugdb. 260.*

Granadilla bicornis, flore candido: filamentis intortis. *Dill. elth. 164. t. 137. f. 164.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 458.*

Fledermausartige Passionsblume. W.

*Habitat in America. †*

Folia subtus punctata, basi punctis 2 majoribus excavatis, setula nulla inter lobos. Petioli eglandulosi.

### \*20. PASSIFLORA *oblongata.*

P. foliis oblongis subtus punctatis basi rotundatis, apice lunato-bilobis, lobis brevissimis erectis, setula intermedia minuta. *Swartz fl. ind. occid. 2. p. 1135.*

P. foliis ellipticis antice subtrilobis subtus punctatis, lobis acutiusculis, intermediobreviori. *Swartz prod. 97.*

Längliche Passionsblume. W.

*Habitat in Jamaicae fruticetis submontosis. †*

Caulis frutescens, cirrhis alte scandens, teres sulca-

*tus scabrosus subdivisus rigidus. Folia petiolata alterna 2-3-pollicaria oblongata, basi rotundata, apice subretusa lunata biloba, lobis brevissimis obtusis erectis, margine integra subconvexa trinervia venosa scariosa, membranacea glabra, supra nitida, subtus pallidiora, punctis compressis remotis serie duplici longitudinali. Scutula brevissima, intermedia loco lobi medii quasi obsoleti. Petioli unciales vel semiunciales teretes supra sulco exarati glabri eglandulosi. Cirrhi axillares solitarii filiformes spirales rigidi. Stipulae oppositae ad basin petiolorum, lineari-subulatae rigidae. Flores pedunculati axillares solitarii majusculi. Descriptio floris desideratur. Swartz l. c.*

## 21. PASSIFLORA capsularis. †

*P. foliis cordatis bilobis acutis mucronatis, petiolis eglandulosis, fructu oblongo utrinque attenuato hexagono. W.*

*P. foliis bilobis cordatis oblongis petiolatis. Sp. pl. 1357. Mill. dict. n. 10.*

*Granadilla fructu rubente, folio bicornii. Plum. spec. 6. ic. 138. f. 2. Barr. obs. praef. 1. titul. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 459.*

*Capselfartige Passionsblume. W.*

*Habitat in Gallia aequinoctiali. †*

*An varietas P. rubrae? Convenit in omnibus cum P. rubra at solo fructu differre videtur, qui secundum Jacquin et Lamarck valde variat. W.*

\* \* \* *Foliis trilobis.*

## 22. PASSIFLORA rotundifolia.

*P. foliis subrotundis brevissime obtuse trilobis punctatis, subtus tomentosis, petiolis eglandulosis, petalis calyce duplo brevioribus. W.*

*P. foliis subtrilobis obtusis subrotundis subtus punctatis. Sp. pl. 1357. Jacq. obs. 2. t. 46. f. 1. Cavan. diff. 10. p. 455. t. 290. \* Swartz obs. 337. \**

*Granadilla folio hederaceo, flore albo, fructu globofo villoso. Plum. spec. 6. ic. 138. f. 1. Barr. obs. praef. 1. titul. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 460.*

*Rundblättrige Passionsblume. W.*

*Habitat in America australiori. †*

Folia *subtus inter nervos longitudinali ordine punctata*. Petioli *eglandulosi*.

Fructus *globosus villosus*. W.

\*23. PASSIFLORA *orbiculata*.

P. foliis *subrotundis brevissime obtuse trilobis punctatis glabris*, petiolis *eglandulosis subcirrhosis*, flore *apetalo*, corona *cylindracea truncata*. W.

P. foliis *orbiculato-subtrilobis tubo conico stipitem laxo vaginante*. *Cavan. diff. 10. p. 456. t. 286.\**

Kreisförmige Passionsblume. W.

*Habitat in insula St. Dominica.* †

*Cirrhi rarissimi folio multo breviores*. Petioli *semel torti cirrhi ad inslar*. Flos *ut in P. Murucuja sed apetalus*. W.

24. PASSIFLORA *punctata*.

P. foliis *subrotundis subcordatis obtusis obsolete trilobis glabris punctatis*, petiolis *eglandulosis*, petalis *calyce duplo brevioribus*. W.

P. foliis *subtrilobis oblongis subtus punctatis: intermedio minore*. *Amoen. acad. 1. p. 224. f. 12.\* Fabric. helmst. 349. Cavan. diff. 6. p. 446. t. 269.\**

P. foliis *bilobis obtusis*, nectario *multifido*. *Roy. lugdb. 260.*

*Granadilla folio tricuspidi obtuso et oculato*. *Fsuill. peruv.*

*1. p. 718. t. 11. Hort. angl. 25.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 461.*

Punctirte Passionsblume. W.

*Habitat in Peru.* †

Flos *albidus*. Petala *calyce breviora*. Nectarii *ambitus exterior radiis 30 luteis*, longitudine *fere petalorum*, *clavatis*; *Intermedius ordo capillaris brevior*; *Intimus plicatus, truncatus etiam viridis*. Receptaculum *tectum operculo concavo striato albido*. Folia *fere biloba sunt*. Petioli *eglandulosi*.

25. PASSIFLORA *lutea*.

P. foliis *cordatis trilobis obtusis glabris*, petiolis *eglandulosis*, pedunculis *axillaribus geminis*, petalis *calyce duplo angustioribus*. W.

P. foliis *trilobis cordatis aequalibus obtusis glabris integerrimis*. *Amoen. acad. 1. p. 224. f. 13.\* Gron. virg. 140. Mill. dict. n. 3. Cavan. diff. 10. p. 444. t. 267. Jacq. ic. 3. t. 607. Collect. 2. p. 282.\**

P. foliis cordatis trilobis integerrimis glabris: lateribus angulatis. *Hort. cliff.* 431. *Roy. lugdb.* 261.

P. foliis trilobis integerrimis: laciniis semiovatis acutis integerrimis glabris. *Gron. virg.* 1. p. 112.

Clematis passionalis triphyllus, flore luteo. *Morif. hist.* 1. p. 7. f. 1. t. 2. f.

Flos passionis minor; folio in tres lacinias non serratas minus profundas diviso. *Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. p. 231.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 461.

Gelbe Passionsblume. W.

*Habitat in Virginiae, Jamaicae glareosis, saxosis.* † (v. v.)

*Caulis annuus. Folia eglandulosa.*

\*26. PASSIFLORA *angustifolia*.

P. foliis inferioribus trilobis acuminatis, superioribus indivisis lanceolatis, petiolis biglandulosis, floribus apetalis. W.

P. (*angustifolia*) foliis inferioribus trilobis, superioribus indivisis subcordatis lanceolatis, petiolis biglandulosis, floribus solitariis. *Swartz prod.* 97. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1133.\*

P. (*heterophylla*) foliis indivisis lineari-oblongis trilobisque glabris integerrimis, petiolis biglandulosis. *Ait. Kew.* 3. p. 309.

P. (*heterophylla*) foliis peltatis indivisis lobatisque, petiolis biglandulosis. *Jacq. hort. Schönb.* 2. p. 28. t. 181.\*

P. (*longifolia*) foliis inferioribus semitrifidis acutis, superioribus integris lanceolatis longissimis, petiolis biglandulosis. *Lamarck encycl.* 3. p. 39.\* *Cavan. diff.* 10. p. 446. t. 270.\*

Schmalblättrige Passionsblume. W.

*Habitat in fruticetis Jamaicae.* † (v. v.)

27. PASSIFLORA *minima*.

P. foliis trilobis glabris, lobis lanceolatis intermedio longiore, petiolis biglandulosis, pedunculis geminis longitudine petioli, floribus apetalis, caule basi suberoso. W.

P. foliis trifidis integerrimis: lobis sublanceolatis, intermedio longiore. *Jacq. hort. t.* 20. *Amoen. acad.* 1. p. 229. f. 28. *Swartz obs.* 338.\* *Cavan. diff.* 10. p. 444. t. 266.\*



P. foliis nitidis trilobis medio angusto longiori, lateralibus quandoque auritis, fructu minore baccato nitido.  
*Brown. jam. 328.*

P. l. Flos passionis curassavicus, folio glabro trilobato et angusto, flore flavescente omnium minimo. *Pluk. alm. 282. t. 210. f. 3.*

Granadilla folio glabro et angusto, flore virescente minimo. *Tournef. inst. 240. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 462.*

Kleinste Passionsblume. W.

*Habitat in Curassao. ʒ (v. v.)*

Folia subpubescentia, ultra medium trifida. Petioli biglandulosi. Flores minuti. Caulis senior suberosus evadit.

## 28. PASSIFLORA *suberosa.*

P. foliis trilobis glabris, lobis oblongis, lateralibus brevissimis, petiolis biglandulosis, pedunculis subgeminis petiolo longioribus, floribus apetalis, caule basi suberoso. W.

P. foliis trilobis subpeltatis, cortice suberoso. *Amoen. acad. 1. p. 226. f. 14. Mill. dict. n. 5. Jacq. hort. t. 163. Swartz obs. 340. Cavan. diff. 10. p. 444. t. 265.\**

P. foliis trilobis peltatis integris: glandulis duabus sub dorso basi convexis. *Roy. lugdb. 261.*

Clematis indica flore minimo pallido. *Plum. amer. 73. t. 88.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 463.*

Korkstielige Passionsblume. W.

*Habitat in Dominica, Antillis. ʒ (v. v.)*

Caulis perennis: Cortice suberoso, fisso, albo. Flores axillares, gemini, albi, apetalis. Bacca violacea.

## \* 29. PASSIFLORA *peltata.*

P. foliis peltatis profunde trilobis glabris, lobis lineari-lanceolatis divaricatis, petiolis biglandulosis, pedunculis solitariis axillaribus, floribus apetalis. W.

P. foliis peltatis profunde trilobis, lobis divaricatis, petiolis biglandulosis. *Cavan. diff. 10. p. 447. t. 274.\**

Granadilla folio angusto tricuspidi, fructu olivaeformi. *Tournef. inst. 240.*

Clematis indica, folio angusto trifido, fructu olivaeformi. *Plum. 70. t. 85.*

Passiflorae affinis hederae folio americana. *Plum. alm.*  
 202. t. 210. f. 4.  
 Schildblättrige Passionsblume. W.  
*Habitat in Antillis. †*

\*30. PASSIFLORA *hederacea.*

P. foliis peltatis semitribobis glabris, lobis ovatis obtusis, petiolis biglandulosis, pedunculis solitariis axillaribus, floribus apetalis. W.  
 P. foliis peltatis basi orbiculatis supra trilobis crassis coriaceis. *Cavan. diff. 10. p. 448.*  
 Granadilla folio amplo tricuspidi, fructu olivaeformi. *Tournef. inst. 240.*  
 Clematis indica, folio hederaceo major, fructu olivaeformi. *Plum. amer. 70. t. 84. Raj. suppl. 339.*  
 Epheuartige Passionsblume. W.  
*Habitat in Antillis ad sepes. †*

\*31. PASSIFLORA *glauca.*

P. foliis peltatis cordatis trilobis, lobis aequalibus oblongis obtusis, petiolis subquadriglandulosis, petalis calycis longitudine. W.  
 P. foliis cordatis glabris, lobis ovatis aequalibus petiolis glandulosis, stipulis semiovatis. *Ait. Kew. 3. p. 308.*  
 P. (*stipulata*) foliis trilobis integerrimis, petiolis glandulosis, stipulis latis oblongis inferne productis acutis. *Aubl. guj. 2. p. 830. t. 325.*  
 Graugrüne Passionsblume. W.  
*Habitat in Cajenna. † (v. v. l. fl.)*  
*Tota planta laevissima: Folia subtus glauca impunctata. Petioli infra medium glandulis 2 vel 4 instructi. Stipulae acutae integerrimae, semiuncia longiores. Calycis foliola lanceolata subtus viridia supra albida, uncia paullo longiora. Petala lanceolata obtusa alba longitudine calycis. Nectarium petalis dimidio brevius, radii violacei apice albi. Flores suaveolentes. Ait l. c.*

32. PASSIFLORA *holosericea.*

P. foliis trilobis tomentosis: basi utrinque denticulo reflexo. *Amoen. acad. 1. p. 226. f. 15. \* Mill. dict. n. 9. Cavan. diff. 10. p. 459. t. 291. \**  
 P. foliis cordato-trilobis integerrimis, basi utrinque denticulo reflexo. *Hort. cliff. 432. Roy. lugdb. 261.*

Granadilla folio hastato holosericeo: petalis candicantibus: fimbriis ex purpureo et luteo variis. *Mart. cent. 51. t. 51.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 464.*

Sammetartige Passionsblume. W.

*Habitat in Vera Cruce. ʒ (v, v.)*

Petioli glandulis 2 oppositis. Foliorum lobi laterales breves: subtus pone sinum lobi glandula obsoleta. Folia ovata, utrinque tomentosa.

### 33. PASSIFLORA hirsuta.

P. foliis trilobis villosis, inferioribus supra glabris, lobis oblongis integerrimis, intermedio productiore, petiolis biglandulosis. *Ait. Kew. 3. p. 309. Swartz obs. 340.*

P. foliis trilobis villosis, floribus oppositis. *Amoen. acad. 1. p. 227. f. 16.\**

P. non crenata americana triphylla, *Pluk. alm. 282. t. 212. f. 1?*

Clematis indica, flore minore pallido, foliis hirsutis. *Plum. amer. 74. t. 88. f. A.*

Flos passionis albus, folio ibisci sericeo trilobato. *Herm. par. 176. t. 176.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 464.*

Rauhe Passionsblume. W.

*Habitat in Dominica, Curassao. ʒ*

### 34. PASSIFLORA foetida.

P. foliis trilobis cordatis pilosis, involucris multifido-capillaribus. *Amoen. acad. 1. p. 228. f. 17.\* Phil. bot. 260.\* Mill. dict. n. 7. Giseck. ic. fasc. 1. t. 20. Cavan. diff. 10. p. 458. t. 289.\**

P. florum involucris triphyllis multifido-capillaribus. *Hort. cliff. 431. Roy. lugdb. 261.*

P. vesicaria, florum involucris triphyllis multifido-capillaribus. *Brown. jam. 327.*

Flos passionis albus reticulatus. *Herm. par. 173. t. 173.*

Clematis indica hirsuta foetida. *Plum. amer. 71. t. 86.*

β. Passiflora vesicaria hederacea, foliis lanuginosis, odore tetro, filamentis florum ex albo et purpureo variegatis. *Pluk. alm. 382. t. 104. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 465.*

Stinkende Passionsblume. W.

*Habitat in Dominica, Martinica, Curassao. ☉ (v, v.)*

Foliorum lobus medius multoties lateralibus major.

Stipulae ciliares. Petioli eglandulosi pilis viscidis. Involucrum *Nigellae damascenae* simile.

\* 35. PASSIFLORA *ciliata*.

P. foliis trilobis cordatis glabris ciliato-ferratis, involucri multifido-capillaribus. W.

P. foliis trilobis glabris ciliato-ferratis, intermedio longissimo, petiolis eglandulosis. *Ait. Kew. 3. p. 310. Curt. mag. 288.*

Gefranzte Passionsblume. W.

*Habitat in Jamaica* †

Folia cordata triloba, lobis oblongis acuminatis intermedio longiore, margine ciliato-ferrata. Petioli eglandulosi. Stipulae pinnatifidae angustae. Flos magnitudine *P. incarnatae*. Involucrum ut in praecedente e foliolis tribus bipinnatis subulatis compositum. Calyx et corolla incarnata. Fila coronae alba basi apiceque saturate violacea. W.

\* 36. PASSIFLORA *ferrulata*.

P. foliis trilobis tenuissime ferrulatis, lobis oblongis intermedio longiore, petiolis biglandulosis. W.

P. foliis trilobis ferrulatis, petiolis in medio biglandulosis. *Jacq. obs. 2. p. 26. t. 46. f. 2.*

Feingefägte Passionsblume. W.

*Habitat in sylvis Carthagenae.* †

*A P. incarnata est haec distinctissima. Folia enim sunt dense ferrulata, nec laxius ferrata, minora obtusiora, paginis lateralibus ad petiolum usque productis, nec ut in P. incarnata, basi ad nervos laterales usque deficientibus. Glandulae duae concavae alternatim medietatem petioli occupant, nec sicut in illa, in suprema petioli parte nervos laterales suffulciunt. Tota planta glabra est et cirrhis axillaribus scandit arbores. Florum calyx et corolla ex purpureo albescunt; involucrum triphyllum integrumque viret; nectaria alba sunt purpurea et atropurpurea. Floris diameter duorum cum dimidio pollicum est; odor autem suaveolens et gratissimus. Jacq. 1. c.*

\* 37. PASSIFLORA *aurantia*.

P. foliis trilobis, lobis oblongis obtusis medio longiore, petiolis biglandulosis, corona cylindracea denticulata. W.

*P.* foliis trilobis, lobis parabolicis distantibus, medio productiore. *Forst. prod. n.* 326.

*P.* foliis trilobis obtusis, lobo medio longiore, petiolis biglandulosis, tubo vaginante dentato. *Cavan. diff. 10. p.* 457.

Pomeranzenartige Passionsblume, W.

*Habitat in Nova Caledonia, †*

*Caulis sulcatus glaber. Folia lata triloba, lobis obtusis, medio longiore, prope laterales externe lobuli utrinque solitarii. Petiolus folio brevior pollicaris et prope folium biglandulosus. Cirrhi rubentes. Involucrum ex tribus setulis brevibus coloratis. Flos in sicco rubescens, laciniis oblongis. Coronae nullae in quarum loco membranula tubulosa ut in P. Murucuja et orbiculata at apice dentata. Cavan. l. c.*

\*38. *PASSIFLORA cuneifolia.*

*P.* foliis trilobis ferratis, lobis ovatis acuminatis, petiolis biglandulosis, involucri triphylo, foliolis ellipticis integerrimis obtusis, filis coronae corolla quadruplo brevioribus. W.

*P.* foliis trilobis ferratis basi cuneatis biglandulosis, calycis foliolis ovatis, corona brevi. *Cavan. diff. 10. p.* 460. *t.* 292.\*

Keilblättrige Passionsblume. W.

*Habitat in America. †*

*Admodum affinis sequenti. W.*

\*39. *PASSIFLORA incarnata.*

*P.* foliis trilobis ferratis, lobis oblongis acutis, petiolis biglandulosis, involucri triphylo, foliolis lanceolatis glanduloso-dentatis, filis coronae corolla longioribus. W.

*P.* foliis trilobis ferratis. *Amoen. acad. 1. p.* 230. *fig. 19. a b c d e* \* *Hort. upf.* 278. *Gron. virg.* 140. *Mill. dict. n. 1. Jacq. ic. rar. 1. t.* 187. *Collect. 1. p.* 107.\*

*P.* foliis trilobis ferratis basi biglandulosis, foliolis calycinis acutis crenulatis glandulosis. *Cavan. diff. 10. p.* 460. *t.* 293.\*

*P.* foliis semitrifidis ferratis: basi duabus glandulis convexis: lobis ovatis. *Hort. cliff.* 432. *Roy. lugdb.* 260.

Granadilla hispanis, Flos passionis italicis. *Hern. mex.* 888. *t.* 888. *Raj. hist.* 649.

Clematis tritolia, flore roseo clavato. *Bauh. pin.* 301.

Clematis trifolia, f. Flos Passionalis, flore viridi. *Morif. hist. 2. p.* 6. *f. 1. t. 1, f.* 9.

*Balsamina indica repens triphylla*, f. folio hastato. *Ambr. phyt.* 89. t. 90.

*Murucuja maliformis* alia. *Marcgr. bras.* 71.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 466.

Fleischfarbene Passionsblume. W.

*Habitat in Virginia, Brasilia, Peru.* † (v. v.)

*Petiolis glandulis 2 ad basin folii.*

\*40. *PASSIFLORA tomentosa.*

P. foliis trilobis serratis tomentosis, petiolis glandulosis, involucreo tubuloso trifido, calyce longissimo tubuloso. W.

P. foliis trilobis serratis tomentosis, petiolis glandulosis, corollae tubo longissimo. *Cavan. diff.* 10. p. 450. t. 275. 276.\*

P. foliis trilobis serratis tomentosis, petiolis glandulosis, calyce tubuloso. *Lamarck encycl.* 3. p. 36.\*

Filzige Passionsblume. W.

*Habitat in Peru.* †

*Tota planta tomentosa. Petiolis sexglandulosis, glandulis pedicellatis. Stipulae semicordatae acuminatae denticulatae. Involucrum monophyllum trifidum laciniis oblongis acuminatis, refert calycem. Calycis tubus longissimis quadri vel quinquepollicaris. Nectarium e simplici serie filorum brevissimorum clavatorum compositum. W.*

\*41. *PASSIFLORA mixta.*

P. foliis trilobis serratis glabris, petiolis glandulosis, involucreo tubuloso trifido, calyce longissimo tubuloso. W.

P. foliis trifidis serratis, floribus tubulosis. *Lin. suppl.* 408. *Smith ined.* 1. p. 25. t. 25.\*

β. P. (*Tacso*) foliis quinquelobis serratis glabris, inferne reticulatis, corollae tubo longissimo. *Cavan. diff.* 10. p. 451. t. 277.\*

P. (*longiflora*) foliis trilobis serratis subtus venoso-reticulatis, tubo calyce longissimo. *Lamarck encycl.* 3. p. 38.\*

Gemischte Passionsblume. W.

*Habitat in Nova Granada β vero in Peru.* †

*Simillima praecedenti, differt vero: glabritie caulis foliorum et stipularum, caule sulcato, stipulis profunde dentatis magis lanceolatis, foliis subtus reticulatis, involucri laciniis non acuminatis, calyce brevioris tubo*

*tantum tripollicari. Varietas β differt: lobis foliorum lateralibus bifidis. W.*

\* \* \* \* Foliis multifidis.

#### 42. PASSIFLORA *coerulea.*

P. foliis palmatis quinquepartitis integerrimis, petioli glandulosis, involucre triphylo integerrimo, filis coronae corolla brevioribus. W.

P. foliis palmatis integerrimis. *Amoen. acad. 1. p. 231. f. 20. Hort. upf. 278. Gouan. monsp. 476. Mill. dict. n. 2 et illustr. Fabr. helust. 350. Knorr. del. 1. t. P. Kuiph. cent. 2. n. 50.*

P. foliis palmatis integerrimis, stipulis lunaribus integris aristatis. *Lamarck encycl. 3. p. 39. Cavan. diff. 10. p. 461. t. 295.\**

P. foliis palmatis quinquepartitis integerrimis, involucre cordatis triphyllis. *Hort. cliff. 432. Roy. lugdb. 260.*

Granadilla polyphyllis, fructu ovato. *Tournef. inst. 241.*

Granadilla pentaphyllos, flore coeruleo magno. *Boerh. lugdb. 1. p. 81. Duham. arb. 1. p. 272. t. 107.*

Granadilla indica scandens et sempervirens, radice repente, foliis palmatis etc. *Mich. flor. 46.\**

Clematis quinquefolia americana l. Flos passionis. *Rob. ic.*

Flos passionis major pentaphyllos. *Sloan. jam. 104. hist.*

*1. p. 229. Raj. suppl. 339.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 467.*

Gemeine Passionsblume. W.

*Habitat in Brasilia. h̄ (v. v.)*

#### \*43. PASSIFLORA *filamentosa.*

P. foliis palmatis quinquepartitis serratis, petioli glandulosis, involucre triphylo serrato, filis coronae corolla longioribus. W.

P. foliis quinquelobis serratis, lobis inferioribus brevioribus, coronis quinque. *Cavan. diff. 10. p. 461. t. 294.\**

Vielsädige Passionsblume. W.

*Habitat in America. h̄*

*Similis praecedenti sed differt: foliis serratis acuminatis, stipulis lanceolatis dentatis, involucre serrato, et filiis coronae corolla longioribus. W.*

#### 44. PASSIFLORA *serrata.*

P. foliis palmatis septempartitis serratis, petioli glandulosis, involucre trifido integerrimo. W.

- P. foliis palmatis ferratis. *Amoen. acad.* I. p. 231. f. 21.  
*Cavan. diff.* 10. p. 449. t. 296.\*  
 Clematis indica polyphylla major, flore clavato, fructu  
 colocynthidis. *Plum. amer.* 62. t. 79. *Raj. suppl.* 340.  
 Granadilla polyphyllus fructu colocynthidis. *Tournef.*  
*inst.* 241.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 468.  
 Gefägte Passionsblume. W.  
*Habitat in* Martinica. ‡  
 Calycis tubus clavatus. W.

#### 45. PASSIFLORA pedata.

- P. foliis septenis pedatis ferratis, petiolis glandulosis, involucro triphylo ferrato. W.  
 P. foliis pedatis ferratis. *Amoen. acad.* I. p. 233. f. 22.\*  
 Clematis indica polyphylla flore crispato. *Plum. amer.*  
 66. t. 81. *Raj. suppl.* 341. *Petiv. gaz.* t. 114. f. 4.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 469.  
 Siebenblättrige Passionsblume. W.  
*Habitat in* Dominica. ‡

#### \*46. PASSIFLORA heterophylla. †

- P. foliis superioribus quinatis pedatis obovatis subincis-  
 sis, inferioribus ternatis lineari-lanceolatis, vel simplicibus. W.  
 P. (*heterophylla*) foliis inferioribus indivisis lanceolatis  
 subsessilibus, superioribus pedato-laciniatis, cirrho  
 nullo. *Lamarck. encycl.* 3. p. 39.\*  
 Granadilla heterophylla flore albo. *Plum. sp.* 7. ic. 139.  
 f. 1.  
 Granadilla folio vario. *Tournef. inst.* 241.  
 Verschiedenblättrige Passionsblume. W.  
*Habitat in* Domingo. †  
 Radix napiformis divisa. Caulis absque cirrhis. Folia  
 inferiora lineari-lanceolata simplicia integerrima;  
 intermedia ternata, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis;  
 summa quinata pedata, foliolis obovatis integerrimis  
 obtusis interdum levissime trifidis. Petala calyce  
 breviora. W.



## \*1263. E R O D I U M.

*Ait. Kew. 2. p. 414.*

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nect.* Squamulae 5 cum filamentis alternantes et *Glandulae* melliferae basi staminum infidentes. *Arilli* 5 monospermi aristati ad basin receptaculi rostrati; *Aristis* spiralibus introsum barbatis.

\* *Foliis compositis, pinnatis, pinnatifidisque.*

\*1. ERODIUM *crassifolium.* †

*E.* umbellis multifloris, foliis pinnatifido-laciniatis crassis, laciniis linearibus. *Ait. Kew. 2. p. 414.*

*Geranium (crassifolium)* caule procumbente, foliis pinnatis seu bipinnatis, pinnulis remotis linearibus, laciniis distinctis acutis, calycibus mucronatis. *Desf. atl. 2. p. III.\**

Dickblättriger Reiherschnabel. *W.*

*Habitat in insula Cypro et in arenosis Africae borealis prope Casam.* †

*Corolla coerulea.* *Desf. l. c.*

\*2. ERODIUM *Stephanianum.* *W.*

*E.* pedunculis bifloris, foliis bipinnatifidis, laciniis linearibus acuminatis, caule villoso. *W.*

Stephanischer Reiherschnabel. *W.*

*Habitat in Dauria ad fluvium Tschikoi. (v. l.)*

*Caulis villosus pedalis, quandoque bi- immo tripedalis. Rami breves axillares. Folia sesquipollicaria opposita bipinnatifida glabra, laciniis angustis linearibus acuminatis, subtus pilis patentibus sparsis ut petiolus, in quo densiores, obsita. Stipulae lanceolatae acuminatae ad basin bipartitae petiolo breviores. Pedunculi foliorum longitudine biflori pilosi. Calycis foliola elliptica longe mucronata pilosa. Petala vix calyce longiora ita ut arista calycina ut plurimum prominat. Rostrum calyce quadruplo longius. Florum 2 rudimenta frequenter ad pedunculi bifurcaturam observantur.* *W.*

\*3. ERODIUM *tataricum.* *W.*

*E.* caule pedunculis subbifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, laciniis linearibus, petiolo communi nu-

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

*R r*

do pubescente, petalis obovatis calyce duplo longioribus. W.

Tatarischer Reiherschnabel. W.

*Habitat in Tataria et Sibiria ulteriore.* 24 (v. l.)

Radix *crassitie digiti minoris fusca apice a petiolorum stipitibus ut in Athamantha Meo comosa.* Caulis nullus. Folia pollicaria longe petiolata pinnata, pinnis oppositis profunde pinnatifidis, laciniis angustissimis linearibus integerrimis, terminalis tripartita. Utraque superficies non est pilosa, sed pube vix manifesto raro obsita. Petiolus pubescens inter pinnas nudus. Pedunculi bi-f. triflori radicales pubescentes et canescentes. Calycis foliola pubescentia oblonga margine villoso-ciliata breve mucronata. Petala obovata forte coerulea vel violacea duplo calyce longiora. Simillimum *E. supracanum* at differt: radice comosa Mei, laciniis pinnarum longioribus linearibus, petiolo inter pinnas nudo, nec dentibus foliaceis instructo. W.

\*4. **ERODIUM** *supracanum.*

*E. acaule, pedunculis subbifloris, foliis supra canis pinnatis, pinnis pinnatifidis, laciniis lanceolatis, petiolo communi inter pinnas dentato, petalis retusis calyce duplo longioribus.* W.

*Erodium supracanum. l'Herit. geran. t. 2.*

*Geranium (rupestre) radice crassa lignosa, foliis bipinnatis desuper tomento canescentibus inodoris, scapis bitrifloris. Cavan. diff. 4. p. 225. t. 90. f. 4.\**

*Geranium hispanicum magna radice cicutae folio crassiflori. Tournef. inst. 269.*

Grauer Reiherschnabel. W.

*Habitat in Hispania prope Barcinonem in saxosis montis Serrati.* 24 (v. l.)

*Canitie superficiei superioris foliorum distinctum.* W.

\*5. **ERODIUM** *petraeum.*

*E. acaule, pedunculis multifloris, foliis pinnatis glaberrimis, pinnis pinnatifidis, laciniis lanceolato-linearibus, petiolo communi inter pinnas dentato, petalis retusis calyce duplo longioribus.* W.

*Geranium (petraeum) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis bipinnatis, foliolis incis, scapis radicalibus. Gouan. illust. 45. t. 21. f. 1. optima. Ejusd. fl. monsp. 274.\**

*Geranium (petraeum)* subcaule, foliis oppositis numerosis bipinnatis, scapis axillaribus multifloris. *Cavan. diff.* 4. p. 224. t. 96. f. 2. \*

*Geranium petraeum cicutae* folio, radice crassa. *Tournef. inst.* 269. *Magn. monf.* 109.

*Geranium foetidum.* *Park. theatr.* 709. *Lob. illustr.* 134. *Morif. hist.* 2. p. 517. f. 5. t. 16. f. 27.

Felsen Reiherschnabel. W.

*Habitat in Galliae meridionalis rupibus.* 2. (v. f.)

*Differt a sequente: foliis non tenuissima pube tectis, pedunculis et petiolis pilis patentibus obsitis, corollis majoribus et quod acaule sit; ab E. glanduloso distinctum: petalis retusis unicoloribus, nec acutis et binis maculatis; denique ab E. supracano foliis superne non incanis et foliolis lanceolato-linearibus diversum.* W.

\*6. *ERODIUM absinthoides.* W.

*E. pedunculis multifloris, foliis pinnatis canescentibus, pinnis pinnatifidis, laciniis lanceolatis, petiolo communi inter pinnas dentato, petalis emarginatis calyce majoribus, caule simplici adscendente.* W.

*Geranium orientale moschatum absinthii foliis.* *Tournef. cor.* 20.

Wermuthblättriger Reiherschnabel. W.

*Habitat in Armenia.* 2. (v. f.)

*Radix crassitie digiti minoris fusca. Caules digitales vel spithamaei uno vel binis paribus foliorum instructi, adscendentes, tenui adpressa pube tectis. Folia utrinque pilis adpressis sparsis more Artemisiae Absinthii canescentia, pinnata, pinnis pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis integerrimis. inferioribus bi-trifidisve. Petiolus in foliis radicalibus longus, in caulinis brevissimus tenue pilis adpressis pubescens, inter pinnas foliolis sessilibus lanceolatis dentatus. Stipulae membranaceae magnae emarginatae vel indivisae. Peduncali longi axillares ut petioli pube adpressa obsiti, tri-vel quadriflori. Involucrum pedicellorum membranaceum, foliolis oblongis obtusis brevibus. Calyx canescens, foliolis membranaceis cum nervis tribus viridibus. Petala emarginata parum calyce majora. Ab E. supracano diversum: foliolis multo latioribus utrinque canescentibus, pedunculis tri-quadriflorisve, floribus minoribus, et quod caulescens sit.* W.

R v 2

\*7. *ERODIUM glandulosum*.

*E. acule, pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, laciniis lanceolatis, petiolo communi inter pinnas dentato, petalis subaequalibus acutis calyce duplo longioribus. W.*

*Erodium macrademum. l'Herit. geran. t. 1.*

*Geranium (glandulosum) acule foliis tripinnatis longe petiolatis, petalis duobus latioribus maculatis plumosis. Cavan. diff. 5. p. 271. t. 125. f. 2.\**

*Geranium (radicatum) scapis radicalibus umbellatis, floribus pentandris, foliis subdecurrenti-bipinnatis, petalis duobus larvatis, radice crassissima. Lapey. pyren. 1. p. 1. t. 1.\**

Drüfiger Reiherschnabel. W.

*Habitat in Hispania. W.*

*In pedunculis petiolis et foliis pili sunt brevissimi patentes. Corolla pallide violacea, petalis acutis, binis latioribus basi saturate violaceis linea ramosa more Pelargoniorum signatis. Differt a tribus assinibus praecedentibus: petalis acutis et involucris lineari-lanceolatis paucisque aliis notis. W.*

\*8. *ERODIUM bipinnatum*. †

*E. pedunculis bifloris, foliis pinnatis glabris, pinnis pinnatifidis, laciniis lanceolatis subdentatis, aristis glabris, caule glabro decumbente. W.*

*Geranium (bipinnatum) caule decumbente, foliis oppositis inaequalibus bipinnatis, pedunculis bifloris. Cavan. diff. 5. p. 273. t. 126. f. 3.\**

*Geranium (aethiopicum) caule decumbente, foliis oppositis bipinnatis glabrisculis inaequalibus, pedunculis bifloris. Lamarck encycl. 2. p. 655.\**

Zweymalgefiedelter Reiherschnabel. W.

*Habitat in Numidiae arenosis. ☉*

*Simillimum E. cicutario at differt caule glabro, foliis angustissime divisis, laciniis plerumque indivisis, pedunculis bifloris aristis seminum glabris. Clarif. Desfontaines pro varietate E. cicutarii habet. W.*

\*9. *ERODIUM alpinum*.

*E. pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis inciso-dentatis, petiolo communi inter pinnas dentato, petalis ovatis, caule divaricato. W.*

*Erodium alpinum. l'Herit. geran. t. 3.*

*Geranium (alpinum)* pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis, foliolis incisus et crenatis, radice tuberosa. *Burm. geran.* 31.\*

*Geranium (alpinum)* caule herbaceo rubescente, foliis bipinnatis, floribus umbellatis rubescentibus rugosis. *Cavan. diff.* 4. p. 229. t. 96. f. 1.\*

*Geranium alpinum* coriandri folio longius radicatam, flore purpureo majori. *Michel. hort. flor.* 41. n. 24.

Alpen-Reiherfchnabel. W.

*Habitat in alpibus Italiae.* 4

*Simillimum sequenti at radix tuberosa perennis, caulibus glabriusculus, pinnae foliorum breviores et corollae petala omnia ovata obtusifuscula.* W.

## 10. ERODIUM *ciconium*.

*E.* pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis dentatis, petiolo communi inter pinnas dentato, petalis oblongis obtusis binis emarginatis, caule ascendente. W.

*Geranium (ciconium)* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis obtusis. *Sp. pl.* 952. *Amoen. acad.* 4. p. 282.\* *Burm. geran.* 28. *M. l. dict.* n. 19. *Jacq. hort.* 1. p. 7. t. 18. *Kniph. cent.* 11. n. 49.

*Geranium* caule herbaceo reclinato, foliis pinnatis, pinnulis incisus, petalis duobus superioribus latioribus. *Cavan. diff.* 4. p. 228. t. 95. f. 2.\*

*Geranium* petiolis multifloris, foliis pinnatis, pinnis latelcentibus dentatis, alterne maximis. *Hall. helv.* 946.

*Geranium cicutae* folio, acu longissima. *Bauh. pin.* 136. *prod.* 138.

*Geranium apulum* coriandrifolium. *Colum. ecphr.* 1. p. 136. t. 135.

*Geranium chrysanthemum creticum* folio neapolitanum. *Boeckl. mus.* 2. p. 39. t. 83.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 406.

Langfchnabliger Reiherfchnabel. W.

*Habitat* Monspeli, inque Hispania, Italia, Vallesia, ☉  
(v. v.)

## 11. ERODIUM *cicutarium*.

*E.* pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnati-

fidis incis, corollis calyce majoribus, caule hirtoprostrato. W.

E. pedunculis multifloris, foliis pinnatis, foliolis sessilibus pinnatifidis incis. *Smith brit.* 2. p. 727.\*

Geranium pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incis obtusis, caule ramoso. *Hort. cliff.* 314. *Fl. suec.* 579; 625. *Roy. lugdb.* 352. *Dalib. parif.* 208. *Burm. geran.* 33. *Gmel. sib.* 3. p. 275. n. 8. *Scop. carn.* n. 853. *Pollich pal.* n. 646. *Hoffm. germ.* 243.

Geranium (*chaerophyllum*) caule erecto - decumbente, foliis oppositis pinnatis incis pedunculis elongatis multifloris, cotyledonibus trilobis. *Cavan diff.* 4. p. 226. t. 95. f. 1.\* *Roth. germ.* II. 136.

Geranium caule procumbente, petiolis multifloris, foliis duplicato - pinnatis, pinnis acute incis. *Hall. helv.* n. 944.

Geranium cicutae folio minus et lupinum. *Bauh. pin.* 319. *Dill. giff.* p. 48.

Geranium lupinum. *Dod. pempt.* 63.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 401.

Schierlingsblättriger Reiherschnabel. W.

*Habitat in Europae sterilibus cultis.* ☉ (v. v.)

\*12. **ERODIUM** *pimpinellifolium.*

E. pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis ovatis sessilibus incisodentatis, corollis calyce minoribus, aristis glabris, caule decumbente subpiloso. W.

Geranium (*cicutarium*) caule ramoso prostrato, foliis pinnatis, pinnis subovatis. *Cavan. diff.* 4. p. 226. t. 93. f. 1.\* *Roth. germ.* I. 292. II. 135.

Geranium pimpinellae folio. *Dill. gieff.* 69.

Geranium minus, Geranium arvense. *Tabern.* 57.

Pimpinellenblättriger Reiherschnabel. W.

*Habitat in sterilibus Germaniae, Galliae.* ♂

*Simile praecedenti, sed diversum: cotyledonibus cordatis indivisis nec trilobis, pinnis foliorum basi latioribus semper sessilibus, petalis calyce minoribus vel subaequalibus, aristis seminum glabris, nec barbatis.* W.

13. **ERODIUM** *romanum.*

E. acaule, pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis ovatis pinnatifidis, petalis calyce majoribus. W.

E. acaule, scapae radicalibus multifloris, foliis pinnatis,

foliolis pinnatifidis. *Ait. Kew. 2. p. 414. Smith brit. 2. p. 728.*

*Geranium (romanum)* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisif, scapis radicalibus. *Sp. pl. 951. Burm. geran. 30. Mill. dict. n. 41.*

*Geranium acaule*, foliis bipinnatis hirsutis, scapis radicalibus multifloris. *Cavan. diff. 4. p. 225. t. 94. f. 2.\**

*Geranium myrrhinum tenuifolium* amplo flore purpureo. *Barr. rar. 568. t. 1245.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 401.*

Römischer Reiherschnabel. W.

*Habitat Romae in plateis.* ☉ (v. v.)

*Simillimum E. cicutario, sed caules nulli, nullae maculae in basi petalorum.*

#### 14. *ERODIUM moschatum.*

*E. pedunculis multifloris*, foliis pinnatis, pinnis subpetiolatis oblongis inciso-dentatis, petalis calycem aequantibus, caule procumbente. W.

*E. pedunculis multifloris*, foliis pinnatis, foliolis subpetiolatis inaequaliter incisif. *Ait. Kew. 2. p. 414.*

*Geranium (moschatum)* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisif, cotyledonibus pinnatifidis. *Sp. pl. 951. Mat. med. 165. Burm. geran. 29. Mill. dict. n. 17. Pall. itin. 3. p. 588. Jacq. hort. 55. Scop. carn. n. 854. Blackw. t. 150. Hoffm. germ. 243.*

*Geranium procumbens*, foliis pinnatis, pinnulis ovatis incisif, cotyledonibus pinnatifidis, floribus umbellatis. *Cavan. diff. 4. p. 227. t. 94. f. 1.\**

*Geranium petiolis multifloris*, caule diffuso, foliis ovatis pinnatifidis. *Hall. helv. n. 945.*

*Geranium moschatum.* *Riv. pentap. t. 110.*

*Geranium cicutae folio moschatum.* *Bauh. pin. 319.*

*Myrrhina Plinii*, rostrum ciconiae, seu acus moschata officinarum et pastoris. *Lob. ic. 658.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 403.*

Bisamduftender Reiherschnabel. W.

*Habitat in pascuis montosis Carnioliae, Helvetiae, Angliae, Sibiriae, Barbariae, Cap. b. spei, Brasiliae et Peru.* ☉ (v. v.)

#### \* 15. *ERODIUM praecox.*

*E. acaule*, pedunculis bifloris, foliis pinnatis: pinnis ob-

longis obtusis inaequaliter dentatis, petalis calyce duplo majoribus. W.

Geranium (*praecox*) acaule foliis pinnatis, scapis bilobis. *Cavan. diff. 5. p. 272. t. 126. f. 2.\**

Früher Reiherschnabel. W.

*Habitat in Hispania inter Aranjuez et lacum Antigola. ☉*

*Affine E. pimpinellifolio sed acaule et pilis albis undique tectum, foliolis obtusioribus minus profunde dentatis oblongis, pedunculis bifloris, denique corolla multo majore. W.*

\* 16. **ERODIUM pulverulentum.**

E. pedunculis multifloris, foliis pinnatifidis canescentibus, laciniis inciso-dentatis, caule procumbente. W.

Geranium (*pulverulentum*) caulibus reclinato-erectis, foliis oppositis pinnatifidis, laciniis incisis, pedunculis elongatis umbelliferis. *Cavan. diff. 5. p. 272. t. 125. f. 1.\* Desf. atl. 2. p. 121.\**

Bestaubter Reiherschnabel. W.

*Habitat in monticulis arenosis Hispaniae inter Aranjuez et lacum Antigola, inque Africa boreali. 4 (v. l.)*

*Convenit quoad floris formam et magnitudinem cum E. cicutario, quoad colorem hujus cum quinque praecedentibus speciebus; differt vero foliis incanis pubescentibus quasi pulvere conspersis, pinnatifidis. W.*

\* 17. **ERODIUM hirtum.**

E. pedunculis multifloris, foliis subbipinnatifidis hirtis, caule ramoso diffuso. W.

Geranium (*hirtum*) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis subbipinnatifidis, caule ramoso. *Vahl symb. 1. p. 49.*

Geranium (*hirtum*) pedunculis multifloris, calyce pentaphyllo, floribus pentandris, foliis petiolatis triangularibus bipinnatifidis hirsutis. *Forsk. deser. 123.*

Rauher Reiherschnabel. W.

*Habitat in Aegypto. 4*

*Radix lignosa perennis. Caules annui sesqui spithamei articulati, ad genicula gibbi, dichotomi erecto-diffusi villosi. Folia ad genicula opposita, inferiora majora villosa, petiolo tripollicari villosa, supra unisulcata. Lamina sesquipollicaris cordato-triangularis pinnatifida, laciniis lanceolatis acutis. Stipulae utrinque solitariae membranaceae lanceolatae rufescentes,*



*connatae in vaginam circa caulem una cum basi petiolorum. Pedunculi umbellae simplices terminales saepe quinqueflori, involucris membranaceis albidis ovatis. Flores violaceo-rubri. Pedicelli floriferi erecti, fructiferi ad unum latus dependentes. Fructus erectus rubens vix villosus bipollicaris. Forsk. l. c.*

*Folia Pelargonii carnosifhirta uti caulis, laciniis acutiusculis. Flores plerumque quinque. Involucra scariosa ovata. Calyx striatus villosus, foliolis mucronatis. Petala basi nigricantia. Vahl l. c.*

\*18. **ERODIUM laciniatum.**

*E. pedunculis multifloris, foliis bipinnatifidis glabris, stipulis involucrisque scariosis, caule prostrato. W.*

*Geranium (laciniatum) caule herbaceo, foliis oppositis profundissime trifidis, laciniis pinnatis linearibus, pedunculis elongatis umbelliferis, acu longissima. Cav. diff. 4. p. 228. t. 113. f. 3.\**

*Geranium (laciniatum) caule prostrato, foliis radicalibus cordatis sublobatis, caulinis bipinnatis, foliolis linearibus acutis inaequalibus, pedunculis folio longioribus. Desf. atl. 2. p. 110.\**

*Geranium creticum humifusum, foliis subrotundis laciniatis acu longissima. Tournef. cor. 19.*

*Schlitzblättriger Reiherschnabel. W.*

*Habitat in arenosis maritimis Cretae et Africae borealis prope Carthaginem. (v. l.)*

*Folia pinnatifida, laciniis binis oppositis inferioribus pinnatifidis superioribus indivisis, interdum vero omnes lacinae sunt iterum pinnatifidae. Stipulae magnae obtusae membranaceae scariosae. Involucra obtusa magna membranaceo-scariosa. Petala coerulea parum calyce majora. Rostrum biunciale subulatum. W.*

*\*\* Foliis ternatis et tripartitis.*

19. **ERODIUM gruinum.**

*E. pedunculis submultifloris, foliis ternatis acuminatis inciso-dentatis, intermedio pinnatifido petiolato, caule hispido. W.*

*E. pedunculis submultifloris, foliis ternatis crenato-dentatis, extimo pinnatifide dentato. Ait. Kew. 2. p. 415.*

*Geranium (gruinum) pedunculis submultifloris, floribus pentandris, foliis ternatis lobatis. Sp. pl. 952. Burm.*

*geran.* 32. *Mill. dict. n.* 18. *Willich. obs.* 61. *Kniph. cent.* 7. n. 26.

*Geranium caule crasso herbaceo erecto piloso, foliis radicalibus cordatis ovatis indivisis, caulinis oppositis subternatis, medio longissimo, floribus pentandris saepissime binis. Cavan. diff. 4. p. 217. t. 88. f. 2.\**

*Geranium pedunculis multifloris pentandris. Hort. cliff. 498. Hort. ups. 198. γ.*

*Geranium pedunculis bifloris pentandris, radice annua. Vir. cliff. 66. Roy. lugdb. 352.*

*Geranium latifolium acu longissima. Bauh. pin. 319.*

*Geranium speciosum annuum longissimis rostris creticum. Bauh. hist. 3. p. 479.*

*Geranium creticum annuum haematodes. Lob. icon. 662. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 406.*

β. *E. pedunculis bifloris, foliis pinnatifidis obtusis dentatis. W.*

*Geranium (Botrys) caule supino, foliis cordatis oblongis sinuato-pinnatifidis hirsutis, fructibus longis erectis. Cavan. diff. 4. p. 218. t. 90. f. 2.\**

*Geranium lupinum botrys folio acu sursum spectante. Bocc. mus. 2. p. 145. t. 109.*

*Candischer Reiherschnabel. W.*

*Habitat in Creta, Africa boreali, Italia, Hispania. ☉*

(v. v.)

*Geranium Botrys ab hac planta nullo modo est diversum, licet foliorum forma valde sit diversa, possideo enim specimina intermedia quae transitum demonstrant. W.*

## 20. ERODIUM *chium*.

*E. pedunculis multifloris, foliis cordatis incis, summis tripartitis, laciniis tripartito-incis. Willd. phytog. p. 10. n. 33.*

*Geranium (chium) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis incis, superioribus lyrato-pinnatifidis. Sp. pl. 951. Burm. geran. 35. Mill. dict. n. 44.*

*Geranium caule herbaceo erecto, foliis oppositis cordatis incis, superioribus trilobatis, lobis pinnatifidis. Cavan. diff. 4. p. 221. t. 92. f. 1.\**

*Geranium chium venum caryophyllatae folio. Tournef. cor. 20. Mart. cent. 4. t. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 403.*

*Griechischer Reiherschnabel. W.*

*Habitat in Chio.* ☉ (v. v.)

Cotyledones cordati integri retusi regulares nec oblique cordati ut *E. gruino* et *ciconio*. Caules *E. cicuta* majores. Macula nulla ad basin petalorum superiorum.

Folia inferiora trilobata inciso-dentata, superiora tripartita, laciniis pinnatifidis inciso-dentatis. Calycis foliola lanceolata acuminata cuspidata pilosa, pilis simplicibus. Non est varietas *E. malacoidis* ut perhibent *l'Heritier* et *Aiton*, sed species constans. Differt praeter formam foliorum diversam et calyce pilis simplicibus nec glanduliferis. W.

\*21. **ERODIUM** *asplenioides*.

*E. acaule*, pedunculis multifloris, foliis ternatis obtusis dentatis pubescentibus intermedio laciniato sessili. W. *Geranium (asplenioides)* acaule, foliis pubescentibus subtus nervosis obtusis subtrilobis, pedunculis multifloris, calycibus muticis. *Desf. atl. 2. p. 109. t. 168.\**

Streifenfarrenblättriger Reiherfchnabel. W.

*Habitat in Africae borealis montibus Sibiae.* 24

Radix *crassitie digiti*. Folia pubescentia longe petiolata ternata, foliolis sessilibus; lateralibus oblongis obtusis dentatis: intermedio trifido vel pinnatifido dentato obtuso, basi cuneiformi. Flores purpureo-vioacei, petalis calyce non mucronato duplo longioribus obtusis. W.

\*22. **ERODIUM** *hymenodes*.

*E. pedunculis multifloris*, foliis obtusis inciso-dentatis, inferioribus ternatis, superioribus trilobis, caule erecto. W.

*Erodium hymenodes.* *l'Herit. geran. t. 4.*

*E. (trilobatum)* pedunculis multifloris, foliis cordatis subrotundis tripartitis hirsutis serratis. *Jacq. ic. rar. 3. t. 508. Collect 4. p. 200.\**

*Geranium (trifolium)* caule herbaceo crasso ramoso, foliis radicalibus ternatis lobatis, caulinis oppositis simplicibus lobatis, petalis venosis, superioribus maculatis. *Cavan. diff. 4. p. 223. t. 97. f. 3.\**

*Geranium (geifolium)* caule herbaceo, foliis cordatis trilobis hirsutis, lobis sursum latioribus rotundatis, pedunculis multifloris, petalis inaequalibus venoso-reticulatis. *Desf. atl. 2. p. 108.\**

Dreytheiliger Reiherfchnabel. W.

*Habitat in Atlantis rupium fissuris.* 24 (v. v.)

\* 23. *ERODIUM murcicum.*

E. pedunculis submultifloris, foliis tripartitis dentatis, lobo intermedio elongato. W.

Geranium (*murcicum*) caulibus gracilibus herbaceis ramosis, foliis oppositis trilobis, lobo medio longiore obtuso crenato. *Cavan. diff.* 5. p. 272. t. 126. f. 1.\*

Murcischer Reiherfchnabel. W.

*Habitat in Murcia.* ☉

Pedunculi *bi-tri-et quadriflori.* Folia *inferiora tripartita, superiora triloba.* W.

\* \* \* *Foliis lobatis et indivisis.*

\* 24. *ERODIUM guttatum.*

E. pedunculis subtrifloris, foliis cordatis oblongis subtrilobis dentatis incanis, caule prostrato. W.

Geranium (*guttatum*) caule prostrato, foliis cordatis sublobatis cinereo argenteis, subtus venoso-reticulatis, pedunculis bi- aut trifloris folio longioribus. *Desf. atl.* 2. p. 113. t. 169.\*

Geranium pusillum argenteum Heliotropii minoris folio. *Shaw. afr. n.* 260. t. 260.

Gefleckter Reiherfchnabel. W.

*Habitat in Africa boreali prope Belide.* 24

Folia *incana parva quadrilineariter longe petiolata, caulina opposita, petiolis alternis brevioribus.* Corolla *magna violacea, petalis obtusis basi maculatis.* W.

25. *ERODIUM glaucophyllum.*

E. pedunculis multifloris, foliis oblongis sublobatis crenatis subcarnosis glabris, aristis apice plumosis. W.

E. pedunculis multifloris, foliis oblongis obsolete crenatis glaucis, rostris plumosis. *Ait. Kew.* 2. p. 416.

Geranium (*glaucophyllum*) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis ovatis serratis incanis lineatis. *Sp. pl.* 952. *Mill. dict.* n. 46.

Geranium pedunculis multifloris, foliis oblongis lineatis crenato-sublobatis crassis, rostris plumosis. *Vahl symb.* 1. p. 49.\*

Geranium caule herbaceo, foliis ovatis serrato-crenatis carnosis, floribus umbellatis, rostris longissimis coma aurea nitentibus. *Cavan. diff.* 4. p. 221. t. 92. f. 2.\*

*Geranium (crassifolium)* foliis glabris crassiusculis, inferioribus cordatis, superioribus oblongis omnibus crenato-lobatis. *Forfk. descr.* 123.

*Geranium aegypticum glaucophyllum*, rostris longissimis plumosis. *Dill. elth.* 150. t. 124. f. 150.

*Houtt. yn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 405.

Bärtiger Reiherschnabel. W.

*Habitat in Aegypto prope Memphim.* ☉ (v. v.)

Caulis teres subramosus adscendens. Folia glabra crassa glauca obsolete lobata, crenis rarioribus, inferiora cordata, superiora oblonga. Pedunculi tri-vel quadriflori. Corolla calyce major violacea, petalis basi saturatioribus. Aristae basi tortae pilosae apice vero eleganter plumosae. W.

## 26. ERODIUM *incarnatum*.

E. pedunculis submultifloris, foliis scabris cordatis trilobis tripartitisve dentatis, caule fruticuloso. W.

E. pedunculis paucifloris, foliis tripartitis ternatisve trifidis scabris, caule fruticuloso. *Ait. Kew.* 2. p. 415. *Herit. geran.* t. 5. *Curt. mag.* 261.

*Geranium (incarnatum)* pedunculis bifloris, foliis tripartitis trifidis glabris, petalis integris, arillis glabris. *Lin. suppl.* 306.

*Geranium* foliis incisissimis subquinelobis punctatis parvis, petiolis longissimis, pedunculis trifloris. *Cavan. diff.* 4. p. 223. t. 91. f. 2.\*

Fleischfarbener Reiherschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei in Hottentos Hollands Klof.* † (v. l.)

Caulis digitalis lignosus ramos herbaceos digitales et longiores exserens. Folia scabra tripartita, triloba, vel leviter quineloba vel etiam indivisa grosse dentata, basi subcordata. Pedunculi bi-quinqueflori longi. Corolla magna pulcherrima hujus generis, petalis oblongis obtusis incarnatis basi flavescens et circulo sanguineo pictis. W.

## 27. ERODIUM *arduinum*.

E. acaule, pedunculis multifloris, foliis cordatis quinelobis. W.

*Geranium (arduinum)* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis quinelobis, scapis radicalibus. *Sp. pl.* 952.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 405.*

Arduinischer Reiherfchnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 2.*

*Folia cordata quinqueloba crenata obtusa subtus scabra. Scapi radicales. Caules nulli.*

\*28. **ERODIUM** *ribifolium*.

*E. pedunculis multifloris, foliis cordatis trilobis obtusis dentatis, petalis calycis longitudine. W.*

*E. (ribifolium) pedunculis subquinquefloris, calycibus aristatis, foliis cordatis sublobatis ferratis. Jacq. ic. rar.*

*3. t. 509. Collect. 5. p. 121. \**

Johannisbeerblättriger Reiherfchnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ☉*

*Caules debiles pedales erectiusculi hirti. Folia tri- vel quinquelobis obtusis dentatis. Pedunculi quadri- seu quinqueflori. Corolla purpurea longitudine calycis. Simillimum E. malacoide et differt tantum: foliis hispidis lobatis, corollis purpureis et pedunculis quadri- vel quinquefloris. W.*

\*29. **ERODIUM** *arborescens*. †

*E. pedunculis multifloris, foliis cordatis crenatis sublobatis, caule fruticoso. W.*

*Geranium (arborescens) foliis longe petiolatis cordatis crenatis sublobatis, pedunculis multifloris, calyce pentaphyllo. Desf. atl. 2. p. 110.*

Baumartiger Reiherfchnabel. W.

*Habitat in Africae borealis montibus prope Cassam. ‡*

*Caulis ramosus 3 vel 5-pedalis erectus fruticosus. Folia longe petiolata cordata glabra subacuta unciam vel sesquiuncias lata, vix longiora, crenata sublobata crassiuscula, inferiora alterna, superiora opposita. Stipulae scariosae ovatae pubescentes acutae. Calyx striatus pubescens pentaphyllus. Folia elliptica striata brevissime acuminata. Stamina 5 antherifera. Nec corollam nec fructum vidi. Folia contrita odorem suavissimum spargunt. Species distincta et pulcherrima. Facies Pelargoniorum. Desf. l. c.*

\*30. **ERODIUM** *heliotropioides*. †

*E. pedunculis multifloris, foliis subrotundo-ovatis crenatis villosis, aristis apice plumosis. W.*

*Geranium (heliotropioides) caule fruticoso minimo, foliis oppositis incanis subrotundo-ovatis crenato-den-*

tatis, pedunculis umbelliferis atque aristis longissimis.

*Cavan. diff. 4. p. 220. t. 113. f. 2.\**

Scorpionchwanzblättriger Reiher Schnabel. W.

*Habitat* - - - - -

Caulis vix uncialis. Folia subrotunda crenata longe petiolata dense albo-villosa. Pedunculi quadrislori. Aristae plumosae ut in *E. glaucophyllo*. W.

### 31. ERODIUM *malacoides*.

E. pedunculis multifloris, foliis cordatis sublobatis obtusis dentatis glabris, caule petiolisque hirtis. W.

Geranium (*malacoides*) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. *Sp. pl.* 952. *Hort. cliff.* 344. *Hort. upf.* 198. *Roy. lugdb.* 352. *Sauv. monsp.* 154. *Burm. geran.* 34. *Mill. dict. n.* 45. *Fabric. helmst.* 264. *Kniph. cent.* 11. n. 53. *Willd. phytog. p.* 10. n. 34.\*

Geranium caule herbaceo, foliis oppositis cordatis subovatis lobatis crenatis, floribus umbellatis parvis. *Cav. diff. 4. p. 220. t. 91. f. 1.\**

Geranium folio althaeae. *Bauh. pin.* 318. *Tournef. inst.* 268. *Morif. hist. 2. f. 5. t. 15. f. 7.*

Geranium malacoides. *Lob. ic.* 662.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 404.

Malvenartiger Reiher Schnabel. W.

*Habitat in maritimis Galliae australis, Hispaniae, Italiae, inque Canariis.* ☉ (v. v.)

Petoli oppositi altero brevior.

Pedunculi quinque-sex-vel septemflori. Corolla calycis magnitudine coerulea. W.

### 32. ERODIUM *maritimum*.

E. pedunculis subtrifloris, foliis cordatis incisicrenatis scabris, caulibus depressis. *Smith. brit.* 2. p. 728.\*

Geranium (*maritimum*) pedunculis subtrifloris, floribus pentandris, foliis cordatis incisicrenatis scabris, caulibus depressis. *Sp. pl.* 951. *Neck. gallob. p.* 290. *Cavan. diff. 4. p. 218. t. 88. f. 1.\**

Geranium pedunculis bifloris, foliis ovatis hirsutis crenato-incisicrenatis obtusis, caulibus procumbentibus. *Roy. lugdb.* 451.

Geranium minimum procumbens folio betonicae. *Morif. hist. 2. p. 512. f. 5. t. 35. f. 10.*

Geranium pusillum maritimum althaeae f. betonicae folio. *Pluk. phyt.* 31. f. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 404.*

Meerstrands-Reiherschnabel. W.

*Habitat in Angliae, Gallo-belgiae maritimis. 4 (v. f.)*  
*Pedunculi saepe biflori. Petala integra. Flores saepe*  
*petalis mutilati. Umbella saepe foliosa.*

\*33. *ERODIUM malopoides.*

*E. pedunculis subtrifloris, foliis cordatis subrotundis obtusis crenatis canis. W.*

*Geranium (malopoides) foliis cordatis crenatis cinereis, radicalibus longe petiolatis, scapis folio brevioribus, aristis longis pubescentibus. Desf. atl. 2, p. 112.\**

*Geranium (crassifolium) caule humifuso foliis cordatis subrotundis rugosis crassis, floribus umbellatis parvis. Cavan. diff. 4. p. 219. t. 90. f. 1.*

*Geranium malacoides lupinum, lato rotundo crasso rugoso integro folio, acu brevissima, carinense. Bocc. mus. 2. p. 109. t. 89. Tournef. inst. 268.*

Malopenartiger Reiherschnabel. W.

*Habitat in arenosis Algeriae inque Sicilia circum montosa Carinensia. 4*

*Caules decumbentes filiformes digitales. Folia obtusissima subrotunda cordata et crenata. Pedunculi tri- vel quinquesidi. Flores parvi pallide rosei. W.*

\*34. *ERODIUM Chamaedryoides.*

*E. subacaule, pedunculis unifloris, foliis cordatis obtusis crenatis. Ait. Kew. 2. p. 416. Herit. geran. t. 6.*

*Geranium (Chamaedryoides) acaule, foliis radicalibus parvis orbiculatis cordatis crenato-incisis, scapis unifloris bracteatis. Cavan. diff. 4. p. 197. t. 76. f. 2.\**

*Geranium (parvulum) pedunculis radicalibus nudis unifloris, floribus pentandris. Scop. del. insub. 1. p. 8. t. 3.\**

*Geranium (Reichardi) scapis unifloris, foliis plerisque oblongis trilobis vel quinquelobis inciso-crenatis. Murr. in Comment. goett. 1780. p. 11. t. 3.\* Curt. mag. 18.*

*Geranium minimum chamaedryoides. Tournef. inst. 269.*

*Geranium aestivum minimum lupinum alpinum chamaedryoides, flore albo variegato. Bocc. mus. 160. t. 123.*

Niedriger Reiherschnabel. W.

*Habitat in Minorca et Corsica in monte St. Michaelis.*

*4 (v. v.)*



## HEPTANDRIA.

## \*1264. PELARGONIUM.

*Ait. Kew. 2. p. 417.*

*Cal.* 5-partitus; lacinia suprema desinente in tubulum capillarem nectariferum secus pedunculum decurrentem. *Cor.* 5-petala irregularis. *Filamenta* 10 inaequalia, quorum 3 (raro 5) castrata. *Arilli* 5 monospermi aristati ad basin receptaculi rostrati, aristis spiralibus introrsum barbatis.

\* *Acaulia radice rapacea, umbella composita.*

\*I. PELARGONIUM *longifolium.*

P. acaule umbella composita, foliis lanceolatis integerrimis acutis glabris, senioribus pinnatifidis linearibus, floribus tetrandris, petalis obtulis lanceolatis superioribus obovatis. W.

P. acaule, radice rapacea simplici, foliis lanceolatis acutis glabris, senioribus saepe pinnatis, filamentis novem, quatuor fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 518. Collect. 4. p. 192.\**

Geranium acaule, foliis lanceolatis longissime petiolatis, scapo radicali ramoso, umbellis multifloris. *Cavan. diff. 4. p. 235. t. 102. f. 1.\**

Geranium calycibus monophyllis, foliis simplicibus oblongo-lanceolatis, radice tuberosa. *Burm. geran. 67. tab. 2.\**

Geranium prolificum. *ε Sp. pl. 950.*

Geranium africanum folio integro, radice lignosa tuberosa. *Herm. afr. 12*

Langblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 4*

Folia oblongo-lanceolata acuta integerrima glabra, seniora breviora profunde pinnatifida, laciniis linearibus acutis. Petioli longitudine foliorum basi pilis raris ciliati. Scapus erectus ramis tribus basi involu-cratis, Involucris lineari-lanceolatis trifidisve ciliatis. Umbella multiflora. Involucris oblongis acutis ciliatis. Calycis laciniae ciliatae aristatae patulae. Corolla incarnata, petalis lanceolatis obtusis, binis superioribus obovatis basi saturatoribus. W.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

S s

\*2. PELARGONIUM *longiflorum*.

P. acaule, umbella composita, foliis lanceolatis integerrimis acutis glabris, floribus tetrandris, petalis lineari-lanceolatis. W.

P. (*longiflorum*) acaule radice rapacea simplici, foliis lanceolatis acutis glabriusculis, petalis longissimis, filamentis decem, quatuor fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 521. Collect. 4. p. 194.\**

β. P. (*depressum*) acaule radice rapacea simplici, foliis anguste lanceolatis acutis glabris, umbellis tandem depressis, filamentis novem, quatuor fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 520. Collect. 4. p. 193.\**

Langblütiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 2*

Folia oblongo-lanceolata acuta integerrima glabra. Petioli foliorum longitudine pilis raris basi ciliati. Scapus erectus trifidus basi involucreto, involucreto lineari-lanceolatis ciliatis. Umbella quadristora involucreto lanceolatis cincta. Calycinis laciniis lanceolatis reflexis. Petala longissima lineari-lanceolata albida, bina superiora a basi ad medium usque linea lata atrofusca picta. Varietas β differt tantum umbellis sex-octofloris, pedunculis demum subreflexis, petalis brevioribus, et filamentis novem. W.

\*3. PELARGONIUM *dipetalum*.

P. acaule, umbella simplici, foliis ovatis integerrimis acutis glabris, floribus pentandris dipetalis. W.

Pelargonium dipetalum. *l'Herit. geran. t. 43.*

Urvollkommener Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei? 2*

Folia exacte ovata acuta integerrima. Petioli longitudine foliorum pilis brevibus ciliati. Scapus nudus foliis altior umbella simplici triflora terminatur. Pedunculi deflexi. Corolla dipetala, petalis obovatis retusis. Filamenta 10 quorum quinque antherifera. W.

\*4. PELARGONIUM *oxaloides*.

P. acaule, umbella composita, foliis oblongis sagittatis integerrimis glabris. W.

Geranium calycibus monophyllis, foliis ovato-hastatis carnosissimis, radice rapacea. *Burm. geran. 71. t. 2.\* Cav. diff. 4. p. 237. t. 97. f. 1.*

Geranium prolificum. ζ. *Sp. pl. 950.*

- β. *Geranium floribus parvis rubellis, foliis subrotundis procumbens. Herm. afr. II.*  
 Ampferblättriger Kranichschnabel. W.  
*Habitat ad Cap. b. spei. 2*  
*Ab omnibus foliis sagittatis carnosus distinctum. W.*

\*5. **PELARGONIUM** *Ficaria*. W. †

P. acaule, umbella composita, foliis subrotundis acutis integerrimis pubescentibus. W.

*Geranium Chelidonium. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 398. t. 61. f. 1.*

Löffelkrautblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2*

*Folia exacte Ranunculi Ficariae vel Cochleariae officinalis sed integerrima non angulata. Petala lanceolata obtusa pallide purpurea basi maculis saturatoribus picta. W.*

\*6. **PELARGONIUM** *ciliatum*.

P. acaule, umbella composita, foliis ovatis acutiusculis integerrimis margine ciliatis, floribus pentandris. W.

*Pelargonium ciliatum. l'Herit. geran. t. 7.*

*Geranium (ciliatum) acaule radice tuberosa, foliis ovatis ciliatis integerrimis, scapo radicali umbellifero. Cav. diff. 4. p. 234. t. 118. f. 2. \**

Gefranzter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2*

*Foliis margine ciliatis simplicibus ovatis distinctissimum. Planta Clariff. Cavanilles differre videtur, sed descriptio et icon ad specimen spontaneum sunt factae. W.*

\*7. **PELARGONIUM** *auriculatum*. W.

P. acaule, umbella composita, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis acutis hirsutis margine ciliatis, basi appendiculatis, floribus pentandris. W.

P. (*ciliatum*) acaule radice rapacea subsimplici, foliis lanceolatis utrinque acutis ciliatis subtus glabris, supra pilosis, saepe appendiculatis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar 3. t. 519. Collect. 4. p. 195. \**

Kleinöhriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2*

*Radix tuberosa rapacea multiceps. Folia biuncialia oblongo-lanceolata acuta basi attenuata, superne hir-*

*suta, inferne glabra, margine ciliata, basi foliolis binis quadrilinearibus angustolanceolatis saepe appendiculata. Petioli longitudine foliorum saepe vero longiores pilis rarissimis ciliati. Scapus trifidus erectus una cum calycibus reflexis hirsutus. Petala linearia obtusa albido-rubicunda, bina superiora latiora et basi atro-sanguinea. Affine P. longifloro sed diversum: Numero fertilium filamentorum, foliis superne hirsutis margine ciliatis et basi appendiculatis. A. P. ciliato foliis angustioribus longioribus hirsutis appendiculatis distinctum. W.*

### 8. PELARGONIUM auritum.

*P. acaule, umbella subcomposita, foliis oblongis subintegerrimis obtusis simplicibus ternatisque. W.*

*Geranium (auritum) calycibus monophyllis, scapis radicalibus, umbella composita divisa, foliis ovalibus simpliciusculis. Mant. 433.*

*Geranium prolificum. d. Sp. pl. 950.*

*Geranium (auritum) calycibus monophyllis, foliis oblongis integris tripartitis, pedunculis radicalibus. Burm. geran. 61.\**

*Geranium aricanum, foliis plerumque auritis, floribus erubro-purpurascentibus. Comm. hort. 2. p. 121. t. 61. Raj. hist. 3. p. 514.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 397.*

*Geöhrter Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. 4*

*A praecedente diversissimum: Foliis obtusis saepius ternatis, foliolis ad petiolum sitis lateralibus oblongis. W.*

*Haec inter omnes capenses rarissima. Burm. l. c.*

### \*9. PELARGONIUM hirtum.

*P. acaule, umbella composita, foliis ovatis integerrimis obsolete trilobis ciliatis, floribus pentandris. W.*

*Geranium (pilosum) radice rapiformi, scapis proliferis, foliis subovatis subtrilobis. Cavan. diss. 5. p. 273.\* et diss. 6. p. 352. t. 199.*

*Haarstielliger Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. 4*

*Folia longe petiolata ovata obtusiuscula obsolete lobata integerrima glabra, margine ciliata. Petioli, Scapi et Pedunculi pilis albis vestiti. Corolla carnea,*

*petalis lanceolatis obtusis, binis superioribus emarginatis, basi macula atro-rubra notatis. Affine sequentis discrepat vero: foliis ciliatis leviter trilobis, pilis longis albis scapum petiolos et pedunculos tegentibus; petalis latioribus, et filamentis quinque antheriferis. W.*

\*10. PELARGONIUM punctatum.

*P. acaule, umbella composita, foliis ovatis dentatis glabris, floribus diandris, petalis tribus inferioribus duplo brevioribus. W.*

*Geranium (punctatum) foliis radicalibus, floribus umbellatis diandris, petalis duobus superioribus punctatis, stigmata quatuor. Andrews reposit. I. p. 60. t. 60.*

*Punctirter Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. 4*

*Folia ovata subcordata utrinque dentibus quatuor vel sex grossis inaequalibus instructa. Petioli, Scapi et Pedunculi tenuissime pubescentes. Umbella multiflora ultra 20 flores continens. Corolla ochroleuca, petalis angustis linearibus obtusis, binis superioribus duplo longioribus apice emarginatis et basi sanguineo-punctatis. Filamenta septem, quorum bina antherifera longiora. Stigma quadrifidum. W.*

\*11. PELARGONIUM bifolium. †

*P. acaule, umbella simplici, foliis cordatis inciso-dentatis. W.*

*Geranium calycibus monophyllis, foliis binis cordato-angulatis, radice rapacea. Burm. geran. 73. \* Cavan. diff. 4. p. 254. t. 115. f. 3.*

*P. rapaceum bifolium, floribus maculatis. Burm. afr. 90. t. 35. f. 1.*

*Geranium africanum humile latifolium, tuberosa radice, floribus incarnatis. Herm parad. bat. app. et pl. afr. 12.*

*Zweyblättriger Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. 4*

*Folia radicalia tantum bina petiolata incisa et obtuse dentata. Umbella pauciflora. W.*

\*12. PELARGONIUM hirsutum.

*P. acaule, umbella composita, foliis obovatis lanceolatisve integerrimis pinnatifidisve hirtis ciliatis. Ait. Kew. 2. p. 417.*

*Geranium (hirsutum)* calycibus monophyllis, foliis ovatis laciniatis rugosis, radice turbinata. *Burm. geran.* 68. t. 2. \* *Cavan. diff.* 4. p. 247. t. 101. f. 2. \*

*Geranium lobatum.* *β. Sp. pl.* 950.

Haariger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 4

\*13. *PELARGONIUM atrum.*

*P. acaule*, umbella composita, foliis glabris oblongis dentatis, pinnatifidisve integerrimis, floribus pentandris. W.

*Pelargonium atrum.* *l'Herit. geran. t.* 44.

Schwarzer Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 4

*Folia glabra non ciliata oblonga dentata vel pinnatifida integerrima. Petala lineari-lanceolata obtusa atra.* W.

\*14. *PELARGONIUM trifidum.* †

*P. acaule*, umbella simplici, foliis tripartitis, laciniis lineari-cuneiformibus tridentatis. W.

*Geranium (trifidum)* calycibus monophyllis, foliis ternis trilobis et trifidis, radice rapacea. *Burm. geran.* 74. *Cavan. diff.* 4. p. 254. t. 115. f. 1.

*P. rapaceum*, foliis ternis trilobatis et tridentatis, flore sanguineo. *Burm. afr.* 91. t. 35. f. 2. *Petiv. gazop.* 84. f. 11.

Dreispaltiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 4

*Folia terna breve petiolata profunde tripartita, laciniis lineari-cuneiformibus, apice acutis tridentatis.* W.

\*15. *PELARGONIUM heterophyllum.*

*P. acaule*, umbella composita, foliis ciliatis simplicibus, trilobis ternatisve foliolo intermedio trilobo. W.

*P. acaule* radice rapacea simplici, foliis ternatis integrisque glabris ciliatis, foliolis saepe lobatis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 516. *Collect.* 4. p. 197. \*

Verschiedenblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 4

*Folia integerrima glabra margine ciliata obtusa plerumque ternata, foliolo intermedio trilobo, interdum vero tantum triloba, vel ovata indivisa.* Scapi, Pe-

tioli, Pedunculi et Calyces *hirti*. Corolla *alba*, *petalis lanceolatis obtusis*, *binis superioribus subretusis basi macula sanguinea notatis*. W.

\*16. PELARGONIUM *triphyllum*.

P. *acaule*, umbella subcomposita, foliis ternatis obtusis crenatis glabris. W.

P. *acaule radice rapacea simplici*, foliis ternatis crenatis glabris, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 515. Collect. 4. p. 199.\**

Dreyblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4.*

Folia *ternata glabra obtusa et obtuse crenata*. Petioli, Scapi, Pedunculi et Calyces *reflexi pubescentes*. Corolla *incarnata*, *petalis linearibus obtusis*, *binis superioribus latioribus basi sanguineo-punctatis*. W.

\*17. PELARGONIUM *nervifolium*.

P. *acaule*, umbella composita, foliis ternatis glabris, foliolis obtusis integerrimis nervosis sublobatis subtus glaucis. W.

P. *acaule radice rapacea simplici*, foliis ternatis trilobis integrisque multinerviis glabris, ad oras aculeato-ciliatis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 517. Collect. 4. p. 198.\**

Nervenblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4.*

Folia *longe petiolata ternata glabra*, *subtus glauca*, *foliolis obtusis multinerviis trilobis vel indivisis margine scabris*. Scapi, Petioli, Pedunculi et Calyces *patentes hirti*. Corolla *alba*, *petalis oblongis obtusis basi linea sanguinea ramosa pictis*, *binis superioribus majoribus lineisque binis instructis*. W.

18. PELARGONIUM *pinnatum*.

P. *acaule*, umbella subcomposita, foliis pinnatis, foliolis subrotundo-ovatis indivisis utrinque hirsutis. *Ait. New. 2. p. 417.*

P. (*astragalifolium*) *acaule*, radice rapacea multicipite, foliis pinnatis, foliolis ovatis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 511. Collect. 3. p. 184.\**

Geranium (*pinnatum*) calycibus monophyllis, foliis pinnatis, foliolis ovatis. *Sp. pl. ed. 1. p. 677. Burm. geran. 66.*

*Geranium prolificum*.  $\gamma$ . *Sp. pl. ed. 2. p. 950.*

*Geranium (astragalifolium)* radice crassa, foliis pinnatis, foliolis ovato-acuminatis latioribus cinereis hirsutis, scapis subradicalibus elongatis umbelliferis. *Cav. diff. 4. p. 257. t. 104. f. 2.\**

*Geranium africanum* astragali folio. *Comm. prael. 53. t. 3.*

$\beta$ . *Geranium (pinnatum)* acaule radice turbinata tuberosa, foliis pinnatis, foliolis ovatis sublesilibus. *Cavan. diff. 4. p. 257. t. 115. f. 2.\**

Genederter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 24 (v. l.)*

*Folia utrinque hirsuta viridia. Petala linearia alba, bina majora linea sanguinea basi ornata. Varietas  $\beta$ . differt foliolis minoribus subtus tomentosis et corollis majoribus.* W.

\*19. PELARGONIUM *barbatum*.

*P. acaule*, umbella composita, foliis pinnatis, foliolis linearibus trifidis acuminatis apice barbatis. W.

*P. (barbatum)* acaule, radice rapacea simplici, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis lanceolato-linearibus acutis apice barbatis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 513. Collect. 4. p. 196.\**

*Geranium prolificum*.  $\beta$ . *Sp. pl. 949.*

*Geranium (proliferum)* calycibus monophyllis, foliis pinnatim divisis, foliolis tri- et quinquepartitis linearibus, radice turbinata. *Burm. geran. 70. t. 2.\* Cav. diff. 4. p. 259. t. 120. f. 3.*

*Geranium africanum*, umbellatis floribus carneis, duabus maculis nigricantibus insignitis, foliis tenuissimis, radice rapacea. *Raj. hist. 3. p. 513.*

Bärtiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 24*

*Folia longe petiolata pinnata, pinnis angustis linearibus acuminatis tripartitis vel etiam pinnatifidis e laciniis quinque compositis, apice fasciculo parvo pilorum barbatis. Corolla carnea petalis linearibus obtusis, binis superioribus retusis nervis binis sanguineis pictis.* W.

\*20. PELARGONIUM *melananthon*.

*P. acaule*, umbella composita, foliis pinnatis hirtis, foliolis oblongis obtusis pinnatifidis. W.



P. (*melananthon*) acaule, radice rapacea simplici, foliis pinnatis hispidulis, pinnis lobato-incisus obtusis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 514. Collect. 4. p. 188.\**

Schwarzblütiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. v.)*

Folia pinnata hirta, pinnis oblongis obtusis superioribus confluentibus pinnatifidis. Petala linearia obtusa fusco-sanguinea. W.

## \*21. PELARGONIUM carneum.

P. acaule, umbella subcomposita, foliis bipinnatis glabris, foliolis lanceolatis triidibus obtusis. W.

P. (*carneum*) acaule, radice rapacea simplici, foliis bipinnatis, pinnulis incisus glabriusculis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 512. Collect. 4. p. 189.\**

Geranium (*pinnatifidum*) calycibus monophyllis, foliis duplicato-pinnatifidis, laciniis linearibus obtusis, radice turbinata. *Burm. geran. 69. t. 2.\* Cavan. diff. 4. p. 260. t. 120. f. 1.*

Geranium africanum foliis hirsutis longis tenuiter dissectis, flore albo, punctis purpureis, radice tuberosa. *Herm. afr. 11.*

Geranium lobatum. *γ. Sp. pl. 950.*

Fleischfarbener Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4*

Corolla carnea, petalis oblongis obtusis nervis binis ramosis sanguineis pictis, binis superioribus majoribus obovatis retusis. W.

## 22. PELARGONIUM rapaceum.

P. acaule, umbella composita, foliis decomposite laciniatis villosis. *Ait. Kew. 2. p. 418.*

P. (*rapaceum*) acaule, radice rapacea multicipite, foliis bipinnatis villosis incisus, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 510. Collect. 4. p. 190.\**

Geranium rapaceum. *Syst. nat. ed. 10. p. 1141.*

Geranium prolificum. *α. Sp. pl. 949.*

Geranium africanum myrrhidis folio, flore albicante, radice rapacea. *Commel. hort. 2. p. 125. t. 63.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 396.*

Rübenartiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. l.)*

Folia bipinnata, foliolis trifidis pinnatifidisve lanceolatis obtusis, in planta spontanea inter folia bipinnata sunt et pinnata foliolis palmato-multifidis. Corolla papilionacea albo-incarnata, petalis supremis basi punctatis. W.

\* \* Subacaulia, radice tuberosa.

### 23. PELARGONIUM lobatum.

P. acaule, umbella composita, foliis subtus tomentosis simplicibus cordatis, ternatis, quinatisque, foliolis lobatis sinuatis dentatis. W.

P. acaule, umbellis compositis, foliis ternatis quinatisve lobatis tomentosis. *Ait. Kew. 2. p. 418.*

Geranium calycibus monophyllis, caule truncato, scapis subradicalibus umbella composita. *Sp. pl. 950. Mill. dict. n. 39.*

Geranium radice tuberosa, foliis ternatis crassis magnis tomentosis, scapis radicalibus divisis umbelliferis. *Cavan. diff. 4. p. 250. t. 114. f. 2.\**

Geranium calycibus monophyllis, tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda, foliis lobatis crenatis hirsutis. *Roy. lugdb. 352. Burm. geran. 58.*

Geranium africanum noctu olens tuberosum vitis foliis hirsutis. *Commel. hort. 2. p. 126. t. 62.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 398.*

Lappiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 4 (v. v.)*

Petala obovata nigricantia basi flava. Filamenta decem, quorum sex antherifera. Folia admodum varia, interdum simplicia cordata lobata, plerumque ternata, saepius vero quinata; Foliola sunt lobata, lobi obtuse sinuati: margo inaequaliter argute dentatus; sunt tomentosa, subtus vero mollissima alba. W.

### 24. PELARGONIUM triste.

P. subcaule, umbella simplici, foliis hirtis pinnatis, foliolis bipinnatifidis, laciniis oblongis acutis. W.

P. subcaulescens, umbella simplici, foliis multifido-laciniatis villosis, laciniis lanceolatis. *Ait. Kew. 2. p. 418.*

Geranium calycibus monophyllis sessilibus, scapis bifidis monophyllis. *Sp. pl. 950. Mill. dict. n. 35. Knorr. del. hort. 1. t. 8. 19. Kniph. cent. 7. n. 29.*

Geranium radice tuberosa, foliis longissimis bipinnatis

hirtis, floribus umbellatis noctu suaveolentibus, corollis subaequalibus atro-maculatis. *Cavan. diff.* 4. p. 261. t. 107. f. 1.\*

Geranium calycibus monophyllis, tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda. *Hort. cliff.* 344. *Hort. upf.* 197. *Roy. lugdb.* 352. *Burm. geran.* 57.

Geranium triste. *Corn. canad.* 109. t. 110.

Geranium noctu olens aethiopicum, radice tuberosa, foliis myrrhidis latioribus ac angustioribus. *Breyn cent.* 126. t. 58.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 399.

Traurender Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 24 (v. v.)

Folia ad radicem diversa latiora et angustiora. Petala tristi colore viridi-luteo-pallida, omnibus maculata rufa, excepto solo margine eorum.

## 25. PELARGONIUM *appendiculatum*.

P. subcaule, umbella simplici, foliis bipinnatis villosis, foliolis linearibus, stipulis apice dilatato-ovata petiolorum basi adnatis. W.

Geranium (*appendiculatum*) calycibus monophyllis, foliis radicalibus supradecompositis hirsutis, petiolis appendiculatis, umbella scapo longiore. *Lin. suppl.* 304.

Geranium radice rapacea rufescente, foliis radicalibus tomentoso-lanatis duplicato-pinnatis, stipulis longe decurrentibus apice latissimis, umbellae radiis scapo subaequalibus. *Cavan. diff.* 4. p. 262. t. 121. f. 2.\*

Geflügelter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 24

Distinctissimum omnium petiolis in medio utrinque auriculatis, lobo ovato s. cordato lato integro glabro, inter quos lobos exit petiolus teres hirsutus cum folio supradecomposito, s. tripinnato hirsuto. Radix tuberosa. Folia omnia radicalia et quasi caespitosa. Scapus unus s. bini palmares foliis vix longiores erecti sulcati hirsuti. Involucrum polyphyllum breve, foliolis subulatis hirsutis. Umbella decem radiata, radiis longitudine fere scapi, hirsuta. Flores violacei.

## 26. PELARGONIUM *flavum*.

P. subcaulescens, umbellis simplicibus, foliis decomposite laciniatis hirsutis, laciniis linearibus. *Ait. Kew.* 2. p. 418.

*Geranium (flavum)* calycibus monophyllis, foliis trifariam alternatim pinnatis, foliolis pinnatifidis, scapis hirtis. *Mant.* 257. *Burm. prod.* 19.

*Geranium (daucifolium)* calycibus monophyllis, foliis hirtis alterpatim tripinnatis, foliolis pinnatifidis. *Murr. Comment. goett.* 1780. p. 13. t. 4.\*

*Geranium (daucifolium)* radice globosa tuberosa, foliis hirsutis tripinnatis, pinnulis alternis, foliolis minimis ut plurimum lanceolatis. *Cavan. diff.* 4. p. 260. t. 120. f. 2.\*

*Geranium africanum* folio staphyllini. *Riv. irreg.* t. 109.

β. P. (*daucoides*) subcaulescens radice tuberosa, scapo simplicissimo, foliis tripinnatis hirsutis, pinnulis lanceolato-linearibus, filamentis decem, septem fertilibus.

*Jacq. ic. rar.* 3. t. 522. *Collect.* 5. p. 143.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 392.

Gelber Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 4 (v. v.)

Planta hirta. Folia *Dauci* instar multifida. Petala bina superiora adscendentia, media concava, conniventia, includentia primo petalum quintum.

\* \* \* *Herbacea aut Suffruticosa.*

## 27. PELARGONIUM *Oenotherae*.

P. pedunculis paucifloris, foliis oblongo-lanceolatis obtusis dentatis incanis tomentosis, caule adscendente herbaceo. W.

P. (*Oenotherae*) pedunculis paucifloris, foliis lanceolatis ferratis tomentosis, caule bienni procumbente, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 525.

*Geranium (Oenotherae)* calycibus monophyllis, foliis oppositis lanceolatis ferrato-dentatis mollissime tomentosis, umbella pauciflora. *Lin. suppl.* 305.

*Geranium ovatum.* *Jacq. Collect.* 2. p. 355.\*

Nachtkerzenartiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 4

Herba habitu *Oenotherae* mollissimae, tota tomento tenuissimo cano mollissima. Folia petiolata lineari-lanceolata dentato-ferrata, caulina opposita. Stipulae subulatae. Pedunculi filiformes longi. Involucrum pentaphyllum, foliolis lanceolatis hirsutis. Umbella tri-f. quadriflora, pedicellis calyce brevioribus. Calyces magni. Flores violacei.

Calyces fructiferi ovati magni. Corolla calyce duplo longior rosea, petalis subaequalibus, binis superioribus latioribus. W.

\*28. PELARGONIUM chamaedrifolium.

P. pedunculis subbifloris, foliis ellipticis obtusis incano-pubescentibus dentatis, petalis longitudine calycis caule procumbente. W.

P. (*chamaedryfolium*) pedunculis subbifloris, caulibus herbaceis decumbentibus, foliis oblongis obtusis ferratis villosis, filamentis decem, quinque fertilibus. Jacq. ic. rar. 3. t. 523. Collect. 5. p. 130.\*

Gamanderblättriger Kranichschnabel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 4

Caules ramosi diffusi articulato-nodosi flexuosi decumbentes. Folia cinerea oblonga obtusa inaequaliter dentata petiolata opposita. Pedunculi biflori interdum uniflori. Flores parvi. Petala alba basi sanguinea, longitudine laciniarum calycis. W.

\*29. PELARGONIUM ovale.

P. pedunculis multifloris, foliis ovatis acutis dentatis canescentibus, caule debili tortuoso prostrato. W.

Pelargonium ovale. l'Herit. geran. t. 28.

Geranium (*ovale*) calycibus monophyllis, foliis ovalibus crenatis planis tomentosis, petiolis longissimis, caule suffruticoso prostrato. Burm. prod. 19.

Elliptischer Kranichschnabel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. 4

Folia longissime petiolata. Pedunculi communes fere semipedales quadri- seu quinqueflori. Corolla magnitudine P. elegantis. Simile quatuor sequentibus, sed abunde diversum foliis acutis et caule debili prostrato. W.

\*30. PELARGONIUM trichostomon.

P. pedunculis subtrifloris, foliis elliptico-subrotundis obtusis crenatis holosericeis, petalis superioribus subrotundis, caule suffruticoso ascendente. W.

P. (*trichostomon*) pedunculis paucifloris, foliis subrotundo-ovatis obtuse ferratis holosericeis, caule bienni erectiusculo, filamentis decem hirsutis, quinque fertilibus. Jacq. ic. rar. 3. t. 524. Collect. 5. p. 131.\*

β. Geranium (*glaucum*) acaule, foliis ovato-oblongis fer-

ratis incano-tomentosis, scapis radicalibus. *Cavan. diff. 4. p. 237. t. 103. f. 2.*

Geranium calycibus monophyllis, foliis ovato-oblongis ferratis, caule nullo, radice lignosa. *Burm. geran. 62.*

Haarfädiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 24*

*Folia viridia holosericea. Pedunculi uni-bi-vel triflori. Corolla incarnata, petalis basi albidis, binis superioribus subrotundis, tribus inferioribus lanceolato-oblongis obtusis. W.*

\*31. PELARGONIUM *blattarium.*

P. pedunculis multifloris, foliis subrotundis obtusis incanis holosericeis, petalis superioribus subrotundis, caule suffruticoso erecto. W.

P. (*blattarium*) pedunculis umbelliferis subsexfloris, caule suffruticoso, foliis subrotundo-ovatis, obtuse ferratis, holosericeis glaucescentibus, petalorum superiorum laminis subrotundis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 3. t. 131.\**

Königskerzenartiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 24*

*Simillimum praecedenti cujus forte varietas, tamen differt: foliis cinereis plicatis, pedunculis multifloris, floribus parum majoribus, atque antheris rubris nec flavis, Corolla pallide violacea, petalis tribus inferioribus oblongis obtusis, binis superioribus subrotundis basi albis. W.*

\*32. PELARGONIUM *eriosstemon.*

P. pedunculis paucifloris, foliis elliptico-subrotundis obtusis crenatis holosericeis, petalis superioribus obovatis acute emarginatis, caule suffruticoso erecto. W.

P. (*eriosstemon*) pedunculis umbelliferis subquadrifloris, caule suffruticoso, foliis subrotundo-ovatis ferratis holosericeis, petalis superioribus obverse ovatis. *Jacq. hort. 2. p. 4. t. 132.\**

Geranium (*ovatum*) caule brevi suffruticoso, foliis ovatis dentatis tomentosis, pedunculis terminalibus paucifloris. *Cavan. diff. 4. p. 238. t. 103. f. 3?*

Wollenfädiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 24 (v. l.)*

*Folia holosericea viridia. Pedunculi subquadriflori. Corolla magna alba, petalis inferioribus oblongis ob-*

*tufis, binis superioribus obovatis acute emarginatis basi lineis binis brevissimis purpureis pictis. W.*

*In hoc et binis praecedentibus sunt stamina quinque fertilia, in P. ovali, et eleganti vero septem fertilia. W.*

\*33. PELARGONIUM *elegans.*

P. pedunculis multifloris, foliis elliptico-subrotundis argute serratis obtusis rigidis glabris, petalis omnibus obovatis, caule suffruticoso erecto. W.

Geranium (*elegans*) pedunculis multifloris, calycibus monophyllis, foliis orbiculatis serratis rigidis, petiolis longissimis, caule herbaceo. *Andrews reposit. I. p. 28. t. 28.*

Schöner Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4*

*Petala albido-rubicunda omnia obovata, bina superiora latiora lineis quatuor ramosis sanguineis picta. Differt a praecedente cui simillimum; foliis rigidis glabris acute serratis, umbella quadri-vel sexflora, petalis omnibus obovatis ut et staminibus septem fertilibus. W.*

34. PELARGONIUM *stipulaceum.*

P. pedunculis paucifloris, foliis oblongis obtusis subcordatis inciso-dentatis villosis, caule brevissimo stipularum rudimentis tecto. W.

Geranium (*stipulaceum*) acaule, calycibus monophyllis, foliis oblongis inciso-serratis, stipulis subulatis rigidis. *Lin. suppl. 306.*

Geranium caule brevissimo imbricato, foliis sublobatis crenato-incisis, stipulis apice bifidis lanceolatis reflexis, florum pedicellis longissimis. *Cavan. diff. 4. p. 254. t. 122. f. 3.\**

Beblätterter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5*

*Caulis uncialis et ultra crassus rudimentis stipularum magnis fuscis tectus. Folia longissime petiolata, oblonga obtusa subcordata villosa, basin versus parum incisa et ad lobatam figuram quodammodo accedentia, dentata. Stipulae lineari-subulatae bifidae. Pedunculi longi quadriflori. W.*

\*35. PELARGONIUM *articulatum.*

P. pedunculis paucifloris, foliis reniformibus quinquelo

lobis villosis, lobis subtrilobis, caule stipularum rudimentis tecto. W.

Geranium (*articulatum*) radice squamosa lignosa articulata, foliis radicalibus quinquelobis incisis, umbella subquadriflora, radiis longissimis. *Cavan. diff.* 4. p. 252. t. 122. f. 1.\*

Gegliedërter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Caulis vix uncialis squamis fuscis subrotundis tectus. Folia longissime petiolata villosa, reniformia quinqueloba, lobis oblongis obtusis trilobis, apice dentibus paucis instructis. W.

### 36. PELARGONIUM *tabulare*.

P. pedunculis subtrifloris, foliis reniformibus quinquelobis obtusis apice dentatis glabriusculis, caule adscendente piloso-hispido. W.

P. pedunculis paucifloris, foliis subrotundo-cordatis quinquelobis obtusis, caulibus decumbentibus pilosis. *Ait. Kew.* 2. p. 419. *l'Herit. geran.* t. 9.

Geranium (*tabulare*) calycibus monophyllis, foliis cordatis sublobatis crenato-dentatis glabris subciliatis, caule fruticoso. *Sp. pl.* 947.

Geranium (*elongatum*) caule herbaceo prostrato hispido, foliis longissime petiolatis quinquelobatis, pedunculis elongatis erectis, fructibus cernuis. *Cavan. diff.* 4. p. 233. t. 101. f. 3.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 132.

Tafelbergs - Kranichschnabel. W.

*Habitat in monte* Tabulari Capit. b. spei. 4 (v. v.)  
Folia scabriuscula. Corollae albae, W.

### 37. PELARGONIUM *alchimilloides*.

P. pedunculis paucifloris, foliis cordatis quinquelobopalmatis dentatis villosis, caule diffuso villosa, stigmatibus sessilibus. W.

P. pedunculis subquadrifloris, foliis orbiculatis palmato-incisis pilosissimis, caule herbaceo decumbente, stigmatibus sessilibus. *Ait. Kew.* 2. p. 419.

Geranium calycibus monophyllis, foliis orbiculatis palmatis incisis pilosis, caule herbaceo decumbente. *Sp. pl.* 948. *Virid. cliff.* 345. *Hort. upf.* 197.\* *Roy. lugdb.* 354. *Burm. geran.* 55. *Mill. dict. n.* 33. *Kniph. cent.* 9. n. 40.



Geranium caule herbaceo, foliis orbiculatis pilosis quinquepartitis, lobis trifidis, umbellis longissimis multifloris. *Cavan. diff. 4. p. 234. t. 93. f. 1.\**

Geranium calycibus monophyllis longissimis sessilibus, fructu assurgente, foliis palmatis crenatis. *Hort. cliff. 345.*

Geranium africanum alchimillae hirsuto folio, floribus albis. *Herm. lugdb. 282. t. 283. Stiff. bot. 107. t. 107.*

Geranium africanum folio alchimillae maculato. *Riv. pent. 331.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 391.*

Löwenfussblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. v.)*

### 38. PELARGONIUM odoratissimum.

P. pedunculis subquinquefloris, foliis subrotundo-cordatis mollissimis. *Ait. Kew. 2. p. 419.*

Geranium calycibus monophyllis, caule carnosio brevissimo, ramis herbaceis longis, foliis cordatis mollissimis.

*Sp. pl. 948. Hort. cliff. 345. Roy. lugdb. 354. Burm. geran. 45. Mill. dict. n. 34. Kniph. cent. 5. n. 34. Cavan. diff. 4. p. 241. t. 103. f. 1.\**

Geranium africanum humile, folio fragrantissimo molli. *Dill. elth. 157. t. 131. f. 138.*

β. Geranium (*africanum*) foliis alternis cordatis dentatis villosis, inferioribus orbiculatis, superioribus subtrilobis, floribus umbellatis parvis. *Cavan. diff. 4. p. 242. t. 104. f. 1.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 393.*

Wohlriechender Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. v.)*

### 39. PELARGONIUM grossularioides.

P. pedunculis subbifloris filiformibus, foliis cordatis subrotundis incisive dentatis, caulibus glaberrimis. *Ait. Kew. 2. p. 420.*

Geranium calycibus monophyllis, foliis cordatis subrotundis lineatis incisive crenatis, caule herbaceo. *Syst. veg. 512.*

Geranium calycibus monophyllis, foliis cordatis subrotundis lobatis crenatis, caule herbaceo laevi. *Sp. pl. 948. Burm. geran. 53. Mill. dict. n. 42.*

Geranium caule prostrato laevi herbaceo, foliis cordatis subrotundis lobato-incisive crenatis, pedunculis capillaribus. *Cavan. diff. 4. p. 245. t. 119. f. 2.\**

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

T t

*Geranium pedunculis bifloris, foliis cordatis incisis glabris, caulibus filiformibus procumbentibus. Roy. lugdb. 351.*

*Geranium africanum uvae crispae folio, cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis. Herm. lugdb. 287. t. 289.*

*Geranium africanum flore minuto. Riv. pent. 337.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 394.*

Stachelbeerblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2 (v. v.)*

*Caules prostrati tetragoni, ut tota planta glabri. Folia lineata. Pedunculi capillares, floribus 2 f. 3 minutis pallide incarnatis. Antherae 4.*

#### \*40. PELARGONIUM anceps.

*P. umbellis multifloris, floribus subcapitatis, foliis cordato-subrotundis obsolete lobatis, caulibus triquetro-ancipitibus. Ait. Kew. 2. p. 420. Jacq. Collect. 4. p. 184. t. 22. f. 3.\**

Zweykantiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2 (v. v.)*

*Tota planta glabra. Caules longi decumbentes triquetro-ancipites. Folia longe petiolata cordata obtusa levissime quinqueloba, lobis grosse obtuse dentatis. Stipulae oblongae bipartitae. Pedunculi axillares foliis duplo et ultra longiores, umbellati. Pedicelli sex usque decem breves. Flores parvi rubicundi. Simile praecedenti sed duplo majus, folia obtusa et obtuse dentata, pedunculi umbellati multiflori, floribus subcapitatis. W.*

#### 41. PELARGONIUM althaeoides.

*P. pedunculis multifloris, foliis cordato-ovatis yiliosis trilobis dentatis, summis sinuatis, petalis calyci aequalibus. W.*

*P. pedunculis multifloris, foliis cordato-ovatis sinuatis dentatis, summis pinnatifidis, petalis calyci aequalibus. Ait. Kew. 2. p. 420. l'Herit. geran. t. 10. Jacq. Collect. 4. p. 185. t. 21. f. 2.\**

*Geranium calycibus monophyllis, foliis ovatis plicatis sinuatis tomentosis crenatis, caule herbaceo prostrato. Syst. veg. 512.*

*Geranium calycibus monophyllis, foliis cordato-ovatis plicatis sinuatis crenatis, caule herbaceo prostrato. Sp.*

pl. 949. Hort cliff. 345. Roy. lugdb. 354. Burm. geran. 54. Mill. dict. n. 48.

Geranium caule herbaceo tomentoso, foliis oppositis cordato-ovatis sinuatis crenatis, umbella longissime pedunculata, floribus minimis. Cavan. diff. 4. p. 242. t. 123. f. 2. \*

Geranium africanum folio althaeae, odore melissae, Boerh. lugdb. 1. p. 263.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 394.

Eibischblättriger Kranichschnabel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♂ ⊙ (v. v.)

Planta depressa tota subtomentosa. Petala longitudine calycis, extus atropurpurea, margine albo, intus rubicunda; superioribus 2 basi siliis punctatis sanguineis.

#### 42. PELARGONIUM columbinum.

P. pedunculis multifloris, foliis ternatis tripartitis trifido-laciniatis, caule decumbente hirto. W.

P. (columbinum) pedunculis subquinquefloris, foliis subrotundis tripartitis obtusis multifidis, caulibus herbaceis decumbentibus. Jacq. hort. Schönb. 2. p. 4. t. 133. \*

Geranium (alceoides) calycibus monophyllis, foliis ternatis trifidis laciniatis, caule herbaceo hirto. Sp. pl. 948?

Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, foliis lyrato-multifidis, cotyledonibus lobatis. Burm. geran. 36?

Geranium africanum hirsutum uvae crispae folio laciniato, flore duabus maculis purpureis. Raj. suppl. 513?

Malvenblättriger Kranichschnabel. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ♀ (v. v.)

Folia multifida facie Geranii columbini. Geranium alceoides ab hoc vix diversum, nisi numero staminum fertile, quorum quinque a Linnaeo indicantur, at in hoc constanter quatuor observantur. W.

#### \*43. PELARGONIUM coronopifolium.

P. pedunculis paucifloris, foliis lineari-lanceolatis apice inciso-dentatis subtus canescentibus, caule suffruticoso adscendenti. W.

P. (coronopifolium) pedunculis paucifloris, foliis lanceolato-linearibus dentato-serratis supra glabris subtus

hirtulis, caule suffruticoso, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 526. Collect. 5. p. 132.\**

Schmalblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2*

Caules *suffruticosi adscendentes, ramis junioribus hirtis. Folia tri-vel quadriuncialia sensim in petiolum brevem attenuata, lineari-lanceolata apice dentata vel ab apice ultra medium inciso-dentata, angusta, supra viridia, inferne albicantia. Pedunculi bi-vel triflori. Corolla pallide violacea unicolor, petalis binis superioribus obovatis basi supra unguem utrinque dente obtuso unico instructis, reliquis angustioribus brevioribus lanceolatis obtusis. W*

\*44. PELARGONIUM *capillare.*

P. pedunculis subtrifloris, foliis lanceolatis profunde pinnatifidis pubescentibus, caule suffruticoso. W.

Geranium (*capillare*) foliis oppositis pinnatis, pinnulis linearibus, pedunculis solitariis subunifloris. *Cavan. diff. 4. p. 258. t. 97. f. 1.\**

Haarstieleriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2*

Folia *semiuncialia pubescentia lanceolata profunde pinnatifida, laciniis linearibus integerrimis. Petioli foliis triplo longiores capillares. Pedunculi uni-bi-f. triflori. Simile praecedenti differt vero: pedunculis longissimis capillaceis, foliis multo brevioribus profunde pinnatifidis. W.*

\*45. PELARGONIUM *tricolor.*

P. pedunculis subtrifloris, foliis lanceolatis villosocanescentibus inciso-dentatis subtrifidis, caule suffruticoso erecto. W.

P. (*tricolor*) petalis duobus superioribus punctis prominentibus lucidis ad basin scabris. *Curt. mag. 240.\**

P. (*violareum*) pedunculis paucifloris, foliis oblongis obtusiusculis callose serrato-incisis villosis, caule bienni, filamentis decem, quinque vel quatuor fertilibus, sterilibus squamaeformibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 527. Collect. 5. p. 129.\**

Dreyfarbiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 2 (v. l.)*

*Tota planta villosocanescens. Folia lanceolata inciso-dentata longe petiolata, superiora basi trifida in-*

*aequaliter dentata. Stipulae et Involucra scariosa aristata. Pedunculi plerumque triflori interdum biflori. Petala obovata, tria inferiora nivea, bina superiora atro-sanguinea basi macula nigra signata. W.*

\*46. PELARGONIUM *senecioides.*

P. pedunculis subtrifloris, involucris calycibusque obtusis, foliis bipinnatifido-laciniatis, caule herbaceo. *Ait. Kew. 2. p. 420. l'Herit. geran. t. II.*

Creuzkrautblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ☉*

Pedunculi tri-vel biflori. Flores albi magnitudine *Geranii robertiani*, petalis binis superioribus ad basin macula instructis. W.

47. PELARGONIUM *myrrhifolium.*

P. pedunculis paucifloris, foliis ternatis pinnatifidis serratis, superioribus bipinnatifidis, floribus pentandris, corollis tetrapetalis, caule strigosiusculo. W.

P. (*myrrhifolium*) pedunculis subtrifloris, corollis subtetrapetalis, foliis bipinnatifidis, inferioribus cordatis lobatis, caule strigosiusculo. *Ait. Kew. 2. p. 421.*

P. (*betonicum*) pedunculis paucifloris, corollis tetrapetalis rarius pentapetalis, caule bienni, foliis pinnatifidolobatis hirtulis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 531. Collect. 5. p. 127.*

*Geranium (myrrhifolium)* calycibus monophyllis, foliis bipinnatis, inferioribus cordatis lobatis, caule herbaceo, calycibus strigosis. *Sp. pl. 949. Burm. geran. 59. Mill. dict. n. 36. Berg. cap. 178. Kuiph. cent. 10. n. 47.*

*Geranium (betonicum)* caule herbaceo, foliis subovatis lobato-pinnatis crenatis obtusis umbellis paucifloris. *Cavan. diff. 4. p. 264. t. 118. f. I.\**

*Geranium africanum betonicae* folio laciniato et maculato, floribus incarnatis. *Herm. lugdb. 279. t. 281?*

*Geranium africanum* folio *betonicae*. *Riv. pentap. t. 106.*

β. P. (*bullatum*) pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis, caule bienni, foliis ternatis pinnatifide lobatis utrinque subhispidulis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 530. Collect. 5. p. 124.\**

Kälberkropfblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. v.)*

Antherae quinque, alternis sterilibus. Caulis herba-

*ceus patulus subpubescens. Folia ternata incisa subser-  
rata lineata, adspersa pilis erectiusculis, disco occu-  
pato macula lata fusca, foliolo intermedio latiore se-  
mipinnatifido. Calyx laciniis binis trinerviis, binis  
uninerviis, unica binervi. Petala quatuor (absque in-  
fimo) pallide incarnata, superioribus venis purpureis.*

\*48. PELARGONIUM *lacerum.*

P. pedunculis paucifloris, foliis bipinnatifidis, laciniis lanceolatis obtusis apice dentatis, caule hirtio. W.

P. (*lacerum*) pedunculis quinquefloris, corollis pentapetalis, caule bienni piloso, foliis pinnato-lobatis incis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 532. Collect. 5. p. 122.\**

Geranium africanum tuberosum anemones folio, flore incarnato. *Herm. 179. t. 178?*

Geranium aethiopicum myrrhidis folio 3, flore magno striato. *Breyn. cent. 129. t. 59.*

β. P. (*longicaule*) pedunculis uni-quinquefloris, corollis tetrapetalis, rarius pentapetalis caule bienni hirsuto, foliis pinnato-lobatis, filamentis decem, septem fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 553. Collect. 5. p. 125.\**

γ. P. (*anemonaefolium*) pedunculis subquinquefloris, corollis pentapetalis, caule bienni, foliis pinnato-lobatis subtus hirtulis supra glabris, filamentis decem septem fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 535. Collect. 5. p. 123.\**

Geranium africanum folio anemones. *Riv. pentap. 105.*

Schlitzblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. v.)*

*Varietates β et γ parum ab α diversae et cultura ortae videntur, ut cultura reliquarum hujus generis specierum abunde demonstrat. W.*

\*49. PELARGONIUM *multicaule.*

P. pedunculis multifloris subcapitatis, foliis subbipinnatifidis dentatis, corollis tetrapetalis, caule decumbente glabro. W.

P. (*multicaule*) pedunculis subquinquefloris, corollis tetrapetalis, caule bienni glabro, foliis pinnato-lobatis glabris, filamentis decem, septem fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 534. Collect. 5. p. 126.\**

Vielfstenglicher Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. l.)*

Folia *pinnatifida dentata*, *seniora bipinnatifida dentata*. *Praecedenti simillimum tamen pluribus notis diversum videtur, potissimum caule et foliis glabris, foliis minoribus, pedunculis tri-quinquefloris subcapitatis, corollis constanter tetrapetalis violaceis, petalis binis superioribus venosis et macula saturatiori pictis.* W.

50. PELARGONIUM *coriandrifolium*.

P. pedunculis subtrifloris, foliis bipinnatis, foliolis pinnatifidis linearibus, floribus pentandris, corollis subtetrapetalis, caule laeviusculo. W.

P. pedunculis subtrifloris, corollis subtetrapetalis, foliis bipinnatis linearibus, caule herbaceo laeviusculo. *Ait. Kew. 2. p. 421.*

P. pedunculis bi-quinquefloris, corollis tetra-vel pentapetalis, caule bienni, foliis bipinnatis, filamentis decem, quinque fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 528. Collect. 5. p. 142.\**

Geranium calycibus monophyllis, foliis bipinnatis linearibus squarrosis, caule herbaceo laeviusculo. *Sp. pl. 949. Mill. dict. n. 40.*

Geranium ramis reclinato-erectis nodosis, foliis bipinnatis linearibus, umbellis paucifloris. *Cavan. diff. 4. p. 263. t. 116. f. 1.\**

Geranium foliis coriandri. *Riv. pentap. t. 106.*

Geranium africanum coriandri folio, floribus incarnatis minus. *Herm. lugdb. 279. t. 280.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 395.*

Corianderblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ♂ 4 (v. v.)*

\* 51. PELARGONIUM *caucalifolium*.

P. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, foliolis pinnatifidis linearibus, floribus heptandris, corollis tetrapetalis, caule hirto. W.

P. (*caucalifolium*) pedunculis unifloris, corollis tetrapetalis, caule bienni, foliis bipinnatis sublinearibus, filamentis decem, septem fertilibus. *Jacq. ic. rar. 3. t. 529. Collect. 5. p. 145.\**

Haftdoldenblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4*

*Simile praecedenti: sed folia breviora, caulis hirtus, pedunculi uniflori, et flores majores heptandri.* W.

\* 52. PELARGONIUM *minimum*.

P. pedunculis subquadrifloris, foliis bipinnatis longe petiolatis foliolis oblongis, caule erecto glabro. W.

Geranium (*minimum*) foliis pinnatis, inferioribus et radicalibus caespitosis, caulinis oppositis, floribus terminalibus umbellatis. *Cavan. diff. 4. p. 260. t. 121. f. 3.\**

Kleinster Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 24*

Planta *digitalis glabra*, caule *erecto vel adscendente*. Folia *parva bi-tri-f. quadrilinearia bipinnata, foliolis oblongis indivisis*, Petioli *foliorum longitudine*. Pedunculi *plerumque quadriflori*. W.

\* \* \* \* *Fruticosa, foliis indivisis non angulatis.*

53. PELARGONIUM *glaucum*.

P. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis integerrimis acuminatis glaucis. *Ait. Kew. 2. p. 429. l'Herit. geran. t. 29.*

Geranium (*glaucum*) glaucum, calycibus monophyllis, caule erecto, foliis lanceolatis integerrimis. *Lin. suppl. 306.*

Geranium (*lanceolatum*) caule fruticoso, ramis virgatis, foliis lanceolatis oppositis integerrimis glaucis, pedunculis axillaribus subunifloris. *Cavan. diff. 4. p. 235. t. 102. f. 2.\* Diff. 5. p. 271. Curt. mag. 56.*

Lanzettblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. v.)*

Frutex *glaberrimus erectus suffruticosus rufescens*. Folia *opposita petiolata lanceolata integerrima acuta, longe petiolata, glauca f. cana*. Stipulae *subulatae breves*. Umbellae *pauciflorae pedunculatae*.

\* 54. PELARGONIUM *diversifolium*.

P. pedunculis subunifloris paniculatis, foliis lanceolatis integerrimis glaucis, ternatisve, inferioribus dentatis. W.

P. (*diversifolium*) caule fruticoso tenui glabro rubro, foliis diversis laciniatis, trilobis vel sublanceolatis concavis glabris glaucis, junioribus dentatis, floribus paniculatis erectis. *Wendl. obs. 51.*

Verschiedenblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 5 (v. l.)*

Frutex *ramosissimus*. Folia *inferiora oblonga den-*



*tata: superiora ternata: foliolis omnibus lanceolatis acutis integerrimis glabris glaucis, apice subbarbatis; foliolis lateralibus subsessilibus duplo brevioribus et angustioribus; summa folia sunt simplicia lanceolata integerrima glauca. Pedunculi uniflori, rarius biflori, in apice caulis paniculam flexuosam formantes. Flores praecedentis sed minores. Simillimum praecedenti, differt vero: foliis angustioribus simplicibus, atque ternatis et inferioribus dentatis, floribusque minoribus paniculatis. W.*

### 55. PELARGONIUM *betulinum*.

*P. umbellis paucifloris, foliis ovatis inaequaliter ferratis laevigatis. Ait. Kew. 2. p. 429. Curt. mag. 148.*

*Geranium (betulinum) calycibus monophyllis, foliis ovatis inaequaliter ferratis planis, caule fruticoso. Sp. pl. 946. Burm. geran. 38. Berg. cap. 175. Mill. dict. 43. Cavan. diff. 4. p. 208.*

*Geranium frutescens, folio subrotundo-dentato, flore purpureo. Burm. afr. 92. t. 33. f. 2.*

*Geranium frutescens, folio lato dentato, flore magno rubente. Burm. afr. 92. t. 33. f. 1.*

*Geranium fruticosum betulae folio africanum. Raj. suppl. 513. Pluk. mant. 90. t. 415. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 127.*

*Birkenblättriger Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. ̄ (v. v.)*

### 56. PELARGONIUM *acetosum*.

*P. umbellis paucifloris, foliis obovatis crenatis glabris carnosis, petalis linearibus. Ait. Kew. 2. p. 430. Curt. mag. 103.*

*Geranium calycibus monophyllis, foliis glabris obovatis carnosis crenatis, caule fruticoso laxo. Sp. pl. 947. Hort. cliff. 345. Roy. lugdb. 352. Burm. geran. 47. Mill. dict. n. 28. Kniph. cent. 11. n. 28.*

*Geranium caule fruticoso, foliis cuneato-ovatis crenatis carnosis, corollae petalis superioribus angustioribus. Cavan. diff. 4. p. 239. t. 104. f. 3.\**

*Geranium africanum frutescens, folio crasso et glauco acetosae sapore. Comm. prael. 54. t. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 125.*

*Saurer Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. ̄ (v. v.)*

Folia *carnosa glabra glauca obovata basi cuneiformia integerrima, apice inaequaliter obtuse grosse crenata.* W.

\*\*\*\* *Fruticosa, foliis angulatis, lobatis, palmatisve.*

\* 57. PELARGONIUM *scandens.*

P. pedunculis multifloris, foliis subrotundis obsolete lobatis crenatis zonatis, petalis linearibus latitudine laciniarum calycis. W.

P. (*scandens*) caule fruticoso, foliis subcordatis crenatis subpubescentibus zonatis, umbellis multifloris, foliolis calycinis inferioribus reflexis, petalis sublinearibus striatis calycis latitudine. *Ehrh. Beitr. 7. p. 161.*

Kletternder Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. v.)*

*Caulis fruticosus revera non scandens, rami tantum flexuosi implexi. Simile sequenti, sed petalis abunde distinctum.* W.

\* 58. PELARGONIUM *stenopetalum.*

P. pedunculis multifloris, foliis subrotundis obsolete lobatis crenatis zonatis, petalis linearibus laciniis calycis angustioribus. W.

P. (*stenopetalum*) caule fruticoso, foliis cordato-reniformibus crenatis pubescentibus zonatis, umbellis multifloris, foliolis calycinis inferioribus reflexis, petalis linearibus unicoloribus foliolo calycino multo angustioribus. *Ehrh. Beitr. 7. p. 161.*

Schmalblütiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. v.)*

*Petala angustissima saturate violacea.* W.

59. PELARGONIUM *hybridum.*

P. pedunculis multifloris, foliis subrotundis obsolete lobatis crenatis immaculatis, petalis lineari-cuneiformibus laciniis calycis latioribus. W.

P. (*hybridum*) umbellis multifloris, foliis obovatis crenatis glabris carnosis, petalis linearibus. *Ait. Kew. 2. p. 424.*

P. (*coccineum*) caule fruticoso, folis reniformibus crenatis glanduloso-pubescentibus immaculatis, umbellis multifloris, foliolis calycinis patentibus, petalis obovato-cuneatis. *Ehrh. Beitr. 7. p. 162.*

Geranium (*hybridum*) calycibus monophyllis, foliis sub-

orbiculatis glabris crenatis integris, caule fruticoso.  
*Mant.* 97.

Geranium caule fruticoso succulento, foliis alternis orbiculatis crenatis, umbellis elongatis floribus maximis coccineis. *Cavan. diff.* 4. p. 239. t. 105. f. 2.\*

Geranium africanum arboreescens, malvae folio pingui varietas. *Dill. elth.* 125. t. 125. f. 152.

β. *P. (roseum)* caule fruticoso, foliis cordato-reniformibus crenatis pubescentibus immaculatis, umbellis multifloris, foliolis calycinis patentibus, petalis cuneatis.  
*Ehrh. Beitr.* 7. p. 161.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 124.

Bastardartiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* † (v. v.)

Flores *simillimi P. inquinanti*, sed herba minor. Folia non tomentosa *simillima P. acetoso*, at basi nec cuneata nec reniformia, minus acetosa.

In hoc et binis praecedentibus Basis foliorum est quasi truncata, nec cordata aut cuneiformis. W.

## 60. PELARGONIUM zonale.

P. umbellis multifloris, foliis cordato-orbiculatis obsolete lobatis dentatis zonatis. W.

P. umbellis multifloris, foliis cordato-orbiculatis vix lobatis, dentatis zonatis. *Ait. Kew.* 2. p. 424.

Geranium calycibus monophyllis, foliis cordato-orbiculatis incisus zona notatis, caule fruticoso. *Sp. pl.* 947.

*Hort. upf.* 196. *Burm. geran.* 43. *Mill. dict. n.* 43.

Geranium (zonale) caule fruticoso, foliis orbiculatis crenatis obtuse lobatis, zona nigricante, floribus umbellatis. *Cavan. diff.* 4. p. 230. t. 98. f. 2.\*

Geranium africanum arboreescens alchemillae hirsuto folio, floribus rubentibus. *Comm. prael.* 51. t. 1.

β. *G. (marginatum)* caule frutescente, foliis rotundatolobatis, limbo albo marginatis, vetustate scariosis, floribus umbellatis rubicundis. *Cavan. diff.* 4. p. 230.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 130.

Schwarzbemahlter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* † (v. v.)

Folia disco zona rotundata. Varietas foliorum limbo albo f. *flavescente*.

In varietata β folia non zona nigra sunt picta; sed margine alba vel flavescentia et profundius incisa. Ce-

*terum in  $\alpha$  et  $\beta$  flores sunt vel coccinei vel violacei.* W.

61. PELARGONIUM *inquinans.*

P. umbellis multifloris, foliis orbiculato-reniformibus subindivisis crenatis tomentoso-viscidis. *Ait. Kew. 2. p. 424.*

Geranium calycibus monophyllis, foliis orbiculato-reniformibus tomentosis crenatis integriusculis, caule fruticoso. *Sp. pl. 945. Hort. upf. 195. Burm. geran. 46. Mill. dict. n. 24. Kniph. cent. 3. n. 42. Knorr. del. 1. t. S. 19. a.*

Geranium caule fruticoso succulento, foliis cordatis orbiculatis lucidis sublobatis crenatis, flore eleganter Kermelino. *Cavan. diff. 4. p. 243. t. 106. f. 2.\**

Geranium calycibus monophyllis, floribus florentibus erectis, foliis subcordatis. *Hort. cliff. 345. Roy. lugdb. 353.*

Geranium africanum arborescens malvae folio pingui, flore coccineo. *Dill. elth. 151. t. 125. f. 151.*

Geranium africanum arborescens malvae folio plano lucido, flore elegantissimo Kermelino. *Mart. cent. 3. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 123.*

Beschmutzender Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.  $\xi$  (v. v.)*

*Folia digitis tacta inquinant colore ferrugineo.*

\*62. PELARGONIUM *heterogamum.*

P. umbellis multifloris, foliis suborbiculatis inciso-lobatis dentatis, caule erecto fruticoso. *Ait. Kew. 2. p. 424. l'Herit. geran. t. 18.*

Rother Kranichschnabel. W.

*Habitat - - - -  $\xi$*

*Filamenta sex fertilia. W.*

\*63. PELARGONIUM *monstrum.*

P. foliis orbiculato-reniformibus obsolete lobatis complicatis crispis. *Ait. Kew. 2. p. 425.*

Ungestalteter Kranichschnabel. W.

*Habitat - - - -  $\xi$*

\*64. PELARGONIUM *crassicaule.*

P. umbellis multifloris, foliis reniformibus obacumina-

tis. caule carnosio ramoso laevi. *Ait. Kew. 2. p. 428.*  
*l'Herit. geran. t. 26.*

Dickstämmiger Kranichschnabel. W.

*Habitat in Africae australis littoribus occidentalibus. †*

*Caulis digitalis crassitie pollicis, ramis brevibus ejusdem crassitiei semiuncialibus et brevioribus. Folia fere P. inquinantis. Petala obovata retusa. Stamina quinque fertilia. W.*

\*65. PELARGONIUM *peltatum.*

P. umbellis paucifloris, foliis quinquelobis integerrimis carnosis peltatis, ramis angulatis. *Ait. Kew. 2. p. 427.*

Geranium calycibus monophyllis, foliis quinquelobis integerrimis glabris subpeltatis, caule fruticoso. *Sp. pl. 947. Hort. cliff. 345. Roy. lugdb. 352. Burm. geran. 48. Mill. dict. n. 32 et ic. t. 140. Kniph. cent. 6. n. 43. Curt. mag. 20. Cavan. diff. 4. p. 232. t. 100. f. 1.\**

Geranium africanum, foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agriae macularis splendentibus et acetosae sapore. *Comm. prael. 52. t. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 130.*

Schildblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

*Caulis fruticosus adscendens, quandoque procumbens. W.*

\*66. PELARGONIUM *lateripes.*

P. umbellis multifloris, foliis cordatis quinquelobis subdentatis carnosis, ramis teretibus. *Ait. Kew. 2. p. 428.*  
*l'Herit. geran. t. 24.*

Seitenstielliger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Simile praecedenti, at rami teretes, et folia majora subdentata. W.*

67. PELARGONIUM *tetragonum.*

P. pedunculis bifloris, ramis tetragonis carnosis, corollis tetrapetalis. *Ait. Kew. 2. p. 427. l'Herit. geran. t. 23. Curt. mag. 136.*

Geranium carnosum, caule tetragono scandente, foliis lobatis crenatis glabris, pedunculis bifloris. *Lin. suppl. 305. Jacq. ic. rar. 1. t. 132. Collect. 1. p. 92.\* Roth. abh. 51. t. 11.\**

Geranium caule tetragono fruticoso, foliis lobatis carno-

sis, pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis. *Cavan. diff. 4. p. 231. t. 99. f. 2.\**

*Geranium (trigonum)* pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis, caule fruticuloso angulato, foliis petiolisque pilosis. *Scop. del. 1. p. 12. t. 5.*

Vierkantiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ̄ (v. v.)*

*Singularis succulenta sua carnositate, qua fragilis, et siccata parva sua folia facile perdit, inde in Herbariis plerumque aphylla.*

\*68. PELARGONIUM *cordatum*.

P. umbellis multifloris, foliis cordatis acutis dentatis, petalis inferis linearibus acutis. *Ait. Kew. 2. p. 427. Curt. mag. 165.*

*Geranium (cordifolium)* caule fruticoso, foliis cordatis subrotundo-acutis denticulatis tomentosis, umbellis numerosis terminalibus. *Cavan. diff. 4. p. 240. t. 117. f. 3.\**

α. P. foliis indivisis mollissimis planis. *Ait. l. c.*

β. P. foliis laciniatis crispis. *Ait. l. c.*

Herzblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ̄ (v. v.)*

*Corolla magna, petalis tribus inferioribus albis linearibus acutis, binis superioribus obovatis emarginato-cuspidatis violaceis, lineis binis ramosis atrosanguineis pictis. W.*

69. PELARGONIUM *cucullatum*.

P. umbellis submultifloris, foliis reniformibus cucullatis dentatis. *Ait. Kew. 2. p. 426.*

*Geranium calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis, caule fruticoso. Sp. pl. 946. Hort. cliff. 345. Hort. upf. 196. Roy. lugdb. 353. Burm. geran. 42. Berg. cap. 174. Mill. dict. n. 21. Cavan. diff. 4. p. 341. t. 106. f. 1.\**

*Geranium africanum* arborefcens ibisci folio rotundo, carlinae odore. *Herm. lugdb. 274. t. 275. Seb. musf. 1. t. 26. f. 2.*

*Geranium africanum maximum. Riv. pent. 325.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 127.*

Aufgerollblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. ̄ (v. v.)*

*Planta tota pubescens, reliquis altior rigidior erectior. Folia alterna cucullata s. basi contracta absque*

*lobis manifestis, undulata crenata. Calycis tubus limbo brevior. Petala incarnata venis rubris: bina superiora venis atro-purpureis.*

*Corolla est violacea. W.*

\*70. PELARGONIUM *angulosum.*

*P. umbellis multifloris, foliis rotundatis cucullatis angulosis dentatis. Ait. Kew. 2 p. 426.*

*Geranium (acerifolium) caule erecto fruticoso, foliis angulosis acutis dentatis subcucullatis, floribus umbellatis. Cavan. diff. 4. p. 243. t. 112. f. 2.\**

*Geranium (cucullatum & fimbriatum) calycibus monophyllis foliis cordato-angulatis, crenis purpureis fimbriatis. Burm. geran. 42.*

*Geranium africanum arborescens, foliis cucullatis angulosis. Dill. elth. 155. t. 129. f. 156.*

*Geranium africanum arborescens ibisci folio anguloso, floribus amplis purpureis. Martyn. cent. 28. t. 28.*

*Geranium capense aceris folio. Petiv. gazop. t. 84. f. 5.*

*Eckiger Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

\*71. PELARGONIUM *acerifolium.*

*P. umbellis subquinquefloris, foliis palmato-quinquelobis serratis inferne cuneatis indivisis. Ait. Kew. 2. p. 427. l'Herit. geran. t. 21.*

*Geranium (citriodorum) caule suffruticoso, foliis subcucullatis quinquelobis serratis, citrum redolentibus. Cavan. ic. 1. p. 6. t. 8.\**

*Ahornblättriger Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

*Folia quinqueloba, summa triloba, rigida, basi cuneiformia, acute dentata, utrinque pubescentia. W.*

72. PELARGONIUM *papilionaceum.*

*P. umbellis multifloris, foliis subrotundo-cordatis angulatis, petalis binis superioribus obovatis duplo calyce longioribus, tribus inferioribus linearibus calyce duplo brevioribus. W.*

*P. umbellis multifloris, foliis subrotundo-cordatis angulatis, corollis papilionaceis, alis carinaque minutis. Ait. Kew. 2. p. 423.*

*Geranium calycibus monophyllis, corollis papilionaceis, alis carinaque minutis, foliis angulatis, caule fruticoso. Sp. pl. 945. Hort. cliff. 345. Hort. upf. 197. Roy.*

lugdb. 353. *Burm. geran.* 49. *Mill. dict. n.* 27.  
*Kniph. cent.* 7. n. 27.

*Geranium caule fruticoso, foliis alternis cordatis lobatis rugosis. Cavan. diff.* 4. p. 244. t. 112. f. 1.\*

*Geranium africanum arborescens, flore veluti dipetalo eleganter variegato. Dill. elth.* 124. t. 128. f. 155.

*Geranium africanum arborescens, malvae folio mucronato, petalis florum inferioribus vix conspicuis. Mart. cent.* 15. t. 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 125.

Schmetterlingsblütiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. v.)

*Petala tria inferiora calycinis foliolis minoribus sunt; superiora retusa.*

\*73. *PELARGONIUM cortusae-folium.*

*P. umbellis multifloris, foliis cordatis inciso-lobatis undatis obtuse dentatis, stipulis subulatis. Ait. Kew.* 2. p. 428. *l'Herit. geran.* t. 25.

Cortusablättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat in Africae australis littoribus occidentali-bus.* †

*Folia undulato-plicata Cortusae. Umbella multiflo-ra. Petala omnia obovata, superiora bina parum la-tiora retusa.* W.

\*74. *PELARGONIUM fuscatum.*

*P. umbellis quadrifloris, foliis cordatis quinquelobis, superioribus subpalmatis dentatis zonatis.* W.

*P. (fuscatum) umbellis quadrifloris, foliis cordato-subrotundis subquinelobis, acute serratis glabriusculis, stipulis ovatis, caule fruticoso erecto, juniore scabro.*

*Jacq. ic. rar.* 3. t. 540. *Collect.* 4. p. 186.\*

Braunefleckter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* †

*Rami juniores scabri. Folia seniora cordato-subrotunda quinqueloba dentata, lobis obtusiusculis, juniora profunde triloba, lobis lateralibus bilobis acutiusculis apice dentatis. Zona fusca in foliis junioribus. Umbella quadriflora. Petala bina superiora obovata purpurea basi nervis ramosis atropurpureis picta; tria inferiora angustolanceolata obtusa alba apice leviter incurvata.* W.



\*75. PELARGONIUM *saniculaefolium*. W.

P. umbellis subquinquefloris, foliis subrotundo-cordatis quinquelobis dentatis planis glaucis zonatis. W.

P. (*cortusaefolium*) umbellis subquadrifloris, foliis cordatis inciso-lobatis acute dentatis glaucis glabris, stipulis ovatis caule fruticoso erecto. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 539. *Collect.* 5. p. 134.\* (*excluso synonymo Aitoni.*)

Geranium (*tabulare*) caule fruticoso, calycibus monophyllis, foliis peltatis rotundatis angulosis dentatis glabris. *Burm. geran.* 44. t. 1. *Cavan. diff.* 4. p. 232. t. 100. f. 2.\*

Geranium africanum, folio anguloso circulo nigro notato. *Herm. afr.* II.

Geranium africanum floribus rubellis, foliis glabris cordiformibus ferratis, circulo purpureo inscriptis. *Raj. hist.* 3. p. 514.

Sanickelblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. † (v. v. f. fl.)

Folia plana glauca glabra zona fusca signata. Petioli longissimi horizontales triplo quaaruplove foliis longiores. Stipulae ovatae obtusae. Petala bina superiora obovata retusa violacea supra medium macula saturatiore et basi nervis ramosis picta; tria inferiora albedo-incarnata lineari-lanceolata obtusa. W.

\*76. PELARGONIUM *patulum*.

P. pedunculis bifloris, foliis cordato-reniformibus inciso-lobatis glaucis acute dentatis, summis sessilibus. W.

P. pedunculis bifloris, foliis subreniformibus lobato-incisis acute crenatis, supra glabris, caule fruticoso, filamentis decem, sex fertilibus. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 541. *Collect.* 4. p. 187.\*

Ausgebreiteter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. †

Caulis bipedalis ramosus tenuis fruticosus. Folia superne glabra inferne hirsutiuscula glaucescentia immaculata, cordato-reniformia inciso-lobata acute dentata. Petioli longissimi horizontales vel angulo obtuso patentes. Folia in summo caule revera sessilia. Stipulae ovato-lanceolatae. Pedunculi biflori. Petala lanceolato-cuneiformia obtusa incarnata, bina superiora retusa et basi circulo sanguineo picta. Stamina sex fertilia. W.

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

U u

\*77. PELARGONIUM *grandiflorum*.

P. pedunculis trifloris, foliis quinquelobo palmatis dentatis, petalis calyce triplo longioribus. W.

Geranium (*grandiflorum*) calycibus monophyllis, foliis quinquelobis glabris dentatis, floribus amplissimis subalbidis. *Andréus reposit.* 1. p. 12. t. 12.

Großblütiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Ab omnibus cognitis flore maximo distinctum. Folia quinquelobo-palmata glaucescentia glabra, lobis oblongis acutis divergentibus dentatis. Stipulae oblongae obtusae. Pedunculi triflori. Corolla alba, petalis uncialibus, tribus inferioribus lanceolato cuneiformibus obtusis: binis superioribus obovatis basi sanguineo striatis. W.*

78. PELARGONIUM *variegatum*.

P. pedunculis subbifloris, foliis quinquelobis glaucis, lobis trifidis dentatis. W.

Geranium (*variegatum*) glaucum, calycibus monophyllis, foliis alternis trifidis quinquepartitis, lobis trifidis serratis, stipulis cordatis ovatis, umbella pauciflora. *Lin. suppl.* 305.

Geranium foliis alternis quinquelobis, lobis trifidis serrato-dentatis, stipulis latis cordatis, pedunculis bifloris. *Cavan. diff.* 4. p. 251. t. 118. f. 3.\*

Bunter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Habitu P. acetosi f. hybridi absque ulla hirsutie. Petioli teretes. Stipulae latae aequales cordatae. Flores magni variegati.*

79. PELARGONIUM *Cotyledonis*.

P. umbellis compositis, foliis cordatis peltatis rugosis pubescentibus subtus tomentosis, caule crasso carnoso nudo. W.

P. umbellis compositis, foliis cordatis peltatis rugosis, caule carnoso. *Ait. Kew.* 2. 428. *L'Herit. geran.* t. 27.

Geranium calycibus monophyllis, foliis cordato-orbiculatis peltatis cucullatis crenatis pubescentibus. *Mant.* 569.

Nabelkrautartiger Kranichschnabel. W.

*Habitat in insula St. Helena et ad Cap. b. spei. † (v. f. f. fl)*

*Folia peltata rugosa superne pubescentia, subtus mollissime tomentosa reticulato-venosa, margine obsolete*

*lobato crenato. Pedunculus communis trifidus, pedicellis umbelliferis. Petala subrotunda parum inaequalia. Caulis carnosus pollice crassior ramosus nudus. W.*

\*80. PELARGONIUM *echinatum*.

P. umbellis multifloris, foliis ovato-cordato subulatis crenatis, caule crasso carnoso, stipulis persistentibus spinulentibus tecto. W.

P. (*echinatum*) caule carnoso, stipulis spinulentibus, foliis cordato-subrotundis tri-quinquelobis, floribus umbellatis, umbellis subseptemfloris. *Curt. mag.* 309.

P. (*hamatum*) caule carnoso, floribus umbellatis, foliis cordatis trilobis mollibus, stipulis subulatis recurvis spiniformibus. *Jacq. hort. Schönb.* 2. p. 7. t. 138.\*

Stacheliger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. h̄ (v. v.)*

Caulis crassitie digiti et ultra, carnosus ramosus; stipulis persistentibus lanceolatis recurvis spinulentibus obsitus. Folia subtriloba obtusa pubescentia subtus tomentoso-sericea mollissima. Umbella quinque-ad octoflora. Petala incarnato-alba obovata, superiora bina retusa basi maculis tribus sanguineis picta. W.

\*81. PELARGONIUM *australe*. W.

P. umbellis multifloris capitatis, foliis cordatis sublobatis subtus villosis. W.

Südlicher Kranichschnabel. W.

*Habitat in Nova Hollandia. h̄ (v. v.)*

Rami juniores canescentes tenuissime villosi. Folia cordata obtusa subplicata vix lobata, potius repanda crenata, superne glabra inferne villosa. Petioli longi canescentes. Stipulae lanceolatae pubescentes. Umbella 12-15-flora, capitata. Calyces villosi, laciniis lanceolatis acutis. Corolla pallide incarnata, petalis lanceolato-ovatis, binis superioribus retusis basi linea bipartita ramosa pictis. Accedit quoad foliorum formam ad P. altheidem sed flores duplo majores. W.

82. PELARGONIUM *vitifolium*.

P. floribus capitatis, foliis cordatis trilobis scabriusculis, caulibus erectis. *Ait. Kew.* 2. p. 425.

Geranium calycibus monophyllis, foliis adscendentibus lobatis pubescentibus, floribus capitatis, caule fruticoso. *Sp. pl.* 947. *Hort. ups.* 196. *Burm. geran.* 40. *Mill. dict. n.* 26.

Geranium caule fruticoso, foliis oppositis lobatis rugosis

- pubescentibus, floribus capitatis. *Cavan. diff. 4. p. 245. t. III. f. 2. \**
- Geranium africanum* arborescens vitis folio odore meliferae. *Dill. elth. 152. t. 126. f. 153.*
- Geranium capense* ribesii folio. *Petiv. gazoph. t. 84. f. 6.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 131.*
- Weinblättriger Kranichschnabel. W.
- Habitat ad Cap. b. spei. ̄ (v. v.)*
83. **PELARGONIUM capitatum.**
- P. floribus capitatis, foliis cordatis lobatis undatis mollibus, caulibus diffusis. *Ait. Kew. 2. p. 425.*
- Geranium calycibus* monophyllis, foliis lobatis undatis villosis, floribus capitatis, caule fruticoso diffuso. *Sp. pl. 947. Hort. upf. 196. Burm. geran. 41. Mill. dict. n. 25. Kuiph. cent. 9. n. 41. Cavan. diff. 4. p. 249. t. 105. f. 1. \**
- Geranium calycibus* monophyllis, floribus capitatis, foliis cordatis lobatis crenatis pilosis. *Hort. cliff. 345. Roy. lugdb. 353.*
- Geranium africanum* frutescens malvae folio laciniato odorato. *Herm. lugdb. 277. t. 278.*
- Geranium malvae* folio. *Riv. pent. 326.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 132.*
- Kopfförmiger Kranichschnabel. W.
- Habitat ad Cap. b. spei. ̄ (v. v.)*

\*84. **PELARGONIUM glutinosum.**

- P. umbellis paucifloris, foliis cordatis hastato-quinquangulis viscosis. *Ait. Kew. 2. p. 426. l'Herit. geran. t. 20. Curt. mag. 143.*
- Geranium (glutinosum)* calycibus monophyllis, foliis trilobis cum lobo medio majore trilobato acutis, inaequaliter serratis glutinosis, facie lucidis, subtus scabris, caule fruticoso. *Jacq. ic. rar. 1. t. 131. Collect. 1. p. 85. \**
- Geranium (viscosum)* caule fruticoso, foliis cordatis quinquelobatis acutis dentatis viscosis sinuatis, floribus umbellatis. *Cavan. diff. 4. p. 246. t. 108. f. 1. \* Scop. del. infub. 2. p. 27. t. 14. \**
- Geranium (crataegifolium)* calycibus monophyllis, foliis cordatis denticulatis acutis quinquangulis, lobis

infirmis divaricatis, caule fruticoso. *Roth. abh. p. 50.*  
t. 9. \*

Klebriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ̄ (v. v.)*

85. PELARGONIUM *hispidum*.

P. umbellis multifloris paniculatis, foliis palmatis denticulatis tomentosis hispidis. W.

Geranium calycibus monophyllis, caule fruticoso hispido, foliis palmatis dentato-laceris hispidis, umbellis compositis, involucris reflexis. *Lin. suppl. 303. Cav. diff. 4. p. 248. t. 110. f. 1. \**

Rispenblütiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ̄ (v. v.)*

*Caulis fruticans teres ramosus altitudine bipedali et ultra. Folia alterna petiolata palmata incisa dentata f. lacera utrinque hispida. Umbellae terminales compositae; universalis triradiata, partiales quinque f. sex radiatae, radiis brevioribus. Involucra et Involucella pentaphylla reflexa marcescentia. Flores parvi. Styli capillares. Stigmata quinque. Singularis hispidis omnibus partibus et umbellis compositis.*

*In planta culta flores in umbellis paniculatis. W.*

\*86. PELARGONIUM *tomentosum*.

P. umbellis multifloris subpaniculatis, foliis cordatis hastato-quinquelobis villosis mollissimis. W.

P. (*tomentosum*) umbellis multifloris simplicibus compositisque, foliis cordatis subquinquelobis ferratis tomentosis mollissimis, caule carnosio. *Jacq. ic. rar. 3. t. 537. Collect. 5. p. 140. \**

Filziger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ̄ (v. v.)*

*Foliorum forma fere ut in P. glutinoso sed rami petioli et folia utrinque pilis longis albis erectis dense sunt tecta. Umbellae subpaniculatae. Petala lanceolata obtusa alba basi linea brevissima sanguinea colorata. Filamenta sanguinea. Antherae aurantiae. W.*

\*87. PELARGONIUM *ribifolium*.

P. umbellis multifloris, foliis cordatis hastato-subquinquelobis scabris. W.

P. (*ribifolium*) umbellis multifloris depressis subdimidiatis, foliis cordatis trilobis ferratis hirsutulis, lobis

lobato incisus, caule carnosio. *Jacq. ic. rar. 3. t. 538. Collect. 5. p. 141.\**

Iohannisbeerblättriger Kranichschnabel. W.  
*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Petala alba lanceolata obtusa. Filamenta alba. Antherae aurantiae. Simile praecedenti, sed diversum: foliis minoribus non villosis sed scabris a pilis raris brevibus, conveniunt forma et magnitudine cum Ribete rubro, umbellis depressis, calycis tubo longitudine laciniarum, nec ut in praecedente iis brevior, petalis et filamentis albis absque ullo alio colore. W.*

88. PELARGONIUM *quercifolium*.

P. umbellis submultifloris, foliis cordatis pinnatifidis crenatis, sinubus rotundatis, filamentis apice adscendentibus. *Ait. Kew. 2. p. 420. l'Herit. geran. t. 14.*

Geranium (*quercifolium*) calycibus monophyllis, foliis pinnatifidis, sinubus rotundatis, lobis crenatis, floribus umbellatis. *Lin. suppl. 306.*

Geranium (*quercifolium*) caule fruticoso, foliis sinuatis, lobis rotundatis crenatis oblongis, floribus umbellatis. *Cavan. diff. 4. p. 246. t. 119. f. 1.\**

Geranium therebinthinaceum. *Murray in Comment. Götting. 1785. p. 88. t. 4.\**

β. P. foliis duplicato-pinnatifidis. *l'Herit. geran. t. 15.*  
Eichenblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

\*89. PELARGONIUM *graveolens*.

P. umbellis multifloris subcapitatis, foliis palmatis septemlobatis, laciniis oblongis obtusis, margine revolutis. *Ait. Kew. 2. p. 423. l'Herit. geran. t. 17.*

Geranium (*therebinthinaceum*) caule arborecente, foliis duplicato-trifidis, lobis latis incisus crenatis, umbellis multifloris. *Cavan. diff. 4. p. 250. t. 114. f. 1.\**

Starkkriechender Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

\*90. PELARGONIUM *asperum*.

P. umbellis subquinquefloris capitatis, foliis palmatis septemlobatis, laciniis oblongis obtusis margine crispato-denticulatis scaberrimis. W.

Pelargonium asperum. *Ehrh.*

Geranium (*Radula*) calycibus monophyllis, foliis pal-

matis inciso-ferratis scabris, caule fruticoso. *Roth. abh. p. 51. t. 10.\**

Scharfrandiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. § (v. v.)*

*Simillimum praecedenti, sed diversum: foliis parum angustioribus rigidis, margine argute crispato-denticulatis scaberrimis. Involucra ovata magna acuta. W.*

\*91. PELARGONIUM *balsameum.*

P. umbellis paucifloris, foliis palmatis quinquelobis basi cuneatis, laciniis lanceolatis remote dentatis. W.

P. umbellis paucifloris, foliis quinquepartitis hirtulis, lobis lanceolatis acutis incisus rigidulis, caule fruticoso.

*Jacq. ic. rar. 3. t. 543. Collect. 5. p. 136.\**

Balsamischer Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. §*

*Folia rigida hirta, basi cuneiformia, laciniis acutis remotis dentatis. Pedunculi tri-quadriflorique. Corolla incarnata, petalis cuneiformi-lanceolatis obtusis, binis superioribus obovatis emarginatis basi lineis tribus brevibus sanguineis punctatis pictis. W.*

\*92. PELARGONIUM *Radula.*

P. umbellis paucifloris, foliis palmato-bipinnatifidis scabris margine revolutis, laciniis linearibus. W.

P. umbellis paucifloris, foliis pinnatifido-laciniatis scabris margine revolutis, laciniis linearibus. *Ait. Kew. 2. p. 423. l'Herit. geran. t. 16.*

Geranium (*Radula*) caule fruticoso, foliis profundissime multifidis, laciniis linearibus pinnatis, pedunculis paucifloris. *Cavan. diff. 4. p. 262. t. 101. f. 1.\**

Geranium (*revolutum*) pedunculis subbifloris, foliis multifidis linearibus scabris ad oras revolutis, caule arboreo. *Jacq. ic. rar. 1. t. 133. Collect. 1. p. 84.\**

β. P. (*roseum*) umbellis paucifloris, foliis palmato-bipinnatifidis scabris margine revolutis, laciniis lanceolatis. W.

Raspelblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. § (v. v.)*

*Odor totius plantae balsameus therebinthinaceus. In varietate β quae laciniis latioribus atque brevioribus diversa odor est exacte florum rosae centifoliae. Varietas haec est hybrida proles matre P. Radula et patre P. graveolente orta, datur et varietas foliis ad-*

*huc latioribus odore rosae, minus grato, cujus pater P. Radula et mater P. graveolens est.* W.

\*93. PELARGONIUM *denticulatum*.

P. umbellis paucifloris, foliis palmato - bipinnatifidis viscosis margine planis, laciniis linearibus repandis. W.

P. (*denticulatum*) caule carnosio, umbellis paucifloris, foliis bipinnatifide pinnatis laciniatis planis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 5. t. 135.\**

Gezähnelter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. § (v. l.)*

*Simillimum praecedenti sed abunde distinctum: foliis viscosis, margine planis non revolutis et laciniis crenis obtusis margine obsitis.* W.

\*\*\*\*\* *Fruticosa, foliis trifidis ternatisque.*

\*94. PELARGONIUM *bicolor*.

P. umbellis multifloris, foliis cordatis trifidis undulatis hirsutis, laciniis trilobis dentatis obtusis. W.

P. umbellis multifloris, foliis ternatifidis lobatis dentatis undulatis villosis. *Aiton. Kew. 2. p. 425. Curt. mag. 201.*

*Geranium (bicolor) calycibus monophyllis, foliis cordatis tripartitis lobatis hirsutis, floribus capitatis, caule fruticoso. Murr. Syst. veg. ed. 14. p. 614. Jacq. hort. 3. p. 23. t. 39.*

*Geranium caule brevi fruticoso, ramis teretibus, foliis oppositis tripartitis hirsutis, lobis crispis dentatis, umbellis multifloris speciosis capitatis. Cavan. diff. 4. p. 248. t. III. f. I.\**

Zweyfarbiger Kranichschnabel. W.

*Habitat - - - § (v. v.)*

*Petala cuneiformi - lanceolata obtusa bina superiora obovata retusa omnia atro - violacea albo - marginata.* W.

\*95. PELARGONIUM *tricuspidatum*.

P. pedunculis bifloris, foliis tricuspibus, lobo intermedio productione subferrato, costa subtus muricata.

*Ait. Kew. 2. p. 430. l'Herit. geran. t. 30.*

Dreyspitziger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. §*

*Folia trifida basi cuneiformia, lobo intermedio productione subferrato, lateralibus integerrimis. Differt a sequente: foliis subtus tantum muricatis lobis latera-*



*libus integerrimis, pedunculis bifloris, tubo calycinis laciniis triplo longiore, qui tantum duplo laciniis longior in sequente, et corollis majoribus. W.*

96. PELARGONIUM *scabrum.*

P. umbellis paucifloris, foliis cuneatis semitrifidis scabris, lobis lanceolatis laxe serratis. *Ait. Kew. 2. p. 430. l'Herit. geran. t. 31. Jacq. ic. rar. 3. t. 542. Collect. 2. p. 327.\**

Geranium calycibus monophyllis, foliis cuneiformibus multifido-laciniatis scabris caule fruticoso. *Syst. veg. 511.*

Geranium calycibus monophyllis, foliis cuneiformi-trifidis multifidisve scabris, caule fruticoso. *Sp. pl. 946. Amoen. acad. 4. p. 281.\* Burm. geran. 39. t. 1.*

Geranium caule fruticoso lignoso, foliis cuneiformi-trifidis multifidisque scabris, umbellis paucifloris. *Cav. diff. 4. p. 247. t. 108. f. 1.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 126.*

Scharfblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. h̄ (v. f.)*

\*97. PELARGONIUM *spinosum. W.*

P. umbellis compositis paucifloris, foliis cuneiformibus trifidis dentatis, petiolis stipulisque persistentibus spinulentibus. W.

Geranium nova species. *Patterf. it. ed. germ. t. 13.*

Dorniger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. h̄*

*A Geranio spinoso diversissima planta, quae absque ulla descriptione depicta exstat in itinere Celeb. Paterf. W.*

\*98. PELARGONIUM *rigidum.*

P. umbellis multifloris, foliis subrotundis leviter trilobis obtusis scaberrimis planis, margine crispato-denticulatis. W.

Pelargonium rigidum. *Dom. ind. hort. cantab. p. 79.*  
Steifblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. h̄ (v. v.)*

*Frutex rigidus aspectu similis P. crispo tamen pluribus notis distinctissimus. Rami flexuosi scabri. Folia alterna longe petiolata rigida plana, subrotunda, basi truncata brevissime triloba obtusa, margine argute dentata, dentibus inaequalibus crispis, Stipulae*

*subrotundae acutae. Umbella quinque seu sexflora. Involucrum pentaphyllum foliolis subrotundis acutis. Petala albida oblonga obtusa, bina superiora obovata retusa, basi lineis binis violaceis colorata. W.*

99. PELARGONIUM *crispum*.

P. pedunculis subbifloris, foliis distichis subrotundo-cordatis trifidis undulato-plicatis scabris dentatis. W.

P. pedunculis subbifloris, foliis distichis cordatis trilobis crispis muricatis. *Ait. Kew. 2. p. 430. l'Herit. geran. t. 32. et 33.*

Geranium (*crispum*) calycibus monophyllis, foliis reniformibus crispis scabris, caule fruticoso. *Mant. 257.*

Geranium (*hermanniaefolium*) calycibus monophyllis, caule fruticoso, foliis lobatis crenatis subcucullatis, stipulis cordatis, involucrisque hispido-muricatis. *Lin. suppl. 305.*

Geranium (*crispum*) caule fruticoso, foliis cordatis lobatis dentatis crispis, stipulis cordatis, pedunculis uni-bifloris. *Cavan. diff. 4. p. 252. t. 109. f. 2.\**

Geranium calycibus monophyllis, foliis reniformibus quinquelobis plicatis crenatis crispis, caule fruticoso. *Berg. cap. 176.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 126.*

Krauser Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

Frutex rigidus. Folia minuta quinqueloba odore *Melissae*. Flores violacei. Pedunculi saepius biflori.

100. PELARGONIUM *hermannifolium*.

P. pedunculis bifloris, foliis cuneiformibus distichis scabris plicatis apice inciso-dentatis, W.

P. pedunculis bifloris, foliis cuneato-subrotundis incisifoliis hirtis rigidis distichis, caule fruticoso. *Jacq. ic. rar. 3. t. 545. Collect. 5. p. 137.\**

Geranium (*hermannifolium*) calycibus monophyllis, foliis cuneiformibus plicatis scabris superne serratis, caule fruticoso. *Mant. 569. Berg. cap. 177.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 126.*

Hermannienblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

Frutex erectus ramulis pubescentibus. Folia truncata plicata apice dentata indivisa scaberrima. Flores rubicundi.

*Differt omnino a P. crispo foliis minime divisis, Corolla albido-incarnata, petalis lanceolatis obtusis, binis superioribus obovatis emarginatis basi lineis binis sanguineis pictis. W.*

\* 101. PELARGONIUM adulterinum.

P. pedunculis subbifloris, foliis cordatis trilobis undulatis villosis mollibus. *Ait. Kew. 2. p. 431. l'Herit. geran. t. 34.*

Verfchwägerter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

*Folia obtusa triloba plicata utrinque pubescentia. Pedunculi uni-bi-vel triflori. Flores violacei magni, Petala inferiora oblongo-ovata, superiora bina maxima subrotunda basi venis binis ramosis saturatioribus picta. W.*

\* 102. PELARGONIUM semitrilobum.

P. pedunculis subbifloris, foliis subrotundis trifidis planis hirtis, lobis divaricatis apice serratis. W.

P. pedunculis subbifloris, caule frutescente, foliis semitrilobis hirtis, lobis oblongis obtusis superne serratis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 3. t. 130.\**

Halbdreylappiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*A praecedente distinctum: foliis profundius divisis lobis rectangule patentibus, floribus minoribus longe aliter coloratis aliisque uotis. Flores sunt pallide incarnati, petalis inferioribus lanceolatis obtusis, binis superioribus obovatis retusis basi sanguineo-striatis. W.*

\* 103. PELARGONIUM tripartitum. W.

P. pedunculis subtrifloris, foliis inferioribus trilobis, summis ternatis, lobis foliolisque cuneiformibus apice subinciso-dentatis. W.

P. (*trifidum*) caule lignoso, umbellis paucifloris, foliis obtuse serratis, inferioribus tripartitis, summis ternatis, stipulis subovatis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 5. t. 134.\**

Dreytheiliger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Frutex ramis tenuibus flexuosis elongatis. Folia utrinque villosa subtus glauca, inferiora tripartita, lobis cuneiformibus apice subincisis parce obtuse dentata;*

*summa ternata. Stipulae ovatae acutae. Umbellae tri-  
vel quinqueflorae. Petala elongata albido-ochroleu-  
ca, inferiora lanceolato-cuneiformia obtusa, bina su-  
periora longiora cuneiformia emarginata supra basin  
sanguinea. W.*

#### 104. PELARGONIUM *fulgidum.*

*P. umbellis multifloris geminatis, foliis ternatis, folio-  
lis sessilibus inciso-dentatis, intermedio elongato pin-  
natifido. W.*

*P. umbella gemina, foliis tripartitis pinnatifido-incisus,  
lacinia intermedia maxima. Ait. Kew. 2. p. 422.*

*Geranium calycibus monophyllis, foliis tripartitis incisus,  
intermedia majore, umbellis geminis, caule frutico-  
so carnosio. Sp. pl. 945. Vir. cliff. 67. Hort. cliff.  
498. Roy. lugdb. 353. Burm. geran. 52. Mill. dict.  
n. 31. Cavan. diff. 4. p. 253. t. 116. f. 2.\**

*Geranium africanum folio alceae, flore coccineo fulgidis-  
simo. Dill. elth. 156. t. 130. f. 137.*

*Geranium furinamenae chelidonii folio, flore coccineo,  
petalis aequalibus. Till. pis. 68. t. 26.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 123.*

*Leuchtender Kranichschnabel. W.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. 5 (v. v.)*

#### 105. PELARGONIUM *gibbosum.*

*P. umbellis multifloris, foliis ternatis, foliolis obtusis  
inciso-dentatis, intermedio cuneato petiolato trifido,  
caule nodoso, nodis tumidis. W.*

*P. umbellis multifloris, foliis pinnatis apice pinnato-con-  
fluentibus, geniculis carnosis gibbosis. Ait. Kew. 2.  
p. 422.*

*Geranium calycibus monophyllis, caule fruticoso, geni-  
culis carnosis gibbosis, foliis subpinnatis. Sp. pl. 946.  
Burm. geran. 50. Mill. dict. n. 30. Kniph. cent. 8.  
n. 46.*

*Geranium caule fruticoso carnosio, geniculis gibbosis,  
foliis pinnato-lobatis glaucis, corollis luteo-viridibus.  
Cavan. diff. 4. p. 265. t. 109. f. 1.\**

*Geranium calycibus monophyllis, geniculis nodosis, fo-  
liis duplicato-pinnatifidis. Hort. upf. 345.*

*Geranium calycibus monophyllis, caule carnosio nodoso,  
internodiis filiformibus, foliis lobato-pinnatifidis.  
Roy. lugdb. 354.*

*Geranium africanum* noctu olens tuberosum et nodosum  
aquilegiae foliis. *Herm. lugdb.* 284. t. 285. *Stiff.*  
*bot.* III. t. III. *Burm. afric.* t. 37. f. 2.

*Geranium* foliis aquilegiae. *Riv. pent.* 327.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 129.

Höckriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. v.)

\*106. PELARGONIUM *exstipulatum*.

P. umbellis paucifloris, foliis cordatis tripartito-lobatis  
dentatis canis, stipulis subnullis. *Ait. Kew.* 2. p. 431.  
*l'Herit. geran.* t. 35.

*Geranium (exstipulatum)* caule fruticoso, ramis ere-  
ctis, foliis alternis duplicato-trilobis crenatis glabris  
exstipulatis. *Cavan. diff.* 4. p. 253 t. 123. f. 1. \* *et*  
*diff.* 5. p. 271.

Nacktwinkliger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. v.)

Stipulae nullae ad foliorum seniorum petiolos, in ra-  
mis junioribus vero subulatae minutissimae. Folia ca-  
na tripartita, lobis cuneiformibus, apice inaequaliter  
grosse dentatis. Umbellae tri-quinqueflorae. Corollae  
pallide violaceae. W.

107. PELARGONIUM *ternatum*.

P. pedunculis subunifloris, foliis ternatis cucullatis sca-  
bris, foliolis sessilibus cuneiformibus inciso-denta-  
tis. W.

P. pedunculis unifloris, foliis ternatis scabris rigidis,  
foliolis cuneatis apice dentatis, filamentis decem, quin-  
que fertilibus, caule fruticoso. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 544.  
*Collect.* 5. p. 135. \*

*Geranium* calycibus monophyllis, foliis ternatis, folio-  
lis lobatis, lobis dentatis, floribus subumbellatis, cau-  
le hispido. *Lin. suppl.* 306.

*Geranium* caule fruticoso hispido, foliis oppositis ternatis,  
foliolis cuneatis inciso-trifidis serratis scabris. *Ca-*  
*van diff.* 6. p. 255. t. 107. f. 2. \*

Gedreyter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* †

Folia alterna, in ramis junioribus vero opposita. W.

108. PELARGONIUM *laevigatum*.

P. pedunculis subbifloris, foliis ternatis glaucis glabris,  
foliolis trifidis cuneatis, laciniis lineari-lanceolatis. W.

*Geranium (laevigatum) glaucum*, calycibus monophyllis, caule erecto, foliis pinnatifidis, laciniis integris lanceolatis. *Lin. suppl.* 306.

*Geranium* caule fruticoso glabro rubescente, foliis ternatis sublinearibus trifidis glaucis, pedunculis bifloris.

*Cavan. diff.* 4. p. 255. t. 121. f. 1. \*

Glatte Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* †

\*109. PELARGONIUM *fragile*.

*P. umbellis multifloris*, foliis ternatis carnosis inciso-dentatis, foliolis sessilibus cuneiformibus intermedio tripartito elongato. W.

*Geranium (fragile)* foliis carnosis pinnatis, caule fruticoso ramoso fragili, petalis linearibus, pedunculis erectis. *Andrews repos.* 1. p. 37. t. 37.

Zerbrechlicher Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* † (v. v.)

*Caulis tenuis fruticosus admodum fragilis. Folia alterna longe petiolata ternata, foliolis cuneiformibus sessilibus carnosis apice inciso-dentatis, intermedio majore tripartito, laciniis inciso-dentatis. Stipulae et Involucra membranacea. Flores magni. Petala ochroleuca, inferiora lanceolata obtusa, bina superiora cuneiformia retusa basi linea lata bipartita sanguinea picta. W.*

\*110. PELARGONIUM *incisum*.

*P. umbellis multifloris*, foliis ternatis, foliolis sessilibus tripartitis multifido-laciniatis. W.

*Geranium (incisum)* foliis multifidis crassis confertis, floribus umbellatis, pedunculis longissimis, caule erecto fruticoso. *Andrews repos.* 1. p. 67. t. 67.

Eingeschnittener Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* † (v. v.)

*Folia ternata, atro-viridia, foliola lateralia cuneiformia trifida laciniata, vel bipartita laciniis inciso-dentatis; foliolum intermediam cuneiforme irregulariter trifido-laciniatum. Stipulae fere nullae. Umbellae subquinqueflorae. Petala omnia lineari-spathulata alba, bina superiora basi sanguinea. W.*

\*\*\*\*\* *Fruticosa, foliis pinnatifidis pinnatisque.*

111. PELARGONIUM *carnosum*.

*P. umbellis multifloris*, foliis sinuato-pinnatifidis, laci-

- niis oblongis obtusis apice inciso-dentatis, petalis linearibus, caule crasso carnosio. W.
- P. umbellis multifloris laciniatis, foliis pinnatifidis, petalis linearibus, articulis carnosio-gibbosis. *Ait. Kew.* 2. p. 421.
- Geranium calycibus monophyllis, caule fruticoso, articulis carnosio-gibbosis, foliis pinnatifidis laciniatis, petalis linearibus. *Sp. pl.* 946. *Amoen. acad.* 4. p. 281. *Burm. geran.* 51. *Mill. dict. n.* 29. *Cavan. diff.* 4. p. 266. t. 99. f. 1.
- Geranium africanum carnosum, petalis angustis albican-  
tibus. *Dill. elth.* 153. t. 127. f. 154.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 128.
- Fleischiger Kranichschnabel. W.  
*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. v.)

\*112. PELARGONIUM *ferulaceum.* †

- P. umbellis multifloris, foliis pinnatis, foliolis inciso-  
dentatis undulatis, petalis longitudine calycis, caule  
crasso carnosio. W.
- Geranium calycibus monophyllis, foliis laciniatis multi-  
fidis, radice tuberosa. *Burm. geran.* 71.
- Geranium foliis pinnatis, pinnulis lobatis incisis revolu-  
tis, petalorum unico superiore erecto, reliquis quatuor  
dependentibus. *Cavan. diff.* 4. p. 265. t. 110. f. 2.\*
- P. foliis ferulaceis multifidis, flore rubello. *Burm. afr.*  
93. t. 36. f. 1.
- Seckenkrautartiger Kranichschnabel. W.  
*Habitat ad Cap. b. spei.* †

\*113. PELARGONIUM *alternans.*

- P. umbellis paucifloris, foliis pinnatis, foliolis petiolatis  
suboppositis cuneiformibus apice inciso-dentatis. W.
- Pelargonium alternans. *Wendl. hort. herrenhus.* 1. p.  
14. t. 9.\*
- P. (*alternatim-pinnatum*) caule fruticoso carnosio villo-  
so, ramis clavatis carnosis villosis, foliis alternis pin-  
natis, pinnis ternatis vel quinquelobatis villosis, flori-  
bus bi- et trifloris erectis. *Wendl. obs.* 53.\*
- Wechselfiedriger Kranichschnabel. W.  
*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. v.)

*Tota planta viridis, pilis rectis obsita. Folia pin-  
nata, pinnis brevissime petiolatis cuneiformibus apice  
inciso-dentatis undulatis suboppositis. Flores albi.  
Petala linearia alba calyce parum longiora bina supe-*

*riora ad apicem lineis binis rubris notata. Stamina quinque fertilia. W.*

\*114. PELARGONIUM *ceratophyllum*.

P. umbellis multifloris, foliis remote pinnatis carnosis teretibus, laciniis canaliculatis obsolete trifidis. *Ait. Herw. 2. p. 422. l'Herit. geran. t. 13. Curt. mag. t. 315.*

Hornblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Petala alba lanceolata acuta. W.*

\*\*\*\*\* *Fruticosa, foliis decompositis et supradecompositis.*

\*115. PELARGONIUM *crithmifolium*.

P. umbellis multifloris paniculatis, foliis bipinnatis carnosis apice dilatatis incis, petalis obtusis, superioribus basi crispis. *Smith. ic. pict. 1. p. 13. t. 13.\**

P. (*paniculatum*) caule carnos, umbellis paucifloris sparse paniculatis, foliis pinnatis sparse glabris, foliis incis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 6. t. 137.\**

Bacillenblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

\*116. PELARGONIUM *ramosissimum*. †

P. umbellis paucifloris subpaniculatis, foliis bipinnatis, foliolis subrotundis. W.

Geranium (*ramosissimum*) caule frutescente, foliis bipinnatis, pinnulis subrotundis glabris. *Cavan. diff. 4. p. 260.*

P. frutescens ramosum foliolis plurimis, subrotundis. *Burm. afr. 89. t. 34. f. 2.*

Vielästiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

117. PELARGONIUM *abrotanifolium*.

P. umbellis paucifloris, foliis digitato-pinnatis, foliolis linearibus trifidis. W.

P. caule fruticoso, floribus umbellatis paucis, foliis subrotundis pinnatis multifidis, laciniis linearibus obtusis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 6. t. 136.\**

Geranium (*abrotanifolium*) calycibus monophyllis, foliis multifidis linearibus incanis. *Lin. suppl. 304.*

Geranium caule fruticoso, foliis minimis ternatis trifidis, laciniis linearibus, floribus umbellatis. *Cavan. diff. 4. p. 256. t. 117. f. 1.\**

Stabwurtzblättriger Kranichschnabel. W.



*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. f.)*

Caulis *suffruticosus*, ramis a rudericibus *stipularum foliorumque inaequalibus*. Folia *petiolata triternata incana, quasi fastigiata, foliolis seu segmentis linearibus obtusis, omnibus simul ambitu reniformi*. Flores *umbellati purpurei, calycibus monophyllis*.

\*118. PELARGONIUM *fruticosum*.

P. pedunculis *bifloris, foliis bipinnato-decompositis glabris, foliolis linearibus*. W.

Geranium (*fruticosum*) caule *fruticoso lignoso, foliis oppositis bipinnatis, pedunculis bifloris*. *Cavan. diff. 4. p. 163. t. 122. f. 2.\**

Strauchartiger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

\*119. PELARGONIUM *hirtum*.

P. umbellis *multifloris, foliis bipinnato-supradecompositis hirtis, foliolis linearibus obtusis, caule carnososquamoso decumbente*. W.

P. umbellis *subquinquefloris, foliis tripinnatis hirsutis, pinnis linearibus, caule carnososquamoso*. *Jacq. ic. rar. 3. t. 536. Collect. 5. p. 144.\**

Geranium caule *brevi hirto, foliis duplicato-pinnatis, laciniis capillaribus, umbellis pluribus terminalibus elongatis*. *Cavan. diff. 4. p. 258. t. 117. f. 2.\**

Geranium calycibus *monophyllis, corollis papilionaceis foliis pinnatis multifidis caule villososquamoso*. *Burm. geran. 64.*

Geranium calycibus *monophyllis, foliis duplicato-pinnatifidis, laciniis filiformibus*. *Roy. lugdb. 354.*

Behaarter Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Simillimum sequenti at differt: caule decumbente a stipulis persistentibus squamoso, qui in sequenti erectus nudus, foliolisque brevioribus obtusis*. W.

\*120. PELARGONIUM *tenuifolium*.

P. umbellis *multifloris, foliis bipinnato-supradecompositis hirsutis, foliolis lineari-subulatis, caule carnososquamoso nudo erecto*. W.

P. umbellis *multifloris, foliis decomposite pinnatis multifidis linearibus hirsutis, caule carnososquamoso, ramis floriferis gracilibus*. *Ait. Kew. 2. p. 421. l'Herit. geran. t. 12.*

Dünnblättriger Kranichschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

X x

## O C T A N D R I A.

## 1265. P I S T I A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. III2.*

*Cal.* spatha tubuloso-cucullata lingulata. *Cor.* 0.  
*Filamentum* laterale. *Antherae* 3-8. *Styl.* 1.  
*Capsf.* 1-locularis polysperma.

I. PISTIA *Stratiotes.*

*P. foliis obcordatis.* *Fl. zeyl.* 322. *Löfl. itin.* 281. *Jacq. amer.* 234. t. 148.\* *Swartz. obsf.* 343.\*

*P. aquatica villosa, foliis obovatis ab imo venosis, floribus sparsis foliis infidentibus.* *Brown. jam.* 329.

Kodda-pail palustris, folio oblongo specioso. *Plum. gen.* 30.

Kodda-pail. *Rheed. mal.* II. p. 63. t. 32.

Plantago aquatica. *Rumph. amb.* 6. t. 74.

β. *Stratiotes aegyptia.* *Bauh. hist.* 3. p. 787. *Morif. hist.* 3. p. 619. f. 15. t. 4. f. infer. *Vesl. aegypt.* 44. t. 45. *Raj. hist.* 1324.

*Stratiotes Hai-alem maoui.* *Alp. aegypt.* 106. t. 108.

*Lenticula palustris* VI. f. *aegyptia* f. *Stratiotes aquatica.* foliis sedo majore latioribus. *Bauh. pin.* 362. *Sloan. jam.* II. *hist.* I. p. 15. t. 2. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 10. p. 129.

Schwimmende Muschelblume. W.

*Habitat in Asiae, Africae, Americae meridionalibus natans.* 4. (v. l.)

*Radiculis Lemnae instar natans.* Folia in rosae formam expansa, diaphana viridia, superne glauco-velutina cuneiformia obtusa nervosa. Folia interiora erecta convoluta tomentosa. Flores albi axillares. Stolones e basi emittit minoribus plantis terminati. W.

## 1266. A I T O N I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. III3.*

*Cal.* 4-partitus. *Cor.* tetrapetala. *Styl.* 1. *Bacca* sicca quadrangularis unilocularis polysperma.

I. AITONIA *capensis.*

*Aitonia capensis.* *Lin. suppl.* 303. *Thunb. Act. lund.* I.

p. 166. c. fig. \* *Thunb. diff. Nov. Pl. Gen. 2. p. 52.*

*Cavan. diff. 5. p. 301. t. 159. f. 1.\**

Cotyledon foliis linearibus, flore quadrifido, fructu subrotundo. *Burm. afr. 53. t. 21. f. 2.*

Capische Aitonie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei prope Goudo-Rivier. h̄ (v. l.)*

Caulis fruticosus orgyalis. Rami alterni subteretes rugoso-angulati erecti glabri, gemmis nodulosis. Folia fasciculata lanceolata obtusa integerrima glabra. Pedunculi laterales solitarii uniflori glabri foliis breviores, saepe recurvi. Petala incarnata. Antherae flavae fusco-striatae. Fructus *Physalidis Alkekengi* assimilans.

## D E C A N D R I A.

### \*1267. CRINODENDRUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1114.*

*Cal. o. Cor. 6-petala campanulata. Styl. 1. Caps. 1-locularis trisperma trigona apice elastice dehiscens.*

#### \*1. CRINODENDRUM Patagua.

*Crinodendrum Patagua. Molin. chil. ed. germ. p. 154.*

*Cavan. diff. 5. p. 300. t. 158. f. 1.\**

Schöner Lilienbaum. W.

*Habitat in Chili. h̄*

Arbor speciosa sempervirens. Folia opposita petiolata lanceolata acuminata dentata venosa. Pedunculi uniflori solitarii erecti. W.

### 1268. CONNARUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1116.*

*Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Styl. 1. Caps. bivalvis unilocul. monosperma.*

#### \*1. CONNARUS africanus.

C. foliis ternatis, foliolis oblongis venosis acuminatis. W.

C. foliis trifoliatis, petalis ebarbatis, floribus paniculatis.

*Cavan. diff. 7. p. 375. t. 221.\* Vahl symb. 3. p. 86.\**

C. foliis ternatis, foliolis ovatis utrinque acutis subrotundis.

nervosis, floribus paniculatis monogynis. *Lamarck. encycl. 2. p. 96. \**

Africanische Baumbohne. W.

*Habitat in Sierrae Leonae montibus. †*

*Folia ternata glabra, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis venosis. Flores paniculati terminales. Capsula ovata acuta. W.*

2. **CONNARUS asiaticus.** W. †

C. foliis ternatis, foliolis subrotundo-ovatis venosis. W.

Connarus monocarpus. *Sp. pl. 944. Fl. zeyl. 248.*

Rhus zeylanicus trifolius phaeoli facie, floribus copiosis spicatis. *Burm. zeyl. 199. t. 89.*

Phaeolus arborescens zeylanicus monocarpus. *Raj. suppl. 438.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 143.*

Asiatische Baumbohne. W.

*Habitat in India orientali. †*

Arbor. Folia alterna ternata petiolata, foliolis ovatis acurinatissimis integerrimis glabris petiolatis aequalibus. Racemi erecti ramos terminantes. Calyx rufescens. *Figura Burmanni quodammodo cum nostro specimine convenit, sed ejusdem t. 109. propius accedit respectu pedunculorum crassiorum.*

\*3. **CONNARUS pentagynus.**

C. foliis ternatis, foliolis subrotundo-ovatis trinerviis, floribus pentagynis. W.

C. foliis omnibus ternatis trinerviis, floribus pentagynis. *Cavan. diff. 7. p. 376. t. 223. \**

C. foliis omnibus trifoliatis foliolis ovatis acutis subtus venosis, floribus pentagynis. *Lamarck. encycl. 2. p. 95. \**

Fünfgriffliche Baumbohne. W.

*Habitat in Madagascar, Guinea. † (v. l.)*

*A reliquis distinctissimus foliolis trinerviis venosis floribusque pentagynis. W.*

4. **CONNARUS decumbens.**

C. foliis ternatis, foliolis ovatis emarginatis, caule herbaceo decumbente. W.

C. (*decumbens*) foliis ternatis hirsutis, foliolis obovatis excisis, caule decumbente herbaceo. *Thunb. in Römer Archiv für die Botan. I. p. 2. t. I. \**

*Hermannia (triphylla)* foliis ternatis petiolatis planis obovatis. *Sp. pl.* 942. *Amoen. acad.* 6. afr. 25.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 117.

Liegende Baumbohne. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* †

*Habitus plantae a reliquis diversus. Caulis decumbens herbaceus pilosus. Stipulae ovatae acutae. Folia longe petiolata hirsuta, foliolis obovatis emarginatis, intermedio sessili. Flores in pedunculo longo subcapitati. W.*

\*5. **CONNARUS pinnatus.**

C. foliis ternatis pinnatisque, foliolis oblongis venosis, petalis basi bifetis. W.

C. foliis trifoliatis aut quinato-pinnatis, petalis basi bifetosis. *Cavan. diff.* 7. p. 375. t. 222.\*

C. foliis aliis trifoliatis, aliis pinnato-quinatis, foliolis oblongo-ovalibus, floribus monogynis. *Lamarck. encycl.* 2. p. 95.\*

Perim curigil. *Rheed. mal.* 6. p. 43. t. 24.

Gefiederte Baumbohne. W.

*Habitat in India orientali.* †

*Praeter folia pinnata ternatis mixta, differt adhuc petalis lanceolatis basi utrinque seta deflexa instructis. W.*

\*6. **CONNARUS Santaloides.**

C. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus aggregatis, floribus racemosis. *Vahl symb.* 3. p. 87.\*

Santaloides. *Fl. zeyl.* 408.

Vieltraubige Baumbohne. W.

*Habitat in India orientali.* †

*Arbor ramis teretibus glabris. Folia impari-pinnata bi-f. quadrijuga. Foliola interdum sesquipollicaria, integerrima acuminata glaberrima utrinque venoso-reticulata, supra nitida. Pedunculi axillares 4-6, folio dimidio breviores glabri, partiales sparsi versus apicem flores 3-4 pedicellati. Vahl l. c.*

\*7. **CONNARUS mimosoides.**

C. foliis pinnatis subdecemjugis, foliolis ovali oblongis emarginatis, racemis axillaribus. *Vahl. symb.* 3. p. 87.\*

Sinnpflanzenartige Baumbohne. W.

*Habitat in insulis Nicobaricis,* †

Rami teretes superne villosi. Folia alterna pinnata cum impari 9-11-juga. Foliola brevissime petiolata opposita vel alterna unguicularia interdum minora glabra obtusa profunde emarginata. Vahl, l. c.

## 1269. HUGONIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1117.

Cal. 5-partitus inaequalis. Cor. 5-petala. Styl. 5. Drupa monosperma, nuce friata subdecemloculari.

1. HUGONIA *Myrtax*.

H. spinis oppositis revolutis, foliis ovatis glabris integerimis. *Lamarck. encycl.* 3. p. 143. \*

H. spinis oppositis revolutis. *Fl. zeyl.* 249.

Cerasus zeylanica sarmentosa amara capreolata f. cornigera. *Burm. zeyl.* 57.

Aegoceras arbor zeylanica lauri fructu, cortice coltum olente. *Raj. dendr.* 45.

Myrtax frutex baccifer malabaricus, fructu calyculato rotundo monopireno. *Raj. hist.* 1570.

Modira-canni. *Rheed. mal.* 2. p. 29; t. 19.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 144.

Ganzblättriger Knebelbart. W.

Habitat in Malabaria, Zeylona. † (v. f.)

Spinae axillares cirrhi insiar revolutae oppositae interdum et solitariae. Possideo varietatem e Zeylona foliis obovatis majoribus, ramis flavescentibus inermibus. W.

\*2. HUGONIA *ferrata*.

H. spinis oppositis revolutis, foliis ovato-oblongis serratis, adultis utrinque glabris. *Lamarck encycl.* 3. p. 143. \*

H. (*Myrtax*) caule fruticoso, foliis ovato-lanceolatis serratis glabris, spinis oppositis revolutis. *Cavan. diff.* 3. p. 177. t. 73. f. 1. \*

Gefägter Knebelbart. W.

Habitat in insula Mauritii. †

Rami juniores, folia juniora subtus, pedunculi, bracteae et calyces tomento rufescenti sunt tecti. Folia adulta utrinque glabra oblongo-ovata acuminata re-

*mote ferrata venosa. Pedunculi gemini subumbellati terminales. W.*

\*3. HUGONIA *tomentosa.*

H. foliis oblongis ferratis utrinque tomentosis. W.

H. foliis ovatis tomentosis obsolete dentatis basi angustatis. *Cavan. diff. 3. p. 178. t. 73. f. 2. Lamarck eneycl. 3. p. 143.\**

Filziger Knebelbart. W.

*Habitat in insula Mauritiæ. ‡*

Planta forte inermis. Folia oblonga obtusa basi parum angustiora obtuse ferrata venosa utrinque tomentosa. Pedunculi axillares paniculati. W.

\*1270. S E N R A E A.

Senra. *Cavan. diff. 2. p. 83.*

*Cal.* duplex exterior triphyllus, interior 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Styl.* 5-fidus. *Caps.* 5-ocularis?

\*1. SENRAEA *incana. †*

Senra incana. *Cavan. diff. 2. p. 83. t. 35. f. 3.\**

Graue Senräa. W.

*Habitat in Arabia contra insulam Socotora.*

Tota planta incana tomentosa. Folia alterna petiolata semipollicaria et minora cordata truncato-tridentata ceterum integerrima quinquenervia. Pedunculi axillares brevissimi uniflori. Calyx exterior interiore multo major, foliolis ovatis obtusis cordatis nervosis integerrimis. Fructus maturus adhuc ignotus. W.

## 1271. GERANIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1118.*

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala regularis. *Nect.* glandulae 5 melliferae, basi longiorum filamentorum adnatae. *Arilli* 5 monospermi aristati ad basin receptaculi rostrati; Aristis nudis simplicibus (nec spiralibus nec barbatis).

\* *Pedunculis unifloris.*

I. GERANIUM *spinosum.*

*G.* pedunculis unifloris, caule carnosio nodoso, spinis solitariis strictis. *Mant.* 98.

*G.* caule carnosio nodoso, spinis subulatis, foliis cuneiformibus reflexis, pedunculis unifloris. *Cavan. diff.* 4. p. 195. f. 75. f. 2.\*

*G.* pedunculis simplicibus unifloris, foliis cuneiformisinuosis, ramis nodosis spiniferis. *Burm. geran.* 2.

*G.* spinosum et nodosum, foliis reflexis. *Burm. afr.* 18. t. 31.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 426.

Dorniger Storchschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* †

Planta succulenta. Caulis suffruticosus obvallatus undique tuberculis latis inaequalibus glabris. Spinae in singulo tuberculo subulata lignosa pollicaris, apice saepe foliolum proferens. Folia subpetiolata obovata integerrima s. parce crenata, adspersa punctis glandulosis. Calyx pentaphyllus, sub apice aristatus more *G. europaeorum*, absque tubo. Stamina 10 aequalia. Stylus ut in *europaeis*. Pedunculi uniflori.

\* 2. GERANIUM *sessiliflorum.*

*G.* acaule, pedunculis unifloris radicalibus, foliis reniformibus septemlobis, lobis trifidis. W.

*G.* radice napiformi squamosa, foliis subrotundis septempartitis laciniis trifidis, floribus sessilibus. *Cav. diff.* 4. p. 198. t. 77. f. 2.\*

Stiellofer Storchschnabel. W.

*Habitat ad fretum Magellanicum.* 2

Caulis nullus. Folia magnitudine *G. argentei* sed non sericea septemloba, lobis trifidis. Petioli biunciales. Flores magnitudine *G. robertiani*. Pedunculi longitudine floris radicales. W.



3. GERANIUM *sibiricum*.

G. pedunculis unifloris, caule erecto ramoso, foliis quinquelobo-palmatis, lobis oblongis inciso-dentatis. W.

G. pedunculis subunifloris, foliis quinquepartitis acutis, foliolis pinnatifidis. *Sp. pl.* 957. *Burm. geran.* 3. *Gmel. sib.* 3. t. 67. *Jacq. hort.* 1. p. 7. t. 19. *Mill. dict.* n. 16. *Kniph. cent.* 10. n. 48.

G. caule herbaceo villosissimo, foliis oppositis quinquepartitis, pedunculis subunifloris. *Cavan. diff.* 4. p. 198. t. 77. f. 1.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 424.

Sibirischer Storchschnabel. W.

*Habitat in Sibiria, China.* 4 (v. v.)

Caules pedales diffusi divaricati. Folia quinquepartita, lobis pinnatifidis. Pedunculus e singula bifurcatura, longus uniflorus, in medio geniculatus bracteis binis oppositis subulatis. Corolla alba striis purpureis, petalis vix emarginatis. Calyx pentaphyllus aristatus. Arilli subvillosi.

4. GERANIUM *sanguineum*.

G. pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis, *Sp. pl.* 958. *Burm. geran.* 3. *Pollich. pal.* n. 655. *Kniph. cent.* 7. n. 28. *Fl. dan.* 1107. *Hoffm. germ.* 245. *Roth. germ.* I. 295. II. 145.

G. caule articulato rubro hispido, foliis orbiculatis profunde 5-7-partitis, laciniis trifidis, pedunculis solitariis longissimis unifloris articulatis. *Cavan. diff.* 4. p. 195. t. 76. f. 1.\*

G. pedunculis unifloris, foliis septilobis, petalis bifidis. *Hall. helv.* n. 930.

G. pedunculis simplicibus unifloris. *Hort. cliff.* 343. *Fl. succ.* 571; 619. *Roy. lugdb.* 350. *Dalib. paris.* 206.

G. sanguineum maximo flore. *Bauh. pin.* 318.

G. VII. haematodes. *Clus. hist.* 2. p. 202.

G. columbinum erectum tenuius laciniatum, flore magno. *Loef. pruss.* 103. n. 18.

β. (*prostratum*) caule prostrato nodoso, nodis inflatis, foliis oppositis profunde quinquelobatis, lobis trifidis, corollis roseis variegatis. *Cav. diff.* 4. p. 196. t. 76. f. 3.\*

G. haematodes lancastrienſe, flore eleganter striato. *Dill. elth.* 163. t. 136. f. 163.

G. haematodes flore variegato, *Tournef. inst.* 267.

G. haematodes flore pallido minore, striis rubris verlicolore. *Pluk. alm.* 168.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 425.

Blutrother Storchschnabel. W.

*Habitat in Europae pratis siccis umbrosis β in Anglia, Suecia.* 24 (v. v.)

*Varietas β differt caule humiliori prostrato, floribus pallidis striatis; sed e seminibus hujus vidi plantam flore sanguineo caule altiore.* W.

\* \* *Pedunculis bifloris, Perennia.*

### 5. GERANIUM *tuberosum.*

G. pedunculis bifloris, foliis multipartitis, laciniis linearibus pinnatifidis obtusis. W.

G. pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis linearibus subdivisis obtusis. *Hort. cliff.* 343. *Roy. lugdb.* 350. *Burm. geran.* 9.

G. foliis albicantibus multipartitis, laciniis linearibus subpinnatis obtusis, pedunculis binis aut bifloris petalis emarginatis. *Cavan. diff.* 4. p. 199. t. 78. f. I.\*

Geranium tuberosum majus. *Bauh. pin.* 318.

Geranium bulbosum. *Lob. hist.* 377.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 408.

Knolliger Storchschnabel. W.

*Habitat in Italia.* 24 (v. f.)

*Caulis simplex in planta spontanea superne trifidus, ramo intermedio simplici pedunculo bifloro instructo, vel iterum trifido. Rami laterales trifidi, ramulis pedunculis solitariis bifloris instructis. Folia radicalia ampla, caulina tantum bina ad divisionem caulis ut bina alia in quolibet ramo laterali. Vidi varietatem vel speciem distinctam e Sibiria, cujus folia radicalia minutissima multipartita, laciniis linearibus trifidis, caulina vero multipartita laciniis linearibus integerrimis, ceterum habitus idem.* W.

### \* 6. GERANIUM *anemonefolium.*

G. pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-palmatis, laciniis bipinnatifidis dentatis, caule fruticoso. W.

G. (*anemonefolium*) foliis palmatis, foliolis pinnatifidis, caule fruticoso. *Ait. Kew.* 2. p. 432. *l'Herit. geran.* t. 36. *Curt. mag.* 206.

G. (*palmatum*) caule dichotomo, internodiis aphyllis longissimis, foliis radicalibus palmatis, lobis pinna-

tis, superioribus hastato-trilobis. *Cavan. diff.* 4. p. 216. t. 84. f. 2.\*

- G. (*rutilans*) caule fruticoso, foliis quinatis glabris, foliolis pinnatifidis, lateralibus basi paullulum connatis, pedunculis bifloris, calyce aristato, fructu glabro. *Ehrh. Beitr.* 7. p. 164.

Anemonenblättriger Storchschnabel. W.

*Habitat in Madera.* † (v. v.)

## 7. GERANIUM *macrorrhizum.*

- G. pedunculis bifloris, calycibus globofo-inflatis, petalis integris, foliis quinquelobis dentatis, caule dichotomo. W.

G. pedunculis bifloris, calycibus inflatis, petalis integris, pistillo longissimo, scapo dichotomo. *Mant.* 343. *Jacq. ic. rar.* I. t. 134. *Collect.* I. p. 258.\*

G. pedunculis bifloris, calycibus inflatis, pistillo longissimo. *Hort. cliff.* 343.\* *Roy. lugdb.* 350. *Burm. geran.* 10. *Mill. dict n.* 2. *Kniph. cent.* II. n. 52.

G. foliis oppositis quinquelobatis, calycibus inflatis sphaericis rubris, pistillo declinato longissimo. *Cavan. diff.* 4. p. 212. t. 85. f. 1.\*

G. batrachioides odoratum. *Bauh. pin.* 318. *Morif. hist.* 2. p. 514. f. 4. t. 16. f. 15.

G. batrachioides longius radicatium odoratum. *Bauh. hist.* 3. p. 477.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 408.

Großwurzlicher Storchschnabel. W.

*Habitat in Italia, inque Carinthia.* † (v. v.)

Folia lobata, incisa, obtusiuscula, supra mollia. Radix repens. Scapi aphylli, erecti, dichotomi. Calyces aristati, globosi, angulati; foliolis 2 exterioribus majoribus. Petala orbiculata, integra, planā, patentia, purpurea. Stamina nutantia. Pistillum declinatum, in fructu longius.

## 8. GERANIUM *phaeum.*

G. pedunculis solitariis oppositifoliis, calycibus subaristatis, caule erecto, petalis undulatis. *Syst. Veg.* 514. *Hoffm. germ.* 243. *Roth. germ.* I. 293. II. 137.

G. pedunculis bifloris foliisque alternis, calycibus subaristatis, caule erecto, petalis undulatis. *Burm. ger.* II. *Jacq. vind.* 122. *Mill. dict. n.* 3. *Mattusch. sil. n.* 505. *Kniph. cent.* 5. n. 35.

- G. caule herbaceo erecto, foliis alternis hirsutis palmato-  
 quinquelobis dentato-incisis, floribus subspicatis, caly-  
 cibus mucronatis. *Cavan. diff.* 4. p. 210. t. 89. f. 2.
- G. foliis rugosis hirsutis, semiseptilobis, lobis dentatis,  
 petalis ferratis, acuminatis. *Hall. helv. n.* 934.
- G. pedunculis bifloris alternatim cauli integro superne  
 nudiusculo infidentibus. *Hort. cliff.* 343.\* *Hort.*  
*upf.* 198. *Roy. lugdb.* 350.
- β. *Geranium batrachioides hirsutum*, flore atro-rubente.  
*Bauh. pin.* 318.
- Geranium* I. pullo flore. *Clus. hist.* 2. p. 99.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 409.  
 Rothbrauner Storchschnabel. W.  
*Habitat in alpihus Pannonicis, Helveticis, Styriacis.*  
 4 (v. v.)

### 9. GERANIUM *fuscum*. †

- G. pedunculis bifloris oppositifoliis geminis, caule pa-  
 tulo, petalis integerrimis. *Mant.* 97.
- G. pedunculis bifloris, foliis quinquelobis incisis, petala  
 reflexis. *Mill. dict. n.* 7.
- G. phaeum f. *fuscum* petalis reflexis. *Morif. hist.* 2. p. 515.
- G. montanum *fuscum*. *Bauh. pin.* 318.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 410.  
 Brauner Storchschnabel. W.  
*Habitat in Europa australi.* ‡
- Invitus hanc separo a G. phaeo, cum quo convenit  
 multis, etiam Corolla tota expansa atra: sed differt  
 Foliis rigidis, Corolla magis reflexa, minor: petalis  
 suborbiculatis mucronatis, integerrimis, planis; Pe-  
 dunculis non solitariis bifloris, sed 2 distinctis.* H. U.  
*Est varietas praecedentis secundum Clariff. Cava-  
 nilles.* W.

### 10. GERANIUM *reflexum*.

- G. pedunculis bifloris foliisque alternis, petalis reflexis  
 laciniatis longitudine calycis mutici. *Mant.* 257.
- G. caule herbaceo, foliis alternis 5-7-lobatis acutis, pe-  
 talis reflexis laciniatis, basi inter se hiantibus, calycibus  
 muticis. *Cavan. diff.* 4. p. 208. t. 81. f. 1.\*
- G. flore purpureo reflexo, italicum. *Barr. ic.* 39.  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 410.  
 Zurückgebogner Storchschnabel. W.  
*Habitat in Italia.* 4 (v. v.)

*Affine G. phaeo et fusco. Caulis petalis, dichotomus f. bifidus, patulus, pubescens. Folia superiora alterna, quinqueloba, rugosa, tomentosa, non maculata. Flores cernui: pedunculis oppositifoliis, cernuis. Calyx muticus. Petala rubra, subincisa, calyce non longiora, reflexa, basi inter se hiantia. Stamina corollis fere longiora, nutantia. Antherae flavae margine fusco.*

\*11. GERANIUM *lividum.*

G. foliis semiseptilobis, calycibus simplicibus pilosis, petalis planis subundulatis. *Ait. Kew. 2. p. 434. l'Herit. geran. t. 39.*

G. (*patulum*) foliis septilobis pilosis incisilis, caule subprostrato, petalis subdentatis patentissimis. *Vill. delph. 3. p. 371.*

G. foliis semiseptilobis rugosis dentatis, petalis planissimis circumferratis indivisis. *Hall. helv. n. 935.*

Bläulicher Storchschnabel. W.

*Habitat in alpibus Helvetiae, Galliae. 2 (v. f.)*

*Folia septemloba, lobis oblongis acuminatis dentatis, subtus pubescentia. Caulis et Pedunculi pilis patentibus obsiti. Calyces non mucronati villosi. Petala crenata acutiuscula plana. W.*

*In hoc et in G. phaeo atque reflexo arilli sunt carinati, basi pilosi apice transversim pilicati. W.*

12. GERANIUM *nodosum.*

G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis, foliis caulinis trilobis ferratis, lobis oblongis acuminatis, caule tetragono, arillis undique pilosis aequalibus. W.

G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis, foliis caulinis trilobis integris ferratis, subtus lucidis. *Sp. pl. 953.*

G. pedunculis bifloris, foliis caulinis trilobis integris ferratis: summis subsessilibus. *Hort. cliff. 343. Roy. lugdb. 350. Burm. geran. 7. Mill. dict. n. 5.*

G. caule tetragono rubescente erecto, foliis 3-5-lobis dentatis, desuper scabris, subtus lucidis, petalis striatis. *Cavan. diss. 4. p. 208. t. 80. f. 1. \**

G. nodosum. *Bauh. pin. 318. Moris. hist. 2. f. 5. t. 16. f. 22.*

G. 5, 6, plateau. *Clus. hist. 2. p. 101.*

G. magnum folio trifido. *Bauh. hist. 3. p. 478.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 411.*

Knotiger Storchschnabel. W.

*Habitat in Anglia et Gallia australi.* 24 (v. v.)

Caules *diffusi, compressi magis quam in G. striato.*  
 Petala *emarginata, incarnata striis tribus purpureis.*

13. GERANIUM *striatum.*

G. pedunculis bifloris, petalis bilobis reticulato-venosis, foliis summis trilobis dentatis, lobis ovatis acutis, caule tereti, arillis glabriusculis basi villosis. W.

G. pedunculis bifloris, foliis quinquelobis: lobis medio dilatatis, petalis bilobis venoso-reticulatis. *Amoen. acad. 4. p. 282. Burm. geran. 6. Mill. dict. n. 8. Curt. mag. 55.*

G. caule herbaceo decumbente, foliis quinquelobis, lobis dentatis medio dilatatis, petalis bilobis venoso-reticulatis. *Cavan. diff. 4. p. 207. t. 79. f. 1. \**

G. romanum vericolor s. *striatum.* *Park. parad. 229. Morif. hist. 2. p. 516. f. 5. t. 10. f. 24. Raj. hist. 1063.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 412.*

Gestreifter Storchschnabel. W.

*Habitat in Italia.* 24 (v. v.)

*Folia macula fusca ad sinus in pagina superiore.*

\*14. GERANIUM *angulatum.*

G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis reticulato-venosis, foliis summis quinquelobis dentatis, radicalibus septemlobis. W.

G. foliis radicalibus subseptemlobis incisis hirsutis, caule erecto subangulato, petalis venosis. *Curt. mag. 203. Eckiger Storchschnabel. W.*

*Habitat - - - 24*

*Respectu magnitudinis medium inter G. pratense et aconitifolium, quoad floris colorem vero simile G. striato et sanguineo β. Corolla magnitudine G. pratensis sed petala pallide incarnata venis sanguineis reticulata. W.*

\*15. GERANIUM *ibericum.*

G. pedunculis bifloris, petalis trilobo-emarginatis, foliis subseptemlobis inciso-dentatis, caule villosa. W.

G. (*ibericum*) caule herbaceo dichotomo villosa, foliis oppositis quinquepartitis incisis, petalis trilobis, medio brevioribus cuspidatis. *Cavan. diff. 4. p. 209. t. 124. f. 1. \**

- G. orientale* batrachioides amplioribus foliis, flore maximo. *Tournef. cor.* 20.
- β. *G. orientale* batrachioides tenuioribus foliis, flore maximo. *Tournef. cor.* 20.
- Iberischer Storchschnabel. W.  
*Habitat in Iberia.* 4 (v. l.)  
*Simile praecedenti, sed differt: foliorum lobis inciso-dentatis, caule pilis candidis longis rectis dense obsito, denique petalis bilobis et inter lobos dente instructis.* W.
16. GERANIUM *sylvaticum.*
- G. pedunculis* bifloris foliis subpeltatis quinquelobis inciso-ferratis, caule erecto corymbose, petalis submarginatis. W.
- G. pedunculis* bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-ferratis, caule erecto, petalis emarginatis. *Fl. lapp.* 266. *Fl. suec.* 572; 617. *Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 351. *Burm. geran.* 12. *Scop. caru. n.* 851. *Gunn. norv. n.* 73. *Flor. dan. t.* 124? *Hoffm. germ.* 243. *Roth. germ. I.* 293. *II.* 138.
- G. caule* erecto, foliis rugosis septilobis, lobis acute serratis, petalis emarginatis. *Hall. helv. n.* 932.
- G. batrachioides*, folio aconiti. *Bauh. pin.* 317.
- Geranium 2. batrachioides minus. *Clus. hist. 2. p.* 99. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p.* 412.
- Wald-Storchschnabel. W.

*Habitat in Europae borealis sylvis* 4. (v. v.)

*Albo flore et flore albo lineis purpureis picto variat. R. Variat petalis integris et emarginatis. G. batrachioides Cavan. diff. 4. p. 211. t. 85. f. 2. forte eadem, sed flores nimis magni.* W.

17. GERANIUM *palustre.*

- G. pedunculis* bifloris longissimis declinatis, foliis quinquelobis dentatis, caule decumbente ascendente, petalis integris. W.
- G. pedunculis* bifloris longissimis declinatis, foliis quinquelobis incis, petalis integris. *Amoen. acad. 4. p.* 323. *Burm. geran.* 13. *Gort. ingr. p.* 108. *Pollich. pal. n.* 647. *Kniph. cent 11. n.* 54. *Flor. dan. t.* 596. *Hoffm. germ.* 243. *Roth. germ. I.* 293. *II.* 138.
- G. caule* herbaceo villosa, foliis oppositis villosis, quinquelobis incis, pedunculis longissimis declinatis. *Cav. diff. 4. p. 211. t. 87. f. 2.\**

*G. caule diffuso, foliis rugosis semiquinquelobis, lobulis trifidis, floribus sparsis, petalis integerrimis. Hall. helv. n. 933.*

*G. sanguineum majus. Besl. eyft. vern. 1. t. 9. f. 2.*

*G. batrachioides palustre, flore sanguineo. Dill. app. 55. elth. 160. t. 134. f. 161. Hall. opusc. 109.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 413.*

Sumpf-Storchschnabel. W.

*Habitat in* Russia, Germania, Anglia. 4 (v. v.)

*Rami divaricatissimi, bifariam angulati angulis obtusis. Petala nervis 3 fuscis, basi villosa.*

\*18. GERANIUM *aphodeloides.*

*G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis calyce triplo longioribus caule flaccido piloso, pilis reflexis, foliis quinquelobis, lobis trifidis obtusiusculis. Willd. in Schrad. Journ. 2. p. 23. t. 1.\**

*G. pedunculis bifloris, foliis multipartitis orbiculatis, laciniis acutis, radice tuberosa. Burm. geran. 27. Cav. diff. 4. p. 213.*

*G. orientale columbinum flore maximo aphodeli radice Tournes. cor. 20. itin. ed. germ. 2. p. 339. t. 36. mala.*

*G. columbinum montanum saxatile perampla radice, foliis parvis altius incis, flore atro-purpureo. Till. pif. 67.*

Affodillwurzlicher Storchschnabel. W.

*Habitat in* Graeciae Orientis pratis. 4 (v. l.)

\*19. GERANIUM *aconitifolium.*

*G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis septempartitis lobis laciniatis, caule adscendente, petalis calyce majoribus, calycibus pedunculisque villosis. W.*

*G. foliis subpeltatis septempartitis, petalis integris venoso-lineatis. Ait. Kew. 2. p. 435. l'Herit. geran. t. 40.*

*G. (rivulare) foliorum segmentis linearibus, petalis striatis integris, radiculis rapiformibus. Vill. delph. 3. p. 372. t. 40.\**

*G. foliis septilobatis rugosis acute dentatis, petalis venosis emarginatis. Hall. helv. n. 936.*

Eisenhutblättriger Storchschnabel. W.

*Habitat in* alpibus Helvetiae, Delphinatus. 4 (v. l.)

*Folia Aconiti neomontani. Corolla alba, petalis calyce parum majoribus lineis rectis sanguineis pictis. W.*



\*20. GERANIUM *collinum*.

G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis septempartitis, lobis laciniatis, caule decumbente, petalis longitudine calycis, calycibus pedunculisque glanduloso-pubescentibus. W.

*Geranium collinum.* *Stephan. in litt.*

Hügel - Storchschnabel. W.

*Habitat in Sibiria.* 2 (v. l.)

*Simillimum praecedenti, differt vero: caule decumbente; foliis subtus praecipue in venis, quae in hoc magis reticulatae, albo pubescentibus; pedunculis et calycibus pube albo, e pilis apice glandulosis composito, dense tectis, nec viridibus et pilis longis simplicibus patulis obsitis; denique petalis violaceis longitudine calycis. Reliqua conveniunt.* W.

21. GERANIUM *pratense*.

G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. *Syst. veg.* 514. *Hoffm. germ.* 244. *Roth. germ.* I. 293. II. 139.

G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis pinnato-laciniatis rugosis acutis, petalis integris. *Hort. cliff.* 344; *Fl. suec.* 573. 618.\* *Roy. lugdb.* 350. *Burm. geran.* 16. *Gmel. sib.* 3. p. 274. *Scop. carn. n.* 852. *Gmel. it.* I. p. 8. *Pollich. pal. n.* 648. *Kniph. cent.* 5. n. 36.

G. caule herbaceo erecto, foliis oppositis subpeltatis multipartitis rugosis, lobis pinnatis acutis. *Cavan. diff.* 4. p. 210. t. 87. f. 1.\*

G. caule erecto, foliis rugosis, hirsutis, multilobis, lobis trifidis, lobulis semipinnatis, floribus umbellatis. *Hall. helv.* n. 931.

G. batrachioides, Gratia dei germanorum. *Bauh. pin.* 318.

*Geranium 3 batrachioides majus.* *Clus. hist.* 2. p. 100. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 414.

Wiesen - Storchschnabel. W.

*Habitat in Europae borealis pratis.* 2 (v. v.)

22. GERANIUM *maculatum*.

G. pedunculis bifloris, caule dichotomo erecto, foliis quinquepartitis incisis, summis sessilibus. *Sp. pl.* 955.

*Gron. virg.* 101. *Burm. geran.* 17. *Mill. dict. n.* 14.

G. caule erecto herbaceo, foliis oppositis quinquepartitis  
*Linnaei Spec. Plant. T. III.* Y y

incisis, summis sessilibus, petalis integerrimis rotundatis. *Cavan. diff.* 4. p. 213. t. 86 f. 2.\*

*G. batrachioides americanum maculatum*, floribus obsolete caeruleis. *Dill. elth.* 158. t. 131. f. 159.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 415.

Gellecter Storchschnabel. W.

*Habitat in Carolina, Virginia, Sibiria.* 24 (v. l.)

\*23. GERANIUM *pilosum*.

*G. pedunculis bifloris, foliis tripartitis, laciniis trifidis obtusis, caule decumbente piloso.* W.

*Geranium pilosum.* *Forst. prod.* n. 531.

Haariger Storchschnabel. W.

*Habitat in Nova Zeelandia,* (v. l.)

*Caulis decumbens pilosus. Folia longe petiolata ad basin usque tripartita, laciniis lanceolatis trifidis obtusis, utrinque glabra, margine integerrima ciliata. Pedunculi axillares solitarii foliis longiores biflori pilosi. Calyx aristatus basi villosus. Corollam non vidi. Flores parvi.* W.

\*24. GERANIUM *canescens*.

*G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquepartitis subtus canescentibus, lobis incisis, petalis emarginatis.*

*Ait. Kew.* 2. p. 433. *l'Herit. geran.* t. 38.

Grauer Storchschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 24 (v. v.)

*Differt a G. incano foliis minoribus 5-partitis, lobis oblongis incisis, nec linearibus pinnatifidis, petalis emarginatis.* W.

25. GERANIUM *incanum*.

*G. pedunculis bifloris, foliis septempartitis, subtus incanis, lobis pinnatifidis linearibus, petalis integris.* W.

*G. pedunculis bifloris, calycibus aristatis, petalis integris, arillis hirsutis, foliis subdigitatis pinnatifidis.* *Sp. pl.* 957. *Amoen. acad.* 6. afr. 26.\*

*G. caule procumbente, foliis palmatis subtus incanis, laciniis pinnato-linearibus, capsulis hirsutis, pedunculis bifloris.* *Cavan. diff.* 4. p. 201. t. 82. f. 2.\* (*petala perperam emarginata depinxit.* W.)

*G. pedunculis subbifloris, foliis palmatis, multipartitis laciniis pinnato-linearibus subtus tomentosis.* *Burm. geran.* 26. t. 1.\*

*G. pedunculis bifloris, foliis multipartitis, laciniis linearibus. Roy. lugdb. 331.*

*G. africanum folio pulsatillae, infra argenteo, flore albo. Boerh. lugdb. n. 23.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 421.*

Bestäubter Storchschnabel. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. 4 (v. f.)*

*Folia Potensillae argenteae subtus tomentosa.*

## 26. GERANIUM *argenteum.*

*G. pedunculis bifloris subradicalibus, foliis septempartitis utrinque sericeo-tomentosis, laciniis linearibus trifidis, petalis emarginatis. W.*

*G. pedunculis bifloris, foliis subpeltatis septempartitis trifidis tomentoso-sericeis, petalis emarginatis. Amoen. acad. 4. p. 324. Burm. geran. 8. Mill. dict. n. 13. Jacq. ic. rar. 3. t. 546. Collect. 2. p. 143. \* Vill. delph. 3. p. 375. t. 40. \**

*G. radice crassa, foliis subpeltatis 5-7-partitis, laciniis trifidis tomentoso-sericeis, scapis bifloris. Cav. diff. 4. p. 205. t. 77. f. 3. \**

*G. argenteum alpinum. Bauh. pin. 313. Pluk. phyt. 186. f. 3. longius radicatum. Pon. bald. 341. t. 342. Segu. ver. 1. p. 571. t. 10.*

*G. argenteum montis baldi. Bauh. hist. 3. p. 474.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 414.*

Silberblättriger Storchschnabel. W.

*Habitat in summis alpibus Galliae, Italiae, Carinthiae. 4 (v. f.)*

## \*27. GERANIUM *varium.*

*G. pedunculis bifloris subradicalibus, foliis quinquepartitis utrinque glaucis pubescentibus, laciniis cuneiformibus lanceolatis trifidis, petalis emarginatis. W.*

*Geranium varium. l'Herit. geran. t. 37.*

*G. (cinereum) radice crassa, foliis orbiculatis profunde quinquelobis cinereis, radicalibus longissime petiolatis, caulinis oppositis, flore magno variegato. Cav. diff. 4. p. 204. t. 89. f. 1. \**

*G. (cineraceum) scapis bifloris, foliis radicalibus subpeltatis lobatis cinereis, lobis intermediis cuneiformibus tridentatis, candice simplici. Lapeyr pyren. 1. p. 3. t. 2. \**

*G. pyrenaicum*, foliis cineraceis, radice crassa, magno flore variegato. *Tournef. inst.* 267.

Verschiedenblättriger Storchschnabel. W.

*Habitat in Pyrenaeis.* 4 (v. l.)

Folia quinque-vel septempartita. Planta acaulis quandoque subcaulescens. W.

## 28. GERANIUM *pyrenaicum*.

*G. pedunculis bifloris*, foliis reniformibus septemlobis, lobis oblongis obtusis trifidis, laciniis tridentatis, caule erecto ramoso, petalis emarginatis. W.

*G. pedunculis bifloris*, floribus pentandris, petalis bilobis, calycibus apice glandulosis, antheris erectioribus sterilibus. *Mant.* 97. *Hudsf. angl.* 302.

*G. pedunculis bifloris*, petalis calyce duplo longioribus, foliis reniformibus lobatis, capsulis aequalibus subpubescentibus. *Smith. brit.* 2. p. 735. \*

*G. caule herbaceo villoso*, foliis oppositis subpeltatis orbiculatis, lobis trifidis obtusis, corollis purpureo-violeaceis. *Cavan. diff.* 4. p. 203. t. 79. f. 2. \*

*G. pedunculis bifloris*, foliis multifidis, laciniis obtusis inaequalibus, petalis bifidis. *Burm. geran.* 27. *Gerard. prov.* 434. t. 16. f. 2.

*G. columbinum pyrenaicum perenne maximum.* *Tournef. inst.* 268.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 407.

Pyrenäischer Storchschnabel. W.

*Habitat in Angliae, Galliae pratis et pascuis.* 4 (v. v.)  
Stamina decem, quorum quinque interdum sterilia.  
*Variat corollis purpureis et albis.* W.

\* \* \* *Pedunculis bifloris.* *Annua.*

## 29. GERANIUM *bohemicum*.

*G. pedunculis bifloris*, petalis emarginatis longitudine calycis, foliis quinquelobis dentatis, arillis hirsutis. W.

*G. pedunculis bifloris*, petalis emarginatis, arillis hirsutis, cotyledonibus trifidis: medio truncato. *Amoen. acad.* 4. p. 323. \* *Burm. ger.* 24. cent. 176. *Mill. dict. n.* 15. *Hoffm. germ.* 244.

*G. caule villoso-viscoso*, foliis oppositis rugosis glaucis viscosis, filamentis ciliatis. *Cavan. diff.* 4. p. 206. t. 81. f. 2. \*

*G. batrachioides bohemicum*, capsulis nigris hirsutis. *Dill. elth.* 159. t. 133. f. 160.

*G. bohemicum* batrachioides annuum. *Raj. hist.* 1063.

*G. batrachioides minus* annuum purpurea-caeruleum.

*Morif. pracl.* 267. *hist. p.* 511. *f.* 5. *t.* 15. *f.* 1. *mala.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 416.

Böhmischer Storchschnabel. W.

*Habitat in* Bohemia, Silesia. ☉ (v. v.)

*Planta pubescens viscida. Pedicelli fructus recti.*

*Calyx aristatus nervis 3-f. 5 Corolla caerulea, calyce major. Arilli hirsuti, atri.*

*Folia quinqueloba, lobis oblongo-lanceolatis dentatis, in caulinis lobis intermediis reliquis est brevior.*

*Rostrum est crassum subulatum calyce triplo longius.* W.

### \*30. GERANIUM *divaricatum.*

*G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis calyce brevioribus, foliis quinquelobis dentatis, lobo unico laterali longiore, arillis scabris superne venoso-rugosis.* W.

*G. (divaricatum) radice annua, caulibus dichotomis, ramis divaricatis pilosis glandulosisque, foliis quinquelobis pubescentibus, lobis incisif, pedunculis bifloris, calyce subaristato hirsuto, foliolis trinervatis, petalis obcordatis subquinquenerviis calyce vix longioribus, arillis hirsutis rugosis.* *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 164.

*G. (Winterli) pedunculis bifloris, foliis angulatis, inferioribus quinquelobis, floralibus trilobis, lobis incisodentatis, caule divaricato ramosissimo.* *Roth. catal.* 2. *p.* 78. \*

Ausgebreiteter Storchschnabel. W.

*Habitat in* Hungaria, Sibiria. ☉ (v. v.)

*Folia quinqueloba, lobis oblongo-lanceolatis incisodentatis, unico laterali reliquis longiore. Arilli a pilis brevibus adpressis sparsis scabri, superne venis transversis rugosi. Rostrium tenuissimum filiforme duplo calyce longius.* W.

### 31. GERANIUM *lucidum.*

*G. pedunculis bifloris, foliis quinquelobis rotundatis, calycibus transverse corrugatis, capsulis multicarinatis.* *Smith. brit.* 2. *p.* 733.

*G. pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis elevato-rugosis, foliis quinquelobis rotundatis.* *It. gotl.* 228. \* *Fl. suec.* 574. 620. *Dalib. parif.* 208. *Sauv. monsp.* 207. *Burm. geran.* 19. *Gott. ingr. p.* 110. *Pollich pal. n.* 650. *Flor. dan. t.* 218. *Kuiph.*

cent. II. n. 51. *Hoffm. germ.* 244. *Roth. germ.* I. 294. II. 141.

G. caule herbaceo, foliis oppositis pilosis lucidis rotundato-lobatis, calycibus pyramidatis transversim rugosis. *Cavan. diff.* 4. p. 214. t. 80. f. 2.\*

G. foliis subrotundis, semiquinquelobis, lobis obtusis, calycibus transversim rugosis. *Hall. helv.* n. 942.

*Geranium lucidum saxatile.* *Bauh. pin.* 318.

*Geranium saxatile.* *Thal. herc.* 44. t. 5.

*Geranium rotundifolium saxatile montanum.* *Col. ecphr.* I. p. 138. t. 137.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 418.

Glänzender Storchschnabel. W.

*Habitat in Europae rupibus umbrosis.* ☉ (v. v.)

## 52. GERANIUM *molle.*

G. pedunculis bifloris, foliis reniformibus, radicalibus novemlobis, caulinis septemlobis, lobis trifidis, petalis bifidis longitudine calycis mutici, arillis glabris transversim rugosis. W.

G. pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiusculo. *Syst. veg.* 515.

G. pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, caule ramofo erectiusculo, calycibus muticis, arillis laevibus. *Sp. pl.* 955. *Burm. geran.* 21. *Scop. carn.* n. 850. *Pollich pal.* n. 651. *Fl. dan.* t. 679. *Hoffm. germ.* 244. *Roth. germ.* I. 294. II. 141.

G. caule suberecto, foliis orbiculatis subseptemlobis trifidis obtusis, caulinis oppositis, superioribus alternis. *Cavan. diff.* 4. p. 203. t. 83. f. 3.\*

G. foliis mollissimis, hirsutis, reniformibus semiquinquefidis, lobis semitripartitis obtusis. *Hall. helv.* n. 939.

G. foliis infimis semimultipartitis: laciniis linearibus triquadridis, calycibus exaristatis. *Neck. gallob.* 291.

G. pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis rotundatis: laciniis obtusiusculis, capsulis hirtis. *Fl. suec.* 577; 624. *Dalib. parif.* 206.

G. pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus semiquinquefidis mollibus et latissimis. *Sauv. monsp.* 207.

G. columbinum minus, majori flore et foliis bifidis. *Magn. monsp.*

G. columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. *Vail. parif.* 79. t. 15. f. 3.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 419.

Weicher Storchschnabel. W.

*Habitat in Europa ad plateas.* ☉ (v. v.)

*Petala semibifida. Calyces submutici, corolla breviores. Pedicelli declinati. Stipulae bifidae.*

### 33. GERANIUM *carolinianum.*

G. pedunculis bifloris apice confertis, petalis emarginatis longitudine calycis aristati, foliis quinquelobis, lobis trifido-incisis, arillis villosis. W.

G. pedunculis bifloris, calycibus aristatis, foliis multifidis, arillis hirsutis, petalis emarginatis. *Sp. pl.* 956. *Roy. lugdb.* 351. *Gron. virg.* 100. *Burm. geran.* 24. *Mill. dict. n.* 47. *Kniph. cent.* 10. n. 46.

G. foliis quinquepartitis incisis, calycibus aristatis, petalis emarginatis, arillis hirsutis. *Ait. Kew.* 2. p. 437.

G. caule herbaceo dichotomo, geniculis inflatis rubescentibus, foliis oppositis quinquepartitis trifidis, corollis parvis, capsulis nigris hirsutis. *Cavan. diff.* 4. p. 206. t. 84. f. 1. et t. 124. f. 2.\*

G. (*lanuginosum*) pedunculis bifloris calycibus aristatis, foliis quinquepartitis incisis, caule erecto hirsuto. *Jacq. hort. Schönb.* 2. p. 8. t. 140.\*

G. columbinum carolinum, capsulis nigris hirsutis. *Dill. elth.* 162. t. 135. f. 162.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 420.

Carolinischer Storchschnabel. W.

*Habitat in Carolina, Virginia.* ☉ (v. v.)

*Corolla incarnata, vix calyce longior. Arilli hirti, nigri. Calyces villosi aristati, maturi rubri. Pedicelli fructus recti (ut in bohemico), nec declinati, ut affinium.*

### 34. GERANIUM *columbinum.*

G. pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartitis, lobis multifidis linearibus, petalis emarginatis longitudine calycis aristati, arillis glabris laevibus. W.

G. pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, arillis glabris, calycibus aristatis. *Sp. pl.* 956. *Fl. suec.* 576; 623. *Dalib. paris.* 207. *Burm. ger.* 22. *Gmel. sib.* 3. p. 275. n. 7. *Scop. carn.* n. 849. *Pollich pal.* n. 653. *Hoffm. germ.* 244. *Roth germ.* I. 294. II. 142.

G. pedunculis folio longioribus, foliis quinquepartito-

multifidis, calycibus pentagonis, arillis glabris. *Ait. Kew. 2. p. 437.*

G. caule procumbente, foliis oppositis palmatis, laciniis pinnatis, pedunculis solitariis longissimis bifloris. *Cav. diff. 4. p. 200. t. 82. f. 1.\**

G. caule procumbente, foliis quinquepartitis, lobis trilobis, lobulis trifidis. *Hall. helv. n. 938.*

G. columbinum, foliis dissectis, pediculis florum longissimis. *Vaill. paris. 79. t. 15. f. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 420.*

Feintheiliger Storchschnabel. W.

*Habitat in Gallia, Helvetia, Germania.* ☉ (v. v.)

*Pedunculi foliis longiores. Calyces maxime aristati, magni. Petala emarginata. Hall.*

### 35. GERANIUM *dissectum.*

G. pedunculis bifloris, foliis quinquepartitis, lobis trifidis linearibus, petalis emarginatis longitudine calycis aristati, arillis pilosis, pilis glanduliferis. W.

G. pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Amoen. acad. 4. p. 282.\* Burm. geran. 15. Fl. suec. 2. n. 622. Gmel. sib. 3. p. 275. Scop. carn. n. 848. Pollich pal. n. 652. Leers. herb. n. 541. Hoffm. germ. 245. Roth germ. I. 295. II. 143.*

G. caule villoso erectiusculo, foliis quinquepartito-trifidis, pedunculis bifloris folio brevioribus. *Cavan. diff. 4. p. 199. t. 78. f. 2.\**

G. caule erecto, foliis quinquelobis, lobis trifidis, acutis. *Hall. helv. n. 937.*

G. majus, foliis imis longis ad usque pediculum divisis. *Morif. hist. 2. p. 511. f. 5. t. 3. f. 3. Vaill. paris. t. 15. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 421.*

Schlitzblättriger Storchschnabel. W.

*Habitat in Europa australiore.* ☉ (v. v.)

*Calyces aristati. Pistillum villosum. Petala pallido-incarnata, calyce nonlongiora. Stipulae coloratae. Antherae coeruleae. (Petala potius sanguinea. Leers et mihi. R.)*

### 36. GERANIUM *rotundifolium.*

G. pedunculis bifloris, petalis integris longitudine calycis aristati, foliis radicalibus reniformibus septemlobis.



- caulinis subrotundis basi truncatis quinquelobis trifidis, arillis hirsutis. W.
- G. pedunculis bifloris, petalis subintegris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis. *Sp. pl.* 957. *Burm. geran.* 20. *Scop. carn. n.* 846. *Hoffm. germ.* 245. *Roth germ. I.* 295. *II.* 144.
- G. caule prostrato, foliis oppositis, inferioribus subrotundis semiquinquepartitis, superioribus subcuneatis, petalis integerrimis calyce paullo longioribus. *Cav. diff.* 4. p. 214. t. 93. f. 2.\*
- G. viscidum, caule decumbente, foliis semiquinquelobis, lobis tridentatis et quinquelobatis. *Hall. helv. n.* 941.
- G. pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 344. *Fl. suec.* 575; 621. *Roy. lugdb.* 351. *Dalib. paris.* 206.
- G. folio malvae rotundo. *Bauh. pin.* 318.
- G. alterum. *Fuchf. hist.* 205.
- G. columbinum majus, flore minore caeruleo. *Raj. synop.* 358.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 422.
- Rundblättriger Storchschnabel. W.
- Habitat in Europae cultis.* ☉ (v. v.)
- Caulis divaricatus, teres, pubescenti-viscidus. Petioli rufi. Folia reniformia, rotundata, pubescenti-mollia, subviscosa praesertim subtus, lobata sinibus puncto rubro. Calyx aristatus, patulus, rugis 3 longitudinalibus. Petala cuneata, obtusissima, integra, basi striis 3 rufis. Antherae flavae.

37. GERANIUM *pufillum*.

- G. pedunculis bifloris, floribus pentandris, petalis emarginatis, longitudine calycis mutici, foliis subseptemlobis trifidis, arillis pubescentibus. W.
- G. pedunculis bifloris, petalis emarginatis, caule depresso, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. *Sp. pl.* 957. *Burm. geran.* 23. *Hoffm. germ.* 245.
- G. caule herbaceo ramoso, foliis subrotundo-lobatis, lobis trifidis, floribus minimis pentandris coeruleis. *Cav. diff.* 4. p. 202.\*
- G. (*malvaefolium*) petalis emarginatis mutico calyce vix longioribus, foliis semiseptifidis. *Scop. carn. n.* 847.
- G. foliis hirsutis, semiseptilobis, lobis semitrilobis obtusis. *Hall. helv. n.* 940.

*G. columbinum majus*, flore minore caeruleo. *Vaill. parif.* 79. t. 15. f. 1.

*G. columbinum tenuius laciniatum*. *Bauh. pin.* 318. prod. 138.

β. *Geranium humile*. *Cavan. diff.* 4. p. 202. t. 83. f. 2.

*G. columbinum humile*, flore caeruleo minimo. *Raj. angl.* 3. p. 359. t. 16. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 423.

Niedriger Storchschnabel. W.

*Habitat in Angliae, Galliae, Germaniae, Helvetiae ruderatis cultis.* ☉ (v. v.)

*Caulis prostratus, vix pubescens. Folia magis dissecta, laciniis quibusdam ad basin usque sectis, quod non in G. rotundifolio simillimo. Petala vere emarginata purpurea. Antherae caeruleae. Stamina 5 alterna castrata sunt.*

### 38. GERANIUM robertianum.

*G. pedunculis bifloris, foliis ternatis quinatisque trifidopinnatifidis, petalis integris calyce aristato duplo longioribus, arillis reticulatis.* W.

*G. pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. Sp. pl.* 955. *Mat. med.* 165. *Burm. geran.* 18. *Scop. carn. n.* 845. *Pollich pal. n.* 649. *Fl. dan. t.* 694. *Blackw. t.* 480. *Hoffm. germ.* 244. *Roth germ. I.* 294. *II.* 140.

*G. pedunculis bifloris, foliis quinque- trive partitis lobis pinnatifidis, calycibus hirsutis. Hort. cliff.* 344. *Fl. suec.* 578: 619. *Dalib. parif.* 207. *Roy. lugdb.* 351.

*G. foliis quinatis ternatisque incilis, calycibus decemangulatis. Ait. Kew.* 2. p. 437.

*G. foliis ternatis pinnatis incisis, calycibus rubris decem striatis pilosis. Cavan. diff.* 4. p. 215. t. 86. f. 1.

*G. foliis duplicato- pinnatis, pinnis ultimis confluentibus, calycibus striatis hirsutis. Hall. helv. n.* 943.

*G. robertianum primum. Bauh. pin.* 319.

*Geranium 3. Fuchs. hist.* 206.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 416.

Stinkender Storchschnabel. W.

*Habitat in Europae nemoribus ac rupibus, etiam in Arabia felici.* ☉ (v. v.)

*Calyx pilosus decem- carinatus ex foliolis 1 et 3 exterioribus tricarinatis; 2 et 5 unicarinatis; 4 bicarinato. Petala integra. Odor hircosus.*

\*39. GERANIUM *purpureum*.

G. pedunculis bifloris, foliis ternatis quinatisque trifido-pinnatifidis, petalis integris calyce aristato parum longioribus, arillis transversim rugosis. W.

G. (*purpureum*) foliis quinquefidis pinnatifidis, calycibus transversim rugosis et angulatis, petalis minimis. *Vill. delph.* 3. p. 374. t. 40.\*

Geranium robertianum  $\beta$ . *Smith. brit.* 2. p. 732.

G. lucidum saxatile foliis Geranii robertiani. *Raj. synop.* 358.

Purpurfarbiger Storchschnabel. W.

*Habitat in rupibus Delphinatus inque maritimis Angliae.* ♂ (v. l.)

*Affine praecedenti, tamen abunde distinctum: caule adscendente, foliis quintuplo minoribus, petalis brevioribus, et arillis transversim rugosis. Calyces transversim rugosos ut in G. lucido, quales indicavit Clariff. Villars, in speciminibus siccis non observavi. Arilli hujus superne rugis tribus transversis elevatis et inferne reticulo elevato sunt notati; in G. robertiano vero sunt Arilli levissime reticulati absque rugis transversalibus.* W.

## E N D E C A N D R I A.

## 1272. B R O W N E A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1115.*

*Cal.* tubulosus bifidus. *Cor.* duplex; exterior 5-fida; interior pentapetala. *Legumen* uniloculare.

I. B R O W N E A *coccinea*.

B. staminibus longitudine corollae, pedunculis subaggregatis, ramis glabris. W.

*Brownea coccinea.* *Sp. pl.* 958. *Jacq. amer.* 194. t. 121.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 146.

Scharlachrothe Brownie. W.

*Habitat in rupestribus sylvaticis Zeucaae ad sinum Venezulae Americes.* ♂ (v. l.)

*Stamina huic decem,* W.

\*2. *BROWNEA grandiceps.*

B. staminibus longitudine corollae, floribus capitato-spicatis, ramis pubescentibus. W.

*Brownea grandiceps.* Jacq. *Collect.* 3. p. 287. t. 22. fig. a-i.\*

Grofsköpfige Brownie. W.

*Habitat in montosis sylvaticis ad Caracas.* ‡

Foliola reticulato-venosa rami et rachides foliorum pubescentes. Flores coccinei in spica quinque uncias longa et quatuor lata. W.

\*3. *BROWNEA Rosa de Monte.*

B. staminibus corolla duplo longioribus, floribus capitatis. W.

B. (*Rosa de Monte*) floribus aggregato-capitatis sessilibus, staminibus longissimis. Berg. in *Act. Angl.* 1773. p. 171. t. 8. 9.\*

Hermefias vulgo Rosa de monte. Loesl. *itin.* 278.

Rosenfarbige Brownie. W.

*Habitat in montosis Terrae Firmae, Portobello.* ‡

Flores roseo-coccinei in capitulo magnitudine pugni. Stamina undecim ut in praecedente, corolla duplo longiora. W.

\*4. *BROWNEA pauciflora.* W.

B. staminibus corolla sesqui-longioribus, floribus tribus quatuorve terminalibus sessilibus. W.

Ginannia. Schreb. *gen. pl.* n. 691.

Paloue gujanensis. *Aubl. guj.* 1. p. 365. t. 141.\*

Wenigblumige Brownie. W.

*Habitat in sylvis Gujanae.* ‡

Folia in hac non pinnata sed simplicia alterna. Flores purpurei terminales tres vel quatuor sessiles in ramorum apice. Calyx bifidus. Corolla exterior quadrida, interior tripetala. Stamina novem corolla duplo longiora flexuosa. W.

## D O D E C A N D R I A.

## \*1273. A C I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1119.*

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* sicca coriacea fibrosa monosperma.

\*1. A C I A *dulcis.* W.

*A. petiolis glabris.* W.

*Acioa gujanensis.* *Aubl. guj. 2. p. 698. t. 280.\**

Süfse Acie. W.

*Habitat in Gujanae sylvis.* W.

*Arbor sexagintapedalis. Petioli glabri. Folia alterna oblonga acuminata integerrima glabra. Calyx albus. Corolla violacea. Nux putamine fragili. Semen amygdalinum edule, saporis grati.* W.

\*2. A C I A *amara.* W.

*A. petiolis ferrugineo-pubescentibus.* W.

*Couepia gujanensis.* *Aubl. guj. 1. p. 519. t. 207.\**

Bittere Acie. W.

*Habitat in Gujanae sylvis.* †

*Arbor sexagintapedalis. Petioli ferrugineo-pubescentes. Folia alterna oblonga acuminata integerrima glabra. Nux putamine fragili. Semen amarum non edule.* W.

## 1274. M O N S O N I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1120.*

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 15 connata, urceolo filamentorum 5-fido. *Styl.* 5-fidus. *Arilli* 5 monospermi arilitati ad basin receptaculi rostrati.

\*1. M O N S O N I A *tenuifolia.* W.

*M. foliis supradecompositis, foliolis lineari-subulatis, petalis dentatis.* W.

*Geranium (grandiflorum) pedunculis simplicibus unifloris, foliis tripartito-multifidis linearibus, caule arboreo.* *Burm. geran. n. 1? Cavan. diff. 4. p. 194. t. 75. f. 1?*

*Geranium frutescens incanum* flore magno luteo dentato. *Burm. afr.* 88. t. 34. f. 1. ?

Feinblättrige Monsonie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 2 (v. l.)

Folia quadripinnata subradecomposita, foliolis lineari-subulatis brevibus, fere composita ut in *Pelargonio tristi* at multo tenuiora. Pedunculi uniflori, ut videtur radicales, supra medium involucrati foliolis binis lineari-lanceolatis tripartitis. Flores magni flavescentes Petala magna quinquenervia, apice inaequaliter subquinedentata. Similis *Geranio grandifloro Burmanni*, sed folia multo tenuiora, foliola breviora, pedunculi involucrati, petala duplo latiora grosse quinedentata. W.

## 2. MONSONIA speciosa.

M. foliis quinatis, foliolis bipinnatis, petalis dentatis. W.

M. foliis quinatis, foliolis bipinnatis. *Lin. suppl.* 342.

*Curt. mag.* 73.

M. foliis quinatis, foliolis bipinnatis, scapis radicalibus unifloris. *Cavan. diff.* 3. p. 179. t. 74. f. 1. \*

*Geranium folio tenuissime dissecto, flore singulari amplissimo.* *Breyn. prod.* 3. app. 31. t. 21. f. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 781.

Prächtige Monsonie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 2 (v. v. l. fl.)

Folia quinata, foliolis bipinnatis, pinnulis linearibus. Pedunculi uniflori supra medium involucrati. Petala ampla purpurea nervosa apice dentata. W.

## 3. MONSONIA lobata.

M. foliis cordatis sublobatis serratis, petalis dentatis. W.

M. foliis cordatis lobatis dentatis. *Ait. Kew.* 3. p. 100.

Monsonia lobata. *Montin. in Act. goth. ob.* 2. p. 1. t. 1.

M. (filia) foliis simplicibus cordatis lobatis. *Lin. suppl.* 341.

M. (filia) foliis cordatis subrotundo-lobatis dentatis pilosis scapis unifloris. *Cavan. diff.* 3. p. 180. t. 74. f. 2. \*

Gelappte Monsonie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* 2

Folia simplicia cordata obtuse septemlobata crenata obtusa, ut tota herba subpubescentia, omnino *Pelargonii vitifolii*. Fructus excrefcit rostro ut in *Erodiis*

*ciconiis acie longissima. Capsula retusa et quasi coronata.*

4. **MONSONIA ovata.**

M. foliis oblongis cordatis dentatis plicatis, petalis subdentatis. W.

M. (*ovata*) foliis oblongis subcordatis crenatis undulatis. *Ait. Kew. 3. p. 101.*

M. (*ovata*) caule tereti, foliis oppositis ovatis crenatis, pedunculis axillaribus longissimis unifloris. *Cav. diff. 2. p. 193. t. 113. f. 1.\**

Monsonia emarginata. *l'Herit geran. t. 41.*

Geranium (*emarginatum*) pedunculis unifloris, foliis emarginatis ovatis crenatis. *Lin. suppl. 306.*

Eyförmige Monsonie. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. ♂ (v. l.)*

\*. **MONSONIA spinosa.**

M. foliis ellipticis acuminatis integerrimis, petiolis persistentibus spinoscentibus, petalis subdentatis. W.

Monsonia spinosa. *l'Herit. geran. t. 42.*

Dornige Monsonie. W.

*Habitat - - - - †*

*Similis Geranio spinoso, sed Spinae non tuberculis insident, Folia elliptica acuminata integerrima, Flores majores. W.*

\*1275. **PLAGIANTHUS.**

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1121.*

*Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala, duo approximata a reliquis remota. Styl. 1. Stigma clavatum. Bacca.*

\*1. **PLAGIANTHUS divaricatus.**

Plagianthus divaricatus. *Forst. prod. n. 254. Char. gen. 43.*

Ausbreitete Schiefblume. W.

*Habitat in Nova Zeelandia. † (v. l.)*

*Rami divaricati fusci alterni. Folia parva quadrilincaria fasciculata, tria vel quatuor ex eodem puncto provenientia, linearia acutiuscula, basi attenuata subpetiolata, angusta. Flores solitarii, in pedunculo foliis multo brevioribus unifloro. Plagianthus cum Coma-*

ro nil commune habet, differt praeter petalorum situm: filamentis more malvacearum nec basi tantum cohaerentibus, denique bacca. W.

## 1276. HELICTERIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 734.

Cal. tubulosus oblique 5-fidus. Cor. 5-petala. Germen longissime pedicellatum. Styl. subquinquefidus. Caps. 5, uniloculares polyspermae spiraliter contortae.

1. HELICTERIS *baruensis*.

H. decandra, foliis cordatis argute serratis subtus tomentosis, fructu contorto apicibus rectis. W.

H. decandra, foliis cordatis serratis fructu contorto apicibus rectis. *Mant.* 122. *Jacq. amer.* 236. t. 149.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 252.

Baruensischer Schraubenbaum. W.

*Habitat in sylvaticis maritimis insulae Baru et in isthmo Panama.* † (v. l. c. fr.)

Calyx cylindraceus bilabiatus, labiis lanceolatis, superiore bifido, inferiore trifido. Petala linearia quinque. W.

\*2. HELICTERIS *jamaicensis*.

H. decandra, foliis cordatis inaequaliter serratis pubescentibus subtus tomentosis, fructu ovato contorto acuto. W.

H. foliis cordatis serratis, fructu ovato-acuto contorto. *Swartz prod.* 98. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1156.\*

H. foliis cordatis serratis, floribus decandris, fructu composito integro contorto. *Jacq. amer.* 235. t. 179. f. 99.\*  
*Jacq. hort.* 143.

H. villosa et fruticosa, foliis cordatis acuminatis serratis. *Brown. jam.* 330.

H. arbor Indiae occidentalis, fructu majore. *Pluk. alm.* 182. t. 245. f. 3.

Abutilo affinis arbor althaeae folio, cujus fructus est styli apex acutus quatuor s. quinque filiquis hirsutis, funis ad instar in spiram convolutis. *Sloan. jam.* 97. *hist.*

I. p. 22.

Westindischer Schraubenbaum. W.



*Habitat in fruticetis maritimis Jamaicae* † (v. l.)

Flores terminales. Calyx campanulatus farinaceo-pubescentibus obliquus quinque-dentatus. Petala quinque inaequalia oblonga. W.

### 3. HELICTERIS *Ifora*.

H. decandra, foliis ellipticis subcordatis dentato-serratis acuminatis scabris subtus tomentosis, floribus axillaribus, fructu contorto apice subulato. W.

H. foliis ellipticis subcordatis serratis, fructu apice subulato. Swartz. *obj.* 343.

H. foliis cordatis serratis, fructu composito contorto. *Sp. pl.* 1366. *Hort. cliff.* 433.

H. arbor indiae orientalis, liliqua varicosa et funiculi in modum contortuplicata. *Pluk. alm.* 181. t. 245. f. 2.

Frutex indicus, fructu e styli apice egresso sextuplici funiculo in spiram convoluto constante. *Raj. hist.* 1763.

Fructus regis. *Rumph. amb.* 7. p. 32. t. 17. f. 1.

*Ifora Murri.* *Rheed. mal.* 6. p. 55. t. 30.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 254.

Hafelnufsblättriger Schraubenbaum. W.

*Habitat in Malabaria et in Moluccis.* † (v. l.)

Folia elliptica basi subcordata dentata et serrata supra glabra infra tomentosa-pilosa. Forma foliorum est ut in *Corylo* vel *Hamameli*. Flores 2-4 pedunculati in omnibus foliorum axillis. Calyx tubuloso-clavatus basi attenuatus, margine bilabiatus. Petala quinque inaequalia obovata. Fructus cylindraceus contortus apice longo subulato. W.

### \*4. HELICTERIS *hirsuta*.

H. decandra, foliis ovatis acuminatis serratis subcordatis tomentosis, pedunculis multifloris axillaribus, fructu oblongo recto hirsutissimo. W.

H. (*hirsuta*) decandra, foliis cordatis serratis, fructu quinqueloculari recto hirsutissimo. *Loureiro coch.* 2. p. 648.\*

Rauher Schraubenbaum. W.

*Habitat in sylvis planis Cochinchinae.* †

Calyx monophyllus tubo longo curvo piloso colorato, limbo brevi quadrisido, lacinia suprema emarginata. Petala quinque turbinato-oblonga inaequalia. *Loureiro l. c.*

*H. hirsuta* est distincta et pulchra species, quam *vi. Linnaei Spec. Plant. T. III.* Z z

*di, folia vero non sunt cordata, sed ovata acuminata, basi leviter excisa.* Swartz in litt. W.

5. *HELICTERIS angustifolia.*

G. foliis lanceolatis integerrimis, fructu ovato recto.

*Sp. pl.* 1366. *Osbeck. itin.* 232. t. 5. *Loureiro coch.* 2. p. 647?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 255.

Schmalblättriger Schraubenbaum. W.

*Habitat in China.* *Osbeck.* †

*Arbor.* Folia lanceolata supra nuda, subtus tomentosa petiolata integerrima acuminata. Flores pedunculati sparsi. Calyx tomentosus. Petala quinque ad basin laminarum utrinque dente aucta. Receptaculum longitudine floris filiforme, cujus apici stamina decem parva et Stylus unicus. Capsula ovata tomentosa minime contorta, sed ex Capsulis quinque parallelis rectis approximatis composita.

Folia lanceolata obtusiuscula. Planta Loureiri diffuse videtur. W.

6. *HELICTERIS pentandra.*

H. pentandra, foliis ovatis, floralibus coloratis. *Mant.*

294.

*Spiriopoco. Allemand. mss.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 256.

Fünflädiger Schraubenbaum. W.

*Habitat Surinami.* †

Folia alterna ovata acuminata ferrata. Floralia obscure purpurea. Calyces hispidi setis ramosis. Petala calycis longitudine. Stamina quinque. Capsulae contortae pilosae.

7. *HELICTERIS carthagenensis.*

H. polyandra, foliis cordatis ferratis, fructu oblongo recto. *Sp. pl.* 1366. *Jacq. amer.* 237. t. 150.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 256.

Carthagenischer Schraubenbaum. W.

*Habitat in Carthagenae sylvis.* †

*Affinis H. baruensi sed flore et fructu diversa.* W.

8. *HELICTERIS apetala.*

H. dodecandra apetala, foliis quinquelobis, siliquis divaricatis. *Sp. pl.* 1366. *Jacq. amer.* 238. t. 181. f. 98.\*

*Macpalxochl. Hern. mex.* 383. 459.

*Houttuyni Lin. Pfl. Syst. 2. p. 257.*

Nacktblütiger Schraubenbaum. W.

*Habitat in Carthagenae sylvis. †*

*Stamina quatuordecim.*

\*1277. CIENFUEGIA.

*Cavan. diff. 3. p. 174.*

*Cal. duplex, exterior 12-phyllus, foliolis setaceis. Cor. 5-petala. Styl. filiformis. Stigma clavatum. Caps. trilocularis trisperma.*

\*I. CIENFUEGIA *digitata.*

*Cienfuegosia digitata. Cavan. diff. 3. p. 174. t. 72. f. 2.\**

Gefingerte Cienfuegie. W.

*Habitat in Senegal. †*

*Folia alterna petiolata glabra tri-vel quinquepartita, laciniis lanceolatis obtusiusculis integerrimis vel dentatis. Pedunculi uniflori axillares. Calyx exterior e setis 12 brevissimis compositus, interior quinquepartitus. Affinis Hibisco sed stigmate clavato et capsula triloculari, loculis monospermis distincta. W.*

\*1278. ASSONIA.

*Cavan. diff. 3. p. 120.*

*Cal. duplex, exterior monophyllus lateralis bracteiformis tricuspидatus. Cor. 5-petala. Stam. 20, quorum 5 sterilia. Styli 5. Caps. 5-coalitae unilocul. 2-spermae.*

\*I. ASSONIA *populnea.*

*Assonia populnea. Cavan. diff. 3. p. 120. t. 42. f. 1.\**

Pappelblättrige Assonie. W.

*Habitat in sylvis insulae Borboniae. † (v. l.)*

*Folia alterna longe petiolate fere ut in Populo balsamifera utrinque glabra saturate viridia ovato-lanceolata basi subcordata crenata subtriplinervia venosa. Flores albi in corymbo bifido terminali longe pedunculato. W.*

## \*1279. D O M B E Y A.

*Cavan. diff. 3. p. 121.*

*Cal.* duplex, exterior 3-phyllus deciduus. *Cor.*  
5-petala. *Stam.* 20, quorum 5 sterilia.  
*Stylus* 5-fidus. *Caps.* 5 coalitae unilocul.  
1-f. polyspermae.

\*1. DOMBEYA *palmata.*

D. foliis glabris cordatis septemlobo-palmatis, lobis lanceolatis ferratis, corymbo bifido. W.

D. foliis cordatis palmatis subglabris, digitationibus septem acutis ferrato-crenatis, floribus corymbosis. *Cavan. diff. 3. p. 122. t. 38. f. 1. \**

Handförmige Dombeye. W.

*Habitat in insula Borbonia. †*

Corymbi vel Umbellae bifidae hujus generis speciebus peculiare, gaudent in pedunculi communis divisura, pedunculo solitario unifloro. W.

\*2. DOMBEYA *acutangula.*

D. foliis oblongis cordatis quinquangularibus acuminatis crenatis, junioribus ferrugineo-tomentosis, corymbis bifidis. W.

D. foliis cordatis subrotundo-tricuspidatis crenatis, initio tomentosis, floribus racemosis. *Cavan. diff. 3. p. 123. t. 38. f. 2. \**

Spitzeckige Dombeye. W.

*Habitat in insula Borbonia. †*

\*3. DOMBEYA *angulata.*

D. foliis subrotundis cordatis dentatis tomentosis obsolete tricuspidatis, umbellis simplicibus axillaribus. W.

D. foliis cordatis subrotundis, supra angulatis ferrato-dentatis tomentosis, umbellis numerosis, pedunculis communibus petiolo brevioribus. *Cavan. diff. 3. p. 123. t. 39. f. 1. \**

Eckige Dombeye. W.

*Habitat in insula Borbonia. †*

Folia subrotunda cordata dentata acuminata in utroque latere supra medium apicem versus angulo prominente instructa. Stipulae ovato-lanceolatae magnae. Umbellae simplices. W.

\*4. *DOMBEYA tiliaefolia.*

D. foliis subrotundis cordatis crenatis, junioribus tomentosis, corymbo bifido. W.

D. foliis cordatis subrotundo-acutis crenatis, floribus racemoso-corymbosis. *Cavan. diff. 3. p. 124. t. 39.*

*f. 2.\**

Lindenblättrige Dombeya. W.

*Habitat in insula Borbonia. †*

\*5. *DOMBEYA tomentosa.*

D. foliis subrotundis cordatis acuminatis crenatis tomentosis, umbellis bifidis. W.

D. foliis cordatis subrotundis crenatis tomentosis venosis, venis fere circularibus, floribus umbellatis. *Cav. diff. 3. p. 125. t. 39. f. 3.\**

Filzige Dombeya. W.

*Habitat in Madagascar. †*

*Folium orbiculatum cordatum acuminatum crenatum quinquenervium venosum, subtus vero venulae sunt transversales et fere in circulis concentricis posita. Stipulae subrotundo-ovatae. W.*

\*6. *DOMBEYA umbellata.*

D. foliis ovato-acuminatis cordatis glabris subrepandis, umbellis simplicibus multifloris capitatis. W.

D. foliis cordatis ovato-oblongis acuminatis repandis glabris, floribus umbellatis globosis. *Cavan. diff. 3. p. 127. t. 41. f. 1.\**

Doldenblütige Dombeya. W.

*Habitat in insula Borbonia. †*

\*7. *DOMBEYA ferruginea.*

D. foliis subpeltatis ovato-oblongis subcordatis ferrulatis superne glabris subtus ferrugineo-tomentosis, corymbis bipartitis. W.

D. foliis ovato-oblongis septemnerviis subtus ferrugineis, petioliis pedunculis calycibusque tomentosis. *Cav. diff. 3. p. 128. t. 42. f. 2.\**

Braune Dombeya. W.

*Habitat in summitate montis Trimamis insulae Mauriti. †*

\*8. *DOMBEYA Erythroxyton.*

D. foliis subpeltatis ovatis acuminatis cordatis crenula-

tis, subtus tomentosus reticulatis, pedunculis subtrifloris, floribus pentandris. W.

Pentapetes (*Erythroxylo*) foliis cordatis subcrenatis subtus tomentosus rugoso-reticulatis, floribus subumbellatis decandris. *Ait. Kew. 2. p. 438.*

Pentapetes (*Erythroxylo*) foliis lanceolato-cordatis crenatis acuminatis. *Forst. in Comment. goett. 9. p. 61.\**

Alcea arborea populi nigrae foliis, prona parte albicantibus, flore amplissimo rubicundo. *Pluk. mant. 6. t. 333. f. 1. Amman. in Comment. petrop. 8. p. 217.*

Rothholzige Dombeye. W.

*Habitat in nemoribus insulae St. Helenae. †*

Corolla magna. Stamina decem, quorum quinque sterilia. W.

\*9 **DOMBEYA decanthera.**

D. foliis ellipticis acuminatis repando-dentatis glabris, umbellis simplicibus, floribus pentandris. W.

D. (*decanthera*) foliis ovatis acumine terminatis repando-crenatis glabris, staminibus quinque diantheris, floribus parvis umbellatis. *Cavan. diff. 3. p. 126. t. 40. f. 2.\**

Zehnbeutlige Dombeye. W.

*Habitat in Madagascar. †*

Folia fere Solani boariensis at acuminata atque minora. Filamenta decem, quorum quinque sterilia lauceolata longiora, quinque fertilia breviora filiformia antheris geminatis. W.

\*10 **DOMBEYA velutina.**

D. foliis ovato-lanceolatis ferratis tomentosus, umbellis axillaribus simplicibus quadrifloris, floribus pentandris. W.

Pentapetes (*velutina*) foliis ovato-lanceolatis ferratis, floribus pentandris. *Vahl symb. 1. p. 49.*

Melhania velutina. *Forst. descr. 64.\**

Sammetartige Dombeye. W.

*Habitat in Arabiae felicitis monte Melhan. †*

Filamenta decem, quorum quinque sterilia. W.

\*11. **DOMBEYA ovata.**

D. foliis ellipticis tomentosus dentatis basi integerrimis, corymbo bipartito. W.

D. foliis ovatis dentatis quinquenerviis tomentosis, stylo minimo. *Cavan. diff.* 3. p. 127. t. 41. f. 2.\*

Elliptische Dombeye. W.

*Habitat in insula Borbonia.* W.

\* 12. DOMBEYA *punctata.*

D. foliis oblongo-ovatis subdentatis superne punctato-scabris, subtus tomentosis, corymbis bifidis capitatis. W.

D. foliis ovato-lanceolatis longis integerrimis subtus tomentosis, desuper punctato-scabris. *Cavan. diff.* 3. p. 125. t. 40. f. 1.\*

Punctirte Dombeye. W.

*Habitat in Caffrorum planitie insulae Borboniae.* †  
(v. l.)

Folia ovato-oblonga superne a pilis stellatis punctata scabra, subtus dense pilis stellatis tomentosa. Basis foliorum est subcordata. W.

*Alcea arbor populnea fronde tota argentea quinquecapsularis f. Ebenus viridis ex insula St. Helena Pluk. mant.* 6. t. 333. f. 3. est alia mihi ignota hujus generis species. W.

1280. PENTAPETES.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1122.

*Cal.* duplex, exterior triphyllus caducus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20, quorum 5 sterilia. *Styl.* obsolete 5-dentatus. *Caps.* 5-locul. polysperma, dissepimentis contrariis.

I. PENTAPETES *phoenicea.*

P. foliis hastato-lanceolatis ferratis. *Sp. pl.* 958. *Mill. dict. ic.* t. 201.

Dombeya (*phoenicea*) foliis subhastatis longissimis crenato-ferratis, floribus saturate purpureis cernuis. *Cavan. diff.* 3. p. 129. t. 43. f. 1.\*

*Alcea indica* lucido hastato folio, flore blattariae phoeniceo. *Pluk. phytog.* 255. f. 3. *Raj. suppl.* 523. *Trew. rar.* 7. t. 5.

*Alcea fruticosa* pentaphylloidis aemula, floribus amoenissime rubellis, calyce producto. *Pluk. phyt.* 126. f. 4.

*Blattaria zeylanica*, flore amplo coccineo. *Comm. hort.* 1. p. 11. t. 6.

Flos impius. *Rumph. amb.* 5. p. 288. t. 100. f. 1.

Siamin. *Rheed. mal.* 10. p. 1. t. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 427.

Scharlachrothe Pentapetes. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. v.)

Cotyledones bipartitae. Pedunculi axillares gemini. Involucrum unislorum triphyllum deciduum. Flores cernui. Stamina 15: inter horum singula tria Filamentum castratum longitudine corollae petaloideum coloratum.

## \* 1281. P T E R O S P E R M U M.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1124.

*Cal.* simplex 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20, quorum 5 sterilia. *Styl.* cylindraceus. *Stigma* crassiusculum. *Capf.* lignosa 5-locularis. *Sem.* alata.

### I. P T E R O S P E R M U M *suberifolium.*

*P.* foliis oblongis acuminatis apice subdentatis. W.

Pentapetes (*superifolia*) foliis ovatis repandis. *Sp. pl.* 959. *Amoen. acad.* 1. p. 407.

Pentapetes (*suberifolia*) foliis oblongis repandis apice sinuatis acuminatis subtus incanis. *Cavan. diff.* 3. p. 130. t. 43. f. 2.

Pentapetes. *Fl. zeyl.* 250.\*

*Pterospermadendrum suberis* folio anguloso subtus incano floribus albis. *Ammann Act. petrop.* 8. p. 215. t. 14.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 148.

Zugespitzter Flügelkern. W.

*Habitat in India orientali.* ☿ (v. l.)

Ramuli ferrugineo-tomentosi. Folia alterna petiolata oblonga tri-vel quadriuncialia acuminata coriacea superne glabra, subtus albo-tomentosa. Variat forma foliorum saepius enim sunt integerrima, interdum vero apice sinuato-lentata. Racemus pauciflorus terminalis. Flores male depinxit *Anman. l. c.* cujus figurametiam *Clariff. Cavanilles* assumpsit, sunt enim duplo et ultra majores. Calyx externe et interne fulvo tomento splendido obductus, laciniis linearibus acutis margine interne glabris. Petala obovata calycis laciniis sesquiuncialibus parum breviora, in sicco meo specimine



*atra, forte itaque alba, externe albo-tomentosa interne glabra.* W.

2. **PTEROSPERMUM acerifolium.**

*P. foliis oblongis cordatis obtusis subintegerrimis.* W.

*Pentapetes (acerifolia) foliis cordatis repandis.* *Sp. pl.* 959. *Amoen. acad.* 1. p. 408. *Cavan. diff.* 3. p. 131. t. 44.

*Pterospermadendrum folio aceris, flore fructuque majore.* *Ammann. act. petrop.* 8. p. 216. t. 16. 17.\* *Burm. ind.* 145.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 150.

*Herzblättriger Flügelkern.* W.

*Habitat in India orientali.* †

**P O L Y A N D R I A.**

1282. **C A R O L I N E A.**

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1225.

*Cal.* simplex subtruncatus. *Filamenta* ramosa. *Stylus* longissimus. *Stigmata* 6. *Capf.* lignosa unilocularis polysperma.

1. **C A R O L I N E A princeps.**

*C. foliis subquinatis, foliolis ovato-lanceolatis.* *Swartz. prod.* 101.

*Carolinea princeps.* *Lin. suppl.* 314.

*Pachira aquatica.* *Aubl. guj.* 2. p. 725. t. 291. 292.\*

*Cavan. diff.* 3. p. 176. t. 72. f. 1.

*Sergeant Surinam.*

*Cacao lauvage Gujan.*

*Fürstliche Caroline.* W.

*Habitat in Gujanae locis aqua marina submersis ad fluviorum ripas.* †

*Arbor inermis magna. Folia alterna petiolata digitata, foliolis tribus s. quinque, lato-lanceolatis subpetiolatis integerrimis. Stipulae binae breves caducae. Flores solitarii axillares sessiles maximi speciosissimi. Petala flava. Filamenta rubra. Antherae purpureae. Fructus facie fructus Cacao s. Cucumeris torulosus obovatus. Semina amygdalina, cotyledonibus plicatis.*

Semina esculenta sunt, sed non multa edenda, nisi prius tosta, nam nimis statulenta.

\* 2. CAROLINEA insignis.

C. foliis subseptenatis, foliolis obovato-oblongis. Swartz prod. 101. Fl. ind. occid. 2. p. 1202.\*

Bombax (*grandiflorum*) foliis septenatis, floribus pentapetalis maximis polyandris, staminibus basi in tubum coalitis. Cavan. diff. 5. p. 295. t. 154.\*

Xiloxochitl flore capillaceo. Hernand. mex. 68.

Ansehnliche Carolina. W.

Habitat in America meridionali prope Veram Crucem, in Brasilia, inque insulis Tabago et Martinica. † (v. l. f. fl.)

1283. ADANSONIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1126.

Cal. simplex, deciduus. Stylus longissimus. Stigmata plura. Caps. lignosa, 10-locularis pulpa farinacea, polysperma.

I. ADANSONIA digitata.

Adansonia digitata. Sp. pl. 960. Cavan. diff. 5. p. 298. t. 157.\*

Baobab. Alp. aegypt. 66. t. 67.

Baobab f. Abavi. Bauh. hist. 1. p. 110.

Abavo arbor, radice tuberosa. Bauh. pin. 434.

Guanabanus scaligeri. Bauh. hist. 1. p. 109. Raj. hist.

1371.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 151.

Gefingerte Adansonie. W.

Habitat in Senegal, Aegypto. † (v. l. f. fl.)

Genus et Habitus nimum affinia Bombaci; differt enim fructificatio tantum farina obducente semina loco lanae.

Arbor trunco valde crasso, diametro saepe 25-pedali. W.

## 1284. B O M B A X.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1127.*

*Cal* 5-fidus. *Stam.* 5 f. multa. *Capf.* lignosa. 5-ocularis, 5-valvis. *Sem.* lanata. *Recept.* 5-gonum.

## 1. BOMBAX pentandrum.

B. floribus pentandris, antheris anfractuosis, foliis septenatis. W.

B. foliis pentandris, foliis septenatis. *Sp. pl.* 959. *Jacq. amer.* 191. t. 176 f. 70. *Mill. dict. n.* 2.

B. foliis septenatis lanceolatis, floribus pentandris, antheris lunatis binis aut ternis. *Cavan. diff.* 5. p. 293. t. 151. \*

B. foliis digitatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 220. *Hort. upf.* 148.

B. foliis, digitatis, brachiis erecto-patentibus. *Brown. jam.* 277.

Xylon caule inermi. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 437.

Gossypium javanense, falicis folio. *Bauh. pin.* 430.

Eriophoros javana. *Rumph. amb.* 1. p. 194. t. 80.

Pania paniala. *Rheed. mal.* 3. p. 59 t. 49. 50. 51.

Houttuyn Lin. *Pfl. Syst.* 2. p. 161.

Fünflädiger Wollbaum. W.

*Habitat in India orientali, etiam in America.* † (v. l.)

Folia nunc integerrima, nunc serrata. Caulis tenerior aculeatus, adultior inermis. Flores numerosissimi.

Vidi tantum specimina plantae Indiae orientalis, americana mihi est ignota, nec affirmare possum an eadem. Antherae in plantis indicis sunt incumbentes anfractuosae, loculis gyrose intortis. Corolla est extus lanata. Similis sequenti, sed antherarum forma et corolla multo minori diversa. W.

## \*2. BOMBAX Erianthos.

B. floribus pentandris, antheris simplicibus erectis, foliis septenatis. W.

B. caule aculeato, foliis septenatis lanceolatis glabris, corollis magnis extus lanatis, antheris adnatis. *Cav. diff.* 5. p. 294. t. 152. f. 1. \*

Vieltachlicher Wollbaum. W.

*Habitat in Brasilia prope S. Sebastjanum.* †

3. BOMBAX *Ceiba*.

B. floribus polyandris, foliis quinatis. *Sp. pl.* 959. *Mill. dict. n.* 1.

B. quinatum. *Jacq. amer.* 192. t. 176. f. 71.

B. caule aculeato, foliis quinatis, floribus monopetalis polyandris, fructu apice concavo. *Cavan. diff.* 5. p. 296. t. 152. f. 2. \*

Xylon foliis digitatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 221. *Hort. upf.* 148.

Xylon caule aculeato. *Hort. cliff.* 75. *Roy. lugdb.* 437.

Gossypium arboreum, caule spinoso. *Bauh. pin.* 430.

Gossypium arboreum maximum spinosum, folio digitato, lana sericea grisea. *Sloan. jam.* 159. *hist.* 2. p. 72.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 166.

Starker Wollbaum. W.

*Habitat in America.* ‡

*Arbor caudice aculeato est.*

4. BOMBAX *heptaphyllum*.

B. floribus polyandris, foliis septenis. *Sp. pl.* 960.

B. septenatum. *Jacq. amer.* 193.

B. foliis septenatis, floribus polyandris, staminibus pentadelphis. *Cavan. diff.* 5. p. 296. \*

Gossypium f. Xylon arbor orientalis digitatis foliis laevibus fructu alba nitente lanugine. *Pluk. alm.* 172. t. 188. f. 4.

Moul-elauou. *Rheed. mal.* 3. p. 61. t. 52. *Raj. hist.* 1899.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 168.

Siebenblättriger Wollbaum, W.

*Habitat in America.* ‡

*Arbor caudice inermi.*

\*5. BOMBAX *globosum*. †

B. floribus - - - , foliis quinatis septenisve obovatis emarginatis, fructu globoso. W.

B. foliis quinatis emarginatis, fructu globoso rufescente. *Aubl. guj.* 2. p. 701. t. 281. \* *Cavan. diff.* 5. p. 297. t. 155. et *Diff.* 6. p. 353.

Kugelträchtiger Wollbaum. W.

*Habitat in Cajenna.* ‡

6. BOMBAX *Gossypinum*.

B. foliis quinquelobis acuminatis subtus tomentosis.

*Syst. Veg.* 517. *Fl. zeyl.* 222. *Sonnerat, itin.* 2. p. 255. t. 133.\*

B. foliis quinquelobis acuminatis subtus tomentosis, floribus polyandris, calycibus pentaphyllis. *Cavan. diff.* 5. p. 297. t. 156.\*

*Ketmia* folio quinquefido subtus candicante, flore flavescente, semine tomentoso. *Burm. zeyl.* 136. R.

*Bombax Conga.* *B. ind.* 145. R.

*Grossypium frutescens* annuum, folio vitis ampliore quinquefido, insulae providentiae. *Pluk.* 172. t. 188. f. 2?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 170.

Baumwollenartiger Wollbaum. W.

*Habitat in India orientali.* ♀ (v. l.)

*Simillimum* *Gossypio religioso*, ut figura *Pluknetii* utramque referat, sed differt foliis subtus tomentosis et staminibus distinctis.

### \*1285. L A G U N A E A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1128.

*Cal.* simplex quinquefidus. *Styl.* quinquefidus.  
*Capsf.* quinquelocularis, dissepimentis contrariis!

#### \*1. LAGUNAEA lobata.

L. foliis cordatis trilobis dentatis. W.

*Solandra lobata.* *Murr. in Com. goett.* 1784. p. 21. t. 1.\*

*Cav. diff.* 2. p. 55. et *diff.* 5. p. 279. t. 136. f. 1.

*Hibiscus (Solandra)* foliis subcordatis tricuspидatis serratis, calycibus ecalyculatis. *VHerit stirp.* 1. p. 103. t. 49.\*

*Triguera (acerifolia)* foliis petiolatis, inferioribus cordatis, superioribus palmatis incilis, summis trifidis aut lanceolatis, caule spica laxa terminato, pedunculis unifloris. *Cavan. diff.* 1. p. 41. t. 11. f. ult.\*

Lappige Lagunaea. W.

*Habitat in insula Borbonia.* ☉ (v. v.)

#### \*2. LAGUNAEA ternata.

L. foliis ternatis simplicibusque integerrimis. W.

*Solandra (ternata)* caule herbaceo villoso, foliis inferioribus ternatis, medio longissimo, superioribus subha-

statis longissimis integerrimis. *Cavan. diff. 5. p. 279. t. 136. f. 2.\**

Dreyblättrige Lagunaea. W.

*Habitat in Senegal. †*

Folia integerrima, inferiora ternata, foliolis lanceolatis obtusis, superiora indivisa lanceolata obtusa basi auriculato-cordata. W.

\*3. LAGUNAEA aculeata.

L. foliis ternatis, foliolis inciso-dentatis, caule muricato. W.

Laguna (aculeata) caule aculeato-tomentoso, foliis profunde multipartitis, floribus axillaribus solitariis. *Cav. diff. 3. p. 173. t. 71. f. 1.\**

Stachliche Lagunaea. W.

*Habitat in Coromandel prope Pondicheri.*

Caulis muricatus. Calyx quinquedentatus longitudinaliter rumpens. W.

1286. S I D A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1129.*

Cal. simplex, angulatus. Stylus multipartitus. Caps. plures, mono- seu trispermae.

\*Foliis angustis lanceolatis, oblongis, ovatisque.

\*1. SIDA linifolia.

S. foliis linearibus integerrimis, racemis terminalibus, capsulis submuticis. W.

S. (linifolia) foliis linearibus hirsutis integerrimis, floribus corymbose-spicatis, spicis terminalibus. *Cavan. diff. 1. p. 14. t. 2. f. 1.\**

Malva hirsuta gramineo folio. *Barr. aeq. 72. Aubl. guj. 2. p. 704.*

Leinblättrige Sida. W.

*Habitat in Peru inque insula Cajenna.*

Capsulae quinque submuticae. W.

\*2. SIDA angustifolia.

S. foliis lineari-lanceolatis dentatis, pedunculis subfoliariis axillaribus, capsulis bicuspidatis. W.

S. (angustifolia) foliis linearibus dentatis subtus glaucis subtomentosis nudis subtrispinosis. *L'Herit. stirp. 1. p. 89. t. 52.*

S. (*angustifolia*) foliis angustis oblongis ferratis, axillis subspinosis, trium spinularum media majore. *Cav. diff. 1. p. 14. t. 2. f. 2.\* et diff. 2. p. 48.*

S. (*angustifolia*) foliis lineari-lanceolatis ferratis subtus tomentosis, stipulis setaceis, axillis trispinosis. *Murr. Syst. veg. ed. 14. p. 621.*

S. (*ulmifolia*) foliis inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus linearibus, omnibus ferratis, capsulis bicuspidatis. *Retz. obs. 3. p. 37.\**

Schmalblättrige Sida. W.

*Habitat in Brasilia inque insula Borbonia. 2 (v. v.)*

*Capsulae quinque birostratae. Axillae foliorum unif. biflorae. W.*

### \*3. SIDA acuta.

S. foliis lineari-lanceolatis dentatis, pedunculis solitariis axillaribus, capsulis bicuspidatis, stipulis lanceolatis. W.

S. (*acuta*) foliis anguste lanceolatis dentatis inferne integris, floribus subsessilibus solitariis. *Cavan. diff. 1. p. 15. t. 2. f. 3.\**

S. foliis lanceolatis ferratis, stipulis setaceis, floribus axillaribus solitariis. *Burm. ind. 147.*

*Althaea coromandeliana* angustis praelongis foliis, semine bicorni. *Pluk. mant. 10. t. 334. f. 1.*

*Silagurium longifolium.* *Rumph. amb. 6. p. 43. t. 18. f. 2.*

*Tsjeru-parua.* *Rheed. mal. 10. p. 105. t. 53.*

Spitzige Sida. W.

*Habitat in Java.*

*Similis praecedenti, sed floribus axillaribus solitariis, et stipulis lanceolatis, nec setaceis diversa. W.*

### \*4. SIDA canariensis. W.

S. foliis lanceolatis sublinearibus dentatis glabris, pedunculis solitariis axillaribus longitudine foliorum, capsulis birostratis. W.

S. (*alba*) foliis ovato-oblongis angustis ferratis glabris, pedunculis longissimis erectis, stigmatibus purpureis, axillis inermibus. *Cavan. diff. 1. p. 22. t. 3. f. 8.\* et diff. 2. p. 48.\**

Canarische Sida. W.

*Habitat in Canariis. †*

*Non est S. alba Linnæi. Capsulae 9-10 birostratae. W.*

## \*5. SIDA lanceolata.

S. foliis oblongo-lanceolatis dentatis glabriusculis, pedunculis axillaribus solitariis capsulis birostratis, stipulis linearibus nervosis pedunculo longioribus. W.

S. (*lanceolata*) foliis lanceolatis ferratis, stipulis linearibus acutis nervosis. *Hetz. obs. 4. p. 28.\**

S. (*stipulata*) foliis lanceolatis acutis pilosis, stipulis longis linearibus ciliatis, flore longioribus. *Cavan. diff. 1. p. 22. t. 3. f. 10.\**

Lanzettblättrige Sida. W.

*Habitat in Zeylona, et in insula Mauriti. ☉ (v. f.)*

*Stipulae lineares longae nervosae ciliatae, saepius altera stipularum est filiformis. Capsulae sunt 5-9. W.*

## 6. SIDA spinosa.

S. foliis ovato-lanceolatis obsolete cordatis dentatis, pedunculis subfoliariis axillaribus, axillis subspinosis, stipulis setaceis pedunculo longioribus, capsulis birostratis. W.

S. foliis cordato-ovatis ferratis, stipulis setaceis axillis subspinosis. *Hort. upf. 199. Fl. zeyl. 254. Roy. lugdb. 349. Cavan. diff. 1. p. 11. t. 1. f. 9.\* Swartz. obs. 257. Vahl. symb. 2. p. 78.*

S. foliis cordato-ovatis ferratis, capsulis quinis bicuspidatis. *Hort. cliff. 346.*

*Stewartia (corchoroides)* foliis ovatis ferratis subtus villosis. *Forsk. descr. 126.*

*Malva erecta minor* carpini folio, flore luteo, femibus singulis simplici aculeo longiori donatis. *Sloan. cat. 96. hist. 1. p. 218.*

*Alcea carpinifolia americana* frutescens, flosculis luteis, femine duplici rostro. *Comm. hort. 1. p. 3. t. 2.*

*Althaea virginiana* bidens, pimpinellae majoris acutiore folio, flosculis minimis luteis. *Pluk. alm. 25. t. 9. f. 6.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 429.*

Stachliche Sida. W.

*Habitat in India orientali, Arabia felici, Senegal, Jamaica et Gujana. ☉ (v. v.)*

## \*7. SIDA frutescens.

S. foliis ovato-oblongis ferratis, pedunculis unifloris axillaribus, capsulis birostratis. W.

S. foliis ovato-oblongis ferratis subtus albicantibus, pe-



dunculis erectis unifloris folio duplo minoribus. *Cav.*

*diff. I. p. 12. t. 10. f. 1.\**

Strauchartige Sida. W.

*Habitat* - - - - †

Capfulae 3 birostratae. W.

8. SIDA *carpinifolia*.

S. foliis ovato-oblongis subduplicato-ferratis, pedunculis axillaribus subquadrifloris, capsulis birostratis. W.

S. fruticosa, foliis bifariis ovato-lanceolatis ferratis, serraturis arctatis, umbellis axillaribus. *Lin. suppl. 307.*

*Jacq. ic. rar. I. t. 135. Collect. I. p. 38.\* Cavan. diff. 5. p. 274. t. 134. f. 1.\**

S. (*planicaulis*) foliis ovato-lanceolatis ferratis, caule compresso, floribus subsessilibus. *Cavan. diff. I. p. 24. t. 3. f. 11. (junior planta)*

Haynbuchenblättrige Sida. W.

*Habitat culta Maderae in horto Monasterii St. Francisci. † (v. v.)*

Rami patentes bifarii pilosi. Folia breve petiolata bifaria ovato-lanceolata serrata, serraturis terminatis pilos. seta rigida, venosa glabra. Stipulae subulatae petiolo longiores erectae coniventes. Pedunculi axillares rarius solitarii umbellati, longitudine petioli pilosi. Calyx glaber. Corolla lutea. Capsulae octo apice birostratae.

Capfulae non sunt muticae ut dixit *Clariff. Cavanilles. W.*

9. SIDA *jamaicensis*.

S. foliis ovatis ferratis tomentosis, floribus axillaribus subpedunculatis, capsulis quinis bicornibus. *Sp. pl. 962. Amoen. acad. 5. p. 401.\* Swartz. obs. 258.\**

*Cavan. diff. I. p. 17. t. 2. f. 5.\**

S. humilior foliis ovatis ferratis distiche sitis, petiolis et pedunculis brevibus, ramulis floriferis foliatis alaribus. *Brown. jam. 280.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 432.*

Jamaicansche Sida. W.

*Habitat in aridis Jamaicae australis. †*

\*10 SIDA *orientalis*.

S. foliis ovatis acuminatis dentatis glabris, pedunculis unifloris axillaribus, capsulis muticis. W.

S. foliis ovato-acutis et rhombeis inferne integris supra *Linnaei Spec. Plant. T. III.*

A a a

inaequaliter ferratis, stipulis oblongis linearibus, capsulis muticis. *Cavan. diff.* I. p. 21. t. 12. f. 1.\*  
 Orientalische Sida. W.

*Habitat in India orientali.*

Capsulae 9-10 muticae. Cavan. l. c.

\*11. SIDA *glomerata*.

S. foliis ovato-lanceolatis ferratis, floribus subquinis axillaribus subsessilibus, capsulis bicornibus. W.

S. ovato-lanceolatis dentatis, subsessilibus, floribus conglomeratis sessilibus. *Cavan. diff.* I. p. 18. t. 2. f. 6.\*

Gedrängtblütige Sida. W.

*Habitat* - - - -

Caulis simplex pedalis tomentosus. Folia tomentosa. Stipulae lanceolatae erectae. Calyces ciliati. Corolla lutea. Cavan. l. c.

Capsulae 5 bicornes: *Varietatem muticis capsulis, (quae forte distincta species) habet Clariss. Cavanilles.* W.

\*12. SIDA *maculata*.

S. foliis ovatis obtusis ferratis tomentosis, pedunculis axillaribus, apice caulis racemosis, capsulis bicornibus. W.

S. foliis ovatis ferratis tomentosis, floribus spicatis terminalibus, corollis maculatis. *Cavan. diff.* I. p. 20. t. 3. f. 7.\*

Gefleckte Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica.* †

Capsulae novem birostratae. Corolla mediocris flava basi maculis quinque rubris. W.

\*13. SIDA *suberosa*.

S. foliis ovatis dentatis hirsutis, pedunculis axillaribus unifloris petiolo duplo longioribus, capsulis bicornibus, caule basi suberoso. W.

S. foliis ovalibus subinciso-dentatis, cortice suberoso. *l'Herit. stirp.* I. p. 113. t. 54.

Korkrindige Sida, W.

*Habitat in Hispaniola.* †

Capsulae 9 birostratae. S. *brasiliensis* Cavan. *diff.* I. p. 37. et *diff.* 2. t. 34. f. 1. huic est proxima, sed differre videtur, est vero planta dubia, cujus flores et capsulae ignotae. W.

\*14. SIDA *capensis*.

S. foliis ovato-lanceolatis dentatis, pedunculis solitariis,

stipulis linearibus ciliatis petiolo longioribus, capsulis muticis. W.

S. caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis quandoque subrotundo-ovatis dentatis, stipulis ciliatis, capsulis muticis. *Cavan. diff. 1. p. 23. t. 12. f. 3. et diff. 2. p. 49.*

*Althaea maderaspatana melochiae angustis foliis: fructu ex alis foliorum pediculo curto. Pluk. alm. 25. t. 240. f. 5.*

Capische Sida. W.

*Habitat ad Cap. b. spei?*

Capsulae decem muticae. Cavan. l. c.

\*15. SIDA *microphylla*.

S. foliis ellipticis dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis bicornibus. W.

S. caule erecto duro ramosissimo, foliis ovatis dentatis parvis, floribus axillaribus pluribus in caulis et ramorum apicibus. *Cavan. diff. 1. p. 22. t. 12. f. 2.\**

Kleinblättrige Sida. W.

*Habitat in India orientali. 4 (v. l.)*

Capsulae septem bicornes. Cavan. l. c.

\*16. SIDA *micans*.

S. foliis ovatis obtusis ferratis tomentosis nitidis, pedunculis solitariis petiolo multo longioribus, capsulis bicornibus. W.

S. foliis subcordatis ovato-lanceolatis dentatis tomento mollissimo micantibus, calycibus globosis decemangulatis. *Cavan. diff. 1. p. 19. t. 3. f. 1.\**

Glänzende Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica.*

\*17. SIDA *pufilla*.

S. foliis subrotundo-ellipticis dentatis glabris, pedunculis petiolo longioribus solitariis, capsulis muticis, caule prostrato. W.

S. caule fruticoso reclinato minimo, foliis ellipticis dentatis glabris. *Cavan. diff. 1. p. 6. t. 1. f. 4.\* et diff. 5. t. 127. f. 1.*

Zwerg-Sida. W.

*Habitat in insula Mahe. †*

Capsulae quinque muticae. Cavan. l. c.

\* \* *Foliis cuneiformibus.*

18. *SIDA rhombifolia.*

S. foliis oblongato-lanceolatis dentatis basi cuneiformibus integerrimis, pedunculis petiolis multo-longioribus, capsulis bicornibus. W.

S. foliis lanceolato-rhomboidibus ferratis, axillis subbispidosis. *Sp. pl.* 961. *Vir. cliff.* 68. *Hort. cliff.* 346. *Hort. upf.* 199. *Fl. zeyl.* 252. \* *Gron. virg.* 101. *Roy. lugdb.* 349. *Murray prod.* 168. *Kniph. cent.* 8. n. 85. *Cavan. diff.* 1. p. 23. t. 3. f. 12. \* *et diff.* 2. p. 48. *Swartz obs.* 257.

Malva minor erecta betonicae folio, flore luteo, semine duplici rostro praedita. *Sloan. cat.* 96. *hist.* 1. p. 217.

Malvinda unicornis, folio rhomboide perennis. *Dill. elth.* 216. t. 172. f. 212.

Althaea carpinifolia, flosculis luteis. *Bocc. sic.* 11. t. 2.

Rautenförmige Sida. W.

*Habitat in India orientali, Jamaica.* † (v. v.)

\*19. *SIDA canescens.*

S. foliis rhombeo-ovatis apice dentatis subtus tomentosis, pedunculis folio longioribus. W.

S. caule humili fruticoso, foliis rhomboidibus subtus villosissimis subsessilibus, stipulis setaceis nigris erectis. *Cavan. diff.* 1. p. 23. t. 8. f. 3.

Graue Sida. W.

*Habitat in Senegal.* †

*Capsulae ignotae.* W.

20. *SIDA retusa.*

S. foliis obovatis apice dentatis retusis subtus tomentosis, pedunculis solitariis folio longioribus, capsulis muticis. W.

S. foliis cuneiformibus retusis ferratis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 961. *Cavan. diff.* 1. p. 18. t. 3. f. 4. *et diff.* 5. p. 274. t. 131. f. 2.

Althaea indica, latiori folio cordiformi ad summum sinuato. *Pluk. alm.* 26. t. 9. f. 2.

Silagurium rotundum seu vulgare. *Rumph. amb.* 6. p. 44. t. 19.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 431.

Ausgerandete Sida. W.

*Habitat in Tranquabaria, Amboina, Philippinis et insula Mauritii.* ☉ (v. l.)

*Varietatem S. alnifoliae statuit Dillenius, mihi distincta visa est.*

Capulae novem muticae. Cavan. l. c.

21. SIDA *alnifolia*.

S. foliis subrotundo-obovatis dentatis basi integerrimis, pedunculis pluribus axillaribus folio brevioribus, capsulis bicornibus. W.

S. foliis orbiculatis plicatis ferratis, Hort. cliff. 346. Hort. upf. 200. Fl. zeyl. 253. \* Roy. lugdb. 349. Mill. dict. n. 7.

S. foliis ferratis subvillosis, inferioribus rotundatis cordatis, mediis ellipticis, superioribus lanceolatis. Cav. diff. I. p. 12. t. I. f. 13?

Malvinda stellata alnifolia. Dill. elth. 215. t. 172. f. 211.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 431.

Ellenblättrige Sida. W.

Habitat in India orientali. ☉

Capulae 6-7 bicornes. W.

22. SIDA *ciliaris*.

S. foliis lanceolatis truncatis dentatis basi subcuneatis, stipulis linearibus ciliatis flore longioribus, floribus solitariis subsessilibus, capsulis muticis muricatis. W.

S. foliis ovalibus retusis ferratis, stipulis linearibus ciliatis, seminibus muricatis. Sp. pl. 961. Amoen. acad. 5. p. 401. \* Cavan. diff. I. p. 21. t. 3. f. 9. \* et diff. 5. p. 275. t. 127. f. 2. Swartz. obs. 257. \*

Malva minima supina, foliis oblongis ferratis pedunculis unifloris monophyllis, calyce exteriori remoto, foliolis angustissimis ciliatis. Brown. jam. 282.

Malva minor supina betonicae folio, flore coccineo, seminibus asperis. Sloan. jam. 96. hist. I. p. 217. t. 137. f. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 431.

Gefranzte Sida. W.

Habitat in Jamaicae aridis graminosis inque insula St. Dominica. †

Flores sanguinei. Capulae quinque muticae depressae muricatae. W.

\* \* \* Foliis cordatis integerrimis.

23. SIDA *periplocifolia*.

S. foliis cordato-lanceolatis acuminatis integerrimis sub-

tus tomentosis, pedunculis subdivisis petiolo longioribus, capsulis aristatis. W.

S. foliis cordato-lanceolatis integerrimis caule paniculato. *Sp. pl.* 962. *Fl. zeyl.* 251. *Loeßl. it.* 257. *Cav. diff.* 1. p. 26. t. 5. f. 2. \* *Swartz obs.* 260. \*

S. foliis ovatis lanceolatis, caule paniculato. *Roy. lugdb.* 349.

S. erecta glabra, foliis cordatis acuminatis integris subtus incanis, pedunculis longissimis tenuissimis. *Brown. jam.* 280.

Abutilon periplocae acutioris folio, fructu stellato. *Dill. elth.* 4. t. 3. f. 2.

Alcea populifolia, folio incano integro. *Sloan. jam. hist.* 1. p. 222. t. 139. f. 3.

Alcea orientalis scamoniae folio major, floribus albis. *Pluk. alm.* 17. t. 74. f. 7.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 434.

Schlingenblättrige Sida. W.

*Habitat in America calidiorae, Zeylona.* ☉ ☿ (v. l.)

Capsulae quinque trispermae arista solitaria terminatae. W.

\*24. SIDA *excelsior*.

S. foliis cordatis ovatis acuminatis integerrimis subtus tomentosis, racemis paniculatis, capsulis bidentatis. W.

S. foliis cordato-acuminatis integris superne rubescentibus glabris, subtus villosis lutescentibus, floribus paniculatis. *Cavan. diff.* 1. p. 27. t. 5. f. 3. \*

Hohe Sida. W.

*Habitat in Peru locis calidis.* ☿

Arbor *excelsa*. Capsulae quinque trispermae bidentatae. W.

\*25. SIDA *hernandioides*.

S. foliis subpeltatis cordatis ovatis acuminatis subintegerrimis pubescentibus, pedunculis unifloris, capsulis muticis. W.

S. foliis cordatis subpeltatis acuminatis subintegris, pedunculis fructiferis productioribus, *l'Herit. Jürp.* 1. p. 121. t. 58. \*

Hernandienblättrige Sida. W.

*Habitat in Hispaniola.* ☿

Capsulae quinque trispermae acutae. W.

\*26. SIDA *nudiflora*.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis subintegerrimis

- subtus tomentosus, panicula terminali racemosa, capsulis muticis. W.
- S. (*nudiflora*) foliis cordatis rotundatis crenulatis panicula aphylla. *L'Herit. stirp.* I. p. 123. t. 59. bis\*
- S. (*stellata*) foliis subrotundo-cordatis acutis integerrimis. *Cavan. diff.* I. p. 27. t. 5. f. 4. \* et *diff.* 6. p. 349.
- Sida periplocifolia. *β. Sp. pl.* 963.
- S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 350.
- Abuti'on amplissimo folio, caule villoso. *Plum. spec.* 2. ic. 3.
- Nacktblütige Sida. W.
- Habitat in Peru et in insula St. Dominica.* †
- Folia obsolete crenata. Capsulae 5, 6, 7; muticae trispermae. W.
- \*\*\* Foliis cordatis dentatis, pedunculis unifloris.

## 27. SIDA triquetra.

S. foliis cordatis acuminatis serrulatis, pedunculis solitariis, capsulis muticis truncatis, ramis triquetris. W.

S. foliis cordatis serratis subtomentosis, ramis triquetris. *Sp. pl.* 962. *Jacq. hort.* t. 118. *Cavan. diff.* I. p. 26. t. 5. f. 1.\*

S. (*trifulcata*) ramis trifurcatis. *Jacq. amer.* 195.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 432.

Dreykantige Sida. W.

*Habitat in America calidiore.* † (v. v.)

Frutex tripedalis, ramis subtomentosis triquetris, lateribus sulco obtuso excavatis. Folia cordata absque angulis, mollissima, obsolete tomentosa obtuse serrata acuminata. Pedunculi axillares uniflori. Corolla lutea basi purpurea. Stamina lutea. Stylus quinquefidus. Capsulae quinque trispermae. W.

## \* 28. SIDA fragrans.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis crenatis hirsutiviscosis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, capsulis bifetosis. W.

S. foliis imbricato-cordatis rotundatis ligulato-acuminatis dentatis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus. *L'Herit. stirp.* I. p. III. t. 53.\*

Wohlriechende Sida. W.

*Habitat in Hispaniola.* †

*Habitu similis S. hernandioidi. Folia triuncialia profunde cordata, lobis imbricatis, longissime acuminata. Petioli longitudine fere foliorum. Pedunculi solitarii petiolis triplo vel quadruplo breviores. Capsulae quinque monospermae bifetosae. W.*

\* 29. SIDA lignosa.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis crenatis tomentosis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis muticis. W.

S. foliis cordatis crenatis tomentosis orbiculato-acuminatis, acumine producto, capsulis 7-8 durissimis. *Cavan. diff. 1. p. 28. t. 6. f. 2.\**

Holzige Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica. †*

Capsulae muticae trispermae. W.

\* 30. SIDA reflexa.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis crenatis tomentosis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, petalis cuneiformibus apice dentatis reflexis. W.

S. foliis subrotundo-cordatis acutis tomentosis obsolete crenatis, corollis magnis reflexis coccineis. *Cavan. diff. 1. p. 36. t. 7. f. 7. et diff. 2. p. 54. atque diff. 6. p. 549. t. 195. f. 1.*

S. (*retrorsa*) foliis cordatis crenatis, petalis reflexis. *l'Herit. stirp. 1. p. 133. t. 64.\**

Zurückgeschlagene Sida. W.

*Habitat in Peru locis arenosis. †*

Capsulae 12 trispermae. W.

\* 31. SIDA humilis.

S. foliis subrotundo-cordatis supra pilosis ferratis, pedunculis subfoliariis petiolo longioribus, capsulis muticis. W.

S. (*humilis*) caule spithamaeo scabro, foliis cordatis orbiculatis villosis. *Cavan. diff. 5. p. 177. t. 134. f. 2.\**

S. (*unilocularis*) foliis rotundato-dentatis cordatis rugosis, seminibus semiarillatis. *l'Herit. stirp. 1. p. 117. t. 53. bis\**

S. (*pilosa*) foliis subrotundis cordatis ferratis, supra pilosis, seminibus eornibus. *Retz. obs. 1. p. 23.\**

β. S. (*morifolia*) foliis subrotundo acutis cordatis lato-crenatis, crenulis acuminatis, pedunculis annulatis



petiolo paulo majoribus, calycibus pilosis. *Cav. diff.*

I. p. 9. t. I. f. I. \*

*Althaea morifolia* Indiae orientalis ad foliorum sinus capitulis singularibus parvis. *Pluk. alm.* 25. t. 132. f. 5.

γ. *S. (veronicaefolia)* caule hirto, foliis cordatis inaequaliter dentatis, pedunculis longissimis suberectis pilosis. *Cavan. diff.* I. p. 7. t. I. f. 3. et *diff.* 5. p. 274. t. 127. f. 3.

*Althaea minima* surrecta *veronicae* villosis foliis e maderaspata. *Pluk. phyt.* t. 132. f. 3.

Niedrige Sida. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. l.)

Capsulae quinque muticae monospermae. W.

\* 32. SIDA *repens*.

*S.* foliis subrotundo-cordatis dentatis utrinque hispidis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, caule filiformi prostrato. W.

*S.* caule filiformi longo prostrato, foliis cordatis crenatis utrinque hispidis, pedunculis unifloris. *Cavan. diff.*

I. p. 7. t. I. f. 2. \*

Kriechende Sida. W.

*Habitat in Peru et praesertim in umbrosis* Limae.

Caulis prostratus nec radicans. Capsulae quinque muticae vel biaristatae. *Cavan. l. c.*

\* 33. SIDA *bivalvis*.

*S.* foliis ovato-cordatis acuminatis crenatis tomentosis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, calycibus aristato-acuminatis, capsulis cohaerentibus bidentatis. W.

*S.* foliis cordatis orbiculato-acuminatis tomentosis, floribus subsessilibus, fructu pentagono depresso glabro patenti. *Cavan. diff.* I. p. 13. t. II. f. 3. \*

Zweyklappige Sida. W.

*Habitat in insula* St. Dominica.

*Ab affnibus distincta:* calycibus aristato-acuminatis, capsulis quinque cohaerentibus, ad latus leviter bidentatis, obtusis bivalvibus. W.

\* 34. SIDA *ulmifolia*.

*S.* foliis ovato-cordatis acuminatis crenatis, pedunculis solitariis petiolo subaequalibus, capsulis rostratis. W.

*S.* foliis crenatis cordatis oblongis acumine producto, capsularum rostris longis hamatis. *Cavan. diff.* I. p. 15. t. 2. f. 4. \*

Rüsterblättrige Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica.*

Capulae quinque rostris exsertis longis hamatis.  
Cavan. l. c.

\* 35. *SIDA multiflora.*

S. foliis ovato-cordatis obtusiusculis dentatis tomentosis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis birostratis. W.

S. foliis ovatis dentatis tomentosis, floribus numerosis, pedunculis petiolo longioribus. *Cavan. diff. I. p. 18. t. 3. f. 3.\**

Vielblütige Sida. W.

*Habitat in Brasilia.*

Fructus intra calycem: capsulis novem birostratis, rostris fasciculatis longis. Cavan. l. c.

\* 36. *SIDA microsperma.*

S. foliis subrotundo-cordatis acutis subcrenatis, pedunculis subfolitariis petiolo brevioribus, capsulis birostratis. W.

S. caule flexuoso ramofo, foliis cordatis orbiculato-acutis quinquenerviis, fructu vix calyce majori, seminibus minimis. *Cavan. diff. I. p. 29. t. 13. f. 4.\**

Kleinsamige Sida. W.

*Habitat - - - - - †*

Capulae sub 13 trispermae, dehiscendo birostratae, rostris ciliatis, seminibus minimis. Cavan. l. c.

37. *SIDA viscosa.*

S. foliis ovato-cordatis acuminatis tenuissime ferratis tomentoso-viscosis pilosis, pedunculis subfolitariis petiolo longioribus, capsulis muticis. W.

S. foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus subfolitariis capsulis septemlocularibus rotundis depressis. *Sp. pl. 963. Amoen. acad. 5. p. 401.\* Swartz obs. 239.*

S. viscosa f. villosa, foliis cordatis acuminatis, petiolis longis, pedunculis tenuibus solitariis. *Brown. jam. 280. Althaea populi folio villosa leviter ferrato. Sloan. jam.*

*98. hist. I. p. 222. t. 139. f. 4.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 433.*

Klebrige Sida. W.

*Habitat in Jamaica. † (v. l.)*

Planta 2-4-pedalis patens. Folia minora hirsuta. Flores lutei. Tota planta viscosa, valde graveolens. Swartz l. c.

## \* 38. SIDA foetida.

S. foliis subrotundo-cordatis acutiusculis dentatis tomentosis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, capsulis muticis. W.

S. (foetida) caule erecto atropurpureo, foliis ovatis cordatis ferratis foetidis. *Cavan. diff. 6. p. 349.\**

S. (viscosa) foliis cordatis dentatis, capsulis septemlocularibus, caule viscido. *l'Herit. stirp. I. p. III. t. 53. bis \**

Stinkende Sida. W.

Habitat in Peru. ☉ (v. v.)

*Diverſa a praecedente: foliis non acuminatis, nec pilosis ſed mollibus tenuiſſime tomentosis multo majoribus groſſe dentatis, pedunculis petiolo brevioribus, capsulis ſeptem in globum coarctatis. W.*

## \* 39. SIDA calycina.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis repando-dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis muticis pyriformibus. W.

S. foliis cordatis crenatis, calyce magno quinquepartito, corollis magnis patentibus. *Cavan. diff. I. p. 9. t. 8. f. 2.\**

Großkelchige Sida. W.

Habitat in insula Borboniae.

Capsulae quinque. W.

## 40. SIDA crispa.

S. foliis oblongo-cordatis acuminatis crenatis summis sessilibus, pedunculis solitariis petiolo longioribus fructiferis dellexis, capsulis inflatis muticis undulato-crispis. W.

S. foliis cordatis sublobatis crenatis tomentosis, capsulis cernuis inflatis multilocularibus crenatis repandis. *Sp. pl. 964. Loeſt. it. 240. Kniph. cent. 4. n. 80. Cavan. diff. I. p. 30. t. 7. f. 1. \* et diff. 5. p. 275. t. 135. f. 2.*

Abutilon vesicarium crispum, floribus melinis parvis. *Dill. elth. 6. t. 5. f. 5.*

Abutilon americanum, fructu subrotundo pendulo e capsulis vesicariis crispis conflato. *Mart. cent. 29. t. 29.*

Abutilon aliud vesicarium. *Plum. ic. 15. t. 25.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 439.*

Krause Sida. W.

*Habitat in Carolina, Providentia, Bahama.* ☉ (v. v.)  
*Caulis tomentosus nec pilosus. Stipulae subulatae patententes. Folia acumine producto, variant cum et absque angulis. Pedunculus capillaris declinatus laevis semper pendulus. Flos albus ante anthesin cernuus, florens rectus a geniculo pedunculi. Capsulae obtusae compressae, carina hirtae.*  
*Capsulae 12 trispermae. W.*

\*41. *SIDA persica.*

*S. foliis inferioribus petiolatis cordatis acuminatis, superioribus sessilibus lanceolatis dentatis, pedunculis solitariis unifloris. Burm. ind. 148. t. 47. f. 1. \* Cav. diff. 1. p. 35. t. 4. f. 1.*  
*Persische Sida. W.*  
*Habitat in Persia.*  
*Capsulae plures muticae. Cavan. 1. α*

\*42. *SIDA sylvatica.*

*S. foliis ovato-cordatis acuminatis crenatis, pedunculis geminatis petiolo multo longioribus, capsulis muticis capitatis. W.*  
*S. caule arborescente, foliis tomentosis cordatis longissime acuminatis, pedunculis binis axillaribus unifloris, capsulis monospermis. Cavan. diff. 2. p. 56. \* et diff. 5. p. 276. t. 133. f. 2.*  
*Wald-Sida. W.*  
*Habitat in sylvis prope flumen Maragnon in Peru. ‡*  
*Capsulae 30-36 compressae muticae monospermae globoso-umbilicatae. Cavan. 1. c.*

43. *SIDA arborea.*

*S. foliis orbiculato-cordatis crenatis tomentosis, pedunculis geminis petiolo longioribus, capsulis muticis truncatis, caule arboreo. W.*  
*S. (arborea) foliis cordatis subpeltatis crenatis, floribus campanulatis, caule arboreo. L'Herit. stirp. 1. p. 131. t. 63. \**  
*S. (arborea) foliis cordatis ovatis acuminatis crenatis quinquenerviis mollissime tomentosis, pedunculis axillaribus unifloris. Lin. suppl. 307.*  
*S. (peruviana) foliis subrotundo-cordatis acutis crenatis tomentosis, pedunculis axillaribus unifloris longis, floribus maximis, stipulis lanceolatis ciliatis patulis.*

*Cavan. diff. 1. p. 36. t. 7. f. 8. \* et diff. 5. p. 276. t. 130.*

Baumartige Sida. W.

*Habitat in Peru. § (v. l.)*

*Capsulae numerosae 13 - 15, truncatae polyspermae. W.*

\*44. SIDA mauritiana.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis dentatis subtus tomentosis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis birostratis truncatis calyce longioribus. W.

S. (*mauritiana*) foliis cordatis acutis holosericeis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis multilocularibus hirtis, caule arboreo. *Jacq. ic. rar. 1. t. 137. Misc. 2. p. 352. \**

S. (*mauritiana*) foliis cordatis rotundatis ligulato-acuminatis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis calyce majoribus. *l'Herit. stirp. 1. p. 129. t. 62. \**

S. (*planiflora*) foliis cordatis subrotundo-acuminatis dentatis tomentosis, capsularum rostris initio solitariis postea binis longis villosis. *Cavan. diff. 1. p. 32. t. 7. f. 4. et diff. 5. p. 275. t. 135. f. 1.*

Flachblütige Sida. W.

*Habitat in insula Mauriti. § (v. v.)*

45. SIDA occidentalis.

S. foliis oblongo-cordatis dentatis sublobatis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, capsulis obtusis globosis nutantibus. W.

S. foliis cordatis sublobatis, stipulis patentibus, pedunculis petiolo brevioribus, capsulis multilocularibus pendulis obtusis. *Sp. pl. 964. Amoen. acad. 4. p. 325. \* Cavan. diff. 1. p. 24. t. 4. f. 3. \**

Abutilon velicarium, flore, fructuque majore non crispo. *Dill. elth. 7. p. 6. t. 6.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 435.*

Westindische Sida. W.

*Habitat in America. ☉*

*Pedunculi petiolo longiores, crassitie filii, persistentes, erecti post lapsum capsulae.*

*Capsulae 27-30 muticae monospermae, in capitulum globosum collectae. W.*

46. SIDA americana.

S. foliis cordatis oblongis indivisis, capsulis multilocularibus longitudine calycis: loculis lanceolatis. *Sp. pl. 963.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 436.

Americanische Sida. W.

*Habitat in Jamaica.*

Folia duplo longiora quam lata, valde tomentosa, ferrata, petiolis duplo longiora. Capsulae magnitudine *S. Abutili*, 12-loculares, tomentosae; loculamentis desinentibus in acumen lanceolatum longitudine ipsius capsulae. minime ad futuram anteriorem excisis. Calyx tomentosus. Pedunculus folio brevior.

#### 47. SIDA *Abutilon*.

*S. foliis subrotundo cordatis acuminatis dentatis tomentosis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, capsulis biaristatis truncatis.* W.

*S. foliis subrotundo cordatis indivisis, pedunculis folio brevioribus, capsulis multilocularibus: corniculis bifidis.* *Sp. pl.* 963. *Roy. lugdb.* 349. *Hort. cliff.* 346. *Hort. upf.* 198. *Gron. virg.* 78. *Lepech. it.* 1. p. 309. *Kniph. cent.* 4. n. 79. *Cavan. diff.* 1. p. 34. *Diff.* 2. p. 49.

*Abutilon foliis tomentosis, cordatis, petiolatis, siliquis bicornibus.* *Hall. helv. n.* 1075. R.

*Althaea theophrasti, flore luteo.* *Bauh. pin.* 316.

*Althaea altera s. Abutilon.* *Cam. epit.* 668.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 436. t. 61. B.

Gemeine Sida. W.

*Habitat in Indiis; Helvetia, Sibiria.* ☉ (v. v.)

*Fructus nigri pilosi. Calycis foliola complicata s. canaliculata.*

*Capsulae 15 birostratae trispermae truncatae.* W.

#### 48. SIDA *Abutiloides*.

*S. foliis cordatis indivisis acuminatis crenatis, pedunculis longitudine petiolorum, capsulis decem trispermis.* *Jacq. obs.* 1. p. 17. t. 7. \*

*Lavatera (americana) caule fruticoso, foliis cordatis indivisis crenatis acuminatis tomentosis, pedunculis solitariis unifloris.* *Sp. pl.* 973. *Amoen. acad.* 4. p. 400. \*  
*Swartz obs.* 263.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 139.

Sammetartige Sida. W.

*Habitat in Jamaica.* ☉

#### 49. SIDA *asiatica*.

*S. foliis oblongo cordatis dentatis, pedunculis solitariis*

petiolo longioribus, capsulis acutis truncatis calyci subaequalibus. W.

S. foliis cordatis indivisis, stipulis reflexis, pedunculis longioribus, capsulis multilocularibus hirsutis calyce brevioribus. *Sp. pl.* 964. *Amoen acad.* 4. p. 324.\*

S. foliis cordatis acutis rugosis venosis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis calyce vix brevioribus. *l'Herit. stirp.* 1. p. 130.

S. foliis cordatis dentatis, pedunculis unifloris petiolo longioribus, fructu lanuginoso calyce paulo majore. *Cavan. diff.* 1. p. 31. t. 7. f. 2. *diff.* 2. p. 49. et *diff.* 5. p. 275. t. 128. f. 1.

Abutilon indicum, flore luteo minore. *Fl. zeyl.* 520.

Alceae affinis indicica Abutilon dicta, flore parvo, foliis mollibus profunde venosis, filiculis lanuginosis, *Pluk. phyt.* 126. f. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 437.

Asiatifche Sida. W.

Habitat in India. ☉

Folia longiora quam lata, ut in *S. americana*. Capsulae truncatae, hirsutissimae.

Capsulae circiter 20 truncatae muticae acutae trispermae. W.

### \*50. SIDA populifolia.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis inaequaliter repando-dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis acutis truncatis calyce longioribus. W.

S. foliis cordatis crenatis fuscis subrotundo-acutis, stipulis spiralibus patulis, caule atro-rubefcente. *Cav. diff.* 1. p. 32. t. 7. f. 9. \* et *diff.* 5. p. 275. t. 128. f. 2.

S. (*Beloere*) foliis rotundatis cordatis acuminatis crenatis mollibus, pedunculis petiolo longioribus, capsulis calyce majoribus. *l'Herit. stirp.* 1. p. 130.

*Beloere. Rheed. mal.* 6. p. 77. t. 45.

Pappelblättrige Sida. W.

Habitat in India orientali. ☉

Capsulae 11-19 truncatae acutae trispermae. W.

### \*51. SIDA hirta.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis truncatis acutis calyce brevioribus. W.

S. caule hirto, foliis cordatis subrotundis dentatis, stipu-

lis horizontalibus cornuum instar contra petiolum directis, floribus solitariis maculatis. *Cavan. diff.* 1. p. 33. t. 7. f. 5. et *diff.* 5. p. 276. t. 129. f. 1.

S. (*pilosa*) foliis orbiculatis cordatis acuminatis, pedunculis petiolo brevioribus, capsulis calyci aequalibus pilosissimis. *l'Herit.* 1. p. 130.

*Abutilon hirsutum.* *Rumph. amb.* 4. p. 29. t. 10.

Langhaarige Sida. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. v.)

Capsulae 15-17 truncatae trispermae. W.

### 52. SIDA indica.

S. foliis oblongo-cordatis obtusiusculis inaequaliter dentatis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis muticis globofo-aggregatis scabris calyce longioribus. W.

S. foliis cordatis sublobatis, stipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis multilocularibus scabris calyce longioribus. *Sp. pl.* 964. *Amoen acad.* 4. p. 324.\*  
*Cavan. diff.* 1. p. 33. t. 7. f. 10.\* *Vahl. symb.* 2. p. 79.

*Sida cordifolia.* *Forsk. descr.* 124.

*Abutilon indicum.* *Cammer. hort.* 3. t. 1. *Bauh. hist.* 2. p. 959. *Morif. hist.* 2. p. 531. f. 5. t. 19. f. 4.

*Althaeae theophrasti similis.* *Bauh. pin.* 316.

Indische Sida. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. l.)

Pedunculi erecti. Capsulae terminatae angulo recto.

Capsulae 13-15 trispermae globofo-truncatae. W.

### \*53. SIDA mollissima.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis dentatis, pedunculis subbifloris petiolo brevioribus solitariis, capsulis bidentatis truncatis calyci aequalibus. W.

S. (*mollissima*) caule erecto tomentoso, foliis cordatis orbiculato-acuminatis dentatis mollissimis, floribus solitariis, calyce fructifero decagono magno. *Cav. diff.* 2. p. 49. t. 14. f. 1.\*

S. (*cistiflora*) foliis cordatis acuminatis pedunculis subbifloris petiolo brevioribus, calycibus quinquangulis, corollis capsulisque calyci subaequalibus. *l'Herit. stirp.* 1. p. 127. t. 61.\*

Weichste Sida. W.

*Habitat in Peru in sylvis prope flumen Maragnon.* †

Capsulae 11 trispermae truncatae bidentatae. W.



\*54. SIDA *Sonneratiana*.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis dentatis, pedunculis solitariis folio longioribus, capsulis truncatis obtusis calyce majoribus. W.

S. foliis cordatis crenatis acutis tomentosis, pedunculis crassis geniculatis erectis folio duplo longioribus, fructu pilis stellatis ornato. *Cavan. diff. 1. p. 29. t. 6. f. 4.\**

Sonneratsche Sida. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

*Simillima S. asiaticae. Capsulae 9-trispermae obtusae truncatae. W.\**

\*55. SIDA *pubescens*.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis angulato-dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis bidentatis truncatis calyce majoribus. W.

S. foliis cordatis sublobatis valde tomentosis, pedunculis erectis hirsutissimis unifloris, fructu tomentoso conico-truncato. *Cavan. diff. 1. p. 33. t. 7. f. 6.\**

Behaarte Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica.*

*Capsulae 15 trispermae truncatae bidentatae. W.*

\*56. SIDA *althaeifolia*.

S. foliis cordatis subangulatis obtusis ferrato-crenatis utrinque tomentosis, rostris seminum calyce brevioribus. *Swartz. prod. 101. Fl. ind. occid. 2. p. 1207.\**

S. foliis cordato-ovatis dentatis utrinque tomentosis, floribus paniculato-confertis. *L'Herit. stirp. 1. p. 112. bis.\**

Althaea flore luteo. *Sloan. hist. 1. p. 218. t. 136. f. 2.*  
Eibischblättrige Sida. W.

*Habitat in campis siccis Jamaicae australis. †*

*Pedunculi axillares versus apicem ramulorum petiolis brevioribus, subsolitarii, rarius 2-3, teretes tomentosi uniflori. Flores mascululi fulvi. Capsulae 10-12 subrotundo-compressae monospermae. Swartz. l. c.*

\*57. SIDA *glutinosa*.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis dentatis, pedunculis geminatis subbifloris petiolo longioribus, capsulis biaristatis, aristis calyce longioribus. W.

S. caule tomentoso-glutinoso, foliis magnis cordatis oblongis acuminatis subtus tomentosis, superioribus par-

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

B b b

vis, pedunculis capillaribus longissimis. *Cavan. diff.*

1. p. 16. t. 2. f. 8.\*

Langstielige Sida. W.

*Habitat in insula Mauriti.*

Capulae *quinque longissime biaristatae*. W.

\*58. SIDA *exstipularis*.

S. foliis ovato-cordatis acuminatis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus, capsulis muticis calyce brevioribus. W.

S. foliis cordatis acutis subtomentosis exstipulatis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris petiolo brevioribus. *Cavan. diff.* 2. p. 56. t. 14. f. 2.\*

Nacktwinklige Sida. W.

*Habitat in insula Borbonia.* †

Capulae *sub 30 monospermae truncatae obtusae*. W.

\*59. SIDA *nutans*.

S. foliis oblongo-cordatis acutis dentatis, pedunculis subgeminatis petiolo longioribus, floriferis nutantibus, capsulis obtusis. W.

S. (*nutans*) foliis cordatis acutis dentatis, capsulis depressis multilocularibus, loculamentis introrsum appendiculatis. *l'Herit. stirp.* 1. p. 119. t. 57. bis.\*

S. caule herbaceo glabro, foliis cordatis ovato-lanceolatis oblongis dentatis, floribus solitariis, seminibus calypratis. *Cavan. diff.* 2. p. 57.\* *et diff.* 5. p. 276. t. 133. f. 1.

Hängende Sida. W.

*Habitat in Peru locis arenosis.* †

Capulae *decem et ultra obtusae depressae monospermae*. Semina *arillo lineari instructa*. W.

\*60. SIDA *borbonica*.

S. foliis subrotundo-cordatis acutis dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis biaristatis, aristis calyce longioribus. W.

S. caule erecto ramoso hirtio, foliis cordatis subrotundo-acutis dentatis, floribus solitariis axillaribus, pedunculis petiolo paulo longioribus. *Cavan. diff.* 1. p. 9. t. 10. f. 2.\*

Bourbonsche Sida. W.

*Habitat in insula Borbonia.*

Capulae *quinque biaristatae, monospermae*. W.

\*61. *SIDA flavescens.*

S. foliis ovato-cordatis obtusis inaequaliter dentatis, pedunculis geminatis subbifloris petiolo brevioribus, capsulis acutis. W.

S. (*prostrata*) caule prostrato, foliis cordatis latis crenatis tomentosis flavescens, floribus flavis geminis, capsulis muticis. *Cavan. diff. 1. p. 13. t. 13. f. 3.\**

β. S. (*flavescens*) caule erecto, foliis cordatis oblongis crenatis tomentosis flavescens, floribus rubescentibus, geminis. *Cavan. diff. 1. p. 14. t. 13. f. 2.\**

Gelbliche Sida. W.

*Habitat in Brasilia in rupibus Monteideo. ‡*

*Capsulae quinque obtusae muticae.*

\*62. *SIDA radicans. †*

S. foliis subrotundo-cordatis acutis ciliato-dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis muticis. W.

S. caule repente, surculis radicanibus, foliis cordato-acutis pilosis dentatis, dentibus in setam terminatis. *Cavan. diff. 1. p. 8.*

Nela-Vaga. *Rheed. mal. 10. p. 137. t. 69.*

Wurzelnde Sida. W.

*Habitat in India orientali.*

*Capsulae quinque muticae monospermae. W.*

\*63. *SIDA arguta.*

S. foliis cordatis serratis apice attenuatis, caule virgato, pedunculis axillaribus filiformibus unifloris. *Swartz prod. 101. Fl. ind. occid. 2. p. 1205.*

S. (*glabra*) foliis cordatis serratis acuminatis glabris, caule ramoso, pedunculis axillaribus unifloris. *Mill. dict. n. 14.*

Scharfgesägte Sida. W.

*Habitat in sepibus aridis Jamaicae australis. ‡*

*Capsulae quinque apice biaristatae glabrae monospermae. Swartz l. c.*

\*64. *SIDA multicaulis.*

S. foliis subrotundo-cordatis acutis dentatis, pedunculis solitariis petiolo duplo longioribus, capsulis muticis. W.

S. caulibus tenuibus tomento canescentibus, foliis subrotundo-cordatis dentatis pulverulentis villosis. *Cav. diff. 1. p. 10. t. 1. f. 6.\**

Vielästige Sida. W.

*Habitat in* Malabarìa.

Capfulae *quinquemuticæ calyce multo minores.* W.

\*65. *SIDA pilosa.*

S. foliis ovato-cordatis obtusis dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis birostratis calyce brevioribus. W.

S. caule piloso ramoso, foliis crenatis, inferioribus cordatis subrotundis parvis, reliquis cordato ovatis, pedunculis longis geniculatis pilosis. *Cavan. diff. 1. p. 9. t. 1. f. 8. \**

Haarige Sida. W.

*Habitat in insula* St. Dominica.

*Variat caule piloso et glabro.* Capfulae 5 birostratae. W.

\*66. *SIDA rotundifolia.*

S. foliis subrotundo-ovatis cordatis obtusis dentatis, pedunculis solitariis petiolo multo longioribus, capsulis biaristatis, aristis calyce longioribus. W.

S. foliis subcordatis subrotundis crenatis tomentosis, capsularum rostris fasciculatis hirtis. *Cavan diff. 1. p. 20. t. 3. f. 6. \* et diff. 6. p. 529. t. 194. f. 2.*

Rundblättrige Sida. W.

*Habitat in insula* Borbonia.

Capfulae novem biaristatae, aristis pilosis. W.

\*67. *SIDA supina.*

S. foliis subrotundo-cordatis obtusiusculis crenatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis biaristatis, caule procumbente. W.

S. (*supina*) foliis cordato-ovatis crenatis, caulibus filiformibus prostratis. *l'Herit. stirp. 1. p. 109. t. 52.\**

S. (*procumbens*) foliis cordatis ovato-subrotundis ferratis villosis, caulibus procumbentibus. *Swartz prod. 102. Fl. ind. occid. 2. p. 1211.\**

S. (*ovata*) caule prostrato ramoso, foliis ovatis cordatis crenatis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. *Cavan. diff. 6. p. 350. t. 196. f. 2.\**

Liegende Sida. W.

*Habitat in campis siccis* Hispaniolae. 2 (v. f.)

Capfulae quinque biaristatae monospermae. W.

\*68. *SIDA truncata.*

S. foliis subrotundis cordatis apice truncato-obtusis den-

tatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus, capsulis muticis. W.

S. foliis subovatis dentatis rugoso-tomentosis apice truncatis. *Cavan. diff. I. p. 35. t. 6. f. 7.\**

Abgestutzte Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica.* ☉

Capsulae novem muticae. W.

\*69. SIDA herbacea.

S. foliis oblongis acutis dentatis basi cordatis, pedunculis solitariis petiolo paulo brevioribus, capsulis biaristatis. W.

S. caule erecto piloso ramoso, foliis subcordatis crenatodentatis, pedunculis petiolo paulo brevioribus, capsulis novem birostratis. *Cavan. diff. I. p. 39. t. 13. f. 1.\**

Krautartige Sida. W.

*Habitat in India orientali.*

\*70. SIDA emarginata. W.

S. foliis ovato lanceolatis cordatis dentatis, apice truncatis retusis, pedunculis petiolo duplo brevioribus, capsulis birostratis. W.

S. (*truncata*) foliis cordato-oblongis retusis serratis, stipulis setaceis, nodis subtrispinosis. *l'Herit. stirp. I. p. 107. t. 51.\**

Ausgerandete Sida. W.

*Habitat in Hispaniola.* ☉

Capsulae quinque birostratae. W.

71. SIDA alba.

S. foliis oblongo-cordatis rotundato-obtusis dentatis, pedunculis petiolo aequalibus, capsulis bicornibus. W.

S. foliis cordatis subrotundis, stipulis setaceis, axillis subtrispinosis. *Sp. pl. 960.*

Malva bicornis sanguiforbae folio villosa et glabra. *Dill. elth. 214. t. 171. f. 210.*

Althaea rostrata coromandeliensis, pimpinellae majoris, folio subrotundō, femine bicorni. *Pluk. alm. 26. t. 9. f. 3.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 430.*

Weisse Sida. W.

*Habitat in India orientali.* ☉

Simillima S. spinosae sed folia rotunda. Flores albi

*stigmatibus purpureis; Petalorum apicibus purpurascens; tota demum planta major.*

Capulae quinque birostratae. W.

72. SIDA *cordifolia*.

S. foliis ovatis cordatis dentatis subangulatis obtusiusculis, pedunculis solitariis petiolo paulo brevioribus, capsulis birostratis. W.

S. foliis cordatis subangulatis serratis villosis. *Sp. pl.* 961. *Mill. dict.* 8. *Cavan. diff.* 1. p. 19. t. 3. f. 2.

Malva bicornis, ballotes folio molli, *Dill. elth.* 211. t. 171. f. 209.

Althaea maderaspatana subrotundo folio molli et hirsuto multipilis. *Pluk. alm.* 25. t. 31. f. 2.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 433.

Herzblättrige Sida. W.

Habitat in India, Cap. b spei. ☉

Radix annua. Calyx simplex. Seminum rostra decedente corolla in fasciculum longitudine calycis prominentia. Calyx pilosus.

Capulae 7-10 birostratae. W.

\*73. SIDA *hederifolia*.

S. foliis subrotundo-cordatis obtusis repandis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis biaristatis, caule prostrato repente. W.

S. caule nodoso radicante, foliis cordatis obtuse crenatis subhirsutis, capsularum corniculis erectis longis hamatis. *Cavan. diff.* 1. p. 8. t. 9. f. 3. \*

Malvae hederæ terrestris folio et facie, capsulis bifurcatis. *Plum. spec.* 2. ic. 169. f. 3.

Gundermannblättrige Sida. W.

Habitat in insula St. Dominica.

Capulae quinque biaristatae. W.

\* \* \* \* \* *Foliis cordatis dentatis pedunculis multifloris vel racemosis.*

\*74. SIDA *verticillata*.

S. foliis ovato-cordatis acuminatis dentatis, floribus subsessilibus aggregatis verticillatis, capsulis submuticis. W.

S. caule piloso, foliis cordatis acuminatis crenatis, floribus subverticillois sessilibus. *Cavan. diff.* 1. p. 13. t. 1. f. 12. \*

Wirtelförmige Sida. W.

*Habitat in Brasilia ad Rio-Janeiro.*

*Capfulae quinque. W.*

75. *SIDA urens.*

S. foliis ovato-cordatis acuminatis dentatis, pedunculis axillaribus multifloris glomeratis, capsulis muticis. W.

S. foliis cordatis ferratis hispidis, pedunculis multifloris terminalibus glomeratis. *Sp. pl.* 963. *Amoen. acad.*

5. p. 402. \* *Murray comment. goett. III. p. 75. t. 5.*

*Swartz obs.* 261. \* *Cavan. diff. I. p. 15. t. 2. f. 7.*

S. urticata, foliis cordatis ferratis, floribus capitatis, pedunculis communibus alaribus. *Brown. jam.* 286.

*Althaea spicata betonicae folio villosa, spica brevior et laxa. Sloan. cat.* 97. *hist.* 2. p. 44.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 435.

Brennende Sida. W.

*Habitat in Jamaicae fruticetis aridis. †*

*Capfulae quinque muticae. W.*

76. *SIDA umbellata.*

S. foliis subrotundo-cordatis dentatis subangulatis acutis, pedunculis subquadrifloris umbellatis axillaribus, capsulis biaristatis. W.

S. foliis cordatis subangulatis subtomentosis, floribus umbellatis, capsulis birostratis. *Sp. pl.* 962. *Amoen. acad.* 5. p. 401. \* *Jacq. hort. t.* 56. *Cavan. diff. I. p.*

28. t. 6. f. 3. \* *et diff. 5. p. 276. t. 129. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 434.

Doldenblütige Sida. W.

*Habitat in Jamaica. ☉ (v. v.)*

*Capfulae sex-ad undecim biaristatae trispermae. W.*

\* 77. *SIDA pyramidata.*

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis ferratis, pedunculis corymbosis subpaniculatis, capsulis biaristatis. W.

S. foliis cordatis subrotundis magnis dentatis, panicula terminali, flosculis numerosis. *Cavan. diff. I. p. 11.*

*t. I. f. 10. \* et diff. 6. p. 549. t. 194. f. 1.*

Pyramidenförmige Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica.*

*Flores parvi in pedunculis corymbosis paniculam terminalem foliosam formantes. Capfulae quinque biaristatae. W.*

78. *SIDA paniculata*.

S. foliis ovato-cordatis dentatis, racemis paniculatis, capsulis birostratis. W.

S. foliis cordato-oblongis acuminatis ferratis subtus tomentosis, pedunculis capillaribus longissimis. *Sp. pl.* 962. *Amoen. acad.* 5. p. 401.\* *V'Herit. stirp.* I. p. 112. *Cavan. diff.* I. p. 16. t. 12. f. 5.\*

S. foliis cordato-ovatis acuminatis ferratis hirsutiusculis, floribus paniculatis, pedunculis longissimis capillaribus. *Swartz obs.* 259.\*

S. foliis cordato-acuminatis, pedunculis longis tenuissimis capillaribus alaribus, inferioribus simplicibus, superioribus ramosis. *Brown. jam.* 280.

β. S. (*atro-sanguinea*) foliis cordato-ovatis acutis ferratis utrinque villosis, pedunculis unifloris solitariis capillaribus, caule fruticoso. *Jacq. ic. rar.* I. t. 136. *Collect.* I. p. 49.\*

S. (*capillaris*) foliis cordato-oblongis tomentosis, pedunculis longissimis capillaribus, corollis minimis maculatis subreflexis. *Cavan. diff.* I. p. 10. t. 1. f. 7. *diff.* 5. p. 274.

Rispenblütige Sida. W.

*Habitat in rupibus calcareis Jamaicae, inque Peru, Brasilia. (β v. v.)*

Corolla *atro-purpurea reflexa*. Capsulae quinque birostratae. W.

\* 79. *SIDA dumosa*.

S. foliis cordatis ovatis acuminatis ferratis utrinque glabris, floribus paniculatis. *Swartz prod.* 101. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1209.\*

Hecken-Sida. W.

*Habitat in Jamaicae australis fruticetis. †*

Paniculae terminales ramosae erectiusculae. Petala pallide-lutea. Capsulae 5 plerumque 6 subrotundae hinc gibbae inde angulatae, rostrato subulato, incano-hirtae pilis minutissimis stellatis, apice arcte conniventes, monospermae. *Swartz l. c.*

\* 80. *SIDA ramosa*.

S. foliis ovato-cordatis inaequaliter dentatis, racemis axillaribus, capsulis biaristatis. W.

S. foliis cordatis acutis inaequaliter et profunde denta-



tis, floribus ramosis, capsulis sex birostratis. *Cav. diff.*

*I. p. 28. t. 6. f. 1.\**

Aeltige Sida. W.

*Habitat in Senegal.*

\*81. *SIDA spicata.*

S. foliis ovatis cordatis acutis dentatis, racemo terminali nudo capsulis muticis capitatis calyce majoribus. W.

S. foliis subcordatis acuminatis, pedunculis petiolo parvo vix longioribus, capsulis pendulis obtusis, floribus spicatis. *Cavan. diff. I. p. 24. t. 8. f. 1.\**

Abutilon vesicarium flore luteo majus. *Plum. ic. I. t. 2.*

Traubenblütige Sida. W.

*Habitat in insula St. Dominica. †*

Capsulae numerosae monospermae in globum coarctatae. W.

\*82. *SIDA terminalis.*

S. foliis ovato-lanceolatis cordatis dentatis, racemo terminali elongato bracteato, capsulis muticis capitatis calyce majoribus. W.

S. foliis cordatis sublobato-crenatis tomentosis, scapo longissimo spina terminato. *Cavan. diff. I. p. 29. t. 6. f. 6.\* et diff. 6. p. 49. t. 195. f. 2.*

Langtraubige Sida. W.

*Habitat in Brasiliae rupibus prope Montevideo. †*

Folia longitudine petioli uncialia. Racemus simplex terminalis longe pedunculatus. Pedunculi uniflori basi bractea lineari-lanceolata suffulti. Capsulae novem villosae trispermae. W.

\*\*\*\*\* *Foliis cordatis tricuspидatis vel basi angulatis.*

\*83. *SIDA vesicaria.*

S. foliis ovato-cordatis dentatis subtricuspидatis, pedunculis solitariis axillaribus petiolo longioribus, capsulis truncatis muticis acutiusculis. W.

S. foliis cordatis dentatis subtrilobis, fructu inflato, capsulis decem pentaspermis. *Cavan. diff. 2. p. 55. t. 14. f. 3.\**

Aufgeblasene Sida. W.

*Habitat in Mexico. † (v. v.)*

\*84. *SIDA crassifolia.*

S. foliis ovato-cordatis dentatis subtricuspидatis, pedun-

culis solitariis axillaribus petiolorum longitudine, capsulis biaristatis. W.

S. (*crassifolia*) foliis cordatis pedato-nervibus utrinque tomentosis, pedunculis petiolo aequalibus, capsulis calyce quinquangulo vix majoribus. *l'Herit. stirp. I. p. 125. t. 60.\**

S. (*tricuspidata*) foliis cordatis subrotundo-tricuspidatis dentatis tomento canescentibus, calycum laciniis introrsum carinatis. *Cavan. diff. I. p. 30. t. 6. f. 5.\**

Dickblättrige Sida. W.

*Habitat in Hispaniola. ‡*

Capsulae 9-10 *bicuspidatae trispermae*. W.

\* 85. SIDA *biflora*. †

S. foliis ovato-cordatis acuminatis dentatis tricuspidatis, pedunculis geminatis axillaribus petiolo aequalibus. W.

S. foliis cordatis magnis crenatis tomentosis, acumine producto, inferioribus oblongis tricuspidatis, floribus geminis axillaribus. *Cavan. diff. I. p. 37. t. 9. f. 1.\**

Zweyblumige Sida. W.

*Habitat - - - - ‡*

Capsulae *plures*. W.

\* 86. SIDA *obtusa*. †

S. foliis cordatis ovatis obtusis dentatis tricuspidatis, pedunculis petiolo longioribus subquadrifloris umbellatis, capsulis acutis. W.

S. foliis subrotundo-cordatis, pedunculis umbellatis, capsulis multilocularibus. *Vogel cent. pl. t. 89. Cavan. diff. I. p. 34. t. 9. f. 2.*

Stumpfe Sida. W.

*Habitat - - - -*

Capsulae *octo acutae trispermae*. W.

\* 87. SIDA *gigantea*.

S. foliis subrotundo-cordatis crenatis acuminato-tricuspidatis, floribus paniculatis, corollis reflexis. W.

S. foliis subrotundo-cordatis acuminatis indivisis vel superne trilobis, calyce basi gibboso, petalis reflexis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 8. t. 141.\**

Riefenartige Sida. W.

*Habitat ad Caracas. ‡*

Arbor *vigintipedalis*. Capsulae 10-12 *truncatae acuminatae villosae*. W.

\*88. *SIDA javensis*.

S. foliis subrotundo-cordatis dentatis tricuspидatis, pedunculis solitariis axillaribus petiolo longioribus, capsulis bicuspidatis, caule reclinato. W.

S. caule reclinato subglabro, foliis cordatis acutis sublobato crenatis. *Cavan. diff. 1. p. 10. t. 1. f. 5.\**

Javanische Sida. W.

*Habitat in Java.*

Capulae quinque bicuspidatae. W.

\*89. *SIDA hastata*.

S. foliis inferioribus cordatis acuminato-quinquangulis subdentatis obtusis, superioribus hastatis acuminatis basi subdentatis, pedunculis solitariis axillaribus longitudine foliorum. W.

Anoda (*hastata*) foliis cordatis angulatis, superioribus elongatis hastatis, pedunculis longissimis unifloris axillaribus. *Cavan. diff. 1. p. 38. t. II. f. 2.\**

Sida cristata. *β. Sp. pl. 964.*

S. foliis inferioribus cordato-angulatis, superioribus hastatis petalis integerrimis. *Roy. lugdb. 349. Hort. upf. 199.*

*β. A.* caule atropurpureo decumbente, foliis vix cordatis latis 5-7 angulatis inaequaliter crenatis. *Cavan. l. c.*

*γ. A.* foliis cordatis inferioribus quinquelobis acutis, lobo medio obtuso, floribus albis, fructu decafermo. *Cavan. l. c.*

Spontanblättrige Sida. W.

*Habitat in Mexico et Lima locis humidis. ☉ (v. v.)*

Capulae plures acuminatae basi connatae in hac et in binis sequentibus. Flores hujus magnitudine *Malvae rotundifoliae*. W.

90. *SIDA cristata*.

S. foliis omnibus crenatis, inferioribus subrotundo-cordatis obtusis subquinquangulis superioribus rotundato-hastatis acuminatis, pedunculis solitariis axillaribus folio longioribus. W.

S. foliis angulatis, inferioribus cordatis, superioribus pauduriformibus, capsulis multilocularibus. *Sp. pl. 964. Kniph. cent. 2. n. 85.*

Anoda (*triloba*) foliis inferioribus cordato-subangulatis crenatis, superioribus trilobatis lobo medio lanceolato longiori, reliquis inaequalibus, floribus solitariis axil-

laribus longissime pedunculatis. *Cavan. diff. I. p. 39. t. 10. f. 3.\**

S. foliis crenatis, inferioribus dentatis obtusis, superioribus acuminatis. *Roy. lugdb. 349.*

S. foliis cordatis obsolete serratis. *Hort. cliff. 346.*

Kammförmige Sida. W.

*Habitat in Mexico.* ☉ (v. v.)

Flos magnitudine *Lavaterae Olbiae*. W.

• 91. SIDA *Dilleniana*.

S. foliis inferioribus trianguli-subhastatis crenatis, superioribus ovato-lanceolatis subintegerrimis, pedunculis solitariis axillaribus longitudine foliorum. W.

Anoda (*Dilleniana*) foliis triangularibus, inferioribus lato-crenatis, superioribus obsolete crenatis longe petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris longissimis.

*Cavan. diff. I. p. 40. t. II. f. I.\**

Abutilon lavaterae flore, fructu cristato. *Dill. elth. 3. t. 2. f. 2.*

Dillenische Sida. W.

*Habitat in Mexico.* ☉ (v. v.)

Folia superiora plerumque integerrima. Flores magnitudine praecedentis. Differt a praecedente: foliis superioribus non trilobo-hastatis sed ovato-lanceolatis absque ullo angulo; inferioribus tri-rarius quinqueangularibus elongatis, nec subrotundo-cordatis, petalis magis emarginatis quam in praecedente, quae in *S. hastata* integerrima. W.

\*\*\*\*\* Foliis lobatis, palmatis, compositisve.

\* 92. SIDA *triloba*.

S. foliis cordatis dentatis trilobis, lobo intermedio acuto longiore, pedunculis axillaribus solitariis, capsulis muticis. W.

S. fructibus suboccapularibus, foliis cordatis trilobatis. *Jacq. hort. Schönb. 2. p. 9. t. 142.\**

S. foliis trilobis crenatis, lateralibus rotundatis, intermedio acuto. *Thunb. prod. 117.*

S. foliis inferioribus cordatis crenatis, superioribus dentatis trilobatis, medio lanceolato. *Cav. diff. I. p. II. t. I. f. II. et Diff. 5. p. 274. t. 131. f. I.*

Dreylappige Sida. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. v.)

Folia infima cordata indivisa, superiora triloba

quandoque sed rarius quinqueloba. Pedunculi capillares foliis breviores, longitudine foliorum vel longiores. Corolla alba. W.

93. SIDA ternata.

S. foliis ternatis, foliolis lanceolatis remote serratis. Thunb. prod. 118.

S. foliis ternatis, foliolis serratis. Lin. suppl. 307.

Dreyblättrige Sida. W.

Habitat ad Cap. b. spei.

\*94. SIDA pterosperma.

S. foliis tripartitis, laciniis linearibus repando-finuatis, floribus subracemosis, capsulis alatis. W.

S. foliis tripartito-pinnatifidis, lobis sinubusque obtusis, arillis membranaceo appendiculatis. l'Herit. stirp. 1. p. 119. t. 57.\*

S. (multifida) foliis multifidis, caule prostrato, floribus secundis versus terram, seminibus alatis. Cavan. diff. 1. p. 25. t. 4. f. 2.\*

Flügelfrüchtige Sida. W.

Habitat in Peru locis arenosis. ☉

Capsulae 25 monospermae alatae. Corolla alba. W.

\*95. SIDA ricinoides.

S. foliis subpeltatis quinquelobis, lobis ovatis acutis dentatis indivisis, pedunculis subunifloris, capsulis biaristatis. W.

S. (ricinoides) foliis quinquelobis serratis acuminatis, arillis biaristatis. l'Herit stirp. 1. p. 115. t. 55.\*

S. (palmata) foliis palmatis magnis quinquangulatis serratis stipulis nullis, floribus subumbellatis. Cav. diff. 1. p. 20. t. 3. f. 5.\*

Wunderbaumblättrige Sida. W.

Habitat in Peru. ☉

Folia exacte Ricini. Clariff. Cavanilles hanc pro varietate sequentis habet, quae foliorum forma diversissima. W.

\*96. SIDA jatrophioides.

S. foliis subpeltatis septemlobo-palmatis, lobis lanceolatis acuminatis pinnatifidis dentatis, pedunculis multifloris, capsulis subbiaristatis. W.

S. (jatrophioides) foliis palmatis peltatis, laciniis lanceolatis runcinato-lobatis. l'Herit. stirp. 1. p. 117. t. 56.\*

S. (*palmata*) foliis palmatis peltatis, laciniis lanceolatis ferratis incis. *Jacq. ic. rar. 3. t. 547. Collect. 2. p. 336.\**

*Sida palmata. Cav. diff. 5. p. 274. t. 131. f. 3.*

Brechnusblättrige *Sida*. W.

*Habitat in Peru locis arenosis.* ☉ (v. v.)

*Folia novem- seu septemloba. Corolla violacea.* W.

### 97. *SIDA Napaea.*

S. foliis subquinelobis glabris, lobis oblongis acuminatis dentatis, pedunculis multifloris, capsulis muticis acuminatis. W.

S. (*Napaea*) caulibus virgatis ramosis, foliis glabris cordatis palmatis, lobis quinque acutissime productis, petalis concavis cuspidatis. *Cavan. diff. 5. p. 277. t. 132. f. 1.\**

*Napaea (laevis) pedunculis nudis laevibus, foliis lobatis glabris. Syst. veg. 750. Amoen. acad. 3. p. 18. Fabr. helmfi. 281.*

*Napaea hermaphrodita. Sp. pl. 965. Mill. dict. n. 2. Kniph. cent. 8. n. 73.*

S. foliis palmatis, laciniis lanceolato-attenuatis. *Hort. cliff. 346. Hort. upf. 198. Roy. lugdb. 348.*

*Althaea virginiana ricini folio. Herm. lugdb. 22. t. 23.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 10. p. 303.*

Virginische *Sida*. W.

*Habitat in Virginia. 4 (v. v.)*

*Folia cordata quinqueloba acuminata plana. Pedunculi floribus 3. f. 4.*

### \*98. *SIDA dioica.*

S. foliis septemlobo-palmatis scabris, lobis lanceolatis inciso-dentatis, floribus dioicis corymbosis bracteatis. W.

S. (*dioica*) foliis palmatis scabris, floribus parvis dioicis. *Cavan. diff. 5. p. 278. t. 132. f. 2.\**

*Napaea (scabra) pedunculis involucretis angulatis, foliis palmatis scabris. Syst. veg. 750.*

*Napaea dioica. Sp. pl. 965. Gron. virg. 102. Amoen. acad. 3. p. 18.\* Mill. dict. n. 1. Fabr. helmfi. 282. Trew. in Nov. Act. A. n. C. tom. I. t. X.*

*Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris mas. Ehret. pict. 8. f. distincta.*

*Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris femina. Ehret. pict. 7. f. 1.*

*Althaea magna aceris folio, cortice cannabino, floribus parvis, femina rotatim in summitate caulium, singula singulis cuticulis rostratis cooperta ferens. Banisl. virg. 1928.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 10. p. 304.*

Getrennte Sida. W.

*Habitat in Virginia. 24 (v. v.)*

Flores feminei gaudent etiam staminibus, at antherae minimae effoetae et steriles sunt. Folia subpeltata sed ad petiolum usque aperta 7-9-loba. Flores in capitula digessi. Fructus orbiculatus depressus, capsulis 8-10.

\*99. SIDA *Phyllanthus*.

S. acaulis, foliis ternatis, foliolis sessilibus tripartitis cuneiformibus integerrimis indivisis obtusis, flore solitario petiolo alato inserto. W.

S. foliis crassis tomentosis imbricatis duplicato-trifidis, petiolis floriferis. *Cavan. diff. 5. p. 276. t. 127. f. 4.\**

Blattblütige Sida. W.

*Habitat in Peru. 24*

Planta acaulis. Folia tomentosa superne alba, inferne rufescentia, ternata. Foliola sessilia ad basin usque tripartita, laciniis lanceolatis obtusis integerrimis imbricatis. Petiolus a stipulis decurrentibus alatus. Flos magnus coeruleus sessilis in petiolo. W.

\*1287. P A L A V I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1130.*

*Cal. simplex quinquefidus. Capsulae monospermae absque ordine glomeratae.*

\*1. PALAVIA *malvifolia*.

P. glabra, pedunculo petioli longitudine, caule prostrato. W.

Palava (*malvifolia*) caulibus declinatis ramosissimis, foliis cordatis obtusis et profunde crenatis aut lobatis glabris, pedunculis axillaribus unifloris petiolo longioribus. *Cavan. diff. 1. p. 40. t. 11. f. 4.\**

Malope (*parviflora*) calycibus simplicibus, foliis subcordatis laevibus, pedunculis petiolo vix longioribus.

*Herit. stirp. 1. p. 105. t. 50.\**

Malvenblättrige Palave. W.

*Habitat in Limae arenosis.* ☉ (v. v.)

Caulis ramosus decumbens. Folia glabra semiuncialia et ultra cordata obtusa inaequaliter crenata. Pedunculi solitarii axillares uniflori longitudine petiolorum vel parum longiores. Flores purpurei minores quam in *Anagallide*. W.

\*2. PALAVIA *moschata*.

P. tomentosa, pedunculo folio longiore, caule erecto. W. Palava (*moschata*) foliis cordatis ovato-crenatis tomentosis, stipulis lanceolatis parvis subnigris, floribus axillaribus unifloris longissime pedunculatis. *Cavan. diff.* I. p. 41. t. II. f. 5.\*

Bisamduftige Palave. W.

*Habitat in arenosis ad Limam.* ☉

Caulis erectus bipedalis ramosus. Folia tomentosa ovato-cordata repanda crenata obtusa sesquiuncialia. Pedunculi solitarii uniflori axillares foliis longiores. Flores flavo-purpurascens magnitudine *Sidae cristatae*. W.

1288. MALACHRA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1131.*

*Cal.* commun. 3 - phyllus, multiflorus, major.  
*Capsulae* 5, monospermae.

I. MALACHRA *capitata*.

M. capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris, foliis subcordatis obsolete lobatis, caule scabro. W.

M. capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris. *Syst. Veg.* 518. *Swartz obs.* 262.

M. caule erecto scabro, foliis cordatis subrotundo-angulatis denticulatis rigidis, calyce communi triphylo septemfloro. *Cavan. diff.* 2. p. 97. t. 33. f. 1. 2.\*

*Sida capitata.* *Spec.* 2. p. 965. *Act. upf.* 1743. p. 137. t. 2. *Mill. dict. n.* 10.

*Sida hirta* assurgens, foliis angulato-cordatis obtuse lobatis dentatis, floribus conglobatis, capitulis foliolatis, pedunculis validis alaribus. *Brown. jam.* 281.

Malva caule erecto hispido, foliis erectis crenatis difformibus. *Roy. lugdb.* 357.

Maiva frutescens hirsuta, floribus luteis in capitulum congestis. *Plum. spec.* 2. ic. 169. f. 1.



Malva aspera major aquatica ex hortensium rosarum genere, flore minore luteo, semine aculeato. *Sloan. jam. 96. hist. 1. p. 217. t. 137. f. 1. Raj. suppl. 320. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 134.*  
Kopfförmige Malachra. W.  
*Habitat in Caribaeis, locis paludosis.* ☉ (v. v.)

\*2. MALACHRA *fasciata*.

M. capitulis pedunculatis triphyllis subquinquefloris, foliis subrotundis obsolete lobatis, caule villosa. W.  
M. capitulis triphyllis subquinquefloris, caule foliisque hispidissimis. *Jacq. ic. rar. 3. t. 548. Collect. 2. p. 352.\**  
Langhaarige Malachra. W.  
*Habitat ad Caracas.* ☉  
Caulis valde villosus, pilis rigidis. Folia hispido-villosa obtusissime tri- vel quinqueloba obtuse dentata Flores incarnati. W.

\*3. MALACHRA *alceaefolia*.

M. capitulis pedunculatis pentaphyllis subdecemfloris, foliis cordatis quinquelobis. W.  
M. capitulis pentaphyllis subdecemfloris, caule rariter hispido, foliis glabriusculis, stipulis utrinque subquaternis. *Jacq. ic. rar. 3. t. 549. Collect. 2. p. 350.\**  
Stockmalvenblättrige Malachra. W.  
*Habitat ad Caracas.* ☉ (v. v.)  
Folia cordata quinqueloba, lobis acutis dentatis. Involucri foliola ovata acuminata subtriloba integerrima setacea ciliata. Flores flavi. W.

4. MALACHRA *radiata*.

M. capitulis pedunculatis pentaphyllis multifloris, involucri foliolis acuminatis, foliis palmatis. W.  
M. capitulis pedunculatis pentaphyllis multifloris, foliis palmatis. † *Syst. veg. 518.*  
M. caule urente hirsutissimo, foliis palmatis, calyce communi 5-6-phyllo multifloro, floribus ebracteatis. *Cav. diff. 2. p. 98. t. 33. f. 3.\**  
Sida radiata. *Spec. pl. 2. p. 965.*  
Alcea hirsutissima frutescens. *Plum. spec. 2. t. 19.*  
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 135.*  
Gefralte Malachra. W.  
*Habitat in St. Dominica.*  
*Linnaei Spec. Plant. T. III.* C c c

Folia *quinquelobo-palmata*, lobis *subtrifidis oblongis ferratis*. Involucri *foliis basi attenuatis subtrilobis ferratis piloso-ciliatis*. W.

\*5. MALACHRA *bracteata*.

M. capitulis pedunculatis pentaphyllis multifloris, involucri foliolis ovatis acutis, floribus bracteatis, foliis palmatis. W.

M. caule urente, foliis palmatis, capitulis multifloris, floribus minimis bracteatis. *Cav. diff. 2. p. 98. t. 34. f. 2.\**

Beblätterte Malachra. W.

*Habitat in America.*

Folia *septemlobo-palmata*, lobis *intermedio trifido, ferrata*. Involucri *foliola ovata acuta dentata*. Bracteae *setaceae villosae ad flores, involucro cinctae*. Corolla *albida*. W.

\*6. MALACHRA *plumosa*. W.

M. capitulis pedunculatis polyphyllis multifloris, foliis indivisis ellipticis dentatis. W.

Sida (*plumosa*) foliis ovatis dentatis retusis, floribus terminalibus glomeratis, foliolis longis linearibus longe ciliatis cancellatis. *Cavan. diff. 1. p. 7. t. 12. f. 4.\**

Fedrige Malachra. W.

*Habitat in Brasilia.*

Folia *elliptica truncata dentata*. Involucrum *polyphyllum, foliola exteriora elliptica dentata; interiora linearia ciliata*. W.

1289. ALTHAEA.

*Gen. plant, ed. Schreb. n. 1132.*

*Cal. duplex: exterior 6-f. 9-fidus. Capsulae plurimae monospermae.*

I. ALTHAEA *officinalis*.

A. foliis tomentosis oblongo-ovatis obsolete trilobis dentatis. W.

A. foliis simplicibus tomentosis. *Hort. cliff. 348. Hort. ups. 204. Mat. med. 166. Roy. lugdb. 357. Dalib. paris. 210. Gort. gelr. 410. Crantz. austr. p. 144. Scop. carn. n. 855. Pollich. pal. n. 656. Flor. dan. t. 530. Ludw. ect. t. 1. Kniph. cent. 6. n. 3. Regn*

*bot. Cavan. diff. 2. p. 93. t. 30. f. 2. Hoffm. germ. 246. Roth. germ. I. 297. II. 150.*

*A. discoridis et plinii. Bauh. pin. 315.*

*Althaea, Fuchf. hist. 15. Cam. epit. 667. Blackw. t. 90.*

*A. tomentosa, herbacea, caule erecto, foliis cordato-lanceolatis obsolete trilidis. Hall. helv. n. 1074.*

*β. Althaea laciniato folio. Bauh. pin. 316.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 441.*

*Gemeiner Eibisch. W.*

*Habitat in Hollandiae, Angliae, Galliae, Sibiriae etc. subhumidis. 4 (v. v.)*

## \*2. ALTHAEA narbonensis.

*A. foliis tomentosis inferioribus quinque-septemlobisve superioribus trilobis. W.*

*A. foliis utrinque tomentosis, inferioribus quinquelobis, superioribus trilobis, pedunculis solitariis unifloris. Jacq. ic. rar. I. t. 138. Collect. 2. p. 275.\**

*A. caule tomentoso, foliis cordatis dentatis, inferioribus angulatis acutis, superioribus subhastatis. Cav. diff. 2. p. 94. t. 29. f. 2.\**

*A. foliis trilobis, superioribus subhastatis leviter villosis. Aff. intröd. in oryct. Arag. 175. t. 5. f. 1.*

*Französischer Eibisch. W.*

*Habitat in Gallia, Hispania. 4 (v. v.)*

## 3. ALTHAEA cannabina.

*A. foliis tomentoso-scabris inferioribus palmato-digitatis, summis ternatis, foliolo intermedio longissimo. W.*

*A. foliis inferioribus palmatis, superioribus dentatis. Hort. upf. 205. Sauv. monsp. 200. Jacq. vind. 124. austr. t. 101. Mill. dict. n. 4. Crantz. austr. p. 144. Scop. carn. ed. 2. n. 856.*

*A. foliis inferioribus palmatis dentatis, superioribus hastatis, lacinia media longissima. Cavan. diff. 2. p. 94. t. 30. f. 1.\**

*A. foliis compositis scabris. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb. 357.*

*Alcea cannabina. Bauh. pin. 316.*

*Alcea fruticosa, cannabino folio. Clus. hist. 2. p. 25.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 443.*

*Hanfblättriger Eibisch.*

*Habitat in Hungaria, Italia, G. Narbonensi, ad sylvarum margines. 4 (v. v.)*

4. *ALTHAEA hirsuta*.

A. foliis cordatis obtusis quinquelobis supra glabris, caule hirsuto. W.

A. foliis trifidis piloso-hispidis, supra glabris, pedunculis solitariis unifloris. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 357. *Dalib. parif.* 210. *Sauv. monsp.* 200. *Jacq. vind.* 125. *Pollich. pal. n.* 657. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 857. *Jacq. austr. t.* 170. *Hoffm. germ.* 246. *Roth. germ. I.* 297. *II.* 150.

A. foliis cordatis piloso-hispidis supra glabris, radicalibus numerosis subrotundo-lobatis, caulinis trilobis et quinquelobis, pedunculis solitariis unifloris. *Cavan. diff. 2. p.* 95. *t.* 29. *f.* 1. \*

A. foliis radicalibus reniformibus, caulinis palmatis, trilobis et quinquelobis, calycibus hispidis. *Hall. helv. n.* 1073.

A. foliis imis reniformibus, semiquinquelobis, summis quinquepartitis, ferratis, hirsutis. *Grim. isen. in Nov. Act. A. N. C.* 3. *app. p.* 353.

*Alcea hirsuta.* *Bauh. pin.* 317.

*Alcea hirsuta minima, flore caesio, hispanica.* *Barr. ic.* 1169.

*Alcea villosa.* *Dalech. hist.* 594. *Bauh. hist. 2. p.* 1067. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 443.

Behaarter Eibisch. W.

*Habitat in Galliae, Italiae, Hispaniae, Austriae sepius.* ☉ (v. v.)

Caules *diffusi, ut tota planta, hirti pilis patulis, sed Folia supra glabra. Calyx exterior 8-phyllus; interior longitudine corollae, acuminatus. Corolla incarnato-alba, crenulata.*

5. *ALTHAEA Ludwigii*.

A. foliis lobatis utrinque nudis, pedunculis congestis unifloris. *Mant.* 98. *Murray. prodr.* 169. \*

A. caule erecto, foliis subrotundo-quinquelobatis, lobis tricrenatis, floribus minimis congestis pedunculatis. *Cavan. diff. 2. p.* 96. *t.* 30. *f.* 3. \*

*Alcea minor sicula, flore minore.* *Raj. hist.* 605?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. *p.* 444.

Ludwigfcher Eibisch. W.

*Habitat in Sicilia.* *D. Schreber.* ☉

Herba *tota facie refert Foliis Malvam Alceam, ut ovum ovo. Pedunculi axillares, 2-5, uniflori, longi-*

*zudine petiolorum.* Calyx exterior 8-phyllus foliis lanceolatis; Interior fere brevior, 5-fidus, albis villis hirsutissimus, minor *A. hirsutae*.

*Alcea hirsuta differt ab hac Foliis minus divisis acutioribus, Caule Pedunculisque Petiolisque pilosis; Calycibus strigosis (nec lanatis,) quadruplo majoribus: interiore non hispido, nec lanato albo,*

\*6. *ALTHAEA acaulis.*

*A. subacaulis, foliis subrotundo-cordatis subquinquangularibus crenatis, petalis emarginatis. W.*

*A. caule crasso minimo, foliis numerosis, floribus spicatis. Cavan. diff. 2. p. 93. t. 27. f. 3. \**

*Malva rosea folio subrotundo chalepentis acaulos, flore pallide luteo. Moris. hist. 2. p. 524.*

*Stielloser Eibisch. W.*

*Habitat in Oriente? ☉*

\*7. *ALTHAEA rosea.*

*A. foliis quinque-f. septemlobo-angulatis. W.*

*A. caule erecto, foliis rugosis, cordatis 5-7 angulatis crenatis. Cavan. diff. 2. p. 91. t. 28. f. 1. \**

*Alcea (rosea) foliis sinuato-angulosis. Hort. cliff. 348. Hort. upf. 204. Mat. med. 166. Roy. lugdb. 357. Mill. dict. n. 1. et illustr. Ludw. ect. t. 42. Knorr. del. 1. t. R. 15. Kniph. cent. 6. n. 2.*

*Malva rosea folio subrotundo. Bauh. pin. 315.*

*Malva hortensis. Dod. pempt. 652.*

*β. Althaea (sinensis) caule erecto glabro inferne ramoso, foliis cordatis scabris crenatis angulatis, radice annua.*

*Cavan. diff. 2. p. 92. t. 29. f. 3. \**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 445.*

*Stockrosen Eibisch. W.*

*Habitat in Oriente ♂ β. in China. ☉ (v. v.)*

*Varietas β est forte species distincta sed praeter radicem annuam caulemque humiliorem, nec dum certos characteres invenire potui. W.*

\*8. *ALTHAEA pallida.*

*A. foliis subrotundo-ovatis. W.*

*Althaea pallida. Waldst. et Kitaib. pl. var. hung.*

*Bleicher Eibisch. W.*

*Habitat in Hungaria. ♂ (v. l.)*

*Simillima praecedenti, sed folia vix lobata, calyces*

*exteriores interiorum longitudine, et petala albidopurpurea profunde biloba.* W.

\*9. **ALTHAEA** *sicifolia*.

A. foliis septemlobo-palmatis obtusis. W.

A. caule erecto, foliis inferioribus palmatis septemlobatis, superioribus hastatis. *Cavan. diff. 1. p. 92. t. 28. f. 2.\**

*Alcea (sicifolia)* foliis palmatis. *Hort. cliff. 348. Hort. upf. 204. Roy. lugdb. 357. Mill. dict. n. 2. Lepech. it. 1. p. 130. Knorr. del. 2. t. A. Gmel. it. 1. p. 125.*

*Malva rosea* folio ficus. *Bauh. pin. 315.*

*Malva rosea simplex peregrina.* *Tabern hist. 315.*

*Malva arborea.* *Blackw. t. 54.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 446.*

Feigenblättriger Eibilch. W.

*Habitat in Sibiria, ♂ (v. v.)*

1290. **M A L V A.**

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1134.*

*Cal. duplex: exterior 3-phyllus. Caps. plurimae monospermae.*

\* *Foliis indivisis.*

1. **MALVA** *spicata*.

M. foliis ovatis subcordatis duplicato-crenatis superne scabris, subtus tomentosis, spica oblonga tomentosa. W.

M. foliis cordatis crenatis tomentosis, spicis oblongis hirtis. *Sp. pl. 967. Amoen. acad. 5. p. 401.\* Swartz obs. 262.*

M. foliis subcordatis crenatis subtrilobatis scabriusculis, floribus axillaribus solitariis, terminalibus dense spicatis. *Cavan. diff. 2. p. 80. t. 20. f. 4.\**

M. assurgens subvillosa, viminibus tenuioribus lentis, floribus sessilibus, spicis oblongis. *Brown. jam. 282.*

*Althaea spicata betonicae* folio glabro, flore luteo, spica habitiore. *Sloan. cat. 97. hist. 1. p. 219.*

β. M. (*ovata*) caule tomentoso, foliis ovatis dentatis, floribus spicatis, spica densissima oblonga. *Cavan diff. 2. p. 81. t. 20. f. 2.\* (excluso synonymo).*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 447.*

Aehrenblütige Malve. W.

*Habitat in Jamaica. † (v. v.)*

\*2. *MALVA polystachya.*

*M. foliis subrotundo-ovatis acuminatis dentatis scabris, floribus axillaribus et terminalibus spicatis. W.*

*M. caule fruticoso, foliis ovato-acuminatis serratis scabris, floribus spicatis, capsulis glabris muticis. Cav. diff. 5. p. 281. t. 138. f. 3.\**

Vielährige Malve. W.

*Habitat in Peru. †*

3. *MALVA tomentosa.*

*M. foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus lateralibus congestis, caule fruticoso. Sp. pl. 967. Fl. zeyl. 255.\**

*M. foliis cordatis crenatis villosis. Hort. cliff. 347. Roy. lugdb. 357.*

*Althaea orientalis bidens, subrotundis foliis, floribus parvis luteis. Pluk. amalth. II. t. 356. f. 1.?*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 447.*

Filzige Malve. W.

*Habitat in India. †*

*Caulis frutescens, tomentosus. Folia sine lobis cordata, tomentosa. Calyx inferior triphyllus. Seminum rostra, deciduo flore, brevissima, angulos fructus reperiuntur constituentia.*

\*4. *MALVA scoparia.*

*M. foliis ovatis crenato-serratis, floribus axillaribus confertis, caule fruticoso. V. Herit. stirp. 53. t. 27.\**

*M. foliis ovatis acutis, floribus subglomeratis, arillis submuticis, ramis scabris. Jacq. ic. rar. I. t. 139. Collect. I. p. 59.\**

*M. caule fruticoso, foliis ovato-acutis latis crenato-serratis, floribus axillaribus solitariis ad latus ramuli, superioribus glomeratis, calycibus in stellam apertis.*

*Cavan. diff. 2. p. 65. t. 21. f. 4.\**

Besenartige Malve. W.

*Habitat in Peru. †*

5. *MALVA gangetica.*

*M. foliis cordatis obtusis scabris, floribus sessilibus glomeratis arillis densis muticis crenulatis. Sp. pl. 967.*

*M. indica*, abutili subrotundo folio, flore luteo spicato.

*Pluk. phyt.* 74. f. 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 448.

Ganges Malve. W.

*Habitat in India.* ☉ (v. f.)

Soror *M. coromandeliana*, sed rigidior. Folia cordata, obtusissima, serrata, strigosa. Stipulae lineares. Flores ad ramorum apices glomerati, sessiles, lutei. Semina disco retuso, mutica, margine superiore tuberculis minutis crenulata.

## 6. MALVA coromandeliana.

*M. foliis oblongis cordatisve ferratis, pedunculis axillaribus, floribus glomeratis, arillis tricuspидatis, Swartz obs.* 262.\*

*M. foliis ovato-oblongis acutis, floribus glomeratis, arillis denis tricuspидatis. Hort. cliff.* 346.\* *Hort. ups.* 201.

*Althaea coromandeliana*, angustis praelongis foliis, semine bicorni. *Pluk. mant.* 20.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 448.

Dreyborstige Malve. W.

*Habitat in graminosis Jamaicae.* ☉

Flores axillares glomerati. Fructus truncatus apice hirtus.

## 7. MALVA americana.

*M. foliis ovatis acutis dentatis scabris, floribus axillaribus solitariis, terminalibus capitato-spicatis.* W.

*M. foliis cordatis crenatis, floribus lateralibus solitariis, terminalibus spicatis. Sp. pl.* 968. *Roy. lugdb.* 359. *Willich. obs.* 53. *Swartz obs.* 263.

*M. caule rubescente erecto ramoso, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus solitariis terminalibus spicatis, capsulis tridentatis. Cavan. diff.* 2. p. 80. t. 22. f. 2.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 459.

Americanische Malve. W.

*Habitat in America.* ☉ (v. v.)

Caulis pedalis, strictus, teres, subpilosus. Rami ex alis inferioribus, erecti. Folia indivisa, cordata, vix tomentosa. Pedunculi axillares, erecti, solitarii, uniflori. Spica terminalis floribus multis, sessilibus. Flores lutei, post meridiem explicati: Petalis obcordatis. Calyx exterior linearis, patens, longitudine interioris:



*Interior basi urceolatus. Styli 10, capillares, staminibus longiores.*

\*8. *MALVA calycina.*

M. foliis ovatis cordatis obtusis crenatis, pedunculis axillaribus foliorum longitudine. W.

M. foliis cordatis crenatis indivisis piloso-hispidis, floribus solitariis longe pedunculatis, calyce exteriori maximo, *Cavan. diff. 2. p. 81. t. 22. f. 4.\**

M. foliis ovatis obtusis crenatis tomentosis, pedunculis solitariis, caule frutescente erecto. *Thunb. prod. 118.*  
Großkelchige Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

\*9. *MALVA cuneifolia.*

M. foliis obovato-cuneiformibus apice truncatis repandis, pedunculis axillaribus petiolo longioribus, calyce exteriori diphylo. W.

M. foliis lato-cuneiformibus supra crenatis, floribus solitariis, calyce exteriori diphylo. *Cavan. diff. 2. p. 64. t. 20. f. 1.\**

Keilblättrige Malve. W.

*Habitat - - - -*

\*10. *MALVA angustifolia.*

M. foliis lanceolatis, floribus axillaribus binis, pedunculis petiolo brevioribus, calyce exteriori setaceo deciduo. *Ait. Kew. 2. p. 447.*

M. foliis ovato-lanceolatis dentatis angustis, fructu globoso tomentoso, calyce exteriori minimo setaceo. *Cavan. diff. 2. p. 64. t. 20. f. 1.\* diff. 5. p. 280.*

M. foliis ovato-lanceolatis crenulatis, fructu globoso tomentoso, capsulis trispermis. *Cavan. ic. 1. p. 48. t. 68.\**

Schmalblättrige Malve. W.

*Habitat in Mexico. † (v. v.)*

*Folia incauta tomentosa. Flores magni purpureo-violacei. W.*

\*11. *MALVA subfastata.*

M. foliis ovato-lanceolatis dentatis obsolete trilobis, pedunculis solitariis axillaribus petioli longitudine. W.

M. caule pilis adpressis, foliis subfastatis, floribus soli-

tariis breviter petiolatis. *Cavan. diff. 2. p. 72. t. 21. f. 3.\**

Commerfonsche Malve. W.

*Habitat in Brasilia, Peru. †*

\* 12. MALVA *scabra.*

M. foliis ovato-lanceolatis duplicato-dentatis obsolete trilobis, pedunculis subbifloris axillaribus, caule scabro. W.

M. caule virgato scabro rubescente, foliis cordatis crenatis subrugosis, pedunculis solitariis 1-2-floris. *Cav. diff. 5. p. 281. t. 138. f. 1.\**

Scharfästige Malve. W.

*Habitat in Peru locis aridis. †*

\* \* *Foliis angulatis.*

13. MALVA *peruviana.*

M. caule erecto herbaceo, foliis palmatis, spicis secundis axillaribus, seminibus denticulatis. *Sp. pl. 968. Mill. dict. n. 8. Willich. illustr. n. 24. Jacq. hort. t. 156. Kniph. cent. 7. n. 52. Cavan. diff. 2. p. 68. t. 19. f. 1.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 450.*

Peruvianische Malve. W.

*Habitat in Peru. B. Jussieu. ☉ (v. v.)*

*Caulis erectus, tripedalis, pilis rarioribus saepius geminis. Folia septemlobata, plicata glabra, venosa, acute serrata; petiolis longitudine folii. Stipulae ovato-lanceolatae. Pedunculus axillaris, nudus, longus. Spica secunda, sursum versa, recurvata ante florescentiam. Corollae parvae purpureae. Semina 10, supra exasperata dentibus alternis plurimis.*

*Folia 5-l. 3-loba. Flores rubri. Jacq. l. c. R.*

14. MALVA *linensis.*

M. caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis secundis axillaribus, seminibus laevibus. *Sp. pl. 968. Amoen. acad. 4. p. 325.\* Jacq. hort. t. 141.*

M. caule erecto scabro ramosissimo, foliis septemlobatis rugosis, spicis axillaribus, floribus coeruleis, capsulis laevibus. *Cavan. diff. 2. p. 69. t. 19. f. 2.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 450.*

Limasche Malve. W.

*Habitat in Peru, Lima. ☉ (v. v.)*

*Soror M. peruviana, sed flores coerulei, nec purpurei.*

Racemi hujus breviores subsecundi et Capsulae laeves. W.

\* 15. MALVA capitata.

M. foliis quinquelobis, lobis pinnatifido-sinuatis dentatis, intermedio elongato, floribus corymboso-capitatis pedunculatis, capsulis birostratis. W.

M. caule arborecente, foliis quinquelobis, medio longissimo, floribus corymboso-capitatis. *Cavan. diff.* 5. p. 280. t. 137. f. 1.\*

Kopfbütige Malve. W.

*Habitat in Peru.* †

Pedunculus axillaris longus apice floribus corymboso-capitatis instructus. W.

16. MALVA bryonifolia.

M. foliis quinquelobis obtusis scaberrimis, caule tomentoso fruticoso. pedunculis multifloris, corollis reflexis. W.

M. foliis palmatis scabris, caule tomentoso fruticoso, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 968. *Roy. lugdb.* 356. *Mill. dict. n.* 12. *Ait. Kew.* 2. 448.

Malva reflexa. *Wendl. hort. herrenhusf.* 1. p. 6. t. 4.\*

Malva (*stellata*) foliis subpalmatis tomentosis, pedunculis aggregatis, caule frutescente. *Thunb. prod. p.* 119?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 451.

Zaunrübenblättrige Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei.* † (v. l.)

*Planta belle echinata per discum foliorum.*

*Malva reflexa Clariss. Wendlandii est absque ullo dubio M. bryonifolia Linnaei, Synonyma vero sub hac specie citata huc non pertinent. M. stellata Celeber. Thunbergii a nostra vix differre videtur.* W.

\* 17. MALVA umbellata.

M. foliis subpeltatis quinquelobis obtusis, floribus umbellatis, calycis exterioris foliolis obovatis deciduis. W.

M. foliis cordatis quinquelobatis, floribus umbellatis. *Cavan. ic.* 1. p. 64. t. 95.\*

Doldenblütige Malve. W.

*Habitat in Mexico.* †

Pedunculi axillares foliis longiores solitarii umbellati. Flos magnus igneo-violaceus. W.

18. MALVA *abutiloides*.

M. foliis quinquangulari-lobatis tomentosis, pedunculis subquadrifloris bifidis axillaribus, capsulis polyspermis W.

M. foliis lobatis, caule erecto, calycibus brevissimis, capsulis globosis striatis, loculis polyspermibus. *Sp. pl.* 971.

M. caule fruticoso, foliis cordatis lobatis tomentosis, pedunculis paucifloris, fructibus globosis striatis, loculis oligospermis. *Jacq. hort. Schönb.* 3. p. 23. t. 293.\*

M. caule malvarum maximo frutescente, foliis angulatis planis tomentosis, pedunculo axillari multifloro. *Cavan. diff.* 2. p. 60. t. 16. f. 2.\*

Sidaartige Malve. W.

*Habitat in insulis Bahamenfibus.* h (v. v.)

*Planta facie althaeae alta, distincta a reliquis Pericarpiis globosis striatis, loculis minime distinctis polyspermis.*

*Capsulae polyspermae, etiam in M. angustifolia, caroliniana atque aliis videre sunt.* W.

\* 19. MALVA *albulensis*.

M. foliis inferioribus quinquangularibus, superioribus trilobis basi cuneatis, pedunculis unifloris petiolo brevioribus. W.

M. caule scabro tomentoso, foliorum inferiorum basi concavo-arcuata, superiorum cuneiformi, floribus breviter pedunculatis. *Cavan. diff.* 2. p. 76. t. 34. f. 3.\*

Avilische Malve. W.

*Habitat in Hispania.*

\* 20. MALVA *lobata*.

M. foliis quinquelobis repandis, floribus subracemosis. W.

M. foliis subcordatis quinquelobatis crenatis tomentosis, floribus axillaribus et fastigiatis. *Cavan. diff.* 2. p. 76. t. 18. f. 4.\*

Lappige Malve. W.

*Habitat -*

*Tota planta tomentosa. Flores in foliorum superiorum axillis solitarii et in ramorum apice subracemosi.* W.

\* 21. MALVA *fastigiata*.

M. foliis quinquelobis inaequaliter dentatis, floribus terminalibus subumbellatis. W.

M. caule tomentoso, foliis cordatis quinquelobatis, lobis acutis, medio productione, floribus fastigiatis conglomeratis. *Cavan. diff. 2. p. 75. t. 23. f. 2. \**

Gipfelblütige Malve. W.

*Habitat in montibus Arvernus.*

\*22. MALVA *bonariensis*. †

M. foliis trilobis repandis tomentosis, floribus axillaribus glomeratis. W.

M. caule tomentoso, foliis trilobatis, lobis inaequaliter crenato-dentatis, floribus glomeratis axillaribus subsessilibus parvis. *Cav. diff. 2. p. 69. t. 22. f. 1. \**

Brafilianische Malve. W.

*Habitat in Bonaria.*

\*23. MALVA *stricta*.

M. foliis ovatis indivisis trilobisve dentatis hirtis, pedunculis unifloris axillaribus. W.

M. caule fruticoso stricto, foliis trilobis integrisque.

*Jacq. hort. Schönb. 3. p. 24. t. 294. \**

Steife Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

*Similis sequenti, sed diversa: foliis trilobis et indivisis, pedunculis unifloris, petalis calyce majoribus albis basi rubicundis. W.*

\*24. MALVA *lactea*.

M. frutescens, foliis angulatis acutis cordatis villosis, petalis obcordatis calyce brevioribus, pedunculis paniculatis. *Ait. Kew. 2. p. 448.*

M. (*vitifolia*) caule erecto orgyali ramofo, foliis quinquelobatis crenatis villosis, axillis multifloris. *Cav. ic. 1. p. 13. t. 20. \**

Milchweisse Malve. -W.

*Habitat in Mexico. † (v. v.)*

\*25. MALVA *operculata*.

M. foliis angulato-quinquelobis, lobo intermedio elongato, racemis axillaribus secundis, capsulis operculatis. W.

M. foliis cordatis quinquelobatis tomentosis, floribus racemoso-spicatis, fructu operculato. *Cavan. diff. 2. p. 65. t. 35. f. 1. \**

Bedeckte Malve. W.

*Habitat in Peru locis arenosis. †*

Racemi longi floribus subsessilibus unilateralibus.  
Capfulae 8-10 operculo tectae. W.

26. MALVA *fragrans*.

M. foliis cordatis quinquelobis dentatis, pedunculis solitariis longitudine petioli. W.

Malva fragrans. *Jacq. hort.* 3. t. 35.

M. caule frutescente viscoso atropurpurescente, foliis cordatis 5-7 lobatis crenatis, floribus solitariis pedunculis capillaribus folio brevioribus. *Cavan diff.* 2. p. 72. t. 23. f. 3. \*

M. foliis cordatis quinquelobis crenatis villosis, pedunculis solitariis, caule frutescente. *Thunb. prod.* 118.

Malva capensis.  $\gamma$  *Sp. pl.* 968.

M. (*scabrosa*) caule fruticoso pilis simplicibus, foliis lobatis, floribus erectiusculis, petalis incumbentibus. *Amoen. acad.* 4. p. 345. *Kniph. cent.* 6. n. 58.

M. africana frutescens, flore rubro. *Comm. hort.* 2. p. 171. t. 86.

M. africana frutescens, flore parvo carneo unguiculis atrorubentibus. *Pluk. amalth.* 140. t. 431. f. 5.

Wohlriechende Malve. W.

Habitat ad Cap. b. spei.  $\ddagger$  (v. v.)

Facile credo ab hac et *M. virgata*. *M. capensem*, *grossularifoliam* et *balsamicam* ortas esse. W.

27. MALVA *capensis*.

M. foliis ovatis subquinquelobis dentatis, pedunculis petiolo longioribus. W.

M. caule arborecente, foliis cordatis quinquelobis. *Syst. Veg.* 519.

M. caule fruticoso, foliis quinquelobis, superioribus trilobis crenato, dentatis glutinosis, floribus binis cernuis, pedunculis fructiferis erectis petiolo longioribus. *Cav. diff.* 2. p. 71. t. 24. f. 3. \*

M. foliis oblongis trilobis ferratis, pedunculis solitariis, caule fruticoso erecto. *Thunb. prod.* 118.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 451.

Capische Malve. W.

Habitat ad Cap. b. spei.  $\ddagger$  (v. v.)

\*28. MALVA *balsamica*.  $\dagger$

M. foliis ovatis subtrilobis acutis inaequaliter dentatis, pedunculis solitariis petiolo longioribus. W.

M. foliis subcordatis sublobatis inaequaliter ferratis glutinosis, caule fruticoso. *Jacq. ic. rar. 1. t. 140. Misc. 2. p. 321.\**

Balsamische Malve. W.

*Habitat* - - - - - † (v. f.)

29. MALVA *grossularifolia*.

M. foliis oblongis subtrilobis inaequaliter dentatis, pedunculis solitariis petioli longitudine. W.

M. foliis cordatis trilobis dentatis hirtis, pedunculis solitariis caule fruticoso. *Thunb. prod. 118?*

M. caule hirsuto frutescente, foliis subfinuato-lobatis ferratis rugosis, floribus solitariis, fructu hirsuto. *Cav. diff. 2. p. 71. t. 24. f. 2.\**

Malva capensis. *β. Sp. pl. 968.*

M. capensis frutescens grossulariae folio majore hirsuto. *Dill. elth. 209. t. 169. f. 207.*

Stachelbeerblättrige Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

30. MALVA *virgata*.

M. foliis profunde trilobis dentatis basi cuneatis, pedunculis geminatis petiolo longioribus. W.

M. foliis basi angustatis multiformibus partitis, laciniis inciso-crenatis, pedunculis unifloris caule frutescente. *Murr. in comm. goett. 1779. p. 20. t. 6.\**

M. caule frutescente virgato, foliis incisifidis crenatis glabris rigidis, corollis planis substellatis. *Cav. diff. 2. p. 70. t. 18. f. 2.\**

M. (*capensis*) foliis subcordatis laciniatis glabris, caule arborecente. *Sp. pl. 968. Hort. cliff. 347. Hort. upf. 201.*

M. capensis frutescens grossulariae folio minore glabro. *Dill. elth. 208. t. 169. f. 206.*

Ruthenförmige Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. v.)*

\*31. MALVA *miniata*.

M. foliis ovatis trilobis dentatis tomentosis, pedunculis racemosis axillaribus. W.

M. caule erecto tomentoso, foliis trilobatis, spicis axillaribus corollis miniatis. *Cavan. ic. 3. p. 40. t. 278.\**

Mennigfarbene Malve. W.

*Habitat* - - - - - † (v. v.)

\*32. MALVA *retusa*.

M. foliis oblongis obtusissime trilobis dentatis tomentosis, pedunculis axillaribus petiolo longioribus W.

M. foliis sublanceolatis retusis dentato-crenatis obsolete trilobatis, floribus subspicatis, fructu glabro. *Cavan. diff. 2. p. 73. t. 21. f. 1.\**

M. (*triloba*) foliis trilobis dentatis tomentosis, pedunculis solitariis, caule fruticoso. *Thunb. prod. 118.*

Stumpfe Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. † (v. l.)*

\*33. MALVA *tridactylides*.

M. foliis cuneiformibus trifidis integerrimis, pedunculis axillaribus foliorum longitudine. W.

M. caule frutescente ramosissimo, foliis minimis cuneiformibus supra trilobis. *Cavan. diff. 2. p. 73. t. 21. f. 2.\**

Dreyfingerige Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

\*34. MALVA *althaeoides*.

M. foliis palmatis, lobis lanceolatis dentatis pedunculis foliis longioribus, caule prostrato, petalis cuneiformibus apice dentatis. W.

M. caule prostrato, foliis inferioribus lobatis, superioribus quinquefidis, floribus solitariis longe pedunculatis. *Cavan. ic. 2. p. 30. t. 135.\**

Eibischartige Malve. W.

*Habitat in Hispania. ☉*

*Canlis hirtus prostratus. Folia inferiora cordata crenata indivisa vel leviter quinqueloba; superiora palmata, lobis lanceolatis angustis argute dentatis. Pedunculi axillares filiformes foliis duplo longiores. Calycis foliola lineari-lanceolata. Corolla magna roseo-alba, petalis cuneiformibus, apice dentatis mucronatis. Capsulae muticae. W.*

35. MALVA *caroliniana*.

M. foliis quinquelobis palmatisve inciso-dentatis, pedunculis petiolo longioribus, petalis integris, fructu villoso, caule prostrato. W.

M. caule repente, foliis multifidis. *Hort. cliff. 347. Hort. upf. 201. Willich. obs. n. 55.*

M. caule repente radicante, foliis radicalibus crenatis in-



divisis, superioribus multifidis fructu cristato. *Cavan. diff. 2. p. 58. t. 15. f. 1.\**

*Abutilon repens*, alceae foliis, flore helvulo. *Dill. elth. 5. t. 4. f. 4.*

*Abutilon carolinianum repens*, alceae foliis, gilvo flore. *Mant. cent. 34. t. 34.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 452.*

Carolinische Malve. W.

*Habitat in Carolina.* ☉ (v. v.)

Fructus *trepani* figura supra tuberculatus ambitu aristis 2 e singulis loculis.

\*36. MALVA prostrata.

M. foliis palmatis inciso-dentatis, pedunculis petiolo longioribus, petalis integris, fructu glabro, caule prostrato. W.

M. caule humifuso anguloso, foliis palmato-multifidis, floribus solitariis, fructu glabro. *Cavan. diff. 2. p. 59. t. 16. f. 3.\**

Gestreckte Malve. W.

*Habitat in pascuis ad vias circa Montevideo in Brasilia.*

Capsulae ut in praecedente *biaristatae dispermae, sed glabrae.* W.

\*37. MALVA cretica.

M. foliis cordatis subrotundis quinquangularibus crenatis villosis, pedunculis axillaribus petiolo longioribus, caule erecto. W.

M. caule semipedali hirsuto, foliis cordatis subrotundolobatis crenatis, floribus solitariis longe pedunculatis. *Cavan. diff. 2. p. 67.\* et diff. 5. p. 280. t. 138. f. 2.*

Alcea cretica hirsuta. *Tournef. cor. 2.*

Candische Malve. W.

*Habitat in Creta.* ☉

38. MALVA parviflora.

M. caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus sessilibus glomeratis, calycibus glabris patentibus. *Amoen. acad. 3. p. 416. Jacq. hort. t. 39. Cavan. diff. 2. p. 68. t. 26. f. 1.\**

M. annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis pentapetalis verticillatim genicula ambientibus. *Morif. 2. p. 521. Raj. hist. 598.*

M. tingitana, flore caeruleo, parva. *Pluk. phyt. 44. f. 2.*

*Linnaei Spec. Plant. T. III.*

D d d

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 452.*

Kleinblütige Malve. W.

*Habitat in Barbaria.* ☉ (v. v.)

*Differt a M. rotundifolia: Caule erectiusculo triplo majore; Foliis acutioribus apice petioli adscendente. Calycibus glabris, inferiore lineari nec lanceolato. Floribus sessilibus. Calycibus maturo fructu purpurascens. Arillis supra rugosis et ad latera dentatis.*

\*39. MALVA *nicaeensis.*

M. caule prostrato, foliis angulatis acutis, pedunculis erectis, calycibus pilosis. W.

M. caule decumbente calycibusque glomeratis pilosis, foliis quinquelobatis. *Vahl. symb. 1. p. 50.*

M. caule piloso decumbente herbaceo, foliis subcordatis quinquelobis, lobis acutis, pedunculis erectis. *Allion. ped. n. 1416. \* Cavan. diff. 2. p. 79. t. 25. f. 1.\**

β. M. (*montana*) caule decumbente, foliis quinquelobis ferratis villosis mollibus, calycibus axillaribus glomeratis villosis. *Forst. descr. 124. \**

Nicäenische Malve. W.

*Habitat in Italia.* ☉ (v. v.)

40. MALVA *rotundifolia.*

M. caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Hort. cliff. 347. Fl. suec. 580; 626. Mat. med. 166. Roy. lugdb. 356. Gronov. virg. 79. Dalib. parif. 209. Hall. helv. n. 1070. Crantz. austr. 143. Scop. carn. n. 858. Pollich. pal. n. 658. Knorr. del. 2. t. M. 1. Flor. dan. t. 721. Cavan. diff. 2. p. 79. t. 26. f. 3. Hoffm. germ. 246. Roth. germ. I. 296. II. 147.*

Malva sylvestris, folio subrotundo. *Bauh. pin. 314.*

Malva sylvestris pumila. *Fuchf. hist. 508.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 453.*

Rundblättrige Malve. W.

*Habitat in Europae ruderatis, viis, plateis.* 4 (v. v.)  
*Albo flore ludit.* R.

\*41 MALVA *acaulis.*

M. acaulis, foliis angulatis dentatis, dentibus bifetis, pedunculis radicalibus multifloris. W.

M. foliis omnibus radicalibus lobatis denticulatis, pe-

dunculis radicalibus 2-4-floris. *Cavan. diff. 2. p. 82. t. 35. f. 2. \**

Stiellose Malve. W.

*Habitat in Peru in Cordilleris. 4*

42. MALVA *sherardiana*.

M. caulibus prostratis, foliis orbiculatis plicatis tomentosis crenatis, pedunculis solitariis unifloris arcuatis.

*Sp. pl. 1675. Cavan. diff. 2. p. 67. t. 26. f. 4. \**

M. cretica minor hirsuta. *Buxb. cent. app. 46. f. 32.*

M. humifusa minima. *Till. pif. 108. t. 35. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 461.*

Sherardische Malve. W.

*Habitat in Bithynia. Arduini. 4*

Pedunculi sub florescentia arcuati, foliis breviores. Petala rubra, rotundata cum mucrone. Capsulae plures quam 5, in orbem positae aut sparsae.

43. MALVA *sylvestris*.

M. caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Sp. pl. 969. Hoffm. germ. 247. Roth. germ. I. 296. II. 147. Scop. carn. n. 859.*

*Pollich. pal. n. 659. Blackw. t. 22.*

M. caule scabro, foliis 5-7-lobatis crenato-dentatis, calyce exteriori submonophyllo. *Cav. diff. 2. p. 78. t. 26. f. 2. \**

M. caule erecto, foliis multipartitis. *Hort. cliff. 347. Fl. suec. 581; 627. Roy. lugdb. 356. Dalib. parif. 208.*

M. caule erecto, foliis lobatis, lobis serratis, quinis et septenis. *Hall. helv. n. 1069.*

M. caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis, pedunculis petiolisque pilosis. *Crantz austr. 143. R.*

M. foliis quinquelobis serratis, obtusis: calycum foliolis exterioribus subtrifidis. *Neck. gallob. p. 294.*

M. sylvestris, folio sinuato. *Bauh. pin. 314.*

M. sylvestris recta. *Cord. hist. 114.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 455.*

Wald-Malve. W.

*Habitat in Europae campestribus. ♂ (v. v.)*

*Caulis et petioli hujus villosi; at sequentis Petiolorum latus superius villosum. Albo flore variat.*

44. MALVA *mauritiana*.

M. caule erecto herbaceo, foliis quinquelobatis obtusis,

Ddd 2

- pedunculis petiolisque glabriusculis. *Sp.pl.* 970. *Hoffm. germ.* 247. *Roth. germ.* I. 296. II. 148.
- M. caule erecto subglabro, foliis cordatis crenatis quinquelobatis, floribus numerosis magnis rubescentibus, stipulis connatis. *Cavan. diff.* 2. p. 77. t. 25. f. 2.\*
- M. hederaceo folio. *Bauh. pin.* 315. *Hort. upf.* 200.
- M. major tertia. *Dalech. hist.* 586. *Kuiph. cent.* 7. n. 51.
- β. M. folio ficus altera. *Bauh. pin.* 315. *prodr.* 137.
- γ. M. (*sinensis*) caule herbaceo reclinato glaberrimo, foliis quinquelobatis obtusis crenatis, floribus speciosis axillaribus numerosis. *Cavan. diff.* 2. p. 77. t. 25. f. 4.\*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 456.
- Mauritanische Malve. W.
- Habitat in Italia, Lusitania, Hispania.* ☉ (v. v.)
- Similis praecedenti. Huic folia costis 5; illi 7. Huic Calyx exterior lanceolatus, illi ovatus. Huic corolla sanguinea magis, illi coerulefscens.*

45. MALVA *hispanica*.

- M. caule erecto, foliis semiorbiculatis crenatis, calyce exteriori diphyllo. *Sp.pl.* 970. *Loesl. it.* 157. \* *Desf. atl.* 2. p. 117. t. 170. \*
- M. caule erecto villoso, foliis crenato-dentatis, inferioribus semiorbiculatis, superioribus subrhomboideis, supremis angustis, calyce exteriori diphyllo. *Cavan. diff.* 2. p. 62. t. 19. f. 3. \*
- M. rotundifolia glabra et *hispanica*, flore amplo rubello. *Pluk. alm.* 238. t. 44. f. 3.
- β. M. (*spithamaea*) caule *spithamaeo*, foliis minimis subrotundo-crenulatis, calyce exteriori diphyllo aut monophyllo. *Cavan. diff.* 2. p. 61. t. 18. f. 3. \*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 456.
- Spanische Malve. W.
- Habitat in Hispania.* ☉ (v. f.)
- Caules diffusi, adscendentes, hirti. Folia cordato-subrotunda, vix lobata, crenata. Stipulae lanceolatae. Pedunculi solitarii, uniflori, folio longiores. Calyx exterior diphyllus, deficiente tertio interiore foliolo. C. interior 5-fidus lobis cordatis s. sinibus prominentibus. Corolla incarnata.*

46. MALVA *verticillata*.

- M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glo-

meratis sessilibus, calycibus scabris. *Sp. pl.* 970. *Vir. cliff.* 356. *Hort. cliff.* 502. *Hort. upf.* 200. *Roy. lugdb.* 356. *Mill. dict. n.* 5. *Jacq. hort. t.* 40. *Cavan. diff.* 2. p. 78. t. 25. f. 3. \*

*M. linenfis erecta*, flosculis albis minimis. *Boerh. lugdb.* p. 268.

*M. annua rotundifolia*, floribus omnium minimis albis pentaphyllis verticillatim genicula ambientibus. *Morif. hist.* 2. p. 521. *Raj. hist.* 598.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 457.

Wirtelblütige Malve. W.

*Habitat in China.* ☉ (v. v.)

#### 47. MALVA *crispa.*

*M. caule erecto*, foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. *Sp. pl.* 970. *Mill. dict. n.* 4. *Leers. herb. n.* 545. *Doerr. nass. p.* 149. *Cavan. diff.* 2. p. 74. t. 23. f. 1. \* *Hoffm. germ.* 247. *Roth. germ. I.* 296. II. 148.

*M. foliis angulatis crispis*, floribus axillaribus glomeratis. *Hort. cliff.* 347. *Hort. upf.* 200.

*M. foliis crispis.* *Bauh. pin.* 315.

*M. crispa.* *Dod. pempt.* 653.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 457.

Krausblättrige Malve. W.

*Habitat in Syria; in Germania quasi sponte.* ☉ (v. v.)

#### \*48. MALVA *Papaver.*

*M. foliis quinatis ternatisque*, foliolis linearibus integerrimis ciliatis, calyce exteriori diphyllo. W.

*M. caule hirsuto parce foliato*, foliis 5-3-phyllis, calyce exteriori diphyllo. *Cavan. diff.* 2. p. 64. t. 12. f. 3. \*

Mohnartige Malve. W.

*Habitat in Lusitania.*

#### \*49. MALVA *stipulacea.*

*M. foliis inferioribus trilobis integerrimis*, superioribus multifidis, laciniis trifidis apice dentatis, stipulis lanceolatis petiolo longioribus. W.

*M. foliis inferioribus trilobatis*, lobis subrotundis, superioribus palmato-incisis, stipulis longissimis, calyce exteriori majore setaceo. *Cavan. diff.* 2. p. 62. t. 15. f. 2. \*

*M. foliis inferioribus lobatis*, superioribus palmato-in-

cifis, calyce exteriori setaceo diphylo. *Affo synop. pl. Arag. p. 90. n. 647. t. 5. f. 1.*

Beblätterte Malve. W.

*Habitat in Hispania.* ☉

\*50. MALVA *Alcea*.

M. caule erecto, foliis inferioribus anguatis, superioribus quinquepartitis scabriusculis, calycis exterioris foliolis oblongis obtusis. W.

M. caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Hort. cliff. 347. Fl. suec. 582; 628. Roy. lugdb. 356. Dalib. parif. 209. Mill. dict. n. 9. Scop. carn. n. 860. Pollich. pal. n. 660. Kniph. cent. 7. n. 50. Sabbati hort. 1. t. 48. Hoffm. germ. 247. Roth. germ. I. 296. II. 149.*

M. caule erecto glabro, foliis cordatis, inferioribus subrotundo-peltatis crenatis, reliquis profunde quinquepartitis. *Cavan. diff. 2. p. 75. t. 17. f. 2.\**

M. caule erecto, foliis scabris, trilobatis, trilobis lateralibus bipartitis, medio tripartito et quinquepartito. *Hall. helv. n. 1071.*

M. caule erecto: foliis subpeltatis multipartito-pinnatifidis. *Neck. gallob. p. 293.*

*Alcea vulgaris major. Bauh. pin. 316.*

*Alcea vulgaris. Clus. hist. 2. p. 25. Blackw. t. 309.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 458.*

Schlitzblättrige Malve. W.

*Habitat in Germania, Anglia, Gallia.* 4 (v. v.)

*Caulis scaber pilis fasciculatis expansis.*

51. MALVA *moschata*.

M. caule erecto, foliis radicalibus reniformibus incisiss, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis, calycis exterioribus foliolis linearibus. W.

M. caule erecto, foliis radicalibus reniformibus incisiss, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Hort. upf. 202. Fl. suec. 2. n. 629. Mill. dict. n. 10. et ic. t. 17. Scop. carn. n. 861. Pollich. pal. n. 661. Leers. herb. n. 547. Cavan. diff. 2. p. 76. t. 18. f. 1.\* Hoffm. germ. 247. Roth. germ. I. 297. II. 149.*

M. foliis radicalibus reniformibus incisiss, caulinis quinquepartitis pinnatis, pinnis dentatis. *Hall. helv. n. 1072.*

M. montana f. *Alcea rotundifolia laciniata. Col. ecphr. I. p. 148. t. 147.*

*Alcea folio rotundo laciniato. Bauh. pin. 316.*

β. *Alcea vulgaris minor. Bauh. pin. 316.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 459.*

Bifamduftige Malve. W.

*Habitat in Anglia, Gallia, Germania, etc. 4 (v. v.)*

*Differt a praecedente: Floribus ambrosiacis; Caule humiliore pilis solitariis erectis infidentibus puncto prominulo.*

## 52. MALVA elegans.

*M. foliis canescentibus tripartitis, laciniis apice dentatis, intermedia trifida, pedunculis axillaribus, caule fruticoso. W.*

*M. caule tomentoso, foliis pinnatifidis tomentosis crispis subtus albis, fructu globofo, capsulis trispermis. Cav. diff. 2. p. 59. t. 16. f. 1. \* et diff. 5. p. 280. Jacq. Collect. 4. p. 206. t. 6. f. 1.\**

*M. foliis tertrilobis crenatis tomentosis, pedunculis solitariis, caule herbaceo. Thunb. prod. 119.*

*M. (abutiloides) fruticosa incana, foliis profunde lobatis sinuatisque. Lin. suppl. 307.*

Schöne Malve. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei. 5 (v. f.)*

*Frutex simillimus M. capensi, sed totus, excepta pagina superiore foliorum albo-incanus s. subtomentosus. Folia parva cordata tri-f. quinquelobata, lobis incis, intermedio productiore. Flores in racemis terminalibus magni. Calyx inferior lanceolatus. Corolla alba. Fructus globosus retusus, loculis numerosis quindecim s. viginti, arcte connexis, ut in Abutilo veterum.*

## 53. MALVA tournefortiana.

*M. foliis radicalibus quinquepartitis trilobis linearibus, pedunculis folio caulino longioribus, caule decumbente. Sp. pl. 971. Amoen. acad. 4. p. 283.\* Mill. dict. n. 3.*

*M. caule decumbente, foliis pinnatifidis, pinnulis linearibus ciliatis apice trifidis, floribus solitariis, pedunculis folio longioribus. Cavan. diff. 2. p. 74. t. 17. f. 3.\**

*Malva maritima galloprovincialis, geranii folio. Tournef. inst. 98.*

*Alcea minor maritima tenuifolia procumbens. Herm. parad. 9. t. 9.*

*Alcea tenuifolia humilis maritima galloprovincialis, fo-*

liis inferioribus ad geranium accedentibus. *Pluk. alm.*  
13. t. 44. f. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 459.*

Tournefortische Malve. W.

*Habitat in Galloprovinciae, Hispaniae maritimis.* ☉

*Folia obtusiora, ciliata, ad apices supra setis adspersa. Caules ad basin valde ramosi, prostrati, assurgentes. Corollae calyce quadruplo majores.*

54. *MALVA aegyptia.*

M. caule erecto, foliis tripartitis, laciniis trifidis apice dentatis, corollis calyce minoribus, calyce exteriori diphylo. W.

M. caule erecto, foliis palmatis dentatis, corollis calyce minoribus. *Sp. pl. 971. Mill. dict. n. II. Jacq. hort. t. 65.*

M. caule erecto scabro pedali, foliis palmatis dentatis, corollis calyce brevioribus, exteriori diphylo. *Cavan. diff. 2. p. 61. t. 17. f. 1.\**

*Alcea aegyptia, geranii folio. Linn. aegypt. niff.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 460.*

Aegyptische Malve. W.

*Habitat in Aegypto.* ☉ (v. l.)

*Folia acutiora, ciliata, supra omnino glabra. Caulis erectus. ramis alternis in superiore caulis parte; nullis ad radicem. Corollae non calyce longiores. Affinis M. tournefortianae.*

\* 55. *MALVA trifida.*

M. caule erecto, foliis tripartitis, laciniis trifidis obtusis, corollis calyce triplo majoribus, calyce exteriori diphylo. W.

M. foliis parvis duplicato-trifidis, calycibus piloso-scabris, exteriori diphylo. *Cavan. diff. 3. p. 280. t. 137. f. 2.\**

Dreytheilige Malve. W.

*Habitat in Hispania.* ☉ (v. l.)

*Simillima praecedenti, sed folia multo minora et flores maximi.* W.



## 1291. L A V A T E R A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1133.**Cal. duplex; exterior 3-fidus. Capsulae plurimae, monospermae.*\* *Caule fruticoso.*

## 1. LAVATERA arborea.

L. caule arboreo, foliis septemangularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus.

*Sp. pl. 972. Hort. ups. 202. Cavan. diff. 2. p. 86. diff.**5. p. 282. t. 139. f. 2.\**L. foliis septemangularibus obtusis plicatis villosis, caule fruticoso, floribus ad alas confertis. *Hort. cliff.**348. Roy. lugdb. 355.*Malva arborea veneta dicta, parvo flore. *Bauh. pin. 315.*Malva arborecens. *Dod. pempt. 653. Camer. hort. 95.**Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 136.*

Baumartige Lavatere. W.

*Habitat inter Pisas et Liburnum, inque Anglia, Hispania et Africa boreali. ♂ (v. v.)*

## 2. LAVATERA micans.

L. caule arboreo, foliis septemangularibus acutis crenatis plicatis tomentosis, racemis terminalibus. *Sp. pl.**972. Roy. lugdb. 356. Cav. diff. 2. p. 86.*Malva foliis mollibus undulatis: in margine superius micis sulphureis ad solem splendentibus donatis. *Morif.**hist. 1. p. 523. f. 5. t. 17. f. 9.*Malva hispanica. *Morif. prael. 285.**Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 137.*

Schimmernde Lavatere. W.

*Habitat in Hispania, Lusitania. † (v. f. c. fr.)*

## \*3. LAVATERA hispida.

L. caule frutescente, foliis superioribus trilobato-hastatis dentatis tomentosis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, ramis petiolisque fasciculato-hirtis. W.

L. caule fruticoso piloso, pilis fasciculatis, foliis superis hastato-trilobis, floribus sessilibus solitariis, calycibus hirsutissimis. *Desf. atl. 2. p. 118. t. 171.*β. L. (*africana*) caule fruticoso, foliis canescentibus quinquelobatis crenatis, floribus cernuis geminis. *Cavan.**diff. 5. p. 282. t. 159. f. 1?*

Büschelhaarige Lavatere. W.

*Habitat in sepibus Algeriae. †*

Rami et Petioli pilis fasciculatis obsiti. Folia superiora trilobo-hastata, summa floralia lanceolata indivisa. *L. africana* Clariss. Cavanilles est forte planta junior, differt enim a *L. hispida* foliis omnibus quinquelobis, floribus geminatis longe pedunculatis cernuis. convenit vero ramis et petiolis fasciculato-pilosis. In plantis fruticosis exoticis hujus classis facies omnium partium in juventute saepius longe alia est, hinc plantam Clariss. Cavanilles pilis fasciculatis convenientem huc pertinere autumavi. W.

#### 4. LAVATERA olbia.

*L.* caule fruticoso, foliis quinquelobo-hastatis, floribus solitariis. *Hort. ups.* 202. *Mill. dict. n.* 8. *Jacq. hort. t.* 73.

*L.* foliis dentatis inferioribus quinquelobatis, superioribus trilobatis acutis, lobo medio duplo longiore, floribus solitariis. *Cavan. diff.* 2. p. 86. t. 32. f. 2.\*

*L.* foliis quinquangularibus acutis crenatis: lacinia media productiore. *Hort. cliff.* 348. *Roy. lugdb.* 355. *Althaea frutescens*, folio acuto, parvo flore. *Bauh. pin.* 316.

*Althaea frutescens*, folio acuto virente molli, flore specioso. *Pluk. phyt.* 8. f. 1.

*Althaea arborea olbia* in galloprovincia. *Lob. ic.* 653. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 137.

Olbische Lavatere. W.

*Habitat in Olbia insula Galloprovinciae. † (v. v.)*

Variat Foliis primi anni maximis, insequentium vero longe minoribus, quod assuibus commune. Simillima *L. trilobae*, sed huic flores solitarii pedunculo brevissimo; huic Calyx exterior acuminatus, fere tripartitus longitudine interioris.

#### 5. LAVATERA triloba.

*L.* caule fruticoso, foliis subcordatis subtrilobis rotundatis crenatis, stipulis cordatis, pedunculis aggregatis unifloris. *Mill. dict. n.* 7. *Jacq. hort. t.* 74. *Kuiph. cent.* 7. n. 41.

*L.* foliis subcordatis - obsolete trilobis in triangulum pliacatis crenatis, stipulis cordatis, pedunculis aggregatis unifloris. *Cavan. diff.* 2. p. 87. t. 31. f. 1.\*

*L.* foliis subcordatis emarginatis obsolete trilobis crenatis petiolo brevioribus, stipulis cordatis. *Roy. lugdb.* 355.

*Malva foliis subcordatis trilobis obtusis ferratis villosis.*

*Hort. cliff.* 347.

*Althaea fruticans hispanica, aceris montepessulani incanis foliis, grandiflora saponem spirans. Pluk. alm.* 24. t. 8. f. 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 138.

Dreylappige Lavatere. W.

*Habitat in Hispania, Gallia.* † (v. v.)

*Planta tomentosa: tota pilis minimis glutiniferis, eisque immixtis aliis pilis majoribus apice stellatis. Pedunculi tres pluresve ex alis petiolorum, uniflori. Flos magnus, pallide purpurascens. Calyx interior in fructu duplo longior est.*

#### 6. LAVATERA lusitanica.

L. caule fruticoso, foliis septemangularibus tomentosis plicatis, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 973. *Roy. lugdb.* 355. † *Kniph. cent.* 9. n. 55.

*Althaea frutescens lusitanica, folio ampliore minus incana. Tournef. inst.* 97.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 139.

Portugiesische Lavatere. W.

*Habitat in Lusitania.* †

#### \* 7. LAVATERA maritima.

L. foliis subrotundis obtuse angulatis crenatis tomentosis, pedunculis solitariis axillaribus. W.

L. foliis cordatis subrotundo-lobatis crenatis tomentosis, floribus solitariis. *Cavan. diff.* 2. p. 88. t. 32. f. 3.\*

L. caule fruticoso lanato, foliis cordato-orbiculatis quinquelobis obtusis crenatis, pedunculis unifloris, stipulis fetaceis deciduis. *Gouan. illust.* 46. t. 21. f. 2.\*

*Althaea frutescens, folio rotundiore incano. Bauh. pin.* 316.

*Althaea arborescens Clusii. Tabern. ic.* 770.

Meerstrands Lavatere. W.

*Habitat in Galliaë maritimis inque Hispania.* † (v. v.)

\* \* *Caule herbaceo.*

#### 8. LAVATERA thuringiaca.

L. caule herbaceo tomentoso, foliis subtomentosis, inferioribus angulatis, superioribus trilobis, lobo intermedio longiore obtuso, pedunculis axillaribus solitariis. W.

L. caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incis. *Hort. upf.* 203. *Mill. dict. n.* 4. *Crantz. austr. p.* 144. *Pall. it.* 1. 31. *Schell. barb. n.* 539. *Jacq. austr. t.* 311. *Kniph. cent.* 6. n. 53. *Hoffm. germ.* 246. *Roth. germ. I.* 146. II. 295.

L. foliis inferioribus cordatis crenatis subrotundo-lobatis, summis hastatis, pedunculis longis solitariis unifloris. *Cavan. diff.* 2. p. 89. t. 31. f. 5.\*

L. caule herbaceo, foliis summis hastatis calycibusque acutis, pedunculis solitariis unifloris. *Schreb. spicil. flor. lipf.* p. 8.

L. foliis inferioribus cordato-subrotundis, superioribus lobatis crenatis, calycibus utrinque incis, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355.

*Althaea thuringiaca. Cam. hort.* 1. t. 6.

*Althaea thuringiaca grandiflora. Dill. elth* 9. t. 8. f. 8.

*Althaea flore majore. Bauh. pin.* 316.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 462.

Thüringische Lavatere. W.

*Habitat in Pannonia, Tataria, Suecia, Germania, etc. ad sepes.* 4 (v. v.)

#### 9. LAVATERA cretica.

L. caule herbaceo hispido-scabro, foliis quinquelobis acutis, pedunculis axillaribus aggregatis. W.

L. caule erecto, ramis inferioribus diffusis, pedunculis confertis unifloris, foliis lobatis: superioribus acutis. *Hort. upf.* 202.\* *Jacq. hort. t.* 41.

L. caule erecto scabro, foliis cordatis septangulatis, superioribus acutis, floribus confertis axillaribus, pedunculis erectis unifloris. *Cavan. diff.* 2. p. 89. t. 32. f. 1.\*

*Malva cretica annua altissima, flore parvo ad alas umbellato. Tournef. cor.* 2.

*Malva annua hirsuta: foliis hederæ instar angulosis. Morif. hist.* 2. p. 521. f. 5. t. 7. f. 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 8. p. 463.

Candische Lavatere. W.

*Habitat in Creta.* ☉ (v. v.)

#### \* 10. LAVATERA flava.

L. caule herbaceo tomentoso, foliis subtomentosis subrotundis obsolete trilobis, pedunculis axillaribus aggregatis. W.

- L. caule herbaceo, foliis semiorbiculatis crenatis, superioribus obsolete trilobis tomentoso-pubescentibus. *Desf. atl. 2. p. 119. t. 172. \**  
 Gelbe Lavatere. W.  
*Habitat in Africae borealis agris cultis prope Mascar.* ☉  
 Corolla magna flava. W.

\*11. LAVATERA punctata.

- L. caule herbaceo punctato-scabro, foliis subtomentosis, inferioribus orbiculato-cordatis, summis trilobis, pedunculis solitariis folio longioribus. W.  
 L. caule herbaceo, foliis subrotundis quinquangularibus, deinde hastatis, pedunculis unifloris axillaribus, floribus campanulatis. *All. auct. p. 26. \**  
 Punctirte Lavatere. W.  
*Habitat in agro Nicaeensi.* ☉ (v. v.)  
 Petioli cauli fere adpressi hinc folia deflexa. Corolla pallide violacea magna, petalis bilobis. W.

12. LAVATERA trimestris.

- L. caule herbaceo superne hispido-scabro, foliis inferioribus subrotundo-cordatis, superioribus angulatis, summis trilobis, lobo intermedio lanceolatis, pedunculis solitariis folio brevioribus. W.  
 L. caule scabro herbaceo, foliis lanceolatis, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. *Hort. upf. 203. Mill. dict. n. 3. Jacq. hort. t. 72. Kuiph. cent 8. n. 56.*  
 L. caule herbaceo scabro, foliis inferioribus subrotundis, mediis quinquelobatis acutis, summis lobo medio longiore, fructibus orbiculo tectis. *Cavan. diff. 2. p. 90. t. 31. f. 1. \**  
 L. foliis trilobis: lacinia media productione, caule herbaceo. *Hort. cliff. 348.*  
 L. foliis ovato-lanceolatis: inferne angulatis, pedunculis unifloris, caule herbaceo. *Roy. lugdb. 355. Sauv. monsp. 101.*  
 Malva folio vario. *Bauh. pin. 315. prod. 137. t. 137.*  
 β. Lavatera foliis subcordatis obtusis angulatis serratis, caule herbaceo. *Roy. lugdb. 355. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 463.*  
 Garten-Lavatere. W.  
*Habitat in Syria, Hispania, G. Narbonensi.* ☉ (v. v.)

## \*1292. RUIZIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1135.*

*Cal. duplex: exterior 3-phyllus. Styl. 10. Caps. decem uniloculares dispermae arcte cohaerentes.*

\*1. RUIZIA *cordata*.

R. foliis cordato-lanceolatis repandis. W.

R. foliis cordatis oblongo-acuminatis sinuato-crenatis incanis, subtus farinaceis. *Cavan. diff. 3. p. 117. t. 36. f. 2.\**

Herzblättrige Ruizie. W.

*Habitat in insula Borbonia prope vicum St. Dionysii. †*

\*2. RUIZIA *lobata*.

R. foliis cordatis quinquelobis crenatis. W.

R. foliis cordatis crenatis 3-5-lobatis oblongis, lobo medio productiore acuminato. *Cavan. diff. 3. p. 118. t. 36. f. 1.\**

Lappige Ruizie. W.

*Habitat in insula Borbonia ad promontorium St. Bernardi. † (v. l.)*

\*3. RUIZIA *variabilis*.

R. foliis ramorum florentium palmatis, sterilium digitatis. *Jacq. hort. Schönb. 3. p. 24. t. 295.\**

R. (*palmata*) foliis utrinque incanis palmatis incisis quinquepartitis, lobis acuminatis sinuato-crenatis, medio productiore. *Cavan. diff. 3. p. 119. t. 37. f. 1.\**

R. (*laciniata*) foliis usque ad petiolum laciniatis, laciniis septem angustissimis linearibus pinnatifidis, pinnulis decurrentibus. *Cavan. diff. 3. p. 119. t. 37. f. 2.\**

Veränderliche Ruizie. W.

*Habitat in insula Borbonia. †*

*Forma foliorum mire variat. Folia in ramis floriferis quinqueloba fere praecedentis sed dentata, in ramis sterilibus palmata, lobis pinnatifidis, laciniis lanceolatis, vel digitata foliolis angustissimis pinnatifidis linearibus. In omnibus Ruiziis folia sunt subtus tomentosa, et flores in corymbis pedunculatis bifidis axillaribus. W.*

## 1293. MALOPE.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1136.*

*Cal. duplex: exterior 3-phyllus. Capsulae absque ordine glomeratae monospermae.*

1. MALOPE *malacoides.*

*M. foliis oblongis obtusis integris crenatis supra glabris, pedunculis solitariis axillaribus. W.*

*M. foliis ovatis crenatis supra glabris. Hort. cliff. 347. Hort. upf. 206. Roy. lugdb. 357. Mill. dict. n. 1. Fabric. helmst. p. 277. Sabb. hort 1. t. 50. Desf. atl. 2. p. 120.\**

*M. foliis cordatis ovatis crenatis, floribus solitariis magnis longissime pedunculatis. Cavan. diff. 2. p. 84. t. 27. f. 1.\**

*Malva betonicae folio. Moris. hist. 2. p. 522. f. 5. t. 17. f. 11. Bocc. sic. 15. t. 8, f. 2.*

*Alcea betonicae folio, flore purpureo violaceo. Barr. ic. 1189.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 8. p. 464.*

*Malvenartige Malope. W.*

*Habitat in Hetruriae pratis et Mauritania. ☉ (v. l.)*

\*2. MALOPE *multiflora.* †

*M. foliis subrotundis integris crenatis villosis, pedunculis ternis quaternisque axillaribus. W.*

*M. foliis subrotundis crenatis villosis, floribus 3-4 axillaribus. Cavan. diff. 2. p. 85.*

*Vielblütige Malope. W.*

*Habitat in Baetia. ☉*

*Caules semipedalis parum ramosus. Flores parvi. Calyces villosi. Corolla alba. Fructus (habita proportionem) major quam in ceteris. Cavan. l. c.*

\*3. MALOPE *trifida.*

*M. foliis oblongis lemitrilobis acuminatis dentatis glabris, pedunculis solitariis axillaribus. W.*

*M. foliis crassis trinerviis trifidis dentatis, floribus solitariis axillaribus longissime pedunculatis. Cav. diff. 2. p. 85. t. 27. f. 2.\**

*Dreytheilige Malope. W.*

*Habitat in pratis Baetia inque Barbaria. ☉*

*Differt a M. malacoides: foliis trilobis acutioribus crassioribus. W.*

## \*1294. K I T A I B E L I A. W.

*Willd. N. Act. Soc. N. Sc. Berol. 2. p. 107.**Cal. duplex: exterior 7- f. 9-fidus. Capsulae in capitulum quinquelobum glomeratae monospermae.*\*1. K I T A I B E L I A *vitifolia*. W.*Kitaibelia vitifolia. Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 2. p. 108. t. 4. f. 4.\* Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 1. p. 29. t. 31.\***Weinblättrige Kitaibele. W.**Habitat in Slavoniae comitatu Syrmienfi. 24 (v. v.)**Planta spontanea orgyalis vel octo-pedalis, nosira culta quadri vel quinquepedalis. Tota planta pilis glanduliferis viscidis parvis est tecta. Caulis teres non striatus. Folia alterna petiolata quinqueloba inaequaliter dentata, lobo intermedio longiore acuminato. Petioli teretes absque ullo sulco, inferiores longitudine foliorum, superiores breviores. Stipulae ovatae subcordatae bifidae, lacinia exteriora versus petiolum sita minore. Flores axillares plerumque tres pedunculatae. Calyx exterior plerumque novemfidus interdum septemfidus, laciniis ad basin utrinque dentibus parvis binis vel tribus instructis, inaequalibus. Calyx interior villosus exteriora minor. Corolla alba, petalis calyce exteriora parum majoribus cuneiformibus truncatis. W.*

## 1295. U R E N A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1137.**Cal. duplex: exterior 5-fidus. Caps. 5-locularis, 5-partibilis, loculis clausis monospermis.*1. U R E N A *lobata*.*U. foliis subrotundo-cordatis angulatis, subtus triglandulosis. W.**U. foliis triglandulosis cordatis angulatis ferratis, latitudine longitudinem superante. Cavan. diff. 6. p. 336. t. 185. f. 1.\***U. foliis angulatis. Hort. cliff. 348. Hort. upf. 200. Fl. zeyl. 256. Roy. 353. Mill. dict. n. 1.*



U. sinica, xanthii facie. *Dill. elth.* 340. t. 319. f. 412.  
Trifolio affinis indiae orientalis, xanthii facie. *Breyn.*  
*cent.* 82. t. 35.

Lappago amboinica. *Rumph. amb.* 6. p. 59. t. 25. *Burm.*  
*ind.* p. 149. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 140.

Eckige Urene W.

*Habitat in China.* † (v. v.)

Porus glandulosus subtus in costis 3 intermediis fo-  
liorum.

\*2. URENA reticulata.

U. foliis subtus uniglandulosus, inferioribus trilobis, su-  
perioribus panduriformibus. W.

U. foliis reticulatis uniglandulosus sinuato-serratis, infe-  
rioribus trilobis, reliquis lanceolatis. *Cavan. diff.* 6.  
p. 335. t. 183. f. 2.\*

Netzblättrige Urene. W.

*Habitat in America aequinoctiali.* †

Folia subtus albicantia tomentosa reticulato-nervo-  
sa uniglandulosa; inferiora triloba dentata; superio-  
ra panduriformia oblonga dentata; summa lanceolata  
dentata. W.

\*3. URENA tricuspis.

U. foliis subtus uniglandulosus trilobis acuminatis, caule  
hirto. W.

U. caule piloso, foliis uniglandulosus ovato-angulatis, an-  
gulis acuminatis serratis. *Cavan. diff.* 6. p. 334. t.  
183. f. 1.\*

Dreyspitzige Urene. W.

*Habitat in insula Mauriti et Borbonia.* †

Folia omnia trilobata, inaequaliter dentata, lobis fo-  
liorum inferiorum angulatis. Differt a praecedente:  
caule hirto piloso, nec tomentoso, foliis omnibus tri-  
lobis. W.

4. URENA americana.

U. foliis trifidis basi integris. *Lin. suppl.* 308.

Malva fruticosa ribesii foliis, seminibus asperis. *Sloan.*  
*hist.* 1. p. 37. t. II. f. 2.

Amerikanische Urene. W.

*Habitat in Surinamo.* C. G. Dalberg. †

Caulis frutescens teres vix scaber. Folia petiolata  
semitriloba, sinibus obtusis non rotundato-excavatis,  
serrata, basi integra obtusiuscula, lobo medio paulo  
majore, lobis extrorsum magis distantibus, sub to-  
*Linnaei Spec. Plant. T. III.* Eee

mento poro nectareo ad basin nervi intermediï paginæ inferioris. Calyx et Fructus ut in reliquis, sed Corolla minor.

*Urena americana* vix nisi varietas *U. sinuatae*, quae foliis superioribus trifidis saepe variat. Swartz obs. 265.

### 5. URENA *sinuata*.

*U. foliis subtus triglandulosis sinuato-quinquelobis, lobis angulatis denticulatis obtusis. W.*

*U. foliis triglandulosis sinuato-lobatis serratis, sinibus obtusis. Cavan. diff. 6. p. 336. t. 185. f. 2.*

*U. foliis sinuato-palmatis: sinibus obtusis. Fl. zeyl. 257. Mill. dict. n. 3. Burm. ind. p. 149.*

*Alcea indica frutescens, foliis in lacinias varie dissectis. Pluk. alm. 15. t. 74. f. 1.*

*Alcea indica frutescens. Pluk. alm. 15. t. 5. f. 3. melior.*

*Malvinda foliis inferioribus multifidis, superioribus incis, flore solitario. Burm. zeyl. 150. t. 69. f. 2.*

*Uren. Rheed. malab. 10. p. 3. t. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 141.*

Ausgebogene Urene. W.

*Habitat in India. † (v. f.)*

*Porus glandulosus subtus in costa 1 intermedia foliorum.*

*Urena sinuata Swartz obs. 264. ob porum solitarium glandulosum foliorum differre videtur. W.*

### \*6. URENA *multifida*.

*U. foliis subtus uniglandulosis hirsutis quinquelobis, lobis oblongis acuminatis inciso-dentatis. W.*

*U. foliis uniglandulosis sinuato-multifidis, sinibus rotundatis denticulatis, caule ramosissimo. Cav. diff.*

*6. p. 336. t. 184. f. 2.*

Vieltheilige Urene. W.

*Habitat in insula Mauritii. †*

*Tota planta hirta. Facies praecedentis, sed folia uniglandulosa et lobi acuminati inciso-dentati. W.*

### 7. URENA *procumbens*.

*U. foliis oblongis sinuatis serratis, caule procumbente.*

*Syst. Veg. 522.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 142.*

Liegende Urene. W.

*Habitat in Chinae monticulis. Osbeck. †*

*Caulis frutescens, procumbens, repens, ramosissimus. Folia magnitudine Origani, subcordata, integra, nec lobata, laevia, argute serrata. Flores foliis majores sunt. Spec. 975.*

\*8. URENA *viminea*.

U. foliis uniglandulosis subrhombeis dentatis. W.

U. foliis uniglandulosis, inferioribus rotundato- acutis sublobatis, superioribus lanceolatis serratis calyce exteriori majore. *Cavan. diff. 6. p. 335. t. 184. f. 1.\**

Ruthenförmige Urene. W.

*Habitat in Brasilia. †*

*Folia uniglandulosa, inferiora subrotundo- ovata acuta angulata dentata, reliqua subrotundo- rhombea dentata summa lanceolata. Calyx exterior interiore longior. W.*

1296. GOSSYPIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1138.*

*Cal. duplex. exterior 3- fidus. Caps. 4- locularis. Sem. lana obvoluta.*

1. GOSSYPIUM *herbaceum*.

G. foliis quinquelobis mucronatis subtus uniglandulosis, caule herbaceo laevi. W.

G. foliis quinquelobis, subtus eglandulosis, caule herbaceo laevi. *Hort. upf. 203. Mat. med. 167. Mill. dict. n. 1. Murray prodr. 170. Blackw. t. 354. Kniph. cent. 8. n. 47.*

G. foliis quinquelobis subtus uniglandulosis, lobis rotundatis mucronatis, calyce exteriori serrato. *Lamarck. encycl. 2. p. 133. Cavan. diff. 6. p. 310. t. 164. f. 2.\**

G. caule decumbente. *Hort. lugdb. 350. Roy. lugdb. 359.*

G. frutescens, semine albo. *Bauh. pin. 430.*

Gossypium. *Cam. epit. 203.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 143.*

Krautartige Baumwolle. W.

*Habitat in India, Syria, Africa. ☉ (v. v.)*

\*2. GOSSYPIUM. *indicum*

G. foliis trilobis quinquelobisve obtusis subtus eglandulosis, caule herbaceo hirsuto. W.

E e e 2

G. foliis subtrilobis subtus eglandulosis, lobis cuneatis brevibus, fructu conico. *Lamarck. encycl. 2. p. 134.\**  
*Cavan. diff. 6. p. 314. t. 169.\**

Gossypium l. capae. *Rumph. amb. 4. p. 33. tab. 12.*  
 Indische Baumwolle. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ ♂

Caulis hirsutus. Folia plerumque triloba et eglandulosa. Flores majores quam in praecedente, Calycesque exteriores apice subdentati. W.

\*3. GOSSYPIUM micranthum.

G. foliis quinquelobis obtusis subtus uniglandulosis, calyce exteriori multifido flore longiore, caule glabro punctato. W.

G. foliis quinquelobis uniglandulosis glaberrimis, calyce superante corollam. *Cav. diff. 6. p. 311. t. 193.\**

Kleinblumige Baumwolle. W.

*Habitat in Persia ad Hispahan.*

4. GOSSYPIUM arboreum.

G. foliis quinquelobo-palmatis, lobis lanceolatis obtusis mucronatis, caule fruticoso. W.

G. foliis palmatis: lobis lanceolatis, caule fruticoso. *Sp. pl. 975. Mill. dict. n. 3. Forskaehl aegypt. p. 125. Cav. diff. 6. p. 311. t. 193.\**

G. caule erecto. *Hort. cliff. 350. Gron. orient. 208. Roy. lugdb. 359.*

G. arboreum caule laevi. *Bauh. pin. 430.*

G. herbaceum l. Xylon maderaspatense, rubicundo flore, pentaphyllum. *Pluk. alm. 172. t. 188. f. 3?*

Cudupariti. *Rheed. mal. 1. p. 55. t. 31.*

Xylon arboreum. *Tournef. inst. 101. Burm. ind. 150.*

Gossypium arborecens. Gotnem legiar. *Alp. exot. 38. t. 38.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 144.*

Baumartige Baumwolle. W.

*Habitat in Indiae arenosis.* †

*Inter foliorum sinus saepe lacinula, unde omnes sinus obtusi.*

\*5. GOSSYPIUM vitifolium.

G. foliis inferioribus quinquelobo-palmatis superioribus trilobis, subtus uniglandulosis, lobis acuminatis, caule punctato. W.

G. foliis palmatis quinquelobis acutis subtus uniglandulosis, calyce exteriori profunde laciniato. *Lamarck encycl. 2. p. 135.\* Cavan. diff. 6. p. 311. t. 166,*

G. arboreum. *Merian. surin. t. 10.*

G. latifolium. *Rumph. amb. 4. p. 37. t. 13.*

G. frutescens annuum folio vitis ampliore quinquefido. *Pluk. alm. 172. t. 188. f. 2.*

Weinblättrige Baumwolle. W.

*Habitat in India orientali. ♀ ♂ (v. v.)*

## 6. GOSSYPIUM *hirsutum.*

G. foliis superioribus indivisis cordatis, inferioribus triquinquelobis, ramulis petiolisque hirsutis, seminibus viridibus adhaerentibus. *Swartz Act. holm. 1790. p. 20.\**

G. foliis quinquelobis subtus uniglandulosis, ramulis petiolisque pubescentibus. *Sp. pl. 975. Mill. dict. n. 4. Sabb. hort. 1. t. 55. Cavan. diff. 6. p. 312. t. 167.*

Xylon americanum praestantissimum, semine virescente. *Tournef. inst. 101.*

Gossypium frutescens pentaphyllus barbadense. *Pluk. alm. 172. t. 299. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 145.*

Behaarte Baumwolle. W.

*Habitat in America. ☉ ♂*

*Variat foliis obtusis.*

## 7. GOSSYPIUM *religiosum.*

G. foliis superioribus trilobis, inferioribus quinquelobis ramulis petiolisque - nigro punctatis, calyce exteriori subtriphyllo, seminibus nigris lana colorata adhaerentibus. *Swartz Act. holm. 1790. p. 21.\**

G. foliis trilobis acutis subtus uniglandulosis, ramulis nigro-punctatis. *Syst. Veg. 522.*

G. caule hispido, foliis trilobis et quinquelobis uniglandulosis stylo exserto. *Cavan. diff. 6. p. 313. t. 164. f. 1.\**

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 146.*

Gelbe Baumwolle. W.

*Habitat in India orientali. ♀ (v. v.)*

*Frutex ramis vix pilosis, sed uti Petioli adpersus atomis nigris. Folia cordata, profunde triloba, in fertiliori solo quinqueloba, magnitudine palmae, acu-*

*minata, glandula unica sub costa tantum media. Stamina omnino monadelphica.*

*Lana pallide crocea. W.*

\*8. **GOSSYPIUM latifolium.**

G. foliis acutis, infimis indivisis, reliquis trilobis subtus uniglandulosis. *Murr. in Comm. goett. 1776. p. 32. t. 1. \**

Breitblättrige Baumwolle. W.

*Habitat* - - - - ♂ ♀ (v. v.)

9. **GOSSYPIUM barbadense.**

G. foliis superioribus trilobis, inferioribus quinquelobis, caule laeviori, seminibus liberis. *Swartz Act. holm. 1790. p. 29. \**

G. foliis trilobis integerrimis, subtus triglandulosis. *Hort. upf. 204. Mill. dict. n. 2.*

G. frutescens annuum, folio trilobo, barbadense. *Pluk. alm. 172. t. 188. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 147.*

Westindische Baumwolle. W.

*Habitat in Barbados. ♂ ♀ (v. f. f. fl.)*

*Glandulae 3 sub costis foliorum, quae non in praecedentibus.*

\*10. **GOSSYPIUM peruvianum.**

G. foliis quinquelobis triglandulosis, inferioribus indivisis, calycibus basi triglandulosis. W.

G. foliis quinquelobis acutis triglandulosis, calycibus exterioribus triphyllis triglandulosis. *Cavan. diff. 6. p. 313. t. 168. \**

Peruvianische Baumwolle. W.

*Habitat in Peru. ♂*

1297. **HIBISCUS.**

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1139.*

*Cal. duplex: exterior polyphyllus. Stigmata 5.*

*Capf. 5-locularis, polysperma.*

1. **HIBISCUS Moscheutos.**

H. foliis ovatis acuminatis ferratis subtus tomentosis, petiolis floriferis, calycibus tomentosis. W.

H. foliis ovatis acuminatis ferratis: caule simplicissimo,

petiolis floriferis. *Hort. upf.* 205. *Gron. virg.* 102.  
*Cavan. diff.* 3. p. 163. t. 65. f. 1.\*

H. foliis ovatis crenatis: angulis lateralibus obsoletis.  
*Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 358.

*Alcea rosea peregrina*, forte *Rosa moscheutos plinii*.  
*Corn. canad.* 144. t. 145. *Morif. hist.* 2. p. 532. f. 5.  
t. 19. f. 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 148.

Blattstielblütiger Hibiscus. W.

*Habitat in Canada, Virginia.* 2 (v. v.)

*Flos petiolo insidet uti Turneræ ulmifoliae.*

*Folia superne glabra inferne sericeo-tomentosa, sub-*  
*quinquenervia, nervis venosis.* W.

### \* 2. HIBISCUS *incanus*.

H. foliis ovatis acuminatis ferratis utrinque tomentosis,  
pedunculis axillaribus, calycibus tomentosis subaequa-  
libus. W.

H. caule herbaceo simplicissimo incano, foliis ovatis acu-  
minatis quinquenerviis ferratis incanis sericeis, flori-  
bus petiolisque geniculatis. *Wendl. obs.* 54. \* *Wendl.*  
*hort. herrenhus. fasc.* 4. p. 8. t. 24.\*

Grauer Hibiscus. W.

*Habitat in Carolina.* 2 (v. l.)

*Folia ovata acuminata utrinque sericeo-tomentosa*  
*incana, margine, ut in praecedente, obtuse serrata,*  
*quinquenervia, nervis venosis. Calyx exterior fere lon-*  
*gitudine interioris, e foliis decem lineari-subulatis*  
*compositus, et ut interior tomentosus. Corolla sulphu-*  
*rea venosa magna. A praecedente distinctus: foliis utrin-*  
*que tomentosis, pedunculis axillaribus nec petiolo in-*  
*fertis.* W.

### \* 3. HIBISCUS *lasiocarpus*.

H. foliis ovato-lanceolatis acutis ferratis tomentosis, pe-  
dunculis axillaribus, calycibus tomentosis, exteriore  
ciliato. W.

H. foliis ovato-lanceolatis magnis, crenato-ferratis to-  
mentosis subtus canis, capsula ovato-acuminata setosa.  
*Cavan. diff.* 3. p. 159. t. 70. f. 1.\*

Rauhfrüchtiger Hibiscus. W.

*Habitat* - - - - - †

*Calyx exterior 13-phyllus, foliolis linearibus arista-*  
*to-ciliatis, interiore calyce dimidio brevioribus.* W.

4. HIBISCUS *palustris*.

H. caule herbaceo simplicissimo, foliis ovatis subtrilobis subtus tomentosis, floribus axillaribus. *Mill. dict. n. 18. Fabric. helmst. p. 278. Cavan. diff. 3. p. 162. t. 65. f. 2.*

*Althaea palustris. Bauh. pin. 316. (ex horto C. B. Burserus.)*

*Althaea hortensis f. peregrina. Dod. pempt. 655.*

*Ketmia palustris flore purpureo. Tournef. inst. 100. R. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 149.*

Sumpf-Hibiscus. W.

*Habitat in Virginia. Gronov. Canada. Kalm. 24 (v. v.)*

*Habitus Moscheutos. Caulis sesquipedales, non ramosi, annui. Folia lato-ovata, obtuse ferrata, trinervia, acuminata, subtus tomentosa. Pedunculi ex axillis foliorum superiorum solitarii, petiolo longiores, uniflori, non e petiolo enati, geniculati. Flos maximus.*

\* 5. HIBISCUS *militaris*.

H. foliis glabris trilobis acuminatis ferratis, caule herbaceo simplicissimo. W.

H. (*militaris*) foliis ferratis hastatis acutissimis, floribus magnis pulcherrimis, petalis bifidis. *Cavan. diff. 6. p. 352. t. 198. f. 2.\**

H. (*laevis*) herbaceus glaber, pedunculis solitariis articulatis unifloris. *Scop. del. insub. 3. t. 27.*

Glatte Hibiscus. W.

*Habitat in Louisiana. 24 (v. v.)*

*Tota planta glaberrima. Folia triloba, lobis acuminatis, intermediō reliquis multo longiore. Calyx exterior interiore duplo brevior 12-16-phyllus, foliis lineari-subulatis. Corolla purpurea. W.*

\* 6. HIBISCUS *hastatus*. †

H. foliis lanceolatis trilobo-hastatis dentatis, capsulis tomentosis. W.

H. foliis hastatis ferratis oblongis angustis, floribus magnis solitariis, fructu parvo tomentoso. *Cavan. diff. 3. p. 144. t. 50. f. 1.\**

*Alcea maderaspatana hastatis foliis glabris, pericarpio tantum villoso. Pluk. t. 127. f. 2.*

Spontonblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India.*



\*7. HIBISCUS *ferrugineus*.

H. foliis cordatis parabolicis obtusis dentatis scabris, pedunculis axillaribus petiolo longioribus. W.

H. caule tomentoso ferrugineo, foliis cordatis oblongis versus basin latioribus scabris flavescentibus, floribus solitariis. *Cavan. diff.* 3. p. 162. t. 60. f. 1.\*

Rostfarbener Hibiscus. W.

*Habitat in Madagascar.*

Calyx exterior decaphyllus interiore duplo brevior, foliolis lineari-subulatis. Corolla magnitudine H. Trioni rubicunda. W.

8. HIBISCUS *cordifolius*.

H. arboreus tomentosus, foliis cordatis ovatis serratis, floribus pedunculatis terminalibus, calyce polyphylo lineari longo. *Lin. suppl.* 309.

Herzblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in America meridionali. Mutis.* †

Figura foliorum ut in H. populneo absque ullis angulis. Calyx ut in Achania Malvavisco, sed multo longior et magis polyphyllus. Flores inter mediocres.

9. HIBISCUS *populneus*.

H. foliis subrotundo-cordatis acuminatis integerrimis glabris, caule arboreo, calyce exteriori triphylo caduco, interiore truncato. W.

H. foliis cordatis integerrimis, caule arboreo, calycum exteriori truncato. *Sp. pl.* 976. *Fl. zeyl.* 258. \* *Mill. dict.* 17.

H. caule arboreo, foliis cordatis acuminatis integerrimis, calyce exteriori triphylo deciduo. *Cavan. diff.* 3. p. 152. t. 56. f. 1.\*

Alcea malabariensis, abutili folio, flore majore ex albo flavescente. *Raj. hist.* 1069.

Novella litorea. *Rumph. amb.* 2. p. 224. t. 74.

Bupariti. *Rheed. mal.* 1. p. 51. t. 29.

Ketmia indica, populi folio. *Tournef. inst.* 100. R.

Houttuyn *Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 150.

Pappelblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India orientali inque Societatis insulis.* †

Calyx exterior triphyllus caducus, interior truncatus obsolete quinque dentatus. W.

10. HIBISCUS *tiliaceus*.

H. foliis subrotundo-cordatis acuminatis crenatis, caule arboreo, calyce exteriori decemdentato. W.

H. foliis cordatis subrotundis indivisis acuminatis crenatis, caule arboreo, calyce exteriori decemdentato. *Sp. pl.* 976. *Roy. lugdb.* 532. *Fl. zeyl.* 259. \* *Cavan. diff.* 3. p. 151. t. 55. f. 1.\*

Malva arborea maritima, folio subrotundo minore acuminato subtus candido, cortice in funes ductili. *Sloan. jam.* 93. *hist.* 1. p. 215. t. 134. f. 4.

Alcea malabarica, abutili folio, flore minore ex albo flavescente exterius aspero. *Raj. hist.* 1070.

Alcea indica finarum, flore luteo malvaceo. *Pluk. amalth.* 6. p. 355. f. 5.

Althaea maritima arboreescens diffusa, foliis orbiculato-cordatis crenatis subtus cinereis. *Brown. jam.* 284.

Novella. *Rumph. amb.* 2. p. 218. t. 73.

Pariti f. Tali pariti. *Rheed. mal.* 1. p. 53. t. 30.

Ketmia zeylanica sempervirens et florens, flore luteo. *Burm. zeyl.* 136. *ind.* 150. R.

Ketmia indica, tiliae folio. *Tournef. inst.* 100. *Plum. spec.* 2. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 151.

Lindenblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India ad rivos.* † (v. l.)

Folia juniora subtriloba, subtus poris 3. Stipulae magnae, rotundatae.

*In America calidiore haec species etiam occurrit; sed ab indica varietate, foliis minoribus integerrimis differre dicitur. An re vera varietas?* W.

\* 11. HIBISCUS *elatus*.

H. foliis cordatis subrotundis integerrimis, pedunculis brevissimis unifloris, calyce decemdentato. *Swartz prod.* 103. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1218.

H. arboreus, foliis angulato-cordatis, flore amplo croceo, ligno violaceo. *Brown. jam.* 284.

Malva arborea folio rotundo, flore liliaceo. *Sloan. jam.* 95. *hist.* 1. p. 95. t. 134. f. 2. 3. (non f. 1. f. folium quod alienum.)

Hoher Hibiscus. W.

*Habitat in campis montium Jamaicae interioris.* †

Arbor 50-60-pedalis, coma ampla, cortex laevifolius tenax. Rami teretes patentes laeves. Folia

*petiolata alterna cordata lato-subrotunda acumine brevissimo, integerrima, rarissime obtuse crenata, nervosa venosa, glabra, subtus incano-tomentosa firma. Petioli elongati teretes laeves. Rima linearis (porus glandularis) ad basin nervi medii foliorum. Pedunculus semipollicaris crassus erectus solitarius in axillis foliorum extimorum angulatus laevis uniflorus. Flores magni purpureo-croci. Swartz l. c.*

\* 12. **HIBISCUS Lampas.** †

H. foliis cordatis tricuspidatis crenatis, subtus punctatis, calyce exteriori brevissimo. W.

H. foliis subcordatis latis acuminatis trilobis desuper punctatis, calycum exteriori minimo setaceo, interiori laciniis angustissimis longissimis terminato. *Cavan.*

*diff. 3. p. 154. t. 56. f. 2.\**

Philippinischer Hibiscus. W.

*Habitat in Philippinis.* †

*Folia subtus punctata. Puncta e pilis stellatis sunt composita. Calyx exterior e quinque seu pluribus brevissimis setaceis foliolis, interior campanulatus dentibus 5-lineari-subulatis longissimis. Stigma clavatum quinquesulcatum. Fructus ignotus. W.*

\* 13. **HIBISCUS membranaceus.**

H. foliis ovato-lanceolatis cordatis dentatis, floribus solitariis axillaribus, calycis interioris laciniis ellipticis foliaceis trinerviis. W.

H. foliis cordatis oblongo-acuminatis obsolete denticulatis, calycum interno tubuloso magno, membranis quinque instructo. *Cavan. diff. 3. p. 159. t. 57. f. 2.\**

Häutiger Hibiscus. W.

*Habitat - - - - †*

*Folia basi subangulata. Flores magnitudine H. syriaci. Calyx exterior decaphyllus, foliolis subulatis calyce interiori quadruplo brevioribus; interior quinquefidus, laciniis magnis ellipticis acuminatis trinerviis; qua nota facile a congeneribus distinguendus. W.*

\* 14. **HIBISCUS lunarifolius.** W.

H. foliis subrotundo-cordatis acuminatis argute dentatis subtus hirtis, calyce exteriori interioris longitudine. W.

Mondviolenblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India orientali. (v. l.)*

Caulis, ut videtur herbaceus, tripedalis teres, pilis splendidis adpressis, in apice frequentissimis tectus. Folia fere Lunariae annuae at duplo et ultra minora levissime cordata acuminata argute dentata superne parce pilis tecta, inferne dense pilis fragilibus splendidis obsita. Pedunculi uniflori incrassati villosi-hirti calyce brevioribus in foliorum superiorum axillis et in apice aphylla caulis racemum formantes. Calyx exterior decaphyllus, foliolis lineari-subulatis longitudine calycis interioris. Corolla magnitudine et colore ut in *H. Manihot.* W.

15. *HIBISCUS Rosa sinensis.*

H. foliis ovatis acuminatis dentatis glabris basi integerrimis, caule arboreo, calyce exteriori suboctophyllo. W.

H. foliis ovatis acuminatis ferratis glabris, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 260. \* *Cavan. diff.* 3. p. 158. t. 69. f. 2. \*

*Alcea javanica* arborescens, flore pleno rubicundo. *Breyn. cent.* 121. t. 56.

Flos festalis. *Rumph. amb.* 4. p. 24. t. 8.

Scheru pariti. *Rheed. mal.* 2. p. 25. t. 16.

*Ketmia sinensis*, fructu subrotundo, flore pleno. *Tournef. infl.* 100. *Burm. zeyl.* 133.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 150.

Rosenartiger Hibiscus. W.

*Habitat in India.* † (v. v.)

Variat flore pleno.

Calyx exterior pentā-vel octophyllus. W.

\* 16. *HIBISCUS spiralis.*

H. foliis ovatis acutis dentatis glabris basi integerrimis, caule fruticoso, calyce exteriori subenneaphyllo, corolla tubuloso-spirali. W.

H. caule fruticoso, foliis ovatis acutis ferratis, corollis convolutis. *Cavan. ic.* 2. p. 47. t. 162. \*

Spiralblütiger Hibiscus. W.

*Habitat in Mexico.* †

Corolla ex luteo et incarnato variegata forma *Achaniae Malvavisci.* W.

17. *HIBISCUS brasiliensis.*

H. foliis cordatis denticulatis, calycibus exterioribus duplo longioribus, caule fruticoso: ramis hirtis. *Sp. pl.* 977.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 153.*

Brafilischer Hibiscus. W.

*Habitat in Brasilia. ‡*

Frutex parvus, caule, ramis, petiolis, pedunculis, calycibus hirtis. Folia cordata serrato-dentata. Stipulae subulatae. Pedunculi uniflori, foliis longiores. Calyx exterior 8-phyllus, linearis, patens. Interior dimidio brevior. Capsula 5-cocca, non longior calyce interiore. Facies *H. mutabilis.*

\*18. HIBISCUS *unilateralis*, †

H. foliis ovatis acuminatis dentatis, calyce exteriori longitudine interioris enneaphyllo, staminibus unilateralibus. W.

H. caule fruticoso, foliis ovato-acutis mollibus, tubo staminifero altera parte longitudinaliter nudo. *Cavan. diff. 3. p. 158. t. 67. f. F. e.\**

*Ketmia frutescens mori folio flore purpureo. Plum. spec. 1. ic. 160. f. 1.*

Einseitiger Hibiscus. W.

*Habitat in aridis sylvis St. Dominicae. ‡*

\*19. HIBISCUS *acuminatus*,

H. foliis cordatis acuminatis, inferioribus tricuspидatis, calycibus exterioribus subenneaphyllis, capsula depresso pentagona tomentosa. W.

H. caule tomentoso, foliis cordatis subrotundo-acuminatis, fructu pentagono tomentoso depresso. *Cavan. diff. 3. p. 144. t. 50. f. 2.\* (excluso synonymo Plukenetii quod ad zidae speciem spectat.)*

Zugespitzter Hibiscus. W.

*Habitat - - - ‡*

Calyx exterior hepta-vel enneaphyllus, foliolis linearibus interiore calyce parum brevioribus. Corolla *H. phoeniceae*. Capsula parva pentagona depresso tomentosa. Semina nuda. W.

20. HIBISCUS *phoeniceus*.

H. foliis ovatis acuminatis serratis, inferioribus subcordatis tricuspидatis, pedunculis articulatis, seminibus lanatis. W.

H. foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis articulatis supra articulos incrassatis, lobis longioribus, calycibus nudis seminibus lanatis. *Lin. suppl. 310. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 4.*

- H. caule fruticoso hirsuto, foliis serratis acuminatis, saepe subtrilobatis, floribus rubris, seminibus lanatis. *Cavan. diff. 3. p. 157. t. 67. f. 2.\**
- β. H. (*hirtus*) foliis lanceolato-ovatis acuminatis serratis ramis scabris, caule herbaceo. *Sp. pl. 977.*
- H. caule herbaceo scabro, foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis, calycem exteriori longiore polyphyllo- floribus solitariis rubris. *Cavan. diff. 3. p. 156. t. 67. f. 3.\**
- Alcea fruticosa malabariensis, angustis foliis rigidiusculis, floribus amoene rubellis, semine papposo. *Pluk. alm. 14. t. 254. f. 3.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 154.*
- Schönrother Hibiscus. W.
- Habitat in India orientali. † (v. v.)*
- Planta parva. Caulis et praesertim Pedunculi, nec non Folia et Calyces subtus pilis rigidiusculis hirta. Folia lato-lanceolata, argute serrata. Corolla purpurea. Capsulae subrotundae. Semina lanata. *Sp. pl.*
- Frutex pulcherrimus, qui per totam aestatem in caldariis ruberrimis floribus ornatus est, ut cum pluribus inodoris Coronariis certet. Hibiscus hirtus hujus solummodo varietas, quae forte a sola cultura dependet. *Suppl.*
- Inter H. phoeniceum et hirtum nullam video differentiam, praeter calycem exterioriorem, qui longior in H. hirta. W.*

## \*21. HIBISCUS ovalifolius.

- H. foliis ovalibus subangulatisque, calycibus exterioribus pentaphyllis. *Vahl. symb. 1. p. 50.*
- Urena (ovalifolia)* foliis cordato-ovalibus serratis hispidis. *Forsk. descr. 124.\**
- Ovalblättriger Hibiscus. W.
- Habitat locis montosis circa Taaes in Arabia felici. †*
- Pili stellati tuberculis minutis insidentes, superne ad apices ramorum confertiores, inferne sparsi. Folia subtus magis pilosa utrinque acuta, suprema subangulata. Stipulae setaceae. Calyx exterior pentaphyllus, foliolis lanceolatis nervosis, seta foliolo breviori terminatis. Interior laciniis ovato acuminatis. Flores magnitudine et facie *H. vitifolii*. Capsula quinquevalvis quinquelocularis, loculis polyspermis. Semina reniformia villosa. *Vahl. l. c.*

\*22. HIBISCUS *clandestinus*.

H. foliis oblongis subcordatis dentatis scabriusculis, inferioribus obsolete trilobis, pedunculis foliorum longitudine, calyce exteriori hexaphyllo, petalis calyci inclusis. W.

H. caule virgato hirto fruticoso, foliis ovatis acutis subtrilobis, floribus minutis clausis. *Cavan. ic. I. p. I. t. 2.\**

Heimlicher Hibiscus. W.

*Habitat in Senegal. ‡*

Pedunculi longissimi geniculati. Corolla vix calyce longior albicans villosa, emarcida vero violacea. W.

23. HIBISCUS *rigidus*.

H. foliis oblongis dentatis scabris, pedunculis foliis longioribus, calyce exteriori heptaphyllo, corollis reflexis, feminibus lanatis. W.

H. suffruticosus hirsutus, ramis simplicibus, foliis oblongis serratis, limbo corollae reflexo, feminibus lanatis. *Lin. suppl. 310.*

Steifästiger Hibiscus. W.

*Habitat in graminosis Zeylonae. König. ‡ (v. f.)*

Ramuli longi filiformes simplicissimi rigidi. Folia oblongo-serrata petiolata parva. Stipulae erectae setaceae rigidae. Pedunculi axillares uniflori. Limbus corollae eximie reflexus. Semina lana involuta.

Rami rectanguli simplices rigidi scabri ut folia, sed non hirsuti. W.

24. HIBISCUS *micranthus*.

H. foliis subrotundis integris serratis, corollis reflexis obliquis. *Lin. suppl. 308. Cavan. diff. 3. p. 155. t. 66. f. I.*

Kleinblumiger Hibiscus. W.

*Habitat in India orientali. König. ☉ (v. f.)*

Caulis teres erectus simplex pedalis. Folia alterna petiolata, angulis nullis, magnitudine oboli. Flores in summitate minuti. Semina lanuginosa.

*Figura Clariff. Cavanilles ad praecedentem 'pertinere videtur. W.*

\*25. HIBISCUS *gossypinus*. †

H. foliis ovatis hispida serratis, feminibus lana involutis. *Thunb. prod. 118.*

Baumwollenariger Hibiscus. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

\*26. HIBISCUS *ovatus*.

H. foliis ovatis integerrimis ciliatis trinerviis subtus villosis, floribus axillaribus solitariis, pedunculis folio brevioribus. *Cavan. diff. 3. p. 143. t. 50. f. 3.\**

Eyförmiger Hibiscus. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

27. HIBISCUS *aethiopicus*.

H. foliis cuneiformibus subquinqüedentatis stellato-pilosis, pedunculis folio longioribus. *Thunb. prod. 118.*

H. foliis subcuneatis subtridentatis summis oppositis. floribus terminalibus. *Mant. 258.*

H. caule fruticoso minimo, foliis ovatis retusis apice dentatis, floribus axillaribus et terminalibus. *Cavan. diff. 3. p. 155. t. 61. f. 1.\**

Alcea vesicariae similis aethiopica moschum redolens, summo tantum folio circa margines crenato. *Pluk. alm. 13. t. 254. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 169.*

Capischer Hibiscus. W.

*Habitat ad Cap. b. spei. †*

Fruticulus parvus. Folia alterna, sed summa opposita brevissime petiolata oblonga obtusa subcuneata, extremo tri-dentata (rarius quinqüedentata), laevia rarissimis pilis subtus hispida. Stipulae acerosae vix petiolis longiores. Flores terminales pedunculati solitarii, pedunculo foliis brevior. Calyx exterior 8-10-phyllus, lineari-lanceolatus hispidus. Petala obovata magnitudine Fragariae, staminibus longiora.

\*28. HIBISCUS *microphyllus*.

H. foliis ovalibus hirtis antice ferratis, caule fruticoso. *Vahl. symb. 1. p. 50.*

H. (*flavus*) floribus decandris, foliis petiolatis ovalibus ferratis obtusis scabris. *Forsk. descr. 126.\**

Fileinblättriger Hibiscus. W.

*Habitat Lohojae in Arabia felici. †*

Frutex ramis junioribus, foliis calycibusque hirtis, pilis stellatis. Folia petiolata ovalia subrotunda semi-unguicularia, a medio marginis ferrata, avenia subquinqüenervia, subtus magis hirta. Petioli foliis longiores. Stipulae minutae setaceae. Pedunculi axillares solitarii longitudine foliorum, versus apicem geniculati crassiores. Calyx exterior 10-phyllus, foliolis



*setaceis: interior pentaphyllus, foliolis lanceolatis exteriori brevior.* Vahl. l. c.

\*29. **HIBISCUS** *urens*.

H. tomentosus, foliis reniformibus crenatis, calycibus lanatis. *Lin. suppl.* 309. *Cavan. diff.* 3. p. 161. t. 67. f. 1.

H. foliis cordatis lobatis dentatis tomentosus, caule decumbente. *Thunb. prod.* 118.

Brennender Hibiscus.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

*Magnitudo et facies Althaeae roseae.* Herba tomentosa, leviter urens. Caulis herbaceus. Folia reniformia rotundata vix lobata inaequaliter crenata, subtus magis tomentosa pallidiora palmaria. Pedunculi saepius folio longiores. Flores axillares bini ternive subsessiles glomerati. Calyces lanati, exterior paulo brevior; foliolis decem linearibus villosis; interior paulo longior angulatus crassus utrinque villosus. Corolla ratione calycis minor purpurea. Stamina angusta. Antherae luteae.

\*30. **HIBISCUS** *calycinus*. W.

H. foliis cordatis angulatis subtrilobis repandis, calyce exteriori pentaphyllo longiore, petalis inclusis. W.

H. (*calyphyllus*) foliis cordatis crenatis latis subtrilobis, calycum exteriori folioso maximo. *Cavan. diff.* 5. p. 283. t. 140.\*

Grofskelchiger Hibiscus. W.

*Habitat in insula Borbonia.* †

Folia ampla cordata obtusa quinquangularia obsolete triloba repanda. Flores axillares solitarii in pedunculis brevibus. Calyx exterior pentaphyllus, foliolis oblongo-lanceolatis basi angustatis, apice acuminatis nervosis, interiore multo longior. Corolla parva calyce interiore minor. W.

31. **HIBISCUS** *mutabilis*.

H. foliis cordatis angulatis quinquelobis acuminatis dentatis, calyce exteriori octophyllo, capsula villosa, caule arboreo. W.

H. foliis cordato-quinquangularibus obsolete ferratis, caule arboreo. *Hort. upf.* 205. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 358. *Brown, jam.* 286. n. 7.

H. caule arboreo, foliis cordatis quinqueangulatis, acuminatis. *Linnaei Spec. Plant. T. III.* Fff

- minibus productis acutis, fructu obovato rugoso. *Cdv. diff. 3. p. 165. t. 62. f. 1.\**
- H. sinensis. *Mill. dict. n. 2.*
- Althaea arborea Rofa sinensis. *Morif. hist. 2. p. 530. f. 5. t. 18. f. 2.*
- Rofa sinensis. *Ferr. flor. 493. f. 497. Mer. sur. 31. t. 31.*
- Flos horarius. *Rumph. amb. 4. p. 27. t. 9.*
- Hina-pariti. *Rheed. mal. 6. p. 66. t. 38. 39. 40. 41. Burm. ind. 151.*
- Huttuyun Lin. Pfl. Syst. 4. p. 154.*
- Veränderlicher Hibiscus. W.
- Habitat in India. † (v. l.)*
- Flores magni in pedunculis solitariis ad apices ramorum ex omnibus axillis formant corymbum. Calyx exterior octophyllus interiore dimidio brevior, foliis linearibus. Corolla matutino tempore alba, meridie pallido-incarnata, vespere rosea, atque cum sole occidit. W.

### 32. HIBISCUS syriacus.

- H. foliis cuneiformi-ovatis trilobis dentatis. calyce exteriori suboctophyllo interioris longitudine, caule arboreo. W.
- H. foliis cuneiformi-ovatis: superne inciso-dentatis, caule arboreo. *Hort. cliff. 350. Hort. upf. 205. Spec. pl. 2. p. 978. Mill. dict. n. 1. Du Roi. herb. 1. p. 304. Medic. in obs. soc. oecon. Lutr. 1774. p. 212. Kniph. cent. 2. n. 32. Knorr. del. 1. t. K. 2. a et tab. K. 2. b. Willd. arb. 141.*
- H. caule fruticoso, foliis cuneiformi-ovatis trilobatis inaequaliter dentatis glabris subcoriaceis, seminibus zona hispida. *Cavan diff. 3. p. 169. t. 69. f. 1.\**
- Ketmia syriaca. *Scop. carn. n. 863.*
- Alcea arborefcens syriaca. *Bauh. pin. 316.*
- Alcea arborefcens. *Cam. hort. t. 3. 4.*
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 157.*
- Syrifcher Hibiscus. W.
- Habitat in Syria, Carniolia † (v. v.)*
- Calyx exterior 6-7-8-fidus. W.

### \*33. HIBISCUS rhombifolius.

- H. foliis rhombeo-ovatis indivisis apice crenatis acuminatis, calyce exteriori heptaphyllo interioris longitudine, caule fruticoso. W.

H. caule fruticoso glabro, foliis rhomboideis, lateribus superioribus crenatis. *Cavan. diff. 3. p. 156. t. 69. f. 3.*\*

Rautenblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India orientali.* †

*Affinis praecedentis a quo tantum diversus, foliis exacte rhombeis nec trilobis.* W.

\*34. HIBISCUS *liliflorus*.

H. foliis obovatis integerrimis nervosis obtusiusculis vel levissime trilobis, calyce exteriori pentaphyllo brevissimo, caule arboreo. W.

H. caule arboreo, foliis lanceolato-ovatis oblongis trinerviis, nonnullis tripartitis, corolla liliacea magna speciosa, tubo longissimo. *Cavan. diff. 3. p. 154. t. 57. f. 1.*\*

Lilienblütiger Hibiscus. W.

*Habitat in montibus sylvaticis insulae Borboniae.* †  
(v. l.)

*Folia lanceolato-obovata basi valde attenuata integerrima tri-vel quinquenervia, nervis venosis, apice obtusa vel obtuse acuminata, vel brevissime inaequaliter bi- seu triloba.* W.

\*35. HIBISCUS *bifurcatus*.

H. foliis dentatis, inferioribus trilobis, superioribus lanceolatis auriculato hastatis, calycis exterioris endecaphylli foliolis apice bifidis, caule pedunculisque aculeatis. W.

H. caule fruticoso, foliis serratis, inferioribus trilobatis, mediis hastatis, superioribus lanceolatis, calycis exterioris foliolis bifurcatis. *Cavan. diff. 3. p. 146. t. 51. f. 1.*\*

Gabelkelchiger Hibiscus.

*Habitat in Brasilia.* †

*Caulis aculeatus. Folia inferiora cordata triloba, lobis ovatis acutis; superiora lanceolata acuta basi auriculato-hastata; summa lanceolata absque auriculis. Petioli etiam subaculeati. Calycis exterioris foliola undecim linearia apice parum dilatata bifida, longitudine fere calycis interioris. Corolla magna ut in H. Manihot, sed purpurascens.* W.

\*36. HIBISCUS *trilobus*. †

H. foliis cordatis trilobis dentatis, lobo intermedio lon-

giore, calyce exteriori dodecaphyllo, caule aculeato arboreo, pedunculis inermibus. W.

H. caule arboreo, foliis trilobis ferratis, floribus solitariis, pedunculis inermibus. *Cavan. diff. 3. p. 147. t. 53. f. 2. \** (excluso synonymo *Rheedii*.)

*Ketmia aculeato flore amplissimo coccineo. Plum. sp. 2. ic. t. 159.*

*Dreylappiger Hibiscus. W.*

*Habitat in paludosis insulae St. Dominicae. †*

*Caulis et Petioli aculeati. Pedunculi vero inermes. Calyx exterior dodecaphyllus foliolis lineari-filiformibus interiore calyce brevioribus. Corolla magnitudine H. syriaci. W.*

\*37. *HIBISCUS diversifolius.*

H. foliis quinque-trilobisve obtusis dentatis, superioribus oblongo-lanceolatis indivisis, pedunculis inermibus, caule petiolisque aculeatis. W.

H. (*diversifolius*) caule arboreo ramis petiolisque aculeatis, foliis ferratis, inferioribus quinquelobis, sublesquitrilobis, summis oblongis integrisque. *Jacq. ic. rar. 3. t. 551. Collect. 2. p. 307. \**

H. (*ficulneus*) caule fruticoso verrucoso ramosissimo, foliis quinquefido-palmatis, summis oblongis ovato-lanceolatis, floribus subspicatis terminalibus. *Cavan. diff. 3. p. 148. t. 51. f. 2. \**

*Verchiedenblättriger Hibiscus. W.*

*Habitat in India orientali. †*

*Calyx exterior emneaphyllus. Corolla flava fundo atroviolaceo. Pedunculi brevissimi inermes. Observatio in Systemate vegetabilium sub H. ficulneo data nempe: Aculei insident verrucis rubris saepe reflexis, quod non in H. Sabdariffa, huc spectat. W.*

\*38. *HIBISCUS domingensis.*

H. foliis quinque-trilobisve dentatis, petiolis hirtis subaculeatis, pedunculis inermibus hirtis, caule arboreo aculeato, calyce exteriori subdodecaphyllo, interiore elevato-fulcato. W.

H. (*domingensis*) caule arboreo, seniore inermi, juniore armato aculeis tectis, foliis subquinelobis, lobis subovatis ferratis acutis. *Jacq. ic. rar. 3. t. 550. Collect. 3. p. 213. \**

H. (*striatus*) caule fulcato, foliis hastatis glabris ferra-

tis, calyce interiori striato inflato inermi. *Cavan. diff.*

3. p. 146. t. 54. f. 1?

Domingifcher Hibiscus. W.

*Habitat in insula Domingo. †*

Calyx exterior foliolis 13-linearibus subulatis duplo interiore brevior; interior fulcis elevatis striatus. Corolla magna albido-violacea, fundo atrosanguineo. *H. striatus Clariss. Cavanilles est forte hujus varietas. H. trilobus etiam parum differre videtur. W.*

### 39. HIBISCUS *ficulneus*.

H. foliis quinquelobo-palmatis summis trilobis, lobis obtusis inaequaliter dentatis basi angustatis, calyce exteriori pentaphyllo caduco, interiore longitudinaliter rupto, caule aculeato. W.

H. foliis quinquefido-palmatis, caule aculeato, floribus pedunculatis. *Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 359. Fl. zeyl. 263.\* Mill. dict. n. II. Forstkaehl. aegypt. cent. 4. p. 125.*

H. (*sinuatus*) foliis cordatis dentatis quinquelobatis, calycibus deciduis, interioribus latere rumpendis, caule aculeato. *Cavan. diff. 3. p. 147. t. 52. f. 2.\**

*Ketmia zeylanica*, fici folio, perianthio oblongo integro.

*Dill. elth. 190. t. 157. f. 190. Burm. zeyl. 137.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 158.*

Feigenartiger Hibiscus. W.

*Habitat in Zeylona. † (v. v.)*

### 40. HIBISCUS *Sabdariffa*.

H. foliis dentatis, inferioribus ovatis indivisis, superioribus trilobis basi cuneatis, calyce exteriori subduodecimdentato, caule inermi, floribus subsessilibus. W.

H. foliis serratis: inferioribus ovatis indivisis, superioribus tripartitis, caule inermi, floribus sessilibus. *Sp. pl. 978. Jacq. obs. 2. p. 10. Mill. dict. n. 9. Swartz. obs. 269.\**

H. caule herbaceo glaberrimo rubescente, foliis serratis, inferioribus ovatis, superioribus tripartitis, floribus solitariis axillaribus sessilibus. *Cavan. diff. 3. p. 170. et diff. 6. p. 351. t. 198. f. 1.\**

H. inermis, foliis serratis: inferioribus ovatis integris: superioribus trilobis. *Hort. cliff. 350. Fl. zeyl. 262. Roy. lugdb. 359.*

*H. rufescens acetosus*, foliis trilobis. *Brown. jam.* 383.  
*Althaea indica*, gossypii folio, acetosae sapore. *Raj. hist.* 1900.

*Alcea acetosa indica mitis*, foliis superioribus gossypii in modum tripartito-divisis. *Pluk. alm.* 15. t. 6. f. 2.

β. *Hibiscus inermis*, foliis ferratis: infimis indivisis: mediis tripartitis; summis quinquepartitis. *Roy. lugdb.* 359.

*Alcea indica*, magno flore. *Bauh. pin.* 317.

*Alcea americana.* *Clus. hist.* 2. p. 26.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 159.

Dreytheiliger Hibiscus. W.

*Habitat in Indiis.* ☉

Caulis inermis linea a petiolis utrinque decurrente.  
 Petioli subtus aculeis retrospectantibus.

#### \*41. HIBISCUS *speciosus*.

*H. foliis quinquepartitis palmatis glabris*, laciniis lanceolatis acuminatis apice remote ferratis, calycibus exterioribus decaphyllis, caule pedunculisque laevibus. W.

*H. foliis palmatis glabris*, laciniis lanceolatis ferratis, caule pedunculis calycibusque laevibus. *Ait. Kew.* 2. p. 456. *Curt. mag.* 360. *Wendl. hort. herrenhus.* p. 15. t. II. \*

*H. (coccineus)* foliis digitato-palmatis quinquepartitis acuminatis, caule ramoso, floribus patulis coccineis. *Walt. carol.* 177.

Anfehnlicher Hibiscus. W.

*Habitat in Carolina australi.* 2 (v. v.)

Corolla ampla coccinea patentissima. W.

#### 42. HIBISCUS *cannabinus*.

*H. foliis ferratis: superioribus palmatis quinquepartitis subtus uniglandulosis*, caule aculeato, floribus sessilibus. *Sp. pl.* 979.

*H. caule herbaceo glabro*, foliis superioribus palmatis quinquepartitis ferratis uniglandulosis, floribus sessilibus, calycibus glandulosis. *Cavan. diff.* 3. p. 148. t. 52. f. 1. \*

*H. vitifolius.* *Mill. dict. n.* 18. R.

*Alcea benghalensis spinosissima*, acetosae sapore, flore luteo pallido: umbone purpurascente. *Comm. hort.* 1. p. 35. t. 18.

*Ketmia indica*, foliis digitatis, flore magno sulphureo: umbone atro-purpureo, petiolis spinosis. *Ehret. t.*

6. f. 1.

*Ketmia indica*, Vitis folio, magno flore. *Tournef. infl.* 100. R.

*Ketmia indica*, cannabinis foliis, Banguè dicta. *Burm. zeyl.* 134. ind. 152. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 161.

Hanfartiger Hibiscus. W.

*Habitat in India.* ☉ (v. v.)

Caulis quinquepedalis, adpersus aculeis sursum erectis; Ramis paucis, simplicibus. Petioli patentes, longitudine foliorum, adpersi subtus aculeis rectis. Folia inferiora indivisa ovata; media globa; superiora 5-partito-digitata, inermia nervo medio subtus basi glanduloso. Calyx Exterior subulatus, erectus, aculeatus; interior hispidus glandula in singulo foliolo. Fructus subrotundus, pilosus, calyce tectus.

Convenit cum *H. Sabdariffa*: Structura, facie, serraturis, glandula sub foliis.

#### 43. HIBISCUS fraternus. †

*H. calycibus exterioribus radiis teretibus apice mucronato-concavo, foliis trilobis.* *Lin. suppl.* 311.

Anonyma. *Marian. surin. t.* 37.

Brüderlicher Hibiscus. W.

*Habitat in Surinamo.* C. G. Dalberg.

Caulis herbaceus laevis ut tota planta. Folia petiolata profunde trifida, laciniis serratis lanceolatis media majore, nervo subtus poro glanduloso. Calyx interior quinquepartitus angulatus duplo longior, laciniis ovato-oblongis erectis marginatis rigidis. Corolla lutea. Capsula subglobosa pubescens quinquelocularis quinquevalvis brevis.

*Idem ac H. Sabdariffa esse videtur.* Swartz obs. 271.

#### \*44. HIBISCUS sororius.

*H. calycibus exterioribus teretibus apice dilatatis, foliis cordatis crenatis scabris.* *Lin. suppl.* 311.

Verchwisterter Hibiscus. W.

*Habitat in Surinamo.* C. G. Dalberg.

Caulis herbaceus s. suffruticosus teres totus pilosus suffultus arboribus. Folia alterna petiolata cordata absque angulis crenata scabra remota. Stipulae subu-

*latae minutae. Pedunculi axillares longitudine foliorum solitarii pubescentes uniflori. Calyx hirsutus, exterior radiis decem teretiussculis patentibus distantibus, calyce interiore brevioribus, apice dilatatis in folium cordatum obtusum cucullatum; interior campanulatus major angulatus quinquesfidus, laciniis ovatis. Corolla, Stamina, Pistilla ut in H. Manihot. Capsula glabra pilosa calyce brevior. Semina glabra.*

#### 45. HIBISCUS *surattensis*.

H. recurvato-aculeatus, foliis quinquelobis, calycibus exterioribus appendiculatis, stipulis semicordatis, floribus pedunculatis. *Sp. pl.* 979. *Burm. ind.* 152.

H. aculeis recurvis, foliis digitatis, calycibus appendiculatis. *Cavan. diff.* 3. p. 149. t. 33. f. 1.\*

Herba crinium. *Rumph. amb.* 4. p. 46. t. 16.

β. Hibiscus foliis palmato-digitatis quinquepartitis: laciniis lanceolatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 264.

Narinam-pouilli. *Rheed. mal.* 6. p. 75. t. 44.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 162.

Surattischer Hibiscus, W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. f.)

*Caulis teres, erectus, rigidus, 2-pedalis, superne purpurascenti-maculatus. Petioli horizontales, teretes, longitudine foliorum, uti Caulis adsperfi pilis et subtus aculeis recurvis copiosis. Folia patentia, palmata, semi 5-fida: laciniis lanceolatis, serratis, adsperfa setulis e puncto, subtus in costis aculeolis recurvis. Stipulae reniformes, amplexicaules, laeves, ciliatae, magnitudine extimi pollicis. Pedunculi aculeati, apice hirti. Corolla lutea, basi atropurpurea. Calyx quasi radiatus.*

#### \*46. HIBISCUS *radiatus*.

H. foliis serratis septem- seu quinquepartitis palmatis, laciniis lanceolatis acuminatis, caule petiolis pedunculis calycibusque aculeatis, calycibus exterioribus decaphyllis aristato-ciliatis. W.

H. caule frutescente viridi aculeato, foliis palmatis digitationibus lanceolatis dentatis, floribus breviter pedunculatis. *Cavan. diff.* 3. p. 150. t. 54. f. 2.\*

Gestrahler Hibiscus. W.

*Habitat* - - - ☉ (v. v.)



47. HIBISCUS *Manihot*.

H. foliis palmato-digitatis septempartitis, caule petiolisque inermibus. *Hort. cliff.* 350. *Hort. upf.* 206. *Roy. lugdb.* 358. *Mill. dict. n.* 4. *Sabb. hort.* 1. t. 56. *Kniph. cent.* 9. n. 47. *Burm. Fl. ind. p.* 152. *Cavan. diff.* 3. p. 172. t. 63. f. 2.\*

*Ketmia folio manihot ferrato, flore amplo sulphureo.* *Dill. elth.* 189. t. 156. f. 189.

*Alcea sinica, manihot stellato folio, capsula longa pilosa pyramidata quinquefariam divisa.* *Pluk. amalth.* 7. t. 355. f. 2.

β. H. (*palmatus*) radice crassa alba fungosa, foliis cordatis palmato-lobatis, pedunculis nutantibus. *Cavan. diff.* 3. p. 168. t. 63. f. 1.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 162.

Schwefelfarbener Hibiscus. W.

*Habitat in Indiis.* † (v. v.)

\*48. HIBISCUS *digitatus*.

H. foliis quinquelobo-palmatis plicatis, lobis oblongis acutis ferratis, calyce exteriori septempartito, caule petiolisque aculeatis. W.

H. foliis digitatis, laciniis quinque inaequalibus lanceolatis ferratis, calycibus monophyllis inermibus, floribus solitariis subsessilibus. *Cavan. diff.* 3. p. 151. t. 70. f. 2.\*

Gefingertes Hibiscus. W.

*Habitat in Brasilia.* †

\*49. HIBISCUS *flavescens*.

H. foliis quinquelobo-palmatis inaequaliter dentatis hirsutis, caule petiolisque inermibus. W.

H. caule hirsuto pilis aureis, foliis palmato-quinquelobatis hirsutis, floribus numerosis terminalibus. *Cav. diff.* 3. p. 164. t. 70. f. 3.\*

Gelblicher Hibiscus. W.

*Habitat in Pondicheri.*

\*50. HIBISCUS *spicatus*. †

H. foliis quinquelobis obtusis dentatis tomentosis, floribus sessilibus terminalibus spicatis. W.

H. caule hirsuto, foliis cordatis 5-7-lobatis valde tomen-

tosus, floribus spicatis subsessilibus, stipulis utrinque  
sex. *Cavan. diff. 3. p. 163. t. 59. f. 1.\**

Aehrenblütiger Hibiscus. W.

*Habitat* - - - - †

\* 51. HIBISCUS *micans*.

H. foliis cordatis quinquangularibus dentatis acuminatis, calyce exteriori sexpartito, caule inermi. W.

H. foliis cordatis latis quinquangulatis tomento lucidis, calycum exteriori monophyllo magno, sexpartito, corolla extus tomentosa nervosa. *Cavan. diff. 3. p. 167. t. 60. f. 2.\**

Glänzender Hibiscus. W.

*Habitat in Java.* †

52. HIBISCUS *Abelmoschus*.

H. foliis subpeltato-cordatis septemangularibus acuminatis serratis, calyce exteriori suboctophyllo, caule hispido. W.

H. foliis subpeltato-cordatis septemangularibus serratis, caule hispido. *Hort. cliff. 349. Hort upf. 206. Fl. zeyl. 261.\* Mat. med. 167. Roy. lugdb. 358. Mill. dict. n. 3. Burm. ind. 153. Cavan. diff. 3. p. 167. t. 62.*

Alcea hirsuta, flore flavo, semine moschato. *Marcgr. bras. 45. t. 45. Brown. jam. 285. n. 4.*

Alcea aegyptiaca villosa. *Bauh. pin. 317.*

Flos moschatus. *Mer. surin. 42. t. 42.*

Granum moschatum. *Rumph. amb. 4. p. 38. t. 15.*

Cattu-gasturi. *Rheed. mal. 2. p. 71. t. 38.*

Nietmia aegyptiaca, semine moschato. *Tournef. inst. p. 100. Burm. zeyl. 134. R.*

Mosch s. Bammia moschata. *Alp. exot. 197. R.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 163.*

Bisam-Hibiscus. W.

*Habitat in Indiis.* † (v. v.)

\* 53. HIBISCUS *columnaris*.

H. foliis cordatis quinquangularibus obtusifusculis repandis, calyce exteriori subsexfido, columna staminifera corolla campanulata longiore. W.

H. foliis cordatis rotundato-angulatis subtomentosis, calycibus monophyllis, tubo columnari longissimo. *Cav. diff. 3. p. 166. t. 59. f. 2.\**

Langsäuliger Hibiscus. W.

*Habitat in insula Borbonia.* †

54. HIBISCUS *pedunculatus*.

H. foliis quinque - trilobisve obtusis crenatis hirsutis, pedunculis axillaribus foliis duplo longioribus, corolla campanulata. W.

H. hirsutus, foliis quinquelobis dentatis, pedunculis axillaribus unifloris elongatis. *Lin. suppl.* 309.

H. caule frutescente, foliis quinquelobis trilobisque hirsutis, pedunculis axillaribus unifloris elongatis. *Cav. diff.* 3. p. 163. t. 66. f. 2 \*

H. foliis trilobis obtusis dentatis villosis, pedunculis axillaribus longissimis. *Thunb. prod.* 118.

Langstieliger Hibiscus. W.

*Habitat ad Cap. b. spei in sylva Galgebosch. †*

55. HIBISCUS *esculentus*.

H. foliis cordatis quinquelobis obtusiusculis dentatis, petiolis flore longioribus, calycibus exterioribus subdecaphyllis deciduis, interioribus longitudinaliter rumpentibus. W.

H. foliis quinquepartito - pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus. *Sp. pl.* 980. *Jacq. obs.* 2. p. 11. *Burm. ind.* 153.

H. caule herbaceo crasso, foliis quinquelobatis crenatis subpedatis, calycibus utrisque deciduis, fructu corniculato, stigmatibus quinque ad decem. *Cavan. diff.* 3. p. 168. t. 61. f. 2. \* *et diff.* 6. p. 351. \*

H. ficifolius. *Mill. dict. n.* 15. R.

*Alcea americana* annua, flore albo (flavo potius) maximo fructu pyramidalis sulcato. *Comm. hort.* 1. p. 37. t. 19. *Raj. suppl.* 518.

*Alcea maxima*, malvae roseae folio, fructu decagono recto crassiore brevioris esculento. *Sloan. jam.* 98. *hist.* 1. p. 223. t. 133. f. 3. *Brown. jam.* 284. n. 3.

Okra. *Kalm. it.* 2. p. 209.

Quingambo. *Marcgr. bras.* 31.

*Houttuyi* *Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 164.

Efsbarer Hibiscus. W.

*Habitat in Indiis.* ☉ (v. f.)

Calyx exterior 12-partitus cadit cum corolla, remanente basi: Interior 5-dentatus, latere rumpendus, a Corolla expicanda.

\* 56. HIBISCUS *longifolius*. W.

H. foliis quinque - vel tripartito - palmatis, lobis lanceo-

latis inciso-dentatis, petiolis flore longioribus, calycibus exterioribus subdecaphyllis deciduis, interioribus longitudinaliter rumpentibus. W.

Langblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. l.)

Caulis herbaceus erectus. Folia ad basin usque tri-vel quinquepartita, laciniis tri-vel quadriuncialibus. semi-unciam vel quatuor lineas latis lanceolatis inciso-dentatis utrinque attenuatis. In foliis e tribus laciniis compositis, omnes fere aequales sunt excepta intermedia quae paullo longior; in foliis vero ex quinque laciniis compositis binae exteriores sunt minutissimae et leviter serratae. Petioli longissimi. Flores praecedentis sed majores. W.

### 57. HIBISCUS clypeatus.

H. foliis cordatis angulatis, capsulis turbinatis truncatis hispida. *Sp. pl.* 980. *Cavan. diff.* 3. p. 166. t. 58. f. 1.\* *Swartz. obs.* 270.\*

Ketmia amplissimo folio angulato, capsulis truncatis hispida. *Plum. spec.* 3. t. 160. f. 2.

Malva arborea, folio oblongo acuminato velutino dentato et leviter serrato, flore ex rubro flavescenti. *Sloan. jam. hist.* 1. t. 135. f. 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 166.

Schildförmiger Hibiscus. W.

*Habitat varius in fruticetis maritimis Jamaicae.* † (v. l.)

*Nomen vulgare huic est in Jamaica Congo Mahoe, quia ex Africa olim allatum dicunt Nigri.* Swartz l. c.

### \* 58. HIBISCUS senegalensis.

H. foliis cordatis dentatis tomentosis, inferioribus angulatis, calyce exteriori decaphyllo longiore. W.

H. foliis cordatis subangulatis tomentosis, calycum interiori breviori, exteriori cancellato. *Cavan. diff.* 3. p. 160. t. 68. f. 1.\*

Senegalscher Hibiscus. W.

*Habitat in Senegal.*

*Calyx exterior e decem subulatis foliolis interiori longioribus compositus. Corolla parva tubuloso-flavescentis.* W.

### \* 59. HIBISCUS tubulosus.

H. foliis crenatis inferioribus subrotundo-cordatis acumi-

natis, superioribus oblongo-cordatis tricuspидatis, floribus petiolo brevioribus, calyce exteriori octophyllo obtuso. W.

H. caule frutescente hirsuto, foliis cordatis angulatis crassis tomentosis, floribus solitariis, calycis exterioris apicibus spathulatis recurvis. *Cavan. diff.* 3. p. 161. t. 68. f. 2. \*

H. (*panduraeformis*) foliis cordato-lanceolatis denticulatis tomentosis, caule hirto. *Burm. ind.* 151. t. 47. f. 2?

Röhriger Hibiscus. W.

*Habitat in India orientali.* ☉ (v. f.)

Folia *superne hirta inferne tomentosa, inferiora subrotundo-cordata acuminata exacte Sidae, superiora oblonga cordata tricuspидata.* Flores axillares brevissime pedunculati. Calyx exterior octophyllus, foliolis linearibus apice obtusis et parum latioribus. Corolla flava. *Descriptio Burmanni convenit, sed icon differt in multis.* W.

\*60. HIBISCUS *obtusifolius*. W.

H. foliis subtus tomentosis crenatis cordatis, inferioribus subrotundis, superioribus acuminatis trilobis obtusis, floribus cernuis. W.

Stumpfblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India orientali.* (v. f.)

Caulis *leviter tomentosus canus. Simillimus H. vitifolia, sed folia majora subtus albo-tomentosa obtusiora, et flores quadruplo majores, calycibus tomentosis, exteriori breviori, nec longitudine interioris.* W.

61. HIBISCUS *vitifolius*.

H. foliis glabriusculis dentatis quinquangularibus acuminatis; floribus cernuis. W.

H. foliis quinquangularibus acutis ferratis, caule inermi, floribus cernuis. *Mant.* 569. *Fl. zeyl.* 265. \*

H. caule herbaceo, foliis quinquangulatis crenatis villosis, floribus solitariis cernuis, capsula pentaptera. *Cav. diff.* 3. p. 145. t. 58. f. 2. \*

*Althaea indica, vitis folio, flore amplo flavo pendente. Herm. lugdb.* 26. t. 28.

Katu-Beloeren. *Rheed. mal.* 6. p. 79. t. 46.

*Abutilon indicum, fronde pampinea, fructu quinquecapsulari. Tournef. inst.* 99. *Raj. hist.* 1880. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 166.*

Weinblättriger Hibiscus. W.

*Habitat in India* ☉ (v. v.)

*Caulis erectus, sesquipedalis, crassitie fere digiti, teres, viridis, subtomentosus, scaber mucronibus raris minutis. Folia (Malvae sylvestris) cordata, 5-angula, obtuse serrata, venosa, utrinque viridia, patentia. Petioli teretes, patentes, longitudine folii. Stipulae setaceae, breves, pilosae, patulae. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, aphylli, longitudine foliorum, ante anthesin cernui. Calyx exterior foliolis 8, subulatis, patentibus; interior 5-fidus. Corolla magna, flava fundo atropurpureo. Stamina et Pistillum purpurea. Stigmata 5, atropurpurea. Capsula 5-angularis, obtusa: angulis valde compressis, et apice et lateribus rotundatis.*

## 62. HIBISCUS *tricuspis*.

H. foliis incanis trilobis, lobis lanceolatis subdentatis, pedunculis axillaribus subbifloris, terminalibus subracemosis, calyce exteriori novemdentato. W.

H. caule arboreo, foliis trilobis, lobis acutis productis, floribus racemosis, stipulis magnis acutis. *Cav. diff. 3. p. 152. t. 55. f. 2. \**

H. (*hastatis*) incanus, foliis oblongis simplicibus basi trilobo, racemo terminali. *Lin. suppl. 310.*

H. (*hastatus*) foliis oblongis subhastato-trilobis integerrimis, pedunculis axillaribus terminalibusque subtrifidis, petalis laceris. *Forst. prod. n. 265.*

Dreyspitziger Hibiscus. W.

*Habitat in Societatis insulis.* †

*Totus tomento tenui canescens. Folia petiolata elongata lato-linearia, alia basi lobis appendiculata, alia exacte triloba, majora glabra. Stipulae oblongae integerrimae obtusae magnae caducae. Racemus terminalis elongatus pauciflorus. Bractee binae stipulaeformes obliquae ad exitum pedicellorum. Calyces simpliciter fissi absque spinis s. appendiculis. Capsula globosa laevis cana.*

## 63. HIBISCUS *virginicus*.

H. foliis acuminatis inaequaliter dentatis, inferioribus indivisis cordatis superioribus cordatis oblongis trilobis, racemo terminali, floribus cernuis, pistillis nutantibus. W.

H. foliis acuminatis ferratis inferioribus cordatis, superioribus hastato-lobatis, racemis terminalibus, floribus nutantibus, pistillis cernuis. *Jacq. ic. rar. 1. t. 142. Collect. 1. p. 123.\**

H. foliis inferioribus cordatis acuminatis ferratis; superioribus hastatis. *Sp. pl. 981. Gron. virg. 102.*

Alcea f. Bamia americana, parvo flore, petalis rotundioribus. *Pluk. phyt. 6. f. 4.*

*Houttuyi Lin. Pfl. Syst. 4. p. 168.*

Virginilcher Hibiscus. W.

*Habitat in Virginiae paludosis, salsis. 24*

Caulis viridis, erectus, angustior. Folia caulina cordato-oblonga, demum hastata, viridia, subtomentosa, trinervia, tenuissime serrata. Pedunculi uniflori, ex alis solitarii; in summitate subracemosi, nudi. Nimis affinis sequenti, anne varietas?

*A. sequenti distinctissimus; foliis acuminatis superioribus profundius lobatis; calyce exteriori longitudine interioris, corollis duplo majoribus, denique racemo nudo terminali. W.*

#### 64. HIBISCUS pentacarpos.

H. foliis cordatis oblongis dentatis obtusiusculis angulatis leviter subtrilobis, pedunculis axillaribus, floribus cernuis, pistillis nutantibus. W.

H. foliis acutis ferratis, inferioribus cordatis superioribus subhastato-lobatis, pedunculis axillaribus unifloris, floribus nutantibus, pistillo cernuo. *Jacq. ic. rar. 1. t. 143. Collect. 1. p. 150.\**

H. foliis inferioribus cordatis angulatis, superioribus subhastatis, floribus subnutantibus, pistillo cernuo. *Sp. pl. 981. Mill. dict. n. 16.*

H. foliis cordatis angulatis, ferratis, stipulis setaceis divaricatis. *Hort. cliff. 350. Roy. lugdb. 359.*

H. caule annuo glaberrimo, foliis cordatis subhastatis acuminatis ferratis, floribus subnutantibus. *Cavan. diss. 3. p. 145. t. 66. f. 3. (qui hunc perperam cum praecedente conjunxit.)*

*Ketmia palustris*, foliis lobatis subrotundis inferna parte molli subcinerea lanugine, flore purpureo magno. *Mich. flor. 54. Tozzet it. 2. p. 309.*

*Ketmia palustris minor*, folio angusto, flore parvo purpurascente, fructu depresso pentagono. *Zamnich. vet. 155. t. 91.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 168.*

Fünffruchtiger Hibiscus. W.

*Habitat in paludosis Venetiae, circa Astrachan. Lerche.*  
4 (v. l.)

*Planta antecedenti nimis affinis; sed fructu parum diverso; forte a praecedenti orta? Caulis tripedalis, angustius. Folia caulina cordato-oblonga; superiora hastiata, viridia, subtrinervia, subtus tomentosa, tenuissime serrata. Pedunculi axillares in summitate plantae solitarii, nudi, petiolo, longiores, uniflori. Calyx inferior patens, radiis subulatis, vix longitudine interioris. Corolla patens, dilute rubra, subnuttans. Stamina lutea tota; Antherae saturatius. Stylus cernuus cum staminibus, albus; Stigmata 5, capitata, incarnata.*

\*65. *HIBISCUS vesicarius.*

H. foliis dentatis, superioribus quinquelobis, lobis oblongis subaequalibus obtusis, calycibus inflatis membranaceis nervosis. W.

H. caule herbaceo hispido urente, foliis imis subrotundo-crenatis indivisis, reliquis quinquelobis obtusis crenatis, calycibus inflatis. *Cavan. diff. 3. p. 171. t. 64. f. 2.\**

*Ketmia vesicaria africana. Tournef. inst. 101.*

*Hibiscus africanus. Mill. dict. n. 20.*

Aufgeblasener Hibiscus. W.

*Habitat in Africa. ☉ (v. v.)*

66. *HIBISCUS Trionum.*

H. foliis dentatis, superioribus tripartitis, lobis lanceolatis, intermedio longissimo, calycibus inflatis membranaceis nervosis. W.

H. foliis tripartitis incis, calycibus inflatis. *Sp. pl. 981. Hort. upf. 206. Mill. dict. n. 19. Gmel. it. 1. p. 182. Sabb. hort. 1. t. 55. Kniph. cent 5. n. 43. Curt. mag. 209.*

H. caule herbaceo scabro, foliis tripartitis dentato-ferratis, lobo medio longissimo lanceolato, calycibus inflatis. *Cavan. diff. 3. p. 171. t. 64. f. 1.\**

*Ketmia Trionum. Scop. carn. n. 862.*

*Trionum. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb. 35.*

*Alcea vesicaria. Bauh. pin. 317.*



*Alcea peregrina* folifequa. *Lob. ic.* 656.

β. *H. (ternatus)* caule humili herbaceo, foliis ternatis, calycibus inflatis. *Cavan. diff.* 3. p. 172. t. 64. f. 3.\*  
*Houttuyn Lin. Syst. Pfl.* 4. p. 170.

Stunden-Hibiscus. W.

*Habitat in Italia, Africa, Carniola.* ☉ (v. v.)

Planta admodum varians caule humiliore et altiore, lobis foliorum remote dentatis, profunde dentatis ac fere pinnatifidis. A praecedente tamen semper foliis superioribus tripartitis lobis lanceolatis, intermedio longissimo distinctissimus. W.

### \*1298. PAVONIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1140.

*Cal. duplex: exterior polyphyllus. Stigmata 10.*  
*Capsulae 5 bivalves monospermae.*

#### 1. PAVONIA praemorsa.

P. foliis subrotundo-cuneatis truncatis apice dentatis, pubescentibus. W.

P. (*cuneifolia*) caule fruticoso, foliis obsolete cordatis ovato-truncatis crenatis, floribus solitariis erectis longe pedunculatis, calycibus glabris. *Cavan. diff.* 3. p. 139. t. 45. f. 1. et *diff.* 6. p. 351.

Hibiscus (*praemorsus*) hirsutus, foliis ovatis basi angustato-cordatis apice praemorsis, crenatis, calycibus tomentosis, seminibus tuberculatis. *Lin. suppl.* 309. *Jacq. ic. rar.* 1. t. 141. *Collect.* 1. p. 81.

Hibiscus (*praemorsus*) foliis subrotundis dentato-serratis retulis pubescentibus. *Ait. Kew.* 2. p. 454.

Abgebillene Pavonie. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.* † (v. v.)

#### 2. PAVONIA leptocarpa. †

P. foliis lanceolatis serratis, calycibus pentaphyllis. *Cav. diff.* 6. p. 351.

Urena (*leptocarpa*) foliis lanceolatis serratis. *Lin. suppl.* 308

Kleinfrüchtige Pavonie. W.

*Habitat in Surinamo.* C. G. Dalberg.

Frutex decempedalis, ramis teretibus. Folio alterna petiolata remota lanceolata serrata. Flores terminales glomerati sessiles capitati. Calyx exterior foliolis quin-  
*Linnei Spec. Plant. T. III.* G g g

que lanceolatis, interior foliolis totidem minor. Corolla magnitudine vix Ranunculi acris. Petala oblonga calyce duplo longiora. Stamina monadelphia petalis non longiora. Germen subrotundum. Styli quinque. Stigmata simplicia. Capsula subrotunda aequalis, superne cincta mucronibus quindecim, quinquelocularis seu discedens quinque partibus. Semina oblonga solitaria.

### 3. PAVONIA *Typhalaea*.

P. foliis oblongo-lanceolatis serratis, capitulis pedunculatis terminalibus, calycibus exterioribus quinquefidis, capsulis triaristatis. W.

P. foliis ellipticis, capsulis recurvato-tridentatis. *Cavan. diff.* 3. p. 134. et *diff.* 6. p. 350. t. 197.\*

Urena (*Typhalaea*) foliis ellipticis, capsulis recurvato-tridentatis. *Mant.* 258. *Swartz. obs.* 264.\*

Urena fruticulosa, foliis serratis oblongis, floribus conglobatis, pedunculis longissimis terminalibus. *Brown. jam.* 281.

Malva scabiofae folio, capsulis tridentatis vestibus adherentibus. *Barrer. aequin.* 73.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 142.

Kopfblütige Pavonie. W.

*Habitat in pascuis graminosis* Jamaicae, Gujanae. †

Caulis frutescens. Folia oblongo-ovata utrinque acuta serrata. Bractee confertae, pedunculos distinguentes. Pedicelli approximati uniflori. Calyx exterior 1-phyllus quinquepartitus persistens; Interior semiquinquefidus persistens. Petala alba. Stylus decemfidus, stigmatibus capitatis. Fructus quincapsularis: capsulis mucronibus 3 subulatis retrodenticulatis medio longiore; monospermibus.

### \*4. PAVONIA *hastata*.

P. foliis lanceolatis hastatis dentatis, pedunculis axillaribus, calycibus exterioribus pentaphyllis. W.

P. foliis hastatis crenato-dentatis, desuper punctatis, floribus folitariis longe pedunculatis. *Cavan. diff.* 3. p. 138. t. 47. f. 2.\*

Spontanblättrige Pavonie. W.

*Habitat in Brasilia.* †

### 5. PAVONIA *spinifex*.

P. foliis ovatis acuminatis subcordatis duplicato-denta-

tis, pedunculis axillaribus, calyce heptaphyllo, capsulis quadriaristatis, aristis divergentibus. W.

P. caule arborecente, foliis ovato-lanceolatis inaequaliter dentatis, tubo et stigmatibus decumbentibus, capsulis aristatis. *Cavan. diff.* 3. p. 133. t. 45. f. 2.\*

Hibiscus (*spinifex*) foliis cordatis crenatis indivisis, capsulis spinis exstantibus. *Sp. pl.* 978. *Jacq. amer.* 196. *hort.* t. 103.

Abutilon americanum fruticosum folio subrotundo flore luteo, fructu aculeato majore. *Plum. spec.* 2. ic. 1.

β. P. (*aristata*) caule fruticoso humili, foliis cordatis ovato-lanceolatis crenatis scabriusculis, floribus solitariis parvis, capsulis aristatis. *Cavan. diff.* 3. p. 133. t. 45. f. 3.\*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 156.

Vielstachliche Pavonie. W.

*Habitat in America meridionali.* † (v. v.)

*Variat planta pedunculis longioribus et brevioribus, corollis magnis et calyce minoribus. Ex uno semine vidi P. spinificem et aristatam.* W.

#### \*6. PAVONIA papilionacea.

P. foliis subrotundo-cordatis acutis dentatis, pedunculis axillaribus, stylo ascendente. W.

P. caule erecto tomentoso, foliis cordatis dentatis, subrotundo-acuminatis, floribus solitariis, genitalibus declinatis. *Cavan. diff.* 3. p. 140. t. 49. f. 1.\*

Schmetterlingsartige Pavonie. W.

*Habitat in insula Tahiti.* †

#### 7. PAVONIA cancellata.

P. foliis sagittato-cordatis dentatis, pedunculis axillaribus, calyce exteriori polyphylo piloso interiore longiore. W.

*Pavonia cancellata.* *Cavan. diff.* 3. p. 135.

Hibiscus (*cancellatus*) caule debili hirtio, foliis cordatis ferratis, calycibus globosis, radiis vicinis subulatis hirtis. *Lin. suppl.* 311.

Gegitterte Pavonie. W.

*Habitat in Surinamo.* Dalberg.

*Caulis herbaceus filiformis prostratus pilosus ut tota planta. Folia alterna petiolata sagittato-cordata dentata. Pedunculi axillares uniflori petiolis longiores. Calyx exterior globoso-inflatus e radiis viginti seta-*

*ceis pilosis: interior parvus quinquefidus. Stigmata decem. Capsula semipentacocca, loculis quinque. Semina plurima.*

\*8. PAVONIA *racemosa*.

P. foliis ovatis cordatis acuminatis subferratis, racemo terminali, calyce exteriori octofido. W.

P. (*racemosa*) foliis simplicibus cordatis ovatis ferratis superne scabris, racemo terminali erecto. Swartz *fl. ind. occid.* 2. p. 1215.\*

P. (*spicata*) foliis cordatis ovato-acuminatis ferratis hirtis rugosis, floribus thyrsis terminalibus. Cavan. *diff.* 3. p. 136. t. 46. f. 1.\*

Althaea *racemosa*. Swartz *prod.* 102.

Malache scabra. Trem. Ehret. 50. t. 90.

Althaea uliginosa frutescens, foliis ovato-acuminatis leniter crenatis, spicis laxis terminalibus. Brown. *jam.* 284.

Alcaea fruticosa aquatica, folio cordato scabro, flore pal. lide luteo. Sloan. *jam. hist.* 1. p. 121. t. 139. f. 2.

Abutilon americanum palustre, spica florum pyramidata, flore parvo exalbido. Plum. *spec.* 2.

Traubenblütige Pavonie. W.

Habitat in paludosis Jamaicae inter fruticeta Rhizophorae. Avicenniae et Annonae uliginosae. † (v. l.)

\*9. PAVONIA *corymbosa*.

P. foliis cordatis angulatisve ferratis glabris, pedunculis calycibusque polyphyllis pilosis, floribus corymbosis. W.

Althaea (*corymbosa*) foliis simplicibus cordatis, angulatisve glabris, pedunculis calycibusque pilosis, floribus corymbosis. Swartz *prod.* 101. *Fl. ind. occid.* 2. p. 1213.\*

Doldentranbige Pavonie. W.

Habitat in Jamaicae, et Hispaniolae ripis fluviorum. †

\*10. PAVONIA *paniculata*.

P. foliis subrotundo-cordatis ferratis acuminatis, tricuspidadisve glabris, pedunculis calycibusque polyphyllis pilosis, racemis corymbosis terminalibus et axillaribus, stylis adscendentibus. W.

P. (*paniculata*) caule hirtio ramoso, foliis cordatis subrotundis acuminatis crenato-dentatis, saepe tricuspida-

tis, floribus paniculatis, genitalibus declinatis. *Cav.*

*diff. 3. p. 135. t. 46. f. 2.\**

Rispenblütige Pavonie. W.

*Habitat in Peru ad originem fluminis Maragnon. †*

*Videtur praecedenti valde affinis. W.*

\*11. PAVONIA *odorata*. W.

P. foliis ovatis subcordatis tricuspидatis subdentatis, ramisque piloso-viscosis, pedunculis axillaribus, calycibus polyphyllis. W.

Wohlriechende Pavonie. W.

*Habitat in India orientali. (v. †)*

*Tota planta piloso-viscosa. Folia oblonga basi leviter cordata tricuspидata acuminata rarius dentata. Pedunculi uniflori axillares interdum subracemosi in apice caulis, longi, in ramorum apice folio longiores. Calyces exteriores dodecaphylli setacei ciliati calyce interiore longiores. Corolla inter parvas videtur rubra, magnitudine Hibisci phoeniceae, campanulata, Stylus decemfidus. Capitulae quinque acuminatae carinatae venosae. W.*

\*12. PAVONIA *coccinea*.

P. foliis cordatis trilobis ferratis, pedunculis axillaribus unifloris adscendentibus, calyce exteriori pentaphyllo. W.

P. foliis cordatis subtrilobis pubescentibus, floribus solitariis coccineis, liliaceis revolutis. *Cavan. diff. 3. p. 140. t. 47. f. 1.\**

Malva folio hederaceo, flore coccineo. *Plum. spec. 2. ic. 169. f. 2.*

Scharlachrothe Pavonie. W.

*Habitat in insula St. Dominica. †*

\*13. PAVONIA *Columella*.

P. foliis quinquangularibus acuminatis dentatis glaberrimis, pedunculis axillaribus solitariis, calyce exteriori pentaphyllo. W.

P. foliis dentatis angulatis, inferioribus latis, superioribus oblongis, floribus axillaribus solitariis pedunculo brevi. *Cavan. diff. 3. p. 138. t. 48. f. 3.\**

Fünfeckige Pavonie. W.

*Habitat in insula Borbonia. † (v. †)*

Flores sessiles. W.

\*14. PAVONIA *urens*.

P. foliis septemangularibus acuminatis dentatis hirtis, floribus axillaribus subsessilibus glomeratis, calyce exteriori subnephyllo. W.

P. caule fruticoso suberente, foliis palmatis, floribus axillaribus glomeratis subsessilibus. *Cavan. diff.* 3. p. 137. t. 49. f. 1.\* et *diff.* 5. p. 283. *Jacq. ic. rar.* 3. t. 522. *Collect.* 3. p. 171.\*

Brennende Pavonie. W.

*Habitat in insula Mauritii.* †

15. PAVONIA *zeylanica*.

P. foliis quinquepartitis palmatis, laciniis lanceolatis dentatis, pedunculis axillaribus folio longioribus, calycibus exterioribus majoribus decaphyllis setaceis ciliatis. W.

P. caule herbaceo hirtio, foliis cordatis crenato-dentatis, inferioribus subrotundis, reliquis profunde tri-quinquefidis: pedunculis elongatis geniculatis unifloris. *Cavan. diff.* 3. p. 134. t. 48. f. 2.\*

Hibiscus (*zeylanicus*) foliis cordato-hastatis, pedunculis alternis unifloris geniculatis. *Sp. pl.* 981. *Fl. zeyl.* 266. *Burm. ind.* 153. t. 48. f. 2.

Ketmia *zeylanica urens pilosa annua.* *Seb. mus.* 2. t. 18. f. 3.

Alcea pentacoccus, ranunculi auricomi folio et facie. *Pluk, alm.* 13. t. 125. f. 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 167.

Zeylonische Pavonie. W.

*Habitat in Zeylona.* ☉ (v. v.)

Caulis herbaceus erectus teres hirtus, ramis alternis, inferioribus longioribus. Folia alterna petiolata remota profunde trifida inciso-crenata cordata obtusa, subtus gummoso-arenacea. Petioli patentis foliis longiores, supra planiores. Stipulae subulatae patentis. Pedunculi solitarii axillares (ad latus ramuli) ad latus extensi, erectiores, infra florem geniculati uniflori. Calyx exterior quasi inflatus ratione fructus, ovatus ut in *Atractyli cancellata*. Corolla incarnata magnitudine *Potentillae Anserinae*.

Planta nostra, quae eadem ac illa a *Clariff. Cavanilles* descripta, convenit praeter folia cum *Linneana*. Folia plantae *Linneanae*, cujus iconem dedit *Bur-*

*mann, sunt trifido-hastata, reliqua vero conveniunt; tamen nostram non diversam credo, quum folia partita quam maxime in hisce plantis variant. W.*

\*1299. ACHANIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1141.*

*Cal. duplex: exterior polyphyllus. Corolla convoluto-clausa. Stigmata 10. Bacca 5-locularis 5-sperma.*

1. ACHANIA *Malvaviscus*.

A. foliis scabriusculis acuminatis, foliolis calycis exterioris erectis. *Ait. Kew. 2. p. 459. Swartz prod. 102. Fl. ind. occid. 2. p. 1222.\**

*Malvaviscus (arboreus)* caule arboreo, foliis cordatis crenatis acuminatis tomentosis. *Cavan. diff. 3. p. 131. t. 48. f. 1.\**

*Hibiscus (Malvaviscus)* foliis cordatis crenatis, angulis lateralibus extimis parvis, caule arboreo. *Sp. pl. 978. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb. 358. Mill. dict. n. 22. Sabb. hort. 1. t. 54. Kniph. cent. 1. n. 31.*

*Hibiscus frutescens*, foliis angulatis cordatis acuminatis, petalis ab uno latere auritis. *Brown. jam. 284.*

*Malvaviscus arboreus*, flore miniato clauso. *Dill. elth. 210. t. 170. f. 208.*

*Malva arborea*, folio oblongo acuminato glabro dentato. *Sloan. cat. 96. hist. 1. p. 216. t. 136. f. 1.*

*Alcea indica arborea*, folio molli, flore amplo eleganter coccineo. *Pluk. alm. 14. t. 257. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 155.*

Baumartige Tutenmalve. W.

*Habitat in petrosis calcareis Jamaicae, inque Mexico.*  
‡ (v. v.)

\*2. ACHANIA *mollis*.

M. foliis tomentosis, foliolis calycis exterioris patulis. *Ait. Kew. 2. p. 459.*

Weiche Tutenmalve. W.

*Habitat in America.* ‡

\*3. ACHANIA *pilosa*.

A. foliis pilosis obtusis acutisque. *Ait. Kew. 2. p. 459. Swartz prod. 102. Fl. ind. occid. p. 1224.\**

Haarige Tutenmalve. W.

*Habitat in fruticetis Jamaicae australioris.* † (v. l.)

### 1300. S T U A R T I A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1142, 1143.*

*Cal. simplex rotatus. Petala 5. Styli 5 coaliti vel distincti. Caps. 5-locularis, 5-valvis. Semina solitaria binave.*

#### I. STUARTIA *Malachodendron.*

S. floribus lateralibus subbinis, calycibus ovatis obtusis stylis coalitis. *l'Herit. stirp. 1. p. 153. t. 73.\**

*Stewartia Malacodendron. Sp. pl. 982. Act. upf. 1741. p. 79. t. 2. Catesb. car. 3. p. 13. t. 13. Duham. arb. 2. p. 284. t. 78. Gron. virg. 101.*

*Stewartia (virginica) foliis ovatis acutis serratis, floribus solitariis albis, petalorum altero maculato. Cav. diff. 5. p. 303. t. 159. f. 2.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 173.*

Eingriffliche Stuartie. W.

*Habitat in Carolina.* † (v. l.)

#### \*2. STUARTIA *pentagyna.*

S. floribus axillaribus solitariis, calycibus calyculatis lanceolatis, stylis distinctis. *l'Herit. stirp. 1. p. 155. t. 74.\**

*Malachodendron (ovatum) caule arborecente, foliis alternis ovatis acutis, floribus solitariis subsessilibus. Cavan. diff. 5. p. 302. t. 158. f. 2.\**

*Malachodendron. Mitch. gen. 16.*

Fünfgriffliche Stuartie. W.

*Habitat in Virginia.* †

### 1301. G O R D O N I A.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1144.*

*Cal. simplex. Stylus 5-gonus, stigmate 5-fido. Caps. 5-locularis. Sem. bina ala foliacea.*

#### I. GORDONIA *Lafianthus.*

G. floribus longius pedunculatis, foliis coriaceis glabris, capsulis ovatis. *l'Herit. stirp. 1. p. 156.*

G. foliis coriaceis utrinque glabris. *Ait. Kew. 2. p. 231.*



- G. foliis ovatis planis, pedunculis elongatis, corollis ovatis, stylo quinquefido. *Swartz. obs.* 271.\*
- G. foliis lanceolatis subserratis utrinque glabris et viridibus, pedunculis axillaribus longis unifloris. *Lamarck encycl.* 2. p. 770. *Cavan. diff.* 6. p. 307. t. 161.\*
- Gordonia. *Mant.* 570. *Ellis Act. angl.* 1770. (vol. 60.) p. 518. t. II.
- Hypericum (Lafianthus)* floribus pentagynis, foliis lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 380. *Spec. ed.* 3. p. 1101.
- Hypericum* foliis lanceolatis rigidis, denticulatis, floribus alaribus pedunculis longissimis, capsulis lignosis. *Mill. dict.*
- Alcea floridana* quinquecapsularis, laurinis foliis leviter crenatis seminibus coniferarum instar alatis. *Pluk. amalth.* 7. t. 352. f. 3. *Catesb. car.* 1. p. 44. t. 44. *Amm. Act.* 7. t. 551. f. 3.
- Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. p. 171.
- Langstielige Gordonie. W.
- Habitat in Carolina, locis uliginosis.* † (v. l. l. fl.)
- Calyx tomentosus, margine villosus. Stamina vix calyce longiora.*

\*2. GORDONIA *Haematoxylon.*

- G. foliis ovatis acuminatis serratis apice recurvis, pedunculis brevissimis, floribus stylis quinque. *Swartz. fl. ind. occid.* 2. p. 1199.\*
- Rothholzige Gordonie. W.
- Habitat in Jamaicae occidentalis montibus altis.* †

\*3. GORDONIA *pubescens.*

- G. floribus subsessilibus, foliis subtus pubescentibus. *l'Herit. stirp.* 1. p. 156.
- G. foliis subtus pubescentibus. *Ait. Kew.* 2. p. 231.
- G. foliis lanceolatis subserratis, superne viridibus lucidis, subtus pubescentibus, floribus sessilibus. *Lamarck encycl.* 2. p. 770. *Cavan. diff.* 6. p. 308. t. 162.\*
- Behaarte Gordonie. W.
- Habitat in Carolina meridionali.* †

\*4. GORDONIA *Franklini.* †

- G. floribus sessilibus, foliis glabris, fructibus globosis. *l'Herit. stirp.* 1. p. 156.

Franklinia Alatomaha. *Marsh. arb.* 49.

Stiellose Gordonie. W.

*Habitat in Carolina meridionali.* †

### 1302. C A M E L L I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1145.

*Cal. imbricatus, polyphyllus: foliolis interioribus majoribus.*

#### I. CAMELLIA japonica.

*C. foliis acute ferratis acuminatis. Thunb. jap.* 272.\*

*Jacq. ic. rar.* 3. t. 553. *Collect.* 1. p. 117.\*

*C. foliis ovatis utrinque acuminatis, ferraturis minimis.*

*Cavan. diff.* 6. p. 305. t. 160. f. 1.

*Camellia japonica. Sp. pl.* 982.

*Thea chinensis pimentae jamaicensis folio, flore roseo.*

*Pet. gaz. t.* 33. f. 4.

*Tsubakki montanus f. sylvestris, flore roseo simplici.*

*Kaempf. amoen.* 850. t. 851.

*Tsubakki hortensis, flore pleno maximo rosae hortensis.*

*Kaempf. amoen.* 852. *Andrews reposit.* p. 25. t. 25.

*Rosa chinensis. Edw. av.* 2. p. 67. t. 67.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. p. 174.

*Japanische Camellie. W.*

*Habitat in Japonia, China.* † (v. v.)

#### \*2. CAMELLIA Sasanqua.

*C. foliis obtuse ferratis emarginatis. Thunb. jap.* 273.

t. 29.\* *Cavan. diff.* 6. p. 306. t. 160. f. 2.

*Sasankwa. Kaempf. amoen.* 853.

*Stumpfblätrige Camellie. W.*

*Habitat in Japonia.* †

*Differt a C. japonica: foliis tenuioribus angustioribus obsulete ferratis, floribus multoties minoribus, petalis oblongis emarginatis, caule longe minori et graciliori. Thunb. l. c.*

## 1313. M E S U A.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1146.**Cal. simplex, 4-phyllus. Cor. 4-petala. Pist.*1. *Nux tetragona, 1-sperma.*1. M E S U A *ferrea.**M. foliis lanceolatis. Spec. pl. 734. Fl. zeyl. 203.\***Nagallarium. Rumph. amb. 7. p. 3. t. 2.**Calophyllum nagallarium. Burm. ind. 121.**Naghas. Herm. zeyl. 7.**Balutta tsiampacum f. Castanea rosea indica. Rheed.**mal. 3. p. 63. t. 53. Raj. hist. 1680.**Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 3. p. 176.**Eisenharte Mesue. W.**Habitat in India. † (v. l. f. fl.)*

## \*1304. M Y R O D I A.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1147.**Cal. simplex tubulosus rumpens. Petala 5. Styl.**filiformis. Drupa sicca 2-3-locularis; loculis monospermis.*\*1. M Y R O D I A *turbinata.**M. foliis ovato-oblongis, calycibus turbinatis, columna staminum petalis brevior. W.**M. foliis ellipticis, calycibus turbinatis intus subfericeis. Swartz. prod. 102. Fl. ind. occid. 2. p. 1227.\***Kreiselkelchiger Balsamduft. W.**Habitat in insulis Caribaeis ad torrentum ripas. † (v. l.)*\*2. M Y R O D I A *longiflora.**M. foliis lanceolato-oblongis, calycibus cylindraceutis, columna staminum petalis longior. W.**M. foliis oblongis, calycibus cylindraceutis, intus villosis, staminum columna longissima. Swartz prod. 103. Fl. ind. occid. 2. p. 1229.**Quararibea gujanensis. Aubl. jug. 2. p. 692. t. 278.\* Cavan. diff. 3. p. 175. t. 71. f. 2.**Langblumiger Balsamduft. W.**Habitat ad fluviorum ripas Gujanae. †*

## 1305. MORISONIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 1148.*

*Cal.* simplex, bifidus. *Cor.* 4-petala. *Pist.* 1.  
*Bacca* cortice duro, 1-locularis, polysperma,  
 pedicellata.

I. MORISONIA *americana.*

*Morisonia.* *Sp. pl.* 719. *Jacq. amer.* 156. *t.* 97. *Cav.*  
*diff.* 6. *p.* 309. *t.* 163.

*Morisona arbor nucis juglandis folio.* *Plum. gen.* 36.  
*ic.* 203.

*Capparis (Morisonia)* pedunculis subquinquefloris, foliis  
 oblongis coriaceis, calycibus diphyllis, fructibus bac-  
 catis corticosis. *Swartz. obs.* 272.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 170. *t.* 13. *f.* 3.

Americanische Morifonie. W.

*Habitat in America calidiori.* ‡

*Folia alterna, petiolata, ovata, obtusa.*

## \*1306. POURRETIA. W.

*Cavanillesia. Ruiz. et Pavon. p.* 97.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5 lanceolata. *Drupa*  
 sicca 1-sperma magna 5-alata.

\*I. POURRETIA *arborea.* W.

*Cavanillesia. Ruiz et Pavon prod. gen. fl. peruv.* 97.  
*t.* 20.\*

Baumartige Pourretie. W.

*Habitat in Perú.* ‡

*In honorem Clariff. Pourret variis itineribus per*  
*Hispaniam celebris et qui multa nova detexit vegeta-*  
*bilia, nominavi. Pourretia Ruizii et Pavonii est Pit-*  
*cairnia, et in memoriam Clariff. Cavanilles jam aliud*  
*genus Celebr. Thunberg est nuncupatum.* W.

## \*1307. CROSSOSTYLIS.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 1148.*

*Cal.* 4-partitus. *Petala* 4 calyci inserta. *Nect.*  
fida 20 urceolo staminum inter filamenta in-  
serta. *Bacca* unilocularis polysperma.

\*1. CROSSOSTYLIS *biflora*.

*Crossostylis biflora*. *Forst. prod. n. 266. Charact. gen.*  
*n. 44.*

Zweyblütige Kranzseule. W.

*Habitat in Societatis insulis.*

## 1308. BARRINGTONIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1150.*

*Cal.* 2-phyllus superus. *Petala* 4. *Drupa* sicca  
magna quadrangularis, nuce quadriloculari.

1. BARRINGTONIA *speciosa*.

*Barringtonia speciosa*. *Lin. suppl. 312. Forst. prod. n.*  
*255. Charact. gen. n. 38. Thunb. diff. nov. pl. gen. 2.*  
*p. 47. \* Cook. it. 1. p. 157. t. 24. I. F. Mill. ic. 7.*

*Burtonia speciosa*. *Lamarck encycl. 1. p. 515. Ait. Kew.*  
*2. p. 439. Rumph. amb. 3. p. 179. t. 114.*

*Commerlonia*. *Sonnerat. it. nov. guin. p. 14. t. 8. 9.*

*Mammea (asiatica)* staminibus flore longioribus. *Sp.*  
*pl. 731. Osb. itin. 278.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 20.*

Prächtige Barringtonie. W.

*Habitat in maritimis ad ostia fluviorum inter tropi-*  
*cos Asiae, ab ore australiore Chinae per omnes*  
*insulas Moluccas usque ad insulas Societatis, Ami-*  
*corum et Marchionis maris Pacifici. †*

Arbor procera, omnium, quae in eleganti Flora ae-  
quinotiali superbiunt. speciosissima, spissis lateque  
umbrosis foliorum comis et undique interjectis flori-  
bus maximis formosissimis purpureo et niveo colore sul-  
gentibus. Truncus excelsus crassus erectus, cortice  
cinereo-fusco glabro, rimulis exarato. Rami patentes  
teretes amplissimi extensi subflexuosi varie divisi, cor-  
tice rimoso tecti, apice foliosi. Folia sparsa conferta  
summa subverticillata sessilia cuneiformia obtusa inte-  
*Linnaei Spec. Plant. t. III. Hhh*

*gerrima patentia pedalia vel bispithamaea crassa coriaceo glaberrima, splendentia, saturate viridix venis flavis, rachique flava crassa, basi rubicunda notata. Thyrsus terminalis ramulorum, solitarius pedalis erectus. Pedunculus teres subangulatus laevis subflexuosus pedalis. Pedicelli quinque ad viginti uniflori sparsi teretes laeves patentis palmares crassitie pennae anserinae. Bractee subrotundae laeves integerrimae sessiles deciduae solitariae ad basin pedicellorum. Flores maximi pellucido-candidissimi. Filamenta candida basi diaphana apice purpurea. Antherae flavae aureae. Stylus candidus apice purpureus. Drupa rufosusca.*

*Noctu flores aperit sponte deciduos, quos jam primo solis ortu amittit, verum et ab aviculis rostro avulsi flores late sparguntur, inde terra staminibus sanguineis confita est. pulcherrimae stragis vestigiis.*

*Nuclei hujus arboris escae admixti et a piscatoribus in mare abjecti, viribus toxicis pisces inebriant, eadem ratione, qua Cocculi indici, Galega Piscidia, multaeque aliae plantae littorales idem praestant.*

### 1309. G U S T A V I A.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 1151.*

*Cal. 4-f. 6-fidus. Cor. 4-f. 6-petala. Bacca licca 4-f. 5-ocularis.*

#### 1. GUSTAVIA *augusta*.

*G. calycinis laciniis quatuor subrotundis petaloideis, corolla tetrapetala, foliis oblongis acuminatis dentatis. W. Gustavia augusta. Lin. suppl. 313.*

*Pirigata (tetrapetala) foliis ovato-oblongis acuminatis per limbum dentatis, magno fructu. Aubl. guj. I. p. 487. t. 192.\**

*Japarandiba. Pis. bras. 121. Marcgr. bras. 109. Majestätische Gustavie. W.*

*Habitat in Surinamo et in insula Cajenna. †*

*Arbor ramis crassiusculis, altitudine 20-30 pedum. Folia alterna, subsessilia, confertiuscula, superne lato-lanceolata, basi angustiora, spithamaea s. pedalia, costata, subserrata, glabra. Pedunculi terminales, 2-f. 3-uniflori, uniarticulati. Flos speciosissimus, albus: Petalis apice rubris, major Nymphaeae albae. Antherae*

*flavae*. Stylus minutus, flavus: Fructus pyriformis, fronte calva, sexlocularis. Semina unilocularia, magnitudine pistaciorum, ovata, plura in singulis loculis, corculo bifido, cum appendice extus, ut in violis, serpentino, cartilagineo, contortuplicato. Diff. alt. de plant. surinam. 1776. cum fig.

Calycis lacinae quatuor magnae subrotundae habent petalorum formam. W.

\*2. GUSTAVIA *fastuosa*.

G. calycinis laciniis sex lanceolatis, corolla hexapetala, foliis obovatis acuminatis ferrulatis. W.

Pirigara (*hexapetala*) foliis obovatis acutis, parvo fructu. *Aubl. guj. I. p. 490. t. 193.\**

Prächtige Gustavie. W.

*Habitat in interioribus Gujanae regionibus. §*

Arbor 25 pedalis. Folia obovata acuminata ferrulata glabra. Differt a praecedente, praeter formam foliorum, etiam calyce sexfido, laciniis angustis brevioribus lanceolatis acuminatis et corolla hexapetala. W.



1314











