



NIEUWE NAAMLIJST

VAN

NEDERLANDSCHE DIPTERA

DOOR

F. M. VAN DER WULP

EN

Dr. J. C. H. DE MEIJERE

Uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging
als Bijvoegsel tot deel XLI
van het Tijdschrift voor Entomologie.

'S GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF

1898



S. 12

Jff

S. 224

Mr. 14. 81

VOORWOORD.

S. 123

Ruim veertig jaren geleden zag voor het eerst eene lijst van inlandsche Diptera het licht (Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland, dl. I en II), waarin door Mr. S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN en F. M. VAN DER WULP 694 soorten als zoodanig werden opgesomd. Dit gaf aan velen, die zich toen in ons land met het verzamelen van insecten bezig hielden, aanleiding om ook de Diptera niet meer als vroeger over het hoofd te zien; en het gevolg was, dat reeds binnen enkele jaren in deel III der „Bouwstoffen” eene nieuwe lijst werd opgenomen van VAN DER WULP, waarbij het aantal soorten nagenoeg was verdubbeld. Nog later, in 1877, verscheen VAN DER WULP's „Diptera Neerlandica”, waarin de Nematoceren, alsmede de familiën Stratiomyidae en Coenomyidae behandeld werden en het getal soorten, althans dat der Nematoceren, opnieuw aanmerkelijk was gestegen. Ofschoon de schrijver zich sedert meer hoofdzakelijk met exotische Diptera bezig hield, verzuimde hij toch niet, voortdurend aanteekening te houden van al wat hem ook van de inlandsche soorten onder de oogten kwam. Veel had hij in de laatste jaren op dit gebied te danken aan Dr. J. C. H. DE MEIJERE, onder onze vaderlandsche entomologen de eenige die, even als hij, van Diptera eene meer opzettelijke studie maakt.

Wel werd nu en dan in de vergaderingen onzer Entomologische Vereeniging melding gemaakt van de „faunae novae species”, maar de opgaven daarvan zijn in de verslagen verspreid en bovendien op verre na niet volledig.

Beiden zijn wij dan ook overtuigd, dat het meer dan tijd wordt, de verkregen uitkomsten tot een geheel samen te vatten en zoo doende den tegenwoordigen stand van de kennis der dipterologische fauna van ons land in het licht te stellen. Van daar deze nieuwe Naamlijst.

Aanvankelijk meenden wij ons te kunnen bepalen tot eene opgave van de nader als inlandsch bekend geworden soorten en van nieuwe vindplaatsen; maar het bleek alras, dat de soorten, waarvan niets te melden viel, slechts eene zeer kleine minderheid uitmaakten. Het scheen ons daarom de voorkeur te verdienen, om in stede van zulk een bloot supplement, eene volledige lijst van *alle* tot dusver in ons land aangetroffen soorten te geven. Ten einde de verspreiding onzer Diptera gemakkelijker te kunnen overzien, hebben wij ook de vroeger reeds vermelde vindplaatsen in onze nieuwe lijst opgenomen.

Bij de eerste familiën (de Cecidomyiden tot en met de Coenomyiden) is korthedshalve naar de „Diptera Neerlandica” verwezen; bij de Xylophagiden en alle verdere familiën naar het tweede en derde gedeelte van de naamlijst in dl. III der „Bouwstoffen” (blz. 101 en 255). Voor de nieuw bekend geworden soorten wordt telkens een der meest karakteristieke beschrijvingen aangehaald, zooals die vooral te vinden zijn in Schiner's „Fauna austriaca”, dat nog altijd bij het determineeren een onmisbaar handboek blijft.

Blijkens deze Nieuwe Naamlijst is thans het aantal der in Nederland gevonden Diptera-soorten tot 2133 geklommen. Eene vergelijking met de dipterologische fauna van naburige landen laat zich, bij het ontbreken van de noodige gegevens, moeielijk maken. Zooveel ons bekend is, bestaat er alleen van de in Groot-Brittannië voorkomende Diptera eene naamlijst van Verrall ¹⁾; maar zij is ten deele slechts eene optelling van alle soorten, die als zoodanig waren

1) G. H. Verrall, A List of British Diptera. London, 1888.

—

aangegeven, o. a. ook in Walker's „Diptera Britannica”, waarvan zeker velen, indien de typische exemplaren nog kunnen worden vergeleken, zouden blijken slechts synoniemen te zijn. Men zie hieromtrent de voorrede van Verrall's Lijst.

Het laat zich intusschen verwachten, dat nog van menige soort de aanwezigheid in ons land onbekend is gebleven, vooral onder de uiterst kleine vormen, als Cecidomyiden, Sciarinen en dergelijken. Deze zullen eerst tot haar recht komen, als iemand onzer entomologen zich meer uitsluitend op zulke groepen zou gaan toeleggen.

Ten slotte betuigen wij onzen dank aan het Bestuur der Nederlandsche Entomologische Vereeniging en de Redactie van het Tijdschrift voor Entomologie, die met groote welwillendheid de kosten der publicatie van onzen arbeid voor hunne rekening hebben genomen.

NAMEN VAN MEDEWERKERS.

H. A.	Wijlen Mr. J. H. Albarda te Leeuwarden.
Back.	" J. Backer jr. te Oosterbeek.
v. Bemm.	" A. A. van Bemmelen te Rotterdam.
Bog.	W. J. Bogaard te Haarlem.
v. d. Br.	A. van den Brandt te Venlo.
Brants.	Mr. A. Brants te Arnhem.
v. Bruck.	Wijlen E. von Bruck te Crefeld (tijdens zijn verblijf te Scheveningen).
Burgersdijk.	Dr. L. A. J. Burgersdijk te Deventer.
Drechsler.	A. G. Drechsler te Leiden.
Erbr.	Wijlen J. F. G. W. Erbrink te Amsterdam.
Everts.	Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts te 's Gravenhage.
v. Eyndh.	Wijlen A. J. van Eyndhoven te Zutphen.
Fokk.	Mr. A. J. F. Fokker te Zierikzee.
l. Font.	N. H. la Fontijn, thans te Leeuwarden.
Frans.	Wijlen C. Franszen Hz. te Rotterdam.
de Gav.	Dr. C. de Gavere, vroeger te Groningen.
G. v. W.	H. L. Gerth van Wijk te Middelburg.
G. H.	Wijlen A. Gijsberti Hodenpijl te Rotterdam.
de Gr.	Mr. H. W. de Graaf te 's Gravenhage.
Grebner.	Wijlen G. W. Grebner te Amsterdam.
Gunn.	J. W. B. Gunning, vroeger te 's Gravenhage.
t. Haar.	D. ter Haar te Warga.
v. Hass.	Dr. A. W. M. van Hasselt te 's Gravenhage.
Heinsius.	Dr. H. W. Heinsius te Rotterdam.
Herkl.	Wijlen Dr. J. A. Herklots te Leiden.
v. Heyden.	Wijlen C. H. G. von Heyden te Frankfort a. M. (tijdens zijn verblijf te Scheveningen).
Heyl.	F. J. M. Heylaerts te Breda.
Jasp.	J. Jaspers te Amsterdam.

Kemp.	K. J. W. Kempers te Nijkerk.
Kink.	J. Kinker te Amsterdam.
Koorev.	P. Koorevaar te Amsterdam.
Lat.	H. J. H. Latiers te Roermond.
Lod.	Wijlen J. W. Lodeesen te Amsterdam.
de Man.	Dr. J. G. de Man te Yerseke.
Maur.	Wijlen Mr. A. H. Maurissen te Maastricht.
v. M. d. R.	Wijlen A. B. van Medenbach de Rooij te Arnhem.
de M.	Dr. J. C. H. de Meijere te Amsterdam en J. L. F. de Meijere Joh. Czn. te Bodegraven.
Cl. M.	Wijlen Prof. Claas Mulder te Groningen.
Numan.	Wijlen Prof. A. Numan te Utrecht.
Oudem.	Dr. J. Th. Oudemans te Amsterdam.
Perin.	A. Perin, vroeger te Leiden.
Piag.	Dr. E. Piaget, vroeger te Rotterdam.
Rits.	C. Ritsema Cz. te Leiden.
v. Ross.	Dr. A. J. van Rossum te Arnhem.
Schepm.	M. M. Schepman te Rhoon.
Iv. Schepm.	Wijlen Ivangh Schepman te Voorburg.
Schuyt.	J. M. Schuyt te Rotterdam.
Six.	G. A. Six te 's Gravenhage.
Sn.	P. C. T. Snellen te Rotterdam.
Sw.	Wijlen K. N. Swierstra te Amsterdam.
Verhuell.	" Q. M. R. Verhuell te Arnhem.
VerL.	Dr. M. C. VerLoren te Amersfoort.
Versl.	Dr. J. Versluys jr. te Amsterdam.
v. Voll.	Wijlen Dr. S. C. Snellen van Vollenhoven te 's Gravenhage.
de Vos.	H. A. de Vos tot Nederveen Cappel te Apeldoorn.
v. Walchr.	Wijlen J. C. H. van Walchren te Brummen.
Wasm.	E. Wasmann, S. J., te Exaeten.
Weyenb.	Wijlen Dr. H. Weyenbergh jr., vroeger te Haarlem.
Wtt.	" Dr. J. Wttewaall te Utrecht.
v. d. W.	F. M. van der Wulp te 's Gravenhage.

CECIDOMYIDAE.

Cecidomyia Meig.

- C. pavid*a Winn. — D. N. 47. ¹⁾. — Middenduinen onder Overveen, 9, Kink.
- C. saliciperda* L. Duf. — D. N. 48 ²⁾. — Gekweekt uit eene wilgenknots, uit Breda ontvangen, v. d. W.; Rotterd. Frans.; Leiden, 7, v. Voll. en Rits.; Bodegraven, 5, de M.
- C. galii* Winn. — D. N. 48. — Wassenaarsche duinen, v. d. W.; Bloemendaal, 8, de M.
- C. salicis* Schrank. — D. N. 49. — Gekweekt uit wilgen van de duinen nabij Scheveningen, v. d. W.
- C. riparia* Winn. — D. N. 50. — In Nederland gevonden door Dr. Wtewaall.
- C. inclusa* Frauenf. — D. N. 50. — Uit rietstengels gekweekt, Sn.; Oisterwijk, Oudem.; Zwammerdam, de M.
- C. brassicae* Winn. — D. N. 51. — In de provincie Groningen in 1861 schadelijk aan het koolzaad, Wtt.
- C. salicina* Schrank. — D. N. 51. — Indertijd op wilgen in de voormalige duinen van Meerderwoort bij den Haag, 6, v. d. W.
- C. heterobia* Löw. — D. N. 52. — Door Dr. Wtewaall en Dr. Weyenbergh gekweekt; ook Maastr. 8, Maur.
- C. urticae* Perris. — D. N. 52. — 's Gravenhage, v. d. W. (de gallen); Amsterdam, de M. (de gallen).
- C. pyri* Bouché. — D. N. 53. — Rotterdam, Sn.
- C. rosaria* Löw, Dipt. Beitr. III. 35. — Gekweekt uit wilgenrozen, Weyenb., de M.; Bodegraven, Bloemendaal, Bussum, Amsterd., de M.
- C. crataegi* Winn. Linn. Entom. VIII. 228. — Gekweekt, Weyenb.; Amsterd. en Linschoten, de M.
- C. cernis* Koll. Denkschr. Ak. Wiss. I; Schin. Fn. austr. II. 379. — Gekweekt, Weyenb.
- C. bryoniae* Bouché, Stett. Ent. Zeit. VIII. 144. — 's Gravenhage, gekweekt, Six.
- C. persicariae* L. — Winn. Linn. Ent. VIII. 219. — Uit gallen van *Polygonum persicaria*, Bodegraven, 8, de M., Vogelenzang, 9, v. d. W.

¹⁾ D. N. verwijst naar F. M. van der Wulp, „Diptera Neerlandica,” 's Gravenhage 1877; het daarachter gevoegde cijfer is dat der bladzijden.

²⁾ *C. albipennis* Winn. (D. N. 48) is hier weggelaten, omdat F. Löw (Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XXIV, p. 324) die soort als synoniem beschouwt met *C. saliciperda* L. Duf.

- C. sisymbrii* Schr. — Winn. Linn. Ent. VIII. 230. — Bodegraven, 7, de M. (uit gallen van *Nasturtium sylvestre*).
- C. ulmariae* Bremi, Neue Denkschr. der Schweiz. Gesellsch. VIII. 52. — Bodegraven, 7, de M.
- C. destructor* Say, Journ. Acad. N. Sc. Phil. I. 45—48 en 63, 64. pl. III. f. 1—6. Schadelijk voor granen. In den allerlaatsten tijd bij ons aangetroffen: in 't oosten van Gelderland, Oldambt (zie Ritzema Bos, Ziekten en beschadigingen van kultuurgewassen, II. p. 70).
- C. ranunculi* Bremi, Neue Denkschr. Schweiz. Gesellsch. VIII. 29. — De gallen te Zwammerdam, 7 en 8, de M.
- C. thalictri* Löw, Dipt. Beitr. IV. 30. — De gallen bij het Naardermeer, 7, Versluys.
- C. tilianvolvans* Rübs. Berl. Ent. Zeitschr. 1889, p. 55. — De gallen bij het kasteel van Middachten aan de Steeg, 6, de M.
- C. marginemtorquens* Winn. Linn. Entom. VIII. 223. — De gallen te Zwammerdam en te Linschoten, 8, de M.

Hormomyia Löw.

- H. producta* Meig. — D. N. 56. — Maastricht, 6, Maur.; Valkenburg, Piag.; Rijen, 6, Piag.; Utrecht en Amersfoort, Six.
- H. fagi* Hartig. — D. N. 57. — Hilversum, v. d. W.; Bussum, de M.; Amersfoort, v. d. W.; Beek, v. d. W.; aan het Uddelermeer, 7, Sn.; Arnhem, Brants.
- H. elegans* Winn. — D. N. 58. — Utrecht en Beek, Six.
- H. millefolii* Löw. — D. N. 58. — Wijk aan Zee, Weyenb.
- H. piligera* Löw, Dipt. Beitr. IV. 26. — De gallen te Bloemendaal, 8, de M.
- H. poae* Bosc. N. Bull. Soc. Phil. 1817, p. 133; Winn. Linn. Entom. VIII. 292 (*H. graminicola*). Oosterbeek, Beijerinck; Nijmegen, 7, Oudem.

Colpodia Winn.

- C. pallidula* v. d. W. — D. N. 59. — Scheveningsche bosch, Sn., Six en v. d. W.; Utrecht, Six.
- C. angustipennis* Winn. Linn. Ent. VIII. 293. — Middelburg, de Man.

Epidosis Löw.

- E. analis* Winn. — D. N. 61. — Aerenhout bij Haarlem, 5, Weyenb.
- E. nitida* v. d. W. — D. N. 61. — Driebergen, 6, Six.
- E. venusta* Winn. — D. N. 61. — Haagsche bosch, 5, v. d. W.
- E. albitarsis* Meig. — D. N. 61. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Velzen, 7, v. Voll.
- E. dorsalis* Winn. — D. N. 62. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.

Diplosis Löw.

- D. fascipennis* Winn. — D. N. 64. — Utrecht, Six.
D. variegata Macq. — D. N. 65. — Utrecht en Rijnsburg, 7 en 8, Six; Kuilenburg, 7, de M.
D. centralis Winn. — D. N. 65. — Rotterdam, Fransen.
D. ochracea Winn. — D. N. 66. — Limburg, Maur.; Middelburg, 6, de Man; Amsterdam, 6, de M.; Driebergen, 6, Six.
D. invocata Winn. — D. N. 66. — Rotterdam, 5, Frans.
D. coniphaga Winn. — D. N. 66. — Zundert, 7, v. Voll.; 's Gravenhage, v. d. W.
D. pini de G. — D. N. 67. — Gekweekt, Sn.
D. tremulae Winn. — D. N. 67. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.
D. acetosellae Rübs. Berl. Entom. Zeitschr. 1892. — Gekweekt uit gallen in de bloesems van *Rumex sanguineus*, uit den IJpolder bij Amsterdam, Versl.
D. tritici Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. 1797, p. 246. -- Schadelijk aan tarwe, ook in Nederland, volgens Ritzema Bos (Ziekten en beschadigingen der kultuurgewassen, II, p. 83).
D. dryobia Löw, Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XXVII. 14. — De gallen, Hilversum, 6, de M.

Asynapta Löw.

- A. pectoralis* Winn. — D. N. 70. — 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, Weyenb.; Diemen, de M.; Utrecht, Six.

Asphondylia Löw.

- A. verbasci* Vall. — D. N. 71. — Beek, 7, v. Voll.
A. sarothamni Löw, Dipt. Beitr. IV. 38. — Gekweekt uit bremgallen, Arnhem 7, Brants.

Clinorhyncha Löw.

- Cl. crassipes* Winn. — D. N. 72. — Driebergen en Beek, Six.

Lasioptera Meig.

- L. rubi* Schrank. — D. N. 73. — Den Haag en Driebergen, Six.

Miastor Mein.

- M. metraloas* Mein. Nat. Tijdskr. III. 106; Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XX. 7. — Gekweekt uit poppen, te Loosduinen op een rotten boomstam gevonden, Oudem.

Campylomyza Meig.

- C. halterata* Zett. — D. N. 76. — 's Gravenhage, meermalen, reeds in Maart, v. d. W.; Zeist, 4, de M.
- C. flavida* Winn. — D. N. 76. — Den Haag, 5, v. d. W.
- C. fuscipes* Meig. — D. N. 77. — Den Haag, 3, v. d. W.
- C. flavipes* Meig. — D. N. 77. — Limburg, Maur.; Middelburg, 10, de Man; den Haag, v. d. W.; Amsterdam, Kink.; Overveen, Weyenb.
- C. aequalis* Winn. — D. N. 77. — Limburg, Maur.; Bodegraven en Zwammerdam, 5, de M.; Haarlem, 3, Rits.; Amsterdam, 5, 11, de M.
- C. bicolor* Meig. — D. N. 78. — Middelburg, 3, de Man; Leiden, 9, v. Voll.; Driebergen, 10, Six.
- C. aceris* Meig. — D. N. 78. — Maastricht, 9, Maur.; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Amersfoort, 6, Six.

Catocha Hal.

- C. latipes* Hal. — D. N. 79. — Haarlem, 3, Rits.
- C. crassitarsis* v. d. W. — D. N. 79. — Rotterdam 4, een ♀, Piag.

Lestremia Macq.

- L. leucophoea* Meig. — D. N. 80. — 's Gravenhage, niet zeldzaam, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Noordwijk, Piag.; Zwammerdam, 4, de M.; Haarlem, Rits.; Driebergen, Six.

MYCETOPHILIDAE.

Zygoneura Meig.

- Z. sciarina* Meig. — D. N. 90. — 's Gravenhage, 10, v. d. W.; Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.

Trichosia Winn.

- Tr. modesta* Winn. — D. N. 92. — Scheveningen, duinen, C. von Heyden.

Sciara Meig.

- Sc. rufiventris* Macq. — D. N. 95. — 's Gravenhage, eens in verscheidene exemplaren in de bosschen aan den duinzoom, v. d. W.
- Sc. Thomae* L. — D. N. 96. — Zeer gewoon.
- Sc. carbonaria* Meig. — D. N. 96. — Maastricht, 8, Maur.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 6, de M.
- Sc. analis* Egg. — D. N. 97. — Plasmolen, 6, Piag.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 6—8 en Schielandsche plassen, v. d. W.; Beek, v. Voll.; Kuilenburg, 7, de M.

- Sc. humeralis* Zett. — D. N. 97. — Plasmolen, 6, Piag.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Helder, 8, de M.; Amsterdam, 5, v. d. W. en 7, de M.; Zeist, 8, de M.
- Sc. pilosa* Staeg. — D. N. 98. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Haarlem, 4, Rits.; Hilversum, 5, de M.
- Sc. longiventris* Zett. — D. N. 98. — Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.
- Sc. brunnipes* Meig. — D. N. 98. — 's Gravenhage, v. d. W.
- Sc. annulata* Meig. — D. N. 99. — Leiden, 4, v. Voll.; Bussum, 9, de M.
- Sc. ruficauda* Meig. — D. N. 99. — Haagsche bosch, 7, een ♂, v. d. W.
- Sc. lugubris* Winn. — D. N. 99. — Vrij gemeen, in de meeste provinciën waargenomen.
- Sc. praecox* Meig. — D. N. 100. — 's Gravenhage, 3 tot 5, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.
- Sc. quinquelineata* Macq. — D. N. 100. — Koudekerke, duinen, 9, de Man; 's Gravenhage, Piag.; Bussum, 9, de M.; Amsterdam, 4, Jaspers.
- Sc. sylvatica* Meig. — D. N. 101. — Maastricht, 6, 7, 10, Maur.; Middelburg en Domburg, 9, de Man; Voorschoten, 7, v. Voll.; Overveen, 4, Weyenb.; Amsterdam, reeds in Februari, Rits.; Schoorl, Jaspers.
- Sc. scatopsoides* Meig. — D. N. 101. — Haarlem, 12, Rits.; Utrecht, 4, Six.
- Sc. Giraudii* Egg. — D. N. 101. — Rotterdam, Frans.
- Sc. fenestrata* Meig. — D. N. 102. — Limburg, Maur.; Haagsche bosch, v. d. W.; Empe, v. Eynth.
- Sc. nitidicollis* Meig. — D. N. 102. — Limburg, Maur.; Middelburg, de Man; 's Gravenhage, niet zeldzaam, in het voorjaar, v. d. W.; Rotterdam, Frans; Amsterdam, Jasp.; Utrecht, Six; Maarsbergen, Piag.; Kuilenburg, 8, de M.
- Sc. villica* Winn. — D. N. 102. — Middelburg, 7, 8, 9, de Man; Leiden, v. Voll.; Utrecht, Six.
- Sc. pulicaria* Meig. — D. N. 103. — Vrij gemeen; in Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- Sc. fucata* Meig. — D. N. 103. — 's Gravenhage, duinen, v. d. W.
- Sc. aprilina* Meig. — D. N. 104. — Maastricht, 8, Maur.; 's Gravenhage, v. d. W.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Amsterdam, 2, Rits.
- Sc. flavipes* Meig. — D. N. 104. — Maastricht, 7, Maur.; Plasmolen, 6, v. d. W.; Bergen, 7, Gooi, 7 en 9, de M.; Utrecht en Driebergen, Six; Arnhem, 8, v. d. W.; Ruurlo, 7, Sn.; Groesbeek, 7, de M.
- Sc. pusilla* Meig. — D. N. 104. — Maastricht, 9, Maur.; Haarlem, 3, Rits.; Driebergen, 6, Six.
- Sc. nobilis* Winn. — D. N. 105. — Een ♂, in Nederland gevangen door Snellen van Vollenhoven.
- Sc. falsaria* Winn. — D. N. 105. — Walcheren, G. v. W.
- Sc. umbratica* Zett. — D. N. 105. — Rotterdam, 4, Piag.

- Sc. pallipes* Fabr. — D. N. 106. — Maastricht, 9, Maur.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.
Sc. minuta Winn. — D. N. 106. — Middelburg, 8, de Man.
Sc. lutea Meig. Syst. Besch. I. 287; Winn. Monogr. Sciar. 145. — Liesbosch bij Breda, 5, Piag.
Sc. conspicua Winn. Monogr. Sciar. 135; — Maastricht, Maur.
Sc. placida Winn. Monogr. Sciar. 67. — Maastricht, Maur.

Epidapus Hal.

- Ep. venaticus* Hal. — D. N. 107. — Rijsenburgerbosch bij Driebergen, een ♀, 9, Six.

Glaphyoptera Winn.

- Gl. bimaculata* Meig. — D. N. 109. — Utrecht, Six.
Gl. Winthemii Lehm. — D. N. 110. — Glijphoeve bij Heemstede, v. Voll.; Bloemendaal, 9, de M.; Voorst, Wtt.; Zutphen, v. d. W.
Gl. fascipennis Meig. — D. N. 111. — Zeeland, Wtt.; 's Gravenhage, 6 tot 9, Rotterdam, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Amsterdam, 5, 8, de M.; Schoorl, 6, Jasp.; Helder, 8, de M.; Heemstede, v. Voll.; Utrecht, 8, Six; Voorst, v. d. W.
Gl. subfasciata Meig. — D. N. 111. — Wolfhezen, 8, Piag.

Anaclinia Winn.

- A. nemoralis* Meig. — D. N. 112. — Driebergen, 6, een ♂, Six.

Acnemia Winn.

- A. nitidicollis* Meig. — D. N. 113. — Middelburg, 7, de Man, 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Kuilenburg, 7, de M.

Boletina Staeg.

- B. sciarina* Staeg. — D. N. 115. — 's Gravenhage, 4, 12, v. d. W.; Hilversum, 4, de M.; Zeist 4, de M.; Driebergen, 10, Six.
B. trivittata Meig. — D. N. 116. — 's Gravenhage, 12, een ♀, v. d. W.
B. basalis Meig. — D. N. 116. — Haagsche bosch, v. d. W.; Utrecht, Six.
B. silacea v. d. W. Tijdschr. v. Entom. XXX. 166, pl. 11, f. 1. — Rijen, een ♀, 7, Sn.

Leia Meig.

- L. variegata* Winn. — D. N. 118. — Driebergen, in het najaar, Six.

Azana Walk.

- A. anomala* Staeg. — Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 802. — 's Gravenhage, duinen, 5, een ♀, Six.

Zygomia Winn.

- Z. flaviventris* Winn. — D. N. 121. — Maastricht, 10, Maur.; 's Gravenhage, v. d. W.; Driebergen, v. Voll.
Z. notata Stann. — D. N. 122. — Driebergen, in het najaar, Six.
Z. vara Staeg. — D. N. 122. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.
Z. pictipennis Staeg. — D. N. 122. — Driebergen, in het najaar, Six.
Z. valida Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 902. — Limburg, Maur.; Middelburg, 10, de Man.

Sceptonia Winn.

- S. c. nigra* Meig. — D. N. 123. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Driebergen, 10, Six.

Docosia Winn.

- D. sciarina* Meig. — D. N. 125. — Walcheren, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Voorst, 4, v. Voll. Telkens slechts een exemplaar.

Phronia Winn.

- Ph. rustica* Winn. — D. N. 128. — Hilversum, 5, de M.; Utrecht, Six; Driebergen, Six en de M.
Ph. vittata Winn. — D. N. 129. — 's Gravenhage, 4 en 6, v. d. W.; Bussum, 7, de M.
Ph. tarsata Staeg. — D. N. 129. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Driebergen, 10, Six.
Ph. nitidiventris v. d. W. — D. N. 130. — Niet zeldzaam en zeer verbreid.
Ph. truncata Winn. — D. N. 130. — Driebergen, 10, Six.
Ph. tenuis Winn. — D. N. 131. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.

Exechia Winn.

- E. Schummeli* Stann. — D. N. 132. — IJsselstein, 8, Six.
E. tenuicornis v. d. W. — D. N. 133. — Niet zeldzaam. Walcheren, de Man; 's Gravenhage, 11, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Driebergen, 9, Six; Zutphen, v. Eyndh.
E. lateralis Meig. — D. N. 133. — Niet zeldzaam. In N. Brabant, N. en Z. Holland en Utrecht aangetroffen.
E. fungorum de G. — D. N. 134. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 1, de M.; Hilversum, 4, 5, 10, de M.; Empe, v. Eyndh.
E. contaminata Winn. — D. N. 134. — Maastricht, 9, 10, Maur.; Rotterdam, 10, Sn.
E. cincta Winn. — D. N. 135. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Brummen, 10, v. Voll.

- E. interrupta* Zett. — D. N. 135. — 's Gravenhage en Scheveningen, 10 en 11, v. d. W.; Brummen, v. Voll.
E. rufithorax v. d. W. — D. N. 136. — Driebergen, 6, Six.
E. pallida Stann. — D. N. 136. — Limburg, Maur.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 1, 5, de M.; Driebergen, in 't najaar, Six.

Rymosia Winn.

- R. domestica* Meig. — D. N. 137. — Limburg, Maur.; Bergen-op-Zoom, 5, Rits.; 's Gravenhage, v. d. W.
R. fasciata Meig. — D. N. 138. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage en Scheveningen, 9, 10 en 11, v. d. W.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht en Driebergen, 8, 9, Six; Wolfhezen, 8, v. d. W.; Brummen, v. Voll.
R. signatipes v. d. W. — D. N. 139. — Utrecht en Driebergen, 10, Six; Brummen, 10, v. Voll.

Brachycampta Winn.

- Br. alternans* Zett. — D. N. 141. — Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 3 en 4, v. d. W.; Glijphoeve, 10, v. Voll.; Bodegraven, 7, de M.; Heemstede 10, v. Voll.; Hilversum, 5, de M.; Driebergen, 5 en 10, Six; Kuilenburg, 7, de M.
Br. ruficauda v. d. W. — D. N. 142. — 's Gravenhage, 4 tot 6, v. d. W.; Sterkenburg bij Driebergen, v. Voll.
Br. bicolor Macq. — D. N. 142. — 's Gravenhage en Scheveningen, v. d. W.; Utrecht, 8, en Driebergen, Six.
Br. griseicollis Staeg. — D. N. 142. — Middelburg, 10, de Man; 's Gravenh., 3 tot 5, v. d. W.; aldaar uit een fungus gekweekt, Kempers.
Br. amoena Winn. — D. N. 143. — 's Gravenh., 5, een paar ♀, v. d. W.
Br. flaviventris v. d. W. — D. N. 143. — 's Gravenhage, v. d. W.; Utrecht, Six.
Br. caudata Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 843. — 's Gravenhage, 5, Six.

Trichonta Winn.

- Tr. submaculata* Staeg. — D. N. 144. — 's Gravenhage, 4, een ♀, v. d. W.
Tr. melanura Staeg. — D. N. 145. — Bodegraven, 5, de M.; Driebergen, 10, Six.

Allodia Winn.

- A. ornaticollis* Meig. — D. N. 146. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, gemeen, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.; Schoorl, 3, Jasp.; Bloemendaal, 4, Zandvoort, 8, de M.; Linschoten, 4, de M.; Utrecht, en Driebergen, 5, 9, Six.

- A. crassicornis* Stann. — D. N. 147. — 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Noordwijk, Piag.; Rotterdam, Frans.; Utrecht, Six.
- A. punctipes* Staeg. — D. N. 148. — 's Gravenhage, voorjaar. v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.; Amsterdam, 8, de M.

Mycetophila Meig.

- M. punctata* Meig. — D. N. 150. — Niet zeldzaam; in Limburg, N. Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- M. lineola* Meig. — D. N. 151. — 's Gravenhage, in voor- en najaar, niet zelden, v. d. W., Leiden, v. Voll.; Rotterdam, 8, Frans., v. Voll.; Heemstede, v. Voll.; Bloemendaal, 8, de M.; Linschoten, 4, de M.; Arnhem, v. M. d. R.
- M. unicolor* Stann. — D. N. 152. — Driebergen, Six.
- M. sordida* v. d. W. — D. N. 152. — 's Gravenhage, v. d. W.; Haarlem, Rits.; Zandvoort, 8, de M.; Amsterdam, 10, Kink.; telkens een exemplaar.
- M. xanthopyga* Winn. — D. N. 153. — 's Gravenhage, v. d. W.; Velzen, Jasp.; Witterholt bij Assen, v. d. W.
- M. bimaculata* Fabr. — D. N. 153. — 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht, Six; Driebergen en Brummen, v. Voll.
- M. vittipes* Zett. — D. N. 154. — 's Gravenhage en Scheveningen, v. d. W.
- M. cingulum* Meig. — D. N. 154. — 's Gravenhage, 7—10, v. d. W.; Noordwijk, de Gr.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Heemstede, v. Voll.; Amsterdam, 8, de M.; Driebergen, v. Voll.
- M. signata* Meig. — D. N. 155. — Niet zeldzaam. Maastricht, 7, Maur.; 's Gravenhage, v. d. W.; Bodegraven, 5, 6, de M.; Amsterdam, 9, de M.; Baarn, 8, de M.; Amersfoort, v. d. W.; Driebergen, Six; Brummen, v. Voll.; Arnhem, v. M. de R.; Kuilenburg, 6, 7, de M.
- M. lunata* Meig. — D. N. 155. — 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Bodegraven, 2, 5, 8, de M.; Heemstede, v. Voll.; Driebergen, v. Voll.; Utrecht en Driebergen, 6, Six; Brummen, v. Voll.; Empe, v. Eyndh.
- M. biusta* Meig. — D. N. 156. — Brummen, 10, v. Voll.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.
- M. luctuosa* Meig. — D. N. 156. — 's Gravenhage, v. d. W.; Bodegraven, 1, 4, 5, de M.; Amsterdam, 9, de M.; Aerenhout bij Haarlem, Kink.; Driebergen, Six.
- M. gratiosa* Winn. — D. N. 157. — 's Gravenhage, 5, een ♀, v. d. W.; Driebergen, in het najaar, een ♀, Six.
- M. stolidata* Walk. Dipt. Brit. III., 15; Schin. Fn. austr. II, 486. — Middelburg, 7, een ♀, de Man.

Dynatosoma Winn.

- D. fuscicornis* Meig. — D. N. 158. — Plasmolen, 8, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Middenduin bij Haarlem, Kink.; Arnhem, 3, v. M. d. R.

Cordyla Meig.

- C. crassicornis* Meig. — D. N. 159. — Utrecht, Six; Kuilenburg, 7, de M.
C. flaviceps Staeg. — D. N. 160. — Driebergen, Six; Zandvoort, 8, de M.
C. fusca Latr. — D. N. 160. — Haagsche bosch en Scheveningen, v. d. W.; Zandvoort, 8, de M.; Driebergen, verscheidene exemplaren, in het najaar, Six.
C. cinerea Zett. — D. N. 161. — Utrecht, 7 en 8, Six.

Tetragoneura Winn.

- T. sylvatica* Curt. — D. N. 162. — Driebergen, 6, een ♂, Six.
T. hirta Winn. — D. N. 163. — 's Gravenhage, 5, 9, v. d. W.; Rotterdam, 7, een ♂, Frans.

Sciophila Meig.

- Sc. fuscata* Winn. — D. N. 165. — 's Gravenhage, 2 tot 4, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Kuilenburg, 7, de M.
Sc. limbata Winn. — D. N. 165. — 's Gravenhage, 3 tot 5, v. d. W.; Zeist, 4, de M.
Sc. notabilis Staeg. — D. N. 166. — Driebergen, 6, een ♀, Six.
Sc. maculata Meig. — D. N. 166. — Empe, v. Eyndh.
Sc. punctata Latr. — D. N. 167. — 's Gravenhage, 10, een ♂, v. d. W.
Sc. incisurata Zett. — D. N. 167. — Utrecht, 6 en Driebergen, in het najaar, Six; Baarn, 8, de M.; Wolfhezen, 8, v. d. W.; Rozenaal, 8, de M.
Sc. flava Winn. — D. N. 168. — Driebergen, 10, een ♂, Six.
Sc. nigricornis Zett. — D. N. 168. — Driebergen, 10, een ♂, Six.
Sc. tumida Winn. — D. N. 168. — Hilversum, 6, 10, de M.; Driebergen, in het najaar, Six.
Sc. aestiva v. d. W. — D. N. 169. — Driebergen, 6, Six.
Sc. ornata Meig. — D. N. 169. — Plasmolen, 6, v. d. W., 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Utrecht, 6, Six; Zeist, 8, de M.
Sc. apicalis Winn. — D. N. 170. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.; Hilversum, 4, de M.; Driebergen, in het najaar, Six; Zeist, 4, de M.
Sc. alacris Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 710. — Limburg, het ♀, Maur.
Sc. hyalinata Meig. Syst. Besch. VI. 295; Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 713. — Venlo, 10, een ♂, v. d. Br.

Lasiosoma Winn.

- L. hirtum* Meig. — D. N. 171. — 's Gravenhage, 7, 9, 10, v. d. W.; Rotterd., 6, Frans.; Bodegraven, 5, 9, de M.; Amsterd., 5, 8, de M.

- L. nigriventre* Macq. — D. N. 172. — Middelburg, 7, de Man; 's Gravenh., 7 en 10, v. d. W.; Bodegrav., 6, de M.; Zutphen, v. d. W.
L. rufum Meig. — D. N. 172. — Bodegraven 7, de M.; Empe, v. Eyndh.
L. luteum Macq. — D. N. 172. — Rotterdam, 7, een ♀, Sn.

Monoclona Mik.

- M. halterata* Staeg. — D. N. 173 (*Staegeria*). — Vogelenzang, 9, een ♀, Rits.

Empheria Winn.

- E. striata* Meig. — D. N. 174. — Venlo, 7, een ♀, v. d. Br.

Empalia Winn.

- E. vitripennis* Meig. Syst. Besch. I. 251; Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 763. — 's Gravenhage, 5, een ♂, Six.

Polylepta Winn.

- P. leptogaster* Winn. — D. N. 175. — Leiden, een ♀, v. Voll.

Diadocidia Ruthe.

- D. ferruginosa* Meig. — D. N. 177. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 6, Six; Driebergen, 6, 10, Six.

Mycetobia Meig.

- M. pallipes* Meig. — D. N. 178. — Maastricht, 8, Maur.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht, 7, Six.

Plesiastina Winn.

- Pl. annulata* Meig. — D. N. 178 — (het ♀ als *Pl. apicalis* Winn. D. N. 179) zie Kowarz, Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XVII. 213. — 's Gravenhage, 6, een ♂, v. d. W.; Rotterdam, een ♀, Frans

Bolitophila Meig.

- B. cinerea* Meig. — D. N. 181. — Den Haag, 4, 10, v. d. W.; Noordwijk, 10, v. Voll.; Bodegraven, 5, 10, Hilversum 5 en Amsterdam, 11, de M.; Zeist, 4 en Baarn, 8, de M.; Driebergen, in 't najaar, Six.
B. fusca Meig. — D. N. 181. — 's Gravenhage, 5, 9, 10, v. d. W.; Zandvoort, 8, de M.; Driebergen, Six.

Macrocera Meig.

- M. angulata* Meig. — D. N. 183. — Haagsche bosch, 6, v. d. W.; Utrecht, 8, Six; Kuilenburg, 7, de M.

- M. centralis* Meig. — D. N. 183. — Ruurlo (Gelderl.) 6, een ♂, Sn.
M. fasciata Meig. — D. N. 184. — Venlo, 8, v. d. Br.; 's Gravenhage, 7, Piag., 9, de M.; Driebergen, 6, Six; Empe, v. Eyndh.
M. lutea Meig. — D. N. 184. — Amby, 9, Maur.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Hilversum, 6, v. d. W.; Driebergen, 6, Six; Zeist, 8, de M.; Brummen, 7, v. d. W.
M. vittata Meig. — D. N. 185. — Maastricht, 6, Maur.; Driebergen, 6, Six; Brummen, 10, v. Voll.
M. phalerata Meig. — D. N. 185. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Driebergen, 6, Six.
M. stigma Curt. — D. N. 185. — Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; Driebergen, 6, Six.

Asindulum Latr.

- A. flavum* Winn. — D. N. 187. — Oosterwijk, 6, de M.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Driebergen, v. Voll.

Ceroplatus Bosc.

- C. lineatus* Fabr. — D. N. 188. — 's Gravenhage, 7 tot 9, v. d. W.; Amsterdam, 6, de M.; Driebergen, v. Voll.
C. sesioides Wahlb. — Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 685. — Maastricht, 9, een ♂, Maur.
C. tipuloides Bosc. — Schin. Fn. austr. II. 435. — Maastricht, 7, een ♀, Maur.

Platyura Meig.

- Pl. atrata* Fabr. — D. N. 190. — Ginneken, 5, Rits.; Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; Maarsbergen, 6, Piag.; Empe, v. Eyndh.
Pl. concolor v. d. W. — D. N. 190. — Voorst, 6, een ♂, Wtt.
Pl. humeralis Winn. — D. N. 191. — Den Haag, Six.
Pl. modesta Winn. — D. N. 191. — Rotterdam, Frans.; Baarn, 8 de M.
Pl. infuscata Winn. — D. N. 191. — Valkenburg, 6, Oudem.; Venlo, 7, v. d. Br.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Utrecht, Wtt.
Pl. unicolor Staeg. — D. N. 192. — Velzen, 6, de M.; Beek, 6, v. M. d. R.
Pl. discoloria Meig. — D. N. 192. — 's Gravenhage, 6, meermalen, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Bodegraven, 6, de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Kuilenburg, 6, de M.
Pl. bicolor Macq. — D. N. 193. — Utrecht, 7, Six.
Pl. nemoralis Meig. — D. N. 193. — Rijen, 6, Piag.; Utrecht, 5, Six.
Pl. nana Macq. — D. N. 194. — Oosterwijk, 7, Schuyt; 's Gravenhage, 6, v. d. W.
Pl. fulvipes Meig. — D. N. 194. — 's Gravenhage, 7, een ♀, v. d. W.

- Pl. succincta* Meig. — D. N. 194. — Bloemendaal, 8, de M. Driebergen, 6, Six.
- Pl. cineta* Winn. — D. N. 195. — Middelburg, 7, de Man; 's Gravenh., 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Bodegraven, 5, 6, de M.; Amsterdam, 5, Jasp. en de M.; Hilversum, 6, de M.; Utrecht en Driebergen, 6, Six.
- Pl. fasciata* Meig. Syst. Besch. I 240; Winn. Verh. Zool. bot. Ges. Wien. XIII. 694. — Breda, 6, een ♀, Sn.

SIMULIDAE.

Simulia Latr.

- S. reptans* L. — D. N. 197. — Maastricht, 9, Maur.; Plasmolen, 6, 8, Piag.; Houthem, 6, 7, Versl.; Leiden, v. Voll.; Driebergen, 10, Six; Arnhem, 8, v. Voll.; Wolfhezen, 4, Sn.
- S. latipes* Meig. — D. N. 198. — Rotterdam, 5, Piag.
- S. nana* Zett. — D. N. 199. — Venlo, 8 en 9, in 1871 zeer talrijk, v. d. Br.; Dinther, 7, de Man.
- S. maculata* Meig. — D. N. 199. — Maastricht, 7, Maur.; Dinther, 7, de Man; Rotterdam, Frans.; in Gelderland zeer gewoon.

BIBIONIDAE.

Scatopse Geoffr.

- Sc. flavicollis* Meig. — D. N. 204. — Venlo, 10, v. d. Br.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Noordwijk, in 't najaar, v. Voll.; Driebergsche bosch, 10, Six; Nijmegen, 9, Sn.
- Sc. transversalis* Löw. — D. N. 205. — Empe, een ♂, v. Eyndh.
- Sc. albitarsis* Zett. — D. N. 205. — 's Gravenhage, 6, een ex., v. d. W.
- Sc. notata* L. — D. N. 206. — Overal gemeen.
- Sc. scutellata* Löw. — D. N. 207. — Haagsche bosch, 10, meer malen in aantal, v. d. W.
- Sc. pulicaria* Löw. — D. N. 207. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, Piag.; Haarlem, Weyenb.; Diemen 7 en Bussum 7, de M.; Utrecht, Six.
- Sc. brevicornis* Meig. — D. N. 207. — 's Gravenhage, 5 en 6, niet zeldzaam, v. d. W.; Zwammerdam, 9, en Amsterdam 7, de M., Amsterdam, 9, Jasp.; Medemblik, 9, de M.; Utrecht, Driebergen en Amersfoort, Six.; Zutphen, v. Eyndh.
- Sc. recurva* Löw. — D. N. 207. — 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Velzen, Jasp.; Amersfoort en Driebergen, v. Voll.
- Sc. flavitarsis* Zett. — D. N. 208. — Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Zwammerdam, 6, 8, 9, de M.; Empe, v. Eyndh.

Aspistes Meig.

- A. berolinensis* Meig. — D. N. 209. — 's Gravenh., 5 en 6, v. d. W.;
Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.; Bloemendaal en Zandvoort, de M.

Penthetria Meig.

- P. holosericea* Latr. — D. N. 211. — Roermond, een ♂, Latiers;
's Gravenhage, een ♀, Maitland.

Bibio Geoffr.

- B. pomonae* Fabr. — D. N. 213. — Venlo, v. d. Br.; Lochem, 6,
Winterswijk, 7, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.; Brummen, 6, v. Voll.
- B. marci* L. — D. N. 214. — In het voorjaar overal gemeen.
- B. hortulanus* L. — D. N. 214. — Venlo, v. d. Br.; Limburg en
Ulvenhoutsche bosch, Piag.; Walcheren, G. v. W.; Schouwen, 6, de
Man; 's Gravenh., in 't voorjaar, v. d. W.; Rotterd., Frans.; Vianen,
Everts; Haarlem, Weyenb.; Velzen, Jasp.; Empe, v. Eyndh.
- B. leucopterus* Meig. — D. N. 215. — Limburg, Maur.; 's Gra-
venhage, 5, v. d. W.; Bussum, 4, de M.
- B. reticulatus* Löw. — D. N. 216. — 's Gravenhage, 5, vroeger
gemeen, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.; Aerenhout bij Haarlem, Weyenb.;
Velzen, Jasp.; Bloemendaal 5 en Bussum, 4, de M.
- B. nigriventris* Hal. — D. N. 216. — Domburg, 5, de Man;
's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Aerenhout bij Haarlem,
Weyenb.; Velzen, Jasp.; Heemstede, v. Voll.
- B. clavipes* Meig. — D. N. 216. — 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden,
de Gr.; Empe, v. Eyndh.
- B. varipes* Meig. — D. N. 217. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.;
's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Leiden, Maitl.; in het Overmaassche,
Piag.; Bergen, 5, Jasp.; Bussum, 5, Oudem.; Utrecht, Six; Gelder-
land, v. Walch.
- B. johannis* L. — D. N. 217. — 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.;
Haarlem, Weyenb.; Vogelenzang en Overveen, 4, Rits.; Amsterdam,
4, 5, en Bussum, 4, de M.
- B. lacteipennis* Zett. — D. N. 218. — 's Gravenhage, 5 en 10,
v. d. W.
- B. ferruginatus* L. — D. N. 218. — 's Gravenhage, v. d. W.;
Rotterdam, Frans.; in een tuin te Amsterdam, 5, de M.
- B. laniger* Meig. — D. N. 219. — In het voorjaar op vele plaatsen
gemeen.
- B. hybridus* Hal. — D. N. 219. — 's Gravenhage, 5, een ♂, v. d. W.
- B. anglicus* Verrall. — Löw. Syst. Beschr. I. 22. — Doorn, Gunning.

Dilophus Meig.

- D. vulgaris* Meig. — D. N. 220. — In het voorjaar en weder in Augustus, overal zeer gewoon.
- D. femoratus* Meig. — D. N. 221. — 's Gravenhage, 5, 8, 9, v. d. W.; Nieuwkoop, 8, de M.; Zandvoort en IJmuiden, 8, de M.
- D. humeralis* Zett. — D. N. 222. — 's Gravenhage, 5, 9, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Gliphoeve bij Heemstede, 8, v. Voll.

CHIRONOMIDAE.

Ceratopogon Meig.

- C. bipunctatus* L. — D. N. 229. — Niet zeldzaam. 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, Sn.; Bodegraven, 7, de M.; Utrecht en Driebergen, Six; Zutphen en Empe, v. Eyndh.
- C. niger* Winn. — D. N. 230. — Middelburg, 6, en duinen Koudekerke, 8, de Man; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Rotterdam en in het Overmaassche, 5 en 6, Piag.; Overveen, 4, Weyenb.; Bussum, 6 en Diemen, 7, de M.; bij Amsterdam, 8, Kink.
- C. brevipennis* Macq. — D. N. 230. — Utrecht en Driebergen, 6, Six; Rozendaal bij Arnh., 8, v. d. W.; Beek bij Nijmegen, 6, Six.
- C. frutetorum* Winn. — D. N. 230. — Walcheren, G. v. W.; Haarlem, 9, Rits.; Buiksloot, 5, Kink.; Utrecht, 5 en 6, Six.
- C. murinus* Winn. — D. N. 231. — Maastricht, 8, Maur.; Middelburg, 6, de Man; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 7, de M.
- C. scutellatus* Meig. — D. N. 231. — Utrecht, 6, Six.
- C. pulicaris* L. — D. N. 232. — Vrij gemeen.
- C. fascipennis* Staeg. — D. N. 232. — Middelburg, 6, 9, de Man; Driebergen, 10, Six.
- C. pictipennis* Staeg. — D. N. 233. — Middelburg, 5, de Man; Utrecht, Amersfoort, 6, Six.
- C. varius* Winn. — D. N. 233. — Limburg, Maur.; Amsterdam, 11, Kink.; Utrecht, 5, Six.
- C. arcuatus* Winn. — D. N. 233. — Utrecht en Amersfoort, 5 en 6, Six; Zutphen, v. Eyndh.
- C. pumilus* Winn. — D. N. 234. — Maastricht, 8, Maur.; Utrecht, 5, een ♀, Six.
- C. rostratus* Winn. — D. N. 234. — Oosterwijk, 7, de M.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Bussum, 6, 9, de M.; Utrecht, Six; Heelsum, v. Voll.
- C. brunripes* Meig. — D. N. 235. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Utrecht, 4, Six.
- C. minutus* Meig. — D. N. 235. — Utrecht, 6, Six.
- C. pavidus* Winn. — D. N. 235. — Bij Amsterdam, 8, Kink.; Diemen, 7, de M.

- C. fuscus* Meig. — D. N. 235. — Utrecht, 6, Six.
- C. flavirostris* Winn. — D. N. 236. — Zutphen, 7, v. d. W.
- C. fulvus* Macq. — D. N. 236. — Nuth, 7, Maur.; bij Rotterdam, 6, v. d. W.; Bussum, 6, de M.; Utrecht en Amersfoort, Six.
- C. leucopeza* Meig. — D. N. 237. — Maastricht, 5, Maur.; 's Gravenhage, niet zeldzaam, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Amsterdam, Kink.; Diemen, 6, de M.; Utrecht, Six.
- C. nitidus* Macq. — D. N. 237. — Bunde, 7, Maur.; Venlo, 7, v. d. Br.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6 tot 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 6, 7, de M.; in het Overmaassche, Piag.; Utrecht, Six; Driebergen, v. Voll.
- C. femoratus* Fabr. — D. N. 238. — Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam en Hillegom, Kink.; Hilversum, 6, de M.; Utrecht en Amersfoort, Six; Vreeland, Kink.
- C. unimaculatus* Macq. — D. N. 239. — Bodegraven, 7, de M.; Utrecht en Amersfoort, 6 en 7, Six.
- C. spinipes* Panz. — D. N. 239. — Rotterdam, 6, Piag.
- C. fasciatus* Meig. — D. N. 240. — Breda, Heyl.; Middelburg, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, Grebner; Utrecht, Six.
- C. lineatus* Meig. — D. N. 240. — Mastbosch bij Breda, Piag.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdamsche plassen en in het Overmaassche, Piag.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Texel, Rits.; Driebergen, v. Voll.; Utrecht, Six en Wtt.; Wageningen, 7, v. d. W.
- C. flavicornis* Staeg. — D. N. 241. — Utrecht, 7, Six, een ♂.
- C. ornatus* Meig. — D. N. 242. — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Amsterdam, 5, v. d. W.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht, Amersfoort en Beek bij Nijmegen, Six.
- C. solstitialis* Winn. — D. N. 242. — 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Bodegraven, 5, 7, 8, de M.; Overveen, Diemen, 6, de M.; Utrecht, 8, Six.
- C. rubiginosus* Winn. — D. N. 242. — Nuth, 7, Maur.; Bodegraven, 8, de M.; Kortenhoef, de M.; Utrecht, 6 en 7, Six.
- C. venustus* Meig. — D. N. 243. — Plasmolen, Piag.; Bodegraven, 7 en Zwammerdam, 8, de M.; Overveen, Weyenb.; Utrecht, Six.
- C. bicolor* Meig. — D. N. 243. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, Piag.

Corynoneura Winn.

- C. scutellata* Winn. — D. N. 245. — Driebergen, Six.
- C. pumila* v. d. W. — D. N. 245. — Den Haag, 4, v. d. W.

Chironomus Meig.

- Ch. plumosus L. — D. N. 250. — Zeer gemeen, vooral in het voorjaar.
- Ch. prasinus Meig. — D. N. 250. — 's Gravenh., niet zeldzaam in de duinen, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Warmond en Lisse, v. Bemm.; Amsterd., Kink. en de M.; Diemen, 5, de M.; Utrecht, Six; Groning., de Gav.
- Ch. ferrugineovittatus Zett. — D. N. 251. — 's Gravenhage, v. d. W.; Schielandsche plassen, Piag.; Amsterdam, Kink.; Diemen, 5, en Durgerdam, 7, de M.; Velzen, Jasp.; Zutphen, v. Eyndh.
- Ch. aprilinus Meig. — D. N. 251. — Limburg, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, soms in aantal, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Amsterdam, Grebn. en Sw.; Durgerdam, 7, de M.; Helder, 8, de M.; Haarlem, Weyenb.; Zutphen, v. d. W.; Lekkuum, in Friesland, H. A.
- Ch. flaveolus Meig. — D. N. 252. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Amsterdam, Kink.; Zutphen, v. Eyndh.
- Ch. barbipes Staeg. — D. N. 252. — Amsterdam, 5, 6 en 9, Kink. en de M.; eens aldaar in groot aantal, v. d. W.; Haarlem, Weyenb.; Nieuwediep, 8, in aantal tegen vensterruiten, de M.
- Ch. annularis de G. — D. N. 253. — Zeer gemeen.
- Ch. riparius Meig. — D. N. 253. — Zeer gemeen.
- Ch. viridicollis v. d. W. — D. N. 254. — Haagsche en Wasse-naarsche duinen, v. d. W.
- Ch. tentans Fabr. — D. N. 255. — Venlo, v. d. Br.; Oisterwijk, 7, de M.; Koudekerksche duinen, 9, de Man; 's Gravenhage gemeen; in het Westland, v. d. W.; Rotterdam, Piag. en Frans.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam, Kink.; Bussum, 5, de M.; Terschelling, Rits.; Groningen, de Gav.
- Ch. dorsalis Meig. — D. N. 255. — Gemeen.
- Ch. chloris Meig. — D. N. 256. — Zeeland, Wtt.; 's Gravenhage, in 't voorjaar gewoon, v. d. W.; Bodegraven, 4, de M.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, Piag.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam, Kink. en de M.; Kortenhoeft, 5, de M.; Zeist, 4, de M. en Kink.; Voorst, Wtt.; Groningen, de Gav.
- Ch. dispar Meig. — D. N. 257. — 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Rotterdamsche plassen, 8, Piag.; Kuilenburg, de M.
- Ch. albipennis Meig. — D. N. 257. — Rotterdam, 5, Piag.; Hillegom, Kink.; Hilversum, 5, de M.; Leeuwarden, H. A.
- Ch. tendens Fabr. — D. N. 257. — Wassenaarsche duinen, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, Jasp.; Bloemendaal, 9, de M.; Utrecht, Six.; Voorst, Wtt.; Doesburg, de Gav.
- Ch. psittacinus Meig. — D. N. 258. — Maastricht, 7, Maur.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Lisse, 5, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Utrecht, Six.
- Ch. viridis Macq. — D. N. 258. — Op vele plaatsen gemeen.

- Ch. biannulatus* Staeg. — D. N. 259. — 's Gravenhage, een ♀, v. d. W.; Driebergen, een ♂, Six.
- Ch. pedellus* de G. — D. N. 259. — Op vele plaatsen vrij gemeen.
- Ch. prasinatus* Staeg. — D. N. 260. — Bergen-op-Zoom, 7, de M.; Rotterdamsche plassen, 6, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Amsterdam, 5, de M.; Zutphen, 8, v. Eyndh.
- Ch. nigrimanus* Staeg. — D. N. 261. — Middelburg, 7, de Man; Rotterdamsche plassen, 6, Piag.; 's Gravenh., 5, v. d. W.; Utrecht, Wtt.
- Ch. brevitibialis* Zett. — D. N. 261. — Limburg, Maur.; Rijen, 6, Piag.; bij 's Gravenhage gewoon, v. d. W.; Rotterd. en Voorschoten, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem, Weyenb.; Kortenhoef, 5, de M.; Utrecht, Six.
- Ch. tricolor* v. d. W. — D. N. 262. — Plasmolen, 6, 8, Piag. en v. d. W.; Hilversum, 7, v. d. W.
- Ch. paganus* Meig. — D. N. 262. — 's Gravenhage en Wassenaarsche duinen, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Hillegom, Kink.
- Ch. monochromus* v. d. W. — D. N. 262. — Wassenaar, v. d. W.
- Ch. blandus* v. d. W. — D. N. 263. — Utrecht, 8, Six; Beek, 5, Six; Zutphen, v. Eyndh.
- Ch. pusillus* L. — D. N. 263. — Zeeland, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Utrecht, Six.
- Ch. viridulus* L. — D. N. 263. — 's Gravenhage en Wassenaar, soms in groot aantal, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Bodegraven, 8, de M.; Buiksloot, Kink.
- Ch. virescens* Meig. — D. N. 264. — 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Wassenaar, v. Voll.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 7, de M.; Utrecht, Six.
- Ch. flexilis* L. — D. N. 264. — Rotterdam, v. Voll. en Schuyt; Gelderland, v. Walchr. en v. Eyndh.; Kuilenburg, de M.
- Ch. rufipes* L. — D. N. 265. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Middelburg, de Man; Rotterdam, v. d. W.; Leiden, v. Eyndh. en Rits.; Bodegraven, 5, 7 en 8, de M., vrij gemeen; Amsterdam, Oudem.; Abcoude, Kink.; Utrecht, Six, Wtt.; Zutphen, v. Eyndh.
- Ch. marmoratus* v. d. W. — D. N. 266. — Bodegraven, 7, de M.; Utrecht, 7 en 8, Six.
- Ch. scalaenus* Schrank. — D. N. 266. — Maastricht, 8, Maur.; Rotterdam, Frans.; Utrecht, 5, Six; Empe, v. Eyndh.
- Ch. trinotatus* v. d. W. — D. N. 267. — Utrecht, 5, Six.
- Ch. histrio* Fabr. — D. N. 267. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Zutphen, v. Eyndh.; Kuilenburg, 7, de M.
- Ch. pictulus* Meig. — D. N. 267. — Utrecht, 5, Six; Kuilenb., 7, de M.
- Ch. fasciatus* Meig. — D. N. 268. — Utrecht, v. Voll.
- Ch. albimanus* Meig. — D. N. 268. — Plasmolen, 6, 8, Piag.; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Utrecht, Six.

- Ch. nubilus* Meig. — D. N. 268. — Rotterdam, Frans. en Piag.; in het Overmaassche, Piag.; Bodegraven, 7, 8, de M.
- Ch. niveipennis* Fabr. — D. N. 269. — 's Gravenhage, duinen, v. d. W.; Glyphoeve, 4, v. Voll.; Beek, Six.
- Ch. nubeculosus* Meig. — D. N. 269. — 's Gravenhage, 4—9, v. d. W.; Rotterdam, Sn., Frans. en Piag.; Leiden, v. Voll.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem en Overveen, Weyenb.; Utrecht, Wtt. en Six; Zutphen, v. Eyndh.
- Ch. laetus* Meig. Syst. Besch. I. 38. — Maastricht, 8, 10, Maur.

Cricotopus v. d. W.

- Cr. tibialis* Meig. — D. N. 271. — 's Gravenhage, v. d. W.; Bodegraven, 6, de M.; Utrecht, v. Voll.; Driebergen, Six.
- Cr. bicinctus* Meig. — D. N. 271. — 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Utrecht, 4 en 5, Six; Zutphen, v. Eyndh.
- Cr. tricinctus* Meig. — D. N. 272. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Utrecht en Driebergen, nog in October, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- Cr. annulipes* Meig. — D. N. 273. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenh., 4—6, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Amsterdam, 4, de M.; Aerenhout bij Haarlem, Weyenb.; Utrecht, Six.
- Cr. motitator* L. — D. N. 273. — Limburg, Maur.; Middelburg, de Man; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Rotterdam en het Overmaassche, Piag.; Utrecht, Six.
- Cr. unifasciatus* Macq. — D. N. 273. — Rotterd., Piag.; Utrecht, 5, Six.
- Cr. oscillator* Meig. — D. N. 274. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Amsterdam, Jasp.
- Cr. sylvestris* Fabr. — D. N. 274. — Gemeen.
- Cr. ornatus* Meig. — D. N. 275. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6, v. Voll.; Schielandsche plassen, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; bij Amsterdam, Kink.; bij Kampen, v. Voll.

Camptocladius v. d. W.

- C. byssinus* Schrank. — D. N. 276. — Limburg, Maur.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 4—9, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Leiden, v. Voll.; Amsterdam, 6, de M. en 9, Jasp.; Overveen, Weyenb.; Maarsbergen, v. d. W.; Utrecht, Six; Zutphen, v. d. W.
- C. aterrimus* Meig. — D. N. 276. — Limburg, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage en Wassenaar, v. d. W.; Rotterdam, Sn.; Zwammerdam, 9, de M.; Haarlem, Rits.; Amsterdam, 8, de M.; Zeist, 4, de M.; Utrecht, Six.
- C. minimus* Meig. — D. N. 277. — Limburg, Maur.; Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 7, de M.; Amsterdam, 5, 9, Jasp.; Utrecht, Six.

Orthocladius v. d. W.

- O. dilatatus* v. d. W. — D. N. 278. — Venlo, 6, de M.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 5, 8, de M.
- O. stercorarius* de G. — D. N. 279. — Middelburg, de Man; Rotterdam in het Overmaassche, Piag.; Amsterd., 10, Kink.; Driebergen, Six.
- O. diversus* v. d. W. — D. N. 279. — Walcheren, G. v. W.; Overveen, Weyenb.; Utrecht, 4 en 5, Six.
- O. pygmaeus* Meig. — D. N. 279. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.
- O. nanulus* v. d. W. — D. N. 280. — Limburg, Maur.; Walcheren, G. v. W.; Schielandsche plassen, 8, Piag.; Bodegraven, 7, de M.
- O. sordidellus* Zett. — D. N. 280. — In het Overmaassche, 6, Piag.; Amsterdam, 5, Weesp, 6, Kortenhoef, 5, de M.
- O. nigri ventris* v. d. W. — D. N. 281. — Walcheren, G. v. W.; Rotterdam, Piag.; Buiksloot, Kink.; Utrecht, Six.
- O. albinervis* v. d. W. — D. N. 281. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, Six; Utrecht en Driebergen, 10, Six.
- O. thoracicus* Meig. — D. N. 281. — Limburg, Maur.; Rotterdam, 6, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Diemen, 6, de M.
- O. ietericus* Meig. — D. N. 282. — Limb., Maur.; Amersf. 6, Six.

Tanytarsus v. d. W.

- T. punctipes* Wied. — D. N. 283. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Amsterdam, 9, de M.; Utrecht, 7, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- T. danicus* v. d. W. — D. N. 284. — Leiden, 6, v. Voll.
- T. flavipes* Meig. — D. N. 284. — Limburg, Maur.; Rotterdam, 5, 7 en 9, Sn., Piag. en Frans.; Bodegraven, 7, de M.; Helder, 8, de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Driebergen, in het najaar, Six; Zutphen, 7, v. d. W.
- T. sylvaticus* v. d. W. — D. N. 285. — Haagsche bosch, 3, v. d. W.
- T. gmundensis* Egg. — D. N. 285. — Maastricht, 9, Maur.; Hoek v. Holland, 9, Piag.
- T. sordens* v. d. W. — D. N. 286. — 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Rotterdamsche plassen, Piag.; Overveen, 9, de M.; Zutphen, 7, v. d. W.
- T. signatus* v. d. W. — D. N. 286. — Driebergsche bosch, 10, Six.
- T. pusio* Meig. — D. N. 287. — Limburg, Maur.; Schoorl, Jasp.; Utrecht en Driebergen, 4 en 10, Six.
- T. junci* Meig. — D. N. 287. — Limburg, Maur.; Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 4 en 10, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdamsche plassen, 8, Piag.; Driebergen, in 't najaar, Six.
- T. albipes* Meig. — D. N. 287. — Driebergen, in 't najaar, Six.
- T. tenuis* Meig. — D. N. 288. — Maastricht, 8, 9, Maur.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Haarlem en Overveen, 4 en 5, Weyenb.; Utrecht, 5 en Driebergen, 10, Six.

- T. flavellus* Zett. — D. N. 288. — Maastricht, 8, Maur.; 's Gravenhage, Six; Driebergen, 10, Six.
T. vernus Meig. Syst. Besch. I. 40. — Limburg, Maur.
T. hilarellus Zett. Dipt. Scand. IX. 3584. — Limburg, Maur.

Eurynemus v. d. W.

- E. elegans* Meig. — D. N. 289. — Heelsum, 6, v. Voll.; Arnhem, v. M. d. R., telkens een ♂.

Metriocnemus v. d. W.

- M. albolineatus* Meig. — D. N. 290. — Bodegraven, 8, 9, de M.; Amsterdam, 9, Jasp. en 4, de M.; Utrecht, Six.
M. fuscipes Meig. — D. N. 291. — Limburg, Maur.; Walcheren, de Man en G. v. W.; 's Gravenh., zeer gewoon, v. d. W.; Rotterdam, Piag. en Frans.; Leiden, v. Voll.; Haarlem, Weyenb.
M. incomptus Zett. — D. N. 291. — 's Gravenhage, 4 en 8, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.; Utrecht, 7, Six.
M. nanus Meig. — D. N. 292. — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 5 en 9, v. d. W.
M. pallidulus Meig. — D. N. 292. — 's Gravenh., 9, v. d. W.
M. ochraceus v. d. W. — D. N. 292. — Utrecht, Six.

Diamesa Meig.

- D. notata* Staeg. — D. N. 294. — Maastricht, 7, 8, Maur.; Hoek v. Holland, 9, Piag.
D. Gaedii Meig. — D. N. 294. — Driebergsche bosch, een ♂, Six.

Tanypus Meig.

- T. nervosus* Meig. — D. N. 297. — Venlo, 6, 7, v. d. Br.; Plas-molen, 8, Piag.; Mastbosch bij Breda, 6, Piag.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage en Wassenaarsche duinen, v. d. W.; Schielandsche plassen, Frans.; in het Overmaassche, Piag.; Utrecht, v. d. W.; Amersfoort, Six; Weesp, 6, de M.; Kuilenburg, 7, de M.
T. rufovittatus v. d. W. — D. N. 298. — Schielandsche plassen, 6, Piag.
T. punctipennis Meig. — D. N. 298. — 's Gravenhage, 6 en 9, gemeen, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Bodegraven, 6—9, de M.; Velzen, Jasp.; Hilversum, 6, de M.; Utrecht, Six; Kuilenburg, 6, 7, de M.
T. culiciformis L. — D. N. 299. — Niet zeldzaam, 's Gravenhage, 4 tot 6, v. d. W.; Rotterdam, Schielandsche plassen en in het Overmaassche, Piag.; Bodegraven, 5, de M.; Diemen, 6 en Amsterdam, 9, de M.; Schoorl, Jasp.; Amersfoort, v. Voll.

- T. choreus* Meig. — D. N. 299. — 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Rotterdam, Sn.; Amsterdam, Kink.; Utrecht, Six en Wtt.; Maarsbergen, 6, Piag.
- T. signatus* Zett. — D. N. 300. — Lisse, Piag.; Bussum, 6, de M.; Utrecht, Six; Steenwijk, Jasp.
- T. plumipes* Fries. — D. N. 300. — Jaren geleden eens in groot aantal op eene plek in het Haagsche bosch, 3, v. d. W.
- T. praecox* Meig. — D. N. 301. — Maastricht, 8, 9, Maur.
- T. elegantulus* v. d. W. — D. N. 302. — Beek, het ♂, Six.
- T. monilis* L. — D. N. 302. — Breda, 6, Sn.; 's Gravenh., v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Bodegraven, 5, 7, 8, niet zeldzaam, de M.; Schoorl, 5 en Beverwijk, 7, Jasp.; Haarlem, Weyenb.; Hilversum, 6, de M.; Heemstede, v. Voll.; Utrecht en Driebergen, Six; Maarsbergen, Piag.; Empe, v. Eyndh.; Groesbeek, 7, de M.
- T. guttipennis* v. d. W. — D. N. 302. — Eens in aantal in de duinen bij den Haag, v. d. W.; Nieuwkoop, 7, een ♀, de M.
- T. nebulosus* Meig. — D. N. 303. — Eens het ♂ bij Amsterdam, 6, Kink.
- T. varius* Fabr. — D. N. 303. — Gemeen.
- T. punctatus* Fabr. — D. N. 304. — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, v. d. W.; Utrecht, Six; Gelderland, v. Walchr.
- T. ornatus* Meig. — D. N. 304. — Maastricht, 8, Maur.; Middelburg, 5, de Man; Bodegraven, 5, de M.; Aerenhout bij Haarlem, 10, Kink.; Kuilenburg, 7, de M.
- T. carneus* Fabr. — D. N. 304. — Venlo, 6, de M.; Apeldoorn, 7, v. d. W.; Beek, Six; Brummen, v. Voll.
- T. ferruginicollis* Meig. — D. N. 305. — Maastricht, 5, 8, Maur.; 's Gravenhage en Wassenaarsche duinen, meermalen het ♂, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Kortenhoef, de M.; Kuilenburg, 7, de M.
- T. griseipennis* v. d. W. — D. N. 305. — 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Amersfoort, v. d. W.; Zutphen, v. Eyndh.
- T. pygmaeus* v. d. W. — D. N. 306. — Driebergsche bosch, 10, Six.
- T. melanurus* Meig. — D. N. 306. — Utrecht en Driebergen, 5 en 6, Six; Maarsbergen, 6, v. d. W.
- T. melanops* Meig. — D. N. 306. — Hillegersberg, 6, v. d. W.; Driebergsche bosch, 5, Six.

Hydrobaenus Fries.

- H. lugubris* Fries. — D. N. 308. — Bij den Haag eens in verband aantal op overstroomde weilanden, v. d. W.

Macropeza Meig.

- M. albitarsis* Meig. — D. N. 309. — Brummen, 7, v. Walchr. en v. Voll.

PSYCHODIDAE.

Psychoda Latr.

- P. sexpunctata* Curt. — D. N. 314. — Zeer gemeen.
P. humeralis Meig. — D. N. 315. — Maastricht, 7, 9, Maur.;
 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Haarlem, Weyenb.
P. phalaenoides L. — D. N. 315. — Zeer gemeen.
P. albipennis Zett. — D. N. 315. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.;
 Amsterdam, 10, Kink.

Ulomyia Walk.

- U. fuliginosa* Meig. — D. N. 316. — Nuth, 6, Maur.; Venlo, 5,
 v. d. Br.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.

Pericoma Walk.

- P. palustris* Meig. — D. N. 317. — Nuth, 6, Maur.; 's Gravenhage, v. d. W.; Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.
P. calceata Meig. — D. N. 318. — Rotterd., Piag.; Amsterd., Jasp.
P. fusca Macq. — D. N. 318. — 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Beverwijk, 6, Jasp.; op Sterkenburg bij Driebergen, v. Voll.
P. ocellaris Meig. — D. N. 318. — Maastricht, 8, Maur.; Middelburg, 7, de Man; Haagsche bosch, 4 tot 6, en Schielandsche plassen, v. d. W.; Wassenaar, 4, v. Voll.
P. magnicornis v. d. W. — D. N. 319. — Limburg, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.
P. canescens Meig. — D. N. 319. — Amby, 5, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; 's Gravenhage en Schielandsche plassen, v. d. W.
P. tristis Meig. — D. N. 319. — Venlo, 5, v. d. Br.; Plasmolen, 8, Piag.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Wassenaar en Schipluiden, Piag.; Beek, v. Voll.
P. nubila Meig. — D. N. 320. — Plasmolen, 6, Piag.; Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, gemeen, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam en in het Overmaassche, Piag.; Aerenhout bij Haarlem, Weyenb.

Trichomyia Curt.

- Tr. urbica* Curt. — D. N. 321. — Leeuwarden, 7, een ♀, H. A.

CULICIDAE.

Culex L.

- C. annulatus* Schrank. — D. N. 324. — Zeer gemeen in het najaar.
C. dorsalis Meig. — D. N. 325. — Bergen-op-Zoom, 8, Sn.; Vogelenzang, duinen, Kink.; Brummen, 8, v. Voll.

- C. vexans* Meig. — D. N. 325. — 's Gravenhage, een ♂, v. d. W.
- C. cantans* Meig. — D. N. 326. — Venlo, 6, de M.; Zeeland, Wtt.; 's Gravenhage, 6, en Leiden, v. d. W.; Noordwijk en in het Overmaassche, Piag.; Utrecht, Wtt.; Zutphen, v. d. W.; in het voormalige Beekbergerwoud bij millioenen, v. Voll.
- C. annulipes* Meig. — D. N. 326. — Rijen, 5, Piag.; bij Goes, 7, v. Voll.; Bodegraven, 7, de M.; Rockanje, Piag.; op Texel, Rits.; Diemen, 5, 7, de M.; Kuilenburg, 7, de M.
- C. ornatus* Meig. — D. N. 327. — Venlo, 6, de M., een ♀; Ulvenhout, 5, Piag.; Amsterdam, 6, een ♂, de M.; Driebergen, Six, een ♀.
- C. nemorosus* Meig. — D. N. 327. — Venlo, 5, v. d. Br.; Limburg, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, Piag.; Bodegraven, 5, 7, de M., niet zeldzaam; Hilversum, 5, Overveen, 5 en Diemen, 8, de M.
- C. lateralis* Meig. — D. N. 328. — Aan de Vuursche, 7, een ♀, v. d. W.
- C. pipiens* L. — D. N. 328. — Overal zeer gemeen.
- C. ciliaris* L. — D. N. 329. — Limburg, Maur.; Goes, v. Voll.; 's Gravenhage, v. d. W.; Brummen, 8, v. Voll.

Anopheles Meig.

- A. maculipennis* Meig. — D. N. 330. — Gemeen.
- A. bifurcatus* L. — D. N. 331. — Maastricht, 9, Maur.; Venlo, 9, v. d. Br.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam en het Overmaassche, Piag.; Overveen, 9, de M.; Kortenhoef, 5, de M.; Utrecht, Wtt.; Arnhem, v. M. de R.; Kuilenburg, 7, de M.
- A. nigripes* Staeg. — D. N. 331. — 's Gravenhage, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.

Aedes Meig.

- A. cinereus* Meig. Syst. Besch. I. 13. — Mastbosch bij Breda en Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.

Corethra Meig.

- C. pallida* Fabr. — D. N. 332. — Plasmolen, 8, Piag.; 's Gravenhage, 5, 6, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 7, de M.; Linschoten, 8, de M.; Maarsbergen, v. d. W.; Brummen, v. Voll.; Kuilenburg, 7, de M.
- C. plumicornis* Fabr. — D. N. 332. — Zeer gemeen.
- C. obscuripes* v. d. W. — D. N. 333. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Bloemendaal, 5, de M.; Kuilenburg, 7, de M.

TIPULIDAE.

Dixa Meig.

- D. aestivalis* Meig. — D. N. 342. — 's Gravenhage, 10, v. d. W.; Driebergen, Six.; Rozendaal, 8, de M., telkens een exemplaar.

- D. nigra* Staeg. — D. N. 342. — Bussum, 7, de M.; Utrecht, 4, Wtt.; Kuilenburg, 7, de M.; telkens een exemplaar.
- D. aprilina* Meig. Syst. Besch. I. 218; Schin. Fn. austr. II. 642. — Middelburg, 10, een ♂, de Man.
- D. maculata* Meig. Syst. Besch. I. 219; Schin. Fn. austr. II. 642. — Plasmolen, 8, een ♂, Piag.

Ptychoptera Meig.

- Pt. albimana* Fabr. — D. N. 343. — Zeer gemeen.
- Pt. scutellaris* Meig. — D. N. 344. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, niet zeldzaam, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Wassenaar, v. Bemm.; Bodegraven, 7 en 8, Nieuwkoop, 8, Bergen, 7, en Helder, 8, de M.; Driebergen, v. d. W.; Amersfoort, Kink.
- Pt. contaminata* L. — D. N. 344. — Zeer gemeen.
- Pt. lacustris* Meig. — D. N. 345. — Maastricht, 6, Maur.; Venlo, v. d. Br.; Empe, v. Eynth.; de Steeg, de M.

Dolichopeza Curt.

- D. sylvicola* Curt. — D. N. 346. — Plasmolen, 8, Piag.; Galdersche heide bij Breda, Rits.; Haagsche bosch, v. d. W.; Driebergen, Six; Baarnsche bosch, 5, de M.; Brummen, v. Voll.; Empe, v. Eynth.; Beekhuizen, 6, Rits.

Dictenidia Brullé.

- D. bimaculata* L. — D. N. 348 (*Otenophora*). — Vrij gemeen; bijna in alle provinciën gevonden.

Xiphura Brullé.

- X. atrata* L. — D. N. 349 (*Otenophora*). — Venlo, 6, v. d. Br.; Mastbosch bij Breda, 5, Piag.; Domburg, 6, de Man; Leiden, 6, v. Voll.; Rotterdam, G. H.; Woerden, de Gr.; Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.; Beverwijk, 6, Jasp.; Linschoten, de M.; Loenen (Utrecht), de M. — De var. *ruficornis* Meig. (D. N. 349) Maastricht, Maur.; Middelburg, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 5, de M.; Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.; Overveen, Weyenb.; Haarlemmerhout, de M.

Otenophora Meig.

- Ct. pectinicornis* L. — D. N. 350. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën gevonden.
- Ct. guttata* Meig. — D. N. 350. — Rotterdam, 5, een ♀, Piag.
- Ct. flaveolata* Fabr. — D. N. 351. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Middelburg, de Man en G. v. W.; Zierikzee, 5, Fokker; Rotterdam, Frans.; Leiden, v. Voll.; Bodegraven, 5, soms in aantal, de M.; Amsterdam, v. d. W.; Utrecht, Six.

- C. festiva* Meig. — D. N. 351. — Limburg, Maur.; Breda, Burgersdijk; Driebergen, Six en v. Bemm.; Gelderland, v. Walchr.; Putten, 6, Oudem. Telkens een exemplaar.
- C. elegans* Meig. — D. N. 352. — Rotterdam, G. H.; Voorst, 6, v. Voll.; Arnhem, 5, v. M. d. R.; Oosterbeek, 6, Rits.; Apeldoorn, 6, de Vos; Laag Soeren, 6, v. d. W. Telkens een exemplaar.

Tipula L.

- T. gigantea* Schrank. — D. N. 357. — Limburg, Maur.; Sittard, 5, Schuyt; Wassenaar, 5, de Gr.; Aerenhout bij Haarlem, Weyenb.; Utrecht, Six; Putten (Geld.), 6, Oudem., verscheidene exempl.; de Steeg, 6, de M.
- T. fulvipennis* de G. — D. N. 357. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Haagsche bosch, v. d. W.; Vogelenzang, v. d. W.; Haarlem, Weyenb.; Amersfoort, v. Voll.; Linschoten, de M.; aan de Vuursche, v. d. W.; Brummen, v. Voll.; Ede, Maitl.; Putten (Geld.), 8, verscheidene exemplaren, Oudem.
- T. vittata* Meig. — D. N. 358. — Venlo, v. d. Br.; Breda, Heyl.; Rijen, 5, en Ulvenhout, 5, Piag.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Leiden en Wassenaar, de Gr.; Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.; Haarlem, Rits.; Hilversum, 4, de M.; Utrecht, Six; Ede, Maitl. en Kink.
- T. truncorum* Meig. — D. N. 358. — Mastbosch bij Breda, 6, Piag.; Wassenaar, 8, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Schielandsche plassen, 6, v. d. W.; Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.; Bussum, 6, Versl.; Valkeveen, 7, v. d. W.; Zeist, Kink.; Lochem, de M.; Putten (Geld.), 6, Oudem.; Arnhem, v. M. d. R.
- T. pabulina* Meig. — D. N. 359. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Hillegom, Kink.; Bloemendaal, 5, en Bussum, 4, de M.; Utrecht, Six.
- T. scripta* Meig. — D. N. 359. — Gemeen.
- T. hortensis* Meig. — D. N. 360. — Valkenburg, 6, Piag.; Ulvenhout, 6, Piag.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.; Bloemendaal, Weyenb.
- T. longicornis* Schumm. — D. N. 360. — Venlo, 6, v. d. W.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Driebergen, v. d. W.; Utrecht, Six; Linschoten, 8, de M.; Kuilenb., 7, en de Steeg, 6, de M.
- T. varipennis* Meig. — D. N. 361. — Limburg, Maur.; Rijen, 5, Piag.; 's Gravenhage, 5 en 6, gemeen, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Noordwijk, Piag.; Bodegraven, 5, de M.; Haarlem, Weyenb.; Kortenhoeve, 5, en Bussum, 4, de M.; Utrecht, Six; Groningen, de Gav.; Driesum, H. A.
- T. hortulana* Meig. — D. N. 362. — Houthem, 6, Versl.; 's Gravenhage, 5 en 6, gemeen, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Kortenhoeve, 5, en Bloemendaal 5, de M.; Amsterdam, Kink.; Groningen, v. Hall.
- T. irrorata* Macq. — D. N. 362. — Venlo, 5, v. d. Br.; 's Graven-

- hage, niet zeldzaam in het Haagsche bosch, 6 tot 8, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Rotterdam, 5, Schuyt; Bodegraven, 7, de M.; Amsterdam, Kink. en de M.; Lochem, 6, de M.
- T. marmorata* Meig. Syst. Besch. I. 179; Zett. Dipt. Scand. X. 3931 (Syn. *T. obsoleta* v. d. W. — D. N. 363). — Venlo, 7, v. d. Br.; Breda, Heyl.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Vreeland, 10, Jasp.; Groningen, Cl. M.
- T. anonyma* Bergr. Wien. Ent. Ztg. VIII. p. 119 (Syn. *T. marmorata*, D. N. 363 — en *confusa* v. d. W. Tijdschr. v. Entom. XXVI. 117). — Venlo, v. d. Br.; Limburg, Maur.; Haagsche bosch, jaarlijks in Sept., v. d. W.; bij Amsterd., Kink.; Hilvers., 10, de M.; Velzen en Schoorl, 9, Jasp.; Soest, Kink.; Utrecht, Six; Zeist, de Gr.
- T. signata* Staeg. — D. N. 364. — Haagsche bosch, jaarlijks in Oct., vrij gemeen, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Rotterdam en Noordwijk, Piag.; Driebergen, Six; de Bilt, Weyenb., steeds in Oct.
- T. lateralis* Meig. — D. N. 364. — Gemeen, bijna in alle provinciën.
- T. vernalis* Meig. — D. N. 365. — In Mei en Juni gemeen, uit de meeste provinciën vermeld.
- T. pagana* Meig. — D. N. 366. — Limburg, Maur.; Driebergsche bosch, 8, het ♂, Kink.; Empe, v. Eyndh., het ♂.
- T. oleracea* L. — D. N. 366. — Zeer gemeen, meest in Mei en Juni.
- T. paludosa* Meig. — D. N. 367. — Zeer gemeen, vooral in Augustus en September.
- T. nigra* L. — D. N. 368. — Oisterwijk, 7, de M.; Dinther, 7, de Man; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, Wassenaar; Voorburg, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, Frans; Bodegraven, 7, 8, de M.; Diemen, 7, de M.; Abcoude, Kink.; Utrecht, Six; Driebergen, v. Voll.; Linschoten, 8, de M.; Laag Soeren, 6, Oudem.; Kuilenburg, 7, de M.
- T. nodicornis* Meig. — D. N. 368. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6–8, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Noordwijk, Kink.; duinstreek bij Haarlem, 5 tot 9, Weyenb., de M.; Hilversum, 6, en Bergen, 7, de M.; Utrecht, Six.
- T. flavolineata* Meig. — D. N. 368. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Hilversum, 6, de M.; Utrecht, Six; Lochem, 6, de M.; Velp, 7, v. d. W. Telkens slechts een exemplaar.
- T. pruinosa* Wied. — D. N. 369. — Oud-Vroenhoven, 7, en Nuth, 7, Maur.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, en Wassenaar, v. d. W.; Bodegraven, 5 tot 7, de M.; Utrecht, v. d. W.; Driebergen, v. Voll.; Zutphen, v. Eyndh.; Kuilenburg, 7, en Lochem, 6, de M.
- T. livida* v. d. W. — D. N. 370. — 's Gravenhage, 6 en 7, jaarlijks vrij gemeen in het Haagsche bosch, v. d. W.; Vogelenzang, 7, Piag.
- T. lunata* L. — D. N. 370. — Gemeen, uit Limburg, Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Groningen vermeld.
- T. Diana* Meig. — D. N. 371. — Rijen, 5, Piag.; Oisterwijk, 7, de

- M.; 's Gravenh., 4, 7, 8 en 10, v. d. W.; Rotterd., Piag.; Bodegraven, 5, de M.; Bussum, 4, de M.; Heilo, 7, de M.; Kortenhoef, 5, de M.; Baarn, 5, de M.; Groningen, de Gav.
- T. luteipennis* Meig. — D. N. 371. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Driebergen, 8, een ♂, v. d. W.
- T. Selene* Meig. — D. N. 372. — Venlo, 7, v. d. Br.; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Utrecht, Six.
- T. fascipennis* Meig. — D. N. 372. — Venlo, 6, de M.; 's Gravenh., 6 tot 8, v. d. W.; Wassenaar, Piag.; Heilo, 6, en Bussum, 7, de M.; Apeldoorn, 6, Oudem.; Lochem, 6, de M.
- T. ochracea* Meig. — D. N. 373. — Gemeen.
- T. peliostigma* Schumm. — D. N. 373. — Mastbosch bij Breda, v. d. W.; Wageningen, 7, v. d. W.
- T. caesia* Schumm. Besch. Schles. Tipul. 65; Schin. Fn. austr. II. 516. — Bunde, 6, een ♂, Maur.
- T. marginata* Meig. Syst. Besch. I. 173; Schin. Fn. austr. II. 517. — Plasmolen, 8, Piag.; Venlo, v. d. Br.; Rijen, 6, Piag.; Bodegraven, 7, de M.

Pachyrrhina Macq.

- P. annulicornis* Meig. — D. N. 375. — Valkenburg, Piag.; Ulvenhout, 6, Piag.; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Noordwijk, v. Voll.; Overveen, Grebn.; Haarlemmerhout, Weyenb.; in het Gooi, 4 en 5, de M.; Ede, Kink.; Empe, v. Eyndh.; de Steeg, 6, de M.
- P. crocata* L. — D. N. 376. — Herhaaldelijk aangetroffen in bijna alle provinciën.
- P. pratensis* L. — D. N. 377. — Zeer gemeen, in Mei en Juni.
- P. imperialis* Meig. — D. N. 377. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bussum, 7, de M.
- P. flavipalpis* Meig. — D. N. 377. — Haagsche bosch, 7, v. d. W.; Wassenaar, v. Bemm.
- P. lunulicornis* Schumm. — D. N. 378. — Oosterwijk, 7, de M.; 's Gravenhage, 6—8, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Amsterdam, 6, Jasp.; Empe, v. Eyndh.; Kuilenburg, 7, de M.; Groesbeek, 7, de M.; Groningen, de Gav.
- P. quadrifaria* Meig. — D. N. 378. — Amby en Limmel, 6, Maur.; Bergen-op-Zoom, 7, de M.; in Noord- en Zuid-Holland op verscheidene plaatsen; Linschoten, 8, de M.
- P. analis* Schumm. — D. N. 379. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën gevonden.
- P. cornicina* L. — D. N. 380. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, v. Voll.; Bodegraven, 7, de M.; Ridderkerk, 7, de M.; Linschoten, 8 de M.; Kuilenburg, 7, de M.; Arnhem, 8, v. d. W.; Zutphen, v. Eyndh.; Harenderdijk, de Gav.

- P. scurra* Meig. — D. N. 380. — Op droge gronden niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.
P. maculosa Meig. — D. N. 381. — Gemeen.
P. histrio Fabr. — D. N. 382. — Zeer gemeen en verspreid.

Nephrotoma Meig.

- N. dorsalis* F. — D. N. 383. — Limburg, Maur.; 's Gravenh., v. d. W.; Rotterdam, v. Voll.; Ridderkerk, 7 en Bodegraven 7, de M.; Overveen, Piag.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam en Velzen, 7, Jasp.; Nijmegen, v. d. W.; Putten (Geld.), 7, Oudem.; Lochem 6, en Kuilenburg, 7, de M.; aan den Harendermolen, 7, de Gav.

Dicranomyia Steph.

- D. dumetorum* Meig. — D. N. 402 (*Limnobia*). — Limburg, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; Oisterwijk, 7, de M.; Lisse, 8, de M.; 's Gravenhage, 6 tot 8, v. d. W.; Hilversum 6 en Bloemendaal, 8, de M.; Vogelenzang, v. d. W.; Utrecht, Six; Groesbeek, 7, de M.
D. didyma Meig. — D. N. 402 (*Limnobia*). — 's Gravenhage, 8, 10, v. d. W.; Bodegraven, 6, 8, de M.; Amsterdam, 8, de M.
D. chorea Meig. — D. N. 402 (*Limnobia*). — Zeer gemeen.
D. morio Fabr. — D. N. 403 (*Limnobia*). — Wassenaar, 8, de M.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Bloemendaal, 7, 8 en Bussum, 4, de M.; Heemstede, v. Voll.; Zeist, 4, de M.; Utrecht, Six; Zutphen, v. Eynth.; Voorst, Wtt.; Kuilenburg, 7, de M.
D. modesta Meig. — D. N. 403 (*Limnobia*). — Zeer gemeen.
D. macrostigma Schumm. — D. N. 404 (*Limnobia*). — 's Gravenhage, 5 tot 7, v. d. W.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Hilversum, 5, de M.; Utrecht, Six; Amersfoort, Piag.; Linschoten, 8, de M.
D. lutea Meig. — D. N. 404 (*Limnobia*). — Venlo, 8, v. d. Br.; Plasmolen, 6, v. d. W.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Alkmaar, Jasp.; Texel, Rits.; Zutphen, v. d. W.
D. stigmatica Meig. — D. N. 404 (*Limnobia*). — Plasmolen, 8, Piag.; duinen Koudekerke, 9, de Man; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Schoorl, 5, Jasp.; Leeuwarden, H. A.

Limnobia Meig.

- L. quadrinotata* Meig. — D. N. 398. — Niet zeldzaam; in Limburg, N. Brabant, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden.
L. nubeculosa Meig. — D. N. 398. — Gemeen. Uit Limburg, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland vermeld.
L. flavipes Fabr. — D. N. 399. — Plasmolen, 8, Piag.; Rijen, 5, Piag.; 's Gravenhage, 5 tot 9, v. d. W.; Hillegom, Kink.; Bloemendaal, 9, de M.

- L. bifasciata* Schrank. — D. N. 400. — Herhaaldelijk in Limburg, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- L. nigropunctata* Schumm. — D. N. 400. — Limburg, Maur.; Gronsfeld, 6, Oudem.; Scheveningsche bosch, jaarlijks in Mei en Juni, v. d. W.
- L. stigma* Meig. — D. N. 400. — 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Lisse, 8, de M.; Vogelenzang, v. d. W.; Bloemendaal, 8, de M.
- L. tripunctata* Fabr. — D. N. 401. — Oud-Vroenhoven, 5, Maur.; Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag. In N. en Z. Holland op vele plaatsen, soms zeer gemeen; Utrecht, Six; Linschoten, 5, de M.; Zutphen, v. Eyndh.
- L. trivittata* Fabr. — D. N. 401. — Haagsche bosch, 6 en 7, v. d. W.; Schielandsche plassen, Frans.; Bodegraven, 7, de M.; Linschoten, 8, de M.; Kuilenburg, 7, de M.

Rhipidia Meig.

- Rh. maculata* Meig. — D. N. 395. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Friesland aangetroffen, doch slechts bij enkele exemplaren.

Dicranoptycha Ost. Sack.

- D. fuscescens* Schumm. — D. N. 393. — Bij Zutphen, een ♀, v. d. W.

Rhamphidia Meig.

- Rh. longirostris* Meig. — D. N. 393. — Venlo, 7, v. d. Br.; Rotterdam, Frans.; Schielandsche plassen, Piag.; Zwammerdam 7 en Bodegraven, 8, de M.; Bussum, 7 en Heilo, 7, de M.

Molophilus Curt.

- M. ochraceus* Meig. — D. N. 421 (*Erioptera*). — Plasmolen, 6, v. d. W.; Nuth, 6, Maur.; 's Gravenhage en Wassenaar, 7 en 8, v. d. W.; Amsterdam, 5, 8, en Bussum, 4, 7, de M.; Maarsbergen, v. d. W.; Linschoten, 8, de M.
- M. appendiculatus* Staeg. — D. N. 422 (*Erioptera*). — Vrij gemeen; uit Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland vermeld.
- M. obscurus* Meig. — D. N. 422 (*Erioptera*). — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, Z.- en N.-Holland, Utrecht en Gelderland gevonden.
- M. murinus* Meig. — D. N. 422. — Rijen, 6, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Utrecht, Six.
- M. propinquus* Egg. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XIII. 1105; Schin. Fn. austr. II. 541 (*Erioptera*). — Plasmolen, 8, Piag.; Mastbosch bij Breda, 6, Piag.; 's Gravenhage, Six.

Rhypholophus Kolen.

- R. h. varius* Meig. — D. N. 427 (*Dasyptera*). — Jaarlijks in Sept. in het Haagsche bosch, v. d. W.; Bussum, 9, de M.
- R. h. lineatus* Meig. — D. N. 428 (*Dasyptera*). — Niet zeldzaam. Plasmolen, 8, Piag.; in N.- en Z.-Holland op verschillende plaatsen, soms gemeen; Utrecht en Driebergen, Six; Lekkum, H. A.
- R. h. nodulosus* Macq. — D. N. 428 (*Dasyptera*). — Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Bodegraven, 5, 7, 8, de M.; in de bosschen bij Haarlem, Weyenb. en de M.; Hilversum, 5, de M.

Erioptera Meig.

- E. maculata* Meig. — D. N. 423 (*Trichosticha*). — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.; Utrecht, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- E. imbuta* Meig. — D. N. 424 (*Trichosticha*). — 's Gravenhage, 7, v. d. W.
- E. flavescens* L. — D. N. 424 (*Trichosticha*). — Venlo, 6, v. d. Br.; Nuth, 7, Maur.; Rijen, 8, Piag.; Oosterwijk, 7, de M.; 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht, Six; Uddelermeer, 7, Sn.
- E. lutea* Meig. — D. N. 425 (*Trichosticha*). — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, 5 en 8, v. d. W.; Bodegraven, 5 en 8, de M.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- E. fuscipennis* Meig. — D. N. 425 (*Trichosticha*). — Niet zeldzaam; in Zeeland, N.- en Z.-Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- E. cinerascens* Meig. — D. N. 425 (*Trichosticha*). — Herhaalderlijk in bijna alle provinciën gevonden.

Symplecta Meig.

- S. punctipennis* Meig. — D. N. 429. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam en in het Overmaassche, Piag.; Bodegraven, 5, 9, de M.; bij Amsterdam, Kink.; Driebergen, Six; Zeist, 8, de M.; Arnhem en Apeldoorn, v. d. W.; Zutphen, v. Eyndh.
- S. stictica* Meig. — D. N. 429. — Gemeen; Middelburg, de Man; in N.- Z.-Holland en Utrecht op talrijke plaatsen; Kuilenb., 7, de M.
- S. similis* Schumm. — D. N. 430. — Duinen Koudekerke, 9, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, 4, 5, 9, de M.; Leeuwarden, H. A.

Gonomyia Ost. Sack.

- G. tenella* Meig. — D. N. 431. — Niet zeldzaam; uit Limburg, N.-Brabant, N.- en Z.-Holland, Utrecht, Gelderland en Friesland vermeld.

Empeda Ost. Sack.

E. flav a Schumm. — D. N. 431 (*Gonomyia*.) — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Kuilenburg, 7, de M.

E. n u b i l a Schumm. — D. N. 432 (*Gonomyia*.) — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 8, de M.; Utrecht, Wtt.

Trimicra Ost. Sack.

T r . p i l i p e s Fabr. — D. N. 433 (*Gnophomyia*.) — 's Gravenhage, 6 en 7 en Schielandsche plassen, v. d. W.; Haarlemmermeer, voor jaren, v. Voll.; Utrecht, Six.

Gnophomyia Ost. Sack.

G n . v i r i d i p e n n i s Gimm. Bullet. de Moscou, 1847. — Scheveningsche bosch, 2 exemplaren, de M.

Anisomera Meig.

A . n u b e c u l o s a Burm. — D. N. 435. — Een ♀ in de collectie van Eyndhoven, denklijk uit Gelderland.

Epiphragma Ost. Sack.

E . p i e t a Fabr. — D. N. 408. — Venlo, 4, v. d. Br.; Mastbosch bij Breda, 5, Piag.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, Frans.; Amsterdam, Grebn. en Kink.; Linschoten, 8, de M.; de Steeg, 6, de M.

Idioptera Macq.

I d . f a s c i a t a L. — D. N. 409. — Bergen-op-Zoom, 5, Rits.; Galdersche heide bij Breda, Piag.; aan de vennen te Oisterwijk, verscheidene exemplaren, 7, de M.; bij Amsterdam, Kink.; 's Graveland, v. Voll.; Utrecht, Six.

Ephelia Schin.

E . m a r m o r a t a Meig. — D. N. 410. — Venlo, 5 tot 7, v. d. Br. en de M.; Mastbosch bij Breda, 5, Piag.; Hoek v. Holland, 9, Piag.; Hilversum, 6, de M.; Utrecht en Driebergen, in het najaar, Six.

Eutonia v. d. W.

E . b a r b i p e s Meig. — D. N. 412. — Vrij zeldzaam. Oisterwijk, 5, Oudem.; 's Gravenh., 6 en 8 en Wassenaar, v. d. W.; Rotterd., Frans.; in het Overmaassche, Piag.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Velzen, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.; Utrecht, Six en Weyenb.; Driebergen, Brummen, 5, 8, v. Voll.; Zutphen, v. Eyndh.; Lekkuum, H. A.

Poecilostola Schin.

- P. punctata* Schr. — D. N. 413. — Bussum, 4, de M.; Naarden, 5, Jasp.; de Bilt, 5, Six; Empe, v. Eyndh.; Ede, Kink.
- P. pictipennis* Meig. — D. N. 414. — Venlo, 8, v. d. Br.; Plasmolen, 8, Piag.; Breda, Heyl.; Walcheren, de Man; Haagsche bosch, 7, v. d. W.; Schielandsche plassen, Frans.; Amsterdam, Kink.; Utrecht, Six; Voorst, v. Voll.
- P. angustipennis* Meig. — D. N. 414. — In Z. Holland op verscheidene plaatsen; Amsterdam, 5, de M.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht, en de Bilt, Six; Empe, v. Eyndh.; Groningen, 5, de M.; Leeuwarden, Lekkum, H. A.

Limnophila Macq.

- L. nemoralis* Meig. — D. N. 416. — Niet zeldzaam. Plasmolen 8, Piag.; 's Gravenhage, gemeen, v. d. W.; Bodegraven, 5 tot 8, de M.; Velzen, 6 en Kortenhoef 5, de M.; Utrecht, Six.; Kuilenburg, 7 en Groesbeek 7, de M.
- L. bicolor* Meig. — D. N. 417. — Venlo, 7, v. d. Br.; 's Gravenhage, niet zeldzaam, v. d. W.; Lisse, 5, Piag.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Austerdam, Kink. en de M.
- L. placida* Meig. — D. N. 417. — De Steeg, 8, v. d. W.
- L. subtineta* Zett. — D. N. 417. — 's Gravenhage, 6 en 9, en Schielandsche plassen, v. d. W.; Zwammerdam, 7, de M.; Amsterdam, 5, de M.
- L. fuscipennis* Meig. — D. N. 418. — Venlo, 5, 6, v. d. Br.; 's Gravenhage, v. d. W.; Wassenaar, Piag.; Heemstede, v. Voll.; Driebergen, v. Voll.; Utrecht en Zeisterbosch, Six; Zutphen, v. Eyndh.
- L. discicollis* Meig. — D. N. 418. — Rotterdam, Frans.; Schielandsche plassen, 8, Piag.; Brummen, v. Voll.; Lochem, 6, de M.
- L. ochracea* Meig. — D. N. 418. — Walcheren, G. v. W.; in N. en Z. Holland op talrijke plaatsen; Linschoten, 7, de M.; Kuilenburg, 7, de M.; Groningen, de Gav.
- L. ferruginea* Meig. — D. N. 419. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Friesland gevonden.
- L. lineola* Meig. — D. N. 420. — Venlo, 6, v. d. Br.; Plasmolen, 6, v. d. W.; Dinther, de Man; Oisterwijk, 7, de M.; Middelburg, 5, de Man; Schielandsche plassen, 6, v. d. W.; Loosduinen, 7, Piag.; Maarsbergen, Piag.; Linschoten, 5, de M.; Lochem, 6, de M.; Groningen, Cl. M. en de M.
- L. dispar* Meig. — D. N. 420. — Ulvenhoutsche bosch bij Breda, een ♀, Piag.; Walcheren, v. d. W.; 's Gravenhage, een ♂, v. d. W. Allen in Juni.

- L. lucorum* Meig. Syst. Besch. I. 127; Schin. Fn. austr. II. 557. — Venlo, v. d. Br.; Rijen, 6, Piag.
L. phaeostigma Schumm. Beitr. z. Entom. I. 165; Schin. Fn. austr. II. 557. — Venlo, 7, v. d. Br.; Rijen, 5, Piag.; Groesb., 7, de M.

Trichocera Meig.

- Tr. annulata* Meig. — D. N. 406. — Middelburg, de Man; 's Gravenhage, 10 en 11, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Bodegraven, 1, 4, 10, de M.; Amsterdam, 4, 9, 10, de M.; Heemstede, v. Voll.; Aerenhout bij Haarlem, Kink.; Driebergen, Six.
Tr. regelationis L. — D. N. 406. — Zeer gemeen, van Oct. tot Maart. Uit Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland, Gelderland en Friesland vermeld.
Tr. hiemalis de G. — D. N. 406. — 's Gravenhage, gemeen, v. d. W.; Bodegraven, 1, 4, Amsterdam, 10, en Hilversum, 10, de M.
Tr. fuscata Meig. — D. N. 407. — Middelburg, 1, de Man; 's Gravenhage, 2, 3, gemeen, v. d. W.; Zutphen, v. Eynth.

Amalopsis Hal.

- A. immaculata* Meig. — D. N. 390 (*Tricyphona*). — Venlo, 5, v. d. Br.; Plasmolen, 6, Piag.; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, Piag.; Schielandsche plassen, Frans.; Zwammerdam, 5, de M.; Hilversum, 6, 10 en Kortenhoef, 5, de M.; Utrecht, Six; Ede, Kink.; Groningen, v. Bemm.

Pedicia Latr.

- P. rivosa* L. — D. N. 387. — Plasmolen, een ♂, Piag.; Limburg, Maur.; Beek, v. Voll.; Beekhuizen, 6, Kink. Telkens slechts een exemplaar.

Ula Hal.

- U. pilosa* Schumm. — D. N. 389. — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, v. d. W.; Bodegrav., 5, de M.; Haarlem, Weyenb.; Drieberg. Six.

Dicranota Zett.

- D. bimaculata* Schumm. Beitr. z. Entom. I. 180; Schin. Fn. austr. II. 530. — Venlo, 3, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag.

Liogma Ost. Sack.

- L. glabrata* Meig. — D. N. 385 (*Cylindrotoma*). — Valkenburg, 7, Piag.; 's Gravenhage, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Bergen, 7, de M.; Linschoten, 7, de M.; Groesbeek, 7, en Kuilenburg, 7, de M.; Zutphen, v. d. W.; Empe, v. Eynth.

Cylindrotoma Macq.

- C. distinctissima* Meig. — D. N. 385. — Niet zeldzaam. 's Gravenhage, 5, 8, v. d. W.; Zwammerdam, 5, de M.; Bloemendaal, 5, de M.; Baarn, 8 en Linschoten, 8, de M.; Utrecht, Six; Kuilenburg, 7, de M.

Triogma Schin.

- Tr. trisulcata* Schumm. Beitr. z. Entom. I. 105; Schin. Fn. austr. II. 561. — Venlo, een ♀, v. d. Br.

Phalacrocera.

- Ph. replicata* L. — D. N. 386. — 's Gravenhage, 4, een ♂, v. d. W.; Zwammerdam, 4, verscheidene exemplaren, de M.; Utrecht en de Bilt, Six.

RHYPHIDAE.

Rhyphus Latr.

- Rh. fenestralis* Scop. — D. N. 437. — Gemeen. Uit Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland vermeld. Uit een fungus gekweekt, 's Gravenhage, Kempers.
- Rh. punctatus* Fabr. — D. N. 438. — Gemeen. In Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Friesland gevonden.
- Rh. fuscatus* Fabr. — D. N. 438. — Venlo, 7, v. d. Br.; 's Gravenhage, 5, 6, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Heemstede, v. Voll.; Arnhem, v. d. W.

STRATIOMYIDAE.

Beris Latr.

- B. chalybeata* Forst. — D. N. 442. — Limburg, Maur.
- B. clavipes* L. — D. N. 443. — Venlo, v. d. Br.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, Weyenb.; Ede, Maitl.; Laag Soeren, 6, Oudem.
- B. vallata* Forst. — D. N. 443. — Vrij gemeen; bijna in alle provinciën aangetroffen.

Actina Meig.

- A. tibialis* Meig. — D. N. 444. — Valkenburg, 7, Piag.; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W. en de M.; Wassenaar, Piag.; Vogelenzang, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.; Bussum, 7, de M.

Pachygaster Meig.

- P. ater* Panz. — D. N. 445. — Z. Limburg, Maur., Piag. en Oudem.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Loosduinen,

7, de M.; Bussum, 7, en Heilo, 7, de M.; Bloemendaal, v. d. W.; Amersfoort, v. d. W.; Driebergen, Six; Voorst, v. d. W.

P. Leachii Curt. — D. N. 446. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, v. d. W.; Wassenaar, Piag.; Rotterdam, Frans.; Leiden, v. Voll.; Haarlem, Weyenb.

Nemotelus Geoffr.

N. nigrinus Fall. — D. N. 447. — Oud-Vroenhoven en Nuth, 6, 7, Maur.; 's Gravenhage en Wassenaar, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, Piag.; Bodegraven, de M.; Vogelenzang, Kink.; Amsterdam, 7, de M.; Utrecht en Driebergen, Six; Brummen, 7, v. Voll.

N. pantherinus L. — D. N. 447. — Nuth, 7, Maur.; Houthem, 7, Versl.; Middelburg, de Man en G. v. W.; 's Gravenhage, eens in aantal, v. d. W.; Overmaasche, Piag.; Huissen, v. M. d. R.

N. uliginosus L. — D. N. 448. — Middelburg, de Man en G. v. W.; Bergen-op-Zoom, 8, Sn.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Leiden, v. Voll.; Sloterdijk, v. Eyndh.; Zeeburg bij Amsterdam, 5—8, Kink. en de M.; menigvuldig aan den zeedijk te Kampen, v. Voll.

N. notatus Zett. — D. N. 449. — Zeeland, Wtt. en de Man; 's Gravenhage, een exemplaar, Six; Terschelling, 7, Veth.

Ephippium Meig.

E. thoracicum Latr. — D. N. 450. — Venlo, een exempl., v. d. Br.

Stratiomyia Geoffr.

Str. furcata Fabr. — D. N. 451. — Zeer gemeen; Juli en Aug.

Str. longicornis Scop. — D. N. 452. — Limburg, Maur.; Walcheren, G. v. W.; Schalkwijk, Wtt.; Brummen, v. Voll.; Empe, v. Eyndh.; Voorst, Wtt.; Arnhem, v. M. d. R.

Str. chamaeleon de G. — Schin. Fn. austr. I. 16. — Nuth, een ♀, Maur.

Odontomyia Meig.

O. argentata Fabr. — D. N. 454. — 's Gravenhage, een exempl., v. d. W.; Utrecht, Six en Maitl.

O. tigrina Fabr. — D. N. 454. — Gemeen.

O. ornata Meig. — D. N. 455. — Herhaaldelijk in de meeste provinciën aangetroffen.

O. viridula Fabr. — D. N. 455. — Gemeen, Juni tot Augustus.

O. angulata Panz. — D. N. 455. — Zeldzaam. Nuth, 7, Maur.; Plasmolen, 6, v. d. W.; Rotterdam, een ♂, Frans.; Bodegraven, 6, 8, de M.; Bloemendaal, 8, de M.

O. hydroleon L. — D. N. 456. — Nuth, 7, een ♀, Maur.

Oxycera Meig.

Ox. trilineata Fabr. — D. N. 457. — Zeer verspreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

- Ox. leonina* Panz. — D. N. 458. — Houthem, 7, Oudem.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Bloemendaal, 8, de M.; Heemstede, 7, v. Voll.; Driebergen, v. Voll.; Utrecht, Six; Ede, Maitl.; Arnhem, Brants; Kuilenburg, 7, de M.
- Ox. pulchella* Meig. — D. N. 458. — Venlo, 7, v. d. Br.; Nuth, 7, Maur.; Nijmegen, Maitl.
- Ox. formosa* Meig. Syst. Besch. III. 127; Schin. Fn. austr. I. 10. — Nuth, 7, Maur.

Sargus Fabr.

- S. cuprarius* L. — D. N. 460. — Zeer gemeen, in Juni tot Aug.
- S. bipunctatus* Scop. — D. N. 461. — Limburg, Maur.; Sterkenburg bij Driebergen, v. Voll.; Empe, v. Eyndh.; Oosterbeek en Brummen, v. Bemm.; Beekhuizen, Rits.; Putten, Oudem.
- S. flavipes* Meig. — D. N. 461. — Vrij zeldzaam, doch verbreid. Gevonden in Limburg, N. Brabant, Zeeland. N. en Z. Holland, Gelderland en Groningen.

Chrysomyia Macq.

- Chr. formosa* Scop. — D. N. 463. — Zeer gemeen in Juni en Juli.

Microchrysa Löw.

- M. polita* L. — D. N. 463 (*Chrysomyia*). — Zeer gemeen.
- M. flavicornis* Meig. — D. N. 464 (*Chrysomyia*). — Maastricht, 6, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6 tot 8, niet gemeen, v. d. W.; Diemen, 8, de M.; Utrecht, v. Hass.; Arnhem, Rits.; Oosterbeek, Beek, Empe, v. Eyndh.

COENOMYIDAE.

Coenomyia Latr.

- C. ferruginea* Scop. — D. N. 465. — Houthem (Z. Limburg), 6, eenige exemplaren, Oudem. en Versl.; Arnhem, een ex, v. M. d. R.

XYLOPHAGIDAE.

Subula Meig.

- S. marginata* Meig. — B. 348¹⁾ — Empe, v. Eyndh., een ♂.

1) B. verwijst naar het tweede en derde gedeelte van de lijst van Diptera op blz. 101 en 255 van deel III der „Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland”, Leiden 1866; het daar achter gevoegde cijfer is het nummer aldaar aangegeven.

TABANIDAE.

Tabanus L.

- T. bovinus* L. — B. 333. — Vrij gemeen. Uit Limburg, N. Brabant, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland vermeld.
- T. autumnalis* L. — B. 334. — Vrij gemeen. In Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht, Gelderland en Friesland.
- T. bromius* L. — B. 335. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- T. tropicus* Fabr. — B. 336 ¹⁾ — Niet zeldzaam. In bijna alle provinciën aangetroffen.
- T. rusticus* L. — B. 339. — Limburg, Maur.; Middelburg, 7, de Man; Bodegraven, 6, 7, verscheidene exemplaren, de M.; Arnhem 7, v. M. d. R.; Ruurlo, 7, Rits.; Kulenburg, 7, de M.; Empe, v. Eynndh.
- T. fulvus* Meig. — B. 340. — Venlo, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag.; Breda, Heyl.; Oisterwijk, 8, Oudem.; in het Gooi, 7, v. d. W.; Doorn, de Gr.; Zeist, 8, Oudem.; Groesbeek, 7, de M.
- T. micans* Meig. — B. 341. — Empe, v. Eynndh., een ♂; Laag Soeren, 6, Oudem., een ♀.
- T. gigas* Herbst. — Schin. Fn. austr. I. 29. — Bemelen (Limburg), 7, een ♀, Maur.
- T. plebeius* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 31. — Nuth, 7, Maur.; Breda, 7, Heyl.
- T. sudeticus* Zell. Isis, 1842, 815; Schin. Fn. austr. I. 34. — Venlo, een ♂, v. d. Br.
- T. maculicornis* Zett. Dipt. Scand. I. 117; Schin. Fn. austr. I, 36. — Valkenburg, 7, een ♀, v. d. W.; Venlo, een ♂, v. d. Br.
- T. cordiger* Meig. Syst. Besch. II. 47; Schin. Fn. austr. I. 35. — Venlo, 6, een ♂, v. d. Br.

Hexatoma Meig.

- H. pellucens* Fabr. — B. 344 (*H. bimaculata*). — Venlo, 8, v. d. Br.; Valkenburg, Rits.; Breda, 7, 8, Heyl.; Utrecht en Driebergen, Six; Brummen, 7, v. Voll.; Apeldoorn, 6, Oudem.; Putten, 8, Oudem.; Arnhem, v. M. d. R.

Haematopota Meig.

- H. pluvialis* L. — B. 342. — Gemeen. Uit bijna alle provinciën; ook op Terschelling, 7, Veth.
- H. italica* Meig. — B. 343. — 's Gravenhage, duinen, 6, een ♀, Piag.

1) De vroeger onder N^o. 337 en 338 in de „Bouwstoffen” opgenomen *T. solstitialis* Meig. en *luridus* Fall. vervallen, wjl gebleken is, dat al de daartoe gebrachte exemplaren tot *tropicus* behooren (zie Tijdschr. v. Entom. XXXI, p. XXI en CVII).

Chrysops Fabr.

- Chr. relictus* Meig. — B. 345. — Overal gemeen; ook op Terschelling, 7, Veth.
- Chr. caecutiens* L. — B. 346. — Z. Limburg, 7, v. d. W. en Oudem.; Breda, Heyl.; in Z. Holland, v. d. W.; Driebergen, v. Bemm.; in Gelderland op verschillende plaatsen.
- Chr. quadratus* Meig. — B. 347. — Nuth, 7, Maur.; Plasmolen, 6, 8, Piag.; Vught, 6 en Oosterwijk, 8, Oudem.; Walcheren, G. v. W.; Hilversum, 7, v. d. W.; aan de Vuursche, 7, v. d. W.; Driebergen, 7, v. Voll.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.; Heelsum, v. Voll.
- Chr. sepulcralis* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 41. — Plasmolen, 6, v. d. W.; Breda, 7, Heyl.
- Chr. rufipes* Meig. Syst. Besch. II. 71; Schin. Fn. austr. I. 41. — Limburg, Maur.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Overveen, Piag.; Linschoten, 7, de M.; Arnhem, 7, v. M. d. R.

LEPTIDAE.

Leptis Fabr.

- L. strigosa* Meig. — B. 495. — Valkenburg, Drechsler; Venlo, v. d. Br.; Zutphen en Empe, v. Eyndh.
- L. scolopacea* L. — B. 496. — Overal gemeen.
- L. tringaria* L. — B. 497. — Vrij gemeen en verspreid.
- L. immaculata* Meig. — B. 498. — Breda, Heyl.; Middelburg, 7, de Man; in Z. en N. Holland op verscheidene plaatsen; Utrecht, Six; Empe, v. Eyndh.
- L. vitripennis* Meig. — B. 499. — Venlo, 6, v. d. Br.; Valkenburg, 6, Oudem.; in Gelderland op verschillende plaatsen; Groningen, de Gav.
- L. lineola* Fabr. — B. 500. — Houthem, 6, Oudem.; Oosterwijk, 7, de M.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Amsterdam 8 en Hilversum, 6, 7, de M.; Bloemendaal, v. Bemm.; Gliphoeve bij Heemstede, v. Voll.; Utrecht, Six; Doorn, de Gr.; Driebergen, v. Bemm.; Putten (Gelderl.) 8, Oudem.; Vorden, 8, de Gav.

Chrysopila Macq.

- Chr. atrata* Fabr. — B. 501. — Vrij gemeen; in Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden.
- Chr. diadema* L. — B. 502. — Zeeland, Wtt.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 6, de M.; Utrecht, 6 en 7, Six en Wtt.; Linschoten, 7 en 8, de M.; de Steeg, 8, v. d. W.; Kuilenburg, 7, de M.; Brummen, 7, v. d. W.
- Chr. nigrita* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 176. — Valkenburg, 7, Piag.; de Bilt, 7, v. d. W.
- Chr. flavicola* Meig. Syst. Besch. II. 100; Schin. Fn. austr. I. 177. — Venlo, v. d. Br.; Kuilenburg, 7, de M.

Atherix Meig.

- A. luteola* Fall. — B. 503. — Utrecht, 7, Six; Gliphoeve bij Heemstede, 8, v. Voll.
A. marginata Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 178. — Breda, Heyl.
A. crassipes Meig. Syst. Besch. II. 108; Schin. Fn. austr. I. 178. — Amersfoort, 7, Piag.
A. ibis Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 179. — Z. Limburg, Maur. en Oudem.

Ptiolina Zett.

- Pt. immaculata* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 179. — In Z. Limburg, Oudem.
Pt. nigra Zett. Dipt. Scand. I. 227. — Utrecht, Six.

CYRTIDAE.

Oncodes Latr.

- O. gibbosus* L. — B. 479. — Roermond, Latiers; Groesbeek, 6, v. M. d. R.; Empe, v. Eynth.
O. zonatus Er. — Schin. Fn. austr. I. 72. — Bunde, 7, Maur.; Laag Soeren, 6 en Winterswijk, 7, v. d. W.; Assen, 7, v. d. W.

Aerocera Latr.

- A. orbiculus* Fabr. — B. 480. — Empe, v. Eynth.

BOMBYLIDAE.

Exoprosopa Macq.

- E. capucina* Fabr. — B. 486 (*Anthrax*). — Breda, Heyl. en Sn.; Putten, 7, de M.; Zeist, Martens; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Velp, 7, Rits.; Winterswijk, 7, v. d. W.; Hoog Soeren, 6, in aantal, v. d. W.; Lochem, 6, de M.

Anthrax Scop.

- A. hottentotta* L. — B. 487 ¹⁾. — Houthem, 7, Oudem.; Breda, 8, Heyl.; Domburg, 8, de Man; 's Gravenhage, Scheveningen, Loosduinen, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Haarlem, Maitl.; Driebergen, 6, Six; Wolfhezen, 7, 8 en Winterswijk, v. d. W.; Apeldoorn, 5, de Vos; op de heide bij Rozendaal, 7 en 8, v. d. W.; Dieren, 7, de Gav.
A. fenestrata Fall. — B. 485. — Limburg, Maur.; Plasmolen, 7, Oudem.; Putten, 7, de M.; Doorn, 8, de M.; Utrecht, Six; Arnhem, v. M. d. R.; Hattem, 8, Rits.; Diever, 8, de Gav.

1) De vroeger onder N^o. 488 in de „Bouwstoffen” vermelde *A. venusta* Meig. moet vervallen; de exemplaren bleken later niet van *hottentotta* te verschillen.

- A. morio* L. — B. 484. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; West-Capelle, 6, Piag.; in Z. Holland en Utrecht in droge streken niet zeldzaam; Heemstede, v. Voll.; Hilversum, 6, de M.; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Beek, 8, H. A.; Velp, v. d. W.
- A. afra* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 50. — West-Capelle, 6, Piag.; 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.

Argyramoeba Schin.

- A. sinuata* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 53. — Roermond, Latiers; Maastricht, Maur.; Arnhem, 7, v. M. d. R.

Bombylius L.

- B. discolor* Mikan. — B. 482. — Limburg, Maur.; Zierikzee, 6, Fokker; 's Gravenhage, Maitl.; Rotterdam, v. Walchr.; Woerden, 5, de Gr.; Utrecht, Six; Arnhem, 4, Veth, Brants; Doesburg, Tengb.
- B. major* L. — B. 481. — Rotterdam, v. Walchr.; Woerden, 4, d. Gr.; Alblasserdam, 4, de Gr.; Rhoon, Schepm.; Hilversum, 4, verscheidene exemplaren, de M.; Utrecht, Six; Arnhem, 4, v. M. d. R.
- B. canescens* Mikan. — Schin. Fn. austr. I. 61. — Houthem, 6, Oudem., verscheidene exemplaren; St. Pieter, Maur.
- B. fugax* Wied. — Schin. Fn. austr. I. 62. — Bunde en Valkenburg, 7, Rits.; Groesbeek, 7, de M.

Systoechus Löw.

- S. sulphureus* Mikan. — Schin. Fn. austr. I. 64. — Plasmolen, 7, Oudem.; Oosterbeek, 7, Rits.; Beek, 6, v. d. W.

Phthiria Meig.

- P. pulicaria* Mikan. — B. 483. — Koudekerke, 6, de Man; 's Gravenhage en Wassenaarsche duinen, 6, verscheidene exemplaren, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Vogelenzang, 6, vrij gemeen, v. Voll.; Soesterheide, 7, Kink.; Arnhem, 7, v. R.

T H E R E V I D A E.

Thereva Latr.

- Th. nobilitata* Fabr. — B. 489. — Niet zeldzaam. In Limburg, Noord-Brabant, Z. en N. Holland, Utrecht, Gelderl. en Groningen gevonden.
- Th. fulva* Meig. — B. 490. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Dinther, 8, de Man; Bergen-op-Zoom, 7, de M.; West-Capelle, 5, Piag.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Terschelling, 6, 7, Rits. en Veth.; Amsterdam, 6, en Bussum, 6, de M.; Laren, 8, v. d. W.; Voorst, 7, Wtt.
- Th. anilis* L. — B. 491. — In Limburg, Noord-Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Groningen gevonden, meest in droge streken.

- Th. annulata* Fabr. — B. 492. — Venlo, v. d. Br.; Breda, Heyl.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage en Scheveningen, 5 tot 7, v. d. W.; Terschelling, 7, Veth.; Bloemendaal, 8, Bussum en Hilversum, 6, de M.; Driebergen, 6, Six.
- Th. bipunctata* Meig. — B. 494 — Venlo, 8, v. d. Br.; Domburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Velp, 7, v. d. W.; Voorst, 7, Wtt.
- Th. subfasciata* Schumm. — Schin. Fn. austr. I. 165. — Dinther, 7, en Breda, 7, de Man; 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Bussum 7, en Heilo, 7, de M.; Beek, v. M. d. R.
- Th. plebeia* L. — Schin. Fn. austr. I. 166. — Venlo, v. d. Br.; Breda, 7, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.

Psilocephala Zett.

- Ps. ardea* Fabr. — B. 493 (*Thereva*). — Schin. Fn. austr. I. 167. — Dinther, 8, de Man; Velp, 7, v. d. W.; Empe, 7, v. Eyndh.; Voorst, 7, Wtt.; Arnhem, 8, v. M. d. R.

SCENOPINIDAE.

Scenopinus Latr.

- Sc. fenestralis* L. — B. 700. — Niet zeldzaam tegen vensterruiten; in Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht, Gelderland en Groningen gevonden.

ASILIDAE.

Leptogaster Meig.

- L. cylindricus* de G. — B. 374. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden, soms b. v. in de Rietlanden bij Amsterdam, in aantal, de M.
- L. guttiventris* Zett. — B. 375. — Venlo, 7, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag.; Houthem, 6, Versl.; Rotterdamsche plassen, 7, Frans.; Lisse, 8, de M.; Heilo, 7, de M.; Amersfoort, 6, v. Voll.; Utrecht, Six; Velp, 7, 8, Rits.

Dioctria Meig.

- D. oelandica* L. — B. 376. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Amsterdam, Lodeesen; Putten, 5, Oudem.; Arnhem, v. M. d. R.; Brummen, v. Walchr.; Empe, v. Eyndh.; Groningen, 6, de Gav.; Friesland, 6, H A.
- D. Reinhardi* Wied. — B. 377. — In N. Brabant, Limburg, Utrecht en Gelderland op verscheidene plaatsen gevonden; verder Steenwijk, 5, Jasp.

- D. atricapilla* Meig. — B. 378. — Niet zeer zeldzaam; in N. Brabant, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- D. flavipes* Meig. — B. 379. — De meest gewone soort van het genus; in bijna alle provinciën waargenomen.
- D. Baumhaueri* Meig. — B. 380. — Eveneens vrij gemeen en zeer verspreid.
- D. linearis* Fabr. — B. 381. — Limburg, Maur.; Gronsveld, 6, Oudem.; 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Bodegraven, 6 tot 8, de M.; Driebergen, Six; Linschoten, 7, de M.; de Steeg, 6, de M.; Brummen, 7, v. Voll.
- D. lateralis* Fabr. — B. 382. — Schin. Fn. austr. I. 123. — Valkenburg, 7, Piag.; Rhoón, 7, Schepm.; Utrecht, Six.
- D. rufipes* de G. — B. 383. — Schin. Fn. austr. I. 121. — Zuid-Limburg, 6, Oudem.; Breda, Heyl.; Bergen-op-Zoom, 5, Piag.; Middelburg, 6, de Man; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Zuidlaren, Cl. M.
- D. longicornis* Meig. Syst. Besch. II. 249; Schin. Fn. austr. I. 120. — Maastricht, 6, 7, Maur.; Houthem, 6, 7, Versl.
- D. bicincta* Meig. Syst. Besch. II. 251; Schin. Fn. austr. I. 121. — St. Pieter, 6 en Bunde, 7, Maur.; Houthem, 6, Oudem.
- D. hyalinipennis* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 121. — Valkenburg, 7, Piag.; Breda, Heyl.; Schielandsche plassen, 6, v. d. W.; Vogelzang, 6, Piag.

Dasypogon Meig.

- D. teutonus* L. — Schin. Fn. austr. I. 124. — Een ♀, Limmel, 7, Maur.; een ♂, Roermond, Lat.

Lasiopogon Löw.

- L. cinctus* Fabr. — B. 387 (*Dasypogon*). — Venlo, 4, v. d. Br.; Breda, 6, Heyl.; 's Gravenhage, duinen, soms vrij gemeen, v. d. W.; Noordwijk, 5, Piag.; Driebergen, v. Bemm., Six; Utrecht, Six; Soestdijk, 5, Sn.; Maarsbergen, 5, Piag.; Gliphoeve bij Heemstede, 6, v. Voll.; Hilversum, 5 en Bussum, 4, de M.; Brummen, v. Walchr.; Empe, 7, v. Eynth.; Arnhem, 7, v. M. d. R.

Laphria Meig.

- L. flava* L. — B. 384. — Indertijd een ♂, Brummen, 7, v. Voll., doch sedert nooit meer aangetroffen.
- L. gilva* L. — B. 385. — Venlo, 7, 8, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag.; Breda, 7, Heyl.; Woerden, 7, een ♀, de Gr.; Hoog Soeren, 6, Rits.; Arnhem, 9, v. Ross., in verscheidene exemplaren; Brummen, v. Walchr.; Putten, 7 en 8, Oudem.; Oosterbeek, v. Bemm.; Steenwijk, 5, Jasp.
- L. marginata* L. — B. 386. — Breda, Heyl.; Utrecht, Six; Driebergen, v. Bemm.; Empe, v. Eynth.; Nijkerk, v. M. d. R.; Wageningen, 7, v. d. W.; Lochem, 6, de M.

Asilus L.

A. crabroniformis L. — B. 388. — Maastricht, 7, v. d. W.; Breda, Heyl.; Oisterwijk, 8, Oudem.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem, 10, Weyenb.; aan den IJdijk bij Amsterdam, 8, Sn.; Hilversum 7, 9, Jasp. en de M.; Soesterheide, 9, Kink.; Driebergen, v. Bemm.; Doorn, de Gr.; Brummen, v. Voll.; Arnhem, 8, v. d. W.; Ede, Maitl.; Zutphen, 8, v. Eynth.; Putten, 7, Oudem.; Hoenderlo, de Vries.

Philonicus Löw.

Ph. albiceps Meig. — B. 394 (*Asilus*). — Niet gemeen, doch zeer verspreid; in Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden.

Pamponerus Löw.

P. germanicus L. — B. 389 (*Asilus*). — Venlo, v. d. Br.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Katwijk, 5, de Gr.; Glijphoeve bij Heemstede, 5 en 6, v. Voll.; Zandvoort, Maitl.; Hillegom, 5, Kink.; Driebergen, v. Bemm.; Arnhem, v. M. d. R.

Antipalus Löw.

A. varipes Meig. — B. 396 (*Asilus*). — Schin. Fn. austr. I. 145. — Dinther, 7, de M.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Haarlem, 9, Weyenb.; Hilversum, de M.; Utrecht en Driebergen, 6, Six, v. Bemm. en Jasp.; Velp, 8, Cl. M.

Lophonotus Macq.

L. trigonus Meig. — B. 393 (*Asilus*). — Vrij gemeen; in de meeste provinciën gevonden.
L. punctipennis Meig. Syst. Besch. II. 330; Schin. Fn. austr. I. 146. — Limburg, Maur.; Venlo, v. d. Br.
L. forcipula Zell. — Schin. Fn. austr. I. 147. — Houthem, Maur.

Eutolmus Löw.

E. rufibarbis Meig. — B. 395 (*Asilus*). — Niet gemeen, doch zeer verspreid; in Limburg, N. Brabant, N. Holland (in het Gooi, de M.), Utrecht en Gelderland gevonden.

Machimus Löw.

M. atricapillus Fall. — B. 391 (*Asilus*). — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Z. Holland (Hoek v. Holland, 9, Piag.; 's Gravenhage, v. d. W.), Drenthe (Assen, v. d. W.) en Gelderland gevonden.
M. rusticus Meig. Syst. Besch. II. 311; Schin. Fn. austr. I. 151. — Nuth, 7, Maur.

Mochtherus Löw.

- M. pallipes* Meig. Syst. Besch. II. 327; Schin. Fn. austr. I. 153. — Venlo, v. d. Br.; Plasmolen, 8, Piag.; Beek, 7, v. Voll.; Beekhuizen, 7, Kink.; Wolfhezen, 8, v. d. W.

Itamus Löw.

- I. cyanurus* Löw. — B. 392 (*Asilus*). — Niet zeldzaam. In Limburg, N. Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe, op droge gronden gevonden.
- I. geniculatus* Meig. Syst. Besch. II. 317; Schin. Fn. austr. I. 154. — Valkenburg, 7, Piag.; Wageningen, 7, v. d. W.
- I. cothurnatus* Meig. Syst. Besch. II. 317; Schin. Fn. austr. I. 155. — Wageningen, 7, en de Steeg, 7, v. d. W.

Epithriptus Löw.

- E. cingulatus* Fabr. — B. 390 (*Asilus*). — Venlo, 9, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag.; Breda, Heyl.; schorren bij Bergen-op-Zoom, 8, Sn., 7, de M.; Walcheren, l. Font.; 's Gravenhage, 9, Piag.; Glijphoeve bij Heemstede, 8, v. Voll.; Driebergen, 8, v. d. W.; de Bilt, 8, Six; Soesterheide, 9, Kink.; Brummen, v. Bemm.
- E. setulosus* Zell. — Schin. Fn. austr. I. 157. — Valkenburg, 7 een ♀, Piag.
- E. arthriticus* Zell. — Schin. Fn. austr. I. 156. — Roermond, Lat.

Rhadiurgus Löw.

- Rh. variabilis* Zett. — B. 397 (*Asilus*). — Vuursche, 7, een ♂, v. d. W.

EMPIDAE.

Syneches Hal.

- S. muscarius* Fabr. — Meig. Syst. Besch. II. 394 (*Hybos*); Schin. Fn. austr. I. 77 (*Pterospilus*). — Nuth, 7, Maur.; Kralingsche plassen, 7, Frans.; Zwammerdam, 6 tot 8, de M.; Bussum, 7, de M.; Arnhem, 7, v. M. d. R.

Hybos Meig.

- H. grossipes* L. — B. 398. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe gevonden.
- H. culiciformis* Fabr. — B. 399. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderl. aangetroffen.
- H. fumipennis* Meig. — B. 400. — Oirschot, 5, Maur.; Dinther, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.
- H. femoratus* Müll. — B. 401. — Schin. Fn. austr. I. 78. —

Maastricht, 7, v. d. W.; Venlo, 7, v. d. Br.; Dinther, de Man; Rijen, 6, Piag.; Middelburg, 7, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Rotterdamsche plassen, 6, Frans.; Bussum, 6, de M.; Hilversum, 7, v. d. W.; Driebergen, 7, Six; Beek, 7, v. d. W.

Oedalea Meig.

O. pallipes Zett. — B. 405. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Utrecht, 6, Six.

Ocydromia Meig.

O. glabricula Meig. — B. 402¹⁾ — Niet zeldzaam. In Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderl. gevonden.

Leptopeza Macq.

L. flavipes Meig. — B. 404. — Utrecht, 6, v. Voll. en Six.

L. ruficollis Meig. Syst. Besch. II. 353. — Driebergen, 6, Six.

Pachymeria Macq.

P. femorata Fabr. — B. 408. — Breda, Heyl.; Bodegraven, 5, de M.; Zwammerdam, 5, eens in aantal, de M.; Amsterdam, 5, Kink. en 6, de M.; Utrecht, 5, Six; Groningen, 5, de M.

Empis L.

E. tessellata Fabr. — B. 409. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden, in Mei en Juni.

E. maculata Fabr. — B. 410. — Limburg, Maur.; Utrecht, 5, Wtt.; Empe, 5, v. Eyndh.; Brummen, v. Walchr.; Arnhem, 5, v. M. d. R.

E. rustica Fall. — B. 411. — Schin. Fn. austr. I. 104. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, 4 en 5, de Gr.; Rotterdam, Frans.; Geervliet, v. Bemm.; Haarlem, 5, 7, Weyenb.; Empe, v. Eyndh.

E. livida L. — B. 412. — Gemeen.

E. opaca Fabr. — In het voorjaar vrij gemeen en zeer verspreid.

E. ciliata Fabr. — B. 414. — Limburg, Maur.; Arnhem, 5, v. M. d. R.; Empe, 5, v. Eyndh.; Brummen, v. Walchr.

E. stercorea L. — B. 415. — In het voorjaar gemeen.

E. stigma Meig. — B. 416. — 's Gravenh., v. d. W.; Hillegom, 5, Kink.

E. ignota Meig. — B. 417. — Liesbosch bij Breda, 5, Piag.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 4 en 6, vrij gemeen, v. d. W.;

1) De onder n^o. 403 in de „Bouwstoffen” vermelde *O. scutellata* Meig. is slechts eene variëteit van *glabricula*.

- Leiden, 5, de Gr.; Amsterdam, 5, Kink.; Overveen, 5, Weyenb.; Bussum, 4, de M.; Utrecht, 6, Six en Wtt.; Zutphen en Empe, 5, v. Eyndh.; Kuilenburg, de M.; Groningen, 5, de M.
- E. punctata* Fabr. — B. 418. — Niet zeldzaam; in Limburg, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- E. chioptera* Fall. — B. 419. — In het voorjaar niet zeldzaam; in N. Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Friesland aangetroffen.
- E. pennaria* Fall. — B. 420. — Breda, 5, Heyl.; Walcheren, de Man; Rotterdam, 4, 5, Frans.; Bodegraven, 5, de M.; 'sGravenhage en Amsterdam, 5, v. d. W.; Utrecht, 5, Six.
- E. vitripennis* Meig. — B. 421. — Gulpen, 7, en Houthem, 6, Oudem.; Plasmolen, 8, Piag.; Hoek van Holland, 9, Piag.; 'sGravenhage, 7, v. d. W.; Noordwijk, 7, v. Voll.; Haarlemmerh., 4, Weyenb.; Bussum, 9, Jasp.; Baarn en Zeist, 8, de M.; Maarsbergen, 7, Piag.; Utrecht, de Bilt en Driebergen, 6 en 7, Six; Beekhuizen, 8, v. Voll.
- E. hyalinipennis* Fall. — B. 422. — Middelburg, 6, de Man; Utrecht, 8, Six; Sterkenburg, v. Voll.
- E. pusio* Egg. — Schin. Fn. austr. I. 106. — Middelburg, 5, de Man.
- E. pennipes* Panz. — Schin. Fn. austr. I. 107. — Domburg, 5, de Man.
- E. vernalis* Meig. Syst. Besch. III. 27; Schin. Fn. austr. I. 107. — Middelburg, 5, de Man.
- E. lutea* Meig. Syst. Besch. III. 37; Schin. Fn. austr. I. 107. — Valkenburg, 7, Piag.; Limmel, 6, Maur.; Walcheren, 7, de Man; Linschoten, 7, 8, de M.; Kuilenburg, 6, de M.
- E. serotina* Löw, Berl. Ent. Zeitschr. XI. 48. — Plasmolen, 8, Piag.; Breda, 5, Heyl.; Winterswijk, 7, en Wolfhezen, 8, v. d. W.
- E. borealis* L. — Meig. Syst. Besch. III. 36; Schin. Fn. austr. I. 105. — Venlo, 4, een ♀, v. d. Br.
- E. aestiva* Löw, Berl. Ent. Zeitschr. XI. 39. — 'sGravenhage, 6, 7, v. d. W.; Lochem, 6, de M.

Rhamphomyia Meig.

- Rh. sulcata* Fall. — B. 423. — In het voorjaar vrij gemeen; bijna in alle provinciën.
- Rh. canaliculata* Macq. Suit. à Buffon, I. 355. — Rotterdam, 5, Frans.
- Rh. nigripes* Fabr. — B. 424. — Venlo, 4, v. d. Br.; Middelburg, 4, de Man; 'sGravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 4, 5, Frans.; Haarlem, 5, Weyenb.; Schoorl, Jasp.; Bussum, 4, en Hilversum, 5, de M.; Heemstede, 5, v. Voll.; Baarn, 5, de M.; Arnhem, 4, v. M. d. R.
- Rh. spinipes* Fall. — B. 425. — Empe, 9, v. Eyndh.
- Rh. cinerascens* Meig. — B. 426. — Venlo, 4, v. d. Br.; Middelburg, 4, de Man; Rotterdam, 4, 5, Frans.; 'sGravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Haarlem, 4, Rits.; Utrecht, Six; Arnhem, 4, v. M. d. R.

- R. h. plumipes* Fall. — B. 427. — 's Gravenhage en Amsterdam, v. d. W.; Utrecht, 5, Six; Maarsbergen, 8, Piag.; Zutphen, v. Eyndh.
- R. h. atra* Meig. — B. 428. — Domburg, 5, de Man; Rotterdam, Frans.; Gliphoeve bij Heemstede, 4 en 5, v. Voll.; Utrecht, 5, Wtt.; Gelderland, 8, v. Walchr.
- R. h. pennata* Macq. — B. 429. — Leiden, 5, de Gr.; 's Gravenhage, 5, Amsterdam, 5 en Haarlem, 6, v. d. W.; Heemstede, 5, v. Voll.; Utrecht, Six.
- R. h. variabilis* Fall. — B. 430. — Maastricht, 5, Maur.; Houthem, 6, Versl.; duinen van Meerdervoort bij 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Rozendaalsche heide, 8, v. d. W.; Beekhuizen, 8, v. Voll.
- R. h. tenuirostris* Fall. — B. 431. — 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Bussum, 9, Jasp.; de Bilt, 8, Six.
- R. h. umbripennis* Meig. — B. 432. — Maastricht, 5, Maur.; Middelburg en Domburg, 5—7, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Utrecht, 6, Wtt.; Driebergen, 6, Six.
- R. h. gibba* Fall. — B. 433. — Schin. Fn. austr. I. 101. — Wolfhezen, 8, v. d. W.; Rozendaal, 8, v. Voll.

Hilara Meig.

- H. lurida* Fall. — B. 434. — Venlo, 5, v. d. Br.; Haagsche bosch, 6, v. d. W.; Lisse, 8, Hilversum, 7 en Baarn, 8, de M.; Driebergen, 6, Six.
- H. quadrivittata* Meig. — B. 435. — In Mei en Juni niet zeldzaam; in Limburg, N. en Z. Holland, Utrecht en Friesland gevonden.
- H. maura* Fabr. — B. 436. — In het voorjaar vrij gemeen; in de meeste provinciën gevonden.
- H. interstincta* Fall. — B. 437. — Empe, 5, het ♂, v. Eyndh.
- H. chorica* Fall. — B. 438. — Vrij gemeen. In de meeste provinciën gevonden.
- H. nigrina* Fall. — B. 439. — Limburg, Maur.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, 6, Jasp.; Utrecht, Six; Amersfoort, 8, v. Voll.
- H. clypeata* Meig. — B. 440. — Maastricht, 8, Maur.; Middelburg en Domburg, 6, 7, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Lisse, 5, Piag.; Amsterdam, 7, Sn.; Maarsbergen, 8, Piag.
- H. pilipes* Zett. — B. 441. — Driebergen, 5, een ♂, Six.
- H. longirostris* Macq. — B. 442. — 's Gravenhage, duinen, 5, Piag.; Utrecht, 6, Six.
- H. litorea* Fall. — B. 443. — 's Gravenhage, v. d. W.; Vogelenzang, 8, Kink.; Hilversum, 5, de M.; Heilo, 7, de M.; Maarsbergen, 8, Kink.; Baarn, 8, de M.; Wageningen, 7, v. d. W.
- H. nigritarsis* Zett. — B. 444. — Driebergen, 6, Six.

- H. flavipes* Meig. — B. 445. — Vrij gemeen; in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden.
- H. fuscipes* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 114; Amsterdam, 7, Sw.; Utrecht, 6, Six; Beek, 6, Six.
- H. manicata* Meig. Syst. Besch. III. 5; Schin. Fn. austr. I. 114. — Maastricht, 7, 8, Maur.; Breda, 5, Heyl.
- H. pinetorum* Zett. Dipt. Scand. VIII. 3017; Schin. Fn. austr. I. 114. — Nuth, 7, Maur.; Ulvenhout, 5, Piag.; Middelburg, 6, de Man.
- H. pilosa* Zett. Dipt. Scand. I. 343; Schin. Fn. austr. I. 115. — Domburg, 5, de Man.
- H. tenella* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 115. — Amersfoort, 7, v. d. W.
- H. cinerea* Macq. Suit. à Buffon, I. 342. — Beek, 7, v. Voll.

Microphorus Macq.

- M. velutinus* Macq. — B. 406. — 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, 5, de Man; Amsterdam, v. d. W.; Heemstede, 3, v. Voll.; Bloemendaal, 5, de M.
- M. crassipes* Macq. — B. 407. — Rotterdam, 9, Frans.; Utrecht, een ♂, Six.
- M. clavipes* Meig. Syst. Besch. VI. 336; Schin. Fn. austr. I. 79. — Santpoort, 6, de M.; Utrecht, 7, v. d. W.

Cyrtoma Meig.

- C. spurium* Fall. — B. 475. — Limburg, Maur.; Domburg, 6, 7, de Man; Rotterdam, 6, Frans.; Noordwijk, 5, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Santpoort, 6, Bussum, 9 en Kortenhoef, 5, de M.; Haarlem, 6, Weyenb.; Driebergen, 6, Six; Zutphen, v. Eynhd.
- C. nigrum* Meig. — B. 476. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 5, Frans.; Driebergen, 6, Six; Empe, 8, v. Eynhd.
- C. simplicipes* Zett. — B. 478. — Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Schoorl, 5, Jasp.; Zutphen, v. Eynhd.
- C. sulcatum* Zett. — B. 477. — 's Gravenhage, 5, 8 en Wassenaar, 7, v. d. W.; Amsterdam, 6, v. Eynhd.; Utrecht en Driebergen, 6, Six; Empe, 6, v. Eynhd.

Anthalia Zett.

- A. rostrata* Zett. Dipt. Scand. I. 250. — Driebergen, 5, Six.

Hemerodromia Meig.

- H. praecatoria* Fall. — B. 446. — Driebergen, 6, een ♂, Six; Empe, een ♀, v. Eynhd.

H. oratoria Fall. — Schin. Fn. austr. I. 83. — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, Six; Rotterdam, 5, 6, Piag.; Driebergen, Six; Kuilenburg, 7, de M.

H. raptoria Meig. Syst. Besch. III. 65. — Bij Rotterdam, 6, Piag.

Sciodromia Hal.

Sc. immaculata Hal. — Schin. Fn. austr. I. 86. — Amsterdam, 5, de M.; Baarn, 8, de M.; Driebergen, 9, Six.

Thamnodromia Mik.

Th. vocatoria Fall. — B. 447 (*Hemerodromia*). — 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Hilversum, 6, Bussum, 7, IJmuiden, 6, Santpoort, 6 en Heilo, 7, de M.

Th. melanocephala Fabr. — B. 448 (*Hemerodromia*). — Niet zeer zeldzaam; in N. Brabant, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.

Tachypeza Meig.

T. cimicoides Fabr. — B. 449. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland en Utrecht aangetroffen.

T. albitarsis Staeg. — B. 450. — Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 5 en 6, niet zeldzaam, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Hilversum, 7, v. d. W.; Driebergen, 7, de Gr.; Empe, v. Eyndh.

T. connexa Meig. — B. 451. — 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 5, de M.; Amsterdam, 5, Kink. en de M.; Utrecht, Six.

T. sabulosa Winth. — B. 452. — 's Gravenhage, v. d. W.

T. nervosa Meig. — B. 453. — Haagsche bosch, 8, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, 4, v. d. W.; Hilversum, 6, 10 en Bussum, 4, de M.; Zeist, 6, Six; Putten (Gelderl.), Oudem.

T. fuscipennis Fall. — B. 454. — Empe, een ♂, v. Eyndh.

T. arrogans L. — Schin. Fn. austr. I. 93. — Walcheren, l. Font.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Velzen en Schoorl, 7, Jasp.

T. calcanea Meig. Syst. Besch. VII. 95; Schin. Fn. austr. I. 93. — 's Gravenhage, 5, 7, v. d. W.

T. terricola Zett. Dipt. Scand. I. 320. — 's Gravenh., duinen, 8, Frans.

Tachydromia Meig.

T. albisetia Meig. — B. 455. — 's Gravenhage, 7 tot 9 en Wassenaar, 8, v. d. W.; Vogelenzang, 8 en Haarlemmerhout, v. d. W.; de Bilt, 8, Six.

T. longicornis Meig. — B. 456. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; duinen Katwijk, 8, v. d. W.; Heemstede, 6, v. Voll.; Driebergen, 10, Six; Wolfhezen, 8, v. d. W.

- T. flavicornis* Meig. — B. 457. — Plasmolen, 6, Piag.; Goes, 6, v. Voll.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Rotterdam, 5, Frans.; Leiden, v. Voll.; Utrecht, 5, Six.
- T. bicolor* Fabr. — B. 458. — In Zeeland, N. en Z. Holland op verschillende plaatsen; verder Zutphen, 7, v. Eyndh.; Kampen, 7, v. Voll.; Groningen, 6, de Gav.
- T. pallidiventris* Meig. — B. 459. — Dinther, 7, de Man; Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, 7, v. Voll.; Amsterdam, 7, Sn.; Wolfhezen, 6, Kink.
- T. annulata* Fall. — B. 460. — Herhaaldelijk in Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- T. annulipes* Meig. — B. 461. — Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Utrecht, 5 en 6, Wtt.
- T. agilis* Meig. — B. 462. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Amsterdam, 5, Kink.; Empe, v. Eyndh.
- T. flavipes* Fabr. — B. 463. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën gevonden.
- T. calceata* Meig. — B. 464. — 's Gravenhage, v. d. W.
- T. fasciata* Meig. — B. 465. — Utrecht, 7, een ♀, Maitl.
- T. exigua* Meig. — B. 466. — 's Gravenhage, 6 tot 8, v. d. W.
- T. cursitans* Fabr. — B. 467. — Niet zeldzaam; in Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- T. maculipes* Meig. — B. 468. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6 en Wassenaarsche duinen, 8, v. d. W.; Amsterdam, 6, Jasp.; Utrecht, 5, Six en Wtt.
- T. cothurnata* Macq. — B. 469. — 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Utrecht en Driebergen, 5, Six.
- T. pectoralis* Fall. — B. 470. — 's Gravenhage, 7, v. d. W. en 6, de M.; Baarn, 8, de M.
- T. major* Zett. Dipt. Scand. I. 287; Schin. Fn. austr. I. 88. — 's Gravenhage, 5, 7, v. d. W.
- T. minuta* Meig. Syst. Besch. III. 76; Schin. Fn. austr. I. 89. — Walcheren, G. v. W.; Rotterdam, 5, 6, Piag.; Amsterdam, 5, Kink.
- T. rufipes* Meig. Syst. Besch. VII. 99; Schin. Fn. austr. I. 89. — Plasmolen, 6, Piag.
- T. notata* Meig. Syst. Besch. III. 78; Schin. Fn. austr. I. 89. — Amsterdam, 6, Jasp.
- T. femoralis* Zett. Dipt. Scand. I. 299; Schin. Fn. austr. I. 90. — 's Gravenhage, Six.
- T. unguiculata* Zett. Dipt. Scand. I. 291; Schin. Fn. austr. I. 90. — Plasmolen, 6, Piag.
- T. ciliaris* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 90. — Maastricht, 7, Maur.; Driebergen, 10, Six.
- T. candicans* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 89. — Dinther, 7, de Man.

- T. fuscicornis* Zett. Dipt. Scand. I. 291; Schin. Fn. austr. I. 90. — 's Gravenhage, 5, Six.
- T. pallipes* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 90. — Dinther, 8, de Man; Brummen, 10, v. Voll.
- T. albocapillata* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 90. — 's Gravenhage, Frans.
- T. compta* Walk. — Schin. Fn. austr. I. 91. — Utrecht, Six; Maarsbergen, 8, Piag.
- T. exilis* Meig. Syst. Besch. III. 90; Schin. Fn. austr. I. 91. — Maastricht, 8, Maur.
- T. nigrina* Meig. Syst. Besch. III. 76; Schin. Fn. austr. I. 89. — Haarlem, 5, Weyenb.

Elaphropeza Macq.

- E. ephippiata* Fall. — B. 471. — Middelburg, 7, de Man; Utrecht, 9, Six; Amersfoort, 6, Six; Kulenburg, 7, de M.

Ardoptera Macq.

- A. irrorata* Fall. — B. 472. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, 5 en 8, de M.; Driebergen, 9, Six.

Drapetis Meig.

- Dr. graminum* Fall. — B. 473. — Utrecht, 3, 5, 9, Six.
- Dr. assimilis* Fall. — B. 474. — Maastricht, 8, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, Six; Utrecht, Six; Zutphen, v. Eynth.
- Dr. lunata* Walk. — Schin. Fn. austr. I. 95. — Walcheren, l. Font.; Utrecht, 6, 7, Six.
- Dr. flavipes* Macq. — Schin. Fn. austr. I. 95. — Maastricht, 8, 9, Maur.
- Dr. nervosa* Löw, Neue Beiträge, VI. 37. — 's Gravenhage, 4, 6 en duinen bij Katwijk, 8, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Overveen, 4, Weyenb.; Diemen, 7, de M.; Buiksloot, 5, Kink.; Utrecht, Six.

DOLICHOPODIDAE.

Psilopus Meig.

- Ps. platypterus* Fabr. — B. 504. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.
- Ps. nervosus* Wied. — B. 505. — Venlo, 6, de M.; Oirschot, 7, Maur.; Bussum, 7 en Hilversum, 6, de M.; Zutphen, 6, v. Eynth.
- Ps. contristans* Wied. — B. 506. — 's Gravenhage, 6, Katwijksche strand, 7, v. d. W.; Rotterdam, 5, Frans.; Haarlem, 7, Weyenb.;

- Texel, 5, Rits.; Gliphoeve bij Heemstede, 7, v. Voll.; Driebergen, 6; Six; Apeldoorn, 7, v. d. W.; Heelsum, 6, v. Voll.
- Ps. Wiedemanni* Fall. — B. 507. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden.
- Ps. lobipes* Meig. — B. 508. — Venlo, 6, de M.; Ossendrecht en Bergen-op-Zoom, 7, de M.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 8, Heemstede, 7, v. Voll.; Bloemendaal, 8, Santpoort, 6 en Heilo, 7, de M.; Vogelenzang, 6, Kink., Groesbeek, 7, de M.
- Ps. albifrons* Hfmg. — B. 509. — Venlo, v. d. Br.; Dinther, 7, de Man; Brummen, 7, v. Voll.; Voorst, Wtt.
- Ps. lugens* Meig. — B. 510. — Gliphoeve bij Heemstede, 9, het ♀, v. Voll.
- Ps. laetus* Meig. Syst. Besch. IV. 38. — 's Gravenhage en Wassenaar, duinen, 8; v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 8, Piag.; Zwammerdam, 8, de M.
- Ps. pallens* Wied. Auss. Zweifl. II. 219. — *Ps. albonotatus* Löw, Neue Beiträge, V. 4. — Oorspronkelijk eene N. Amerikaansche soort, doch door Löw ook op het eiland Rhodus gevangen. In ons land werd zij aangetroffen: Amsterdam, 7, Kink. en Haarlem, 5, Weyenb.

Neurigona Rond.

- N. quadrifasciata* Fabr. — B. 511 (*Saucropus*). — Venlo, 6, de M.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, soms in aantal, v. d. W.; Voorst, 6, Wtt.

Xanthochlorus Löw.

- X. tenellus* Wied. — B. 512. — Valkenburg, 7, Piag.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage en Wassenaar, 7 en 8, v. d. W.; Vogelenzang, 8, Kink.; Santpoort, 9, Piag.; Velzen en IJmuiden, 6, de M.; Utrecht, 6, Wtt.; Driebergen, Six.
- X. ornatus* Hal. — B. 513. — Herhaaldelijk in Limburg, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland gevonden.

Achaleus Löw.

- A. flavicollis* Meig. Syst. Besch. IV. 56; Schin. Fn. austr. I. 184. — Diemen, 7, de M.

Chrysotus Fall.

- Chr. cupreus* Macq. — B. 514. — Gronsveld, 6, Oudem.; Middelburg, 6, de Man; Wassenaar, 6, v. Voll.; Overveen, 6, Piag.; Utrecht, 6, Six; Maarsbergen, 8, Piag.
- Chr. gramineus* Fall. — B. 515. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.

- Chr. cilipes* Meig. — B. 516. — 's Gravenhage, duinen, 5, v. d. W.; Heilo, 7, de M.; Maarsbergen, 7, Kink.; Empe, v. Eyndh.
- Chr. neglectus* Wied. — B. 517. — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, N. Brabant, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland.
- Chr. laesus* Wied. — Schin. Fn. austr. I. 186. — Beek, 6, Six; Winterswijk, 7, v. d. W.
- Chr. suavis* Löw, Neue Beitr. V. 49; Schin. Fn. austr. I. 186. — Middelburg, 6, de Man; Loosduinen, 7, de M.; Diemen, 8, en Bussum, 7, de M.; Amsterdam, 6, Kink.; Utrecht, Six.

Chrysotimus Löw.

- Chr. molliculus* Fall. — B. 518. — Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage en Wassenaar, 6, 8, v. d. W.; Bloemendaal, 8, de M.; Heemstede, 9, v. d. W.; de Bilt, Six; Amersfoort, 8, v. Voll.; Maarsbergen, 7, Kink.

Diaphorus Meig.

- D. oculatus* Fall. — B. 519. — Venlo, 6, v. d. Br.; Maastricht, 6, Maur.; Plasmolen, 6, v. d. W.; Haagsche bosch, 7, v. d. W.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Groesbeek 7 en Kuilenburg 7, de M.
- D. Hoffmannseggii* Meig. — B. 520. — Oisterwijk, 7, de M.; Wassenaar, 7, v. Voll. en v. d. W.; eens in aantal, Utrecht, Six.
- D. tripilus* Löw, Neue Beiträge, V. 47; Schin. Fn. austr. I. 187. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.
- D. nigricans* Meig. Syst. Beschr. IV. 32; Schin. Fn. austr. I. 187. — Putten (N. Brabant), 7 en Bergen-op-Zoom, 7, de M.; Maarsbergen, 8, Piag.; Lochem, 6, de M.
- D. Winthemi* Meig. Syst. Beschr. IV. 34; Schin. Fn. austr. I. 188. — Houthem, 7, Versl.

Argyra Macq.

- A. diaphana* F. — B. 521. — Venlo, 5, v. d. Br.; Middelburg, 6, de Man; in N. en Z. Holland op verscheidene plaatsen gevonden; Utrecht, 5, Wtt.; Apeldoorn, 7, v. d. W.; Leeuwarden, 5, H. A.
- A. leucocephala* Meig. — B. 522. — Ossendrecht, 7, de M.; 's Gravenhage en Leiden, 6 en 7, v. d. W.; Rotterdam, 5, Frans.; Noordwijk, Piag.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Bussum, 7, de M.; Amsterdam, 5, 7, Kink.; Utrecht, 6 en 7, Wtt. en Six; Beek, 8, v. M. d. R.
- A. argentina* Meig. — B. 523. — Walcheren, l. Font.; Rotterdam, 5, Piag.; Sterkenburg bij Driebergen, 7, v. Voll.; Beekhuizen, 8, Piag.; Brummen, 7, v. Voll.
- A. argentata* Macq. — B. 524. — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland.

Leucostola Löw.

L. vestita Wied. — B. 525. — Rotterdam, 6, 7, Frans.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Diemen, 6, 7, niet zeldzaam, de M.; Weesp, 6, de M.; Utrecht, 7, Six.

Anepsius Löw.

A. flaviventris Meig. Syst. Besch. IV. 58; Schin. Fn. austr. I. 191. — Haagsche bosch, 5, v. d. W.

Syntormon Löw.

S. pallipes Fabr. — B. 526. — Bergen-op-Zoom, 7, de M.; Middelburg, 7, 8, de Man; Voorburg, v. d. W.; Schoveningen, 5, v. Voll.; Noordwijk, 5, Piag.; Buiksloot, 5, Kink.; Diemen, 5—8, soms talrijk, de M.; Helder, 8, de M.; Driebergen, Six.

Xiphandrium Löw.

X. caliginosum Meig. — B. 527 (*Rhaphium*). — Haagsche bosch, 5, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 7, Frans.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Ridderkerk, 7, Durgerdam, 7 en Hilversum, 5, de M.; Utrecht, 8, Six; Sterkenburg, 7, v. Voll.; Driebergen, 10, Six.

X. fasciatum Meig. — B. 528 (*Rhaphium*). — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Utrecht, 5, Six; Zeisterbosch, 6, Six.

X. monotrichum Löw, Stett. Entom. Zeit. XI. 132; Schin. Fn. austr. I. 195. — In het Overmaassche, 5, Piag.; Diemen, 6, 7, de M.

X. appendiculatum Zett. Dipt. Scand. VIII. 3058; Schin. Fn. austr. I. 195. — Linschoten, 5, de M.

Porphyrops Meig.

P. spinicoxa Löw. — B. 529. — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 5, een ♂, v. d. W.; Zutphen, een ♂, v. Eynth.

P. nemorum Meig. — B. 530. — Maastricht, 7, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Zeeburg bij Amsterdam, 5, Kink.; Utrecht, 7, Six.

P. praerosus Löw. — B. 531. — Venlo, 5, v. d. Br.; Maastricht, 9, en Nuth, 7, Maur.; Rotterdam, 7, Frans.; 's Gravenhage, v. d. W.

Systemus Löw.

S. adpropinquans Löw. — B. 532. — Glijphoeve bij Heemstede, 6, v. Voll.

Machaerium Hal.

M. maritimae Hal. — B. 533. — Bergen-op-Zoom, 7, de M.; Woensdrecht, v. Voll. en v. d. W.; Middelburg, 8, de Man.

Rhaphium Meig.

R. h. longicorne Fall. Dolich. 51; Meig. Syst. Besch. IV. 28. —
Galdersche heide bij Breda, 5, Piag.; Putten (N. Brabant), 6, een ♂, de M

Tachytrechus Stann.

T. ammobates Walk. — B. 534. — Driebergen, 7, Six en 8, v. d. W.
T. insignis Stann. — Schin. Fn. austr. I. 204. — Plasmolen, 8, Piag.;
aan afzanderijen in de duinen, 's Gravenhage, 6, v. d. W.

Hypophyllus Löw.

H. discipes Ahr. — B. 568. — Venlo, 5, v. d. Br.; Middelburg,
6, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 5—7, eens ver-
scheidene exemplaren, Amsterdam, 7, de M.; Utrecht, 6, Six.
H. crinipes Staeg. — Schin. Fn. austr. I. 226. — 's Gravenhage,
6, een ♂, v. d. W.
H. obscurellus Fall. — Schin. Fn. austr. I. 227. — Plasmolen,
6, v. d. W.; Middelburg, 6, de Man; Haagsche bosch, 6, v. d. W.

Poecilobothrus Mik.

P. nobilitatus L. — B. 535 (*Gymnopternus*). — Vrij gemeen; in
Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Groningen aan-
getroffen.
P. principalis Löw, Wien. Ent. Mon. schr. V. 166 (*Gymnopternus*). —
Aan den Leidschendam, 7, v. d. W.
P. comitalis Kow. Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1867, 320. — B. 536
(*Gymn. regalis*). — Aan den Leidschendam, 7, v. d. W., te gelijk
met de vorige.
P. chrysozygos Wied. — B. 537 (*Gymnopternus*). — Middelburg,
6, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, soms gemeen, v. d. W.; Rotterdam,
6, Frans.; Heemstede, 8, gemeen, v. Voll.; Haarlemmerhout, Weyenb.;
Hilversum, 7, v. d. W.; Diemerbrug, 7, Jasp.; Utrecht, 7, v. d. W.;
Empe, v. Eyndh.

Hereostomus Löw.

H. nigricornis Meig. — B. 538 (*Gymnopternus*). — Ossendrecht,
7, de M.; 's Gravenhage en Wassenaar, 7 en 8, niet zeldzaam, v. d. W.
en de M.; Staalduinen, 6, 7, v. d. W.; Katwijk, 8, v. Voll.; Noord-
wijk, 7, Kink.; Overveen, 7, Kink.; Arnhem, 8, Perin.
H. nigriplantis Stann. — B. 539 (*Gymnopternus*). — 's Gravenhage
en Wassenaar, 6 tot 8, vrij gemeen, v. d. W. en de M.; Bloemendaal,
7, v. d. W.; Vogelenzang, 7, Weyenb.; Santpoort, 6, de M.

Gymnopternus Löw.

- G. germanus* Wied. — B. 540. — Venlo, 5, v. d. Br.; Bunde, 6, Maur.; Helder, 8, de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Wageningen, 7, v. d. W.; Brummen, 8, v. Voll.; Assen, 7, v. d. W.; Groningen, 8, de Gav.
- G. nigripennis* Fall. — B. 541. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe aangetroffen.
- G. cupreus* Fall. — B. 542. — Plasmolen, 6, Piag.; Rijen, 5, Piag.; Bergen-op-Zoom, 5, Rits.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Bodegraven, 6, de M.; Hilversum, 5, 6, de M.; Amsterdam, 5, Kink.; Maarsbergen, 7, Kink.
- G. aerosus* Fall. — B. 543. — Nuth, 7, Maur.; Oosterwijk, 7, de M.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Heemstede, 6, v. Voll.; Bussum, 6, de M.; Utrecht, 6, Six; Zutphen, 7, v. d. W.
- G. brevicornis* Staeg. — B. 544. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.
- G. celer* Meig. — B. 545. — Nuth, 7, Maur.; Oosterwijk, 7, de M.; Middelburg, 6, 7, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Vreeland, 5, Kink.; Driebergen, 6, Six; Amersfoort, 8, v. Voll.; Apeldoorn, 6, Oudem.
- G. plagiatus* Löw, Neue Beitr. V. 16; Schin. Fn. austr. I. 208. — Bij Rotterdam, 6, 8, Piag.
- G. chalybaeus* Wied. — Schin. Fn. austr. I. 210. — Nuth, 7, Maur.; Rotterdamsche plassen, 6, v. d. W.
- G. metallicus* Stann. — Schin. Fn. austr. I. 210. — Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 5, 6, v. d. W.; Rotterdam, 4, 5, Frans.
- G. nigrilamellatus* Macq. Suit. à Buffon, I. 460. — Domburg, 6, de Man.

Hygroceleuthus Löw.

- H. latipennis* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 212. — Diemen, 7, soms in aantal, de M.

Dolichopus Latr.

- D. brevipennis* Meig. — B. 546. — Zeeland, Wtt.; 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Rotterdam, 6, 7, Frans.; Bodegraven, Amsterdam, 5, 7 en Bussum, 6, de M.; Texel, 5, Rits.; Utrecht, 6, Six; Abcoude, 6 en Vreeland, 5, Kink.
- D. claviger* Stann. — B. 547. — Op verscheidene plaatsen in N. en Z. Holland en Gelderland aangetroffen; bij den Haag gemeen.
- D. confusus* Zett. — B. 548. — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, Wassenaar, 6 en 7, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Hilversum, 7, v. d. W.; Bergen, 7, IJmuiden, 6, Santpoort, 6, de M.; Maarsbergen, 6, Piag.; aan de Vuursehe, v. d. W.; bij Zutphen, v. d. W. en v. Eyndh.

- D. plunitarsis* Fall. — B. 549. — 's Gravenhage, 7, een ♂, v. d. W.; Schielandsche plassen, 6, v. d. W.
- D. planitarsis* Fall. — B. 550. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.; Overveen, 5, de M.
- D. pennatus* Meig. — B. 551. — Limmel, 7, Maur.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 5 tot 7, v. d. W.; Rotterdam, 6, 7, Frans.; Heemstede, v. Voll.; Overveen, 6, Kink.; Kuilenburg, 7, de M.
- D. signatus* Meig. Syst. Besch. IV. 92 (nec Schiner) = *D. argenteifer* Löw. — B. 552. — 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Bussum, 6, de M.
- D. plumipes* Scop. — B. 553. — Gemeen.
- D. Wahlbergi* Zett. — B. 554. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Utrecht, 7, v. d. W.
- D. popularis* Wied. — B. 555. — 's Gravenhage, 5 tot 7, v. d. W.
- D. urbanus* Meig. — B. 556. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Kortenhoef, 5, de M.
- D. griseipennis* Stann. — B. 557. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- D. nitidus* Fall. — B. 558. — Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; Oisterwijk, 7, de M.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Zwammerdam, 7, de M.; Groesbeek, 7, de M.
- D. unguatus* L. — B. 559 (*aeneus* Deg.). — Zeer verbreid en veelvuldig; ook aangetroffen op Terschelling, 7, Veth.
- D. nubilus* Meig. — B. 560. — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Rotterdam, 5, 6, Piag.; Amsterdam, 5, Kink.; Diemen, 6 en 8, de M.
- D. sabinus* Hal. — B. 561. — Scheveningsche duinen, 6, een ♂, v. d. W.; duinen bij Overveen, 6, Kink.
- D. trivialis* Hal. — B. 562. — Valkenburg, 7, Piag.; Dinther, 7, 8, de Man; Middelburg, 6, 7, de Man; 's Gravenhage en Wassenaar, 7 en 8, v. d. W.; Driebergen, v. Bemm.
- D. festivus* Hal. — B. 563. — Nuth, 7, Maur.; Koudekerke, duinen, 6, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Overveen, 6, 7, Piag.; Utrecht en Amersfoort, 7, v. d. W.; Linschoten, 7, de M.; Groningen, 7, 8, de Gav.
- D. simplex* Meig. — B. 564. — Meermalen in N. Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- D. longicornis* Stann. — B. 565. — Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Leiden, 7, v. Voll.; Heemstede, 8, v. Voll.; Utrecht, 6, Six; Maarsbergen, 7, Piag.; Apeldoorn, 7, v. d. W.
- D. acuticornis* Wied. — B. 566. — Oirschot, 7, Maur.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Hilversum, 7, 8, v. d. W., 6, de M.; Santpoort en IJmuiden, 6, de M.; Maarsbergen, 6, Piag.; Lochem, 6, de M.; Kampen, 7, v. Voll.

- D. campestris* Meig. — B. 567. — Haagsche bosch, 7, en Rotterdamsche plassen, 6, v. d. W.; Terschelling, 7, Veth; Diemen, 7, de M.; Utrecht, 7, v. d. W.
- D. atratus* Meig. Syst. Besch. IV. 76; Schin. Fn. austr. I. 213. — Venlo, 6, de M.; Plasmolen, 8, Piag.; Rijen, 6, Piag.; Kortenhoef, 5, de M.; Maarsbergen, 8, Piag.
- D. excisus* Löw, Neue Beiträge, VI. 10; Schin. Fn. austr. I. 215. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.
- D. arbustorum* Stann. — Schin. Fn. austr. I. 220. — Amersfoort, v. Voll.
- D. agilis* Meig. Syst. Besch. IV. 97; Schin. Fn. austr. I. 221. — Middelburg, 6, de Man.
- D. longitarsis* Stann. Isis 1831. 124 (= *equestris* Hal.); Schin. Fn. austr. I. 221 en 223. — Rotterdam, 6, Piag.
- D. vitripennis* Meig. Syst. Besch. IV. 78. — Maarsbergen, 7, 8, Piag.; Winterswijk, 7, v. d. W.
- D. aemulus* Löw, Neue Beitr. VI. 9. — Haagsche bosch, 6, v. d. W.

Thinophilus Wahlb.

- Th. flavipalpis* Zett. Dipt. Scand. II. 472; Schin. Fn. austr. I. 228. — Bergen-op-Zoom, aan de Schelde, 7, de M.; Diemen, 6, de M.

Liancalus Löw.

- L. virens* Scop. — Schin. Fn. austr. I. 229. — In de collectie Fransen (thans berustende bij Natura Artis Magistra te Amsterdam) bevinden zich een paar exemplaren, denkelijk bij Rotterdam gevangen.

Hydrophorus Wahlb.

- H. bipunctatus* Wied. — B. 569. — Utrecht, Six.
- H. nebulosus* Fall. — B. 570. — Oisterwijk (vennen) 7, Ossendrecht, 7, Putten (N. Brabant), 7, de M.; Utrecht, Six; Groesbeek, 7, de M.
- H. inaequalipes* Macq. — B. 571. — Bergen-op-Zoom, 5, Rits. en 7 de M.; Goes, 6, v. Voll.; Hoek v. Holland, v. Bemm.; Oostvoorne, 6, de M.; Katwijk (strand), 4, Perin; duinen bij Overveen, 6, Kink.; Diemen, 5, 6 en Amsterdam, 8, de M.; Driebergen, 6, Six; Vlieland, 5, Rits.
- H. praecox* Lehm. — Schin. Fn. austr. I. 230. — Bergen-op-Zoom, 5, Rits.; 's Gravenhage, duin, Six.
- H. litoreus* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 231. — Ossendrecht, 7, de M.
- H. balticus* Meig. Syst. Besch. II. 66; Schin. Fn. austr. I. 231, — Wassenaar, 7, Piag.

Sympycnus Löw.

S. annulipes Meig. — B. 572. — Vrij gemeen; in de meeste provinciën aangetroffen.

S. bifasciatus Macq. — B. 573. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Driebergen, 6, Six.

Teuchophorus Löw.

T. spinigerellus Zett. Dipt. Scand. II. 604; Schin. Fn. austr. I. 236. — Rotterdam, Piag.; Diemen, 7, de M.

Medeterus Fisch.

M. diadema L. — B. 577. — Dinther, 7, de Man; Ossendrecht, 7, de M.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 5, Frans.; Wassenaar en Katwijk, v. d. W.; Haarlem, 7—9, Weyenb.; Amsterdam, 8, Sw.; Hilversum, 7, v. d. W.

M. jaculus Fall. — B. 578. — Maastricht, 7, Maur.; Dinther, 7, de Man; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage en Scheveningen, 7 tot 9, v. d. W.; Hilversum, 6, Velzen, 6 en Bergen, 7, de M.; Zutphen, 9, v. Eyndh.

M. truncorum Meig. — B. 579. — Vrij gemeen; in de meeste provinciën gevonden.

Oligochaetes Mik.

O. plumbellus Meig. — B. 580 (*Medeterus*). — Bergen-op-Zoom, 7, de M.; 's Gravenhage, 7, een ♀, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bloemendaal, 9, de M.; Maarsbergen, 7, Piag.

O. muralis Meig. Syst. Besch. IV. 62; Schin. Fn. austr. I. 238 (*Medeterus*). — Middelburg, 6, 8, de Man; 's Gravenhage, 6, 8, v. d. W.; Rotterdam, 6, 7 en in het Overmaassche, 9, Piag.; Amersfoort, 6, Six.

O. pallipes Zett. Dipt. Scand. II. 453 (*Hydrophorus*). — 's Gravenhage, 7, v. d. W.

Campsicnemus Walk.

C. scambus Fall. — B. 574. — Oisterwijk, 7, de M.; Middelburg en Domburg, 8, 9, de Man; Scheveningen, 5 en 10, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Utrecht, 2 en Driebergen, 7, Six; Baarn, 8, de M.; Brummen, 8, v. Voll.

C. curvipes Fall. — B. 575. — Middelburg, 8, 9 en duinen bij Koudekerke, 6, de Man; Bodegraven, 8, de M.; Wassenaar, 9, Bits.; Hoek v. Holland, 9, Piag.; Utrecht, 9, Six.

C. compeditus Löw. — B. 576. — Utrecht, een ♂, Six.

C. lumbatus Löw, Neue Beitr. V. 28; Schin. Fn. austr. I. 235. — Driebergen, Six.

C. marginatus Löw, Neue Beitr. V. 28; Schin. Fn. austr. I. 235. — Driebergen, 10, Six.

C. pectinulatus Löw, Syst. Besch. II. 302. — Diemen, 6, 7 en Naarden, 7, de M.

LONCHOPTERIDAE.

Lonchoptera Meig.

- L. lutea* Panz. — B. 711. — Eene gewone en zeer verbreide soort.
L. lacustris Meig. — B. 712. — Als de vorige.
L. rivalis Meig. — B. 713. — 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, 5, Frans.
L. palustris Meig. — B. 714. — 's Gravenhage, 3 en 10, v. d. W.
L. trilineata Zett. Dipt. Scand. VII. 2804; Schin. Fn. austr. I. 244. — Bodegraven, 5, de M.; Amsterdam, 9, Sw.; Hilversum, 6, de M.; Kuilenburg, 7, de M.
L. flavicauda Meig. Syst. Besch. IV. 107; Schin. Fn. austr. I. 244. — Middelburg, 8, de Man; Wassenaar, 4, v. Voll.

PLATYPEZIDAE.

Callomyia Meig.

- C. amoena* Meig. — B. 715. — 's Gravenhage, 5, 6, 8, v. d. W.; Amsterdam, 5, de M.; Doorn, 8, de M.
C. antennata Meig. — B. 716. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Driebergen, 5, 7, v. Voll.; Maarsbergen, 7, Piag.

Platyeza Fall.

- Pl. fasciata* Fabr. — B. 717. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Loosduinen, 9, zes exemplaren, Schuyt.
Pl. ornata Meig. — B. 718. — 's Gravenhage, een ♀, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Driebergen, 6, een ♀, Six.
Pl. atra Fall. — B. 719. — Breda, 8, Heyl.; 's Gravenhage, 5, 7, 9, v. d. W.; Putten (Gelderland), 6, Oudem.
Pl. brunnipennis Macq. — B. 720. — Empe, v. Eyndh.
Pl. dorsalis Meig. — B. 721. — 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Leiden, 10, v. Voll.
Pl. picta Meig. — B. 722. — Noordwijk, Piag.; Haarlemmerhout, 10, Kink.; Driebergen, 10, Six.
Pl. rufa Meig. — B. 723. — Domburg, 9, de Man; Haagsche bosch, 9 en 10, meermalen, v. d. W.; Rotterdam, 9, Frans.; Driebergen, 10, Six.
Pl. rectinervis v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XI. 229. — 's Gravenhage, duinen, 5, v. d. W.; Hillegom, 5, Kink.

Opetia Meig.

- O. nigra* Meig. — B. 724. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, 9, v. Voll.; Kortenhoef, 5, de M.; Utrecht, Six.

PIPUNCULIDAE.

Nephrocerus Zett.

N. flavicornis Zett. — B. 701. — Empe, 7, een ♂, v. Eyndh.

Pipunculus Latr.

- P. auctus* Fall. — B. 702. — Walcheren, l. Font.; Haagsche bosch, 7, een ♀, v. d. W.; Leiden, een ex., Perin.
- P. furcatus* Schin. — B. 703. — Duinbosschen bij 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Rotterdam, 8, 9, Frans.; Haarlem, 6, Weyenb.
- P. campestris* Latr. — B. 704. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Utrecht, 6, Six; Amersfoort, 7, v. d. W.
- P. nigritulus* Zett. — B. 705. — Limburg, Maur.; duinbosschen bij 's Gravenhage, 7, v. d. W.; de Bilt, 8, Six; Amersfoort, 6, Six; Zeist, 8, de M.; Kuilenburg, 6, de M.
- P. pratorum* Fall. — B. 706. — Mastbosch bij Breda, 7, v. d. W.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Utrecht, 9, Six; Maarsbergen, 8, Piag.; Wolfhezen, 8, v. Walchr.
- P. geniculatus* Meig. — B. 707. — 's Gravenhage, 7, een ♂, v. d. W.
- P. ater* Meig. — B. 708. — 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.
- P. flavipes* Meig. — B. 709. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.; beide keeren slechts één exemplaar.
- P. sylvaticus* Meig. Syst. Besch. IV. 20; Schin. Fn. austr. I. 246. — 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.
- P. elegans* Schin. Fn. austr. I. 246. — Dinther, 7, een ♀, de Man.
- P. modestus* Hal. — Schin. Fn. austr. I. 246. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.
- P. rufipes* Meig. Syst. Besch. IV. 21; Schin. Fn. austr. I. 247. — Domburg, 7, de Man; Rotterdamsche plassen, 8, Piag.
- P. ruralis* Meig. Syst. Besch. IV. 22; Schin. Fn. austr. I. 247. — Valkenburg, 7, Piag.; Maastricht, 7, v. d. W.; 's Gravenhage, Six; Utrecht, Six.
- P. haemorrhoidalis* Zett. Dipt. Scand. III. 959. — Linschoten, 8, een ♀, de M.

Ateleneura Macq.

- A. spuria* Fall. — B. 710. — Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 5 en 8, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Bodegraven, 5 en Zwammerdam, 8, de M.; Amsterdam, 5, 6, de M.; Utrecht, 6, Six; Brummen, 5 en Beekhuizen, 8, v. Voll.; Beek, 6, Six.
- A. holosericea* Meig. Syst. Besch. IV. 24 (*Pipunculus*); Schin. Fn. austr. I. 245. — Utrecht, 5, Six.

CONOPIDA E.

Conops L.

- C. quadrifasciata* Deg. — B. 725. — Vrij zeldzaam, doch zeer verbreid; uit Limburg, N.Brabant, N. en Z.Holland, Utrecht en Gelderland vermeld.
- C. vitellina* Löw. — B. 726. — Een ♀ in de coll. v. Walchr., denklijk uit Gelderland.
- C. flavipes* L. — B. 727. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- C. strigata* Meig. — B. 728. — Plasmolen, 8, Piag.; Wolfhezen, 8, v. d. W.; Empe, 8, v. Eyndh.
- C. ferruginea* Macq. — B. 729. — Driebergen, Six.
- C. vesicularis* L. — Schin. Fn. austr. I. 373. — Wolfhezen, 5, een ♀, v. M. d. R.

Physocephala Schin.

- Ph. rufipes* Fabr. — B. 730. — Valkenburg, 7, v. d. W.; St. Pieter, 8, Maur.; Middelburg, 6, de Man; Rotterdam, 7, 9, Frans.; Utrecht, Six; Arnhem, 8, v. Eyndh.; Apeldoorn, de Vos.
- Ph. vittata* Fabr. — B. 731. — Katwijk, 8, de Gr.; Rotterdam, 8, Frans.; Velzen, Jasp.; Enschedé, 7, de Man.
- Ph. chrysorrhæa* Meig. — B. 732. — Venlo, 7, 8, v. d. Br.; Valkeveen, 7, v. d. W.; de Bilt, 7, v. d. W.

Sicus Scop.

- S. ferrugineus* L. — B. 734 (*Myopa*). — Niet zeldzaam, in de meeste provinciën gevonden.

Zodion Latr.

- Z. notatum* Meig. — B. 733. — Valkenburg, 7, Piag.; Houthem, 7, Oudem.; Oirschot, 6, Maur.; Driebergen, 6, Six; Wintersw., 7, v. d. W.
- Z. cinereum* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 381. — Houthem, 6, Oudem.; Venlo, 7, v. d. Br.; Plasmolen, 7, Oudem.; Ulvenhoutsche bosch, 6, Piag.; Zierikzee, 8, Fokker; de Bilt, 7, v. d. W.; Laag Soeren, 6, Oudem.

Occemyia Rob. D.

- O. atra* Fabr. — B. 738 (*Myopa*). — Valkenburg, 6, Oudem., en 7, Piag.; Houthem, 6, 7, Oudem.; Liesbosch bij Breda, 8, v. d. W.; Walcheren, G. v. W.; Utrecht, een ♂, Six.

Myopa Fabr.

- M. fasciata* Meig. — B. 735. — Venlo, 8, v. d. Br.; Plasmolen,

- 8, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; Breda, 9, Heyl.; Putten (N. Brabant), 7, de M.; Utrecht, Six; Doorn, de Gr.; Soesterheide, 9, Kink.; Arnhem en Velp, 7 en 8, v. d. W.; Beek, 7, v. d. W.
- M. testacea* L. — B. 736. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- M. buccata* L. — B. 737. — Nuth, 6, Maur.; Breda, Heyl.; Ulvenhoutsche bosch, Piag.; 's Gravenhage, v. Voll.; Rotterdam, 4, Piag.; Haarlem, 4, Weyenb.; Hilversum, 4, Oudem.; Hillegom, 3, Kink.; Utrecht, Six; Arnhem, 5, v. M. d. R.
- M. polystigma* Rond. — Schin. Fn. austr. I. 387. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.; Overveen, 4, Weyenb.; Hilversum, 4, Oudem.; Apeldoorn, 4, de Vos.

Dalmannia Rob. D.

- D. punctata* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 389. — Arnhem en Oosterbeek, 5, v. M. d. R.

SYRPHIDAE.

Ceria Fabr.

- C. conopoides* L. — B. 581. — Oud-Vroenhoven, Maur.; Venlo, 6, v. d. Br.; Breda, Heyl.; Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; Rotterdam, een ♀, Frans.; Utrecht, Six; Driebergen, v. Bemm.; Groesbeek, 8, v. M. d. R.; Brummen, v. Walchr.; Heerenveen, Jasp.

Microdon Meig.

- M. devius* Schrank. — Schin. Fn. austr. I. 251. — Bunde, 6, Maur.; Houthem, 6, Oudem.; Apeldoorn, 6 en Laag Soeren, 6, Oudem.
- M. mutabilis* L. — Schin. Fn. austr. I. 250. — Rijen, 6, een ♀, Piag.; Laag Soeren, 6, Oudem.

Psarus Latr.

- Ps. abdominalis* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 253. — Valkenburg, 7, Piag.; Oirschot, 6, Maur.; Bergen-op-Zoom, 7, de M.; Hilversum, 7, Six; Beek, 7, v. d. W.; Putten (Gelderland), 8, Oudem.

Chrysotoxum Meig.

- Chr. bicinctum* L. — B. 582. — Venlo, v. d. Br.; 's Gravenhage, duinen, 6, een ex., v. d. W.; Overveen, duinen, 6, Kink.; Utrecht, Six; Apeldoorn, 7, Rits.; Winterswijk, 7, v. d. W.; Brummen, 8, v. Voll.; Groesbeek, 7, de M.; Putten (Gelderland), 8, Oudem.
- Chr. festivum* L. — B. 583. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Utrecht en Gelderland aangetroffen; ook Bodegraven, 7, de M.; Heemstede, 7, v. Voll.

- Chr. octomaculatum* Curt. — B. 584. — Venlo, 6, de M.; Oirschot, 6, Maur.; Utrecht, Six; Driebergen, v. Bemm.; Wolfhezen en Doorn, de Gr.; Arnhem, 6, v. M. d. R.
- Chr. arcuatum* L. — Schin. Fn. austr. I. 253. — Venlo, v. d. Br.
- Chr. intermedium* Meig. Syst. Besch. III. 169; Schin. Fn. austr. I. 254. — Venlo, 5, v. d. Br.; Nuth, Maur.; Domburg, 6, de Man.
- Chr. vernale* Löw, Stett. Ent. Zeit. 1841, 459; Schin. Fn. austr. I. 255. — Plasmolen, 8, een ♂, Piag.

Paragus Latr.

- P. tibialis* Fall. — B. 682. — Maastricht, 7, Maur.; Valkenburg, 7, Piag.; Utrecht, 9, een ♂, Six; Maarsbergen, 7, v. d. W.; Beek, 7, v. d. W.; Empe, 8, v. Eyndh.
- P. lacerus* Löw, Isis, 1840. 42; Schin. Fn. austr. I. 258. — Valkenburg, 7, twee ♂, Piag.

Pipiza Fall.

- P. quadrimaculata* Panz. — B. 683. — Leiden, de Gr.; Rotterdam, Frans.
- P. festiva* Meig. — B. 684. — Limburg, Maur.; Middelburg, de Man; Rotterdam, 5, 6, Frans.; 's Gravenhage, 5, een ♀, v. d. W.; Zutphen, 7, Rits.; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Kuilenburg, 7, de M.; Putten (Gelderl.), 9, Oudem.
- P. noctiluca* L. — B. 685. — Oirschot, 6, Maur.; Middelburg, 5, de Man; Rotterdam, 7, Frans.; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Bussum, 5, de M.; Utrecht, Six.
- P. signata* Meig. — B. 686. — Venlo, 8, v. d. Br.; Heemstede, 8, v. Voll.; Beek, 6, v. M. d. R.
- P. bimaculata* Meig. — B. 687. — 's Gravenhage, 7, een ♂, v. d. W.; Middelburg, 5, de Man.
- P. guttata* Meig. — B. 688. — Een ♀ in de coll. v. Walchr., denklijk uit Gelderland.
- P. funebris* Meig. — B. 689. — Rotterdam, 5, Frans.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.; Driebergen, 7, Six.
- P. chalybeata* Meig. — B. 690. — Maastricht, 7, de Man; Arnhem, 8, v. Eyndh.; Laag Soeren, 6, Oudem.
- P. anthracina* Meig. — B. 691. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Brummen, 7, v. Voll.
- P. lugubris* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 263. — Houthem, 7, Oudem.; Middelburg, 6, de Man; Hilversum, 6, de M.; Linschoten, 5, de M.
- P. carbonaria* Meig. Syst. Besch. III. 251; Schin. Fn. austr. I. 264. — Valkenburg, 7, Piag.; Breda, 6, Heyl.; Rotterdam, 6, Piag.

Pipizella Rond.

- P. virens* Fabr. — B. 692. — In Limburg, N. Brabant en Gelderland op verscheidene plaatsen; verder Middelburg, 6, 7, de Man; Rotterdam, 6, Frans.; Schielandsche plassen, 6, v. d. W.; Leiden, 7, Perin; Warmond, v. Bemm.; Maarsbergen, 8, Piag.
- P. annulata* Macq. — B. 693. — Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, 7, 8, Frans.

Chrysogaster Macq.

- Chr. coemeteriorum* L. — B. 677. — In Limburg op verscheidene plaatsen; Rotterdam, 7, Frans.; Utrecht, Six; Sterkenburg, 7, v. Voll.; Apeldoorn, 7, v. d. W.
- Chr. viduata* L. — B. 678. — In Limburg, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- Chr. Macquarti* Löw. — B. 679. — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland.
- Chr. metallina* Fabr. — B. 680. — Meermalen in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen, ook op Texel, 5, Rits.
- Chr. splendida* Meig. — B. 681. — Nuth, 7, Maur.; Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, Frans.; Zwammerdam, 6, Nieuwkoop, 8, de M.; Diemen, 5 tot 8, niet gemeen, Bussum, 6, de M.
- Chr. aerosa* Löw, Stett. Ent. Zeit. 1843, 252; Schin. Fn. austr. I. 269. — Limmel, 5, Maur.; Texel, 5, Rits.
- Chr. splendens* Meig. Syst. Beschr. III. 266; Schin. Fn. austr. I. 269. — Maastricht, Maur.
- Chr. chalybeata* Meig. Syst. Beschr. III. 267; Schin. Fn. austr. I. 270. — Nuth, 7, Maur.; Houthem en Gulpen, 6, Oudem.

Orthoneura Macq.

- O. elegans* Meig. Syst. Beschr. III. 272 (*Chrysogaster*); Schin. Fn. austr. I. 272. — Nuth, 7, Maur.; Kortenhoef, 5, de M.

Chilosia Meig.

- Ch. oestracea* L. — B. 662. — Zutphen en Voorst, 7 en 8, v. Eyndh.
- Ch. variabilis* Panz. — B. 663. — Limburg, Maur.; Dinther, 7, de Man; Hilversum, 7, de M.; Amersfoort, 7, v. Voll.; Empe, 7 en 8, v. Eyndh.
- Ch. albitarsis* Meig. — B. 664. — Op verscheidene plaatsen in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- Ch. chrysocoma* Meig. — B. 665. — Venlo, 5, v. d. Br.; 's Gravenhage, 5, een ♂, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Haarlem, 5, Weyenb.

- Ch. vernalis* Fall. — B. 666. — Ginneken, 7, v. Voll.; Walcheren, G. v. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Overveen, 4, Weyenb.; Arnhem, 5, Sw.
- Ch. impressa* Löw. — B. 667. — Venlo, 8, v. d. Br.; Dinther, 8, de Man; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.
- Ch. praecox* Zett. — B. 668. — Rijen, 6, Piag.; Walcheren, G. v. W.; Bodegraven, 7, de M.; Hilversum, 5, de M.; Overveen, 4, Rits.; Valkeveen, 5, Oudem.
- Ch. modesta* Egg. — B. 669. — Venlo, 8, v. d. Br.; Limburg, Maur.; Dinther, 8, de Man; Walcheren, G. v. W.; Hillegom, 8, v. d. W.
- Ch. chloris* Meig. — B. 670. — Plasmolen, 6, Piag.; Venlo, v. d. Br.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Utrecht, 5, Six; Arnhem, v. M. d. R.; Groningen, 8, de Gav.
- Ch. mutabilis* Fall. — B. 671. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; de Bilt, 8, Six.
- Ch. nigricornis* Macq. — B. 672. — Leiden, 9, v. Voll.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Zutphen, 7 en 8, v. Eyndh.
- Ch. rostrata* Zett. (= *cynocephala* Löw). — B. 673. — Oud-Vroenhoven, 7, Maur.; Rotterdam, 7, Frans.; Utrecht, Six.
- Ch. scutellata* Fall. — B. 674. — Limburg, Maur.; Dinther, 8, de Man; Wassenaar, 8, v. Voll.; Rotterdam, Frans.; Vogelenzang, 8, Kink.; Driebergen, v. Voll.; aan de Vuursche, v. d. W.; Arnhem, v. d. W.; Beek, 6, Six.
- Ch. pulchripes* Löw. — B. 675. — Limburg, Maur.; Middelburg, 7, 8, de Man; 's Gravenhage, 4 tot 9, v. d. W.; Lisse, 5, Piag.; Heemstede, 6, v. Voll.; Brummen, 6, v. Voll.
- Ch. gagatea* Löw. — B. 676. — 's Gravenh., 7, v. d. W.; Utrecht, Six.
- Ch. pubera* Zett. — Schin. Fn. austr. I. 278. — West-Capelle, 5, Piag.
- Ch. soror* Zett. — Schin. Fn. austr. I. 279. — Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, duinen, 7, Piag.
- Ch. carbonaria* Egg. — Schin. Fn. austr. I. 281. — Venlo, 7, v. d. Br.; Breda, 7, de Man; Velp, 7, v. d. W.
- Ch. proxima* Zett. Dipt. Scand. II. 792; Schin. Fn. austr. I. 282. — Scheveningsche duinen, 8, v. d. W.
- Ch. fasciata* Egg. — Schin. Fn. austr. I. 284. — Walcheren, G. v. W.
- Ch. canicularis* Panz. — Schin. Fn. austr. I. 284. — Venlo, v. d. Br.
- Ch. flavicornis* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 285. — Mastbosch bij Breda, 8, Piag.; 's Gravenhage, 4, 5 en 8, v. d. W.; Utrecht, 5, Six, Piag.

Melanostoma Schin.

- M. hyalinatum* Fall. — B. 651. — Venlo, 10, v. d. Br.; Breda, Heyl.; Middelburg, 8, 9, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, 9, Piag.; Haarlem, 9, Weyenb.; Amersfoort, 8, v. Voll.; Friesland, H. A.

- M. gracile* Meig. — B. 652. — Venlo, v. d. Br.; 's Gravenhage, 5 tot 9, gemeen, v. d. W.; Wassenaar, 5, de Gr.; Warmond, v. Bemm.; in Gelderland op verscheidene plaatsen; Haren 8, de Gav.
- M. mellinum* L. — B. 653. — Overal gemeen.

Platychirus St. Farg.

- Pl. manicatus* Meig. — B. 645. — West-Capelle, 6, Piag.; Scheveningen, 6, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Overveen, 5, Piag.; den Helder, 8, de M.
- Pl. albimanus* Fabr. — B. 646. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland en Utrecht gevangen; ook te Kuilenburg, 7, de M.
- Pl. scutatus* Meig. — B. 647. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, N. en Z.-Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- Pl. peltatus* Meig. — B. 648. — Vrij gemeen, bijna in alle provinciën.
- Pl. clypeatus* Meig. — B. 649. — Als de vorige.
- Pl. fulviventris* Macq. — B. 650. — Oosterwijk, 5, de M.; Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Bodegraven, 7, de M.; Durgerdam, 7, de M.; Empe, v. Eyndh.
- Pl. podagratus* Zett. Dipt. Scand. II. 751; Schin. Fn. austr. I. 296. — Nuth, 7, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Overveen, 5, Weyenb.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Assen, 7, v. d. W.

Pyrophaena Schin.

- P. ocy mi* Fabr. — B. 644. — Herhaaldelijk in Zeeland N. en Z. Holland en Utrecht aangetroffen.
- P. rosarum* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 298. — Venlo, v. d. Br.; Nuth, 7, Maur.; Rotterdamsche plassen, 8, Piag.

Leucozona Schin.

- L. lucorum* L. — B. 661. — Woerden, een ♂, de Gr.

Catabomba Ost. Sack.

- C. pyrastris* L. — B. 623 (*Syrphus*). — Gemeen.
- C. selenitica* Meig. — B. 624 (*Syrphus*). — Plasmolen, 8, Piag.; Leiden, een ♂, Herklots.

Syrphus Fabr.

- S. laternarius* Mill. — B. 625. — Venlo, v. d. Br.; Driebergen, 7, een ♀, v. Voll.
- S. tricinctus* Fall. — B. 626. — Limburg, Maur.; Venlo, 8, v. d. Br.; Oosterwijk, 8, Oudem.; Utrecht, een ♀, Six; Zeist, een ♂, Mailt.; Arnhem, v. M. d. R.; Apeldoorn, 8, Oudem.
- S. albostriatus* Fall. — B. 627. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 7, Frans.; Rotterdam, 8, v. Voll.; Leiden, de Gr.; Amsterdam, 7, Sw.; Utrecht en Driebergen, Six; Oosterbeek, v. Bemm.

- S. confusus* Egg. — B. 628 (volgens Verrall variëteit van de voorgaande). — N. Brabant, Sn.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Ridderkerk, 8, de M.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Bloemendaal, 8, de M.
- S. glaucius* L. — B. 629. — Venlo, 8, v. d. Br.; Nuth, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; 's Gravenhage, 8, een ♀, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Putten, 8 en Winterswijk, 8, Oudem.
- S. venustus* Meig. — B. 630. — Venlo, v. d. Br.; 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Rotterdam, 7, Frans.; Heemstede, 5, v. Voll.; Voorst, 6, Wtt.
- S. arcuatus* Fall. — B. 631. — Haarlem, 8, een ♂, v. d. W.
- S. luniger* Meig. — B. 632. — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, een ♂, v. d. W.
- S. corollae* Fabr. — B. 633. — Overal gemeen.
- S. grossulariae* Meig. — B. 634. — Venlo, 4, 5, v. d. Br.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 4, een ♀, v. d. W.; Wassenaar, 5, een ♀, de Gr.
- S. ribesii* L. — B. 635. — Overal gemeen.
- S. vitripennis* Meig. — B. 636. — Herhaaldelijk in de meeste provinciën aangetroffen; waarschijnlijk slechts variëteit van de voorgaande.
- S. bifasciatus* Fabr. — B. 637. — Venlo, 5, v. d. Br.; Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Utrecht, 6, Six; Zutphen en Empe, 5, v. Eynth.
- S. balteatus* Deg. — B. 638. — Zeer gemeen.
- S. cinctus* Fall. — B. 639. — 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Haarlem, 5, Rits.; Rozendaal, 8 en Kuilenburg, 6, 7, de M.; Assen, 7, v. d. W.
- S. cinctellus* Zett. — B. 640. — Venlo, 4, v. d. Br.; 's Gravenhage, 8 en Wassenaar, 8, v. d. W.; Bodegraven, 7 en Lisse, 8, de M.; Kuilenburg, 7, de M.; Arnhem, 8, v. d. W.; Brummen, 7, v. Voll.
- S. auricollis* Meig. — B. 641. — Herhaaldelijk in Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht, Gelderland en Groningen aangetroffen.
- S. decorus* Meig. — B. 642. — Limburg, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Wassenaar, 7, de Gr.; Hillegom, 8, v. d. W.; Velzen, Grebn.; Amersfoort, 8, v. Voll.
- S. maculicornis* Zett. — B. 643. — Meermalen in Limburg, Zeeland, N. en Z. Holland en Gelderland aangetroffen.
- S. topiarius* Meig. Syst. Besch. III. 305; Schin. Fn. austr. I. 304. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Amsterdam, 6, 7, Jasp.; Maarsbergen, 6, Piag.; Lochem, 6, de M.
- S. guttatus* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 307. — Nuth, 7, Maur.; Middelburg, 8, de Man.
- S. umbellatarum* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 308. — Venlo, v. d. Br.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 8, 9, v. d. W.

- S. triangulifer* Zett. Dipt. Scand. II. 737; Schin. Fn. austr. I. 308. — Rotterdam, 5, Piag.
S. nitidicollis Meig. Syst. Besch. III. 308; Schin. Fn. austr. I. 310. — Limburg, Maur.; Soesterheide, Frans.; Velp, 8, Rits.
S. excisus Zett. Dipt. Scand. VIII. 3136; Schin. Fn. austr. I. 311. — Venlo, 7, v. d. Br.; Valkenburg, Piag.; Oisterwijk, 7, de M.; Watergraafsmeer, 7, Kink.

Didea Macq.

- D. fasciata* Macq. — B. 622. — 's Gravenh., v. d. W.; Driebergen, Six.
D. intermedia Löw, Neue Beiträge, II. 18; Schin. Fn. austr. I. 314. — Venlo, v. d. Br.; Hilversum, Heinsius; Driebergen, Kink.; Beek, 8, v. Voll.

Pelecocera Meig.

- P. tricincta* Meig. — B. 619. — Mastbosch bij Breda, 7, v. Voll.; Putten (N. Brabant), 7, de M.; Hoek van Holland, 9, Piag.; Hilversum, Heinsius; Utrecht, 8, Six; Lochem, 6, de M.

Chamaesyrrhus Mik.

- Ch. scaevoides* Fall. — B. 620 (*Pelecocera*). — Utrecht, het ♀, Six.

Melithreptus Löw.

- M. scriptus* L. — B. 655. — Overal vrij gemeen.
M. taeniatus Meig. — B. 656 ¹⁾. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe gevonden.
M. dispar Löw. — B. 657. — Venlo, 7, 8, v. d. Br.; Dinther, 8, de Man; Mastbosch bij Breda, 7, v. d. W.; Zeeland, Wtt.; Voorburg, 8, v. d. W.; Amsterdam, 6, Kink.
M. strigatus Zett. — B. 658. — Meerssen, 5, Maur.; Breda, 6, Heyl.; Ulvenhoutsche bosch, 6, Rits.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bussum, 9, Jasp.; Vogelenzang, 7, Weyenb.
M. melissae Meig. — B. 659. — Limburg, Maur.; Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, 7, Frans.; Haarlem, Weyenb.; Utrecht, 6, Six; Maarsbergen, 8, Piag.; Wolfhezen, 8, Weyenb.; Beekhuizen, 7, Kink.; Beek, 6, Six; Assen, 7, v. d. W.
M. pictus Meig. Syst. Besch. III. 325; Schin. Fn. austr. I. 317. — Venlo, 5, 9, v. d. Br.; Oirschot, 6, 8, Maur.; Walcheren, 1, Font.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Utrecht, 5, Six; Kuilenburg, 7, en Groesbeek, 7, de M.

1) Volgens Kowarz zijn *M. dispar* Lw. en *strigatus* Zett. slechts variëteiten van *M. scriptus* L.; evenzoo *pictus* Mg. en *taeniatus* Zett. variëteiten van *M. menthastri* L.

M. menthastri L. — Schin. Fn. austr. I. 317. — Walcheren, l. Font.; Bodegraven, 7, en Ridderkerk, 7, de M.; Zeist, 8, de M.; Kuilenburg, 7, de M.

M. nitidicollis Zett. Dipt. Scand. VIII. 3163; Schin. Fn. austr. I. 318. — Valkenburg, 7, Piag.; in het Overmaassche, 5, Piag.

Xanthogramma Schin.

X. ornata Meig. — B. 654. — Limburg, Maur.; Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 7, de Man; Oosterbeek, 8, v. M. d. R.; Brummen, 7, v. Voll.

X. citrofasciata de G. — Schin. Fn. austr. I. 319. — Venlo, 4, een ♀, v. d. Br.; Roermond, een ♂, Latiers.

Doros Meig.

D. conopseus Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 320. — Zierikzee, 4, de Man; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Laag Soeren, 6, Oudem.

Ascia Meig.

A. podagrica Fabr. — B. 694. — Vrij gewoon en in alle provinciën.

A. lanceolata Meig. — B. 695. — Nuth, 7, Maur.; Walcheren, G. v. W.; Rhoon, 9, Schepm.; 's Gravenhage, 5 en Leiden, v. Voll.; Westland, 8, v. d. W.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Amsterdam, 9, Sw.; Maarsbergen, 5, Piag.; Apeldoorn, 7, v. d. W.

A. dispar Meig. — B. 696. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Rotterdam, 5, 8, Frans.; Bodegraven, 7, en Nieuwkoop, 8, de M.; Kortenhoeft, 5, de M.

A. floralis Meig. — B. 697. — Plasmolen, 6, Piag.; Oosterwijk, 7, de M.; Walcheren, l. Font.; Rotterdam, 6, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.

A. quadripunctata Meig. Syst. Besch. III. 189; Schin. Fn. austr. I. 321. — Rotterdam, 5, 6, Piag.

A. aenea Meig. Syst. Besch. III. 191; Schin. Fn. austr. I. 322. — In het Overmaassche, 5, Piag.

Bacha Fabr.

B. elongata Fabr. — B. 699. — Niet zeldzaam. In Limburg, N. Brabant, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland herhaaldelijk aangetroffen.

B. obscuripennis Meig. Syst. Besch. III. 199; Schin. Fn. austr. I. 324. — Ulvenhoutsche bosch, 5, een ♂, Piag.

Sphegina Meig.

Sph. clunipes Fall. — B. 698. — Eenmaal in verscheidene exemplaren op Rozendaal, bij Velp, 8, Six en v. d. W.

Rhingia Scop.

R. h. rostrata L. ¹⁾ — B. 616. — Gemeen, in alle provinciën, ook op Texel, 7, Veth.

Brachyopa Meig.

B. r. bicolor Fall. — B. 618. — Limburg, Maur.; Breda, 6, Heyl.; Haarlem, 5, Weyenb.; Schoorl, 5, Jasp.

Volucella Geoffr.

V. bombylans L. — B. 585 (*plumata*) en 586 (*bombylans*). — Zeer verbreid en overal bij enkele exemplaren aangetroffen.

V. pellucens L. — B. 587. — Houthem, 7, en Gulpen, 7, Oudem.; Dinther, 8, de Man; Breda, 6, Heyl.; Haagsche bosch, 6 en 7, en Voorburg, 5 en 7, v. d. W.; Hilversum, 6, de M.; Heemstede, 5 en 6, v. Voll.; Driebergen, v. Bemm.; Baarn, 8, de M.; Utrecht, Six; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Ellekom, 6, Kink.; Empe, 7, v. Eyndh.; Velp, v. d. W.; Assen, 7, v. d. W.

V. zonaria Poda. — B. 588. — Leiden, een ex., v. Voll.; Vogelenzang, 8, een ♀, v. d. W.; Rhede, 8, een ♂, v. Voll.

V. inflata Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 329. — Een ♀, bij Maastricht, Maur.

V. inanis L. — Schin. Fn. austr. I. 330. — Gronsfeld en Nuth, 7, Maur.

Sericomyia Meig.

S. borealis Fall. — B. 589. — Venlo, v. d. Br.; Plasmolen, 6, v. d. W.; Breda, 6, Heyl.; Oisterwijk, 8, Oudem.; Scheveningen, een ♀, von Bruck; Amsterdam, Iod.; Doorn, een ♂, de G.; Soesterheide, 9, Kink.; Velp, 7, Rits.; Putten, 6, en Apeldoorn, 7, Oudem.

S. lappona L. — Schin. Fn. austr. I. 331. — Venlo, een ♂, v. d. Br.

Arctophila Schin.

A. mussitans Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 332. — Een ♂, in Belgisch Limburg, op korten afstand van Maastricht, Maur.

Eristalis Latr.

E. intricarius L. — B. 592. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.

E. rupium Fabr. — B. 593. — Wassenaar, duinen, 8, v. d. W.; een ♀ in de coll. v. Walchr., denkelijk uit Gelderland.

1) De vroeger onder n^o. 617 in de „Bouwstoffen” als afzonderlijke soort vermelde *Rh. campestris* Meig. is niet meer dan eene variëteit van *rostrata* L.; zij komt even veelvuldig voor als de type.

- E. pertinax* Scop. — B. 594. — Herhaaldelijk in Limburg, Zeeland, Z. en N.Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
- E. nemorum* L. — B. 595. — Vrij gemeen. Uit de meeste provinciën vermeld.
- E. arbustorum* L. — B. 596. — Overal gewoon.
- E. horticola* de G. — B. 597. — Op een aantal plaatsen in Limburg, N.Brabant, N. en Z.Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe aangetroffen.
- E. tenax* L. — B. 598. — Even gemeen als *arbustorum*.
- E. aeneus* Fabr. — B. 600. — Limburg, Maur.; Breda, 5, Heyl.; Middelburg, 8, de Man; Scheveningen, 5, v. d. W.; Nieuwkoop, 8, de M.; Schoorl, 7, Jasp.
- E. sepulchralis* L. — B. 601. — Op vele plaatsen in Limburg, N.Brabant, Zeeland, Z. en N.Holland, Gelderland en Groningen gevonden, hier en daar gemeen.
- E. cryptarum* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 333. — Limburg, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; Venlo, 9, v. d. Br.
- E. pratorum* Meig. Syst. Besch. III. 393; Schin. Fn. austr. I. 336. — Venlo, 9, v. d. Br.; Plasmolen, 8, Piag.; Walcheren, de Man; Rotterdam, 4, Piag.
- E. alpinus* Panz. — Schin. Fn. austr. I. 336. — Venlo, v. d. Br.; Maastricht, Maur.; Winterswijk, 7, v. d. W.

Helophilus Meig.

- H. florens* L. — B. 599 (*Eristalis*). — Niet zeldzaam. In Limburg, N.Brabant, Z. en N.Holland, Utrecht, Gelderland en Groningen meermalen gevonden, soms zelfs gemeen.
- H. pendulus* L. — B. 602. — Overal gewoon.
- H. trivittatus* Fabr. — B. 603. — Venlo, 4, v. d. Br.; Breda, Heyl.; duinen bij Koudekerke, 9, de Man; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Rotterdam, 6, 7, Frans.; Lisse, 7, Kink.; Bodegraven, 6, 7 en 8, de M.; Amsterdam en Diemen, 7, de M.; Vogelenzang, 7 en 8, v. d. W.; Utrecht, Six; Doorn, de Gr.; Zutphen, 8, v. Eyndh.
- H. lunulatus* Meig. — B. 604. — Zeldzaam. 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Rotterdam, 5, Frans.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Bodegraven, 6 en 8, de M.; Hilversum, Heinsius; Utrecht, Six.
- H. frutetorum* Fabr. — B. 605. — Limburg, Maur.; Venlo, v. d. Br.; Rotterdam, 6, 7, Frans.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Leiden, Perin; Abcoude, 6, Kink.
- H. nigrotarsatus* Schin. Fn. austr. I. 339. — Roermond, een ♀, Latiers; Middelburg, 7, een ♂, de Man.
- H. vittatus* Meig. Syst. Besch. III. 378; Schin. Fn. austr. I. 339. — Valkenburg, 7, Piag.; Haarlem, 6, Weyenb.
- H. versicolor* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 341. — Walcheren, G. v. W.

Eurimyia Mik.

- E. transfuga* L. — B. 606 (*Helophilus*). — Warmond, v. Bemm.; Lekkum, 5, H. A.
E. lineata Fabr. — B. 607 (*Helophilus*). — Koudekerke, duinen, 7, de Man; in N. en Z.Holland op verscheidene plaatsen gevonden, op drassig weiland of tusschen riet; Utrecht, Six.

Mallota Meig.

- M. fuciformis* Fabr. — B. 591. — St. Pieter, 4, Maur.; Breda, 4, Heyl.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Leiden, Maitl.; Amsterdam, 4, 5, Oudem., Lod. en de M.

Merodon Meig.

- M. equestris* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 344. — Meermalen gekweekt uit bloembollen uit Haarlem en omstreken, v. d. W. en de M.
M. spinipes Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 345. — Oirschot, 6, Maur.; Winterswijk, 7, v. d. W.; Velzen, 6, Rits.

Tropidia Meig.

- Tr. milesiformis* Fall. — B. 608. — Herhaaldelijk in Limburg, N.Brabant en Z. en N.Holland aangetroffen.

Criorrhina Macq.

- Cr. asilica* Fabr. — B. 590. — Venlo, 5, v. d. Br.
Cr. ruficauda de G. — Schin. Fn. austr. I. 350. — Heer, 4, Maur.; Houthem, 6, Oudem.
Cr. oxyacanthae Meig. Syst. Besch. III. 237; Schin. Fn. austr. I. 351. — Venlo, v. d. Br.; Limburg, Maur.

Brachypalpus Macq.

- Br. Meigenii* Schin. Fn. austr. I. 353. — Venlo, 3, een ♀, v. d. Br.
Br. valgus Panz. — Schin. Fn. austr. I. 353. — Venlo, twee ♂, v. d. Br.; Arnhem, 6, een ♂, v. M. d. R.

Xylota Meig.

- X. segnis* L. — B. 609. — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, N.Brabant, Z. en N.Holland, Utrecht en Gelderland.
X. lenta Meig. — B. 610. — Limburg, Maur.; Scheveningsche bosch, 5 en 6, v. d. W.; Laag Soeren, 6, v. d. W.; Assen, 7, v. d. W.
X. florum Fabr. — B. 611. — Venlo, 7, v. d. Br.; 's Gravenhage, een ♂, v. d. W.

- X. nemorum* Fabr. — B. 612. — Breda, Heyl.; Haagsche bosch, 5—7, v. d. W.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Rotterdam, 6, Frans.; Utrecht, 5 en 6, Six en Wtt.; Arnhem, v. M. d. R.; Empe, v. Eyndh.
- X. pigra* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 355. — Venlo, v. d. Br.; Winterswijk, 8, Oudem.; telkens een exemplaar.
- X. femorata* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 355. — Venlo, 4, 5, v. d. Br.
- X. sylvarum* L. — Schin. Fn. austr. I. 356. — Venlo, v. d. Br.; Domburg, 6, de Man.; Haagsche bosch, 6, v. d. W.
- X. abiens* Meig. Syst. Besch. III. 218; Schin. Fn. austr. I. 357. — Venlo, v. d. Br.

Syritta St. Farg.

- S. pipiens* L. — B. 613. — Overal gewoon.

Eumerus Meig.

- E. lunulatus* Meig. — B. 615. — Zeldzaam. Venlo, 5, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 8, de Man; Bodegraven, 7, 8 en Ridderkerk, 7, de M.; Utrecht, 4, Six; Amersfoort, 8, v. Voll.; Voorst, 6, Wtt.
- E. tricolor* Fabr. — B. 614. — Utrecht, 8, een ♂, Six.
- E. sabulonum* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 360. — Venlo, 8, v. d. Br.; 's Gravenhage, duinen, v. d. W.; Maarsbergen, Piag.
- E. ornatus* Meig. Syst. Besch. III. 205; Schin. Fn. austr. I. 362. — Maastricht, 7, de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.

Chrysochlamis Rond.

- Chr. ruficornis* Fabr. — B. 660. — Venlo, 4, v. d. Br.; Breda, 5, Heyl.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 7—9, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; herhaaldelijk in de streek tusschen Heemstede en Velzen, Weyenb., Jasp., v. Voll., de M.; Soesterheide, 9, Kink.; Brummen, v. Bemm.; Putten (Gelderl.), 9, Oudem. De meeste exemplaren hebben een donkeren sprietborstel en gelijken daardoor veel op *Chr. nigrifrons* Egg.

Spilomyia Meig.

- Sp. saltuum* Fabr. — B. 621. — Eens een exemplaar in de oranje op Sterkenburg, onder Driebergen, v. Voll.
- Sp. vespiformis* L. — Schin. Fn. austr. I. 366. — Houthem, Maur.

OESTRIDAE.

Oestrus L.

- O. ovis* L. — B. 739. — Limburg, Maur.; Gelderland, v. Walchr.; de larve op schapen aan het abattoir te Amsterdam, Koorevaar.

Hypoderma Clark.

H. bovis L. — B. 740. — De larve vrij gemeen op runderen, aan het abattoir te Amsterdam, Koorev.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Ellekom, 6, Kink.

Gastrophilus Leach.

G. equi Fabr. — B. 741. — De meest gewone soort van het genus. Amsterdam, Koorev.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Walcheren, l. Font.; aan 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht, Numan.

G. haemorrhoidalis Fabr. — B. 742. — Aan 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht, Numan; Amsterdam, Koorev.

G. nasalis L. — B. 744 (*nasalis* L.) en B. 743 (*salutaris* Clark). ¹⁾ — Aan 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht, Numan; Amsterdam, Koorev.

G. pecorum Fabr. Ent. Syst. IV. 230; Schin. Fn. austr. I. 391. — Gekweekt uit larven, afkomstig van een ontwijfelbaar Hollandsch paard, aan het abattoir te Amsterdam, Koorev.

MUSCIDAE.

PHASINAE.

Hyalomyia Rob. D.

H. semicinerea Meig. — B. 745. — Limburg, Maur.; Breda, 6, de Man; Scheveningen, 7, v. d. W.; Driebergen, 9, een ♂, Six; Voorst, 7, v. Eyndh.; Beekhuizen, 8, v. Voll.

H. hyalinipennis Fall. — B. 746. — Driebergen, 9, Six.

H. aurulans Meig. Syst. Besch. IV. 197 (*Phasia*); Schin. Fn. austr. I. 404 (*Alophora*). — Limburg, Maur.

H. muscaria Fall. — Schin. Fn. austr. I. 405 (*Alophora*). — Limburg, Maur.

H. umbripennis Meig. Syst. Besch. IV. 195 (*Phasia*); Schin. Fn. austr. I. 405 (*Alophora*). — Houthem, Maur.; Venlo, v. d. Br.

H. atropurpurea Meig. Syst. Besch. IV. 193 (*Phasia*); Schin. Fn. austr. I. 406 (*Alophora*). — Limburg, Maur.; Oosterbeek, v. M. d. R.

H. pygmaea Fall. — Meig. Syst. Besch. IV. 200 (*Phasia*). — 's Gravenhage, 6, Six.

Syntomogaster Schin.

S. viduus Egg. — Schin. Fn. austr. I. 409. — Walcheren, G. v. W.

S. delicatus Meig. Syst. Besch. IV. 368 (*Tachina*). — Nuth, 7, een ♀, Maur.

1) *G. salutaris* is slechts eene variëteit van *nasalis* L.

GYMNOSOMINAE.

Gymnosoma Meig.

G. rotundatum L. — B. 747. — Venlo, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag. en Oudem.; Houthem, 7, Oudem.; Utrecht en Driebergen, Six; Arnhem, 5, Verhuell.

Cistogaster Latr.

C. globosa Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 411. — Duinen bij 's Gravenhage, op *Daucus carota*, een ♀, Six.

OCYPTERINAE.

Ocyptera Latr.

O. brassicaria Fabr. — B. 748. — Gulpen, 7, Oudem.; Wassenaar, 9, Piag.; Utrecht, 10, een ♂, Six.; Arnhem, 7, v. M. d. R.; Beek, 7, v. d. W.

O. pusilla Meig. — B. 749. — 's Gravenhage, 7, v. d. W. en de M.; Wassenaar, 7, 9, Piag.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Overveen, 7, en Beverwijk, 7, Rits.

PHANINAE.

Phania Meig.

Ph. vittata Meig. Syst. Besch. IV. 219; Schin. Fn. austr. I. 421. — Limburg, een ♂, Maur.

TACHININAE.

Echinomyia Dum.

E. grossa L. — B. 750. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, duinen, v. d. W.; Lisse, 7, Kink.; Velzen, 7, Rits.; Utrecht, Six; aan de Vuursche, 7, v. d. W.; Arnhem, 7, v. M. d. R.; Apeldoorn, 7, 8, Oudem.; id. gekweekt uit *Bombyx quercus*, de Vos; Putten (Gelderl.), 7, Oudem.; Zuidlaren, Cl. M.; Groningen, de Gav.

E. fera L. — B. 751. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.

E. magnicornis Zett. — B. 752. — Roermond, Latiers; Gulpen, 7, Oudem.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Haarlemmerhout, 8, Weyenb.; Hilversum, 3, de M.; de Grebbe, Heinsius; Apeldoorn, 8, en Putten, 8, Oudem.; Wolfhezen, 8, Piag.; Beek, 8, Kink.; Empe, 5, v. Eynth.

E. praeceps Meig. — B. 753. — Wolfhezen en Doorn, de Gr.

Peleteria Rob. D.

P. tessellata Fabr. — B. 754 (*Echinomyia*). — Herhaaldelijk in N. Brabant, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen; ook op Texel, 5, Rits.

Fabricia Rob. D.

F. ferox Panz. — B. 755 (*Echinomyia*). — Valkenburg, 7, Piag.; Utrecht, Six; Doorn, 8, de M.; Empe, v. Eyndh.; Laag Soeren, 6 en Putten, Oudem.

Servillia Rob. D.

S. ursina Meig. Syst. Besch. IV. 245; Schin. Fn. austr. I. 426. — Venlo, v. d. Br.; Schoorl, 3, Jasp.; Bloemendaal, 4, de M.; Amersfoort, 4, Oudem.

S. lurida Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 426. — Venlo, v. d. Br.; Breda, Heyl.

Micropalpus Macq.

M. vulpinus Fall. — B. 756. — Venlo, v. d. Br.; Breda, Heyl.; Oisterwijk, 8, Oudem.; 's Gravenhage, duinen, 7, Frans.; Doorn, v. Voll.; aan de Vuursche, 7, v. d. W.; Amersfoort, 8, Six; Soesterheide, Kink. In Gelderland op verscheidene plaatsen.

M. fulgens Meig. — B. 757. — Venlo, 8, v. d. Br.; Breda, 7, Heyl.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, 7, Rits.; Bloemendaal, 7, 8, v. d. W.; Arnhem, 8, v. M. d. R.; Hattem, 8, Piag.

M. haemorrhoidalis Fall. — B. 758. — Dinther, 8, de Man; Rotterdam, Frans.; Loosduinen, 7, v. d. W.; 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.

M. pictus Meig. — B. 759. — Venlo, 6, v. d. W.; Oirschot, 6, Maur.; Oisterwijk, 8, Oudem.; Lisse, 8, de M.

Gymnochaeta Rob. D.

G. viridis Fall. — B. 760. — St. Pieter, 4, Maur.; Rotterdam, Frans.; Kortenhoef, 5, de M.; Linschoten, 5, de M.; Empe, 4, v. Eyndh.

Aphria Rob. D.

A. longirostris Meig. — B. 761. — Venlo, 6, v. d. Br.; 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.; Zutphen, v. Eyndh.; Beek, 7, v. d. W. Telkens slechts één exemplaar.

Demoticus Macq.

D. plebeius Fall. — Schin. Fn. austr. I. 433. — Velzen, 7, een ♀, Rits.
D. spretus Meig. Syst. Besch. IV. 343; Schin. Fn. austr. I. 434. — Valkenburg, een ♂, v. d. W.

Oliviera Rob. D.

O. lateralis Fabr. — B. 763. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën.

Zophomyia Macq.

- Z. temula* Scop. — B. 762. — Breda, Heyl.; Bergen-op-Zoom, 5, Piag.; Oisterwijk, 5, Oudem.; Domburg, 7, de Man; West-Capelle, 5, Piag.; Amsterdam, 9, Sw.; Hilversum, 6, de M.; Maarsbergen, 6, Piag.; Driebergen, 6, Six; Ede, 5, Kink.

Plagia Meig.

- Pl. trepida* Meig. — B. 764. — Rotterdam, Frans.; Empe, v. Eynth.
Pl. ruralis Fall. — B. 765. — Venlo, 8, v. d. Br.; Dinther, 7, 8, de Man; Rotterdam, 8, v. Voll. en 9, Piag.; 'sGravenhage, v. d. W.; Leiden, 8, v. Voll.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Amsterdam, 7, 8, Kink.; Haarlem, 9, Weyenb.; Voorst, Wtt.; Empe, v. Eynth.
Pl. ambigua Fall. — B. 766. — Middelburg, 8, de Man; 'sGravenhage, v. d. W.; Rotterdam, uit *Plusia gamma*, Sn.
Pl. marginata Meig. Syst. Besch. IV. 301; Schin. Fn. austr. I. 438. — 'sGravenhage, 6, v. d. W.
Pl. curvinervis Zett. Dipt. Scand. III. 1018; Schin. Fn. austr. I. 438. — Venlo, een ♀, v. d. Br.
Pl. aurifluae v. d. W. Tijdschr. v. Entomol. XII. 137. — Groningen, 7, de Gav.; 'sGravenh., gekweekt uit *Liparis auriflua*, v. d. W.
Pl. impressa v. d. W. Tijdschr. v. Entomol. XII. 139. — West-Capelle, 5, Piag.; 'sGravenhage, duinen, 5, 6, v. d. W.; Beekhuizen, 7, Kink.

Peteina Meig.

- P. erinacea* Fall. — B. 767. — De Bilt, 7, een ♂, Six.

Germaria Rob. D.

- G. ruficeps* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 441. — 'sGravenhage, een ex., Everts.
G. sabulosa v. d. W. Tijdschr. v. Entomol. XII. 146. — Duinen bij 'sGravenhage, Scheveningen en Wassenaar, v. d. W.

Ammobia v. d. W.

- A. glabriventris* v. d. W. Tijdschr. v. Entomol. XII. 148. — Rockanje, 5, Piag.; 'sGravenhage, duinen, 6, 7 en 8, v. d. W.

Gonia Meig.

- G. capitata* d. G. — B. 768. — Bergen-op Zoom, 5, Rits; Domburg, 6, de Man; 'sGravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Wassenaar, de Gr.; Haarlem, 5, Weyenb.; Bloemendaal, 4, 5, Oudem.; Overveen, 3, de M.; Schoorl, 5, Jasp.; Diemen, 4, de M.; Bussum, 5, Oudem.; de Bilt, 4, Six; Nieuwersluis, 4, Oudem.

- G. fasciata* Meig. — B. 769. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Hilversum, 5, Oudem.; duinen bij Overveen, 4, Weyenb.; Driebergen, v. Bemm.; de Bilt, 4, Six; Groningen, 5, de Gav.
- G. divisiva* Meig. Syst. Besch. V. 4.; Schin. Fn. austr. I. 442. — Venlo, v. d. Br.; Overveen, 3, de M., en 4, Kink.; Bloemendaal, 5, de M.; Wolfhezen, 5, v. M. d. R.

Nemoraea Rob. D.

- N. glabrata* Meig. — B. 770. — 's Gravenhage, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Ede, Maitl.; in aantal uit *Trachea piniperda*, VerL. en v. Voll.
- N. pellucida* Meig. — B. 771. — Limburg, Maur.; Amsterdam, 6, Kink.; Zutphen en Empe, v. Eyndh.
- N. puparum* Fabr. — B. 772. — Leiden, 4, Rits.; Bodegraven, 5, de M.
- N. strenua* Meig. — B. 773. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Hillegom, 5, Kink.; Hilversum, 5, 6, de M.; Laag Soeren, 6 en Putten, 5, Oudem.; Lochem, 6, de M.
- N. radicum* Fabr. — B. 774. — Niet zeldzaam. In Limburg, Noord-Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe gevonden.
- N. caesia* Fall. — B. 775. — Limburg, Maur.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.
- N. vagans* Meig. — B. 776. — Empe, een ♂, v. Eyndh.
- N. rudis* Fall. — B. 777. — Venlo, 8, v. d. Br.; Plasmolen, 8, Piag.; Mastbosch, 7, v. d. W.; 's Gravenhage, v. d. W.; Soest, 8, Kink.; Hattem, 8, Piag.
- N. vivida* Zett. — B. 778. — Limburg, Maur.; Venlo, 9, v. d. Br.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Zutphen, v. Eyndh.
- N. consobrina* Meig. — B. 779. — Voorst, 7, v. Eyndh.
- N. breviseta* Zett. Dipt. Scand. III. 1137; Schin. Fn. austr. I. 450. — Ulvenhoutsche bosch, een ♀, v. d. W.

Nemorilla Rond.

- N. maculosa* Meig. — B. 780 (*Nemoraea*). — Venlo, 8, v. d. Br.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, Piag.; Rotterdam, Frans.; Voorst, Wtt.; Groningen, 7, de Gav.
- N. notabilis* Meig. Syst. Besch. IV 266; Schin. Fn. austr. I. 454 (*Nemoraea*). — Middelburg, 9, de Man.

Chetolyga Rond.

- Ch. analis* Meig. — B. 781 (*Nemoraea*). — Haarlem, Weyenb.; Vuursche, 7, v. d. W.; Arnhem, 8, v. M. d. R.; Witterholt, 7, v. d. W.
- Ch. amoena* Meig. — B. 782 (*Nemoraea*). — 's Gravenh., een ♀, v. d. W.
- Ch. quadripustulata* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 454 (*Nemoraea*). — Dinther, 7, de Man.

Epicamocera Macq.

E. succincta Meig. — B. 783. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.

Exorista Meig.

- E. vulgaris* Fall. — B. 784. — Herhaaldelijk gevonden in de meeste provinciën. Gekweekt uit *Sphinx pinastri*, Beekhuizen, 8, Kink. en Doesburg, de M.; uit *Bombyx potatoaria*, v. Voll.; uit *Cucullia verbasci*, Weyenb.
- E. confinis* Fall. — B. 785. — 's Gravenhage, 7, een ♂, v. d. W.; uit *Thecla ilicis*, 6, de Steeg, de M.
- E. dubia* Fall. — B. 786. — 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Amsterdam, v. d. W.
- E. mitis* Meig. — B. 787. — Dinther, 7, de Man; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Empe, 7, v. d. W.
- E. fimbriata* Meig. — B. 788. — Limburg, Maur.; Venlo, 5, v. d. Br.; Middelburg, 5, de Man; Rotterdam, uit *Thamnonoma wavarina*, Frans.; 's Gravenhage, 6 en 7, ook de var. *arvensis* Meig., v. d. W.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Haarlem, Bog.; Empe, v. Eynth.; Voorst, Wtt.
- E. Westermanni* Zett. — B. 789. — Leiden, 7, een ♂, v. Voll.
- E. excisa* Fall. — B. 790. — Breda, uit *Cnethocampa processionea* en *Pygaera curtula*, Heyl.; Ossendrecht, 7, de M.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Overveen 7, Rits.; Beekhuizen, 7, Kink.; Beek, 7, v. d. W.; Lochem 6 en Kuilenburg, 7, de M.
- E. lucorum* Meig. — B. 791. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, N. en Z. Holland en Gelderland aangetroffen. Gekweekt uit *Sphinx ligustri*, Groningen, 6, de Gav.; uit *Orgyia antiqua*, Haarlem, 7, Rits.; uit *Orgyia pudibunda*, 's Gravenhage, 4, v. d. W.; uit *Endromis versicolora*, Putten op de Veluwe, 5, Oudem.
- E. libatrix* Meig. — B. 792. — Limburg, Maur.; Rotterdam, Frans.; 's Gravenhage, 7 een ♀, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.
- E. ruficauda* Zett. — B. 793. — Leiden, 7, een ♂, v. d. W.
- E. agnata* Rond. Dipt. It. Prodr. III. 144; Schin. Fn. austr. I. 459 — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Amsterdam, uit *Abraxas grossulariata*, de M.; Arnhem, 8, v. d. W.
- E. cheloniae* Rond. Dipt. It. Prodr. III. 138; Schin. Fn. austr. I. 463. — 's Gravenhage, 6, een ♂, Six.
- E. lota* Meig. Syst. Beschr. IV. 326; Schin. Fn. austr. I. 464. — Dinther, 8, de Man; Middelburg, 8, 9, de Man; Amsterdam, 6, de M.; Groningen, de Gav.
- E. affinis* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 465. — Rotterdam, Frans.; Overveen, 8, de M.; Oosterbeek, 6, uit *Psyche villosella*, Backer.
- E. ancilla* Meig. Syst. Beschr. VII. 257; Schin. Fn. austr. I. 463. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.

E. prominens Meig. Syst. Besch. VII. 256; Schin. Fn. austr. I. 468. — Rotterdam, uit *Bombyx neustria*, Frans.

E. grandis Zett. Dipt. Scand. III. 1088. — Arnhem, 7, een ♂, v. M. d. R.

Meigenia Rob. D.

M. bisignata Meig. — B. 794. — Maastricht, 7, de Man; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Empe, 7, v. d. W.; Voorst, 3, uit *Athalia spinarum*, v. Voll.

M. floralis Fall. — B. 795. — Middelburg, 6, 7, 8, de Man; Scheveningen, 7, v. d. W. en de M.; Hilversum, 6, de M.; Witterholt, 7, v. d. W.

M. mutabilis Fall. — Meig. Syst. Besch. IV. 403. — Rhedersteeg, 8, een ♀, v. d. W.

Tachina Meig.

T. larvarum L. — B. 796. — Valkenburg, 7, Piag.; Noordwijk, 6, Kink.; Rotterdam, uit *Papilio Machaon* en *Acronycta rumicis*, Frans.; Arnhem, 8, v. M. d. R.; Zutphen, 8, v. Eyndh.

T. vidua Meig. — B. 797. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Rotterdam, 5, Frans.; 's Gravenhage, 7, 9, v. d. W.; Leiden, 8, de Gr.; Groningen, 5, uit *Bombyx rubi*, de Gav.

T. rustica Fall. — B. 798. — Valkenburg, 7, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; Dinther, 7, de Man; Cuyk, 7, ter Haar; Rotterdam, 8, Frans.; Zutphen, 8, v. Eyndh.

T. tibialis Fall. — B. 799. — Venlo, 5, v. d. Br.; 's Gravenhage, 5 en 7, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.

T. nigripes Fall. — B. 800. — Oirschot, 8, Maur.; Arnhem, 8, v. d. W.; Voorst, Wtt.

T. incana Fall. — B. 801. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.

T. polita Meig. Syst. Besch. IV. 314; Schin. Fn. austr. I. 473. — Maastricht, 7, de Man; Rotterdam, 5, Piag.

T. marginella Meig. Syst. Besch. VII. 193; Schin. Fn. austr. I. 473. — 's Gravenhage, duinen, 7, v. d. W.

T. erucarum Rond. Dipt. It. Prodr. III. 201; Schin. Fn. austr. I. 474. — Limburg, Maur.; Empe, 8, v. d. W.

T. nigricans Egg. — Schin. Fn. austr. I. 475. — Dinther, 7, de Man.

T. agilis Meig. Syst. Besch. IV. 307; Schin. Fn. austr. I. 477. — Venlo, v. d. Br.; Velp, 6, Rits.

Brachycoma Rond.

Br. devia Fall. — Schin. Fn. austr. I. 477; syn. *Meigenia bombivora* v. d. W. Tijdschr. v. Entomol. XII. 142. — Uit een nest van *Bombus agrorum*, Haarlem, 5, Rits.

Blepharipa Rond.

- B. scutellata* Rob. D. — B. 802 (*Masicera*). — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.; Haarlem, 6, Weyenb.; Arnhem, 6, v. M. d. R.
- B. major* Macq. — Schin. Fn. austr. I. 483 (*Masicera*). — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Wolfhezen, 4, v. M. d. R.

Masicera Macq.

- M. bimaculata* Hart. — B. 804. — Groningen, 8, de Gav.; uit poppen van *Lophyrus pini*, v. Voll.
- M. pratensis* Meig. Syst. Besch. IV. 218; Schin. Fn. austr. I. 483. — Rotterdam, 3, een ♀, Frans.

Ceromasia Rond.

- C. virescens* Macq. — B. 803 (*Masicera*). — 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.
- C. Wulpianae* Br. B. Denkschr. k. Ak. Wissensch. Wien. LVIII. 330. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.
- C. ruficornis* Macq. — B. 805. — 's Gravenhage, een ♀, v. d. W.

Gaedia Meig.

- G. connexa* Meig. Syst. Besch. IV. 366; Schin. Fn. austr. I. 487. — Amersfoort, 7, een ♂, Piag.

Phorocera Rob. D.

- Ph. concinnata* Meig. — B. 806. — Zeer gemeen. Buiten de reeds vroeger gedane opgaven, gekweekt uit *Papilio Machaon*, *Bombyx neustria*, *Plusia festucae*, *Timandra amataria* en *Hyponomeuta variabilis*, Frans.; uit *Vanessa polychloros*, Schepm.; *Liparis auriflua*, Weyenb.; *Spilosoma lubricipeda*, *Pygaera anachoreta* en *Acronycta tridens*, Grebn.; uit *Vanessa Io*, *Bombyx crataegi*, *Hadena oleracea*, *persicariae* en *brassicae*, Oudem.; uit *Pieris brassicae* en *Abraxas grossulariata*, de M.
- Ph. caesifrons* Macq. — B. 807. — Breda, Heyl.; Ulvenhoutsche bosch, 6, Rits.; 's Gravenhage, 4—6, vrij gemeen, v. d. W.; Heemstede, 3, v. Voll.
- Ph. assimilis* Fall. — B. 808. — Venlo, 5, v. d. Br.; 's Gravenhage, 4 tot 6, v. d. W.; Leiden, 8, v. Voll.; Rotterdam, Frans.
- Ph. segregata* Rond. — B. 809. — Walcheren, G. v. W.; Haagsche bosch, 6, een ♀, v. d. W.; Maarsbergen, 8, Piag.
- Ph. cilipeda* Rond. — B. 810. — 's Gravenhage, v. d. W.
- Ph. pascuorum* Rond. Dipt. It. Prodr. III. 168; Schin. Fn. austr. I. 491. — Breda, 5, een ♀, Heyl.
- Ph. unicolor* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 493. — 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.

Baumhaueria Meig.

B. vertiginosa Fabr. — B. 811. — Dinther, 7, de Man; Middelburg, 7, de Man; Rotterdam, uit *Arctia caja*, Frans.; Haarlem, 4, Rits.; Witterholt, 7, v. d. W.

B. goniaeformis Meig. Syst. Besch. IV. 416; Schin. Fn. austr. I. 495. — Rotterdam, Frans.

Frontina Meig.

Fr. laeta Meig. Syst. Besch. IV. 381; Schin. Fn. austr. I. 497. — Breda, 7, Heyl.; Oisterwijk, 8, de M.; Empe, 7, v. d. W.

Metopia Meig.

M. leucocephala Panz. — B. 812. — Herhaaldelijk aangetroffen, in bijna alle provinciën.

M. campestris Fall. — B. 813. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Maarsbergen, Piag.; aan de Vuursche, 7, v. d. W.; Beek, 7, v. d. W..

M. argyrocephala Meig. Syst. Besch. IV. 372; Schin. Fn. austr. I. 500. — Maarsbergen, 8, een ♂, Piag.

Paragusia Schin.

P. Frivaldzkii Schin. Fn. austr. I. 500; B. 818 (ten onrechte als *Apodacra elegantula* Zett.). — 's Gravenhage, duinen, 5, 6, 7, v. d. W.

Macronychia Rond.

M. polyodon Meig. — B. 814. — 's Gravenhage, 7, een ♂, v. d. W.

Heteroptera Macq.

H. heteroneura Meig. Syst. Besch. VI. 367; Schin. Fn. austr. I. 503. — 's Gravenhage, duinen, 6, 7, v. d. W.

H. multipunctata Rond. Dipt. It. Prodr. III. 211; Schin. Fn. austr. I. 503. — 's Gravenhage, duinen, 7, 8, v. d. W.

Hilarella Rond.

H. siphonina Zett. Dipt. Scand. III. 1213; Schin. Fn. austr. I. 504. — 's Gravenhage, duinen, 6, 7, v. d. W.; Maarsbergen, 7, Piag.

H. Zetterstedtii Rond. Dipt. It. Prodr. III. 213; Schin. Fn. austr. I. 504. — Wassenaarsche duinen, 7, Piag.

Sphixapata Rond.

Sph. conica Fall. — B. 815 (*Miltogramma*). — Dinther, 7, de Man; Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, 7, Frans.; 's Gravenhage, duinen, 7 en 8, v. d. W.; Bloemendaal, v. Bemm.; Vogelenzang, 6, Kink.; Driebergen, v. Voll.; Beek, 7, v. d. W.

Miltogramma Meig.

- M. oestracea* Fall. — B. 816. — 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.
M. punctata Meig. — B. 817. — Doorn, een ♀, de Gr.; Velp, 8, Rits.; Witterholt, 7, v. d. W.
M. murina Meig. Syst. Besch. IV. 230; Schin. Fn. austr. I. 506. — Plasmolen, 8, een ♀, Piag.
M. pilitarsis Rond. Dipt. It. Prodr. III. 218; Schin. Fn. austr. I. 506. — Winterswijk, 7, v. d. W.

Leskia Rob. D.

- L. aurea* Meig. Syst. Besch. IV. 341; Schin. Fn. austr. I. 513. — Limburg, Maur.; Arnhem, 8, v. M. d. R.

Myobia Rob. D.

- M. inanis* Fall. — B. 819. — Middelburg, 8, de Man; Gelderland, v. Walchr.

Roeselia Rob. D.

- R. antiqua* Meig. — B. 820. — Breda, 7, de Man; Middelburg, 6, 7, de Man; Voorburg, 6, v. d. W.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Amsterdam, 7, v. d. W.

Thryptocera Macq.

- Thr. pilipennis* Fall. — B. 821. — Vogelenzang, 8, v. d. W.; Brummen, 8, v. Voll.; Velp, 7, Rits.; Arnhem, 10, uit *Tortrix resinella*, Back.; Arnhem, 7, uit *Depressaria scopariella*, Sn.
Thr. setipennis Fall. — B. 822. — Venlo, 6, v. d. Br.; Maastricht, 7, uit *Notodonta dictaea*, Maur.; Middelburg, 6, 7, de Man; Rotterdam, 6, Piag.; 's Gravenhage, 7, v. d. W. en de M.; Heemstede, 5, v. Voll.; Amsterdam, 5, Kink.
Thr. crassicornis Meig. — B. 824. — Valkenburg, 7, Piag.; Maastricht, 8, Maur.; Venlo, v. d. Br.; Plasmolen, 8, Piag.; Vught, 6, Oudem.; Amsterdam, 8, de M.; Driebergen, 7, Six; Empe, v. Eyndh.; Oosterbeek, 7, Rits.
Thr. exoleta Meig. — B. 826. — 's Gravenhage, 5, een ♀, v. d. W.
Thr. silacea Meig. — B. 827. — Zutphen, 8, een ♀, v. Eyndh.
Thr. infantula Zett. Dipt. Scand. III. 1047. — Gekweekt uit harsgallen van *Retinia resinella* en *Grapholitha cosmophorana*, Exaeten, Wasmann.

Neaera Rob. D.

- N. laticornis* Meig. — B. 826 (*Thryptocera*). — 's Gravenh., Maitl.

Bigonichaeta Rond.

- B. spinipennis* Meig. — B. 823 (*Thryptocera*). — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Heemstede, 6, v. Voll.
B. prasinanae v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XII. 151 (*Thryptocera*). — Gekweekt uit *Halias prasinana*, Doorn, 4, Sn.

Actia Rob. D.

- A. Lamia* Meig. Syst. Besch. VII. 254 (*Roeselia*). — Arnhem, 5, een ♀, Sw.

Siphona Meig.

- S. cristata* Fabr. — B. 828. — Herhaaldelijk in de meeste provinciën aangetroffen.
S. geniculata de G. — B. 829. — Vrij gemeen.
S. flavifrons Staeg. — B. 830. — Plasmolen, 6, v. d. W.; Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Bodegraven, 6, Nieuwkoop 8, de M.; Watergraafsmeer, 7, Kink.; Abcoude, Kink.; Empe, v. Eynth.; Voorst, 7, Wtt.; Kuilenburg, 7 en Lochem, 6, de M.

Clytia Rob. D.

- Cl. tephra* Meig. Syst. Besch. IV. 364; Schin. Fn. austr. I. 524. — Valkenburg, 7, Piag.
Cl. continua Panz. — Schin. Fn. austr. I. 524. — Z.-Limburg, Oudem.
Cl. helvola Meig. Syst. Besch. II. 277; Schin. Fn. austr. I. 524. — Meerssen, 7, een ♂, Maur.

Tryphera Meig.

- Tr. umbripennis* Zett. Dipt. Scand. III. 1146; Schin. Fn. austr. I. 526. — Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; 's Gravenh., 4, 5, v. d. W.

Polidea Macq.

- P. aenea* Meig. Syst. Besch. IV. 273; Schin. Fn. austr. I. 526. — Maastricht, 7, Maur.; Rijen, 6, Piag.; Domburg, 7, de Man.

Macquartia Rob. D.

- M. atrata* Fall. — B. 831. — Limburg, Maur.; Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.
M. nitida Zett. — B. 832. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Amsterdam, 7, v. d. W.; Groningen 7, uit *Botys verticalis*, de Gav.
M. chalybeata Meig. — B. 833. — Venlo, 7, v. d. Br.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Utrecht, Six.
M. grisea Fall. — B. 834. — Domburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Haarlem, 10, Kink.

- M. dispar* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 530. — Venlo, v. d. Br.; Middelburg, 6, de Man; Hillegom, 5, Kink.
M. tenebricosa Meig. Syst. Besch. IV. 270; Schin. Fn. austr. I. 531. — Nuth, 7, een ♀, Maur.

Degeeria Meig.

- D. muscaria* Meig. — B. 835. — Leiden, een ♀, Herkl.
D. fascians Meig. — B. 836. — 's Gravenhage, v. d. W.; Amsterdam, 7, v. d. W.; Brummen, v. Voll. Gekweekt uit *Hylotoma rosarum*, Rits.; uit *Nematus virescens* en *Selandria sericea*, v. Voll.
D. parallela Meig. — B. 837. — Middelburg, 7, 8, de Man; Rotterdam, 8, v. Voll.; Warmond, v. Bemm.; Voorst, Wtt.
D. separata Meig. — B. 838. — 's Gravenhage, 7, een ♀, v. d. W.; in het Overmaassche, 6, Piag.
D. ambulatoria Meig. — B. 839. — Utrecht, 7, Six; Empe, v. Eyndh.
D. blanda Fall. — Schin. Fn. austr. I. 534. — Venlo, 6, de M.; Rotterdam, Frans.; Assen, 7, v. d. W.
D. seria Meig. Syst. Besch. IV. 408; Schin. Fn. austr. I. 535. — Middelburg, 8, de Man; uit *Otenophora pectinicornis* en *atrata*, Weyenb.
D. tragica Meig. Syst. Besch. IV. 408; Schin. Fn. austr. I. 535. — Haarlem, 6, Rits.

Hypostena Meig.

- H. medorina* Schin. Fn. austr. I. 538. — Middelburg, 8, de Man.

Scopolia Rob. D.

- Sc. ocypterina* Zett. — B. 840. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.; Rotterdam, Frans.; uit *Pterophorus lithodactylus*, Rotterdam, Sn.
Sc. costata Fall. — B. 841. — 's Gravenhage, 6, een ♀, v. d. W.
Sc. latifrons Zett. — B. 842. — 's Gravenhage, 6, een ♀, v. d. W.; Rotterdam, 5, uit *Leucania lithargyria*, Frans.
Sc. carbonaria Panz. — Schin. Fn. austr. I. 540. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, duinen, 9, Piag.; Rotterdam, 8, Frans; Arnhem, 10, v. M. d. R.

Clista Meig.

- Cl. gagatina* Meig. — B. 844 1). — Maastricht, 6, Maur.; Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 6, 7, de Man; duinen bij 's Gravenhage, 7 tot 9, niet zeldzaam, v. d. W.; Leiden, 6, v. Voll.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Rotterdam, 6, 7, Frans.; Amsterdam, 7, v. d. W.; Hilversum, 6, Heilo, 6, de M.; Maarsbergen, 7, Kink.; Zutphen, 7, v. Eyndh.; Wageningen, 7, v. d. W.; Assen, 7, v. d. W.

1) De onder n^o. 845 in de „Bouwstoffen” vermelde *Clista lepida* vervalt, als zijnde de daartoe gebrachte exemplaren niet specifiek van *Cl. gagatina* onderscheiden.

Fortisia Rond.

F. foeda Meig. — B. 843 (*Clista*). — Zeeland, een ♂, Wtt.

Leucostoma Meig.

L. simplex Fall. — Schin. Fn. austr. I. 543. — Z. Limburg, 7, Oudem.; Walcheren, l. Font.; Hoek v. Holland, 8, Piag.; Maarsbergen, 8, Piag.; Empe, 8, v. d. W.

Plesina Meig.

Pl. maculata Fall. — B. 846. — Maastricht, 6, Maur.; Breda, 9, Heyl.; Amsterdam, Jasp.; Utrecht, 6, Six en Wtt.

Rhinophora Rob. D.

Rh. melania Meig. Syst. Besch. (*Devia*); Schin. Fn. austr. I. 547. — Valkenburg, 6, 7, Oudem.; Maastricht, 7, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Vianen, 6, Everts; Weesp, 6, Piag.; Kuilenburg, 7, de M.

Microtricha Mik.

M. punctulata v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XII. 150 (*Stylomyia*). — Beekhuizen, 7, Kink.

Medoria Rob. D.

M. pullula Zett. — B. 847 (verkeerdelijk *pullata*). — Voorst, 3 ex. uit poppen van *Plagiodera armoraciae*, Wtt.

DEXINAE.

Morinia Rob. D.

M. melanoptera Fall. — B. 848. — Gronsveld, 8, Maur.; Domburg, 6, de Man; Haarlem, 5, Weyenb.; Maarsbergen, 8, Piag.; Utrecht, S'x; Ruurlo, 7, Sn.; Putten, 5 en Apeldoorn, 6, 8, Oudem.; Zutphen en Empe, 4 en 5, v. Eyndh.

M. nana Meig. — B. 849. — Meermalen gevonden in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland en Gelderland.

M. anthracina Meig. — B. 850. — Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.

M. fimbriata Meig. Syst. Besch. V. 37. — 's Gravenhage, 7, een ♂, Six.

Melanophora Meig.

M. roralis L. — B. 851. — Venlo, v. d. Br.; Breda, uit *Asopia farinalis*, Heyl.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Leiden, 6, v. Voll.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Rotterdam, 7, 8, Frans.; Amsterdam, 6, Kink.; Haarlem, 8, Weyenb.; Utrecht, Six; Empe en Zutphen, 5—8, v. Eyndh.

Nyctia Rob. D.

N. halterata Panz. — Schin. Fn. austr. I. 554. — Z. Limburg, 7, Maur. en Oudem.

Thelaira Rob. D.

Th. leucozona Panz. — B. 852. — Niet zeldzaam, in de meeste provinciën.

Mintho Rob. D.

M. praeceps Scop. — B. 853. — Venlo, v. d. Br.; Maastricht, 6, 7, Maur.; Amsterdam, 5, de M.; Soesterheide, 9, Kink.; Vorden, 8, de Gav.

Dinera Rob. D.

D. cristata Meig. — B. 854. — Zuid-Limburg, Oudem.; Breda, 6, Heyl.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenh., Maitl.; Groesbeek, 7, de M.
D. grisescens Fall. — Schin. Fn. austr. I. 557. — Maastricht, 7, de Man; Plasmolen, 8, Piag.; Walcheren, la Font.

Prosenia St. Farg.

Pr. siberita Fabr. — B. 855. — Houthem, 7, Oudem.; Venlo, 7, v. d. Br.; Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 7—9, v. d. W. en v. Voll.; Overveen, Kink.; Heemstede, v. Voll.; Doorn, de Gr.; Soesterheide, 8, Kink.; Driebergen, 7, v. Voll.; Wolfhezen, 8, v. d. W.; Arnhem en Velp, 7 en 8, v. d. W.; Zutphen en Empe, 8, v. Eyndh.

Dexia Meig.

D. ferina Fall. — B. 856. — Plasmolen, 8, Piag.; Arnhem, 8, v. d. W.; Apeldoorn, 7, Oudem.
D. vacua Fall. — B. 857. — Venlo, v. d. Br.; Plasmolen, 8, Piag.; Breda, 7, Heyl.; Rozendaalsche heide bij Velp, v. d. W.
D. rustica Fabr. — B. 858. — Limburg, Maur.; Z. Limburg, 7, Oudem.; Breda, 5, Heyl.; Putten (Gelderl.), 7, Oudem.; Zutphen, 7, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.; Brummen, 7, v. Voll.
D. canina Fabr. — B. 859. — Vrij gemeen; bijna in alle provinciën.
D. carinifrons Fall. — Schin. Fn. austr. I. 559. — Limburg, 8, 9, Maur.

SARCOPHAGINAE.

Theria Rob. D.

Th. muscaria Meig. — B. 870. — 's Gravenhage, 5 tot 8, bij enkele ex., v. d. W.; Empe, v. Eyndh.

Sarcophila Rond.

S. latifrons Fall. — B. 861. — Venlo, 6, v. d. Br.; Scheveningsche duinen, een ♀, v. d. W.; Wolfhezen, 7, 8, v. d. W.

Sarcophaga Meig.

- S. carnaria* L. — B. 862. — Overal gewoon.
- S. striata* Fabr. — B. 863. — Breda, 7, de Man; 's Gravenhage, Voorburg en aan den Leidschendam, 5 en 8, v. d. W.; Bodegraven, 6, 8, de M.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, 7, 8, Kink.; Beekhuizen, 7, Kink.; Zutphen, Empe, 8, v. Eyndh.
- S. albiceps* Meig. — B. 864. — Meermalen gevonden in N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland.
- S. laticrus* Rob. D. — B. 865. — 's Gravenhage, 5, een ♂, v. d. W.
- S. atropos* Meig. — B. 866. — Z. Limburg, 7, Oudem.; Middelburg, 7, 8, de Man; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Amsterdam, 8, Kink.; Kortenhoef, 5, de M.
- S. vagans* Meig. — B. 867. — Venlo, 8, v. d. Br.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Haarlemmerhout, 6, Rits.; Muiderberg, 8, Kink.; Utrecht, 7, v. d. W.; Schalkwijk, 7, Wtt.; Arnhem, 8, v. Eyndh.
- S. pumila* Meig. — B. 868. — Maastricht, 7, v. d. W.; Haagsche en Scheveningsche duinen, 5—8, v. d. W.; Haarlem, 6, Weyenb.; Amsterdam, 5, Kink.; Linschoten, 8, de M.; Kuilenburg, 7, de M.
- S. haemorrhoidalis* Meig. — B. 869. — Houthem, 7, Oudem.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 6, 8, de Man; Rotterdam, Frans.; Hillegom, 5, Kink.; Amsterdam, 7, Jasp.; Hilversum, 6, de M.; Oud-Valkeveen, 5, Oudem.; Empe, v. Eyndh.
- S. cruentata* Meig. — B. 870. — Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 5—7, v. d. W.; Nieuwkoop, 8, de M.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, 7, v. d. W.; Empe, v. Eyndh.
- S. vulnerata* Schin. — B. 871. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 5—7, de M.
- S. vicina* Macq. — B. 872. — Zeeland, een ♂, Wtt.
- S. haemorrhoea* Meig. — B. 873. — Venlo, 5, v. d. Br.; Z. Limburg, 7, v. d. W. en Oudem.; Middelburg en Domburg, 6, 7, de Man; 's Gravenhage, 5, 7 en 8, v. d. W.; Leiden, 10, v. Voll.; Bodegraven, 5—7, de M.; Amsterdam, Jasp.; Empe, v. Eyndh.
- S. haematodes* Meig. — B. 874. — Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 8, 9, v. d. W. en de M.; Bodegraven, 7, de M.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, 9, Weyenb.; Amsterdam, 8, Kink.; Texel, 5, Rits.; Baarn, 8, de M.
- S. nigri ventris* Meig. — B. 875. — Plasmolen, 8, Piag.; Nuth, 7, Maur.; Middelburg en Domburg, 6, 7, de Man; 's Gravenhage, 7

- en 8, v. d. W.; Rotterdam, 8, Piag.; Amsterdam, 6, 8, Kink.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Zutphen en Empe, 8, v. Eyndh.; Nunspeet, 7, uit rupsen van *Ocneria monacha*, Oudem.
- S. erythrura* Meig. Syst. Besch. V. 30; Schin. Fn. austr. I. 572. — Breda, 7, een ♂, de Man; Kortenhoef, 5, de M.
- S. dissimilis* Meig. Syst. Besch. V. 25; Schin. Fn. austr. I. 572. — Nuth, 7, Maur.; Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 7, de Man.
- S. offuscata* Meig. Syst. Besch. V. 26; Schin. Fn. austr. I. 572. — Middelburg, 7, de Man.
- S. depressifrons* Zett. Dipt. Scand. IV. 1293; Schin. Fn. austr. I. 573. — Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 6, Piag.

Agria Rob. D.

- A. affinis* Fall. — B. 876. — Voorst, uit rupsen van *Ocneria dispar*, Wtt.
- A. lineata* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 573 (*Sarcophaga*). — Beekhuizen, 7, Kink.

Cynomyia Rob. D.

- C. mortuorum* L. — B. 877. — Herhaaldelijk gevonden; in de meeste provinciën.

Onesia Rob. D.

- O. sepulcralis* Meig. — B. 878. — Venlo, 5, v. d. Br.; St. Pieter, 8, Maur.; Middelburg, 7, de Man; Rotterdam, Frans.; Noordwijk, 6, Kink.; Utrecht, 7, v. d. W.; Zutphen en Empe, 7—10, v. Eyndh.
- O. agilis* Meig. — B. 879. — Venlo, 5, v. d. Br.; Maastricht, 8, Maur.; Middelburg, 8 en duinen bij Koudekerke, 8, 9, de Man; 's Gravenhage, 5—9, soms vrij gemeen, v. d. W.; Staalduinen, 7, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.; Amsterdam, 5, 8, Jasp.; Amersfoort, 8, v. Voll.; de Bilt, 5, Six; Zutphen en Empe, 5, v. Eyndh.
- O. cognata* Meig. — B. 880. — Venlo, 8, v. d. Br.; Breda, Heyl.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 5—9, v. d. W.; Rotterdam, 7, 8, Frans.; Leiden, 7, v. Voll.; Amsterdam, 4, Kink.; Amersfoort, 8, v. Voll.; Driebergen, 10, Six; Utrecht, 6, Wtt.; Arnhem, 4, v. M. d. R.; Zutphen, 8, v. Eyndh.
- O. clausa* Macq. — B. 881. — Zeeland, een exempl., Wtt.; 's Gravenhage, 5, en Staalduinen, 7, v. d. W.
- O. gentilis* Meig. Syst. Besch. VII. 302; Schin. Fn. austr. I. 577. — Limburg, Maur.; Rotterdamsche plassen, 8, Piag.

MUSCINAE.

Stomoxys Geoffr.

- St. calcitrans* L. — B. 882. — Zeer verbreid en nergens zeldzaam.

Haematobia Rob. D.

- H. stimulans* Meig. — B. 883. — Plasmolen, 6, Piag.; Middelburg en Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 4, 6 en 9, en Leiden, 7, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Velzen, 7, Rits.; Sloten, 6, Grebn.
- H. melanogaster* Meig. Syst. Besch. IV. 163; Schin. Fn. austr. I. 578 (*Stomoxya*)¹⁾. — Middelburg, 6, een ♀, de Man; Weesp, 6, de M.
- H. irritans* L. — B. 884. — 's Gravenhage, 7 en 9, v. d. W.
- H. ferox* Rob. D. — B. 885. — 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Amsterdam, 4, Kink.; Empe, v. Eyndh.

Graphomyia Rob. D.

- Gr. maculata* Scop. — B. 886. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.

Mesembrina Meig.

- M. meridiana* L. — B. 887. — Vrij gemeen; in bijna alle provinciën.

Calliphora Rob. D.

- C. vomitoria* L. — B. 888. — Venlo, v. d. Br.; Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Walcheren, de Man; 's Gravenhage, 4—9, v. d. W.; Leiden, Herkl.; Heemstede, v. Voll.; Amsterdam 5, Kink. en 7, de M.
- C. erythrocephala* Meig. — B. 889. — Overal gemeen.
- C. azurea* Fall. — B. 890. — Venlo, v. d. Br.; Breda, 9, Heyl.; Leiden, 7, Rits.; Velp, 7, een ♀, v. d. W.

Pollenia Rob. D.

- P. rudis* Fabr. — B. 891. — Overal gewoon.
- P. vespillo* Fabr. — B. 892. — Venlo, 9, v. d. Br.; Gulpen, 7, Oudem.; Breda, 7, Heyl.; Hilversum, 6, en Oud-Valkeveen, 5, de M.; Linschoten, 4, de M.; Utrecht, 5, Six; Driebergen, v. Voll.; Wolfhezen, 8, Weyenb.; Winterswijk, 7, v. d. W.; Apeldoorn, 8, Oudem.; Zutphen, 6, v. Eyndh.; Vorden, 8, de Gav.
- P. atramentaria* Meig. — B. 893. — Venlo, 8, v. d. Br.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Haarlem, 4, Weyenb.; Hilversum, 4, de M.; Arnhem, 4, v. M. d. R.; Zutphen, v. Eyndh.; Putten (Gelderl.), in het najaar van 1890 in ontzettend aantal, Oudem.
- P. varia* Meig. — B. 894. — Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 3 en 5, v. d. W.; Amsterdam, Kink., en 6, 9, de M.; Hilversum, 6, de M.; Schalkwijk, 8, Wtt.; Zutphen, v. Eyndh.
- P. lanio* Panz. — Schin. Fn. austr. I. 587. — Maastricht, een ♀, 7, Maur.

1) Volgens Strobl is *H. melanogaster* het ♀ van *H. stimulans*.

P. depressa Meig. Syst. Besch. V. 67; Schin. Fn. austr. I. 587. — Oirschot, 8, Maur.

Dasyphora Rob. D.

D. cyanella Meig. — B. 895. — Meermalen gevonden in Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland.

Lucilia Rob. D.

L. nobilis Meig. — B. 896. — Gulpen, 7, Oudem.; Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, 5—9, v. d. W.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Amsterdam, 7, 9 en Diemen, 8, de M.; IJmuiden, 6, Hilversum, 7, de M.; Haren, 7, de Gav.

L. caesar L. — B. 897. — Overal gemeen.

L. ruficeps Meig. — B. 898. — Gulpen, 7, Oudem.; Plasmolen, 6, Piag.; Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5 en 9, v. d. W.; Amsterdam, 7, 9, Kink.; Utrecht, Six.

L. latifrons Schin. — B. 899. — Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage en Scheveningsche duinen, 6—9, v. d. W.; Amsterdam, 7, de M.

L. sericata Meig. — B. 900. — Middelburg, 7, de Man; 's Gravenh., 6, 8, 9, en aan den Leidschendam, 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 5, 7, 8, de M.; Diemen en Amsterdam, 8, de M.

L. cornicina Fabr. — B. 901. — Verbreid en vrij gemeen.

L. sylvarum Meig. — B. 902. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6, 7, v. d. W., 8, de M.; Bodegraven, 8, de M.; Diemen, 6, 7, en Bussum, 6—8, de M.; Zutphen, v. Eynhd.

L. illustris Meig. — B. 903. — Limburg, Maur.; Gulpen, 7, Oudem.; Breda, Heyl.; Middelburg, de Man; 's Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam, 7, v. d. W.; Diemen, 8, de M.; Alkmaar, 10, Jasp.; Texel, 5, Rits.; Utrecht, 7, v. d. W.; Harkstede, 4, de Gav.

L. Meigenii Schin. — B. 904. — Limburg, Maur.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Rotterdam, Frans.; Amsterd., 7, Kink.; Voorst, 7, v. Eynhd.; Zuidlaren, Cl. M.

L. regalis Meig. — B. 905. — 's Gravenhage, een paar malen het ♂, v. d. W.

L. parvula Meig. — B. 906. — 's Gravenhage, 7 en 9, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Overveen, 5, Piag.; Zutphen, 6, v. d. W.; Empe, 7, v. Eynhd.

L. regina Meig. Syst. Besch. V. 58; Schin. Fn. austr. I. 589. — Bodegraven, 7, Amsterdam, 2—10, Diemen, 8 en Linschoten, 7, de M.

Pyrellia Rob. D.

P. cadaverina L. — B. 907. — Herhaaldelijk gevonden, in de meeste provinciën.

- P. serena* Meig. — B. 908. — Domburg, 5, de Man; Driebergen, v. Voll.; Beek, 9, Rits.; Groesbeek, 7, de M.; Voorst, Zutphen en Empe, 7 en 8, v. Eyndh.
- P. aenea* Zett. — B. 909. — Walcheren, l. Font.; Zutphen en Arnhem, 8, v. Eyndh.

Musca L.

- M. domestica* L. — B. 910. — Overal gewoon.
- M. corvina* Fabr. — B. 911. — Als voren.

Plaxemyia Rob. D.

- Pl. tempestiva* Fall. — B. 912 (*Musca*). -- Oostvoorne, 6, de M.; 's Gravenh., duinen, 8, v. d. W.; Beek, 5, Piag.; Velp, 7, v. d. W.
- Pl. vitripennis* Meig. Syst. Besch. V. 73; Schin. Fn. austr. I. 594. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, duinen, 6, Piag.

Cyrtoneura Macq.

- C. hortorum* Fall. — B. 913. — Vrij gemeen en zeer verbreid.
- C. simplex* Löw. — B. 914. — Limburg, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.; Zutphen en Keppel, v. Eyndh.
- C. curvipes* Macq. — B. 915. — Plasmolen, 8, Valkenburg, 7, Piag.; Breda, 5, Heyl.; Middelburg, 6, 7, 8, de Man; 's Gravenhage, 4—9, v. d. W.; Rotterdam, 8, Frans.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Amsterd., 6, Jasp.; Rheder Steeg, 6, v. d. W.; Arnhem, Zutphen en Empe, v. Eyndh.
- C. stabulans* Fall. — B. 916. — Vrij gemeen. Uit *Lophyrus pallidus*, Steenwijk, 8, de Gav.
- C. pabulorum* Fall. -- B. 917. — Valkenburg, 7, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, v. d. W.; Haarlem, Weyenb.; Doorn, de Gr.; Utrecht, Maitl.; Voorst, 6, v. Voll.
- C. pascuorum* Meig. — B. 918. — Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, een exempl., v. d. W.; Zutphen, 4, een ♀, v. Eyndh.
- C. assimilis* Fall. — B. 919. — Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, 4—10, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Rijnsaterwoude, uit witte kool verkregen, Wtt.; Amsterd., 9, 10, Kink.; Elspeet, uit uien verkregen, Wtt.
- C. caesia* Schin. (non Meig.) -- Schin. Fn. austr. I. 598. -- Venlo, 7, v. d. Br.; Middelburg, 8, de Man; Haarlem, 3, Rits.; Amsterdam, 9, Kink.

Myospila Rond.

- M. meditabunda* Fabr. — B. 920. — Herhaaldelijk gevonden, in de meeste provinciën, hier en daar vrij gemeen.

ANTHOMYINAE.

Polietes Rond.

P. lardaria Fabr. — B. 921 (*Aricia*). — Niet zeldzaam; in bijna alle provinciën gevonden.

Hyedotesia Rond.

H. albolineata Fall. — B. 922 (*Aricia*). — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland; bij 's Gravenhage o. a. gemeen.

H. lucorum Fall. — B. 923 (*Aricia*). — Middelburg, 9, de Man; Rotterdam, Frans.; 's Gravenhage, 4—10, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Warmond, v. Bemm.; Noordwijk, 10, v. Voll.; Vogelezang, 6, Kink.; Vuursche, 7, v. Voll.; Wageningen, 7, v. d. W.

H. obscurata Meig. — B. 924 (*Aricia*). — 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Wassenaar, 7, de Man; Bussum, 6, de M.

H. dispar Fall. — Schin. Fn. austr. I. 600 (*Aricia*). — Dinther, 7, de Man.

H. marmorata Zett. Dipt. Scand. XIV. 6197; Schin. Fn. austr. I. 601 (*Aricia*). — 's Gravenhage, 6, een ♀, v. d. W.

H. serva Meig. Syst. Besch. V. 86; Schin. Fn. austr. I. 601 (*Aricia*). — Overveen, 6, een ♀, Weyenb.

H. laeta Fall. — B. 928 (*Aricia*). — Oirschot, 6, Maur.; Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Amsterdam, 6 en Overveen, 3, de M.; Haarlem, Rits.; Texel, 5, Rits.

H. plumbea Meig. Syst. Besch. V. 85; Schin. Fn. austr. I. 602 (*Aricia*). — Oirschot, 8, Maur.; Woensdrecht, 6, v. d. W.

H. incana Wied. — B. 925 (*Aricia*). — Nuth, 7, Maur.; Venlo, v. d. Br.; Dinther, 8, de Man; 's Gravenhage, 5—8, v. d. W.; Rotterdam, Sn.; Hoek v. Holland, v. Bemm.; Overveen, 6, Piag.; Amsterdam, 5, 6, Kink. en de M.; Bussum, 6, de M.; Kuilenburg, 7, de M.

H. alpina Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 135. — Witterholt, 7, een ♂, v. d. W.

H. umbratica Meig. Syst. Besch. V. 88 (= *Aricia carbo* Schin.) — B. 926 (*Aricia carbo*). — Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, Piag.; Bodegraven, 5, de M.; Amsterdam, 5, Kink.; Diemen, 8, de M.; Amersfoort, 8, Driebergen, 7, v. Voll.; Utrecht en Schalkwijk, 6, Wtt.; Empe, 5, v. Eynhdh.; Kuilenburg, 7, de M.; Groningen, 7, de Gav.

H. erratica Fall. — B. 930 (*Aricia*). — Venlo, v. d. Br.; Valkenburg, Drechsler; Oirschot, 6, 8, Maur.; Dinther, 8, de Man; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Bodegraven, 8, de M.; Noordwijk, 7, Rits.; Heemstede, 8 en 9, v. Voll.;

- Doorn, de Gr.; Driebergen, v. Voll.; Putten (Gelderl.), 9, Oudem.; Arnhem, 8, v. d. W.; Groningen, 8, de Gav.
- H. errans* Meig. — B. 931 (*Aricia*). — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Gelderland en Groningen.
- H. signata* Meig. — B. 929 (*Aricia*). — Venlo, 6, v. d. Br. en de M.; Breda, Heyl.; Middelburg, de Man; 's Gravenhage, 6—9, v. d. W.; Haarlem, 3, Rits.; Amsterdam, 10, Kink.; Hilversum, 10, de M.; Arnhem, 3, v. M. d. R.; Voorst, 7, Wtt.; Zutphen, v. Eyndh.
- H. lasiophthalma* Macq. Suit. à Buff. II. 297; Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 126 (B. 927, ten onrechte als *Aricia quadrinotata* Meig.). — Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 5, 6, v. d. W.
- H. rufipalpis* Macq. Suit. à Buff. II. 287; Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 128. — 's Gravenhage, 6, een ♂, v. d. W.
- H. vagans* Fall. Musc. 78; Zett. Dipt. Scand. IV. 1638. -- Venlo, een ♂, v. d. W.
- H. basalis* Zett. Dipt. Scand. IV. 1695 (B. 932, *Aricia vagans*). — Venlo, 5, v. d. Br.; Valkenburg, v. d. W.; 's Gravenhage, 6—8, en Wassenaar, v. d. W.; Rotterdam, Sn.; Vogelenzang, v. d. W.; Wageningen, v. d. W.; Voorst, 7, Wtt.; Witterholt, v. d. W.
- H. pallida* Fabr. — B. 935 (*Aricia*). — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.
- H. variegata* Meig. Syst. Besch. V. 114; Schin. Fn. austr. I. 605 (*Aricia*). — West-Capelle, 5, Piag.
- H. scutellaris* Fall. — B. 934 (*Aricia*). — Limburg, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 9, een ♀, v. d. W.; Hilversum, 10, de M.
- H. populi* Meig. — B. 933 (*Aricia*). — Venlo, v. d. Br.; Maastricht, 6, Maur.; Breda, Heyl.; Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 9, en 10, v. d. W.; Hillegom, 5, Kink.; Velzen, 7, Rits.; Driebergen, 9, v. Voll.; Assen, 7, v. d. W.
- H. van der Wulp* Schnabl, Horae Soc. Ent. Ross. XXII. 387 (*Aricia*). — 's Gravenhage, 6, v. d. W.

Mydaea Rob. D.

- M. vespertina* Fall. — B. 951 (*Spilogaster*). -- Herhaaldelijk gevonden; in bijna alle provinciën.
- M. nigrita* Fall. -- B. 953 (*Spilogaster*). — Walcheren, de Man; 's Gravenhage, 5, een ♀, v. d. W.; Utrecht, 6, Wtt.
- M. divisa* Meig. — B. 952 (*Spilogaster*). — Middelburg, 9, de Man; Scheveningsche strand, een ♂, 8, v. d. W.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Amsterdam, 6, Jasp.; Witterholt, 7, v. d. W.
- M. ancilla* Meig. — B. 943 (*Spilogaster*). — Koudekerke, duinen, 6, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Wassenaar, 4, v. Voll.; Utrecht, 5, Six.

- M. tincta* Zett. — B. 947 (*Spilogaster*). — Driebergen, v. Voll. en v. d. W.; Witterholt, 7, v. d. W.
- M. pagana* Fabr. — B. 946 (*Spilogaster*). — Herhaaldelijk en in bijna alle provinciën gevonden.
- M. demigrans* Zett. Dipt. Scand. IV. 1699; Schin. Fn. austr. I. 610 (*Spilogaster*). — Venlo, v. d. Br.; Ossendrecht, 7, de M.; Domburg, 9, de Man; in de omstreken van Haarlem, de M. en Weyenb.; Hilversum, 6, de M.
- M. impuncta* Fall. — B. 944 (*Spilogaster*). — Herhaaldelijk gevonden, in de meeste provinciën.
- M. innoxia* Meig. — B. 948 (*Spilogaster*). — 's Gravenhage, 9, twee ♀, v. d. W.; Doorn, de Gr.
- M. separata* Meig. — B. 945 (*Spilogaster*). — Limburg, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; Domburg, 9, de Man; 's Gravenhage en Wassenar, 7 en 8, v. d. W.; Oosterbeek, v. Bemm.
- M. urbana* Meig. — B. 950 (*Spilogaster*)¹). — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën.

Spilogaster Macq.

- Sp. fuscata* Fall. — B. 941. — Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.
- Sp. trigonalis* Meig. Syst. Besch. V. 127. 79; Schin. Fn. austr. I. 612. — 's Gravenhage, 5, een ♂, v. d. W.
- Sp. uliginosa* Fall. — B. 940. — Maastricht, 10, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 5, 6, v. d. W. en v. Voll.; Rotterdam, 5, 7, Frans.; Amsterdam, 8—10, de M.
- Sp. notata* Fall. — B. 939. — Venlo, 7, v. d. Br.; Limburg, Maur.; 's Gravenhage, duinen, 5—9, v. d. W.; Katwijk, 7, de Gr.; Rotterdam, 5, 6, Frans.
- Sp. maculosa* Meig. Syst. Besch. V. 91; Schin. Fn. austr. I. 608. — Rotterdam, 5, Frans.; Beek, 8, v. M. d. R.
- Sp. quadrum* Fabr. — B. 936. — Niet zeldzaam, in de meeste provinciën.
- Sp. calceata* Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 96. — 's Gravenhage, 4, 5, twee ♂, v. d. W.
- Sp. communis* Rob. D. — Meade, Ent. Monthl. Mag. XVIII. 64. — Dinther, 7, 8, de Man; Domburg, 5, 6 en duinen bij Koudekerke, 8, de Man.
- Sp. duplicata* Meig. — B. 937. — Herhaaldelijk aangetroffen; in bijna alle provinciën.
- Sp. duplaris* Zett. — B. 938. — Middelburg, 6, de Man; 's Gra-

1) Van de onder 949 B. vermelde *Spilogaster angelicae* Scop. behooren al de exemplaren ook tot *Mydaea urbana* Meig. (zie Tijdschr. v. Ent. XXVI. p. 116).

- venhage, 7 en Staalduinen, v. d. W.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Amersfoort, 7, v. d. W.
- Sp. flagripes* Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 79 (B. 942, als *Sp. tetrastigma* Meig.). — Zutphen, v. Eyndh.
- Sp. pertusa* Meig. — B. 964 (*Limnophora*). — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.
- Sp. quadrimaculata* Fall. — B. 965 (*Limnophora*). — 's Gravenhage, een ♂, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.

Onodontha Rond.

- O. occulta* Meig. — B. 954 (*Hydrotaea*). — 's Gravenhage, 5, 7, v. d. W.
- O. ciliata* Fabr. — B. 955 (*Hydrotaea*). — Venlo, v. d. Br.; Ulvenhout, 6, Piag.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Utrecht, 6, Wtt.; Driebergen, v. Bemm.; Rhedersteeg, 8, v. d. W.; Hattem, 6, Piag.; Keppel, 8, v. Eyndh.; Kuilenburg, 7, de M.; Assen, 7, v. d. W.
- O. sylvicola* Löw. — B. 956 (*Hydrotaea*). — Arnhem, 8, een ♂, v. d. W.

Hydrotaea Rob. D.

- H. dentipes* Fabr. — B. 957. — Gemeen.
- H. palaestrica* Meig. — B. 958. — 's Gravenhage, 6, 7, v. d. W.
- H. armipes* Fall. — B. 959. — Z. Limburg, 7, Oudem.; Koudekerke, duinen, 8, de Man; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Bodegraven, 5, de M.; Haarlem, 6, Weyenb.; Hilversum, 7, v. d. W.; Utrecht, 6, Wtt.; Empe, 5, v. Eyndh.
- H. irritans* Fall. — B. 960. — Middelburg, de Man; 's Gravenhage, 6, 7, en Staalduinen, 7, v. d. W.; Bodegraven, 6, de M.; Haarlem, 5, Weyenb.; Amsterdam, 6, 7, Grebn. en de M.; Vogelenzang, Kink.; Bloemendaal en Hilversum, 7, v. d. W.; Driebergen, v. Voll.; Amersfoort, 8, v. Voll.; Assen, 7, v. d. W.
- H. meteorica* L. — Schin. Fn. austr. I. 616. — Venlo, v. d. Br.; Walcheren, G. v. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Haarlem, 5, Weyenb.; Wolfhezen, 8, Piag.; Heerenveen, Jasp.
- H. brevipennis* Löw. — Schin. Fn. austr. I. 616. — 's Gravenhage en Rotterdam, 6, Piag.

Ophyra Rob. D.

- O. leucostoma* Wied. — B. 961. — Vrij gemeen; in bijna alle provinciën aangetroffen.
- O. anthrax* Meig. — B. 962. — 's Gravenhage, op het kerkhof van Eikenduinen, 7, 8 en 10, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.

Drymeia Meig.

- Dr. hamata* Fall. — B. 963. — Empe, 7, v. Eyndh.; Groesbeek, 7, de M.

Limnophora Rob. D.

- L. didyma* Zett. — B. 966. — Plasmolen, 6, v. d. W.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Arnhem, 11, v. M. d. R.
- L. tristis* Meig. Syst. Besch. V. 153; Schin. Fn. austr. I. 623. — In het Overmaassche, 6, Piag.

Eriphia Meig.

- E. Billbergi* Zett. Dipt. Scand. IV. 1528; Schin. Fn. austr. I. 626. — Venlo, 4, een ♂, v. d. Br.
- E. sylvestris* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 626. — Maastricht, 5, een ♀, Maur.

Pegomyia Macq.

- P. varians* Zett. — B. 967 (*Limnophora*). — Valkenburg, 7, Piag.; Ulvenhout, 6, Piag.; Oirschot, 7, Maur.; 's Gravenhage, 8, een ♀, v. d. W.; Gelderland, een ♂, v. Walchr.
- P. mitis* Meig. — B. 988 (*Anthomyia*). — Niet zeldzaam; in bijna alle provinciën aangetroffen.
- P. nigritarsis* Zett. — B. 989 (*Anthomyia*). — Limburg, Maur.; Walcheren, l. Font.; 's Gravenhage, 5 en 7, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Rotterdam, 5, Piag.; Haarlem, 7, Weyenb.; Amsterdam, 6, de M.; Baarn, 8, de M.; Zutphen, 7, v. Eyndh.
- P. bicolor* Wied. — B. 990 (*Anthomyia*). — Middelburg, 7, de Man; Rotterdam, 7, Piag.; 's Gravenhage, 5—9, enkele exempl., v. d. W.; Heemstede, 9, v. Voll.; Bodegraven, 7, de M.; Amsterdam, 6, de M.
- P. exilis* Meig. — B. 991 (*Anthomyia*). — Venlo, 5, v. d. Br.; Breda, 5, Heyl.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.; Haarlem, 8, Weyenb.; Weesp, 6, de M.
- P. versicolor* Meig. — B. 992 (*Anthomyia*). — Plasmolen, 6, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Utrecht, 6, Wtt.
- P. ephippium* Zett. — B. 999 (*Anthomyia*). — Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, 5, 6, in de duinbosschen, eens in verscheidene ex., v. d. W.
- P. hyoscyami* Panz. — B. 1000 (*Anthomyia*). — Empe, v. Eyndh.
- P. diaphana* Wied. — Schin. Fn. austr. I. 623 (*Limnophora*). — Domburg, 6, de Man; Amersfoort, 7, v. Voll.; Laag Soeren, 6, Oudem.; de Steeg, 6, de M.; Oldenzaal, 7, Oudem.
- P. fulgens* Meig. Syst. Besch. V. 183; Schin. Fn. austr. I. 634 (*Anthomyia*). — Venlo, 5, v. d. Br.; Rotterdam, 4, Sn.; Utrecht, 7, v. d. W.; Lekkum, 4, H. A.
- P. latitarsis* Zett. Dipt. Scand. V. 1754; Schin. Fn. austr. I. 635 (*Anthomyia*). — Venlo, 8, v. d. Br.; Oirschot, 8, Maur.; Ulvenhoutsche bosch, 6, Piag.; Driebergen, 10, Six; Winterswijk, 7, v. d. W.; Assen, 7, v. d. W.

- P. Winthemi* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 641 (*Anthomyia*). — Wassenaar, 7, Piag.; Haren, 7, de Gav.
P. vittigera Zett. Dipt. Scand. V. 1788; Schin. Fn. austr. I. 641 (*Anthomyia*). — Domburg, 5, een ♂, de Man.
P. flavipes Fall. — Schin. Fn. austr. I. 642 (*Anthomyia*). — Domburg, 7, de Man; Wageningen, 7, v. d. W.

Eustalomyia Kow.

- E. hilaris* Fall. — B. 968 (*Hylemyia*). — Breda, 6, Heyl.; Middelburg, 7, de Man; Haarlem, Weyenb.; Empe, 5, v. Eynth.; Heelsum, 7, v. Voll.

Hylemyia Rob. D.

- H. virginica* Meig. — B. 969. — 's Gravenhage, 5, 8 en 10, v. d. W.; Schalkwijk, 7, een ♂, Wtt.; Wolfhezen, 8, Piag.
H. flavipennis Zett. — B. 970. — Schalkwijk, 7, een ♂, Wtt.
H. variata Fall. — B. 971. — Herhaaldelijk aangetroffen, in de meeste provinciën.
H. lasciva Zett. — B. 972. — 's Gravenhage, 5—7, enkele malen, v. d. W.; Schalkwijk, 7, Wtt.
H. coarctata Fall. — B. 973. — Limburg, Maur.; Breda, Heyl.; Dinther, 7, de Man; Ossendrecht, 7, de M.; Vught, 6, Oudem.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Rotterdam, 7, Piag.; Loosduinen, 7, de M.; IJmuiden, 6, de M.; Overveen, 6, Piag.; Hilversum, 7, v. d. W.; Maarsbergen, 7, Piag.; Utrecht, 6, Wtt.; Wageningen en Wolfhezen, 7, v. d. W.; Kuilenburg, 7, de M.
H. puella Meig. — B. 974. — Oirschot, Maur.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bloemendaal, 8, Hilversum, 7 en Bussum, 4, de M.; de Bilt, 4, Kink.; Zutphen, 7, v. Eynth.
H. strigosa Fabr. — B. 975. — Vrij gemeen; in bijna alle provinciën.
H. nigrimana Meig. — B. 976. — Plasmolen, 6, Piag.; 's Gravenhage, 8, een ♂, v. d. W.; Amsterdam, 10, Kink.; Groesbeek, 7, de M.; Empe, 8, een ♂, v. Eynth.; Vorden, 8, de Gav.
H. regens Meig. — B. 977. — 's Gravenhage, 5, zeldzaam, v. d. W.
H. praepotens Wied. — B. 978. — Venlo, v. d. Br.; Oirschot, 6, 8, Maur.; Middelburg, 8, de Man; Velp, 7, een ♀, v. d. W.
H. cardui Meig. — B. 1009 (*Anthomyia*). — Oirschot, 6, Maur.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Voorst, 7, v. d. W.
H. cinerella Meig. Syst. Besch. V. 100; Schin. Fn. austr. I. 628. — Plasmolen, 6, v. d. W.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, duinen, 6, Piag.; Bodegraven, 10, de M.; Bussum, 7, de M.; Kuilenburg, 7, de M.

- H. paralleliventris* Zett. Dipt. Scand. XII. 4725; Schin. Fn. austr. I. 629. — Mastbosch bij Breda, 5, Piag.; Rotterdam, 5, Piag.
H. Garriglietti Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 193. — Bunde, 7, een ♀, Maur.

Hydrophoria Rob. D.

- H. linogrisea* Meig. — B. 979 (*Hylemyia*). — Valkenburg, 7, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; Rotterdam, 8, Frans.; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Leiden, de Gr.; Amsterdam, 5, 8, de M. en Kink.; Warnsveld, 6, v. Eyndh.
H. conica Wied. — B. 980 (*Hylemyia*). — Vrij gemeen; in bijna alle provinciën.
H. coronata Zett. — B. 981 (*Hylemyia*). — Schalkwijk, 7, een ♂, Wtt.

Acanthiptera Rond.

- A. inanis* Fall. — B. 987 (*Anthomyia*). — Nuth, 7, Maur.; Houthem, 7, Oudem.; Oirschot, 4, Maur.; Vught, 6, Oudem.; Wassenaarsche duinen, 7, een ♂, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem, 8, uit een nest van *Vespa germanica*, Rits.; Hilversum, 7, Valkeveen, 7, Driebergen, 8 en Wageningen, 7, v. d. W.; Putten (Gelderland), 9, Oudem.

Anthomyia Meig.

- A. pluvialis* L. — B. 1016. — Herhaaldelijk gevonden in de meeste provinciën.
A. pratincola Panz. — B. 1017. — 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Leiden, 7, v. Voll.; Amersfoort, 7, v. d. W.
A. albicincta Fall. — Schin. Fn. austr. I. 648. — 's Gravenh., 6, v. d. W.
A. arenosa Zett. — B. 993. — Scheveningen en Katwijk, 7, 8, eenige exempl. aan het strand, v. d. W.; 's Gravenhage, Frans.
A. pusilla Meig. — B. 994. — Venlo, v. d. Br.; Rotterdam, 7, Sn.; Amsterdam, 5, 8, 9, Kink.; Zutphen, 8, v. Eyndh.
A. pratensis Meig. — B. 1002. — Venlo, 7, v. d. Br.; Nuth, 7, Maur.; Domburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 4, 7, v. d. W.; Loosduinen, 7, en Bodegraven, 5, de M.; Amsterdam, 6, Jasp.; Kulenburg, 7, de M.
A. aestiva Meig. — B. 1004. — Walcheren, l. Font.; Goes, 8, v. Voll.; 's Gravenh., niet zeldzaam, 5—10, v. d. W.; Leiden, 7, v. Voll.; Rotterdam, 5, Frans.; Texel, 5, Rits.; Hilversum, 7, v. d. W.; Amsterdam, Kink.; Utrecht, Six; Amersfoort, 6, v. Voll.; Empe, v. Eyndh.; Groningen, 7, de Gav.
A. humerella Zett. — B. 1006. — Dinther, 7, de M.; Ulvenhoutsche bosch, 6, Piag.; Goes, 6, v. Voll.; Amsterdam, 4, Kink.; Heelsum, 6, v. Voll.; Arnhem, 8, v. d. W.
A. ruficeps Meig. — B. 1007. — Maastricht, 7, Maur.; Plasmolen,

- 6, v. d. W.; Oirschot, 8, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage en Scheveningsche strand, 6 en 7, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.; Rotterdam, 4, 5, Piag.; Overveen, 9, Kink.; Amsterdam, 6, de M.; Utrecht, 6, Wtt.; Leeuwarden, 4, H. A.
- A. spreta* Meig. — B. 1008. — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 4 en 7, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, 5, Grebn.
- A. radicum* L. — B. 1010. — Niet zeldzaam; in bijna alle provinciën aangetroffen.
- A. floralis* Fall. — B. 1012. — Walcheren, G. v. W.; St. Michelsgestel; 's Gravenhage, 4—9, v. d. W.; uit koolrapen, v. Voll.; Rijnsaterwoude, uit witte kool, Wtt.; Voorst, uit zomerknollen en koolrapen, Wtt.; Zutphen, 6, v. Eyndh.
- A. fugax* Meig. — B. 1013. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 4, 5, 8, ook in de Scheveningsche duinen, v. d. W.
- A. antiqua* Meig. — B. 1003. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.; Haarlemmermeer, Wtt.; Kuilenburg, 7, de M.; Elsgeest en Voorst, Wtt.; Groningen, Wtt. Door Wttewaall uit uien gekweekt.
- A. scatophagina* Zett. Dipt. Scand. IV. 1510; Schin. Fn. austr. I. 637. — Loosduinen, 5, v. d. W.; Rockanje, Piag.; Amsterd., 5, Jasp.
- A. trapezina* Zett. Dipt. Scand. IV. 1513; Schin. Fn. austr. I. 638. — Loosduinen, 5, v. d. W.
- A. intersecta* Meig. Syst. Besch. V. 175; Schin. Fn. austr. I. 646. — Oirschot, 8, een ♀, Maur.
- A. brevicornis* Zett. Dipt. Scand. IV. 1534; Schin. Fn. austr. I. 646. — Venlo, v. d. Br.
- A. setaria* Meig. Syst. Besch. V. 178; Schin. Fn. austr. I. 648. — Venlo, v. d. Br.; Oirschot, 8, Maur.

Azelia Rob. D.

- A. aterrima* Meig. — B. 995 (*Anthomyia*). — 's Gravenhage, 5—9, niet gemeen, v. d. W.; Utrecht, 6, Six en Wtt.; Driebergen en Amersfoort, 8, v. Voll.; Empe, 8, v. Eyndh.
- A. Staegeri* Zett. — B. 996 (*Anthomyia*). — Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, 6—10, v. d. W.; Rotterdam, 5, 6, 9, Piag.; Amsterdam, 7, 8, Kink.; Utrecht, 5, 6, Wtt.; Driebergen, v. Voll.; Beek, 7, v. Voll.
- A. triquetra* Wied. — B. 997 (*Anthomyia*). — Herhaaldelijk gevonden, in bijna alle provinciën.
- A. Macquarti* Zett. — B. 998 (*Anthomyia*). — Oirschot, 8, Maur.; Walcheren, l. Font.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Hilversum, 6, 7, de M.; Amsterdam, Kink.; Utrecht, 6, Wtt.; Zutphen, 7, v. Eyndh.; Kuilenburg, 7, de M.

Hammomyia Rond.

H. albescens Zett. Dipt. Scand. IV. 1520; Schin. Fn. austr. I. 638 (*Anthomyia*). — Walcheren, l. Font.

Homalomyia Bouché.

- H. canicularis* L. — B. 1018. — Zeer gemeen.
H. pretiosa Schin. — B. 1019. — Driebergen, v. Voll.; Empe, 8, v. Eyndh.; Gelderland, v. Walchr.
H. hamata Macq. — B. 1020. — Rotterdam, 7, Frans.
H. scalaris Fabr. — B. 1021. — Niet zeldzaam; in bijna alle provinciën aangetroffen.
H. manicata Meig. — B. 1022. — Maastricht, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 3—6, v. d. W.; Rotterdam, 4, Piag.; Haarlem, 3, Weyenb.; Amsterdam, Jasp.
H. armata Meig. — B. 1023. — 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Domburg, 7, de Man.
H. lepida Wied. — B. 1024. — Plasmolen, 8, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, vrij gemeen, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Rotterdam, 6, Frans.; Haarlem, 4, Rits.; Amersfoort, Driebergen, 6, 7, v. Voll.; Maarsbergen, 6, Piag.; Kuilenburg, 7, de M.; Leeuwarden, 4, H. A.; gekweekt uit champignons (*Cantharellus cibarius*), v. Voll.
H. floricola Meig. — B. 1025. — Limburg, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Rotterdam, 8, v. Voll.; Bussum, 5 en Bergen, 7, de Man; Schalkwijk, 7, Wtt.
H. incisurata Zett. — B. 1026. — Limburg, Maur.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 4—8, ook aan den Leidschendam, v. d. W.; Noordwijk, v. Bemm.; Bodegraven, 5, de M.; Amsterdam, 5, Grebn., 8, de M.; Utrecht, 4 en 5, Wtt.; Linschoten, 4, de M.; Zutphen en Empe, v. Eyndh.
H. sociella Zett. Dipt. Scand. IV. 1564; Schin. Fn. austr. I. 655. — Oirschot, 6, Maur.; Amsterdam, 6, Jasp.
H. pallitibia Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 49. — Middelburg, 8, de Man.

Chortophila Macq.

- Ch. munda* Meig. — B. 982 (*Hylemyia*). — 's Gravenhage en in de duinen bij Scheveningen, een paar ex., 7, v. d. W.
Ch. caesia Macq. — B. 984 (*Hylemyia*). — Aan den zeedijk te Kampen, een ♀, v. Voll.
Ch. oralis Rob D. — B. 985 (*Hylemyia*). — Koudekerke, 8, de Man; Wassenaarsche duinen, 8, v. d. W.; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Voorst, Wtt.
Ch. fuscula Fall. — B. 986 (*Hylemyia*). — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.

- Ch. muscaria* Fall. — B. 1005 (*Anthomyia*). — Plasmolen, 6, Piag.; Oud-Vroenhoven, 4, Maur.; Breda, Heyl.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 6, 7, de Man; 's Gravenhage en aan 't strand te Katwijk, 7, v. d. W.; Wassenaar, 6, v. Voll.; Amsterdam, 9, Sw.; Schoorl, Bussum, 9, Jasp.; Utrecht, 5, Wtt.; Zutphen, 5, Arnhem, 8, v. Eynth.
- Ch. platūra* Meig. — B. 1010 (*Anthomyia*). — Dinther, 7, de Man; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 5—9, v. d. W. en d. M.; Katwijk, v. Bemm.; Overveen, 4, Weyenb.; Hilversum, 7, v. d. W.; Maarsbergen, 8, Piag.; Driebergen, 10, Six; Wageningen, 7, v. d. W.; Arnhem, 3, v. M. d. R.; Leeuwarden, 4, H. A.
- Ch. striolata* Fall. — B. 1014 (*Anthomyia*). — Maastricht, 7, v. d. W.; Oirschot, 8, Maur.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 4—9, en Katwijk, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.; Rotterdam, 5, Noordwijk, 5, Piag.; Haarlem, 3, Weyenb.; Amsterdam, 6, Jasp.; Utrecht, 5 en 6, Wtt.; Arnhem en Rhedersteeg, v. d. W.; Brummen, 8, v. Voll.; Winterswijk, 7, v. d. W.
- Ch. angustifrons* Meig. Syst. Besch. V. 146 (*Anthomyia*); Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 216. — Duinen bij Koudekerke, de Man.
- Ch. cilicrura* Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 213. — Venlo, 4, v. d. Br.; Middelburg, 5, 9, de M.
- Ch. ignota* Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 231. — Maastricht, 7, de Man; Dinther, 7, de Man.
- Ch. insularis* Kuntze, Deutsche Entom. Zeitschr. 1894, 335 (het ♀), id. 1896, 54 (het ♂). — IJmuiden, de M.

Phorbia Rob. D.

- Ph. lactucae* Bouché. — B. 1001 (*Anthomyia*). — Venlo, v. d. Br.; Middelburg, 5, 8, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Utrecht, 6, v. d. W.
- Ph. discreta* Meig. — B. 1015 (*Anthomyia*). — 's Gravenhage, 5, een ♂, v. d. W.; Schalkwijk, 7, Wtt.
- Ph. floccosa* Macq. Suit. à Buff. II. 326; Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 217 (*Chortophila*). — Duinen bij Koudekerke, 9, de Man.
- Ph. pudica* Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 227 (*Chortophila*). — Middelburg, 8, de Man.

Myopina Rob. D.

- M. reflexa* Rob. D. — B. 1027. — Maastricht, 7, v. d. W.; Breda, 7, de Man; Oisterwijk, 7, de M.; Middelburg, 5, 8, de Man; aan den Leidschendam en te Scheveningen aan het strand, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, 5, 10, Piag.; Bodegraven, 8, de M.; Hillegom, 7, Kink.; Amsterdam, 6, 8, 9, Jasp. en de M.; Overveen, 5, de M.; Enschedé, 7, de M.

Calliophrys Kow.

C. riparia Fall. — Schin. Fn. austr. I. 658. — Rotterdam, 6, Frans.

Lispe Latr.

L. tentaculata d. G. — B. 1028. — Maastricht, aan de Maasoevers, 7, v. d. W.; duinen bij 's Gravenhage, 6, 7, v. d. W.; Katwijk, 7, een exempl., de Gr.; duinen bij Zandvoort, 9, de M.

L. consanguinea Löw, Wien. Entom. Mon. schr. II. 8; Schin. Fn. austr. I. 661. — Maastricht en 's Gravenh., met de voorgaande, v. d. W.

L. uliginosa Fall. — Schin. Fn. austr. I. 663. — Scheveningen, 7, v. d. W.; Amsterdam, 7, Oudem.

L. hydromyzina Fall. — Meig. Syst. Besch. V. 228. — 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.

L. pulchella Löw, Stett. Entom. Zeit. VIII. 29. — 's Gravenhage, duinen, 6, met de voorgaande, v. d. W.

L. litorea Fall. — Meig. Syst. Besch. V. 227. — Scheveningen, 7, v. d. W.

L. gemina v. d. W. Tijdschr. v. Entom. XI. 233 ¹⁾. — Koudekerke, duinen, 7, 8, de Man; Goes, v. Voll.; Loosduinen, aan het strand, v. d. W.

L. pilosa Löw, Wien. Entom. Monat. schr. VI. 44. — Bergen-op Zoom, aan de schorren, 7, de M.; Diemen, 6, 7, de M.; Putten (Gelderland), 8, een exempl., Oudem.

Mycophaga Rond.

M. fungorum d. G. ²⁾. — B. 1029 (*Coenosia*). — Venlo, 6, de M.; Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, 6, 9 en 10, v. d. W.; Haarlem, 5, Weyenb.

Caricea Rob. D.

C. tigrina Fall. — B. 1030 (*Coenosia*). — Niet zeldzaam; in bijna alle provinciën gevonden.

C. ciliatocosta Zett. — B. 1031 (*Coenosia*). — Arnhem, 8, een ♂, v. d. W.; Beekhuizen, 8, v. Voll.

C. humilis Meig. — B. 1040 (*Coenosia*). — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 6 en 9, v. d. W.

C. intermedia Fall. — Schin. Fn. austr. I. 666 (*Coenosia*). — Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, 6, Piag.; Bussum, 6, Kortenhoef, 5 en Hilversum, 6, de M.; Hillegom, 5, Kink.; Driebergen, 10, Six; Beekhuizen, 8, v. Voll.

C. nana Zett. Dipt. Scand. IV. 1716; Schin. Fn. austr. I. 667 (*Coenosia*). — Utrecht, Six.

1) Kowarz (Wien. Entom. Zeit. XI. 49) beschouwt deze soort als synoniem met *litorea*.

2) *Hylemyia rufiventris* Macq., onder n^o. 983 B. opgenoemd, moet vervallen, als zijnde syn. met *M. fungorum* de G.

Hoplogaster Rond.

H. mollicula Fall. — B. 1032 (*Coenosia*). — Vrij gemeen en zeer verbreid.

Chelisia Rond.

Ch. monilis Meig. Syst. Besch. V. 222; Schin. Fn. austr. I. 666 (*Coenosia*). — Plasmolen, 8, Piag.; Maastricht, 7, de Man; Oosterwijk, 7, de M.

Macrorchis Rond.

M. meditata Fall. — Schin. Fn. austr. I. 666 (*Coenosia*). — Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, 6, Piag.; Hillegom, 5, Kink.; Driebergen, 10, Six; Beekhuizen, v. Voll.

Coenosia Meig.

- C. murina* Meig. — B. 1033. — 's Gravenhage, 5—7, en Leiden, 7, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Hillegom, Amsterdam, 5, Kink.; Bussum, 7, Durgerdam, 7, de M.
- C. geniculata* Fall. — B. 1034. — Maastricht, Maur.; Rotterdam, Rockanje, 6, 8, Piag.; Hilversum, 6, de M.; Baarn, 8, de M.; Roendaalsche heide, 8, v. d. W.
- C. sexnotata* Meig. — B. 1035. — 's Gravenhage, 6—10, en Scheveningsche duinen, v. d. W.; Rotterdam, 6, 8, Frans.; Rockanje, 5, Voorschoten, 9, Piag.; Bodegraven, 8, de M.; Overveen, 7, 9, Kink., 8, de M.; IJmuiden, 8, de M.
- C. albicornis* Meig. — B. 1036. — Oosterwijk, 7, de M.; Dinther, 7, 8, de Man; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage en Scheveningen, 5 en 8, v. d. W.; Leiden, 6, v. Voll.; Bodegraven, 5, 9, de M.; Amsterdam, 8, Kink.; Diemen, 7, 8, de M., Bussum, 9, Jasp., 7, de M.; Kortenhof, 5 en Bergen, 7, de M.; Driebergen, 7, v. Voll.; Kuilenburg, 7, de M.
- C. decipiens* Wied. — B. 1037. — Walcheren, G. v. W.; Rijen, 5, Piag.; 's Gravenhage, 6—8, en Staalduinen, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Wassenaar, 9, v. d. W.; Buiksloot, 5, Kink.; Bussum, 9, Jasp.; Vogelenzang, 7, v. d. W.; Soesterheide, 9, Kink.; Maarsbergen, 5, Piag.; Driebergen, v. Voll.; Zutphen, 9, v. Eyndh.
- C. pedella* Fall. — B. 1038. — 's Gravenhage, 6, 7, v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.; Driebergen, 10, Six; Zutphen en Empe, 7, v. Eyndh.
- C. sexmaculata* Meig. — B. 1039. — Plasmolen, 6, Piag.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 7, 8, de Man; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Soesterheide, 9, Kink.: Assen, 7, v. d. W.
- C. humilis* Meig. — B. 1040. — 's Gravenhage, 6, 9, v. d. W.
- C. nigra* Meig. — B. 1041. — Koudekerke, duinen, 9, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Amsterdam, 7, Kink.; Utrecht, 6, Wtt.

- C. stygia* Meig. — B. 1042. — 's Gravenhage, 5—8, v. d. W.; Warmond, v. Bemm.; Rotterdam, 6, en in het Overmaassche, 7, Wassenaar, 7, Piag.; Amsterdam, 5, Kink.; Utrecht, 6 en 8, Six en Wtt.; Driebergen, v. Voll.; Arnhem, 8, v. d. W.; Zutphen, 8, v. Eyndh.
- C. atra* Meig. — B. 1043. — 's Gravenhage, duinen, 9, Piag.; Wassenaar, 8, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Overveen, 6, 9, Kink., de M.
- C. exul* Zett. Dipt. Scand. IV. 1716; Schin. Fn. austr. I. 663. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, duinen, 5, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.
- C. pacifica* Meig. Syst. Besch. V. 149; Schin. Fn. austr. I. 664. — Rotterdam, een ♂, Frans.
- C. triangula* Fall. — Schin. Fn. austr. I. 664. — Maastricht, 9, Maur.; Domburg, 6, de Man; Diemen, 6, de M.
- C. nigrimana* Meig. Syst. Besch. V. 215; Schin. Fn. austr. I. 666. — Walcheren, G. v. W.; Bodegraven, 8, de M.
- C. verna* Fabr. — Schin. Fn. austr. I. 666. — Plasmolen, Piag.
- C. sexpustulata* Rond. Dipt. It. Prodr. VI. 266. — Koudekerke, duinen, de Man.

Syllegoptera Rond.

- S. ocypterata* Meig. Syst. Besch. V. 131; Schin. Fn. austr. I. 669. — Overveen, duinen, 7, een ♂, Kink.

Schoenomyza Hal.

- Sch. litorella* Fall. — Meig. Syst. Besch. VI. 93 (*Ochthiphila*). — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Diemen, 6, 7, verscheidene ex., de M.; Kortenhoef, 5, Bussum, 9 en Overveen, 5, de M.; Lochem, 6, de M.

CORDYLURINAE.

Leptopa Zett.

- L. filiformis* Zett. Dipt. Scand. V. 1794. — 's Gravenhage, 9, een ♂, v. d. W.

Cordylura Fall.

- C. ciliata* Meig. — B. 1044. — Venlo, 8, v. d. Br.; Nuth, 7, Maur.; West-Capelle, 6, Piag.; Heemstede, v. Voll.; Linschoten, 7, 8, de M.
- C. pubera* L. — B. 1045. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën.
- C. albilabris* Fall. — B. 1046. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderl. aangetroffen.
- C. albipes* Fall. — B. 1047. — Eveneens herhaaldelijk en op talrijke plaatsen gevonden.
- C. pudica* Meig. Syst. Besch. V. 231; Schin. Fn. austr. II. 2. — Venlo, 8, v. d. Br.; Oisterwijk, 7, de M.; Haagsche bosch, 6, Piag.; Zwammerdam, 8, de M.; Rotterdam, 6, v. d. W.

Norellia Rob. D.

- N. spinimana* Meig. — B. 1048. — Herhaaldelijk gevonden in de meeste provinciën.
N. flavicauda Meig. — B. 1049. — 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Utrecht, 5, Six.
N. liturata Meig. — B. 1050. — Bussum, 7, de M.; Utrecht, een ♂, Six.

Cleigastra Macq.

- Cl. apicalis* Meig. — B. 1051. — Plasmolen, 6, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 6, Frans.; Bodegraven, 5, de M.; Bussum, 4, de M.; Kortenhoef, 5, de M.; Kuilenburg, 7, de M.
Cl. punctipes Meig. — B. 1052. — Scheveningsche duinen, 5 en 6, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Diemen, 5, 7, 8 en Hilversum, 5, de M.; Kortenhoef, 5, de M.
Cl. fasciata Meig. — B. 1053. — 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Noordwijk, 5, Piag.; Maarsbergen, 5, Piag.; Utrecht en Driebergen, 6, Six.
Cl. obscura Fall. — B. 1054. — Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Utrecht, 5, Six.
Cl. flavipes Fall. — Schin. Fn. austr. II. 11. — Ulvenhoutsche bosch, een ♂, Piag.; Kortenhoef, 5, de M.
Cl. tibiella Zett. Dipt. Scand. V. 2068; Schin. Fn. austr. II. 12. — Liesbosch bij Breda, 4, Piag.; 's Gravenhage, Six; Bussum, 4, de M.
Cl. nitida v. d. W. Tijdschr. v. Entom. XIV. 186. — Breda, Heyl.

Hydromyza Fall.

- H. fraterna* Meig. — B. 1055. — In Z. Holland op verscheidene plaatsen; Amsterdam, 5, Grebn.; Bloemendaal, 9 en Diemen 5, de M.; Utrecht, 7, Six; Kuilenburg, 7, de M.
H. Fallenii Schin. — B. 1056. — 's Gravenhage en in het Scheveningsche duin, enkele malen, 5 tot 8, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 6, Piag.; Diemen, 5 tot 8, de M.
H. livens Fall. — Schin. Fn. austr. II. 14. — Bodegraven, 7, 8 en Nieuwkoopse plassen, 7, op sommige plaatsen in aantal, de M.

Fucellia Rob. D.

- F. fucorum* Fall. — B. 1057. — Rotterdam, 8, Frans.; Scheveningen en Katwijk, strand, 7 tot 10, v. d. W.; Oostvoorne, 6, de M.; Diemen, 5—8, IJmuiden, 6, Valkeveen, 7 en Helder, 8, de M.; voortgekomen uit het door den paalworm vernielde hout in het IJ, VerL. en Maitl.

Scatophaga Meig.

- Sc. scybalaria* L. — B. 1058. — Limburg, Maur.; Leiden, een ♂, de Gr.; Harkstede, 4, de Gav.
Sc. lutaria Fall. — B. 1059. — Vrij gemeen; in de meeste provinciën.

- Sc. inquinata* Meig. — B. 1060. — Breda, Heyl.; 's Gravenhage, 10, v. d. W.; Bodegraven, 5, de M.; Haarlemmerhout, 5, Weyenb.; Overveen, 3, de M.; Utrecht, 6, Wtt.; Empe, 8, v. Eyndh.
- Sc. spurca* Meig. — B. 1061. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bussum, 4, de M.; Kortenhoef, 5, de M.; Kuilenburg, 6, 7, de M.; Empe, v. Eyndh.; Groningen, 7, de Gav.
- Sc. stercoraria* L. — B. 1062. — Overal gewoon.
- Sc. merdaria* L. — B. 1063. — Als voren.
- Sc. litorea* Fall. — B. 1064. — Schorren te Bergen-op-Zoom, 8, Sn.; Ossendrecht, 7, de M.; Zeeland, Wtt.; 's Gravenhage, 10 en aan den Leidschendam, 8, v. d. W.; Ridderkerk, 7, de M.; Amsterdam, 8, 9, Kink.; Diemen, 6 tot 8, de M.; Haarlem, Weyenb.; Schoorl, Jasp.; Helder, 7, de M.
- Sc. squalida* Meig. — B. 1065. — Venlo, 3, v. d. Br.; Amby, 9, Maur.; 's Gravenhage, 8 en 10, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 6, Piag.; Wolfhezen, 4, Sn.
- Sc. borealis* Zett. Dipt. Scand. V. 1971. — Bergen-op-Zoom, aan de schorren, 7, 8, Sn. en de M.; Walcheren, G. v. W.

HELOMYZINAE.

Orygma Meig.

- O. luctuosa* Meig. Syst. Besch. VI. 6; Schin. Fn. austr. II. 21. — Aan het strand te Zandvoort, 4, Kink.

Helomyza Fall.

- H. rufa* Fall. — B. 1066. — Oisterwijk, 8, de M.; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Noordwijk, 6, Kink.; Hillegom en Haarlem, 9, 10, Kink.; Bussum, 7 en Bloemendaal, 8, de M.; Baarn, 8, de M.; Schalkwijk, 8, Wtt.
- H. affinis* Meig. — B. 1067. — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, 5—9, v. d. W.; Rotterd., Frans.; Velzen, 6, de M.; Driebergen, 10, Kink.
- H. flava* Meig. — B. 1068. — Putten (N. Brabant), 7, de M.; 's Gravenhage en Wassenaar, 6 en 7, v. d. W.; Lisse, 8, de M.; Hilversum, 6, IJmuiden, 6 en Bussum, 9, de M.; Kortenhoef, 5, de M.; Beek, 6, Six; de Steeg, 6, de M.
- H. praeusta* Meig. — B. 1069. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Doorn, de Gr.
- H. similis* Meig. — B. 1070. — Vrij gemeen en zeer verbreid.
- H. atricornis* Meig. — B. 1071. — Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W. en 7, de M., telkens slechts één exempl.
- H. pallida* Fall. — B. 1072. — Maastricht, 6, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, niet ongemeen, 6 tot 10, v. d. W.; Bloemendaal, Erbr.; Baarn, 8, de M.
- H. testacea* Zett. — B. 1073. — Herhaaldelijk aangetroffen in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland en Groningen.

Leria Rob. D.

- L. fenestralis* Fall. — B. 1074. — Maastricht, 9, Maur.; Venlo, 6, de M.; Walcheren, de Man; 's Gravenhage, 5 en 10, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, 5 tot 10, de M.; Arnhem, 4, v. M. d. R.
- L. longiseta* Meig. — B. 1075. — 's Gravenhage, 10, een ♀, v. d. W.
- L. villosa* Meig. — B. 1076. — 's Gravenhage, 8, een ♂, v. d. W.
- L. canescens* Meig. — B. 1077. — Leiden, 3, het ♀, Maitl.
- L. serrata* L. — Schin. Fn. austr. II. 29. — Maastricht, 2, Maur.; Venlo, 6, de M.
- L. caesia* Meig. Syst. Besch. VI. 56.; Schin. Fn. austr. II. 30. — St. Pieter, Maur.
- L. flavifrons* Zett. Dipt. Scand. VI. 2448 (*Helomyza*). — Venlo, 6, de M.
- L. myopina* Zett. Dipt. Scand. VI. 2459 (*Helomyza*). — Maastricht, 9, Maur.

Heteromyza Fall.

- H. flavipes* Zett. — B. 1078. — Maastricht, 6, 10, Maur.; Middelburg, 3, 7, 9, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, 10, Frans.; Bodegraven, 1, de M.; Haarlem, 2, Rits.; Amsterdam, 6, Sw.; Schoorl, Jasp.; Arnhem, 11, v. M. de R.
- H. atricornis* Meig. — B. 1079. — Herhaaldelijk en in de meeste provinciën aangetroffen.
- H. buccata* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 34. — IJmuiden, 6, de M.

Thelida Rob. D.

- Th. oculata* Fall. — B. 1080. — Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5, een ♂, v. d. W.

SCIOMYZINAE.

Dryomyza Fall.

- Dr. anilis* Fall. — B. 1083. — Herhaaldelijk gevonden; in Limburg, N. Brabant, Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Groningen.
- Dr. flavoola* Fabr. — B. 1084. — Herhaaldelijk gevonden; bijna in alle provinciën.

Actora Meig.

- A. aestuum* Meig. — B. 1085. — Middelburg, 9, de Man; Scheveningen en Noordwijk aan zee, niet zeldzaam, 6—9, v. d. W.; IJmuiden, 8, Zandvoort, 9 en Helder, 8, de M.

Sciomyza Fall.

- Sc. fuscipennis* Meig. — B. 1086 (*Phaeomyza*). — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Wassenaar, 7,

- Noordwijk, 6, v. Voll.; Loosduinen, 7, de M.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Heemstede, 7 en 9, v. Voll.; Bussum, 7, de M.
- Sc. pallida* Fall. — B. 1087. — Liesbosch bij Breda, 4, Piag.; 's Gravenhage, enkele malen, 4, 5, 8 en 9, v. d. W.
- Sc. albocostata* Fall. — B. 1088. — 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Bloemendaal, 7, v. d. W.
- Sc. griseola* Fall. — B. 1089. — Maastricht, 7, v. d. W.; Valkenburg, 7, Piag.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 8, 9, de M.; in het Gooi, 6—9, de M.; Diemen, 7, de M.; Linschoten, 8, de M.; Kuilenburg, 7, de M.
- Sc. pallidiventris* Fall. — B. 1090. — 's Gravenhage, 5 en 8, v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.
- Sc. cinerella* Fall. — B. 1091. — Vrij gemeen en zeer verbreid.
- Sc. dubia* Fall. — B. 1092. — Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.
- Sc. nana* Fall. — B. 1093. — Rotterdam, 8, Piag.; Diemen, 5—7, de M.; Vreeland, 5, Kink.; Utrecht, Six.
- Sc. Schoenherri* Fall. — B. 1094. — Utrecht, 3, Six; Kortenhoeft, 5, de M.
- Sc. simplex* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 46. — Noordwijk, 5, Piag.
- Sc. bifasciella* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 46. — In het Overmaassche, 5, Piag.
- Sc. dorsata* Zett. Dipt. Scand. V. 2096; Schin. Fn. austr. II. 46. — Overveen, 6, een ♂, Piag.
- Sc. obtusa* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 47. — Limburg, 10, Maur.; Diemen, 7, de M.; Wolfhezen, 4, v. M. d. R.; Kuilenburg, 7, de M.

Melanochira Schin.

- M. glabricula* Fall. — B. 1095. — Utrecht, 5 en 7, Six.
- M. albimana* Meig. — B. 1096. — Wassenaarsche duinen, 8, v. d. W.
- M. distincta* Meig. Syst. Besch. VI. 106; Schin. Fn. austr. II. 285 (*Opomyza*). — Koudekerke, duinen, 9, de Man.
- M. sororcula* Meig. Syst. Besch. VI. 106; Schin. Fn. austr. II. 285 (*Opomyza*). — Hoek v. Holland, 9, Piag.
- M. nigrimana* Meig. Syst. Besch. VI. 105 (*Opomyza*). — Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, 6, Piag.; Bodegraven, 8, de M.; Bussum, 7, de M.; Kuilenburg, 7 en Lochem, 6, de M.

Tetanocera Latr.

- T. elata* Fabr. — B. 1097. — Valkenburg, 7, Piag.; Venlo, 10, v. d. Br.; Ulvenhout, 6, Piag.; Dinther, 8, de Man; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage en Wassenaar, 6 en 7, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Hilversum, 6, Bussum, 7 en Diemen, 7, de M.; Utrecht, 7, Six; Kortenhoeft, 5, de M.; Empe, v. Eyndh.; Groesbeek, 7, en Kuilenburg, 7, de M.

- T. laevifrons* Löw. — B. 1098. — Valkenburg, 7, Piag.; Amby, 5, Maur.; Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 6 tot 9, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Santpoort, 9, Piag.; Schalkwijk, 7, Wtt.; Linschoten, 8, de M.; Kuilenburg 7 en Groesbeek, 7, de M.
- T. ferruginea* Fall. — B. 1099. — Vrij gemeen en zeer verbreid.
- T. sylvatica* Meig. — B. 1100. — Als voren.
- T. reticulata* L. — B. 1101. — Breda, 5, Heyl.; Oirschot, 6, Maur.; Domburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 5 tot 8, zeldzaam, v. d. W.; Rotterdam, 5 en 6, Frans.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Diemen 7 en Bussum, 7, de M.; Abcoude, 6, Kink.; Kuilenburg 7, en Lochem, 6, de M.
- T. punctulata* Scop. — B. 1102. — Niet zeldzaam en zeer verbreid.
- T. robusta* Löw, Stett. Ent. Zeit. VIII. 197; Schin. Fn. austr. II. 54. — Plasmolen, 6, Piag.; Rotterdam, 5, 6 en Noordwijk, 5, Piag.; Zwammerdam, 7, de M.; Empe, 8, v. Eyndh.
- T. umbrarum* L. — Schin. Fn. austr. II. 56. — Oisterwijk, 6, 7, de M.; Haagsche bosch, Six; Rotterdam, 4, 5, Piag.; Bussum, 6, de M.
- T. unicolor* Löw, Stett. Ent. Zeit. VIII. 199; Schin. Fn. austr. II. 57. — Zwammerdam, 7, de M.; Bussum, 6, 7, de M.

Limnia Rob. D.

- L. marginata* Fabr. — B. 1103. — Limburg, Maur.; Valkenburg, 7, Piag.; Walcheren, l. Font.; 's Gravenhage, duinbosschen, een ♂, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; meermalen in de duinbosschen bij Haarlem, Heilo, 7, de M.; Arnhem, 7, v. M. d. R.
- L. unguicornis* Scop. — B. 1104. — Niet zeldzaam en zeer verbreid.
- L. rufifrons* Fall. — B. 1105. — 's Gravenhage en Wassenaar, 6 tot 9, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bloemendaal, v. d. W. en de M.; Amsterdam, 7, de M.; Linschoten, 8, de M.; Zutphen, 7, v. Eyndh.
- L. oblitterata* Fabr. — B. 1106. — Venlo, 9, v. d. Br.; Valkenburg, 7, Piag.; Houthem, 6, Versl.; Koudekerke, duinen, 9, de Man; 's Gravenhage, 7 tot 9, en Staalduinen, v. d. W.; Leiden, Herkl.; Rotterdam, 5 en 6, Frans.; Heemstede, 9, v. Voll.; Bloemendaal, 9, de M.; Overveen, 9, Rits.; Amersfoort en Utrecht, 6, Six.
- L. fenestrata* Macq. Suit. à Buffon, II. 370 (*Tetanocera*). — 's Gravenhage, 3, Six; Vogelenzang, 8, Kink.; Santpoort, 9, Piag.

Elgiva Meig.

- E. albiseta* Scop. — B. 1107. — Middelburg, 8, de Man; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 6 en 's Gravenhage, 8, de M.; Leiden, 8, v. Voll.; Bussum, 6 en Diemen 7, de M.; Kuilenburg, 7, Groesbeek, 7 en Lochem, 6, de M.; steeds bij enkele exemplaren.
- E. dorsalis* Fabr. — B. 1108. — Maastricht, 7, Maur.; 's Gravenhage, 7, een ♂, v. d. W.; Rotterdam, 9, Frans.; Hoek van Holland, 9, Piag.; IJmuiden, 6, de M.; Linschoten, 8, de M.

E. rufa Panz. — B. 1109. — Herhaaldelijk en in de meeste provinciën aangetroffen.

E. cucularia L. — B. 1110. — Haagsche bosch, 3 en 4, v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.; Bussum, 7, de M.; Kortenhoef, 5, de M.; Arnhem, 3, v. M. d. R.

Sepedon Latr.

S. sphaeus Fabr. — B. 1111. — Vrij zeldzaam, doch verbreid, in bijna alle provinciën gevonden.

S. spinipes Scop. — B. 1112. — Minder zeldzaam dan de vorige, en eveneens zeer verbreid.

PSILINAE.

Loxocera Meig.

L. elongata Meig. — B. 1200. — Herhaaldelijk gevonden in Zeeland, N. en Z. Holland, Utrecht, Gelderland en Groningen.

L. fulviventris Meig. — B. 1201. — Plasmolen, 8, Piag.; Driebergen, 9, een ♀, Six.

L. ichneumonea L. — B. 1202. — Niet zeldzaam en zeer verbreid.

Platystyla Meig.

Pl. Hoffmannseggii Meig. Syst. Besch. V. 366; Schin. Fn. austr. II. 199. — Venlo, 8, v. d. Br.

Lissa Meig.

L. loxocera Fall. — B. 1203. — Haagsche bosch, 7 en 8, v. d. W.; Velzen, Jasp.

Chyliza Fall.

Ch. leptogaster Panz. — B. 1204. — Maastricht, 5, 7, Maur.; Middelburg, 5, 6, de Man; Rotterdam, Frans.; Woerden, 5, de Gr.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Utrecht en Driebergen, 6, Six.

Ch. vittata Meig. — B. 1205. — 's Gravenhage, 6--8, v. d. W.; Leiden, 10, v. Voll.; Gelderland, v. Walchr.

Ch. atriseta Meig. Syst. Besch. V. 369; Schin. Fn. austr. II. 200. — Valkenburg, 7, een ♂, Piag.; Leiden, 7, een ♀, Rits.

Psila Meig.

Ps. fimetaria L. — B. 1206. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.

Ps. bicolor Meig. — B. 1207. — In Zeeland, Wtt.; Scheveningen, Wassenaar en Staalduinen, 7, v. d. W.; Zeeburg bij Amsterdam, 7, Kink.; Empe, v. Eyndh.

- P. pectoralis* Fall. — B. 1208. — 's Gravenhage, 5—7, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Amsterdam, 7, Kink.; Hilversum, 6, de M.
- P. rosae* Fabr. — B. 1209. — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland.
- P. nigricornis* Meig. — B. 1210. — Venlo, 5, v. d. Br.; Dinther, 8, de Man; 's Gravenhage, 5, 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven, 5, en Nieuwkoop, 8, de M.; Noordwijk, 5, Piag.; Haarlemmerhout, 5, Weyenb.; Heemstede, 9, v. Voll.; Amsterdam, v. d. W.; Bussum, 7, de M.; Kortenhoef, 5, de M.
- P. atra* Meig. — B. 1211. — Koudekerke, duinen, de Man; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Utrecht, Six; Maarsbergen, 5, Piag.
- P. rufa* Meig. — Schin. Fn. austr. II. 203. — Staalduinen, 8, Piag.
- P. debilis* Egg. — Schin. Fn. austr. II. 204. — Maastricht, 6, Piag.; Rotterdam, 6, Piag.; 's Gravenhage, 7, en Bodegraven, 7, de M.; Diemen, 7, de M.
- P. fuscinervis* Zett. Dipt. Scand. VI. 2405; Schin. Fn. austr. II. 205. — Bodegraven, 5, de M.
- P. morio* Zett. Dipt. Scand. VI. 2409; Schin. Fn. austr. II. 205. — Oirschot, 6, een ♀, Maur.
- P. gracilis* Meig. Syst. Besch. V. 359; Schin. Fn. austr. II. 205. — Rijen, 5, Piag.; West-Capelle, 4, Piag.; 's Gravenhage, 5, 8, v. d. W. en de M.; Lisse, 5, Piag.; den Helder, 8, de M.; Utrecht, Six.
- P. villosula* Meig. Syst. Besch. V. 360; Schin. Fn. austr. II. 206. — Maastricht, 5, Maur.; Middelburg, 6, de Man; Leiden, 9, v. Voll.; Bodegraven, 5, de M.; Amsterdam, 9, de M.; Utrecht, 5, Six.
- P. nigra* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 206. — Mastbosch bij Breda, een ♂, Piag.; Bussum, 4, de M.

Tanypeza Fall.

- T. longimana* Fall. — B. 1193. — Scheveningsche duinbosschen, 6, Piag. en v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.

CALOBATINAE.

Calobata Meig.

- C. ephippium* Fabr. — B. 1194. — Venlo, 6, de M.; Nuth, 7, Maur.; Rijen, 6, Piag.; Zierikzee, 8, Fokk.; in N. en Z. Holland op verscheidene plaatsen; Abcoude, 5 en 6, Kink.; Utrecht, Six; Winterswijk, 7, v. d. W.; Kuilenburg, 7, de M.
- C. petronella* L. — B. 1195. — Niet zeldzaam; in bijna alle provinciën.
- C. cibaria* Meig. — B. 1196. — Als de vorige.
- C. cothurnata* Panz. — B. 1197. — Venlo, 5, v. d. Br.; Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6, 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Empe, 5, v. Eyndh.

Micropeza Meig.

- M. corrigiolata* L. — B. 1198. — Herhaaldelijk gevonden in Limburg, N. Brabant, Zeeland, Z. en N. Holland, Utrecht en Gelderland.
- M. lateralis* Meig. — B. 1199. — Venlo, v. d. Br.; Oirschot, Maur.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Hattem, 8, Rits.; Groesbeck, 7, de M.; Ubbergen, 8, v. Eyndh.; Nijmegen, 7, Maitl.; Zutphen, 7, v. d. W.

SEPSINAE.

Sepsis Fall.

- S. cynipsea* L. — B. 1174. — Verbreid en gemeen.
- S. flavimana* Meig. — B. 1175. — Middelburg, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, Jasp.; Diemen, de M.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Wageningen, 7, v. d. W.; Zutphen, v. Eyndh.
- S. nigripes* Meig. — B. 1176. — 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Voorschoten, Maitl.; Amsterdam, 6, Jasp.; Driebergen, v. Voll.
- S. punctum* Fabr. — B. 1177. — Nuth en Valkenburg, 7, Maur.; Gronsveld, 6, Oudem.; Walcheren, l. Font.; Bodegraven, 8, de M.; 's Gravenhage, 5, 7 en 8, v. d. W. en de M.; Amsterdam, 10 en Diemen, 7, de M.; Bussum, 6, de M.; Utrecht, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- S. violacea* Meig. — B. 1178. — Z. Limburg, 7, Oudem.; Rotterdam, 6, Piag.; 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Diemen, 6, 7 en Bussum, 6, de M.
- S. pilipes* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 189. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Amsterdam, 7, v. d. W.; Utrecht en Amersfoort, 6, 8, Six.

Nemopoda Rob. D.

- N. cylindrica* Fabr. — B. 1179. — Overal zeer gewoon.
- N. stercoraria* Rob. D. — B. 1180. — Venlo, 7, v. d. Br.; Maastricht, 7, Maur.; Oirschot, 6, Maur.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Amsterdam, Jasp.; Bussum, 7, de M.; Amersfoort, 8, v. Voll.; Driebergen, 10, Six; Schalkwijk, 7, Wtt.; Beek, 6, Six; Rhedersteeg, 8, v. d. W.; Zutphen en Empe, v. Eyndh.; Lochem, 6, de M.
- N. umbripennis* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 190. — Amsterdam, 8, Kink.

Themira Rob. D.

- Th. putris* L. — B. 1181. — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën gevonden.
- Th. minor* Hal. Ent. Mag. I. 170. — B. 1183, als *dentimana*, v. d. W., Tijdschr. v. Entom. XIV. 191. — Middelburg, 8, de Man; in het Overmaassche, 6, Piag.; Diemen, 7, de M.; Arnhem, 8, v. d. W.

T. consobrina v. d. W. Tijdschr. v. Entom. XIV. 192. — B. 1182, als *minor* Hal. — Middelburg, 6, de Man; 'sGravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Amsterdam, 5, Kink.; Durgerdam, 7, de M.; Zutphen, v. Eyndh.

T. curvipes v. d. W. — B. 1184. — 'sGravenhage, 6 en 8, v. Voll. en v. d. W.; Rotterdam, 5, Frans.; Amsterdam, 6, 7, Kink.

T. annulipes Meig. — B. 1185. — 'sGravenhage en Wassenaar, 7 en 8, v. d. W.; Bussum, 6, de M.; Utrecht, Six.

T. gracilis Zett. Dipt. Scand. VI. 2300. — Ulvenhoutsche bosch, 6, Piag.

Saltella Rob. D.

S. scutellaris Fall. — B. 1186. — 'sGravenhage, 8, v. d. W. en de M.; Wassenaar, 6 en Rotterdam, Piag.; Zwammerdam, 7, de M.; Amsterdam, 5, 7, de M.; Weesp, 6, de M.

Mycetaulus Löw.

M. bipunctatus Fall. — Schin. Fn. austr. II. 187. — Oirschot, 8, Maur.

Piophila Fall.

P. casei L. — B. 1187. — Venlo, 7, v. d. Br.; Oirschot, 8, Maur.; Leidschendam, 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bodegraven en Zwammerdam, vrij gemeen, de M.; 'sGravenhage, 6, v. d. W.; Amsterdam, 6, 8, de M.; Zutphen, v. Eyndh.

P. affinis Meig. — B. 1188. — Limburg, Maur.; Middelburg, 5, 6, de Man; Bodegraven, 5, de M.; 'sGravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, 7, 8, Jasp. en de M.; Utrecht, 5, Wtt.

P. nigriceps Meig. — B. 1189. — Rotterdam, 6, en in het Overmaasche, 5, Piag.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Amsterdam, 5, Kink.; Utrecht, 5, Six.

P. foveolata Meig. — B. 1190. — Limburg, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; Walcheren, G. v. W.; Rotterdam, 5, 9, 10, Piag.; 'sGravenhage, 7, v. d. W.; Amsterdam, 5, Diemen, 8 en Durgerdam, 7, de M.

P. pusilla Meig. Syst. Besch. VII. 360; Schin. Fn. austr. II. 186. — Oirschot, 8, een ♂, Maur.

Madiza Fall.

M. glabra Fall. — B. 1191. — Limburg, Maur.; Goes, 6, v. Voll.; 'sGravenhage en Scheveningsche duinen, 4 tot 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Amsterdam, 8, 9, Sw. en de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.; de Bilt, 5, Six; Empe, v. Eyndh.

M. griseola v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 198. — Duinen bij Scheveningen, 7, v. d. W. en 8, de M.

ORTALINAE.

Tetanops Fall.

- T. myopina* Fall. — B. 1113. — Dinther, 7, de Man; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, duinen, enkele exemplaren, v. Voll. en v. d. W.; Katwijk aan zee, 5, 6, Rits.; Zandvoort, 5, 6, Rits.; Heemstede, v. Voll.; Terschelling, 6, Rits.; Soesterheide, Frans.

Ceroxys Macq.

- C. crassipennis* Fall. — B. 1114. — Venlo, 6, v. d. Br.; Nuth, 6, Maur.; Dinther, 7, de Man; Mastbosch bij Breda, 5, Piag.; Rotterdamse plassen, 6, v. d. W. en Frans.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Driebergen, 6, Six; Lochem, 6, de M.; Paterswolde, 6, de Gav.
- C. ommissa* Meig. — B. 1115. — Breda, 6, Heyl.; Bergen-op-Zoom, 5, Piag.; Veere, Maitl.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Bodegraven, 6, de M.; Valkeveen, 7, de M.; Amsterdam, 5, 6, de M.; Terschelling, 6, Rits.
- C. urticae* L. — B. 1116. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Amsterdam, 5, 6, v. d. W. en de M.; Haarlem, 5, Weyenb.; Schoorl, 7, Jasp.; Texel, 5, Rits.; Ede, Maitl.
- C. picta* Meig. Syst. Besch. V. 276; Schin. Fn. austr. II. 74. — Bergen-op-Zoom, 5, Piag.; Woensdrecht, 6, v. d. W.; Middelburg, 8, de Man; Diemen, 6, 7, de M.

Myennis Rob. D.

- M. fasciata* Fabr. — B. 1117. — Limburg, Maur.; Breda, 6, Heyl.; Ossendrecht, 7, v. d. W. en de M.; Amsterdam, 7, Sw.; Utrecht, Six; Zutphen, 7, v. Eyndh.; Elburg, 6, Sn.

Herina Rob. D.

- H. palustris* Meig. — B. 1118. — Wassenaar, 7, v. d. W.; Groesbeek 7 en Lochem, 6, de M.
- H. frondescens* L. — B. 1119. — Maastricht, 7, 8, v. d. W.; Breda, 6, 7, Heyl.; Ulvenhoutsche bosch, 8, Rits.; Rotterdam, 5, Sn.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Bussum, 6, de M.; Amersfoort, 6 en Utrecht, Six; Arnhem, 6, v. M. d. R.; Groesbeek, 7, de M.; Laag Soeren, 6, Oudem.; Assen, 7, v. d. W., op sommige plaatsen in aantal.

Rivellia Rob. D.

- R. syngenesiae* Fabr. — B. 1120. — Herhaaldelijk gevonden in de meeste provinciën; op sommige plaatsen vrij gemeen.

Platystoma Meig.

Pl. seminacionis L. — B. 1121. — Z. Limburg, Maur., Piag. en Versl.; Rotterdam, 5, Piag.; Woerden, 7, de Gr.; Linschoten, 5, de M.; Utrecht, 7, Six en v. d. W.; Brummen, v. Walchr.; Voorst, 7, v. Voll. en Wtt.; Arnhem, v. M. d. R.

Seoptera Kirby.

S. vibrans L. — B. 1121 (*Myodina*). — Niet zeldzaam en zeer verbreid.

TRYPETINAE.

Platyparea Löw.

Pl. discoidea Fabr. — Schin. Fn. austr. II. 111. — Limburg, Maur.

Acidia Rob. D.

A. heraclei L. — B. 1150. — Herhaaldelijk gevonden in de meeste provinciën.

A. cognata Wied. — B. 1151. — Rotterdam, G. H.; 's Gravenhage, 7, en Bodegraven, 7, de M.; Utrecht, 6, Six; Schalkwijk, 7, Wtt.

A. lychnidis Fabr. — B. 1152. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Amsterdam, Jasp.; Heemstede, 7 en 8, v. Voll.; Utrecht, Six; Brummen, 7 en 8, v. Voll.; Voorst, 7, Wtt.

Spilographa Löw.

Sp. Zoë Meig. — B. 1153. — Venlo, v. d. Br.; Limburg, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; Breda, Heyl.; Middelburg, 5, 8, de Man; Rotterdam, Frans.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, v. Bemm. en Maitl.; Bodegraven, 5, de M.; Hillegom, 5, Kink.; Utrecht, 6, Wtt.; Groningen, 5, de M.

Sp. artemisiae Fabr. — B. 1154. — Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage en Staalduinen, 7, de M.; Loosduinen, gekweekt uit *Artemisia vulgaris*, de M.; Amsterdam, 9, de M.; Arnhem, 5, 7, v. M. d. R.; Empe, v. Eyndh.; Velp, 7, v. d. W.

Sp. cerasi L. — B. 1155. — Utrecht, Six.

Sp. hamifera Löw, Linn. Ent. I. 496; Schin. Fn. austr. II. 120. — Enschedé, 7, v. d. W.

Sp. Meigenii Löw, Germ. Zeitschr. V. 316; Schin. Fn. austr. II. 122. — Maastricht, 6, een ♂, Maur.; Gronsveld, 6, Versl.

Orellia Rob. D.

O. Wiedemanni Meig. Syst. Besch. V. 320; Schin. Fn. austr. II. 125. — Venlo, 6, v. d. Br.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.

Trypeta Meig.

- T. onotrophes* Löw. — B. 1156. — Valkenburg, 7, Piag.; Maastricht, 7, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; Wassenaar, 6, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Heemstede, 8, v. Voll.; Linschoten, 8, de M.; Maarsbergen, 5, Piag.; Utrecht en de Bilt, Six; Brummen, 8, v. Voll.; Empe, v. Eynindh.; Voorst, 7, Wtt.; Arnhem, 8, v. M. d. R.; Groesbeek, 7, de M.
- T. tussilaginis* Fabr. — B. 1157. — Rotterdam, 7, Frans.; 's Gravenhage en Staalduinen, 8, Piag.
- T. ruficauda* Fabr. — B. 1158. — Empe, v. Eynindh.
- T. winthemi* Meig. — B. 1159. — Empe, 8, v. Eynindh.
- T. colon* Meig. Syst. Besch. V. 346; Schin. Fn. austr. II. 131. — Valkenburg, Piag.; Gulpen, 7, Oudem.
- T. serratulæ* L. — Schin. Fn. austr. II. 134. — Haarlem, 6, uit distelknoppen, Weyenb.

Urophora Rob. D.

- U. stylata* Fabr. — B. 1160. — Zierikzee, 7, Fokk.; Ruurlo, 7, Rits.; Empe, v. Eynindh.; Groningen, 9, de Gav.
- U. cardui* L. — B. 1161. — Empe, v. Eynindh.
- U. quadrifasciata* Meig. Syst. Besch. V. 331; Schin. Fn. austr. II. 139. — Limburg, Maur.
- U. cuspidata* Meig. Syst. Besch. V. 328 (syn. *U. macrura* Löw, Schin. Fn. austr. II. 137). — Veghel, 5, Sn.; Lochem, 6, de M.
- U. aprica* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 140. — Schoorl. 7, Jasp.

Ensina Rob. D.

- E. sonchi* L. — B. 1162. — 's Gravenhage, 8, 9, de M. en v. d. W.; uit *Picris*, de Gr.; Staalduinen, 7, v. d. W.; Voorschoten, 9, Piag.; Ridderkerk, 7 en Bodegraven, 7, de M.; Heemstede, v. Voll.; Diemen, 8, de M.; Amsterdam, 8, Kink.; de Bilt, 8, Six; Hattem, 8, de Man; Empe, 7, v. Eynindh.

Carphotricha Löw.

- C. guttularis* Meig. — B. 1163. — Venlo, v. d. Br.; Zundert, 7, v. Voll.; Utrecht, Six.
- C. pupillata* Fall. — B. 1164. — Plasmolen, 8, Piag.; Katwijk, 7, de Gr.; 's Gravenhage, 5, Piag.; Maarsbergen, 8, Piag.; Amersfoort, v. Voll.

Oxyphora Rob. D.

- O. miliaria* Schr. — B. 1165. — Venlo, v. d. Br.; Valkenburg, Piag.; Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Rotterdam, 7, Frans.; Weesp,

- 6, de M.; Empe, Beek, Wageningen, 7, 8, v. d. W.; Lochem, 6, de M.; Zutphen en Empe, v. Eyndh.
O. corniculata Fall. — B. 1166. — Wassenaarsche duinen, 7, 8, v. d. W. en Piag.; Rotterdam, Frans.; Heemstede, 8, v. Voll.; Utrecht, Six; Empe, v. Eyndh.; Groningen, de Gav.

Tephritis Latr.

- T. marginata* Fabr. — B. 1167. — Oisterwijk, 7, de M.; Koudekerke, duinen, 9, de Man; 's Gravenhage, 9, v. Voll.; Wassenaar, de Gr.; Noordwijk, 5, Piag.; Heemstede, 8, v. Voll.; Heilo, Amsterdam en Diemen, 7, 8, de M.; de Bilt, 8, Six; Brummen, 8, v. Voll.; Empe, 7, v. Eyndh.; Arnhem, v. M. d. R.
T. pantherina Fall. — B. 1168. — Herhaaldelijk in Limburg, N. Brabant, N. en Z. Holland, Utrecht en Gelderland aangetroffen.
T. flavipennis Löw, Germ. Zeitschr. V. 368; Schin. Fn. austr. II. 154. — Walcheren, l. Font.; de Bilt, 7, Six; Assen, 7, v. d. W.
T. proboscidea Löw, Germ. Zeitschr. V. 371; Schin. Fn. austr. II. 154. — Maastricht, 7, v. d. W.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.
T. elongatula Löw. — B. 1169. — Walcheren, l. Font., 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.; in het Overmaassche, 8, Piag.; Rotterdam, 7, Frans.; Zwammerdam, 8, de M.; Diemen, 8, de M.
T. tessellata Löw. — B. 1170. — Valkenburg, 7, v. d. W.; Oisterwijk, 7, de M.; Scheveningen, 6, v. d. W.; Diemen, 6, 8, de M.; de Bilt, 8, Six.
T. argyrocephala Löw, Germ. Zeitschr. V. 372; Schin. Fn. austr. II. 155. — Winterswijk, 7, v. d. W.
T. leontodontis d. G. — Schin. Fn. austr. II. 164. — Venlo, 7, een ♂, v. d. Br.
T. arnicae L. — Schin. Fn. austr. II. 165. — Uit bloemknoppen van *Arnica*, Laag Soeren, ter Haar; Apeldoorn, 6, de Vos; Lochem, 7, de M.
T. ruralis Löw, Germ. Zeitschr. V. 386; Schin. Fn. austr. II. 166. — Nuth, 7, Maur.; Venlo, 6, de M.; Groesbeek, 7, de M.
T. vespertina Löw, Germ. Zeitschr. V. 387; Schin. Fn. austr. II. 171. — Limburg, Maur.; Plasmolen, 6, v. d. W.; Breda, 5, Heyl.; Bergen-op-Zoom, 5, Rits.; Arnhem, 4, v. M. d. R.; Empe, v. Eyndh.; Beek, 6, Six.

Urellia Rob. D.

- U. conjuncta* Löw. — B. 1171 (*Tephritis*). — Oirschot, 7, Maur.; Beek, 7, v. d. W.; Arnhem, 3, v. M. d. R.; Empe, v. Eyndh.
U. stellata Füssl. — B. 1172 (*Tephritis*). — Breda, 7, Heyl.; Zierikzee, 8, Fokk.; Scheveningsche duinen, 8, v. d. W.; 's Gravenhage, 9, v. Voll.; uit *Centaurea* en *Hieracium*, 8, de Gr.; Bussum, 9, Jasp.; Arnhem, 6, 7, v. M. d. R.; Groningen, 9, de Gav.

Anomoia Walk.

- A. antica* Wied. — B. 1173. — Limburg, een ♂, Maur.; Driebergen, een ♀, Six.

SAPROMYZINAE.

Palloptera Fall.

- P. ustulata* Fall. — B. 1146. — Maastricht, 7, 8, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, v. d. W.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Amsterdam, 6, 9, Sw. en de M.; Haarlem en Vogelenzang, 7, 9, Weyenb.; Amersfoort, 8, v. Voll.; Empe, v. Eyndh.; Brummen, v. Bemm.; Kuilenburg, 7, de M.; Beek, 8, v. M. d. R.; Groningen, 8, de Gav.
- P. umbellatarum* Fall. — B. 1147. — Bunde, 7, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 6, 8, de Man; Rotterdam, 6, Sn. en v. d. W.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, 6, de M.; Driebergen, v. Voll.; Utrecht, v. Hass. en Six; Empe, v. Eyndh.
- P. saltuum* L. — B. 1148. — 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Schalkwijk, 7, Wtt.
- P. inusta* Meig. — B. 1149 (*arcuata* Fall.)¹⁾. — Breda, Heyl.; 's Gravenhage, 8, 9, v. d. W.; Driebergen, v. Voll.; Arnhem, 5, v. M. d. R.; Kuilenburg, 7, de M.; Groningen, 7, de Gav.
- P. usta* Meig. Syst. Besch. V. 270; Schin. Fn. austr. II. 108. — Middelburg, 9, de Man; Amsterdam, 7, Oudem.

Minettia Rob. D.

- M. longipennis* Fabr. — B. 1130. — Herhaaldelijk aangetroffen; in de meeste provinciën.
- M. lupulina* Fabr. — B. 1131. — Als de vorige soort.
- M. fasciata* Fall. — B. 1132. — Niet zeldzaam en zeer verbreid.
- M. plumicornis* Fall. — B. 1133. — Venlo, v. d. Br.; Valkenburg, 7, v. d. W.; Dinther, 7, 8, de Man; Ossendrecht, 7, de M.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage en Wassenaar, 6—9, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Bussum, 6, Weesp, 6 en IJmuiden, 8, de M.; Velzen, 7, Weyenb.; Zutphen, 7 en Empe, v. Eyndh.; Arnhem, v. M. d. R.
- M. notata* Fall. — B. 1134. — 's Gravenhage, 6 en 8, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Santpoort, 6, de M.
- M. decempunctata* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 99 (*Sapromyza*). — Middelburg, 5, 8, de Man.
- M. basalis* Zett. Dipt. Scand. VI. 2367 (*Lauvania*); syn. *M. dimidiata* Löw, Dipt. Beitr. III. 27. — Loosduinen, 7, de M.; IJmuiden, 6, de M.

1) De soort werd door Fallen ten onrechte *arcuata* genoemd, omdat hij daarin *Musca arcuata* Fabr. meende te herkennen; deze is echter synoniem met *Oxyphora miliaria* Schr.

Sapromyza Fall.

- S. pallidiventris* Fall. — B. 1135. — Venlo, 6, de M.; Breda, Heyl.; Domburg, 6, de Man; 's Gravenhage, 5—7, v. d. W.; Staalduinen, 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Loosduinen, 9, Schuyt; Lisse, 8, de M.; Hillegom en Vogelenzang, 5, 6, Kink.; Arnhem, v. M. d. R.; Empe, v. Eynth.; Assen, 7, v. d. W.
- S. bipunctata* Meig. — B. 1136. — Venlo, v. d. Br.; Hilversum, 7, v. d. W.; Vogelenzang, 6, Kink.; Maarsbergen, 8, Piag.; Beekhuizen, 7, Kink.; Empe, v. Eynth.; Velp en Wolfhezen, v. d. W.; Groningen, de Gav.
- S. quadripunctata* L. — B. 1137. — Houthem, 7, Versl.; Koudekerke, duinen, 6, de Man; Scheveningsche duinen, eens in aantal, v. Voll. en v. d. W.; Staalduinen, 7, v. d. W.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Haarlem, 9, Weyenb.; IJmuiden, 6 en Zandvoort, 8, de M.; Wolfhezen, 7, v. d. W.; Empe, v. Eynth.
- S. sexpunctata* Meig. — B. 1138. — Scheveningen, een ♀, v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.
- S. tarsella* Zett. — B. 1139. — Oirschot, 6, Maur.; 's Gravenhage, 5—7, v. d. W.; Amsterdam, 5, Kink.; Zutphen, 6, v. Eynth.
- S. simplex* Löw. — B. 1140. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6—8, v. d. W.; Noordwijk, Kink.; Oostvoorne, 6, de M.; Hillegom en Overveen, 6, 7, Kink.; Santpoort, 6 en IJmuiden, 8, de M.; Empe, v. Eynth.
- S. subfasciata* Zett. — B. 1141. — Oirschot, 8, Maur.; Oisterwijk, 7, Schuyt; Dinther, 7, de Man; Domburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 7—9, v. d. W.; Wolfhezen, v. d. W.; Beek, Six.
- S. rorida* Fall. — B. 1142. — Verbreid en nergens zeldzaam.
- S. decipiens* Löw. — B. 1143. — Houthem, 7, Oudem.; Maastricht, 7, 9, Maur.; Dinther, 7, de Man; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.; Rotterdam, 6, Voorschoten, 9, Piag.; Bussum, 6, de M.; Assen, 7, v. d. W.
- S. praeusta* Fall. — B. 1144. — Herhaaldelijk in de meeste provinciën aangetroffen.
- S. illota* Löw. — B. 1145. — Plasmolen, 6, Piag.; Walcheren, l. Font.; Oostvoorne, 6, de M.; 's Gravenhage, eens verscheidene ex. in de duinbosschen, 5, v. d. W.; Amsterdam, 8, v. d. W.; Zandvoort, 8 en Bloemendaal, 9, de M.
- S. anisodactyla* Löw, Dipt. Beitr. I. 24; Schin. Fn. austr. II. 101. — Hilversum, 6, de M.; Assen, 7, v. d. W.
- S. albiceps* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 103. — Breda, 7, de Man; Haarlem, 8, Weyenb.
- S. modesta* Löw, Zeitschr. ges. Naturw. 1857, 110; Schin. Fn. austr. II. 104. — Middelburg, 6, de Man; Leiden, 6, 7, v. Voll.; Amsterdam, 6, de M.; Amersfoort, 6, Six.

S. obsoleta Fall. --- Meig. Syst. Besch. V. 260. --- Winterswijk, 7 en Assen, 7, v. d. W.

Lonchaea Fall.

L. dasyops Meig. — B. 1123. — Bergen-op-Zoom, 5, Rits.; Empe, 5, een ♂, v. Eyndh.

L. chorea Fabr. — B. 1124. — Venlo, 4, v. d. Br.; Plasmolen, 6, Piag.; Breda, 5, Piag.; Middelburg en Domburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Leiden, 9, v. Voll.; Rotterdam, Frans.; Hillegom, 7, Kink.; Haarlem, 6, Weyenb.; Amsterdam, 8, v. d. W.; Heemstede, 6, v. Voll.; Utrecht, 5 en Schalkwijk, 7, Wtt.; Empe, 8, v. Eyndh.

L. vaginalis Fall. — B. 1125. — Breda, Heyl.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 7, 8, de Man; Rotterdam, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Linschoten, 5, de M.; Kuilenburg, 7, de M.; Oosterbeek, Back.

L. tarsata Fall. — B. 1126. — Venlo, 5, v. d. Br.; Liesbosch bij Breda, 4, Piag.; Rotterdam, 5, Piag.; 's Gravenhage, 6 en 9, v. d. W.; Hillegom, Kink.; Haarlem, 8, Weyenb.; Zutphen, v. Eyndh.

L. laticornis Meig. — B. 1127. --- 's Gravenhage, 5 en 6, v. d. W.

L. hirticeps Zett. Dipt. Scand. VI. 2357; Schin. Fn. austr. II. 89. — Groningen, 5, de M.

L. fumosa Egg. — Schin. Fn. austr. II. 90. — Venlo. v. d. Br.

L. palposa Zett. Dipt. Scand. VI. 2355; Schin. Fn. austr. II. 91. — Bodegraven 5 en Zwammerdam 5, gekweekt uit larven achter boomchors, de M.; Leiden, 10, v. Voll.; Amsterdam, 8, de M.

L. parvicornis Meig. Syst. Besch. V. 308; Schin. Fn. austr. II. 92. — Oirschot, 8, een ♂, Maur.

L. lucidiventris Beck. Berl. Ent. Zeitschr. XL. 334; syn. Schin. Fn. austr. II. 90 (*L. Deutschii*). — Houthem, 6, Versl.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Amsterdam, 5, de M.

Lauxania Latr.

L. cylindricornis Fabr. — B. 1128. — Maastricht, 6, Maur.; Valkenburg, 7, Piag.; Mastbosch bij Breda, 5, 6, en Rijen, 6, Piag.; Oirschot, 6, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Hilversum, 5 en Bussum, 4, de M.; Driebergen, 6, Six; Wageningen, 7, v. d. W.; Beek, 6, Six; Lochem, 6 en de Steeg, 6, de M.; meest bij enkele exemplaren.

L. aenea Fabr. — B. 1129. — Herhaaldelijk in de meeste provinciën aangetroffen.

L. frontalis Löw, Wien. Ent. Monatschr. II. 14; Schin. Fn. austr. II. 96. — West-Capelle, 5, Piag.

HETERONEURINAE.

Heteroneura Fall.

- H. albimana* Meig. — B. 1081. — Maastricht, 5, Maur.; Middelburg, 8, de Man; Wassenaar, 7, Piag.; Leiden, 5, v. Voll.; Bodegraven, 8, de M.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.
- H. pictipes* Zett. — B. 1082. — 's Gravenhage, 6, een ♂, v. d. W.

GEOMYZINAE.

Opomyza Fall.

- O. germinationis* L. — B. 1290. — Gemeen, uit alle provinciën.
- O. florum* Fabr. — B. 1291 (*florum*) en 1292 (*Nataliae* Egg.). — Venlo, 6, de M.; Maastricht, 7, de Man; Plasmolen, 8, Valkenburg, 7, Piag.; Breda, 5, Heyl.; Rotterdam, Frans.; Staalduinen, 6, v. Voll.; Bussum, 7, de M.; Driebergen, 6 en 10, Six; Maarsbergen, 8, Piag.; Baarn, 8, de M.; in Gelderl. op verscheidene plaatsen; de var. *Nataliae*: 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W. en de M.; Bloemendaal, 9, de M.; Amsterdam, 7, de M.

Balioptera Löw.

- B. combinata* L. — B. 1293 (*Geomyza*). — Niet zeldzaam; in de meeste provinciën aangetroffen.
- B. tripunctata* Fall. — B. 1294 (*Geomyza*). — Dinther, 8, de Man; 's Gravenhage, 5—8, Wassenaar en Staalduinen, 7, v. d. W.; Leiden, v. Voll.; Bussum, 6, 7, de M.; Haarlem, 9, Rits.; Heemstede, 7, v. Voll.; Driebergen en Utrecht, 10, Six; Maarsbergen, 8, Piag.; Linschoten, 8, de M.; Kuilenburg en Groesbeek, 7, de M.; Brummen, 7, v. Voll.; Witterholt, 7, v. d. W.
- B. sabulosa* Hal. — B. 1296 (*Geomyza*). — Utrecht, 7, Six; Beek, 6, Six.
- B. venusta* Meig. Syst. Besch. VI. 110; Schin. Fn. austr. II. 287 (*Geomyza*). — Ruurlo, 7, een ♀, Sn.

Geomyza Fall.

- G. marginella* Fall. — B. 1295. — 's Gravenhage en Scheveningsche duinen, 7 en 8, v. d. W.; Hilversum, 6, de M.; de Bilt, 7, Six; Beek, 6, Six.
- G. obscurella* Fall. — B. 1297 (*Diastata*).¹⁾ — Domburg, 7, de Man; in N. en Z. Holland op verschillende plaatsen, doch bij enkele exemplaren; Driebergen, 5, 10, Six.

1) *G. obscurella* Fall. is eene echte *Geomyza*; Meigen's beschrijving slaat op eene andere soort, die tot het gen. *Diastata* behoort en door Löw *D. vagans* is genoemd.

G. frontalis Fall. — Meig. Syst. Besch. VI. 111 (*Opomyza*). — Beek, 6, Six.

Diastata Meig

D. punctum Meig. — B. 1298. — Middelburg, 10, de Man; 'sGravenhage, 4, 5, 8, 9, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Velzen, 6 en Santpoort, 7, de M.; Utrecht, 5, Six.

D. costata Meig. — B. 1299. — 'sGravenhage, 6, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Bloemendaal, 8, Santpoort, 6, IJmuiden, 6, de M.; Baarn, 8, de M.; Utrecht, 5, Six; Rozendaal, 8, de M.; Wolfhezen, 8, v. d. W.; steeds bij enkele exemplaren.

D. fumipennis Meig. — B. 1300. — Venlo, v. d. Br.; Haarlem, 10, Kink.; Driebergen, 10, Six.

D. unipunctata Zett. Dipt. Scand. VI. 2537. — Bodegraven, 8, de M.; Utrecht, Six; Lochem, 6, de M.

Stegana Meig.

St. curvipennis Fall. — Schin. Fn. austr. II. 271. — Duinen bij Overveen, 7, Kink.

St. coleoptrata Scop. — Schin. Fn. austr. II. 271. — Maastricht, 6, een ♂, Maur.

Periseelis Löw.

P. annulata Fall. — Schin. Fn. austr. II. 272. — Middelburg, 7, een ♂, de Man.

Phortica Schin.

Ph. alboguttata Wahlb. — Zett. Dipt. Scand. VI. 2547. — 'sGravenhage, Six.

Noterophila Rond.

N. glabra Fall. — Schin. Fn. austr. II. 276 (*Drosophila*). — Maastricht, 8, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; Bodegraven, 8, de M.; 'sGravenhage en Wassenaarsche duinen, 5, 7, Piag.; duinstreek bij Haarlem, 6, 7, de M.

Drosophila Fall.

Dr. transversa Fall. — B. 1275. — Maastricht, 9, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; 'sGravenhage, 7, v. d. W.; Bodegraven, 5, 8 en Lisse, 8, de M.; Haarlem, 9, Weyenb.; Amsterdam, 8, 10, Kink. en de M.; Bloemendaal, 8, de M.; Baarn, 8, de M.; de Bilt, 8, Six.

Dr. phalerata Meig. — B. 1276. — Maastricht, 8, Maur.; Middelburg, 7, de Man; 'sGravenhage, in 't eerste voorjaar en 7, 8, v. d. W.; Heemstede, v. Voll.; Amsterdam, 11, Kink.

Dr. obscura Fall. — B. 1277. — Maastricht, 7, 8, Maur.; 'sGravenhage, 9, v. d. W.

- D. tristis* Fall. — B. 1278. — Maastricht, 8, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.
- D. fasciata* Meig. — B. 1279. — Maastricht, 6, Maur.; Rotterd., Frans.
- D. fenestrarum* Fall. — B. 1280. — Niet zeldzaam. Maastricht, 8, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, 7, Frans.; Bodegraven, de M.; Amsterdam, Kink. en de M.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Kuilenburg, 7, de M.
- D. funebris* Fabr. — B. 1281. — Vrij gemeen, in de meeste provinciën gevonden.
- D. confusa* Staeg. — Zett. Dipt. Scand. VI. 2565; Schin. Fn. austr. II. 279. — Maastricht, 8, Maur.; Rotterdam, 6, Piag.

Scaptomyza Hardy.

- S. flavicola* Meig. Syst. Besch. VI. 66 (*Notiphila*); Schin. Fn. austr. II. 279 (*Drosophila*). — B. 1282 (*Drosophila flava*). — Middelburg, 8, de Man; duinen bij 's Gravenhage, Scheveningen en Katwijk, 8, v. d. W.; 's Gravenhage, de larven in bladeren van *Tropaeolum maius*, de M.; Rotterdam, 6, Piag.; Rhooen, 10, Schepm.; Bodegraven, 8, de M.; Diemen, 6—8, Helder, 8, de M.
- S. graminum* Fall. — B. 1283 (*Drosophila*). — Gemeen.

Asteia Meig.

- A. concinna* Meig. — B. 1284. — Maastricht, 9, Maur.; 's Gravenhage, 6—8, enkele exempl., v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Vogelenzang, 7, Piag.; Haarlem, 4, Rits.; Bloemendaal, 7, 8, v. d. W. en de M.; Bergen, 7, de M.
- A. amoena* Meig. Syst. Besch. VI. 89; Schin. Fn. austr. II. 280. — Maastricht, 9, Maur.; Bodegraven, 10, de M.; Amsterdam, 9, 10, Sw. en de M.; Driebergen, 4, 10, Six.

Leptomyza Macq.

- L. gracilis* Fall. — B. 1285. — Plasmolen, 6, 8, Piag.; Rotterdamsche plassen, 6, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Diemen, 6—8, en Durgerdam, 7, de M.; Utrecht, 5, Six; Empe, v. Eyndh.
- L. flavipes* Zett. — B. 1286. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Vogelenzang, 8, v. d. W.
- L. pallida* Zett. Dipt. Scand. VII. 2702; Schin. Fn. austr. II. 281. — 's Gravenhage, v. d. W.
- L. sordidella* Zett. Dipt. Scand. VII. 2695; Schin. Fn. austr. II. 282. — Domburg, 9, de Man; Bodegraven, 8, de M.; Santpoort, 9, Piag.; Diemen, 6, Helder, 8, Bussum, 7 en Kortenhoef, 6, de M.; Maarsbergen, 5, Piag.; Kuilenburg, 7, de M.

Scyphella Rob. D.

- Sc. lutea* Fall. — B. 1287. — Meerssen, 8, Maur.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.; Rotterdam, Sn.; Bodegraven, 7, de M.; Amsterdam, 6, 7, de M.
- Sc. flava* L. — B. 1288. — Maastricht, 6, 7, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; Dinther, 8, de Man; Mastbosch bij Breda, 6, Piag.; Wassenaar, 7, Piag.; Leiden, Rits.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem, 6, 9, Weyenb.; Amsterdam, 6, 7, de M.; Schoorl, 7, Jasp.; Utrecht, 4, Wtt.; Zutphen en Empe, v. Eyndh.
- Sc. interstincta* Fall. — B. 1289. — Warmond, het ♀, v. Bemm.
- Sc. bipunctella* Zett. Dipt. Scand. VI. 2341 (*Sapromyza*). — Maastricht, 6, 7, Maur.; 's Gravenhage, Six; Wassenaar, 6, v. Voll.
- Sc. flavella* Zett. Dipt. Scand. VII. 2704 (*Anthophilina*). — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Wassenaar, 7, Piag.

CHLOROPINAE.

Platycephala Fall.

- Pl. planifrons* Fabr. — Schin. Fn. austr. II. 208. — Walcheren, G. v. W.; Diemen, 5—8, en Durgerdam, soms in aantal tusschen het riet, de M.

Meromyza Meig.

- M. pratorum* Meig. — B. 1212. — Middelburg, 8, de Man; Scheveningsche duinen, 7, v. d. W.; Katwijk, 7, de Gr.; Wassenaar, 8, v. Voll.; in het Overmaassche, 5, Piag.; Oostvoorne, 6, de M.; Bussum, 6, en IJmuiden, 6, de M.; Vogelenzang, 8, Kink.; Haarlem, 7, Jasp.
- M. variegata* Meig. — B. 1213. — Herhaaldelijk gevonden in de meeste provinciën.
- M. laeta* Meig. — B. 1214. — Als voren.
- M. saltatrix* L. — B. 1215. — Als voren.
- M. nigriventris* Macq. Suit. à Buff. II. 590; Schin. Fn. austr. II. 210. — Utrecht, Six.

Chlorops Meig.

- Chl. gracilis* Meig. — B. 1216. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6—8, v. d. W.; Wassenaarsche duinen, 8, v. Voll.; duinstreek bij Haarlem, eenige exempl. 6, 7, de M.; Bergen, 7, de M.
- Chl. nasuta* Schr. — B. 1217. — Z. Limburg, 6, Oudem.; 's Gravenhage en Wassenaar, 6 tot 8, v. d. W. en de M.; in het Overmaassche, 5, 6, Piag.; Lisse, 8, de M.; Bodegraven, 5, 8, de M.; Zandvoort, 9, de M.; Laag Soeren, 6, Oudem.
- Chl. scalaris* Meig. — B. 1218. — Limburg, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 6 en 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Wageningen, 7, v. d. W.

- Chl. didyma* Zett. — B. 1219. — Herhaaldelijk in de meeste provinciën aangetroffen.
- Chl. laeta* Meig. — B. 1220. — Koudekerke, duinen, de Man; Bodegraven, 7, de M.; Diemen, 8, de M.; Heemstede, v. Voll.; Empe, v. Eyndh.
- Chl. hypostigma* Meig. — B. 1221. — Herhaaldelijk en in bijna alle provinciën gevonden; hier en daar gemeen.
- Chl. glabra* Meig. — B. 1222. ¹⁾ — Valkenburg, 7, Piag.; Maastricht, 5, Maur.; Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, duinen, 5 en 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Amsterdam, 6, 7, Jasp. en de M.; Utrecht, 7, v. d. W.; Kampen, v. Voll.; Groningen, 8, de Gav.
- Chl. taeniopus* Meig. — B. 1223. — Breda, 5, Heyl.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 10, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, 6, Piag.; Amsterd., 6, Jasp.; Texel, 5, Rits.; Velp, 7, v. d. W.; Voorst, Wtt.
- Chl. strigula* Fabr. — B. 1224. — Houthem, 6, Oudem.; 's Gravenhage en Wassenaar, 8 en 9, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, 6, Piag.; Rotterdam, Frans.; Rozendaalsche heide bij Velp, v. d. W.
- Chl. longicornis* Zett. — B. 1225. — 's Gravenhage, 8 en 9, v. d. W.; Wassenaarsche duinen, 8, v. Voll.
- Chl. cereris* Fall. — B. 1227. — Overal gewoon.
- Chl. messoria* Fall. — B. 1228. — Middelburg, 7, de Man; Scheveningsche duinen, 7, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Wassenaar, 7, Piag.; Rotterdam, 5, Frans.; Zwammerdam, 8, de M.
- Chl. rufina* Zett. Dipt. Scand. VII. 2628; Schin. Fn. austr. II. 211. — Limburg, Maur.
- Chl. cingulata* Meig. Syst. Besch. VI. 146; Schin. Fn. austr. II. 212. — Oosterdoekdijk te Amsterdam, 8, Kink.
- Chl. notata* Meig. Syst. Besch. VI. 144; Schin. Fn. austr. II. 214. — Maastricht, 9, Maur.; Rotterdam, 4, 6, Piag.; Bodegraven, 5 en Loosduinen, 7, de M.; Amsterdam, 5, 9, Kink.; Weesp, 6, de M.; Utrecht, Six.
- Chl. lineata* Fabr. — Schin. Fn. austr. II. 215. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Utrecht, Six.
- Chl. circumdata* Meig. Syst. Besch. VI. 147; Schin. Fn. austr. II. 215. — Oosterwijk, 9, v. Voll.; Rotterdam, Frans.
- Chl. brunripes* Zett. Dipt. Scand. VII. 2626; Schin. Fn. austr. II. 216. — Breda, 7, een ♂, de Man.
- Chl. tarsata* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 217. — In het Overmaassche, 5, Piag.; Diemen, 5, gekweekt uit gallen van *Lipara lucens*, de M.
- Chl. sulcata* v. d. W. Tijdschr. v. Entom. XIV. 201. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, duinen, v. d. W.

1) De exemplaren van *Chl. limbata* Meig. (B. 1226) bleken later niet van *Chl. glabra* te verschillen; eerstgemelde vervalt daardoor als inlandsche soort.

Lipara Meig.

- L. lucens* Meig. Syst. Besch. VI. 1; Schin. Fn. austr. II. 219. — Plasmolen, 6, Piag.; Rijen, 6 en Mastbosch bij Breda, 5, Piag.; Oisterwijk, 6, Oudem.; Diemen, 5 en Kortenhoef, 5, 6, de M.; Amersfoort, Oudem.; Lochem, de M.
- L. rufitarsis* Löw, Wien. Ent. Mon. schr. III. 57; Schin. Fn. austr. II. 219. — Mastbosch bij Breda en Rijen, 6, Piag.; Oisterwijk, 6, Oudem.

Camarota Meig.

- C. flavitarsis* Meig. Syst. Besch. VI. 7; Schin. Fn. austr. II. 223. — Bunde, 7, Maur.

Oscinis Latr.

- O. maura* Fall. — B. 1229. — Herhaaldelijk gevonden in bijna alle provinciën.
- O. frit* L. — B. 1230. — Maastricht, 7, Maur.; Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Zwammerdam, 9, de M.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, 4, Weyenb.; Amsterdam, Jasp.; Utrecht, Six; Amersfoort, 8, v. Voll.; Zutphen, v. Eyndh.
- O. pusilla* Meig. — B. 1231. — Maastricht, 5, 9, Maur.; Plasmolen, 8, Piag.; Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 7 en 8, en duinen bij Katwijk, 8, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam, 6, Jasp.; Diemen, 5, 8, de M.; Vogelenzang, 5, Kink.; Zutphen, 8, v. Eyndh.
- O. nigrita* Meig. — B. 1232. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Amsterdam, 9, Sw.
- O. albipalpis* Meig. — B. 1233. — Duinen bij 's Gravenhage, v. d. W.; Loosduinen, 7 en Bodegraven, 8, de M.; Utrecht, Six.
- O. rufipes* Meig. — B. 1234. — 's Gravenhage, 8, een ♂, v. d. W.
- O. cognata* Meig. — B. 1235. — 's Gravenhage, 9, een ♀, v. d. W.
- O. albiseta* Meig. Syst. Besch. VI. 153; Schin. Fn. austr. II. 224. — Middelburg, 8, de Man; Rotterdam en in het Overmaassche, 5, 6, Piag.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, 5, Jasp.; Utrecht, 5, 6, Six.
- O. plumiger* Meig. Syst. Besch. VI. 153; Schin. Fn. austr. II. 225. — Breda, 7, een ♂, de Man.
- O. lineella* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 225 (*lineola*). — Maastricht, 9, Maur.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Bodegraven, 3, de M.; Haarlem, 8, Weyenb.; Utrecht, Six.
- O. frontella* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 225. — Maastricht, 8, Maur.; Bussum, 6, 7, de M.; Driebergen, 4, Six.
- O. fasciola* Meig. Syst. Besch. VI. 154. — In het Overmaassche, 5, Piag.
- O. bipunctata* Macq. Suit. à Buff. II. 601. — 's Gravenh., 5, v. d. W.

O. dubia Macq. Suit. à Buff. II. 604. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.

O. sulcella Zett. Dipt. Scand. VII. 2657. — Walcheren, G. v. W.

O. annulifera Zett. Dipt. Scand. VII. 2658. — Driebergen, 4, 10, Six.

Siphonella Macq.

S. pumilionis Bjerk. — Schin. Fn. austr. II. 229. — 's Gravenhage, duinen, 5, 6, 7, Piag.; Hilversum, 6, de M.

S. laevigata Fall. — Schin. Fn. austr. II. 229. — Oisterwijk, 7, de M.; Katwijk, 9, v. Voll.; Diemen, 6, 7, de M., Kuilenburg, 7, de M.

S. aenea Macq. Suit. à Buff. II. 585. — Maastricht, 8, Maur.; Utrecht, 4, Six.

S. flavella Zett. Dipt. Scand. VII. 2666; Schin. Fn. austr. II. 229. — Scheveningsche en Wassenaarsche duinen, 7, Piag.; Bloemendaal, 7, v. d. W.

S. palposa Fall. — Schin. Fn. austr. II. 230. — Groesbeek, 7, de M.

Myrmomorpha L. Duf.

M. cornuta Fall. — B. 1236. — Oisterwijk, Oudem.; Middelburg, 9, duinen bij Koudekerke, 8, de Man; 's Gravenhage, 5 en 9, soms in grooten getale tusschen riet, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; in het Overmaassche, 6, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Amsterdam, 4, Kink.; Diemen, 6, 7, soms in aantal, de M.; Haarlemmerhout, 5, Weyenb.; Utrecht, Six; Linschoten, 4, de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Driebergen, 10, Six; Arnhem, 4, v. M. d. R.

M. brevipennis Meig. — B. 1237. — Walcheren, G. v. W.; Zierikzee, 8, 9, Fokk.; Hillegersberg, 3, Sn.; Katwijk, 7, v. Voll.; Amsterdam, 8, 10, Kink.; Utrecht en Driebergen, Six.

Mosillus Latr.

M. arcuatus Latr. — B. 1238. — Limburg, Maur.; Middelburg; 8, duinen bij Koudekerke, 6, de Man; 's Gravenhage, duinen, 6, Piag.; Bodegraven, 6, 7, Zwammerdam, 8, een paar malen, de M.; Amsterdam, v. d. W.; Driebergen, 9, Six.

E P H Y D R I N A E.

Dichaeta Meig.

D. caudata Fall. — B. 1239. — Breda, 5, Heyl.; Rotterdamsche plassen, Frans.; Nieuwkoop, 8, de M.; Bussum, 7, de M.; Driebergen, Six.

Notiphila Fall.

N. riparia Meig. — B. 1240. — Niet zeldzaam aan slootkanten enz.

N. annulipes Stenh. — B. 1241. — Als voren.

N. nigricornis Stenh. — Schin. Fn. austr. II. 237. — Venlo, 6, de M.; Valkenburg, 7, Piag.; Middelburg, 6, de Man; 's Gravenhage,

- 6, 8, v. d. W.; Bodegraven, 5—7, niet zeldzaam, de M.; Hilversum en Amsterdam, 6, de M.; Maarsbergen, 5, Piag.
- N. cinerea* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 239. — Plasmolen, 8, Piag.; duinen bij Koudekerke, 8, de Man; in het Overmaassche, 6, Piag.; Bodegraven, 5, 7, de M.; Bussum en Diemen, 6, 7, de M.; Hattem, 8, de Man; Lochem, 6, de M.
- N. stagnicola* Stenh. — Schin. Fn. austr. II. 239. — Bodegraven, 7, de M.

Trimerina Macq.

- Tr. madizans* Fall. — B. 1242. — Loosduinen, 7, de M.; Diemen, 7 en Bussum, 9, de M.; Baarn, 8, de M.; Driebergen, 10 en Utrecht, 5, Six; Beek, 6, Six.

Discomyza Meig.

- D. incurva* Fall. — B. 1243. — Valkenburg, 7, Piag.; Breda, 5, Heyl.; Loosduinen 7, de M.; Rotterdam, Frans.; Bloemendaal, 8, de M.; Heemstede, v. Voll.; de Bilt, 8, Six; Kuilenburg, 7, de M.

Ephygrobia Schin.

- E. leucostoma* Meig. — B. 1244. — Amsterdam, 9, Diemen, 5 en Bussum, 4, de M.; Utrecht, 7, Six.
- E. compta* Meig. — B. 1245. — In het Overmaassche 6, Piag.; Driebergen en Utrecht, 10, Six.
- E. plumosa* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 242. — Middelburg, 9, de Man; Rotterdam, 5, 8, Piag.; Bodegraven, 4, de M.; Amsterdam, Jasp.; Durgerdam, 7, de M.
- E. nigritella* Stenh. — Schin. Fn. austr. II. 242. — Limburg, Maur.; Driebergen, 4, Six.

Clasiopa Stenh.

- Cl. calceata* Meig. — B. 1246. — Oirschot, 8, Maur.; Middelburg, 6, 10, de Man; 's Gravenhage, 7, 8, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 6, v. d. W.; Bodegraven, 4, 7, de M.; Amsterdam, 6, 7, 9, de M. en Sw.; Utrecht, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- Cl. pulicaria* Hal. — B. 1247. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Haarlem, 3, Rits.; Empe, 6, v. Eynth.

Athyroglossa Löw.

- A. glabra* Meig. — B. 1248. — 's Gravenhage, 3, 5 en 8, v. d. W.

Hecamede Hal.

- H. glaucella* Stenh. — Schin. Fn. austr. II. 245. — 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.
- H. albicans* Meig. Syst. Beschr. VI. 65 (*Notiphila*). — 's Gravenhage en Scheveningen, duinen, 6, 8, v. d. W.

Hydrellia Rob. D.

- H. griseola* Fall. — B. 1249. — Herhaaldelijk en in bijna alle provinciën aangetroffen.
H. ranunculi Hal. — B. 1250. — Als voren.
H. chrysostoma Meig. — B. 1251. — 's Gravenhage, 6, 9, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, Piag.
H. mutata Zett. Dipt. Scand. V. 1876; Schin. Fn. austr. II. 247. — Middelburg, 8, de Man; Driebergen, 6, Six.
H. nigripes Zett. Dipt. Scand. V. 1903; Schin. Fn. austr. II. 248. — Diemen, 6, 7, de M.

Philygria Stenh.

- Ph. punctatonevosa* Fall. — B. 1252. — Duinen bij 's Gravenhage, Scheveningen en Wassenaar, 6—8, v. d. W.; Bloemendaal, 8, de M.; Texel, 5, Rits.; Utrecht, Six.
Ph. interstincta Fall. — B. 1253. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, v. d. W.; Utrecht, 9, Six.
Ph. interrupta Hal. — B. 1254. — Middelburg, 9, de Man; Utrecht, 7, Six.
Ph. picta Fall. — B. 1255. — Utrecht, Six.
Ph. flavipes Fall. — Schin. Fn. austr. II. 252. — Scheveningsche duinen, 9, v. d. W.; Bodegraven, 6, 8, de M.; Amsterdam, 5, Diemen, 7 en Bussum, 6, de M.; Hillegom, 5, Kink.; Utrecht, Six.
Ph. stictica Meig. Syst. Besch. VI. 121; Schin. Fn. austr. II. 253. — 's Gravenhage en Utrecht, Six.

Hyadina Hal.

- H. guttata* Fall. — B. 1256. — Scheveningsche duin, 5, v. d. W.; Diemen, 6, 7 en Hilversum, 4, de M.; Amersfoort, 6 en Driebergen, 10, Six.

Axysta Hal.

- A. cesta* Hal. — B. 1257. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.

Pelina Hal.

- P. aenea* Fall. — B. 1258. — 's Gravenhage, duinen, 6, Piag.; Hilversum, 5, 6 en Diemen, 7, de M.; Baarn, 8, de M.; Driebergen en Utrecht, 4, Six.

Ochthera Latr.

- O. mantis* d. G. — B. 1259. — Plasmolen, 8, Piag.; Oosterwijk, 7 en Diemen, 8, de M.; Driebergen, 10, Six; Velp, 8, Rits.

Parydra Stenh.

- P. coarctata* Fall. — B. 1260. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.
- P. quadripunctata* Meig. — B. 1261. — Middelburg en duinen bij Koudekerke, 7, de Man; Rotterdam, Frans.
- P. pusilla* Meig. — B. 1262. — Middelburg, 8, de Man; Bodegraven, 8, de M.; Diemen, 6, 7, verscheidene exempl., de M.; Utrecht, Six.
- P. fossarum* Hal. — B. 1263. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Diemen, 6, 7, Hilversum, 6 en Naarden, 7, de M.; Baarn, 8, de M.; Utrecht en Driebergen, 10, Six.
- P. aquila* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 259. — Maastricht, aan de oevers van de Maas, 7, v. d. W.
- P. litoralis* Meig. — Schin. Fn. austr. II. 259. — De Steeg, 6, een ex., de M.

Ephydra Fall.

- E. riparia* Fall. — B. 1264. — Koudekerksche duinen, 7, 8, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Zwammerdam, 7, 8, de M.; Amsterdam, 9, 10, Kink. en de M.; Utrecht, Six.
- E. micans* Hal. — Schin. Fn. austr. II. 261. — Amsterdam, 3, 4, Diemen, 7 en Helder, 8, de M.
- E. macellaria* Egg. — Schin. Fn. austr. II. 262. — Koudekerksche duinen, 6, de Man; 's Gravenhage, duinen, 6, v. d. W.; Amsterdam, 11, Diemen, 6, Helder, 8 en Naarden, 7, de M.

Ilythea Hal.

- I. spilota* Curt. — B. 1265. — Rotterdamsche plassen, 6, een ex., Frans.

Caenia Rob. D.

- C. palustris* Fall. — B. 1266. — Koudekerke, duinen, 8, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 6, Frans.; Zwammerdam, 7, de M.; Diemen, 7, de M.
- C. fumosa* Stenh. — Schin. Fn. austr. II. 264. — Walcheren, G, v. W.; Diemen, 6, 7, verscheidene ex. en Helder, 8, de M.

Scatella Rob. D.

- Sc. cribrata* Stenh. — B. 1267. — Walcheren, G, v. W.; in het Overmaassche, Piag.; Rotterdam, een ♂, 8, Frans.; Amsterdam, 6, 7 11, enkele ex., de M.; Driebergen, 4, Six.
- Sc. despecta* Hal. — B. 1268. — Utrecht, 3 en Driebergen, 10, Six.
- Sc. noctula* Meig. — B. 1269. — Utrecht, Six.
- Sc. quadrata* Fall. — B. 1270. — Middelburg, 7, 10, de Man; in het Overmaassche, 4, Piag.; Bodegraven, 1, de M.; Amsterdam, 6, 8, 9, enkele ex., Hilversum, 10 en Helder, 8, de M.

- S. c. stagnalis* Fall. — B. 1271. — Verbreid en niet zeldzaam.
S. c. sorbillans Hal. — B. 1272. — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 6, een ♂, v. d. W.; Diemen, 5, de M.
S. c. sibilans Hal. — B. 1273. — 's Gravenhage en in de Scheveningsche en Wassenaarsche duinen, 4—8, soms in aantal, v. d. W.; Voorschoten, 9, in het Overmaassche 5, Piag.; Vogelenzang, 5 en Haarlem, 7, 8, Kink.; Amsterdam, 6, 9, Jasp.; Diemen, 3, 6, 7, de M.; Driebergen, 7, Six; Baarn, 8, de M.; Wolfhezen, 7, Sn.; Rozendaalsche heide, v. d. W.
S. c. aestuans Hal. — Schin. Fn. austr. II. 266. — Koudekerke, duinen, 6, de Man; 's Gravenhage, duinen, Piag.; Oostvoorne, 6, de M.; Bloemendaal, 4, de M.

Teichomyza Macq.

- T. fusca* Macq. — B. 1247. — Maastricht, 7, Maur.; Breda, 4, Heyl.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, soms in aantal, v. d. W.; Rotterdam, 5, Sn.; Bodegraven, 6, de M.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam, 6, 7, 9, Sw. en de M.; Utrecht, 5, Six; Arnhem, 6, v. M. d. R.

Canace Hal.

- C. ranula* Löw, Berl. Ent. Zeitschr. 1874. 81. — Bergen-op-Zoom, 7, aan de schorren, de M.

Aulacigaster Macq.

- A. rufitarsis* Macq. Suit. à Buff. II. 580; Schin. Fn. austr. II. 270. — Maastricht, 8, 9, enkele exempl., Maur.

BORBORINAE.

Coelopa Meig.

- C. frigida* Fall. — B. 1333. — Eenmaal aan het strand te Scheveningen, 10, Maitl.

Borborus Meig.

- B. geniculatus* Macq. — B. 1334. — Niet zeldzaam, in bijna alle provinciën, op verscheidene plaatsen gemeen.
B. suillorum Hal. — B. 1335. — 's Gravenhage, 7 en 10, v. d. W., 9, de M.; Zutphen, 12, v. Eyndh.
B. nitidus Meig. — B. 1336. — 's Gravenhage, 5, 8 en 10, bij enkele exempl., v. d. W.; Haarlem, 4, Weyenb.; Amsterdam, 11, Kink.
B. equinus Fall. — B. 1337. — Overal gewoon.
B. vitripennis Meig. — B. 1338. — Dinther, 7, de Man; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 4—9, enkele exempl., v. d. W.; in het Overmaassche, 4, 6, Piag.; Bussum, 9, de M.; Brummen, 10, v. Voll.
B. fumipennis Stenh. — B. 1339. — Venlo, 5, v. d. Br; 's Graven-

- hage, 4, v. d. W.; Leiden, 3, Rits.; Haarlem, 2, Weyenb.; de Bilt, 11, Weyenb.
B. tibialis Zett. Dipt. Scand. VI. 2482. — Domburg, 9, de Man.
B. pedestris Meig. Syst. Besch. VI. 209; Schin. Fn. austr. II. 321. — Rhoon, 4, Schepm.; 's Gravenhage, Everts; Oegstgeest, Rits.

Sphaerocera Latr.

- Sph. subsultans* Fabr. — B. 1340. — Overal vrij gewoon.
Sph. pusilla Fall. — B. 1341. — Middelburg, 2, de Man; Rotterdam, 5, Frans.; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Bodegraven, 3, 7, de M.
Sph. denticulata Meig. Syst. Besch. VI. 200; Schin. Fn. austr. II. 326. — Voorschoten, 9, Piag.; Amsterdam, 10, Kink.

Limosina Macq.

- L. sylvatica* Meig. — B. 1342. — Maastricht, 6, 8, Maur.; Middelburg, 6, 10, de Man; 's Gravenhage, v. d. W.; Rotterdam, 6, Sn.; Haarlem, 5, Weyenb.; Amsterdam, 6, 10, de M.; Utrecht, 5, Six; Empe, 10, v. Eyndh.
L. fontinalis Fall. — B. 1343. — Venlo, v. d. Br.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 8—10, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Noordwijk, 10, v. Voll.; Bodegraven, 7, 8, de M.; Amsterdam, 2, 10, Diemen, 6 en Hilversum, 4, 10, de M.; Haarlem, 3, Weyenb.; Baarn, 8, de M.; Driebergen, 10 Six.
L. limosa Fall. — B. 1344. — Herhaaldelijk en in bijna alle provinciën aangetroffen.
L. oelandica Stenh. — B. 1345. — Maastricht, 9, Maur.; Middelburg, 2, 7, 9, de Man; 's Gravenhage, in 't voor- en najaar, v. d. W.; Bodegraven, 7, de M.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, 2, Weyenb.; Diemen, 6, de M.; Amsterdam, 3, 9, 10, Kink. en de M.; Utrecht, 5 en Driebergen, 10, Six.; Zutphen, v. Eyndh.
L. pumilio Meig. — B. 1346. — Maastricht, 6, 7, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 9, v. d. W.; Voorschoten, 9, Piag.; Diemen, 5—7, de M.; Amsterdam, 1, 6, Jasp. en de M.; Bloemendaal, 9, de M.; Driebergen, 10, Six.
L. pusio Zett. — B. 1347. — Maastricht, 9, Maur.; Zwammerdam, 9, de M.; Haarlem, 3, Weyenb.; Zutphen, 6, v. Eyndh.
L. ochripes Meig. — B. 1348. — Middelburg, 7, 9, de Man; in N. en Z. Holland en Utrecht op verschillende plaatsen, meest bij enkele exempl.
L. bifrons Stenh. — B. 1349. — Limburg, Maur.; Walcheren, 1. Font.; Beverwijk, 4, Jasp.; Bussum, 9, de M.; Utrecht, 3 en 4, Six.
L. clunipes Meig. — B. 1350. — 's Gravenhage, 4, v. d. W.
L. fenestralis Fall. — B. 1351. — Limburg, Maur.; Middelburg, 7, de Man; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Wassenaar, 4, Frans.; Utrecht, Six; Empe, v. Eyndh.

- L. acutangula* Zett. Dipt. Scand. VI. 2499; Schin. Fn. austr. II. 328. — Walcheren, l. Font.; in het Overmaassche, 4, Piag.
- L. litoralis* Stenh. — Schin. Fn. austr. II. 331. — Middelburg, 9, de Man; den Helder, 8, de M.; Arnhem, 4, v. Voll.
- L. coxata* Stenh. — Schin. Fn. austr. II. 332. — Oosterwijk, 7, de M.; Diemen, 7 en Bussum, 6, 9, de M.
- L. pullula* Zett. Dipt. Scand. VI. 2498; Schin. Fn. austr. II. 332. — Walcheren, G. v. W.; Haarlem, 7, Weyenb.
- L. zosteræ* Hal. Ent. Mag. I. 178; syn. *L. setulosa* Zett. Dipt. Scand. VI. 2552. — Middelburg, 10, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.

OCHTHIPHILINAE.

Ochthiphila Fall.

- O. maritima* Zett. — B. 1301. — 's Gravenhage, 7, v. d. W. en 8, de M.; Wassenaarsche duinen, 6, 8, v. Voll.; Loosduinen, 7, de M.; Texel, 5, Rits.
- O. polystigma* Meig. — B. 1302. — 's Gravenhage, 6—8, enkele exempl., v. d. W.; Diemen, 6, IJmuiden, 6—8 en Kortenhoef, 5, de M.; Utrecht, 5, Six.
- O. juncorum* Fall. — B. 1303. — Niet zeldzaam op zandgrond.
- O. aridella* Fall. — B. 1304. — Als de vorige, doch minder algemeen.
- O. cornuta* Löw, Wien. Ent. Mon. schr. II. 221; Schin. Fn. austr. II. 292. — 's Gravenhage en Scheveningen, 5, 6, Piag.
- O. elegans* Panz. — Schin. Fn. austr. II. 292. — Zuid-Limburg, Versl.

Leucopis Meig.

- L. griseola* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 294. — Haarlem, 5, Weyenb.; Utrecht, Six.
- L. nigricornis* Egg. — Schin. Fn. austr. II. 295. — 's Gravenhage, een ♀, Six.

Cacoxenus Löw.

- C. indagator* Löw, Wien. Ent. Mon. schr. II. 218; Schin. Fn. austr. II. 299. — Leiden, 5, Rits.; Bodegraven, 5, de M.

Phyllomyza Fall.

- Ph. flavitarsis* Meig. — B. 1321. — Leiden, 8, v. Voll.
- Ph. securicornis* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 312. — Valkenburg, 7, Piag.; uit een nest van *Formica rufa*, Exaeten, Wasm.; Diemen, 6, 8, de M.; Maarsbergen, 7, Piag.

AGROMYZINAE.

Agromyza Fall.

- A. lacteipennis* Fall. — B. 1305. — 's Gravenhage, 5, 7, v. d. W.; Haarlem, 5, Weyenb.; Amsterdam, 9, Sw.; Driebergen, 6, Six.

- A. vagans* Fall. — B. 1306. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, Frans.; Driebergen, Six.
- A. lutea* Meig. — B. 1307. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Voorst en Empe, 8, v. Eynth.; aan den zeedijk te Kampen, v. Voll.
- A. pusilla* Meig. — B. 1308. — Bergen-op-Zoom, 5, Piag.; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, Piag.; Bloemendaal en Hilversum, 7, v. d. W.; Amsterdam, 5, Kink.; Diemen, 6, 7, de M.; Schoorl, 5, Jasp.; Utrecht, Six.
- A. flaveola* Fall. — B. 1309. — Middelburg, 5, 9, de Man; 's Gravenhage, 5—7, v. d. W.; in het Overmaassche 5, Piag.; Haarlem, 10, Kink.; Utrecht, 5, Six.
- A. strigata* Meig. — B. 1310. — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Voorburg, 9, Iv. Schepm.
- A. exigua* Meig. — B. 1311. — Voorburg, 9, Iv. Schepm.; 's Gravenhage, 9, v. d. W.
- A. reptans* Fall. — B. 1312. — Maastricht, 5, 8, 9, Maur.; Valkenburg, 6, Oudem.; 's Gravenhage, 5—10, v. d. W.; Rotterdam, 5, Piag.; Bloemendaal, 7, v. d. W.; Amsterdam, 5, 7, 8, Kink.; Bussum, 4, 6, de M.; Amersfoort, 8, v. Voll.; Kuilenburg, 6, de M.
- A. nigripes* Meig. — B. 1313. — Middelburg en Domburg, 7, 8, 9, de Man; 's Gravenhage en Wassenaar, 5—9, v. d. W.; in het Overmaassche, 5, Piag.; Bodegraven, 7, de M.; Haarlem, 6, Weyenb.; Amsterdam, 5, Kink.; Diemen, 7, de M.; Amersfoort, 7, v. d. W.; Maarsbergen, 8, Piag.; Brummen, 10, v. Voll.; Wageningen, 7, v. d. W.
- A. errans* Meig. — B. 1314. — 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.; Empe, v. Eynth.
- A. albohyalinata* Zett. — B. 1315. — Dinther, 7, de Man; 's Gravenhage, 9, een ♀, v. d. W.
- A. curvipalpis* Zett. — B. 1316. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 8, Piag.
- A. gyrans* Fall. — B. 1317. — 's Gravenhage, 8, Six en v. d. W.
- A. maura* Meig. — B. 1318. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.; Hilversum, 7, v. d. W.; Haarlem, 5, Weyenb.; Vogelenzang, 7, Piag.; Utrecht, Six; Beek, 7, v. d. W.; Empe, v. Eynth.
- A. bimaiculata* Meig. — B. 1323 (*Phyllomyza*). — 's Gravenhage, 5 en 8, v. d. W.; Driebergen, 6, Six.
- A. obscurella* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 300. — Rotterdam, 10, Piag.; Bodegraven, 8, 9 en Enkhuizen, 9, de M.; Amsterdam, 8, Sn.; Utrecht, 5, uit larven, mineerend in *Lonicera xylosteum*, Six.
- A. capitata* Zett. Dipt. Scand. VII. 2750; Schin. Fn. austr. II. 302. — Nuth, 7, Maur.; Liesbosch bij Breda, 5, Piag.; Koudekerke, duinen, 6, de Man.

- A. geniculata* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 302. — Middelburg, 6, de Man.
- A. carbonaria* Zett. Dipt. Scand. VII. 2739; Schin. Fn. austr. II. 303. — Maastricht, 6, Maur.; Middelburg, 7, 8, de Man; in N. en Z. Holland op verschillende plaatsen; Amersfoort, 6, Six; Kuilenburg, 7, de M.
- A. cunctans* Meig. Syst. Besch. VI. 178; Schin. Fn. austr. II. 304. — West-Capelle, 6 en Rotterdam, 6, 8, Piag.; Haarlem, 6, Weyenb.
- A. amoena* Meig. Syst. Besch. VI. 187; Schin. Fn. austr. II. 306. — Amsterdam, 7, uit larven, mineerend in bladeren van *Sambucus nigra*, de M.
- A. albitarsis* Meig. Syst. Besch. VI. 171. — Walcheren, G. v. W.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.
- A. flavata* Meig. Syst. Besch. VI. 177. — Diemen, 6, gekweekt uit bladeren van *Symphytum officinale*, de M.
- A. ruficornis* Macq. Suit. à Buff. II. 608. — 's Gravenhage, 8, v. d. W.; Haarlem, 7, Rits.
- A. xanthocephala* Zett. Dipt. Scand. XIV. 6547. — Bloemendaal, 9, uit larven, mineerend in bladeren van *Saponaria officinalis*, de M.
- A. flavoscutellaris* Zett. Dipt. Scand. VII. 2769. — 's Gravenhage, Six.
- A. ferruginosa* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 205. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 5, Frans.
- A. riparia* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 205. — Plasmolen, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Schielandsche plassen, 8, Piag.; Amsterdam, 5, Kink.; Utrecht, Six.
- A. discrepans* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 206. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.

Desmometopa Löw.

- D. latipes* Meig. — B. 1319, het ♂ (*Agromyza latipes*); B. 1192, het ♀ (*Madiza annulitarsis*). — Nuth, 7, Maur.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Frans.
- D. sordida* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 305 (*Agromyza*); v. d. W., Tijdschr. v. Ent. XIV. 197 (*Madiza*). — Domburg, 7, de Man; Haarlem, 5, Weyenb.

Ceratomyza Schin.

- C. acuticornis* Meig. — B. 1320. — Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage en Scheveningen, 6—8, v. d. W.; Rotterdamsche plassen, 6, v. d. W.; Leiden, 5, v. Voll.; Bodegraven, 8, de M.; Amsterdam, 8, Kink.; Diemen, 6, 7, Bussum, 9 en Hilversum, 6, de M.; Utrecht, Amersfoort, 6 en Driebergen, 10, Six; Lochem, 6, de M.
- C. spinicornis* Macq. — B. 1321. — Middelburg, 8, de Man;

's Gravenhage, 6—9, v. d. W.; Rotterdam en in het Overmaassche, 6, Piag.; Amsterdam, 6, Jasp.; Vreeland, 5, Kink.; Utrecht, Amersfoort en Driebergen, 5, 6, 10, Six.

Napomyza Hal.

- N. elegans* Fall. — B. 1324 (*Phytomyza*). — Venlo, 6, de M.; 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Loosduinen, 7, de M.; Rotterdam, 6, Piag.; Hilversum, 6 en Kortenhoeve, 5, de M.; Utrecht, 7, Six.
- N. lateralis* Fall. — B. 1325 (*Phytomyza*). — Walcheren, G. v. W.; Rotterdam, 5, Piag.; 's Gravenhage, 5 en 9, v. d. W.; Bodegraven, 8, de M.; Haarlem, 5, 7, Weyenb.; Amsterdam, 9, Jasp.; id. 8, gekweekt uit bloemhoofdjes van *Chrysanthemum inodorum*, de M.; Alkmaar, 10, Jasp.; Overveen, 5 en Naarden, 7, de M.
- N. annulipes* Meig. — B. 1326 (*Phytomyza*). — Voorst, 4, Wtt.
- N. harlemensis* Weyenb. Tijdschr. v. Ent. XIII. 196 (*Phytomyza*). — In het Overmaassche, 6, Piag.; Haarlem 7, gekweekt uit *Symphoricarpos racemosa*, Weyenb.
- N. picipes* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 207 (*Phytomyza*). — 's Gravenhage, 4, v. d. W.
- N. nigriceps* v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 207 (*Phytomyza*). — 's Gravenhage, 5, v. d. W.

Phytomyza Fall.

- Ph. flava* Fall. — B. 1327. — Middelburg, 8, 9, de Man; 's Gravenhage, 7, v. d. W.; Wassenaar, 6, v. Voll.; Rotterdam en in het Overmaassche, 6, 7, Piag.; Amsterdam, 9, Jasp.; Diemen, 7, de M.; Amersfoort en Utrecht, 5, 6, Six.
- Ph. nigripennis* Fall. — B. 1328. — Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; 's Gravenhage, 5, v. d. W.
- Ph. obscurella* Fall. — B. 1329. — Herhaaldelijk en in de meeste provinciën aangetroffen. Gekweekt uit larven, mineerend in Hulstbladeren, Zutphen, v. Eyndh.; Haarlem, Weyenb.; Amsterdam, Maitl.
- Ph. flavicornis* Fall. — B. 1330. — Rockanje, 5, Piag.; 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Zwammerdam, 2, de M.; Haarlem, 4, 8, Weyenb.; Diemen, 7, de M.; Utrecht, 5, Six.
- Ph. flavoscutellata* Fall. — B. 1331. — Middelburg, 5, de Man; 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam en in het Overmaassche, 4, 5, Piag.; Bodegraven, 5, 8, de M.; Bloemendaal, 8, de M.; Bussum, 5, Jasp.; Amsterdam, 5, Kink.
- Ph. geniculata* Macq. — B. 1332. — 's Gravenhage, 5, v. d. W.; Rotterdam, 5 en Rockanje, 6, Piag.; Vreeland, 5, Kink.; Driebergen, 10, Six; Empe, 6, v. Eyndh.
- Ph. albipennis* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 315. — Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 4, 7, v. d. W.; Utrecht, Six.

- Ph. Zetterstedtii* Schin. Fn. austr. II. 315. — In het Overmaassche, 6, Piag.; Amsterdam, 4, Kink.
- Ph. praecox* Meig. Syst. Besch. VI. 194; Schin. Fn. austr. II. 316. — Utrecht, 5, Six.
- Ph. affinis* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 316. — Middelburg, 9, de Man; in het Overmaassche, Rotterdam en Noordwijk, 5, 6, Piag.; Amsterdam, 4, Kink.; Bussum en Diemen, 6, de M.
- Ph. albiceps* Meig. Syst. Besch. VI. 194; Schin. Fn. austr. II. 317. — Middelburg, 8, de Man; Haarlem, 4, Weyenb.; Amsterdam, 4, 9, Kink. en de M.; Diemen, 6 en Linschoten, 4, de M.
- Ph. tridentata* Löw, Wien. Ent. Mon. schr. II. 76; Schin. Fn. austr. II. 317. — Amersfoort, 6, een ♂, Six.
- Ph. xanthaspis* Löw, Wien. Ent. Mon. schr. II. 79; Schin. Fn. austr. II. 318. — 's Gravenhage, een ♂, Six.
- Ph. atra* Meig. Syst. Besch. VI. 191. — 's Gravenhage, Six.
- Ph. crassiseta* Zett. Dipt. Scand. XIV. 6469. — Utrecht, 5, Six.
- Ph. heraclei* Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde, 284. — Diemen, 6, gekweekt uit *Heracleum sphondylium*, de M.
- Ph. milii* Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde, 761. — Amsterdam, 8, uit gras gekweekt, de M.
- Ph. orobanchia* Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde, 457. — Loosduinen, 7, uit *Orobanche*-stengels gekweekt, Versl.

PHORIDAE.

Conicera Meig.

- C. atra* Meig. — B. 1352. — 's Gravenhage, 6, 7, v. d. W.; Leiden, v. Voll.

Phora Latr.

- Ph. interrupta* Zett. — B. 1353. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Bergen, 7, de M.; Driebergen, 10, Six.
- Ph. florea* Fabr. — B. 1354. — Dinther, 8, de Man; 's Gravenhage, 4, v. d. W.; Bodegraven, 6, de M.
- Ph. incrassata* Meig. — B. 1355. — 's Gravenhage en Wassenaar, 7—9, v. d. W.; Bodegraven, 8, Bloemendaal, 8 en Bussum, 7, de M.; Vogelenzang, 8, v. d. W.; Haarlem, 8, 9, Piag.; Amsterdam, 8, Kink.; Zutphen, v. Eyndh.
- Ph. Bernuthi* Egg. — B. 1356. — Maastricht, 8, Maur.; 's Gravenhage, 8, v. d. W.
- Ph. mordellaria* Fall. — B. 1357. — 's Gravenhage, 5—7, v. d. W.; Rotterdam, Frans.
- Ph. femorata* Meig. — B. 1358. — Heilo en Diemen, 7, de M.; Maarsbergen, 6, Piag.; Zutphen, 5, v. Eyndh.

- Ph. rufipes* Meig. — B. 1359. — Niet zeldzaam; uit bijna alle provinciën vermeld.
- Ph. heracleella* Bouché. — B. 1360. — Limburg, Maur.; 's Gravenhage, 3—10, v. d. W.; Rotterdam, 10, Frans. en Piag.; Leiden, 5, Rits.; Haarlem, 9, Weyenb.; Utrecht, 4, Wtt.; Zutphen, v. Eyndh.
- Ph. pulicaria* Fall. ¹⁾. — B. 1361. — Maastricht, 7, 8, Maur.; Middelburg, 9, de Man; 's Gravenhage, 4—10, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Wassenaar, 8, v. Voll.; Rhoon, 9, Schepm.; Bussum, 9, Jasp.; Haarlem, 9, gekweekt uit een nest van *Vespa germanica*, Rits.; Utrecht, 10, Weyenb.; Wolfhezen, 8, v. d. W.
- Ph. ruficornis* Meig. — B. 1362. — 's Gravenhage, 5, 6, v. d. W.; Rotterdam, Frans.
- Ph. urbana* Meig. — B. 1363. — 's Gravenhage, 4 en 5, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.; Zutphen, 7, v. d. W.
- Ph. thoracica* Meig. — B. 1364. — Oirschot, 8, Maur.; Breda, Heyl.; Ulvenhoutsche bosch, 5, Piag.; Haagsche bosch, 5, v. d. W.; de Bilt, 7, Six; Empe, v. Eyndh.; Kuilenburg, 7, de M.
- Ph. lutea* Meig. — B. 1365. — Maastricht, 9, Maur.; Amersfoort, 6 en Driebergen, 5, Six.
- Ph. flava* Fall. — B. 1366. — 's Gravenhage, 8 en 10, v. d. W.; Utrecht, 5, 7, Six; Amersfoort, 6 en Driebergen, 10, Six.
- Ph. fasciata* Fall. — B. 1367. — Driebergen, 6, een ♀, Six.
- Ph. sordidipennis* L. Duf. — B. 1368. — Valkenburg, 7, Piag.; 's Gravenhage, 7 en 8, v. d. W.; Utrecht, 7, Six.
- Ph. crassicornis* Meig. — B. 1369. — Oisterwijk, 7, de M.; 's Gravenhage en Wassenaar, 6 en 7, v. d. W.; Kuilenburg, 7, de M.
- Ph. abdominalis* Fall. — Schin. Fn. austr. II. 336. — Haagsche bosch, 6, Piag.
- Ph. distincta* Egg. — Schin. Fn. austr. II. 338. — Maastricht, 7, 8, Maur.
- Ph. ciliata* Zett. Dipt. Scand. VIII. 2872; Schin. Fn. austr. II. 341. — Plasmolen, 6, Piag.
- Ph. maculata* Meig. Syst. Besch. VI. 214; Schin. Fn. austr. II. 341. — Leiden, 2, 3, Rits.; Rotterdam, 4, Piag.
- Ph. opaca* Meig. Syst. Besch. VI. 216; Schin. Fn. austr. II. 342. — Walcheren, G. v. W.; Haarlem, 2, 10, Weyenb.
- Ph. nigricornis* Egg. — Schin. Fn. austr. II. 342. — 's Gravenhage, 3, v. d. W.; Arnhem, 3, 4, v. M. d. R.
- Ph. concinna* Meig. Syst. Besch. VI. 221; Schin. Fn. austr. II.

1) Strobl (Wien. Ent. Ztg. XI. 202) beschouwt *rufipes*, *heracleella* en *pulicaria* als variëteiten van ééne soort (*pulicaria* Fall).

345. 1). — Limburg, Maur.; Bodegraven, 7, de M.; Voorburg, 9, Iv. Schepm.
Ph. pusilla Meig. Syst. Besch. VI. 218; Schin. Fn. austr. II. 345. — Limburg, Maur.
Ph. palpina Zett. Dipt. Scand. VII. 2868; Schin. Fn. austr. II. 345. — 's Gravenhage, 6, v. d. W.; Rotterdam, 6, Piag.
Ph. zonata Zett. Dipt. Scand. VII. 2862. — Driebergen, 10, Six.
Ph. sororecula v. d. W. Tijdschr. v. Ent. XIV. 209. — Amsterd., 5, Kink.

Gymnophora Macq.

- G. arcuata* Meig. — B. 1370. — Niet ongemeen bij den Haag, 6—10, v. d. W. en Piag.

Trineura Meig.

- Tr. aterrima* Fabr. — B. 1371. — Maastricht, 8, Maur.; Middelburg, 8, de Man; 's Gravenhage, 4—8, v. d. W.; Leiden, 6, v. Voll.; Bodegraven, 6, 7, de M.; Rotterdam, 5, Piag.; Noordwijk, 5, Kink.; Hilversum, 5, 7, v. d. W. en de M.; Amsterdam, 6, 9, Sw. en de M.; Utrecht, 6, Wtt.; Maarsbergen, 7, Piag.; Zutphen, v. Eyndh.
Tr. velutina Meig. — B. 1372. — 's Gravenhage, 7, v. Voll. en v. d. W.

Metopina Macq.

- M. galeata* Hal. Ent. Mag. I. 179 (syn. *Phora oligoneura* Mik, Verh. Zool. bot. Ges. XVII. 414; *Drepanophora Braueri* Strobl, Dipt. Funde um Seitenstetten, 40; en *Leptophora perpusilla* Six, Tijdschr. v. Ent. XXI. 186). — 's Gravenhage, Six.

HIPPOBOSCIDÆ.

Hippobosca L.

- H. equina* L. — B. 1373. — Venlo, v. d. Br.; Brummen, v. d. W.; Apeldoorn, 7, Oudem.

Olfersia Wied.

- O. ardeae* Macq. Suit. à Buff. II. 640; Schin. Fn. austr. II. 645. — Op eene *Ardea purpurea*, in Natura Artis Magistra te Amsterdam, Sw.

Ornithomyia Latr.

- O. avicularia* L. — B. 1374. — Limburg, Maur.; Leiden, 5, v. Voll.; Rotterd., Frans.; Amsterd., 9, Oudem.; Heemstede, 7, v. Voll.; Patten, 7 en Harderwijk, Oudem.; Groningen, de Gav.
O. metallica Schin. — B. 1375. — Een ex. op *Ardea minuta*, Frans.

1) Volgens Strobl (Wien. Ent. Ztg. XI. 199) zou *Ph. concinna* Meig. het ♀ zijn van *Ph. crassicornis* Meig.

Stenopteryx Leach.

St. hirundinis L. — B. 1376. — Venlo, v. d. Br.; Leiden, v. Voll.; Rotterdam, Frans.; Haarlem, 7, Rits.

Oxypterus Leach.

O. pallidum Leach. — B. 1377. — Venlo, v. d. Br.; Zutphen, 7, v. Eyndh.; Arnhem, 6, 7, v. M. d. R.

Liptena Nitzsch.

L. cervi L. — B. 1378. — Arnhem, 9, een gevleugeld ex., v. M. d. R.; Gelderland, v. Voll. en v. Eyndh.

Melophagus Latr.

M. ovinus L. — B. 1379. — Sluis, 6, de Man; Rotterdam, 7, Piag.; Bodegraven, 2, 3, de M.; Vogelenzang, 6, Weyenb.; Schoorl, 8, Jasp.; Buurlo, 7, Rits.

NYCTERIBIDAE.

Nycteribia Latr.

N. Blasii Kolen. — Schin. Fn. austr. II. 656. — Op *Vespertilio murinus*, Rits.

I N D E X.

- Acanthiptera 101.
Achalcus 53.
Acidia 118.
Acnemia 6.
Acrocera 40.
Actia 85.
Actina 35.
Actora 110.
Aedes 24.
Agria 91.
Agromyza 136.
Agromyzinae 136.
Allodia 8.
Amalopsis 34.
Ammobia 79.
Anaclinia 6.
Anepsius 55.
Anisomera 32.
Anomoia 121.
Anopheles 24.
Anthalia 49.
Anthomyia 101.
Anthomyiinae 95.
Anthrax 40.
Antipalus 44.
Aphria 78.
Aretophila 72.
Ardoptera 52.
Argyra 54.
Argyramoeba 41.
Ascia 71.
Asilidae 42.
Asilus 44.
Asindulum 12.
Asphondylia 3.
Aspistes 14.
Asteia 126.
Asynapta 3.
Ateleneura 62.
Atherix 40.
Athyroglossa 131.
Aulacigaster 134.
Axysta 132.
Azana 6.
Azelia 102.
Bacha 71.
Balioptera 124.
Baumhaueria 84.
Beris 35.
Bibio 14.
Bibionidae 13.
Bigorichaeta 86.
Blepharipa 83.
Boletina 6.
Bolitophila 11.
Bombylidae 40.
Bombylius 41.
Borborinae 134.
Borborus 134.
Brachycampta 8.
Brachycoma 82.
Brachyopa 72.
Brachypalpus 74.
Cacoxenus 136.
Caenia 133.
Calliophrys 105.
Calliphora 92.
Callomyia 61.
Calobata 114.
Calobatinae 114.
Camarota 129.
Campsicnemus 60.
Camptocladius 19.
Campylomyza 4.
Canace 134.
Caricea 105.
Carphotricha 119.
Catabomba 68.
Catocha 4.
Cecidomyia 1.
Cecidomyiidae 1.
Ceratomyza 138.
Ceratopogon 15.
Ceria 64.
Ceromasia 83.
Ceroplatys 12.
Ceroxys 117.
Chamaesyrrhus 70.
Chelisia 106.
Chetolyga 80.
Chilosia 66.
Chironomidae 15.
Chironomus 17.
Chloropinae 127.
Chlorops 127.
Chortophila 103.
Chrysochlamis 75.
Chrysogaster 66.
Chrysomyia 37.
Chrysopila 39.
Chrysops 39.
Chrysotimus 54.
Chrysotoxum 64.
Chrysotus 53.

- Chyliza 113.
 Cistogaster 77.
 Clasiopa 131.
 Cleigastra 108.
 Clinorhyncha 3.
 Clista 87.
 Clytia 86.
 Coelopa 134.
 Coenomyia 37.
Coenomyidae 37.
 Coenosia 106.
 Colpodia 2.
 Conicera 142.
Conopidae 63.
 Conops 63.
 Cordyla 10.
 Cordylura 107.
Cordylurinae 107.
 Corethra 24.
 Corynoneura 16.
 Cricotopus 19.
 Criorrhina 74.
 Ctenophora 25.
 Culex 23.
Culicidae 23.
 Cylindrotoma 35.
 Cynomyia 91.
Cyrtidae 40.
 Cyrtoma 49.
 Cyrtoneura 94.
 Dalmannia 64.
 Dasyphora 93.
 Dasyopogon 43.
 Degeeria 8.
 Demoticus 78.
 Desmometopa 138.
 Dexia 89.
Dexinae 88.
 Diadocidia 11.
 Diamesa 21.
 Diaphorus 54.
 Diastata 125.
 Dichaeta 130.
 Dicranomyia 29.
 Dicranoptycha 30.
 Dicranota 34.
 Dictenidia 25.
 Didea 70.
 Dilophus 15.
 Dinera 89.
 Dioctria 42.
 Diplosis 3.
 Discomyza 131.
 Dixia 24.
 Docosia 7.
 Dolichopeza 25.
Dolichopodidae 52.
 Dolichopus 57.
 Doros 71.
 Drapetis 52.
 Drosophila 125.
 Drymeia 98.
 Dryomyza 110.
 Dynatosoma 9.
 Echinomyia 77.
 Elaphropeza 52.
 Elgiva 112.
 Empalia 11.
 Empeda 32.
 Empheria 11.
Empidae 45.
 Empis 46.
 Ensina 119.
 Ephelia 32.
 Ephippium 36.
 Ephydra 132.
Ephydrinae 130.
 Ephygrobia 131.
 Epicamocera 81.
 Epidapus 6.
 Epidosis 2.
 Epiphragma 32.
 Epithriptus 45.
 Erioptera 31.
 Eriphia 99.
 Eristalis 72.
 Eumerus 75.
 Euricnemus 21.
 Eurimyia 74.
 Eustalomyia 100.
 Eutolmus 44.
 Eutonia 32.
 Exechia 7.
 Exoprosopa 40.
 Exorista 81.
 Fabricia 78.
 Fortisia 88.
 Frontina 84.
 Fucellia 108.
 Gaedia 83.
 Gastrophilus 76.
 Geomyza 124.
Geomyzinae 124.
 Germaria 79.
 Glaphyoptera 6.
 Gnophomyia 32.
 Gonia 79.
 Gonomyia 31.
 Graphomyia 92.
 Gymnochaeta 78.
 Gymnophora 142.
 Gymnopternus 57.
 Gymnosoma 77.
Gymnosominae 77.
 Haematobia 92.
 Haematopota 38.
 Hammomyia 103.
 Hecamede 131.
 Helomyza 109.
Helomyzinae 109.
 Helophilus 73.
 Hemerodromia 49.
 Hercostomus 56.
 Herina 117.

- Heteromyza 110.
 Heteroneura 124.
Heteroneurinae 124.
 Heteropterina 84.
 Hexatoma 38.
 Hilara 48.
 Hilarella 84.
 Hippobosca 142.
Hippoboscidae 142.
 Homalomyia 103.
 Hoplogaster 106.
 Hormomyia 2.
 Hyadina 132.
 Hyalomyia 76.
 Hybos 45.
 Hydrellia 132.
 Hydrobaenus 22.
 Hydromyza 108.
 Hydrophoria 101.
 Hydrophorus 59.
 Hydrotaea 98.
 Hyetodesia 95.
 Hygroceleuthus 57.
 Hylemyia 100.
 Hypoderma 76.
 Hypophyllus 56.
 Hypostena 87.
 Idioptera 32.
 Ilythea 133.
 Itamus 45.
 Laphria 43.
 Lasiopogon 43.
 Lasioptera 3.
 Lasiosoma 10.
 Lauxania 123.
 Leia 6.
Leptidae 39.
 Leptis 39.
 Leptogaster 42.
 Leptomyza 126.
 Leptopa 107.
 Leptopeza 46.
 Leria 110.
 Leskia 85.
 Lestremia 4.
 Leucopis 136.
 Leucostola 55.
 Leucostoma 88.
 Leucozona 68.
 Liancalus 59.
 Limnia 112.
 Limnobia 29.
 Limnophila 33.
 Limnophora 99.
 Limosina 135.
 Liogma 34.
 Lipara 129.
 Lipoptena 143.
 Lisse 105.
 Lissa 113.
 Lonchaea 123.
 Lonchoptera 61.
Lonchopteridae 61.
 Lophonotus 44.
 Loxocera 113.
 Lucilia 93.
 Machaerium 55.
 Machimus 44.
 Macquartia 86.
 Macrocera 11.
 Macronychia 84.
 Macropeza 22.
 Macrorchis 106.
 Madiza 116.
 Mallota 74.
 Masicera 83.
 Medeterus 60.
 Medoria 88.
 Meigenia 82.
 Melanochira 111.
 Melanophora 88.
 Melanostoma 67.
 Melithreptus 70.
 Melophagus 143.
 Merodon 74.
 Meromyza 127.
 Mesembrina 92.
 Metopia 84.
 Metopina 142.
 Metriocnemus 21.
 Miastor 3.
 Microchrysa 37.
 Microdon 64.
 Micropalpus 78.
 Micropeza 115.
 Microphorus 49.
 Microtricha 88.
 Miltogramma 85.
 Minettia 121.
 Mintho 89.
 Mochtherus 45.
 Molophilus 30.
 Monoclona 11.
 Morinia 88.
 Mosillus 130.
 Musca 94.
Muscidae 76.
Muscinae 91.
 Mycetaulus 116.
 Mycetobia 11.
 Mycetophila 9.
Mycetophilidae 4.
 Mycophaga 105.
 Mydaea 96.
 Myennis 117.
 Myobia 85.
 Myopa 63.
 Myopina 104.
 Myospila 94.
 Myrmomorpha 130.
 Napomyza 139.
 Neaera 85.
 Nemopoda 115.
 Nemoraea 80.

- Nemorilla 80.
 Nemoteles 36.
 Nephrocera 62.
 Nephrotoma 29.
 Neurigona 53.
 Norellia 108.
 Noterophila 125.
 Notiphila 130.
 Nycteribia 143.
Nycteribidae 143.
 Nyctia 89.
 Occemyia 63.
 Ochthera 132.
 Ochthiphila 136.
Ochthiphilinae 136.
 Ocydromia 46.
 Ocyptera 77.
Ocypterinae 77.
 Odontomyia 36.
 Oedalea 46.
Oestridae 75.
 Oestrus 75.
 Olfersia 142.
 Oligochaetes 60.
 Oliviera 78.
 Oncodes 40.
 Onesia 91.
 Onodontha 98.
 Opetia 61.
 Ophyra 98.
 Opomyza 124.
 Orellia 118.
 Ornithomyia 142.
Ortalininae 117.
 Orthocladius 20.
 Orthoneura 66.
 Orygma 109.
 Oscinis 129.
 Oxcera 36.
 Oxyphora 119.
 Oxypterum 143.
 Pachygaster 35.
 Pachymeria 46.
 Pachyrrhina 28.
 Palloptera 121.
 Pamponerus 44.
 Paragus 65.
 Paragusia 84.
 Parydra 133.
 Pedicia 34.
 Pegomyia 99.
 Pelococera 70.
 Peleteria 77.
 Pelina 132.
 Penthetria 14.
 Pericoma 23.
 Periscelis 125.
 Peteina 79.
 Phalacroceras 35.
 Phania 77.
Phaninae 77.
Phasinae 76.
 Philonicus 44.
 Philygria 132.
 Phora 140.
 Phorbia 104.
Phoridae 140.
 Phorocera 83.
 Phortica 125.
 Phronia 7.
 Pthiria 41.
 Phyllomyza 136.
 Physocephala 63.
 Phytomyza 139.
 Piophila 116.
 Pipiza 65.
 Pipizella 66.
Pipunculidae 62.
 Pipunculus 62.
 Plagia 79.
 Platycephala 127.
 Platychirus 68.
 Platyparea 118.
 Platypeza 61.
Platypezidae 61.
 Platystoma 118.
 Platystyla 113.
 Platyura 12.
 Plaxemyia 94.
 Plesiasina 11.
 Plesina 88.
 Poecilobothrus 56.
 Poecilostola 33.
 Polidea 86.
 Polietes 95.
 Pollenia 92.
 Polypleta 11.
 Porphyrops 55.
 Prosenia 89.
 Psarus 64.
 Psila 113.
Psilinae 113.
 Psilcephala 42.
 Psilopus 52.
 Psychoda 23.
Psychodidae 23.
 Ptiolina 40.
 Ptychoptera 25.
 Pyrellia 93.
 Pyrophaena 68.
 Rhadiurgus 45.
 Rhamphidia 30.
 Rhamphomyia 47.
 Rhamphium 56.
 Rhingia 72.
 Rhinophora 88.
 Rhipidia 30.
Rhyphidae 35.
 Rhypholophus 31.
 Rhyphus 35.
 Rivellia 117.
 Roeselia 85.
 Rymosia 8.
 Saltella 116.

- Sapromyza 122.
Sapromyzinae 121.
 Sarcophaga 90.
Sarcophaginae 89.
 Sarcophila 90.
 Sargus 37.
 Scaptomyza 126.
 Scatella 133.
 Scatophaga 108.
 Scatopse 13.
Scenopinidae 42.
 Scenopinus 42.
 Sceptonia 7.
 Schoenomyza 107.
 Sciara 4.
 Sciadromia 50.
 Sciomyza 110.
Sciomyzinae 110.
 Sciophila 10.
 Scopolia 87.
 Scyphella 127.
 Sceptera 118.
 Sepedon 113.
Sepsinae 115.
 Sepsis 115.
 Sericomomyia 72.
 Servillia 78.
 Sicus 63.
 Simulia 13.
Simulidae 13.
 Siphona 86.
 Siphonella 130.
 Sphaerocera 135.
 Sphegina 71.
 Sphixapata 84.
 Spilogaster 97.
 Spilographa 118.
 Spilomyia 75.
 Stegana 125.
 Stenopteryx 143.
 Stomoxys 91.
 Stratiomyia 36.
Stratiomyidae 35.
 Subula 37.
 Syllegoptera 107.
 Symplecta 31.
 Sympyctus 60.
 Syneches 45.
 Syntomogaster 76.
 Syntormon 55.
 Syritta 75.
Syrphidae 64.
 Syrphus 68.
 Systemus 55.
 Systoechus 41.
Tabanidae 38.
 Tabanus 38.
 Tachina 82.
Tachininae 77.
 Tachydromia 50.
 Tachypeza 50.
 Tachytrechus 56.
 Tanypeza 114.
 Tanypus 21.
 Tanytarsus 20.
 Teichomyza 134.
 Tephritis 120.
 Tetanocera 111.
 Tetanops 117.
 Tetragoneura 10.
 Teuchophorus 60.
 Thamnóromia 50.
 Thelaira 89.
 Thelida 110.
 Themira 115.
 Thereva 41.
Therevidae 41.
 Theria 89.
 Thinophilus 59.
 Thryptocera 85.
 Tipula 26.
Tipulidae 24.
 Trichocera 34.
 Trichomyia 23.
 Trichonta 8.
 Trichosia 4.
 Trimerina 131.
 Trimicra 32.
 Trineura 142.
 Triogma 35.
 Tropidia 74.
 Trypeta 119.
Trypetinae 118.
 Tryphera 86.
 Ula 34.
 Ulomyia 23.
 Urellia 120.
 Urophora 119.
 Volucella 72.
 Xanthochlorus 53.
 Xanthogramma 71.
 Xiphandrium 55.
 Xiphura 25.
Xylophagidae 37.
 Xylota 74.
 Zodion 63.
 Zophomyia 79.
 Zygomomyia 7.
 Zygoneura 4.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a list or index of names and numbers.



