

P. 67

BULLETIN INTERNATIONAL
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE CRACOVIE.
CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET NATURELLES.

N° 3.

Mars

1905.



- Sommaire:** 12. M. VL. KULCZYŃSKI. *Fragmenta arachnologica*, II.
13. M. T. BROWICZ. Sur la fonction sécrétoire du noyau des cellules hépatiques.
14. M. M. P. RUDZKI. Remarque sur le mémoire de M. Denizot „Sur la théorie du mouvement relatif etc.“.
15. M. K. WÓJCIK. *Infraoligocène de Riszkania près de Uzsok.*

Séance du lundi 13 Mars 1905.

PRÉSIDENTE DE M. N. CYBULSKI.

12. M. VL. KULCZYŃSKI m. c. *Fragmenta arachnologica*, II.
(Accedit tabula VII).

V. De Araneo cucurbitino Clerck et nonnullis aliis araneis similibus.

Araneus cucurbitinus (Clerck) auctorum, nonnullorum saltem, duas certo continet formas, inter se proximas et, ni fallor, non nisi partibus genitalibus distinctas. Utrum pro speciebus propriis an pro subspeciebus modo habendae sint hae formae, nescio. Inter exempla Europaea, non pauca, quae in manibus habeo, marem saltem non ullum vidi, qui transitum inter eas efficiat (feminae difficilius distinguuntur); formas has itaque species esse censerem, nisi novissem *Araneum cucurbitinum* Madeirae insulae proprium; huius mas palporum fabricâ quodammodo medium tenet inter formas *Aranei cucurbitini* Europaeas, feminam eius vero ab alterâ earum, eâ quidem, quam *opisthographam* appellabo, distinguere nescio (non audeo tamen contendere, feminas Maderianas ab *A. opisthographo* revera nullâ re differre, duas enim eas modo vidi, mediocriter quidem conservatas). Ad tempus itaque formas has tres, Europaeas duas et Maderianam, ut subspecies proferam; investigationes futurae fortasse eas species veras esse demonstrabunt, fortasse inter varietates destrudent.

Qui sit typicus *Araneus cucurbitinus* Clerckii, difficilius est ad extricandum, mihi quidem, nescio enim, an ambae formae, de quibus agitur, Sueciam incolant; si incolunt ambae, certo a Clerckio

confusae sunt et nihil interest, utra earum pro typo speciei habeatur. *Araneum cucurbitinum typicum* eum appellabo, cuius solius exempla aliquot in Norvegiâ lecta et nomine *A. cucurbitini* Cl. signata, dono mihi dedit Cel. Embr. Strand; de hac enim formâ dubitari non potest, quin etiam in Sueciâ occurrat. Alterius subspeciei: *opisthographae*, quae in Poloniâ rarior est quam *A. cucurbitinus typicus* et meridiem versus, ni fallor, frequentior fit, exemplum Scandinavicum non vidi.

E descriptionibus *Aranei cucurbitini* ab auctoribus prolatis cognosci non potest, ni fallor, quas formas spectent. Qualem in modum per terras distributi sint *Araneus cucurbitinus typicus* et *opisthographus*, investigationes futurae itaque demum demonstrabunt. Secundum exempla, quae in manibus habeo, *Ar. cucurbitinus typicus* incolit Galiciam, Poloniam Rossicam, Silesiam, Austriam Inferiorem, Tiroliam, Hungariam cum Transsilvania, Croatiam (Adriaticam), Istriam, Belgium, Angliam, Norvegiam, *opisthographus* vero: Galiciam, Bohemiam, Austriam Inferiorem, Hungariam, Transsilvaniam, Croatiam (Adriaticam), Belgium.

E speciebus *Araneo cucurbitino* similibus Europam inhabitat etiam *Araneus proximus* (Kulcz.), quem olim secundum marem a Dre B. Dybowski in Camtschadaliâ lectum descripsi¹⁾. Marem huius speciei in Norvegiâ captum dono mihi dedit Cel. Embr. Strand. *Araneus mediocris* (Kulcz.)²⁾ probabiliter femina huius speciei est. Fortasse etiam in Galiciâ occurrit haec species: inter araneas in Galiciâ collectas, quas olim pro *A. cucurbitino* habui, inveni non solum exempla multa *A. opisthographi*, sed etiam marem et feminam *A. proximi*; parum probabile mihi videtur, exempla haec extra Poloniam lecta et casu quodam inter Polonica iniecta esse.

Alia species per orbem terrarum multo latius diffusa, quam archnologis videtur, *Araneus Westringii* (Thor.) est; hic non solum Europam septentrionalem et mediam et Asiam septentrionalem, sed etiam Americam septentrionalem incolit: *Epeira displicata* Hentz, quam Cel. H. C. Mc Cook pro varietate *Aranei cucurbitini* habuit³⁾, secundum exempla olim mihi a Dre G. Marx communicata adeo

¹⁾ *Epeira proxima* Kulcz. 1885. Araneae in Camtschadalia a Dre B. Dybowski collectae (Pamiętnik Wydziału matem.-przyrodn. Akademii Umiej. w Krakowie, vol. XI), pag. 19, tab. IX, fig. 1.

²⁾ *Epeira mediocris* Kulcz. 1901 in: Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy, vol. II, pag. 332, tab. XII, fig. 21.

³⁾ Mc. Cook, American Spiders and their Spinningwork, vol. III, 1893, pag. 150.

parum differt ab *Araneo Westringii*, ut speciei propriae adscribi non possit. *Araneus Westringii* itaque *Ar. displicatus* (Hentz) 1847 appellandus est. *Epeira ornata* Blackw. nimis dubium synonymum huius speciei mihi videtur propter scapum epigynae, qui longus describitur¹⁾.

Praeter has species tres alii Europae incolae, *Ar. cucurbitino* similes, prolati sunt ab auctoribus: *Araneus alpicus* (L. Koch), *A. inconspicuus* (E. Sim.), *A. silesiacus* (Fick.)²⁾. Prodebunt in lucem fortasse alii: Femina quaedam in regione Adriaticâ Croatiae capta et in „Araneae Hungariae... conscriptae a C. Chyzer et L. Kulczyński“, vol. I, pag. 131, ut *Epeira cucurbitina* prolata, neque *A. cucurbitino*, neque, ni fallor, ulli e speciebus ad hoc tempus descriptis subiungi potest. Novo nomine, *A. croaticus* m., speciem hanc ornandam censeo, quamquam marem eius, eheu, non novi.

Quum omnes hae species inter se valde sint similes, notae vero, quae ad eas distinguendas utiles esse possunt, nondum exhaustae videantur, descriptiones earum aliquatenus supplendas censeo. Tacitum praeteribo *Araneum silesiacum* (Fick.), quem non novi et qui dubia species mihi videtur: secundum descriptionem scapi epigynae, qui latior quam longior esse et plicis transversis carere dicitur, araneam hanc pro exemplo nondum adulto *Ar. alpici* (L. Koch) habuerim. Attingam *Araneum Cossoni* (E. Sim.)³⁾ Tunetanum, cuius feminam et marem (nondum descriptum), una cum exemplo typico *Ar. inconspicui* in montibus Pyrenaeis lecto, communicavit mihi Cel. E. Simon, fautor meus benignissimus, quem rogo, gratias meas maximas accipiat.

Mares.

Ad distinguendos mares specierum, de quibus agitur, — plurimorum saltem, — notas optimas stemma⁴⁾ praebet. In palpo porrecto,

¹⁾ J. Blackwall, A History of the Spiders of Great Britain and Ireland, pag. 346.

²⁾ C. Fickert, Verzeichniss der schlesischen Spinnen (Zeitschrift für Entomologie, Breslau, 1876) pag. 70.

³⁾ Exploration scientifique de la Tunisie. Étude sur les Arachnides... Paris 1885, pag. 23.

⁴⁾ Brevitati studens, organum copulationis maris, parti tarsali insertum, „stemma“ (stema Mengei) appellabo; ut autem talia loquendi genera dura et inepta, ut „pars apicalis partis basalis“ cet. evitem, partem eam stemmatis, quam Menge partem basalem nominavit, Cel. E. Simonium sequens, bulbum dicam.

desuper viso, e stemmate bulbus solus conspicitur, in spiram contortus, striatus, scutum paene aequabiliter convexum, paullo oblongum formans. Apex partis huius latus anticum stemmatis et latus anticum exterius occupat, foras et retro plus minusve productus, plerumque corneus et obscure coloratus. Cum anfractu apicali bulbi, prope apicem intus, pars quaedam plerumque coniungitur, plus minusve membranacea, quam conductorem emboli appellabo, quamquam non satis mihi persuasum est, partem hanc revera conductorem esse. Pars „terminalis“ stemmatis e tribus constat processibus, subter in bulbo sitis; eorum duo in latere interiore initium capiunt, foras fere directi sunt; e processibus his posterior embolus est, anteriorem processum phylloidem appellabo; processus tertius, lateri exteriori et basi bulbi propior, intus directus, plus minusve anteriora versus curvatus, manifesto „retinaculum“ (Menge) quoddam est. In stemmate ab imo viso processus tres commodo commemorati in eius parte anteriore conspiciuntur, basis emboli et processus phylloidis plerumque margine laminae tarsalis, basis retinaculi vero conductore emboli et apice bulbi plus minusve occultatur; in fronte processuum et in latere exteriori anfractus apicalis bulbi conspicitur.

Araneus cucurbitinus typicus, *opisthographus*, *maderianus*, *A. Cossoni*, *proximus*, *displicatus* formâ bulbi inter se similes sunt valde et insigniter eâ differunt ab *A. alpico* et *A. inconspicuo*.

Aranei cucurbitini typici (fig. 1) „retinaculum“ spina est cornea, apicem versus fortius indurata et obscurior, quam in parte basali, gracilis, a basi apicem versus parum inaequabiliter angustata, apice acuta, inaequabiliter curvata: a basi intus (et paullo retro) directa, paullo pone medium subito anteriora et paullo interiora versus flexa, prope apicem leviter interiora versus curvata. In parte basali leviter scabrum est hoc retinaculum, in apicali laeve, lineâ rectâ basim cum apice coniungenti dimensum ca. 0.30 mm longum; apex eius laminam tarsalem non attingit. Embolus, a parte inferiore visus, elongatus, a basi usque ad apicem paene aequabiliter angustatus, acutus, basi pallidus, apicem versus induratus et corneus. Processus phylloides totus pallidus, membranaceus, elongato lanceolatus fere, in parte basali angustior quam embolus, apicem versus primo leviter dilatatus, tum angustatus, apice obtusiusculus. Conductor emboli cum margine interiore anfractus apicalis bulbi, ante eius apicem, connatus, formam membranae crassiusculae habet, maximam partem sat mollis, paullo oblongae, foras et retro directae, recurvatae, late-

ribus fere parallelis, apice rotundatae. Margo apicalis conductoris deorsum reflexus est; pars haec reflexa extrinsecus in mediâ fere latitudine carinulâ ornatur corneâ brevi sat altâ, in longitudinem directâ, lateri antico, cui propior est, parallelâ. Margines conductoris anticus et posticus apicem versus item cornei sunt et extrinsecus paullo prominent (anticus saltem) ita, ut conductor certo situ (fig. 15) desinere videatur in denticulos tres corneos, quorum anticus et medius melius expressi sunt et spatio minore inter se distant quam denticulus medius a postico. Anfractus apicalis bulbi ab imo adspetus crasse falciformis videtur, apice acutus; revera anfractus hic in parte anticâ bulbi triqueter est, margine antico superiore acuto, antico inferiore crasso, obtuso, quasi tumido, sed ultra reliquas partes bulbi non prominenti, quum ab imo adspicitur. Partem exterioriorem versus margo anticus inferior, compressus, in carinam abit acutam, optime evolutam, aequabiliter arcuatam; carinâ haec cum margine antico superiore coniungitur non procul ab apice anfractus, qui itaque e triquetro omnino compressus, lamelliformis fit (fig. 11). Carinâ commemoratâ et marginibus anfractus area definitur fere semicircularis, concava, dense et subtiliter oblique striata similem in modum atque pars anfractus carinae et margini antico superiori interiecta; margo apicalis interior anfractus deorsum deflexus est. A parte exteriori inferiore summus apex anfractus obtusus videtur. Margo anfractus anticus superior in parte bulbi anticâ, acute excisus, dente ornatur parvo, formâ varianti, obtuso, foras directo.

Stemma maris, quem nomine *Aranei Cossoni* signatum communicavit mihi Cel. E. Simon, nullâ re a stemmate *A. cucurbitini* differre mihi videtur, nisi carinâ anfractus apicalis bulbi, non aequabiliter fere curvatâ, sed in angulum latum acutum fracta (fig. 13). Dens, quo margo anticus superior anfractus apicalis ornatur, in altero palpo exempli huius sat bene evolutus, in altero fere nullus¹⁾.

Aranei cucurbitini opisthographi (fig. 2) embolus et processus phylloides eâdem fere sunt formâ atque in *typico*, processus phyl-

¹⁾ Aranea haec non solum formâ stemmatis sed etiam omnibus aliis partibus adeo similis est *A. cucurbitino typico* (sternum eius non obscurius coloratum est quam coxae, metatarsi anteriores non differunt armaturâ a metatarsis *A. cucurbitini*), ut addubitari possit, an revera sit mas *Aranei Cossoni*, cuius femina — etiam simillima *A. cucurbitino typico* — ab eo armaturâ metatarsorum anteriorum insigniter differt.

loides modo fortasse apicem versus minus evidenter angustatus, apice magis obtusus, obscurior apicem versus; differunt: retinaculum, conductor emboli, anfractus apicalis bulbi. Retinaculum spinam similem quidem format, sed longiorem, ca. 0.40 mm longam (in palpo non distorto apex retinaculi fortasse constanter margine laminae tarsalis occultatur), fere aequabiliter et minus fortiter curvatam, apicem versus non aut vix sinuatam; non aequabiliter a basi ad apicem attenuata est haec spina, sed medium versus subter leviter tumida, evidentius et in maiore parte scabra. Conductor emboli ut in *A. cucurbitino typico* situs, membraniformis, apicem versus incrassatus, apice acuminatus potius quam rotundatus et deflexus, extrinsecus carinulâ corneâ simili ornatus, sed longiore; margo anticus conductoris, corneus, compressus, carinam alteram format, versus carinam mediam curvatam et in apice conductoris cum eâ coniunctam aut eam attingentem saltem; margo posticus anteriora versus curvatus, non induratus, in palpo ab imo viso dentem evidentiore non format. Anfractus apicalis bulbi similis atque in *A. cucurbitino typico*, sed eius margo anticus superior in apice bulbi obtuse modo excisus est, dente itaque minus expresso ornatur (an constanter?); margo anticus inferior item tumidus, sed in parte exteriori evanescens, neque carinâ acutâ cum margine antico superiore coniunctus; deest itaque in apice anfractus huius cavum illud semilunare, margine elevato circumdatum, quo ornatur forma typica; pars cavo huic respondens prope apicem minus evidenter striata, loco ab apice magis remoto verum fortius et magis inaequaliter quam in formâ typicâ plicata.

Araneus cucurbitinus maderianus (fig. 3) formâ retinaculi, ca. 0.40 mm longi, modice et paene aequabiliter curvati, sub marginem laminae tarsalis ingredientis, non differt fere a subsp. *opisthographâ*; modo minus evidenter tumidum est retinaculum medium versus. Conductor emboli contra fere eâdem est formâ atque in *A. cucurbitino typico*, quoniam margo eius posterior apicem versus sat late corneus in palpo ab imo viso prominet et dentem format manifestum; carina cornea, quâ margo anterior conductoris ornatur, fortius evoluta, quam in subsp. *typica* esse solet, et usque fere ad carinam mediam producta. Anfractus apicalis bulbi etiam similior parti respondenti *A. cucurbitini typici* quam *opisthographi*, carinâ acutâ ornatus tumorem subter situm cum margine externo coniungenti; carina haec in ambobus exemplis, quae vidi, paullo altior et fortius com-

pressa in parte basali quam in subsp. *typicâ*, in parte hac bene a tumore distincta, neque in eum sensim abiens. Pars anfractus carinae et apici interiecta acute plicata, sive carinulis tribus aut quatuor acutis, optime expressis ornata (an constanter?).

Araneus proximus fabricâ stemmatis (fig. 4) valde similis est *A. cucurbitino typico* et imprimis *opisthographo*. Retinaculum eâdem est fere formâ atque in *opisthographo*, sed longius, ca. 0.50 mm longum (apex eius difficiliter conspicitur, in palpo non distorto enim laminâ tarsali occultatur), parte apicali sat brevi exceptâ scabrum. Conductor emboli similem in modum atque in prioribus cum anfractu apicali bulbi coniunctus, magnam partem membranaceus, apicem versus incrassatus, latere antico, quum ab imo adspicitur rotundato-dilatato; apicem versus margo hic corneus, in carinam acutam compressus, cum parte marginis apicalis, item cornei et compressi, in angulum plus minus rectum coniungitur. In paginâ exteriori partis apicalis deflexae conductor emboli carinulâ ornatur corneâ, in longitudinem paullo oblique positâ, humili, minus quam in prioribus perspicuâ, et ad eam, lateri postico propius, dente corneo compresso triangulari altiore, proxime a latere antico verum carinulâ humillimâ, margini huic parallelâ, quae difficiliter conspicitur. Certo situ apex conductoris quadridentatus videtur (fig. 14), denticulis duobus anterioribus humilibus, primo lato obtuso, secundo acuto, dente tertio maiore obtuso, quarto (postico) adhuc maiore et acuto. Anfractus apicalis bulbi ut in prioribus excisus sinu rectangulo fere; in parte interiori sinus huius non in carinam compressus ut in illis, sed crassus et in tuber elevatus (fig. 10), quod in palpo ab imo viso insigniter prominet; pone sinum margo compressus et acutus est. Tumor, in quem inflatus est margo anticus inferior anfractus apicalis, similis atque in *opisthographo*, in parte exteriori non productus in carinam.

Aranei displicati Europaei (*A. Westringii*) (fig. 5) retinaculum simile atque in prioribus, spinam format corneam, minus gracilem, modice curvatam, apicem versus similem in modum atque in *A. cucurbitino typico* sinuatam, modice compressam, in parte apicali magnâ laevem, in basali scabram, ca. 0.40 mm longam, laminam tarsalem non attingentem (an constanter?). Processus phylloides parum pallidior quam embolus, ab imo visus prope medium ca. 0.065 mm crassus, a basi medium versus levissime incrassatus, tum longius et fortius attenuatus, in apicem longum tenuem desinens, in

universum ab embolo crassitudine non multum differens¹⁾. A fronte visus processus phylloides (fig. 12) ubique ca. 0.065 latus, apice paullo oblique truncatus. Conductor emboli non cum margine interiore sive postico anfractus apicalis bulbi, sed cum eius latere inferiore connatus, maiore ex parte membraniformis fere, in parte posticâ incrassatus; magnam partem deorsum directus est conductor emboli, valde inaequalis; latus eius anticum valde breve, cum margine apicali, qui late concavus est, arcu lato coniunctum; latus posticum basi profunde concavum, apicem versus inaequaliter fortiter convexum, cum margine apicali angulum format plus minusve acutum²⁾. Carinis corneis in paginâ exteriori caret conductor emboli. Facilius quam retinaculi et conductoris formâ distinguitur *Ar. displicatus* a praecedentibus anfractu apicali bulbi; hic a fronte visus (fig. 12) multo minorem partem bulbi occupat quam in illis, laevis, neque striis obliquis in parte apicali ornatus, subter non tumidus. Pars apicalis anfractus huius ab imo visa rostrum format acutum, magis fere foras quam retro directum, latere postico fere in transversum, latere antico — parum curvato — paribus fere angulis retro et foras directo, quum in praecedentibus rostri, in quod desinit anfractus apicalis bulbi, apex retro aut magis retro quam foras directus et latus exterius arcuatum sit. Pars anfractus huius ab apice magis remota latior est extrinsecus, obtusa; inter partes: basalem latior et apicalem compressam anfractus hic dente aut angulo parvo ornatur in limite inter parietem externum et superiorem, qui dens melius a parte anticâ quam ab inferiore conspicitur.

Stemma *Aranei displicati* Americani non differt, ni fallor, a stemmate *Ar. Westringii* nisi denticulo anfractus apicalis bulbi melius evoluto (an constanter?; huius formae unum exemplum et *Aranei Westringii* tria modo exempla vidi).

Aranei alpici (fig. 7) retinaculum spina est cornea, 0.50 mm saltem longa, parum aut vix curvata, quum ab imo adspicitur, in parte basali mediocriter compressa, scabra, in parte apicali fortiter compressa, laevis, paullo ante medium in latere antico ramo ornata brevi

¹⁾ Figura 5 nostra processum hunc a parte inferiore simulque paullo a fronte visum repraesentat.

²⁾ In figura 5 latus anticum conductoris cum margine apicali in lineam sigmoideo curvatam coniungitur, latus posticum brevius videtur, quam revera est.

lato obtuso, fortiter compresso, scabro, parum divaricanti, cum corpore retinaculi, cui basi latâ adnatus est, sulcum profundum includenti; apex retinaculi sub laminam tarsalem ingreditur et eâ occultatur. Processus phylloides basi insigniter latior quam basis emboli (ca. 0.22 mm latus), paullo pone basim in latere antico subito angustatus, ceterum autem latitudine maximam partem subaequali (ca. 0.13 mm), ad apicem in latere antico leviter angustatus, apice truncatus et leviter emarginatus. Pars anfractus apicalis bulbi, quae in apice stemmatis conspicitur, formam fere dimidii disci utrimque concavi habet; paries externus disci huius (fig. 6), in longitudinem in arcum paullo inaequabilem curvatus, in transversum concavus est et transverse inaequabiliter non dense plicatus; margo disci anticus inferior corneus, compressus, extrinsecus dense oblique crenatus; prope ab apice processus phylloidis hic limbus crenatus evanescit et paries externus lamellâ ornatur corneâ; lamella haec fere semilunaris est, in margine apicali medio incisa, transverse posita, reclinata, basi deorsum curvatâ totam latitudinem parietis occupat. Conductor emboli similis atque in proribus deest.

Stemma *Aranei inconspicui* (fig. 8, 9) simillimum est stemmati *A. alpici*, sed minus et in partibus quibusdam quasi minus evolutum; retinaculum modo 0.35 longum, processus phylloides a fronte visus ca. 0.27 (in *A. alpico* ca. 0.45), latitudo maxima anfractus apicalis a fronte adspecti 0.40 (in *A. alpico* 0.60). Totum stemma desuper visum ca. 0.6 longum, ca. 0.4 latum est in *A. inconspicuo*, ca. 0.7 longum et 0.6 latum in *A. alpico*, margo inferior laminae tarsalis in illo 0.52, in hoc 0.63 longus. Cum longitudine suâ comparatum stemma latius est itaque et partes suae apicales maiores in *A. alpico*, quam in *A. inconspicuo*. Ad formam differunt paullo processus phylloides et lamella in pariete externo anfractus apicalis bulbi sita; ille, a fronte visus, a basi usque ad apicem fortius et fere aequaliter angustatus est, apice, ni fallor, obtusus; lamellae commemoratae margo apicalis non incisus in medio.

Mares, de quibus agitur, differunt inter se ex parte formâ paracymbii. Haec appendix laminae tarsalis in *Araneo cucurbitino typico* foras et paullo retro directa est, subito sursum curvata, parte sursum directâ fortiter compressâ, apice vero in bullam subito dilatâtâ deplanatam, in lateribus et ante prominentem, oblique positam: in partem interiorem inclinatam. Eâdem aut fere eâdem formâ est para-

cymbium *Aranei cucurbitini opisthographi et maderiani, A. Cossoni, proximi*; in hoc modo bulla apicalis ultra scapum non evidenter prominet in latere interiore. In *Araneo alpico et inconspicuo* bulla apicalis non deplanata, sed a lateribus fortiter compressa est, paracymbium a parte posticâ adspertum apice parum modo, a latere adspertum modice aut leviter in latere antico dilatatum videtur. Paracymbium *Aranei displicati* prope apicem in angulum rectum anteriora versus fractum est; angulus ipse fortiter in carinam acutam compresus, pars anteriora versus directa verum leviter modo compressa, apice obtusa.




Fig. 1.

Apex paracymbii sinistri a parte posticâ visus: *a* — *Aranei cucurbitini*, *b* — *A. proximi*, *c* — *A. alpici*, *d* — *A. displicati* (*Westringii*); idem a latere visus: *e* — *A. alpici*, *f* — *A. displicati*; pars tibialis palpi sinistri a latere inferiore interiore visa: *g* — *Aranei alpici*, *h* — *A. inconspicui*, *i* — *A. displicati* (Americani), *k* — *A. displicati* Europaei (*A. Westringii*), *l* — *A. cucurbitini*, *m* — *A. proximi*.

Araneus displicatus insignis est parte tibiali palporum in latere interiore in processum productâ aequè circiter atque processus exterior longum, sed tenuiorem, apice obtusum; processus a parte posticâ magis cylindratus, a latere magis conicus videtur. Reliquae species carent tali processu.

Processus partis tibialis subter in latere exteriorè situs non eâdem est formâ in singulis speciebus, sed parum prodest ad eas distinguendas. A parte inferiore interiore visus in formis *Aranei cucurbitini* et in *Araneo Cossoni* longior est quam latior, circiter in $\frac{1}{3}$ basali leviter dilatatus in latere postico, tum inaequaliter angustatus latere postico recto, antico arcuato, apice obtusus, in *A. proximo* latior quam longior, in parte basali minore leviter dilatatus, tum in latere antico arcuato, in postico rectâ fere lineâ subito angustatus, apice late obtusus; in *A. Westringii* aequè circiter longus ac

latus, in parte basali minore leviter dilatatus fortius pone quam ante, tum in latere antico lineâ rectâ fere, in latere postico, quod in angulum manifestum fractum est, sinuato angustatus; in *A. displicato* similis, sed paullo longior quam latior, minus evidenter dilatatus basi et minus angustatus apicem versus, latere postico parum angulato, apice latius obtuso; in *A. alpico* insigniter latior, a basi usque circiter ad medium dilatatus fortius pone quam ante, tum inaequaliter rotundato-truncatus, latere antico a basi usque ad apicem inaequaliter rotundato, latere postico in angulum rectum fere fracto; in *A. inconspicuo* similis atque in *A. alpico*, angulo lateris postici latiore et magis obtuso.

E notis, quae ad species *Araneo cucurbitino* similes distinguendas adhibebantur, non omnes satis certae et sibi constantes sunt. Cephalothorax *Aranei Westringii* in mare vittis lateralibus nigricantibus, quales cephalothoracem *Ar. cucurbitini* ornant, carere dicitur et revera caret nonnunquam aut fortasse plerumque, sed non constanter: mas huius speciei ad Bonnam a Dre Ph. Bertkau lectus et mas Americanus carent vittis eis, quae contra optime expressae sunt in exemplis duobus aliis, quae vidi, altero in Galiciâ, altero in Sibiâ septentrionali capto. — Armatura lateris inferioris femorum III et IV, qua differre inter se dicuntur mares *A. cucurbitini* et *A. alpici*, insigniter mutabilis est in *A. cucurbitino typico* et *opisthographo* saltem (harum formarum solum mares sat multos, reliquarum autem perpaucos modo vidi). Occurrunt mares subsp. *typicae* femoribus III subter aculeis, praeter apicales, duobus tantum, femoribus IV aculeis tribus, imo duobus modo fortibus et tertio tenui, armatis; subsp. *opisthographa* fortasse minus variat hac in re, sed etiam in ea series aculeorum saepe apicem femorum longe non attingunt¹⁾.

Feminae.

Araneus cucurbitinus typicus. Corpus epigynae (fig. 16) ca 0.5 longum, ca. 0.6 latum, non multo itaque latius quam longius est

¹⁾ Secundum Cel. E. Simonium (Les Arachnides de France, vol. I, pag. 49) tibia IV *Ar. cucurbitini* ornatur intus serie aculeorum totam longitudinem occupanti, *Ar. alpici* vero aculei respondententes dimidium basale internodii eius occupant. Nonne lapsus calami?

sed plerumque in abdomen plus minusve impressum multo latius quam longius videtur; complanatum est, ca. 0.4 mm crassum, a parte inferiore visum a basi apicem versus modice dilatatum lateribus fere rectis, apice late rotundatum; a latere visum apicem versus paullulo angustatum, apice oblique rotundatum, latere postico fere recto. Paries inferior corporis in transversum convexus, transverse striatus, striis recurvatis. Pone, in apice epigynae, excisus est hic paries pro receptione scapi in sinum latum, brevem, circiter 0.08 mm modo longum. Supra, in pariete cum ventre contingenti, corpus epigynae in partes tres divisum est, mediam et laterales; harum utraque limbum format insigniter latum (ca. 0.15 mm), corneum, obscure coloratum, laevem, fere libratum, inaequaliter incurvatum; pars media ad basim corporis aequae elevata atque partes laterales, in parte posteriore verum, multo maiore, plus minusve impressa ita, ut corpus epigynae hic foveâ ornatum dici possit hexagonâ, in lateribus optime, ante (basim corporis versus) vero parum definitâ, pone apertâ et scapo epigynae modo clausâ, ca. 0.23 longâ, 0.27 latâ. Fovea haec a parte latissimâ posteriora versus brevius et fortius angustata est quam anteriora versus. Scapus epigynae (fig. 25) valde brevis, ca. 0.23—0.26 latus, 0.16 longus (quum a parte posticâ adspicitur), usque ad partem apicalem deflexam latitudine aequali, transverse plicatus, apice late rotundatus et concavus ita, ut hic foveâ ornetur transversâ, aequae atque pars basalis scapi latâ. Scapi pars basalis sinum apicalem corporis replet et in eum ita impressa est, ut sub lente acutâ tantum distinguatur; prominet pars apicalis excavata sola.

Epigynè *Aranei Cossoni* omnino eâdem est formâ atque *Ar. cucurbitini typici*.

Aranei cucurbitini opisthographi femina adeo similis est formae typicae non solum aliis partibus sed etiam epigynâ, ut ab eâ difficiliter distinguatur, imo occurrunt, quamquam raro, exempla, quae utri subspeciei sint subiungenda, vix decerni potest. Epigyna his modo rebus distincta mihi videtur: foveae, quâ paries superior corporis ornatur (fig. 20), latera plerumque arcuata potius quam in angulum fracta, fovea itaque rotundata potius quam hexagona, in parte mediâ fere, neque in posteriore latissima (nota parum perspicua et non satis constans), posteriora versus non aut parum fortius angustata quam anteriora versus. Scapus (fig. 23, 26) longior: aequae latus ac longus aut longior quam latior (ex. gr. 0.24 mm longus

et latus; 0·27 lg., 0·24 lat.; 0·24 lg., 0·19 lat.; 0·31 lg., 0·21 lat.), formâ varians; quum aequè longus est ac latus, pone basim latissimus, basim et apicem versus leviter angustatus, parte apicali concavâ manifesto angustiore quam pars basalis; si longior est, latitudine parum inaequali esse solet; saepissime minus impressus est scapus in sinum apicalem corporis et pars eius basalis facilius conspicitur a latere quam in priore; ultra corpus epigynae non solum apex excavatus, sed etiam pars quaedam ei vicina prominet plerumque. Corpus epigynae plerumque plus minusve deorsum directum est in hac subspecie, in formâ typicâ vero plerumque ventri adpressum.

Feminam *Aranei cucurbitini maderiani* ab exemplis subsp. *opisthographae* (scapo epigynae brevi ornatis) distinguere nescio.

Paries superior epigynae etiam in *Ar. displicato* (et *Westringii*) et *croatico* sulcis duobus longitudinalibus divisus est in tres partes, quarum lateralis utraque limbum similem format atque in *Ar. cucurbitino*; pars media apicem versus dilatata lateribus plus minusve rotundatis. In *Ar. displicato* (fig. 19) pars media, tota cornea, etiam plana est et aequè atque laterales elevata, in parte posteriore sulco ornata longitudinali, vadoso aut profundiore, nonnunquam prope apicem corporis in ramos duos fortiter divaricantes divisio. Corpus epigynae ca. 0·45 longum, 0·52 latum, 0·35 crassum, ab imo visum (aut a fronte, plerumque enim deorsum directum est) lateribus paene parallelis, apice — cuius pars maxima scapo tegitur — leviter angustatum; a latere adspectum supra planum, apice oblique truncatum, margine apicali cum latere inferiore in angulum latum et rotundatum coëunt. Scapus (fig. 24) in angulo commodum commemorato initium capit, apice in foveam excavatus, ceterum in transversum subplanus, transverse striatus, utrimque limbo sat crasso, paullulum elevato, obtuso, basim versus evidentiore, nonnunquam evanescenti ornatus, formâ paullo varians, corpore nonnunquam parum, nonnunquam evidenter, sed non dimidio, angustior (ex. gr. 0·48, 0·44, 0·37 latus), parum aut insigniter longior quam latior (0·52, 0·55, 0·45 latus), basi late truncatus, ceterum modo ovatus et apice lateribus leviter sinuatis aut rectis acuminatus, modo triangularis fere lateribus paullo inaequalibus, modo denique circiter in $\frac{2}{3}$ lateribus fere parallelis et apice subito angustatus. A latere visus scapus parieti apicali corporis non adpressus et modo paene rectus, modo sat fortiter sinuatus. Feminae Americanae unice, quam vidi, corpus epi-

gynae idem atque in exemplis Europaeis, scapus 0·55 longus, 0·39 latus, et fere aequabiliter angustatus, parte apicali, ca. 0·13 longâ, abrupte angustiore, hac parte exceptâ totus margine paullulo elevato limbatus.

Aranei croatici epigyna (fig. 22) insigniter minor quam *A. displicati*; eius* corpus 0·35 longum, 0·42 latum, simile atque in hac specie, sed apice transverse truncatum, quum a latere adspicitur (an constanter?), lamella media parietis superioris paullulo humilior lateralibus. Scapus (fig. 30) ut in priore innatus, 0·25 latus, corpore itaque plus dimidio angustior, 0·32 longus, lateribus arcuatis, nullum vestigium limbi marginalis, sulco intus definiti, ostendens, latitudine insigniter inaequali, basi leviter constrictus, ad partem apicalem, quae in foveam excavata est, item constrictus, sive apice paullo latior quam prope eum. (Unicum modo exemplum huius speciei vidi; formâ scapi variat ea certo).

In *Araneo mediocri* (Kulcz.), quem feminam *Ar. proximi* censeo, pars media parietis superioris corporis epigynae (fig. 17), ut in praecedentibus omnibus, partes laterales excedit latitudine in dimidio apicali epigynae; insignis est vero haec femina partibus lateralibus parietis eiusdem declivibus, neque libratis, praesertim apicem epigynae versus, ita, ut partes hae in epigynâ levatâ a parte posticâ adspectae apice angustatae et acutae videantur, neque usque ad apicem latitudine subaequali et apice rotundatae aut truncatae, ut in prioribus. Pars media parietis superioris, basi exceptâ, impressa, apice incisa, cordiformis; margines interiores partium lateralium apicem versus paullulo modo incurvati. Corpus epigynae 0·37 mm longum, 0·53 latum, 0·34 crassum (crassius itaque quam in prioribus), a latere visum apice fere transverse truncatum, ab imo visum lateribus fere parallelis, apice utrimque rotundatum, in parte mediâ scapo tectum. Scapus (fig. 29) in angulo inter parietem inferiorem et apicalem initium capit, 0·24 latus, 0·44 longus est, in $\frac{2}{9}$ latissimus, basim versus et apicem versus modice angustatus, in $\frac{1}{3}$ apicali latitudine fere aequali et circiter dimidio angustior quam in parte latissimâ, apice subter in foveam transversam excavatus, in parte latissimâ in transversum fere planus, limbo simili atque in *Ar. displicato* carens, a latere visus parieti apicali corporis adpressus, ultra eum insigniter prominens, sinuatus. (Etiam huius speciei feminam unam modo in manibus habeo. In feminâ, quam superiore tempore ut *Ar. mediocrem* descripsi, scapus ca. 0·40 longus, 0·24 latus,

latitudine ubique subaequali, a basi apicem versus paullulo modo angustatus est).

Araneus alpicus et *A. inconspicuus* differunt a praecedentibus omnibus formâ parietis superioris corporis epigynae; pars eius media multo angustior est, apicem versus parum modo dilatata, multo angustior quam partes laterales, quae sublibratae sunt. Corpus epigynae in plerisque exemplis *Ar. alpici* (fig. 21), quae vidi, circiter 0.40 longum, 0.48 latum, 0.37 crassum est, a parte exteriori visum latere superiore recto, inferiore sigmoideo, apicem versus plus minusve incrassatum, apice transverse truncatum aut oblique truncatum angulo inferiore producto; ab imo ad spectum lateribus paene parallelis aut apicem versus paullulum dilatatum, apice fere toto basi scapi tecto. Scapus (fig. 27, 31) basi 0.37—0.39 latus, longitudine et formâ insigniter varians: 0.42—0.57 longus; a basi apicem versus angustatus est scapus, lateribus crenatis, ceterum autem paene rectis aut parum sinuatis, triangulum format transverse plicatum, pilosum, modo aequilaterum, modo paullo humiliter, modo denique aequae fere altum atque basi latum; apex trianguli huius cum parte apicali scapi, subter profunde excavatâ, circiter 0.12 latâ, collo coniungitur molliore, non piloso, quod manifeste contrahi et extendi potest; contractum non conspicitur (fig. 27) aut valde breve est, fortiter plicatum, parte apicali scapi parum angustius, extensum vero usque ad 0.13 longum, leviter modo plicatum, pallidum, dimidio angustius quam apex scapi. — Variat haec species non parum magnitudine epigynae; in exemplo quodam ad Marillavölgy (Hungaria meridionalis) lecto corpus epigynae 0.40 longum, 0.56 latum, 0.34 crassum est, scapus basi 0.45 latus, 0.53 longus; in alio, in Galiciâ mediâ capto, corpus epigynae modo 0.26 longum, 0.32 latum, 0.21 crassum, scapus basi 0.23 latus, 0.24 longus (adeo contractus, ut „collum“ non conspicitur).

Unicae feminae *Aranei inconspicui* (ad Bonnam lectae), quam subtilius examinare potui, epigyna (fig. 18) nullâ re evidentiore ab epigynis parvis *Ar. alpici* differre videtur. Corpus eius 0.24 longum, 0.35 latum, 0.24 crassum, a latere visum apicem versus non evidenter incrassatum, apice transverse truncatum; scapsus parum angustior basi quam corpus: 0.29 latus, 0.32 longus, apice 0.095 latus, ad formam similis scapo *Ar. alpici*, parte basali circiter dimidio latiore quam longiore, collo modice elongato, non angustiore quam apex. Epigyna exempli typici e Hispaniâ septentrionali, quod mihi

Cel. E. Simon benigne communicavit, paullo maior videtur, corpore 0·39 lato, scapo (fig. 28) basi 0·34 lato et aequae circiter longo, in parte apicali 0·13 lato.

Praeter formam epigynae paucae modo notae plus minusve utiles esse possunt ad distinguendas feminas *Araneo cucurbitino* similes, ex. gr. armatura metatarsorum anteriorum et sternum colore fulvo suffusum in *Araneo Cossoni* (cfr. descriptionem Cel. E. Simonii loc. cit.), pictura dorsi abdominis, quae tamen, quoad e colore rubro constat (in *Ar. displicato*), evanescit in exemplis diu in spiritu vini conservatis, puncta nigra, quibus dorsum abdominis in parte posteriore laterum ornatur, color ventris.

Magnitudo et situs oculorum variant non parum in nonnullis saltem speciebus, et hanc ob causam generatim non multum est eis tribuendum. In *Araneo Cossoni* (feminâ), quam communicavit mihi Cel. E. Simon, diameter oculorum mediorum posticorum 0·13 mm explet, anticorum 0·115 mm, intervallum illorum 0·13, horum 0·16, latitudo areae oculorum mediorum postica 0·37, antica 0·355, longitudo 0·42 mm explet. In feminis quatuor *Ar. cucurbitini typici* modos responentes hos inveni:

0·13,	0·09,	0·10,	0·135,	0·34,	0·30,	0·34,
0·115,	0·10,	0·095,	0·12,	0·32,	0·31,	0·34,
0·12,	0·095,	0·09,	0·145,	0·32,	0·33,	0·345,
0·115,	0·09,	0·115,	0·16,	0·33,	0·32,	0·37.

Oculi medii postici itaque non solum in *A. Cossoni* sed etiam in *A. cucurbitino* maiores sunt quam medii antici; intervallum eorum in *A. cucurbitino* diametro modo aequale — ut in *A. Cossoni*, modo eâ minus, area oculorum mediorum modo aequae longa, modo — ut in *A. Cossoni* — evidenter longior quam pone latior.

Similem in modum atque in *A. cucurbitino typico* variant oculi medii in subsp. *opisthographa*.

Aranei cucurbitini maderiani area oculorum mediorum ante paululo magis dilatata est, quam in subsp. *typica* et *opisthographa* esse solet; eius moduli hi sunt:

0·115, 0·095, 0·095, 0·145, 0·31, 0·34, 0·36.

Araneus croaticus non differt ab *A. cucurbitino* modulis oculorum mediorum:

0·12, 0·095, 0·095, 0·135, 0·315, 0·315, 0·355.

Oculi medii *A. proximi* variant paullo; in exemplo, quod in Galiciâ lectum credo, moduli eorum hi sunt:

0·115, 0·085, 0·115, 0·145, 0·315, 0·30, 0·34;

feminae vero ad Baltim in Siberiâ lectae (*Ar. mediocris* Kulcz.) area oculorum mediorum paullulo latior est ante quam pone.

Araneus alpicus et *inconspicuus* differre paullo videntur inter se oculis mediis, quorum area (fortasse paullo magis declivis et) ante paullo magis dilatata est in *A. inconspicuo* (cuius exempla tamen duo tantum vidi!), quam in *A. alpico*¹⁾. Modi supra dicti hi sunt in exemplis duobus *A. inconspicui* (quorum primum typus speciei est, secundum vero ad Bonnam lectum est a Dre Ph. Bertkau) et in exemplis quatuor *A. alpici*:

A. inconspicuus:

0·115, 0·115, 0·12, 0·195, 0·33, 0·395, 0·39,
0·115, 0·115, 0·13, 0·18, 0·345, 0·395, 0·40,

A. alpicus:

0·13, 0·105, 0·095, 0·17, 0·34, 0·355, 0·37,
0·095, 0·09, 0·095, 0·17, 0·305, 0·325, 0·355,
0·12, 0·095, 0·105, 0·17, 0·315, 0·35, 0·39,
0·115, 0·085, 0·09, 0·16, 0·29, 0·325, 0·34.

Numerus punctorum nigrorum, quibus dorsum abdominis ornatur in laterum parte posteriore non idem in singulis speciebus, sed etiam non satis sibi constans:

A. cucurbitinus opithographus plerumque paribus punctorum quinque ornatur, quorum quatuor in dorso, postremum vero in pariete postico abdominis situm est; puncta postrema minora quam praecedentia et ab eis aequè circiter atque a mamillis remota; rarius deest par punctorum postremum et abdomen punctis modo octo pictum est.

Etiam *A. cucurbitinus maderianus* et *A. croaticus* ornantur punctis in pariete abdominis postico; in exemplo unico *A. croatici*, quod vidi, dorsum praeterea in uno latere punctis quatuor, in altero punctis quinque, in exemplis *A. maderiani* (duobus) utrimque punctis quinque pictum est.

¹⁾ Femina Hungarica, ut *Epeira inconspicua* prolata in „Araneae Hungariae“ vol. I, pag. 121, 131, areâ oculorum mediorum ante oculi radio tantum latiore quam pone, fortasse non *Ar. inconspicuus* est sed *A. alpicus* punctis nigris in dorso abdominis carens et maculis albidis in ventre valde indistinctis ornatus.

In *Ar. cucurbitino typico* paria punctorum plerumque quatuor, rarius tria, par postremum praecedentibus maius aut non minus saltem et a mamillis circiter duplo longius remotum quam a pari penultimo; raro etiam paries posticus punctis duobus pictus ut in subsp. *opisthographa*.

In *Ar. displicato* plerumque puncta utrimque 3, raro 4, rarissime 2, in pariete postico abdominis nulla.

Araneus alpicus saepissime punctis utrimque duobus ornatur, nonnunquam vero uno tantum, raro nullo; in uno tantum exemplo inter sat multa, quae examinavi, puncta tria vidi in uno latere, in altero dua.


Ar. inconspicuus caret punctis nigris.

Venter concolor est in subspeciebus *Aranei cucurbitini*, in *Ar. Cossoni*, *croatico*, *proximo*, *inconspicuo*; raro in *A. cucurbitino typico* et *opisthographo* vestigia macularum albidarum quatuor cernuntur. Venter *Ar. displicati*, plerumque obscure coloratus, ad epigastrium fascia transversâ albidâ et pone eam pari macularum albidarum ornatur, rarius fascia in maculas duas aut tres divulsa est. Picturae huius, evidentissimae in exemplis Sibiricis, modice expressae in exemplo Americano, nullum vestigium video in exemplis Polonicis plerisque et in exemplo Bonnensi; in nonnullis vero exemplis Polonicis venter albidus lineam mediam longam et ad eam utrimque maculas binas purius albas, obsoletas ostendit.


Araneus alpicus saepissime paribus macularum albidarum duobus ornatur in ventre, bene expressis; nonnunquam maculae anteriores inter se confluent plus minusve et ventris pictura similis fit atque in *A. displicato*; raro, praesertim in exemplis parvis¹⁾, pictura haec adeo obsolescit, ut venter concolor dici possit. Quum vero, ut supra dictum est et ut scripserunt Dr. L. Koch, T. Thorel, W. Bösenberg, etiam puncta nigra dorsualia evanescant nonnunquam in hac specie, et epigyna eius nullâ re evidentiore differat ab epigynâ *A. inconspicui*, facile crediderim feminas *Ar. alpici* et *Ar. inconspicui* difficiles nonnunquam esse ad distinguendum: occurrunt fortasse exempla harum specierum nullâ re nisi formâ areae oculorum mediorum inter se distincta.

¹⁾ Occurrunt exempla *Aranei alpici*, ♀, cephalothorace 3·1 mm longo, 2·5 lato, et 2·4 longo, 1·9 lato.







1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.



9.



10.




11.



12.




13.




14.




15.




16.



17.




18.



19.



20.




21.




22.



23.



24.



25.




26.



27.



28.



29.



30.



31.

1111



Index.

- Araneus alpicus* (L. Koch) pag. 238, 240, 241, 245, 247, 248.
A. Cossoni (E. Sim.) 235, 240, 242, 246, 248.
A. croaticus Kulcz. 233, 243, 244, 246, 247, 248.
A. cucurbitinus Clerck 231, 240, 241, 248.
 " " subsp. *maderiana* Kulcz. 231, 236, 240, 243, 246, 247.
 " " subsp. *opisthographa* Kulcz. 232, 235, 240—242,
 246—248.
 " " subsp. *typica* Kulcz. 232, 234, 239, 241, 246, 248.
A. displicatus (Hentz) 237, 240, 241, 243, 248.
A. inconspicuus (E. Sim.) 239, 240, 241, 245, 247, 248.
A. proximus Kulcz. 232, 237, 240, 244, 247, 248.
Epeira mediocris Kulcz. 232.
E. ornata Blackw. 233.
E. Westringii Thor. 232, 240, 241.

Explicatio tabulae.

1. *Araneus cucurbitinus* Clerck, subsp. *typica*, stemma (cum parte quadam laminae tarsalis) a parte inferiore visum.
2. *Araneus cucurbitinus* Clerck, subsp. *opisthographa*, stemma a parte inferiore visum.
3. *Araneus cucurbitinus* Clerck, subsp. *maderiana*, stemma (omissâ parte posticâ) a parte inferiore visum.
4. *Araneus proximus* (Kulcz.), stemma a parte inferiore visum.
5. *Araneus displicatus* (Hentz), stemma a parte inferiore visum (exempli Europaei).
6. *Araneus alpicus* (L. Koch), stemma a latere exteriori visum.
7. Eiusdem speciei stemma a parte inferiore simulque paullo a fronte visum.
8. *Araneus inconspicuus* (E. Sim.), stemma a parte inferiore visum.
9. Eadem pars eiusdem speciei a latere exteriori visa.
10. *Araneus proximus* (Kulcz.), pars antica inferior bulbi a fronte visa.
11. *Araneus cucurbitinus typicus*, bulbus a fronte visus.
12. *Araneus displicatus*, pars tarsalis palpi sinistri a fronte visa.
13. *Araneus Cossoni* (E. Sim.), pars antica bulbi ab imo visa.
14. *Araneus proximus*, conductor emboli cum parte processus phylloidis et emboli.
15. *Araneus cucurbitinus typicus*, conductor emboli cum apice emboli et processus phylloidis.
16. Eiusdem speciei epigyna desuper visa.
17. *Araneus proximus*, epigyna desuper visa.
18. *Araneus inconspicuus*, epigyna desuper visa exempli ad Bonnam lecti.
19. *Araneus displicatus*, epigyna desuper visa.

20. *Araneus cucurbitinus opisthographus*, epigyna desuper visa.
21. *Araneus alpicus*, epigyna desuper visa.
22. *Araneus croaticus* Kulcz., epigyna desuper visa.
23. *Araneus cucurbitinus opisthographus*, epigyna desuper visa.
24. *Araneus displicatus*, epigyna a parte posticâ visa.
25. *Araneus cucurbitinus typicus*, epigyna a parte posticâ visa.
26. *Araneus cucurbitinus opisthographus*, scapus cum partibus vicinis corporis epigynae.
27. *Araneus alpicus*, epigyna a parte posticâ visa (exempli staturâ parvâ excellentis).
28. *Araneus inconspicuus*, epigyna exempli typici a parte posticâ visa.
29. *Araneus proximus*, epigyna a parte posticâ visa.
30. *Araneus croaticus*, epigyna a parte posticâ visa.
31. *Araneus alpicus*, epigyna a parte posticâ visa.

-
13. M. T. BROWICZ m. t. **O funkcji wydzielniczej jądra komórki wątrobniej** (*Über die sekretorische Funktion des Leberzellkernes*). (*Sur la fonction sécrétoire du noyan des cellules hépatique*).

(Planche VIII).

Im Jahre 1897 (Über Befunde im Kerne der Leberzelle, welche für die sekretorische Funktion desselben sprechen. Anzeiger der Akad. d. Wissenschaften in Krakau, April), berichtete ich, daß in gewissen pathologischen Zuständen der Leber z. B. in Muskatnußlebern sowohl im Cytoplasma als auch im Karyoplasma der Leberzellen innerhalb scharf begrenzter Räume vorwiegend in Gestalt von Vakuolen aber auch manchmal in Räumen von länglicher Gestalt teils körniges, teils nadelförmig kristallinisches Pigment vorhanden ist. (Fig. 1). Dieses Pigment hielt ich damals irrtümlich für Gallenpigment, berichtigte aber diesen Irrtum in der Abhandlung über Kristallisationsphänomene in der Leberzelle (Anzeiger d. Akad. d. Wissenschaften in Krakau, April 1898), da ich zu der Ansicht gelangt bin, daß dieses Pigment zwar hämoglobinärer Herkunft, aber kein Gallenpigment ist. Sobald nämlich flüssiges Hämoglobin in den Geweben befindlich ist, ändert sich dasselbe unter dem Einflusse des Formalins, welches ich eben als Härtungsmittel gebrauche, so daß man mikroskopische Spuren von Hämoglobin in Gestalt von körnigem oder kristallinischem Pigment in den Geweben aufdecken kann. Ich bezeichnete das Formalin gleichsam als mikrochemisches Reagens auf das zur Zeit der Entnahme der Zellen und Gewebe zur mikroskopischen Untersuchung, in denselben vorfind-

bare flüssige, gelöste Hämoglobin; Kohert hat später (1899) diese kristallinischen Pigmentmassen, Formalinpigmentkristalle benannt (vide auch meine Publikation über die Einwirkung des Formalins auf das in den Geweben vorfindbare Hämoglobin, Virchows Archiv, Bd. 162, 1900).

Dieser Befund von Pigmentablagerungen innerhalb des Kernes der Leberzelle gab mir den ersten Anstoß zur Annahme, daß der Kern der Leberzelle an dem Sekretionsvorgange in der Leberzelle aktiv tätig ist.

In demselben Jahre (Über den Bau der Leberzelle. Anzeiger d. Akad. d. Wissenschaften in Krakau. Mai 1897) führte ich aus, daß manchmal in ikterischen Lebern neben sehr gewöhnlichen Gallenablagerungen im Cytoplasma der Leberzellen, ferner auch, obwohl sehr selten, in deren Kerne Galleinlagerungen vorgefunden werden, deren natürliche grüne Farbe ihre gallige Herkunft beweist (Fig. 2).

Dies bildete eine weitere Stütze für meine Annahme des aktiven Anteils des Leberzellkernes an den Sekretionsvorgängen in der Leberzelle.

Eine dritte Stütze dafür fand ich in den Bildern der normalen Leberzelle des normalen Hundes, hauptsächlich während der Verdauung, wo sowohl innerhalb des Cyto- als auch innerhalb des Karyoplasmas wohl erhaltene Erythrocyten, im Kerne dagegen und nur im Kerne auch Hämoglobinkristalle vorzufinden sind. (Fig. 3 und 4). (Wie und in welcher Form wird den Leberzellen Hämoglobin zugeführt? Anzeiger d. Akad. d. Wissenschaften in Krakau. Juni 1897).

Im Cytoplasma der Leberzelle habe ich nach intravenöser Injektion einer Hämoglobininlösung (Intussuszeption von Erythrocyten durch die Leberzelle. Anzeiger d. Akad. d. Wissenschaften in Krakau. Juli 1899), sowie nach der Transfusion fremdartigen Blutes beim Hunde (Über die Herkunft der amyloiden Substanz. Anzeiger der Akad. d. Wissenschaften in Krakau, 1901) im Cytoplasma der Leberzellenhauten von Erythrocyten in Vakuolen vorgefunden, welche teils wohl erhalten aussahen, teils ausgelaugt erschienen, teils zu hyalinen, mit Eosin, Pikrinsäure, Fuchsin färbbaren Kugeln zusammenflossen. Das Auftreten von Hämoglobinkristallen nur im Kerne der Leberzellen, obwohl im Cytoplasma Erythrocyten, teils vereinzelte, teils haufenweise in Vakuolen vorfindbar sind, deutet darauf hin, daß das Parenchym des Cytoplasmas anders auf die

Erythrocyten einwirkt als das Kernparenchym, daß die Wirkungsweise der beiden Parenchymarten anders gestaltet ist.

Eine vierte Stütze für die Annahme des aktiven Anteils des Kernes an den Sekretionsvorgängen in der Leberzelle lieferten mir Bilder nach intravenöser Injektion von Hämoglobinlösung. (Das mikroskopische Bild der Leberzelle etc. Anzeiger d. Akad. d. W. in Krakau. November 1898), wo einige Stunden nach erfolgter Injektion nach Formalinhärtung metamorphosiertes Hämoglobin in Gestalt von braunschwarzen Pigmenthaufen im Cyto- als auch im Karyoplasma vorfindbar war. (Fig. 5.)

In letzter Zeit fand ich noch eine neue und, meiner Ansicht nach, definitive Stütze für die Annahme einer Sekretionstätigkeit des Kernes der Leberzelle.

In gewissen Fällen von Ikterus neonatorum — denn nicht in allen Fällen von Ikterus neonatorum findet sich dasselbe mikroskopische Bild — erscheinen im Lebergewebe teils tafelförmige, teils nadelförmige Bilirubinkristalle. Dieselben finden sich auch in anderen Zellen und Geweben des Organismus, wo das Bilirubin mit dem Blute hineingelangt, im Blute, im Harne, was ja schon längst hinlänglich bekannt ist.

Die Bilirubinkristalle findet man im Lebergewebe zwischen den Erythrocyten in den intraacinösen Blutcapillaren, in den Leukocyten, im Cytoplasma der Leberzellen. Ich habe dieselben aber auch in den Kernen der Leberzellen vorgefunden¹⁾ (Fig. 6).

Die Lage des Bilirubinkristalls innerhalb des Kernparenchyms unterliegt keinem Zweifel. Ich habe im Kerne der Leberzelle, innerhalb welcher keine Gallenablagerungen, kein Bilirubinkristall gelegen war, gewöhnlich nur einen Bilirubinkristall von charakteristischer Form und Farbe beobachtet, selten zwei Kristalle, welche manchmal kreuzweise über einander gelagert waren. In zweikernigen Leberzellen befand sich gewöhnlich der Bilirubinkristall nur in dem

¹⁾ Am leichtesten gewahrt man dieselben an ungefärbten Gefrierschnitten von frischen oder in Formalin gehärteten Leberstückchen, welche man z. B. in einer Lösung von Kali acticum untersucht. In gefärbten, mit Alkohol und Xylol behandelten Schnitten verschwinden dieselben leicht, da Bilirubin sich etwas in Alkohol, leicht in Xylol löst. Wenn man den Kern z. B. mit Hämatoxylin färbt, behutsam den Schnitt mit Alkohol entwässert und mittelst irgend eines Öles aufhellt, so erscheint mitten im blaugefärbten Kern der ziegelrote Bilirubinkristall sehr prägnant.




1.



2.



3.



4.



5.



6.



einen Kerne, selten waren in beiden Kernen Bilirubinkristalle zu sehen. Das Erscheinen von Bilirubin, eines Produktes der Leberzelle, in Form von Kristallen, innerhalb des Kernparenchyms der Leberzelle, bildet einen definitiven Beweis für den aktiven Anteil des Leberzellkernes an den Sekretionsvorgängen in der Leberzelle, beweist die Richtigkeit meiner einer Reihe von Kernbefunden entnommenen Schlußfolgerungen. Der Kern der Leberzelle produziert Gallenfarbstoff, wozu das Material das Hämoglobin liefert, dessen Hineingelangen in den Kern ich vorhin sowohl in der menschlichen Leberzelle in gewissen pathologischen Zuständen der Leber als auch experimentell in der Leberzelle des Hundes dargetan habe. Der Kern der Leberzelle bildet daher sowohl ein Fortpflanzungs- wie auch zugleich ein Sekretionsorgan der Leberzelle.

14. M. M. P. RUDZKI m. c. Uwaga o rozprawie p. Denizota pod tytułem „Teorya ruchu względnego etc.“ (*Bemerkung zum Aufsatz des Herrn Denizot unter dem Titel „Theorie der relativen Bewegung etc.“*¹⁾). (*Remarque sur le mémoire de M. Denizot „Sur la théorie du mouvement relatif etc.“*)

Im zweiten Teil dieses Aufsatzes, wo Herr Denizot die allgemeinen Formeln auf das Foucaultsche Pendel anwendet, befindet sich ein Mißverständnis: Herr Denizot verwechselt nämlich die Richtung nach dem Erdzentrum mit der Vertikale, was aus dem Texte und der Zeichnung auf S. 468 sofort ersichtlich ist.

Weiter sind die für das Foucaultsche Pendel gültigen Gleichungen 14* auf Seite 472 fehlerhaft.

Diese Gleichungen, wenn man noch die Komponenten der Tension des Fadens hinzufügt, wie es Herr Denizot auf derselben Seite richtig verlangt, lauten folgendermaßen:

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= \omega^2 \sin^2 \varphi x + \omega^2 \cdot \sin \varphi \cos \varphi z - 2\omega \sin \varphi \frac{dy}{dt} - \frac{Rx}{l} \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \omega^2 y + 2\omega \sin \varphi \frac{dx}{dt} + 2\omega \cos \varphi \cdot \frac{dz}{dt} - \frac{Ry}{l} \\ \frac{d^2z}{dt^2} &= g + \omega^2 \cos^2 \varphi z + \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi x - 2\omega \cos \varphi \frac{dy}{dt} - \frac{Rz}{l}.\end{aligned}$$

¹⁾ Dieses Bulletin. Dezember 1904 (pp. 449 — 485).

Nehmen wir den denkbar einfachsten Fall, nämlich denjenigen, wo das Pendel sich in Ruhe befindet. Indem Herr Denizot den Anfangspunkt der Koordinaten im Aufhängepunkt des Pendels annimmt [Seite 469 unten] und die Länge des Pendels mit l bezeichnet, so sind die Koordinaten des Pendels:

$$x = 0 \quad y = 0 \quad z = l$$

während die Geschwindigkeiten und Akzelerationen verschwinden. Dann gibt aber die erste der Gleichungen 14*

$$\omega^2 \sin \varphi \cos \varphi \cdot l = 0$$

Also muß die Länge des Pendels gleich Null sein. Dieser Widerspruch reicht hin, um zu beweisen, daß die Gleichungen 14* fehlerhaft sind.

Selbst wenn man der Absicht des Verfassers entgegen die Bestimmung beseitigt, daß die z Achse in die Richtung der Vertikale fällt, so kann man doch [den Fall der Ruhe vorausgesetzt] die Gleichungen 16* auf keine Weise erfüllen, ohne zu physisch unmöglichen Schlüssen zu gelangen. Ebenso fehlerhaft sind die auf Seite 482 stehenden, auf gleiche Weise wie die Gleichungen 14* abgeleiteten Gleichungen 26*, welche den Seitendruck der Eisenbahnzüge auf die Schienen ausdrücken sollen. — Ich könnte noch andere Widersprüche hervorheben, doch erscheint mir eine ausführliche Auseinandersetzung überflüssig, sobald auf den Fehler in den Gleichungen hingewiesen wird.

00. M. K. WÓJCIK. Dolny oligocen z Riszkanii koło Użoka. (*Das Unteroligocän von Riszkania bei Uzsok*). (*Infraoligocène de Riszkania près de Uzsok*). Mémoire présenté par M. Vl. Szajnocha m. c.

Im Jahre 1879 hat M. Vacek bei den für die k. k. geologische Reichsanstalt von ihm in den Mittelkarpaten ausgeführten geologischen Aufnahmearbeiten an zwei Punkten bei Alsò-Verecske und bei Uzsok oligocäne Faunen gefunden¹⁾. Die in Alsò-Verecske bei Volocs in Ungarn, unweit der galizischen Grenze gefundene Fauna hat er als unteroligocän, und die Mergelschiefer, in denen sie angetroffen wurde, als Äquivalent der Menilitschiefer bestimmt. Die

¹⁾ Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt. 1881.

andere Fauna dagegen, die von Riszkania bei Uzsok, hatte er zwar ebenfalls als oligocän, aber als jünger als die Verecskaer bestimmt. Die Uzsoker fossilienführenden Mergelschiefer samt den Magurasandsteinen, zwischen denen dieselben auftreten, hat Vacek über die Schichten von Verecske, beziehungsweise über die Menilitschiefer als höchsten Horizont in den galizischen Mittelkarpaten gestellt, ohne jedoch das Alter näher zu präzisieren.

Noch vor Vacek wurde die Gegend von Uzsok von K. Paul¹⁾ geologisch durchforscht. Dieser hatte von dem in den Mittelkarpaten die Grenzkämme bildenden, von ihm Magurasandstein benannten, Komplexe den Sandstein von Uzsok als einen besonderen Horizont abgetrennt. Auf Grund des Einfallens dieses Sandsteines unter die Melettaschiefer hat er ihn als den ältesten tertiären Komplex der Mittelkarpaten bestimmt und dem Eocän zugeteilt.

Während meines zweimaligen Aufenthaltes in Uzsok im Jahre 1902 und 1904 gelang es mir die Stelle, wo Vacek seine Fossilien gesammelt hatte, aufzufinden. Ich habe dann nicht nur die kalkigen Einlagerungen daselbst ausgebeutet, sondern auch aus den Schiefen selbst durch Schlemmen ziemlich viele Foraminiferen erhalten, von denen die Nummuliten und Orbitoiden am zahlreichsten und am besten erhalten sind.

Ich hoffe die Bearbeitung dieser Fauna in nächster Zeit abschließen zu können und sie wird, zusammen mit analogen Faunen anderer Fundpunkte der Mittelkarpaten, als Fortsetzung der im Jahre 1903 begonnenen paläontologischen Bearbeitung des tertiären Flysches der Karpaten²⁾ veröffentlicht werden.

Der Erhaltungszustand der Fossilien aus Riszkania ist nicht besonders gut, manche jedoch in einer, von Vacek übersehenen kieselig-mergeligen Schicht gefunden Formen sind verhältnismäßig gut erhalten, so daß ihre richtige Bestimmung keinem Zweifel unterliegt. Diese Formen ermöglichen neben den Nummuliten und den Orbitoiden eine genaue Altersbestimmung der Schichten.

Herr M. Vacek, Vizedirektor der geologischen Reichsanstalt in Wien hatte die große Liebenswürdigkeit mir das von ihm gesammelte und in der geologischen Reichsanstalt aufbewahrte Material von Uzsok und Verecske zur Durchsicht anzuvertrauen. Hierdurch wurde

¹⁾ Ibidem 1870.

²⁾ Rozprawy Akad. Umiej. Kraków 1903.

es mir ermöglicht, alle bislang in den Grenzgebieten der galizischen Mittelkarpaten gefundenen Fossilien mit der unteroligocänen Fauna Norddeutschlands und anderer Gegenden zu vergleichen. Durch ein mir von der Akademie der Wissenschaften zu Krakau gewährtes Stipendium wurde ich in die Lage versetzt, diese Vergleichungsstudien unter der persönlichen Leitung des Herrn Geheimrat Professor Dr. A. v. Koenen im Geologischen Institute zu Göttingen auszuführen, wobei Herr Geheimrat v. Koenen die Güte hatte, mich in liebenswürdigster Weise zu unterstützen. Diesen beiden Herren möchte ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank für die Unterstützung und Förderung meiner Arbeit aussprechen.

Die aus Riszkania bestimmten Arten sind folgende:

Foraminifera ¹⁾.

- Truncatulina grossaerugosa* Gümb.
 „ *sublobatula* „
Pulvinulina bimammata „
 „ *rotula* Kaufm.
Operculina ammonica Leym.
 „ *granulata* „
Heterostegina reticulata Ritüm.
 „ *carpatica* Uhlig.
Nummulites Fichteli Michel.
 „ *vasca* Joly et Leym.
 „ *Boucheri* Harpe.
 „ *budensis* Hantk.
Orbitoides papyracea Boubée.
 „ *aspera* Gümb.
 „ *dispansa* Sow.
 „ *applanata* Gümb.
 „ *tenuicostata* „
 „ *stellata* Archiac.
 „ *stella* Gümb.

Brachiopoda.

- Thecidium mediterraneum* Risso.
Terebratula Delbosii Arch.

¹⁾ Von den Foraminiferen werden nur die charakteristischen Formen aufgezählt.

Lamellibranchiata.

- Ostrea (Gryphaea) Queteleti* Nyst.
 „ *prona* Wood.
Cardium anomale Math.
 „ *cf polyptyctum* Bay.
 „ *fallax* Michel.
 „ *depressum* Koen.
Cyrena semistriata Desh.
Cytherea incrassata Lamk.
 „ *Villanovae* Desh.
 „ *cf splendida* Mer.
 „ *cf lugensis* Fuchs.
Panopaea angusta Nyst.

Scaphopoda.

- Dentalium exiguum* Koen.
 „ *ellipticum* „

Gastropoda.

- Natica crassatina* Lamk.
 „ *cf angustata* Nyst.
 „ *cf achatensis* Koninck.
Turritella sulcifera Desh.
 „ *infundibulum* Koen.
Melania striatissima Zitt.
Bittium plicatum Brug. v. *multinodosum* Sandb.
Eburna caronis Brognt.
Fusus elongatus Nyst.
Marginella conoides Koen.
Cylichna interstincta „
Valvatina umbilicata Bornem.

Aus dem Vergleiche der Fauna aus Riszkania mit der vicentischen ist zu ersehen, daß von den Foraminiferen alle in Riszkania massenhaft auftretenden Orbitoiden (7 Arten) und Nummuliten (4 Arten) in Norditalien für die Priabonaschichten charakteristisch sind. Von anderen oben aufgezählten Foraminiferen fehlen in Italien nur *Truncatulina sublobatula*, *Pulvinulina bimammata*, *P. rotula* und

Heterostegina carpatica, diese aber sind aus den karpatischen unteroligocänen Schichten, namentlich aus Wola Iużańska u. a. wohl bekannt.

Von denjenigen Mollusken, deren richtige Bestimmung keinem Zweifel unterliegt, sind folgende nur aus den Priabona-, bzw. aus anderen unteroligocänen Schichten bekannt: *Ostrea Queteleti*, *O. prona*, *Cytherea Villanovae*, *Marginella conoides*, *Turritella sulcifera*, *T. infundibulum*, *Cylichna interstincta*, *Dentalium ellipticum*, *D. exiguum*. Die anderen Arten sind zwar auch aus anderen oligocänen Horizonten, bzw. aus dem Obereocän bekannt, in den Priabonaschichten kommen sie jedoch ebenfalls vor. Diese sind: *Cytherea incrassata*, *Cardium anomale*, *Natica crassatina*, *N. angustata*, *Fusus elongatus*, *Cerithium plicatum*, *Eburna caronis*. Auch die übrigen Formen, von denen jedoch nicht alle, wegen des schlechten Erhaltungszustandes, sicher bestimmt werden konnten, dürften gleichfalls nur dem Unteroligocän angehören, so daß von 27 Mollusken 15 mit den Priabonaschichten, 13 mit norddeutschem Unteroligocän gemeinsam sind. Nur eine der gefundenen Arten (*Valvatina umbilicata*) ist bislang nur aus dem Mitteloligocän bekannt geworden. Dies jedoch braucht nicht zu verwundern, da diese Form wegen ihrer kleinen Dimension sehr leicht zu übersehen ist.

Die Fauna von Riszkania ist also unzweifelhaft unteroligocänen Alters.

Von Alsò-Verecske wurden folgende Formen bestimmt:

Lamellibranchiata.

- Ostrea prona* Wood.
- Cardita Laurae* Brogn.
- " *latesulcata* Nyst.
- Cardium fallax* Michel.
- " *anomale* Math.
- Cyrena semistriata* Desh.
- Cyprina* sp.
- Cytherea Villanovae* Desh.
- " *incrassata* Sow.
- " *brevis* Fuchs.
- Tellina* sp.
- Pholadomya* cf. *Puschi* Goldf.

Scaphopoda.*Dentalium exiguum* Koen.**Gastropoda.***Turritella sulcifera* Desh." *carinifera* "" *granulosa* "" *conoidea* Rouault." *planispira* Nyst.*Bittium plicatum* Brug. v. *multinodosum* Sandb." " " v. *papillatum* "*Potamides margaritaceum* Brocecki v. *marginatum* Brocecki." *elegans* Desh." *coniunctum* Desh.*Aporrhais tridactylus* A. Braun.*Cylichna interstincta* Koen.

Aus dem Vergleiche dieser Fauna mit der Fauna von Riszkania ist ihre Ähnlichkeit so sehr ersichtlich, daß mir ihre Trennung, wie sie von Vacek vorgenommen wurde, nicht begründet erscheint. Im Gegenteil ist die Tatsache, daß die Schichten mit massenhaftem Auftreten von Cerithien und Ostreen, was Vacek als Charakteristikum für die Schichten von Verecske angesehen hatte, auch bei Riszkania vorkommen, eher ein Beweis dafür, daß meine Identifizierung der Faunen zu Recht besteht. Der einzige Unterschied besteht darin, daß in den kalkigen Schichten in Riszkania *Natica crassatina* und andere Arten dieser Gattung ziemlich zahlreich auftreten, während sie in Verecske bisher gar nicht gefunden wurden, obgleich auch dort die kalkige Einlagerung vorkommt.

Wenn es sich um eine spezielle stratigraphische Gliederung des fraglichen Horizontes handeln sollte, so dürfte uns zu diesem Zwecke Riszkania allein vollständig genügen. An dem dortigen Berge der NW. von Uzsok liegt und zum Grenzkamme zwischen Galizien und Ungarn gehört, ist folgendes Profil von oben nach unten zu sehen:

2—5 m mächtiger fein- oder grobkörniger, massiger Sandstein mit viel Muskowitblättchen (typischer Magurasandstein),

10—15 m dunkler Tonmergelschiefer mit vielen Nummuliten und Orbitoiden,

30—50 cm kieseligmergelige Schicht mit Cerithien und Ostreen,

10—20 m nicht aufgeschlossen,

10—15 m Kalksteinschichten und zwar:

a) sandiger Kalkstein mit vielen Austern,

b) fast nur aus Muschelresten bestehender Kalkstein,

c) dichter sehr harter Kalkstein mit vielen Foraminiferen, besonders aus der Gattung *Miliola* und *Orbiculina*.

Die beiden untersten Schichten *b.* und *c.* enthalten neben sehr vielen schwer herauszubekommenden und demgemäß auch schwer bestimmbareren Molluskenschalen *Natica crassatina* und andere Formen dieser Gattung, welche nur hier vorkommen und in *c.* am häufigsten sind.

10—15 m nicht aufgeschlossen,

zu unterst Sandstein wie oben.

Der ganze Komplex fällt konkordant leicht gegen NO. ein.

Die zwischen beiden Sandsteinbänken auftretenden fossilienführenden Schichten gehören auf Grund der oben aufgezählten Fauna dem *Priabonien* an.

Welches Alter haben nun die Sandsteine?

Vacek hat die Uzsoker Schiefer als eine Einlagerung zwischen beiden Magurasandsteinbänken aufgefaßt. Hierdurch bestritt er die Ansicht Pauls, welcher in der Gegend von Uzsok 10 Jahre vor ihm geologisch gearbeitet, den dortigen Sandstein von den in den mittelkarpatischen Grenzkämmen mächtig entwickelten Magurasandsteinen abgetrennt und denselben auf Grund des Einfallens unter die Melettaschiefer dem Eocän zugezählt hatte.

Die Meinung Pauls kann dadurch erklärt werden, daß er das Einfallen des Sandsteines unter die dunklen Mergelschiefer bemerkte, die er mit Recht als Äquivalent der Menilitschiefer auffaßte. Diejenige Stelle dagegen, die Vacek gefunden hatte, das heißt den Abhang des Rískaniaberges, wo über den Schiefer die obere Sandsteinpartie liegt, hat Paul offenbar nicht gesehen und wodurch er den Sandstein der ganzen Gegend dem Eocän zurechnete.

Vacek fand dagegen, daß hier zwei Sandsteinbänke auftreten. Hat er nun aber die zwischen denselben befindlichen Schiefer nur als eine Einlagerung, und die beiden Sandsteine als einen Komplex des Magurasandsteins mit Recht betrachtet? Oder hat er vielleicht den stratigraphischen Wert der Schiefer zu gering geschätzt? Sollte man den unteren Sandstein nicht eher als einen besonderen Komplex betrachten?

Vor der endgiltigen Entscheidung dieser Frage muß man indessen nicht nur die Gegend von Uzsok, sondern auch den ganzen Grenzkamm und die anliegenden Teile der Mittelkarpaten genauer durchstudieren. Vorläufig ist nur das Eine sicher, daß die Schichten deren Alter paläontologisch bewiesen wurde, sich in drei oben aufgezählte Stufen teilen lassen. Diese sind:

a) Mergelschiefer mit *Nummulites Fichteli*, *N. vasca*, *N. Boucheri* und mit Orbitoiden.

b) die Schicht mit *Ostrea prona* und *Cerithium plicatum*.

c) Kalksteine mit *Miliola*, *Orbiculina* und *Natica*.

Ferner ist es auch sicher, daß sowohl die untere, als auch die obere Sandsteinbank konkordant über, bzw. unter den fossilienführenden Schichten lagert.

Der Vergleich des Profils von Riszkania mit den vicentinischen Verhältnissen ergibt folgende Analogien: In Oberitalien folgt auf die Schichten von San Giovanni Ilarione bzw. von Ronca der Priabonakomplex, der sich in drei Hauptstufen teilen läßt. Zu unterst liegen die Schichten von Granella, Grancona-Lonigo. Es sind Brackwasserabsätze mit massenhaftem Auftreten von *Cerithium plicatum*, *C. margaritaceum*, *C. elegans* = *vivarii*, *C. coniunctum* = *diaboli*, *Cyrena semistriata*. Darüber folgen die Kalke und Mergel mit *Nummulites intermedius*, *N. Fichteli*, *N. vasca*, *N. Boucheri* und zahlreichen Orbitoiden. Über den Mergeln mit *Nummuliten* und Orbitoiden kommt schließlich der Bryozoenmergel von Val di Lonte und Brendola vor. Dieser Mergel bildet schon den Übergang zu den Schichten von Laverda und Sangonini, die schon *Ligurien* angehören und den norddeutschen Unteroligocänschichten entsprechen.

In Riszkania bildet die Basis des fossilienführenden Komplexes die kalkige Schicht, in der neben den oligocänen noch in den Roncaschichten auftretenden Formen vorkommen, wie *Cardium anomale*, *C. polyptyctum*, *Eburna caronis*. Dieser Kalkstein bildet also das tiefste *Priabonien*, in welchem sich noch einige Eocänsuren erhalten haben.

Darüber folgen Schichten mit rein oligocäner Fauna, die auf ähnliche Ablagerungsverhältnisse deutet, wie im Vicentinischen. Da hier eine Menge von brackischen Cerithien, *Cyrena semistriata* u. a. neben marinen Formen auftritt, dürften die Schichten, vom Kalkstein mit Miliolen, Orbiculinen und *Natica* bis zum kieseligen Mergel mit Cerithien, in einem sich immer mehr aussüßenden Meere ab-

gelagert sein. Alle diese Schichten dürfen den brackischen Schichten von Granella, Grancona-Lonigo, also dem unteren *Priabonien* entsprechen.

Über der Schicht mit *Ostreen* und *Cerithien* folgen die Mergel mit *Nummulites Fichteli*, *N. Boucheri*, *N. vasca* und den Orbitoiden. Diese Mergel entsprechen den vicentinischen Mergeln mit denselben Nummuliten und Orbitoiden, also den mittleren Priabonaschichten.

Über diesem Nummuliten- und Orbitoidenmergel liegt konkordant der Sandstein. Er vertritt also bei uns die oberen Priabona- oder höchstens die Sangonini-Schichten, jedenfalls noch das Unteroligocän.

Im Liegenden der fossilienführenden Schichten tritt wieder konkordant ein Sandstein auf, welcher auf Grund der untersten Kalksteinschichten, wenn nicht noch dem untersten *Priabonien*, so doch sicher den Ronca-Schichten, also dem Obereocän entspricht.

Es braucht gar nicht betont zu werden, daß Parallelisierung so weit von einander entfernter tertiärer Bildungen sehr oft nur zu fraglichen stratigraphischen Resultaten führt. Die Ähnlichkeit der Faunen ist ja öfters mehr von den Lebensverhältnissen (Faciesunterschieden), als von einem geringen Altersunterschiede abhängig. Dafür mag als Beweis angeführt werden, daß dieselben Priabonaschichten z. B. in Siebenbürgen etwas anders entwickelt sind, als im Vicentinischen und bei uns.

Die Basis derselben bildet dort der obere Grobkalk von Klausenburg, der auf dem Süßwasserkalke liegt, selbst aber rein marin ist. Es ist ein Kalkstein, der neben der Fauna, die ihn schon dem *Priabonien* zuzählen läßt, noch eine ganze Reihe Formen enthält, die denen des Pariser Grobkalks nahe stehen. Diesem Kalksteine entspricht unsere unterste *Miliola*- und *Orbiculina* Kalkschicht, welche auch Ronca-Formen enthält. Darüber folgen in Siebenbürgen mergelige Kalke mit *Nummulites intermedius* und zahlreichen Mollusken. Dies dürfte dem oberen Teile des unteren *Priabonien* und dem *Intermediusmergel* des Vicentinischen und unseres Profils entsprechen. Schließlich folgt in Siebenbürgen der Bryozoenmergel, der sowohl dort, als auch im Vicentinischen den oberen Teil des *Priabonien* bildet, der aber in *Riszkania* gar nicht entwickelt, erscheint. An seiner Stelle tritt die obere Partie des Sandsteines auf.

Wenn in *Riszkania* kein Äquivalent des Bryozoenmergels auftritt, so finden wir denselben doch am Nordrande der Mittelkarpaten und zwar in den Schichten von *Kruhel maly* stark entwickelt. Diese

Schichten ¹⁾ enthalten eine rein marine Fauna, denen die von Foraminiferen auf die Intermediusschichten und Bryozoenmergel hinweisen; die Mollusken sogar der Sangonini-, bzw. der Lattorfer Fauna entsprechen. Wir haben also in den Schichten von Kruhel nicht nur das ganze Priabonien, mit Ausnahme der unteren brackischen Schichten, sondern auch höchst wahrscheinlich Ligurien entwickelt. Da in Riszkania das oberste Priabonien bzw. Ligurien als Magurasandstein entwickelt ist, so erweist sich hiermit die zeitliche Äquivalenz der beiden in Rede stehenden Komplexe; des Nummulitenmergels und des Magurasandsteines einerseits, der Schichten von Kruhel (Fukoidenmergel) anderseits.

Zum Schluß wiederhole ich nochmals, daß sowohl das Profil von Riszkania, als noch mehr die Vergleichung desselben mit den Schichten von Kruhel mały, positiven Wert erst nach eingehendem Studium mehrerer Punkte, und zwar nicht nur der Faunen, sondern auch der Lagerungsverhältnisse der fossilienführenden Schichten bekommen können.

¹⁾ Rozprawy Akad. Umiej. Kraków 1903.

Göttingen im März 1905.

Nakładem Akademii Umiejętności.

Pod redakcją

Członka delegowanego Wydziału matem.-przyr., Dra Leona Marchlewskiego.

Kraków, 1905. — Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem J. Filipowskiego.

6 Kwietnia 1905.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.

Third block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.

Sixth block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.

Seventh block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.

Eighth block of faint, illegible text, continuing the bleed-through from the reverse side.