



5.665.

Séance du 5 Janvier 1903.

J. L. M. ŁOMNICKI. *Elater Wiśniowskii*, nov. sp. S. 11—12.

In den miocänen Tonen bei Myszyn, südlich von Kolomea in Ostgalizien wurde von Dr. Wiśniowski unter Abdrücken von Blättern auch ein Teil der rechten Flügeldecke eines neuen Schnellkäfers gefunden. Das dem Verfasser mitgeteilte Unicum, obwohl nicht besonders gut erhalten, liess doch eine Determination zu.

Das Tier gehört zu einer dem recenten *Elater ferrugatus* Lac. verwandten Art, von welcher es doch durch mehr ebene Streifenzwischenräume abweicht. Es bewohnte wahrscheinlich die Laubwälder am Strande des obermiocänen Mittelmeeres. Die lateinische Beschreibung des Bruchstückes lautet:

E. elytris elongatis, subdepressis, apicibus subacutis, angulis humeralibus et scutellaribus obtusis et rotundatis; unaquaque striis punctatis bene adhuc servatis septem ornata; striis prima et secunda usque ad apicem liberis, tertia et quarta ante apicem, quinta cum sexta etiam pro-

apl 66
sep 1644
22.549 MP

pius ad apicem coniugatis; striarum interstitiis planis et paribus, irregulariter rugulosis. Long. elytrae: 9 mm., lat.: 2.25 mm.



Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

Explicatio figurarum.

1. Elytrae in argilla vestigium verae magnitudinis.
2. Elytra separatim delineata. Diam. $\times 63$.
3. Imago reficta. Diam. $\times 5$.



Cracovie, 1903. — Imprimerie de l'Université Jagellonne.

