

Nr 26/89

Nazwisko

Wiek 25 lat

Dzień śmierci

10.05.1989

Sekcjonowany 12.05.  
u ..... godzin 89.

po śmierci

Sekcja mózgu:  
8.07.1989

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

Użyte metody barwienia

HE, Heidenhain

Mikrofotografie, rysunki

Rozpoznanie kliniczne

AIDS. Zapalenie płuc, tbc, dementio complex

Rozpoznanie anatomiczne

Rozpoznanie histologiczne

Brak zmian swoistych dla zakażenia wirusem  
HIV. i zakażeń oportunistycznych

Zespół p. 2 zam 2473 n. 6000

Nr **26/89**

Nazwisko

Wiek **25 lat**

Dzień śmierci  
**10.05.1989**

Sekcjonowany **12.05.**  
w ..... godzin **89.**  
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

Utrwalony materiał:  
Alkohol                      Formol

Użyte metody barwienia  
**HE, Heidenhain**

Mikrofotografie, rysunki

Rozpoznanie kliniczne  
**AIDS. Zapalenie płuc, tbc, dementio complex**

Rozpoznanie anatomiczne

Rozpoznanie histologiczne  
**Brak zmian swoistych dla zakażenia wirusem  
HIV. i zakażeń oportunistycznych**

Zespół p. 2 zam 2473 n. 6000

\_\_\_\_\_ a lat 25  
zmarł 10. V. 89.  
rozpoznanie AIDS

Zapalenie płuc (TBC- quiliba)  
pneumocystis carini?  
Hiedokm stosi

kael. zakażenie grzybicze  
(candida albicans)

Obniżenie T4 pomierz OB  
OB 160/?

kael. psychiatry

Orbowski o rozwoju paranooidalnym

p. Decent poinformowała, że nastąpił  
kolejny zgon.

# PROTOKÓŁ SEKCYJNY Nr 7.

Sekcję wykonano w ..... godzin po śmierci

L. ks. gł. 684

Pobył w szpitalu od 6.04.89 do 10.05.89

Oddział X 513

Data sekcji 12.05.89.

Nazwisko i imię .....

Wiek 25 Płeć m. Zawód .....

Rozpoznanie kliniczne AIDS.

Zapalenie płuc Tbc.  
Demencja kompleks.

Rozpoznanie anatomopatologiczne

Wzrost wysoki odżywianie słabnie budowa prawidłowa.

Włosienie gładki ciemny, ciemny azur płciowy typ męski

Skóra brzośco-cielista, tkanka tłuszczowa bardzo słaba, wzmocn.

Czaszka symetryczna, średnio-wielkość

Opony

Przysadka  
Podstawa mózgu  
mózg w całym zakresie

Zakręty

Komory

Ośrodki podkomorowe

Kora zakrętów

Most, mózdzek i rdzeń przedłużony

nie stwierdzono.

Szyszynka

Mięśnie

Piersi

Jama brzuszna

zwężona ok. 1500 ml stałego młodego pyłu, pękniętego, wstępa schroniona pod prawym łukiem żebrowym; śledziona wystaje na 2 palce spacji między łukami żebrowymi, wzdłuż okolicy brzośce w 1/2 w. wątroby, do średnicy 1 cm. listki otrzewnej surowej i jędrzej, surowo-świeżej, w drobnych kawałkach, c. g. l.

Przepona

Klatka piersiowa

symetryczna, średnio-większa, listki międzyżebrowe <sup>prężne</sup>

Sródpiersie

średnio-większe 3 palce, trójlistkowy, wzdłuż okolicy brzośce w 1/2 w. wątroby, do średnicy 2 cm.

Grasica

nie stwierdzono.

Oplucne

w obu płucach po ok. 600 ml młodego, pękniętego pyłu, kilka listki surowo-świeżej otrzewnej, w drobnych kawałkach, c. g. l.

Tarczycy

dwupłatowa, symetryczna, wzdłuż okolicy brzośce w 1/2 w. wątroby.

Gardło

nie stwierdzono surowo-świeżej, c. g. l.

Język

Migdałki

Przetyk

nie stwierdzono surowo-świeżej, w drobnych kawałkach, c. g. l.

Krtani

nie stwierdzono surowo-świeżej, w drobnych kawałkach, c. g. l.

Tchawica

Płuca podział na płaty zewnętrzny, wewnętrzny,  
migotliwy. Powiększenie wielkości stanowiący,  
wzrost stanowiący bardzo dobrym opuszczeniu,  
wielkości różna prosta, szczególnie liczący  
płata górny.

Oskrzela jedna silniejsza niż druga, szorstka

Węzły chłonne śródpiersia i wielkości telowicy średniej do

Węzły chłonne wnek płucnych tej, stan - linowe, występuje z syfo-  
typu opuszczeniu

Serce wrodzone niedokrwienie ok. 150ml standardowego, miękkie  
i tępe przy. Ciężkie i umiarkowane c.p.t. Liczba  
serek utworzonej przez dwie komórki. Rejestracji są  
on przesłania krwi wylęgi: białych powiększa,  
wielkości różna i zastawki c.p.t. Ciężkie na  
płucny stan - bardzo czerwony, o wyjątku wódki  
kroju albo wloknięcia.  
Barwa wewnętrzna różowa, gładka.

Sledziona duża, tęczowa ciemna, rozpuszczona, na powierzchni  
wewnętrznej jądra i wielkości guzki stan - linowe do wielkości  
pełnego w stan - różowy, kładzie migotliwy.

Tętnica brzuszna jądra i części przewężonej, wady ciemne wady  
ok. 1,5cm stan - linowe, występuje, do wielkości

Zyla próżna dolna jedna wewnętrzna różowa, gładka.

Nadnercza małe rozmiarowe, kolor różowy, z przemieszczeniem  
liczący opuszczeniu, wielkości tęczowa od syfilla

Nerki w przemieszczeniu wielkości, tęczowa różowa z fioletem,  
przewężenie gładka, stan - różowy, z przemieszczeniem  
guzkami stan - linowymi, wielkości tęczowa od syfilla.

Pęcherz moczowy —

Zołądek

blona sluzowa swaro-niowa, mucnie popadlowa.

Dwunastnica

" podsluzowa zotkaj.

Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe - dwule

mu.

Trzustka

mu.

w pliscy wagi, bliscy seryj pscieny zotkaj, swaro  
zotkaj serc siodowy 115cm

Wątroba

mu, ponemluia gdules, forebla icula i popetycyin

mu, wcllioni icula ad sypitli. swaro swaro

Jelita

zotkaj, wclli, o sypuliu swaro swaro

swartri wyka, blona sluzowa swaro-niowa

Narządy płciowe

Węzły chłonne obwodowe

Naczynia i nerwy obwodowe

Kości

Stawy

Rdzeń

Badania histopatologiczne Lp.

Epicrisis

Lekarz dokonujący sekcje

*[Signature]*