

Nr 27/66

Nazwisko

Wiek

34

Dzień śmierci

25.I.66

Sekcjonowany

w 24 godzin  
po śmierci

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

*Pusto 123*

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. płąt skroń z ogniskiem
2. kora czołowa

Użyte metody barwienia

parafina: krezyl, H-E  
v. Gieson.

Mikrofotografie, rysunki

K. Staszewska

Rozpoznanie kliniczne

Choroby kesonowa Padaczka. Krwotok podpajęczynówkowy /podejrzenie na krwiak śródmózgowy/

Rozpoznanie anatomiczne

Malformatio vascularis in regione temporalis dextri cum haemorrhagia in. reg. temporo-parietooccipitalis hem.dextr.

I a

Rozpoznanie histologiczne

Haemangioma arterio venosum in reg. lobi temporalis dex. Haemorrhagia recidivans eiusdem regionis. Encephalopathia anoxaemica cum oedema cerebri. W oponach i korze mózgu w okolicy zwoju skroniowego górnego i środkowego prawego widoczna jest pomnożona ilość naczyń przeważnie dużych o rozszerzonym świetle, ścianach nierównomiernej grubości i zatartej warstwowości o krętym przebiegu. Budowa ścian wskazuje na charakter tętniczo-żylny tej nieprawidłowości naczyniowej. Są to naczynia o ścianie silnie zwłókniałej i dość cienkiej lub z bardzo przerostą warstwą wewnętrzną i rozwłóknioną błoną sprężystą i z obecnością złogów soli wapnia. W oponach naczynia często przylegają do siebie i tworzą ścianę wspólną miąższu zaś między nieprawidłowymi naczyniami leży martwiczo zmieniona

tkanka ze złogami hemosyderyny. Część przyrodziona płata skroniowego została zniszczona przez krwotek i w miejscu tym po wypadnięciu krwi pozostała jama wielk. 2x4,5cm. o brzegach postrzępionych z resztkami krwi, otoczona tkanką martwiczo zmienioną. W płacie czołowym drobne i średnie naczynia śródmiąższowe szczególnie w istocie białej mają ściany nieregularnej grubości, o zatartej strukturze z rozdętymi jądrami komórek, światło innych naczyń wypełnia sieć włóknika a ściana jest całkowicie zwłókniała. Zwłókniałe są też naczynia średnie i duże naczyniówki, odczynowe limfocytarne, limfocytarne-makrofagowe z zawartością hemosyderyny, które przemawiają za różnoczasowymi incydentami pochodzenia naczyniowego. Przestrzenie okołonaczyniowe są znacznie poszerzone. W korze są ubytki komórkowe a w istocie białej są i drobne ogniska martwicy niezupełnej.

Z. Ferens