

Nr 46/66

Nazwisko

Wiek 68 lat

Dzień śmierci

9.I.1966 r.

Sekcjonowany

w 24 godzin  
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

puszko 75

Utrwalony materiał:

Alkohol Formol

1. Tętniak

lcl 8

Użyte metody barwienia

parafina, V.G.-orce-  
ina, H-E.

~~P-479~~

Mikrofotografie, rysunki

Rozpoznanie kliniczne

Sip. Groch.

Arteriosclerosis universalis. Hyper-  
tensio arterialis. Haemorrhagia cere-  
bro-meningealis. Focus haemorrhagicus  
in reg. hemisphaerii sin. Myocardio-  
pathia arteriosclerotica in st. in-  
suff. circulatoriae et renum.

Rozpoznanie anatomiczne

Aneurysma a. posterioris cerebri. Hae-  
morrhagia cerebri subarachnoidealis.  
Arteriosclerosis cerebri gradu medio-  
cri. Oedema cerebri.

Rozpoznanie histologiczne

Ta

Aneurysma.

Jedyny preparat dotyczy tętniaka który  
przedstawia się w postaci naczynia o  
ścianie z zabrzeżnej struktury.  
Nie udaje się rozróżnić poszczególnych  
warstw ściany - nieliczne włókna  
mięśniówki są przemieszane z bardzo  
licznymi włóknymi kolagenowymi - zupeł-  
nie brak membrana elastica interma.  
Miejscami rozrzedzenie i zwyrodnienie  
widoczne w ścianach tętniaka.