

Rozpoznanie kliniczne

Tumor lobii temporalis sinistri
suspectio.

Rozpoznanie anatomiczne

Haemorrhagia subarrachnoidealis.
Oedema et hyperaemia cerebri. Encephalitis non classificata?

Rozpoznanie histologiczne

Meningoencephalitis lymphocytaria.
Haemorrhagia subarrachnoidealis recens.

W całym CUN wybitne cechy obrzęku i przekrwienia. Naczynia wszystkie nasiąknięte płynem wysiękowym, makrocytalnie wypełnione krwią, przestrzenie VR poszerzone, pograniczne naczyniowo-tkankowe rozluźnione. W przydatkach pojedynczych naczyń głównie w centrum semiovale nacieki zapalne z limfocytów z obecnością nieraz luźno leżącego barwika krwiopochodnego występującego czasami w makrocytalnych.

Nr 213/66

Utrwalony materiał:

Alkohol Formol

Nazwisko

1. półk. lewa
zwoje wcz.
2. półk. lewa
zwoje środkowe
3. półk. prz. zwoj. późne
4. półk. lewa
potyliczna
5. śródmózg.
6. most
7. opuszka
8. mózdzek

Wiek

44 lata

Dr. K. Wiśniewska

Dzień śmierci

29.XI.66 r.

Sekcjonowany

w.....24..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

pudło 90

Użyte metody barwienia

Mrozik: krezył-fiolet
Parafina: H-E, Holzer, Heidenhain

Mikrofotografie, rysunki

M. Raubo

Wybitna aktywacja i proliferacja gleju. Olegodendroglej obrzęknięty tworzy nieraz typy Penfieldowskie. W centralnej części nakrywkowej śródmózgówia krwinkotoki faliste oraz per diapedesim. W niektórych komórkach nerwowych kory chomogenizacja. W barwieniach mielinowych niewielkie spłowienie mieliny, głównie w częściach centralnych centrum semiovale. W przestrzeni podpajęczynówkowej w półkuli lewej w szczelinach zawoju skroniowo-potylicznego boczne oraz skroniowego środkowego krew świeża. Poza tym w oponach miękkich niewielkie nacieki zapalne z komórek limfocytarnych przy naczyniach lub luźno w tkance łącznej. Na ograniczonej przestrzeni w szczelinie między płacikami potylicznymi po stronie lewej

nacieki zapalne z limfocytów

8. mózdzek
7. opuszka
6. most
5. śródmózg.

Dr K. Wiśniewska

Dzień śmierci

29.XI.66 r.

Sekcjonowany

w 24 godzin

po śmierci

Ogłoszone lub demon-
strowane przez

przebieg

Mikrotopografia, rysunki
Parafina: H-E, Hol-
let
Mrozik: Krezyl-fio-
Użyte metody barwienia

M. Rapko

<http://rcin.org.pl>