

Nr 47/65

Nazwisko

Wiek 82 lata

Dzień śmierci

17.II.1965

Sekcjonowany

w 19.II.65 godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

Rudko 51

510

501

Utrwalony materiał:
Alkohol Formol

1. czoło lewe
2. centralna kora
3. zwoje podst.
4. kora ciem.
5. kora potyl.
6. śródmózg.
7. most
8. opuszka
9. mózdzek
10. zwoje podst. z ogniskiem

Użyte metody barwienia

- 1 - 9 Bielschowsky, Nissl, Perdrau, V.G.-orceina, Heidenhain. Holzer,
10 - V.G., Krezyl
Mikrofotografie, rysunki

W. Krzemiński

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis universalis.
Haemorrhagia cerebri meningealis.
Focus haemorrhagicus hemisphaerii. dex. et in regione pontis. Heplegia sinistra. Ophthalmoplegia interna. Myocardioopathia arteriosclerotica in stadio insuff. circ.
Bronchitis purulenti.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus vasogenes inveteratus in regione capsulae internae dextrae.
Status lacunaris. Arteriosclerosis mediocri gradu.

Rozpoznanie histologiczne

I 6

Encephalomalacia inveterata hemisph. dextra. Status lacunaris.
Senilitas.

W zwojach podstawy półkuli prawej w okolicy torebki wewnętrznej - podłużna stara jamka porozmięknieniowa. W otoczeniu tkanka bliznowaciejąca, bardzo liczne gemistiocyty i resztki makrofagów wypełnionych hemosyderyną.

W łupinie i wzgórzu typowy stan zatokowaty. W korze opustoszenia, szczególnie w warstwie III i V, a w barwieniu Biechowskiego

we wszystkich okolicach bardzo liczne, dobrze wysyczone plaki starcze.
Naczynia wykazują II stopień zmian miażdżycowych, najbardziej nasilonych w zwłazach podstawy i istocie białej półkul.

lek. med. H. Lewicka-Wysocka